







1 K.1

1.1.145

Pl. XV

Mangelia Ponticorum

Medica practica

Ennece 1695. T. II

JO. JAC. MANGET. M.D.
BIBLIOTHECA
MEDICO-PRACTICA
SIVE
RERUM MEDICARUM
THESAURUS
CUMULATISSIMUS

200
OMNES PRORSUS HUMANI CORPORIS
MORBOSÆ AFFECTIONES

Tum ARTEM MEDICAM in Genere, Tum CHIRURGICAM
in Specie, spectantes

ORDINE ALPHABETICO EXPLICANTVR
ET

PER CURATIONES, CONSILIA, OBSERVATIONES, & CADAVERUM
ANATOMICAS INSPECTIONES, tam hinc inde proprias, quàm à variis,
iisque præstantissimis Authoribus, Veteribus & Recentioribus petitas,
abundè imò & curiosè tractantur.

TOMUS SECUNDUS.



GENEVE,

Sumptibus JOANNIS ANTHONII CHOUËT.

M. DC. XCV.



MANUSCRIPT

BIBLIOTHE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

101112-21101



3433433

1873



BIBLIOTHECÆ MEDICO-PRACTICÆ LIBER SEXTUS.

De Morbis à Litera F incipientibus.

FAMES CANINA

Vid.

BVLIMVS.

FASCINATIO.



UAMVIS morbos à fascino paucos admodum credamus, ne tamen hoc caput sinatur vacuum, sicque, de aliquorum sententia Bibliotheca nostra manca videatur, quædam adducemus scilicet qualia

illa præfert Clariss. Wolfgang. Wedelius in Dissertationibus suis Medicis selectis, seu potius Excellentiss. Fridericus Kaseberg sub prædicti Clariss. Viri præsidio Disputationem Medicam inauguralem, de Morbis à Fascino, habens, quæ inter præmemoratas Dissertationes reperitur. Qui plura voluerit atque veritati maximè consona ea capite de Venenis videre poterit, ubi in specie quædam de Philtris traduntur. Qui verò innumera undiquaque excerpta legere exoptarit; consulat Martinum Del Rio Societatis Jesu Presbyter. qui Disquisitionum suarum Magicarum lib. 3. fusè de hisce disserit, ac præcipue Clariss. Johan. Christianum Frommann Doctor. Medic. Saxon. qui novissimè Tractatum admodum amplum de Fascinatione conscripsit, quo quicquid solidius (si modò quædam solida hac in re extent) ab innumeris Autoribus assertur, abundè adducit. Sic itaque Frideric. Kaseberg.

Vulgata est Paræmia: Homo homini Deus, homo homini Diabolus. *Zwei Menschen, animal politicum & sociabile est homo. societati verò nil magis velificatur ac concordia, quando alter alterum iuvat, solatur, tolerat.*

Beneficiis humana vita consistit & concordia, elogio Seneca. Nullo verò magis Deum æmulamur, quàm utrisque. Beneficia collocamus in alterum consilio & monitis; vox amici, vox Dei est. Præstamus eadem re ipsa, tùm

ordinaria consuetudine, tùm casibus fortuitis, servando hominem, velut *dei munus*, quod ajunt, succurrendo.

Ex concordia fluit amor, ex amore beneficia, utraque à Deo. boni omnis autore primo & unico, ut hæc quasi catena sit ab homine ad hominem, ab homine ad Deum tendens.

Sicuti verò homo in adiutorium mutuum generatus est. ira ira, odium, invidia, nocendi cupidus, in exitium. Quis verò enumerare valeat mille modos nocendi, quibus homo homini fit Diabolus? Non aperto solum id fit Marte, sed & furtivo scelere, adeo & inter cætera mortalitatis incommoda homo ipse est homini adversus, furis iræ, ambitionis & similibus agitatus.

Atat, non hoc solum homo homini fit diabolus, ipse suis relictus viribus, sed &, quod turpe dictu est, odiorum autorem, dæmonem in consortium non rarò adsciscit læsionis, ut jus, quod habet nullum, acquirat hoc ipso magis nocendi cupidissimus. Opera hinc pretium facturos nos putavimus, si morbos à fascino considerationi subiceremus. Hoc dum facimus, supremum ut annuat Numen, votorum nostrorum primum est.

Dari morbos à fascino.

Fascini acceptio licet latius pateat pro quacunque noxa, ab altero alteri, citra læsionem violentam, inducta, citra concursum causæ sublimioris, nobis tamen strictiori magis inpræsentiarum venit. Sic fascinari dicuntur vulgo vel ex invidia, vel ex laude, quorum illud oculis, hoc ore magis fit, *beruffen* vocant. De oculis res vel poetæ testimonio clara est, canentis: nescio quis teneros oculos mihi fascinat agnos. De ore id antidotus probat laudationi præservandi sine addita, quod præfiscine dixerim, q. d. ne noceat, unde & à *pharus*, dico derivari commode posset fascini vox.

Neque morbos à fascino illo naturali, si quod datur, ortos tractare animus est. Si quid enim oculus invidus, si lippitudine affectus nocet, similem morbum inferendo, id, nisi per accidens aliquando contingat, ab affluxu humo-

tum, vel effluviis vicinioribus, vel incusso terrore arcessendum potius est, cum pro diversis objectis variè moveatur Archeus, variè agitentur humores, & spiritus, nullibi quasi magis mobiles quàm in oculis.

Inde vero ad murmura sagarum, quæ prolata effectus morbosus aliunde damnosus insequatur, videtur vox deducta, sive id simplici fiat effato, seu additis ceremoniis aliis.

Non hoc nomine veniunt quoque morbi à Dæmone ipso omnipotentis Dei nutu inflicti, neque enim Jobi status morbosus à fascino dici vel potest, vel debet, sed potius, vel Ethnico præeunte Hippocrate nostro, iis in casibus veneramus, cuius acceptionem contra mentem auctoris frustra vulgo ad dæmoniacos affectus torquent.

Multò minus omnes in universum morbos à dæmone arcessere licet Christianis, uti *Kozack Traß. de Hemorrhag. in dedicat.* contendit, qui omnes à dæmonis excitari, imò entia illa, quæ nos morbos, vel morborum causas in nobis nominamus, revera esse substantias & spiritus infernales, dæmonia, scribit, latius ibidem videndus.

Propriè loquendo, & ut res ipsa jubet, non fascinat solus homo, sive oculo, ore, aliisque modis, nec solus dæmon, morbos à fascino inductos infert, sed causæ sociæ concurrunt quasi, homo & dæmon.

Diabolus enim effectum aliquem p. n. rarius præstat immediatè, plerumque vero mediatè & quidem per sua organa, homines scilicet perversæ frontis ac animi, qui lamæ, sagæ, venefici, magi, malefici, incantatores alias audiunt, idque præstant vi fœderis & pacti vel expressi, quo dæmoni perpetuum officium homo spondet, Deoque renunciat, horrendum dictu! & pacta sacra baptismalia cum eodem facta rescindit; vel taciti & impliciti, deliberato animo, vel inscienter initi, altitè nihilominus utrobique cooperatore & suatore maligno spiritu.

Præprimis verò mulieres dæmoniis magis expositæ sunt officiis, quæ cum propter animi impotentiam, ætate magis fortè, non ita resistere respectu virorum insidiis norint, facilius decipiuntur, illecebris illis magis inescari aptæ.

Ut ergo non omnes morbi, quod diximus, ita nec nulli sunt à fascino, quod itidem sunt, qui affirmant, Ita Scharandz sibi nullo modo probari affirmat, rationibus Philosophicis seu naturalibus, varios morbos hominibus veneficiis immitti posse, l. de rat. conf. san. c. 19. p. 147. Id vero duo invicta argumenta demonstrant, à causâ & effectibus petita, tum quod dantur venefici, utroque sexu; magis tamen sequiori respectu, qui, insensu hominum hostis sociato concursu, tam noxas alias, quàm inter has morbos aliis, quos lædere volunt, inferre, quantum in ipsis est, sagunt; tum quod sensus ipsi veneficia talia in corporibus suggerunt, quæ per naturam dari in ipsis impossibile est. Hinc non alio, quàm hocce, sensu supernaturalem causam reliquis addidere Medicorum filii, ut nempe exprimerent alia quoque sphæram naturæ excedentia visa symptomatica, aliunde oriunda.

Negatio fascino sanè species atheismi vide-

tur, præcipuè cum constet, diaboli potestatem, quantumvis limitatam & sub potestate summi Dei, tantam esse, ut nulla sit super terram, quæ cum illa possit comparari. Testatur id ipsum testimoniis omni exceptione maiora ex sacris literis, *Matth. 23. dæmones & archæos*, quantum ex permisso nummis ad morbos per se quoque interendos valeat. Nec culpandi sunt Icti, qui veneficas damnant ad rogam, convictas & confessas irrogati damni, maxime vero, abjurato Salvatore, baptismo novo suscepto, coitu impuro admisso. Revera hæc contingunt, nec si phantastica ponamus, una omnium mens & confessio hæc foret, contra deliriorum naturam. Utut enim Wierus contendat, præstare illa omnia dæmonem solum, citra illam illarum vel alterius hominis cooperationem, obsidentem lamias dementatas, melancholicas; perpetrasse se fatentes, persuasas à dæmone, innocentissimas tamen. l. de præstig. demon. in præfat. & per totum; Recte tamen in contrarium Helmontius asserit, satanam per se inefficacem, nisi per sui mancipia concursum, & per se impossibilem diabolo læsionem talem, puta à fascino inductam, esse, l. recept. injest. 9. & 13.

Sed videamus morbos illos, qui potissimum à fascino induci observantur. Horum licet plura possint dari genera, nec unius modi observentur, communiores tamen quidam haberi solent. Obsessionem ipsam diaboli, ex iusto Dei iudicio, etiam sine fascino dari posse non negamus. Observata tamen, vel nostra memoria, quod pueri bini Arnstadienses energumeni ante aliquot annos satis probant, exempla sunt, ubi id à lamis præstitum & effectum est.

Frequentissima est quoque macies, & atrophia, à fascino cum puerorum nonnunquam, tum & adultorum, quando vel totum corpus, vel certæ partes mirum quantum exarent, prævia talis modi fascinatione.

Contra ea & tumores graviores induci visi sunt ab hac causa, in capite, mammis, pedibus & aliis partibus. Par ratio est contracturarum quando artus perdita articulatione mirum quantum contrahuntur vel contorquentur. Mortus item spasmodici varii, mira & inaudita contorsione ante, retro, sursum, deorsum exercent alios. Sic & in aliis deliria melancholica, cum summa anxietate & inquietudine, videas à fascino inducta. Nec cæcitas à sagis illata de nihilo est, *even sie einem ein Auge ausschlagen*, qualia exempla non raro occurrunt. Præcipuè vero frequens rei exemplum præbet impotentia à fascino, etiamsi ludicro sapè viso modo inducta factio nodo in filo vel ligula, clausa sera, inverso in theca sua cultro, dum copulatio peragitur.

Ligaturæ talis exemplum insigne notavit Nobiliss. D. Præses de civitate quodam Jenensi, qui, à tempore initi conjugii, alioquin vegetus & sanus, hac morbi malitia per aliquot annos ita fuit affluctus, ut humido radicali penitus absumto & dejectis viribus pedetentim ad mortem deproperaret, & tandem naturæ debitum satis citò persolveret. Post huius obitum cum alius multis annis post novus hospes ædes illius entas penitus everteret & novas pararet, forte fortuna gallum gallinaceum, indusio viri de-

mortui

mortui involutum in interstitio parietum intergerminorum absconditum invenit, cum locus tunc temporis, testibus gravissimis & celeberrimis, *Dom. Martino Hartmanno*, Physico Vinarienti, & *Dom. Henrico Linckio*, Iusto Altorino, quæ causa eo usque specialis latuerat. Vomitus item & excretiones insolitorum huc spectant, qualia exempla non semel ad Præudentem sunt relata, qui meminit araneas vivas, chartas, acus, folia ribium, pennas, hla, stramina & similia rejecta.

E tumore quoque mammarum infœmina, nigricante loco in superthecæ, carbones, hutean inæ, ligna, capillos exempta notavit. In alio ex tumore pedis magnam quantitatem pediculorum exemptam observavit. Tacemus summos & incredibiles dolores, atrocissimos ardores & cruciatus à fascino quandoque inductos.

Ad veneficium hoc referendæ omnino sunt blandæ illæ abdominis contrectationes alicujus apud *Cedrochium*, quas illico dirissimæ lancinationes & abortus monstriosi subsequuntur. Sceletum etiam quod annis tredecim in utero quædam gestavit, attracto solum à venefica ventre.

De cultro ex hypochondrio exciso vid. *Wierum. de prælig. dem. c. 4. p. 385.* de clavis *Langius, l. 1. p. 38.* de aliis similibus *Heerius in Observat. pag. 117.*

Diarrhœam maleficio factam observavit *Mercatus torn. 3. p. 284.* ubi præter dictas, ait, diarrhœæ fortes memoriæ proditum est, alias succrescere posse, in quibus ossicula quædam similia passerulorum ossibus produnt, quasi laborans integrum devorasset passerulum, quæ sanè gravissimis excernuntur cum doloribus. Quam etiam excretionem maleficio factam potius, quàm à naturali causa nonnulli sunt arbitrati. Alia enim assuescunt fluere excrementa similia his, quæ in abscessibus externarum partium solent reperiri, quippe novimus excerni pilos, carbones, lapillos, ungues, testarum fragmenta, oleum, cœnum, lutum, mellis specimen aut vinum fecem. Quibus excretis raro laborantes in pristinam sanitatem restituuntur, nam tabidi aut doloribus consumpti plerumque pereunt.

Buſonem ex abscessu notavit, ad manifestam licet causam relatum, *D. Paulus de Sorbait*, cujus verba hæc sunt: Observavi vinicolam post ingentem ex frigida & cœnosa aqua hauritum in bronchocelen incidisse, quæ plurimum excrevit, deinde ex abscessu facto exivit buſo vivus, quem meis ipse oculis vidi: fortasse seminalis virtus cum aqua ad colli membranas exsudans hujus generationis causa fuit. Vid. *Ann. 1. Ephemer. German. Observ. 103. p. 177.*

Ex abscessu pilos, ungues, castaneas & animalculæ vivæ nixque prodisse narrat *Cabrolus Observ. anat. 27.* Pariter in mercatore castrensi abscessum moris laborante, cum ope cauteriorum apertus esset, pus copiosum exivit, deinde pili, globuli, ranulæ & pisa, quæ tamen frustra naturaliter, non magice educta fuisse opinatur *Borell. Cent. 2. Observat. 86.*

Fascinum datum à saga matri & infanti comprobatur *Wolff. Gabelsch. Curat. & Observat. Cent. 1. Observ. 16. 17.* Plura exempla morborum à fascino videri possunt apud *Philipp. Salmuth.*

Observ. Medic. Cent. 3. p. 115. 126. August. Thoner. Observ. Med. lib. 4. p. 122. *Observ. 1.* ubi calus reperitur pueri novennis maleficiati admiratione dignus. Item *Balth. Timæi Cas. Medic. l. 7. Cas. 24. p. 328. & seqq.* ut plures non laudemus, large congestos à *Senneriol. 6. prax.*

Hoc loco & historiam à *Nobilij. D. Schmidio, Archiatro Anhaltino* observatam, non ita pridem Excellent. D. Præfidi transmissam, dignam ut huc referatur censui, quæ ita sese habet: Virgo 26. annorum, temperamenti melancholico-cholerici, habitu corporis macilento, postquam per aliquot jam annos continuo fere capitis dolore, cardialgia nunquam inter itteente, (ita ut circa scrobiculum cordis internam aliquam partem avulsam esse, serio affirmaret) artuum tremore, cordis anxietate perpetua laboraverat, corpore maculis fuscis interdum picto, indies magis magisque emaciato, sola facie carnosa & ob *φλογωσιν* florida appente, appetitu semper prostrato; adhibitis remediis quamplurimis præsertim antiscorbuticis, cordialibus, stomachicis & p. n. aliis, sine ullo levamine omnibus, vivam quandam sibi per artus hinc inde substantiam decurrere, seque fascino maleficiatam esse arguerat. duabus abhinc septimanis acutissimo ossis lterni dolore corripitur. Locum istum digitis comprimit ac statim duas acutissimas acuum cuspides ex sano & integro pectore protrudi videt, quæ remittente compressione retrocedunt. Hinc mixturam ex spir. lign. heracl. 3 ij. Tinct. martis aper. ess. hyper. an. 3 j. constantem mane & vesperi ad 50. gutt. sumit. Externe scrobiculo cordis emplastr. impositum sequens ex empl. stoma h. 3 β. visc. coryl. musc. corall. magnet. præp. an. 5 ij. olei lign. heracl. 3 j hyper. q. s.

Hæc primâ vice adhibitis, sensit gravissimum quasi pondus confestim a pectore per artus cum rigore ac tremore delabi ac distribui; dictum factum molestissima cardialgia, à qua per multos annos ne unico momento libera fuerat, remittit penitus, & quod magis mirandum, emplastrum impositum totum ad alutam usque omnino abiunctum evanuit, quod tan. en pottea impositum intactum permansit, nec ullo modo in minutum, Continuavit horum usum per dies decem, eoque tempore sic satis bene habuit, cibos probe appetit, levi vero diarrhœâ correpta, quæ sponte remisit, hinc insolito totius corporis, præcipue c. utrum, pruritu afflicta est, crura scalpta maculas rubras exhibuerunt pulicum morſibus similes, sed paululum elevatas, ex quibus tuberculis innumera animalcula, minutissima, ruberrima per singulos cutis poros catervatim prodire. Exempta & carbonibus injecta leviter crepuerunt, manibus inposita in momento disparuerunt. Per microscopium duobus pedibus totidemque cornubus instructa esse constitit, & corpore turgido ac succi pleno. Jussu reliqua acrius inquiri & scalpello poris eximi, quæ tamen quantocyus singula retroceſerunt, nec frictionibus calidis, nec mellis inunctione alluci potuerunt, evanescentibus simul omnibus maculis. Egrotâ alias delicata & pudicissima, quæ manè sanissima apparebat, maximum ex horum adſpectu tedium, terrorem ac mœſtitiâ concipit, cardialgia denuo immaui, respiratione difficilissima, lipothymia

creberrimis & cordis anxietate maximā corripitur, ratione privatur, torvum videt, absurda loquitur, caput sibi amputatum esse, se in deserto vivere, turrim sibi supra pectus extructam esse, agnatos, matrem & notissimos non novit. Dato medicamento cordiali & anodyno circa medium noctis alto sepelitur somno, mane expergetacta nescit singula, bene se valere iam dicens, nisi quod ob fascini n. etum anxia & sollicita sit, præsertim cum meminerit, sibi ante annos octo parvum in externa ac superiori dextri femoris parte tuberculum ortum esse, ex quo per emplastra aperto Chirurgus varia ad spectu miranda exemisset verbi gratia, naturales ungulas & pedes avium, materiam quandam ovi columbini magnitudine, crassam, coriaceam ac nigerrimam, quam etiam nunc videndam exhibet, & alia, quæ singula fascini suspensionem penes illam maxime confirmant.

Imo & bruta & arbores, imprimis verò hominem fascino lædi certum est,

Remotius huc faciunt alia ex rebus *Naturæ libris*, v. g. *atav*, uti infantilem, tanquam teneriorem his obnoxiam statuunt non ineptè, ob fluxam magis & minus resistentem texturam; Maximè verò *dispositio* corporis adhuc vel illum morbum, unde melancholia balneum diaboli & in his casibus omnino est; Singula tamen illa concurrente dæmoniaca opera demum effectus morbosos, à fascino dicendos, producere norunt.

Modus quidem respectu dæmonis & læsionis ipsius latet, est enim mille artifex, præstigiator mirus, unde receptior est hypothesis, non revera inexistisse talia v. g. rejecta vel exsecta in corpore; mera tantum, ut loquamur cum *Hellmontio*, operatur ludibria & præstigias duarum inanes. Neque enim datur penetratio dimensionum, non potest culter insui cuti, vel clavis non læsa & divisa parte eadem. Respectu vero hominum modi applicandi fascini occurrunt non uniusmodi. *Generalis* & principalis est pactum jam laudatum initum. *Specialis* comitatus vel præcedens est superstitio & huic affinitas, characteres, plantæ, ut mandragora, victorialis, aliaque in se innoxia, verba incondita & inarticulata, & hinc imprecationes quoque ipsæ, ut & vestimenta, inspirata, contactus, manus, imposita, in limine defossa, vel in plateam effusa, ut transgredi oporteat hominem, cui nocere est intentio. Hæc enim tanquam causam occasionalem aliquando licet deprehendere.

Frequenter & per assumpta id peragitur, placentas, poma, pyra, variis id testantibus exemplis, Notabile enim est non æque per venena inferri fascina, illa enim per naturam sibi relictam interficiunt, sed & hæc illa aliàs innoxia & non venenosa, hoc charactere fascini sigillata, talia evadere.

Neque verò quis putet, posse ipsam conceptam ideam in animo læsuri noxas & morbos hosce inferre. Non enim agit hæc in aliud corpus amicabile vel odioso effectum, nisi ut objectum movens humores & spiritus. Ut enim vel maximè mortem inferre oculis tentet invidus Titius Sempronio: ipse tamen sibi maximè nocet, non item alteri, unde & emblemata invidiæ est ipse suum cor edens. Nec de antipathiâ id

ipsum valet, multo minus id per se verba, mura, talisman, characteres, sigilla efficere possunt, licet & Christianis sint, qui contra religionem, & sanam rationem hæc magnæ estimant, quam in rem citamus *Hiebnerum*, qui mysterium sigillorum, herbarum & lapidum inter scriptum librum edidit. Est & hunc in finem M. Ss. laudatum *H. Arnio*, quod apud *Præsidentem* nostrum vidimus, & inscribitur præstigia Hermetis.

Pertinent huc & philtrea, ardorem in venem in animis aliorum excitantia, interdum erga personam certam, interdum indifferenter, sed venefica, quæ nempe non tam sola muniali confermentatione talis modi ideas interruit, quam magicum & superstitiosum concursum. Par ratio est oppositi huic odii & inimicitia, inter personas adamas utrinque induci. Ad hæc maxime expetere leguntur malefici capillos vel unguium præsemina, vel fasciam sive partem vestimenti, quod solitum sit tangere corpus maleficiandi, aut epistolam vel quid aliud de illius domo, vel corpore, quibus adhibent certas ligaturas & involuta consumit tunica maleficiandi, vel abscondunt sub lectore aut inter plymas & culcitram, super quam dormit, aut sub limine ostii vel alterius loci, super quem femina aut vir maleficiandus transiturus sit. Tale etiam malefici amatorum genus sit per imagines quasdam ex terra vel cera, gemmis aut alia quavis mixtura confectas, quas abusu nominum & operationum divinorum maledictis suis nutibus aptant. Meminit hujus *Virgilius* in pharmacentria, dicens:

Linos ut hic durefcit, & hæc ut cera liquefcit.

Uno & eodem igni, sic nostro Daphnia amore.

Morborum à fascino causas secundas esse naturales, vel præstigias.

Axioma notissimum est: causa sociæ stant pro una. Si ergo morbi a fascino sunt, non ex ipsius naturæ radice propullulantes, quacunque demum causa obstetricante naturali, vel necessitante, vel fortuita sed aliunde citra hæc & quidem a dæmone inducti, facile patet, primum horum movens esse dæmonem, non solum tamen, aut præcipuum. Ipse agit dæmon ut loquamur cum *Scaligero* ex 49. p. 1085. stultus ille ac vecors veneficus putat suis se verbis agere. At ipse non exors est culpæ, & concursus causalis, licet dæmon sit princeps autor fascini, & deceptor & executor. Valet enim & hic illud, quod quis per alium facit, ipse facile putatur.

Duplicis vero generis statui possunt morbi à fascino inducti; primo qui ordinariis aliis, etiam non ab hac causa inductis, videntur similes, imò sæpe iidem; deinde qui toto genere, ut vocant Medici, sunt præter naturam. Ut enim & tales dentur in corpore citra fascinum ullum, quale exemplum præbent vermes & calculi, ad nulum aliquod genus partium corporis referendi, sed tota substantia alieni, & peregrini; distinguuntur tamen facile ab effectis diabolicis, quatenus hi per naturam sibi relictam existere in corpore nequeunt. Adeoque toto genere sunt & dicuntur nobis hæc p. n. quæ nec per naturam fecificari vel produci in corpore ullo modo possunt, animata & inanimata.

Non

Non novum est in corpore nidulari aliquando infecta talismodi, ut ranas, bufones, serpentes non minus ac lumbricos, si per potum atque aliisve liquoris seminum illorum fuerit illatum. Quam in rem insignem præ alius exemplum præbuit ancilla Altenburgensis *Ann. 1. Ephem. Germ. observ. 103.* ut & a *Bartholino Cent. 4. observ. anat. 19.* descripta, Est enim insectorum horum seminum valde materiale & diffusivum sui, corpus hum. num calido & humido gaudens commune insuem præbet hospitium gratum, ipsaque assuetudine nidus lat acceptus ipsis constituitur. Unde frustra fuerit negare, hæc talia in corpore gigni hoc modo posse. At si id fiat loco inconvenienti, quam ut hospitari ibidem possint & produci semina velut in utero quodam vel receptaculo, quod de bufonibus & aliis talismodi locis se quandoque exercentibus diximus, merito id inter fascino habetur. Longe magis vero id de partibus vegetabilium vel arte factis, aut metallicis asserere licebit. Ea sane rejecta per corpus aut generata in eo esse oportet, aut creata denuo, ut ex non ente fiat productio, aut jam extantia huc illuc illata, injecta, aut lusus esse demonis, qui concedente divino numine, impellente vel per voluntatem cooperante & concurrente malefico, gestulationes illas efficiat. Generari eadem in corpore est impossibile, adest quippe in proportio seminum, differt natura a natura, neque ea naturæ est inordinatio, quæ observatissima est legum, quibus se adstrinxit. Imò à sola arte figurata vel fabrefacta inepta sunt, quam ut eodem planè modo, quanta etiam illius sint miracula & diversimoda, una vice produci & producta naturæ ope excerni queant & illa quidem, ut exempla testantur, quæ vel in corbe fascinoantis gestata, vel illi alias placuere, ut in corpore, cui nocere præsumebat, extarent.

Creari hæc talia posse à Dæmone, religio vetat statuere Christiana, imo sana ratio & ethnicis nota, uti nulla natio tam barbara fuit, quæ Deum negare aulit. Creare solius Dei est, qui & ipse peracto creationis universalis opere cessavit non entia producere, perenni productioni per semina propria commisso ordine & negotio, (nihilominus & ipso concurrente primario, quippe in quo vivimus, movemur, & sumus,) liberrime adaligatus naturæ, non exclusa divina, quæ pollet, omnipotentia, etiamnum si velit creandi jam existentia vel nova, quo ipso tamen ex sapientissimo consilio abstinet. Ponamus ergo pediculos, araneas, bufones, nova vermium genera, uti sensus id demonstrant, per fascino inducta reperta vel excreta fuisse, illa sane de suo producere non potuit dæmon, neque credendum est, ad mali genii desiderium summum Numen eo se demittere, ut eadem creet. Abiit, ut hæc cogitemus! Sed inquis, unde ista vera animalia, ut ovum ovo similia? Quasi vero non nosset mille artifex, hæc aliunde arcescere, vel oculos ludere, quod ex historia Ægyptiaca *Exod. 7. & seq.* satis illustrari & intelligi potest.

Maximum & potissimum dubium esse potest, annon ipsissima dicta in corpus intrusa & actu

præsentata statui possint prædicentibus sæpe ægris, ut historiae idem faciunt, jam acum immanere, jam cultrum, aliaque, immo eximi ex divisa prius integra cure chartam, linteamina, carbones. Sane subtilissimum id fuerit artificium, nec humano ingenio assequendum, ubi quidem id revera extat vel se offert, uti quidem negandum non est accidere. Sed ~~amem~~ illa omnino, seu deceptio est. Non novit nisi decipere dæmon, qui, ut imbellem se non esse persuadeat, sed potentem & admirandum, cum revera præstare non possit, fraude conatur, & primo intuitu tantum non persuadere, esse hæc ipsissima illa vel ex corpore educta, quæ tamen corpus ne attigere quidem. Patimur id nobis persuadere, si videamus vel humana vatritie & celeritate gesticulatores infiniti a præstare, quæ incipit vel Jovem lapidem jure tita se habere, objecta non assequente sensu, sed decepto, mira agilitate, modisque aliis. At quantulum homo potest in his talibus, si cum callidissimo spiritu in comparisonem veniat? Producere se fingit gestulator non extantia, autere prius visa deglutire inepta, imo & carbones vivos mirandum dictu, vel ex ore omni generis colores vini liquorumque aliorum velut ex siphone exstillare. Hæc toto die vel publico eveniunt in foro, & putemus, non posse similem tabulam ludere dæmonem, si quidem potentiam a Deo, & quod jure mireris, ab homine socio acquirat, quam ex se non habet, miser spiritus.

Hæc cogitantibus sollicita paulo magis inquisitione facile est colligere, præstigas eas esse dæmonis, tum a parte agentis simul vel quasi hominis, qui putat sua opera sola vel socia saltem certo id contigisse, ab blandiens hinc sibi, ut sit, quod tam potentem effectum ciere noverit; tum a parte patientis potissimum, & adstantium quibus hæc suggeruntur quam maxime. Non attinet denuo latius adducere jam tacta superius. Præstigia sunt, quod præstringunt oculorum aciem, seu quod prætegunt, deludunt enim & quasi tegunt oculos, ut revera ita esse jures ac visui apparet, cum tamen aliter se res habeat.

Quod vero alteram classem attinet, seu priorem illam, dum morbos a fascino dicimus, necesse est, ut eosdem concipiamus secundum pathologiæ leges. Sunt enim iidem, ut alii morbi, vel in partibus similaribus fluidis & spirituosiss, seu sanguine & sero, principiis vitalibus, adeoque intemperiei dictæ, quatenus peregrina miasmata inducta proportionem & compagem illorum disciunt, unde febres, anxietates, ariduræ, sudores. Vel partibus insiliuntur organicis quoad conformationem, ut contracturæ, contorsiones, tumores, curvitas, & similia vitia in figura, situ & connexione. Vel in utrisque communiunitate apparent, ut ulcera prava & cacoëthica, & id genus alia.

Par ratio est symptomatum variorum, ut ex actionibus læsis verbi gratia, dolores immensi ac intolerabiles, impotentia, cæcitas ex fascino, ut plura non laudemus. Cum ergo uniuscujusque effectus morbosus non sit nisi una *Causa immediata*, eaque certa & determinata, inter

quam & morbum nihil intercedit, sine dubio illa etiam in morbis his a fascino locum habebit, ita ut illa quadret & ex suis loculis arcessenda sit in quibusvis morbis vel symptomatibus. Neque enim opus est, ut in his immoremur speciatim longius.

Quin imo id ipsum quoque de *Causis Mediatæ Proximioribus & Remotioribus*, ex ordine quasi quodam sese insequentibus, uniuscujusque talis morbi ex fascino valet.

Sola differentia inter communes seu ordinarios talis modi morbos & ex fascino productos est in causa dirigente extranea malefica illa lapsus & prima nobis dicta. Non differunt specie illi ipsi, sed concursu causæ extrordinariæ, supernaturalis sano sensu dictæ, quatenus non tam quæcunque nullo modo, uti Medicis laxiori sensu causæ morbificæ nomen venit, hunc illum morbum, sive proximius, sive remotius producere valent, hoc casu sibi relicta in corpus agunt, donec positus iurvenientibus recipiendi debitis modis sistatur & se exferat in corpore morbus; sed dirigens & movens sive actuans illas aliud concurrat. Sane dæmon callentissimus est naturæ artifex, quo nemo acutius morborum causas penetrare mortalium ausit. Facile igitur fuerit ipsi ordinarias causas citare, singulas pro suo modulo, sive, ex *Naturalibus*, ætas, habitus & textura corporis, temperamenta, dispositio consentiant; sive ex *Nonnaturalibus*, æt, cibus & potus, motus & quies, somnus & vigilia, excreta & retenta, animi pathemata, aliæque casu evenientia minuantur; seu ipsi jam morbi & symptomata alia ex *Præternaturalium* ordine, quibus se adfociare commode possit.

Variant scilicet hæc omnia pro intentione malefici hominis, callidissime se componente ad nutum genio malo, ut eo se potentior probet. Et sanè moderari eadem universa divinum Numen & limitare verissimum est, quod nec in omnes æque efficax sit nocendi illa insana lubido, in quibusdam vero tam subtiliter id administretur, ut fallere satagat hoc ipso quoque alios, nunquam non fraudes architæctans. Sic, ut quædam repetamus in exempli vicem, in doloribus tensionem fibrarum nervearum acriorem; in impotentia impeditum affluxum spirituum ad partes genitales; in motibus convulsivis stupendis nervosi generis irritationem tensivam constantem vel interpolatam; in melancholia fixationem majorem spirituum, in contracturis ligamentorum exsiccationem, in singulis humorum vitalium deturpationem machinari & præstare ipsi perquam expeditum est.

Ponamus curram dæmonis opera restare, nec moveri posse, uti non raro observatum a fascino fuit, (nulla in movenda machina, vel trahente equo ad sensum præsentem vel investigabili remora,) nullum dubium est, vel in rotis, vel in equis, motum illum præstantibus, culpam inferri, licet non advertendam sensibus, ipsis nihilominus equis ad extremum sudorem coactis, imò, quod *Ronsens* factum a fascino perhibet, vel genitali piso mire intorto, unde fumus dolor & anxietas consurgit necessario. Eundem in modum in machina humani corpo-

ris se res habet. Cujuscunque visceris actio laesa est, illius velut habenas vel nervos, vel concurrentem necessitatio tonum laesum & tantum non corruptum esse, colligendum est.

Causa ipsa interna & effectus quoque est naturalis, exterior in corpus agens & dirigens non est naturalis, sed sublimior, Dæmoni imputanda, siquidem à natura sibi relicta non expectari idem soleat vel possit. Latet anguis in herba, unde cauto opus est, licet, quod diximus, & sensibus id palpare sæpe liceat.

Neque tamen absolutè valet, solum dispositos & aptos inferri morbos a fascino, quod ipsum dubios reddere posset eisdem magis, sed potius pervertit opum naturalium vim dæmon hoc ipso, ut qui antea sanguineo, lato ingenio gaudebat, totus à se diversus appareat, sibi dissimilis, ne plura laudemus, facile ex inferius dicendis colligenda.

Morbos à fascino signant phaenomena ultra spheram naturæ transcendentia.

Digestis causis morborum à fascino oriundorum tractatio de Signis tramite recto incedit, quibus idem dignosci absolute, diagnostica vocant, & respective quoad prognostica queunt.

Hæc difficultate non carent, cum mille formarum proteus naturalibus causis sese sæpe immisceat, illique utatur, ut non facile videatur prima fronte discernere, quid à causis naturalibus, quid ab ipso dæmone profectum sit, multo minus, qualia omnia inde sint capienda, unde etiam sunt, qui negant, dari aliquod morborum a fascino signum pathognomonicum. Difficultate interim hac non deteritis Medicis, fas est signa ista accurate examinare, ne vel naturæ debilitate evenientem morbum pro dæmoniaco habeamus, nec à fascino ortum vice versa pro naturali venditemus.

Si ullibi igitur, sanè hic distinctio locum habet inter signa communia, & propria seu distinctiva. Illa non sufficiunt omnino, ita ut, instar regulæ, quamdiu in morbo quocunque signa adsunt communia, qualia quidem in aliis quoque per naturam eveniunt, tamdiu ille ipse pro naturali sit habendus. id quod ad omnes signorum fontes applicare integrum & fas est.

Sic quamdiu *Essentialiter inhaerentia* cujuscunque morbi, vel symptomatis invenit Medicus, verbi gratia intemperiem, vitiosam conformationem, vel hiatum manifestum, aliæque formalem rationem absolventia, illa merito ex suo æstimat genio, taliaque judicat, qualia invenit. Par ratio est *Essentialiter consequentium*, seu symptomatum aliorum secundariorum, quæ velut inconveniente unoposito ex necessitate consequuntur, sive in actionibus læsis, quorum imprimis spectant dolores punctorii graviores, item convulsiones, contracturæ, & sive in excretis, sive in qualitatibus mutatis.

Id ratio est causarum. Quamdiu hæc fontibus

bus suis seaturiant, ut inter causam & causatum certa sit relatio, quæcunque producta ad ordinem hunc naturalem sunt reducenda, modo sufficiant & paria sint utraque inter se comparata, etiam ratione temporis. Sic quando generosi remedia non juvant, symptomata ingravescent, & sine causa manifesta desubito ingruunt, ad præsentiam scilicet ga extemplo augeantur anxietas, dolores, clamores & insania, conitini aut hæc ipsa fascino.

Tacemus Analogismum, seu comparisonem ægri ad ægrum, vel ad seipsum quoque, quod idem satis est ad contemnendum, utrum morbus sit pro fascino habendus, an non, prout id experientia uniuscujusque contemnerit.

Nullum itaque pathognomonicum aliud signum superest, quam illud unicum, an phænomena sese offerentia intra sphaeram naturæ militent, an vero eandem superent, ita tamen ut accedat prudentia Medici hæc noscentis & distinguere apti. Quicumque nempe morbi vel symptomata intra naturæ terminos versantur, tum quoad ipsam formalem rationem, tum quoad causas, ex quibus oriri queant, illi pro naturalibus sunt habendi, non pro fascino seu supernaturalibus, etiamsi graves appareant factis; & contra ea, quicumque naturalem sphaeram supergrediuntur, ad hos referendi, modo non error committatur in diagnosi circumstantiarum, de quo mox agemus.

Sic certissima morbi à fascino & veneficio illati signa pluribus historiis confirmat *Sennertus lib. 6. prax. part. 9. cap. 3. pag. 391. seq.* si acus, cultri, ligna, cera, capilli & similia reificiosa, vel alia, quæ in corpore humano generari non possint, vel per vomitum vel per alvum ipsosque tumores & ulcera excernantur, aut extrahantur. De iisdem signis videri meretur *Dravizius de Scorbut. pag. 90. & seq.* Ubi & aliquot historias recenset huc pertinentes. Exemplum, præter jam allata, cujusdam feminae refert *Anon. Beniven. de ablit. morbor. & sanat. causis cap. 8.* Quæ longiores & recurvos clavos, æneasque acus una cum cerâ & capillis in globum mixtis evomit: & novissimè jentaculi frustum tantæ magnitudinis, ut devorare integrum nullus potuisset.

Scorsim verò præstigium deprehenditur, cum effectus non oritur à motu locali & superat causarum naturalium applicatarum activitatem, idque tanto magis, cum statim evanescunt visa de portentosis quibusdam à corpore rejectionibus, atque adeo circa morbos evenientia ordinariis metiri non licet regulis.

Obsessionis diabolicæ signa certa & indubitata ex collatione virium naturæ seu hominis quoad animum & corpus eruantur. Quoad animum quidem, si intellectus & voluntas ferantur supra hominum captum, ut si peregrinis linguis loquatur, quas non didicit, æger, vel insidem effata rudis aliàs intelligat, idque tanto magis, quod artificium majus accedit, ut si versus compingat & recitet.

Licet enim sint, qui idem per naturam fieri posse rentur, reverà tamen id sphaeram naturæ superat, & cum miraculosa illa linguarum cognitio hodie cessavit, vel saltem, quæ à Spiritu sancto est, non nisi in divinas laudes & homi-

num salutem feratur, si, citra hunc characterem, ceteris paribus, audiantur hæc talia, demonis id astutiae & concursui adscribimus. Plura hanc rem videri possunt apud *Cedronchium lib. 7. de morb. Venes. cap. 13.* & passim, *Hildeheim. Spicileg. affect. cap. 10. pag. 702.* Ubi & plura habentur.

Idem valet de rebus absconditis, vel præsentibus, vel præteritis, quæ per humanam solertiam scire non datur, ut si occulta aliàs & non nisi huic illi, saltem non personæ edicenti cognita prius, nec semibus haulta proferantur. Per naturam enim nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu, saltem latius, ita ut liber inveniendi, illustrandi quin & ingendi ex co-
gitis illis intellectui maneat locus.

Nec obstat, occulte se se sæpe demonem, nec morbos demoniacos tales æque statim patere; idem enim & de aliis gravioribus sæpe valet. Opus ergo est tanto majori *cautione*, ne fallamur, sed tandem in via recta procedamus, quousque non alium tramitem sequi cogit necessitas.

Ut hæc illustremus specialibus quibuidam exemplis, frequentissimè occurrit impotentia à fascino, quam arbitrari licet, si quis vegetus alias & juvenis nullo prægresso morbo, nullo odio vel avertatione, (quorum alias *Harrellus Cent. 4. Observ. 6.* Ligationes hæc referre fatagit unice, negans concursum Demonis,) nullâ causa manifesta, sentiat se simul & semel defraudari suo genio, emori partem & tinerari veneri aptam, imo & anxietatem sæpe conjungi non levem, idque prima vice, frustraneo omni conatu. Quis non agnoscit subesse maleficium, & hæc sphaeram naturæ ordinariam transcendere?

Idem applicare licebit facile ad maciem, convulsiones Epilepticas, & alia. Licet verò diutius sæpe hæc causa eruatur à priori, ita ut pro naturali habeatur morbo, ubi nihilominus demon subest; præstat tamen, nil temere aleverare, vel in casu dubio hectere huc animum, non detectere, ut uno oculo morbum, quæ talem, altero sublimiorem illam causam attendamus. Facit huc tum juvantium & nocentium notio, & quod alias de morbum simulantibus prædicari solet. si non concordent sibi invicem signa, sed distent; ita tamen ut conjunctim & collective, omnibus & singulis probe examinatis, demum pronunciemus, morbum esse à fascino. Alia enim & hic sunt signa proximius, alia remotius id significantia.

Quod si & Prognosin generalem considerare lubido sit, moderantur eandem in genere collatio & proportio inter lædens & læsum, ut quò magis à statu naturali sunt remota phænomena, eo periculiosior & gravior morbus sit habendus. Sic macies ad extremum gradum marasmi deducta restitui renuit. Vitales actiones magis læsæ gravius affligunt, animales illarum intuitu mitius habent, nec periculosa æque sunt, licet videantur. Impotentia restituitur sæpe. Reliqua ex suis modulis judicanda quoque. Sæpe verò majorem incutit metum demon, quam eventus hinc testatur. Demoniaci morbi ut plurimum longiores esse consueverunt, quandoque & recidivant, statò tempore redeunte melancholiâ, anxietate, delirio.

Neque opus est differentias attexere genericas, quippe quæ facile eruantur ex ipsis phænomenis

menis probè consideratis. Alii tamen primarii sunt, alii comitati, seu reliquis juncti, qui partim naturales sunt, partim dæmoniaci, in partem causæ se vocante dæmone, unde facilius restituantur, uti recentes omnes magis sunt curabiles. Quando vero diuturnâ mora principia vitæ turbata magis sunt, minus sperandum est de perfectâ sanitate, unde sæpe *omnes morbi*.

Non omnes morbos graviores pro fascino habendos.

Ut nec nulli, sic nec omnes morbi a fascino sunt derivandi. Vulgi ea consuetudo est, sive gravior paulo morbus incutiat, seu longius duret, etiam neglectis convenientibus remediis, non cælum respicere & iratam vel castigantem Numinis manum, sed dæmoni acceptam ferre cladem. Idque quotidiana probant satis exempla. Dari enim complures morbos, quorum causæ & remedia non æque statim obvia sunt, & exin à multis pro fascino haberi, nemo nescit.

Exemplo sit melancholia, affectus gravissimus & molestissimus, cujus soboles solet esse phantastica quædam persuasio cum vehementi tristitiâ & animi mœrore, qui non raro ægros adeo torquet, ut animam tantum non extorqueat, à causis tamen naturalibus sæpe producta. Hinc citari hoc loco meretur locus *Æbusina lib. 3. sen. 1. Tr. 4. cap. 18. p. m. 376.* Ubi, quibusdam Medicis, ait, visum est, melancholiam fieri à dæmone; sed nos non curamus, in naturâ occupati, an id fiat à dæmone, an non, certi, si fiat à dæmone, induci ita, ut immutet temperiem in atrabiliariam, & hæc sit causa hinc melancholiz. Quo ipso loco non tam negat eandem a fascino induci, quàm statuit, quod & nos jam innuimus, fieri id effectum naturali, nec temere quamvis melancholiam pro dæmoniacâ habendam. Maniaci quoque sæpe habentur vulgò pro obsessis à dæmone, Epilepsiz graviores pro dæmoniacis, paralytis item crurum & brachiorum, macies corporis, sterilitas utriusque sexus, imprimis verò convulsio & contractio mirè invadens ægrotos, ita ut adstantes sæpius existiment, à veneficiis per incantationem hunc morbum fuisse conciliatum decumbentibus. Singula tamen hæc, ne plures laudemus ejusdem commatibus, naturales omnino agnoscunt causas ut plurimum, & faciliè confunduntur cum dæmoniacis.

Neque id novum vel hodie demum fieri ceptum est, antiquissimus ille mos est, dudum Hippocrati nostro culpandus visus. Hic quippe *l. de morb. sacro cap. 1. & 2.* Ubi speciatim Epilepsiam huic ordini eximit, tres potissimum rationes adducit, quare morbi, ad naturales causas referendi, pro fascinati vel dæmoniacis habeantur, primo *antiquior*, experientiz defectum. Ut pueris omnia nova sunt; ita & qui hos illos graviores casus, non æque patentes ignaris, non viderunt. 2. *Imperitia*, admirationem ob mirros casus, versiones & circuitus morbi, quo insolitum quid præ se ferunt graviores, rapiunt in admirationem, ut præ stupore desperent de cognitione vel remedio. Tertiam causam adlegat *superstitio*, consilii & mentis inopiam, in-

deque ortum prætextum, imò superstitionem, unde in absurda ferantur & salvare sanam Medicum, seu empiricum potius tales satagant, sive evadat æger, augendo ipsam, sive moriatur, ut aliquid egisse videantur & exculpent ignorantiam.

Cavendum sanè est, ne Medici prudentiâ minores sint præ vulgò & inde via adigantur, ubi via tuta & manifesta est, vel alia scilicet. *Medicis*, *quod* *Hippocraticum etiam hic valet, nil temere artemandum, nihil prætervidendum. Aulim dicere, hanc sapiennum causam esse, quare morbi isti minus sanentur, qui sanari tam non potuissent, imprimis, si condescendant ægrotis Medicis, & a fascino esse morbum concedant, qui nihil minus quam talis est. Hinc in absurda teruntur ipsi, relicta morborum panacea medendi methodo, & andabatarum more hinc depugnantes occasionem præbent agris jam dum in deteriora inclinantibus, ut latagant, nequere si nequeant superos, acheronta movere. Itur hinc ad sagas, carnifices, agytas & nullos non se profitentes Medicos, relicti quos consulere intererat, imò ne fidem merentibus ullam, quicquid edicant.*

Ante paucos annos mortuus est machæropæus quidam, temperamenti melancholici, qui à pluribus annis spontaneum quasi carcerem domum habuit suam, octodecim ad minimum, quod crederet se fascinatam, omniaque renueret remedia, pertæsus usurpatorum & desperans curari morbum magicum posse. Sentiebat ardorem intensum in latere dextro, eâ regione quâ bilis decumbit & exoneratur in intellina. Putabat hunc carbonem esse vivum, quo torqueretur à forminâ, quam maleficam induxisse malum firmissime credebat, non minus ac in inguine quoque cruciatus repetentes sapius. Arguenti Præsidi nostro bilem hanc esse acriorem, & acido confermentatam corrosivo, constanter renuit, nec vel educentia, vel temperantia, vel anodyna adsumsit ulla, quod persuasisset prius aliis, aliisque vicissim illis, à fascino hæc oriri omnia. Tulit hos ergo cruciatus, pertulit citra remedium ipse suum cor edens, anxietatibus & doloribus & inquietudine interpolatis, subinde novis accensis facibus. Quod verò toties prædictum à Præside fuerat, bilem esse in culpa, surdo narratâ fabulâ, id post mortem apparuit satis, bile granulatâ penitus apparente & ultra tria millia granorum exhibente, & calculis cum pinguedine mirâ repertis in inguine, cujus rei testis est exceptio major, qui Anatomico cultro cadaver subiecit Excellentissimus *D. Fascinus*, h. t. Academiae Rector Magnificus.

Mortuus tabe infans à fascino laborare putatus, cum post mortem citius corruptionem minueretur abdomen justo elatius, habitus merito fuit ex obstructione vasorum mesentericorum defunctus à Præside, quam sapius curavit solis aperientibus martialibus, humectantibus & nutritiosis, nominatum Tinct Mart. aperit. & arcan. duplic.

Laboraverat tumore in scapulâ rebeli puella 16. annorum, consultus idem *agnoscens* dissuasit apertionem factio prognostico, æmulari cancerum occultum ejusmodi tumores, & si

& si aperiantur, moriendum esse, tolerabili ceteroqui malo, alitque corrigendo. Nihilominus ab empirico apertus idem, nil nisi sanguinem & ichorem fudit, indies incrementa capiens. Mortua tandem in via, reduce a carnice, sentiunt somnum quendam parentes, & aspides nescio quas residentes in tumore sibi haurunt. Iuxta inspectione & apertione ulteriori sola fermentatio ichorum somni illius causa patuit.

Hinc non ita pridem de consimili tumore duro & magno, circa sinistram thoracis latus, orta suspitione fasciæ, quasita inclyta facultas Medica hujus loci respondit, *das die angeführte Umstände zur probation einer Zauberey nicht bindung, sondern vielmehr die erzählte Zufälle, so der Patient erduldet, allein ex causis naturalibus erklären können.* Rationes decidentem tuere aditæ quoque, quod ejusmodi tumores mali moris & rebelles non raro in scorbuticis fuerint observati, dolores ab humoribus acerbis corrupti orti, & ab intempestiva apertione tumores indies in deteriorem statum ruant, & quicquid occurrat circumstantiarum ex naturalibus causis deduci possit, imprimis vero quod nihil inventum fuerit ultra sphaeram naturæ transcendens vel insolitum.

Et talia toto die obvennunt alia quoque. Visi sunt a vernibus nunc torti, quale exemplum in vicinia contigisse meminimus; ubi præ anxietate spasmodica saepe capite intus coacta sunt tanquam, inventis post mortem lumbricis pluribus, qui per intestina exesa in cavitatem abdominis eruperunt, notante id *L. Alarci*, Physico Watershusiano. Visi, qui in cavitatem thoracis aliquid vivi & instar vermis repentis, qui cor ipsum eroderet, conceperunt, unice id a fascina derivantes. Post mortem abscessus repertus docuit satis, materiam purulentam illum tuisse motum, quod itidem laudatissimus *Dom. Fasciatus* observavit.

Dignissimus locus est, qui hic inferatur, *Gassendi lib. 1. de vit. Peireskii pag. 12.* ubi, cum memorasset, ab amica malefica ingrediente per fascinum tum matris ademptam vocem & infanti bimetri ploratum, tum depressum utrique caput in alterum humerum, eâ rigiditate, ut flecti non posset, addit sequentia: Utcunque Optimus Deus innocentes infantulos malitiae cacodæmonum permittere possit; utcunque ipsi ad ea officia, & ad obsequendum miscellis quibusdam oculis se comparent: conipertum est tamen magnam eorum partem, quæ commemorantur, fabulosam esse, aut non alio certe nitifundamento, quam minus solitis quorundam morborum symptomatibus, quibus sunt infantes obnoxii.

Merito hinc morem hunc vulgi, quosvis morbos, quorum causas non satis assequitur, vel symptomata miratur, promiscue ad fascina referentis, carpit *Anton. Prætorius im Bericht von Zauberey und Zaubern cap. 9. pag. 58.* *Es ist leider dahin kommen, so bald einem die Augen verdunkeln, der Bauch grimmet, die Finger schwellen, die Füße geschwellen, das Herz zersehmetzet, die Seele ansahret, oder das Vieh verdorret, verlahmet, versaget und stirbet? da rufft jederman, das gehet nicht recht zu, denn ist vergehen. Er hat am Apfel gefressen, er hat es vom Trunk bekommen. Da gedencket man weit weiter, was man getrunken, was zu*

essen gegeben und getrunken habe, was bey geessen, was angegriffen, und was mehr. Bald verdencke einer diesen, der andere jenen, wie redet man heimlich, da rufft man laut, der und der hat gethan. Also wird Leid mit Leid versaltzen, und Jammer über Jammer angerichtet. Ach! das ist zu viel, unrecht und leichtfertig gehandelt. Es gehören erfahrene Aerzte und Naturkundiger dazu, das Krankheiten, so von Gifft kommen, erkannt und von andern unterschieden werden. Hæc ille.

Fiunt monstra in Medicina toto die, quæ aliis non visa satis hunc censum subeunt. Ac proinde id vulgo, quod plerumque, quæ quotidie non occurrunt, ad fascina refert, sic argutanti condonatur; ast docti sic inferre promiscue, nisi evidentia signa contrarium suadeant, cavent.

Morbus a fascina curari remediis naturalibus.

Præternaturalis causa, à Damone protecta, uti ad Medicum minime pertinet, sic nec curatio, verba sunt *Plateri lib. 1. prax. cap. 3. p. m. 106.* ubi de obsessione agit, quod & alibi, & nominatim de ligatione a fascina agens, repetit, non Medici esse illam solvere asserens. At nunquam desinit subjectum Medicinæ esse corpus humanum, etiam si a Damone obideatur actu, vel ab eodem quomodocunque a statu naturali laesum fuerit.

Spiritus ipse est, *amici*, corpori verò morbum sine medio naturali inducere verum nequit, quod digestimus satis. An putabimus ergo, quod impium est statuere, Deum O. M. liberaliorem esse in infligendo morbos, quam sanando? Uni malo mille opposuit remedia. Quandoquidem ergo corporis naturalis, quod diximus modo, sit vel laesa est læsio, meritò etiam naturalibus remediis suus est locus.

Duo genuina concessa morborum horum sunt remedia, preces & medicamenta; Spuriū & pejus morbo, aliquando male quæsitum, damonis obsequiosa curatio, magica uno verbo.

Preces divinum sunt remedium, & agro & Medico unice commendandum.

Ni Deus adjuverit, virescunt insuderis herbis,

Nil tibi diptamum, nil panacea juvat.

O quam pie *Hippocrates* noster, (qui locus apto dignus & inter reliqua scripta præcipuus est,) *in xxv.* scribit, *πρῶτον, & διὰ τὸν ἀγῶνα. Orare decorum & valde bonum est, lib. de inform. cap. 2. 1. 12.* Imò liceat nobis & alium locum de precibus elegantissimum ab ethnico mutuari, qui extat apud *Xenophontem lib. 1. de ped. Cyri pag. 21.* ubi *Cyrus* differit egregie: 1. Rebus secundis maximè Deum esse implorandum, (multò magis verò adversis, & hoc loco misero, morbo suo itatu;) 2. Manus admoventem implorare divinam opem oportere indigum. 3. Auxilium Dei diligentiam humanam non tollere, unde absurdum addit esse, petere, ut ager fructum ferat, semente non facto. Deus per media agit, licet pro infinita omnipotentia solo nutu, sine ullo medio, agere possit.

Cur ergo negligamus divinam manum, in medicaminibus repositam, & solis exorcistis v. gr. obsessos committamus? Cur pro *magis* agros relinquimus, denegatâ omni ope, sicque ad veneficas sæpè occasionem subministrantes ut convertantur? *de præter. im-*

perat.

perator corporis est Medicus, elogio Philosophorum coryphæus, non diabolus. Excute ergo & ab internali hoste illata ipsi à Deo demanatum est, & natura & Deifunni ministro. Hinc testatur experientia sapiens, curari feliciter morbos à fascino, modò audentius contra eat Medicus, jure suo utens, quod nullum habet in pium diabolus.

Laudandum hanc in rem illustre exemplum est, quod memorat *Erasmus Declamat. de laude Medicin. Tom. 1. oper. p. m. 436.* Ubi, præmissis huc facientibus aliis, Panaceum ait, celeberrimi nominis Medicum, adolescens colui, is, me teste, quendam restituit, nomine Phylarium, patria Spoletanum, qui ex vermibus in novum manæ genus inciderat, ita ut in morbo teutonice loqueretur, quod (uti constabat) nunquam sanus potuerat. Quis imperitus rei Medicæ non hunc dæmoniacum vel dejerasset etiam? At is hominem facili paratoque remedio menti reddidit. Redditus sibi teutonice nec loquebatur, nec intelligebat. Omittimus, quæ subiungit & alia elegentia. Reverà id supra sphæram naturæ, adeoque dæmoniacum fuit.

Neque tamen putandum est, quod inuere ibidem videtur, esse crassiores quosdam dæmones, qui medicam etiam opem sentiant. Satis est nidum extimulari, amnuente votis Jehovâ. *Piè Paracelsus*: ideò creata est Medicina, ut superfluitio devitetur, & Medicus pro illa; & Deus solus Deus est, etiam si orcus moveatur. *Fragm. 1. de morb. ex incant. pag. 139.* Præstant ergo id arma Medicorum, ad indicationes, vi Methodi medendi decenter erutas, directæ, quas, de medicamentis contrà fascino nos edocens, canoni sequenti inclusit *D. Preses*: Quæcunque vel principia vitali tutantur, vel effectus naturalibus conformes specificè tollunt, vel satanicam vim illudunt, fascino sunt antidota.

Accersenda ergo & huc evacuantia & alterantia, interna & externa. Purgantia, tum *2.º*, tum *3.º* operantia, & in morbis à fascino remedia sunt probatissima, siue alvus fuerit obstructa seu per venenium ingesta in primis viis subsistant, seu saltem bilis alique humores ibi corrupti hæreant. Hinc uti observatum est, à veneficis per vim infusa nonnunquam quædam, nocendi & fascino indifine; ita his exturbandis unice præstiterè opem non raro emetica. Sic *B. Michaelis* alicubi refert, se generosum quendam nobilem, ex fascino sterilem, intra paucos dies felicissime per vomitoria curasse, & vidisse tres vermes nigros cum magnâ venenatæ materiæ copiâ fuisse rejectos.

Idem valet de philtis, de maniâ & melancholiâ satanicâ, (probè tamen distinguendâ,) de obsessis & similibus, quibus hoc ipso vecte, non alio præsentius, mederi licet, unde helleborus niger, antimoniatæ & vitriolica, imò & asarina emetica, ut alia lenientia quoque & clysteres ipsos non memoremus, huc eximè faciunt.

Diaphoretica ut apta nata sunt excutere peregrina præputa, feri ræon & ichorefcientiam prohibere, liberamque aditæ glandulis in poros cutaneos hiantibus præstare; sic insignissime profunt in morbis à fascino, nominatim in tumoribus, inflammationibus, dolo-

ribus, anxietatibus, aliisque, unde huc faciunt Rad. alii, succis herba paris, camphora, nyrha, infusum sanguin. alin. Tinctura bezoard. spir. sal. arm. C. C. ebore. spir. & sal. volat. tulig. liquor. C. C. succinatus, antum. diaph. theriaca, mithridat. ruta & ex his parata alia varia.

Diuretica quin ipsa quoque apprime opem ferunt, serum superfluum ex alveis suis ad vias urinarias derivando, ejulque varia coagula, indeque ortas obstructions tollendo. Hinc aperientia, Edina, saponaria, speciatim in macie, tumoribus ventris, ischuriâ, impotentiâ ipsa non sunt de nihilo, v. gr. ex eryngio, tulice, verbenâ, Tinct. Mart. aperit. nephrit. Wedel. arcan. duplicat. arcan. tartari, tart. vitriolat. spir. sal. ltriat. vitrioli Philo'soph. nitri dule. sal. urin. & succini, ocul. caner. & cum his paratis.

Ipsa vero Alterantia specifica varia quidem recensentur apud Autores, optimè vero juxta dictam divisionem patere possunt, opposita vel universali læsioni, vel effectibus determinatis. Cum enim vita & sanitas radiceatur in sero & sanguine, tanquam principis vitalitatis, & fascino ad instar venenorum subruere eadem satagant, si non actuali veneno, confirmata tamen sigillata caractere, merito opponuntur hisce bezoardica & balsamica, sub diaphoreticis jam exposita.

Idemmodi polychresta & pluribus symptomatibus satisfaciunt sunt cumprimis viscus colurnus, antarrhinum, ruta, filix, verbenâ, adiantum aureum, & præ aliis hypericum, fuga dæmonum hinc dictum, omniaque exinde parata. Dilaudat id ipsum mirum quantum hunc in nem *Paracelsus lib. 3. de reb. natura. cap. 5. p. 1038. & seq.* & hinc quoque *Angelus Sala* stupendos effectus vidisse se refert *1. de essent. veget. cap. 4. p. 7.* & de eodem insignis siue fabula siue historia ex *Hercule Saxonia* citata videri meretur apud *Scipion. Mercur. de Obs. r. lib. 2. cap. 38. pag. 511.*

Cumque balsamica sit pl. ura, si quæ alia, & ad maciem, impotentiam, dolores & imprimis melancholiam, &c. Ex causis manifestis eximè conducant, præ aliis ad fascino commendatur non immerito; sumenda tum in essentia balsamica, tum mixtura l. c. *A. Sala* laudata, bis in die, manè ante solis ortum, & vespere ante somnum, quod speciatim commendant sine dubio ideo, quod morbi serosi & inter hos quoque fascino debiti nocturno tempore magis soleant exacerbari. Faciunt huc quoque corallia, quorum Tincturam Helmontius multum solaminis attulisse testatur, ess. antimonii simpl. & comp. spir. & oleum Heraclina, &c. Ostriquetrum Cranii humani, tum per se, tum combustum mire laudatur.

Sin ad exempla morborum specialium devolvamur, in melancholia ess. hyperici, spir. sal. armon. infusum sanguin. asini, Tinctura smaragdi profunt. In impotentiâ rot. stimul. Myns. non semel expertæ, chocolada Indæ, collect. alkermes, ess. satyr. officium faciunt. *Helmontius lib. de lithiasi cap. 8. §. 25.* dilaudat cerevisiam, in quâ betula cocta. In doloribus anodynâ; in motibus convulsivis Epileptica activiora ex usu sunt, & sic quoque idem valet de aliis.

Succenturiantur his Topica varia, causas morbuicis inductas exturbant: Inter appensa laudatur Mercurius vivus; electrum immaturum

turum Paracelsi, intus & extus usurpatum, suis experimentis dilaudat *Helmont. l. de injunct. med. pag. 48.* Cynoglossum Dioscoridis superiori seculo expertos esse alexipharmacum præstantissimum contra fascinationes civis Genevæ re-
fert *Singher. schol. in pharmac. t. 1. pag. 147.* sine dubio, vel emolliente vel anodyna virtute, ipso-
ne tetro odore id præstante.

In Balneis, præter alia jam laudata commu-
nia, ex ruta, hyper. verben. abrot. in primis ad
manciam commendantur ob absterforiam virtu-
tem siederitis & conyza coerulea, ruga vulgò
dicta *gros und klein Beruff-Krant*, quæ etiam ner-
vina sunt, non minus ac Unguenta & Empla-
stra. Celeberrimum inter hæc est unguentum
de visco corylino Carichterii, quod *Heer. observat. 6. pag. 128.* Item *Horslim lib. 11. observ. 16. p. m. 549.* Commendat, ubi & alia egregia re-
periuntur. Viscus sane nervinus est itidem &
emolliens. Ex emplastris instat omnium est em-
plastrum scitidum Mynsichti. Ad quævis, ait
Auctor, malencia experimentum est stupendum
& quasi cælitus demissum, super centrum enim,
ubi cruciatus, persequendo positum, non tan-
tum malencium ipsum, verum etiam omnia
phantasmata & incantationes sine superstitione
& contestum ligit, propullat atque debellat,
sed internis non onusis.

Joh. Agricola in Chirurg. parv. tract. 5. p. m. 646.
abscessibus vel tumoribus incantatione indu-
ctis imponere jubet excrementum proprium,
hinc suspendere id in vesica suilla in fumum, &
iuxta paucum tempus evanescere dolorem,
quod ipse fuit expertus. Nec inconvenientia
sunt ipsa suffimenta, dissipandi, alterandi, de-
molecendi virtute conspicua, tum ex dictis, tum
ex aliis, quatenus sale volatili oleoso, in ato-
mos minutissimas per ignem redacto, partibus affe-
ctis succurrunt.

Plura remedia, contra quoscunque morbos
venenosos, si quis scire audeat, vid. *Barth. Car-
richterii Herbar. tit. Von gründlicher Heilung der
Zauberischen Schaden, & lib. 2. de ulceribus anti-
quis cap. 10. & seq. Codronehium, Helmont. l. c. &.*
qui instat omnium esse potest, *D. Frommannum
tract. de fasciatis.* Exempla verò morborum ex
fascino curatorum plura memorant Autores
varii, v. g. *Mart. Kul. Cent. 3. observat. 100. D.
Schorerus in Medic. peregrin. p. 205. Thonerus lib. 4.
observ. Medic. 1. & alii.*

Pertinent huc remedia alia quoque licita
pro fascinis averruncandis, quæ nempe in illu-
sionem cedunt Satanz ac contemptum. Super-
bissimus est spiritus daemon, unde nihil minus
ferre potest, quam quæ in ejusdem ignominiam
cedunt, vel precibus præviis forti animo op-
ponuntur. Sic anu sub fascini administratione
vapulante, apud *Gassendum l. c. mater & infans*
fascinati restituti sunt, nullo alio quam plaga-
rum sufficientium remedio. Sic alium & assa
ferida lattrinæ indita & cum fecibus incantati
confermentata dicuntur stercoreum saporem
incantanti inferre. Sic mixtio per annulum
sponsalem huc referri potest, à ligato faciendâ,
aliaque jam dicta, modò non superstitionis
reatum præ se ferant. Neque enim curatio Ma-
gica, etiamsi primâ fronte talis non videatur,
ullum habet locum, unde non imitandæ histo-
riæ hinc inde annotatz, ubi sagarum murmure

ablatis leguntur morbi à fascino. Talia exempla
recenset *Cass. Ca'der. de Hered. Tribun. Medico
magico sect. 11. art. 1. pag. 68.* ubi & hæc facientia
plura præmittit.

Tale etiam relatu dignum exemplum conti-
git non ita pridem in pago Bucha, præfectura
Nonzensis in Comitatuschvartzburgico, quod
coronidis loco atreximus. Incola ibidem, in
variis mechanicis artibus parandis cæcoris,
Johannis Hoffmanni, annorum 40. vitæ inte-
gerrius, ædes catus niger, antea non visus, an-
te duos annos frequentavit, caseos, o. a galli-
nacea & lac sæpè subducens, adeoque damno
non levi pagum hunc afficiens, ut de remedio
ei opponendo cogitare teneretur. Cum ergo
aliquando hospitem hunc molestum in horto æ-
dibus contiguo conspiceret, bomb. rdæ explo-
sione illum occidit. Projecturus eundem extra
sepis oleas, nondum penitus mortui pedes de-
curtat, atque sic ejicit horto, quo loco sequenti
die non repertus, nec fuit, qui anulum conquæ-
reretur. Elapso mense ingruente nocte domum
ex agro repetens in prato prædio suo vicino
catum eundem offendit, eumque sæpè verberibus
petit, sed frustra, saltu icum semper decli-
nante. Postridie ingentes dolores dextri oculi
perferens, tertio die ob eorundem adaucias
fases prodit in pagum, ubi tamen persillere non
fuit integrum, examen enim vespæ dextro
oculo subito ingruit, quod impossibile fuit de-
pellere. Celeri pede domum se confert, vespæ
presso pede insequuntur in supremam ulque
contignationem. Dolores ingravescunt indies,
ut per quatuordecim sæpè dies insonnes noctes
ducere cogeretur sequitur cæcitas per 3. heb-
domades durans. Medicos consulit, sumptibus
non parens, sed frustra; quotidie spinas, stu-
pas, pilos, grana mihi ex oculo extraxit. Ela-
pso hoc tempore cum malum hoc sedem muta-
ret, & in sinistram oculum consideret evenit,
ut tres ignorâ facie scæmæ ipsam inviserent, &
iter ex Ægypto ad illum susceptum simulantes
curam promitterent, modò de soltro conveni-
rent. Promittit quinque imperiales, enumerant
rem totam, ut gesta erat, & de octis herbis
aliquot visum perfectè restitunt, dimissæ hinc
unde venerant.

De Dixta tandem non attinget seorsim plura
dicere, conformandâ ad morborum proprium
genium, unde hæc vice discursui huic finem im-
ponimus.

Clarissimo Doctorando S. P. D. Praeses.

De divino in morbis frequens occurrit tum
apud Medicos, tum alios quoque eruditos dis-
cursus, non æque tamen constat, vel singulis
cordi est, quidnam per id ipsum innatur.

Cum dulcius ex ipso fonte bibantur aquæ,
inexhaustum verò suggerant divini Hippocrati
scripta, fas est eundem velut primum autorem
consultere, & quid subit, sciscitari. Ita verò hic
l. 1. de morbis cap. 1. l. 14. dicitur inquit, & dicitur
Simul verò & si quid divini in morbis inest,
etiam hujus præmotionem ediscere oportet.

Non nostrum est loculos excutere interpre-
tum, vel acquiescere communi quæ involuit opi-
nioni, per divinum in morbis intelligi morbos
à fasci-

à fascino. Repugnat id omnino & pietati divini semis, & textui.

Pietati quidem, argumento totius libri de morbo sacro, ubi satis probat, quantum naturæ sacerdos alienus sit a superstitione, & ponit, magos mala & morbos inferre, id Æm. divinum nullo modo vocandum esse, L. c. c. 3. t. 32. Taceo, quæ sobriè admodum de Dei puritate & bonitate addat.

Textui vero id contrarium est, si antecedentia & mentem lustremus. Cui. Agens enim de prædictionum medicarum necessitate & excellentiâ, summam rei complexurus scribit, nosse oportere morborum naturas, *nam viri ratiōe dīgnis viri ratiōe dīgnis*, quantum corporum vires excedunt.

Regula hæc unica est & norma certissima omnis prognosticos, ex qua tanquam ex tripode licet augurari, hunc evasurum, hunc non oriturum; proportio, inquam, inter morbum & naturam, & vires utriusque inter se comparatæ.

At, cum in morbis aliquando contrarium eveniat, ut qui evasuri videbantur satis cedant, & qui morituri prognostico relictī erant, evadant, tum alibi jam inculcat, 2. *Aphor.* 19. non omnino certas esse prædictiones in morbis acutis, tum *id Æm.* tendere hoc loco jubet.

Divinum ergo in morbis ait, et auctoritate, si extra regulam illam quidpiam eveniat. Decumbit studiosius maligna febris, ad sunt convulsivi motus gravissimi, pulsus frequens, inordinatus & debilissimus, teles invitz prodeunt, oculi teroces, natura prostrata, evadit tamen.

Alius, febris maligna itidem laborans, ad oblata bene habet, vires constant, pulsus bonus, urina bona, moritur tamen. Utrobique Dei digitum veneratitas est omnia ex artis legibus facienti.

Idque toto evenit die, cum primis in morbis epidemicis, unde alterum, juxta Hippocratem, *æstivum* est divini in morbis, cum plures indifferenter morbo eodem corripuntur, & biliosi & pituitosi, seu dispositi & indispositi, Tros Rutulive fiet. 1. *de morb. sacr. cap. 5. t. 13. & 14.* Exemplo sit pestis, ubi divini hujus innumera contingunt exempla; ut adeo si non à priori, tamen ex post facto pateat satis, fatalem adfuisse horam, Dei hoc esse, Deoque debere adscribi unice vitam & mortem.

Addi quinimo possunt huc alia quoque, quæ in morbis contingunt omina sæpe, sive per infortunium, sive per sonum fortiozem, & velut sublapsum domus; sane & illa divina sæpe sunt monita & ad divinum in morbis referri debent.

Quod verò magicos morbos attinet, quando ultra naturæ vires absurda quædam se exerunt, illa sanè ad divinum in morbis nullo modo spectant, nisi eatenus velimus id. contra Hippocratem mentem, explicare, quod Deus permittat hæc talia demoni, ad nutum malefici hominis, sed valde *avertit*. Non divinum scilicet id est, sed magicum, & diabolicum.

Sed, ne ultra propositum evagetur oratio, breviter hæc suffecerint ad explicandum *id Æm.* in morbis. Finio ergo, & ut laudatissimis studiis condigna præmia divinitus obtingant, gratulante & votivo animo precor. Dab. è mense 1682. Calend. Septemb.

Rudolph. Wilhem. Krauss. Philos. & Medic. Doctor. Prætic. & Chim. Profess. publicus. Facultat. Medic. Senior & h. t. Decanus Lectori Benevolo s. d. p.

Magi nomen æque ac magorum apud antiquissimos mortaliū nonnullum erat ac venerabile, contra quam solet nos die ad res turpissimas trahi, & qui ejus cognoscendæ illud occupati, inter sæculi dedecora atque opprobria connumerentur. *Hesychius* magni describit, rerum divinarum curatorem, *Democritus*, *Democritus*, qui sacra tractat, & illis operam suam addicit. Neque tamen magi ab initio naturam curam spernebant, intenti siderum curi, ortum, variumque motum & occasum diligenter utillime observantes, anni tempestates, & hujus generis plura scrutantes anxie, ut *Suidas* ob cæmentatæque cognitionem præcipuum in numerito *Philosophi* illos & *Philosophi* appelleret, qui sapientia humanæ ac divinæ æditi essent. Sed ne soli putemus incubantē contemplationi, & jucundis meditationibus, activæ pariter vitæ studiosi, rationem transire imperia teliciter administrandi, respublicas instaurandi, leges & salutem publicam condendi, quæ regibus a puero diti comites indivisi, ut horum consilio fruerebantur. Hæc itaque causa noscitur, quæ re nemo summam rerum inter Perlas suscipere potuerit, nisi magi studio probe excultis sue sit. Estet hæc amplissimus campus, per series annorum demonstrare, quænam ex his præstatitiores, in maximis imperis gloriosis factis eni inveniunt, quænam consilio salubritate regibus adjuverint, quæ per eosdem scientiis ac disciplinis olim incrementa accesserint: verum sic extra sphaeram propositi forte constituti in aliena digrediemur. Sufficiat vel tribus ostendisse, quænam insigni nomen atque honoratum ab initio magorum fuerit. Quando tamen nihil tam præclarum habeatur, aut eximium, quin pravitatem ingenii, & successu temporum, in sequiorem partem inclinet, id manifeste magi exemplo condiscimus. Circa religionem duo statuebant principia, magi cultores, lucem ac tenebras illique bonorum omnium. his autem malorum tribuebant priordia, causam & originem; & quæ sententia, seu fonte errorum, ingentia mortalium incommoda extricere. Ipsi magi ex altera parte, non lucem sectati, opera tenebrarum potius facere optarunt, tanta impietate, ac facinoris malignitate, ut nefandas incantationes & veneficia denique profiterentur. Qui lucem odit *Cacodemon*, magister erat, inque perniciem hominum ea excogitabat, quæ speciem artis habebant, & à viris auctoritate & sapientia commendatis ad communem secessum transibant. Auctæ sic miræ superstitiones, cognitæ fraudes nocentissimæ, diaboli imitæ artes, & execranda mortalium execratio pecuit, quibus ex detrimento plurimorum & odia iustissima & supplicia statuta sunt. Illinc voces horrendæ præstigatorum, veneficorum, sagorum, incantatricum, mancipiorum nuntiorumque diaboli, hinc exquirilium cruciatus, rogi, accensæ pyre & his similia. Nec immerito, ob pacta illa sive explicata sive implicita cum tenebrarum principium, ob detestabilem baptismum illum & abnegationem,

gationem, renunciationemque omnium impurissimam, obpollulata illa pestifera, & alia ineffabilia. Quis jam percereret remedia, & superstitione protecta, quibus effectus naturalis adscribi nequit, ac quibus ad non naturale quid præstandum tenere utuntur. cuius generis sunt verba ignota, characteres, circuli, ligna innumera? Adeo enim nemo extra semetipsum constituitur, qui rebus per se inefficacissimis tantam inesse crederet virtutem, qua tot miranda contingunt, nisi pactum accederet tacitum, ac turpissima cum hoste generis humani collusio. Et quamvis in operibus his nefandis ~~miris~~ ille potissimas exequatur vires, utpote qui omnem aucupatur occasionem miseris nocendi mortalibus, ministerio tamen magorum utitur ac sagarum; ut sic verissima sit opinio *del Rionis*: Magi possunt multa operari mirabilia demone adjuvante, ac Deo permittente. Scilicet hic solus est, qui verbis ipsorum tum ore prolatis, tum etiam scriptis, sive characteribus, vim tribuit, & omnem efficaciam imperit. Ecce enim quæso adhiberent serias adorationes, tot obsecrationes, comminationes? Cur prostermerent corpora, & alia peragerent nefaria, quam ut magistri sui nequiti in implerent, sine cuius auxilio nihil plane efficere possunt. Quod sine rubore vix dixerō, sunt inter Medicorum filios nonnulli, qui sibi & aliis persuadent, licitum esse remedium, characteribus in curatione uti, ac tantam verbis tam ore prolatis, quam stylo consignatis inesse virtutem, ut morbi aliàs pertinaces & invicti his superentur. At profecto suam in rebus naturalibus imperitiam, in disciplinis pruritur, inque studio Christiani hominis impietatem produunt, ac sese præterea Medici honore ac titulo indignos reddunt, quod, nisi brevitati licendum pluribus demonstrari posset. Pari quoque ratione vulgi sententia putatur illa, qua cuncta præter naturam eventientia sagis protinus imputantur, *Es sey einem gemacht*, sicut neque admittitur *Wieri* contraria, qua negatur, incantationum nullam esse efficaciam. neque hinc morbos oriri, quod experientia & rectæ rationis iudicio convincitur, sicut ex Inaugurali Disputatione de Morbis ex Fascino, videre est, quam publicæ ventilationi exhibiturus est clarissimus & dignissimus artis Medicæ Candidatus Dn. *Friedericus Kefeburg*, &c.

FASTIDIUM CIBORVM.

Vid.

ANOREXIA.

FAVI.

Vid.

CRVSTA LACTEA.

FEBRIS.

Febus pro Dea culta fuit apud Veteres, eique ne noceret Romani tria consecraverant templa, primum, scilicet, in Palatio, secundum in Marianorum arce, tertium in summa Vici Longi parte; ac in illa remedia corporibus febricitantium prius iuncta, deferebantur, tum

ad præsentem fugandum morbum, tum etiam ad eundem adventantem arcendum. Hæc n orbus Græcis *ἡ Febriς, τὸ πρὸς*, imò si ardentior fuerit Hippocrati absolute *πῖρ*, dicitur: Vocem autem *Febriς* quod attinet; Sennertus postque cum Willisius, putat. *atm*is a *februo* dici, quod verbum uterque ab alio scilicet *ferveo* deducit, addita ratione physica, quod purgamenta cum optime per fervescentiam periciantur, sic itidem februo quod significat expurgo a *ferveo* optime derivetur. Verum præterquam quod non valet consequentia, liquor effervescentis commode expurgatur; Ergo *februo* expurgo a *ferveo* bene derivatur, omnis purgatio non fit per effervescentiam, ac de effervescencia nequidem sonnuando cogitabant Veteres cum Februarium mentem ea propter vocabant quod per illius decursum Dns Manibus placandis ædes suas hiltrarent & expurgarent; sic nec etiam ad illam prorsus attendebant in denominatione februa Dex, a *Februa* seu purgationibus propterea dicta: quod feminas post partum, secundis exeuntibus purgare putaretur. Præstabit itaque cum Vossio ac etiam Schokio, febrem deducere a *fervere* seu *ferbere*, inde enim *ferbis*, ac per literarum transpositionem, *febris*. Verum quid istis immoriamur, quin potius pergitur ad huiusce morbi definitionem de qua sanè acriter apud Medicos disputatur.

Galeno cum febris natura ipso nomine cognita crederetur, *definitionem* ejusdem asserre & supervacuum, & inutile visum est; ex illius tamen operibus satis elici potest; vocat enim febrem alicubi conversionem nativi caloris ad ignem; alibi excessum intemperiei in caloris abundantia, ut & totius animantis immodicum calorem. Ex his Avicenna proculdubio definitionem suam consarcinavit quæ talis est ex Arculani interpretatione. Febris est calor extraneus accensus in corde, & procedens ab eo mediantibus spiritu & sanguine per arterias & venas in totum corpus, inflammatur in eo inflammatione, quæ nocet operationibus naturalibus: non sicut caliditas iræ & laboris: cum non ultimatur, vel cum non pervenit ad hoc ut sit accensus, & nocet operationibus. Avertthoës calorem in genere pro febris essentia adduxisse non contentus, specialius scribit eum compositum esse ex naturali & præternaturali. Fernellius qui incultam & obsecram Arabum dictionem, advertens eorum nomina ut placet Roderico a Castro obscurare decrevit, edito egregio opere quo universam fere medicinam complexus est, febrem uno verbo atque secundum eorundem mentem dehinc Calorem præternaturam e corde in omne corpus effusum. Sic etiam Sennerto. Febris dicitur calor contra naturam in corde accensus, & ex eo mediantibus spiritibus ac sanguine per arterias & venas in totum corpus diffusus, actionesque naturales lædens. Seu potius: Intemperies calida totius, a calore præternaturam in corde accenso, & mediantibus spiritibus & sanguine per venas & arterias in totum corpus diffuso, ortum habens, actionesque naturales lædens. Ne nimis sumus, abstinemus ab aliis definitionibus adducendis in quibus quamvis aliis verbis calor de febris essentia declaratur, ut videamus jam quomodo hæc veritati conveniant. Celeber. Helmontius,

super hac re sic habet : Cum in Scholis calor sit essentialis febris, debet imprimis a febre ita esse inseparabilis, ut febris mentaliter concipi nequeat, quia individuus sit illi comes calor iste : sed se noviter obicere Calentes febres, quæ extra utrum ac in nitellum calorem accidunt ; ita est ab initio in finem vitæ usque, absque calore suavi peragunt tragœdiam. Si dicant has febres Veteribus ignoras, nec ideo sub demutatione comprehensas ; concludo saltem inde has febres, aut ideo non posse esse febres, aut febrium essentiam non alligari necessario, sed tantum per accidens calori. Præterea quicumque frigus penetrabile per horas aliquot senserit, in febrium principis, non persuadeat tamen febri sibi inchoatam non adesse, sed alium affectum hactenus anonyum. Etenim quamquam concutitur rigore, dentibus quatit, labrilque præ frigore liveat, persuadeat tamen sibi per huiusmodi squalores, febrium initia illa non esse febrium initia : neque enim qui talibus initus moritur (quod plerumque in intertuentibus fit) vera febre extinctum, credat qui vult : etenim non soleo de contingentibus sensu notis, alium advocare iudicem præter tacum ; ita enim stupidus sum, quod de sensibilibus, non nisi sensuum iudicio ito. Medici vero optimi, &c. *Vnde concludit* ; utcumque calor præter naturam auctus possit esse indicium febrium, ipsum tamen non esse febrem, nec illi inter medendum magnopere esse insudandum. Sic etiam Clar. Bontekoe. Calor non est ipsa febris, sed ejus tantummodo effectus, vel ad summum pars aliqua ipsius, ita ut qui febrem nihil aliud quam calorem statunt, pari ratione loquantur, ac si dicerent, brachium, vel crus hominis esse integrum hominem. Et in sequentibus addit. Cum itaque febris existeret possit absque calore, quales sunt ex gr. febres illæ agida in Belgio adeo frequentes, in quibus ægri nihil aliud sentiunt quam frigus : hinc luce meridiana clarius patet, calorem & frigus febrium tantummodo esse effectus, non secus ac lux & calor effectus sunt ignis. Et quod notandum, febris potest existeret sine calore & frigore : quippe febricitans dum febre laborat algente, vel conquassante, nullum per sentit calorem, pariter nec frigus ipsi molestum est, quando causo infestatur ; nam si reapse calor ipsa esset febris, sequeretur necessario cum qui incaluit labore, nimia exercitatione, vel æstu solis, igne & similibus, febre quoque revera laborare, quod Doctores nostri animadvertentes, hunc calorem dixere præternaturalem. At si febris revera esset calor, atque cor illius focus, ubi primò accenditur, prout sibi persuadent, necessario flammam conciperet & delagraret, antequam quispiam in membris externis, possit observare calorem adeo insignem, cum experientiâ teste videamus calorem magis calefacere & incendere corpora proxima, quam quæ sunt remotiora. Jam verò considerare oportet, quòd si quis ægrotantium querelas audiat, deprehendat, eos præcipuè conqueri de dolore regionis lumbaris, capitis, vel alius corporis partis, rarissime etiam æqualem ubique per sentiscere calorem, vix unquam verò conqueruntur de insigni aliqua cordis inflammatione, vel calore. Si febris insuper revera consisteret in calore, ne-

cessario ea toret continua, & tandiu duraret donec omnis calor, ut ejus causa, prius esset dissipatus : ut si hoc verum esset, tum non amplius febres haberemus intermittentes, certo tempore, ac præcise recurrentes. Porro si calor reapse esset febris, & ab una eademque posset incendi materia eam producente, proculdubio sequeretur febre extinctum ea adhuc dum laborare & esse calidum ; cum materies quæ febris causa fuerat, adhuc in defuncto tenderet, calor etiam tanto magis subnitere deberet, si febris ex mente Autorum nostrorum ex aliqua proveniret putrefactione. Nam si revera sint febres putridæ, unde fit, quod quamprimum ac aliquis ex febre obit, calor una cum vita extemplo cesset ? Cum tamen materia corrupta adhuc super sit, & corpus paulo post mortem factorem emittere incipiat. Adeo ut si febris & calor originem ducerent a putrefactione, sequeretur calorem & febrem post obitum non tantum permanere, verum etiam intensiora esse. Unde optime concludimus, calorem aliunde oriri, nec ad essentiam febrium aliquid continere. Præterea si febris consisteret in calore, omnes febres ejusdem essent essentia, & Doctores nostri seniet ipsos quam maxime deciperent, statuendo tam diversas & differentes febrium species, (experientia enim nos æque ac illos docet, varias earum dari species) cum calor semper sit calor, nunquam vero aliud observetur discrimen, quam quod sit intensior, vel remissior. Interim deprehenduntur febres non disterre inter se ratione intensioris vel remissionis, vel quod revera diversi caloris gradus percipiuntur, sed quod revera diversæ dentur species. Hinc cum differentia in febribus occurrentes, absque controversia sint, nemo ratione præditus iudicet ibi calorem non esse ipsam febrem, cum unus idemque calor diversas nequeat efficere febrium species. *Hæstern Bontekoe* Exemplum febris pure frigidæ a se observatum refert Clar. Ettmullerus. Erat hic, inquit, artifex, qui laborabat perfecta tertiana, anticipando tamen semper duabus horis cum nullo subsequente calore. Pateris inclinabat ad phthisim, ac erat insignis scorbuticus. Paroxysmus ingruerat cum insigni horrore & frigore gravissimo, qui ultra horam integram durabat, postmodum, cum deberet succedere calor, nullus sentiebatur, sed loco huius acerbissimi dolores totum corpus, omnesque artus excruciant, imprimis regionem dorsi & femora, & in specie in regione dorsi lumbari circa locum connexionis mesenterii. Circa finem interdum materia viridissima amaricantis saporis vomitu rejiciebatur, absque ullo calore, urina erat insigniter turbida, crassa cum copioso sedimento. Paroxysmi observabant ordinarium typum anticipando bihorio. Vocatus ergo cum jam ab uxore purgatus esset, præscripti ad temperandum acidum.

℞. Tartar. vitriol. Oculor. cancr. præparat. ana gr. xv. M. exhibeatur ante paroxysmum qui tum erat quartus.

Post hoc remedium & frigus & dolores insigniter remiserunt, & quidem blando sudore subsequente, absque tamen insigni corporis incallescencia. Die intermissionis,

℞. Spir. sal. armoniac. ʒij. Spir. cochlear. ʒj. M. Ca-

M. Capiantur 40. guttæ bis in die intermissionis, & die sequenti tantumdem bihorio ante paroxysmum.

Paroxysmus eodem modo redibat, cum frigore absque calore, remittentibus doloribus. Die nona intermissionis continuavit hunc spiritum. Ante paroxysmum ordinavi,

℞. Sal. abinthii ℥j. Oculor. cancr. ℥ss. M. Usurpetur bihorio ante paroxysmum.

Paroxysmus non rediit. Die intermissionis continuavit spiritum, & tempore paroxysmi adhuc semel præfatum puiverem, sicque curatus fuit. *Hæc Erismullerus.*

Hæc omnibus non opus est addamus propria experimenta & ratiocinia, quo concludatur calorem non constituere propriam febris essentiam, a qua scilicet sit inseparabilis. Clariss. Barbetæ hæc forsitan, aut alius similibus motus rationibus a calore febrem non definit, sed eam dicit, auctam sanguinis circulationem, per pulmonem, cor, cerebrum, totiusque corporis partes. Cum eo consentit Clar. de le-Boc Sylvius dum febrem adesse ait cum pulsus plus solito frequentior est. pulsusque frequentior a motu cordis & sanguinis aucto deducit. Verum contra circulationem sanguinis auctam in febribus sic opponit Clar. Bontekoe. Falsò creditur insignem febricitantis calorem, urinam rubicundam & quasi inflammata, sitim, imprimis pulsum, in aliquibus febribus, tanta vehementia & celeritate pulsanter, verissima esse signa citioris circulationis, vel ebullitionis atque effervescentiæ alicujus præter ordinem in massa sanguinea; tales enim Doctores interrogo, quomodo calor signum esse possit auctioris circulationis; Fateor quidem calorem consistere in motu particularum subtilium, inter quas acidum & alkali, cum partibus crassis multa cum rapiditate moventur. Notum enim est aquam ebullitioni proximam esse, absque ulla motione unde evidenter liquet, liquorem aliquem exillere posse fervidum, quamvis non fluminis ad instar rapiatur; simili modo etiam videtur, si sanguis febrilis non magis circularetur quam more solito, non minus fore calidum, dummodo multis scateret particulis igneis. Fluvii quoque currentes, mare ab undis agitata, fontesque salientes nos docent, liquorem magno cum impetu moveri posse, nec minimum tamen incallescere, neque etiam tubulis suis, quos turgescere facit, ulum imprimere calorem. Hæc itaque demonstrant calorem non semper esse necessarium consequens, neque certum aliquod signum insignis liquorum agitationis. Præterea pisces sufficientem nobis præbent rationem probandi, succum aliquem sat citò fluere posse per angustissimos ductus absque caloris sensibilibus perceptione. Videmus enim etsi illorum succi & alimenta circulentur, nullum tamen in iis observari calorem. His adjungere possumus ægros inventi, quorum pulsus & sanguinis circulatio admodum est lenta, quique nihilominus de ingenti conqueruntur calore. Idem certum in phlegmone, quod scilicet quamvis patiens vehementem sentiat calorem, nulla tamen observatur nota unde judicare liceat sanguinem velocius, ac vulgo in ea parte circulari. Si denique attendamus halitum nostrum manifestè videbimus quòd calor non semper sequatur mo-

tum celerem: nam si compressis labiis manum intremus, illico speciem frigidi alicujus ventum percipiemus; & contra calorem, eodem halitu, at leniori eam inspirando. Observamus porro quòd aer tanto sit frigidior, quanto magis a ventis agitatus, & quo minus movetur, eo majorem nos sentire calorem, ita ut optimis cum rationibus concludere possimus, quòd calor febrilis non sit signum concitatoris sanguinis circulationis. Jam quærat aliquis ex nobis, si calor non est verum ignum, quid tum dicendum de rubicundo urinæ colore? Designat ne ille nihil? An non inde velocior indicatur sanguinis circulatio? Respondeo uterique quædam urinam intensiorem esse, quorum tamen sanguinis circulatio non est admodum velox; nam potius cernimus in hoc morbo sanguinem lentius circulari, ita ut motum suum quasi perdidisse videatur: atque hoc est quòd in plurimis casibus manifestè apparet, videlicet ex tarditate pulsus, patientis debilitate, ejusque virium prostratione. Neque sitis magis verum signum est; nam nihil inde concludere licet nisi quòd gula humectatione indigeat; verum hoc non semper a calore procedit, ut ex frigore liquido constat, quò durante patiens sapiuscule magis intolerabili infestatur, quam præsentì calore, quamvis hoc tempore sanguis tam lente circuletur, ut videatur motu suo prope destitutus. Iustus ergo fortan erit qui nos docebit quanta cum velocitate circulatio peragatur? At non obstante Doctorum nostrorum opinione, assero contrarium, persuasus me paradoxon hoc tot validis rationibus defensorum, ut nemo possit non assentiri. Primo itaque animadvertendum est quanta cum velocitate cor alicujus animalis exsectum & mensæ impositum, palpitet, ubi revera frequens observatur pulsus, licet sanguis tum, non tantum parum circuletur, verum etiam cum nec sanguis, nec circulatio ibi inveniatur; adde complures morbos dari, in quibus sanguis crassus & coagulatus admodum lente circulationem perficit, ubi interim vehementem adesse pulsum deprehendimus.

Nemo quoque inficias ire potest, quin in principio paroxysmi febrilis, cum æger tam vehemens sentit frigus, ut omnes corporis partes inde concutiantur, pulsus æquè celer sit quàm accedente calore. At quis audeat affirmare sanguinem præsentì frigore esse calidum & tenuem, simulque concitato cursu? Quòd tamen fieri oporteret, si verum esset pulsus celeritatem produci calore, & sanguinis agitatione; jam verò si certò velimus experiri pulsum celerem non esse signum aut consequentiam frequentioris circulationis, oportet primò percipiamus quid sit pulsus, quo comprehenso, evidenter constabit, haud aliam adesse causam, aliudque nihil denotare, quàm cordis & artèriarum motum velocem & convulsivum, non tamen motum sanguinis idcirco velociorem. Sciendum enim est cor nihil aliud esse quàm muscolum, vel potius compagem multorum musculorum ejus diastoli & systoli inservientem sine vel minima sanguinis opera. Nam si cor propter introitum & exitum sanguinis se aperiret & clauderet, absolutè impossibile foret, ut cor ex vivo animali sectum tantas ederet pulsationes, cum ne unica sanguinis guttula in eo

reperitur. Sanguis itaque non est qui cordi motum conciliat, sed cor cum recipit, & ut ita dicam, non secus ac machinæ hydraulicæ, aquam, cum haurit. At si hoc sit verum quod pulsus live sit frequens live tardus, non aliunde proveniat quàm ex motu cordis; tum arteriæ erunt ductus live tubuli sanguinem eodem tempore recipientes & expellentes, non per ipsam sanguinis agitationem, sed mediis certis quibusdam musculis, eodem modo quo cor hoc perficit. Hinc accidit quòd dilatentur & contrahantur velocissimè, non tantum cum sanguis tenuis exiit, verum etiam cum crassus & coagulatus est, atque tarde circulatur. Nam si cor pulsare potest, licet nulla sanguinis guttula intret, idem facere potest sanguine existente crasso & tarde se movente, postquam ejus pulsationem haud propriè a sanguine dependere videmus. Præterea si rem bene perpendamus, sanguinem coagulatum necessariò esse causam velocioris pulsus, ac ubi nimium crassus est, circulationem sistere deprehendimus. Certum enim est, quando sanguis est coagulatus eum tarde circulari, & difficulter per arteriarum ramusculos in venas transire: quare necesse est cordis pulsationem frequentior fieri, & loco unius, tres vel quatuor edere pulsus, ut sic frequenti sua pulsatione sanguinem, tarde fluentem melius expellere possit. Hoc autem necessariò debet sequi, quia sola cordis contractio insufficiens est, influentem sanguinem uno nixu depellere, quòd cum non perfectè sit occlusum, illico dilatatur, & denuò contrahitur, quæ verissima rarioris circulationis & frequentioris pulsationis causa est. Quod si in corde accidat idem consequenter fiet in arteriis, cum hæc contrahantur & dilatentur multo velocius, sanguine coagulato & tarde circulante. Nam cum sanguis est tenuis faciliè arteriæ eum comprimantibus cedit, & multa cum celeritate fluit in extremitates venarum, ita ut ten pus quo arteria utitur ad se denuò dilatandum multo longius sit, quam tum quando crassior sanguis, tarde circulans, & haud faciliè in venas, ob ductus nimium angustos fluens, ita arteriarum contractioni resistit, ut non nisi dimidia ex parte claudantur, hæc ratio est, quòd arteriæ breviorē habent viam faciendam, quia sanguinem coagulatum non ita comprimere possunt, quam qui ex particulis magis dissolutis est compositus. Hinc necessariò sequitur pulsus frequentiorē existere, licet sanguis crassus & circulatio tarda sit; e contra verò quando sanguis subtilis, calidus, &c. Deprehenditur, pulsus lentius necessariò ferire oportet, quia cor & arteriæ in contractione sua minimè impediuntur, cum sanguis faciliè cedat & fluat multa cum celeritate. *Hic ille in Definitionem Barbettianam animadvertit.* Signum febrium pathognomonicum à Francisco De-le-Poë Sylvio additum, quod spectat, illud in pulsu frequentiori non ita bene ponitur, quin multæ dentur febres, tum algidæ, tum etiam summè calentes, eaque malignæ, in quibus cum oculorum rubore, & scintillatione, delirio immani, doloribus atrocissimis, & linguæ nigrore, pulsus adest debilitas, infrequentia, & aliquando etiam intermissio; imò quosdam vidi febribus intermittenti-

bus peculiaris generis laborantes, qui inter valis a paroxysmo vacuis satis bene habebant, quibus vires & appetentia mediocriter tum constabant, pullumque aderat naturali proximus; sed in quibus adventantem paroxysmum, cuique postea præsentem, ab initio ad finem usque non alias observare licebat, quàm per ejusdem pulus tarditatem, remissionem & debilitatem, cum adjunctis etiam aliquando motibus convulsivis. Illos tamen remediis febribus intermittētibz intenso calore & pulus frequentia comitatis, destinatis, & insequentibus reterendis, curavi. Unde probabile est eandem causam febrilem variè in pulsum agere posse, eumque aut citatiorem, aut remissiorem facere pro varia succorum corporis, cerebri, nervorum necnon nervorum omnium fibrarum dispositione, nam ab hisce pendet cordis, arteriarum vasorumque omnis generis major vel minor motus, per quem sanguinis vario, unque humorum circulatio peragitur. Verum super hisce satis; videamus jam an alibi veritiorem aliquam reperire detur definitionem. Clar. Willisus, in pigræ & indefessæ fermentationum patronus, febrem describit per motum inordinatum sanguinis, ejusque nimiam effervescentiam cum calore & siti, aliisque præterea symptomatibus, quibus œconomia naturalis variè perturbatur; additque effervescentiam illam esse vel brevem & interpolatam, quæ febres intermittētes, vel magnam & diu protractam, quæ continuas pariat. Magni sane lacimus, cum toto Orbe Literato, Viri Celeberrimi industriam, artificiosamque methodum qua sua systemata condit, atque ex iis varia phaenomena ingeniosissimè deducit; non propterea tamen credimus omnia ab ipso allata sine examine esse admittenda, & fermentationem sanguinis in specie ab ipso propositam, pluribusque tum musti, tum aliorum liquorum fermentescibilium collatione, illustratam, quod spectat; illa pluribus nominibus non arduet. Qui enim sanguis velociori & continuo cursu ad instar rapidi fluminis vasa sua pererrans, nec alicubi moras trahens fermenta excipiet particulis suis salinis ita admiscibilia ut inde tota massa varias commotiones, rarefactiones, & ebullitiones patiatur? Nihil motui particularum alicujus liquoris vario, in quo ex saniori Philosophia & fermentatione & calor, magis officit quam ejusdem motus directus. Succus uris expressus, cerevisia aut alia id genus quibuscum comparatio instituitur, difficiliter fermentationem inirent si semper vehementius agitantur. Aliam instantiam addert etiam Clariss. Bontekoe, scilicet quòd cum cor, venæ atque arteriæ cruore sint plenæ, nullusque ad eas aer pateat aditus, ea propter sanguis in iis nullatenus fermentari potest; sed præterquam quòd vasa sanguinea non sunt ita plena ac tingit vir Clar. & aeris in ea intromissio non ita est impossibilis quin pluribus, iisque solidissimis & mechanicis argumentis fundamentis eam probet Joh. Alphonfus Borelius in elaboratissimo suo de motu animalium Tractatu; non sanè verum est liquorem fermentescibilem apprimè conclusum, nullo modo fermentari; quotidie sic parantur vina, eaque generosissima, fermentationisque tam vehementis, ut ea sæpe vasa continentia maximè crassifi-

rici & duritiei disruptisse viderim. At quid hoc habet cum sanguine commune? Vinum quantumvis exquisitè conclusum, in cavitate ampla non alium habet motum quam intestinum, & tum sensu Cartesiano a particulis primi & secundæ elementæ impressum, tum sensu Chymicorum, & concursu salium diversimode in se invicem agentium, sicque fermentationem efficiunt: Cum in sanguine dum in venis animalis viventis circulator secundus motus impediatur, ut jam significavimus, per eam cordis & arteriarum vim, quæ illum exprimendo, in motum directum agit, minusque patitur salium prædictorum congressus in cavitatibus exilibus. Primus vero totus impendatur in circuitibus absolvendis. Itaque Bontekoe instantia non ita valida est, ut evincat quod ipse opinatur. Non minus interim concussa erit Willisii de fermentatione etiam in febribus sententia, quomodo-cunque illam defendat. Qui alias in hoc argumento rationes voluerit, legat quæ in sequentibus fuscè adijcimus à Clar. Joh. Alphonsio Borellio, ubi de causis febrium.

Hic non moramur Paracelsistarum & Helmontii definitiones, quorum illi de incendio sulphuris & nitri, vel incandescencia universalis balsami & mercurii vitæ loquuntur; hic vero de Archei, quoties non vitale in agrum vitalem inferatur, indignatione & excandescencia ut illud peregrinum e sui anatomia excludat, verba facit: sunt hæc enim mera ineptiæ, ac callæ voces.

Clariss. Thomas Sydenham morbum quemcunque, ipsamque etiam febrem, nihil aliud esse dicit, quam naturæ conatum, materię morbificæ exterminationem, in ægri salutem, omni ope molientis. Hæc quamvis dilucidè satis prolata, rem multò magis non explicant, quam ab Helmontio decantata Archei excandescencia, quæ peregrina e sui anatomia excludere nititur; nam quod huic Archeus, illi Natura est, quod huic Archei excandescencia, illi Naturæ conatus, quod hic Archeus per exclusionem e sui anatomia, illic per exterminationem materię morbificæ intendit. Itaque quicquid ad Præxim faciat definitio Sydenhamiana Helmontianam explicans, illam merito Vir Clariss. pro generali tantum & rudi motuum in morbis contingentium descriptione, non verò pro legitima, regulisque logicis conveniente febrium definitione habet. Nec est sanè quòd talem hic exquiramus definitionem, cum enim illa ex iis omnibus quæ febrem antecedunt, concomitantur & sequuntur, necnon ex eorundem causis, colligi possit, illa exponenda veniunt in subsequenti-bus prius quàm quid sit febris declaretur. Itaque missas facimus cæteras de febri definitione disputationes ut jam de ejusdem subjecto aliquid addamus.

Clarissimus Franc. Piens suo de febribus Tractatu eandem defendit de febri *subiecto* opinionem quam prius Donatus Antonius ab Altomari vulgaverat; nam hic in calido innato, mutato, alterato, caliditateque accidentalem suscipiente, eam locaverat; ille in corde, non quoad parenchyma, sed respectu ignis vitalis & naturæ, cordis hospitis, à cujus actione pulsus pendet, ipsam ponit. Quid enim aliud est ignis ille vitalis, cordis hospes, quàm Veterum

calidum innatum alia decoratum denominatione in scenam productum. Verum ut solide objicit Clariss. Lovver. Tantum abest ut credam sanguinis motum à sua in corde accensione ulla dependere, ut nec cordi calorem suum præ aliquo debere videatur: Quanquam enim cor caloris fons, (unde calor in totum corpus emanat) rectè satis agnoscendus sit; non ideo tamen in illo solo calorem istum excitari, aut sanguinem ab illo solo tantum incallescere, verius tortè dicetur quàm aquas thermarum a balneo ubi erumpunt, & non ab intestino partium æstu, quas in visceribus terræ in transitu lambunt aluuntque, calorem suum concipere; nihil enim in corde quod tanto calori producendo sufficit: Constat utique cor ex se non calere; sed quemadmodum sanguine per arterias in se deposito omnino alitur, ita quoque foveri desiderat. Cordi itaque non magistribuendum est quàm vasis & visceribus omnibus, iisque præcipuè quæ in pectoris & abdominis claustro conclusa sunt, quod sanguis tantum incalescat: Quippe uti sanguinem in extremis partibus, ubi aeri externo sere nudus & expositus fertur, refrigerari accidit, ita pariter certum est ubi in pectoris & abdominis cavitatem recipitur, in locis adeo conclusis protinus incallescere, atque hinc est quod homines obeli & pingui aquiliculo donati, quorum vasa sanguifera profundè magis & quasi in carne sepulta latent, præ macilentis frigoris patientes sunt; quanquam corda hujusmodi præpinguium hominum non adeo sint vegeta & robusta, ac illorum qui magis sunt graciles & strigosi. Sanguini itaque in totum debemus quòd cor ipsum caleat, quòd corpora nostra calore suo actuet & vivificet. Concedimus interim, licet major illi calor quam cæteris musculis à natura datus non sit, in quantum tamen continuo motu, & in loco adeo concluso indefinenter exercetur, ita præ cæteris corporis membris calore magis constantè & vegeto donari; unde forsitan sit ut sanguinem in se receptum aliquantulum à contactu suo magis adhuc foveat, calfaciatque. Quibus ritè perpensis clarum fore arbitror sanguinis calorem à cordis foco ullo, omnino non dependere. *Hæc ille.* Sic etiam Clariss. Needham. Dum inquit, de flammula vitali loquuntur Philosophi mihi videntur entia sine necessitate multiplicare. Neque enim hæcenus aut experimento quocunque evidum est dari in rerum natura talem igniculum, aut nodus in Philosophia adeo dignus vindice occurrit ut Deo hoc in scenam vocato opus sit. Saltem qui facilius ex hoc commento solvi, quàm aliter potest. Flammam hanc nulli mortalium conspectam fatentur, imò contendunt illius sententiæ assertores. At neque occultum in cordis sinu, aut arteriarum cavitatibus recondi, & cæco nos igne carpi, imaginari prout est. Etenim si ad sanguinis genus propius attendamus ignitioni minus aptus videbitur. Carbonibus nempe injectus flammam non facile concipit, sed potius torretur in grunum. Et licet negandum non sit dari in sanguine sulphureum quiddam quod distillatione elici potest, tamen illud quantitate minus est quàm vulgò creditur, & aliis multorum generum particulis adeo permixtum, ut omnia simul sumpta

ineptissima incendio evadant. In dextro nempe ventriculo, tum lymphæ, tum chylo, neutris sane inflammabilibus contunditur. Et licet in pulmonibus postea intimiorem partium commutationem obtineat, cruor tamen, cum in cor redit, adhuc venosus exiit, neque nitrosi aeris additamentum quolibet indicio prodit. Difficile itaque erit hujusce accensionis locum, aut modum assignare. Vel enim tum sit cum sanguis aëri commisceri statuitur in pulmone; vel in cordis sissu, dum alicui terrio occurrit. Prius illud est contra experientiam eorum qui cruorem hinc effluentem nihil pristini moris mutasse deprehendunt, cujus rei testem habeo ipsum Doctissimum Lovverum eo ipso in loco ubi omnium accuratissime hanc hypothesin explicuit & magna probabilitatis specie firmavit. Ex his cum satis constet ignem vitalem nullum in corde sedere ac inde in totum corpus calorem spargere, ruinosa est omnino sententia quæ ei, ut & calido innato tanquam subjecto apto febres adjudicat. Clarissimus Willisius dum in sanguinis effervescencia materiam febrium ponit, pro earum utique subjecto sanguinem habet. Sic & Clarissimus Bellini dum tanquam certum quid & inconcussum statuit nullam febrem sine vitio sanguinis dari, ejus focum in liquore, seu miscella per arterias & venas fluente constituit; nam, inquit, cum sanguinis naturaliter in arteriis se habentis necessaria proprietates sit pulsus naturalis; & nulla sit febris in qua pulsus non aberret à naturali ordine, in qua nempe non desint aliquot, vel omnes earum conditionum, quæ ad pulsus naturalem requiruntur, concludendum nullam febrem sine vitio sanguinis dari. Ulterius progreditur Medicus quidam Gallus dum in Ephemeridibus Medico-Physico-Gallicis, explicaturus, quænam in specie sanguinis partes, & quomodo hocce in morbo afficiantur, ejus anatomem cum Clarissimis Leuvenhoek & Hook microscopio instituit, postque concludit, ratum ergo esto nihil singulare in febribus accedere cujus non facilis sit per hæc explicatio: Cum extra controversiam sit minores sex globulos, ex quibus unusquisque rubrorum globulorum componitur, posse quoque seorsim & peculiari sibi motu moveri, aut axiformi, aut variis aliis modis; Iterum unius motum, alterius motui posse adversari, aut etiam unum motui totius globuli quem constituunt; adde his globulos crystallinos, & partes tetragonas posse motibus anomalis præterea cieri, ideoque varios tumultus toti massæ sanguineæ inducere. Verum sententiam de subjecto febrium in sanguine in genere habendo, tum quod secundum Willisium illius effervescencia sit febris ipsa; tum quod secundum Bellini ab ejusdem vitio necessario pendeat; satis in superioribus, ubi de febris definitionibus, vidimus excussam. Fabulam à Medico Gallo in Ephemeridibus memoratis attexam quod attinet, uno verbo eam indicasse sufficiat. Jam verò si quis de febrium subjecto curiosius à nobis querat; respondemus nos nihil hac in materia pronunciare posse priusquam veras febrium causas explicuerimus, quod in sequentibus satis forsitan abundè fiet.

Differentias febrium si ex earundem symptomatibus colligere liceret, in immensum sane excrescerent. Franciscus De-le-Boc Sylvius ex illorum tantum parte febres in specie intermittentes distinguit in Algidas, Ardentes, Siccilosas, Hamelicas, Cardiacas, Ictericas, seu Colicas, Syncopales, Præcocantes, Anhelosas, Asthmaticas, Iulicuiosas, Catarrhales, Arthriticas, Inanas & Deliras, Emericas, Dejectorias, Sudatorias, Micurientes, Sputatorias. Additque; occurrunt dubio procul adhuc plures intermittantium febrium species, ac differentiarum, a symptomatibus gravibus, molestisque appellandarum; sed sufficiat aliquot ad exemplum proposuisse. Differentias legitimas & ab ipsa febrium diversarum natura petitas quod attinet, eas curiose periequitur Clar. Laurentius Bellini, & propterea integram illius dissertationem hic atteximus.

Si in febriliū, inquit, affectionum enumeratione aliquem servare ordinem constituamus, non illum sane suscipiemus qui pendere posset ab illa vulgatissima, atque acceptissima febrium divisione in Ephemeram, Humoralem, & Hecticam; hæc enim divisio supponit febrium causam, in ephemeris quidem accensionem spirituum, aut sanguinis, in humoralibus humorum putredinem aut accensionem, in Hectica partium solidarum. Sed ille nobis erit instituendus ordo, qui, si cum aliqua divisione febrium debeat esse conjunctus, nullam suppositionem contineat de earundem febrium causis, in quarum cognitionem, ac si essent penitus incompetæ, devenire studemus per cognitionem eorum, quæ in unaquaque febre sensibus patent. Cum itaque nihil magis amemus in rebus nostris, quam ordinem, disponemus hanc febriliū affectionum enumerationem per duo quædam ipsis conjuncta obvia sensibus, & quæ non solum causas non supponunt, sed ne minimam quidem ejus suspicionem movere possunt, & secum ferunt facilem febrium omnium partitionem, ac differentiam, cum duo illa conjuncta sint quasi summa genera, in quibus febres singulæ continentur. Duo autem illa conjuncta cum febribus obvia sensibus, & nihil causarum supponentia, à quibus febres singulæ deducuntur, sunt quidam modi ratione temporis, quibus febres inhærent corpori: Siquidem nullam febrem invenias; imò verò ne ullam quidem dari posse, demonstres, quæ aut per nullum temporis spatium omnino cesset, aut omnino cesset per aliquod intervallum temporis, seu nullam febrem invenias, quæ non sit, ut appellant, continua, aut intermittens, duo summa genera febrium sensibus obvia, & nihil causarum, à quibus febres producantur, supponentia. Ponamus igitur tanquam summa genera febrium continuam, & intermittentem (neque enim à febris definitione in genere exordiri possumus, qui ipsam ignorare supponi interim volumus,) & continuæ nomine intelligamus, quæ per totum temporis spatium, quo æger quispiam tali febre laborare dicitur nunquam relinquit corpus integrum, seu cujus nullus est finis integer intra datum illud tempus, seu quæ nunquam ex toto finitur, seu quæ nunquam planè desinit (sunt enim hæc omnes Celsi formulæ ad exprimendum summum de-

cessionis

cessionis terminum in febribus:) nomine autem intermittens febrem, quæ intra spatium temporis, quo eger quispiam laborare dicitur, relinquit aliquando corpus integrum, vel cuius est aliquis nris integer intra illud tempus, seu mittitur penitus aliquando, vel planè desinit. Quoniam igitur febris continua illa est, quæ per totum tempus, quo quis febre dicitur, nunquam relinquit corpus integrum; vel igitur vis causæ movens, & conservantis febrem per unicum & simplicem febris circuitum tota absumitur, ac plene desinit, vel ita post unicum circuitum superest, atque persistit, ut alios circuitus excitare possit, eosque vel ita ut alter invadat, antequam prior planè desierit, vel aliquo temporis intervallo, postquam desit, & utrumque vel certo quodam, ac statuto, vel nullo ordine. Si per unicum, simplicemque febris circuitum vis causæ ipsam movens, & conservantis tota absumitur ac planè desinit, igitur cessante causa cessabit similiter febris illa per unicum circuitum, atque simplicem, atque ita cessabit, ut ulterius per novum circuitum ab eadem causa productum invadere non possit, cum causa hæc profus consumpta supponatur. Erit igitur huiusmodi febris continua unius, ac simplicis circuitus, & promde continua simplex appellari debet; si vero per unicum febris circuitum causa ipsam movens, atque conservans, alios circuitus excitare possit, & recurrat alter, antequam prior planè desierit, & recurrat semper eodem certo, ac statuto ordine temporis servato, erit similiter febris continua, ut patet, sed ex pluribus circuitibus, seu periodis composita, usque ex suppositione ordinatis; quare dici debet continua periodica, si vero non recurrat alter servato semper eodem ordine temporis, sed sæpius, rarius, prius, posterius; recurrat tamen, antequam prior planè desinat, erit continua vaga, sive erratica. Si autem causa febrem movens, atque conservans post unicum circuitum alios movere possit, sed non nisi aliquo ipatio temporis, postquam prior desit, producat jam febrem intermittens, & periodica quidem, si circuitus recurrant eodem semper certo ordine accessionum servato; vaga vero, sive erratica, si iidem recursus ordinem ejusmodi non servant, sed sæpius, rarius, prius, posteriusve contingant. Erit igitur hæc summa febrium ad rem præsentem faciens, & huiusmodi eorum dispositio: febris omnis aut continua, aut intermittens, continua aut simplex, aut periodica, aut vaga; intermittens autem periodica solum, aut vaga. Et sanè ex recensione singularum febrium subito patebit, in hac facili, perspicua, & necessaria febrium partitione ipsas omnes contineri. Ecce siquidem ephemera legitima est continua simplex, cum per unicum circuitum 24. horarum, paulò plurium, pauciorumve finiatur, ita ut alius ipsius recursibus ulterius non affligatur corpus: Ephemera plurium dierum est quidem aliquantò longior, sed est semper idem circuitus ad plures dies protrahens. Synochus imputris (cognitur hic, & in sequenti febre uti vocibus putredinis, nempe causam quandam febrium experientibus, cum aptioribus careamus) seu synochus simplex, vel febris inflativa dicta unius

simplicis & ipsa circuitus, post cuius finem febre simili non rursus tentatur corpus. Synochus putris, seu febris continens, cum dixerat hæc febris a priore per maiorem calorem, & intensiorem affectionum omnium, ceterum circuitus unicus, post quem perfecta laus: causus, seu febris ardens, quando periodo caret, cum enim sine recurso est, distat solum a duobus præcedentibus per calorem excurrentem, & extremum situm, cum quibus conjungitur: ac tandem hectica, cum hæc sit febris unius circuitus, caloris, ac pulsus semper ejusdem gradus, nisi quantum leviter uterque intenditur a cibo. At vero continuis ordinatè reu renibus accensendæ sunt tertiana continua, cum hæc ex pluribus circuitibus constet, quorum singuli tertio quoque die servato semper huius ipsius temporis ordine recurrunt ita, ut invadat alter, antequam prior planè desierit, & ad hanc tertianam continuam redigenda est superius exposita causus, cum typum tertianæ habet, vel ejus calorem ad hanc colligans, vel ratione typi, vel caloris ludentis ita, ut colliquefcere cogat corpus. Ad hanc Astodes & Elodes ex non absimilibus causis. Quotidiana continua, cum hæc pariter pluribus constet circuitibus, sed singuli singulis diebus recurrant, servare semper huius ipsius temporis ordine ita, ut invadat alter, antequam prior planè desierit, & ad hanc quotidianam continuam propter frigus quoddam redigunt Epialam, Synopalem minutam, Synopalem humoralem vel repletionalem. Quartana continua, cum hæc pariter pluribus constet circuitibus, sed singuli quarto quoque die servato semper huius ipsius temporis ordine recurrant ita, ut invadat alter, antequam prior planè desierit: ac denique maligna, & pestilens febris sunt ut plurimum e genere continuatum ordinate recurrentium, licet aliquando sint etiam ex continuis simplicibus, unde ad alterutram expositarum classium redigendæ sunt; in vero sunt etiam erraticæ, ut notabimus infra; Hæ autem febres omnes dicuntur continuæ essentialis, sive primariæ, aliæ sunt secundariæ, quæ accidentis, symptomaticæ, & earum aliquæ etiam comitatæ nuncupantur; & primariæ quidem sunt ex seipsis morbus, nec ulli alii morbo, a quo pendeant, superveniunt; symptomaticæ pendent ab alio morbo, cui vel dum sit, vel postquam factus est, superveniunt; comitatæ denique conjunctum secum habent morbum alium, quem vel ipse necessariò generant, vel uterque simul generatur. Has omnes febres esse debere continuas, asserunt (non tamen video, cur intermittentes esse non possint, si à causa pendeant, quæ non nisi per vices possit invadere) recensentque Phlegmonoden, Erysipelatoden, Typhoden, Lypiriam, Lentam, febrem variolarum, & morbillorum in pueris. Succedunt his intermittentes periodica, e quarum numero est tertiana intermittens, cum hæc ex pluribus circuitibus constet, quorum singuli tertio quoque die servato semper huius ipsius temporis ordine recurrunt ita, ut invadat alter, postquam prior per aliquod spatium temporis corpus integrum reliquerit: quotidiana intermittens eundem in circuitibus suis temporis ordinem servans recurrendo diebus singulis, post-

quam prior circuitus per aliquod spatium temporis ex toto desinit : & quartana intermittens quarto quoque die ordinate recurrens circuitibus suis , quorum prior per aliquod interval- lum temporis ex toto huiatur, antequam invadat alter. Tam continuæ, quàm intermittentes febres sunt vel legitimæ, exquisitæ, veræ, vel spuræ, & nothæ : illæ sunt, quibus conveniunt omnes, & non aliæ affectiones, quàm unius alicujus febris ; nothæ verò, quibus plurimæ quidem insunt affectiones alicujus febris, sed non omnes, & aliquot alicujus alius. De nothis seorsim, ac distinctè à nobis, neque in hac enumeratione affectionum, quæ febribus conveniunt, neque in sequentibus propositionibus agendum est, cum quid illæ sint, subito pateat, si quid sint febres legitimæ, intelligatur. Ex his interim patet, à febribus nothis non constitui genus aliquod febrium, quod in hac earum partitione non contineatur. Ulterius tam febres continuæ simplices, quàm periodicæ, & intermittentes aliquando componuntur, hoc est, plures febres ejusdem, vel diversi generis eodem tempore affligunt ægrum, ut plures continuæ simplices, plures continuæ periodicæ, plures intermittentes, vel simplices, & periodicæ, vel periodicæ, & intermittentes, vel continuæ simplices, & intermittentes, & recensentur confusæ, quæ eodem tempore incipere, ac desinere dicuntur ita, ut vix discerni possint ; servant tamen utraq; naturam suam, & neutra prævalet, aut trahit, mutatque alteram in propriam conditionem, aut aliquid suæ sortis ipsi communicat, unde distinguuntur a nothis, quæ sunt febres singulares plurium naturam participant, & ab illa, quæ prævalet, denominationem sumentes, ut mixtæ ab elemento, quod est potentius, seu dominatur. In implicitæ, cum plures febres eodem tempore desinent, & evidenter distinguuntur, quæ si sunt ejusdem generis, denominantur ab ea, quæ sunt, multitudine, ut duæ, tres, &c. tertianæ, duæ &c. quartanæ, duæ, aut plures quotidianæ. Cum verò implicentur febres diversi generis, proprio carent nomine, excepta febre, quæ componitur ex tertiana intermittente & quotidiana continua, cum hæc appellari soleat semitertiana, vel horrida. Cum autem hæc febres implicentur, seu componuntur, siquidem alterius paroxysmus invadat, antequam prioris desinat, dicuntur subintrantes : si brevi à fine integro unius invadat alter, coalternæ ; si verò quasi statim à fine decessionis unius invadat alter, communicantes ab Avicenna nuncupantur. Neque igitur de compositis febribus seorsim, atque distinctè à nobis in febrium enumeratione, aut propositionibus pertractandum ; quicquid enim in compositis demonstrationem exigit, illud totum in iis febribus seorsim continetur, ex quibus illæ componuntur : erit solum aliquid de semitertiana exponendum, cum in ipsa quædam contingant, quæ penitus omittenda non sunt ; sed & hic patet interim, à febribus compositis non constitui genus aliquod febrium, quod in exposita partitione non contineatur. Postremò vagas, aut erraticas febres ex ipsa appellatione, patet, esse posse tam continuas quàm intermittentes, adeoque etiam malignas, ac pestilentes, quæ nullum certum ordi-

nem accessionum, finium, circuituum, nullam certam febris formam servant, sed sapius, rarius, per plures dies, paucioresve, per horas etiam invadunt, desinunt modo cum calore, modo cum frigore, & hujusmodi perturbatis, & ordinem minime servantibus affectionibus conjunctæ ; sed neque in his contineri quidquam, patet, quod a nostra partitione febrium non habeamus, & erraticas ad eas ipsas facile redigi. Quoniam itaque series febrium, quas ad continuas, & intermittentes redeimus, est quantum febrium a rei Medicæ peritis dari supponitur, earumque distributio est juxta partitionem febrium comparatam per quaidam earundem affectiones notas sensibus, nec de causis, aut operandi modo quidquam supponentibus perspicuam, ac necessariam, & hujusmodi partitione nobis est opus, ut aliquo apto ordine enumerentur antecedentia, conjuncta, & succedentia singularum febrium, in quarum causam, naturamque perquirere constituimus ; febrium igitur enarrationem eo ordine instituanus oportet, quem superius exposita partitio secum fert, adeoque primò exponendæ affectiones febrium continuarum simplicium, tum continuarum periodicarum, tertio periodicarum intermittentium, postremò tam continuæ quàm intermittentes erraticæ, quid sint singulæ, deinde per propositiones indagaturi. Age itaque & rem ipsam aggrediamur.

Antecedentia, conjuncta, & succedentia febribus continuis simplicibus. Febris Diaria, vel Ephemera legitime & propriè dicta : Græcis πυρετός ἡ φήμερα.

Antecedentia. Tristitia, timor, sollicitudo, ira, vigilæ nimia, animi contentio, evacuationes, motus corporis, nimia omnia, dolor, fames, sitis, cibus, & potus calidus, ebrietas, cruditas sive nidorosa à nimio calore, sive à parvo veniens, ætus aëris, mora ad ignem, vel solem, balneum nimis calidum, prohibita perspiratio, perfrigida, vel adstringentia, ut balneum aluminosum, & hujusmodi : glandularum, & inguinum inflammationes, seu bubones, præcipue cum suppurantur, temperamentum calidum, & siccum, somnus nimius, retentio fuliginum, alvi tæcum, & urina : Erythelasma extremorum, plenitudo.

Conjuncta. Initium à causa procacitica, evidente, & manifesta, vel immediatè febrem excitante, prohibendo ex. gr. perspirationem, &c. Urina sub initium, colore, substantia, & contentis fere qualis sanorum aliquando crudior, & albidior, mox sedimentum bonum, aut enco- remia, aut nubecula, & bonus color, respiratio magna, & frequens, calor, & dolor capitis, pulsus non multum à naturali dissimilis, solum aliquando major, celerior ; atque frequentior, aliquando etiam debilior ; semper tamen sine ulla inæqualitate, & cessante febre statim ad naturalem statum redigitur nulla identidem recurrente inæqualitate, ut in aliis febribus contingit, calor naturali quidem major, & molestior, sed mitis, & suavis etiam in statu, & vigore febris, accessio sine frigore, rigore, horrore, pandiculatione, oscitatione, vel levis aliquando, & subito evanescens horror, incre-

mentum

mentum caloris, ac pulsus liberum, & æquale. Declinatio (decessio dicitur Celsus) cum madore, & humida evaporatione, qualis sanorum sudor, post quem perfecta apyrexia, seu, ut Celsus diceret, tiliis integer. Ab animi affectibus veniens est cum urina rubicundior: ex ira pulsus magnus, creber, vehemens, calor non mordax, sed copiosus, & blandus: ex tristitia pulsus parvus, tardus, languidus, rarus, calor acrior potius, quam copiosus, corpus extenuatum, oculi contavi, & nova quedam decoloratio. Huic similis febris, quæ ex animi contentione, sed extenuatio corporis, oculorum cavitas, & decoloratio faciei minor succedit. Ex vigiliis facies humidior, oculorum morbus gravior, elevatio palpebrarum difficilior, & in his humiditas quedam; ex lassitudine per labores cutis sicciior usque ad statum; a statu vero his, qui ad summum non fatigantur, ex imo corpore humidus vapor ad cutem fertur, unde hæc humescit, summæ autem tætigatis etiam declinante febre siccitas permanet. Ex cutis adstrictione eadem durior, compactior, calor primo attractu mitis; sed eo diutius protracto calor intensior, urina rubicundior, non cavi oculi, non extenuatio corporis. A bubonibus pulsus maximi, veloces, frequentes, æquales, calor multus, suavis, faciei rubor. Ex plenitudine facies, & oculi rubicundiores, urina rubicundior, pulsus magnus, velox, durat 24. horas, paulo plures, aut pauciores.

Succedentia. Synochus simplex, vel continens, vel hectica præcipue in juvenibus calidioribus tempore verno periodicè in cacochymis; quæ autem succedant febres, ostendunt affectiones singularum propriæ, & præmonstrant dispositiones, quæ febrienti insunt etiam, antequam ephemera finiatur. Instat autem ephemera aliqua expositarum febrium, si transactis 24. horis adhuc ephemera protrahitur etiam postquam sudavit febriens si fuit ephemera cum dolore capitis, qui eodem spatio temporis exacto adhuc perseveret, si nullus sudor erupit.

Ephemera plurium dierum.

Antecedentia. Eadem, quæ Ephemeram propriè dictam, sed majoris roboris, obstructio cutis, repletio, ebrietas, catarrhi, bubones.

Coniuncta. Eadem similiter, sed duratio per plures dies absque ulla remissione, aut intentione.

Succedentia. Similiter eadem.

Synochus non putris, seu Synochus simplex, sive febris inflativa dicta.

Antecedentia. Eadem cum Ephemerâ, sed præcipue prohibita perspiratio, & potissimum effusiorum calidorum, plenitudo vasorum à sanguine, seu plethora ad vasa cum duritie corporis, tempus vernum, juvenus, vini nimius usus, cibi succi pleni, suppressio hæmorrhoidum, menstruorum, vel cujuslibet alius effluxus, qui vel natura fieri debeat vel ex assuetudine.

Coniuncta. Eadem cum Ephemerâ, sed magis evidentiâ, & magis activa, calor blandus, sed maior, quàm in ephemeris, cutis non sicca, sed madore persusa, urina naturali similis, crassior tamen, & rubicundior, pulsus vehemens, celer,

frequens, plenus, magnus, & æqualis. Facies, ac totum corpus rubens, & quasi inflatum, venæ sanguine infartæ, ac tumidæ, lassitudo tendens, caput grave, respiratio difficilior, & frequentior, somnus plerumque profundus, & rubra per ipsum spectra, pulsatio temporum, pectoris angustia, inquietudo. Duratio per tres, quatuor, aut non multo plures dies ad usque septimum sine remissione, & per totum durationis spatium vel calor est æquabilis, seu ejusdem gradus, & dicitur febris homotonos, vel acmaltica, vel continue crescit, & dicitur epacmaltica, vel continue decrescit, & dicitur paracmaltica. Sudore, vel hæmorrhagiâ narium solvitur.

Succedentia. Eadem cum Ephemerâ quoad febres, & in insigni plethora, quæ si non sit per artem medicam immutata, phrenitis, angina, pleuritis, vel quid simile à nimio sanguine.

Synochus putris, seu febris continens.

Antecedentia. Cutis, jecoris, & aliarum partium internarum obstructions à crassis, & viscidis humoribus, copia nimia sanguinis, ætas juvenilis, tempus vernum, suppressio consuetæ, aut naturalis evacuationis, biliosi, aut sanguinei temperamenti corpus, multus labor & exercitatio, cura vexantes, insolatio, & æstus longior, ciborum, & medicamentorum incendendum, & exsiccantium usus, quicquid bilem cumulat.

Coniuncta. Accessio sine frigore, horrore, rigore, calor tactui multus, vaporosus, nimis molestus, & acris, quàm in periodicis, major, & acrior, quàm in continuis simplicibus hæcenus expositis. Processus ejus ab accessione usque ad finem integrum apta proportionem decrescit, increscit continue, aut in eodem semper gradu persistit, & hoc per totum primi diei spatium præcipue solet contingere: quæ ejusdem gradus calorem conservat, dicitur febris homotonos, vel acmaltica, ut in synocho simplici, continue decrescens paracmaltica, continue increscens anabatica, seu epacmaltica; nulla accessio nova, aut exacerbatio; pulsus magnus, vehemens, celer, frequens, inæqualis, inordinatus, urina crassa, turbida sine sedimento, cruda vel leviter cocta in principio; aliquando etiam dolor capitis, inquietudo, vigilia, sitis; urina tenuior; aliquando dyspnœa, inflatio, & rugitus ventris, pustulæ nigre, aut livide. Pura durat septem dies, notha quatuordecim.

Succedentia. Urinæ sub initium rubicundiori salus, & brevi succellura; albæ autem plerumque mors: diutius protractæ faciliè causos, asthma, inflammatio pulmonum, hæmorrhagia, vel pruritus, & titillatio narium, splendores ob oculos, visus hebetudo.

Causos, seu febris ardens sine periodo.

Antecedentia. Quicquid intensè siccat, & calefacit, temperamenta calida, & sicca, ætas juvenilis, aut consistens, aeris calida, & sicca temperies, ferventissimus solis æstus, labor immodicus, vigilia diuturna, copiosior vini potus, ira, sitis, &c. A dolore ventris laborioso febris ardens lethale, ait Hippocrates.

Coniuncta. Calor urens, constans, & perpetuus

tuus sine ulla exacerbatione, & sitis inextinguibilis, etiam si biberint ægri, quæ duo sunt præcipua, & constituenta: utraque intentiora in causo legitimo, quam in notho, lingua sicca, aspera, nigra, ventris motus dejectiones pili, vigilæ, interdum delipientia, respiratio difficilis, densa, magna efflatio continue os aperiendo, jactatio, & inquietitudo indetesta, pulsus duri, celerrimi, urinae flammæ. Puræ ardentes plerumque septem, non puræ novem, undecim, quatuordecim, &c. Diebus durant, & solvuntur per alvi dejectiones, sudores, vomitus, abscessus, & hujusmodi.

Succedentia. Senibus plerumque mors, sicut iis, qui causo corripuntur in aëre, temperamento, anni tempore, & cæteris frigidis: Quartana intermittens præcipue, si febris ardens ad Autumnum pertingat.

Hæctica.

Febris hæctica dicitur intemperies calida, & sicca partium solidarum, & cum abiit humiditatem ipsarum toridam, primus gradus hæctica: cum substantiam carnosam, & adiposam, ut Galenus asserit, ut alii, cambium, secundus gradus: cum membranulam, & fibrosam, quæ Galeno in specie solida dicitur, ut aliis gluten, tertius, ac summus gradus. Hinc duplex status potest, cum tæbe, & sine tæbe; sine tæbe, cum humiditas partium nondum absumpta est; cum tæbe eadem jam absumpta, & exsiccata, ac tum Hæctica marasmodes, & ejus summus terminus marasmus non naturalis, & incurabilis; datur enim & naturalis marasmus, Latinis marcor, & est illa viventis corruptio naturalis ob siccitatem, qua senes omnes naturæ morentur, & senium etiam dicitur, & a simili affectu siccitatis tractum est hoc nomen ad ultimam vim Hæcticae fataliter exsiccantem, quæ non per frigiditatem, & siccitatem, ut naturalis marasmus, sed per caliditatem, & siccitatem interimit. Dicitur Hæctica catexin juxta habitum, seu habitum, hoc est quæ tam invaluit, ut ex sese ipsam conservet, habeatque suæ conservationis causam inherendo partibus, easque consumendo, atque ita nulla aliunde veniente, & conservante causa opus habeat; reliquæ verò febres dicuntur catachasin, seu febriles, hoc est in dispositione, ad quas nimirum excitandas, & conservandas requiritur fons, & causa in corporibus cæteroquin febriendo dispositis, quæ sine ejusmodi causa nunquam febrerent.

Antecedentia. Quæcumque plurimum humidæ substantiæ in partibus solidis absumere, vel maximum calorem excitare, vel utrumque præstare possunt, & dispositio ad suscipiendas eorum impressiones, sic diurnæ atque insignes evacuationes per alvum, urinam, sudores, &c. Ulcus in pulmonibus, thorace, utero, renibus, &c. Inedia, labor, tristitia, curæ, singula diuturna, calor febrium ardentium, & acutarum, & aliarum etiam febrium diurnarum, habitus corporis calidior, & siccior aëris, & loci constitutio calida, & sicca, ebrietas, furor.

Conjuncta. Calor sine ullo ægri dolore, ac molestia ita, ut se febrile vix sentiat, primo tactu debilis, diutius protracto acer, & mordax, major in arteriis, quam in partibus circumpositis: intensio ejus ab assumpto cibo,

quæcumque hora sumatur, etiam non servata eadem hora ipsum sumendi diversis diebus, & duratio ejus intentionis per totum tempus, quo chylus distribuitur, quo absoluto calor ad suum priorem statum se redigit, & semper eundem gradus ad usque novam assumptionem cibi perleverat. Cum calore mutatur pulsus, qui fit major, & velocior, duratque talis, quousque durat caloris intensio, ac tum pulsus etiam redigitur ad eum statum, in quo fuerat, antequam cibis assumeretur, nempe parvum, crebrum, & celerem. Mutationes istæ contingunt sine ullo frigore, rigore, horrore, oscitatione, pandiculatione, & si quæ alia aliarum febrium accessiones comitantur, & hæc mutationes caloris, & pulsus à cibo sunt propria, & inseparabilia ab Hæctica: Cæterum pulsus parvus, creber, modicè celer, urina per colorem naturali similis, debilitas semper increfcens, extenuatio corporis, & exsiccatio. Cum vero ad secundum gradum deducitur, siccitatis, & debilitas major, pulsus magis debilis, frequentior, minor, durior, urina oleaginosa, cui nempe pinguedo innatat, qualis aranearum telæ. In tertio autem gradu invalescunt hæc omnia mala cum iis omnibus, quæ conjuncta sunt cum summa siccitate. Insuper cum Hæctica in genere conjungitur calor in hypochondriis primo tactu mitis, post acer, mordax, aridus, pigrities, ad motum desidia, & motus difficilis. Complicatur Hæctica cum ephemeris periodicis continuis, & intermittentibus, & cognoscitur per singularum signa, quod difficile capto non est.

Succedentia. Primo gradui secundus, nisi ille curetur, & nisi curetur pariter secundus (secundum enim etiam curari posse, sunt qui asserant) ipsi secundo summa tæbes, seu marasmus, & mors irreparabilis.

Antecedentia, conjuncta, & succedentia febribus continuis periodicis.

Febris Synechis, sive continua proportionalis, proportionata, & periodica (ita enim appellatur communiter) est ejus naturæ, ut nunquam ad finem integrum, seu pyrexiam perveniat ante accessionem alterius circuitus, & diversa sortitur nomina, prout alter ille circuitus singulis, tertio, aut quarto quoque die recurrit, unde quotidiana continua, tertiana continua, quartana continua. Accessiones autem nullus præcedit, aut comitatur horror, rigor, aut frigus; decessiones nullus sudor.

Tertiana periodica.

Antecedentia. Quæcumque ad intensiorem calorem disponunt, abundantia bilis, temperamentum calidum, & siccum, vel similis intemperies alicujus partis, vel totius corporis, juvenus, alimenta calida, & sicca, inedia, victus tenuis, & parcius, exercitatio corporis frequens, & vehemens, æstus aëris, sive à regione, sive ab anni tempore, sole, balneo, &c. Evacuationes biliosæ suppressæ, vigilæ nimix, animi contentio, & hujusmodi.

Conjuncta. Calor urens, & sitis ardens, vigilæ, aut somnus levis, insomnia itam præ se ferentia, deliria, oris amaritudo, linguæ siccitas, & nigredo: sine frigore, rigore, aut horrore exacerbatio,

cerbatio, sine sudore decessio, pulsus in accessione compressus, contractus, & quasi se abdens, parvus, rarus, aut frequens, & inæqualis inæquitate systematica, qualescunt una pullatio cum major altera, deinde celer, & frequens: urina ignea, rubra, acris, initio semper cruda sine sedimento: in ulca, vomitus biliosi, & similes de ectiones, & agna anxietas.

Antecedentia. Quarantia intermittens præcipue, si tertiana periodica Autumnum attingat.

Aut tertianam continuam periodicam pertinent cautos, seu febris ardens, cum servat tertiana periodicæ typum, vel calorem ejus, & de hac febre superius. Colliquans, quæ est summi caloris, pinguedinem, carnem, partium, que solatarum substantiam fundens, in liquidum redigens, & extra corpus mittens per insensilem perspirationem, sudores, urinas, dejectiones, & in hac contingit subita corporis emacratio & consumptio, oculi concavi, collapsa temporaria, nates acutæ, dejectiones rube, pingues, lætidæ, viscosæ, corpulentæ, lincæ, biliose, & ipumolæ, urine pingues, oleosæ. Febris Atodes, in qua per totum frequens, & inquietudo molesta, quam febrientes graviter ferunt, nausæa ut plurimum, & vomitus, morsus, & stimulus omnium superioris ventriculi, & membrarum ejus: ac denique febris Eiodes, in qua perpetuo sudores funduntur.

Quotidianæ continuæ periodicæ Barbaris Latice, quod latentem quandam habet calorem.

Antecedentia. Ætas, natura corpus humidum, pueri, infantes lactentes, vel adhuc carentes dentibus, senes, qui ex calore sunt corporis nutriti, otio, crapula, longo somno deuti, loca humida, vel regiones, & tempestates similes.

Conjuncta. Calor primo attractu mitis, mox acrior per se, etiam a prima ad alteram accessione, & hæc circa vespere sine ullo frigore, rigore, horrore, sine ullo sudore decessio; pulsus rarior, tardior, inæqualior, & minor, quam in reliquis periodicis, & adhuc rarior, & tardior in accessione, & completus, & quasi se abdens. Urina initio, & ad accessiones crudior, mox crassior, minus ignea, & rubra, quam in cæteris periodicis, sicut etiam remissior, nisi urgeat lassa pituita, facies subhumida, laxa, sublivida somnolentia, inappetentia, excretionibus pituitosa, in longum protrahitur, vix desinit ante diem 40. & ad sexagesimum, atque ulterius excurrit.

Succedentia. Per sudorem, alvi fluxum, aut abscessum judicatur, ut per parotides, quæ ipsi non raro superveniunt, Cachexia, Hydrops, febris Hæctica.

Ad quotidianam continuam periodicam pertinent eprala vel *ætiæ*, quod blanda, & lenis est, vel a rigore, qui *ætiæ*. Atticis, illa est cum Galeno, in qua eodem tempore minima, & universi corporis particule, calore, & frigore afficiuntur, non ut Avicenna, & Arabes, in qua per totum circuitum interiora trigent, exteriora calent. Hanc alij ad intermittentes, alij ad continuas periodicas, alij ad symptomaticas reducunt. Atunt tamen, ad quotidianam periodicam referendam propter frigus, quod a pituita, quæ nondum putruit, nec putrescit adauget

calorem, qui a pituita similiter, sed quæ jam putruit, vel putrescat, quæ utraque, calor scilicet, & frigus simul tactu tette in hac febre contingunt. Hinc igitur asserunt, originem hujus febris repetendam esse a pituita putrida, vel putrescente, quæ non putrida admixta sit.

Syncopalis. quæ duplex, utraque ad pituitosas febres pertinet, altera humorosa, vel repletionalis conjuncta cum copia crudorum, & pituitosorum humorum, cum oris ventriculi debilitate, unde æger in syncopem labitur præcipue febre invadente, adest virium imbecillitas, pulsus parvus, debilis, valde inæqualis. Syncopalis minuta dicitur altera, & conjuncta statuitur cum humore tenui, paucio, acris, icorio; sed corrupto, & venenato, quo os ventriculi afficiatur, & fiat syncope.

Quartana continua periodica.

Antecedentia. Quæcumque humores crassos frigidos, ac terreatos, seu necros generate possunt, corpus aridum, & macilentum, color luscus, aut obscurus, temperamentum frigidum, & necum, ætas incipiens, tempus autumnale, aut magis inæqualitates habens, curæ multæ, & sollicitudines, hæmorrhoides suppreßæ, tumores lienis.

Conjuncta. Calor quarto quoque die invalescens, nullo precedente frigore, rigore, aut horrore, nullo succedente sudore. Cætera eadem cum quartana intermittente, nisi quod pulsus in continua initio est parvus, tardus, & submersus, postea magis, plenus, cæcior, & inæqualior, quam in intermittente, & in statu ut interior; calor mitior, quam in tertiana periodica acrior, quam in quotidiana: sicut media inter situm tertianæ, & quotidianæ periodicarum. Urina initio crudior, & tenuis, post, varra, protrahitur ad 40. diem & ulterius etiam, raro contingit, & vires maxime deperit.

Succedentia. Quartana intermittens, cachexia, tabes.

Febris maligna κακοῦρος, seu mali moris: & varietates ejus species, nempe morbum Hungaricum, sudorem Anglicum, febrem malignam cum spasmo, catarrhum, ac iussim epidemicam malignam vide apud res medica scriptores.

Antecedentia. Vitioli, ac pravi humores in corpora collecti per cibum pravam, vitia, & corruptioni facile obnoxium, prava a natura constitutio, in eadem vitia facilis, & quicquid humores corrumpere, & quasi a venenatam naturam pervertare possit.

Conjuncta. Species quædam benignioris febris, nempe mitior calor, quo sit ut principio lateat natura febris deterioris: paulo post principium virium insignis imbecillitas sine causa manifesta, & major, quam pro febris, & caloris natura, inquietudo, anxietas, inordinati sudores. Pulsus frequens, parvus, imprimis debilis, aliquando naturali similis cum inquietudine, anxietate, aliisque pessimis, unde & talis pulsus pessimus est, aliquando initio febris formicanti similis, minimus, & frequentissimus, ut plurimum pulsus varius. Urina primis diebus aliquando quales sanorum cum pessimis interim symptomatis aliis, aliquando tenuis, crudæ,

fine

sine sedimento, vel quid in fundo matulæ potius excremento, quam sedimento urule, aliquando crassæ, coloratæ, turbidæ, cum crasso, rubro, turbido sedimento, Calor comparatus cum calore febris ardentis minor, etsi luminus est in his febribus, & magnum plerumque incendium, symptomata interim graviora, quam in febre ardente, & quam quæ secum ferre debere cæteroquin videretur calor ille minus acer. Sitis aliquando magna superans caloris febrilis modum, aliquando nulla cum intensa febre, & linguæ siccitate, singularis ad omne ciborum genus inappetentia non secus, ac si essent medicamenta qualibet gustui gravissima, nausea & vomitus in principio præcipue morbi, horror frequens, & inordinatus sæpius in die recurrens. Gravitas totius corporis, & veluti membrorum contractio, deliria, dolor capitis non eundem locum servans, sed modo in fronte, modo in occipite, dolent & alia partes fixo dolore, vel vago; sudores frequentes, parvi, minuti, inutiles principio morbi, oculorum rubor frequentissime contingit, variolæ, & morbilli per totum corpus erumpere solent, sed majori copia in facie, pedibus, & manibus: similiter maculæ purpureæ, seu petechiæ; sed hæ majori copia proveniunt in dorso præcipue, & pectore, in facie, pedibus, & manibus multo pauciores, & plerumque nullæ. Facies tetra, & a naturali statu multum aliena, vividaque sua vi, ac spiritu destituta; aliquando tamen est naturali plane similis, vicens, & florida. Somnus, vigilia, venter, memoriarum debilitatio, spectra varia, insomnia turbantia, nihil coherens, vertigo, tremor, convulsio, corporis inquietudo, anxietas, oculorum caligo, surditas, tinnitus, aut sibilus aurium, odoratus & gustus corruptio, membrorum quasi conquassatio, cardialgia, sitis molesta, nausea, vermes per alvum, os, aut nares, fluxus alvi foetidi, colliquantes, stillicidium sanguinis e naribus præcipue initio morbi, & majoris quantitatis, tumores post aures, circa alas, & inguina difficile maturantes, sæpe retrocedentes, lingua sicca, aspera, nigra, os amarum, extrema modo refrigerantur, modò incendio uruntur, & nihil malorum est, quod cum malignis febribus aliquando non conjungatur. Quæ erumpunt peticulæ, sive petechiæ, vel lenticulæ, aut purpuratæ sunt maculæ lenticulis, puncturis, aut morfibus pulicum similes frequenter purpurei coloris; sed & violaceæ, virides, lividæ, nigre, aliquando majores instar vibicum, & lividæ, quales vibices, aliquando amplissima, & integras partes corporis occupantes, ut brachia, crura, dorsum, atque rubescunt; cum autem petechiæ sint simplices maculæ, nihil à cute eminent; sed ipsam solum inficiunt. At variolæ sunt pustulæ, quæ ad suppurationem veniunt, morbilli minores pustulæ, & quasi asperitates cutis, quæ sine suppuratione excutuntur. Exanthemata pariter erumpunt, pustulæ nempe, quæ eminent, & ad suppurationem veniunt. Febris, in qua, peticulæ, petechiales dici solet.

Succedentia. Febris pestilens, cum nempe febris maligna privata sit popularis, eorum, quos invadit, plerisque necans, & contagiosa.

Pestilens.

Differunt pestis, & febris pestilens; neque enim semper pestis cum febre; sed dantur pestes sine febre, ut apud rei Medicæ scriptores. Cum autem pestis est cum febre, antecedunt, conjunguntur, & succedunt pesti eadem, ac febris, ut patet. Differt autem pestis a febre petulente, ut genus a specie, cum enim pestis in genere sit morbus communis, seu popularis plerisque necans & contagiosus, quoties febris popularis est plerisque necans, & contagiosa petulens dicitur. Ubi notandum populares morbos esse vel 1. *Sporadicos*; cum nempe diversa genera morborum plurimos eodem tempore, ac regione corripunt; vel 2. *Endemios*, cum idem genus morbi plurimos eodem tempore, ac regione corripit, ortumque habet ab eadem regione, cui est familiaris, ac naturalis: vel 3. *Epidemicos*, cum idem genus morbi aliunde translatus plurimos eodem tempore, ac regione corripit, & nullum ex his popularibus esse pestilentem, nisi necet plerisque, & sit contagiosus, & Graecis dicitur 4. *Limadu*, qui pestilens est, vel pestis.

Antecedentia. Victus pravus, aer corruptus vel loci vitio, ventis, vel tempestatibus a naturali ordine devius, contagium aliunde advectum, halitus venenati e terræ imis per terræ motus, fodinas, &c. Mox autem invaluram antecedunt morbi epidemici, qui cujuscunque generis esse possunt, febres petechiales, variolæ, morbilli, dysenteriae, pleuritides, &c. Epidemici; variolæ, & morbilli non solum infantes, sed & adultos corripientes, anthraces, seu carbunculi, & bubones frequentius erumpentes, summa caritas rerum, unde fames naturalis, ex qua pestis juxta dictum Graecum ἡ λοιμὸς ποτὶ λιμὸν pestis post famem.

Conjuncta. Subitaneus virtutis lapsus, summaque virium debilitas; animalis verò facultas in peste ad usque finem vitæ integra persistere dicitur, sicut & naturalis aliquando non adeo insigniter labefactatur, in multos invasio, & plerorumque mors, per contagium communicatio, quod sit vel per verum contactum peste affecti corporis, vel per quid ab eodem non attrectato indians expirans, quod est à peste inseparabile. Cum exposito subitaneo virium lapsu palpitatio cordis, lipothymia, syncope, summa angustia, ob quam quiescere nequit æger, sed corpus volutat, nutatque litum, virium verò lapsus sit sine ulla manifesta causa, & evacuatione insigni, vigiliis, doloribus, &c. Pulsus parvus, languidus, frequens, inæqualis, calor ardens quantoque tam interior, quam exterior, plerumque ingens æstus interior, exterior mitis calor, ita ut nares, aures, sunt maxime manus, ac pedes aut non caleant, aut minime caleant; cum interim per æstum interiorem vestimenta, operimenta, & linthea terre non possint. Exanthemata rubra, pallida, nigra, livida, aliorumque colorum, bubones, & carbunculi, quæ singula ab exanthematis ad carbunculos usque seorsim spectata non erunt argumenta pestis, nisi cum aderunt antecedentia, & conjuncta reliqua cum peste; neque enim omnis carbunculus, &c. est pestilens; sed solum qui conjungitur, ac pendet à causis pestis. Cum verò Animalis

malis facultas etiam afficitur, fit delirium frequens, memoriz lapsus, perpetua vigilia, vel veterans, & sopor, oculi lumen refugientes, aurium tinnitus, surditas, tremores, convulsiones, lingua inepta sermioni, quasi balburientis, nec nisi magno conatu se movens, aliquando inappetentia, nausea, vomitus. Urina nunc tenuis, & summe cruda, nunc turbata, & jumentorum similis frequentius colore livido & plumbeo, non raro foetida, interdum sanorum similis, sudor aliquando copiosus, nonnunquam foetidus, intemptivus, acer, frigidus, stillicidium sanguinis e naribus. Alvi dejectio prava, foetida, male colorata, & sapisime exigua, quidam glutinosa, alba, crocea, viridis, plerumque foetida, non aquosa, sed corpulenta. Lingua ariditas, & asperitas insignis, oculi vivido colore, & splendore destituti siccissimi, ac nocentium similes, foetidus spiritus, universum corpus male olens, sensus putridi saporis in bono cibo, ac potu, cardialgia, singultus. Varie scditates, & ulcera percutem, quorum alia ignem sacrum, inflammationem, scabiginem, impetiginem lepram, scabiem alia referunt, durat 24. horis, triduo, quatrinduo, quinque, septem, novem diebus, ultra quartum decimum etiam producitur.

Succedentia. Mors plerumque, postquam eruperunt per cutem maculae diversi coloris, quales etiam apparent in iis, qui insigni, & vehementiori aliquo veneno sublati sunt.

Febres symptomatica, vel secundaria.

Atque exposita sunt hactenus periodicae febres continuæ primariæ, quæ scilicet nulli morbo necessario superveniunt; sed ex seipsis accidunt, & morbus sunt. Dantur alia continuæ, quæ symptomaticæ, vel accidentes, nempe pendentes ab alio morbo, à quo ex necessitate proveniunt, ut in phrenitide, pleuritide, hepaticide &c. & febris pendens à vera inflammatione à puro sanguine phlegmonodes, ab erysipelate erysipelatodes, ab inflammatione jecoris, yphodes; atque ita de cæteris nuncupatur. Hujus classis est typhiria, in qua interiora omnia quali uruntur, exteriora frigent, febris ardens, ac vehemens ab inflammatione magna, & vehemente alicujus profundi visceris cum pulsu parvo, inæquali, & celeri. Huc pertinet febris lenta à latente obstructione, vel putredine, seu corruptione alicujus visceris, febris nitissima sine ullis accidentibus, ita ut æger vix se laborare judicet, mali tamen notæ in urina, & pulsu, vires ægri collabuntur, ut vix progredi præ imbecillitate possit, nihil ex alimento reficitur, sed sensim contabescit, & absumitur, in longum protrahitur ad 40. diem, & ulterius. Lentæ similis febris est in cachecticis, & virginibus chlorosi laborantibus, in quibus febris alba.

Symptomatica pariter est febris ex lacte corrupto intra ventriculum in pueris, & infantibus; similis à sanguine extra vasa derivato, & putrescente: similis ex vermibus, sed conjuncta cum mille aliis, delirio, læsa imaginatione, memoria, moribus convulsivis, animi deliquis, turbatione visus, & auditus, vigiliis, stridore dentium, contritione labiorum, gemitu, clamore præter occasionem, perfrictione na-

rium, ejusdem loci impatientia, corporis hinc inde pacate, aut cum impetu variatione, ira, inconstantia, pulsu parvo, obscuro, debili, inæquali, deficiente, modo inappetentia, modoque fame canina, & hæc cum antiqui corporis emaciatione, vomitu, nausea, siti maxima, alvi scæcibus aliquando duris, ac siccis, sæpius alvo soluta, urinis spumosis, albis, interdum obscuris, sere semper perturbatis, sudoribus foetidis, ac frigidis, saliva plurima ex ore, labiis nocte humentibus, die siccis, foetido halitu, qualis ex aceto, vel fermento, colore pallido, extremorum frigiditate, tumore ventris, punctioribus, doloribus colicis, oscitatione, pruritu, & frictione narium, morfu ventriculi, tussibus siccis, exiguis, dormitatione. Similis ex cruditate infantium ob defectum dentium plura, atque integra devorantium, & voracitatem; & hæc cura hypochondrii tumore, atque inflatione conjuncta est.

Plures ex his, quas symptomaticas, appellavimus, præcipue quæ cum inflammationibus conjunctæ sunt, possunt esse comitatæ; tales scilicet ut vel ipsæ simul cum inflammatione generentur, vel ipsæ sint, quæ necessario inflammationem generent, quia tamen ad rem Medicam perinde est, de iis fufius non hic agatur speciatim per singulas excurrendo; sed solum comitatam unicam exponimus quæ cum naturaliter invadat sere omnes, antequam pueritiam vel adolescentiam excedamus, momenti est maximum; ut per illam in vitæ discrimen adductis ope Medicam ferre valeamus. Est autem hujusmodi febris, quæ variolas, ac morbillos naturales præit, de qua proinde mox; sed prius adnotabis, non ita plane constare, cur Medici communiter symptomaticas omnes continuas afferant; si enim causa febrem symptomaticam producat ejus sit conditionis, ut febrem ad finem integrum pervenire permittat, dabuntur etiam symptomaticæ intermittentes, nec video, quia sit, quod, id fieri possit, prohibeat.

Febris Variolarum, & Morbillorum in pueris.

Antecedentia. Dolor capitis pulsatorius in fronte, ac temporibus, somnolentia gravis, terrores in somno, deliria, interdum tremores, & convulsiones, iteratio, pandiculatio frequens, rancedo, tussis, spirandi difficultas, calor, rubor, & pruritus sensus in toto corpore, dolor dorsi, magna anxietas, & inquietudo, lacrymarum involuntariorum, oculorum splendor, & pruritus, tumor faciei cum rubore, febris synochus cum his omnibus symptomatibus ab initio vehementibus, ut morbus statim vigorem attigisse videatur.

Conjuncta. Mox Erumpunt pustulae vel majores varis similes, quæ ad suppurationem pervenire solent, & variolæ dicuntur, vel pustulae perexiguæ, & veluti cutis asperitates cum intensa rubedine, qualis erysipelatum, & dicuntur morbilli, & proveniunt in toto corpore; sed præcipue facie, manibus, ac pedibus: morbilli intra 5. vel 7. dies sine suppuratione discutuntur. Veræ variolæ cum rubore, & inflammatione proveniunt; aliud autem genus, quod *Ravaglione*, vel *Variol Salvatico* nobis dicitur, est pu-

stularum genus variolis simile in magnitudine, & figura; sed sunt quasi vesiculæ albæ seroso humore plenæ, quæ intra triduum disrumpuntur, & necantur, nullius sunt periculi, & plerumque sine febre erumpunt. Variolæ, & morbilli sunt rubicundæ, albæ, subflavæ, violacæ, lividæ, nigrae, citius, tardius erumpentes, citius, tardius exarcentes, exteriores solum partes corporis, vel etiam interiores, & viscera occupantes ac denique vel depurativæ ex doctrina Avicennæ, in quibus partes solum excrementitiæ sanguinis putrescunt, & ad cutem quasi per crissim expelluntur, vel non depurativæ, seu corruptivæ, in quibus bonus etiam sanguis putrescit: hæc mali, illæ boni ominis.

Succedentia. Variolis rubris, albis, mollibus, distinctis, paucis, rotundis, fastigiatis, solam cutem, non autem interiora occupantibus cum levi febre cessante, vel multum imminuta post earum eruptionem, se nullis symptomatis, voce libera, & respiratione facili conjunctis salus. Contra vero variolis tarde erumpentibus, multis, magnis, duplicibus, & continuis, depressis, duris, viridibus, lividis, nigris, melioris coloris, sed nigram maculam in medio habentibus, vel permixtas maculas purpuratas, easque lividas, aut nigras, statim ab eruptione evanescentibus, & statim tumore corporis subidente cum alvi fœcibus, & urinis lividis, aut nigris, vel utrisque sanguineis, vel ex puro sanguine constantibus cum hæmorrhagia per nares, gingivas, aliasque corporis partes cum ingenti febre, nec imminuta post eruptionem variolarum, anxietate, & inquietitudine, difficultate spirandi, siti magna, alvi fluxu, aut dysenteria conjunctis summum periculum, aut mors.

Antecedentia, conjuncta, & Succedentia febribus intermittentibus periodicis. Tertianæ intermittens.

Si tertianæ intermittentis circuitus horas duodecim non excedit, dicitur tertiana intermittens legitima, pura, exquisita: si horas 12. excedit, tertiana simpliciter, vel notha: si ultra 24. horas protrahitur, tertiana extensa.

Antecedentia. Quæcunque bilem excrementitiam generare possunt, intemperies corporis, præcipue jecoris, ventriculique calida, & sicca, juvenus, ætas, calida, & squallida aëris constitutio, vigilæ, curæ, ira, inedia, cibi, & potus calidi, medicamentorum calefacientium nimius usus, labor, exercitia nimia. Et hæc quidem tertianam puram. Quod si hæc fiant ab homine pituitoso, vel melancholico, ut misceantur dictæ conditiones cum causis humores siccos, aut frigidos producentibus, antecedunt illa tertianas nothas, aut extensas.

Conjuncta. In ipso statim insultu vehemens rigor totum corpus concutiens, carnem quasi pungens; sed potest & remissior dari, eoque cessante calor multus, acer, & mordax, & in vigore quaquaversum extensus, & ad attactum diuturniorem remitti videtur, & manu superari, nudatio corporis, spirandi difficultas, magna, multaque respiratio, sitis, oris amaritudo, appetitus dejectio, frigida rei cupido, vigilæ, deliria, sæpe capitis dolor, &

præcipue circa statum; pulsus in paroxysmo parvus, debilis, tardus, rarus, ipso incremente pulsus vehemens, velox, frequens, æqualis, inquit, quoad reliqua; sed inæqualis inæqualitate febrium propria, quæ est, ut dilatatio sit contrictione velocior (& rursus alia est, in qua contrictio dicitur velocior dilatatione; sed utraque est tam ficta, ut nihil sit fictum magis, & excogitata ad explicandum expulsiorem fuliginum, & attractionem aeris refrigerantis in febribus; nectam autem esse, ex doctrina pultuum facile patet.) In statu si bibatur, vapor pituitus ex cute, bilis vomitus, sed hic sæpius in rigore, ventris depositio, & nictus biliosus, sudor etiam vaporosus, & calidus per totum corpus æqualiter, pulsus velox, magnus, vehemens, urina subrufa, vel subflava, consistentia mediocri, & paulo post vel nebula alba, vel eneorema, & febris tum ultra quartanæ paroxysmum non extenditur, si autem urina, sit rubicundior, & neque nebula primo circuitu appareat, neque subline aliquid, seu suspensio ad septimum usque circumtum extenditur; quæ autem febris cum expositis omnibus conjuncta est, & primo die subsiditiam in urina levem, & æqualem habuerit, ea exquisita est, & ultra tertium paroxysmum non protrahitur. Desinit etiam, si ulcera aut pustulæ in labiis, aut naribus erumpant, sicut etiam per alvi fluxum.

Succedentia. Quæcunque febres, inquit Hippocrates, non intermittentes tertio die fortiores sunt, magis periculosa sunt; quocunque autem modo intermiserint, periculum abesse, significant; hoc tamen non est universaliter verum, ut patebit ex demonstrationibus. Tertianæ nothæ.

Quotidiana intermittens.

Antecedentia. Quæcunque pituitam generare possunt, debilis calor viscerum, frigida, & humida alimentorum natura, eorumque copia, habitus corporis oberior, & albicans, ventris, & arteriarum angustia, ætas senilis, sexus muliebris, vita otiosa, victus plenior, anni tempus, aer, cælum, locus, frigida, & humida, sonnus longus præsertim a cibo, usus medicamentorum præsertim refrigerantium, mens, & sensus hebetiores, somnus profundus, insomnia de aquis, nive, submersione; pulsus tardus, parvus, mollis, urina alba, vel pallida, nunc tenuis, nunc crassa cum multo sedimento.

Conjuncta. Invadit præcipue tempore nocturno, nec subito, sed sensim cum extremorum saltem refrigeratione, aut horrore, nec rigor est, ut in tertiana; sed levis horror, hinc calor tarde, & difficulter incremens, & cum magna inæqualitate ita, ut modo calor, modo frigus sentiatur, non est acer, sed halituosus, qualis vapor ex accensis lignis viridibus, & inæqualiter manum ferit, quasi per cribrum trajiceretur. Diutius permanente manu ad contactum calor mordax aliquantum, & acris apparet, hinc per corpus totum diffunditur, quod non valde afficit, unde æger nec se nudat, nec tegumenta abjicit, nec multum, aut frequenter respirat, nec potum appetit; lingua non arida, sed humida, neque sitis. In insultu præcordia intumescunt, inflantur, ac distenduntur

tur; color ægri pallidus etiam in statu febris; facies sublivida, & subtumida; corporis gravitas, & maxima in somnum propensio præcipue in paroxysmo, in quo non raro lipothymia ab ore ventriculi, qui affici dicitur. Urinæ primis diebus albæ, tenues, crudæ, & in principio morbi aliquando quid sedimento simile in fundo matulæ; sed revera non sedimentum à coctione, verum portio crudi, pravique proinde humoris; procedente vero morbo crassiores, turbidæ, quin etiam aliquando rubræ: alvi dejectiones crudæ, & pituitosæ. Primis diebus nullus sudor, procedente morbo aliquid sudoris in declinatione paroxysmi. Pulsus minimus, rarus, circa augmentum velocior, & inæqualis, tardissimus febrium omnium; tertianæ enim maximus, frequentissimus, velocissimus, quartanæ inter hæc. Paroxysmus ad octodecim horas extenditur, quandoque & 14. unde fit continuæ similis. Longa est, & raro contingit, dura. quæ dies 40. menses tres, quatuor; imo etiam ulterius progreditur.

Succedentia. Cachexia, hydrops, carum, lethargus, similesque gravissimi morbi.

Quartana intermittens.

Antecedentia. Quæcunque atrum, ac melancholicum humorem generant, ætas supra 40. annum, Autumnus, corpus frigidum, & liccum: len tumidus, obstructus, & imbecillis; crassorum ciborum usus, ut carnes bubulæ, cervinæ, aprugnæ sale conditæ, & fumo duratæ, pisces ex limolis aquis, olera, & legumina, panis non fermentatus, vinum crassum, ac sæculentum, & similis cerevisia, acetum, unde Hippocrates acetum melancholicis noxium esse ait; curæ, tristitia, studia, graves occupationes, suppressæ purgationes, & præcipue per hæmorrhoides; faciei totiusque corporis color fuscus & nigricans, interdum æqualis, & per totum corpus, interdum maculis saltem quibusdam conspicuus; habitus corporis lencus, & macilentus, aspectus tristior, amor solitudinis, somnus turbulentus, insomnia de rebus nigris, fumis, morte, cadaveribus, sepulchris; & similibus tristibus, urina, si nihil melancholiæ simul excernitur, est tenuis, alba: si melancholia simul excernitur, crassa, livida, & nigra.

Conjuncta. Insultus cum oscitatione, pandiculatione, molesta quadam totius corporis inæqualitate, quam rigor sequitur initio parvus, vel ejus loco sola refrigeratio, & horror; progressu vero temporis sensim fit major, donec fiat vehementissimus cum stridore dentium, ac talis, qualis iis, qui hyeme rigent præ frigore, sensumque exhibent non rei pungentis; sed gravantis, & quasi contundentis, & confringentis ossa, qui doloris *ἰσχυροῦ* Græcis, hinc calor paulatim succenditur non adurens, & æstuosus, ut in tertianis; sed summissus. Declinatio est cum perfecta, & longa apyrexia, pulsus toto febris progressu rarus, tardus, parvus, & in principio valde rarus supra omnes febres, & hæc raritas etiam in augmento, & statu servatur: comparatione facta ad frequentiam in augmento, & statu aliarum febrium. Primis diebus nullus sudor, succeden-

tibus copiosissimus. Urina principio alba, tenuis, aquosa; morbo procedente coloratio mutaturque sæpe color, & contenta ejus. Sitis media inter sitim quotidianæ, & tertianæ, minor, quàm in tertiana: major, quàm in quotidiana. Lien ut plurimum afficitur. Duratio paroxysmorum similis tertianæ nonnunquam etiam longior.

Succedentia. Dysenteria brevior, etque salutaris, ait enim Hippocrates, *Lienosis difficultas intestinorum superveniens, bonum, & idem, Qui lienosis difficultate intestinorum corripimur, in longam supervenientem dysenteriam aqua inter cilem, aut laviam intestinorum excipit, & morimur.* Hydrops, aut scorbutus, si conjuncta sit cum alijus visceris nobilioris affectione, ut jecoris, ventriculi, lienis; Senibus plusquam sexagenariis plerumque fatalis: lethalis etiam, cum in continuam mutatur. Similiter fatalis hæmorrhagia narium, cachexia.

Febris semitertiana.

Febris semitertiana 1. *Phricodis*, seu febris horrida etiam dicta, & 2. *Imitatio* proprie sumpta est febris composita ex tertiana intermittente, & quotidiana continua, unde nunquam ad finem integrum pervenit, & in hac febre illud notatu dignum est, quod toto ejus decursu rigores, & horrores pluries, & sæpe redeunt, præcipue tamen in accessione tertianæ, unde differt à rigore ab abscessibus præcipue internis proveniente; hic enim sæpius in die repetit nullo servato ordine ad accessionem, atque insuper plerumque cum sudatione, qua caret rigor semitertianæ. Est maxime lethalis, & afficit os ventriculi, nervosæque partes, venter, cataphoras, vigilias cum delirio, diaphoreses cum syncope inducit, linguam maxime siccat, & animi deliquum parit, vehementer, quæ in profundo sunt, commovens, & omnino ferum habet typum, ut ait Galenus libro de *Typis*.

Antecedentia, conjuncta, & Succedentia febribus erraticis.

Antecedentia. Vitiosus diversorum succorum apparatus ob varia in victus ratione errata, diversorum ciborum ingestionem, quorum alij concoctu faciles, alij difficiles, alij in bilem, alij in pituitam &c. mutabiles; inæqualis, & inconstans tempestatum ordo, vel inconstancia, & diversitas caloris frigoris, humiditatis, aut siccitatis singulis quibuscunque diebus; febres alij non penitus resolutæ.

Conjuncta. Vagi, & inordinati insultus sine ulla certa forma, ideave febris nullo servato tempore, aut ordine invasionis; primis quandoque accessionibus, rigor, quem calor excipit, & sudor sequitur, secundis nullus rigor, sed levis horror, calor, & decessio, vel finis integer sine ullo sudore: nunc sola pandiculatione invadunt cum calore longissimo & sudore multo desinunt; aliquando cum vomitibus, & siti, aliquando sine his, nunc semel intra hebdomadam impetunt, nunc bis, aut ter nullo certo diurni numero, ac tempore, sed quandoque per quinque, aut sex dies relinquunt cor-

pus integrum, quandoque per duos, aut tres recurrunt, quandoque bis in die.

Succedentia. In quartanas commutari solent.

Coniuncta cum febribus in genere, seu, ut appellant, symptomata febrium communia.

Dolor capitis, vigilæ cum dolore, aut sine dolore, sonnus profundus in aliquibus febribus præcipue quotidianis, semitertiis, & malignis. Deliria, phrenitis; convulsiones epileptice præcipue in febribus malignis, & pestilentibus; hæmorrhagia narium; tussis; lingua arida, nigra, aspera, inflammata, nonnunquam lento quodam humore obducta, aliquando quasi fixa, quæ quandoque accidunt universæ œsophago ad usque os ventriculi. Sitis, & hæc aliquando cum magno æstu circa ventriculum, aliquando cum quadam velut ignea expiratione e pulmonibus, & magno pectoris ardore; singultus, cardialgia, nausea, vomitus, alvi fluxus, sudores symptomatici, lipothymia & syncope præcipue in malignis, dolor lunæ horum, inquietudo, inappetentia omnibus propè febribus communis.

Horum autem plurima etsi suis locis in singulis febribus enumerata sunt; quia tamen sunt incerta, & huc, aut illi febri possunt accidere, & fieri potest ut accidant, vel modò plura, modò pauciora eidem febri contingant, prout illa acrior, aut mitior est, hic simul omnia recensere volumus, ut intelligatur, hæc non esse necessario conjuncta cum hac, aut illa febre, hoc illove ejusdem febris tempore, sed posse sine his, vel eorum plurimis febres dari, posse febrem dari cum iis omnibus, aut plerisque conjunctam.

In Febrium *causis* huc non adducemus quæ super sanguinis incallescencia in genere habent Auctores, ut nec quæ de pituita, sanguine ac melancholia in febrium particulari explicatione addunt eisdem; verum in iisdem quid arguat, quidque sentiat Clar. Joan. Alphons. Borellius in suo de motu animalium tractatu, ubi scilicet de motu excandescencia febrilis, Lectori hic exhibemus, additis præterea sub finem ejusce dissertationis, propriis animadversionibus circa causas quasdam febrium ab aliis rursus assignatas, at vero à Clariss. Borellio nullatenus explicatas.

Sic autem Joan. Alphonsus Borellius. De Motu Excandescencia Febrilis,

Agam de motu Excandescencia Febrilis, quæ licet nostris sensibus exposita sit, quam frequenter nostro malo experiamur, nihilominus earum causæ & modi mechanici, quibus efficiuntur, quamvis summo studio quasi fuerint usque ad nostra tempora, adhuc hæmianam sagacitatem fugiunt; cum non vereantur Doctissimi Medicorum ingenue profiteri, adhuc febrium naturam se assecutos non fuisse. Si ergo inter tam ardua & recondita nil profecero, non magis mihi, quam cæteris vicio vertent Eruditi Lectores. Quibus aliunde ingratum non erit, nova methodo à principiis

longè diversis ab iis, quæ traduntur in communi schola, ea me deduxisse & expressisse.

Propositio I. Vulgata febris definitio assertur, ejusque defectus insinuat.

Nomen febris ab hominibus impositum fuisse, constat, passioni cuidam excandescencie motus cordis & arteriarum (non quidem irritatæ ab ira & vehementi corporis motu, sed spontaneæ & permanentis) cui associari solet fervor & caliditas totius corporis, eamque consequuntur alia symptomata, languoris, debilitatis, doloris, & alia plurima. Sed brevius definitur solet febris, quod sit calor, accensus in corde. Febres postea subdividuntur: alie enim intermittentes, alie continuæ sunt; alie periodice, alie irregulares; alie incipiunt cum rigore & frigore, alie ab initio incallescunt; alie ardentissimæ sunt, alie minimum incallescunt; quæ aliquando perniciosæ valde censerentur solent.

Circa causas excandescencie febrilis, putant, efficientem esse naturam cordis caliditatem; materialem esse sanguinem, copia, vel qualitate peccantem, qui, non secus ac ligna, pabulum incendio subministrat: & quia ut plurimum febres habent certas periodos durationis & intermissionis, ut determinatis temporibus exactius quam horologium renouentur, oportet, ut in sanguine generetur, aut aliunde ei communicetur aliquid: quod ad singulas periodos febriles in itata mentura, & æquali proportionem, & tempore possit febrem denuo reaccendere. Hoc autem erit juxta eorum sententiam, humor aliquis excrementitius & corruptus, in minera aliqua delitescens, & sensim augmentatus in itato tempore, ut inde sanguis afficiatur, & fermentescat, Talis minera, seu focus in vulgari sententia ponitur in venis melsaricis, vel alibi; materia vero sunt quatuor humores vulgares. Sed hæc profecto sententia merito reuocatur, post sanguinis circulationem detectam, cum sanguis nec in melsaricis, nec alicubi itaguet; nec recessus, aut specus pro mineris usquam in corpore animalis excogitari possint absque tumore insigni, aut abscessu aliquo. Et proinde tota hæc fabula evanescit.

Propos. II. Non à foco vel fermento in corde existente, febris accenditur.

Alii recentiores cum Cartesio aiunt, sanguinem in febre bullire, & fervescere ex calore contracto in corde, manifeste evinci ab experientia, scilicet ex pulsu grandi & vehementi, & ex æstu intolerabili in præcordiis, & ex siti ardentissima. Ponunt postea præcipuum sanguinis fermentum in corde ipso, quod locus caliditatis est.

Sed contra hanc Cartesianam imaginationem res ipsa clamat: nam in vivorum anatome non observatur in corde fervens illa caliditas, quam tantopere exaggerant; immò irritato animali doloribus & cruciatibus acerbis, dum scatur, proindeque in excessu iracundia ejus (quæ ex sui natura caliditatem in cor-

corde auget) satis moderata caliditas in corde ejus reperitur, nempe ejusdem gradus, ac habent viscera, & reliquæ partes internæ animalis; scilicet non superat gradus 40. thermometri, scilicet est æqualis caliditati solis æstivi.

Postea in corde non reperiuntur vasa fermentum continentia: nil enim aliud ibidem conspicitur, quam cavitates carnes, consistentes, mundæ & absterse, quæ continenter abluuntur a simplici transitu sanguinis; nec saporem aliquem acrem, acidum, aut alterius naturæ, quam purissimo sanguini convenit, quicquam reperiet.

Ex his ergo & ex aliis rationibus, quæ contra Cartesium ab aliis adduci solent, satis evincitur, caliditatem, aut focum cordis, vel ejus fermentum non esse causam excalescenscentiæ febrilis.

Propos. 111. Non accenditur febris à sanguine alterato fermentatoque; neque ob mordacitatem ejus cor irritatum febrilem excalescenscentiam efficit.

Non desunt tamen Præclari Authores, qui adhuc, antiquorum præjudiciis præoccupati, censent, sanguinem principem locum obtinere in hac scena. Aiunt enim, sanguinem vel ob copiam ejus & turgentiam, vel ob admissionem humoris alicujus fermentitii alterari, fermentari & corrumpi facile posse. Ex quo fit, ut motum, fervorem, caliditatemque contrahat sanguis ab ipsamet actione fermentativa; sicuti videmus, herbas contusas maceratasque, & vina nova fervere, ebullire, motum agitationemque vehementem maximam cum caliditate contrahere. Præterea, postquam sanguis ex fermentatione jam dicta acrimonium, & pungitivam quandam naturam contraxit, necesse est (inquiunt) ut in transitu ejus per cor mordicet & pungat stamina fibrosa cordis, non secus, ac in corde avulso à contactu succi mordicantis, ut aquæ fortis, renovatur, augeturque extincta ejus pulsatio: ex qua punctura cor vehementissime commoveri & pulsare debet cum ingenti ardore, ac caliditate, producta ab ipso corde, vel potius à sanguine virtute propriæ caliditatis nativæ, vel excitatæ à fermento ipsi sanguini superaddito.

Nituntur postea confirmare, ex sanguinis corruptela febrem oriri, propterea quod passim in febribus urina alteratur, corrumpitur; cumque urina ex sanguine in renibus segregetur, secum deferre cogitur particulas impuratum, quibus sanguis coinquinatur, & tamdiu urina alterata perseverant, quamdiu febres perdurant; quod est signum indubitatum corruptelæ sanguinis.

Contra hanc plausibilem, & à magnis viris receptam sententiam, nonnulla militare videntur, quæ examini doctorum operæ pretium erit exponere.

Et primo, non quia urina febricitantium alterata est quoad colorem & consistentiam, sequitur, quod sanguis, cui urina commista fuerat, sit quoque corruptus. Fieri enim potest, ut non à sanguine, sed ab alia causa urinae alteratio & perturbatio contrahatur.

Sicut ab oleo purissimo & insipido, à quo aqua commista separatur, possibile est, ut dulcorum, vel acedinem amaram, quam aqua secum deferat, à contractu sacchari, vel maharbari contraxerit, non ab oleo insipido. Quare, etsi urina alterata in febribus à sanguine separaretur, non licet concludere, sanguinem eadem corruptela affectum esse, & causam efficientem fuisse alterationis urinae, nisi certo constiterit, quod à nulla alia causa liquor urinae contaminari potuerit. Quis enim scit, an in stomacho, vel intestinis, aut in glandulis mesenterii reperiatur humor, sal, aut fermentum, à quo effici potuerit talis urinae conturbatio.

Et hoc aliunde evincitur, quia si urina alterata & corrupta indicat corruptelam actu existentem in massa sanguinea, à qua febris gignitur; ergo, dum perseverat alteratio urinae, perseverabit quoque malitia sanguinis, & proinde effectus ejus, nempe febris: sed urinae alteratio perseverat necum diebus & horis paroxysmi febrilis, sed etiam toto tempore quietis & intermittentiæ a febre in tertianariis & quartanariis. Igitur malitia sanguinis etiam diebus vacationis & intermittentiæ perdurat; & tunc quoque sanguis per cor continenter transit, circulando; proindeque accensionem in corde excitaret, & sua acrimonia cor vehementer concitare deberet: ergo diebus intermittentiæ febris accendi deberet. Et propterea febres tertianæ & quartanæ omnes essent continuæ, absque ulla intermissione, quod & falsum. Igitur hypothesis assumpta falsa quoque erit.

Secundo si nulla alia de causa ægritudo tam perniciofa, qualis febris est, accenditur, nisi quia sanguis, alteratione & putredine contracta, valde recedit à statu ejus naturali, procul dubio sanguis febricitantium valde differret à sanguine sanorum, sicut insigni differentia vegetabilia, & animalia putrida à non putridis diverso colore, odore, sapore, consistentia, & facultatibus activis distare videntur. At nos videmus, quod sanguis, per phlebotomiam ex sanis hominibus eductus, nil ferè differt à sanguine febricitantium, etiam in acutis; in utroque enim separatur pars fluida candidans, albumini ovi similis, quæ in igne concrefcit, a parte consistenti rubicunda; eundem saporem atque odorem in sanis & ægris retinent: colores verò licet aliquantulum differant inter se in febricitantibus, eadem differentia pariter observantur in cruoribus hominum perfectè sanorum. Igitur dicendum est, sanguinem febricitantium non esse putrefactum, corruptumque proindeque verum non erit, quod à sanguine corrupto febris accenditur & fovetur.

Tertiò videmus, quod ex apostemate in extremo pedis febris excitatur: idemque contingit in fluxionibus articularibus; in his tamen sanguis non peccat.

Quartò in fluxionibus catharralibus, asthmaticis & epilepticis febres excitantur non quidem à sanguine, sed à fluxionibus cerebri.

Quintò, si ponatur corruptio sanguinis, causa excalescenscentiæ febrilis, salvari non poterant periodi febriles, quæ statis temporibus

circuitu factō renovantur in intermittētibz de non esse ad esse, ut in quotidianis, tertianis & quartanis contingit. Quod satis suadetur ex eo, quod ipsi nequeunt salvere tales effectus assignando illos diversos gradus alterationis & corruptionis sanguinis, a quibus periodi febriles producantur: sed coguntur recurrere ad mysteria motus lunæ, ad numerorum facultates, & ad similes machinas. Præterea si sanguis putridus, dum transit per cor, ipsum irritando, aut venefica qualitate afficiendo, febrem excitat, quomodo cessare periodus febrilis potest? Quia, inquit, in paroxysmo humor peccans concoquitur, & a Natura expellitur per poros, aut ejicitur e locis principalibus ad intestina, vel alio tanquam ad cloacas. Sed si hoc verum est: quare post certum tempus intermissionis redit febris? Aint, remansisse fermentum, quo denuo sanguis corrumpi potest in determinato tempore; & sic denuo creare potest febrilem excandescētiā. Verūm, quia confecto paroxysmo fermentum febrile subito agit, inchoando novam alterationem massæ sanguineæ, continenter augendo corruptionem per gradus, continuato, non verò interrupto motu, ut constat experientia in fermentationibus vegetabilium & humorum; & cum tali inchoata corruptela sanguis per cor continenter circuit, proindeque cor afficiet suo gradu vitalitæ, & putredinis acquisitæ. Ergo semper febris perseverabit, nec daretur perfecta quies & intermissio totalis à febre, sed haberet periodum continuo crescentem usque ad excessum: & hinc continuato progressu decrederet usque ad infinitum terminum, in quo non quiesceret, sed interrupto motu denuo augetur. Ut contingit in oscillationibus fane-penduli, & in fluxu & refluxu maris; eo quod viget causa motus, aut augmenti ejus crescentis causa, vel decremēti, dum causa motus diminuitur. Cum igitur hoc sit falsum, perseverat enim quies à febre per plures horas, & dies integros; non igitur corruptela in massâ sanguinea generata, & augmentata morbosam motionem febrilem creare potest.

Si postea supponamus cum aliquibus Authoribus, fermentationem fieri, & asservari in aliquo specu & angulo corporis animalis, hoc quidem in Anatomica experientia refellitur: nusquam enim in corporibus febricitantium tales specus, seu cloacæ, repletæ humoribus putridis, conspiciuntur; sed in omnibus visceribus, vasis & carnibus sanguis & humores continuo & non interrupto motu fluunt & refluunt; & licet aliquando adsint abscessus, & apostemata interna, tamen hoc rarissimum est, & fere semper febres accenduntur absque ullo abscessu; imo aliquando à simplici intemperie calida, aut frigida, à vigilia, ira, aut tristitia excitantur febres periodicæ, quotidianæ, & tertianæ, in quibus nullum internum apostema reperitur. Unde constat, quod febres humorales non semper excitantur à sanguine, malè affecto & contaminato à commistione succi alicujus fermentitii, asservati in aliquo specu corporis animalis.

Propos. IV. Non accenditur febris à chylo aliena natura à sanguine, qui fermentationem, ebullitionemque ejusdem sanguinis inducat.

Sed antequam ulterius procedamus, operæ pretium erit expendere doctrinam doctissimi Neotherici de eodem argumento. Supponit ipse, quod vere sanguis corruptus febrilem excandescētiā per se efficere potest, quotiescunque spiritus & pars sulphurea sanguinis exaltata & efferata, cæteris sanguinis partibus supereminet, & cum iis conjungi nequit, elicit luctam quandam, quæ ebullitionem & effervescētiā febrilem creat. Ait præterea, quod fermentum, à quo sanguis alteratur, de foris advenit, nempe est succus nutritivus sanguini ætherogeneus; & proinde ei ægre assimilari potest, qui, ad plenitudinem in vasis congestus, fermentationis motum, ebullitionemque inducere potest. Quia vero præviderat, maxime negotium facessere intermittētiū febrilium & periodorum renovationes, nititur diffcultatem hac ratione declinare. Licet, confecto paroxysmo, succus nutritivus sanguini ætherogeneus subito paulatim eidem sanguini admisceatur, non perinde febris subito accenditur; sed expectandum est, quo usque vasa repleantur & turgeant, ut ebullitio vehementius fieri possit: non secus ac cerisia, vel vinum novum utribus infusum, & strictè oclusum, ut evaporare nequeat, licet fermentescat, tamen sine fervore & impetu ibidem continetur; sed multiplicatis vaporibus ibidem cohibitis tota massa turget, ebullit, & adeo insigniter fermentescit, ut vas utris disiliat, distrumpaturque; quæ operatio perficitur, completurque itato tempore, veluti in intermittētibz febrilibz.

Contra quam doctrinam aliqua dubia proponam. Primum est quod ex eo, quod in febre sanguis agitetur, & caleseat ferventissime, non sequitur, talem fervorem produci tanquam a causa ab ipsa sanguinis fermentatione & ebullitione, cum talis effectus agitationis sanguinis producti possit ab aliqua alia causa. Quod aliunde ex eorundem verbis colligitur: concedunt enim, ex mordicatione & titillatione ipsius cordis produci posse vehementem commotionem cordis, & consequenter sanguinis commotionem, quæ ebullitionem æmulatur. Igitur non est necesse, ut à contra solummodo sanguis ipse fermentatus sit primaria causa, excandescētiā febrilem produ-cens.

Secundò videmus in actu ferventissimæ iracundiæ excandescētiā omnino similem febre, quoad vehementem fere convulsivam cordis & arteriarum pulsationem, quoad æstum ardoremque circa præcordia; quoad fervorem excursionemque sanguinis per universum corpus, quoad sitim, amaroremque oris, quoad commotionem viscerum, tremoremque extremarum partium; & tamen sanguis primævam temperiem suam naturalem retinet, est dulcis; nullam acridinem, nec signum abundantie salium, aut sulphuris exaltati ostendit.

Constat

Constat ergo, produci posse excandescentiam febrilem ab alia causa, longe diversa a sanguine fermentato.

Tertio cum asseritur, in motu febrili spiritus, & sulphur sanguinis exaltatum & effertum esse, ita ut ceteris sanguinis partibus supereminet, & cum his conjungi non possit, & ideo luctam illam ebullitionis inducat, sunt hæc (si id, quod sentio, protelle licet) verba metaphorica, gratis & comidenter prolata, quæ causam commotionis fermentativæ sanguinis non declarant, neque ejus existentiam probant.

Dicerem potius, in mistis reperiri ignis innumeras particulas, & præterea alias, quæ aptæ natæ sunt sponte se movere: hæc vero varie neciuntur, & vinculis contriunguntur, ut in calce igniculi retinentur, quæ, si contingat ab humido, vel a consueta motione interna, vel externa, ut vincula dissolvantur, partes illæ vi motiva percitæ, libertatem natæ suam indolem exercent se movendi; & ideo reliquæ multi partes ab illis agitantur, & varie revolvuntur commisceturque. Hoc autem in vino, calce, & aliis similibus patet; fieri posse, tum ob facilitatem dissolutionis, tum ob abundantiam spirituum, seu igniculorum aut hisce analogorum: in sanguine vero non videtur tam grandis effervescencia fieri posse, cum non adit copia olei, sive spirituum, ut in vino: & illi spiritus acres, qui per distillationem à sanguine eliciuntur, dubium est, an opificio & commixtione ignis (ut in calce immiscetur) geniti sint; quod in multis casibus doctissimus Boyle animadvertit.

Quarto circa modum, quo nititur idem Auctor salvare renovationem paroxysmi in intermittentibus, observo, quod exemplum nulli conclusi intra utres, & ibidem bullientis, quod ob nimiam turgentiam vas dissilit, male adaptatur fermentationi sanguinis intra venas, à qua paroxysmus febrilis renovatur in intermittentibus: quia multum inclusum intra utres, semper eodem tenore fermentatur & bullit; scilicet æque incalescit, & æqualibus temporibus gignit ampullas vaporosas ejusdem molis, æque numerosas, & æquali frequentia, sive utris turgeat, sive non. Et ratio, quare ob nimiam turgentiam vas dissilit, non est, quia tunc inclusum vinum majori vehementia fermentatur, scilicet magis calet, & majori proportionem & celeritate ampullas vaporosas gignit. Sed tunc præcisè completur repletio utris; & deinceps aucta superflua moles aeris evaporati à multo non potest in loco strictiori utris dicta moles tantopere dilatata contineri; & proinde vim tacit, ut quærat amplum spatium æquale suæ moli, & hinc scissura vasis efficitur. At sanguis intra venas inclusus, si completo primo paroxysmo, ad instar musti fermentativum motum exercet, & ebullit absque turgentia, non secus ac mustum, non video, quomodo expectari debeat turgentia venarum & arteriarum ad hoc, ut subsequens febris accendatur: quandoquidem dissilitio vasorum sanguineorum frustra timetur, cum vasa sanguinea in principio novi paroxysmi neque turgeant, neque sanguinem ferventem contineant; imo cæcitate, & adeo pu-

silla & frigida sint, ut pulsus contracti & parviant, & ut plurimum rigorem & tremorem concomitantem habeant; nec ebullitio & caliditas sanguinis, producitur à turgentia, sed ab ipso motu fermentativo sanguinis, qui motus ut ab initio (ex concessione ipsiusmet Auctoris) alias comparari non posset cum musto fermentescente. Origo ergo fallaciæ in hoc consistit, quod comparatur quies intermittentiæ febrilis, quæ est defectus & privatio motus fermentativi sanguinis, cum statu utris nullo oppleti ante ejus turgentiam perseverantis, absque dissilitione & ruptura: in quo statu multum fermentescit & ebullit, secus ac sanguis faciebat. Nam si verum est, quod toto tempore intermittentiæ à febre sanguis, contentus in vasis, fermentesceret & ebulliret, non secus ac mustum in utre non turgido, oporteret, ut in transitu per cor fervorem & excandescentiam febrilem excitaret pro gradu fervoris ipsius sanguinis. Quapropter toto tempore intermittentiæ paroxysmus febrilis periret, licet minus intensus. Nulla igitur febris intermittens daretur, sed omnes essent continuæ, crescendo continenter & decrecendo, ut antea dictum est: quod cum sit falsum, latendum est, non à sanguine fermentato febrilem excandescentiam creari.

Propos. V. Experimentis comprobatur, quod sanguis, alteratur à caliditate, putredine, vel ab admixtione salium, aut sulphuris, febrem non producit.

Quotiescunque dubitatur, an aliquid sit certa & indubitata causa alicujus effectus, qui in aliquo subjecto exoritur, hæc regula & cæterio, dictamini naturæ conformi, procedendum esse, uno ore omnes Philosophi fatentur. Si enim possit illa, de qua dubitatur, an causa sit, absque alterius consortio semper sequitur effectus, & pariter verificatur, quod, remota & non existente illa, semper cessat effectus, affirmabimus absque erroris formidine, illam vere causam esse productivam prædicti effectus. Attamen, si inquirendum est, an aliquid non sit causa alicujus effectus, tunc regula infallibilis hæc erit; si nimirum remota & non existente illa, quæ ambigitur, an sit causa, nihilominus aliquando, imo semel effectus producit; tunc affirmare tenemur, illam nequaquam causam fuisse prædicti effectus: e contra, si illa posita, debite subjecto applicata, & non impedita effectus, nihilominus non sequitur, concludere licet, illam non existisse causam effectus non producti, & non existentis in Natura. Modo, quia ambigimus primo loco, an caliditas actualis massæ sanguineæ febrem pariat; quia videmus, quod caliditas sanguinis, contracta à fervore aeris æstivi, vel ab hypocausio, aut a potu abundantissimo aquarum Lucensium calidissimarum, licet sit intimè applicata ipsi sanguini, scil. diffusa sit per omnes sanguinis particulas, & proinde non impedita, nihilominus fervorem febrilem non producit; absq; hesitatione concludere possumus, quod alteratio sanguinis ab actuali caliditate febrilis motus causa non est. Nec obstat, quod aliquando à radiis solis canicularis

febres excitentur; nam hoc contingit, quia contrahitur læsio in cerebro & nervis, non à caliditate, ut calor est. Quod suadetur ex eo, quod prædictæ febres non accenduntur, dum actu viget, aut exiit talis caliditas sanguinis, scilicet quando actu radii solis caput calefaciunt, sed post aliquod tempus, nempe cum caliditas illa non amplius exiit, nec operatur.

E contra, posito defectu & privatione intemperiei calidæ actualis in sanguine, inò posita in sanguine actuali tepiditate tempore hyemali, & rigida frigiditate in quartanariis, tamen subsequitur effectus accensionis febrilis. Igitur intemperies actualis caliditatis sanguinis non est causa productiva ardoris febrilis.

Secundo loco, quod alteratio sanguinis, contracta ab admittance spirituum & sulphuris exaltati, vel salium, non sit causa productiva februm, suadetur ex eo, quod aquæ Thermales sulphureæ & salinæ, copiosissime ebibitur, intime commiscetur sanguini, & per universum corpus sparguntur, & præcipue cor ad instar torrentis irrigando, valde id irritare & mordicare deberent, proindeque insignes febriles excandescencias producere, quod tamen non contingit. Præterea ob urinæ retentionem in calculosis, sales ammoniacales urinæ acerrimi massam totam sanguinis inficere, & cor ipsum perpetuo mordicare deberent; proindeque febrem molestissimam & continuam producere, quod tamen non contingit. Insuper, dum Pius degerem, solertissimi & docti Anatomici Carolus Fracassatus, & Silvester Bonfigliolus, me præsentem, infuderunt intra canis vivi jugularem venam olei sulphuris unam vel alteram dragmam; & post aliquos ejulatus ligata vena canis solutus adeo vegetus & immunis à febre remansit, ut avidissime ossa corroderet, debitis temporibus ederet, & dormiret, ut nullum signum invaletudinis ostenderet; & sic permansit usque ad diem octavum, quando aufugit à cubiculo, in quo detinebatur. Si igitur à tanta copia salium & olei sulphuris acerrimi sanguis alteratus nequaquam febrem efficere potuit, fatendum est alterationem sanguinis, à salibus & sulphureis succis & spiritibus factam, non esse causam productivam febris. Quod præterea confirmatur ex adverso, quia sanguis febricitantium mitissima temperie donatur sapore dulci, non mordicante, nec acri salino: & ideo intemperies acerrima salina & sulphurea, in sanguine non existens, non potest esse causa effectus febrilis. Et proinde sanguinis alteratio febris causa efficiens non est. Nec obstat, quod in ebriis pulsus concitetur, & corpus incalescat: nam præcipua læsio fit in cerebro & nervis ob dolores capitis, vertigines, sopores lethargicos, convulsiones, phrenitides, & similes affectus. Quare potius censendum est, cordis concitationem & caliditatem esse effectum, dependentem à læsione cerebri & nervorum; quod inferius confirmabitur.

Quod putredinem sanguinis pertinet, quid quæso magis coinquinatum & putridum excogitari potest, quam pus pleuritidis? Et hoc tamen, quando per urinas expurgatur, per pulmones ad sinistram cordis ventriculum perducere necesse est, & hinc intra Aortam effundi,

ut nimirum medietas fere puris per ramum ascendentem ad caput & brachia, dispergatur, & per venas jugulares & axillares denuo ad cor reueatur; reliqua vero parte puris per Aortæ descendentem truncum diffusa, non tota simul puris massa prima vice per renes expurgatur, exoneraturque, sed solummodo tertia vel quarta ejusdem puris portio pro mensura & capacitate arteriæ renalis, comparata ad totam Aortæ descendentis amplitudinem, ut demonstravimus: unde puris residuum, per totum corpus diffusum, recolligitur a venis, & denuo per venam cavam unà cum pure, à capite & brachiis descendente, ad cordis dextrum ventriculum, & inde ad pulmones diffusum secunda vice, una cum nova dose puris in pulmonibus stagnante, ad sinistram cordis ventriculum reducit. Et hinc denuo circulando deponitur in renibus exigua alia ejusdem puris portio. Quia vero pluries circulatio prædicta reiterari debet, antequam pus universum per vasa urinaria excernatur; & inter ea nedum necesse est, ut tota massa sanguinea infecta & coinquinata permaneat per horas & dies, sed etiam cor in singulis distolis & pulsationibus ejus affici, & mordicari a prædicto putrefacto pure debeat. Igitur hujusmodi coinquinatio sanguinis a tali puris putredine vehementissimas & anxiosissimas febres producere deberet. Quod cum multoties non contingat, dicendum est, febres non a putredine sanguinis, sed ab alia causa longe diversa produci.

Sed antequam ulterius procedamus, non negabo, sanguinem tam perversa & maligna alteratione affici posse, ut insignes læsiones, & tandem necem animali asserre queat: hoc enim amici superius laudati me præsentem experti sunt. Injusa enim ope syringæ aqua forti intra jugularem venam canis vivi, siquidem aqua fortis non fuerit diluta, & copiose infundatur, tunc sanguis grumescit, consistentiæque tetricæ, & fere lapideam acquirit, replendo totam venæ amplitudinem, ita ut impediatur transitus sequuturo sanguini, ut nequeat cum aqua forti admixta ad cor perducere: si verò sit diluta aqua fortis, vel quilibet succus, & sensim paulatimque intra venam instilletur, tunc quidem cordis sinus attingens, miras convulsiones & spasmos canis patitur, & vehementissime se contorquendo & ejulando cito moritur, & aperto thorace sanguis grumescit in corde & in vasis reperitur. Oleum verò Tartari per deliquium easdem convulsiones, dolores & necem efficit, & sanguis non grumescit, sed fluidus remanet. Observavi quoque, quod quilibet succus acidus, sero, seu albumini sanguinis commixtus, & igni approximatus impedit ejus concretionem. Unde incidenter noto, quod, quando polypi in corde & in venis reperiuntur, tunc sanguis nequaquam à succo acido infici potest.

Ex hisce tamen experimentis non deducitur, quod alterationes sanguinis à spiritibus & salibus acerrimis febres producant: & si forte accidat, ut illis symptomatibus febris aliquando commisceatur, negabo, semper, eam immediate accensam fuisse ab illis sanguinis salinis inquinamentis. Quod evincitur ex eo, quod omnes aliæ immunitatæ febres non producuntur, à san-

à sanguinis alteratione, fermentatione, & corruptione, ut ostensum est.

Propos. VI. Spiritus, seu succi nervei solito redditu aciores, & nervos cordis irruantes, sunt causa productiva prima, & immediata exandescentie febrilis.

Postquam febrium causas ab aliis traditas rejecimus, earumque incertitudinem indicavimus, operæ pretium erit tentare, an aliquid probabilius circa febrium Naturam conijcere valeamus. Pro cuius inquisitione denuo observo, quod propriissima affectio & character febris est pulsus, & commotio vehemens cordis & arteriarum, ad quam consequitur incandescencia, & alia symptomata: & hoc nedum verum esse constat ex universali fere hominum consensu: sed etiam evidenti ratione & experientia suadetur. Quia videmus, quod, posita vehementi cordis motione & concussione, paulo post subsequitur in toto corpore animalis nova quædam caliditas, quæ prius non aderat, ut patet in ira, & in agitatione vehementi corporis. Similiter, ablata tali motione cordis, scilicet diminuta, contracta, & tardius facta, subsequitur tepor, rigor & frigiditas, quæ prius non existebat per corpus animalis, ut contingit in timore, & in rigoribus quartanæ. E contra, posita nimia caliditate, & ardore corporis & viscerum, non semper sequitur nova cordis vehemens commotio, ut experimur in ardore æstivo, in hypocausto, & in potione copiosa aquarum thermalium ferventium. Igitur dicendum est, quod vehemens cordis commotio sit causa effectiva caliditatis corporis, & non e contra, scilicet caliditas corporis non erit causa productiva vehementis cordis motionis.

Videndum modo est, quam sit causa efficiens præcipua, & immediata vehementis motionis cordis, quæ pariter esse poterit principium productivum febris.

Et procul dubio eadem illa causa, quæ in statu sanitatis placido & ordinato motu musculos cordis agitatur, eadem planè viribus aucta id ipsum celerius & vehementius movebit. Sicuti idem ignis, qui exilem tepidamque caliditatem producit, in tactu majorem ardentiorumque procreabit si magis approxinetur, aut flamma ejus augeatur. Similiter ab eodem imperio voluntatis, mediante spiritu, vel succo nerveo, manus, pedes, & ceteri muscoli agitantur tardo & leni motu, nec non magna vehementia celeritateque operando. Et quia cor, ad instar automatis, per se moveri potest independentem ab imperio voluntatis successivis pulsationibus, interpositis morulis, necesse est, ut ab eodem spiritu, vel succo, à nervis intra cor instillato (ut alibi dictum est) pulsationes cordis producantur placido & leni motu in statu sanitatis, & vehementer in statu febrili. Quare ad hoc, ut celerius & vehementius cor moveatur, nil aliud requiritur, nisi ut ille succus spirituosus, acrior redditus, frequentius instilletur. Cumque febrilis constitutio non differat à statu sanitatis, nisi in celeritate & vehementia motus cordis; igitur in statu febrili spiritus seu suc-

cus nerveus ob acredinem citius & frequentius intra cor instillatur.

Et hæc satis ostendunt nedum possibilitatem nostræ positionis de Natura febris, sed præterea facilitatem simplicissimam effectiois ejus. Modo afferemus rationes & experimenta, quibus confirmari potest prædicta assertio.

Et primò observo, quod à simplici odore vini, vel à quolibet vapore spiritoso & nutritivo vires animalis languidæ & labefactæ minime reficiuntur, & cordis languida pulsatio momento vivificatur & augetur. Procul dubio fumi odorosi non communicantur per venas, aut per pulmonis bronchios ad cor, nedum quia transitus per pulmones non patet, sed etiam quia, si retento spiritu fumi odorosi ascendentes per nares insinuantur, & facta expiratione, applicato ore foramini, in cubiculi pariete excavata, excipitur inspireturque novus aer externus, & hoc semper repetatur, certè fumi odorosi intra cubiculum inclusi, ascendentes non ad cor per pulmones, sed per nares insinuat, nervos nasales citillando, ad cerebrum pertingent. Et hinc per nervos celerissime, & quasi momentaneo motu ad cor motio, & affectio odoris communicari potest; unde, vi illius refectiois fortius cor moveri & pulsare posse, videtur nedum possibile, sed necessarium.

Secundò id ipsum confirmatur ab opposita operatione tetri & maligni fœtoris, qui per nares ad cerebrum perductus vires prostermit, & languidas pulsationes in corde producit.

Tertiò non secus retento, & agitato vino intra Os per vasa salivalia spiritus vini ad glandulas, & hinc per nervos ad cerebrum, & cor communicatus citissime vires & pulsationes cordis reficere, & vivificare videtur.

Quartò, sed evidentiùs hoc confirmatur ex animi pathematis. In simplici enim apprehensione objecti horribilis subito cor in suis pulsationibus retrahitur, minuaturque; e contra ex apprehensione objecti suavis, & diu expectati, cor pulsationes augeat subultando. Nemo certe sanæ mentis negabit, communicari talem affectum timoris, aut gaudii per nervos à cerebro, sede imaginationis, ad cor. Si igitur spiritus, seu succi nervei tanta facilitate, & momentanea fere celeritate motus cordis alterant, non erit difficile, imo valde credibile, ut idem spiritus, seu succus nerveus, contracta intemperie mordaci in febricitantibus, agitationes illas malignas cordis vehementes & inordinatas pariat.

Quòd postea ex pulsatione vehementi & concitata musculi cordis sanguis, qui continetur in qualibet pausa, & quiete ejus repletur, effusus à vena Cava impelli intra arterias usque ad extremas ejus capillares extremitates debeat eodem concitato motu, quo cor contrahitur, patet ex legibus circulationis sanguinis. Similiter evidentià sensus constat, à vehementi & concitata circulatione sanguinis per totum animalis corpus excitari fervorem, caliditatemque de novo, quæ prius non extiterat, ut mox insinuavimus: cujus originem haud quaquam ex motu, ut motus est, peti debere nenseo, sed

sed potius ex ipsa sanguinis natura; continet enim sanguis spiritum, seu oleum, seu potius igneas particulas sopitas, quæ, si contingat dissolvi a vinculis, quibus neciebantur, ut indolem sui motus exercere valeant, tunc caliditatem sensui ostendent; quod si non ex attritu partium sanguinis ætherogenearum contingit, saltem ex mixtura cum salibus lixivialibus, dispersis per viscera & reliquas partes corporis reconditas, ad quas pertingere potest sanguis ob violentiam, qua a corde impellitur, contingere potest caliditas & fervor, non secus ac contingit in mixtura acidi vitrioli & salis tartari: vel potius ut Willis experimento comprobavit, qui sanguini extravasato calenti immiscuit spiritum vini, aut coniu cervi, vel fuliginis, aut vitrioli, aliunde liquoris spirituosius, aut salini, & vidit, miram ebullitionem & effervescentiam excitari in prædicto sanguine.

Propos. VII. Quomodo succus nervæ fermentatus, & acredine affectus cordi communicari queat ad febrem concitandam.

Non sufficit nosse, succum nerveum cordi instillatum sua acredine vehementem commotionem febrilem efficere posse: sed præterea oportet, ut indicentur vix & modi, quibus talis succus è remotioribus corporis partibus ad cor perducatur, ut ibidem operationem suam febrilem complere possit. Sed prius, ne videamur laborare in hypothese imaginaria & phantastica, erit operæ pretium ostendere, verè in animali exerceri talem operationem, nempe è locis longinquis, ut ab extremo pedis communicari posse noxium succum per nervos ad cerebrum, & inde ad cor, id vehementer agitando & concutiendo. Hoc patet in succis venenosis qui, si solummodo cutim tangunt, non lædunt; sed si tetigerint cicatrices, aut ulcera, citissime ad cerebrum ducuntur, vertigines & torporem afferendo: & postea ad cor communicantur, ejusque rhythmum alterant, & palpitationes inducunt. Et ne quis putet, non per nervos, sed per venas virus ad cor traduci, observet, quod à morsu viperæ, aut ab oleo Tabaci prius cerebrum afficitur & conturbatur, quàm ad cor læsio producat. Postea consideret, quod ostiola venosa in ulceribus glutine quodam satis tenaci obstructa sunt, cum idem succus tam fortiter obstruat arteriarum orificia, venulis pariter incisus contigua, ut sanguis per ea effluere nequeat; qui aliunde maximo impetu solet ex arteriis exilire. In vulneribus postea recenter incisus neque succus venenosus per venas communicari potest, quia motus contrarius, quo sanguis ipse è venulis foras egreditur, impedit introitum succi venefici, quod animadvertimus in Academia Experimentalis Medicæ, dum experiremur vires potentissime veneficas olei Tabaci, quod, copiosè effusum intra vulnus recens, nullam noxam afferebat, & confricatum filomádido intra carnes post unum vel alterum minutum torpore animal afficiebat, & paulò post extinguebatur.

Necesse est ergo, ut communicatio illa celerissima succi venenosi fiat per ostiola nervulorum, in ulceribus & vulneribus patentia; & subito usque ad cerebrum diffundatur, ibique

plurima prava symptomata pariat, eademque celeritate è cerebro ad cor communicetur, illudque concutiat, motumque febrilem excitet.

Id ipsum comprobatur ex febrili motu, qui exoritur, dum pus concititur in pustulis & ulceribus, in quibus succi pravi pus efficientes & fermentantes non per venas ad cor, sed per nervos ad cerebrum traducuntur. Quod suadet ex eo, quod cor nil fere afficitur a contactu similium succorum fermentatorum, ut patet ex transitu puris pleuritici per cor. Quare prædictus succus fermentatus pustularum, qui valde mordicare nervos ibidem desinentes potest, facile veneficam suam qualitatem cerebro, & hinc cordi commotionem communicare potest, ejusque rhythmum alterare febreque efficere.

Non secus ex febre illa, quæ in arthritide confurgit, id ipsum confirmari potest. Quia, dolores illos articulares acerbissimos ex mordicatione membranarum & tendinum nervosorum oriri, manifestum est; talesque mordicationes fieri à succis salinis & tart. reis, ibidem concurrentibus, fermentatis agitatisque, dubitandum non est: unde colligitur, quod succi illi mordicantes vel irritant nervos usque ad cerebrum, vel communicatur succus ille usque ad cerebrum, & hinc ad cor, unde febrilis illa continuata exandescencia oriri potest.

Idem dici debet de qualibet febre symptomatica, in quibus omnibus verificatur, quod ex locis affectis per nervos communicatur cerebro, & inde cordi, vel translatio mordacitatis, unde motus cordis augetur, acceleraturque.

Ostensa jam symptomatis existentia & veritate, querenda modo restat causa & necessitas, quare irritatio facta in nervis è cerebro communicari potius debeat musculo cordis, quàm cæteris musculis animalis, ad quos è cerebro nervi propagantur non secus, quàm ad cor; & tam hic, quàm illi sunt ductus deferentes vim & facultatem motivam. Quare necesse foret, ut è tali diffusionione a cerebro, sicut cor vehementius agitur & concutitur, sic quoque omnes reliqui musculi concussi paralysem quandam & tremorem contraherent.

Verum cum hoc non contingat, nec veritas illius symptomatis negari possit (nisi velimus recurrere ad vocabula sympathiæ, consensus & convenientiæ, nil significantia, quæ ignorantia sunt velaminum) dicendum est, quod structura organica cordis valde differt ab ea, qua cæteri musculi conformati sunt. Nulla enim alia de causa eadem facultas motiva diversas operationes efficit, nisi quia diversis organis utitur, ut idem fluxus aquæ fluminis modo triticum conterit molisque, modo trabes secet, modo malleis metalla contundit, modo symphonias tibiis & organis pneumaticis canit.

Videamus modò, quonam pacto cordis organica structura differat ab ea, qua cæteri musculi conformati sunt. Et hoc sanè, licet sensibus non pateat, conici tamen poterit ex diversitate operationum eorundem. Videmus enim, quod musculi omnes artuum, licet non careant vi motiva, nempe spiritibus, seu succis intra nervos existentibus, tamen torpent, nec motum inchoant, nisi adveniat voluntatis præ-

præceptum & imperium. E contra videmus, cor esse organum sui juris, quod, siue jubeat, siue renuat voluntas, semper eodem tenore & rhythmo suas pulsationes efficit. Unde quæso hoc, si causa efficiens motus non est, nisi spiritus, vel succus e nervis intra musculos effusus? Nempe quia in musculis artuum talis effusio fieri nequit, nisi initia nervulorum ab imperio voluntatis convellantur, ut ad instar hirudinum succum spirituosum exugant, in corde vero nullius imperio addicto semper talem effusionem guttatim fieri oportet; eo quod subtilia illa nervorum orificia semper patentia & aperta permittunt. Et hinc facili salvari potest, ni fallor, Problema nostrum. Quia nimirum, posita quacunque exili & leni spirituum; seu succi intra cerebrum agitatione, vel effervescencia, non est necesse, imo est impossibile, ut musculi artuum absque voluntatis præcepto moveantur. At cor non item, quia ob ostiolorum in nervis perseverantem aperturam non potest impediri effluxus succi spirituosii intra cor: & ideo omnino necesse est, ut cor concutatur, & vehementius suas consuetas pulsationes efficiendo. motum, quem febrilem vocare solemus, producat.

Et hoc contingere posse diximus, posita levi qualibet spirituum intra nervos commotione. At si talis agitatio succi intra nervos & cerebrum fuerit ferventior, & efferata ob nimis acres sales admixtos, tunc nedum cor vehementissime concutitur, efficitque acriorem ferventiolemque febrem; sed præterea muscoli omnes, vel præcipui totius corporis adeo convellantur, ut convulsivos motus patiantur, quia nempe acrimonia & agitatio succi nervei tam vehemens & efferata est, ut, non obstante voluntatis remittencia, ostiola nervorum destruere possit. Quod observatur in febribus valde perniciosis.

Propos. I. II. De loco & causis, quibus succi nervi alterantur, ut febres periodicas producere possint.

Ut exactè natura febris exponatur, non sufficit indicasse, quod succus nervus fermentatus, & acedine affectus, potest cordi communicari & illud vehementer agitando febrilem excandescencia producere: sed præterea oportet, ut declarentur causæ proximæ, prædictum succum alterantes, & loca, ubi tales alterationes fiunt. Quod ut commodius præstari possit, oportet, ut effectus a febre producti in cadaveribus observentur, in quibus patet, nullam mutationem notatu dignam in sanguine reperiri, sed frequentissime pulmones inflammati, ulcerati, & aliquando cancerati, aut exanthematis conspersi apparent: aliquando lien & hepatis læsi reperiuntur; sed frequentius lien induratus & scirrhusus: semper tamen observantur glandulæ aut duræ & scirrhusæ, aut flavæ & lividæ, præcipue in mesenterio.

Et primò quoad tænedinem saturam pulmonum, illa profecto neque febris causa extitit, neque inflammatio illius visceris, aut læsio ulla censeri debet, cum in omnibus cadaveribus sanorum animalium quoque reperitur: ori-

turque in moribundis ex eo, quod prius cessat respiratio, quam cordis pulsus: & sic copia illa sanguinis, quæ ad pulmones reducit in illo vita continuo ibidem sistitur, turgidosque pulmones reddit, cum exonerari nequeant, extincta respiratione.

Secundo læsiotabida & pustulosa eorundem pulmonum raro est causa febris, licet remota, sed frequentissime est effectus ejusdem, cum non in omnibus cadaveribus febricitantium sic corrupti reperiantur; & e contra in asthmaticis pulmones sunt valde læsi, & pure repleti absque febre: quare aut prope mortem completur talis pulmonum corruptio, aut, si præedit, non erit causa immediata febris. Restant ergo solummodo considerandæ læsiones glandularum, quæ semper in febricitantium cadaveribus observantur.

Præterea constat ex observationibus eruditissimi & solertissimi Wartonis, & aliorum, quod in qualibet ex innumerabilibus glandulis animalis ramificentur nervi, arteriæ, & venæ, & vasa lymphatica, emittendo innumeras radices ad instar arborum; & in aliquibus apparent manifesti ductus, & canales expurgatorii, ut sunt vasa salivalia, & ductus pancreatis.

Ex hac structura percipitur, glandulas esse totidem officinas, in quibus insignè aliquod opus pericetur, elaboraturque. Sed quodnam illud erit? Forsan in glandulis sanguis arterialis expurgatur ab aliquibus impuritatibus & humoribus serosis, qui excipiuntur a vasis expurgatorii, ut sunt salivalia: sed si hoc verum esset, ad quid adderetur nervus ibidem ramificatus, cum glandula nec motum, nec sensum exerceant, aut possideant? Oportet ergo, ut radices nervosæ in glandulis aut excipiant aliquid ab arteriis, aut nervi ejicient evomantque aliquid in vasa, receptioni destinata, ut sunt venæ, aut in vasa expurgatoria, ut sunt salivales ductus. Quod nervi in glandulis ab arteriis sanguinem recipiant, videtur inverisimile, cum arteriæ, copiosissime in cerebrum desinentes, possint ibidem abundantissime magno compendio sanguinem subministrare: cum e contra incommodissime nervi cogerentur in glandulis sanguinem mendicare. Verosimilius igitur videtur, quod e nervis aliquis succus in glandulis exoneretur, certè & determinatè natura pro varia ostiolorum nervorum figura & capacitate; qui postea, commixtus cum particulis ab arteriali sanguine emissis, aptus sit ad aliquod opus exequendum in diversis partibus animalis, nimirum in ore, œsophago, stomacho, intestinis, & alibi ad fermentationem & digestionem ciborum, & ad opera exequenda, nempe ad nutritionem & vivificationem partium animalis.

His præmissis animadverto, quod succi illi destinati, ut e nervis expellantur, deponanturque in glandulis, fieri potest, ut casu aliquo detineantur in eisdem nervis, obstratis nimirum meatibus & ostiis nervulorum, in glandulis desinentium, ob plethoram, vel ob glutinem aliquod in eis contentum: hi vero succi retenti in nervis degenerare facile possunt fermentatione quadam in alienam naturam animali noxiam. Novum enim non est, ut semen genitale in animali perfectissimæ temperiei, destina-

stinatum expulsionem pro fine generationis, diu retentum contrahat corruptam & veneficam naturam. Fieri etiam verisimilius potest, ut ab obstructione & scirrhus glandularum contracta, aut à pravis succis ibidem collectis, aut aliunde communicatis, & congelatis, fermentatisque, ut in lue venerea, nedum prohibentur effluxus nervis, sed insuper communicentur particulæ irritantes, noxiæ, & malignæ ipsis nervis. Ex his omnibus causis manifestum est, irritatione, vel communicatione quadam affici cerebrum posse, & per nervos usque ad cor commotionem illam efferatam spirituum, seu succi nervei propagari.

Loca igitur, in quibus succi nervei primò fermentantur, sunt glandulæ & radices nervulorum earundem obstructæ, & malè affectæ & irritatæ. Causa verò fermentationis est retentio violenta partium, quæ excerni debuerant è nervis, vel coinquinatio ibidem communicata, pariterque ob retentionem apta ad intemperiem spirituum procurandam.

Propos. IX. Ratio exortus paroxysmi febrilis, aut semper calentis, aut primo gelidi & postea ferventis exponitur.

Ostendimus in genere fermentari posse succum nerveum ob glandularum & nervorum earundem obstructionem & læsionem, & quod à tali fermentatione irritari possit cor, ut excandescantiam febrilem producat. Modo hæc generalis Theoria adaptari debet casibus particularibus, ut nimirum ex ea deducantur causæ & modi, quibus omnia phenomena febrium produci possint.

Sed primò, ne quid ambiguum & incertum recipiamus, adverto, quod verisimile videtur, obstructionem totalem glandularum prædictam, & nervulorum ibidem desinentium fieri debere sensim, non celerrimo & quasi instantaneo motu: & proinde paroxysmus febrilis deberet ab ejus privatione & statu quietis augeri, progressu temporis diuturni usque ad gradum maximum per gradus intermedios ascendendo; non vero per saltum à minimo ad notabilem gradum commotionis & fervoris, vel rigoris ægentis, quo ægri corripuntur, ut constat experientia. Et licet ante adventum paroxysmi præcedant somni inquieti, perturbationes, vertigines, oculorum corrugationes & oscillationes, nihilominus hæc levia symptomata sunt potius signa, quam partes febris.

Adductæ difficultati mihi fieri posse satis videtur expendendo experimentum superius adductum, ubi diximus, quod oleum Tabaci, & alii succi venenati officii venarum incisarum applicati nil lædunt, cum communicentur cerebro, aut cordi, propterea quod effluxus ipse sanguinis impedit, ne succi venenosi intra easdem venas intrudi possint. Cogitemus modo, plures glandulas infectas esse succo aliquo pravo & excrementicio, à quo obstruantur canales excretorii magna ex parte, unde fermentatio in glandulis prosequi possit, tunc planè fieri potest, ut canales nervosi & sanguinei adhuc sint obstructi; & ideo à nervis & arteriis continenter effluent succi nervei, & sanguis arterialis, & hinc ambo per venas asportari pote-

runt. Manifestum est, quod toto illo tempore, quo succi e nervis effluunt, magna ex parte impeditur insinuatio & introitus particularum acrium, glutinolarum, fermentatarumque glandulis intra nerveos ductus; & ideo nec nervi, nec cerebrum, aut cormordicari ab eis poterit: quare tunc temporis excandescantia febrilis non excitabitur. At postmodum, crescente plenitudine & plethora glandularum ob additionem & fermentationem excrementorum glutinosorum & viscidorum, tandem nedum poruli nervorum obstruuntur, sed etiam coguntur admittere particulas aliquas acres fermentatasque, e quibus copiose glandulæ repletæ fuerant. Et hanc postremam operationem cito absque diuturnis moris abfolvi posse facile percipimus, scilicet in extremo temporis spatio, quo completur plethora glandularum a succis glutinosis, quam reliqui prædicti effectus consequuntur. Modo, qui paroxysmus febrilis nulla alia de causa fit, nisi quia nervi obstruuntur & mordicantur, & ideo ad cerebrum & ad cor communicatur; hinc est, quod fiat illa celeris. & quali subitanea mutatio à statu quietis ad fervorem febrilem: præcedentibus tamen levibus illis symptomatibus inquietorum somniorum, perturbationum, vertiginum &c. quæ produciuntur ab aliquibus irritatiunculis levibus a succis glandularum fermentatis, tactis, in aliquibus paucis capillamentis nervosis jam obturatis. At postquam omnino completa fuerit plethora glutinis in glandulis, subito obstruuntur officia nervorum, & succi nervei retenti & inquinati fermentantur: & ideo cor irritatur, & febrilis excandescantia exoritur insigni & vehementi fervore.

Porro, nisi adsit peculiaris causa rigoris & frigescantia, semper febrilis paroxysmus ab initio calidus erit ex sui natura; propterea, quod à vehementi cordis pulsu, irritato a spiritibus, vel succis nerveis fermentatis, sanguis vehementissime per corpus circuit, contrahitque caliditatem, ut dictum est.

Exponi ultimo loco debet causa rigoris & frigoris, cum quo aliqui paroxysmi febriles incipiunt. Quæ forsitan esse poterit, quia sanguis nunquam sero urinae omnino privatur, cum post abstinentiam à potu duorum vel trium dierum mejant adhuc animalia. Ergo fieri potest, ut in glandulis obstructis arteriæ evomant particulas nitrosas, & alia salia, quæ aqueum urinae humorem in sanguine existerenti copiose inficiebant, & ob peculiare fermentum, in glandulis malè affectis genitum, calcanti nam frigorificamque naturam acquirant; & postea, plethora & obstructione completa, è glandulis per nervos ad cerebrum & spinalem medullam deferantur (pater enim via expedita & compendiosa e nervis plexus abdominis, qui cum lumbaribus communicantur in spinam dorsalem) & quia nervæ fibræ facillime vellicantur & irritantur, tremoris frigorisque sensum ob peculiarem nutri naturam inducere possunt in principio paroxysmi, ex qua contractione & tremore spiritus torpent; & hinc pulsus contracti & parvi fieri possunt; & hoc continget, dum commotio succi nervei debilis est.

Alio insuper modo passio frigoris in principio paroxysmi

paroxysmi creari potest. Si è glandulis obstructis, terimento alteratis, communicetur per nervos succus non ab similibus spiritui vitrioli, ut mox minuavimus, & supponamus, in medulla spinali sales urinosos ab arteriis relinqui, qui cum ammoniacam naturam retineant (ex urina enim confici ammoniaci sales solent) commisti cum spiritibus calcantiinis, ibidem effervescentiam gelidam producere possunt, ut experimur, apud nos ebullire tamen miscellam cum ingenti frigiditate. Utroque igitur modo effici potest passio rigoris, tremoris & frigoris, præcipue in regione spinalis medullæ una cum corpore spirituum, & pulsus parvitate, eo quod languido motu cor pungitur, nec talis gelida ebullitio subito evanescit, sed poterit per unam, vel alteram horam produci, quia e locis diffitis per canales valorum possunt sentim instillari & misceri prædicti succi: & quia interim spiritus, seu succi nervei, in motu constituti, rapido impulsu ob aperturam ostiorum nervorum ibidem desinentium, & sua acredine cor irritare possunt, necessario pulsationes continenter augendo duplici nomine ardentem fervorem creant; Primo, quia sales nitrosos diffundunt, & partim expellunt intra venas; Secundo, quia sanguis acuto pulsu cordis, vehementissima commotione & circumductione per universum corpus diffusus, creare potest caliditatem & fervorem paroxysmi febrilis, ut ex dictis colligitur.

Propos. X. De causis symptomatum, febrilem paroxysmum concomitantium.

Nedum initia paroxysmorum, sed progressus quoque & accidentia omnia, febrilem motum concomitantia, animadversione digna sunt, cum propter se ipsa, tum etiam, ut theoria a nobis tradita pluribus testimoniis & argumentis fulciatur.

Et primò supervacaneum non erit rationes asserere signorum, seu passionum præcedentium paroxysmum, ut sunt somni inquieti, perturbationes, vertigines, &c. Quia proxime ante paroxysmum licet glandulæ non turgant, tamen abundant succis fermentaris, qui aliqua ex parte cerebrum, mediantibus nervis, infestare possunt, & sic somni turbare. Eadem ratione perturbationes contingunt, quia spiritus, seu succi nervosi infestati neque motiones, neque sensationes consuetas debito ordine & quiete perficere possunt. Hinc pariter vertigines, & oculorum corrugationes originem ducunt, nempe ex cerebri & spirituum perturbatione inchoata. Oscitationes verò, quæ sunt lenissimæ convulsiones, constat, à mordicationibus nervorum fieri posse. Patet igitur, quod ab eadem unica causa, nempe à proximali læsione nervosi succi & cerebri, hæc accidentia produci possunt; quæ postea insigniter aucta excalescentium febrilem creat.

Inchoato deinceps paroxysmo, sæpè vomitus biliosi sunt, quia in rigore & tremore febrili ab hisdem succis nerveis acredine inquinatis membranz totius corporis convelluntur, præcipue stomachus, pylorus, & choleoduchus, qui nervis abundans, & ideo spasmo contractis, bilis e felleo meatu compresso expelli-

tur in duodenum, & hinc in stomachum, & tandem per os ejicitur.

Præterea præcordiorum æstus serè intolerabilis, licet immediate à vehementissimo motu sanguinis pendeat, ut dictum est; mediata tamen causa est mordicatio, facta à succis nerveis acerbis intra musculum cordis, unde pulsationes tam vehementes sunt.

Sitis ardentissima & inextinguibilis nedum à calore, sed præcipue producit ob particulas acres & salinas, quibus glandulæ copiosissimæ linguæ, faucium, œsophagi & oris ventriculi intarciuntur ob jam dictam obstructionem & fermentationem, quæ nervos ibidem desinentes, & papillas nervosus linguæ corroduunt, lacerant, & pustulosas, nigras, scabrasque in acutis præcipue reddunt. Digni tamen animadversione est diversitas hujus operationis ab illa, quam piper & sales acres, linguæ & faucibus obvoluti, producant: hi enim sitim quoque grandem excitant, sed sine oris ariditate, inò sputum copiosissime provocant, contra febris. Quæ diversitas præclare confirmat veritatem nostræ Theoriæ. Quia si vasa excretoria, scilicet ductus salivales glandularum oris in febricitantibus non fuissent obstructi, necessario sales, mordicantes nervos ibidem desinentes, deberent profluvium s. livalem provocare, ut in sanis contingit. Igitur ariditas illa, & siccitas maxima oris febricitantium suadet, quod verè ductus excretorii glandularum obstructi sunt, ut supponimus in nostra Theoria. Incidenter tamen noto, quod vulgò à fuliginosis vaporibus, è stomacho ascendentibus, nigrorem linguæ fieri censent; quo nihil insulsius dici, aut excogitari potest.

Quoad dolores, præcipue capitis, in febribus facillimè salvantur in nostra sententia. Quia à salinis succis acerbis & pungitivis, per nervos excurrentibus, possunt membranz & nervi mordicari, & præcipue in cerebro, ubi sensu exquisitissimo donantur; & proinde dolores & spasmos possunt asserere.

Quod tantopere vires debilitentur, & lassitudines spontaneæ in febribus contingant, facile ex nostra sententia deducitur. Quia læsio fit in nervis, & ideo dissipantur, lædunturque spiritus, seu succi nervei, qui sunt substantiæ exiguz molis, sed impetum facientes in animalibus; non autem in sanguine existunt, eo quod phlebotomia etiam liberalis nil serè debilitat, nisi major pars sanguinis evacuetur.

Vigilia & deliria, quæ paroxysmis associari solent, eadem facilitate in nostra sententia salvantur: ambæ enim hæ operationes fiunt in cerebro à succis acerbis & pungitivis, id irritantibus, & perturbantibus ordinatos motus spirituum.

Syncopes multis modis fiunt, licet ab eadem causa immediate, sed in febribus, de quibus in præsentia agimus, pendent à mordicatione oris ventriculi ob copiam nervorum trunci sextri paris ibidem desinentium, unde cerebrum & cor afficiuntur: talis mordicatio fieri potest à quolibet succo acerrimo, à venenis, à lumbricis, & aliis e usdem generis, & ab eadem causa cardialgia producitur.

Motus convulsivi in paroxysmis agrè salvari possunt, nisi in hac nostra theoria: nam, ut certi

aliqui musculi tensissimè contrahantur; non consentiente voluntate, fieri non potest, nisi ob acridinem & pungitivam naturam, quam spiritus & succi effundunt e nervis intra eisdem musculos, & eos irritando motus illos involuntarios producant.

Postremo loco in acutis, abscessus in glandulis majoribus, & exanthemata mirifice nostram sententiam comprobare videntur; quia succi nervei tanta malignitate & venenositate affici possunt, ut excreti in glandulis majoribus, vel in papillis cutis, abscessus & cancrenas efficere possint; quod contingere solet, non in principio febris, sed postquam confecti sunt aliquot paroxysmi, scilicet postquam ab effluvio sanguinis vehementer circulati deobstruuntur orificia nervorum, intra glandulas desinentium, ut mox ostendemus.

Propos. XI. Causa diminutionis & terminationis febrilis asseritur, & alterationis urina.

Producto paroxysmo ad excessum fervoris ejus, debemus jam declarare, quare & quomodo idem ipse minuitur ordinato decremento usque ad totalem ejus extinctionem. Quia ob turgentiam glandularum, vel ob visciditatem in eis contentam, obstruuntur orificia nervulorum ibidem desinentium: ex quo fit, ut succi nervei retenti & male affecti fermententur, & nervulos pungant; & ideo cerebrum, & postea cor irritando, febrilem motum producant. Igitur, vigente & perseverante febre, necesse est, ut sanguis, vehementer ab arteriis intra glandulas impulsus, sua fervida fluiditate & rapidissimo attritu abluat, abradat, tollatque obturamenta corrosiva, quibus ostiola nervulorum, intra glandulas disseminatorum, obstruebantur, & etiam aperiant aliqua vasa excretoria. Ex qua apertura sequitur, ut succi nervei acres fermentatique, non amplius impediti, effluere excernique e nervis intra glandulas possint, & hinc partim intra venas emitti, in easdem glandulas desinentes (juxta Naturæ leges, quæ venas ad excipiendos succos destinavit) partim vero excerni queant per valvula excretoria, nuper aliqua ex parte deobstructa. Dum igitur sensim e nervis expelluntur prædicti succi fermentati & acres, qui irritando causa febris fuerant, necesse est, ut continenter excandescencia febrilis mitescat & minuat: & tandem completa exoneratione nervorum, & expurgatis a sarcina acrimie succorum, cessabit necessariò irritatio & commotio vehemens musculi cordis; & proinde quies ejus, & finis paroxysmi febrilis subsequetur.

Sed ne quis putet, nervos à succis fermentatis acribusque expurgari omnino non posse per effusionem eorundem intra glandulas, nisi spiritibus omnibus effusis, ut nervi exinaniti & exucci fiant (hoc enim sine animalis interitu fieri non potest) cogitandum potius est, non totam massam succorum nerveorum æque & uniformiter contaminatam esse debere, ad instar dolii aceto oppleri, e quo acredo tolli non potest, nisi totum acetum effundatur, ejiciaturque: sed potius sicuti fæces vim & flegma, à sulphureis & oleosis partibus separata in fundo

valis subidentia, commodè educi e vino & ab oleo possunt per foramen, in fundo dolii apertum; sic quoque succi acres fermentati subidere possunt in intimis partibus nervorum prope glandulas obstructas, & proinde ab apertis orificiis eorum effluere possunt, remanente reliqua massa spirituum nerveorum succera, & à salibus non coinquinata.

Quod veto aliunde cor irritari possit, licet actu non tangatur à salibus acribus, in remotis partibus nervorum sepositis, facile suadet. Quia nervi ejus naturæ sunt, ut mordicato uno ejus extremo termino sensus dolorificus in loco disito percipiat: sicut, læsa spinali medulla ob contusionem, aliquando in genu & crure dolor perceptus est; pariterque intima foræ auriculæ vellicata, excitatur læsio & commotio in septo transverso, & in musculis intercostalibus, à quibus vehemens tussis efficitur. Idemque innumeris aliis exemplis comprobari posset.

Quare manifestum est, quod ex nostra theoria facile adæquata ratio reddi potest diminutionis & extinctionis paroxysmi febrilis.

Pariterque resolvitur hoc aliud Problema. Quare initio morbi urina non sunt alterata, seu post primum & secundum paroxysmum suam malitiam ostendunt, ratio desumi posse videtur ex eo, quod ante primum paroxysmum succi salini, qui sunt fermentum febrile, non in venis, sed intra glandulas obstructas, & deinceps intra nervos detinebantur: & ideo minime non est, urinam a sanguine separatam immunitatem esse ab impuritatibus, in sanguine non adhuc existentibus: sed postquam confecto paroxysmo prædicti succi salini e nervis intra venas magna ex parte exonerantur, necesse est, ut aqueæ sanguinis ferocitates a prædictis salibus iniciantur, impræstenturque, ut aqueæ natura exigit; proindeque urina ostendent malitiam & corruptelam, à dictis salibus dependentem.

Propos. XII. Quomodo paroxysmus febrilis denuò renovari possit post certa ac determinata tempora.

In præcedenti jam diximus, quomodo paroxysmus febrilis diminui, tandem in intermittentibus omnino remitti & extinguí possit. Restat modo difficillimus nodus dissolvendus, quomodo & quare post certa & determinata tempora paroxysmus renovari possit, ut nimirum exactius, quam horologium, statis temporibus redeat; cujus phænomeni tam ardui latent adhuc intus, propriæ & immediate causæ: quare contenti erimus conjecturis illis generalibus, quæ subodorari possunt. Quia, completo uno paroxysmo, subsequens renovari non poterit, nisi denuò reliquæ fermenti & humor viscidus aucti multiplicatique obstruant secunda vice excretoria vasa, & repleant & pungant orificia nervulorum earundem glandularum. Et completo primo paroxysmo, cessat effluxus vehemens sanguinis, à quo ostia glandularum patula & aperta retinebantur. Et aliunde reliquæ fermenti in glandulas nova elaboratione succos viscidos & acres advenientes fermentant: ergo ab iis vasa excretoria, & postea ostiola

ner-

nervorum secunda vice infarci, obstrui & pungi poterunt. Modo certum est, universam hanc operationem fermentativam, & obstructionem vasorum in glandulis heri & absolvi debere certo & determinato tempore, non in instanti, siquidem succus fermentativus, & viscida materia esset in omnibus febribus eadem, ejusdem acedens & consistentiæ; & vasa, eodem modo disposita in eisdem glandulis, proculdubio semper eodem tempore talem operationem complerent; proindeque in omnibus febribus tempora intermittentiæ essent æqualia inter se. Porro cum videamus, inæquales valde inter se esse durationes intercapedinum paroxysmorum; ut nimirum a principio unius ad initium alterius subsequenti intercedant horæ viginti quatuor in quotidianis, & horæ quadraginta octo in tertianis, atque horæ septuaginta duz in quartanis, fatendum omnino est, vim fermenti, & materiæ visciditatem in hisce diversificari eadem proportionem temporum inæqualium, quibus operationes illæ febiles complentur. Et quidem ex vulgari opinione talis differentia in quatuor humoribus alteratis & fermentatis ponitur: ut nimirum longa intercapedo inter antecedentem & subsequentem paroxysmum in quartana dependeat ab inertia, & torpore humoris melancholici, frigidi, atque terreis; e contra brevius interitium in tertiana pendeat a mobiliori qualitate flavæ bilis calidæ & igneæ; & major frequentia paroxysmorum in quotidianis a nobilissima sanguinis natura aërea & vividiori producat. Sed quia tota hæc doctrina de quatuor humoribus, eorumque proprietatibus & operationibus merito antiquata & rejecta est, cum nedum nullis firmis rationibus fulciatur, sed præterea phænomenis febrilium nullomodo satisfacere queat, ideo alia hypothese hoc problema resolvere tentabimus.

Adverto igitur, quod, licet plurimis modis salvari possit inæqualitas intercapedinum paroxysmorum, ille tamen seligendus mihi videtur, qui nedum omnibus phænomenis satisfaciatur, sed etiam omni ex parte congruat, facilis quoque & simplicissimus sit.

Is porro, ni fallor, talis erit. Diximus, quod, nisi orificia nervorum obstruantur punganturque, paroxysmus exacerbari non potest. Igitur si secunda obstructio & vellicatio fieret non prius, quam exactis horis 24. vel 48. aut 72. horis, deberet tot horis præcisè retardari excalescencia secundi paroxysmi. Quia verò causæ, obstruentes & irritantes orificia nervorum in glandulis desinentium, non sunt aliæ, quam succi viscosi & lenti, & acres in glandulis collocati; igitur, si prædicti succi talem consistentiam haberent, ut obstructions perficere possent temporibus inæqualibus superius expositis, deberent effectus febriles iis inæqualibus temporibus fieri.

Videndum modo est, quomodo consistentiæ succorum viscosorum differre possint in quæsitâ proportionem. Hoc autem non videtur difficile. Si enim in tribus cyathis infundantur æquales partes aquæ, v. g. in singulis libra una; & in primo misceantur sex uncie farinæ, aut alterius pulveris gluten efficientis; in secundo vase misceantur uncie tres farinæ; in

tertio vase duz uncie tantum: manifestum est, atomos farinæ, spatium ejusdem molis aquæ occupantes, non æquis intervallis a se invicem distare posse, eo quod sex uncie farinæ continent duplo majorem granulorum farinæ multitudinem, quam ejusdem tres uncie habent: Et ideo atomi hujus duplo intervallo ab invicem recedunt, quam atomi illius. Hinc ut, in descensu farinæ ad vasis fundum gluten ejusdem consistentiæ connectatur tenoribus inæqualibus, nempe duplo citius in eo cyatho, in quo farina duplo copiosa fuerit. Supponamus modo, quod gluten primum contingat canalem aliquem, visum lentissimo & torpidissimo cursu effundentem, eumque obstruat spatio unius horæ, ibidem nimirum ejectis & coagumentatis particulis glutinosi. Patet, quod gluten secundum semilem dolis materiæ obstructioni aptam habens, tardius eundem canalem obstruet, nempe duplo tempore; tandem gluten tertiæ valis, cujus materia glutinosa subtriplo est primi, & subsexquialtera secundi glutinis, obstruet eundem canalem longiori tempore, scilicet triplo primi, & sexquialtero secundi. Hoc igitur cum lumine Naturæ fieri posse constat, plane in casu nostro excalescenciæ febrilis, omnino illi expolito exemplo simili, idem fieri posse probabiliter conjicere possumus. Nam ab orineis nervulorum in statu quietis effluunt succi nervei torpidissimo cursu intra glandulas. Ergo materia viscosa & acris, contingens prædicta ostiola, dum turgit ob fermentationem, facile infinuari potest, obstruere & pungere illa ostiola, & hoc absolvi deberet temporibus reciproce proportionalibus consistentiæ glutinis, scilicet ejus, quam habent materiæ moles admixta, gluten efficientes. Quare in quotidiana illa materia v. g. unius scrupuli admixta, si obstructionem complere poterit post horas 24. in tertiana subduplum molis ejusdem materiæ obstructionem complere poterit post horas 48. & in quartana subtripulum prioris materiæ obstructionem complebit post horas 72. & tantundem dilatarî intermittentiæ, seu distantie inter primum & secundum paroxysmum. Et hæc generalia circa hoc problema mihi conjiciendo dici posse videntur.

Progrediendo postea ad febres continuas, hæc quidem non videntur differre ab intermittentibus, nisi in perseverantia continua excalescenciæ febrilis crescentis, aut decrescantis per eandem periodos quotidianas, aut tertianas. In hisce continuis febribus duz actiones contrariæ supponi debent simul operantes: una est ipsius glutinis fermentati, quod ob ejus copiam & malitiam potest perpetuò obstructionem, irritationem, & puncturam nervulorum in glandulis moliri majori aut minori celeritate proportionali vi, & copia ejus; alia est ipsius sanguinis agitatio à febrili cordis commotione, à qua absterguntur deobstruunturque continenter orificia nervorum, & excretoriorum canalium in glandulis desinentium.

Insuper prædictas duas contrarias operationes hac lege absolvi posse censendum est. Ut, postquam insignis illa turgentia glandularum, & acrium succorum copia (quæ in continuis febribus semper supponi debet) redacta est

ad minimum gradum repletionis, tunc febris ad maximam declinationem reducitur crescente postea materia glutinosa & acris, crescit pariter turgentia glandularum, & febris similiter augetur usque ad summum ejus statum. Hinc vehemens illa energia, qua sanguis concitatur & fluit, abtergere, vel magna ex parte obturamenta nervorum tollere poterit. Quare succus acris incipiet effluere & excerni e nervis; & prout major ejusdem copia expellitur e nervis, eo magis febrilis paroxysmus minuitur.

Modò, quia, dum minuitur paroxysmus ob fermenti acris ejectionem e nervis, non cessat concursus novæ materiæ viscidæ glutinosæ & acris, in glandulas immittæ ab arteriis & vasis lymphaticis, nec vis fermentativa in glandulis exiens otatur, hinc fieri potest, ut, antequam imminutus ille motus febrilis omnino extinguatur, & ad statum naturalis moderationis reducatur, interim succi illi glutinosi & maligni, in glandulis collecti, & fermentati, novam obstructionem efficere possint, replendo vasa excretoria, & orificia nervulorum pungendo & mordicando: propterea, quòd diminutus ille paroxysmus, lenito motu sanguinem impellendo, nedum ob sui debilitatem ineptus est ad deobstruenda omnino nervorum ostiola, sed nec impedire potest adventum novæ materiæ, & novam eorundem vasorum obstructionem. Quare necesse est, ut, antequam primus paroxysmus omnino extinguatur, incipiat secundus, ob easdem causas renovatus. Et hinc mihi verisimilis causa esse videtur continuationis febris, ut, uno paroxysmo non adhuc completo & extincto, alius subsequatur.

Non dissimulabo tamen, quòd, si certum esset, ut vulgo asseritur, in febribus continuis periodos paroxysmorum complicari, ut præcisè inter se corrépondeant, veluti sunt duæ Tertianæ, vel duæ, aut tres Quartanæ, non æquè facillè id salvari posset in nostra Theoria. Sed forsitan hallucinantur hi, qui putant, paroxysmos huiusmodi periodorum complicari inter se, ut animadvertit Doctissimus Willis. Error enim oriri potest ex eo, quod numerantur dies, non vero intervalla horarum inter binos paroxysmos proximè se consequentia. Verbi gratia, si intervallum sit duodecim horarum, unum proximè fiet nocte, alterum die, & hæc non erunt duæ quotidianæ, sed potius febris una semidiaria. Idem dicendum, si intervalla hos terminos supra & infra non valde transgrederentur. Similiter, si intervallum fuerit 16. horarum, complentur tres periodi febriles spatio duorum dierum, præcisè non erunt duæ Tertianæ, sed una periodus subsexquialtera diei. Pari modo, si intervallum sit 28. horarum, fient 4. periodi febriles spatio trium dierum. Et si intervallum sit horarum 40. fient tres periodi diebus quinque. Non secùs ratiocinari possumus de intermediis intervallis. Quare falsum esse potest, quòd in continuis plures febres complicantur, vel potius id ipsum in nostra hypothèsi salvari posse videtur. Si enim verum est id, quod aliqui Medici se observasse aiunt, distingui febres complicatas, nedum quoad tempora accensionum,

sed etiam quoad symptomatum varietatem. Tunc considero, quòd, sicut videmus, ab apostemate extremi pedis febrem excitari, sic etiam fieri potest, ut in duabus glandulis insignibus hant duæ distinctæ obstructions, quæ diversis temporibus extremum gradum turgentis & fermentationis acquirant, & ideo diversis temporibus nervos & cor irriterit. Et sic salvari posse videtur, quòd duo paroxysmi habeant duas mineras, seu locos, qui diversis temporibus fermententur & accendantur.

Propos. XIII. De aliarum exandescensiarum, & symptomaticarum febrium causis.

Præter periodicas febres dantur aliæ exandescensia, quas omnes ab eadem causa superius exposita produci posse ostendemus. Et primò animadversione digna est febris catarrhalis, quæ a frigore improviso produci solet, & multoties, si ob exercitium aut moram in loco calidiori sudor excitetur, ut superveniat aura frigidiuscula, tunc quoque aer communis, insensibiliter refrigeratus, catarrhum excitat. Pro expositione causæ & modi productionis ejus supponendum est, nedum in externa nostra facie, collo & buccis adesse insignes & innumeras glandulas; sed etiam universam cutem totius corporis abundare exiguis glandulis, cum suis propaginibus nervorum & tubulis sudorificis, ut Clariss. Malpighius & alii recentiores Anatomici observarunt. Ergo à frigore superveniente, vel ab aura frigidiuscula, aut a vento necesse est ut impediatur effluviū, quòd ex canalibus excretoriis glandularum sudorificis, & transpirationi insensibili destinatis, continuo egreditur, non secùs ac fluxus aquæ ex virgulis fonticulorum impeditur a venti contraria percussione. Quare succi & particule, quæ a fonticulis cutis exilire debuerant, inde coercentur, aut sistuntur; & ideo cohiberi & fixari coguntur: ex qua mora & fixatione obstructio pororum subsequitur. Porro facta tali obstructione, reliqui succi nervi & sudorifici, seu urinosi, in motu ad egrediendum positi, cohibentur, impediturque ulterior eorum egressus: & ideo, in glandulis coacervati, eas turgidas reddunt, ut patet in tonsillis inflatis; deinceps retrocedendo intra nervulos, eosque obstruendo, oportet, ut fermententur, & ideo mordicatis nervis communicari irritatio cerebro deinceps & cordi potest; unde pulus celer, & caliditas febrilis oriri potest, ut prius dictum est. Veritas huius Theoriæ melius confirmabitur ex curatione catarrhi, ut inferius dicemus.

Adest præterea alia perniciosissima ægritudo, quæ vulgò vocari solet febris latens & proditoria, in qua licet pulsus bonus sit, & urina laudabilis, nihilominus æger moritur. Hanc profecto ægritudinem febrem esse negarem, sed potius passionem similem ei, quæ a venenis producit, quæ absque febre necem afferunt; propterea quòd spiritum, vel succum nervæum tanta celeritate conturbant, alterant & fixant, ut prius vires consternant & interimant, quàm agitationem febrilem excitare possint. Quod verò in hisce malignis ægritudinibus,

& in venenatis, nervei succi sunt malè affecti, & sanguis non sic coagulatus (ut aliqui somnauerunt) patet experimentis, à nobis factis in Academia experimentalis Medicea in animalibus necatis à morfu viperæ, vel ab oleo tabaci, in quibus sanguis semper fluidus & non coagulatus adeò repertus est, ut animalia illa veneno necata, ab aliquibus comella, nullam noxam eis attulerint. Similiter in cadaveribus necatorum à malignis morbis sanguis quoque fluidus, & similis communi sanguini passim reperitur. E contra insigni læsione affici succum nerveum patet ex torpore, lethargo, paralyti, & convulsionibus, delirio, & abscessibus in encephalo.

Sequitur febris illa, quæ hæctica vocari solet, quæ non est periodica, sed lenta exandescens perpetuò vigens; solet tamen post cibum, vigorem & fervorem resumere majorem, quia novus chylus in stomacho, pyloro & intestinis inhectur salibus acidis, & deinde inmixtus salibus lixivialibus, quibus eorum glandulæ mesenterii abundant, fervorem & ebullitionem quandam excitare possunt (prout eorundem Natura exigit) à qua cor mediocriter nervis mordicatum commotionem, ardoremque febrilem excitare potest.

Connumerari hic quoque possunt exandescens podagrica, & aliz symptomatice, de quibus superius egimus, ostendimusque, omnes ab eadem causa immediate produci, nempe ab irritatione cordis, facta à succis nerveis acerbis.

Propos. XIV. Quomodo febris omnino extinguatur, cureturque, ut animal ad naturalem statum restituatur.

Quia remissio paroxysmi in intermittentibus est curatio quædam ad tempus; & causa, quare renovatur, est nova fermentatio, orta ex reliquis fermenti latentis in glandulis; manifeste deducitur, quod integra & absoluta curatio febris non prius continget, quam omnino fermentum febrile tollatur, elimineturque. Quomodo autem hoc consequi possit, non est supervacaneum indicare aliquo exemplo, quod est illud, quo familiaris febris catarrhalis curatur. Quia in hac febre cor, vehementer agitatam, magno impetu sanguinem per arterias impellit; ergo vi impetus, quo sanguis excurret, poterit abstergere glutinosa obturamenta in nervulis & valis excretoris glandularum totius corporis. & præcipue prope cerebrum existentium, ubi læsio principaliter residet. Porro ablatis obturamentis & sudorificis, & ab amplis salivalibus canalibus in regione faucium, narium, oris & pectoris, expurgari possunt succi nervei alterati & fermentati, ejectis nimirum impuritatibus, aut contemperatis: sales enim intra venas magna ex parte amandari, & hinc per urinas excerni solent; & reliqua saliva per vasa sudorifica, & per salivationem emittuntur. Hoc igitur modo, vel etiam contemperatis succis nerveis, ut naturalem suam dulcedinem acquirant similem ei, quam habet cerebrum, & medulla spinalis, tunc cessat omnino febris, & intemperies morbosa catarrhalis.

Hoc præclare confirmatur ab excretionibus,

quæ in fine morbi ejiciuntur; sunt enim dulcis & grati saporis, similis ei, qua cerebri substantia, vel spinalis medulla donatur, cum initio morbi acres, salæ & coctilæ excretiones essent.

Eodem planè modo febres reliquæ omnino curantur, cum nimirum vasa excretoria glandularum, intra viscera & in extrema cute existentium, deobstruantur, & fermentum, in glandulis existens, partim ejicitur per sudorem, aut transpirationem insensibilem, partim contemperatur, partim effunditur per venas, & hinc paulatim cum urinis expurgatur, aut contemperatur ab adveniente succo chyloso bene temperato.

Hinc deduci posse videtur, quod febres nunquam, aut raro curari queant ob copiosas humorum purgationes & ejectiones, cum fermentum febrile exiguum molis esse solet: quod evincitur ex curatione febrium, cum rigore advenientium à radice febrifuga, ab India nuper adjecta, quæ absque ulla ejectione, aut per aërum, aut per sudores, vel per urinas febrem tollit. Et ideo sufficit, ut pusillum illud fermentum aliquando extra nervos asportetur ejiciaturque, aut cum aliis humoribus misceatur confundaturque, aut ejus motus fermentativus stillatur, torpeat, aut commutetur. Quod evidenter suadet ex eo, quod pertinacissimus morbus quartanæ aliquando curatur à simplici opinione iræ, vehementis angoris, aut timoris, cujus ratio esse videtur, quia motus vehemens & concitatissimus spirituum, seu succorum nerveorum perturbare, sistere, & commutare potest motum fermentativum eorundem succorum, & sic introducto novo motu, febris omnino eliminari potest.

Hæc quidem febrium curatio, quæ ut plurimum spontaneo naturæ motu perfici solet, tamen artificio periti Medici, secundum artem operantis, adjuvari posse naturæ conatum, omnes uno ore fatentur. Verum remedia, quæ ab arte adhiberi solent, valde incerta & ambigua sunt, ut peritiores & doctiores Medici sincere fatentur: & licet eventus aliquando utrumque principiorum medicamentorum comprobare videatur, tamen casuale & fallacissimum est, quia ut plurimum febres sunt salutares, in quibus, siue Medicus bene & secundum artem, siue malè & perverse, siue nil omnino operetur, nihilominus ægri perfecte convalescunt. Ergo in hoc casu, cum operationes & medelæ diversæ, & inter se contrariæ, æquè juvamen asserere videantur, quoniam odo fundamenti tantopere fallacibus & vacillantibus inniti poterimus.

E contra aliquando febres sunt adeò pravæ, ut quolibet medicamenta adhibita aut non juvent, aut noceant; ex quibus deducitur, tutius esse, sine urgente necessitate ab omni medicamento artificiali abstinere.

Non is tamen sum, ut omnino Artem medicam, ut inutilem, aut noxiam damnam, & proscribere velim. Scio in tanta ambiguitate (dummodò præjudicia removeantur) bene posse diuturna & sagaci observatione quamplurima medicamenta certo comprobari, ita ut semper, aut frequentius juvent. Et hoc experientia quotidiana patet: his planè prudenter & debita cautione uti poterimus.

Verum, ut ad propositum redeam, intentio principalis Medici in cura febrium (ut ex dictis colligitur) esse debet, ut obstructions vasorum excretoriorum tollantur, & sales fermentantes contemperentur, adhibito cibo, & potu tenui & aquoso, eo quod salium separatio ab humoribus, & expulsio frustra speratur, cum sales, succis glandularum semel inhibiti, & incorporati, agre possint ab illis secerni & ejici. Videmus enim ab aqua marina non posse, nisi distillatione dissoluta aqua in vapores, sales separari, & non omnino: potius igitur prædicti sales contemperari & dulcorari possunt, vel admiscendo fluida menstrua appropriata, vel adhibendo salia contraria, ut experimur in aqua forti, quæ acredine salina vitrioli & aluminis componitur, est adeo valida, ut possit argentum corrodere, & dissolvere in ac. nos minutissimos; huic vero aquæ forti si addantur sales ammoniaci, multò magis acres, quam sint vitriolum & alumen, nedum vim majorem corrodendi non acquirit, sed e contra eam vim, quam habebat, amittit, adeo enim retunditur & debilitatur, ut nequeat amplius argentum corrodere. Similiter mixtura salis nitri & sulphuris accensibilis est, & addito sale ammoniaco, accendi nequit. Alibi postea sal prunellæ, ex eisdem nitro & sulphure combustis compositum, inflammationes tollit, & fusionem succorum coagulatorum promovet. Sed quoque, & pulvis cornu cervi & cancerorum, acredinem acidissimam retundunt, & tollunt; & id ipsum acetum distillatum plumbo affusum, dulcedinem saccharo similem acquirit. Ex his ergo, & ex aliis exemplis, quæ adduci possunt, constat, acredinem salinam fermenti febrilis retundi, dulcificari, & destrui omnino posse ab aliis salibus admistis contrariæ naturæ.

Postremo loco aliquid de usu Phlebotomiæ dicendum videtur, quam aliqui summo opere laudant, alii ut perniciosam vituperant. Hanc ego censeo parum juvare, & parum nocere posse: si enim tam proficua & laudabilis esset, proculdubio in majori proportionem ægri convalescerent in Gallia & Hispania, ubi ab omnibus febricitantibus sanguis educitur, quam in Italia & in aliis locis, ubi nunquam sanguis emittitur. E contra, si tam noxia esset, in majori proportionem ægri in Hispania & Gallia interirent, quam in Italia. Cum igitur neutrum verum sit, sciendum est, neque noxam, neque juvamen notatu dignum asserre.

Præterea, quod Phlebotomia vires non prosternat, educendo spiritus & balsamum vitale, constat experientia in hæmorrhagiis, & liberalibus sanguinis effusionibus in sanis & ægris, in quibus vires non prosternuntur, nisi exangue ferè corpus remaneat.

Experimenta postea, quibus usus Phlebotomiæ, vel non usus comprobatur ab aliquibus, nil probare posse videntur; propterea quod verificantur in febribus salutaribus. in quibus levis errata nil nocent: sed eo ipso, quod educitio & non educitio sanguinis adversantur sibi ipsis, & utramque proficuum experiri, manifestè indicant, fallaces esse, & in eis locum habere paralogismum, quod ex non causa ut causa appellatur.

Negari tamen non potest, aliquando Phle-

botomiam juvare, aliquando verò noxam asserre: in aliquibus verò epidemiis omnes ægri, in quibus sanguis eductus est, intereunt: e contra in aliis constitutionibus Phlebotomia proficua & salutaris sunt. Quare dari possunt casus, in quibus noceant, & in quibus proficua sint: si hoc enim verum non esset, non temper, vel non ut plurimum verificaretur.

Causa verò, quare aliquando Phlebotomia juvare potest, fortan est, quia in fine cujuslibet paroxysmi succi acres & maligni e nervulis glandularum intra venas effunduntur, a quibus massa sanguinea contaminatur, nec omnino per renes expurgari potest: quare per Phlebotomiam ejiciatur cum sanguine succi illi acres, & hi, qui in sanguine remanent, contemperari possunt a chylo superveniente, a quo faciliè & citò sanguis reficitur & renovatur.

Licet igitur sanguis alteratus non sit causa prima & immediata febris, non tamen puto nullam noxam asserre: potest enim multis modis animalis œconomiam perturbare; & ideo reductio ad bonam habitudinem & temperiem curationem valde promovere potest.

Aliquando Phlebotomia utilis esse potest, quia, alterato consueto sanguinis motu, contingit, ut in cerebrum & nervos novus motus introducat; & ideo fermentativa & morbosa agitatio perturbari, & in melius commutari potest. Hoc quidem confirmari potest ex eo, quod multoties hæmorrhagia sistitur per educationem sanguinis in vena secta. Similiter tussis asthmatica suffocativa, vel Epilepsia per Phlebotomiam medicatur.

Alteratio verò motus, qui in sanguine ob Phlebotomiam fieri potest, est acceleratio motus ejus in arteriis, & retardatio ejusdem in venis. Quia, dum sanguis egreditur e vena secta, non impeditur adventus & excursus sanguinis in arteria contigua, & ideo celerius excurrere poterit: eo quod antea ipsamet copia, per vias obstructas tardo motu migrando, impendebat vetabaturque exitum advenienti sanguini. E contra, toto tempore, quo sanguis effluit ab incisa vena a vulnere ad proximum truncum Cavæ, non subministratur sanguis; & ideo nedum ob copiam diminutam, sed etiam, quia non urgetur, ut prius, reliquus sanguis Cavæ tardius & minori impetu ad cordis dextrum ventriculum perducitur. Ex hac, inquam, alteratione motus sanguinis consequi potest in ipso cerebro, & nervis aliqua perturbatio, cum a qualibet minima motuuncula spiritus, seu succi nervi affici & vellicari possint, & novo rhythmo commoveri queant.

Porro prædicta perturbatio motus spirituum, non est necesse, ut in motionem ordinatam, naturali salutiferoque statui conformem, desinat, cum multoties possit in deterius commutari, & sic aliquando sanguinis missio adeo noxia esse potest, ut necem asserat.

Non secus medicamenta, purgantia per alvum & per vomitum, possunt aliquando juvare; aliquando nocere: attamen ex vi rationum vulgaris scholæ certè nunquam juvabunt, quia humores copiosi & pravi non sunt cause februm, sed potius exiguum fermentum in nervis e glandulis communicatum. Hoc autem non video, quomodo Catharticis remediis excerni possit,

possit, quia putare, quod pharmacum vi quadam electiva & attractiva, veluti magnetica ex confusa massa humorum secernat, colligat, & asportet succos aliquos, relictis aliis omnibus salutaribus, videtur somnio simile. Potius dicendum, quod Cathartica acredine & venetica vi, qua pollent, agunt mordicando, exprimunt succos, in vasis excretoriis glandularum, atque in vasis sanguineis contentos, eosque intra intestinorum cavitatem effundunt: eodem prope modo modo, quo Piper, & quælibet salia corrosiva, lingux & faucibus obvoluta, copiosissimam salivam excernunt. Hinc inferre licet, quod in prædictis purgationibus expelluntur humores omnes, in prædictis vasis existentes, sive boni & utiles, sive pravi sint; & hoc nomine utilis & noxia esse potest talis expurgatio.

Verum tamen est, quod ex vehementissima commotione, quam afferunt Cathartica, potest motus fermentativus febrilis adeo alterari, ut in melius, aut in deterius commutetur, & sic casu pharmacum aliquando proficuum, aut noxium esse potest. Nihilominus in periculosissimis ægitudinibus expedit potius aleam dubiam, & periculosam tentare, quam certò interire.

Alio nomine Cathartica proficua esse possunt quia venetica vis salina eorum contendere, contemperare & dulcificare potest salia fermenti febrilis, (ut ex superius dictis colligitur) non secus venenositas Cantharidum in vesicantibus eadem ratione aliquando proficua esse potest: sed hæc omnia non carent incertitudine; imò multoties fieri potest, ut valde noxia sint.

Verum si hæc, quam exposuimus febrium Theoriam, falsa & erronea non est, scilicet, si non valde à janua aberravimus, non diffitemur, quod progressu temporis certiora aliqua febrium medicamenta reperiantur ab eruditis & sagacioribus Medicis.

Hælenus Clarissimus Borellius.

Nos priusquam in hacce disputationum super febrium causis perplexitate, quid sentimus pronunciemus, duas rursus expendamus opiniones, primam quidem Francisci De-le-Boë Sylvii, alteram vero Michaelis Ettmülleri. Ille tum à bile, tum à lymphâ, tum à succo pancreatico, tum à saliva, sive se junctim, sive simul vitiatis, adeoque varie, inter sibi invicem occurrendum, fermentescentibus, febres omnes, earumque symptomata ingeniose satis deducit. Hic, cum Helmontio maxima in nobis acido tribuens, ejus energiz, tum per spirituum alterationem cor irritanti, tum per sui cum aliis succis fermentationem, in cordis ventriculis turgescientiam facienti, tum aliàs etiam in variis partibus operanti, quicquid febrium est accenset. Verum præterquam quod fermentatio omnis in superioribus satis superque explosa est, illique propterea in systemate causatum febrilium condendò minus imitandum, quis non videt celeberrimum Sylvium dum Triumviratus sui partibus nimium studet. sæpius hallucinari; quippe à novo hoc, ut sibi videtur, invento, quasi alia Pandora pixide, omnes corporis humani morbos, tantum non pedum clavos, eruit. At quid hæc immoramur? quando-

quidem satis superque ab aliis viris cordatis qualitates ab hoc Autore, tum pituitæ intestinali à saliva vorata præcipue efformata, tum succo pancreatico ipsi ut & Discipulo suo Græcæ pro morbo salutato, tum bili, tum lymphæ, assignata, jam excussa fuere, ruinolique factum ædificium, quantacumque cum arte condecoratum, ipsis superextractum. Ettmüllerum quod attinet, dum acido & alcali totus attentus est, (quorum tamen insufficientia pro principiorum seu elementorum corporum naturalium, munere gerendo, non tantum probata est, sed etiam ulterius demonstratum, nec ab alterutro, nec ab utroque solis morbos solidè deduci) ex illo quasi malo genio quicquid malorum est effert, dum ab hoc è contra quasi bono genio remedia apta exquirat. At præterquam quod acidum & alcali pura, etiam de patronorum suorum sententia non reperiuntur, unde Clariss. Otto Tackenius tam anxie alcali aliquod vacuum, hoc est particulis acidis non imprægnatum, quasi hactenus sibi non visum, consecratur. Illustrissimus Philosophus Robertus Boyle acidum cum acido, alcalique cum alcali hostiliter agere probat, ac proinde signum solum pathognomicum ea interstinguens, & in hac lucta positum diruit, unde constare potest illa esse mera entis rationis per mentis abstractionem à Chymicis quibusdam recentioribus excogitata, nec ullibi in rerum natura versantia. In tanta opinionum varietate & confusione jam ut quid verosimillimum nobis videtur declaremus, non dubitamus ad sententiam Clar. Borellii accedere, quæ etiam ex parte cum Franc. Piens placitis convenit, nam uterque cordis irritationi motuum febrilium causam adjudicat, sed hic à sanguine eam deducit, dum ille à nervis & succo nerveo ipsam derivat; non opus est hic prædicti Franc. Piens hypothesim de irritationis memoratæ causis unpugnemus, quandoquidem illud jam à præclarissimo Borellio in propria sententiæ explicatione & confirmatione confectum est. Succum nerveum quod spectat, quantumvis eum eliminasse sibi persuadeat Clarissimus Piens ut & alii multi, ad ligaturas & nervorum præcisiones, quæ sine tumefactione & stillicidio peraguntur, in negationis suæ probationem recurrentes, non minus tamen ille alextores suos & protectores impotenter habebit; atque etiam si non ita constaret de ipsius existentia, quis demum inficias ibit particulas acres per nervorum fibrulas tubulatas insinuari posse, quæ eadem vi qua convulsiones in artubus tam vehementes sæpe excitant, corpus cordis musculare, fibrasque articularum motrices varie exagitant, contrahant & contorqueant, unde præter horrores universales choream in febribus continuis, ut & in intermittentiis paroxysmis ut plurimum ducentes, aliaque itidem symptomata magis ordinaria & à Clarissimo Borellio memorata, febres illæ proficiscuntur anomalæ, quæ cum pulsus debilitate, sanguinis retardato, & quasi represso motu, indeque nato algore continuo, vel per paroxysmorum intervalla tantum recurrente, motus suos perficiunt, de quibus omnibus quædam supra diximus ubi de febris definitione verba fecimus. Focum istius acrimoniæ quod spectat, illum Borellius in glandulis me-

Enterii ponit, indeque à nervis quasi exsugari arbitratur, nec multum ab hoc abluerebatur Fernelius, dum febrium, interque eas præcipue intermittentium, sedem in mesenterio constituens, partem illam pro Medicorum culina habebat; in uno revera differunt Viri Celeberrimi, quod famosissimus Fernelius vias per nervos nequidem subodoratus, quicquid morborum est mesenterio subrepere paratum erat per venas devehebat in sanguinis massam, at vero Borellius nervis ut jam diximus totum hoc munus tribuens, eos viti in glandulis memoratis aggesti infaultos vectores facit, de quibus omnibus nullatenus opus est hic repetamus quæ jam ab Illustrissimo Viro abunde satis enarrata in superioribus vidimus. Clariss. Gulielmus Cole elaboratissimo ac ingeniosissimo suo de Febribus intermittentibus Tractatu omnino cum nostro consentit Borellio, dum per nervos causam earundem derivat; verum in eo differt, tum quod non e glandulis mesentericis materiam febrilem à nervis hauriri, sed potius à glandulis totum cerebri corticem conficientibus, reputet; tum etiam quod febres tantum intermittentes istos agnoscere natales, continuas vero nullatenus affirmer. Nobis sanè quandoquidem obscurum admodum hactenus est, quales denum sint motus, ac etiam, ut innuit ipse Borellius, circulationes succi nervei, seu, quod aliis magis arridet, liquoris subtilis spiritus animales in varia sua officia vehentis, non etiam ita patulum est quis demum sit verus focus morborum quorum materia per ipsos in corpus propagatur, aut qualiter ab iisdem exsugatur, ac itaque non multum disceptabimus an in mesenterio, an in cerebro ipso, an in aliis etiam corporis glandulis, aut ipso spinalis medullæ tractu febrilis aggeratur fomes. Sed in eo quod magis clarum videtur subsistemus, rationibus scilicet à Borellio allatis, quibus abunde satis evincitur penes nervos omnino reperiri quicquid tragici, ac tumultuarii motus in febribus excitatur. Minus præterea anxie exquiremus differentiam causarum quæ febres aut continuas, aut intermittentes faciat, probabile tamen satis videtur eandem prope materiam tot insidias quantumcumque inter se primò intuitu diversas nobis struere, cujus scilicet, tum varii acrimoniæ gradus, tum varii motus, tum etiam succorum in toto corpore aggestorum (quibuscum admitta turbas movet) varia indoles, tum ab alimentis, tum ab ipsa aëris in variis tempestatibus, varia etiam constitutione dependens: operationes variant. In succo enim nerveo non ita mordicus hæremus dum de febrium causis agimus quin itidem aliorum succorum in toto corpore, ut jam diximus, reperibilium miscelam agnoscamus, de quo sobrie ac verbò tantum dixisse sufficiat, dum ad ea quæ praxim spectant præcipue attendimus. Hic continuo adderemus quædam ex Præclarissimo Richardo Morton qui tractatum de Febribus novissimè conscripsit, verum cum commodius forsitan fuerit ea ipsius Autoris Curationi annexa perlegere, illuc Lectorem remittimus, scilicet ad Curationes jam jam è variis tradendas, ubi quid hac in parte afferat Illustrissimus Vir propriis ipsius verbis explicabimus.

De Signis tum diagnosticis, tum prognosticis vi-

deri possunt quæ suprà è Clariss. Bellini in febrium differentis; Curationem vero generaleni quod attinet illam jam propriis Clar. Francisci Piens verbis explicabimus. Sic autem ille.

Cum verò omnis Medicinæ ratio in eo consistat, ut Hominem in totum a morbo vindicet, morborumque vehementiam obtundat, Hipp. in lib. de Arte; adeoque non tantum sanitati integre tuendæ occupetur, verum etiam vacillanti suffulciendæ, ac collapsæ instaurandæ; per magni interest, ut juxta Nominis, Definitionis, Subjecti, Differentiarum, causarumque ac Signorum constitutionem, quæ jam sunt tractata, etiam Febrium Indicationes curativas internoscantur, ut, ordiendo ab iis, quæ sunt ad finem, hoc est, à Nobis notis: progrediendo ad finem ipsum, qui est Natura notus, quoquo modo utilitas hujus Tractatus promoveatur. Verè itaque & bene.

Omne tulus punctum qui miscuit utile dulci.

Notandum verò in genere; omne, quod p. n. est, remotionem sui indicare, uti Gal. habet lib. 8. meth. Med. cap. 1. Hinc febrem, utpote affectum ex cordis irritatione p. n. ortum: remotionem sui quoque postulare Hippis, & tonsoribus notum est, idcirco Medicorum auxilia implorat, illaque Medici est consulere. Si febris autem ex simplici effervescencia, ac fermentatione leni originem habeat, ad morbum conventionem respiciendum in curatione, adhibitis imprimis refrigerantibus, ac secundario (si siccitas adsit) humectantibus; Gal. lib. 9. meth. Med. cap. 14. Omnis febris, inquit, quæ febris; humectatio, refrigeratioque remedia sunt. Hipp. etiam lib. 1. Aphor. 16. Quod si ex fermentatione febris ortum ducat, ad causam potius cura dirigenda est, & vel fermentum dispellendum, atque evacuandum; demonstravi enim calorem non esse febrium genus, nec essentiam; sed merum effectum ipsas consequentem, separabilemque ab iis, ac per intervalla ipsas auriorem; ideo ad illum indicatio non est adhibenda. In febribus verò malignis, morbificæ causæ præcipue obstandum, ac tam alexipharmacis, quam discutientibus utendum.

Hæc vero curatio absolvitur duobus modis; vel Empiricè; vel dogmaticè: Medicina Empirica, (cujus Auctor fuit Acon Agrippinus: qui neglectis rationibus, posthabitaque causâ, & naturarum investigatione, atque Anatome, experimentis utebatur, & in incognitis morbis ad similes affectus, & similia remedia confugebat) ab Agyrtis, Circumforaneis, ac mulierculis petita, pluris apud vulgum æstimatur, imò haud raro plus ethicit, quam quæ juxta exactam medendi methodum adhibetur. Floruit hæc secta potissimum apud Ægyptios, apud quos (ut ait Herodotus) singuli morbi singulos ferè Medicos habebant: Antiquior etiam ille erat Hippocrate: Scripsit Athenis linguâ Doricâ de Medicinâ librum unum. Remedia Empirica, quibus febres curantur, paroxysmum ingnentem sine aliquâ evacuatione arcunt: Earque vel intus adhibentur, uti succus plantaginis, atque Rosar. rubrar. Alumen, &c. Quatenus sanguineas particulas fermentativas figunt, constringunt atque arcunt, undè accessionem febrilem impediunt: Cujus rei ratio; cum sanguineæ particule in qualibet parte à motu fer-

men-

mentativo præpediantur, in cæteris impetuosius tumultuantur, adeoque a perturbatione isthac in toto sanguine concitata, liquoris ejus effervescencia spontanea, ac fermentatio disproportionata, paulo post sequutura inluberur: Vel exterius applicantur, uti regioni cordis, carpis manuum aut plantis pedum: hæc etiam quandoque adeo prodesse vulgo notum est, ut quidam sub mulctæ cujusdam poma, per ista remedia febris curationem polliceantur; cujus rei ratio eadem ac præcedens, scilicet quod sanguinearum particularum cum febrili materia effervescencia aut fermentatio inhibeat, quippe a medicamento vasis alligato particulæ quædam spirituosæ, sive effluvia sanguineis particulis valde ligunt, ac costringunt, aut fundendo & agitando velut præcipitant, atque ita febrilem fermentationem impediunt. Progreßu autem temporis homines experientia allaborant addere rationem, & sic paulatim ante Hippocratem, apud Cnidios, Rhodios, & Coos, nova secta subnasci cæpit, qua primò quidem dicta fuit.

Dogmatica, seu Rationalis, & jam verò ob admixtionem aliarum sectarum Dogmatico-hermetica appellatur; seu Dogmatico-spagirica: Veterum enim Medicinam maximam partem retinemus, sed auctam spagiricorum fundamentis, elegantioribusque medicamentorum præparationibus, utilia seligentes, noxiaque & quæ absurdè tradita rejicientes.

Hujus Dogmatis auxilia duplicis generis à me itatuntur: vel *Natura*, vel *Ars* (quæ Artis, & Naturæ instrumenta superant, ad Medicinam non pertinent) Illa Crisium auctor: hæc tam per *Venæsectionem*, quam per *pharmaca* alterat, evacuat & roborat: vel ut aliis placet per Chirurgiam, pharmaciam, ac dietam. Quidam tamen Medici ac Doctores Chymici neque in sanguinis abundantia venam secandam, neque in cachexia purgandum esse dicunt, sed eo respiciendum, quo fermentatio particularum sanguinis sedetur, archeus consopitur, & vitalis balsamus conservetur. Principio huic olim legitur *Asclepiades*, qui floruit ætate Pompei Magni, orandi Magister, nec satis in ea arte quaestuosus, qui ob id magni habitus, quod vim naturæ minime inferret, solum dieta, balneo, inunctione & frictione contentus. Multo tamen operosior hoc seculo *Helmontius*, qui totus in id occupatur, quo medicamentis & auxiliis Archei furorem mitigantibus, universam medendi rationem absolvat, irridens Galenicus, qui tot millia hominum purgantium usu, & sanguinis missione Charonti offerant. Quasi verò hisce solum absolveretur Medicina; neque amplius de *V.S.* esset cogitandum, de Sudoribus, de Purgationibus, per quæ generosa remedia ipsa natura sponte & citra Artis opem, magnos & periculosos morbos sanat. Imò *Democritus*, teste *Plutarcho*, *Helmontium*, *Asclepiadem*, & nos doceat, Animalium nos summis in rebus esse discipulos. Camis enim ab aliquo nunquam institutus laxat quidem stomachum esu cujusdam graminis. Ibis, avis illa Ægyptiaca, rostrum tanquam *clysterem* in alvum inferans, haustum liquorem injicit, ut refert *Galenus*, item *Plinius*, rostri aduncitate, *inquiens*, per eam partem se

perluens, quæ reddi ciborum onera maximè salubre est. Atque *Ovidius*:

De quibus exigua est vulncri devota labello

Corpora projecta, qua sua purgat aqua.

Unde etiam *Phile*:

Obstructionem autem ipsa (Ibis sc.) solvit calidè.

Gerisq; Clysteri vicem oris aduncitæ,

Quo ventris infundens cavo salsuginem,

Excreciones humidas ani ciet.

2. in *Naturam*, quæ in morbis acutis & præcipitibus per hæmorrhagiam: hæmorrhoides, fluxum mensium, per diarrhæam, quoqu岸 impetu se relevat. 3. in *se ipsos* hoc ipso sunt injuri, cum id idem expediunt contraria sua methodo, quod ordinaria illa facere consuevit: nam cum fermentationem anodynæ inhibeamus peccantium particularum, nonne id etiam facit purgatio, nonne eandem auferit *V.S.* 4. nisi præstarent, accessiones febriles extemplo non tollerentur, uti ex praxi quotidiana cuique notum est, purgantia sub initium paroxysmi exhibita, febrilem insultum protinus coercuisse. 5. neque illa Empiricorum curatio, cum, ingruentibus Arthriticis doloribus, partem affectam profunde ita incant, & *V.S.* frequentius institunt, de nihilo est. 6. cum vero ajunt, præcipitantibus commodius hoc posse expediri, æquis nescit purgantia optima esse præcipitantia, neque tantum præcipitantia quantum simul expellentia: Ut taceam quod præcipitantia adhibere in magnâ humorum fermentatione disproportionata, uti in febribus ardentibus multo sit deterius ipsa purgatione & *V.S.* 7. si hoc non sufficiet, vel satisfaciet illis, subsumimus ex Hippocratis mente *lib. 1. Aphor. 6. Ad extremos morbos extrema exquisita remedia optima*: Sed *V.S.* & Purgatio sunt extrema remedia. Ergo.

Cum itaque *Asclepiades*, *Chrisippus Cnidius*, *Erasistratus* & *Aristogenes* Medicus, necnon *Helmontius* in nullo morbo venam secabant, uti dictum; Alii e contrario tam audaces erant, ut nullo denum in morbo ab ea abstinere, quos *Galenus* summâ cum ratione rejicit; est enim *V.S.* tempestive & cum ratione administrata multorum affectuum præfens remedium, eadem in multis aliis morbis summe nociva.

Queritur tamen, an *V.S.* sit adhibenda in omnibus febribus fermentativis? *Galenus* docet *lib. 11. Meth. Med. cap. 15. Saluberrimum est in omnibus febribus, quas putrescens (potius fermentalis) humor concitat, non continuo modo, verum etiam reliquis, venam incidere*. Sed addit: ubi nec atas nec vires prohibent: *Lavatâ scilicet quæ corpus nostrum regit, Naturâ, exonerataque eo, quo uti sarcinâ premitur, haud agere, quod reliquum est, vincet*: itaque proprii muneris haud oblita, & coquat, (hoc est digeret & separabit) quod concoqui est habile; & excernet, quod potest excerni. Deinde, ut fermentationis impetus utcumque sistatur, Venæsectione opus est; sanguis enim velut vinum fermentatione turgens, aperto vase, subsidit: Licet autem in Venæsectione non parum utilium spirituum cum sanguine effluat, & expiret, hi tamen ipsi detenti fermentationem, ac effervescenciam intenderent, æstumque auferent: ac remittente fermentatione immodica, ipsa Natura meliori conatu mox damnum compensat.

Vena

Vena itaque si sit secunda in febribus, ea in principio heri debet juxta Hippocrat. *lib. 11. Aphor. 29. Incipientibus morbis, si quid movendum videatur, move: Vigentibus autem quiescere multo præstat.* Ac eo quidem citius, quò morbus velocius ad augmentum contendit. In reliquis verò præparatio humorum disproportionatorum, extra vasa consistentium, ac fermentum suggerentium, necnon evacuatio aliqua eorundem, Venæsectioni præmittenda est. Plura de hac re, qui deliderat, legat Auger. *lib. 5. de curat. per sang. mission.* Sylvaticum *Controvers. 40. Cons. problem. Med. Decad. 1. quæst. 3.* Itemque *Tom. 1. Disp. 18. Coron. de Venæsect. quæst. 12. pag. 335.* Dom. Sennertum *Tract. de feb.* Jacob. Primeros. *lib. de feb.* De cucurbitulis, scarificationibus, &c. Postea in specie; hic tantum in genere de evacuatione pauca dicenda.

Pharmaciam quod attinet, antequàm de eâ agamus, de coctione aliquid dicendum. Est illa principaliter Naturæ opus, in qua, cùm alicubi Galenus ait, Medicus spectatorem agit: Quo tempore nihil temerè movere expedit, estque hujus operis index clarissimus ille Naturæ motus, qui crisis vocatur, prius non appaens, quàm causæ morbificæ in meliorem statum mutatio præcellerit.

Querenti itaque, utrùm coctionem ejusmodi Medicus accelerare teneatur? Resp. ex Hippocrate, nonnisi virium robur conservando per similia non contraria, aut protinus quiescere: Methodum hujus conservationis *lib. 1. & 11. Aphor. tum lib. de villis rat. in acutis* annotatum invenimus. Sed pergendum est & ad expulsionem materiæ peccantis, quæ opus non solius semper Naturæ, sed etiam Artis, seu Medici. Naturæ, ut in crisi *καταρρέουσι αυτοματῶς* liberati ultrò aut sponte: prout loquitur Hippocr. *lib. de veter. medicin.* Medici, *ὅτι φάρμακον* à pharmaco, quod de purgante intelligendum, vox præcedens *καταρρέουσι* innuit. De hisce vocibus lege sic *imagis*: Dietericinas in *Jureo Hippocratico.*

Cùm verò Purgatio duplicem habeat apud Hippocratem, & Dogmaticos significationem: Primò significat, humorum, qui suâ quantitate, qualitate aut motu molestant, evacuationem, sive naturâ, sive arte factam, per quamcunque regionem, e. gr. vomitum, sudorem, urinam, nares, tussim, alvum, uterum; Secundo solam disproportionati humoris evacuationem per alvum tantum, ope medicamenti factam notat: Prior significatio habetur, *com. 4. in 6. de morb. vulg.* Posterior in eo Aphorismo: *qui bene corpore habent, difficulter ferunt purgationes.*

Aloisius Mundella Vir sane alioquin de re medicâ optimè meritis purgationes (uti fert *Valeriolæ in loc. comm. lib. 3. cap. 16.*) in febribus acutisque morbis ita explodit, averfatur, damnat, ut vox locum in medendo illis relinquat *Epist. namque, 10. lib. Epist. Medicinal* rursusque, *Epist. 22.* ita solventium medicamentorum in febribus usum contemnit, ut priori Epistolâ affirmate non vereatur, nullam à Galeno *lib. 11. Meth. Med.* de solventibus Pharmacis mentionem esse factam; altera autem Epistola ita medicamentorum solventium noxas exaggerat, omittis, quas præstant utilitatibus. De hac sententiâ quoque *Helmontius* fuit.

Contra quam & summorum Medicinæ principum virorum Hippocratis puta, Galeni, Pauli, Aëtii, Abvalibn-rsini, &c. Inconculsa, & Medicinæ auctorum omni in concors assensio, ipsaque experientia fides attestari, comprobareque firmissimo testimonio videntur. Galenus *lib. 11. Meth. Med. cap. 10.* quoque dicit, quæ obituunt, deterfa, dissectaque, per alvum, urinas ac sudorem ea evacuari tentandum. Idem etiam eodem *lib.* de quo *Aloisius* mentionem facit. Hic igitur expressis verbis in utroque loco Galen. purgationes in febribus adhibet. *Helmontius* verò Soli obloquitur: Plurimum hic purgantibus pharmacis loci est: Illa enim febrium materiam expellunt. Et hoc est quod, relictâ alvo, crescant indispositæ, ac febriles particulæ, & hinc gliscant febres. Forfan *Helmontius*, ut *Asclepiades*, à C. Celso sublevari potest. Vomitus, inquit hic, *rejecit & recte, si eo homines vorandi facultatem molimur.* Paulo etiam longius processit. Idem purgationes quoque eodem volumine expulsi. Et sunt hæc perniciofa, si nimis valentibus medicamentis fiant. Sed hæc tamen submovenda esse, non est perpetuum, quia corporum temporumque ratio potest en facere necessaria, dum & modo & nonniscum opus est. Ita non ex toto res condemnanda est.

Queritur, an Purgatio in principio conveniat? nam Hippocrates *lib. 1. Aphor. 12.* inquit; Materia cocta purgatione est educenda, non cruda: coctio tantum fit in statu, cui succedit declinatio, in qua tantum videtur purgandum, etsi enim morbus solutus esse videatur, reliquæ tamen permanent, quæ solent facere recidivas: Cocta autem sunt purganda, quia materia sequax est, nec resistit medicamento purganti, dein naturæ motus sequendus, quæ primum coquit, separant, postea purgat: Ex hisce itaque negarunt esse unquam in principio purgandum. Quidam purgationem distinguunt in eradicativam & minorativam, quæ partem tantum materiæ morbificæ demit dicuntque minorativam in principio convenire posse, eradicativam autem tantum perfectâ coctione, & absolutâ. Sed in harum vacationum explicatione non satis consentiunt: Nam quidam omnino minorativam istam purgationem derident, aut si detur, negant tamen eam ante coctionem convenire. Alii demunt minorativam, quæ partem materiæ morbificæ subtrahit; eradicativam verò, quæ universum humorem: At si ita est, raro eâ purgatione utemur, etsi enim interdum quando humor paucus est, unico dato cathartico totus vacuari potest, tamen id raro contingit, cùm sæpius cogamur catharsin iterare, nec satis tutum sit talem purgationem, quæ præterquam, quod non semper succedit, corpus præterea in multa pericula præcipitat, aggredi. Sed quid de Epicrasi, quæ paulatim tantum humores concoquit, & expurgat, dicturus illi. Præterea purgatio instituitur in morbis ad eorum curationem, unde purgare tantum in declinatione, curato scilicet morbo, aut inutile est, aut saltem id non fit ad curationem, sed tantum ad præcaveudam recidivam, quæ a priori morbo distincta est. Demum per blanda & minorantia pharmaca, sed sæpius repetita universum humorem disproportionatum haud ratò expurgamus, uti Apozematis nostris in quatuor, vel plures doses institutis, & violentis pharmacis aut semel tantum,

aut minore dosi exhibitis partem saltē educimus, unde confundi possunt ista dux vacuationes, ut minorando, uti loquuntur, eradicamus, totumque humorem vacuamus.

Anter igitur istas purgandi rationes explicandas censeo, ut eradicativa illa sit, quæ particulas fermentativas disproportionatas totas educere, & expurgare apta est, sive in unica doli, sive pluribus exhibitis præstat, ut Rhabarbarum, Jalappa, Resina Jalappæ, Resina Scammonii, Hydrocatharticum Turqueti, Calomelanos Turqueti, quæ si sæpius, debitaque quantitate exhibeantur, omnes humores febriles purgare apta sunt; minorativa illa sit, quæ non humores febriles disproportionatos, sed & illos in primis viis latitantes educit, ita ut huiusmodi medicamentum naturâ suâ nunquam ipsum morbum curet, cum natura sua nullam morbi partem demat.

Sitque 1. conclusio; leniens medicamentum, seu minorans utiliter in morbi principi admitteratur, cum quia primam regionem expurgat, cujus impuritas morbum fovete potest, cum quia alias nec venasectione, nec aperientibus pharmacis tuto uti licet. 2. Conclusio: Medicus interdum regulariter operatur, interdum coactè. Regulariter non debet in principio purgare, quoniam humores crudi etli possint esse tenues & parati ad expulsionem, tamen non sunt à reliquis separati, virque non solent esse aperta. Coactè autem potest purgare in principio, quando particula fermentativa turgent. 3. Conclusio: non est semper expectanda perfecta concoctio ad purgandum, sed sufficit quælibetque, ideò licet in principio & augmento quando coctio incipit apparere, catharsin instituire; uti enim particula disproportionata coquantur, & sequestrantur per partes, ita & per partes evacuantur: Id maxime apparet in chronicis febribus & longis, ubi alternis purgare solent Medici, & præparantibus uti.

Vomitiones quoque mortalibus sunt, teste Plinio, in remedium excogitata: At eas Asclepiades condemnavit: sed haud ex toto, si Cæsum audiamus. Ejectum esse, inquit hic, ab Asclepiade vomitum in eo volumine, quod de Tuerndâ Sanitate composuit, video, neque reprehendo, si offensus eorum est consuetudine, qui quotidie ejicienda vorandi sitcultatem moliantur. Cæterum sua cuique natura sit cognita: Quidam ex facili vomunt: Nota habet, Seneca inquit, quisque sui corporis vitia, itaque alius vomitum laxat stomachum, alius interposito jejuno corpus exhaust & purgat. Multi jam satuti haud ægre, quicquid biberint, vomitu remittunt. Cuiusdam quoque stomachus musculosus & ad id valde aptus teste D.D. Bartholino contigit. Contra multi jam ebrii vomendo interiēre. Sane Hippocrates, in lib. de inter aff. tex. 47. vomitum conducere arbitratur. Mos olim fuit apud Aegyptios & Chaldaeos pro conservanda sanitate, quolibet mense vomitum cieri, uti referunt Diodorus Siculus ac Herodotus: quem morem laudat Hippocr. dum lib. de insom. scribit, salubre esse his in mense vomere, & 3. de diarr. humidiore, inquit, debent vomere ter, sicciore bis. Legitur etiam in Eccllesiastico cap. 31. de vomitu præceptum dignum prout: vers. 25. Et si coctus fueris in edendo vulturn, surge e medio & vomere: & refrigerabis te, & non adduces corpori tuo infirmitatē.

Cæterum, quæ Vomitus cieri, ea collegit D. Joh. Freitagius, item Clandius Deodatus, D. Joh. Walejum, Sennertus, aliique; uti sunt Syzomitivus Prævotii, Syr. Emeticus Gr. Horitii, Electuar. Diatar. vomitivum Fernellii, Tartarus Emeticus purgans, Elixir. Emeticum Vegetabile, Symp. Emeticus Zvelferi, Vomitorium Heurnii. Atque Benedicta Rulandi & Freitagii. Sed quod absque ullo quoque periculo a me in febribus aliique morbis in praxi usurpatur, est Sal Tartari Vitriolati.

Nec tantum per alvum & vomitum, sed per urinas & sudores corpus in febribus evacuo. Diuretica itaque, seu urinas moventia, quandoque cum fructu in febribus exhibentur, præsertim in intermittentibus, si natura eodem vergat, & nulla magna humoris quantitas & crassities obstat: Propinqua vero imprunis post alias evacuationes: ac temperatiora ex iis eligenda, quæ simul meatus aperiendi, febrilemque materiam attenuandi vim habent: uti Rad. feniculi, Apii, Petros. A. parag. Saxifrag. Silybr. Ononid. rubr. tinct. &c. Herb. Saxifrag. Herniar. Abrotan. Agrimon. sem. dauci. feniculi. Baccæ Juniperi. Lauri. Sal. Prunell. Spiritus Salis, Vitrioli, Sulphuris, Tartari. ol. junp. veri. Vide sis amplius Schroder. Sennert. Walejum. Heurnium aliosq.

Cum autem varia sint diuretica, non est promiscue quibuslibet utendum; nam si febris sit vehemens, febrilisque materia copiosa, benignioribus utendum, minulque calefacientibus, ne vehementioribus agitatus humor & ad angustos meatus deductus obstructions plurimas pariat: Leviora quoque sufficiunt, si natura jam eo inclinet. Quod si febris sit remissior, febrilis materia crassior, corpusque aliquando repurgatum, validioribus uti commodius poterimus.

Per Sudorem autem evacuari solet febrilis materia, quæ tenuis est serosa, & biliosa: Hæc Sudorifera in quibusvis febribus, circumspicito Medico, conveniunt ad fermentativarum particularum in massa sanguinea hærentium discussionem: In intermittentibus tamen ac periodicis continuis, tutius post humorum præparationem ac purgationem exhibentur; idque eo tempore commodissime, quo natura ipsa humores movere aggreditur, nempe vel horâ circiter ante paroxysmum, quo scilicet instanti exacerbationi præcipiatur febrilis materia, ac causa interceptatur; vel in paroxysmi fine, quò reliquæ fermenti, jam magis ad motum aptæ, dispellantur, & ejiciantur. Ubi vero crisis aliqua per vomitum, vel alvum, vel hæmorrhagiam initat, à Sudoriferis, ne operatio naturæ turbetur, tantisper superfedendum.

Sunt itaque sudorem moventia omnia acrida, & tenuium partium, quæ non peculiari facultate, sed summa humores extenuandi vi sudores concitant: Sed non tantum acrida, sed etiam quædam modicè calida, uti decoctum Chamæmill. Syr. S. Ambrosii. præterea quædam majori vi, ut Guajacum, Rad. Chynæ sed hæc raro in febribus solemus uti, nisi in chronicis, lentis, velut dicemus in specie: Communiter autem conveniunt Sales ex Card. Bened. Absinthio. Pimar. Scordio. Centaur. Minor. Tamaris. &c. Item Hydrodiaphoreticum Turqueti. C. C. PP. Diase. Rob. Sambuci Cortex Peruviana. Trochis. de Vip. Theriac. And. Mithrid. Sp. de Cor. Cer. &c.

Nunc

Nunc de *Acidaliæ, Thermis, & Guccis*, dicendum: *Reinerus Solinus* der prodit, nec *Græcos*, ut *Hippocratem*, *Aristotelem*, *Galenum*, *Asium*, *Oribasium*, nec *Arabes*, nec *Latinos*, nec denique recentiores auctores, ut *Michaelem Savonarolam*, *Barth. Viosum*, *Mengum Blanch.* *Hugolinum*, *Gentilem Tulgi*, naturam Calidorum fontium sat peritè exposuisse. *Hippocrat.* quidem *Thermas Meli* tantum commemorat: Unde *Prosper Martianus*: hic homo medicamentis omnibus incallum adhibitis ad *Thermales aquas*, ut a pruritu sanaretur, *Melum* petiit, quod *Hippocrat.* adeo manifestis verbis asseruit, ut non satis mirari possim *Valesium*, qui eas aquas dulces fuisse exultimavit: Quia si hæc *Balnea* aquæ dulcis ubique parari possunt, ad quid ivit in *Melum*, ubi sunt calidæ *Balnea*, uti *Hippocrat.* ait. Ex recentioribus *Bartholomeus Montagnana* septem *Balnea* optime exequitur, sicut *Balneum Aponense*, *S. Petri*, *Nova Domus*, *Montis Groti*, *S. Bartholomeæ*, *S. Helena*, *Montis Ortonis*. Plura enumerant *Vidui Vidui* & *Fallopini*. Consuli quoque possunt *Menghus Blanchellus*, *Jacobus de Dondis*, *Johan. Anon. Partheni*, *Ludovicus Pasinus*, *Johan. Francisc. Brancalio*, *Nicol. Massa*. De hisce *Thermis* naturâ vel arte factis apud *Horsium Sennertum* aliosque viros videri potest, utrum in febribus conducant necne: Curiosus enim eorum apparatus apud nos desit, vixq; unquam nisi in *Hecticis* eo utimur.

Dietam febrium quod attinet: Rectè scribit *Hippocr.* 1. *Aphor.* 1. non solum Medicum, sed & astantes, & ægrum officio suo fungi debere, alias remedia administrari commode nequeunt, si quæ rectè Medicus præscripsit, astantes aut intempestivè adhibent, aut inconsulto Medico aliquid circa ægrum moliantur, quod postea ipsi futurum est nocivum. Solent enim *Mulierculæ*, quæ ægrotantibus inserviunt, tam affines etiam, quàm amici ægrum invisentes, cibos obtrudere quam plurimos, & sæpius ad vires, uti ajunt, sustinendas. Victus verò ratio omnium maximè virium incolumitatem spectat, per accedens enim curationem. Consistit itaque in quantitate, qualitate, & utendi modo.

Quantitatem quod attinet. Notandum, ægrotos habere latitantes intus causas non orbificas, quæ igni naturæ ac viribus vim inferunt, cibis autem etsi sua natura conservare soleat, causas tamen febriles non debellat. Corpora impura, quo plurius, eo magis laedit. *Hipp.* 1. *Aphor.* 10. Quod observare debent omnes, qui dum ægris opem ferre gestiunt, in certam perniciem illos detrudunt: & live Medicus quippiam aut imperarit, aut prohibuerit ex arbitrio tamen faciunt, quicquid lubet. *Ventriculus* enim in febricitantibus languidior est, idcirco cibum probè non concoquit, sed potius ab humorum ob particulas febriles disproportionatorum copia & fermentatione corrumpitur, sicque febrili causæ fomentum præbet: Hinc *Hippocrat.* 7. *Aphor.* 65. Si quis cibum febricitanti dederit, ut sano robur, sic laboranti morbus. Febres vel sunt acutæ, vel acutissimæ, vel longiores: In acutissimis, quæ quatuor diebus judicantur tenuissimo victu utendum, quia habent brevissimum principium & augmentum, & mox ad statum properant, statim extremos habent labores, *Hipp.* Sed quæ minùs sunt acutæ, non aded ænueum victum pollutant, semper observando

ut juxta statum tenuior sit quàm in principio, quia natura tum humorum pepasmo intenta non debet revocari ad alimentum pepsin. In febribus porro vel materiam morbi spectamus vel vires: Materia cum concoqui & evacuari possulet, nullum cibum desiderat, viribus autem inedia, tenuisque victus nocet, eas enim atterit: Igitur semper vires spectandas esse docet *Abuljibn-Isma*; Item *Hipp.* 1. *Aphor.* 7. & 8. Item 1. *Aphor.* 9. *Galen.* Item observari debent *Regiones*, anni tempus, ætatem, & morbum, in quibus febris expedit, aut non, juxta *Aphor.* 11. & lib. 2. *Aphor.* 34.

Qualitatem quod attinet: Solent itaque *Mulierculæ* haud raro febricitantibus cibos varios, quos roborantes vocant, offerre, uti cerevisiam crassam cum nuce moscata, cinamomo decoctam, alioque, quos variis nominibus appellant: inò urgent sæpè ad solidos cibos capiendos; licet hæc omnia satis imprudenter. Et quidem 1. solidi cibi febricitantibus sunt valde importuni, cum à ventriculo concoqui probè non possint. At quæ sorbentur, facilius vincuntur, citius alunt; hinc sorbitionibus potius quàm cibis solidis alendos ægros suadet. *Hippocr.* variis in locis: Ejusmodi enim diætæ natura citius roboratur, nec revocatur a pugna quàm inivit cum morbo. Facilius est reficere potum quàm cibo. *Aphor.* 11. lib. 1. ubi per potum quicquid sorbendo sumitur, intelligit, uti interpretes advertunt, vide sis *Cor. Cellum* lib. 3 c. 6. *Galenum* 1. *comm.* lib. 1. *Aphor.* 16.

Vivendi modum quod attinet: Solent namque *Mulierculæ* cibos febricitantibus offerre, quando minime oportet. Ubi sciendum, in februm accessionibus à cibo prorsus abstinendum, juxta *Hippocr.* *Aphor.* 11. lib. 1. & 19. ejusdem libri: Quà in re hoc nostro tempore non parum peccatur, in quo plurima pars indiscriminatim alant ægros, nulla observatâ temporum ratione. Natura enim dum in accessione adversus morbum decertat, conficiendo alimento minus intenta est, quo fit ut ille incokus febrem ejusque symptomata augeat: Quæ autem damna ex importuna cibi oblatione succedant, docet *Hippocr.* 4. *de acutis*. Quæritur tandem an illis febribus, quarum accessio tam longa est, ut ferme statim à declinatione novus intet paroxysmus, in statu exhibere cibos conveniat, an in declinatione? Quid in deterius esse putant, cibum largiri in principio paroxysmi, quàm in statu, invadente enim febre, irritatur ignis naturæ, pulsus depravatur, cor magis laeditur; hinc virtus labefactata cibum commodum non coquit, cruditates augentur, fermentatio disproportionata gliscit, particula vaporosa plurimæ ex alimento malè fermentato, & accenso suscitantur, sic periculosior fit paroxysmus & mors interdum ex ignis naturæ irritatione, ac suffocatione contingit, quod enim in principio commissum est erratum, aliis temporibus etiam communicatur: unde *Hippocr.* præsantiam dare, cum pedes sint frigidi, vetat: Hinc error committitur à *Mulierculis*, quæ in febribus, quando toto corpore frigescent ægri, potus & actus calidos, & multum calefacientes propinant, ut molestum illud frigus abigant: Cum potus tamen præsertim calidus facilius corrumpitur, & febrilem fermentationem exasperat,

asperat, in principio itaque nihil dare satius est, at cum calor ad pedes descenderit, aliquid dare licet. Sed in statu tantum non est periculum. Alii his omnino adversantur, cum virtus in illo tu plus laboret in corpore universo, quam in principio. Attamen prior sententia ob rationes supra dictas probabilior est, falsum enim est virtutem plus laborare in statu, quam in principio paroxysmi, peius enim est virtutem opprimere, quam à calore irritari & alterari. Sunt tamen corpora quedam biliosa, calida ac sulphurea sensus exquisitissimi, quæ cum pluribus laboribus, copiosoque victu uti soleant, nisi cibus detur in paroxysmi initio, incidunt in Syncopen, Marasmodum; cuius Historiam narrat Galenus meth. cap. 3. de quodam juvene, qui ætate tertia laborans, nisi in accessione cibum capiebat, incidebat in Syncopen. Casus tamen rarus est & non omnes choërici hisce periculis sunt obnoxii. Denique omnia ea plurimi, qui temere Medicinam faciunt, ignorant, qui tantum id sibi negotii credunt solum dari, populo ut placerent, & videantur esse de viribus agri solliciti, quarum tamen conservatio non ex verbis sed commoda remedium administratione dependet: Sic, uti nimis austeros Medicos non probo, peiores sunt nimium indulgentes, qualis pro exemplo olim erat Romæ Alcibiades, qui agris concedebat Balnea, vinum, carnes, & quicquid agris gratum erat. & optatum, sicque mentes civium Romanorum mirabili artificio ad se traherat, haud dubie non sine insigni multorum perniciæ: Nos vero scribimus, experientia edocti: Ne quid nimis. Nam.

*Balnea, Vina, Venus conservant corpora nostra:
Corrumpunt eadem, Balnea, Vina, Venus.*

Omnia, uti de aliis rebus antea dixi) ad Diva tam pertinentia, quia cum non sint generalia, in febribus particularibus sunt tractanda.

Quoniam genus Mortalium adeo in suam perniciem ruat, ut non tantum contra rectam medendi methodum obluetur, & Medicos ludibrio habeat, verum etiam pentacula sive amuleta quedam in febribus excogitet, in genere hic aliquid idcirco dicendum restat, cum omnes febres in genere hisce curare posse dicant. Nonnulli idcirco hæc Amuleta excogitarunt, uti Zenexeton Paracelsi, cui magnam pesti propulsandæ virtutem inesse multi arbitrantur; sed quia ea ipsa immensis superstitionibus referta sunt, iis quoque à nemine idem adhiberi velim; cum similia vix unquam sine expresso aut implicito pacto Diaboli effectus suos fortiantur. Quidam confugiunt ad nescio quæ Amuleta Sacra, variis literis, characteribus, crucibusque intricata, quibus Deum Opt. Max. tanquam ad sensibilia signa cogi posse putant: Sed hæc uti impia sunt, sic à Cordatioribus Ecclesiæ Pastoribus merito tanquam innumptis Diaboli illusionibus exposta, proscripita sunt. Ex quibus multis hic in gratiam Lectoris unum sat superque jam notum vulgatumque apponam, ut fraudibus cognitis ab huiusmodi malefactorum hominum inventionibus unusquisque abstineat.

Sic igitur se habet.

† Z. † D. I. A. † B. I. Z. † S. A. B. † Z.
† H. G. F. † B. E. R. S.

Quorum characterum hujus Amuleti superstitioni ajunt hanc esse explicationem.

† Crux Christi salva me.

Z. Zelus domus Dei libera me.

† Crux Christi vincit & regnat, per lignum Crucis libera me Domine ab hac febre.

D. Deus Deus meus expelle pestem seu febrim de loco isto, & libera me.

I. In manus tuas Domine commendo animam meam, & corpus meum.

A. Ante calum & terram Deus erat, & Deus potens est liberare me ab hac febre, seu peste.

† Crux Christi potens est ad expellendam febrim & pestem à loco isto.

Et ita de reliquis characteribus. Verum cum hæc scripta ejusdem omnino formæ sint cum innumeris aliis, quæ hominibus malefactoriis, & cum Dæmone haud raro pactum habentibus, ad alios effectus similes, impie excuduntur & superstitione adhibentur: dicendum ea prorsus suspecta atque scandali plena esse, eaque propter, eorum usum cavendum esse. Nec refert, quod horum Amuletorum characteres sic explicari possint, ut sint versuum quorundam Psalmorum, similiumque precum initiales literæ. Nam præterquam quod iidem characteres se ipsos ad id indeterminari sint, possintque à Dæmonis ministris ejusmodi Amuleta crudentibus in sensum prorsus oppositum detorqueri; adhuc tamen ex hoc talis Amuleti usus reprobandus est, quod eo modo nudis characteribus & crucibus consignatum & in corpore gestatum, exinde insignem & singularem, aut certam vim ad effectus suos habere superstitionis existimetur. Atque hæc etiam de hac materiâ difficillima, & apud veteres obscurissimâ dicta in genere sunt: sed breviter. Si quæ tamen obscura & dubia in re hoc modo à paucis tractata occurrent, ista non prius rejicere aut damnare decet, quam meliora fuerint substituta. Ideoque, Lector Benevole.

-----Si quid novisti rectius istis,

Candidus imperti: si non, his utere mecum,

Hactenus Clariss. Pleni, cui continuo subjungeremus Curationes Febrium ex aliis variis, secundum methodum nobis familiarem, n. de Lectoris nostri commodo magis futurum crederemus si rursus duas hic prius attexemus methodos curatorias; primam scilicet qualem illam habet Autor Praxeos Chymiatricæ rationalis qualiscunque demum ille sit; alteram verò qualem ipsam exhibet accuratissimus Richardus Morton in sua *methodo* seu exercitationibus de Morbis universalibus Acutis. adjectis utriusque circa Febres ratiociniis, quæ quidem apud illum paucissimis verbis secundum principia Philosophiæ Cartesianæ, ac Chymicorum explicantur: Apud Clariss. verò Morton, secundum sententiam eorum qui ad Systema Nervosum Febres referunt, nervosè traduntur. Veniant itaque primò Capita de Febribus, quæ in

Praxi Chimiatica Rationali reperiuntur, *decimum* *ollavum* scilicet ac *decimum novum*.

Febris est mala & perturbata sanguinis mixtura, varia producens symptomata.

Divisio februm est *duplex*, aut propter durationem & intervalla quædam, aut propter symptomata urgentia.

Differentia propter durationem est etiam *duplex*, vel *continua*, vel *intermittens*.

Continua dicitur febris quæ à primo momento invasionis permanet usque ad ultimum momentum suæ durationis, absque ulla remissione.

Continua est etiam aut *ephemera*, sive *diaria*, quæ per unum permanet diem: aut *synocha*, latine *continens* dicta, quæ per plures dies durat.

Synocha febris est aut *acmaistica*, quæ nec accrescit, nec decrescit: aut *epacmaistica*, quæ continuo accrescit, aut *paracmaistica*, quæ perpetuo decrescit.

Continuis annumerantur, quæ aliquas exacerbationes & remissiones habent, & sunt 1. *quotidiana continua*, quæ quolibet die remissionem habet: 2. *tertiana continua*, quæ tertio die remissionem habet. 3. *quartana continua*, quæ quarto die remissionem, sive exacerbationem habet.

Intermittens est febris, quæ post intervalla nunc breviora nunc longiora, diversis redit paroxysmis.

Intermittens dividitur propter intervalla, 1. in *quotidianam*, quia quotidie novus redeat paroxysmus præcedenti respondens: estque *duplex* vel *triplex*, quoties eodem die duo, tresve sibi proportionem varia successivè respondentes producuntur paroxysmi. 2. in *tertianam*, quando tertio die novus redeat paroxysmus: estque *duplex* vel *triplex*, quæ ex duobus tribusve tertianis constat, sive in duplici eodem die bini, aut alternis diebus singuli revertantur paroxysmi: sive in tertiana triplici uno die bini, altero unus, aut quandoque uno die terni, altero nullus infelient paroxysmi. 3. In *quartanam*, dum post duos intermissionis dies revertatur paroxysmus: estque *duplex* vel *triplex*. 4. In *quintanam*, *sextanam*, quæ aliquando observantur.

His febribus intermittentibus adduntur *varie*.

Causa febris *synochæ* est sal & sulphur volatile, quod vel propter acrimoniam & volatilitatem à pituita in foco febrili retineri nequit, vel quia ipsa pituita tam mollis & fluida est, ut acrimoniz fermentorum pro tempore resistere non possit. Causa vero *quotidianæ* intermittens est materia salino-pituitosa; sed in *tertiana* intermittente est materia acido-austera, nec non pituitosa. In *quartana* autem intermittente, est materia acido-austera, nec non pituitosa. In *quartana* autem intermittente, est materia magis ilcosa & terrestris, salibus rigidioribus & crassioribus constans. In febre vero maligna sive pestilentiali est materia sive fermentum peregrinum non tantum valde activum, sed insuper acre & corrosivum sanguinis mixturam & fermentationem valde turbans & coagulans.

Solem ad non quotidie demittere effluvia subtilissima motum & vitam sublunaribus cundistribuentia, & conservantia, cuique varias anni tempestates consideranti manifestum est.

Hyeme enim propter obliquum solis situm

ad terram pauci, & non nisi valde obliqui ad nos derivantur radii, ac propterea motus, & in quibusdam etiam ipsa vita, pro tempore quasi suffocata videtur: torpent ranae, muscæ immobiles jacent, privantur suis foliis arbores, semina terræ commissa otiosa jacent, nec illorum principia activa ab universali hoc fermento in actum educuntur, & pleraque quasi mortis imagine sopita jacent.

Verum succedente vere, soleque altius supra nostrum horizontem ascendente, radiosque copiosiores magisque directos ad nos mittente, omnia quasi reviviscere, & ad novam vitam revocari videntur subtilissimis materiz primi elementi effluviis, horum principia activa in actum educuntur, nec hic materiz subtilissimæ transfluxus solummodo locum habet in inanimatis, sed propter suarum particularum tenuitatem quorumvis animalium vitam & motum dirigit, cujus luculenta observare licet experimenta in brutis, quæ tempore veris in æstum concitantur veneriunt, ex agitante materiz primi elementi partes illorum seminales liberiori motu, quæ per totum hyemis spatium non nisi languido concitabantur motu qui furor tam diu durat, donec particulis salino-sulphureis volatilibus discussis, sanguis ad pristinum redeat temperamentum, imò hæc particularum seminalium agitatio tam vehemens est in quibusdam, ut quædam bruta in furorem vertantur, & licet cicurata nullorum suorum dominorum habeant rationem, ut hoc in cervis, elephantibus observatur physici, imò etiam ipso tempore veris, plerique mortales internam quasi lætitiæ perferunt absque ratione manifesta ex liberiori ætheris transfluxu, sanguinem blandius fermentantis, quique per totam hyemem languentibus morbis suere detenti, circa veris initium solamen perferre solent, quæque medicamina in hyeme morbos chronicos superare non potuerunt, à fermento hoc universali adjuncta hoc debellare solent.

Hic materiz subtilissimæ transfluxus, si fiat secundum poros sanguinis figuræ & motui materiz primi elementi convenientes, & correspondentes, nullam inde homo perferre alterationem, nec molestiam.

Sed si contingat, sanguinem per fermenta peregrina in mixtura & partium suarum ordine valde alterari, hinc ponitur per quos materia primi elementi libere transibat, in figura sua multum immutari necessum est, & non potest non, quin magis inde excitentur turbæ.

De Febribus intermittentibus.

Hiscæ enim subito angustatis & coarctatis, pro tempore oritur impeditus liberioris materiz subtilis transfluxus, hinc particule sanguinis tardius motæ, & segnius in corde fermentatæ, calorem debitum corpori communicare nequeunt; friget itaque & languet corpus, & pro ratione salium acrimiarum in peregrinis fermentis contentorum cum sanguine ad partes sensibiles membranosas delatorum, oriuntur rigores intensissimi; Verum cum materia subtilis continuo impetum facit in sanguinem, ad poros sibi restituendos, tandem vehementius sanguinem concutiendo, ardorem introducit molestissimos, quippe sanguinis particule, quæ quæversum motu celeriori agitatæ, calorem suscipiunt intea-

sum,

sum, duratque ille paroxysmus, donec sanguis ad pristinam reducatur mixturam, porosque obtineat trajiciendæ materiæ subtili correspondentes absque resistentia, & donec fermenta peregrina sanguinis mixturam perturbantia, vel per sudores, vel per insensibilem transpirationem, vel per urinas sint educta, quo in casu materia subtilis absque ulla molesta ruit per poros sanguinis, illamque blande tantum termentat.

Redit autem paroxysmus, ubi fermenta peregrina in fociis suis itagnantia, ad istum acridinis statum perveniunt, ut obstructions suas erodere valeant, seseque cum sanguine confundere queant, in quo eandem scenam absolunt ut ante, duratque illa febris intermittens, donec fermentis temperatis, & pituita viscida obstructions faciente soluta, sanguinis mixtura non perturbetur amplius, febrium itaq; intermittentium causam adscribimus fermento salino acido aultero, nec non pituita viscida, obstructionem in pancreate caulanti, quæ fermenta certis quibusdam temporibus exaltata, & in sanguinem acridinis gradum attingentia, pituitam erodunt, seseque in intestina exonerant, vasaque lactea pertranseundo in vena subclavia sanguini se miscunt, prædictasque turbas excitant, interim duobus pancreatis de novo a pituita obstructis. Itagnat fermentum, & successu temporis exasperatum, de novo suam obstruentem pituitam perforat, reditque paroxysmus.

De Febris tertiana Curatione.

Laborandum itaque, ut pituita incidatur & educatur, & fermenta acido-aultera sanguinis mixturam perturbantia enerventur, & eliminentur, quæ temperantibus, purgantibus & sudoriferis perficietur.

℞. Pilul. nost. cathol. ℥j. vel gr. xxv. Formentur pilul. nu. 7. pro dosi.

Vel, ℞. Extract. cathol. ℥j. Mercurii dulcis, gr. 8. Trochisc. alhandal. gr. 3. Olei macis still. gutt. 4. M. F. pilulæ num. 7.

Vel, ℞. Resinæ Jalappæ gr. 6. scammonii gr. 4. Dissolv. in vitello ovi, adde Aq. menthæ ad formam haustus. Tartari vitriolati ℥ss. Olei carui gutt. 3. M. F. Haustus purgans.

Vel, ℞. Purgantis universis antimonii gr. 6. Extract. ros. ℥j. Formentur pilulæ num. 6. pro dosi.

Corpore ritè purgato præscribatur sequens sudoriferum & anodinum.

℞. Reg. antimonii med. ℥j. Mercurii diaphor. Jovialis gr. 5. vel 6. Diacord. frascst. ℥ij. Confect. de hyacinth. ℥j. Salis card. bened. gr. 10. M. F. Bolus, quo assumpto exhibeatur insuper agrotinct. opii cochl. j. aut ij. cum vino aut cerevisia.

Hæc autem fiant per horam 1, aut j β. ante paroxysmum, ægerque se ad sudores componat, ut antequam fermentum obstructions suos referens, se cum sanguine miscere queat, medicamentum hoc in actum educatur.

Si lingua sit arida, aliusque vehemens torqueat ægrum.

℞. Diacord. frascst. ℥ij. Confect. de hyacinth. ℥j. Reg. antimonii med. gr. 12. Camphoræ, gr. 4. Sacchari saturni, gr. 3. Salis prunell.

gr. 10. M. F. bolus sudorificus.

Quod si hæc minus feliciter succedant, vena secetur hora 1. β. ante paroxysmum, & ut dictum prius, prædicta exhibeantur medicamenta.

Pro siti extinguenda exhibeatur decoctum flor. cyan. & buglossæ ut dictum supra, vel spiritus nitri stillatum per guttulas aliquot cum cerevisia vel potu ordinario mixtus, potenter sitim extinguit. uti etiam sal prunellæ per successivas doses exhibitum an ℥ss. ad gr. xv. cui majoris efficaciz gratia camphoræ, aut sacchari saturni gr. 2. vel 7. admisceri possunt.

Quidam carpi manuum applicare solent sequentem mixturam.

℞. Fol. ranunculi incis. & maculat. m j. Cort. interioris sambuci, m β. Fuliginis camini splendentis, salis communis. Piperis nigri, an, p. 2. Misceantur inter se, & humectentur aceto sambucino, & inter duo linthea comprehensa carpi manuum alligentur & continuo aceto sambucino humectentur.

Vulgus exhibet muschatam nucem cum alumine.

Ubi æger ad sudores pervenit, medicamentumque in actum est eductum, sequenti mixtura, sanguinem ad bonam mixturam redactum, regito.

℞. Aq. melissæ, boragin Card. bened. menthæ an. ℥j. Cinnamomi, ℥ss. Reg. antimonii gr. 30. Salis prunellæ. ℥i β. Ocul. cancri, præparat. ℥j. vel gr. 15. Tincturæ opii, ℥ss. Syr. de limonibus, ℥j. M. F. mixtura diaphoretica.

Quod si per sales medicus judicet rem felicius succelluram, sequens præscribatur pulvis sudorificus.

Salis absinthii, card. bened. an. gran. 12. Bezoard miner. gr. x. Croci optimi, gr. 6. Laud. opiat. gr. 1. Tartari vitriolati, gr. v. M. F. pulvis diaphoreticus.

De Febris quartana curatione.

Febres vero quartanæ intermittentes sua diuturnitate & pertinacia, sufficienter ostendunt illarum ortum esse ex materia magis viscosa & terrestri, salibusque rigidioribus & crassioribus obstructions pertinaciores parientibus, quæ se non facile superari & resolvi patiuntur, nisi in principio vel adhibitis generosioribus medicamentis.

℞. Mercurii præcip. albi vulgaris, q. p. Oleo vitrioli irroretur, ut inde pasta formari queat exponantur, hoc tertia vice repetito, & tandem pluvia abluito ad gratam aciditatem pulveris remanentis. Ita enim obtinebis præcipitatum correctum, per inferiora felicissime operans, tenacissimosque humores incidens & educens. M. F. Mercurius præcipitatus albus purgans dosis a gr. v. ad x.

Vel, ℞. Vitri antimonii in sube. pollinem triti, q. p. Oleo vitrioli itidem irroretur, ut inde pasta formari queat, exsicceetur supra ignem, & hoc tertia vice repetatur, digeraturque postmodum cum sequenti sp. vini rectif. (nempe

℞. Mastiches ℥j. sp. vini rectif. ℥ss. digerantur & destillentur ut artis est.) Mastichino per xxv. dies digestionem sp. vini mastichini peracta cum vitri antimonii coquantur simul, &

in fine sp. vini accendatur. Ita enim obtinebis vitrum antimonii per inferiora purgans, dosis, an. gr. 3. ad 8.

Pro purgante tibi insuper inserviant Mercurius vitæ correctus. Precipitatum solare, & lunare, Aloth. solificatum, dosis an. gr. 3. ad 5.

Purgationibus peractis, per sudores, vel per insensibilem transpirationem, vel quandoque per sedes, sequens arcuum potenter operatur.

℞. Antimonii Hungarici per ignem naturæ multiplicatum calcinati, hoc est, per radios solares concentratos per speculum ullorium, (cave tibi à fumis copiose ascendentibus) calcinationem autem hanc tam diu continuato, donec antimonium ad pristinum redeat pondus.

℞. Hujus anti. ouihung. calcinati, ʒj. Sp. summi vegetabilis, sive sp. vini rect. ℥ss. digerantur p. xiv. dies, noctesque, hujus circuli exhibeantur ʒij. vel iij. in commixto vehiculo appropriato.

Vel, ℞. Rad. bryoniæ. ℥ij. raphani rust. ℥ij. Herb. cochlear. M. 8. Contundantur, usque adde Vini albi generos. ℥iv. Digerantur per vii. dies noctesque, Destillentur post modum ex maris balneo ad siccitatem.

℞. Hujus destillati, ʒij. nucis moschat. in vino saccharato, ʒj. M. F. haustus mane & vespere exhibendus.

Vel, ℞. Salis tartari q. p. Butyrum antimonii rect. eo cum stillatim contunde, donec ebullitio cessat, exsiccentur leui igne, & preparatum habebis purgans antimonii quandoque lenissime per vomitum operans, quod potentissime obstructions pertinaciores resolvit, dosis à gr. 3. ad 8.

Vel ℞. Reg. antimonii med. gr. xxv. Antimonii diaphoret. jovi lis gr. x. Theriacis ven. ʒj. Salis card. bened. ʒss. M. F. bolus sudorificus.

Quidam in principio suadent vomitorium, quod quandoque cum fructu succedit.

Prostant insuper decocta ex lignis & radicibus, generosiora salibus volatilibus ammoniaci, tixique card. benedicti. nobilitata.

Uti & sales volatiles, & aromatici per intervalla ex haustu vini sumpti.

Multum contribuit ad curam dixta exacta, qui ordinariæ quartanæ peccare solent, ordinariis medicamentis nihil proficientibus.

Ad chinam chinæ confugere solent tanquam ad sacram ancoram, sed experientia edocuit, quod si china chinæ exhibeatur, corpori præcipue impuro, quod plus noxæ & damni quam utilitatis adferat, brevi enim recidivam patitur, & morbus ingravescere solet, unde non levis est suspicio, chinam chinæ focus febriem pro tempore tantum obstruere, manente interius holte in insidiis, qui mala dixta exasperatus, majores excitat turbas quam ante.

Purgetur itaque ante usum chinæ chinæ æger, ut tantum pituitæ viscosæ & salium educatur, quantum fieri potest, præscribaturque ipsi sequens vinum medicatum.

℞. Raf. ligni saissafas, ʒj. guajaci, ʒij. Cort. cinnamisci, Aurantium, Citeri, an. ʒij. Rad. cou. campan. Raphani rust. an. ʒr. Herb.

cent. minoris. Chamædrios, an. Mj. Bacc. juniperi. Lauri. an. ʒij. Sem. dauci, nativiti, an. ʒj. M. F. species pro vino medicato quibus affundantur, Vini alb. ℥v. Sp. vini v. ʒv. Digerantur per 48. horas. Quod si purgus volueris, capite Prædictor. ℥ss. si que. de sol. leniz mund. ʒj. Trochisc. agar. ʒij. Rad. turbiti, ʒj. Macis, ʒiʒ.

Corpore itaque per purgantia & alterantia bene preparato, lichinam chinæ exubere animus sit.

℞. Cort. chinæ chinæ, pulv. ʒij. Vini Hispanici, ʒvi. Stent in infusione in cineribus calidis, per noctem, detur pro dosi hora. ante paroxysmum.

Quidam præscribunt infusionem ligni colubini, vel ipsum lignum in substantia.

Interea pergat æger, dum febris sopita jacet in usu vini medicati, & strictè dixtam observet suam, ita enim tera febrili. sensim evanescunt, & pituita viscida inciditur & attenuatur, & foras educitur.

De Febribus continuis.

Quod si verò fermenta ita volatilia & acris sint, ut pro tempore a pituita in loco febrili retineri nequeant, vel pituita mollior & fluidior fuerit, ut acrimonia fermentorum pro tempore resistere non possit, ita ut antequam paroxysmus prioris febris solvatur, accessus sit sequentis febris; vel si tota sanguinis massa inquinata sit, oritur febris continua, a fermentis peregrinis continuo sanguinis nuxturam perturbantibus, eisque fermentationem in corde alterantibus, hisce figentibus sales & sulphura nostri sanguinis, tandem per continuatas extraordinarias fermentationes se ex nexibus & vinculis aliarum partium extrahunt, & in libertatem se vendicantes, furibundum motum ebulliunt, ulteriusque sanguinis mixtura resolvitur, & ad putredinem vergit.

Ille enim est status corporum naturalium putrescentium, ubi singula particule seorsum abeunt, & pristinae suæ societati renuntiant; quoniam enim principia activa naturalium corporum suis crassioribus particulis ita moment involuta, ut cum eis certum ordinem & mixturam observare cogantur; tandiu corpora conservantur in suo esse: verum si fermentatione intercedente, vincula corporum naturalia ita laxentur, ut sali & sulphuri volatili, (principiis scilicet illorum activis) detur occasio avolandi, putrescit illud corpus, & ad interitum vergit: in hoc enim interitu corporum naturalium primo secessum faciunt sales & sulphura subtiliora, postmodum crassiora, utidem per fermentationem continuatam attenuata avolant una cum phlegmate, & nil nisi caput mortuum post se relinquant.

Hiscæ in casibus maxime laborandum medico, ut vires conserventur, ut materia morbifica per sudores expellatur, ut sanguinis mixtura restitatur & conservetur, utque sales & sulphura nimium ebullentia figantur, & ad quietem reducantur, quod potissimum fiet cardiacis, sudoriferis fixis, acidis spiritibus, blandisque astringentibus.

℞. Aq.

℞. Aq. melissæ, boraginis, card. bened. an. ʒ ij. Confect. de hyacint. ʒ ij. alkermes, ʒ i ʒ. Reg. antimonii med. gr. 30. Sacchari, saturij. gr. x. Salis prunell. ʒ j. Laud. opiat, gr. ʒ. Syr. de limon. ʒ j. M. F. mixtura diaphoretica.

Si salium & sulphurum nostri sanguinis tantus sit impetus, ut prædictis non auscultet, exhibeatur tinctura opii à cochleari j. ad ij. in mixtura cardiaca.

Vires si ferant, instituatur venæsectio.

Alvus indurata si fuerit, per clysteres emolliatur. vel si remissio notabilis se ostenderit, purgetur æger infusione rhabarbari, sennæ cum cremore tartari, cujus formulam vide supra.

Corpore purgato exhibeatur hauritus sudorificus, ex regulo antimonii medicinali, diascord. fraccast. & saccharo saturij, ut supra, vel

℞. Rad. cichorii. scorzonæ. an. ʒ j. Rasuræ cornu cervi ʒ ʒ. Herb. card. benedicti, acetosæ an. m i ʒ. Tamarindorum. Tartari thenani ana ʒ ʒ. Coq. in f. q. aq. pluv. f. a. col. lb ij ʒ. adde Syr. de limonibus. violarum an. ʒ j. Nitri vitriolati ʒ ij. M. F. apozema.

Ad dolores capitis mitigandos, respice illa, quæ proposuimus capite de phrenitide.

Ad sitim intolerabilem extinguendam, convenit spiritus nitri, vel vitrioli guttatum in crevisia tenui vel aq. hordei exhibitum.

Vel ingetur sal prunellæ vel nitrum vitriolatum in sindone, & in aq. card. bened. madefacta sæpius lingux imponatur. Vel dissolvatur sal prunellæ in pluvia & os sæpius eluatur.

Vel, ℞. Aq. hord. lb j. Rob. de ribes, ʒ ʒ. Syr. de limonibus ʒ j. Olei sulphuris per camp. ad gratiani, M. F. Julapium ad sitim exstringendum.

Vel, ℞. Conserv. ros. pallidarum boraginis, Rob. de ribes an. ʒ ʒ. Crem. tartari ʒ i ʒ. Syr. de limon. q. s. ad form. conditi. M. F. Conditum ad idem.

Observarunt insuper præcici, quod quandoque æger corripiatur tali febre, in qua eodem tempore & de calore & de frigore simul conqueritur, quod quidam adscribunt materię crassæ, lentæ vel pituitæ vitreæ secundum aliquam sui partem putrescenti in venis, quæ ad partes sensibiles delata, calorem iis imprimit, altera vero sua parte aciditate peccans, & non putrescens frigus & rigorem inducit: alii verò hoc phænomenum potius deberi autumant, duabus intermittentibus eodem die concurrentibus, ita ut rigor unus incipiat, antequam alterius calor cessavit, vel cum intermittentes cum continuis concurrunt: In his enim calor ex continua perseverat, dum vero in ac edente intermittente horror & frigus se manifestant: alii verò hoc menti deliranti adscribunt.

De Febris malignis sive pestilentialibus.

De febris malignis ac pestilentialibus acturi oportet, ut inquiramus naturam malignitatis, quam variis modis considerare possumus, vel quatenus sanguinis nostri mixtura à fermentis heterogeneis subito contrahitur, & coagulatur, ita ut ineptus evadat ad fermentationem in cordis thalamis suscipiendam, hoc est, satis attenuari, & dividi in minimas partes nequit, ac proinde circulatio impeditur, æger succumbat, necesse est, hujus effecta luculenter se produunt in

opio, mandragora hyosciamino, quæ sanguinem impulando, prædicta incommoda promovere.

Contra vero, malignitas se conspicienda tradit in nimia sanguinis resolutione, qua superveniente, sanguis putrescit, hoc est, ipius sulphura & sales volatiles a fermento contagioso in actum excitata, & ultra modum fermentata, cellum faciunt a reliquis sanguinis particulis, & sic destruitur tota mixtura sanguinis, avolante enim sale & sulphure volatili, quod reliquum est, se habet intar vappæ & capitis mortui, hoc est, revera putrescit, sanguis insuper nimium resolutus, majori copia & impetu in ventriculos cordis & pulmones ruens, quæ non par est, itidem circulationem sanguinis suffocare valet, quo in casu subito exstinguitur æger.

Denique sanguini nostro supervenit malignitas, quando peregrina ferunt: non tantum valde activa insuper acris & corrosiva sanguinis mixturam & fermentationem valde turbantia, eo cum miscentur, & hoc in casu periculosa & funesta symptomata se ostendere solent, morbo longe lateque se distendente, ad hæc medicus distincte attendere debet, ut pro varia constitutione veneni, curam suam dirigat.

In nimia itaque resolutione sanguinis juncta cum acris sale, tentet medicus, antequam corrosivum eodem fixam sibi capiat, illud vel per sudores eicere, quod potissimum fiet per sudorifera fixa mineralia juncta cum illis, quæ corrosivum demulcere & sanguinis mixturam nimium resolutam, reducere valent. ut

℞. Diascord. fraccast. Confect. de hyacint. an. ʒ j. Theriaces ven. ʒ ij. Ocul. cancr. præp. gr. 15. Reg. Antimonii med. ʒ j. Nitri vitriolati, ʒ ʒ. M. F. Bolus in aq. card. benedict. & prophylacticæ, an. q. s. solvendus.

Vel, ℞. Theriaces venet. ʒ j. Confect. alkermes, ʒ j. Antimonii diaphor. solaris, gr. 25. vel, Ipsi loco, bezoard. miner. gr. xii. Salis prunell ʒ ʒ. Camphor. x. gr. ʒ. M. F. Bolus, ut supra solvendus.

Sudoribus erumpentibus, exhibeatur ægro singulis quadrantibus de sequenti mixtura cochlear i.

℞. Aq. melissæ, ʒ ij. Theriacalis camph. ʒ ʒ. Cinamom. ʒ ʒ. Prophylact. ʒ j. Confect. alkermes, ʒ ʒ. Ocul. cancr. præpar. t. ʒ ij. Reg. antimonii med. gr. 30. Nitri vitriolati ʒ j. Sp. vitrioli q. s. ad gr. tiar. M. F. Mixtura diaphoretica.

Quidam in principio exhibent sal tostum & decrepitum cum aqua calida hauriendum: Sperantes ex sale tosto deterisionem veneni, se ventriculo vel intestinis applicantis, aqua vero calida abluionem, & educationem veneni per sudores.

Postmodum pro sudorifero exhibent flores sulphuris cum vino generoso calido, de quo vide Helmontium in tumulto pestis.

Quidam in principio suadent vomitorium, præcipue si vires ægri hoc ferre queant, cui usui inserviet practico vitrum antimonii per nitrum correctum, ut dictum supra, cum requisitis aliis conditionibus syr. violar. & olei sulphuris per campanam.

Laudantur hic balsama sulphuris tam simplicia quam composita. descriptio ejus.

℞. Flor. sulphuris, lb j. Mirrhæ, ʒ ij. Aloës succotrinæ, ʒ ij. Croc. optimi, ʒ i ʒ. Camphoræ

3 iv. Digerantur cum f. q. Olei Juniperi, & succini rect. an. Et f. s. a. balsamum.

Conducit hic insuper elixir paracelsi cum acido sulphuris præparatum: uti & elixir magni thuconis, cujus præparationem vide in ipsius vita descriptam, temperetur intermedio, quo æger sudoriferis non utitur.

Subinde exhibeatur haustus sequentis aposematis.

℞. Rad. enul. camp. 3 i β. Scorzon. 3 j. Angelicæ, dictamni, Raf. Cornu. cerv. an. 3 β. Herb. scordii, card. benedicti, Melissæ, an. M j. Bacc. Juniperi, 3 β. Cort. citri, aurantii, an. 3 ij. Sem. dauci, 3 i. Coq. in f. q. aq. pl. in fine addendo. Vini rhenani, lb j. colentur, col. lb ij β. adde Nitri vitriolati, 3 iv. M. F. Aposemia sive decoctum.

Vel, ℞. Pulv. liberantis, dianibz, an. 3 j. Rad. enul. camp. cond. Conf. ros. pallidarum, Diascord. Fracast. an. 3 β. Olei Juniperi, 3 j. Tartari vitriolati 3 ij. Syr. helleni. enul. camp. an. q. s. ad form. conditi, M. F. Conditum.

Alvi fluxus si supervenerit.

℞. Terræ sigillatæ, Cornu cervi usti, Corall. rubri præparat. an. 3 j. Diascord. fracast. 3 ij. Theriaces vener. 3 β. M. F. Bolus in aq. card. bened. dissolvendus.

Vel, ℞. Corall. rubr. præparat. Cornu cervi. usti, Terr. sigill. an. 3 ij. Conf. ros. rubr. 3 β. Carn. cydonior. cond. Rob. acaciæ, Diascord. Fracast. an. 3 ij. Syr. cydonior. q. s. ad form. conditi. M. F. Conditum adstringens.

N B. Quod hæc etiam locum habeant in vomitu.

Quod si acre venenum transferit in Carbunculum, hinc sequens apponite topicum,

℞. Farin. rad. althææ, sem. lini, Pulv. scordii, Pollinis far. tritic. an. 3 β. Coq. cum f. q. aq. pl. ad formam pultis, cui adde Mellis, terebinthin. Unguent. apollol. an. 3 ij. picis, liquidæ, Unguenti basilici, an. 3 ij. Vitell. ovi, nu. i. Croci optimi 3 j. M. F. cataplasma, calideque carbunculo applicetur.

Vulgus imponit folia brassicarum rubrarum cum oleo raparum inuncta.

Chyrgi præscribunt diachilum cum gummi mixtum cum unguento basilico.

Chymici summis laudibus extollunt suum magnetem arsenicalem, ut

℞. Antimonii, sulphuris, Arsenici crystall. an. 3 ij. l undantur in vase fictili, donec massa lapidis formam induat, qui in pulverem contritus, sequentibus additamentis in formam emplastri redigatur, ut Gummi ammoniaci, sagapeni, galbani, an. 3 i β. Dissolvantur in aceto ut artis est. Cera. Terebinth. an. 3 ij. Olei succini, 3 j. Capitis mortui vitrioli ab omni sale edulc. 3 β. Modus componendi hic est: cera & terebinthina liqueant leni igne, addantur gummi & exactè inter se misceantur, quibus tunc adde lapidis arsenicalis 3 i β. tandem terram vitrioli, ultimo oleum succini, agitetur continuò, donec omnia bene sint subacta & mista, massaque refrigerata, malaccetur cum oleo scorpionum & præparatum erit emplastrum magnetis arsenicalis, virus ex carbunculo extrahens, cumque naturans & postmodum consolidans.

℞. Rad. lilior. alb. 3 ij. althææ, 3 j. Herb.

rutæ, scabiosæ, althææ, an. m. j. Ficum nu. ix. Capar. sub ciner. assat. num. viii. Sterc. columbini, Ferri. panis acidi, an. 3 i β. Far. tritici, 3 β. Fiat cataplasma f. . . addendo in fine, Mellis, Unguenti basilici, Olei scorpionis, Butyri recentis, an. 3 j. M. F. cataplasma.

Quod si vero venenum magis peccat, sanguinem opprimendo, ejusque fermentationem in corde minuendo, lethargum, morbosque soporolos producendo, conducunt omnia, quæ sanguinis mobilitatem & vivificationem promovere valent, qualia sunt, quæ sulphure & sale volatili gaudent copioso, ut

Theriaca, Orvietanum, Mithridatium, quæ potentiora longe evadunt, si misceantur cum Sale volatili viperarum, Cornu cervi, Eboris & similia.

Insigne cardiacum erit elixir regium, superius præscriptum, ut etiam sequens haustus,

℞. Theriac. venet. 3 j. Confect. alkerm. 3 j. Ocul. cancr. præparat. gr. xv. Salis vol. c. c. 3 β. Antimonii diaphor. solaris, gr. xii. F. bolus in f. q. aq. menthæ, & majoranæ, dissolvendus.

Sudore promotò, sanguis in officio suo continetur sequenti mixtura, ut

℞. Aq. menthæ, majoranæ, card. bened. an. 3 i β. cinamom. 3 β. Elixir. regii, 3 j. Reg. antimon. med. gr. xxx. Ocul. cancr. præparat. 3 j. Confect. alkermes, 3 j. Folior. solis, num. v. Syri de Stechade, de mentha, an. 3 β. M. F. mixtura cochleatim per intervallum mediz horæ exhibenda.

Conducunt hic balsama cephalica temporibus, naribus, & regioni cordis inuncta.

Uti & suffimigia ex succino mastiche & cariophyllis confata.

Pro præservatione quidam præscribunt sequens electuarium, ut

℞. Ficum, Nucleor. nucum jugland. Folior. rutæ recent. an. lb. i. Contundantur in mortario lapideo fortiter terendo, donec bene uniantur, adde postmodum Salis communis 3 j. Syr. limon. q. s. ad form. electuari. M. F. electuarium præservans.

Vel, ℞. Rob. juniper. de ribes, carn cydon. cond. an. 3 j. Syr. de limonibus q. s. ad form. conditi, M. F. conditum præservans.

Quidam mirram ore continendam & mastigandam præscribunt, alii aceta cordialia, ut calendula, rosarum, sambuci, commendant; uti & pillulas russi semel in septimana sumptas, elixir proprietatis Paracelsi, balsama sulphuris cum vino pota, tutissima est fuga citò, longè cede, recede, tarde redi, aer emendetur suffumigiis ex bacis juniperi, & thure, succino, pulv. pyri, aceto in lateres candentes projecto. Masticeatur radix angelicæ, zedoariæ. Naribus poma citrea cariophyllis dedolata offerantur. Vinum generosum ad hilaritatem potum vel simplex, vel absinthites, vel enulatum præscribatur, exactè habeatur diæta, ratio, ne cruditates generantur, metus, tristitia, mæror, cane & angue pejus vitentur. Hilaritas quavis occasione promovetur, ut homo accedat confidentia in clementiam & misericordiam Dei.

De Febrî Hæctica.

Hæctica est febris continua, quæ tamen unâ, duabusve post assumptum alimentum horis tantillum exacerbatur & augetur, iterumque paulò post

post ad pristinam æqualitatem redit. Huic accedit continua, lenta, & corporis emaciatione & tussis.

Hæc in principio adeo lævis esse solet, ut vix percipiatur, nisi accuratissime attendat medicus, sed postmodum gravescens, se satis difficilem cui atque præbet, & quandoque totius corporis emaciationem & consumptionem cavsat.

Hæc autem a diversis causis originem potest trahere suam, vel enim ab ipsis cordis poris celerius materiam primi elementi trajicientibus, quod in casu incurabilis habetur: vel ab apostemate pulmonum, sanguine continuo particulas puruleas abradente, & propter perigrinas istas particulas continuo in corde mole effervescente.

In principio huic obviam eundem est medicamentis sanguinis fermentationem emendantibus, ejusque acrimoniam emulcentibus, quippe quod non tantum ex prædictis causis, sed insuper a fermentis pancreatæ, hepate, hincque collectis, produci potest, unde sanguis ratione suæ fermentationis, & status sui balsamici, multum alterari potest.

Ad fermentationem emendam, & compescendam præscribatur sequens pulvis,

℞. Antimonii diaphor. solaris Reg. antimonii med. an. gr. x. Camphoræ, gr. 3. Sacchar. Saturni, gr. iv. M. f. pulvis ex aq. melissi exhibendus. Conducunt hic cardiaca fixa, ut Corallia, Perla, Folia solis, Lapidis pretiosi, Confect. de hyacintho, Terra sigillata, Diatrachanthum frigidum, &c.

Quod si ex ulcere pulmonis originem traxerit, decocta convenient ex detergentibus, & consolidantibus confata.

Si consumptus seu marasmodus occupaverit ægrum, chymici summis laudibus erunt, tincturam suam muniam, cujus descriptionem vide in chymia rationali.

Corpus subinde blandè purgetur cum cassia, thamarindis, decocto prunorum, cum syr. rosar. soluti, aut de cichoreo cum theo.

Multum prodest nitrum vitriolatum: ut & saccharum saturni nitratum, cujus præparatio est.

℞. Sacchari saturni. q. p. Nitri purissimi tantundem, Solvatur in pluvia, & confundantur simul, filtratur & evaporatur in crystallos, quos cum sequenti apozemate exhibeto, ut

℞. Rad. cichorei, graminis, an. 3j. glycyrr. ras. 3j. Hord. mundati, 3j. Herb. lactuæ, portulacæ, endiviæ, an. m. ij. Passul. corinth. 3ij. Sem. quatuor frig. maj. an. 5j. Coq. ex f. q. pluviz f. a. col. f. b. adde Nitri vitriolati, 3ij. Crystall. saturni nitrati, 3j. Syr. violarum, seu alchæz Fernelii, 3ij. M. f. Apozema.

Prospeticum haberi solet famosum illud antihædicum poterii, cujus descriptio est in chymia rationali.

In victu conveniunt juscula cum vegetabilibus, quæ blande sale nitroso constant, excocta, ut lactuca, borago, endivia, quib. ad demulcendam sanguinis acrimoniam addi possunt, hordeum mundatum, passula uvarum corinthiacarum, prodest præcipue usus lactis hedini recenter mulcti, uti & gelatina cornu cervi, potus sit pteifana aut cerevisia mollis.

Hællenus Auctor Præcox. Chimiatrix rationalis sequitur jam Clariss. Richardi Marton. Tractatus integer Pyretologicus, seu de Morbis universalibus.

Prolegomena sive apparatus Curationis Morborum Universalium.

Medicina est ars medendi sive sanandi corpora humana invaletudine aliqua affecta, ejusmodi scilicet remedia, quorum necessitas ab uniuscujusque morbi causis atque symptomatis indicatur.

Est igitur generale hujus artis subiectum Corpus Humanum, speciale autem Ægrotatio, sive morbosa ejus affectus; Instrumenta sunt Medicamenta tam simplicia quam arte aliqua composita. Ex quibus liquido constare potest, oportere Medicum ad curationem morborum rite peragendum instructum esse. Universi Corporis humani ratione generali, omniumque ejus partium situm, fabricam atque usum callere, necnon perspectis habere omnium morborum causas & symptomata. Medicamentorumque tam simplicium quam arte aliqua paratorum virtutes tenere.

Constat igitur universus Artis medicæ Apparatus ex istis fere partibus, primo Anatomia, quæ singularum humani corporis partium in statu naturæ sano situm, figuram, atque usum ipsi ostendit, secundò pathologia atque ætiologia, quæ in statu naturæ morboso omnium morborum discrimen, causas atque symptomata tradunt, tertio physiologia, sive scientiâ simplicium medicamentorum a natura nobis suppeditatorum, quæ naturales singulorum vires atque virtutes ad medendi artem spectantes edocet; quarto pharmaceuticâ & in chymicâ quàm Galenica, ut ex iustâ ac debitâ simplicium medicamentorum commixtione, composita ad compensandum simplicium defectum aptè consiciantur.

Lubet igitur (licet strictim) in omnes istos titulos commentarios nostros subnectere. Anatomiam tamen, pathologiam, atque inde natam morborum ætiologiam de industria conjungimus, atque unâ eademque opera pertractamus, eo quod contraria juxta se posita magis elucescunt, & quod rectum index sit sui & obliqui. Pathologia enim atque ætiologia, sive vera causarum atque symptomatarum descriptio ex anatomia, seu defunctorum cadaverum inspectione maxime petendæ sunt; Siquidem ejus ope, status naturæ tam sanus quam morbosus, morborumque causæ & effectus, atque horum rursus qualitates atque gradus facillimè in conspectum veniunt. Conclusiones aliis fundamentis innixæ mihi videntur nugæ, & vana hæriolantium insomnia, quandoquidem indicationes curativæ à verâ & certa morborum ætiologia solummodo desumendæ sunt, atque ætiologia istiusmodi certa ac demonstrativa ab anatomia solâ sit expectanda; Tantum momenti habet in apparatu jatrices causas morborum ex anatomia cognitæ habere. Philosophus quidem minutissima quævis naturæ mysteria, speculandi gratiâ, cultro anatomico subiecit, Medicus vero diquisitione anatomicâ, veras morborum causas investigat, ut paratior accedat atque instructor ad eadem ope remedium eradicandas. Ideoque impresentiarum, originem tantum, nexumque partium humani corporis perquiremus, ut inde veras morborum universalium causas ante omnium oculos ponamus; Cum verò ad morbos partium filo sermonis deducamur, viscera varia

venient exactius propendenda, unâ cum eorum singulorum situ, textura & usu, cæterisque omnibus, quæ ad causas morborum particularium eruendas, & clarius explicandas conferre possint. Prima fœtus origo, uti mihi observatione constat, cerebrum est, proximum huic cor, seu punctum saliens; Indeque cerebrum totus seu embryonis proportionem cæteras partes semper superat. Ex hoc fit mina totius corporis sensum & feriatim producuntur. Quod autem ad texturam cerebri peculiarem attinet, sic se habet: Corpus est spongiosum, glandulæ ad iustar, conflatum ex tenuissimis fibrillis circumvolutum complicatis, medulla oblongata & spinalis eodem modo formata sunt. Fibrillæ tam cerebri, quàm medullæ spinalis in nervos compinguntur, qui sive intra cranium à cerebro & cerebello, sive extra cranium à medulla spinali oriuntur, canalium instar, spiritus animales per totum corpus placide deducentes, sensum motumque corpori impertiunt, cæterisque muneribus ad vitam necessariis funguntur. Eadem cerebri & cerebelli propagines ulterius continuatæ in membranas, vasa sanguifera, viscera, & musculos expanduntur, iterum constrictæ in forma tendinum & cartilaginum colliguntur, immò ulterius compactæ in ipsa ossa indurescunt. A cerebro igitur, tanquam fonte quodam, tota compages corporis, omniumque ejus viscerum, & vasorum, ortum habet, e spiritu, instar fulguris, e cerebro perpetuo derivato, animata, ad usus proprios & destinatos apta evadit. Quinetiam in statu præternaturali, spiritus animalis, non secus ac massa sanguinis, fermento peregrino inquinatus morbosum characterem recipit. Ex quo non tantum morbi cephalici, uti apoplexia, vertigo, lethargus, comæ, epilepsia, convulsio, mania, melancholia primaria, &c. verum etiam incubus, hysterica passiones, & affectiones hypochondriacæ, paralytici, cæterique morbi generis nervosi, immò & febres cujuscunque generis, variolæ, morbilli, scorbutus, chlorosis, & generaliter loquendo, omnes morbi sive acuti sive chronici generantur, præter eos qui evidenter à mala diathesi alicujus visceris vel partis specialis oriuntur. Indeque ætiologia omnium morborum universalium, qui totum corpus primario afficiunt, æquæ ac cephalicorum, & nervosorum propriè sic dictorum, ab hinc rite petenda est. Et quidem juxta hanc hypothesin, horum morborum pathologia certior & rationi longe congruentior concinnari potest, quàm ex doctrina humorum à priscis tradita, forsan etiam indicationes curativæ, quæ adhuc desiderantur, ad hos morbos universales magis aptæ, Medicorum expertorum sagacitate & industria, in magnum ægrotantium solatium, exinde excogitari possunt. Licet non inficiat indicationes communes à vitiatò statu sanguinis, & humorum desumptas, suos usus habere. Nam sicut à morbofo spirituum statu, tanquam a præternaturali fermento, illico massa sanguinis morbo afficitur, ita etiam æger spirituum status ut plurimum, à vitiatà crasi sanguinis (qui quidem eorum pabulum & fomes est) dependet.

Quo vero hypotheseos nostræ de morborum universalium origine veritas illustretur, priusquam ad specialem ætiologiam & pathologiam descendamus, ut quædam generalia nobis con-

cedantur, postulamus, quæ tamen, pro viribus, & quantum rei natura patitur, demonstratione evidenter probare conabimur. De morbis partium postea suo loco dicendum est.

Postulata sunt quæ sequuntur, nempe dari revera spiritus animales, eoque in singulis fibrillis totius machinæ hospitari, a cerebro & medulla spinali pro vanae; Eorum canales esse nervos, promptuarii vero cerebrum & medullam antedictam, spiritus esse *vi cæpessens*, seu primum principium activum totius machinæ. Atque eorum unionem cum sanguine esse intimam; Eorum æconomiam sapissime perverti, crasin sanguinis ab eorum morbis semper immutari, atque a morbosa spirituum affectione, & inde consequenti eversa sanguinis crasi morbos universales, quotquot sunt, immediate oriri, mediate autem etiam morbos partium.

Quod autem revera dentur Spiritus animales, quantum res patitur, suo modo scilicet ab effectu demonstrari facile potest. Demonstrationem à priori rei natura non permittit, quoniam hi spiritus omnium fere nobis notorum sensuum captum longe superant; Cunque secundum Philosophorum axiomata, nihil possit esse in intellectu quod non prius fuit in sensu, nec ratio ipsius naturæ atque substantiæ horum spirituum (qui quia sensus omnes præter tactum effugiunt, ideo metaphorice tantum describi possunt & solent) à nobis requiri potest, nec alia aliqua demonstratio illorum existentia, nisi quæ sit à posteriori & ab eorum effectibus, qui tam in statu naturæ integro, quàm in morbofo sensui patent. Hoc modo existentia spiritus animalis atque animæ ipsius æqualiter demonstrari potest, adeò ut utriusque existentia pari ratione vel agnoscenda vel neganda sit. Est enim (ut mihi videtur) Spiritus iste immediatum animæ organon, & vitæ ipsius subiectum, qui ideo mediam quandam naturam inter corpus & animam participat, ut vinculum sit, quo anima corpori uniatur, & totam suam energiam vitalem exerceat. Sicut enim in statu sano, per continuatam horum spirituum irradiationem a cerebro, tota corporis compages ad vitales & animales suas functiones, motum scilicet & sensum, rite & facile exequendas apta redditur, ita in statu morbofo propter horum radiorum influxum, sive à strangulatione, sive à compressione spinalis medullæ impeditum, omnes subiectæ partes illico exsolvantur, ab irritato vero & explosivo eorum statu tota compages variis hic illic spasmis agitur & distorquetur, denique ubi à mala diathesi cerebri & principii nervorum hi spiritus à naturali suo statu in stupidum torporem degenerant, utut partes adhuc sint animatæ, illico inutiles, & sensui atque motui impares redduntur, uti in paralyti clarè conspicitur. Indeque facillimè concludere licet, præter animam & fibrillosam corporis compagem, dari etiam spiritus (cujuscunque naturæ illi sint) in minutissimis quibuscunque fibrillis totius hujus organi hospitantes, quorum ope, quamdiu munus suum debite exequuntur, anima cum singulis partibus sese communicat, & cum eos deficere contingit, vel morbo affici, anima ipsa languescit, & brevi; disruptis carceris sui repagulis, aufugiens cadaver deferit insuper ex sensu

Unionem spirituum animalium cum sanguine esse intimam facile demonstratur ex verissima illa hypothese quæ supponit totam texturam corporis esse vascularem, ad mentem Hippocratis asserentis esse *de anat. sect. 1. cap. 1. §. 1.* *et 2. cap. 1. §. 1.* Namque jam ante probavimus spiritus non detineri in claustris nervorum tenuissime licet ramificationum, sed per minimas fibrillas musculorum & membranarum exspirari, quod fit ut cum sanguine non possunt non commisceri; Eodem enim modo sanguis non arcto venarum & arteriarum spatio inclusus irritum fluxu & refluxu cor perpetuo petit deseritque, Verum ab extremis cujusque arteriole capillaris in corpus musculorum, membranarum &c. effusus fibrarum tubulos implet, unaquaque cordis systole novo flumine à tergo pressus, lento motu habitum corporis pervadit more scaturiginis è terræ visceribus repentis, donec tandem oscula venarum capillarium subintrat & deinde recta via ad cor iter faciat. Hanc sententiam plurimis argumentis confirmare licet: Primum quia sanguinis cantillum ex minima quavis sectione vel punctura sive musculi sive cutis ubicunque nutrita illico effluit.

Nervosæ canales spirituum, ex eorum fabrica, nexu, usu, & ramificatione satis fere sensu patet; formantur enim inter Canales, sive partem inferiorem & medullarem, sive exteriorem seu tunicam spectentur, ortum eximium

Spacelatione, nimia ventriculorum ejus distentione a cruore extravasato; fibrarum ejus præternaturali tensione à frequenti spirituum explosione, vel tandem ab inflammatione à circulatione sanguinis impedita & ejusdem stagnatione, officina spirituum, cerebrum, morbose afficia ut quis spiritus inibi formatos; varios morborum typos induere miretur: Jam sc. nimis calidos esse & ad fermentationem proclives, jam segnes & torpidos, aut è contra explosivos & nimis elasticos evadere? Ubi tandem fibræ in principis nervorum, & spinalis medullæ humiditate laxatæ & resolutæ fuerint (quod sæpe in paralyticis observavimus) vel tonus nervorum imbecillis, minus firmus & athleticus à frequenti spirituum explosione seu influxu nimis violento, & distensione fibrarum nervosarum à vehementibus animi pathematibus reddetur, quid mirum si ex præternaturali spirituum dispensatione morbi quem plurimum in genere nervoso, uti paralytici, hysterici, spasmodici, &c. proveniāt?

Non autem medendi methodum, usque per tot sæcula probatam, quæque venæ sectiones, cathartica, emetica, alterantia, &c. cum successu adhibebat, hac hypothese convellimus. Nam non tantum à morbis spirituum sanguinem & humores, varias mutationes subire contendimus, quod in titulo sequenti ex professo demonstrare conabimur; verum etiam quandoquidem spiritus animales è sanguine, materia sc. habili & idonea eliciantur & renouentur, ut plurimum morbosa quædam dispositio sensim in sanguine facta, non tantum in scorbuto, chlorosi, aliisque morbis universalibus chronicis: quin etiam in febribus, variolis, morbillis, cæterisque morbis acutis ad hanc spirituum ægrotationem viam sternit: Quippe vitiosa sanguinis diathesi, spiritus inde elicitum labem non participare nequeant. Et quidem quoties à massa humorum ex abusu sex rerum non naturalium sensim in morbosam dispositionem redacta, hos spiritus ægrotare contingat morbus magis habitualis, contumax & curatu difficilis evadit. Ubi verò systema spirituum à meris animi pathematibus, aut aeris externi injuriis, sine antecedenti humorum vitio alterari contingat, quoniam morbi fomes in genere nervoso maxima ex parte continetur, appropriati alicujus & specifici medicamenti ope, motus hic spirituum præternaturalis compesci solet, & nullum post se relinquit miasma in sanguine, quod usum methodicum vel alterantis vel evacuantis cujuscunque remedii potuleat, quod clarè conspicitur in febribus intermittentibus, & etiam remittentibus usu corticis peruviani sanatis; in affectione hypochondriaca, scorbuto & chlorosi; chalybe, arte vel natura præparato profligatis; in morbis hysterici & spasmodici, cinnabari nativa, visco querino, ungula aleis, aut alio appropriato specifico in ordinem redactis. Verum circulus hic contra argumentationis leges committi forsan videatur, dum sanguinem à spirituum morbis turbari, itidemque spiritus à sanguinis dyscrasiis affici contendimus: verum, quid vetat circum quendam causarum & effectuum in microcosmo æquè ac in macrocosmo fieri? Annon quotidie videmus terram à pluvia humectatam, eorumque circulatione quædam, à vaporibus è

in corpore humano cibum seu pabulum sanguinis, ope salivæ & fermenti stomachalis parari novimus, quæ nihilominus ex ipso sanguine mediantibus glandulis perpetuo supplentur? Quare igitur absurdum habeatur circulationem hanc inter spiritus & sanguinem, in ætiologia morborum explicanda admittere? Hoc unice volumus, quod, utut ex massa humorum conturbata corpus nonnunquam ad morbos sit prædispositum; morbus tamen ipse (saltem universalis) primò instanti, ab ægrotatione spirituum formetur, qui orgasmo suo, & motu efferrato, eoque præternaturali, primum insultum faciunt, eumque subitum & instantaneum, quo tota corporis compages illico afficitur.

Quorsum vero hæc omnia, & cui bono, tantum labore subtilem hanc hypothesin (& uti forsitan quibusdam videatur inutilem) itabilire aggredimur? Respondeo, quod ex multa morborum observatione, jam diu mihi res ipsa se non aliter habere visa est, Medicumque decere, quantum in se est, ritè Philosophari, & à re ipsius natura hypotheses suas desumere. Potro, multo clarius ex hac hypothese, quam humorum doctrina, (licet ex antiquitate æstimanda,) non tantum ætiologia, verum etiam pathologia morborum, & indicationes curativæ certius desumi queant, quod in sequela operis cuiusdam spero demonstratum iri. Nec non Medici dolentes & sagaces hinc instigati alia specifica excogitare satagent, quæ spirituum motus efferratos compescendo eorumque morbos sanando, varias etiam dyscrasias inde genitas breviori & feliciori compendio tollent, sicut jam inventus Peruvianus cortex febres intermittentes & remittentes abigit, & cinnabaris nativa non rarò affeciones spasmodicas & epilepticas, (à veteribus pro herculeis & insanabilibus habitas) absque magno, eoque magis incerto apparatu medicaminum methodicè adhibitorum, sanat.

Quod, naturalis sanguinis crasis à morbosa spirituum diathesi perverti & labefactari soleat, facile probatur; Sicut enim spiritus à sanguine male disposito generati & reparati, non possunt non ægrotare, ita ab ægro spirituum statu, qui massam sanguineam æque in statu morbofo agitant, alterantque, atque in statu sano regunt, œconomia sanguinis & humorum universalis non potest non perverti. Mihi, sane, variz illæ mutationes non aliter fieri videntur in sanguine, quàm in vino, cerevisia aliisque liquoribus generosis à tonitru: vel terre motu spiritu massam regente ac temperante orbatis, qui illico vappescunt, vel acescunt nec statum pristinum prius recuperant, quàm spiritus depressi aut dissipati partes suas iterum resumant: Hoc factò uterque liquor in statum naturalem sponte redit. Hæc vis spirituum maxime conspicua est in morbis universalibus, qui totum corpus afficiunt, quique ab universalis spirituum tumultu pendunt: Sive primario, & respectu non habito ad partem aliquam specialem: à spirituum orgasmo initium ducant, quales sunt febres acutæ quæcumque, variolæ, Morbilli, chlorosis, scorbutus, rheumatismus, &c. Sive particularium viscerum labe cum universa humorum massa sese communicet, tamque contagionis ritu inquitians, morbos universales, licet secundario, producat

producat, quales sunt Lues venerea, Ictus, Hydrops, Icterus, &c. Exemplis igitur ex hac morborum Classe petitis, Hypothesein nostram illustrabimus, potius quam ex classe morborum particularium, qui etiam à spirituum æstro procreantur sed non immediate. Inter hos morbos Universales primum occurrit Febris Acuta, quæ, cujuscunque sit generis, à primò insultu morbi usque ad finem, siue is salutaris siue funestus fuerit, egregium specimen est hujus Spirituum potentatis: Primo enim morbi momento, cum sc. à frigore in poros cutis admissio, vel aliquo alio hujusmodi accidente Spiritus animales ægrotare (quod ex vertigine, dolore capitis, lassitudine lumborum ulcerosa, tremoribus artuum, aliisque Symptomatis colligere licet) & præternaturaliter algere incipiunt, frigiditas statim in sanguinem inducitur, & quidem tanta, ut sanguinem isto tempore phlebotomia detractum, instar aquæ fluentis frigidum observaverim; verum in progressu morbi, ubi à præternaturali Spirituum motu diutius continuato eisdem æstare contingat, quanto calore illico totam massam humorum flagrare & agitari percipimus? Cujus caloris cutis ariditas, inquieti membrorum jactatio, sitis, aliaque symptomata, indicia dant, donec conspicua quædam materiz è massa humorum agitatorum & colliquatorum secretio fiat per poros cutis, vel aliam aliquam portam convenientem. Hoc facto, tota moles, quiescentibus jam Spiritibus, qui eam prius in motus inordinatos ciebant, cum crisi morbi vel paroxysmi deservescit. Præter has mutationes generales, quas sanguis durante febre cujuscunque generis, à spirituum inordinato motu, subit; observatu dignum est apthas & fœda oris ulcera febres comitari solita non tantum salivæ acrimoniam, sed sanguinis etiam unde seceratur saliva, arguere; & hæc ulcera post febrem judicatam, massa sanguinea jam non amplius à Spiritibus præternaturaliter agitata, sponte evanescere. In febribus malignis & pestientialibus, uti ex bubonibus, carbunculis, ulceribus varii generis malignis, linguæ nigritie, reliquisque Symptomatis liquet, humores sphacelo s. *suppon* à spirituum venenata qualitate afficiuntur. Denique notatu dignissimum est, quod mihi nuperrius videre contigit, sanguis nimirum scæminæ cujusdam febre maligna quasi erysipelatosa laborantis per phlebotomiam extractus, adeo fætebat, ut ex ejus tetro odore tam Chirurgus, quam adstantes in animi plane deliquium incidebant. Ex dictis igitur constat, in omni febre plus minus sanguinem & alios humores mutationes quasdam subire, easque varias pro genio morbi, quo Spiritus animales inficiuntur qui primum insultum fecerant. In arthritide, rheumatismo, pleuritide, peripneumonia, & generaliter loquendo in omni febre inflammatoria & dolorifica autopsia docet serum sanguinis aeri expositum peculiari modo in gelatinam diversicorem concredere. Non est minus miranda sanguinis conversio in variolis, ubi exanthemata per totam cutem à sero planè caustico, inflammatorio & tandem purulento attolluntur: In morbillisetiam, & congenero morbo, febre scarlatina, totus sanguis ex diutina stagnatione in toto corporis habitu, in colluviem serosam & acrem manifesto colliquescit, quæ tussis serenas,

peripneumonias, ophthalmias in decursu horum morborum excitat. Neque in morbis acutis tantum verum etiam in chronicis universalibus, uti in scorbuto, affectione hypochondriaca, chlorosi, &c. insignis hujus alterationis Spiritus animales choream ducunt, nec ab ulla causa, durantibus his morbis, massa sanguinis in acidam serosam vel v. ppidam colluviem, mox stomacacem, exanthemata cutanea, ulcera maligna, sudores & ructus acidum vel fœdum redolentes daturam, quam ab anxietate animi aut malignitate aeris non perflati, frequentius citiusve facessit. Cumque mala dicta horum morborum raro admodum causa sit, fas est suspicari humores à Spiritibus male affectis hoc pessimo condimento uniri, & hos morbos esse nervosi generis sobolem.

Denique morbi secundario universales, qui ex partis alicujus privato vitio oriuntur, non aliam causam agnoscunt. Venenum enim sensim à parte affecta seipens trahit, tandem universale Spiritibus & inde sanguini affigit. Sic ab affecto pulmone, in phthisi pulmonari dicta, totus sanguis colliquatus per poros cutis, intestina, reliquasque omnes corporis portas succum nutritium expuit. In lue venerea, quamprimum contagio ab una parte profecta Spiritus totius machinæ moderatores infecerit, succedunt dolores (spasmodici, & versatiles in toto corpore, bubones atque ulcera varia pus copiose fundentia per totam cutem. Et quidem (quantum mihi observatione notatum est) nullus morbus particularis, lethalis evadit, priusquam ex febre per totalem Spirituum inquisitionem superinducta universalis fiat: Hoc facto, statu humorum penitus everso, tota machina simul corrumpitur.

Morbos omnes universales, siue primarios, siue secundarios immediate à Spiritibus male affectis oriri, atque mediate etiam morbos partium, licet ex ante dictis sequi videatur, ulterius tamen confirmare libet. Quod ad morbos attinet primario universales & acutos, quorum primum vel insultum comitantur vehementia symptomata; Illi certe à segni humorum massa, quæque e partibus constitat crassis, & maxima ex parte motu tantum aliunde communicato præditis, in instanti oriri, concipi nequeunt, sine Spiritibus eam agitantibus; præsertim si serio perpendatur, quo modo sanguis humanus ac alii humores præparari possunt antequam aliquam insignem mutationem subire observentur. Pertinet huc, atque dignissimum est notatu, quod in principio horum morborum tota tragedia in genere nervoso agitur, antequam sanguinis massam turbare pulsus indicet, vel aliquam magnam mutationem pati. Quod quidem in variolis, morbillis & febribus cujuscunque generis quotidie conspicitur, ubi æger, primo momento dolore capitis corripitur, & levi quadam vertigine à motu Spirituum inordinato, & præternaturali fibrillarum cerebri & ejus membranarum distentione inde facta; deinde lassitudine ulcerosa, (quale symptoma fatigatis accidere solet, propter insolitam Spirituum agitationem, & transitum per membranis nimis acceleratum, & quasi explosivum, fibras ultra tonum naturalem distendentem,) frequenti etiam oscitatione, seu motu quodam convulsivo musculorum maxillam inferiorem deprimentium sæpius repetito laborat, & tandem frigore subito

per totos artus diffuso (quasi symptomati Hysterico etiam præsertim hypochondriacas a mera spirituum ~~et~~ frequenter obnoxias videre est.) Horrore item, Rigore, Motu tremulo & convulsivo Artuum, Lumbagine & motu elastico spirituum animalium prætermodum agitatorum, & e medulla spinali in mûculos propinquos explosorum, Comate, Vigiliis, deliriis, nausea, vomitu, ægrotatione universalì, quam ventriculus cum tunicis suis nervolis, velut commune sensorium, præ reliquis partibus sentit, aliisque id genus symptomatis quæ spirituum officinam, eorumque caules unice auctore deprehenduntur: Observatu etiam dignum est pleraque hæc symptomata ad incendium sanguinis subsecuturam viam iterare solere, quo jam flagrans, Ocitatio, Tremor, Rigor, Frigus intensum, plurimaque alia symptomata sponte cessant, vel saltem mitigari solent.

Similiter, in Chronicis affectibus Universalibus, Symptomata in genere nervoso morbum primo produunt. v. g. In Hypochondriacâ & hysterica passionē, quarum genus nervosum, ex omnium medicorum consensu, est Theatrum commune ubi spasmi, oppressiones gravitæ, & suffocativæ, eructationes, & borborygmi frequentes, tragœdiam agunt. Idem dicendum sit de Scorbuto, & Chloroti (quam ego jamdiu speciem esse Scorbuti particularem existinavi) sicut enim in illo per lumbagem, lassitudinem spontaneam, debilitatem crurum, Thoracis oppressionem, aliaque id genus symptomata: Ita non minus in hac, per cephalalgiam & vertiginem frequenter recurrentem, visus debilitatem, palitationem cordis, mœsticiam, lassitudinem, insolitam animi anxietatem: aliaque ejusmodi, altis se prædit. Ad confirmandum hoc argumentum dignum quidem & facile observatu est, quod cum a istis horum morborum omnia in se generant, symptomata nervosi generis aucta se tandem majori cum evidentia in conspectum dant, sibi vigiliæ pertinaces, affectus comatosi, subsultus tendinum, Tremor artuum, pulsus debilis, celer, inordinatus, &c. Idque licet incendium internum minus vehemens, tactu judice, appareat; Quæ quidem omnia quo propius fatum instat, eo intensius augeri solent.

Causæ præterea evidentes quæ ad hos morbos Universales viam iterant, Hypothesin nostram non parum suffulcunt. Nantque cuiquam in medicina mediocriter versato constat, non tantum morbos Universales Acutos, uti Febres, præsertim Pestilenciales & Inflammatorias, sed Chronicas etiam Contagione quadam propagari solere: Atqui vix concipi potest quomodo effluvia extranea eaque præ subtilitate sensus nostros plaie fugientia, & sæpe ne ad punctum temporis permanentia Characterem morbosum in Humoribus imprimant, nisi mediante spiritu animali, cujus particule subtile miasmata s. fermenta quodam heterogeneo contaminata excalescunt, & humorum molem variis irregularibus motibus facile exagitant. Deinde quot morbi Universales evidenter ab Animi Pathematibus, morore, terrore, anxietate, iracundia, vel insolita quadam & pertinaci phantasia promanant? Nec tamen ista perturbationes sanguinem alterant nisi quatenus Spiritus qui totam massam regit, motus efferatos &

avatus suas cum latice purpureo communicat. Abhinc in latione Hypochondriaca & Hysterica, nunc salserine, nunc aciditate, nunc alia peregrina qualitate sanguis imbuatur, imo raro aut nunquam scorbuto, Atrophiam, Phthisin Pulmonarem, aliosque quamplurimos morbos Universales Chronicos deprehendi ubi, cæteris causis evidentibus Melancholia, Anxietas, vel aliquod aliud gravius animi pathema non accesserit. Rheumatismi & Arthritides eos maxime affligunt qui in laeta fortuna consueverunt; At luxus sui pœnas parcius pendunt, qui cum cum hilaritate animi semper conjunctum; durius tractantur Theologi, Jurisperiti, Consilarii Aulici, &c. Qui studii intentis, & curis originem nervorum, Cerebrum sc. & Spiritus in eo hospitantes agitant. Chloroti etiam ipsam non tam a victu pravo oriri observari, quam ab imaginationis vitio, peculiaris cujusdam cibi, generis licet eucharisti, cupiditate flagrantis, a gesticulationis alicujus singularis affectatione, vel ab amore diuturno, aut alio aliquo ejusmodi pathemate animi quod spiritus nimis riget. Quam sæpe etiam Febres, Morbilli, & præsertim Variolæ ex Idea terroris in Phantasia impreca oriri soleant, satis cuius medicinz praxim exerceant notum est.

Quantum etiam Aeris Constitutio morbos Universales promovet, Medicos non latet. Neque enim tantum Febrium Pestilencialium, Variolarum, Morbillorum, aliorumque morborum Acutorum, quoties eos Epidemicos esse contingit, Aer inspiratus fons est, & origo, sed pro diversa hujus constitutione, Morbi ante dicti valde indolis sunt, & diversas Indicationes curativas suggerunt. Ab Aëre palustri vel marino, imò in cubiculo ocluso, modo quispiam sæpius in eo versetur, præsertim autem a decubitu in lecto, facie sub stragulis perperam & frequenter cooperta, ita ut aer recrementis corporis inquinatus, diu & repetitis vicibus inspiretur, quam sæpe capillos decedentes, vultum pallidum & squallidum, gingivas inflammatas & ulceratas, halitum foetentem, cæteraque signa Scorbuti, aliorumque morborum Universalium Chronicorum genuina observamus? Quandoquidem verò Spiritus Animales maximè ex parte naturam æream sortiantur, sintque vi elastica & explosiva aëri simillimi, Aer vitæ animalis conservationi summe & semper necessarius sit, spirituum generationi inserviat & eorum materiam suppeditet: probabilius longè est, Spiritus ab Aëris miasmate infectos, quam Humores, morbis, sive acutis, sive Chronicis ansam præbere. Denique quam sæpe hos morbos Universales, præsertim acutos, ut Febres, Variolas, Morbillos, à frigore in poros cutis invadente oriri observamus? At iste præternaturalis algor spirituum, qui ab extremo frigore sponte in calorem intensum excalescunt (quod in natatoribus & itinerantibus, simulac ab aquæ & aëris inclementia sese subduxerunt, videre est) à poris cutis ad spirituum officinam, cerebrum, continuatus, facilius longè corporis compagem afficit, quam si in humoribus primò imprimetur. Objiciet hic aliquis, memoratas causas non sæpius esse morborum effectrices, quam cruda & dyspepta alimenta, ideoque eorum ætiologiam a crassi sanguinis & humorum vitiosa peti posse.

posse. Diffidendum quidem non est cibum & potum quantitate nimios, vel qualitate peccantes, aque ac pathemata animi, cæteraque non naturalia, in censu causarum evidentium horum morborum habendos esse. Verum quandoquidem non tantum constat spiritus animales, quia ex sanguinis massa generantur, ideo à victu pravo ægrotare solere, sed etiam non raro à victu euchymo eoque moderatè sumpto aniam ægrotandi arripere, modò minus firma valetudine priùs potirentur; nullus dubito quin alimentum incongruum in causarum remotiorum censum referendum sit, & quòd Spiritus sint *id est* immediatum principium morbum formans, & *id est* insultum efficiens, quod quidem totum est quod hic contendimus.

In hac sententià non parum confirmabat cum pleraque morborum phænomena hoc pacto explicari posse perciperem, quæ à priscis vel intacta, vel non satis illustrata, tenebris hucusque obruebantur, imò, quicquid ad eorum solutionem ex crassis antiquorum principiis afferretur, Mihi planè gratis dictum videtur, atque (ingenue fateor) Hoc primum, animum meum anxium & incertum impulit ad hanc novam Hypothesin de ætiologia morborum universalem formandam, quæ naturam morborum clariùs explicat, & eorum causas sensui penè demonstrat, cujus rei in exemplis sequentibus specimen dabo.

Quid in enarranda symptomatum aliquot ætiologia, magis apud Priscos decantatum est quàm Sympathia sive consensus partium? Ex hæc, vomitionis à concussione cerebri, vel nephritica affectione causam reddunt, at nisi respectus habeatur ad continuitatem & nexum totius corporis cum cerebro, & origo morborum in cerebro & spiritibus statuatur, vix aliàs solvi potest hoc Phænomenon; jacto verò hoc fundamento, quòd tota machina e fibrillis cerebri elongatis & expansis conilata, ab eodem dependet, & quòd mala diathesis spirituum & eorum motus inordinati morbum ejusque symptomata formant, quam facile concipi potest remotissimam quamvis machinæ partem, & consequenter ipsum ventriculum affici posse? Absq; hac Hypothesi explicari nequit Morbi Metastasis seu translatio ab una parte in aliam, quæ non tantum in fatali Febrium Crisi evidenter apparet, ubi Morbus ex habitu corporis translatus non raro in cerebro, idque subito, figitur; verum etiam in Peripneumonia frequenter in Anginam mutata, super omnia verò in Rheumatismo versatili: præsertim spurio & nervoso, ubi morbus ab uno artu in alterum unoquoque die vel etiam singulis horis, imò nonnunquam ictu quasi oculi citius transfertur. In sanguine tota humorum massa confunditur, celeri & non interrupto motu agitur, & per vasa innumera æqualiter diffunditur, adeo ut materia morbifica tam subito separari nequeat, & ad partem aliquam singularem determinari: Spiritus autem morbo percussos, pro Genio suo volatili & versatili, alternatim jam hanc, jam illam partem, remotam licet, impetu quodam petere, distendere, vellicare vel spasmodicè constringere, ibidemque morbum hujusmodi vagum producere quid impedit? Cum sanguinem & humores per eam partem trajectos alterare valent, usque chara-

cterem morbosum imprimere; Atque hæc est ratio metastaseos morborum.

Ut cætera mittam, in Paroxysmos febrium Intermittentium, periodicè, statò & certo tempore scil. quotidie, tertio, aut quarto quoque die, ut plurimum eadem hora recurrentium, lubet inquirere. Hujus vulgaris *phænomeni* Ætiologia heu! quantum torsit, Philoſophorum ingenia non tantum priscorum, sed etiam neotericorum, quotquot omnium Morborum causas in sanguine & humoribus inveniendas esse harrolarii sunt. Qui maximo ingenii acumine freti hujusce Phænomeni solutionem aggressi sunt, Fomitem quendam humorosum, Biliosum scil. atrabiliarium vel phlegmaticum statuerunt in viscerum aliquò, aut parte corporis nescio qua delitescentem, pro genio suo jam quotidie, jam tertio vel quarto quoque die moveri, & fermenti instar, humores exagitare. At qualis tandem est hic Fomes? Humor certe, secundum horum Hypothesin, Qua parte vero stabulatur? Hic inter authores maximum est dissidium; apud alios altum silentium; Ab aliis varia assignantur receptacula, omnia vero ejusmodi, ut aliquam partem materiæ morbificæ continuo massæ sanguinis necessario suggerant. Hunc Fomitem in venis mesaraicis, uti veteres autumant, nusquam recondi ab omnibus jam concessum est, namque ex quo, sanguinis circulatio inventa est, apparet nullam dari ejusmodi (saltem materiæ à sanguine distinctæ) stagnationem in vasis sanguiferis. Et si concederetur, tamen à perpetuo sanguinis transitu particulæ heterogeneæ hujus Fomitis eluerentur, & sanguinis massæ commixtæ, eandem indefinenter inquinarent, & à perpetua fermentatione febris continua accenderetur. Non rectius iste Fomes in primis viis collocatur; cum enim chylus ex alimentis in ventriculo concoctus, & in Intestinis gracilibus ulteriùs elaboratis (per ea saltem transientibus) eliciatur, necesse est ut succus chylosus à fermento isto indefinenter depravatus, morbosam qualitatem sanguini impertiat, adeò ut morbus ex ea natus inducias dare non possit, saltem paroxysmus post singulos passus redeat.

Quod ad eorum sententiam attinet, qui minorem morbi in aliquo glanduloso viscerum latere statuunt; nullus sanè (quantum scio) locum adhuc assignavit, in quo hoc inimicum fermentum stabulari, sanis argumentis demonstrare potest, licet unus Lienem, alius aliud ex visceribus gratis inculaverit. Verum si modò, secundum nostram Hypothesin (quam uti spero satis jam ante demonstravimus) tota corporis compages, præsertim viscerum ipsorum uti Hepatis, Lienis, &c. sit vascularis, & sanguis, continuato cursu & recurſu circumactus per singularum fibrillarum tubulos permeet, qua alia parte hic fomes nisi in ipsis fibrosis filamentis delitescere potest, ubi nil, nisi spiritus animales, hospitatur? At cum isti spiritus à cerebro per totum systema fibrosum, velut per canales ad usus vitæ necessarios exequendos, indefinenter deferantur, & pro vario genio invaletudinis, qua afficiuntur, jam quotidie, jam tertio vel quarto quoque die exploduntur, & symptomata, quæ principium Paroxysmi comitantur, inferunt, nempe algorem, horrorem, &c.

Deinde

Deinde fermenti vices supplent, à quo sanguinis massa per ubrilas transiens iniecitur, & in paroxysmos febriles periodice excandescit, quoniam se sponte vel arte sedata hac effervescentia spirituum, finitur etiam Paroxysmus, atque suborta humorum in paroxysmum serie colligata, per poros cutis, vel aliam aliquam portam commodam (nec jam a calore præternaturali ut prius constrictam) prorsus eliminatur. Cui sententia quivis vel Medicus vel Philosophus favere cogetur, qui serio secum perpendit, quam saepe insultus non tantum, Hysterici & Spasmodici, paroxysmorum febrilium, saltem sub initium, plane æmuli, ex micro motu inordinato spirituum orti, intervallis licet incertis redeant; verum etiam insultus Epileptici, statim periodis, bis vel ter in Luna, vel hebdomada, ab eadem causa recrudescant.

Quid plura? Regimen ipsum à præcis Medicis imperatum, atque multo usu jam per plurima æva comprobatum, nolite huic Hypothesi ubique quadrat. In morbis enim acutis, uti Febres, Variolis, &c. Ubi in valetudo producitur à vi elastica spirituum irritata & nimis exaltata, summam quietem, decubitus in lecto, alimen- tum maxime tenue & parcum, detractionem sanguinis, &c. Uno ore imperant; una cum Julapiis, Emulsionibus & Apozematis admodum temperatis, quæ vim spirituum elasticam minime intendunt, sed potius minuant. E contra, in febribus malignis, ubi spiritus a natura veneni deleteria, ~~namque~~ quadam affectu, elasticitate & vi sua expansiva delituntur, quam uno ore usum pulverum Cardiacorum, Bolorum Theriacalium, Julapiorum cordialium, atque hodie Spiritus Salis Armoniaci, Spiritus & Salis volatilis C. C. idque posthabita febre præterente, ex indulgentia, & cum optato successu præferunt? Quæ quidem omnia, non tam legnem humorum molem, quam spiritus respicere videntur, qui primario affici solent. In Scorbuto vero, Chlorosi, aliisque morbis Chronicis Universalibus, ubi, ab agilitate spirituum imminuta, & eorum statu minus quam par est elastico, visciditas humoribus, constrictio pulmonibus, rigiditas & stupor quasi Paralyticus Artubus, contipatus obstruendusque habitus, isque evidentibus criteriis manifestus universo corpori acciderit, Exercitia frequentia, Aer tenuis & perflatus, Omnimoda animi Excitatio, medicamenta sale volatili abundantia, uti Cochlearia, Raphanus Sylvæstris, Chalybeata, Aloëtica, stimulantia omnia & hepatica, in methodo curationis utranque implent paginam. Quid hoc autem ad humores crassos nisi mediante spiritu illo animali, qui eos regit & actuat?

Quod autem ad secundam partem hujus propositionis attinet sc. Quod morbi partium, qui a peculiari aliqua ~~atque~~ partis, vel glandulæ alicujus singularis oriuntur, à spiritibus etiam mediate prodiciuntur. Ea non aequè perspicua est ac prior. Namque horum morborum Ætiologia remotius petenda est, atque ratiocinando tantum invenienda. Quandoquidem vero Viscerum vel partium singularium affectus à morbosâ humorum diathesi oriri conitat, atque (quod ex antedictis manifesto apparet) massam sanguinis, à spirituum animalium, qui ei præsident, dyscrasia, vario modo turbari & agi-

tari; fas sit conicere pro vario dyscrasie spirituum genio, jam hæc, iam illam partem, hanc vel illam glandulam, uti Jecur, Pulmones, Rēnes, &c. laborare. Indeque medicamenta specifica v.g. Antihysterica, Antivenerea, Antiscrophulosa, Antispasmodica, Pelmonaria, Hepatica, Nephritica, Uterina & si qua sint alia, ulu multo contra hos morbos experita & probata, non ejusmodi esse videntur, quæ hanc vel illam specialem partem respiciunt, sed quæ peculiarem spirituum dyscrasiam ad has partes vel glandulas afficiendas aptam, tollant. Quæ quidem remedia mihi inde specifica audire videntur, quia spiritibus, quorum morbi sensus nostros fugiunt, accommodata sunt; sicut enim ex usu Emeticorum, Catharticorum, Diureticorum, Diaphoreticorum aliorumque medicaminum tentabiliter evacuantium, mole humorum præternaturaliter colligatorum & in massa sanguinis coacervatorum subducenda satis propicietur: Ita nis specificis, Hepaticis sc. Hystericis, aliisque ejusmodi, experientia potius quam ratione primum excogitatis, & multo usu comprobatis radix totius mali funditus evellitur, quæ extra sensuum spheram in spiritibus delitescit. Quanta vero pars artis Therapeutica in prudenti usu horum specificorum versetur, norunt Medici Practici.

Juxta hanc nostram Hypothesin facile est, morbos omnes, qui incus nati, corpus humanum affligunt, in duas classes distribuere, nempe in Universales & morbos partium. Universales sunt, qui sicut è systemate nervoso, & spiritibus animalibus in eodem hospitantibus immediate oriuntur, ita totam corporis compagem uno insultu primario vel saltem secundario afficiunt. Secundario dico, quoniam morbi aliqui particulares, uti Lepra, Scabies, Lues Venerea, &c. Licet contagione ab aliqua parte singulari primum propagentur, non tamen unius partis, præ altera, labefactioni, nisi ex accidente, ortum suum debent, & spiritus animales venenoso universim inquinando citissime Universales evadunt, ideoque in censum morborum Universalium, licet secundario talium, referuntur. Morbos autem partium eos voco, qui, à gravi alicujus viscere, vel alterius partis singularis labefactione, oriuntur, utut morboia sanguinis textura, & spiritus animalis dyscrasia us ut causæ remota, ansam præbeant: Præterea quidam, morbo Universalis laborantes, brevi sanitatem recuperant, vel mortem obeunt, alii levius affecti in statu valetudinario vitam diu protrahunt, ideoque morbi Universales, in Acutos, uti Febres Variolas, &c. & Chronicos, uti Scorbutum, &c. distingui debent. De morbis Universalibus primum, postea de morbis partium seriatim (licet strictim) sermonem instituam, in quo eorum ætiologiam & Pathologiam totam, atque Indicationes curativas tradam, quod pensum, modo feliciter absolvatur, in publicum forsitan emolumentum haud parum cedit. Utcunque, satis est in magnis tentasse, & in re tantis tenebris obvoluta, faciem prætulisse & monstrasse viam.

De morbis universalibus in genere.

Radix s. semen horum morborum (sic verbo Paracelli venia) est heterogeneum quid, sensu

vix perceptibile, non raro autem vi venenata & planè deleteria prædictum, tota sua natura flamma vitali contrarium & inimicum, atque ad eam extinguendam, vel saltem suppressendam aptum; siue intus sensum generatum fuerit, siue à veneno assumpto, moriu Viperæ, vel aëre contagioso in corpus admissum. Unus quidem vis deleteria, si adeo præpolleat, ut subito flammam vitalem penitus obruere possit, Ager statim alget & lipothymicus perit, Natura contra non cessante, utpote a vi superiori jam plane evicta, quod non raro, præsertim in Constitutione aëris Pestilentiali ac Epidemia contingit. Sui verò venenum paulò remissius, & vigor spirituum animalium fortior, luctatio succedit, in qua, utut tota Corporis Machina primo insultu (vi elastica spirituum fere obruta) cum pulsu debili algere incipiat, mox Natura vires quadantenus recolligens pugnam init, cujus præludia sunt dolor leviter spasmodicus & vertigilis, Horror, Rigor, Oscitatio, cæterique motus, quibus Spiritus animalis oppressus sese iterum expandere nititur, usque dum tandem, vi spirituum elastica irritata, & supra gradum naturalem everta, Calor intensus, & febrilis orgasmus excitetur. Ab hoc calore pori cutis, sicut cæteræ Corporis portæ, irritati & oclusi, flammam intestinam acrius intendi faciunt, donec Veneni pars, à spiritibus jam victoria potitis, expellatur, vel à propria Antidoto subigatur, & tum demum, pori cutis non amplius contracti, colluviem humorum, à præternaturali calore coeliquatam, copiose diimittunt, modò per alvum, aut alio modo id non ante factum fuerit: Vel denique Natura, vi superata succumbit, Ager Spasimis, deliriis, subsultibus tendinum, aliisque diris naturæ triumphatæ & incassum colluctantis symptomatis in genere nervoso fatigatus, fatis cedit. Hæc est ratio Formalis morborum Universalium Acutorum, & symptomatum eos concomitantium.

Verum, ubi è contra fermentum morbificum, quo spiritus vel sensim ex abusu sex non Naturalium, vel subito & uno impetu a contagionis miasmate inhiuntur, vi non adeo deleteria prædictum est, ut vita in subitaneum discrimen ducatur, vis spirituum elastica inde duntaxat quadantenus opprimitur, unde sese ad munera solita more debito minus aptè expandunt, & hostis non tam aperto Marte quam inidiis vitam aggreditur. Inde evenit, quod spiritus animales, quippe minus irritati, non tam graviter & acriter contra hostem insurgant, nec certamen Paroxysmo & crisi decernunt, ut in Acutis fieri solet, verum Ager sarcinâ hæc oppressus vitam arduosam atque valetudinariam, morbo aliquo Chronico, scorbutico, Chlorosi, Febre hectica, &c. afflictam diù protrahit, cum lassitudine spontanea, stupore, pondere gravitativo Hypochondriorum, somnolentia, vertigine, lumbagine, dolore versatili, crurum & abdominis, aliisque ejusmodi signis spiritus animalis universim in genere nervoso affecti & depressi. Nec quidem Natura, hoc modo habitualiter oppressa, sarcinam hanc in totum negligere videtur, verum licet paroxysmorum nixibus, uti in Acutis, ab onere se liberare non molatur, idem tamen lentè & quasi halitu quodam, per omnes portas, per quas fieri potest, efficere tentat, se-

per Renes, ut in Hypochondriacis & Hystericis, qui tanquam Diabetici, tempore paroxysmi, insigni urinae profluvio non raro corripuntur; per sudores, Diarrhoeam, Vomitiones, quibus Hypochondriaci & scorbutici immodice plerumque tentantur; per Tussim, per Sputa-tionem largam; symptoma Hypochondriacis & scorbuticis maxime familiare, quorum saliva particulis adeo acerbis & venenatis sape saturatur, ut gingivæ & os totum inde inflammetur & ulceribus foetentibus scateat. Nonnunquam etiam Natura certamen, paroxysmi Acutorum fere æmulum, licet non statim temporibus, in his morbis instituit, quod in Paroxysmis Rheumaticis, & Arthriticis admodum dolorificis, & in Spasimis Hystericis & Hypochondriacis sape recurrentibus observatur; In quibus omnibus Natura contra hostem acriter insurgens, saburram extemplo deponere, licet incassum, satagit.

De hisce omnibus jam, calamo fusiori, differemus: primum sermonem instituturi de morbis universalibus Acutis, deinde de Chronicis.

De Morbis Universalibus Acutis.

In hac classe primum locum vendicant Febres omnes præter Hecticam & Pallidam, (utpote quæ diutius protrahi, nec more morborum acutorum, cum evidenti judicio tolerant) Deinde Variolæ & Morbilli ad eandem classem pertinere mihi videntur, quippe humores totam machinam primo insultu amittunt, respectu ad aliquam partem singularem non habito, more etiam cæterorum morborum Acutorum, paucorum dierum circuitu, judicari tolerant; Ideoque licet contra morem sit, de his morbis sub titulo febrium variolarum & morbillorum in generali febrium doctrina agam. Primus enim variolarum & morbillorum insultus, non secus ac febrium, subitus est & instantaneus, sique in genere nervoso, utpote a spirituum animalium *dragis* primum & immediate factus, cum Comate, deliriis, spasimis, vomitione inmani, dolore capitis & Artuum, lumbagine, aliisque ejusmodi symptomatis sociatus. Nec non Pathemata animi ac aërem contagiosum pro causis procatarticeis, non rarius quam alie quælibet febres, agnoscunt, & in omnibus cum cæteris febribus conveniunt, nisi quod in his, quo certamen sit brevius, eo magis durante luctatione, urgeant symptomata; Ideo sub titulo morborum Universalium Acutorum, inter Febres acutas, Variolas & Morbillos ordine tractabimus, & ab eorum Aitiologia & Pathologia, juxta Hypothesin nostram explicata, Indicationes curativas deducemus ad varia horum morborum stadia accommodatas, & quarum ope Medicus in sanandis morbis possit agere Philosophum & non Empiricum.

Exercitatio Prima. De Febribus Acutis in genere, & præsertim de Febre Ephemerâ & Intermittente. De Febribus Acutis in genere.

Febris Acuta in genere est Calor præternaturalis, in sanguine accensus à spiritu animali, miasmate quodam deleterio contaminato, & ex accidente quodam irritato, atque inde insolito more præter naturam suam expanso.

Hujus

Hujus miasmatis heterogenei descriptionem nemo sane a nobis requirat, quandoquidem omnes nostros sensus plane superat: Quippe non tantum intus ex abusu lex non Naturalium generari solet, & inde hanc vim deleteriam lentim acquirere; verum non raro ab effluviis contagiosis cum aëre inspiratis, a morfu serpentum, vel denique ab animi pathematis, momento quasi propagatur: Quocirca coniecere fas est hoc venenum, cuiuscunque naturæ sit, subtilitate sua genium spirituum, non autem materiæ sensibilis, amulari, & inde non huiores, sed spiritus animales immediate afficere atque agitare, ut ut sanguinis massa inde lentim conturbetur. Pathologia morborum acutorum hucusque tenebris obvoitur, quæntum lucis ex hac Hypothesi accedat, proximo loco videamus.

In prima Febris invasione, ab hoc veneno Spiritus animales plane obruuntur, illico totum corpus, præsertim partes extremæ algent, Pulsus in debilem & celerem mutatur, Respiratio in citatiorem, debilem & anhelosam, tanquam Ægro statim ex Lipothymia morituro: sanguinem hoc tempore, urgentibus symptomatis, detractum, frigescentem senti. Hoc stadium morbi vix unquam diu protrahitur: siquidem spiritus irritati & vires suas recuperantes sese expandunt, unde, mutata scena, Algor in calorem febrilem convertitur, nisi vel venenum sit in summo gradu malignum, vel robur spirituum adeo deficiat, ut sese brevi iterum explicare haud possint. In isto casu, primo insultui Æger succumbit. Juvenem novi paroxysmo febris tertianæ per triduum algentem, sine subsequente caloris paroxysmo, & crebris lipothymis laborantem, e vivis sublatum? Cui, præ summo veneni gradu, & debilitate spirituum prius diu lacescentium, neque frictionibus, neque calore externo quocunque modo adhibito, neque cordialium & medicaminum spirituosorum exhibitione, quicquam adjumenti afferre, nec spirituum naturalem expansionem restituere potuimus.

Quo intensius, aut diutius protractum, vel quo remissius est hoc symptoma in primo morbi insultu, eo magis minusve deleterium venenum, aut vis spirituum elastica fortior aut debilior pronuntiari potest; unde ab ipso initio morbi de eventu magis minusve periculoso & fatali hinc licet judicare.

Indicationes in hoc stadio morbi sunt duæ. sc. ut venenum deleterium spiritus obruens citissime Antidoto propria (modo ea nota sit) subigatur; & Spiritus algentes & penè enecti, ope stragulorum & medicaminum cordialium, iterum sese expandant, & subitanæ Machine ruinæ elasticitate suæ præcaveant. Manu tamen non admodum prodiga, nec nisi necessitas postulet, oportet hæc ministrari, ne post vim expansivam spirituum inde restitutam, Æger huus erroris poenas luat, aucto gradu Paroxysmi illico subsequenti. Quamprimum enim Spiritus animalis excitatus vires resumpserit, nullas sibi metas ponit, & dum veneni eliminationem molitur, non raro totam fabricam incendio intellimo consumit. Namque in isto casu spiritus ipsi incallescunt, & flammam in sanguine accendunt non prius extinguendam, quam venenum expellatur: siquidem jam mor-

bus nihil aliud est quam mala dispositio totius corporis, orta a motu inordinato spirituum, in venenum antedictum insurgentium, & novum symptomatum agmen procreantium: Inter quæ sicut gravativa & Comatosa Cerebri oppressio, & inde totius systematis lassitudo spontanea ab oppressione spirituum ortæ videntur; Ita Horror, Tremor Artuum, Jactatio inquieta, Oscitatio & Pandiculatio nihil spirituum sese expandere satagentium consequuntur. Vertiginosa autem affectio ab inordinato spirituum motu in Cerebro, ex hoc nisu & labore intentio fit, sicut & Invaletudo Universalis, præsertim ventriculi, cum nausea & vomitu sociata; Namque Vertigo, quæ usum Opi; quæ in curru vel navi vectorem aliquando comitatur, nauseam & vomitum pariter sibi adjungit. Igitur quamdiu per totum morbi cursum hæc symptomata se prodant, coniecere licet vim spirituum adhuc a veneno quodatenus opprimi, nec se satis expandere posse in præsens Machine tutamen. Atque in Febris continuæ cursu, postquam Spiritus expansi flammam in sanguine, uno tenore diu ardentem excitaverunt, si novus horror aut rigor, reliquo hujusmodi symptomatum satellitio stupatus invadat (quod non raro in praxi observare licet) nisi hoc ex mero accidenti, ab evidenti aliquâ causâ venerit, aut à mutatione typi Febris in intermittentem (quod ab horum symptomatum, statim periodicis, recrudescentiâ unice conjiciendum est) fatalem eventum præfugit, & genus nervosum a veneno recenti, aut vetere vires suas resumente labefactatum, & Naturam deliriosis, spasmodicis, subsultibus tendinum, &c. mox subsecuturis victam, manus daturam.

Indicationes in hoc stadio morbi sunt sæpe eadem cum prius memoratis, sc. ut Alexipharmacorum usu, & stragulorum ingestione spirituum expansio acceleretur, & promoveatur; donec vis veneni saltem obtundatur. Sicut enim ab auctâ spirituum elasticitate symptomata hæc vel evanescunt, vel diminuuntur; Ita etiam, ubi Æger frigori externo expositus fuerit, inexpectatam horrores, rigoris & reliquorum symptomatum recidivam patitur, quo pacto, hoc morbi stadium ultra metam solitam non raro protrahitur. Hæc vero symptomatum caterva, communiter loquendo, brevi evanescere solet, quippe quam citissime locum datura aliis numero pluribus, diutius duraturis, iisque planè contrariis, utpote a contrario spirituum statu ortum ducentibus; Modò, Algoris paroxysmo Ægrotans non succumbat. Quamprimum enim spiritus sarcinam excutere incipiant, & flamma in spiritibus & sanguine accendatur, insequuntur, in genere nervoso, Cephalalgia immanis, Vigilæ pertinaces, Deliria, lassitudo ulcerosa, dolores spasmodici hinc inde versatiles, vel in parte singulari fixi, qualis est Lumbago: Respirationis & Pulsus celeritas & fortitudo, ac mutationes in humoribus non minores. Nam Urina jamprimum tingi incipit, & contentis saturari, & Aëri exposita non raro partes nutritias præcipitare: Sitis, ut plurimum, importuna adest, os arefcit, Cutis siccescit, Appetitus prosternitur; Ventriculi digestio evertitur; Nonnumquam gradus aliquis Cholera morbi, aut saltem Diarrhoea supervenit, nausea augetur, cum

multis alijs, quorum ætiologiam ex hypothefi nostra jam daturi sumus.

Diluentio fibrillarum Cerebri, vel ejus membranarum à febrili spirituum expansione Cephalalgiam illam immanem producit, quæ febrilem calorem comitari solet, de qua Ægri præ omnibus alijs symptomatis, præsertim in principio morbi, conqueri solent. Eadem diluentio in toto corporis habitu, lassitudinem ulcerosam inducit; quale symptoma post equitationem violentam, vel quodcumque aliud insolitum & laboriosum exercitium sentimus, quoniam ab hoc motu fibras ultra tonum suum naturalem distendi accidit. Ex eodem fonte ~~istiusmodi~~ illi dorsi dolorem, Lumbaginem febris multus comitari solitam, oriri rite conjiendum est, quippe in nervos insignes ab hac parte spinalis medullæ propagatos ad ~~mus~~ Artuum inferiorum, Spiritus insistentes & ferociter explodi eos ultra tonum naturalem extendunt. Hinc etiam Dolores huc illuc versatiles febrem Rheumaticam comitari soliti, & dolores spasmodici in parte singulari fixi, in febre peripneumonica, Pleuritica, Anginosa, Arthritica, vel quacunque aliâ Inflammatoriâ, oriri mihi videntur. In febre Rheumaticâ dolores sunt versatiles, quoniam diluentio compagi musculorum laxiori accidit. In spasmodicis vero, ubi dolor in parte singulari fixus est, explosio contingit in compage tendinum, & membranarum striciori. At de hoc postea fusiùs in capitibus de Febris Inflammatoriis & Rheumaticis. In Vigilis permacibus & delirijs Spiritus violenter moventur; In Comate a veneno deprimuntur; atque inde Coma expertis Medicis præsagium magis funestum suggerit, quam vigilæ: Namque ab incendio intestino non tam citamors expectanda est, quam a summo gradu veneni quod spiritus maximo conatu subigere sæpenumerò nequeunt. Denique robur & magnitudo Pulsus & Respirationis cum orgasmo febrili sociari solita, eidem spirituum expansioni debetur, atque inde abhinc de spirituum robore, de veneni progressu, & consequenter de febris genio, vel benigno, vel maligno, & de eventu ejus, vel salutari, vel funesto certissimè judicari potest.

Inter Humorum symptomata, semper ferè observatur, quòd Appetitus prosternatur, & Alimenti assumpti subactio admodum difficilis reddatur, adeò ut Febricitans vix quicquam appetat, & nihil præter potulenta, eaque tenuiora digerat; Quod a fermento ventriculi everso, & alterato fit, quippe fermentum illud per glandulosam ventriculi tunicam secretum ad alimenta maceranda, è malsâ ipsâ sanguinis ministratur, indeque, pro præsentis statu sanguinis, non potest non alterari, neque munere suo iterum fungi, donec sanguis deforbuerit, & in statum pristinum redactus fuerit. Similiter Cholera Morbus, Diarrhœa, Nausea, & ad vomendum propensio aucta, quæ hunc statum morbi comitari solent, à vitio succi glandularum ventriculi & Intestinarum è malsa humorum morbosorum secreti, producuntur; sicut & sitis ingens à salivâ male dispositâ, Oris ariditas, & Cutis siccitas à glandularum salivalium & cutanearum constrictione, ex calore febrili in humoribus accenso, efficitur: Denique Tinctura Urinæ rubra, & copia contentorum ex eadem

precipitari solitorum, ab eodem calore dependent; Inde enim partes sanguinis biliosæ incassantur, atque poris glandularum Hepaticarum à spasmodica exandescencia spirituum contractis, non amplius libere secerantur, vel in vesicam felleam, vel in porum biliarium; sed in sanguine coacervata, sero per renes secerando sese adjungunt, atque urinam intensam rubescere tingunt: Ista sunt particula una cum nutritiis, quæ, si urina Aeri exponatur, precipitantur, & eam conturbant.

Modo Venenum, omnium horum symptomatum lons & origo, ab Antidoto propria subigatur & uretur, (quod jam solummodo Indicatur) Febris Augmenti Status, & Declinationis tempora non percurrit; & sine Crisi sensibili, redit Appetitus & concoctio, Pulsus, Respiratio, Urina, &c. statum naturalem acquirunt. Hæc certa, tuta & jucunda, & eâ de causa optatissima, imò radicalis curandi ratio mihi videtur. At, cum Venenum, in Continuis, & Malignis Febris, nullis Antidotis, quæ nobis innotescunt, superari potest, Medici est rem gerendam Naturæ committere, & ubi non minus periculum intenditur ab incendio in humoribus, ex insorta spirituum expansione, quam à Veneno, pro vario statu morbi, atque symptomatum inde natorum, Naturæ succurrere, sive Enematis, Venæsectionibus, Emulsionibus, Opiatis, aliisve medicamentis orgasmum sanguinis compescendum, sive Vigiliæ, Dolores immanes, Inflammationes, Excretiones, aliæque hujusmodi præsentis incendii pericula præveniendâ judicet. Ideoque per totum cursum morbi, jam hoc, vel illo modo, Indicationes curativæ, pro re nata, variandæ sunt. Verissimum quidem est spiritus, Veneno non valde maligno oppressos, sese ita aliquando expandere, ut hostem primâ luctatione vel fugent, vel sopiant, & inde ~~derogant~~ & quiete potiuntur, donec, à veneni reviviscencia, novum certamen instituantur, quod in Febris Intermittentibus, imò quædamtenus in Remittentibus seu ~~remittentibus~~ conspicere licet. Atque hujus Veneni (modo Natura sibi ipsi non subveniat, absque suppetitis medicinalibus) Antidotus Herculeæ, sere omnibus nota in promptu est, sc. Cortex Peruvianus, à cuius iusta dosi tempestive exhibitâ, illico ~~stiger~~ in statum sanitatis reduci solet. Sin vero, præ gradu veneni summe deleterii, vires hujus febris fugi plane superentur (quod in febris vere ~~zudicant~~ & malignis quotidie contingit) Natura, continuatâ spirituum vibratione indies magis magisque ad extremum usque gradum aucta, venenum live intus natum sive ab extra, contagione communicatum, eliminare molitur, in eo morbi stadio, quod Augmentum vocatur. Quo durante, sicut flamma febrilis, parili gradu, in sanguine intensior indies accenditur, ita Cephalalgia, Sitis, Vigilæ, Tinctura Urinæ, & in Febris benignis, Fortitudo Pulsus, una cum reliquis symptomatis a calore aucto provenientius sensim crescunt; Necnon, ab Inflammatoriâ humorum acrimonia ulterius exaltata, Aphthæ suppurulant Albæ, vel, pro genio veneni magis deleterio, Nigræ, prout salivam e sanguine magis minusve venenato secerni contingit. Eadem acrimonia, dum ventriculum vellicat, Singultum, dum musculos, membranas, vel partes glan-

glanduloſas impetit, Dolores Rheumaticos, Pleuriticos, Phreneticos, Anginoſos producit. Et hic quidem indicantur ea omnia, quæ humorum organiſmum continere poſſint, Julapia admodum temperata, diæta tenuiſſima, ſumma quies in lecto ſtragulis paucis cooperto in loco tædicoſo, &c. quæ tamen caute admodum adminiſtrari debent, ne inde reſreſſi Spiritus in poſterum impares veneno eliminando reddantur.

Sin è contrà, Spiritus jam ſuccumbere contingat, atque Febriſ cum præproprio ſubſultu Tendinum, Delirio, Comatoſo affectu, aliſque veneni Eſſerationis Symptomatis, Malignitatis ſpeciem induerit; viſ ſpirituum expaſſiva ſpiritibus volatilibus C.C. Sal. Armon. Cardiacis & Alexipharmacis, præſertim Suppedaneis acerbis, & frequentibus Veficatoriis excitanda eſt; Diæta quadantenus diſſor induigeatur, uti juſculum pulli, &c. Ager e lecto nonnunquam transferatur in aërem cubiculi clarum & apertum, ut ſpiritus laſius expandantur, & ſeſe à ſymptomatis malignis liberent.

Ubi verò, Spiritus jam ſenſim, ultimis conatibus ſe dilatant Status Morbi incipit, quem ſæpenumero per plures dies protractum conſpicimus, antequam Natura vel vincat vel viſcatur, calore febrili una cum omnibus ſymptomatis, uno tenore, fluentibus. Ideoque non multum nunc a Medico, abſque urgente neceſſitate, moliendum eſt, verum totum negotium Naturæ ſoli, & Patiens regimini debito committendus eſt, niſi quod temperatis Cardiacis jam viſ ſpirituum fovenda ſit, non Opiatis & refrigerantibus, multò minùs Venæſectione opprimenda.

Quamprimùm verò Natura Venenum intus deliteſcens excutere & ſubigere, in agone ultimo, ſemel tentaverit, non diu res manet in æquilibrio, verum Cris ſiſtat, Naturæ quam citiſſimè triumphatura vel triumphanda. Siquidem, cum primùm à ſubactione veneni incepta, Natura quadantenus ſuperior evaſerit, calor febrilis illico mitigari incipit, atque ſymptomata inde provenientia diminui, uti Vigiliæ, Deliria, &c. Pulſus fortior, & nimis celer ſentitur, atque Reſpiration liberior, Aphthæ decreſcunt aut ſaltem colorem in melius mutant. Emonctoria corporis calore priùs conſtricta reſerantur, atque lymphæ inutilis & effata, in habitis corporis priùs congeſta, quæ datâ porta, liberè eſſunt: Cum per Renes excernitur, Urina priùs paucæ, tenuis & ſtraminea; jam copioſa redditur, contentis ſaturata, vel ſaltem hypochreſin aut encephalæmæ dimittens: Cum per poros cutis emittitur, Sudores ſunt univerſales, neque calidi & ſatis copioſi, & cum tolerat. Cum e ductibus Salivalibus, Rivulus Lymphæ ſanæ os collinit, Aphthæ abſterguntur, brevi ſaneſcunt, & ſitis exſtinguitur. Nonnunquam Cris ſit per glandulas Inſteſtinarum, ſuperveniente Diarrhœa micti, & cum nullis torminibus ſociatâ. Quæ quidem Cris, in Febribus Benignis & merè *venæ*, ſicuti cum agone evidenti, & agitatione extremâ totius Machinæ accedit (quod à Jaſtatione, Anguſtiâ pectoris, Sciatiſlatione oculorum, Hæmorrhagiâ narium profuſâ, &c. præcedentibus concludere licet,) ita brevi finiatur, Egro ſpatio paucorum horarum cum *anæſtheſi* placidum ſomnum capeſcente.

Sudores in hoc morbi ſtadio erumpentes non Criticos, verum reâpte Effectum & Signum Criticos inceptæ ritè æſtimo, quippe primum ſolutum morbi, non in maſſa humorum ſenſibili; ſed craſi ſpirituum morboſa deliteſcere ex antedictis ſatis conſtat, Atque uti ex uſu Remediorum Diaphoreticorum & calidorum, urgente adhuc febre, perperam exhibitorum, poro cutis à calore aucto plus conſtringuntur, ita in Malignis febribus, & maxime periculofis (ubi præ gradu veneni intenſo ſpiritus oppreſſi ſummam in maſſa humorum accendere nequeant, quæ poro conſtringuntur) non raro conſpicimus Aërium, per totum curſum morbi, ſudoribus coliquativis, Diarrhœa, aliſque evacuationibus conſectum; Quæ inde ſymptomata apud veteres audire ſolent, & parili gradu, quo augentur, ſummam præſentem minantur. Et quidem in articulo Mortis, ubi jam à veneno prævalente ſpiritus enecantur, & expaſſivâ ſua facultate privantur, cum ſtamina nativæ, quæ ac præternaturalis exſtingui incipit, ſolutus poro calore priùs conſtrictis, quam immenſis ſudoris rivo Ager madefactus animam emittit? Unde concludendum eſt, ſudores, cujuſcunque generis fuerint, immediate dependere à laxitate pororum; ſive ſpiritus à veneno diminuti (ſicut accedit in ſymptomaticis & coliquativis ſudoribus) poros amplius conſtringere non poſſunt, ſive febrili calore in ordinem redacto, poro ante conſtricti naturalem laxitatem recuperant, quod ante ſudores criticos evenire ſolet; qui non inde Critici æſtimari debent, ac ſi per excretionem lymphæ cujuſdam (quæ totus habitus corporis adhuc inſeritur) Cris ſieret; verum quatenus ſunt Criticos, per ſpiritus ipſos eſſectæ, ſigna Diagnosticæ. Cutis nimirum horum ſudorum, inſtrumentum eſt nerveæ membrana, & ad nutum ſpirituum animalium poros ſuos ſacillimè contrahit & dilatat, ſicut in ſudoribus ſubitanis perturbationes animi inſignes comitantibus, videre eſt. Et in quâvis parte corporis ſudore madidâ ſi frigido aëri exponatur, ſtatim enim cutis inſtar aſſerinae pellis contrahitur. Nec frigus tantum, verum etiam nimis caloris gradus horum pororum conſtrictionem ſpasmoticam interte valet; ſicut enim liquorum frigidorum ingurgitatio ſudores non raro provocat, ita e contra, ſpiritus vini & calidorum potatio eodem temperat ac diminuit. ſpiritus enim temperamento moderato, inter calidum & frigidum medio præditi ab utriuſque qualitatis extremo gradu in ſpasmis aguntur, & inde poro cutis à calore & frigore extremo pariter conſtringuntur.

Febrium Malignarum Cris uti ſenſim & ſine notabili apparatu ſit, ita cardius præcedit, & tandem, plurius dierum circuitu abſolvitur. Sub initium vix percipitur, niſi ex Urinæ copiâ & Tincturâ auctâ, unâ cum Hypochreſi aliquali, ſudoribus levibus indies recurrentibus, micti Diarrhœa, vel Salivatione, &c. quippe prout venenum intus deliteſcens à ſpiritibus adhuc quadantenus oppreſſis ſenſim ſubigitur: Itâ calor febrilis una cum deliriis, ſpasmis, ſubſultibus Tendinum, &c. ſenſim diminuitur, atque liquor effectus. priùs congeſtus, per Cutem, Renes, Hepar, ductus Salivales, glandulas Inſteſtinarum, &c. protruditur.

Durante Crisi, utrum illa fuerit Acuta, vel tarda (quæ etiam veterum sententia fuit) absque urgente necessitate, nil moliendum est. Expansio iusta spirituum unice Julapii Cordialibus admodum temperatis, dicta quadantenus ditiori e iuculo pulli tenuiori, atque regimine in cæteris debito fovenda & sustentanda est. Sicut enim à cardiacorum quantitate nimia, vel qualitate incongrua, modo ea perperam jam exhibeantur, spiritus prius nimis expansi, jamque ulterius incitati ferociter intavire solent, Atque Hæmorrhagiis, Sudoribus immanibus aliisque id genus colliquationibus Aërium prius debilem attingere, aut calorem Hecticum accendere, quo pœnas erroris diuturnas, post Crisin Febris acutæ patiens luat; Ita ab Opiatis, Catharticis, magis verò ab Emulsionibus, Julapiis vel Apozematis refrigerantibus, & maxime à Venæsectione, absque urgente necessitate, celebrata, non raro contingit Morbum illico recrudescere; Cum enim expansio spirituum hoc modo intempestive, & perperam præpediatur, Venenum sese in tantum recolligit, ut Natura, jam debilitata, victoriam pene partam vix aut ne vix reportare possit. Quo nomine vehementer oro obtestorque omnes artem medicinalem exercentes, ne, in hoc articulo Morbi, absque urgente necessitate, proprii lucri, vel famæ causâ, quicquam moveant, vel quidem tentent, imo, quoties necessarium videatur vel fræno vel calcaribus uti, ut, cum summâ cautelâ, & parçâ manu, id faciant; satius enim est Aëros à morbo quàm à Medico trucidari.

In ultimâ harum Februm Scenâ, ubi Natura Veneno victa manus datura est, ubi adsunt dirissima nervos generis symptomata, cum Respiratione suspiciosa, pulsû tremulo, urinâ clarâ & stramineâ. & madore frigido per totam machinam diffuso præter caput, quod jam intus calefcere solet, modò quicquam adhuc tentandum restat, unice indicatur copiosus usus Alexipharmacorum, Spirituum Volatilium, acrium Suppedaneorum, atque frequentium Vesicatoriorum. ut, ex inflammatione artificiali, spiritus animales languentes & oppressi tandem resuscitentur, quomodo plurimos ab Orci fere faucibus revocatos novi.

De Febre Ephemerâ sive Diarâ.

Supervacanea forsan videatur de hac Febre dissertatio, utut succincta, cum ultro, absque artus nostræ auxilio, spatio 24. horarum finiri soleat. Quandoquidem verò Pœtologia in genere; atque præsertim hypothesis nostra de causâ febris Continente & immediatâ, inde quadantenus illustrari possit: Necnon, quia ex venenatis principiis prius in spiritibus delitescantibus, & jam in actum erumpentibus, vel ex malo regimine, haud raro contingit Febrem Ephemeram in Intermittemtem, Continentem, aut Malignam ipsam transmutari; Operæ pretium erit, brevi, de genio & eventu hujus Febris observationes nostras subnectere.

Febris Ephemera est, quæ immediatè à merâ agitatione, & motu spirituum animalium nimio, ab evidenti aliquo externo accidente, siue apparatu venenato, producit, ideoque, legitime tractata, spatio 24. horarum sponte sæpenu-

mero terminatur. Spiritus nimirum diu agitati, sese, pro tempore, more febrili expandunt, ac si à veneno aliquo intus nato perciti; indeque massam humorum tandem accendentes, superinducunt Pulsû celerem, Sitim, Dolores, Lumbaginem, Lassitudinem ulcerosam; Rigores incertos, atque id genus symptomata febrilia.

Causæ Procatareicæ & Evidentes sunt Insolatio, Equitatio, siue quævis alia exercitia laboriosa; vigiliæ diuturnæ, studia intensa, & alia quævis Pathemata animi graviora, ingurgitatio multa liquorum spirituosorum, cæteraque ejusmodi, quæ nisi motum, & fervorem insolitum in spiritibus efficiendo, eos in lummam, licet accidentalem, expansionem adigunt.

Indicantur unice quietus admodum in lecto decubitus, atque somnus, quo spiritus, non amplius jam agitati, sponte (sensim licet) in statum naturalem redigi queant. Quo factò, Flamma in sanguine illico exstinguitur, & Febris cum omnibus symptomatis, cessat, Aëro tandem madore undiquaque perfuso, sero per calorem febrilem colliquato, & jam per poros cutis, non amplius fervore inimico contrictos, copiose excreto.

Durante Flammâ febrili, tenuis ac parca dicta instituitur, æque ac in aliâ quâcunque Febre; Copia enim cibi vel potus ingesta, antequam Ventriculi fermentum restituitur, vix minus quàm veneni in nervis delitescantis exsuscitatio, hanc febrem extendit, eamque mutat in Intermittemtem vel Continuum, eamque aliquando malignam; & tunc novæ Indicationes curativæ exsurgunt, quæ in reliquis hujus Pœtologiæ capitibus continentur. Ex dictis constat nullum esse *verum* Pathognomicum hujus Febris, unde ante horas 24. certò dignosci possit, nam si unius diei limites hæc Febris excedat, Typum atque nomen novum libi asciscit.

De Febre Intermitte e jusque causâ, Typo & Symptomati.

Febris Intermitte est calor præternaturalis in sanguine accensus ab insolitâ spirituum expansione, statim periodis, quotidie sc. tertio vel quarto die, vel sæpius redeunte, pro genio Veneni eam efficientis, unde Quotidiana, Tertiana, Quartana simplex vel duplex audit. In hac Febre Algor, Rigor, Calor, & Sudores sese vicissim excipiunt: Nec absunt Aëritudo universalis, Nausea & Vomitus, Dolor Capitis, Lumbago reliquaque ejusmodi symptomata.

Quid sit hoc Venenum (siue id intus natum fuerit siue ab extrâ admissum) haud facile est explicatu, quia sensus omnes nostros planè superat atque fugit, æque ac spiritus ipsi qui eo imbuuntur. Ideoque satis est ejus realem existentiam à posteriori seu effectu probare, sc. à veneni symptomatis quæ in morbo inde formato sese prodere solent, quæ non raro eadem sunt cum iis, quæ à veneno sensibili oriuntur, uti Lipothymia, Vomitiones immanes, Aëritudo universalis, dolores spasmodici, &c.

Verum, fermentum venenatum hujus Febris (quicquid sit) mite admodum videtur præ fomite Febris cujuscunque alterius: Spiritus enim eo imbuti, quàm citissimè, vi suâ elasticâ jam exsuscitatâ, in tantum sese expandunt, ut spatio 24. ho-

24. horarum venenum subigere valeant; necnon Venenum vires Antidoti vulgaris Corticis sc. Peruviani, brevi, agnoscit. Intusper, Fortitudo pulsus, profunda tinctura urinae, Gradus caloris febrilis, immanis Vomitus, vel Diarrhoea, profusi sudores, una cum citissima exacerbatione omnium symptomatum ceterorum; sicuti Spirituum tortem expansionem probant, ita etiam genium veneni minus deleterium, & spiritus agitato, potius quam oppressos esse arguunt.

Argumentis, quæ in Hypothesi nostrâ generali attulimus, pensatis: Nemo (opinor), fermentum hoc venenatum in receptaculis, visceribus aut recessibus nescio quibus, ad mentem veterum collocabit, verum in gremio spirituum delitescere, atque statis periodis, pro genio veneni, reviviscere concedet, præsertim cum omnes coniteatur fomitem insultuum Hystericorum & Epilepticorum, qui non raro statim tempore, sicut Intermittentium februm paroxysmi, repullulant, in nervis contineri.

Causæ procaciter hujus miasmatis, saltem evidentes, sunt Frigus ab ambiente aere, vel a decubitu in terrâ sub Dio, ex quo Spiritus animales saltem in qui in extremis plexibus fibrarum & nervorum cutaneorum hospitantur, algentes, tonum suum naturalem quadantenus amittunt, unde œconomiam spirituum illico everti contingit. Aer item externus, præsertim Pustulis vel Autumnales inspiratus, & cum spiritibus commixtus, particulis heterogeneis & venenatis ita nonnunquam refertus est, ut Febres Intermittentes non aliâ de causâ in locis palustribus & oris maritimis Endemix fiant, atque Autumnales tempore ferè ubique Epidemicæ evadant. Fatendum tamen est à cibo domesticis subito terrore, ceterisque animi Pathematis gravioribus, non raro hoc venenum exaltari, & nullus dubito, quin à longo abusu sex rerum non naturalium hoc Venenum, ut plurimum, intus nascatur, utur ab externis evidentibus causis in actum ducatur; unde evenit quod ab iisdem causis externis non omnes parili modo Febre Intermittente afficiuntur.

Ubi ab energiâ Veneni prius intus delitescens, jam vero à causâ aliquâ evidente exaltata, Spiritus quasi opprimantur; flamma vitali, ferè extinguitur, pulsus fit celer, oppressus & debilis; Urina tenuis & Pallida, Cerebrum grave & Comatosum, Algor etiam totam machinam invadit, qui præsertim prope Spinam dorsali, e qua Spirituum animalium canales propagantur, atque in naso & extremis artubus lentitur.

Quamprimum Spiritus cum veneno manus conieuerunt, luctationem inceptam esse vertiginosus Cerebri affectus prodit: Sequuntur autem in reliquis machinæ partibus Vomitus, Oscitatio, Manducatio, Jactatio inquieta & suspiriosa, Oppressio Hypochondriorum gravata, Respiratio anhelosa; Horror & Rigor universalis, donec flamma in sanguine accendatur, à qua Pulsus fortis & celer evadit, Urina rubedine tingi incipit à Bile, præ calore, inspissata, & in se in sanguine coacervata; necnon contentis plus debito saturari à particulis chylolis eadem de causâ colligatis, & in sero præcipitatis. Incalescit totum corpus, & maxime

Artus extremi, qui siccescunt quia pori cutis à calore contrahuntur: Sicis adest, vel quia papillæ salivales contrahuntur, vel quia saliva, ab ebulliente sanguine secreta, miti suâ & leniente facultate exiit. Cephalalgia meningis, tum quoque partes spirituum vicinas, Lassitudo ulcerosa universos fere mûculos ac totum genus fibrosum torquet, imò ab insana distensione mûculorum quorundam maxime debiliun, spiritibus immaniter explosis, non raro oriuntur dolores spasmodici horrendi, sique huc illuc versatiles more Rheumaticorum; vel in membranis compage strictiore donatis fixi, Pleuriticorum, Colicorum, Choleriæ, &c. Amuli, una cum copiosis vomitionibus aut fluxibus alvi, quoties acrior lymphæ colliquata, e sanguine ebulliente in ventriculum aut intestina confertim excernatur. Idem perturbatus spirituum motus pertinaces Vigiliæ infert, & Deliria, durante Paroxysmi febrilis vigore, atque multorum aliorum symptomatum satellitio itipatus est, quæ nunc recensere longum foret.

Hæc molesta symptomata ad 7. 10. 12. aliquando 24. horas durare solent, & circa finem Paroxysmi vehementiora fieri. Primum insultum hujus Febris, præsertim ubi parvulus ea corripitur contigerit, per triduum vel quadratum protensum, typum Febris continet pro tempore indunt, non raro me observasse memini: Namque, pro genio veneni, citius aut serius Paroxysmus solvitur, & symptomata cessant: Quamdiu autem venenum intus delitescens viget, Paroxysmus elongatur, augecentibus symptomatis, donec, ultimo tandem conamine spirituum, veneni vigor subigatur, aut saltem sopiatur. Hoc facto succedunt sudores: Et deinde ~~durat~~ ^{durat} quæ eo usque durat, donec veneno, de novo reseruescente, spiritus recens irritati, certamen iterum instant, atque inde Paroxysmus febrilis iterum formetur, cum symptomatis prius memoratis, & impensa Naturæ novæ. Siquidem hujus veneni indoles peculiaris est, atque ab omni alio fermento febrili planè diversa, licet enim, extrema spirituum expansione in singulis Paroxysmis facta, ejus energia planè vincatur, & subigatur, intus tamen adhuc delitescit, novas tragedias daturum, usque dum ab arte vel Natura miasma febrile non tantum subactum, sed & penitus eliminatum fuerit. Quippe mensuram durationis cujusque veneni, quod fomitem hisce febribus ministrat (ut mihi videtur) Natura ipsa determinavit, quod exinde, licet ab usu propriæ & potentis Antidoti, aut præpollenti & frequenter repetita spirituum expansione, per plures hebdomadas vel menses subactum videatur; à levissima occasione, imò non raro absque evidenti causa reviviscere solet, donec metam durationis à Natura constitutam attigerit. Hoc facto, vel sponte exultat Fermentum, vel à copioso & repetito Antidoti usu, aut ab expansione spirituum satis valida, Natura hoste superior facta vires veneni prorsus prostermit.

Hic mihi Corticis Peruviani justa defensio suscipienda est. Cui salutifera Antidoto à ~~phlogistone~~ ^{phlogistone} ipsa in levamen ærumnarum vitæ humanæ plurimarum divinitus concessæ convitium faciunt Adversarii, quia febrile fermentum inde subactum, sæptenarum post hebdomadas, vel

saltem

saltem menses aliquot revirescere solet. Quum reverà hocce fermentum (quicquid sit) durationis suæ spatium fixum & determinatum habeat, jam brevius, jam longius, & sæpius ad plures menses imò & annos protensum, adeo ut, priusquam hic Fomes metam suam ultimam attigerit, Febris inde orta, quocunque modo curetur, sive alio quocunque Arcano, sive more methodico sc. Venæsectione, Emeticis, Catharticis, Epithematis, Pericarpis, Diaphoreticis, &c. (Modò hæc unquam scopum attingant) vel Naturæ solius viribus, (quod non raro fit æstivo tempore, cum ex appropinquante sole vis spirituum expansiva multum foveatur & augetur) non rarius tamen Ager recidivam patitur, quàm si Antidoto magna usus fuisset. Indeque Februm recidivatio soli Cortici imputanda non est, potius jure latandum nobis est, quòd Remedium istiusmodi possideamus, quo Naturæ diu oppressæ & attritæ, quoties libuerit, succurrere & fatalem hujusce morbi exitum præcavere possimus, utut à curatione aliquando repullulare soleat. Quinetiam, nescio an non à frequenti, atque post justa intervalla repetito ejus usu, eradicatio fomitis ipsius venenati accelerari queat. Certè revirescentia Morbi Cortice curati, non à medicamento, sed Medico vel Aegro accepta referenda est; præsertim ubi jam vii pretio, magnum hoc Remedium comparari possit, & à liberali ejus usu nunquam quicquam detrimenti ægros passos esse, quantum ego scio, hæcenus observatum est; at à nimis parca ejus dosi hoc incommodi accidit, quòd Morbus exinde vel in propria, vel, Protei instar, in alia forma ad revirescendum aptus natus sit.

Quancumque febrilis Paroxysmus Acutus sit, Morbus tamen ipse, quicunque fuerit ejus Typus, Quotidianus, Tertianus, Quartanus, simplex scil. vel duplex, est serè semper plus minus Chronicus, duraturus usque ad perfectam eliminationem venenati miasmatis, quocunque modò id tandem fiat. Fermentum enim hujusmodi Februm (quicquid è contrà veteres senserint) exinde mihi videtur non multiplex, sed unum idemque esse; quia hæc febres (præsertim ubi diu duraverint) typum suum absque aliqua evidenti causa mutare solent, atque Febris quæ jam legitima Tertiana audit, post unam vel alteram hebdomadam Quotidiana, Hemitritæa, imò non raro Quartana evadit, & vice versa. Quid? quod semel observavi, hujusmodi Febrim, ex malo regimine in Malignam Petechialem admodum periculosam degenerasse? Cujus curatio, maxima ex parte, liberali usu Corticis Peruviani absolvebatur, genio veneni primarii id suadente. Præterea fermentum cujuscunque Febris Intermittentis viribus Corticis Peruviani indifferenter cedit; Et observata facile est, unciz uni Chinæ-chinæ ipsam Febrim Quartanam, absque apparatu Apozematum deobstruentium à veteribus decantatorum; atque solennium Evacuationum, æque citò & certò locum cedere, ac simplicem Tertianam, Quotidianam aut quancunque aliam hujus generis vel levissimam.

De Signis Febris Intermittentis Diagnosticiis.

Febris Intermittentis in genere, aut Quoti-

dianæ, Tertianæ, Quartanæ, Hemitritææ in specie, genuinæ scil. signa Diagnostica & pathognomonica enarrare supervacaneum mihi videtur; cum ea ex Paroxysmorum diligenti observatione, nisi Febris Intermittens typum alterius morbi induerit, cuius innotescant & symptomatis prius descriptis, Atque symptomatum Diagnosticatorum Ætiologia vera & satis luculenta ex antedictis peti possit. Verum quandoquidem aliquando accidit, ob vehementiam symptomatis alicujus singularis cetera omnia in tantum superantis, ut Algor, Horror, Calor, &c. Non tantum Aditantium sed etiam Aegri ipsius sensum plane fugiant, Ager de hoc vehementi symptomate unice conqueratur, & durante Paroxysmo, tractari postulat methodo, ipsi morbo, sub cujus larva Febris jam latitat, debita; ejus tamen revirescentia vix aut ne vix præcaveri possit absque Cortice Peruviano, vel alia (siqua sit) Antidoto in Paroxysmorum intervallis exhibita; operæ pretium mihi videtur hujus Protei varias formas, saltem quæ mihi adhuc innotuerunt, enumerare, quin & criteria subicere, unde dignoscantur à veris ipsis morbis quorum typos mentiantur.

Quancumque multa arte genum suum aliquando dissimulent Febres Intermittentes, certo certius tamen ex Urina (quæ jam multum tincta est, contentis saturatur, & sedimentum præcipitat colore plus minus lateritio, ut in verè Intermittentibus serè semper fit) atque ex stasis Paroxysmorum, & lucidorum intervallorum periodis, & periodica horum symptomatum exacerbatione & remissione, deprehendi & dignosci possunt.

Ita in aliqua parte Meningum, spiritibus inibi veneno agitaris & explosis, Hemisphericam intollerabilem subortam sæpius observavi, eamque post certas & itatas periodos, quotidie ut plurimum, recrudescere solitam, verum absque aliquo solenni Algore, Horrore, Calore & Sudore, qui sese alternatim excipiunt in Intermittentibus legitimis. Urina vero multum tincta & contentis saturata, speciem Aquæ cum pulvere lateritio commixtæ semper præ se ferebat. Morbum sæpè incallum frequenti venæsectione in Jugulari vel ejus ramulis celebratâ, atque æque frequenti Epistapticorum applicatione, usu Cephalicorum omni genorum, Erithinorum, Matticatorum, &c. curare tentavi. Verum Emeticis, Catharticis lenioribus, Chalybeatibus, Antiscorbuticis, &c. Ad mentem veterum exhibitis, aciendo & turbando Spiritus, eam semper auxi, donec tandem experientiâ didiceram, usu copioso Corticis Peruviani Venenum Febrile, doloris hujus fomitem, penitus posse subigi.

Parili modo, à præpollenti vi veneni hujus febrilis Cerebrum & origines Nervorum circumquaque obsidentis, atque spirituum dispensationem præpedientis, iterum iterumque Apoplexiæ symptomata observavi, certo tempore, tertio vel quarto quoque die recurrentia; sc. profundissimum somnum, stuporem & stertorem, Urina interea (uti solet in Febribus Intermittentibus) semper rubedine multum tincta, contentis saturata, atque, cum aëri exponeretur, ad præcipitationem sedimenti lateritii valde proclivi. Hos Aegros, durante Paroxysmo, methodo Apoplexiæ debita, copiosa sc. Venæsectione.

sectione, Epispasticis frequentibus, Emeticis atque Catharticis acrioribus, sternutatoriis, Cephalicis, aliisque ejusmodi Remediis stimulantibus, cum felici successu, excitare satagi; nunquam verò revirescentiam Paroxysmorum præpedire potui absque China-China, in intervallis lucidis, manuliberali, idque confertim ministrata. A quo tempore, Ægros, quamvis ab Apoplexia liberatos, sæpius tamen diuque recrudescentiæ Paroxysmorum Febris Intermittentis obnoxios observavi, unde de origine & vero Fomite hujus morbi Apoplexiam veram mentientis non amplius dubitavi.

Centes observavi Colicam Ventriculi, vel intestinorum, Pleuritidem acutissimam & verè spasmoticam, Rheumatismum universalem, vel particularem, Febrem Scarlatinam, Erysipelatofani cum symptomatis Pathognomonice intensissimis, ab expansione explosivâ spirituum hoc veneno nimis irritatorum, orta fuisse. At ista symptomata statis periodis redibant; Urina reddebatur, qualis in Febribus Intermittentibus apparere solet: Et has febres, cum vel sponte suâ, vel arte coactæ larvas deponunt, China-chinâ citò semper, & feliciter curare soleo.

Denique, quoties hocce venenum, vel Emeticum & Arsenicale vel Catharticum est, vel simul utramque evacuationem inducit: Morbus induit Typum Cholerae morbi, Diarrhoeæ torminosæ, Dysenteria, vel simplicis Vomitionis. Verùm statis periodis revertitur, vel saltem exacerbatur, atque semper Urina rubra & turbata est, ac si pulvis laterum cum Aquâ confunderetur; & qualis in Febribus Intermittentibus semper conspicitur. Hic verò, licet Paroxysmos Laudano sæpius repetito, Enematis, Aqua Pulvis copiose propinata, aliisque ejusmodi debita methodo ministratis curavi: Revirescentiam tamen Paroxysmorum vix unquam absque liberali usu China-chinæ cum Laudani moderatâ dosi commixtæ, & frequenter remissionis tempore exhibitæ, præcavere potui. Ubi verò à Corticis justa dosi venenum hoc Emeticum vel Catharticum subactum fuerit, colluvie humorum colliquatorum versùs ventriculum & Intestina jam minus tendente, facillimè cum, vel absque Laudano horrendæ istæ excretiones ultrò cessant: Aliquas Historias & plurimis aliis selectas, in majorem sententiæ nostræ & Praxeos elucidationem, atque confirmationem, in fine hujus exercitationis subnectere non pigebit.

De Febris Intermittentis Prognosticis.

Prognostica quod attinet, illa duntaxat proferre lubet, quorum veritatem longus usus & experientia comprobavit, & quæ sunt principiis nostris prius stabilitis conformia. 1. In uno eodemque Paroxysmo Febris Intermittentis, post expansionem spirituum inceptam (ex aquâ Naturam, hæc vice, quadantenus victricem fore conjicere liceat) non amplius Ægro periculum intenditur, modo Morbus typum legitimum non mutet, & symptomata aliqua vehementiora non superinducantur; Omnes enim, quos in Paroxysmo pereuntes ego observavi, argentes satis cedebant sere statim à primo insultu Paroxysmi, atque licet Algor ad biduum vel triduum aliquando protraheretur, ope ta-

men caloris interui, vel externi, & artificialis ministrati, nullam omnino spirituum expansionem sentiebant, tanta fuit veneni vehementia!

2. Quotiescunque, ob vehementiam præsentis alicujus symptomatis ex insueta spirituum sive expansione sive oppressionem orti, contingit febrem typum suum nativum mutare in speciem Apoplexiæ, Pleuritidis, Colicæ, seu Cholerae morbi, &c. Unoquoque Paroxysmo Æger in discrimen adducitur, plus minus, pro ratione symptomatis urgentis, atque gradu veneni insulam symptomati ministrantis. Indeque symptomata hæc insolita, quæ subitanæ totius Machinæ ruinam minari videntur, curam præsentem Medici, applicationemque remedium sibi debitorum (posthabitâ Febre & veneno, à quo ortum ducit) postulant. 3. Symptomata isthæc vehementiora sub finem Paroxysmi (modo Æger superstes fuerit) ultro cessant, vel saltem plurimum mitescunt, donec à renovato veneni vigore, in Paroxysmo proximo recrudescere incipiant; atque proinde Medici est, in hisce intervallis, copiosâ eaque satis repetitâ Antidoti propriæ ingestione, subtractionem veneni morbihi quam citissimam, totis viribus, moliri, ut saltem symptomata hæc venenata & lethifera, si non ipsum Paroxysmum subseuturum tollere queat. 4. Febris Intermittens genuina, (eaque non tantum Quartana, verum etiam ipsa Quotidiana & Tertianæ) respectu ad seriem Paroxysmorum, & fomitem eorum delitescentem habito, typum Morbi Chronici induit, utut singularis quisque Paroxysmus fuerit Acutus, imo peracutus, quippe paucarum horarum spatio omnia sua stadia decurrens. 5. Fermentum Febris Quartanæ maxime omnium fixum est atque durabile, quippe, priusquam vires Corticis Peruviani præpotentes in hisce morbis debellandis cognitæ erant, hæc Febris, præ cæteris omnibus, Opprobrium medicorum jure merito habebatur, neque unquam (quantum ego scio) nisi forte fortuito, ab arte vel Natura, nisi tempore æstivo, sole appropinquante & expansionem spirituum multum adjuvante, curationem admitteret, quin etiam, præ cæteris omnibus, Febris hæc curata, sive Arte sive Natura, ad revirescendum mirum in modum proclivis est. 6. Omnis Febris Intermittens, ubi jam annosa & valde chronica evaserit, genus Quartanæ imitari videtur; & sicut Quartana, post longa intervalla, cum, vel absque evidenti causa, incertis periodis, non raro recrudescit, & typum suum sæpius mutare solet, adeo ut quæ uno mense fuerit Quotidiana, altero evadat Tertianæ, Hemitritæ, Quartanæ, & vice versâ. Quo diutius autem typum Quartanæ servet, eò magis chronica redditur, atque eo plus ab ea Natura patitur. 7. Febris Intermittens, quacunque fuerit, Quartanâ non excepta, in ætate juvenili atque æstiva tempestate, viribus solius naturæ sæpius curatur, juvenis enim, æquæ ac verna seu juvenilis anni tempestas, expansioni spirituum favet; ac in ætate proveciori, & hyemali vel Autumnali tempore, sole indies magis magisque recedente, vix aut ne vix absque ope generosa illius Antidoti febrifugæ Corticis sc. Peruviani curationem admittit. Satis igitur auctur à Medicis antiquis, (qui hujus morbi non minus veram causam

causam quam remedium ignorabant,) quasi totidem ignorantie suæ Asyla, excogitata fuerint proverbialia illa ad vulgus decipiendum; quæ in mente plebis, non sine summo Aegrotorum detrimento, hæcenus hæc manent scilicet. Quod hæc febris non debent præpropere sanari, quam revera certam eas curandi methodum planè ignorabant. Quod olfactus Rosæ hunc morbum solvit, cum revera non nisi ætivo tempore hoc remedium comparari possit. Quod Febris Intermittens verna sit Remedium Regium; h. e. Salutiferum & cæterorum morborum prophylacticum, quippe, appropinquante jam sole, brevi ac ipso evanitura, cum instauratione universa naturæ à sarcina sua hoc pacto liberatur. 8. Ante tertium Paroxysmum, Emetico. Pericarpis vel quocunque alio levi remedio facillime nonnunquam tollitur hæc Febris, post hæc autem difficilior. Quo enim magis Chronicus, eo magis curatu difficilis hic morbus evadit, quippe cum malis symptomatis sociatus; Indeque nulli Authorum ero, uti vel secundus Paroxysmus ultro permittatur. Cui enim bono? Eito, morbus Cortice hoc modo derepente sublatus recrudescere non raro solet; Atqui à Corticis exhibitione post debita intervalla frequenter repetita, hoc etiam incommodum præcaveri potest, Neque quidem ex usu præpollentis Antidoti nativæ duratio venenati somitis elongatur, sed inde ejus vires plurimum pessundantur. Quinimo, nonne satius est (licet duratio hujus fermenti inde non brevior fiat) naturæ laboranti, & pessimis symptomatis circumcirca obsessæ, ope generosæ Antidoti succurrere, quam permittere, ut absque ope artis languens natura, symptomatis novi alicujus morbi superinductis, penitus succumbat? Quo nomine non possum non gratias maximas referre Deo Opt. Max. qui tantis viribus hunc simplicem Corticem intruxit, ut ab eo omnia fermenta febrilia acuta, saltem mitiora, penitus tolli queant; adeo ut inter Opium, Mercurium, Chalybem, Aquas minerales & cætera Remedia maxime generosa & quadantenus universalialia, utpote ad plures morbos accommodata, locum mereatur. 9. Hæc Febris, quoties ab arte vel Natura extinguitur in ætate sua, absque signis concoctionis in urina præcedentibus, facilius revirescit; ubi verò sensim deficit, ita ut tandem sine Algore, Rigore, Horrore, aut dolore Spasmodico evidenti, Paroxysmi invadant, à veneno sensim languente, utrum id arti vel naturæ debeatur, Revirescentia amplius vix aut ne vix expectanda vel metuenda est. 10. Febris hæc, quoties legitima est, raro admodum est funesta; Atqui quotiescunque eam esse Chronicam contingit, viam sternere solet ad plures alios morbos, eosque maxime funestos, uti Hydropem, Phthisin, Ictericum, Scorbutum, &c. Qui quidem omnes Cortice Peruviano copiose exhibito atque sæpius repetito feliciter curantur (cui observationi fidem facient hystoriarum aliquot finis hujus Exercitationis adjecit;) atque absque ejus ope vix aut ne vix curationem integram admittere possunt. 11. Denique, hæc Febris, ubi vel Chronica fuerit vel malè morata, mutari solet in Febrem continuam languidam & fatalem, perpetuo conjunctam cum omnibus dirissimis symptomatis in

genere nervoso, Lipothymus, Vomitionibus, Suffocationibus, Vigilis, Aegritudine universalis, &c. Ac si Aeger animam quovis monito efflatus esset. Quæ omnia prægranda symptomata (modo Cortex, decurrente morbo, prius exhibitus fortè fuerit) generoso huic Remedio, ut Probra, vulgo obijciuntur, cum quidem post cætera Febrifuga, Cephalica, atque Hyterica omnigena, intus & extra mecum tentata, illa ipsa symptomata Corticis usu recens repetito unice tollenda sint. In cuius rei testimonium unam vel alteram hystoriam calci hujus Exercitationis bona fide subijciam.

De Febris Intermittentis Indicationibus Curativis.

Indicatio Generalis, pro vario statu veneni morbifici, duplex est scilicet. Una, Vigente Paroxysmo, verum in intervallis plane Altera.

In ipso insultu Paroxysmi, ubi tota Machina, à præfenti vigore veneni, evidenter in periculum adducitur, atque Natura inde exasperata, expansione spirituum insolita, contra vires ejus deleterias sese munire satagit, Indicatio curativa est unica, scilicet ut expansio spirituum iusta atque debita conservetur, ita ut Spiritus à vi veneni lethifera, quamprimum liberentur, & tota Machina à funestis incendii intestini symptomatis immunis servetur. Siquidem ab excessu expansionis, ad gradum usque explosivum, æque ac à defectu, Naturam detrimentum capere sæpius conspicimus: Indeque Medici est, qui Naturæ unice auxiliari debet, ad Naturæ normam, omnia sua mandata diætetica & pharmaceutica dirigere, scilicet ut nimiam spirituum expansionem reprimat, deficientem (quæ plus periculi habet) adaugeat, moderatam vero, iusto regimine, eodem tenore pergere sinat, nihil officiosè & sine urgenti necessitate tentans, verum totum negotium Naturæ ipsi, ad quam jure pertinet, permittens, nec quidquam in regimine, vel in apparatu Medicaminum, suæ, vel aditantium rationi dissonum committat, ut, quicunque tandem fuerit Morbi eventus, egregie officio suo functus sit, sine vel lætæ suæ, vel Conscientiæ lætatura.

Quod spectat ad Regimen, durante vigore veneni, in ipso scilicet Paroxysmo, huic morbo debitum, id paucis absolvam.

Diætæ sit admodum tenuis, uti Avenacea, Possentalia, Panatella, Hordeacea, &c. Jusculum pulsi, vel Cerevisiam crudam sub initium paroxysmi, & bihorio vel trihorio ante paroxysmum Ager ne gustet: quippe fermentum ventriculi jam è massa spiritu venenato labefactata secretum, vix quicquam præter potulentia & pultacea, eaque, quæ particulis fermentescens, quantum possibile est, privata, à forma Chyli minimum distant, potest concoquere, & ab ingestis quibuscunque, quæ facultatem ventriculi superant, Natura antè fatigata, nova & molesta sarcina inde superinducta, incassum premitur, Aegritudo verò perpetua, Nausea, & Vomitus immanis, Gradus caloris intensior, plurimaque alia id genus symptomata succedunt.

Durante Algore, atque etiam ipso Horrore, scilicet donec Spiritus motu quadantenus liberiori sese expandere incipiant, Ager prope ignem lucu-

luculentum multa veste indutus sedeat, vel potius citatiori obambulet, vel aliquo alio modo vires suas exerceat, quo vis spirituum veneno oppressa excitetur, & liberius sese expandat.

Calore vero febrili jam ingruente, potius decubitus isque admodum quietus, atque in loco tepidissimo eligendus est, ubi stragulis Ager cooperiendus est; sed non nimis; ut somnus conciliari, atque inde fervor sanguinis, ac incendium internum ab expansione spirituum ortum, temperari queat, & consequenter dolores spasmodici in capite, reliquisque partibus, cum aliis id genus symptomatis ab explosivo statu spirituum oriri solitis, præveniantur. Quo pacto, paucarum horarum spatium, ab ipsis naturæ viribus hocce veneno quadantenus debellato atque cictrato, Paroxysmus quoniam citissime sudoribus subsequentibus sponte finitur; Calore febrili sensim prius decrecente, prout ejus fomes subtrahatur.

Pharmaceuticam partem quod spectat; durante paroxysmo, modo expansio spirituum rite se habeat, neque vel excessu vel defectu peccet, nullum remedium officinale indicatur, nisi quod ad spiritus resuscilandos, fermentum ventriculi confortandum, & calorem sanguinis temperandum, Julapium Cordiale temperatum concedatur ad libitum lumenum, quem in usum, sequens aut aliud simile ego præscribere soleo.

℞. Aqu. card. ceras. nigr. ana ꝑ iv. cinnam. hord. Mentii. Epidem. ana ꝑ iij. Salis Absinth. ꝑj. Syr. e Limon. vel caryoph. ꝑ iij. M.℞. Julap.

Ab Emeticis, ut in leviōribus, a Catharticis licet benignis, uti decocto amaro, Manna, &c. Vel ab Enematis ipsis, hoc tempore officiose, atque sine urgente indicatione ministratis, multum detrimenti pati solet Ager, si vita ipsa non exinde in subitum discrimen adducatur. Instante Crisi, sine evidente ratione nil arte molendum est; ne Natura inde interturbetur; præterea cum fermenta ventriculi & Intestinarum veneno activo imbuantur, si a pharmaco levissimo vel enemate eam stimulari contigerit, quam enormes evacuationes, cum magna & periculosa virium jactura, inexpectato ipseque quotidie conspiciamus?

Nec minus Venæsectio, præsertim in primo insultu paroxysmi, priusquam spiritus sese libere expandant, perperam celebrata, spiritus labefactando, venenatum fomitem ad letalem usque gradum statim exaltare solet; aut saltem febrem intermittentem in continuam, si non malignam cum dirissimis symptomatis in genere nervoso sociatam mutat. Idem non raro in praxi observare licet, ubi a Natura ipsa magnæ Hæmorrhagiæ in primo paroxysmi insultu contigerint.

Idem Diaphoretica, præsertim Opiata (qualia sunt Theriaca, Mithridatium, Diacordium, &c.) sicuti sub finem paroxysmi exhibita, absque manifesta indicatione, nihil ad curationem promovendam conducere observantur; ita in primo insultu spiritus præpropere agitando, atque interturbando, Naturam in maximas, si non lethales angustias inducere solent, a quibus spiritus prius confusi difficultè admodum sese liberare queant. Verum Opiata, justum spirituum

expansionem præpediendo, indeque gradum veneni deleterium multum promovendo, paroxysmum febris intermittens legitimum, haud raro in tuncam Apoplexiam, vel Comam, vel alium aliquem peracutum & lethalem morbum convertunt. Hoc pacto celeberrimus ille vir *Andreas Mercurius* cum magno Reipub. (præsertim literariæ) detrimento (ex ignorantia Medici tenis atque superciliosi, cui in more erat contra Corticem Peruvianum, quasi communem pestem, immaniter ubique debacchari) e vivis ante diem sublatus fuit. Siquidem, postquam absque evidenti aliqua indicatione, in intervallo, post tertium paroxysmum febris tertianæ legitimæ, præparationis gratia (uti omnia methodice fieri videntur) sanguis ab ægro extate provento, post enematis rejectionem, libere extractus fuisset, & in subsequenti intervallo, Alvus decocto amaro subducta, & paulo ante tertium paroxysmum Emeticum propinatum; Hoc modo strata via, sub initium paroxysmi subsequenti exhibebatur magnum Ictericum, haustus scilicet ex Aqua Theriacali, &c. Ager stragulis opertus, vel potius sepultus jussu Medici, ad somnum & sudores sese componebat; ut saltem Algorem & Horrorem primum insultum paroxysmi comitari solitos evitaret, & brevi, somno profundissimo & sudoribus colliquis correptus, spatium horarum 24. tempore paroxysmi, Apoplecticè periit, Qui tamen ex uncia una Corticis Peruviani rite ministrata (uti ego Medico hanc historiam fronte satis perfricta narvanti exaudescens regerebam) spatium 24. horarum Orci & morbi fauces facile evasisset. Ob talem praxin Mulierculæ reprehendendæ sunt, & acriter corripiendæ, multo magis Medici & Philosophi, quos oportet nihil Empirice, nihil absque urgente ratione, multo minus contra rationem & manifestam indicationem præscribere.

Denique, nec Cortex Peruv. nec aliud quodcumque Ictericum tempore paroxysmi propinandum est, sed in intervallis, (modo ea sint satis protenta, eoque nomine ad Ictericum ingestionem accommodata) Nam durante vigore veneni, vires Antidoti a fermento ventriculi venenato plurimum fractæ, haud libere sese explicare possunt, & totis viribus in hostem insurgere; sicut in intervallis paroxysmorum (in quibus venenum inbellè est, & sine viribus delitescit) & possunt & solent. Præterea cum liquor glandulosus, in ventriculum, cibi fermentandi gratia, continuo depositus, & mæssa sanguinis venenata secernatur, necesse est Agritudinem, Nauseam, Vomitionem vel fluxum alvi œconomiam ventriculi eoque subvertere, ut Ager nutrimentum tenuissimum vel deglutire non possit, vel illicò sursum aut deorsum rejiciat; multo minus remedium officinale amarum, & forma ac quantitate, æque ac sapore ingratum. Imò sæpe observatum est, quod ii qui libentissime in paroxysmorum intervallis Corticem deglutiant, atque faciliè retinent, ingruente paroxysmo, sursum vel deorsum cum semper rejiciant; unde iniquum videtur, Aegros tempore paroxysmi sarcina morbosa plus latis pressos, absque urgente necessitate, amplius ingratum medicamentis plecti.

Sin verò, ob expansionem spirituum hoc tempore deficientem, aut nimis exaltatam,

durante paroxysmo, Vita Ægri in discrimen adducatur, cum scilicet febris alterius morbi symptomata vehementia & lethifera sibi adsciscit; Morbus ille asciticus eadem methodo tractandus est, ac si esset Originalis; ut ex Orci Liberibus Æger quam citissime liberetur; Postquam verò hæc nova symptomata cessent vel mitigentur, assidue atque copiose exhibendus est Cortex Peruvianus, seu aliqua alia (liqua sit) generosa Antidotus febrifuga, qua vires veneni morbifici frangantur, & paroxysmus futurus, vel saltem symptomata peregrina, præcaveri possint: v.g. Cum Æger funesto Algore correptus, quasi moribundus & languens per plures dies jaceat, expansio spirituum quam citissime calore multo externo, frictionibus duris, Julapiis cordialibus, spirituosius, spirituum & salium volatilium repetitis dosibus, frequentibus Velicatoriis (quæ flammam artificialem in spiritibus excitando præ reliquis hic conducunt) & quocunque alio modo convenienti promovenda est.

Ubi verò (quod non raro accidit) à minori veneno spiritus non extinguantur, verum toto paroxysmi tempore opprimantur & langueant, unde Æger Comatosus evadit, & sudoribus frigidis perfunditur, tanquam mox lipothymice animam efflaturus; Indicantur Julapia Hysterica, & Cephalica paulò calidiora, Spiritus & Salia Volatilia, aliaque ejusmodi, præsertim vero Velicatoria, quæ ad quamcunque partem præsertim vero ad totum caput applicata egregie conferunt.

Quoties ob tonum cerebri & nervorum peculiari modo debilem atque ad obstructions aptum, spiritus veneno morbiifico perciti, per nervos non transmittantur, & sanguis, circuitu impedito, in cerebro stagnet, præter medicamenta Cephalica spirituosia & Epispastica prius memorata, indicantur insuper Phlebotomia copiosa, sæpe repetita, & si opus fuerit in Vena Jugulari; Cucurbitula inter scapulas cum profunda scarificatione, Sternutatoria, &c. Remedia Antapoplectica.

Febris hæc Proteiformis, typum Rheumatismi, colicæ ventriculi aut Intestinatorum, cholæræ morbi, Diarrhœæ, Dysentericæ, Febris Scarlatinæ Erysipelatosæ, &c. Induit, ubi venenum morbiificum non valde deleterium est, & spiritus animales veneno irritati hoste longè superiores. Cum igitur symptomata hæc oriantur à nimia spirituum elasticitate; Venæsectione, & Opii usu copioso & repetito, paroxysmi tempore, in ordinem felicissime rediguntur; extra paroxysmos verò, Cortice Peruviano cum Opio commixto, venenum hisce symptomatis, & eorum recrudescentiæ ansam præbens, radicitus tollitur.

Hæc methodo Ægris consulendum est, ubi spiritus nimium expansos confertim in Musculos & Tendines irruere contigerit, eosque ultra tonum solitum distendere, & Spasmos cruciantes, hinc inde versatiles excitare, atque præterea, sanguinis circuitum præpediendo, feri acris secretionem in partibus, unâ cum tumore & inflammatione inferre, ita ut paroxysmus febrilis jam planè latitet sub specie Rheumatismi. Ubi verò à nativa, vel accidentali, à frigore suscepto debilitate partis contigerit

hanc explosionem spirituum fieri in partibus Thoracicis, præsertim in Membrana coltas succingente, Musculis intercostalibus, aut reliquis membranis & musculis Respirationi dicatis durante paroxysmo; Morbus plane, simulat speciem Pleuritidis vel Peripneumoniar, quippe cum dolore laterali atque Iussi immmani, & Respiratione difficili sociatur; & à vehementia symptomatum insolita hic (hic enim, præ doloris & strangulationis vehementia, pulsus sere obruitur, atque extrema algent, ac si Æger illico expiraturus foret) Pleuritidis hæc symptomatica à Genuina præcipue dignoscenda est. In hoc casu utut Pulsus languor, & Algor extremorum contra indicare videantur, Venæsectione tamen copiosa in brachio lateris affecti sine mora celebrata, & repetita, Opii ingestione liber. li. Linimentis, & Fotibus anodynis externe applicatis, hæc explosio spirituum tollenda aut saltem minuenda est; Spasmus enim hoc modo sublati, dolor lateralis horrendus, Dyspnœa & Tussis sine medicaminum Pectoralium ope (quæ in hoc casu nihil valent) sponte cessant, Pulsus robur naturale, atque calor extremorum redit.

Sin forte Febris hæc Colicam ventriculi aut Intestinatorum, vel Iliacam passionem simulat, expansionem spirituum spasmodicam cohibere necessarium est Venæsectione copiosa, applicatione calida Linimenti Anodyni ad partes affectas, Eneinate carminativo, dein Cathartico acro. i cum Laudano commixto, & (si opus fuerit) Aquarum mineralium purgantium coctarum, & lacte alteratarum dosi liberali, unde, saltem sub finem paroxysmi febrilis, solutio horum symptomatum, bombi & dejectiones copiosæ expectari possunt.

Denique, ubi febris intermittens, sub Typo Diarrhœæ torminosæ, Dysentericæ, vel cholæræ morbi latet; quamprimum venenum in singulis Paroxysmis exaltari de novo incipiat, spiritus in ventriculo & intestinis recens exploduntur, & momento quasi Tormina, Vomitiones, Dejectiones enormes, ac si à pharmaco aliquo deleterio sumpto, recrudescunt. In Paroxysmo igitur Vena secetur, Opiata & Astringentia ad spasmos sublevandos & colliquationem inhibendam reperantur, humoris venenati in ventriculum & Intestina excreti acrimonia obrundatur copia liquoris mitioris in os atque anum ingesta, v.g. Decocti Pulli tenuissimi & simplicissimi. Et, denique partibus ab hujus humoris transitu inflammatis, & tantum non Sphacelatis, applicatione Fotium, Sacculorum Aromaticorum in vino & aqua ferratâ coctorum & expressorum, Linimentorum, vel Emplastrorum Carminativorum tempestivè prospiciatur.

In Cholera morbo præcepta ante memorata observentur, nisi quod raro aut nunquam venæsectio celebranda sit.

In Diarrhœa verò & Dysenteria periodica (sive torminosa, sive sine torminibus.) Decocto albo, vel aqua Pulli in locum cujusvis liquoris fermentescens pro potu ordinario substituta; Venæsectione, & Laudani tertia, vel quarta quaque hora repetitione, usque ad finem paroxysmi, expansio spirituum, & liquoris venenati colliquatio refraganda est.

Scarlatinam & Erysipelatosam Efflorescentiam in cute periodicam consilio sileo, quia eas semper Diarrhœæ vel Cholerae periodicæ conjunctas observavi, atque eadem methodo tractandas.

Extra Paroxysmum Indicatio generalis est Unica, scilicet ut Venenum morbificum in nervis delitescens perfecte extirpetur, ut, spiritibus non amplius irritatis, æconomia humorum in posterum facta tecta conservetur, & paroxysmi cujuscunque revirescentia præcaveatur.

Nemo igitur miretur veteres Medicos futilem atque inanem operam navasse huic morbo debellando, Sensibus enim magis quam par est confisi, humores in receptaculis nescio quibus stagnantes fomitem morbi fuisse somniant, indeque toto celo errantes, utramque curationis paginam longo apparatu medicamentum Deobstruentium & Evacuantium impleverunt, idque methodicè, licet absque certa aliqua indicatione a naturâ rei ipsius desumpta, sed in propriis ipsorum Mulieris excogitata. Cumque morbificum hunc fomitem penitus eradicari impossibile crederent absque sensibili humorum evacuatione, copia medicamentum Incidentium humores præparabant, ut Remediis evacuandis magis obsequentes nerent. At hos ipsos medicos appello, noverint ne unquam, nisi fortuito, hac methodo, utut diutius protracta, quenquam perfectè sanatum? Me quod attinet, ego simplicem Tertianam, eamque admodum benignam & legitimam inde non raro in Hemitritæam, vel Quartanam mutatam esse cum Hydropicis, aliisque diris symptomatis sociatam observasse memini. Naturâ hisce Venæsectionibus & purgationibus incassum lacessita. Hujus malæ & infelicitis praxeos (quæ per multa sæcula cum magno Agrotantium incommodo inter nostræ Artis Professores invaluit) *perpetua quædam* est falsa Ætiologia, Non enim, ut ex accidenti, uti in Plethora, Cachexia insigni, &c. (De quibus posthac dicetur) ulla omnino evacuatio indicatur; verum, ut plurimum istæ evacuationes, Naturam inaniter lacessendo, veræ curationi multum officiant, saltem copiam Antidoti admodum ingratae multo majorem necessario requiri faciunt.

Nuperi quidam Medici, postquam methodi veteris infelicem eventum observassent (licet hypothesein veterem palam & expresse mutare hucusque iis visum non sit) ac si consilium commune cepissent, in Arcanis febrifugis inquirendis occupantur, quæ ex proprietate substantiæ (uti loqui amant) vel qualitate occultâ morbum eradicent, vel, quod idem ferè est, venenatum morbi fomitem pessulent atque subigant. Atque in hac sententiâ sunt Neoterici omnes, quotquot in verba Magistri non jurant, verum ad praxim medicinalem propriam attenti, liberam Philosophiam amplectuntur. Tacite enim, licet non palam, hypothesein nostrâ de Ætiologia & curatione hujus morbi Herculei auctoritatem tribuant; dum aliqui Terribilissimum prope insulsum paroxysmum Agro inopinatè oblati, sese hunc morbum sapius prostrasse gloriantur; Alii Amuletis, Pericarpis, aliisque Epithematis externis imo Carminibus (quæ omnia Spiritus animales, & non humores immediate afficien-

do, scopum attingere credibile est) eundem effectum sese consecutos esse jactitant. Inter Pericarpia innumera, duo sequentia ego ipse aliquando satis felici eventu comprobata expertus sum. ex. gr.

℥. Terebinth. Venet. Pulv. Oliban. ana q. s. m. & extend super alutam. F. Pericarpia duo ad pulsus ipsos applicanda, paulò ante Paroxysmum.

Vel ℥. Fol. Chelidon. maj. Rutæ; ana Mj. Fuliginis e lignis combustis, sapon. Venet. Salis marin. ana q. s. m. cum Acet. acerrim. F. Massa pro Pericarpis, horis duabus ante paroxysmum expectatum applicanda.

Nec minus Helmontiani pro more jactabundi, Arcana quædam Chymica, pro certissimis febrifugis venditare solent: Vires nonnullorum ex iis ego ipse cum aliis Medicis (priusquam Herculeæ Antidotus Cortex Peruv. mihi innotuisset) sæpe incertas, haud raro tamen cum felici successu efficaces expertus sum. Inter hæc Vinum Benedictum seu Infusio Croci metallorum, facile palmam cæteris præcipit (præcipitato Diaphoretico Paracelsi non excepto, quod *Gabriel Fontanus* in Apologetico, omnem sanare febrem, si semel exhibeatur, satis impudenter atque falsissimè jactat.) A iusta dosi Vini Benedicti trihorio ante tertium paroxysmum expectatum exhibita sapius febrem tertianam curatam novi, verum non tam ab evacuatione (uti mihi videtur) quam ab Orgasmo inter vomendum in spiritus impresso. Quo pacto etiam Vertiginem, Rheumatismum, & nonnunquam Apoplexiam, atque alios spirituum animalium morbos, illico curatos haud raro conspiciamus. Sæpe etiam gravis 7. Antimoni Diaphoretici in veniculo quocunque convenienti exhibitis paulo ante insultum paroxysmi, febrem intermittentem tertianam simplicem, & Hemitritæam ipsam, absque quacunque sensibili evacuatione humorum, sustuli; Unde mihi pene persuasum est in Antimonio particulas aliquas latitare, quo mereatur in classe febrifugorum proximum Cortici Peruviano locum. Sal Absinthii etiam inter decantatissimam febrifuga (antequam vires Corticis Peruviani exploratae fuerant) à Clarissimis Medicis prædicabatur, & ad hunc usque diem novi quosdam e senioribus, qui Haultum, qui sal illud recipit, paulo ante expectatum paroxysmum, propinatum, Cortici Peruviano præferunt; Quem Haultum, quoniam in febribus intermittentibus magis benignis aliquando prolicuum expertus sum, non piget hic loci describere, & ansam inde arripere palam proponendi cætera febrifuga, quæ mihi contigit usu comprobasse.

℥. Aqu. Card. Theriacal. stillat. ana ℥ij. Salis Absinth. ʒβ. Syr. de Limon. ʒi β. M. Sumat Ager dimidi in partem trihorio ante expectatum paroxysmum, reliquam vero in primo insultu paroxysmi.

Efficacia plurimorum Amarorum, uti sol. Absinth. Matricar. sol. & Sem. Card. Benedict. Sem. Citri. Rad. Gentian. summit. Centaur. minor. flor. Chamæmel. &c. Præ omnibus aliis, in hoc morbo debellando, diu antequam vires Corticis Peruviani satis exploratae fuissent, multo usu (eventu licet sæpe incerto) com-

probata fuit. Imò, posthabitis omnibus aliis febrifugis, nuperrimo sæculo, Amarorum ulus invaluit, non tantum apud vulgum qui, communi quali consensu, haultus largos liquoris Polettici foliis Cardui Benedicti alteratos paulo ante expectatum insultum Amicis ægotantibus propinabant, unde aliquando febris intermittens mitior atque recens sublata est, vel diminuta; Quin & Professores Medicina, præsertim observatores peripicacissimi, & usu longissimo instructi, huiusmodi remediis Amaris locum insignem in curatione febrium intermittentium concedere dignati sunt. Et non tantum decantantur illud febrifugum, Decoctum Amarum, ex Amaris, quæ variis febrifugis maxime pollere experientia docuit, conflatum (quod jam demum loco in *Pharmacopœa Londinensi* cononellatur) palam ubique in hunc usum proposuerunt, verum etiam ex Absterliva & Ecephractica Amarorum natura, eorum efficaciam, ratione & more Philosophico (an rite vel non jam laud disputo) demonstrare sategerunt. Formulam hujus decocti mihi familiarem, & a communi aliquatenus diversam, & modum utendi subicere hic loci non pigebit, quoniam aliquando febres intermittentes mitiores, præsertim verno tempore, eo curatas observavi.

℞. Fol. Matricar. Card. Benedict. Comar. Absinth. summit. Centaur. min. flor. Chamamel. ana Mj. Semin. Card. Benedict. Citr. ana ʒj. Salis Absinth. ʒi. ʒ. Coq. in Aq. F. q. s. ad ʒvj. Colaturæ ʒij. iij. iv. pro ratione ætatis, bibat Ager quarta quaque hora extra paroxysmum.

Sin alvum subducere Medico visum fuerit; sive Vomitus inmodicus, sive alia Cachexia signa id suaserint, omni alio Cathartico longe tutius & melius operatur Infusum Calida ʒi. ʒ. ʒ. ʒij. vel iij. (pro ætate & ~~in~~ purgationis) fol. Sennæ primo haultu decocti parædicti.

Porro Clariss. meus Collega, isque vir integerrimus atque medicus expertissimus D. D. *Elisha Coyle* jam ~~puerum~~, læpius sincero animo mihi asseruit, sese vires horum Chamameli subtilissime pulverisatorum, in vehiculo convenienti exhibitorum, atque post debita intervalla repetitorum, æque felices ac certas in hoc morbo debellando expertum fuisse, ac ipsius Corticis Peruviani. Penes Authorem fides sit, Me quod attinet, ego nusquam efficaciam hujus simplicis Remedii tentando exploravi, verum eodem medicamento cum aliis commixto filium Domini Barnard, Jurisperiti Londinensis febre hemitritâ laborantem, quem Cortice Peruviano diu & copiose adhibito ne quidem ab uno Paroxysmo liberare potui, spatium bidui, perfecte in sanitatem restitui. Nec non Dominam Gunley vetulam febre tertianâ decumbentem (postquam diu & ad nauseam usque vires Corticis Peruviani irritas experta esset) ope ejusdem Arcani, post debita intervalla exhibiti, spatium etiam bidui sanavi. Itemque uxorem Vetulam Domini *Keyson* ~~bi-~~ *biopola* Regis fere septuagenariam, postquam ad biennium febre intermittente, nunc tertiana, nunc Quartana vel Hemitritâ laborasset, spatium duorum dierum eodem Remedio, perfecte & absque recidivatione curavi; Fateor equidem me nunquam (quod scio) in quocunque alio febre intermittente laborante hujus

remedii periculum fecisse, quippe vix unquam (si recte meminerim) præterquam in hisce tribus Ægotantibus, Antidotus illa Herculeæ Cortex scil. Peruvianus spem meam fefellit, proindeque nec licitum, nec decorum esse duxi in humano corio, experiendi gratia, ludere, & certo atque experto Remedio, magis incertum & minus exploratum præferre, Utunque ejus Formulam describere, in gratiam Curiosorum, operæ pretium duxi, ut ii possint, modo velint, experiri, num hoc etiam sit certum febrifugum, vel saltem num (uti mihi evenit) vires Corticis deficientes supplere queat. Formula pulveris est quæ sequitur.

℞. Flor. Chamamel. subtiliss. pulverisat. (plus minus pro ætate) ʒj. Autum. Diaphoret. Sal. Absinth. ana ʒj. M. F. Pulvis sumendus in haultu Polettici, vel cujuscunque Julapii temperati. Aut in formam Boli cum Syrup. Caryoph. vel in formam Pilularum cum Mucilag. Gum. Tragag. redactus, sexta quaque hora per biduum vel triduum repetendus.

Unde Amara vi febrifuga adeo præpollenti donentur, forsitan non facile explatu est. Verissimum quidem est Amara tere quæcunque facultate plus minus Absterliva & Ecephractica pollere, uti a curatione Scorbuti, Hypochondriacæ affectionis & Chlorosis, ex eorum usu, omnibus in Medicina leviter Exercitatis abunde patet. Num vero energia eorum febrifuga in hac facultate Absterliva & Ecephractica speciatim vigeat (quicquid cæteri Professores opinentur) non ita liquido mihi constat; præsertim, cum Chalybeata medicamenta, quæ omnium consensu, multo magis hac vi præpollent, nihil ad febrium curationem conducere observentur, quin potius spiritus incassum agitando & turbando, multum officere. Insuper Ecephractica & Absterliva medicamenta, annuente totâ corona Medicorum, inde præsertim ad curationem morborum conferunt, quatenus humores præparant, quo magis sequaces, atque vi Catharticorum evacuantis obtemperantes fiant, cum quidem febres intermittentes (quoties eas ope Amarorum curari contingit) sæpissime, imo felicissime, absque ulla evacuatione præcedente, comitante, aut subsequente (quod medici hodierni norunt) solvi solent. Quid? quod hæc sententia, falsâ illâ veterum hypothese innixa est, quæ somitem febrium in humoribus, non autem in spiritibus delitescere statuit, atque oportere eum remediis evacuantibus penitus eradicari: Contra quam sententiam ubique militat (uti prius innuimus) non tantum Ratio, verum etiam Experientiæ fere universa.

Restat igitur, ut hæc Remedia, proprietate quadam naturæ, seu qualitate occulta, scopum suum in febribus profligandis attingant, vel, quod idem est, ad instar Antidoti, vi nativa somitem venenatum in spiritibus delitescens subigant: Sique ratio efficaciarum huiusmodi febrifugorum à me requireretur, ego hisce tenebris, in causis rerum indagandis, obrutus, multo potius in peculiari Amartudine sensibili, quam in nescio quâ Absterliva facultate inde consequenti, vim illam collocarem; quia plurima Amara, admodum grata esse ventriculo, nervis, & spiritibus animalibus, multo

multo usu comprobantur; & ferè singula, suo gradu, scilicet hæc plus, illa minus, verum præ cæteris omnibus Cortex Peruvianus, ob excellentem suam amaritiam, vi Febrifuga a Natura donatur, quæ Fermentum spiritus accendens immediate destruitur. Et quidem Febres Intermittentes recentiores atque benigniores, præsertim verna & æstiva tempestate, ab Amaris vulgaribus haud raro curari contingit, & forsitan læpius quam à quibuscunque aliis Febrifugis. Illud vero *l'arbre à pain* Cortex scilicet Peruvianus (cui nihil præter nomen gratum deest ut opinione vulgi commendetur) à quo tempore Europæis innotescere cæpit, consensu Medicorum omnium ferè expertissimorum, Febrifugum Catholicum esse comprobatur, quod omnes Febres Intermittentes, & alias plurimas (utiposthac dicetur) in quavis anni tempestate, in omni sexu, ætate, & Temperamento radicitus & penitus, citò, tutò & feliciter sanat. Ego sanè, qui jam ad viginti annos, & quod excurrit, hoc Polychrestum remedium ferè quotidie præscripsi, vix aliquid incommodi Agrotantibus ortum inde observavi (quicquid clamorè atque falso oggerant malè feriat quidam atque ignorantes) quin etiam, non nisi ter, uti sincero animo prius asserui, in Febribus Intermittentibus spem meam frustratus est: Utinam idem dicere licuisset de quoquam alio quantumvis celebri Remedio in cæteris humani corporis affectibus debellandis decantato. Certè non est ut Medici ingenia sua amplius torqueant in aliis Febrifugis explorandis, modò hujus usum satis perspectum habuerint. Neque justum aut æquum est, methodis antiquorum incertis, sine Indicatione vera, sine successu, gratis stabilitis, in posterum insillere; aut novum aliquod & minus probatum Arcanum prædicto anteferre, verum, sicut oriente sole, itellæ minores disparent, ità cætera Febrifuga, & tribu Amarorum aut alia quavis petita, huic unico locum cedere oportet.

Verum enim verò, cum jam ab omnibus Medicis Corticis hujus efficacia comprobata sit, & communi consensu, titulo Febrifugi *peruvianum* jure insigniri incipiat; posthabitis reliquis Febrifugis, de hoc unice in posterum sermonem habere lubet, ejus Naturalem Historiam succinctim enarrare, rationem efficacie ejus Febrifugæ explicare, ejusque justam causam adversus malevolos atque ignorantes detrectatores suscipere, & denique, modum cum præparandi, eoque utendi varium, una cum justis, & usu probatis Canonibus atque regulis huc spectantibus subjicere.

De Cortice Peruviano, seu Chinâ-Chinâ, atque Virtute ejus Febrifugâ.

Locus natalis Arboris, quæ hoc Cortice obducitur (referente *M. Anon. bollo* Mercatore Genuensi in Epistola sua Italicè scripta) est Regnum Quitensè, præsertim prope Loxam in America Peruviana. Arbor non procera est, sed in ramulos insigniter divaricata; Folia habet, qualia sunt Prunorum rubeorum, neque minùs patula, neque acuminata, quæ saporem Aromaticum, nullatenus Amarum, quippe

è particulis acris & pungentibus constata, in lingua imprimunt. Floribus albis, & cæruleis, ad instar Mali Granati eximie ornatur; Nilum tamen fructum parit, ac si in pompam unice cum tanta luxuriantium florum copia nata fuisset: At istum defectum abunde compensat Cortex ejus Febrifugus in sanitatem gentium, proculdubio, à *Deo Opt. Max.* conditus: Cujus gratia Arbor Vitæ, siqua alia, saltem nobis nota, jure merito appellari potest.

Lignum autem hujus Arboris, atque etiam Flores, uti nullam amaritiam habent, ita (testante *Clariss. Hieron. Bardi*) nulla Febrifuga seu medicatrice virtute donantur. Verum Resina, quæ e ligno, præsertim verò è Cortice exiudat, atque etiam Semina, quæ Hispanice Pipita de quina vocantur, atque Semina Cucurbitæ plane referunt, virtutem non dissimilem, sed interiorē longè, quàm Cortex ipse, sortiuntur. Unde evenit quòd Authores, posthabitis cæteris quibuscunque partibus hujus Arboris. Corticem duntaxat pro decantato Febrifugo venditent.

Arborem hanc salutariferam (quam Incolæ Gannaperide vocant) ab ipsis Mundi primordiis ibi locatam, sponte crevisse nullus dubito. Virtutem Febrifugam, quæ ejus Cortici à Natura inest, Indis hominibus jam olim innotuisse refert idem *Bollus*; Verum à quo tempore Heros ille *Genuensis Christophorus Columbus* hanc plagam mundi primùm detexerat, usque ad annum salutis millesimum sexcentiesimum quadragiesimum, ex odio Indorum erga Europeanos, præsertim Hispanos concepto, magnum hoc Remedium de indultia celabatur.

Quomodo vero, magnum hoc Febrifugum Hispanis, cæterisque Europæis primùm patefactum fuerit, narrat idem Author fide dignus: Nimirum forte sortuito, in civitate Limensi quæ est Metropolis Regni Peruviani; Uxor Proregis, qui tum temporis erat *Comes del Cinchon*, Febre tertiana sævissima (qualis illic loci Epidemia esse solet) correpta fuisse decumbere videbatur. Rumor (uti semper de magnatibus) per urbem divulgatus tandem per finitima loca ad Loxam usque pervenit. Hispanus illius loci tunc temporis præfectus, per literas Proregem monebat, in Arcanis sibi esse Remedium, cujus auxilio Proreginam illicò revalituram spondebat: Lubentissime annuens Proregina, Corticem præparatum sumpsit. Quid sit: Stupentibus omnibus, dicto citius convaleuit. Hinc fama hujus Arcani titulo Pulveris Comitissæ insigniti, ubique per civitatem Limensē, totamque Americam Hispanicæ ditioni subjectam, brevi, multum inclaruit. Discedente autem Prorege ex India, Ubi in Hispaniam reversus est, illicò percrebuit ubique rumor de novo hoc Febrifugo, quod, post experimenta frequenter facta, votis Agrorum semper & ubique respondebat. Circa annum salutis 1649. famam suam indies magis, magisque provexit, non tantum per Hispaniam verum etiam Italiam, Romam usque, conatibus imprimis *Johannis Cardinalis de Lugo Soc. Jesu*, & cæterorum Collegii Jesuitarum Roma Patrum, qui cum gratis religiosis & pauperibus largiebantur. Unde infausto omine, atque in vulgi Reformati terrorem, ac Scandalum, Pulvis Pa-

trum vulgò audit (Anglicè *The Jesuit's Powder*.) Quo nomine plurimòs, eosque non sortis gregariæ, in hunc usque diem, ab ejus usu abhorretere contigit, ac si, non naturale remedium fuisset, sed factitium, diabolicum, & venenatum arte Jesuitarum paratum, potius quàm divinæ Providentiæ donum. Historiam non injucundam huc spectantem refert *Clariss. Badus Anast. lib. 2. cap. 6.* de Matronis duabus Londinensibus, quam audiverat ex *Johanne Lucâ Durante* Oratore Reipubl. Venetorum ad Carolum Secundum. Quia de causa obnixè cupio, ut suo proprio, ac antiquo Chinæ-Chinæ, Chinæ febris, Gentianæ Indicæ, Pulveris Comitilæ vel Peruviani, aut aliquo altero minus infami nomine, communium Medicorum consensu, in posterum appelletur, & a præjudicio, ob Nomen, liberetur.

Quam celeri gressu fama hujus Febrifugi per totam Europam spargebatur, & ipse Cortex ubique gentium a Professoribus ferè quibuscunque in usum recipiebatur, facile potest quis conjicere ex ipsis verbis *Clariss. Badi qui libro primo Anastas. Corticis Peruviani* (quem typis dedit Anno 1663. Cap. 20.) Medicos Londinenses increpat. Quippe *Fama mendaci*, potius quàm propria experientia instructi, saluberrimam hanc Medicinam respuebant, quum tot alii Medici in omni Europâ, sive in Galliâ, sive Hispaniâ, Germaniâ, Flandriâ, Italiâ, non solum usum, quin & miris laudibus extollant.

Verissimum quidem est, non defuisse nefarios quosdam detractatores ubique, præsertim Londini, qui dolo malo consilium ceperunt de hujus Febrifugi famâ præmaturè suppressenda, ne scilicet hac succincta methòdo febres obtundendi, Agrotantium crumenas emulgendi occasio tolleretur; De hac conspiratione sæpè palam verba habuit Dominus Bertram Pharmacopola jam defunctus, cui talem in hac re prompè adhibui, quia nequam quidam & ignavi, quorum nomina honoris causa ille, inemet ipsum, isdem illecebris, in suas partes trahere tentarant. Temere igitur & sine experimentis prius institutis, magnum hoc Remedium condemnarunt, & famam ejus fictis calumniis ubique insectabantur, seise severissimos Chinæ-China speculatores & iudices ultro constituerunt, si forte fortuito, licet post annum ab ejus usu elapsum, symptoma aliquod minus solitum supervenerit, Eheu! quot convitiis Herculeæ & divinæ hæc Antidotus extemplò jactabatur, ac si quid diabolicum in hoc Equo Trojano latuisset; Fæces, nescio quas delecterias, & fermenta morbosa post se in corpore semper reliquisse asseruerunt, unde novæ tragediæ, & funestissima symptomata repullulabant. Hoc modo, siquid mali unquam aliunde subsecutum erat, id omne Medicamini, ut probrum objiciebant, licet symptomata ad morbum primum, minus parco corticis usu imperfectè sanatum, reapse pertinerent. Nec minus iniquè mente, ab Amaro & Ecphrastico hoc Pharmaco habitum corporis denuò obturatum & obsesum iri pertenderunt, atque inde, neminem ad septennium ab ejus usu superstitem fore, reclamante experientia universâ. Hinc Medici Londinenses in experti; atque Agrotantes, ab usu hujus Febrifugi diu perterriti abstinabant; In-

terim Medici antiquis methodis longis, eoque magis incertis insistentes, famæ & tormentum suum; Agroti vero vitæ ipsius dulcissimæ jacturam fecerunt, qui ope Chinæ-Chinæ, spatio bidui vel tridui, facile convalescent.

Insuper, præter hos nefarios detractatores, non defuerunt plures, ceteroquin Viri docti & probi, veteri tamen & crassa humorum sensibulum, & qualitatum hypothesei occæcati, qui de usu Chinæ-Chinæ multum ancipites habebant, quandoquidem Febres absque sensibili quacunque evacuatione curatas ejus ope observarent; Quod quidem gravissimum erat argumentum *Corysostomi Magnesi Professoris Papiensis*, ut in ejus Epistola ad *Hieron. Gardi* data April. 9. 1632. patet.

Quamplurimæ etiam futes & inanes controversiæ, nugæ sane & trices, ex doctrina Humoristarum ortæ, inter doctissimos viros cum eruditione, specie tenuis, & zelo agitatae sunt per decennium & quod excurrit, scil. a primo Corticis in Europam adventu usque ad annum salutis 1663. quas enumerare vix operæ pretium duxi. Febrem enim in humoribus qualitate peccantibus locantes, Remedium qualitate contraria prædictum requirebant, & Hi propter siccitatem, Illi propter Caliditatem, alii sive qualitates mantitas Cortici adscriptas, ejus vim impugnarunt & apud vulgus inopem reddiderunt.

Nec minus equidem mihi à scopo errasse videntur, vel famæ Corticis minus offecisse, qui ex eadem pharetra; manifestarum scil. qualitatum doctrina, Argumenta de promptu, quibus Corticis causam serio tuerentur.

Horum Antesignanum invenio eximium Antymum Conygiunt, qui efficaciam Febrifugam in tenuitate partium Corticis collocat, unde crassos humores incidit, & causam februm tollit; ac si crassum hoc pharmacum cæteris quibuscunque, partium subtilitate præferret: aut Aromatica, & spiritiosa quæcunque, utpote partibus subtilibus insigniter prædita, eo etiam nomine, Febrifugorum titulum rite mererentur.

Gaudentius Brunaccius Romanus forsitan non minus, etsi cum specie magnæ eruditionis, nugatur, dum in libro suo Venetiis cuso Anno 1661. strenuè contendit, Chinam Chinam caliditate ac siccitate sua manifesta hæc Febres (quas auctoritate Avicennæ & Helmontii in Frigido & Humido consistere statuit) præpollenter & efficaciter subigere. Ac si Calida & Sicca, quæ talia, vim febrifugam sortita essent; atque omne Pharmacum hæc facultatibus imbutum, ea de causa (licet experientia Universæ & ratione ubique reclamante) in numerum febrifugorum ascendendum esset. Verum, ut paucis ex rei ipsius natura petitis, velitationem hanc dirimam & absolvam; Sciendum est, Frigus æque ac Calorem hæc Febres comitari solita, effectus esse potius Febris quam causas; Quorum prius a spirituum oppressione, posterius ab eorundem expansione nimia (ut ante demonstravimus) oritur. Causa vero febris est venenatum quid, & delecterium, spiritibus ipsis inimicum, quod propria sua Antidoto (sive calidum vel frigidum vel neutrum fuerit) unice subigi potest; Atque promde frustra, eo quod qualitatem aliquam evidentem possideat, vim

Cor-

Corticis febrifugam vel stabilire vel convellere aggredimur; præsertim cum ex testimonio *Petri Aponensis cap. 45.* de Remediis veneni, atque *Hieron. Cardani* libro de Venenis constet, ab usu *Ficuum Pharaonis* calidarum & siccarum in *Insulâ Sardinia* crescentium, quæ inde febriferæ appellantur, febres Tertianas atque certo induci, ac a Cortice usdem qualitatibus evidentibus imbuto sanantur.

Porro non deluerunt Medici celebres, qui vim Corticis febrifugam, ob ejus siccitatem & caliditatem aliasque evidentes qualitates, majori veritatis specie, mordicis atque acriter impugnarunt: Hoc fecerunt celeberrimi Professores *Placentini* & *Mediolanenses* Anno 1661. ubi res agebatur *Cardinalis Doughi*, Febre Tertiana noctua laborantis (referente *Clariss. Bado lib. 1. cap. 15. Anastas.*) quin & Medici ipsi *Londinenses* in calu *Johannis Luca Duratii* Legati antedicti. Sed agendum, expendamus rationes.

Primum *Christophorus Paravicinus* Med. Clar. *Mediolanensis*, utut in Quartanis China-Chinae usum commendat. In Biliosis autem, & Mixtis Febribus, ob caliditatem eam improbat, metuens scilicet ne, calore humorum inde aucto, Febris etiam adaugeatur. Itane vir Clariss.? Verum quis febrem, cujuscunque fuerit generis, unquam ab usu Corticis auctam vel duplicatam hactenus observavit? Appello sensum, atque Experientiam Universalem. Porro, an non *Hippocrates* ipse, *lib. de Aënis*, Vinum febricitantibus concessit? Quinetiam in curatione febris tertianæ succum Silphii & semen Trifolii in Vino propinabat? Annon *Galenus lib. 1. ad Glauco. cap. 10.* in Noctis Tertianis Piper ipsum, & in Quartanis Theriacum præscripsit, atque alibi Absinthium, Centaurium minus, Myrrham, Diatr. Piper, &c. Dic sodes! Quis æquus judex gradum caloris in Cortice magis intensum, quam in hujusmodi medicamentis sensit, vel ratiocinans, vel quidem somniando id hariolari potuit? Verum ut rem ipsam dicam, Nullus dubito, quin in genere Calidorum febrifuga inveniri possint, quæ, proprietate naturæ venenatum fomitem in Spiritibus latitantem subigendo, febrem tollere valeant, quandoquidem vera & genuina febrium Ætiologia, non a quacunque humorum qualitate, verum a statu spirituum venenato rite deducenda sit, ut ante demonstravimus. Atque mehercule! haud parum latatus sum, cum viderim perspicacissimum & doctissimum *Badum* diu abhinc (*pag. 139. Anastas.*) in hanc sententiam hac ipsissima observatione coactum transivisse.

Clariss. Rochus Casum in Tertianis puris vel Spuriis, & in ipsis Quartanis, usum Corticis convellit, quia eum Frigida & Narcotica natura esse suspicatur, unde (ut asserit) Spiritus pro tempore quodatenus forsan obdormiscunt, & veluti a succis narcoticis hebetantur, at, post inducias, Paroxysmi vehementiores: & humore peccante inde vel aucto, vel in partes nobiliores transato, vel magis putrescente, dirissimi morbi succedunt. Si hæc tanti Viri liceat proferre quod sentiam, totum hoc gratis dictum est, & merum Auctoris commentum, cui experientia refragatur. Quis enim

præter illum usquam vel somniando Corticem in classe Narcoticorum posuit? Quanquam *Hippocrates* febres quartanas Soporiferis medicamentis feliciter se expugnasse asserat.

Præ cæteris, hostes Corticis acerrimi erant Viri Clarissimi *Johannes Jacobus Chiffletius* & *Vopiscus Plempius*.

Primum *Chiffletii* argumentum adversus Corticem sumitur à recidivatione febrium post ejus usum; Cui populari objectioni suo loco responsum dabitur. Dein de Corticis caliditate queritur, metuens scilicet ne ejus igneo calore (sunt ipsius *Chiffletii* verba) siccet, accendat & torreat imbecilla præcordia, nativum calorem dissipet, vitæ pabulum depopuletur & nescio quos humores noxios ad partes ab ortu infirmas inde propellat. Bona verba quæso *Chiffleti*? Mehercule! Quæ spectra & terriculamenta hic finguntur de calore Corticis prorsus igneo, depopulante, dissipante, torrente, accedente; siccante? Quis unquam calusticam hanc & deleteriam vim Corticis, vel actualem, vel potentialem, præter Te Vir Clariss. hactenus expertus est? Iudeat doctum virum Principio precario, & contra sensum, & experientiam universi generis humani ficto, argumentum suum adversus pharmacum salubre inaultro suffulcisse: Verum de calore febrifugorum satis, paucis licet verbis, prius diximus *Pergit Chiffletius lib. sui cap. 4.* Et tertio jaculo Corticem petit his verbis. Utut à resolutione partium humoris subtiliorum ex caliditate Corticis exhibiti, Paroxysmi collantur, pars tamen crassior magis incrassatur, & quodammodo lapidescit; indeque post paucas inducias exemplo ferocit iterum febris. Necnon *cap. 6.* ejusdem lib. Inde Bilis flava in suo folliculo, nigra in Liene, Pituita falsa in ventriculo & intestinis coquantur, densantur, immobiles fiunt, quibus putrescentibus, liquefactis, & in substantiam partium adjacentium imbecillum quaquaversum effusis, ac impactis, diuturni & exitiales morbi, etsi lentè ac serò pullulare solent. Adde nihil nisi humores & manifestas qualitates crepans, Vir Clar. toto cælo à vera & genuina febrium Ætiologia aberrat! At non sic *Hippocrates* qui in Medicinæ praxi, ad primas hæc medicamentorum qualitates primum respexit, quippe persuasum ei fuit, omnibus morbis *in dâs* inesse, atque perinde *in dâs*, seu primum impetum faciens; extra sphaeram sensuum poni, neque sensibilem quarumcunque qualitarum potestati subjeci. Porro hæc figens, crassescens, lapidescenque vis Corticis (quam gratis stabilire conatur Vir Clariss.) nec demonstratæ facilis est, nec docti ac experti cujuscunque Medici assensum meretur, adeo magnificum hoc effectum inter quiescencias & deliramenta jure merito haberi debet! Denique, ne brevibus pereat sua charta libellis, aut saltem nri aliquo stigmate infami Cortex notetur, is ipse Vir Clariss. qui modò ei calorem exurentem & causticum, atque dein nescio quam figentem & crassescentem qualitatem objiciebat, jam *cap. 6.* eadem libertate loquens, potius quàm Philosophica; in febribus curandis suspectam habet Adstrictionem ejus, & obstruentem Scripticitatem, quippe viarum apertione solvuntur febres, constrictione excitantur. Ex eodem Ore calidum

& frigidum spiranti, jure merito dolus & fucus olim in Apologo objiciebatur. Atque profecto Clariss. Chiffletius suam integritatem in Cortice impugnando, inde præsertim mihi maxime suspectam reddit, quia positus videtur in contrarii causa, & accusationi Corticis prævariatur. Quis enim facile crediderit Corticem prorsus igneum & adurentem, sua Caliditate cogere, aut repellere, aut figere, aut humorem incrassare posse, & ceteros Frigoris effectus producere? Quæ etenim sunt calida & sicca (testante Galeno Meth. medendi lib. 4. cap. 7.) quod reliquum est humoris prorsus absumunt. At cum reliqua Amara, uti Absinthium, Gentiana, Centaurium minus, Castoreum, Flores Chamæmeli, atque decantatissimum decoctum amarum ex his factum (quæ ferè omnia Febrifuga & Ecphræctica habentur, atque proinde, omnium Medicorum consensu, tuto ad Febres Intermittentes curandas adhibentur) ipsum Corticem Astringione & Caliditate, sensu judice, superent vel saltem æquent; quare Huic amaro cæteris vi Febrifuga longè præpollenti, Stipticitas & Astringio unice objicitur? Fateor equidem levem quandam Astringionem sive austeritatem Cortici inesse: Atqui inde eo inferri vicera, vel habitum corporis obstrui vehementer nego. Nonne Aloë, Rhabbarbarum atque ipse Chalybs astringente ac stiptica qualitate, æque ac calida imbuuntur? Quis autem ea usquam in obstruentium classem hætenus reduxit? Dic fodes! quare Cortex solummodo propter levem suam stipticam acerbiteritatem in numerum Obstruentium illico relegandus sit. Audiamus Galenum de Rubia loquentem, lib. 6. de simp. Medicam. *Quandocunque Amaritudo & Astringio in uno medicamento simplices concurrunt, possunt hæc qualitates similiter coeuntes Jecur & Lienem expurgare, Menses & Urinas sanguinolentas evocare, idque ratione Amaritudinis; possunt et eadem Astringionis virtute vasa claudere & adstringere.*

Post Chiffletium, Clariss. Vopiscum Plempium audiamus, alterum Corticis acerrimum hostem Chiffletio coxtaneum, quem Cl. Badus. lib. 2. cap. 8. Anastas, ait maledicendi libidine ductum, ore, dente, lingua, calce, calamo in corticem irruisse. Ille pallium Philosophicum deponens, Historicum agit, Experientiam adpellat, atque tela inde acuminata in Corticem collimat. Cap. 3. lib. sui anno æræ Christianæ 1655. typis mandati hæc habet, plures tertio vel quarto reciderunt (Ad quam popularem objectionem suo loco respondebimus.) Plerique cachectici facti, nonnulli mortui. Item Magnates hujus Aulæ nominare possem, qui ab usu pulveris, extenuati sunt, & ad Phthisin præcipites facti ni usu longo lactis Asinini restituti fuissent. Hæc Plempius.

Quam egregie vero reprehensus fuit & falsi convictus hic Corticis calumniator à Clariss. Bado in responsione sua Genævæ typis data anno 1656. cui Author nunquam hætenus aliquid regegere ausus est, ipsa Responsio consulatur. Me quod attinet, Ego fidenter dico, idque postquam jam ad 25. annos quotidiano usu, ejus vires explorando expertus sum, me nusquam novisse aliquid mali ab usu Corticis cuiquam evenisse, præter Surditatem aliqualem tempo-

re usus molestam, quippe, à motu spirituum inordinato & lucta inter Venenum & Antidotum ortam, quam sponte illico a morbo exiçto, vel pulveris omissione cessare semper observavi: Me hujus remedii nunquam poenituit, nunquam aliquem cachecticum, tabidum, aut quocunque alio morbo affectum; multò minus quasi toxico interfectum novi, atque ter tantum (uti olim innui) optato eventu, in Febre Intermittente ope ejus sananda, destitutus sum. Verum res ipsa loquitur. Quo pacto enim Pharmacum amarum, quod Menles ciet, Obstructiones aperit, Ventrículum atque genus nervosum universum confortat, Cachexiæ, vel Tabis futuræ, multò magis mortis repentinæ, & inopinatæ fundamenta jaciatur, difficillimum est conceptum. Fateor equidem (quod etiam Cl. Badus innuit) propter antipathiam quandam naturæ adversus hoc medicamentum, ex Idiosyncrasia ortam, ejus usum subitas & enormes Vomitiones, Lipothymias, aliæque dira symptomata, quasi à veneno, excitata, supervenire posse. Verum quid inde? Nunc hoc ab usu Casei, Anatis, aut cujuscunque alius saluberrimi edulii, vel ab aspectu solo, vel præsentia Felis in eodem cubiculo, vel à Pharmaco saluberrimo sapius evenit? Idem sanè à tantillo Mellis, Syrupo Cariophyllorum & Oculis Cancrorum nonnunquam accidisse memini. An inde hæc omnia in censum deleteriorum & toxicorum potius releganda sunt? Porro quoties à nimis parco, vel non satis frequenter repetito usu Corticis contigerit Fermentum venenatum febrile vi suppressum esse, potius quam penitus subactum, Ager recidivam non raro patitur, & aliquando, ubi fomes venenatus, Cortice quadantenus irritatus & subactus, febrilem paroxysmum haud amplius formare possit, in statu valetudinario, cum appetitu prostrato manet, atque læpe symptomata dira, præsertim in genere nervoso, formam & speciem induentia nunc lipothymiarum, nunc spasmodorum dolorificorum, aliarumque affectionum id genus, peculiari nomine haud designatarum insinuat; Quæ omnia à repetito & justo usu Corticis, absque quacunque alia methodo, sponte cessant. Verum quid hoc ad Corticem? Culpentur Medici qui ipsum satis copiose non exhibuerunt, aut Aegri qui ejus repetitionem respuebant, non verò pharmacum quod insons est.

Corticis, ad decennium præjudiciis Vulgi, & Professorum laborantis, vindicias Rolandus Sturmus Medicus Clariss. Delphensis edidit anno 1659. stylo compto, & perquam elegantè scriptas, sed veterem Humoristarum hypotheseis sapientes. Is pag. 3. disertè ait, Febrifugum Peruvianum hætenus penè sopitum, jam demum ob experimenta varia ejus præpollentis energiz in Quartanis profigandis, Anno 1648. frequenter habita resuscitari coepisse. Et paulo post de Medicis Corvæ hoc modo clarè sententiam suam profert, Medicamentum scilicet, quod non noverant, ausi sunt non modò alto supercilio despicere, sed etiam sesquipedalibus verbis idem prosequentes eliminare. Post hunc Clariss. Sebastianus Badus Medicus Gemmenis. quippe à Vopisco Plempio in libro suo typis dato Anno 1655. ad exequias Corticis Peruviani

viani vocatus, tandem libro, cui titulus Anastasis Corticis, Anno 1663. edito, pro virili Corticis causam agebat; Quo in libro, utut aliqua superstitionem regionis redolentia Lector inveniat, maxima tamen ex parte, Cl. Authorem sentiet in scriptis ubique eruditionem multifariam, ac profundam spirare, atque iudicio admodum limato præpollere, quod quidem præsertim liquet, ubi Doctissimum Chistetium, Plempium, reliquosque Corticis hostes acerrimos argumentis vereblencicis redarguit, atque vires Corticis salutare plurimis usque amplissimis testimoniis comprobant, & causam febrifugi penè proculcati, & triumphari, doctè adeo & argute vindicat, ut vix quisquam è turba Medicorum postea adversus Corticem hircere ausus sit. Quin & exinde, de acri, atque purgato hujus magni viri iudicio ritè conjectura facienda est, quippe is fere primus, pro sagacitate sua, idque jam olim, posthabita humorum & evacuationum sensibilibus, atque qualitatibus manifestarum doctrina, vires hujus magni remedi febrifugas Anastas. lib. 1. cap. 13. ab ejusdem occultis qualitatibus deducere satagebat, atque amplexus est illam ipsam Hypothesin, quam nos mox proponere, explicare, atque stabilire conabimur, utut veteri humorum doctrina imbutus, atque implicitus, non admodum clare & congruè sentia sua ubique proferat.

Ita tandem, licet difficillimè, atque multo labore, oblitricantibus plurimis Medicis doctis & probis, qui ex veris vel falsis principis ejus causam defendebant, Pharmacum hoc divinum, & in plurimis aliis morbis æque ac in Febre Intermittente proficuum Anno 1663. post varia Abortionis signa, & pericula, feliciter in lucem editum, & suffragio Professorum pene universali, in censum Medicaminum salubrium, atque maximè efficacium adaptatum est. Nec de suo jure apud doctos & probos Viros decedet ante consummationem sæculorum, utut ex avaritia, malitia, temeritate, aut ignorantia non desinant aliqui huc usque oblitescere, oggannire.

Verum ægèdum, secundo loco expendamus rationes populares contra salubritatem atque utilitatem hujus remedi, quotquot sunt, quibus vulgus perterritum anceps adhuc, & dubium manet.

Primo & præcipuè objicitur, Febres hoc pacto curatas sæpe in forma priori, vel deteriori recrudescere, indeque potius suppressas quam sublatas videri, cum faeces morbi intus adhuc cohibeantur. An igitur Cortex ea de causa male audiet? Equis præter unicum Connygium in salubris hujus Pharmaci parte terrestriori portiunculæ quasdam deleterias, & febriles, in subtiliori verò Febrifugas delitescere, contra universalem experientiam vel somnando harriolatus est? Febres sanè, substantia Corticis citius ac certius, quam quacunque speciosissima ejus Tinctura, Extracto, vel Elixire fugari, atque fugatas ad recidivationem minus aptas esse certo certius constat. Non igitur Medicamentum, sed Febris indoles in culpa est. si à perenni humorum fonte enutriatur, & non ab Aere maligno, aut alio accidente externo; Sive enim Natura, sive

arte quavis sanetur, ad revirescentiam valde proclivis est. Multa enim experientia fretus, indenter affirmare audeo febrem à Corticis usu fugatam, & demum recidivantem, licet quacunque alia methodo, vel Febrifugo, vel viribus Naturæ subacta fuisset, nihilominus redituram fuisse. Atque hanc sententiam ego eo lubentius amplector, quia Febres Continentes Inflammatoria, æque ac Intermittentes hac Antidoto penitus absque aliqua recidivatione quotidie evincuntur & extinguuntur. Imo Intermittentes Febres, maximè pertinaces, Cortice frequenter repetito, & ad prophylaxin, post debita intervalla, exhibito, absque recrudescentia periculo, funditus tollere facillimum est (uti mox in Methodo exhibendi hoc Pharmacum ostendamus) quod quidem nec alia quavis methodo curationis, nec alio quocunque Febrifugo præstare licet. Neque est, cur quicquam multum Corticis usum noxium esse, ac deleterium suspicetur, utut Phthisis, Scorbutus, Icterus, Hydrops, atque alii Morbi immanes aliquando Febres Chronicas insequantur; atque affectiones etiam nervosi generis, quoties nimis parco Febrifugi usu fermentum supprimitur potius quam subigitur: Nunquam enim me posuisse memini, quod Corticem frequenter & copiose exhiberem; Inde enim sæpe appetitum magis huiusmodi, concoctionem alimentorum in ventriculo restitutam, generi nervoso robur adjectum, & habitum corporis, a statu tabido in Athleticum mutatum observavi. Quod ad faeces febris spectat, quæ in corpore delitescere dicuntur post sublatam Febrem, illas palam profiteor me penitus ignorare, æque ac faeces ipsius Pharmaci, quibus Vulgus perterritum, post usum Corticis Cathartica medicamenta perperam assiligare solet. Fæx quippe unica, seu fomes febris, juxta nostram hypothesin, est venenatus spirituum status, qui inde humorum massam varie agitant; Hoc autem a propria Antidoto subactis, humores in statum naturalem sine faecibus redeunt. Quis igitur, post victoriam à Cortice de veneno reportatam, de faece morbi adhuc solliciti sunt, mihi videntur nodum in scirpo querere, modo abest manifesta Cachexia quæ huic veneno primum animam præbuerit. Quod quidem rarius me observasse memini.

Secundo objicitur, Corticem energiam suam febrifugam exercere Constringendo Humores (uti aiunt) unde habitus corporis non possit non constipari atque obstrui (unde messis morborum funestorum ampla, Hydropum, sc. Icteriorum, &c. expectari possit) & vix quenquam ab usu Corticis ad septennium superfuisset. Bona verba quæso! Quot ego ipse post quatuor lustra annorum, & quod excurrit, ab usu Corticis vegetos, atque firma valetudine utentes vidi, & magis Athleticos quam prius. Forte illi qui hæc objiciunt vix per septennium ejus vires experti sunt. Quo pacto autem Pharmacum quod more Cathartici operari aliquando observatur, quodque in Puerperio salubriter ministratur, inter Obstruentia numerari potest? Veteres isti Philosophastri, qui Ætiologiam omnium morborum ex humoribus & manifestis qualitatibus petendam esse duxerunt, ubi, sine aliqua evacuatione sensibili, febriles

febriles fermentationes, illicò à justâ dosi Corticis exhibita, sopitas videntur, inde, experientia reclamante, & rei ipsius natura, nescio quam omnipotentem Constringendi & Obstruendi facultate. Pharmacum hunc inesse commenti sunt. At sane, Cortex febriles fermentationes neque facultate obstruente, neque deobstruente nititur, verum vi sua Alexipharmaca, qua eximie præpollent. Quocirca non est, quod quinquam nisce terribilimentis, infamius, & deamentis Philosophicis ab usu Polychrethi hujus Pharmaci teneatur.

Denique Objectionem tertiam contra usum Corticis allatam me plane referre pudet, quâ non tantum a Pharmacopolis quibusdam avaris, verum etiam a Professoribus ipsis, iisque viris doctis, nonnunquam me petitum memini, sc. quod ab hoc ore & Laconico modo febres curandi, Ars Medicinalis ultimum detrimenti passura sit, præsertim, si vires hujus Antidoti efficaces atque præpollentes in Febris Continuis, æque ac iam in Intermittentibus protigandis vulgo passim innotescant. Hinc enim quis fiet sibi medicus, & Medicorum lucrum eripietur; tot enim Cantienam ex hoc pendunt, ut quamplurimum lucri faciant. Apage! Decetne Medicum probum emolumento publico proprium lucrum anteferre; aut Deum in entium dona in sudario abscondere? Longe hoc a Nobis absit; Nec Ars nostra in levamen ærumnarum, & tu amen vitæ inluta, in artem crumenæ emulgenti degeneret. Nonne Medicus misericors gemitu, & lacrymis Ægrotum tangitur, cunctis, præ artis nostræ defectu, subvenire haud possit? Quantâ vero lætitia pertunditur quoties desperata sanitas eis restituitur? Nigro equidem carbone notandi sunt, qui cum possunt, nolunt ægrotantibus manum adiutricem porrigere. Quid? quod in honorem Artis nostræ deceat Medicum ab Orci faucibus quam plurimos liberare, quod qui fecerit, optime sanæ, quin & crumenæ suæ consulit, siquidem omnes Ægrotantes eum accerunt, qui sese citis, tutis, & jucundis curationibus prius insigniverit. Denique, ut ut certum atque efficax sit hoc Remedium manu experti Medici ministratum, adeo tamen Proteiformis est febris Intermittens, & multo magis Continua: uti præter ipsius Antidoti exhibitionem, Medici auxilium & præsentia sæpius requiratur, ut Phlebotomia, Vesicatoria aliæque ejusmodi plurima præferantur, quæ non tantum morbus, verum etiam symptomata varia inde suborta, postulant atque exigunt.

Restat jam tertio loco, pro modulo nostri ingenii, eruenda & accuratius pensanda Causa genuina efficacæ Corticis febrifugæ, mirabilis sanè ac stupendæ, quæ ratione scilicet hæc suas vires in febris subigendis tam certo & citò exercet.

Hoc non fieri per sensibilem quancunque humorum evacuationem, Salvationem, sc. Vomitum, Secesum, Urinam, vel Sudores, clamitat universalis experientia, Hoc Amici æque ac Ofores Corticis pro confesso habent. Fateor equidem Vomitum vel Fluxum alvi, quin & Sudorem profusum (evacuationem autem aliam sensibilem inde consecutam haud no-

vi) ab usu Corticis aliquando accidere. Nulatenus vero itæ evacuationes Criticæ, verum potius symptomaticæ reputandæ sunt, quippe ex amari hujus Pharmaci particulis pungentibus, atque membranas ventriculi & luterinorum lacerantibus, maxima ex parte ortæ, Pluries vero idque certius & felicius absque quacunque hujusmodi evacuatione scopus attingi solet.

Æquè etiam certum est non ab evidenti aliqua Corticis quantitate humores attenuante febres fugari, ut ut Gaudentius Brunaccius, lib. sui, cap. 1. ex principis gratis itabilis sefe torqueat, ut probet vim Corticis febrifugam in Caliditate & Siccitate contineri. Quam quidem ob causam doctiss. Chinetius, aliique, majori rationis specie, eum prorsus e censu febrifugorum exulare debere putant. Ecquis enim sanæ mentis hæc in re Gaudentio usquam assensum præbere queat, nisi qui spiritum Vini, vel aliud quod is necessarium & calidissimum Remedium, eodem jure inter febrifuga numerandum, & Cortici præferendum ducat?

Quid sentiendum sit de Clariss. Casato, qui in facultate Corticis narcotica & hgente (gratis sæpe ei adscripta) totam eius vim febrifugam ponit; uti & de Antymo Conygio, qui in subtilitate ejus partium egregiam hanc potestatem inesse opinatus est, ex antedictis satis constat.

Rolandus Sturmius Vir ingenio verè Spagyrico, hypothese quâdamtenus novâ. Hanc vim, dissolventi partium Corticis tenuitati acceptam refert. Ait enim *Part. 2. pag. 36. 37.* libri sui. Eum separare humorem febrilem, prius massæ sanguineæ mare continuo, live contiguo, intune unitum: quo, compage humorum vi Corticis solutâ, pars febrilis, pro genio & aptitudine suâ, per omnia Colatoria eliminatur, pars crassior sc. per Intestina, tenuior per Urinam, Sudores, & insensibilem Transpirationem. Hypothese fateor summo ingenii acumine excogitatam esse, & tanto viro dignam: Quæ tamen, pace Cl. Authoris, mihi videtur principiis prorsus precarius inniti. Non obstante enim docto illo, ac acuto sermone de Naturâ Dissolventium, atque variis Dissolutionum modis, Ecquis Corticem crediderit, quem ille ipse *Sect. 3. p. 46. 47.* verissimè asserit temperamentum moderatè calidum siccum, & amarum, unâ cum reliquis febrifugis participare, atque nullam extremam qualitatem possidere (cui rei sensus testimonio est) particulis adeo præpollenter pungentibus, & penetrantibus esse refertum, ut humores varios cum sanguine intimè unitos, fluxu & refluxu perpetuo agitados, ad instar ignis aut fermenti summè activi, dissolvere queat. Neque facilius demonstrare potest Vir Cl. Evacuationes per Sedes, Urinam, Sudores atque insensibilem transpirationem semper à Corticis usu insequi, quoties vires suas febrifugas cum optato successu exercent, quod prius innuimus. Quid? quod tota hæc hypothesis crassâ humorum & qualitatum manifestarum doctrinâ innititur.

Ad Transpirationem humorum insensibilem à Cortice effectam quod attinet, hoc mihi videtur etiam gratis dictum, quippe ut ut effluvia humo-

humorum, eaque copiosa, per poros cutis perpetim avolare lubentissime concedam, diffinere tamen admodum probatu est, ea a Corticis usu copiosa heri, vel saltem particulas febriles inde hac via protrudi, quandoquidem id insensibiliter veri affirmetur: Atqui minime decet Philosophos istos omniscios, qui minutularum quarumcunque rerum rationem sese reddere posse jactitant, atque inde adversus occultas qualitates debacchantur, ad hoc Asylum ignorantie confugere.

Clarissimus atque doctissimus Sebastianus Badus, penitentis undique, atque demum refutatis variis huc celeberrimorum Authorum sententiis, lib. 1. Anatis. Corticis cap. 13. à cita atque subita ejus efficacia, in omni Sexu, ætate, atque temperamento; Qui non ratione, verum usu atque experientia primum inventus, & demum comprobatus erat, aliisque Argumentis verè Elencicis probat & propendum demonstrat, non à qualitate quacunque manifestâ, verum potius ab Oculta Corticem singulari hac efficacia præditum esse, quem igitur Antidoti nomine sapius cohonestavit. Neque est cur quisquam hanc qualitatem esse ignorantie Asylum Philosopho indignum obiciat (quod ubi vir doctissimus reponi posse præstat) quippe, ubi de Anima, Spiritibus, eorumque affectionibus, & ægrotationibus, aliisque ejusmodi, quæ sensum superant, ratiocinemur; Demonstratio, nisi ab effectu expectanda non est. atque satius est, hoc ritu, modeste ignorantiam confiteri, quam superbe *inspirationis*. Quam funestis erroribus ex hypotheli male formata, & in Philosophia, falso sic dictâ, precario fundata, in praxi Medicinæ sæpe committuntur: à Cortice ipso exemplum peti potest, adversus cujus salubrem usum Philosophi in doctrinâ Humorum & Qualitatum inanitellarum præoccupati strenue acietant. Sufficit Medico ad praxin instituendam, si noverit a posteriori seu, effectu, rem ita se habere, licet *visum* seu quam ob causam contingat, plane nesciat.

Plurimum lætatus sum, cum in tantâ Medicorum multitudine unus tandem repertus esset, doctissimus sc. & sagacissimus Urotospatarius, qui eandem propemodum nobiscum sententiam amplexus est, Cujus verba hæc sunt. Melius ergo ad fermenti extinctionem recurrendum, cum potius fermentata materia augeantur & effervescent. Ad quam adeo! fermenti extinctionem nulla est necessaria subsequens evacuatio, cum sæpe illud in Spiritibus velut indivisibilibus consistat. Non enim bene capio humores esse febris causam immediatam, nam aliâs omnes homines febricitarent: sed potius quid humores agitant & fermentant, in natiæ existens, quo sanè ablato, Natura sese corrigit.

Uc verò Hypothesis nostra de vi Corticis Alexipharmacæ magis illustretur, pauca in genere de Naturâ, Subjecto, & variis differentiis Venenorum, atque Antidotorum (quantum rei natura patitur) prælibare necessarium duco, quatenus ad naturam & causas febrium cognoscendas, eaque curandas conducere videantur.

Venenum seu Toxicum est quid deleterium,

atque vitæ principio, seu Spiritibus animalibus inimicum, unde Facultas eorum Expansiva penitus obruitur, & Flamma vitalis necessario extinguatur.

Spiritus animales, tanquam subjectum primum & immediatum, a veneno affici constat. Quia à minima quantitate materie peregrinæ citissime afficiantur; quod innuit Jul. Caesar Scaliger. Exerc. 218. §. 8. atque etiam Galenus quinto de Simp. Medicam. cap. 19. & lib. 1. de semine cap. 16. huc verbis. Minima portio Venenorum, quæ deleteria appellantur, Ubi in animalium corpora ingressa fuerit, totum id momento temporis immutat, sibi que simili affectione alterat. Ecquis verò segnem humorum massam à grano uno vel altero i harmaci deleterii, eo quod evidenti quacunque qualitate præditum est, tam subito, & quasi momento tantas mutationes subire posse facile credet? Quod autem a Veneno exhibitio, ante aliquam sensibilem humorum alterationem, Principium vitæ petatur, Animi deliqua frequenter recurrant, Genus Nervorum undique vacillet, atque variis Spasmodis dolores tentetur, Intestina torqueantur, cerebri deliret, & vertigine afficiatur, Oculi obtenebrentur, cor trepidet, multaque alia symptomata spirituum animalium morbo affectionum vehementiora accersantur observatu non indignum est. Fateor equidem nonnunquam venenatum hunc fomitem ex abusu longo sex non Naturalium in massa sanguinis intus nasci, atque inibi paratum cum Spiritibus perpetuo commisceri. Hoc tamen unice contendendo cum nunquam nomen Toxicum mereri, nec quidem Veneni speciem induere, donec Spiritus eo inquinentur, atque agitentur, & inde totum systema nervosum præmemorata symptomata patiantur. Præterea, à non orsu Viperæ, vel Aëre contagioso inspiratione hausto, ubi procul omni dubio, Spiritus, non massa humorum, primario afficiuntur; æque certò ac cito tota corporis compages Veneno contaminatur.

Quandoquidem autem tota œconomia sanguinis & humorum, horum spirituum regimini subiecta sit, & vitalis character in humoribus à Spiritibus imprimatur, mirum non est, si ab hoc statu spirituum Venenato, atque variâ eorundem agitatione, illico (uti solet) tota Machina idem virus participet, ac variis,isque dirissimis Symptomatis laboret, atque per corporis colatoria, pro genio Veneni vario, excretiones copiosæ & virulentæ, nonnunquam colatorii Sphacelationem minitantes, extemplo fiant; Necnon à subactione virosi fermenti, per propriam Antidotum, vel expansionem spirituum, excretiones fiant, aut interea temporis, Lacte, Aquâ Pulli, Oleo aliisque ejusmodi liquoribus lenientibus humorum excretorum acrimonia plurimum mitigetur.

Hoc pacto, à Veneno hausto (modò præ gradu Toxicum summe deleterio non contigerit instantanea spirituum extinctio, & subita Mors) Ager illico febre mali moris detinetur, variè sese jactitat, immaniter sitit, Lingua scæda atque arida evadit, Algore, Horrore, Tremore, atque calore, alternis laborat (prout

sc.

sc. Spiritus plus minus Veneno perciti sese expandere inceperint aut tentaverint) Pulsus sit celer, Debilis, Inordinatus; variis doloribus horrendis & spasmodicis Patiens hinc inde corripitur, Cutis ubique rubedine suffunditur, vel Exanthematis, Maculis purpureis, aut Ulceribus sparsim scedatur. Accedunt Mictus sanguineus, atque Dysuria, velut a Cantharidibus devoratis; Ubi Natura, pro genio Veneni peculiari, humores venenatos per Re- nes deturbare satagit; Aut Spasmi ventriculi, ac Intestinatorum lancinantes, una cum Vomitione immani, Dejectione frequenti, vel fluore Alvi cruento, Cholera morbum, Diarrhoeam torminosam, aut Dysenteriam simulantibus, ubi venenatus fomes genium Emeticum, Catharticum aut utrumque sapiens, humores infectos & colliquatos per ventriculi & Intestinatorum glandulas enormiter protudit. Quoties autem venenum de genere Mercurialium fuerit, ad glandulas salivales peculiari modo tendit, & suffocatione molesta, atque Ptyalismo Aërum è medio tollit. Quæ quidem morbo- sa humorum excretiones consueque tantum du- rant, donec Venenum vel ab Antidoto propria, vel à Spirituum expansione subigatur, Atqui, hoc factò, massa humorum sponte quiescit, & in statum naturalem & sanum ultro redit.

Quid autem sit hoc Venenum, quod tam su- bito Principium vitæ adorat: tot tantæque mutationes in tota Machina efficit; vel in quo præsertim ejus Virulentia consistat, narra- tu haud ita facile est; neque quisque id jure merito à nobis exigere potest: Quia, sicut Spiritus quos immediate afficit, sensus nostros planè fugit, & à posteriori duntaxat intelligi potest. Uti enim vehiculum hujus virulentæ, nempe Cicuta, Antimonium, Mercurius, Ar- senicum, Cantharides, vel quodcumque sit, sensui patet, quippe quid quantitativum, & palpabile, his, vel illis manifestis qualitati- bus præditum, virulentia tamen ipsa, in quo consistat, non ita liquido apparet; neque, ut plurimum, à quavis qualitate evidenti, Cali- ditate, sc. Frigiditate, Siccitate, Acrimonia, &c. dependet, proindeque in Classe Ineffa- bilium, quippe sensu non perceptibilium, uti Anima, Spiritus animales, aliæque id genus collocanda est: Satiùs enim est Philosophum sana mente quædam ignorare, quàm insanè nugari & delirare. Quod autem revera Viru- lentia Toxicorum à sensibilibus eorum qualita- tibus deduci nec possit nec debeat, verum potius à peculiari Spirituum animalium fabrica, cui virulentia insensibilissima est, exinde constat; quia nonnunquam saluberrimum Pharmacum, aut Alimentum, ratione Idiosyncrasias, Toxi- ci partes obrinet. Plurimos novi à Pharmacis aut alimentis ejusmodi in enormes vomitiones, atque dejectiones incidisse, ac deliquia per- pessos, ac si Toxico maximè virulento perciti fuissent; Salubria autem hujusmodi Pharmaca, atque Alimenta, non, quia sanguis & humo- res, verum quia Spiritus peculiari modo præ- dispositi sunt, hos effectus producant: Nam- que quantitas eorum tantis motibus atque al- terationibus in mole humorum immensa cien- dis planè impar, licet inopinato deglutita; Rei odio habitæ conspectus, aut ejusdem Idea

in Phantasiam fortiter impressa, eos motus excitat, qui ægre admodum consopiantur, priusquam Idea in Spiritus impressa deletera fuerit.

Disquisitione generali peracta de veneno, ejus causa, subjecto immediato, atque Diffe- rentiis, succincta licet; non opus est ut in na- tura, causis, & differentiis variis Antidoto- rum, atque rationibus operandi describendis diu moras traham; Contraria enim juxta se po- sita magis elucescunt. Sufficit nobis modestam Philosophiam unice professis, nosse, sicut ve- nena immediate Spiritus afficiunt, ita etiam Antidoti, hæc miasmata in Spiritus impressa delendo, vires suas Alexipharmacas exercent, quamquam, *id est* seu per quam manifestam quali- tatem id efficiant, nos prorsus nescire ultro confiteamur. His non contenti, ignorantiam nobis objiciant, si voluerint, atque e Cathedra Verbis desquipedalibus & altisonis, naturam Spirituum, eorumque morbos, & curandi ra- tionem unà cum reliquis, quæ sensum æque ac Intellectum longè superant, disertè describen- do & dogmaticè definiendo pulmones rum- pant, quod ad me attinet, ego non facilem præbebo aurem: De iis, quæ extra sphaeram sensuum posita sunt ratiocinari, quid aliud est quàm eruditè delirare, præsertim, ubi vera Indicatio curativa (quæ quidem hic una tan- tummodo est, scilicet, ut opportunè exhi- beatur juxta quantitas Antidoti certo usu com- probata) absque his argutiolis innotescat.

Ut vela igitur contraham, totum hunc no- strum sermonem de Venenis ac Antidotis ad febres accommodare jam aggredior, Argu- mentis à rei ipsius natura petitis ostensurus, Fermentum febrile esse quid deleterium in Spi- ritibus delitescens, Atque Corticem, more Antidoti, virulentiam febrilem subigere, & vi- res suas febrisugas exercere.

Quod ad primum attinet. Quàm facile ob- servatu est, à supremo gradu Fermenti febrilis, Spiritus adeo esse oppressos, ut ne certam quidem cum hoste influere queant (sive fer- mentum hoc à longo abusu sex non Naturalium intus natum fuerit, sive ab Aëre contagioso, vel frigore externo, Corporum immixtum) Aërum primo insultu prorsus Argentem, frequentia animi Deliquia patientem, tanquam à toxico lethifero propinato Mortem oppetere; Quod quidem in constitutione pestilentiali Epidemi- ca (ut olim inuimus) sæpius evenit.

Quoties autem mitior sit Veneni natura, Spiritus vires suas tandem exercent, atque, quæ sequuntur symptomata febrilia, eadem prorsus sunt cum iis, quæ à Toxico quocun- que mitiori sese alternatim excipientia, quo- tidie producuntur, scil. Algor, Languor, Animi deliquium, Jactatio, Horror, Rigor, Oscitatio, Pandiculatio, Vertigo, Dolores Spasmodici, Debilitas Pulsus, Ardor, Sitis, Lingux Ariditas. Porro massa sanguinis, & humorum à fermento febrili eadem planè, easque æque repentinas mutationes subit, ac si Veneno esset inquinata, Quippe, jam pro febris peculiari genio, per totam cutim Ru- bedo ubique suffunditur; aut in Labiis, Nari- bus, & aliis quibuscumque corporis partibus Exanthemata varia, pustulæ, atque maculæ

Pete-

Petechiales, rubra, vel purpureæ efflorescunt: vel Bubones Alas & Inguina, cæteras partes Carbuiculi, Furunculi, Tumores, atque Ulcera varii generis obsident.

Denique, à vario hujus virulenti Fermenti genio, non tantum typorum varietatis, sed etiam symptomatum febrilium inde consequentium ratio, clariùs quam à quacunque alia hypothefi deduci potest (quod à Philosopho non nihili habendum est), y. g. Ubi Fermentum mire spiritus exagitat, victoria de Naturâ non reportatur, verum spiritus fere integri, quamvis irritati, vi majori in hostem irruunt, atque, quâ data via, Secellu, Vomitu, Sudore enormi, &c. (Pulsu interim forti ac celeri permanente) undiquaque id eliminare fatagunt. Inde symptomata vehementiora momento quasi suborta virulentiam fermenti mitiorem, ac vires Naturæ magis integras, utot lacescit ostendunt. Ita nonnunquam viginti quatuor horarum spatio, plus minus, ab hac extrema expansione spirituum, virulenti Fermenti activitatem planè subactam videre est, atque Ægrum inde in statum *anxiosius* restitutum, nisi post statas periodos, singulis, alternis, vel quarto quoque die suo more recrudescat, atque, viribus refarcitis, Naturam de novo lacescat.

Quoties autem, præ gradu Fermenti Febrilis magis deleterio, accidat vires spirituum eo esse pessundatas & labefactatas, ut nequeant prima sua expansione, de Veneno activo, quo imbuuntur, penitus triumphare, Febris suboritur ab Antiquis dicta, *zuxis* sive continens, continua quidem, at certis ac statis Paroxysmis, atque Remissionibus interpuncta. Cui etiam congener est Febris Inflammatoria, sive Rheumatica, Erysipelatosa, Pleuritica, Peripneumonica, &c. Quam quidem Febrem, utut dira aliqua symptomata, spalmi nempe dolorifici in genere nervoso, aut Diarrhœa, cholera morbus, vomitio, &c. In Emunctoriis, ab insultu Naturæ in hostem provenientia, à primordiis ipsis morbi comitari soleant, quia tamen Venenum non summè deleterium est, Febris minus lethalis fit; At unoquoque congressu victoriam (licet non aded perfectam ac in Febre Intermittente) Natura de Morbo reportat. Hinc Exacerbationes & Remissiones, toto morbi decursu, statis periodis sese alternatim excipiunt.

Ubi verò, Veneno prævalente, vires spirituum nativæ potius delentur, quam opprimuntur ac irritantur, ab initio, sine violento aliquo symptomate, Æger serè *anxiosius* jacet, cum Urina sana, Pulsu debili, vel saltem moderato, utut celeri ac inordinato, Siti pauca, Languore virium summo, si non deliquio frequenti detentus, ac madore frigido ubique perfusus. Febris uno tenore pergit, sine exacerbationibus & remissionibus periodicis, estque ut plurimum periculosa & Maligna, Æger autem fatiscit dirissimis symptomatis in genere nervoso confectus, quia spiritus animales ab initio veneno aded potenti inquinabantur, ut certamini instituendo impares, Fermentum neque subigere neque minuire valerent.

Quoties Venenum Febrile genii Emetici est, Ventriculum petit, per ejus glandulosam tu-

cam virulentiam suam excernere satagens (quod in Febris Intermittentibus præsertim videre est.) Quam enormi Vomitione, vel saltem Nausea, durante Paroxysmo, ac si ab Antimoniali haustu epoto, Ægrum perpetim lacescitum conspiciamus? Viribus autem veneni in decursu Paroxysmi fractis atque subactis, momento quasi, hæ turba sponte compescitur, donec, recrudescente veneno, manna sanguinis, ac si ab Emetico recens propinato, de novo inficiatur. Præterea Febres continuæ dicitur *zuxis* æque ac Intermitteutes, durante Paroxysmo, Diarrhœam serosam & torminosam, Dysenteriam vel cholera morbum simulant; Ægri enim fluxu Alvi enormi, aliquando cruento; aut excretionem humorum colliquatorum immuni sursum ac deorsum, cum Spasms horrendis, quasi à colocythide, Arsenico, vel forti ac deleterio quocunque Pharmaco exhibito, corripuntur: Quippe fermentum Febrile naturam Arsenicalem vel aliam aliquam ejusmodi deleteriæ catharticæ sapiens, Glandulosam Intestinorum tunicam ultro petit: Colliquatio verò, finitâ exacerbatione, sponte cessat, aut saltem mitigari incipit, atque viribus Opiatorum ac alstringentium citius longè, & certius cedit, quam vigente paroxysmo. Porro, in Medicina Tyrones non possunt non sæpius observasse Febres *zuxis*, & Inflammatorias continentibus congeneres, præsertim autumnales, atque ab habitu Scorbutico oriundas, Salivatione legitima per dies 21. plus minus durante, cum Aphthis, Tumoribus oris, & Faucium Ulceribus, cæterisque symptomatis omnibus, præter halitum foetentem, Mercurialem ptyalinum comitari solitis sociata, criticè terminatas: Quippe fermentum Febrile humores exagitant veneno Mercuriali imbutum, suapte sponte ad fauces, & glandulas salivales tendit. Insuper, sicut in Febre Diabetica symptomatice; ita in nonnullis aliis Febris, præsertim Scorbuticis, copiosam serosæ colluviei separationem criticè fieri per Renes nonnunquam conspiciamus, à Fermento virulento, procul omni dubio cantharidibus congeneri, vel ejusmodi alicui sine nomine Toxico, quod Renes præ alia quavis parte petat. Neque multum forsan à verò aberrare videamur, si statuamus Febrem illa à Pestilentiali Epidemicam, Sudorem Anglicanum, à Polydoro Virgilio descriptam, & reliquas Febres istiusmodi colliquativas malignas, à venenato fermento peculiari (utut proprium ejus non en hactenus non sit designatum) quod virulentiam suam per poros cutis eliminare satagat, ortum ducere. Uti & Pestem, aliasque Febres mali moris congeneres, Anthracibus, Carcinomatibus, nigris Maculis in cute efflorescentibus, crusta nigra ori & lingua obducta, reliquisque ejusmodi symptomatis notatas, à Sphacelante, & caustico quodam, seu adurente Fermento oriri: Quippe ipsissima eadem symptomata à Venenis causticis intro sumptis passim proveniunt.

Quamobrem, modò de hisce rebus quæ sensus planè fugiunt ac superant, liceat à Posteriori, seu effectu ratiocinari (quod jure merito negari haud potest) concludendum est hoc fermentum, Veneni reapse semper plus, minus particeps esse.

Hoc concessio, quid opus verbis ut demonstrarem Corticem Peruvianum vim suam febrifugam Antidotorum more, exercere, scilicet venenatum huic fomitem expellendo & subigendo? Ecquis enim hactenus aliquo Remedio Arte parabili, nisi Antidoto seu Alexipharmaco venenum vincendum esse somniavit? Et quam inani labore Medicamentis contrariis qualitatibus imbutis, adversus effectus & symptomata morbi miramur, dum ejus fomes, seu causa integra & salva intus maneat? Huic nostræ sententiæ de virtute Corticis Alexipharmaca fidem facit Modus, quo hoc Remedium operatur; Quam subito enim & inopinatio vires suas exercet, atque in febribus fugandis scopum attingit? *Fracastorius olim lib. 3. de Contag. Morb. Curat. de Boli Armena* vi Alexipharmaca notavit, quod ea homini intumescenti, & in agone à morfu Araneæ posito, exhibita, vox statim rediit ac vita. Non autem à manifesta aliqua alteratione in humoribus inde effecta (quam momento fieri posse nemo opinabitur) verum uti ab Antidoto, quæ venenum propria sua substantia delet, effectus hic verè mirabilis & stupendus ex improvviso producebatur. Ergo eodem planè jure China - China in classem Antidotorum, quo Bolus Armena, adscisci potest. Porro non minus huc spectat Corticis efficacia in omni sexu, in ætate senili ac infantili, in puerperio ipso, in quavis anni tempestate, atque in tempera mentis diversis prorsus, & contrariis: Certe enim experientia comprobatum est, Medicamenta, quæ sensibili quacunque qualitate humores alterando finem assequuntur, pro vario Ægri temperamento, ac causa morbi varia, oportere variari, adeò ut quivis Medicus doctus ac expertus, formulas suas in eodem morbo, & eadem persona curanda necessariò sæpe mutare cogatur: Quinetiam Empiricum, ac Medico indignum hucusque semper visum est, inter unius Receptæ, Formulæ vel Schedulæ cancellos comprehendere. Observatu etiam dignum est quàm parva quantitas Corticis Febrem, quantumvis confirmatam, imò ipsam Quartanam fugare valeat. Licet enim, præ copia Corticis Spiritui, Putridi & Effæti, qui vulgò venalis prostat, Medicamentum hoc magnum, ab indole sua nativa multum degenerasse videatur, & dosis ejus, cum minùs sincerus sit, incerta, ad ʒj. ij. iij. in os Ægri nauseabundi necessariò ingerenda sit, priusquam optatum eventum assequi possimus (de quo jam olim conquerebatur *Cardinalis de Lugo* in Epistola sua ad *Sebastianum Badum*) At quamdiu genuinus ad nos afferebatur, scil. ab anno 1649. ad annum usque 1663 (testante *Bado*) juxta primam formulam *Schedula Romane*, solemini drachmarum duarum dosi Febris quacunque Intermittens, & Quartana contumacissima profligari solebant. Imò *Clariss. Andreas Nicolaus* in Epistola, ait sese drachma una quartanas fugare solere. Alii Scrupulo uno vel ʒʒ. Febres infantium sese subegisse affirmant. Atque equidem Ego ipse, ante annum 1678. Cum circumforaneo Tabor non innotuit, nec apud Medicos increbescere cepit, & Mercatores quidvis putidum ac effæctum, proprii lucris causa, pro Cortice genuino non vendebant, nusquam in Fe-

bre curanda sive Intermittente sive Remittente ʒij. excedere solebam. Qua dosi, æquè certò optatum eventum assequabar ac hodiè Uncia una vel altera. Ecquis autem à tam pusilla quantitate Medicamenti generosissimi totam molem Sanguinis & Humorum, mo: ento quasi, adeò mutari posse concipere queat, ut morbus continuax, qualis est Febris Quartana, inde fugari possit? Præterea nulla extrema qualitate hoc Pharmatum præditum est, qua humores insigniter alterare valeat (ut olim observavit Doctus. *Scutellus*) & ob eandem causam non ratiocinando inventum, & ad usum medicinalem primùm adaptatum erat, verum, sicut alia Antidoti, calu atque Experientia. Præterea (quod prius innuimus) absque quacunque humorum evacuatione sensibili scopum suum attingere solet.

Disertatione de Operatione Corticis peracta, quædam exinde Corollaria deducimus. Primò, ex prædictis Quivis facile concludere poterit, decantatum Febrile fermentum, sive id, quicquid sit, quo Archæus (verbo Helmontiano sit venia) irritatur, atque inde moles Humorum in Febribus variè agitur, non ampliùs quæri debere in massa Sanguinis, ejusve Caliditate, Frigiditate, Siccitate, Humiditate, acrimonia, aliave quacunque Qualitate exuberante, quippe hæc omnes Qualitates manifesta secundariò in sanguine succrescunt, à fermento alibi sito, atque proinde medicamentis contraria qualitate imbutis, in Curatione Februm, unice fidendum non est: Illud autem Febrifugum certissimum est, quod sive calidum, sive frigidum, Fermentum hoc Humores exagitans atque irritans penitus subigit atque delet.

Secundò, Fermentum hoc, quod Principium vitæ petendo, primùm Spiritus irritat, dein totam massam Sanguinis & Humorum diversimode conturbat, in Spiritibus animalibus tanquam primo atque immediato suo subjecto delitescere, atque proinde inibi deleri debere. Quam quidem Hypothesin, utut in apparatu nostro priùs palam demonstravimus; haud parum tamen lucis ei insuper accedit ab observatione efficaciz Remediorum externis applicatorum: Quantum enim cerebrum, atque Genus Nervosum afficiuntur ab Emplastro de Galbano umbilicali, & à variis Odoramentis foedis aut Moschatis, ut in Hyttericis videre est? Quantum à cataplasmate ex Allio plantis pedum applicato, paucarum horarum spatio, Natura patitur ut facile cum suo damno quivis in seipso experiri potest? Quantum denique à Suppedaneis, Pericarpis, Vesicatoriis, Epithematis, cataplasmatibus, atque Emplastris variis Curatio Februm promoveri soleat, Medicis Tyronibus satis notum est. Num autem ab hisce Externis massam sanguinis repente mutatam atque alteratam esse facile quis credat? Multò clariùs mehercule! hujus rei ratio reddi potest ab effluviis horum remediorum externis applicatorum transmissis per poros cutis ad spiritus in fibrillis Membrarum hospitantes, unde Fermentum in partibus nervosis delitescens Immediate, Secundariò verò massa sanguinis alterari facile potest; Neque est, cur quisquam dubitet, utrum Spiritus

Spiritus hi, quippe naturam maxime agilem participant, hujusmodi Fermentorum, quæ itatis periodis delitescunt, atque iterum revirescunt, possunt esse subjectum capax; modo serio secum perpendat in hisce Spiritibus potius quam segni Humorū mole principium Fermentationis ac motus cujusunque, sive continuus sive periodicus fuerit, primum inesse. Tertiō Fermentum hoc febrile plus minus esse venenatum ex jam dictis abunde constat. Atque proinde Quarto, Febrifugum propriè ita dictum, quod ad hunc Fomitē subigendum destinatur, oportere esse veram ejus Antidotum, Amicissimum Spiritibus, verum Fermento inimicissimum, Usu & Experientiā potius quam ratione excogitatum; Cujus parva quantitas scopum suum in fugandis febribus, quatum Fermento par est, cito certo, &c. attingit. In morbis Partium, Viscerum & Emunctoriorum, ubi Fomes in Humoribus præter naturam alteratis immediatè latitare videatur, Medici intereunt causam Morbi ex peculiari humorum Affectu accuratè eruere, quo melius instructus Medicamenta qualitatibus evidenter contrariis ad eos impugnandos imbuta, eligere queat. Verum ad hos morbos Universales curandos satis est nosse Antidotum certo usu comprobata, quæ causæ Morbificæ contraria, eam debeat & Morbum penitus diruat. Qui hac in re altius sapiunt, procul omni dubio in puteum erroris incident, & credulos ac sequaces Discipulos unā secum abducent.

De Corticis Præparatione atque Exhibitione.

Ad ultimum sermonis nostri stadium jam demum deventum est, ubi Justus Modus Corticis præparandi atque exhibendi tradendus est, isque certis Regulis, ac Canonibus usu multo comprobatis comprehendendus. Quod pensum brevi, at pro virili absolvere satagemus.

Atque sanè primo loco, idque accuratissime cavendum est, ne Cortex non sit genuinus & vegetus; Siquidem ubi forte Antidotus ipsa, qua utimur, putida, effæta, male electa aut spuria fuerit; nulla Arte præparandi, nulla methodo ministrandi, hunc defectum compensare possibile est. At cheu! præ locordi incuria, vel sordida avaritia eorum, quorum interest huic Provinciæ diligentius prospicere; quam sæpè Apotheca Pharmacopolarum, & Caplæ Mercatorum, adulterino nescio quo Cortice implentur, vel Cortice genuino, præ ætate autem, vel alio accidente planè effæto, insipido, putido, ligneo, atque proinde nullius pretii? Adeo ut nonnunquam vix decimam ejus partem genuinam, aut saltem vegetam deprehendi. Hoc autem in pollinem redacto, ob veri & vegeti Corticis partem commixtam, fucus non facile percipitur. Ego sanè vix oculis solis, nisi prægustaverim, in Electione Corticis credere soleo, atque equidem, ubi, negotiis impeditus Corticem non coram elegi & probavi, anxius ac tremulus eum semper præscribo, utur, eo nomine, aliquos adversus me vehementer succensentes atque palam exandescentes probè noverim; Quocirca Apotheca publica lege sancienda, & curæ doctorum ac proborum virorum demandanda multum optanda est, ut

Vitæ & Palatis ægrotantium, necnon sanæ Medicorum & Pharmaci Polychreiti consulatur: Dum enim spurium, effæctum & putidum nescio quid, loco hujus generosi Medicamenti, indiscriminatum vendatur, nauseabundi Ægrotantium Ventriculi immensā quantitate ingrati Pharmaci inferciuntur, & ipsa vita nonnunquam in discrimen adducitur, quia in præcipiti morbi cursu tempus sæpenumerò non datur adeo immensæ Corticis adulterini quantitatis deglutiendæ par. Sæpe etiam Medicum ipsum de quantitate Corticis exhibendi incertum manere necesse est, & haud raro expectationem ejus decipi, unde Ars Medicinalis, Medicus, & præsertim Pharmacum Polychrestum non possunt non apud vulgum famam exultationemque amittere. Quam ob causam nemo amplius miretur, si inter plebem adhuc adversus Corticem præjudicia fiant, & Medici vires ejusdem minus perspectas habeant, atque nonnulli eorum sententiam minus æquam de eo adhuc proferre soleant.

Corticem autem qui prostat in Officiis venalis, reapse, maxima ex parte esse spurium, effæctum, ac putidum, testes appello Medicos omnes æquos, expertos, quos ego ipse sæpenumerò audiui hac de re unpenius conquirentes. Quin & res ipsa idem clamat: Quare enim dosin solennem drachmarum duarum Adultis olim præscriptam, hodie in febribus curandis ad tot uncias augere coacti sumus? Quando primum invaluit Corticis usus, scilicet ante Annum 1660. fucum ac neglectum hunc pestiferum à Pharmacopola Collegii Romani jamdudum detectum fuisse constat, ex propriis ejus verbis, quæ hic non pigebit transcribere. Queritur autem Plurimum ejusmodi fictitium Corticem Aqua Aloës lavatum, quo amaritatem conciliet, Romæ tunc temporis advehi, quin & ad alios locos profeminari, ideoque Aromatarios, Pharmacopæos, ac Medicos serio monet, ut sedulo super hac re animadvertatur, ut Cortex, quem emunt, sit germanus, non fucatus. Atque alibi in Epistola sua ad Clariss. Badum April. 9. 1639. data, hisce verbis: Repeto vestræ Dominationi, quotidie magis observari falsitatem Corticis inveciam causa mercimoni, adeoque nocimento fuit in regione Pedemontana duobus, qui post octiduum ab ejus sumptione obiierunt. Et postea, Innotuit damnosum istum Corticem non fuisse genuinum, sed adulteratum, cujus viginti capsulæ Neapolim pervenerunt, & multæ castellæ Romam. Ipsæ etiam Cardinalis de Lugo, cujus industria vis Corticis Febrifuga Romæ primum innocuit in Epistola ad eundem Badum de Cortice scribens ait. Id autem mali est, quod ob ejus usum frequentiore, jam Romæ incipit dehecere, & is qui venum exponi poterit, nescio quamdiu immūnis esse poterit à Mangonum periculis, ut in aliis pretiosis & exoticis Medicamentis accidit. Quid autem jam expectandum est, postquam ejus usus & fama per totam Europam increbuit? Vincentius etiam Protospatarius Doctiss. atque Clariss. Medicus Neapolitanus in Epistola ad eundem Badum disertè ait. Sese duplicem observasse Corticem, Alterum illegitimum, cujusatem vero nescit, sed, ad mercimoni augmentum, à pessimorū quorundā sorditè invecum, nigrescentem, non amarum,

non friabilem, sed austum & viscidum quid ex attritu dentium exhibentem, sapore non aromaticum, sed injucundum potius, ac insuavem. A cujus usu D. Alphons. Gaglia Tertianæ affectus, post quæ dracmica dies summum obiit diem, & Domino Matthæo Sacconi simplex Quartanæ duplicata fuit.

Lubet igitur Criteri genuina adjicere, ex quibus verum à supposititio Cortice distinguere liceat, quæ Articulis perpauis facile comprehenduntur. Genuinus Cortex colorem cinnamomi visui refert: Nigricans colorem rubeum ab Aloë, aut aliquo alio ejusmodi proculubio mutuatus est: Genuinus sapore satis grato ac aromatico amaro est: Injucunde amarus ac intense acerbus pro supposititio habendus est: Genuinus Olfactui odorem spirat peculiari modo Mucidum, attramen suavem, gratum, ac aromaticum; Atque huic sensui in Corticis genuini sinceritate deprehendenda, præ cæteris omnibus, ego credere soleo, & Corticem, cui gratus hic ac peculiari modo Mucidus odor deest, qualemcunque saporem vel colorem referat, semper suspectum habeo. Denique Genuinus dentibus attritus, vel quocunque alio modo tractus, friabilis est, non viscidus & glutinosus, quem utpote liquore aliquo tenaci imbutus ac saturatus rejiciendum duco. Corticem etiam male electum sensu facile deprehendemus, num scilicet sit crassus, & ligneus, quippe tenuis ille, qui à ramulis raditur, est maximè vegetus, quia succo recenti saturatus. Effæctus ac annosus fere omni sapore, præsertim Amaritie privatur. Putridus etiam, modo frangatur, sese palam oculis prodit. Cum multa tamen diligentia hoc scrutinium fieri oportet, quippe ex vassitie & avaritia Mercatorum ac Aromatariorum, mercimonii causa, sapissime ad parvam quantitatem genuini ac vegeti Corticis pars multò major spurii, effæcti ac male electi adjicitur, qui fucus haud ita facile deprehenditur, ubi in pulverem Cortex redigitur.

Quod ad modum Præparandi Corticem spectat, non est quòd diu moras traham in Tincturarum inde elicitarum, Spirituum destillatorum, Elixirium, Extractorum formulis Elegantioribus describendis, cum multà ac diutina Experientia fretus, palam affirmare audeam Chinam-Chinam simplicem, & in substantia, forma Ægro gratissima, exhibitam (modò in polinem seu *Alcohol* arte prius redacta fuerit, ut minori tædio deglutatur, atque ventriculum minus oneret, ac citius per corporis habitum trahatur) certius ac compendiosius vires suas exercere, atque finem optatum attingere, quàm si multa arte, aut igne torqueatur, ac nativis viribus spoliata, more pomposissimo, exhibeatur; Aded ut in istis præparationibus Oleum ac opera perdatur. Neque cuiquam author ero ut nugæ hujusmodi captando, atque reapse nihil efficiendo, temporis pretiosissimi iacturam faciat, siquidem uti cochleariam, reliquæque Antiscorbutica atque (generaliter loquendo) Specifica cætera, quotquot sunt, ita Chinam-Chinam feliciter atque compendiosius operari Experientia didicimus, quo simplicior & minus fucata fuerit.

Copia formularum elegantissimarum præ-

scribendi, atque exhibendi Corticis Medicus instructus esse debet, scilicet ut Pharinacum sua natura non admodum gratum in Haultum, Bolus, Electarium, Apozema, Aliamve quamvis Ægri Palato gratissimam formam redactum minuiretur, & nauseabundi Ægrotantis tædium methodo exhibendi honeste decipiatur; Et nonnunquam Ægro præjudiciis in Corticem præoccupato Remedium salutiferum, nihil tale suspicanti ingeratur, atque denique, ut additamenti aliquibus, quæ vel Medicamento ingratis saporem corrigunt, vel a symptomate aliquo vehementiori indicantur, locus detur opportunus.

In Schedula Romanâ China-China pulverisata in Unciis quatuor Vini Albi generosi propinanda primum præscribatur. Quam formulam Medicos diu solenniter atque religiosè observasse abunde constat: Nihilominus hodie in haultu Julapii cujuscunque temperati, Cerevitiæ fortis vel tenuis exhibitam, æque certò ac tuto eundem effectum producere Experientia comperimus.

In eadem Schedulâ dosis ʒij. præcisè Adultis præscripta erat; Jam autem quia Cortex adulterinus est, coacti sumus saltem ʒj. nonnunquam ij. vel iij. ingerere, priusquam scopum attingere possimus. Drachmas duas viz jam sufficere infantium ac puerulorum febribus sugandis, cuilibet in Medicina exercitato notum est.

Tota dosis præscripta simul unicâ vice exhibebatur; cum hodie, ne ventriculus nimium oneretur à tantâ mole confertim ingesta, Medicis visum sit (ratione ac usu comprobante) partitis vicibus Corticem ministrare, scilicet drachmam unam tertia vel quarta quaque hora, quousque una vel altera uncia absumpta fuerit.

Solenniter etiam in Schedula præfata sub insultu Paroxysmi Pharinacum ministrandum præscribitur; At hodie, cum majori ratione, atque successu magis felici, in intervalis paroxysmorum duntaxat exhibetur, quo tempore uti facilius absque Nauseâ admittitur, certiusque retinetur, ita (quod haud quaquam flocci habendum est) veneno sopito atque delitescente, vires Antidoti magis integræ in corpus transmittuntur, quippe Fermento ventriculi salubri adjutæ.

Secundùm eandem Schedulam, ante exhibitionem Corticis Alvus Medicamenti Cathartici sapientius subducenda est, licet Indi, testante Bollo, neque sese purgabant, neque, quocunque alio modo, ante ejus usum præparare solebant; quin & Excellentissimus *Badm A. Asia*, pag. 119. ait sese æque certo, atque feliciter sine cathartico (morbo urgente ac suadente) febres cortice sugasse, ac corpore prius purgato. *Nicolaus Imperialis* Vir. Doctiss. & rei Medicinalis scientissimus, jure merito, adversus hos succenset, qui aded tardè corticem febricitantibus exhibent, cum non minùs tutò absque specioso hoc apparatu eos curare potuissent. Quin & res ipsa idem clamitat: Quid enim cathartico cum Antidoti commune est? Vel quis hæc corpus purgandum esse ante usum alterius cujuscunque Antidoti duxerit? Certò præterea scimus, à lenissimo quovis cathartico (quia

(quia vires Naturæ ac Antidoti inde franguntur) Febrem cortice sanatam repullulare solet. ideo purgatio ita necessaria ante corticis usum æstimari non debet, quæ postea damnoſa ac periculosa eſſe conſpicitur. Verùm hic Canon ad Corticis uſum ſpectans ab *Anthe-ro Schedula Romana*, *Chiffetio*, cæteriſque Humoribus, & Qualitatum manifeſtarum Patronis primum, procul omni dubio, in errore fundatus erat, & veterem illam doctrinam jam ubique exploſam redolere videtur. Me quod attinet, utur, naſea inſolita ſuadente, lenius Emeticum ante uſum Corticis præſcribere nonnunquam neceſſarium duxerim: Et in Plethora, vel Immani Doloꝛe Spasmodico, aut alio Symptomate vehementiori Phlebotomiam ſuaſerim, & in cachexia inſigni catharticum propinauerim; Nullo modo autem, abſque evidenti Indicatione, quicquam horum, præparationis gratiâ, miniſtratum curationi conducere multo uſu expertus ſum, At è contra; cum, ratione ſymptomatum, liberiores evacuationes (cujuſcunque generis fuerint) inſtituere coactus ſum, eò maiorem Corticis copiam præſcribi ſemper neceſſarium obſervavi.

Canone alio *Schedulæ Romanæ* ſancitum eſt, ut Æger illico à poculo Febrifugo propinato protinus lectum petat, ubique ſtragulis coopertus maneat. Quorſum autem hæc? Si Febris præſentis gratiâ Æger in lecto claudatur; quandoquidem ſub ingreſſum paroxyſmi Pharmacum hoc deglutiri debere priùs decretum fuerat, mitto. Sin ab inſenſibili aliquâ evacuatione, aut Sudore inde elicto effectus Medicamenti expectetur; hanc legem non accipio, quia Febris in Humoribus primariò ſita non eſt. Præterea Cortex in Aëre aprico verſantibus, atque ſolitæ muniis fungentibus propinatus ſcopum tam certo attingit, quàm ſi patientis intra lecti cancellos inſtaretur. Quorſum igitur moleſtis hiſce tædiis quaſi lege ſancitis, nulla neceſſitate ſuadente, Ægros ultro laceſimus? Durante Paroxyſmo, regimen Febricitantibus debitum Ægroti imperetur; Deliteſcente autem Veneno, in Paroxyſmorum intervallis, ſicuti victu quocunque euchymo, caribus non exceptis, ad vires reſarciendas laute & copioſe Ægrum nutrire licet; nec in lecto jacere, nec alias Regiminis regulas obſervare tenetur: Quippe non Antidotus, verùm Febris præſens, ſeu activum Venenum hoc regimen expoſcit: Ecquis autem hætenus in gratiam cujuſcunque Antidoti neceſſarium duxerit Ægrum ſolitâ libertate privare, vel regimine aliquo circumſcribere?

Denique, eadem *Schedula* monet, ne quatrIduo poſt Corticis uſum, ullum aliud Medicamentum admittatur. Medicamentum hic loci procul omni dubio Catharticum, vel ſaltem Evacuans intelligitur, quippe ab eorum uſu vires Naturæ, ac Antidoti franguntur, & venenato Fomite inde repullante, febris ſæpenu-mero revireſcit, quod vel ab Enemate Cathartico non tantum poſt quatuor dies, verùm poſt tot hebdomadas in lecto eveniſſe ſapius memini. Quocirca, à Corticis uſu Ego, niſi evidenti Indicatione coactus, nuſquam intra quatuor dies, ne quidem hebdomadas, vel menſes, donec ex appropinquante ſole tem-

peſtas Anni immutetur, ſolennem evacuationem inſtituere auſus ſum; aut ſaltem facti me poenituit, niſi toties quoties hoc malum repentina Corticis repetitione averruncaviſſem. Neque duntaxat à Cathartico Febrem Cortice ſugatam revocari conſpicimus, verùm ſæpenu-mero à minimo Frigore percepto, vel ultro, abſque cauſâ evidenti, cum magno Medici & Medicinæ opprobrio, niſi tempeſtivâ, ac frequenti Corticis repetitione ei obviam eatur. Quocirca Febre priùs Cortice ſugatâ, Ego Prophylaxeos gratiâ (ut Medicum decet) ſolennem ejuſdem repetitionem, poſt intervallum octo vel decem dierum bis terve imperare ſoleo, ſcil. donec Luna ſtadia ſua ſingula ſemel decurrerit, quam ſtatis curſus ſui periodiſ, vi exſciſcandi Fermenta Morboſa, quæ in ſpiritibus deliteſcunt (ut in inſultibus Epilepticis, præſertim circa Novilunium & Plenilunium periodice repullulantibus) maxime pollere conſpicimus. Atque hoc modo Febres Intermittentes maxime pertinaces certiffimè ut plurimum ſanantur, quas utut vigefies Cortice ſugatas, poſthabito hoc Canone, iterum ſeſe in ordinem recolligere quotidie videre eſt.

Faſciculum Canonum de Corticis uſu, quos mihi ratio ac Praxis ſuppeditavit, hic adjiciam.

Primum, Medicum multum intereſt (neque eo nomine nimis officioſa ſedulitatis inculari debet, ubi vitæ Ægri, & ſanæ propriæ conſulit) diligenter proſpicere ut Cortex, ſecundum Criteriâ prius memorata, ſit genuinus & bene Electus. Deinde, ut in ſubtiliſſimum pol-linem reducatur, quo facilius deglutiri, digeri atque per habitum corporis trajici queat. Formulas Elegantiores mihi hætenus notas mox ſubjiciam. Adultis præſcribendus eſt, prout plus minus genuinus ſit, ab ʒʒ. ad ʒvi. ʒj. ʒiſ. ʒij. Infantibus ac pueris pro ratione ætatis à ʒj. ad ij. ij. iv. Neque tantam molem unicâ vice ingerere neceſſarium eſt, cum ſatius ſit partitis vicibus, ʒj. ſcil. ʒʒ. ʒj. quartâ quâque horâ, reſpectu ad Ætatem habito, miniſtrare. Non autem in Paroxyſmo, ob rationem olim redditam, verum potius in Intervallis: Neque equidem præparationis gratiâ, alia aliqua Medicamenta, uti vomitoria, cathartica, &c. Niſi in Intervallis, ubi aliqua vehementiora Symptomata ea poſtulent, miniſtrari convenit. Hoc autem in caſu, ſi Natura à veneno morbiſico vehementius irriteretur, & Æger inde Cephalalgia, aut Rheumatico quocunque dolore graviore correptus detineatur (quod nonnunquam accidit) Phlebotomia ante uſum pulveris, abſente Paroxyſmo, ſpiritus nimis irritatorum furor compeſcendus eſt. Vel ubi, præ Naſeâ in Ventriculo à præcedent. Paroxyſmo relicta, impoſſibile fuerit febrifugum niſi difficulter admodum deglutiri aut retineri, non abs re erit Poſſetalam foliis Cardui Benedicti alteratam copioſè propinare, vel Vomitorium Antimoniale levius exhibere; Aut ſaltem ubi ſigna Cachexiæ evidentiâ adſint, Decoctum Amarum purgans, Tincturam Sacram, vel aliquod ejusmodi lene Catharticum, in Intervallis, ſemel vel bis præſcribere. Conſuetudinis autem gratiâ, ac, abſque Evidenti Indicatione, aliquid, huiusmodi imperare irritum eſſe docet Experientia, æque ac ratio,

proindeque Empirico dignum potius, quam Medico quem omnia sua Mandata ad normam rationis, non proprii Arbitrii, dirigere oportet. Aque etiam absurdum est in Intervallis paroxysmorum, durante Corticis usu Aegrum in lecto, vel cubiculo, vel domo incarcerari, aut Dieta parca ac tenui solummodo nutrir, aut quocunque alio Regimine circumscribi; modo paulò ante paroxysmum Ventriculus non repletus fuerit alimento, cui digerendo ejus fermentum mox venenosificandum haud par sit; Atque durante Veneni vigore, parca ac tenui Dieta contentus fuerit Ager, in lecto etiam (Febre id tunc temporis exigente) decumbat. Fugata autem à Cortice febre, oportet Medicum attente prospicere, ne iterum revirescat, neque officio suo satis se functum esse credat cum febre sustulerit, si non Aegrum contra ejusdem Recrudescentiam factum rectum muniverit. Quocirca, jubeat ut Ager ab injuriis Aeris, atque erroribus in Dieta (quantum liceat) sese incolumem servet; Cibo Euchymo (tantillo vini etiam quotidie indulto) vires languentes quam citissime refarciat, ut Natura Virulentiam delitescens & sese jam, vel Appetitu dehiciente, vel Sudoribus nocturnis proidentem, prorsus eliminare ac subigere queat. Caveat maxime a Venesectione, absque evidenti necessitate; aut cathartico, seu quocunque alio Medicamento, unde Natura fatigata impensas virium majores sustinere cogatur. Ante omnia (praesertim si ab Appetitu minus vigente recidivationem mox futuram praesagire liceat) saltem ad spatium Lunæ unius, Intervallo octo vel decem dierum, utut firma valetudo videatur, repetatur uncia una Antidoti, cujus drachmam unam in formā quavis gratissimā, ter die, horis Medicinalibus Patiens deglutiat, superbibendo post singulas doses haustum vini admodum generosi. Hoc Canone observato, haud ita frequenter febrium cortice curatarum recidivationes famam Medici & Remedii minuerent.

Formula Corticis praescribendi Elegantiores, mihi usitatissimae sequuntur.

℞. Aqu. Cardu. ℥ij. Aqu. Epidem. Syrup. Caryoph. ana ℥ij. Chin. Chin. Elect. & Subtilissime pulverisat. ℥j. M. F. Haustus, qui, absente Paroxysmo, illico propinetur, repetaturque tertia vel quarta quaque hora ad 8. 10. vel 12. vices: Pulvis hac formā exhibitus, ut plurimum, pro Bolo aut Electuario arridet, & minori cum molestia deglutitur; si verò forma Boli aut Electuarii magis placeat.

℞. Cortic. Peruv. Elect. in subtiliss. pollinem redacti ℥j. Syrup. Caryoph. Melissophyl. aut cujusunque gravioris q. s. M. F. Bolus mollis statim sumendus, repetendusque tertia vel quarta quaque hora extra Paroxysmum ad 8. 10. vel 12. vices, post singulos Bolos superbibendo cochlear. 4. 5. vel 6. Julap. sequentis, de quo etiam bibat ad libitum, praesertim vigente Paroxysmo.

℞. Aqu. Cardu. Meliss. ceras. nigr. cinnam. hord. ana ℥ij. Aqu. Epidem. Stephan. Syrup. caryoph. ana ℥i. s. vel (si Aegro Julapium Perlatum magis arridet) Margar. prapar. ℥i. s. Sacchar. albiss. ℥v. vel vi. M. F. Julap.

Vel ℞. Cortic. Peruv. subtiliss. trit. ℥j. vel

℥i. s. Syrup. è Rub. Idro (à quo; modo recens fuerit, sapor magis gratus Medicamento concilietur) q. s. Ballam. Peruv. ℥j. vel ℥ss. M. F. Electuar. de quo sumat Ager quantitatem nucis Juglandis vel Moschatæ, tertia, vel quarta quaque hora extra Paroxysmum, superbibendo post singulas doses haustum Julapii prius praescripti, vel cujusvis alterius ejus vnnali. Hac forma pulverem pro pueris preparari jubere soleo, ita ut exinde sumant quantitatem Nucis Moschatæ parvæ, vel dimidiatae, solutam in cochleari Julapii supra praescripti, superbibendo unum vel alterum; quo modo facile, ac cum minima Medicamenti jactura, in os Infantium ac puerulorum ingeri potest: vel si forma Pilularum Aegro magis arrideat.

℞. Pulv. febritug. Elect. & subtiliss. trit. ℥j. vel ℥i. s. Mucilag. Gum. Tragacanth. Aqu. Plantag. Extract. q. s. M. F. Pilul. mediocres, deaurand. quarum 8. 10. 12. quarta quaque hora Internissionis deglutiat, & superbibat haustum Julapii supra praescripti. Hac formularum copia multatus, Aegros, honesta fraudè, atque cum proprio suo emolumento, fallere soleo, & unius formulæ pertaxos, ut Remedium idem nova specie, una, vel altera indutum, quandiu opus fuerit, admittant, facile suadeo.

In eorum gratiam qui ægre admodum ferunt Pulveris crassiorem substantiam, quacunque forma, sive Boli sive Electuarii sive Haustus exhibeatur, Tincturam sequentem ex eo eliciendam excogitavi. Qui quidem liquor (modo Cortex, quo saturatus, genuinus fuerit) est admodum ventriculo gratus, neque Palato injucundus; atque sanè, postquam fundamenta curationis prius in aliquot drachmis pulveris in propria substantia ministrati jacta fuerint, facillimè ope hujus Tincturæ perficitur atque felicissimè absolvitur, Tinctura est quæ sequitur.

℞. Cort. Peruv. Crasse pulverisat. ℥ij. coq. Leniter in Aqu. F. lbj. ad dimid. part. consumpt. deinde fiat colatura, atque reliquias decocti eadem Aqu. quantitate recens affusa coq. & cola iterum; hoc modo repetendo Operationem ad tertiam vicem, vel donec tota Corticis Amarities fuerit extracta. Denuò omnes colaturas commisc. & add. Aq. Epidem. Syrup. Caryoph. ana ℥iv. vel v. M. F. Apozem. sive Tinctura, de quo sumat Ager ℥iv. v. vi. quarta quaque hora extra Paroxysmum, vel saepius ad libitum.

Si ob laxitatem Alvi nimiam, vel praesentem Diarrhoeam, quam stimulantia sua Amarities Cortex multum promover, vires suas febrifugas exercere non possent metuatur, utatur Ager Decocto Albo, vel Vino clareto cum Aqua commixto, loco cerevisiæ, atque Opiatum aliquod cortici addatur (quod ei admodum amicum, atque in eundem scopum quadantenus collimare usu comprobatur) plus minus pro Ætate, atque rarius vel frequentius pro Symptomatis vehementia. Exempli gratia.

Prunæ dosi pulveris, pro iis quorum Alvus fluit (quacunque forma ministretur) & deinceps omni dosi nocturnæ adsociantur Laudani liquidi Helmont. gutt. pro Ætate atque Opii Euphoria 4. 8. 12. 20. vel Laud. Londinens. à Semigran. ad gr. j. gr. j. s. Urgente autem Diar-

rhœa torminosâ (quod non raro accidit) necesse est, ut linguis dosibus adjiciatur tantillum Laudani, quantum ad Alvum tractandam seu cohibendam sufficiat, scil. gutt. 4. 8. 10. 11. Laudan. liquid. vel more sequenti Cortex præscribatur.

℞. Cort. Peruv. Elect. & subtilissime pulverisat. ʒj. confect. Fracastor q. l. M. F. Pil. Mediocres deaurand. quarum 8. vel 12. Ager degutiat, repetatque quarta quaque hora extra Paroxysmum in lecto decumbens (ne ob Opium commixtum Vertigine afficiatur) & superbibat narium Julapii supra præscripti post singulas doses. Hoc modo ab Opiato cum Cortice commixto (utut Cortex Amaritie sua Alvum sollicitet) Diarrhœam truculentissime torminosam citius curatam semper observavi, quam a Laudano ipso in dupla licet quantitate per se exhibitio; Quippe fermento febrili humores exagitante, fundente, coliquante ac per alvum deturbante a Cortice jam subactio, Diarrhœa ultro sistitur, aut saltem dosi Opii admodum exigua frænatur ac cohibetur.

Sin Ager Pulmones infarcti sint, satius est post extractionem sanguinis liberalem, Corticem cum Lubricantibus atque Incidentibus ministrare more sequenti.

℞. Ol. A. ygd. d. rec. Syrup. ex Erythimo ana ʒij. Pulv. Peruv. subtiliss. atque Elect. ʒj. Sacchar. chrysal. alb. ʒß. M. exactissime F. Linctus, quem Ager a Paroxysmo liber capiat & cochleari, repetatque quarta quaque hora superbibendo ʒiv. Apozem sequentis calid.

℞. Decoct. Pector. optime depurat. lb iß. Tinctur. croc. Aqua Theriac. Extract. ʒß. Syrup. è V. Rad. ʒiß. M. F. Apozem.

Vel ℞. Chin Chin. Elect. & subtil. pulver. ʒß. Ammoniac. optime depurat. ʒj. flor. Benzoin. ʒß. Syrup. Balsam. q. l. M. F. Pil. Mediocres deaurandæ, quarum sex cap. quarta quaque hora in Intervalis Paroxysmorum superbib. ʒiv. Apoz. sequentis calid.

℞. Cortic. Peruv. Elect. crasse trit. ʒij. cochinel. croc. in nodulo ligat. ana ʒß. Balsam. Tolutan. ʒij. Ingrid. De oët. Pectoral. q. l. coq. insuffic. quant. Aqu. font. ad lb iß. colatura adde Aqu. Epidem. ʒiv. Syrup. Balsam. ex Erythim. ana ʒiß. vel ʒij. M. F. Apozem turbide propinandum.

De Proteiformi Intermittentis Febris genio.

Exempla febrium Intermittentium Cortice Peruviano curatarum adjungere, irritum planè atque inutile esset, postquam Clariss. Indus, Scriverius, ceterique Remedii hujus Polycreti Fautores hanc Provinciam jam dudum inceperint. Et neminem hodie (quod scio) de viibus hujus Remedii febrilugis dubius hæreat. Quandoquidem autem, ob vehementiam symptom. cum, ubi Natura fere integra, acius stimulatur ad luctam cum veneno hominis militandam, hæc febres haud raro plerisque annos Morbos, eoque acutissimos simul re soleant, Corticis tamen viribus cedant, & si Cortex non exhibeatur sæpius funestæ evadant: Operæ pretium duxi Exemplis aliquot hujusmodi febrium, quas inperissime observavi, seligere, scriptis mandare, atque publici juris facere. Atque equidem hoc pensum cōlubentius ag-

gredior, quia Nemo adhuc (quantum scio) hoc subjectum tractavit, cujus cultura ad Praxin Medicinalem promovendam maximè momenti mihi esse videtur. Siquidem inter innumera illa symptomata hæc febres comitari solita, nullum est quod non aliquando adeo vehementer sæviat, ut vita Ageri inde in præsens discrimen adducatur, & typus febris in variis suis Itadiis Algoris, Caloris & Sudoris abscondatur penitus, & opprimatur, ita ut neque ex Urina, Temperie, Pulsu, vel alio quocunque solito modo distingui possit; verum sub larva Algoris funesti, Vomitionis indefinitis, Diarrhœæ torminosæ, Cholera morbi, Colicæ ventriculi, Hemeræ periodicæ, Apoplexiæ, Syncopes, Rheumatismi, Spasmi Universalis, Pleuritidis, Peripneumoniz, Doloris lateris punctorii vel alterius Morbi secute deitescens, Medicum à scopo suo non raro abducit. Symptoma quidem interea Remedii propriis, sed incassum, tentatur; Nam, posthabito fermento febrili, proxima effervescentiæ periodo, priora, aut deteriora symptomata inexpectato recrudescant, Medicus dyspnoia saxum volvit, atque Ager vitæ dulcissimæ dispendio, aut saltem magno sumptu, ignorantia vel incuria Medici penas ferre iuit.

Sic ubi, præ gradu Veneni summè Deleterio, Spiritus adeo perculli sunt, ut a primo tantum se iterum nullatenus expandere valeant, Algor qui primum horum paroxysmorum insitum, ex instituto Naturæ comitari solet, eoque protrahitur, donec Ager Deliquiis frequenter recurrentibus coniectus, tandem fati cedat. Interea Remedia intus vel extra ad flammam vitalem resuscitandam incassum applicantur, febris autem nullo indicio ex Urina, Temperie, vel Pulsu, accuratissimo observatori sese prodit.

Parili modo, ubi in primo Stadio Paroxysmi, Tonnes Venenatus spiritus tantum opprimat, ut non ultra solentem sphaeram sese possint expandere, absque indicio febris præsentis, de Nausea, Aegritudine, & Vomitione Ager non conqueritur, donec Veneno à Cortice Peruviano, vel alia Antidoto subactio, spiritus in naturam suam restituatur.

Nonnunquam Venenum febrile sub initium paroxysmi glandulas intestinorum petit, & Fluxum Alvi torminosum, vel Dysenteriam excitat; At, cum spiritus diu uno tenore opprimuntur, hæc symptomata utut continuatatis periodis exacerbantur & periodica evadunt, sine febris indicio manifestis, & vires Opiatorum & Adstringentium longe superant, donec à Cortice Peruviano cum Laudano commixto, causa, sc. fermentum febrile, Massam coliquans, atque ac symptomata inde orta auferantur.

Ubi Venenum Emeticum simul ac Catharticam naturam participat, Ager frequenter vomitione & deiectione detinetur; & nisi Spiritus in primo Paroxysmi stadio expansione legitime virulentiam exerceant, formatur inde Cholera morbus, febre neque, per pulsum, Urinam vel Temperiem se manifestante. Ventriculo interea, aut Intestinis, aut utrisque simul ab acrimonia Humorū intensissime venenata Sphacelatis, Ager brevi fati

cedere cogitur, aut saltem post Inducias intidas datas, a veneno, proximo Paroxysmo recrudescente, Symptomata eadem crudelia & tunella revirescunt, nisi à tempestiva Antidoti febrifugæ exhibitione antevertantur.

A parili gradu Veneni non raro observavi Ægros, præsertim antiqua & confirmata humilimodi febre lacestitos, denuo (typo febris legitimæ amisso, perpetua Nausca, Ægritudine, Vomitione, sudore coarctativo, suffocationibus Hystericis, cæterisque id genus Symptomatis in Genere Nervoso penè Confectos, atque Animam quasi derepente effluros; quos debita Dosi Corticis (nulla alia arte sanabiles) illico restitui.

Unicuique etiam in Medicina versato notum est horrendos Dolores (& iis qui à Toxico propinato proveniunt non minores) Lumbos & Crura spasmodicè lancinantes, non raro primos insitus febrium Intermittentium legitimarum, præsertim Quartanarum comitari solere, durante Algore & Rigore, donec Spiritus multo nisu expansi, ac agitati pares sint Veneno activo eliminando. Flamma autem inde accensa, Spasmi dolorifici sensim cessant: Verum ubi Spiritus vi veneni non tantum deprimantur, sed etiam in statum Explosivum universim adigantur, nonnunquam deprehendi totum Corporis Systema inde perpetuo algens, idque diu, ac sine ulla febris nota; totam autem Mechanicam interea spasmis universalibus, iisque horrendis, & versatilibus hinc inde vellicatam & lancinatam. Nec mirum est, si Æger perpetua Ægritudine, Vomitione, atque deliquis inde contextus (ut fieri solet) brevi Mortem opperat, nisi Ars tempestive Naturæ languenti succurrat.

Haud raro etiam Spiritus à nativa sua debilitate, vel obstructione, atque præsertim à Frigore percepto, vel alia quavis causa evidenti ansam præbente, in statum Explosivum adiguntur, unde partes aliquæ singulares, præsertim Thoracica, Pulmones, scilicet Pleura, Diaphragma, aut Ventriculus ac Intestina vellicantur, & Spasmi lancinantur. Æger, præ atroci dolore, perpetuo alget, atque Deliquis frequentibus, suffocationibus, & Vomitionibus fatigatur, sine aliqua nota febris evidenti; Urinam claram reddit, & sine Pulsu Moribundus jacet, quousque Spiritus veneno icti Arte vel Natura expansi, si nimiam in Massa denuo excitant: Morbus autem à Cholera morbo, Pleuritide, seu Peripneumonia, duntaxat ex Tussis, & Pulsus defectu, Vomitionis & Doloris excessu, Deliquis, & extremorum Frigiditate dignoscendus est.

Sæpe etiam Ægros de dolore lateris unius aut alterius punctorio conquerentes novi, in quibus tamen febris ægrietas deprehendere non potui per plures dies, nisi quòd Pulsus paulò iusto celerior erat, Postquam autem Venæsectione, & usu Laudani cum Alexipharmacis commixti, isti Spasmi mitigabantur, atque inde vis Spirituum Elastica nativa aucta fuit, signa flammæ in Massa accensæ, quam citissime sese prodiderunt; Urina tineta est & turbata. Pulsui fortitudo ac celeritas pari passu accessit, Temperies universim incaluit, sitis clamorosa evasit, Aphthæ linguam atque Os

cooperuerunt. At, ad Flammæ, & doloris exacerbationem statis periodicis recurrentem semper, quali ad Cynosuram, auspiciatò cursum meum dirigens; Copia Corticis peruviani cum Laudano commixti, intervallis Paroxysmorum exhibiti, Venenum subegi, & Ægotantes à febre ac dolore penitus liberavi.

Præter cætera omnia Mihi pluries mirari contingit, post subactionem Veneni febrilis ab expansione spirituum quædam enus effectam, cum ex Pulsu forti ac celeri, Urina intense rubra, ac turbata, Temperie calida, cæterisque Indicis, febris sese palam ostendat; Artus hisce Doloribus spasmodicis, statis periodicis recurrentibus, & more Rheumatici versatilibus esse affectos, cum Tumore & Ardore partium laborantium, à nisu spirituum in his partibus sese expandere satagentium. At hosce Dolores adhibita Venæsectione debita, usu Corticis Peruviani copioso extra Paroxysmum ministrato feliciter semper prodigavi.

Denique Cerebrum, primo insultu Febris legitimæ affici, non tantum Vertigine, à spiritibus veneno Activo oppressis ac turbatis verum etiam Dolore Acuto vel Gravativo, à nisu spirituum in membranis sese expandere satagentium, cuius Medico notum est. Nonnunquam autem Spiritus hoc tempore febris adeo opprimuntur & turbantur, ut Ægotans, more Apoplecticorum, durante toto Paroxysmo, siue febris indicis, Mortuo similis jaceat, & eadem Symptomata simul cum Paroxysmo subsequenti sæpe recrudescent: Quibus Symptomatis utur Venæsectione, Vesicatoriis, cæterisque ejusmodi Apoplexiæ veræ Remediis, jure merito succurrendum sit, Revirescentia tamen eorum sine Cortice præcaveri nequit.

Hemicraniam Periodicam etiam observavi, à nisu spirituum in membranis Cerebri sese expandere conantium, quam spatio bidui, Venæsectione & usu Corticis penitus sustuli; licet in hujus Symptomatis Curatione, Venæsectio, Vesicatoria, Emetica, Cathartica, Errhina; Masticatoria ad hebdomadas aliquot spem meam deceperant.

Quò genius Versatilis morbi hujus Proteiformis ad vivum depictus dignoscatur, & ut inde sciatur, quo pacto Naturæ hisce Symptomatis laboranti, tempestive succurri possit, Historias huc spectantes hic subnectam, quibus unam Historiam admodum raram subijcere non pigebit Febris à dolore Nephritico ortæ, Symptomatis horrendis spasmodicis stipatæ, & Cortice curatæ; uti & efficaciz nostri febrifugi prius memorati, ubi vires Corticis, ob diutinam assuefactionem, vel peculiarem Ægri dispositionem, defecerant.

Historia I.

Dominus Amblar habitans in Mile-End, Vir quinquagenarius, macilentus & quadantenus valetudinarius, febre Intermitteenti contumaci, ac cum vehementibus Symptomatis sociatæ, ex levissima quacunque occasione sæpe antehac obnoxius, Anno 1690. à Frigore vehementi in Aëre pluvioso primum suscepto, ac à victione super Thamisin diutius protracta, domum reversus Rigore & Horrore immani derepente corripiebatur; quibus successit Algor uni-

universalis, quo durante, Pulsus vibratio vix percipi potuit. Vomitione, Dejectionibus, & horrenda ventriculi Oppressionē, & Agitudine (sicut in Cholera morbo) affatim lacebatur. Pharmacopola advocatus Itragulis multis in positis, ac Bolis Cardiacis atque Jalapiis cordialibus exhibitis, Flammam pene extinctam resuscitare, atque reliqua dicit Symptomata corrigere tota Nocte incassum tentavit. Mane enim sequenti Ego accersitus, inveni faciem plane Hippocraticam, totum corpus instar Glacie frigidum & madore perfusum, Cutim, præ sanguinis Congelatione, nigredine tinctam, vires perpetua agitudine, ac evacuatione Bilis diversicoloris per Os, & Cremoris fetidi albescentis per Anum pene exhaustas. Appropinquantem Mortem omnia ostendebant, quippe Principium vitale, seu Spiritus animales a Veneno adeo deprimebantur, ut sese iterum expansuros spes non esset. Ad demulcendam autem malignam humorum Acrimoniam è Glandulosa Ventriculi & Intestinorum membrana perpetim excretorum, eaque lacebantium; iussit, ut Aqua Pulli Ægro copiose propinaretur, & per Anum siphone injiceretur; ut regio ventriculi affata, sacculis nostris Aromaticis calide foveretur, & Bolus summè Cardiacus, & pro Agri viribus, Optatus, ad Expansionem Spirituum promovendam, & colliquationem humorum præcipitem compescendam, quarta quaque hora, cum haustu Julapii Cardiaci & Alexipharmaci exhiberetur. A tertio vel quarto Bolo deglutito, Pulsus robur plurimum restitutum sensi, nigredinem cutis evanescentem, Calorem in Extremis partibus redintegratum, Evacuationes enormes quadantenus suppressas, Sudores Colliquativos diminutos, jactationem minus inquietam, & Somnos, breves licet, tamen minore agrotatione finitos. Quocirca Venenum, durante hac Symptomatum Remissione, Cortice Peruviano cum Laudano commixto, quartâ quâque horâ in forma Haustus propinato aggredior, probè sciens vires Agri secundo Prælio non esse pares. Verùm ante tertiam Dosis Corticis; Veneno inexpectatò recrudescente, Paroxysmus recens, cum prioribus Symptomatis diris sociatus, atque funestus invasit: Unde misellus Æger spatio 24. horarum fatis cessit.

Historia II.

Filius unicus Mercatoris prædiyitis, 10. Annos natus quietiam jamdiu valetudinarius tuerat, circiter Annum 1676. Febre Tertianâ correptus, in manus Pharmacopolæ per tres hebdomadas curandus tradebatur. At quâ methodo, durante hoc spatio, tractabatur, nescio; Tandem a Veneno febrili intenso Spiritus Animales opprimebantur, & extinguebantur, & Misellus Puer, per triduum ab insultu Paroxysmi ultimi, continua agrotatione, ac Vomitione pressus jacebat; cum Pulsu formicante, inquietus, insomnis, immensè sitiens, & Madore frigido undique perfusus. Die secundo Paroxysmi Ego advocatus, virulentiam humorum per glandulas ventriculi excretorum copiosâ ingestatione Aquæ Pulli demulcere satagi, Itragulis etiam, Calore externo, Sacculis

Aromaticis Vino Claretico incoctis & expressis, & ad ventriculum exterius applicatis; nec non Spiritu CC. Julapius, Speciebus & Bolis Cardiacis, & Vini copiose propinato, Expansionem Spirituum promovere, & Flammam vitalem pene extinctam resuscitare pro virili conabar, Incassum autem omnia; quippe Spiritus Veneno summe Deleterio, a primo Paroxysmi insultu, plane extincti fuerunt. Puer autem languens & Algens, tandem sub finem tertii diei Lipothymice obiit, Toxico prægrandi proculdubio interemptus.

Historia III.

Nuperrimè accersitus à Domina Baker Vtula, habitante in vico dicto Fleet-street, eam inventi continua agitudine & vomitione, à quatrinduo, oppressam, & jam pene confectam; omnia ingesta illico rejicientem, & inde animi Deliquium sæpius perpessam; Pulsus deprehendi celerem & debilem, Temperiem autem præ Languore & perpetua agitudine, mitem, & quadantenus frigidam: Urinam lene sanam. Insomnis jacebat, & tantum non delirabat; De Nauseâ verò & vomitione unice conquerebatur; Mihi de linguis diligenter percontanti narratum est, Laniam à 14 hebdomadis præteritis valetudinariam fuisse, frigore & calore præternaturali sese excipientibus tentatam, nec non periodis incertis, Nausea & Vomitione frequenter laborasse. Unde, jure merito, conjecti eam Veneno febrili mitiori diu intectam fuisse, quod tandem, ex incuria, consueque prævalebat, ut Spiritus Animalis, inde pene extingueretur, Agra, ac si Toxico propinato, Vomitione perpetua laboraret, & brevi fatis cessura, esset nisi veneni viribus, ope Antidoti, sinemor. fractis, Tonus Spirituum & Crasis sanguinis illico restitueretur. Igitur postquam præscripsim Bolum & Julapium Cardiacum, atque Vesicatoria ad Expansionem Spirituum promovendam, & pro potu ordinario, Aquam Pulli ad demulcendam Acrimoniam humorum in ventriculo excretorum, Julapium Sale Absinthii & succo Limonum saturatum, ad ventriculum confortandum cochlearim hauriendum; Jussi ut Cortex Peruvianus exhiberetur copiosè ad venenum febrile subigendum, in formam Haustum & Tincturæ redactus, addendo bis vel ter die gutt. 10. vel 12. Laudani liquid. Vehementis vomitionis gratia, quæ tam alimentorum quàm Medicamentorum retentionem impediabat: Inde spatio unius diei, Agitudine & vomitione diminutis, criticè succreverunt Aphthæ albae per totum Os, Urina multa Rubedine tincta & contentis saturata reddebatur, & cætera indicia Expansionis Spirituum & Febrilis Caloris redintegrata aderant, & brevi, Morbus Propriam Formam Tertianæ legitimæ induebat; Frigus, Calor & Sudores sese alternatim excipiebant, quæ ex continuato usu Corticis post circuitum duorum Paroxysmorum profligata sunt, & Agra ab omni Symptomatum satellitio liberata.

Historia IV.

Domina Harcourt Vidua, habitans in vico dicto Newgate-street, postquam per tres hebdomadas Febre Intermittente legitima laborasset, ubi tandem, ob malum regimen, Febris in continuam degenerasset; Natu-

Naturâ virulentiam per glandulas Intestinorum & ventriculi protrudere satagente, singulis Exacerbationibus, in novum morbum incidisse videbatur, Diarrhœam scilicet torminosam ac truculentam, cui adjuncta erat insuper levis ad Vomendum dispositio. Frigore, Calore, cæterisque febris signis planè evanescentibus, misera Muliercula unice conquerebatur de Fluxu Alvi immodico atque horrendis Torminibus, quibus, durante Paroxysmo, adeo excruciatâ & confecta erat, ut illico moritura sibi videretur. Ex inspectione autem Urinæ intense rubræ ac turbatæ (qualis febre intermittenti Laborantium Urina esse solet) atque observatione Exacerbationum hujus Fluxus, & Alvi Torminum, probe novi molesta hæc symptomata à Venenato Fomite febris Intermittentis ortum suum habuisse. Proindeque suppressionem diorum horum Symptomatum Laudano, cæterisque ejusmodi frustra tentandam duxi, nisi Fermentum, horum omnium Symptomatum causa, propriâ Antidoto prius subigeretur; & quamprimum Natura, a recenti veneni vigore, irritata, virulentam materiam, more suo per alvum deturbare iterum sategerit, Symptomata priora, disruptis ubi que repagulis, recursura; aut, si forte ab Opiatis sisterentur, pejora, atque magis funesta, in genere nervoso, in eorum locum successura. Quocirca, quamprimum Aquâ Pulli, & Decocto Albo in locum porus ordinarii substitutis, atque Bolo Opiato Symptomata præsentia compescueram, atque, finita exacerbatione, inducias obtinueram, illico Corticem Peruvianum absque vel cum Laudano, prout Symptomata id requirebant, confertim ingerendum curavi, unde non tantum à Diarrhœa, & Torminibus periodicis, verum etiam à latitante febre prorsus liberabatur, Urina etiam in sanum colorem restituebatur, atque appetitus rediit. Indeque Ægram, absque alio aliquo præscripto, dimisi, id unum nodò ab prophylaxin, Corticis post debita intervalla, repetitionem suasi, quandoquidem Morbus cum diris suis Symptomatis Cortice solo profligatus esset. Hoc Consilio à muliere jam valetudine integrâ utente spreto, quasi officioso & supervacaneo; Totum Genus Nervosum, post duas hebdomadas elapsas, virulentiam recrudescente, Universali dolore spasmodico versatili, mirum in modum excruciabatur, & tandem Morbus prior revirescens, Speciem Ophthalmiæ dolorificæ, seu Inflammationis Oculi sinistri induibat. Ego advocatus, ubi observâsem Urinam denuo reddi intensè rubram ac turbatam ut prius, sitim urgentem, Pulsum celerem & fortem, atque ipsam Ophthalmiam alternis diebus, statis Periodis, exacerbata, & reliqua indicia febris primariæ; ritè conjeci Naturam à Fomite venenato iterum laceratam, nova hæc Symptomata Proteiformis produxisse. Indeque, licet, ad revelationem Symptomatum urgentium, sanguinem è Vena Jugulari extrahi, Alvum bis, terve diebus alternis, Decocto Amaro, Decocto Sennæ Germanicæ ac Manna, atque tandem Decocto Sennæ cum Syrupum de Spinâ Cerv. Subduci, atque Collyrium anodynum Forum, ac Cataplasma ad Oculum exterius applicari jussim; diebus

tamen intermediis, Electuarium è pulvere Corticis Peruv. Confectum, exhibendum præscripsi; Probè sciens hoc Symptoma Medicamentis frustra impugnari, si Causa ejusdem virulenta propria Antidoto non subacta fuisset. Atque, hac methodo, à febre, æque ac Ophthalmia, brevi, liberata revalescebat, atque hactenus optima valetudine utitur.

Historia V.

Domina *Hudson* vidua, circa Annum Ætatis suæ tricennium, à mutatione Aeris, ac frigore inde suscepto, Diarrhœa torminosâ, & Vomitione adeo atroci corripiebatur, ut in Paroxysmo, præ vehementia Spasmodum ventriculi ac Intestinorum, znum Deliquium ferè semper initiare videretur. Ego, durante vigore Paroxysmi quinti, mediâ nocte, accersitus, Symptomata urgentia facillime sustuli, Præscripsi enim Aquam Pulli, & Decoctum Albi pro potu ordinario, & gutt. 14. Laudani liquid. in haultu Julapii Hysterici, quartâ quaque hora exhibendas. At post horas 14. recens lucta instituta est, quo tempore, non obitante regimine præfato, ac usu Laudani repetito, Symptomata cum priori sævitia recrudescabant; Quod cum semel aut bis observâsem, Urina interea intensè lincta, atque Aeritigine exposita sedimentum Colore lateritio deponentes, jure merito suspicatus sum (utut cætera omnia signa febris Intermittentis Diagnostica hoc Symptomate obscurata disperebant) cruciantem hanc Diarrhœam à veneno febrili prodire, quod, singulis paroxysmis, ad Intestina protrusum, recrudescenz diorum horum Symptomatum auiam præbebat. Indeque utut Laudano Symptomata cederent, revirescentia eorundem, sine subtractione Fermenti febrilis, præcaveri non potuit. Quocirca (annuente Cl. Collegâ D. D. Daniele Cox, qui una mecum Ægræ salutem consulebat) Drachma una pulveris Chin. Chin. cum guttis 11. Laudani liquid. in Paroxysmorum intervallis, in formam Huius redacta quartâ quaque hora propinabatur, unde (quamprimum 3vi. vel 3j. consumpta est) febre, ac Symptomatis inde ortis jam evictis, Ægra illico prorsus revalescebat, Urina ac appetitu in statum integrum restitutis. Nobis autem nihil amplius agendum restabat, nisi ut, revirescentiam Morbi aut everteremus.

Historia VI.

Uxor Domini Peck, habitantis sub Insigni Leporis, in vico dicto *Russel-street* in *Covent-Garden*, Anno 1688. Hectico calore alternis diebus aucto, Iussi importuna, Dyspnœa; ante omnia Nausea & vomitione, præsertim verò Diarrhœa torminosâ correpta, plurimum inde emaciata & viribus spoliata, alium Medicum (Me absente) accersivit. Qui, Symptomata suborta, causa eorum pothabita, aut saltem non probè perspecta, spatio hebdomadæ, variis Remediis incassum impugnâvit. Mihi tandem vocato, Formam in ultimo stadio Phthiseos Acutissimæ versari videbatur, donec ex Historia Morbi clare admodum deprehendi, Fermentum febrile, Fomiti Intermittentium non dissimile ansam præbuisse huic Symptomatum catervæ, in pulmonibus, ventriculo, &

Intesti-

Intestinis subortorum. Indeque utut Venæsectione, Linctu & Apozemate Pectorali Pulmonibus plurimum infarctis succurrere; atque Opiatis & Adstringentibus fluxum aivi colliquativum compescere sategerim; probe tamen sciens cardinem curationis in hoc verti, ut ungu Corticis Peruv. fermentum febrile Venenatum subigeretur; (Colliquationem enim Humorū, eorumque excretionem in Pulmones, Ventrículum atque Intestina hoc modo impedita, Tussis, Dyspnæa, & Diarrhœa torminosa non amplius duraret) Unciam unam, vel alteram Polychrestæ huius antidoti cum Laudano ob præsentem Diarrhœam commixta, spatio tridui, partitis vicibus ministrandam jussi, forma Agræ gratissima. Quo factō, illicō à febre, Diarrhœa, & quadantenus ab affectionibus Pulmonaribus liberata (appetitu etiam, ac Urinæ integrè restitutis) multo melius sese habuit, quocirca Eam in Aerem rusticorum dimisi, ut Pulmones ab infarctu penitus liberarentur, atque ibi, usu Corticis, post debita intervalla, ex meo Consilio bis terve repetito, prorsus revalescebat.

Anno 1690. eadem imprægnata, fere toto Ingravitationis tempore Diarrhœa torminosa, incertis periodis recurrenti obnoxia erat, unde, mente puerperium præcedente, adeo excruciabatur, ut Operam meam iterum petere coacta sit. Ubi Opiatis & adstringentibus hunc Fluxum sistere incassum tentarem, qui postea, tempore puerperii, auctus, solitam ac debitam perspirationem penitus impedivit, unde nāguum aliquod incommodum subsequiturum, jure merito, suspicari fas erat, tandem memor Historiæ prius narratæ, suspicatio judicavi, Diarrhœam hanc torminosam, utut Chronicam, à Fermento Febrili Venenato delitescente subortam fuisse: Indeque Corticis ʒj. cum Diascordio commixtam, forma Pilulari, quam Agra elegerat, exhibendam, & quarta quaque hora repetendam jussi. Unde, sine cuiuscunque alterius Remedii ope, spatio bidui, Sodore & Perspiratione solitis redeuntibus, à Diarrhœa & Torminibus planè liberabatur; Nihilominus (quod apprimè notatu dignum est,) Fermento Venenato post unam vel alteram hebdomadam elapsam iterum recrudescente, duos vel tres Paroxysmos febris intermittens Legitimæ, Tertianæ, cum nulla Diarrhœa vel Torminibus sociatæ, successivè passa est: At febrem repetito Corticis usu facillimè penitus evici.

Historia VII.

Dominus *Arwood*, habitans sub Insigni Lunæ dimidiata, in vico dicto Cheapside, Vir sexagenarius, postquam ad tres vel quatuor dies, statis periodis, jam febricitaret, jam melius se haberet, tandem, quasi in instanti, diris Ventrículi ac Intestinorum spasmodis, Vomitionibus & Dejectionibus immanibus Cholera morbum referentibus correptus, & pene confectus, in hoc mortis procinctu stans operam meam efflagitavit. In levamen symptomatum illicō imperavi (quod mihi in Cholera Morbo solemne est) aquam Pulli copiose uniceque bibendam; atque etiam ad humores per glandulas Intestinorum excretos demulcendos, Enema ex eodem liquore extemplo injicien-

dum. Tandem, regione ventriculi Sacculis aromaticis, in Vino Clareto & aqua terrata coctis & expressis, prius calide tota, Ad spasmos prorsus sublevandos, guttas 12. 14. 15. Laudani liquidi in Haultulo Julapii Carniæativi, singulis vel alternis horis exhibendas, donec, torminibus & evacuationibus diminutis placide obdormiscere cœperit. Hoc pacto, Paroxysmo soluto, evictisque symptomatis inde ortis, Vita Aegri in vado esse visa est. Quandoquidem autem ex Urinæ sediementum colore lateritio præcipitante, aliisque indicis probè noyerim dira hæc symptota sobolem esse Venenati februm intermittentium fomitis; Indeque eorum revirescentiam die secundo vel tertio rite expectandam esse, Præservationis gratia, præscripsi haultum febrifugum cum ʒj. Cortic. & Laudan. liquid. gut. 10. tertiâ vel quarta quaque hora propinandum, ad fermentum febrile subigendum, & recrudescentiam dirorum symptomatum antevertendam. Die sequenti autem, antequam Dosis Pulveris satis larga ingeri potuit, derepentè, absque evidenti occasione quicunque, Paroxysmus Febris Tertianæ Intermittentis legitimus repulsiabatur, non autem diris symptomatis. ut ante, sociatus; quandoquidem ab usu Antidoti, licet hætenus nimis parce ministratæ, vires Venenati fermenti quadantenus fractæ fuerant. Ex continuato verò usu Haultum, sub finem Paroxysmi repetitorum, absque aliquo alio additamento, planè revalescebat Aeger, Urinæ atque appetitu in statum pristinum restitutis, atque huc usque post plurimos Annos supertes manet, optima valetudine utens, inde præsertim (ut arbitror) quia Mandatis nostris morem gerens, post febrem, & Cholera Morbum fugatas, usum Corticis, bis terve, post stata ac debita intervalla, Prophylaxeos gratiâ repetebat.

Historia VIII.

Dominus *Arrie*, postquam diversitata fuisset in Aere rusticano, ubi tunc temporis Febris Intermittens Endemia gratiabatur, Londinum reversa, cholera Morbo derepentè corripiebatur acutissima, adeo ut e lecto suscitatus primo mane, festinanterque accersitus tum ad eam invisendam: Etenim præ vehementia spasmodicæ, & evacuationum supra & infra, vita Aegrotantis in summum periculum adducta videbatur. Extrema quippe algebant, Pulsus deficiebat, & inordinatus evaserat, Patiensque Aegritudine immensa, ad deliquium usque, penè confecta erat. A quibus symptomatis eam brevi restitui. Methodo in priori Historia descripta. Paroxysmo autem finito, ubi Urinam intensè rubram, ac lateritio colore, inspexissem; Haultus febrifugos cum Laudano, Prophylaxeos gratiâ, propinandos jussi; quos, cum sese bene habere jam sensit, plaue neglexit, quasi Officiose, atque absque necessitate præscriptos. Huius autem negligentia die sequente penas luebat, recrudescente Paroxysmo Febrili, cum diris cholera Morbi symptomatis ut ante sociato. A quibus symptomatis ubi sese liberalisset ante præscripta Methodo; Ipsa ultrò à me petebat Haultus febrifugos Prophylacticos, quos illa jam æque diligenter deglutiebat, ac Ego luben-

lubenter præscripseram. Atque, hoc pacto, à febre ac diris hæc Symptomatis liberata, protinus revalefcebat, & usu Pulveris, post debita intervalla, bis terve repetito, hæcenus a v. vel 6. Annis Sana manet.

Historia IX.

Ante tres menses accersitus eram ad invensum Puerum tres Annos natum, ad Insigne Regii Capitis in Fetter-Lane. Inveni eum immensè sitientem, hebetem ac attonitum: Aderat extremorum frigiditas, & Pueri salus à parentibus desperabatur. Quippe per horas 12. Cholera Morbo acutissimè penè confectus erat. Ubi cum ab imminente à Symptomatis periculo, Methodo præfata, spatio unius diei liberasset, ex Urinâ lateritiâ de fermento febrili delitescente certior factus, pulveris febrifugi \mathfrak{Dj} . cum gut. v. Laudani liqu. in cochleari Julapii Cordialis, quartâ quaque horâ exhibendum iussi. Post tres Drachmas huius Antidoti ministratas, virulentia febrili subacta, vegetus ac sanus puer evadebat: Appetitu ac Urinâ (stupentibus omnibus Amicis) spatio tridui integrè restitutus.

Historia X.

Domina Fendall, Mitrona generosa sanè ac formosa, Mense Septembri Anno Dom. 1671. & Etatis suæ quadragelimo, febre Quartanâ correpta, curâ Pharmacopolæ sese committebat. Medicamentis autem nescio quibus, iussu ejus, perperam tractata, & in statum deploratum inde redacta, mediâ Brumâ, ubi ab unâ vel alterâ hebdomada lecto perpetuo, præ languore affixa esset, quasi animam illic efflatura, me accersiebat. Deprehendi pulsum ejus debilem ac celerem, Ægitudinem ventriculi immensam, ac perpetuam, Lipothymias frequentes, Vigiliis pertinaces, Nauseam ac vomitum indecurrentes, sudores multos & Colliquativos, Sitim inextinguibilem, sputationem magnam, continuam Jactationem ac inquietudinem, Appetitum summè prostratum, Suffocationes Hystericas, cæterasque ejusmodi affectiones in genere Nervoso; hæcque omnia Symptomata, noctu dieque, sine quavis Remissione, perpetuò urgentia. Unde Ægra indies sese ultimum diem oppetituram rata, recidivationem febris primigeniæ obviæ optabat, modò, eâ lege, ab hisce miseriis variis ac perpetuis liberaretur. Ubi applicatione Emplastri Hysterici & largâ quantitate Julapii Cordialis, & Cephalicotum, viribus prostratis, & suffocationibus succurrere incassum tentaram, nec Opiata somnum conciliare poterant, nisi quem semper Ægrotudo immensa excipiebat, firmiter statuebam Catharticis lenioribus Morbum hunc in pristinam suam formam restitui debere. Quocirca, Potionem Amaram cum $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. Sennæ duntaxat, ob debilitatem virium, & lubricitatem alvi solitam, propinandam, atque per tres dies continuos repetendam iussi. Dejectiones inde, habuit singulis diebus 8. 10. 12. Unde, quamvis debiliior quadantenus evaserat, hoc tamen commodi (prout vota feceramus) reportavit, quod remissiones & ferè intermissiones Symptomatum urgentium inde perceperit, & Mor-

bus pristinum typum resumpserit: In singulis enim paroxysmis Horror, Ardor, & sudores copiosi sese invicem iterum excipiebant. Quo observato, à purgatione ulteriori prorsus abstinui, atque pilulas e Cortice peruviano exhibendas quartâ quaque horâ præscripsi. Spatio bidui, cum primum pulveris febrifugi $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. (qui tunc temporis vegetus ubique venalis prostabat) devorasset, à febre atque satellitio dirorum Symptomatum eam comitantium liberabatur, atque hucusque in vivis est, optimâ valetudine utens, utut recidivationi simplicis febris Intermittentis, ex levi quâcunque occasione, sæpius obnoxia fuerit.

Historia XI.

Domina Thompson circiter Annos 34. nata, vicina Domini Fendall, ubi ad tres Menses febre Quartana, non obstante Pharmacopolâ, quæ Medicinam faciebat, laborasset, ac jam Symptomatis, fere isdem quibus nuper Domina Fendall confecta esset, adeo ut vix sese in lecto ab una ad alteram partem movere posset sine deliquio, Cum Vicinam suam subito ac inopinato restitutam esse fama accepisset, me etiam accersivit. Ego Hanc etiam, Methodo, in Historia præcedente descripta, brevi restitui: verum ob pertinaciam morbi, pulverem febrifugum ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. in variis formis, exhibere coactus sum. Inde verò, absque additamento cujuscunque alterius Medicamenti, præter spem omnium Amicorum, qui eam pro deplorata habuerant, planè convaluit, à variis atque horrendis Symptomatis liberata.

Historia XII.

Anno 1682. inveni Juvenem habitantem in vico dicto Covv-Cross, quem à frigore suscepto inveni de repente Doloře universali acutissimo, Rheumatismo spasmodicum referente correptum, quo jam ad horas 12. ad minimum, excruciatu fuerat; adeo ut præ Doloris vehementi & diuturnitate, sine viribus, & anhelus jaceret, ac illico animam efflaturus. Urinam autem (uti spasmodicè affecti ubique solent) reddebat tenuem, claram & copiosam, pulsus erat admodum debilis & celer. Dirum hoc Symptoma illico, pro virili, sublevare satagi, effertum Spirituum motum primum Venzsectione (quam in brachio statim celebrandam iussi) compescendo, dein leni vomitorio (quippe vires Emeticorum egregias in Rheumatismo universali debellando jam sæpius expertus fueram) & denuò, gut. 15. Laudani liqu. Helmont. quartâ quaque hora exhibitis, in Haustufo Julapii Cordialis, quousque doloris perseverantia id indicaret. Hoc pacto, nisu spasmodico, seu effertum Spirituum Orgasmo jam diminuto, mane proximo ex pulsu in fortem & celerem mutato, atque Urina contentis saturata, & rubedine profunde tincta, atque ejusdem cum aëri exponeretur, colore lateritio, atque ac ex præsentī Ægri Temperie, febrim manifestò deprehendi. Paroxysmo autem, more solito, subsequenteribus copiosi sudoribus, finito, subsequenteribus copiosis sudoribus finito, ut reliquias febrilis effervescentiæ tollerem, atque Symptomatum dirorum recrudescentiam præcaverem, Venenati fomitibus sub-

actionem

actionem larga quantitate Corticis cum Laudano commixti sellmanter & cum successu moliebatur. Ager morigerus spatio 36. horarum inde plane in flatum *stomatice* redactus, ex Oreci faucibus evasit; Urina in alvæ & Appetitu jam integre restituta, adeo ut, brevi, nudis solus, cum firma valetudine, fungi potuerit. Ut Corticem prophylaxeos gratia non repetens, post 10. dies elapsos negligentia, perinas luebat, uno vel altero Febris tertianæ legitimæ paroxysmo, tunc temporis revirescente, non autem cum diris symptomatis ut prius sociato: A qua febre etiam, repetito usu Chinæ Chinæ, flatum liberabatur, & hucusque (quantum scio) optima valetudine utitur.

Historia XIII.

Dominicus Eruly Juvenis, servus Domini *Wood* habitantis sub insigni Leporis in vico dicto *Pater-Noster-Road*, post ingurgitationem nimiam Vini clareti, cum primam die sequenti Menis scil. *August. 3. 1690* prius esset, Horrore, Rigore, atque frigore intensissimo corripiebatur, una cum dolore horrendo regionem Diaphragmatis occupante, unde *Algeas Anhelus*, & Imbecillitate ac Languore confectus, id plures horas, quasi jamjam moriturus, jacebat, Arteris interim, sensu juxta, vix sese vibranti. Ego advocatus statim deprehendi spiritus a Venenato fermento febrili non tantum irritos esse, verum etiam plurimum oppressos; atque eo magis, quia Ventriculum, cum fermentum stomachicum activo veneno labefactum cibo macerando haud par fuit, recens signaverat. Ideoque, ut Ventriculus a molestia sarcinæ quam citissime liberaretur, jussi, salis Vitrioli ʒi β. cum Oxymel. scilicet. ʒi β. commiscendam, atque mixturam illico cochleari exhibendam; liquore postetico inter singulas doses calidè & copiose ingesto. Ager, unita Vomitione, in lecto decumbens, & multis stragulis coopertus coenlecria 4. vel 5. Julapii sequentis cordialis sapsulis ad libitum sumpsit, donec ab expansione spirituum inde restituta, damnatam massam sanguinis accendi incepit; Deinde jussi ut, ad spasmodorum solutionem promovendam, ʒviii. Sanguinis e brachio mitteret, Bolum ex Theriacâ Andromach. & Pulv. e Chelis Cancr. Comp. ana ʒβ. confectum, ad spiritus refoecillandos; Spasmos ultiores compescendos, & sudores citandos devoraret, superbibendo Hautulum Julapii cordialis sequentis.

℞. Aqu. Melil. Ceras. nig. ana ʒiv. Aqu. Pœon. Comp. Epidem. Syrup. Caryoph. ana ʒi β. M. F. Julap. Die proxima sc. *Aug. 4.* ubi observassem Alvum esse adstrictam, atque pulsum a remissione Febris quadantenus debilem (utut Ager a spasmis in munis esset) ne ex nimia spirituum depressione febris in malignam mutaretur; post resectionem Enematis e Decoct. Emollient. ʒx. Mell. Mercur. & Sacchar. rubr. ana ʒij. & Spec. Hier. Pier. ʒij. confecti, jussi illico ʒβ. Pulveris e Chel. Cancr. Comp. e cochleari Julapii exhibendam, & sexta quaque hora repetendam: Ita etiam ampla & acris Veticatoria ad Nucham scil. & Carpos internos supra pectus applicanda, & Bolum The-

riacalem, hora somni immutandam. *Aug. 5.* Agerum fere *stomatice* in eam, atque omnia (ut mihi videbatur) in vado. Inneque duntaxat jussu repetitionem Julapii cordialis & Enematis quinta 10. erid. (si Alvus adstricta id requireret) injiciendi & Boli Theriacali, hora somni exhibendi, & ut ʒiv. Decoct. Amar. lurgente crastino mane in promptu essent, quo Alvus (si ita visum esset) leniter subduceretur. Mediis autem nocte, inexpectato, spasmus adeo horrendis iterum corripiebatur, ut pluries deliquia inde perpetuus sit, atque ad sex horas, ad minimum, Algeas, & Anhelus, velut illico expiraturus jacebat: A quo discrimine Agerum haud absque Laudano liberare potui, quod inde manu liberali, repetitisque vicibus ministrandum jussi. Spasmi istiusmodi modo soluti, spiritus iterum sese expandere incipiebant, & flumina in Morsa nagare: quocirca ʒviii. sangu. iterum detraxi, & ne spiritus inde labefactati derepente corruerent, Bolum Theriacalem statim a Venæsectione deglutendum jussi, ut & Empl. Hyssericum, Galbano in Margine obductum circa Umbilicum applicandum, & duas Pilulas ex Ammoniac. Galbano, All. Porridâ, & Castoreo contextas tertii quique hora exhibendas, una cum coenlecria 4. vel 5. Julap. sequentis, quando eadem genus Nervorum, velut in Hyssericis, multum pati videbatur.

℞. Aqu. Menil. Ceras. nigr. ana ʒiij. Aqu. Pœon. Bryon. co np. ana ʒi β. Tinctur. Cantor. ʒiij. sp. sal. armon. ʒβ. syr. Pœon. co np. ʒi β. M. F. Julap. H. co autem non obtinentibus, nocte sequenti re-ruderebat paroxysmus cum spasmus Diaphragmatis & car-rarum partium & elpationi intercurrenti horrendis, & Deliquiis frequenter recurrentibus lociatus; Quæ symptoma non sine largo & repetito usu Laudani superare potui. Cum hac tertia vice spasmos periodice recurrere observassem, & ab inspectione Urinæ jam multum tinctæ, & in colorem lateritium præcipitatæ; deprehendi Proteinæ Venenæ a Fomite Intermittentium februm non alienum, sub hac lerva delitescens antea hisce diris symptomatis præbuisse. Ad venenatum igitur hoc venenium penitus eradicandum, Hautum sequentem se-rilugum illico exhibendum jussi, & tertia quaque hora ad 12. vices repetendum, temper addendo Laudan. Londinens. gr. iij. hautum nocturno, ut, tempore paroxysmi, spasmus præpedirentur.

℞. Aqu. cardu. ʒij. Pœon. comp. syrup. Caryoph. ana ʒij. Pulv. Cortic. Peruv. subtiliss. trit. ʒj. M. F. Haustus. His ministr. tis plane convalescit Ager, absque quocunque alio Medicamento, nisi quod ʒj. Corticis semel atque iterum, post Julia intervalla, repetendum jussim, partitis vicibus immutandam, ut recrudescencia diris hujus morbi præcaveretur; atque sanè votis omnia f. ulte responderunt.

Eadem Aestate, *Fabrum Ferrarium* habitantem in vico dicto *Carr-Lane* prope *Smithfield*; Aliumque idem ministerium exercentem in Martea dicta *St. John's-street*, eodem fere modo, post *Crispian* correptos conspexi, diu scil. Argentes, Anhelos, Imbecillitate virum fere ad Liporhyniam usque confectos, adeo ut præ atroci & ineffa-bili dolore, regionem Diaphragmatis & Abdominis totius occupante, sese illico peri-

perituros crederent. At postquam præsentem Orgasimum spirituum, atque Spasmos inde subortos Venæsectione prius cohibuissim; Bolo Theriacali & Opiato, atque Vesicatorius, iustam spirituum expansionem promoventem, dolor mitigatus est, Flamma (ut ex vibratione Arteriarum & Tinctura Urinæ apparebat) in sanguine accendebatur, facillimè Hautibus nostris febrisfugis Opiatis, quarta quaque hora per biduum repetitis, Febris cedebat, integrè & sine alterius Medicamenti auxilio, ambo sanabantur.

Nuperrimè etiam, scil. die instantis *Februarii* decimo sexto, post Meridiem, Pharmacopola diligentissime me accersivit ad invisendum Collegam eximium *D. D. Grear*, qui postquam sese, horis matutinis, injuriis Aeris, post intensum frigus præcedens mox regelantis, incautè exposuisset, Spasmis adeò atrocibus & horrendis totam Pulmonum, & Diaphragmatis regionem occupantibus derepente corripiebatur, uti inde anhelosum, & ad deliquium usque pressum, velut illicò animam effaturum, sedentemque cum invenerim; Decumbere etenim nullatenus potuerat: Extrema frugebant: Urina erat tenuis, & clara; Vibratio Arteriarum tarda & oppressa, atque per plura momenta nedùm explorando perceptibilis: Hæc per quadrantem horæ attonitus, lictore quasi Apoplectico afficiebatur. Accersito igitur Chirurgo, 3. xiv. Sang. illico c. Brachio detrahendas jussi; Pilulam item ex Ammoniaco, Galbano, Castoreo & Asa Fœtida confectam una cum haustu Julapii Cephalici spir. Salis Armon. Tincturâ Castor. &c. saturati lapsius exhibendam. Atque Frontem, tempora, & extremos artus spir. sal. armon. imbutos, frictionibus asperis agitandos. Quamprimum autem Spasmi, horum usu, ex parte sublevati fuerunt, quò decumbere potuerit, eum in lecto prius calefacto positum stragulis operiendum imperavi; Unde sæviens dolor, post trihorium quadantenus mitigari cœpit: Pulsus, oppressus licet, Ordinator fuit: Vires aliquatenus refarcitæ, Respiratio liberior. Indeque (annuentibus Erud. Collegis *D. D. Martin*, & *D. D. Havers* quos in hoc præcipiti casu accersendos duxeram) ad reliquias excruciantium spasmodorum penitus tollendas, post Enematis rejectionem (quod jam in promptu erat) Haustus Paregoricus cum 3. iij. Syrup. de Mecon. gutt. 14. Laud. liq. & gr. v. Salis Volatil. C. C. illicò propinabatur: Quin & quartâ quaque horâ, ad orgasmum spirituum nimium prorsus compescendum, repetebatur: Ne spiritibus autem inde præter modum depressis & irretitis, Febris in Malignam forte degeneraret, Vesicatorium insuper amplum & acre ad Nucham applicandum jussimus. Quid sit? Mane sequenti invenimus Cl. Virum, à Spasmis dolorificis, deliquiis juxta, ac anhelosâ respiratione liberatum, atque Sudore (uti in hunc paroxysmi febrilis) undique persusum: Pulsus verò citatorem ac fortio-rem: Et Urinam intensè rubram, & frigidam aëri expontam colorem lateritium referentem: Unde rite conjectantes, catervam hanc symptomatum dirorum, à febrili fermento delitescente profectam, atque brevi (si venenum Antidoto exlubita non maturè subactum fue-

rit) repullulaturam; Jussimus 3j. Chinæ-Chinæ illicò tota Haustus exhibendam, & quartâ quaque horâ repetendam, addendo Haustui nocturno Laud. Lond. gr. j. Die Morbi tertio, Veneno recrudescente, spasmodico dolore in cruribus, ad modum Rheumatici levioris, afficiebatur: Ex continuato autem Corticis usu, quarto die convalescit, à dolore penitus liberatus: Quin exinde appetitus rediit, atque sanum plane colorem Urina induit. Post vero spatium Tridui elapsum, absque evidenti quâunque causa, recidivam passus est, Spasmis Thoracis, licet non adeò truculentis ut prius denuo correptus est. Urina primum clarè & pallidè reddita, demùm vero intensa Rubedine saturata: Nullo autem alio indicio febris præsentis ex Pulsu, vel siti, apparente; Ab hac Exacerbatione verò, spatium bidui, ex repetita Venæsectione, usu Laudani & Corticis restitutus, per quatuor dies iterum convalescit: Tum demum, ex Veneno recrudescente, levem quandam spasmodorum revirescentiam iterum in Pectore sensit, à qua, Venæsectione & Bolo ex Theriac. Androm. & Pulv. Goan. ana 3ß. & Laudan. Lond. gr. j. confecto ac exhibito; spatium unius noctis, sudoribus undiquaque scatens penitus liberabatur; Urina quæ nocte præcedenti clara & tenuis apparebat, manè sequenti colorem lateritium referente; Tertio autem die, ab usu Corticis sana plane apparente; Ideoque consului, ad futuram horum paroxysmorum sextuorum recrudescentiam anteverteendam, ut quarto quoque die Unciam unam Corticis electi, forma sibi gratissima, devoraret ad tres vel quatuor vices.

Historia XIV.

Filia Domini *Sayers* Procuratoris in *Dollors Common*, Menses 13. nata, nuperrimè a veneno febrili spiritus-deprimente, ad unum vel alterum diem jacebat pallidula, attonita, suspiciosa, ac anhelosa, tanquam illicò moritura (quippe cerebrum & Pulmones plurimùm opprimebantur) & eo prorsus modo quo infantes palmis obnoxii, in Paroxysmorum Intervallis, atecta: Verùm febris præiens ex Temperie vel Pulsu dignoscenda non erat. Ego advocatus jussi ad spiritus exsuscitandos Emplast. Cephalic. cum Euphorb. ad plantas Pedum, atque Vesicatoria ad Nucham & Carpos internos, Linctum etiam ex Oleo Amyg. d. rec. Syrup. ex Erysim. & Sacchar. Cant. alb. confectum, & in Decocto Pectorale solutum, cochleatim, idque sæpius exhibendum: Lini nentum etiam ex æqualibus partibus Unguent. Dialthæ. & Ol. Nucist. pectori exterius illinendum, atque gr. 6. Pulv. è Chel. Cancr. Comp. cum æquali quantitate Pulv. de Guttet. com. mixta, quartâ quaque horâ è cochleari Julapii Cephalici exhibenda. Horum usu Infantula, die sequenti, à prædictis symptomatis plurimùm liberata est: Febris (spiritibus jam sese expandere incipientibus) manifesta apparuit, atque Typum primo Quotidianæ, dein Tertianæ induit, à quâ Pulv. Peruv. 3ß. soluta in cochleari Julapii Cephalici, & quartâ quaque horâ repetita, spatium quinque dierum, Infantulam liberavit.

Historia XV.

Eadem Hebdomada accersebar, ut inviserem in molam Domini *Melton* habitantis in vico dicto *Little St. Helens*, vix 22. Hebdomadas natam, quæ ad quadriduum, singulis diebus, Paroxysmum octo horas durantiem perpeffa erat. Tempore Paroxysmi, clausis oculis perpeffus acebat, pallidula, attonita; frigus externas partes occupabat, tanquam illico esset mortura, neque vagire valebat, ne quidem respirare, (quanquam non aderat evidens Spasmus partium Respirationi inservientium;) quippe Pectus simul ac Cerebrum opprimebatur. Ad resuscitandos Spiritus Venicatoria 3. ad Nucum & Carpos illico applicanda jussi, & ad Respirationem relevandam, totum Pectus Liniamento in præcedente Historia memorato illinendum; atque, durante Paroxysmo, Lintum pectorale ex Oleo Amygd. d. & Syrup. ex Bryum. & Julapium Cephalicum sæpius cochlearum ingerendum; extra Paroxysmum vero Pulv. eruv. ʒss. cum Pulv. de Gutta. gr. ij. commixtum in cochleari ejusdem Julapii ministrandum: A quorum usu, spatio bidui, a febre ac Spasmi liberata (stupentibus, quotquot aderant) revaluit, & hucusque valet.

Febru. 21. 1690. accersitus invisi filium Domini *Goug* habitantis in *Bull and Mouth Street*, Menses 3. natum, *Graviditæ* periodica Cerebri & Pectoris correptum. Durante Paroxysmo, quasi attonitus jacebat. Post applicationem Venicatoriorum ad Carpos, Bolum Theriacalem ad expansionem spirituum promovendam eximitum, & Lintum pectorale ministratum, ʒij. Corticis Peruv partitis vicibus e cochleari Julapii Cephalici propinatis, Puerulum spatio bidui (Deo favente) perfecte restitui.

Historia XVI.

Domina *Kirk* quadragenaria, Mulier proba ac honesta, quarta die Aprilis 1689. Frigore ex mutatione aeris suscepto, dè repente immensi Vomitione, ac Spasmi Ventriculi adeo atrocibus ac truculentis corripiebatur, ut toto curfu Paroxysmi (qui ad octo horas durabat, atque nemum sudore subiequente hniebatur) continuè tere Reliquium pateretur, ac si, quovis momento, animam efflatura: Die uno interposito, iterum, eadem fere horâ, recrudescebat Paroxysmus, & symptomata priora, sed gradu aucta. Ego igitur festinanter accersebar, ne forte, ante adventum meum, subito periret. Agram inveni Vomitione, Dolo ac Langore pene confectam, Pulsus insuper erat celer ac inordinatus, extremaque frigebant; Urina autem intense rubra ac contentis saturata, qualis redditur a Febre Intermittente laborantibus. Colore Urinæ, ac spasmodicorum Paroxysmorum revirescentiâ periodicâ observatis, ritè conjiciebam hosce Spasmos a Fomite Febris Intermittentis ortum suum duxisse, humoribus inde venenatis, per tunicam Ventriculi Glandulosam secretionem & excretionem sui moliri satagentibus. Indeque, ubi largâ quantitate Aquæ Pulli pro potu ordinario, & Opiato, præsentis Paroxysmi solutionem, atque symptomatum inde dependentium allevationem tentassem; ut Paroxysmi recrudescentiam antever-

terem, Corticis largam quantitatem, formâ Haustus exhibendam, ad Fomitum venenatum subigendum præscripsi; singulis etiam h.uli-bus nocturnis Laudani Lond. gr. ʒ. commiscendum jussi, ut spirituum Elasticitas aliquatenus tolleretur; & paulò ante Paroxysmum expectatum Pericarpia ex æq. part. Oliban. ac Terebinth. commixtis applicanda, ut ab intra ac ab extra recrudescentia morbi diri ac atrocis præverteretur. Die octavo, ubi nullus novus Paroxysmus invaserat, repetitionem Corticis, prophylaxeos gratiâ ante Plenilunium & Novilunium præscripsi, & Agram dimisi. Venenato autem Fomite, die decimo tertio, præter expectationem revirescente, Agra Febricitia Ophthalmica admodum dolorifica illico corripiebatur (quod olim etiam sibi contigisse affirmabat ante recrudescentiam Febris Intermittentis Cortice Peruviano, Consilio Medici rusticani, curata, quam ob causam hunc methodo ægre jam consentiebat.) Quocirca ʒx. sanguinis illico e brachio detrahendas jussi, & poltridie ʒiv. Decocti Amari cum dupl. Sennæ propinandas, unde parce admodum deiciebat. Igitur, ut somnum, in levamen virium dolore Ophthalmico plurimum exhaustarum, conciliarem; atque deturbationem aivi citatiorem ac copiosiore promoverem (siquidem a restitutione febris genuinæ Ophthalmicæ hanc admodum molestanti rite proligandam duxi) nocte sequenti ʒj. Pilul. Stomach. cum Gum. & Laudan. Lond. gr. ʒ. exhibui, atque mane proximo Potionem Amaram ut prius. Die decimo quinto, Collyrium ex Aqu. Plantag. Troch. alb. Rhas. sine Opio. & Sacchar. Crystal. alb. ad dolorem mitigandum, Oculis sæpius instillandum, & Haustulum Pægoricum hora somni propinandum præscripsi: Febre Intermittente, hisce Evacuationibus peractis, in propriam suam formam, absque prioribus Spasmi restituta, sponte denuò evanuit gravis hæc Ophthalmia. Febrem autem Intermittentem post hæc evacuationes recrudescentem, usu Corticis repetito illico penitus sanavi.

Historia XVII.

Uxor Vicini n. ei Domini *Wilson*, habitantis sub insigni septem stellarum, in vico dicto *Nervgate-street*, nuperrime correpta erat Spasmus Intestini adeo atrocibus & excruciantibus, una cum Vomitionibus immanibus, & continua ventriculi Nauseâ & agitudine, uti, præ vehementia symptomatum, ad plures horas, extrema frigererent, & illico animam expiratura videretur. Collega noster *Clariss. D. D. Carolus Goodall*, morbum hunc Colicam genuinam esse opinatus, præscripsit Linimentum anodynum, partibus affectis calidè applicandum, atque pilul. ex ʒss. Extracti. Rud. & Laudan. Lond. gr. ʒss. confectas statim exhibendas; & Clysterem Carminativum (si opus foret) injiciendum; unde cum bombis copiosæ defectiones sequebantur, Tormina & Vomitio cessabant, Formica revalescere videbatur. Die tertiâ vero, recrudescebat Paroxysmus, eadem fere horâ, sine evidenti occasione, cum symptomatis prius memoratis sociatus, qui usu Opiatorum cum Catharticis commixtorum, iterum, spatio 24. horarum, Sudore copioso exceptus,

finiebatur. Inde ex præscripto Collegæ Clariss. ad recrudescentiam Colicæ antevertendam Aquæ Minerales Catharticæ coctæ, & Lactæ alteratæ, primo mane calide propinabantur. Paroxysmo autem inopinato revirescente; Intestina spasmodicis tormen- tibus recens vellicata nihil desiciebant, cuncta autem ingesta, inter horrendum & continuam ægritudinem, Vomitione rejecta sunt. Ægra per plures horas, frequentes Lipothymias perpessa est, atque extremorum Frigore terri- ta, sese illico morituram credebat. Collegæ vero alibi occupato, Ego incunctanter accersiebar; Colore vero Urinæ lateritio, recrudescentia paroxysmorum periodicâ, & pulsus celeritate penitatis, ritè conjiciebam hanc colicam (utut nullum febrilem calorem deprehendere possem, & totum corpus frigeret) esse symptomaticam è venenato febris intermittens fermento ortam. Indeque ad spasmos compescendos, & reliqua symptomata vehementia inde succrescentia sublevanda, Clysterem Carminativum statim injiciendum, atque pilul. ex Extract. Rud. & Laudan. repetendas, atque totum Abdomen Panno Wallico Linimento ex Unguent. Dialth. Ol. Lil. alb. & Laterit. prius illico, calide fovendum jussi. Unde sub Vesperam, Alvo iterum cum bombis copiose subductâ, Ægra sudore universaliter persusa, placide dormiebat. Mane sequenti vero, ad præcavendam revirescentiam paroxysmi futuri (annuente Clariss. Collegâ) ʒj. Pulv. Peruv. tertia quæque hora in forma Hæmulus incunctanter exhibendam jussi, donec ʒj. Pulveris absumeretur. Quo facto, sine quocunque alio Remedio revaluit, neque ullam aliam Morbi recrudescentiam passa est. Cortex autem, ex communi nostro consilio, post debita intervalla, iterum iterumque repetebatur.

Historia XVIII.

Dominus *Johnson*, habitans in *London-House-Yard*, spiritibus à venenato fermento febrili plurimum jam laceratis, irritatis atque demum in statum Explosivum adactis, dolore intestinalium spasmodico primum leviori, verum per triduum continuato, corripiebatur, qui tandem quarto die adeò sævire cœpit, uti præ horrendis Spasmodis, Vomitionibus & Deliquiis frequentibus, in summo discrimine versari videretur, indeque Medicum magni nominis accersiri curavit; Qui, postquam Enemate Cathartico, foru externo & Laudano copiosè ac frequenter exhibito, Ægrum, spatio 24. horarum à symptomatis hæcè diris liberasset, nullo respectu ad febrile fermentum habito, ei, quasi in sanum statum integrè restituto, valedixit. At post inducias 24. horarum infidas, Veneno recrudescente atque pro gradu virulentiaë aucto, spiritus jam potius subigente quàm irritante; Æger, à febre in Malignam jam mutatâ, frequentibus Lipothymiis, nullis autem spasmodis dolorificis affectus, sese illico animam missurum credebat; Indeque Me primo mane festinanter advocari jussit. Ego ab Urina rubedine tinctâ, pulsu celeri, utut debili; Aphthis in gutture succrescere incipientibus, ac Deliquiis frequenter recurrentibus, cum nullo dolore sociatis, monitus,

clare perspexi Venenum sub initium morbi mi-
nus (quale est fermentum febrile intermit-
tentium & remittentium) in magis malignum
degenerasse, ex vi spirituum Laudano multo
obruta & oppressa; dum interea fermentum
Venenatum plane negligenteretur. Igitur Velica-
toria frequentia illico applicanda jussi, ut spi-
ritus exagitarentur, & illam in massa sangui-
nis denuo exuscitaretur, & in eundem hinc
Bolum ex Theriac. Androm. Context. Alchem.
& pulv. e Chel. Canc. Comp. ana ʒss. confe-
ctum, una cum haultu Julapii Cardiaci, sexta
quaque hora exhibendam. Unde, die sequenti,
pulsus torriorem, Deliquia verò, cæteraque
symptomata minora deprehendi; Æger placidè
dormiebat: Paroxysmus, interea, cum leviori-
bus deliquiis conjunctus, alternis noctibus re-
currebat, & Aphthæ cum inflammatione, saliva-
tione & levi singultu (ut i aniolet) conjunctæ,
per totum Os serpebant. Tincturam igitur Corti-
cis sæpius & copiosius exhibendam, Gargaris-
mos, cæter. que pro re natâ præscripsi: Uu ve-
rò Bolorum Alexipharmacorum & Julapiorum
cardiacorum continuato, tandem, spatio sex
dierum, mirum in modum misellus Æger reval-
lescebat. At quia paroxysmus, tempore solito,
adhuc recurrebat, cum magno successu Corti-
cis substantiam exhibendam, & quarta quaque
hora repetendam jussi modo sequenti.

24. Aqu. cardu. ʒij. Epidem. Syr. Caryoph.
ana ʒij. Cortic. Peruv. elect. & subtiliss. pulve-
risat. ʒij. Theriac. Androm. ʒi. M. F. Haultus.
Cum ab his ferè in statum *anæsthesiæ* redigi videretur, insigni & perpetua Salivatione Natura
per ductus salivales virulentiam, quasi criticè,
propellere moliebatur. Quocirca ad delitescen-
tes Veneni reliquias penitus subigendas,
Haultus Febrifugos bis scil. vel ter in die, ad
spatium bidui, adhuc, repetendos duxi, unde
Æger, Urinæ, Pulsu, Temperie, & Appétitu,
integrè restitutus, ex Orci faucibus libera-
tus, plaudentibus & mirantibus Amicis, con-
valuit.

Historia XIX.

Uxor Domini *Gamble*, habitantis in Platea
dicta *Foster-Lane*, die *Januar. 14. 1690.* quinto
ingravidationis suæ Mense, immani dolore Lum-
borum primum correpta, dein Spasmodis dolo-
rificis quasi circumcincta, utut Alvum, more
solito, quotidie deiceret, Vomitione tamen
affecta, ingesta quæcunque, illico rejecit, at-
que, præ vehementia Spasmodorum, ferè perpe-
tuo ad modum parturientis, gemens vocifera-
batur. Post triduum hæcè symptomatis penè
confecta, Obstetricem accersivit, ex cujus con-
silio, ad Abortionem præveniendam, ʒvii. San-
guinis e brachio misit, Dolo-
re autem nullatenus
inde mitigato, Ego die 18. suadente Obste-
trice, advocatus sum: Ubi autem ex Pulsu,
Temperie, Lingua, & Urina febrem præsen-
tem senserim, & ab Astantibus narratum sit,
dira hæc symptomata, à primo morbi insul-
tu, alternis diebus, more paroxysmorum, re-
pullulasse, & Obstetrix, exploratione facta,
Os uteri internum stric-
tissimè clausum esse affir-
maverit; nec guttula una sanguinis menstrui
effluxisset, Jure meritò opinatus sum spasmo-
dicos hosce dolores non esse uterinos, & Abor-
tionem

tionem præfagientes, verum Intestinales, spiritibus a fermento febrili irritatis, & se in hisce partibus expandere conantibus. Indeque Venæsectione, ad efferum hunc motum spirituum compescendum, celebrata, Haustum febrifugum illico, cum ulv. Corticis ʒj. propinandum jussit, itque tertia vel quarta quaque hora repetendum, ad fermentum venenatum eliminandum: singulis dosibus addendo Laud. liq. Helmont. gut. 14. ut, Spasmi inde sedatis, Remedium, suapte natura ingratum, in ventriculo nauseabundo & vomituriente melius retineretur. Postridie Ægram inventi ferè æstivè, atque a spasmi dolorificis prorsus liberatam. Quandoquidem vero radio pulveris in propria substantia exhibiti jam adhibebatur, Tincturam nostram Corticis in ejus locum substitui, cum Laudano quarta quaque hora repetendam ut prius. Die autem sequenti, recrudescente paroxysmo, quadantenus febricitare cepit, non autem Spasmi dolorificis & Vomitione uti antea afflicta. Quocirca repetitionem Haustuum Febrifugorum ad sex vices iterum præscripsi, adjuvando alternis Haustibus tantillum Laudani, ne fortè revivescerent Spasmi. His autem absumptis, sine additamento cujuscunque alterius Remedii, prorsus revalescit Ægra, Appetitus, & Urina integre restituebantur, nec minimum Abortus symptoma apparebat.

Uxorem Domini *Moady* habitantem in Platea dicta *Franchurch-street* isdem symptomatibus, & animi insuper Deliquiis laborantem, a septimo mense gravidam, hoc ipso Anno, eadem ferè Metho. liberavi; Quæ macilentæ licet, elumbis & valetudinaria fuerit, tandem, tempore debito, vivum infantem peperit, & hucusque benè valet.

Historia XX.

Domina *Hanni* sexagenaria, habitans in vico dicto *Bull-and-Mouth-street* (cum jam per multos retroactos annos, Tussi & Pulmonum infarctui, Colicæ ventriculi, ac Ictero frequenter recurrentibus, ex obstructione Hepatis obnoxia, valetudinario admodum degisset) postquam per 5. vel 6. dies dolore punctorio Hypochondrii dextrum occupante affecta fuisset, die *Novi* 26. 1690. à Me opem petiit, de hoc symptomate duntaxat conquerens: Ubi autem observassem eam minore solito vestitam, carnibus vescentem, & in cubiculo obambulantem, neque ullo insigni indicio, ex Tussi, Respiratione, Pulsu, Lingua, vel Temperie febre, Pleuritidem, vel Peripneumoniam dignoscere valerem. Urinam autem multum tinctam, & in colorem lateritium præcipitatum vidilem, ratus hoc symptoma ab Hepatis affectione oriundum, ad Ictericam stravisse viam, jussit ut ʒx. Sanguinis illico e Cubito dextro detraherentur; & cochleari unum Linctus sequentis cum ʒiv. Apozematis calidi quarta quaque hora exhiberetur.

ʒl. Ol. Amygd. drec. Syrup. ex Erysim. ana ʒi. Sacchar. Crystal. alb. ʒi. M. exactissime. F. Linctus.

ʒl. Rad. Petroselin. scotic. Gramin. Asparag. cichor. ana ʒij. Rad. Curcum. Cortic. interior. Berber. ana ʒj. Uvar. Corinthiac. ʒij. Rasur. C.C.

Ebor. ana ʒʒ. Croci in nodulo ligat. ʒʒ. sem. Anis. ʒj. Coq. in aqu. F. q. f. ad ʒij. sub finem ebullitionis addendo Vin. Alb. ʒviii. Colaturæ adde aqu. Lumbic. Mag. syr. c. V. Radic. ana ʒij. M. F. Apozema. Die autem 27. quæ nix difficili respiratione pulmones etiam affectos esse, simul ac Hepar suspicarer, jussit tres pilular. seq. horis medicinalibus deglutiendas & cochleari Linctus, superbibendo haustum Apozematis, & Pannum Wallicum linimento sequenti imbutum calide ad partes affectas applicandum.

ʒl. Milleped. præpar. ʒʒ. Ammoniac. depurat. ʒij. Stor. Benzoin. ʒʒ. Extrac. Croc. Balsam. Peruv. ana gr. v. Balsam. sulph. Terebinthinat. q. f. M. F. Pil. mediocres deaurand.

ʒl. Unguent. Dialth. ʒʒ. Ol. Lil. alb. Laterit. ana ʒij. M. F. Liniment. Die autem 28. Cum ex Dyspnæa cum dolore conjuncta suspicatus sim obstructionem Bronchiorum a phlegmate viscido symptomati hunc pertinaci autem dedisse, Apozema sequens præscripsi copiose propinandum.

ʒl. Decoct. Pectoral. depurat. ʒʒ. Tinctur. Croc. ʒj. Syrup. c. V. R. d. ʒi. M. F. Apozema. Vigiliis etiam, & febricula præsentis indicantibus, Bolum sequentem una cum haustu Apozematis Pectoralis, hora somni deglutendum jussit.

ʒl. Theriac. Androm. ʒʒ. Pulv. Chel. Canc. Comp. gr. ʒ. Syr. Calyopn. q. d. f. Bolus. Die 29. ad lubricanda Bronchia, Alvi adtensionem tollendam, & inde dolorem mitigandum præscripsi cochl. ij. Ol. Lini recens sine igne extracti, secunda quaque hora, una cum haustu Apozematis Pectoralis ministranda; & hora somni, febriculæ gratia & Vigiliarum, Bolum Theriacalem repetendum. Die 30. quum radio Olei Lini affecta fuisset, atque gradus Dyspnææ ferè in Asthma, forsitan a Bolo Theriacali exhibito & repetito auctus id requireret, lenem Vomitionem cum Oxymel. scillitic. & aqu. Cinam. fort. ana ʒj. ieiundam, & tincturam una cum Apozemate Pectorale continuandum jussit, atque inde Respiratione multum liberiori tacta, eandem Mixturem Emeticam, ipsa Ægra petente, die 31. repetendam, & Fluxu Alvi nimio jam suadente, Bolum Theriacalem iterum hora somni præscripsi sumendum. Die 1. Aprilis, ubi Languorem senseram una cum febre auctum, cochlearia 4. vel 5. Julapii cordialis sequentis ad libitum propinanda jussit.

ʒl. Aqu. Meliss. Ceras. nigr. ana ʒiv. Aqu. Cinnam. hord. Epidem. ana ʒij. Marg. præpar. ʒi. Sacchar. alb. ʒv. M. F. Julap. Sanguinis etiam ʒviii. illico e brachio detrahendas: Et ad infarctionem pulmonum minuendam Rad. Ireos; Enul. Campan. ana ʒʒ. Ingredientibus Apozemat. Pectoralis adjiciendam; atque ʒʒ. Pulveris sequentis quarta quaque hora in Cochleari Julapii exhibendam.

ʒl. Coral. Rub. Marg. præpar. Pulv. Chel. Canc. Comp. Salis Prunel. ana ʒʒ. M. pro iv. Chartulis, & denique, in subsidium generis Nervosi (quod jam laborare incipiebat) Vesicatoria duo ampla & acuta ad interna brachia applicanda. Die secundo Aprilis, phlegma glutinosum pulmonibus impactum copiosè Apozematis sequentis exhibitione diluere, & temperare tentavi.

ʒl. Rad. Scorzoner. Hisp. ʒij. Liquir. ras. ʒʒ Uvar

Uvar. Corinthiac. \bar{z} iij. Coq. in aqu. Hord. q. s. ad \bar{f} iv. Colaturæ adde Syrup. ex Acetositate Citri, Viol. Balsamic. ana \bar{z} i β . M. F. Apozema. In subsidium autem Tussis & Vigilium (quæ jam urgebant) Bolum sequentem hora somni præscripsi.

\mathcal{L} . Theriac. Androm. Balsam. Lucatel. ana \bar{z} i β . Conserv. fruct. Cynosbat. \bar{z} j. M. F. Bolus. Hoc pacto, docte & argute delirans, quippe falsa principia ponens, & apparentibus symptomatis deceptus, Ægram, febre, Vigiliis, Delirio ac dolore pene confectam ad Orci fauces duxeram, donec febre, quotidianis & stans periodicis Paroxysmis jam tandem typum ac genus suum palam prodente, suspicatus sum fermentum febrile Venenatum delitescens, & spiritibus implicitum, symptomati huic dolorifico admodum molesto, animum præbuisse. Quocirca (annuente Clariss. Collega D. D. Hulse, qui mecum in consilium vocatus est) ad nimum spirituum efferum (quem causam esse doloris deprehendi) minuendum, die tertio Aprilis, Venæsectionem iterum in brachio celebrandam iussi; & ad seminum venenatum delendum, \bar{z} xii. Cortic. Peruv. cum æqualibus partibus Sacchari albi commixti, partitis vicibus, sc. \bar{z} ij. quarta quaque hora exhibendas, & Pannum Wallicum, Oleo Palmitis illitum ad partem affectam calide applicandum: Et in Languoris relevationem Cochle. 4 vel 5. Julapii sequentis ad libitum sumenda.

\mathcal{L} . Aqu. Meliss. Ceras. nigr. ana \bar{z} iv. Epidem. \bar{z} ij. Confect. Alchem. S. Moscho \bar{z} ij. sol. Aur. num. i. Syrup. Caryoph. \bar{z} j. M. F. Julap. Huic finitis, die quinto, præter spem Amicorum, aut meam, conspexi Ægram ~~desuper~~ placide dormientem, hilarem, vegetam, a symptomatis universis, & dolore ipso penè liberatam; Ideoque duntaxat repetitionem mētus ad expectorationem promovendam præscripsi, & Boli Balsamici hora somni exhibendi. Die sexto autem, Ubi gradum febrilis caloris quendam leviozem jam restantem, atque cum Tussi conjunctum observassem, iussi \bar{z} iv. Lincturæ Corticis s. Apozematis nostri febrifugi, ad reliquias venenati fermenti delendas, quarta quaque hora exhibendas, & Bolum Balsamicum hora somni ministrandum. Die septimo febre jam planè profligata, Pilulas narcoticas sequentes præscribere jam ausus sum, hora somni sumendas; ut spasmi & reliquæ Doloris lateralis inde penitus tollerentur.

\mathcal{L} . Pilul. c. Cynogloss. gr. 8. Extract. Croc. gr. 2. M. F. Pil. 2. deaurand. Ne autem Pulmones inde facti quicquam detrimenti paterentur, Linctum Pectoralem repetendum, eumque sæpius cochleatim exhibendum iussi. Die octavo, quia Pilulæ nocte præcedenti præscriptæ ex sententiâ successerant, eas iterum hora somni repetendas duxi; & die nono, quandoquidem venenati fermenti revirescentiam jam futuram suspicabar, Bolum sequentem ter die deglutendum iussi.

\mathcal{L} . Pulv. subtiliss. Cort. Peruv. elect. \bar{z} j. sacchar. alb. \bar{z} 36. Ol. Amygd. d. rec. q. s. M. F. Bolus, addendo semper dosi nocturnæ Laudan. liquid. Helmont. gutt. 14. Decimo autem die, ubi Ægram, more Hystericarum, strangulatione quadam levi affectam observassem, duas Pilul.

sequentes, quarta quaque hora exhibendas præscripsi, unâ cum \bar{z} iv. vel v. Apozematis.

\mathcal{L} . Ammoniac. Gum. Galban. ana \bar{z} 36. M. F. Pilul. 14. deaurand.

\mathcal{L} . Rad. Scorzoner Hispan. \bar{z} i β . Uvar. Corinthiac. \bar{z} ij. Liquir. \bar{z} 36. coq. in Aqu. Hord. \bar{f} ij. ad \bar{f} i β . colaturæ adde Linctur. Croc. \bar{z} j. Syrup. de Erysim. \bar{z} ij. M. F. Apozema. Infectione autem Pulmonum ac diminuto appetitu id suadentibus, die 12. Ægram in ærem rusticianum dimisi, hac lege, ut, quamdiu, ob Tussis & Dyspneæ gradum leviozem adhuc restantem necesse foret, tres Pilul. sequentes, omni mane deglutiret.

\mathcal{L} . Ammoniac. depurat. flor. Benzoin. ana \bar{z} 36. Balf. sulphur. Anilat. q. s. M. F. Pilulæ medicæ deaurandæ. Atque omni nocte gr. 8. Pilul. c. Cynogloss. Et denique ad revirescentiam venenati fermenti præveniendam, post 10. dies Pulver. febrifug. \bar{z} vi. repeteret partitis vicibus; Emplastrum etiam Paracelsi & de Minio ana p. æqu. commixt. partibus diuturno dolore labefactatis superimponi iussi. Unde, brevi, præter spem Amicorum, integre restituta est, & hucusque optima valetudine utitur.

Historia XXI.

Faber Lignarius habitans in vico dicto *Crofters-Alley*, circiter Annum Dom. 1684. horis matutinis, Hore, Frigore, & inde, Dolor lateris sinistri adeo excruciente corripiebatur, ut sub vesperam ejusdem diei, præ venenata spasmodum, universum algens, inbecillitate confectus, & more Peripneumonicorum, pene suffocatus, Me diligenter accersiri jussit, singulis momentis sese animam effuturum credens: Ex Tussi autem inani (cùm advenissem) suppressa, & anhelosa respiratione, Proclivitate ad vomendum, & dolore intensissimo regionem pulmonum & pleuræ occupante, probè intellexi cuncta hæc symptomata dirissima, & præsertim spasmodicam pleuræ & pulmonum constrictionem, ortum duxisse è veneno febrili cum spiritibus implicito. Indeque, post Enematis Carminativi rejectionem, sanguinis è brachio lateris dolentis ad impetum spirituum demulcendum \bar{z} x. detrahendas iussi; Spasmi dolorificis, Madore frigido & pulsu Ægri formicante non obstantibus. Ad solutionem spasmodum ulterius promovendam forum præscripsi ex Rad. Petroselin. fœnic. semin. Lin. fœnugr. flor. Chamæmel. & Melilot. in Aqu. Coctis conficiendum, atque in Vesica Bubula semiplena calidè ad partes affectas applicandum, & in ejus locum (quoties cum amovere visum fuerit) Pannum Wallicum calidè illitum Linimento ex Unguent. Dialth. Ol. Lil. alb. & lateris. ana p. æqu. substituentum; Et dein ad Orgasum spirituum ampliùs compescendum gutt. xv. Laudan. liqu. in Haustu Julapii Cordialis exhibendas, & quarta quaque hora (si dolor perseveraret) repetendas. Ad lubricandas autem fistulas pulmonares, quò facilius phlegma bronchiis impacum rejiceretur, iussi, ut Linctus ex Ol. Amygd. d. rec. Syrup. Capil. Ven. ana \bar{z} i β . Sacchar. Crystall. alb. \bar{z} i β . Cochleatim deglutiretur quarta quaque hora, superbibendo \bar{z} iv. Apozematis calid. ex \bar{f} i β . Decoct. Pectoral.

depurat. Tinctur. Croc. ʒj & Syrup. Capill. Ven. ʒij. Etero spirituum nisi inde sedato, & somnus sparius, pulvis itatim augebatur; Ager a Dolor. liberatus universim incalescere, & ab expansione spirituum evidenter febricitare incepit, unde tandem post mediam noctem sudore cando perfusus, respiratione allevata, & viribus mitioratis, finito paroxysmo, obdormivit. Impecta autem Urina die sequenti multum tincta & lateritia, illico Haustum febrifugum Cortice impraegnatum jussi exhibendum, ad recrudescentiam paroxysmi expectati antevertentiam: & quarta quaque hora repetendum (addendo semper Haustui nocturno Laudan. Londinens. gr. j.) donec Urina (quod spatio bidui evenire observavi) tandem colorem naturalem recuperaret & contentis debitis saturata redderetur. Quo pacto, Agerum quarto die, sine quavis morbi revirescentia planè convalescentem, cibo Eucymo nutriendum Adstantium curæ tradidi, nec quicquam amplius præscripti præter Corticem post decem dies repetendum, ut venenati fomitis recrudescentia anteverteretur. Hoc verò Consilio posthabito, pœnas post duas hebdomadas luebat, recidivatione febris tertianæ legitimæ, cum diaras verò symptomatis, ut prius, non sociatæ, quam repetitione Corticis facile admodum & perfecte curavi; & Ager hucusque (quantum scio) firma valetudine utitur. Eadem planè methodo insuper Vitriarium habitantem in Burgo dicto *Sandvark*, & Viduam in parochia *Sættæ Helenz* minoris, & picroique alios (quos recensere nimium esset) symptomatis horrendis per pneumoniam acutissimam correptos, isque diu, in febrim Intermittentium initis, procrentis, scilicet, atq; spatio brevissimo curavi.

Historia XXII.

Tinctor pannorum in vico dicto *White-Cress-street*, a frigore sæpius suscepto dolore Rheumatico fere universali, per omnes artus inde versatili correptus; Ubi præ gradu doloris ipsamodici deliquim sapennumero perpessus, de vita desperare cœpisset, tandem me advocavit. Cum autem observassem Urinam profunda rubedine tinctam, aëri expositam sedimentum lateritium deposuisse, Atque ab Adstantibus narratum esset, dolores itatis periodicis, singulis scil. vel alternis diebus, augeri solere, atque summa Aegritudine concomitante exacerbari (ut ex pulsu vel Temperamento certa indicia febris, præ symptomate vehementi, deprehendere laud potuerim) ritè decrevi spasmos hosce dolorificos ortum suum duxisse ex venenato febris Intermittentis fomite, spiritum animæ lein adeò irritante, ut ad gradum usque Explosionis adversis venenum, præsertim in paroxysmo, sese expandere moliretur. Quocirca in præens dolorum levamen ʒxii. Sanguinis è brachio illicò detrahendas jussi, atque post intervallum sex horarum Vomitorium Antimoniali mitius propinandum; Quo pacto spasmi derepente minui cœperunt: Ut autem Morbi fundamenta penitus eruerem ʒj. Corticis cum guttis aliquot Laudani liquidi tertia vel quarta quaque hora exhibendas jussi; eo modo subactionem veneni morbifici moliens, ne spiritus inde recens irri-

tatorum paroxysmum reducerent. Postquam sesquiunciam Corticis (qui genuinus eo tempore erat ac vegetus) devorasset, illicò, absque quocunque alio Remedio ministrato, à febre ac spasmis Rheumaticis liberatus, Urina ac Appetitu derepente restituta, revaluit Ager, nisi quod hebes & quadantenus attonitus per triduum manebat, spiritibus animalibus Laudano, plus quàm à fermento febrili depresso. A quo symptomate, applicatione Vesicatoriorum, prorsus liberabatur, licet post 14. dies elapsos quamprimum scil. energia Corticis deficere cœperat, denuò recidivationem Rheumatismi perpessus sit, quæ æquè facile Cortice, post Phlebotomiam, repetito (nullo alio Medicovento exhibito) brevi sanata erat, uti iis accidere solet, qui febris Intermittentis revirescentia afficiuntur.

Historiam Domini Lane congenerem notavi in Phtisiologia nostræ, lib. 3. cap. 11. Verum nimis Lectori videretur, si recenserem singulas Historias quas observavi huc spectantes, quæ pene innumeræ sunt. Plures autem ejusmodi, posthac Graphice descriptas inveniet Lector sub Titulo febris *Enxide*, ac Rheumaticæ comprehensas.

Historia XXIII.

Dominus *Dun* Tinctor sericorum, habitans in vico dicto *Noble street*, Vir quadragenarius, à frigore frequenter suscepto, demum Mensis Maii die 7. 1690. ac si à Toxico quodam sumpto venenatus, vehementi Aegritudine, immensi vomitione ac dejectione, torminibus immensis, ac universali Rheumatismo, sive spasmis totum corporis habitum cruciantibus illicò corripiebatur; Cutis rubedine intensâ ubique perfundebatur; Urina erat non tantum rubra sed etiam contentis saturata; paroxysmus ferè ad horas 10. durabat, atque tandem sudore copioso exceptus finiebatur, utut absque evidenti quocunque algore, Horrore, Oscitatione, ceterisque febris Intermittentis symptomatis usitatis invasisset. Die nono, eadem fere hora diei, inexpectato recrudescere Morbus, cum prioribus symptomatis adeò vehementibus ut illicò sese animam expiraturum fore crederet Ager, indèque me protinus advocari jussit. Ad spirituum explosionem nimiam compescendam, ac dolorem vehementem inde auctum leniendum ʒxx. Sanguinis è Cubito mox detrahendas curavi; Atque deinde Bolum sequentem ad sudores ciendos exhibendum (quo citius præsens paroxysmus finiretur) una cum julpio temperato, de quo post bolum, atque etiam ad libitum Coch. 4. vel 5. sumeret. & ut, durante paroxysmo, à cerevisia abstinere, contentus aqua pulli, decocto albo, &c.

ʒ. Theriac. Androm. ʒss. pulv. è Chel. Cancr. comp. ʒj. Syr. Carioph. q.s. M.F. Bolus.

ʒ. Aqu. Meliss. Ceras. nigr. ana ʒiv. Epidem. ʒij. Syrup. Caryoph. ʒx. M.F. Julap. Finito autem paroxysmo, ad fomitem venenatum subigendum (ut recrudescentia morbi præcaveretur) Haustum febrifugum sequentem hora somni propinandum præscripsi; repetendumque, aurora sequepti, atque deinceps quarta quaque hora, semper addendo Haustui nocturno Laudan. Londinens. gr. j. ad cohiben-

bendum spirituum Orgasum, & præcavendum dolorem ventriculi ac Intestinorum Spasmodicum, modo paroxysmus reverteretur.

℞ Aqu. Card. ʒi. Aqu. Epidem. Syrup. Caryoph. ana ʒij. Pulv. Subtiliss. Cortic. peruv. elect. ʒj. M. F. Haustus.

Verum quia Cortex, quem Pharmacopola paraverat, fuit minus vegetus ne dicam planè effectus, Die undecimo, eadem fere hora diei, novum paroxysmum Ager perpeffus est, non autem tamdiu protractum, neque equidem symptomatis ita vehementibus stipatum ut prius. Indeque Julapium sequens, durante paroxysmo sæpius propinandum præscripsi.

℞ Aqu. Meliss. Ceras. nigr. ana ʒv. Epidem. Cinnam. Hord. ʒij. pzon. comp. ʒß. Marg. præparat. ʒß. Sacch. alb. ʒv. M. F. Julapium. Iussi etiam Corticem magis vegetum à pharmacopœio parandum, atque ut Ager in ejus usu, durante paroxysmorum intervallo, diligentissimè peristeret ut prius. Maii. vero 13. a paroxysmis prorsus liberabatur, atque planè convaleuit, utut ob neglectam repetitionem Corticis, quam præscripseram, post duas hebdomadas, recrudescente febre Intermittente, licet non ita diris symptomatis stipata, probè senserit sese pœnas hujus negligentiae, jure merito dedisse. Repetito autem deinde Cursu Corticis bis terve, post debita intervalla, firmam valetudinem recuperavit, & ea adhuc (quantum ego scio) utitur.

Historia XIV.

Dominus Langley habitans prope Hospitium dictum *bridgwell*, ubi à frigore suscepto, valetudinario ad unam vel alteram hebdomadam degisset, tandem Nauseâ, Aegritudine & vomitione per quatrimum continuata affectus, atque etiam Efflorescentia, per horas quatuor à primo decubitu, singulis noctibus recurrente, & febrem Scarlatinam simulante, per totam curam sparsâ, una cum pruritu, ac calore inflammatorio admodum molesto afflictus, à me nuperrime opem petiit. Symptomatis autem serio penitatis, præsertim ubi Urinam multa rubedine tinctam & contentis saturatam inspexeram, fermentum febrile somitis Intermittentium æmulum percepi. Indeque ad demulcendam irritationem spirituum præternaturalem a veneno inflammatorio ortam, & massâ sanguinis communicatam, ut ʒxii. sanguinis è brachio illico extraheretur, iussi, utque alvus mane sequenti ʒv. Decoct. Amari & ʒß. Syrup. de spm. Cerv. subduceretur. Ne autem spiritus ab hisce evacuationibus depressi, veneno eliminando prorsus impares redderentur, & morbus inde in inalignum mutaretur; bolum Cardiacum præscripsi è Theriac. Androm. & pulv. è Chel. Canc. comp. ʒß. confectum, hora somni, post venæsectionem exhibendum, itidemque post purgationem repetendum, & Julapium cordiale temperatum ad libitum propinandum. Denique posthæc Unciâ una Corticis peruv. formâ Aegro gratissimâ, partitis vicibus, ad spatium 24. horarum, fermentum febrile aggressus sum. Ager verò à Nausea, vomitione, pruritu, cæterisque symptomatis molestis liberatus, Urina ac appetitu restitutus, spatio tri-dui integrè revallescebat.

Historia XXV.

Accersitus Anno Dom. 1680. ad invisendum Filium Reverendi admodum D. D. *Corvler*, nunc Episcopi Gloucestrensis, Puerum circiter annos 12. natum; Eum observavi summo stupore correptum, stertentem, cæterisque Apoplexiæ fortissimæ symptomatis affectum: Et à somno isto profundo, Phlebotomia in vena jugulari celebrata; applicatione Cucurbitularum intra scapulas cum scarificatione profunda. injectione Enematis acris, exhibitione potionis Catharticæ, Veticatoris frequentibus, Sternutatoris aliisque ejusmodi Remediis evacuanti-bus ac Stimulantibus puerum excitare satagi. Die sequenti eum inveni (mirum dictu) non tantum expergefatum, verum etiam, absque minima hebetudine, erectum in lecto sedentem, atque cum sociis ludentem, à febre perfectè liberatum, ac victum petentem. Postridie autem, eadem fere hora diei, advocatus, ubi eum Apoplexia iterum, ut prius, laborantem observassem. Methodo prius memorata Apoplecticæ symptomata sustuli. Observatione hac bis facta, nullus dubitabam fermentum febris Intermittentis sub protectioni hac larva delitescens, Apoplecticis hisce symptomatis ansam dedisse, neque absque venenati hujus somitis subactione, revirescentiam Apoplexiæ præcaveri posse. Quocirca (amante Collega meo eximio D. D. Daniele Cox, qui jam mecum in consilium adhibitus erat.) statutum est, Prophylaxeos gratia, Corticem Peruvianum in paroxysmi intervallo copiosè ministrandum esse. Quo exhibito, Apoplexia nunquam iterum rediit, utut puer, post unam vel alteram hebdomadam elapsam, paroxysmos aliquot febris Intermittentis, primùm Tertianæ, dein simplicis Quotidianæ perpeffus sit; à quibus, repetito usu Corticis facillimè liberabatur.

Historias ejusmodi plures sub finem Capitis de febre Apoplectica & Paralytica videre est.

Historia XXVI.

Circiter Annum 1683. nuntiatus est Avunculum meum Dominum Izart (qui fere per annos 15. retroactos obesus, hebes & somnolentus fuerat, & jam annu ætatis sexagesimum quartum agebat) post triduum valetudinario transactum, deindè Apoplexia correptum fuisse in Domo mea rusticana, cum ibi loci febres Intermittentes, constitutione aeris conspirante, Epidemice grassarentur; Ego quippe multis negotiis Londini implicatus, impetravi à Fratre meo dilectissimo atque Collega C. D. D. Tyson ut eum iuviferet, quod lubenter fecit, Instructus prius Lanceolâ ad extrahendum sanguinem (si visum fuisset) Veticatoris, Julapio Cephalico, pilulis Catharticis, Sternutatoriis, aliisque ejusmodi Medicamentis in curatione Apoplexiæ necessariis. Insuper me suadente, Unciam unam Corticis Peruviani secum tulit, quem (cæteris omnibus posthabitis) jugiter ingerendum consului, modo, ex spontanea symptomatum Apoplecticorum remissione id fieri posset: Rite etenim conjiciebam, ex Constitutione tunc temporis Epidemica, atque Apparatu Apoplexiæ præcedente, gravem hunc Morbum potius symptomaticum esse ac à fermento febrili ortum, quam primarium atque genui-

genuinum; Proindeque desinente paroxysmo, inducias ultro concedendum esse. Ut et contra, si morbus fuisset primarius, ob Ætatem Ægri proVectiorem, atque stuporem solitum, & habitudinem, plane iunctum fore, atque supra Medicinæ sperantiam positum. Clarin. D.D. (itinerare jam peracto) ubi, ob omnium symptomatum remissionem, observasset Ægrum quādamenus a somno ac stupore ultro restitutum, atque sensus, hebetioris licet, compotem, indeque pulveri deglutendo parem; spatio sex horarum ꝑ. Corticis ei inmitrari curavit (ceteris omnibus ad apoplexiam spectantibus posthabitis) unde, licet post bihorium, paroxysmum febris Intermittentis legitimum perpelus sit Æger, nullis symptomatis apoplecticiis denuo tentatus est, atque equidem in posterum, absque exhibitione ejusdemque alterius Remedii, per tres vel quatuor Hebdomadas à Febre liber mansit; utur per totam hyemem insequentem, recidivatiōi febris Intermittentis simplicis, jam Quotidianæ vel Tertianæ, iam Quartanæ sæpenumero obnoxius fuerit. A qua tandem, verni tempestate sequenti, usu Corticis perfecte liberatus optima valetudine per plures annos utebatur, multo minus hebes ac somnolentus quam prius.

Historia XXVII.

Anno 1690. a frigore suscepto, Ego ipse, ad quadriduum, insolito faciei calore periodico, præsertim à pectus, affectus sum: Dein per tres vel quatuor dies continuos Hemiparesin molestantem, sinistram capitis partem occupantem, ab octava hora matutina ad quintam ulque Vespertinam protensam, quotidie patiebar: Quoad cætera hinc valebam, & cum appetitu integro, munis solitis fungebar. Quandoquidem autem hunc morbum, antehac malis, non obstante repetita venæsectione applicatione venæcatoriorum, Cucurbitularum, Potuum, Erithinorum, Malicetiorum, & exhibitione methodica Catharticorum, Emeticorum, cæterorumque idgenus, ad mentem veterum, valde Chronicum & contumacem sæpius observassem; atque moleltum hoc symptoma à fermento febrili delitescente subortum esse, suspicatus essem utut nulla febris præsentis indicia apparerent. Post extractionem ꝑ. sanguinis e brachio sinistro, pulveris febrifugi ꝑ. spatio bidui devoravi. Postquam Corticis ꝑ. assumptissem, dolorem multo mitiorem, die sequenti (periodice licet & designato tempore recurrentem) passus sum. Penitens vero absolutus, die proximo prorsus liberatus sum. Post tres autem hebdomadas recrudescerebat dolor (sicuti in febre Cortice curata solet) quem non sine Chinæ-Chinæ ꝑ. jam superare potui, quippe vegetam & genuinam penes me tunc temporis non habui. Repetito autem Cortice post duas hebdomadas, prophylaxeos gratia hucusque, sine quocunque alio Metacamento exhibitus, optima valetudine utor.

Ad Dominam Bodington habitantem in vico dicto Lothbury, Hemiparesin periodica per tres hebdomadas, eodem fere modo affectam, nisi quod, ex mora paroxysmorum longiori, tandem quadantenus febricitare incepit, accersitus sum. Corticis autem ꝑ. exhibita, post

detraktionem sanguinis, applicationem vesicatorii ad Nucham, & bolum theriacalem prius inmitratum, spatio bidui Patiens plane convaleuit.

Historia XXVIII.

Dominæ Lox viduæ elegans & robusta, quæ a multis retroactis annis affectiones Hymericas atque etiam Nephriticas post longa intervalla recurrentes perpella fuerat, & Calculos plures e Renibus excreverat. Cum Anno Ætatis quadragesimo fere ad duodecim Mensium spatium, menstruarum purgationum solitarum omnimoda suppressione laborasset, demum lumborum dolore atroci correpta, incertis spasmodis, verum ut plurimum quotidie revertentibus excruciebatur. Plurimis, usque maximi nominis medicis (qui variis methodis, jam ut Nephriticam, jam ut menstrialis purgationibus destitutam eam tractarunt) per spatium tri-estris incassum consultis; denud ubi dolores pene continui facti sunt, atque adeo exacerbati, uti extremæ partes inde algerent, atque, præ spasmodorum vehementia, mulier fere perpetuo lipothymica jaceret, nostram opem petiit. Post rejectionem Enematis camminativi (spasmodis vehementioribus id Indicantibus) venæ lateris affecti in brachio tundendum, atque sanguinis ꝑ. illico detrahendas iussi; partes affectas etiam, coram luculento igne, linimento ex unguent. Diach. Ol. Lil. alb. lateris. ana ꝑ. æqu. confecto, illinendas; & demum Extract. Rud. ꝑ. cum Laudan. Lond. gr. ꝑ. commixtam, forma pilulari in lecto deglutendam præscripsi; atque Apozema nostrum Nephriticum ex semin. Malv. Alth. &c. libere propinandum; julapium etiam hyllericum spiritu salis Armon. saturatum sæpius exhibendum. iussi. Incassum autem hæc omnia, quamprimum enim vis laudani anodyna deficere incipiebat, vomitio, rigor extremorum, lipothymia, & spasmi horrendi, ut prius recrudescerebant, quos allevare non potui abique quantitate laudani adeo larga & frequenter repetita, ut misella Ægra inde perpetuo delirans, stupida ac attonita jaceret. Ubi autem die tertio observarem Urinam multa rubedine tinctam, contenti, saturatam, ac in colorem lateritium præcipitatam, clare perspexi fermentum febrile (utur ex vehementia spasmodorum extrema jam frigerent) sub hisce spasmis delitescere: indeque Haustum nostrum febrifugum Corticis ꝑ. & laudani liquid. ꝑ. xx. saturatum statim propinandum, & quarta quaque hora repetendum duxi. Unde post horas 30. (restituta jam urina in colorem naturalem, atque dispositione ad vomendum plurimum evicta) Dolor multo magis allevabatur, quam ubi longè majori laudani dosi ægra hebetabatur: appetitu insuper restituta, carnibus vescabatur, atque magis vegeta ac vivax quam antea apparebat. Quandoquidem autem à spasmodis dolorificis immixtis non erat, nisi quamdiu laudano repetito Renes sensu privati narcosi afficiebantur, eam, per spatium duarum hebdomadarum, omni die à purgatione libero, in balneum artificiale ex aqua & lactis ana ꝑ. æqu. confectum, herbis, cæterisque ingredientibus lubricantibus saturatum, quotidie

immit-

immittendam duxi, ut, lubricatis meatibus urinaris, calculi Renibus aut ureteribus impacti, facilius deturbarentur; &, in eundem finem, tertio vel quarto quoque die, Alvum bolo Cathartico lenitivo, hora somni exhibito, & Aquis mineralibus coctis, cum vel sine manna, prout opus fuit, mane proximo subducendam jussi; ante & post singulas purgationes & balneationes Dofin laudani satis largam ministrando. Unde dolores & spasmi adeo allevabantur, uti femina, quæ prius ob acutos & vehementes dolores vix a lipothymiis, vel in lecto, immunis esse potuit, jam non tantum in cubiculo obambulet, sed etiam foras exiret, atque frequenter (me jubente) currum, ad extrusionem calculorum promovendam, conscenderet, licet omni nocte dosin laudani largam, ad acutos spasmos antevertendos, repetendam jussim; atque Alvum, post debita intervalla, pharmaco Cathartico leniendam; ne ex ejus constrictione dolor Nephriticus (uti solet) adangeretur; Cerevisiam insuper ordinariam, sacculo ingredientium Antiscorbuticorum alterandam, atque haultum ex vini Chalybeati & de octi amari sine purgantibus ana ʒjss. omni mane à purgatione libero propinandum jussi: Quippe ex Diathesi manifestò scorbutica & hypochondriaca, menstruis purgationibus suppressis, &que ac à calculis in Renes aut Ureteres impactis, hosce spasmos subortos esse jam suspicari coeperam. Hac methodo mensibus demùm restitutis, & calculis plurimis majoribus excretis, prorsus convaleuit, & huc usque à dolore onui libera, plaudentibus Amicis, optima valetudine utitur, & hilaris ac vivax munus solitis fungitur.

Eadem fere Methodo Coquum habitantem in vico dicto The Old Change liberavi ab horrendis spasmis calculosis cum febre conjunctis.

Historia XXIX.

Domina Royston, vetula clumbis ac paralytica, circiter Annam Dom. 1678. & ætatis suæ 67. febre Intermitteute tertiana, tempore verno, correpta, Cujus paroxysmis adeo proteritis atque cum diris admodum symptomatis sociatis ubi vires suas haud pares sufferendis sensit; sese in manus Medici consueti atque collegæ mei Clariss. curandam dedit. Ille autem, utut senex, atque exercitatus in arte Medicinali, quandoquidem vires Corticis febrifugas haud sæpe explorasset, ab ejus usu plane abhorruit, atque potius venæsectione, lenibus Catharticis, Emeticis, Pericarpis, atque longo usu decocti amari sine purgantibus, cæterorumque ejusmodi febrifugorum fallacium ac incertorum, curationem perficiendam duxit. Inde, spatio lunæ unius, viribus Agrav plurimum attritis, præsertim à febre jam typum suum in Duplicem tertianam mutante, universa symptomata cum subito virium lapsu in pectus ruebant; Ego igitur à perterritis adstantibus etiam accersabar, ut unâ cum Clariss. collega de nova curationis methodo instituenda consulerem. Ego autem, experientia virium Corticis multifaria fretus, animam dedi Cl. collegæ, ut lubentissime vires ejus in hac vetula experiretur, non obstante profectioni ejus ætate ac paralytica affectione,

quas ob rationes hætenus enim præscribere non ausus fuerat. Cortice autem ad ʒvi. spatio trioui exhibito ac devorato, plane convaleuit Agra, quo circa, ne officiosus viderer, Memet ultro subduxi, atque Agram in Cl. collegæ manu reliqui, postquam eum clam monissem utin Corticis, ac recidivationem antevertendam post debita intervalla repetendum esse. Verum hoc sano consilio (utrum Agra vel medici culpa nescio) posthabito, sæpius, scil. post intervalla unius, duorum, vel trium mensium, ad spatium sesquialanni recruduit Morbus, toties a Cortice proligatus, quoties eum revirescere contigerat: At senium penitus hucusque deietum non erat. Unde Anno 1679. media hyeme, ego solus à vetula perterrita, attrita & imbecillitate pene contacta advocor, ubi vix ulla spes revalescentiæ attulit, unoquoque paroxysmo cum diris synptomatis sociato, & jam singulis diebus revirescente, atque ad spatium horarum 18. vel 20. proterito. Invenio Mulierem præjudicio adversus Corticem præoccupatam, quippe duas ejus libras, ad minimum, nullo cum fructu sese devorasse affirmabat, & ego ipse observaveram ab uncia una Corticis vix unum paroxysmum differri potuisse; adeo sese vetula huic Remedio afflicta erat. Statutum est igitur in gratiam Mulieris, utut vetulæ, tamen vitæ amantissimæ, vires febrifugas alterius speciei experiri, cujus efficaciam ante multos annos, priusquam Cortex mihi notus fuisset, in debellandis hujusmodi febribus sæpius comprobaram. Quandoquidem autem pharmacum erat admodum ingratum; in formam pilularem redactum, ut ejus sapor vomitionem minus provocaret, modo sequenti exhibendum præscripsi.

℞. Pulv. Flor. Chan au el Subtiliss. trit. ʒj. Antimon. Diaphoret. Salis Abynth. ana ʒss. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. M. l. pilul. mediciores deaurandæ, quarum quatuor capiat quamprimum unâ cum haultu julapii cordialis quod in promptu est, repetatque sexta quaque hora. Unde spatio bidui, præter spem Astitantium, à febre, brumali ten. passate, & concrecente ubique gelu, penitus liberabatur, neque postea unquam morbi revirescentiam patita est. Nec non (quod equidem notatu dignissimum est) appetitum integrum, & firmam valetudinem, brevi, consecuta, quasi iterum juvenescere quædamtenus visa est, & jam, ubi octuagesimum ætatis annum pene attigerit, vultu vivaciori, ac animo hiliori prædita est, corpore magis erecto, & gressu magis cito ac firmo incedit, quam ante febrem. Quod mehercule multo de diutino Corticis usui maxime acceptum referendum duco, præsertim, quia nonnullos alios etiam, à multo hujus pharmaci usu, è statu valetudinario, in habitum corporis magis Athleticum & robustum quam prius, restitutos sæpius vidi. Quocirca, hoc vivum ac præclarum exemplar ob oculos eorum ponere soleo, præsertim seniorum, qui opinione nescio quæ præoccupati ab usu hujus Remedii timent. Si quidem mihi jam multa experientia fretus persuasum est, nihil inauspicatum ab hujus pharmaci usu unquam evenitum esse (modo infelix idcirco abis) ubi manu sat liberali succrip exhibitum.

Historia XXX.

Circiter Annum 1685. accersitus, invisi Filio-
lunæ Domini hancur Juniperi, vix duos annos
natum, quem invenimus plurimum febricitantem,
atque, more infantium denturientium, Pulmo-
ni inflatu, cerebri oppressione, ac hebetudi-
ne laborantem, unde spasmos mox subsequen-
tes, jure merito suspicabar. Quocirca ad spi-
ritus revivificandos, suppedanea acris ad pian-
tas pedum, & Venæ toria ad Nucham & car-
pos applicand. iussi, quinetiam Julapium ce-
phalicum ad libitum pituitandum, & Pulv. chel-
canter. comp. gr. vi. cum Pulv. de Guttet. gr. iv.
commixta, sexta quaque hora exhibenda. Un-
de puerum a symptomatibus prædictis liberatus
videbatur. Febrii autem paroxysmo, iisdem-
que symptomatibus, unoquoque die, atque eadem
sepe hora, iterum atque iterum periodice recur-
rentibus, nullus dubitavi recrudescentiam
symptomatum, una cum febre, Cortice tollen-
dum esse. Cum autem Pueri *idcirco* spem
meam frustrata esset, postquam spatium, dierum
prope 3 vi. Pulveris Peruv. nullo cum fructu,
illi ministrarim, vita Pueri in maximo discrimi-
ne jam verante, gr. xv. Pulv. Noltri febrifugi è
co. hleat. Julapii cephalici exhibenda iussi, &
sexta quaque hora repetenda, Unde spatium bi-
dum, a calore atque omnibus symptomatibus libe-
ratus recon. aiescebat Puer, & adhuc valet.

Hoc etiam Remedio Domina *Gumley* Febre
Tertian., quæ ob scœnæ *idcirco* vires
Corticis superaverat, correpta, brevi liberata
est.

*Exercitatio Secunda. De Febribus Continuis,
praesertim Remittentibus, & Zymoticis, sive
Continuis*

De Febribus Continuis in genere.

In priori Exercitatione generalem febrium,
rationem & continentem earum causam, in Ve-
nen. to fermento spiritibus animalibus implici-
to consistere docuimus, & symptomata multi-
taria, quæ febricitantibus accidunt, inde de-
pendere demonstravimus: Febrium etiam In-
termittentiam Aetiologiam, Pathologiam atque
Indicationes curativas ab hoc fonte clare &
perspicue deduximus. Restat iam, ut ad hanc
Cynosuram theoria febrium continuarum con-
tinuæ seu simplicium & mixtarum, Inflammato-
narum, obliquativarum, & Zymoticarum, quæ super-
est excolenda, dirigatur; Indicationes curati-
væ eliciantur, & denique methodus medendi
cum ratione ac experientia congruentior stabili-
tatur, quam ea quæ olim Humorum & Qualita-
tum evidentium doctrina innitebatur.

Ante omnia hic loci notandum venit, Ve-
nena in genere, seu fermenta febrilia, quotquot
sint, eandem ipsissimam naturam sortita esse,
atque, utut jam vi Emerica, jam cathartica, &c.
Eximie prædicta sint, unde vehementia, eaque
admodum multiplicia symptomata profere
apta nata sunt, in quantum tamen species fe-
brium discriminant in Intermitteutes, Remit-
tentes continuas vel Malignas, ab invicem
gradu solummodo differre; prout plus minus
principium vitæ, seu spiritus animales obruunt
aut delent; indeque mutationes in massa san-

guinis, ac symptomata in genere Nervoso va-
riantia producant. Exempli gratia, Quoties
spiritus robore nativo pollente, & miti Vene-
no oblecti, adeo firmi ac constantes sunt, uti
spatio 24. horarum victoriam reportare valeant;
licet delitescens fomes statis periodis nunc
his, nunc aliis, ad recrudescendum aptus sit;
Febrii inde formatur vere Intermitteutes, de
qua in priori Exercitatione sat superque temo-
nem habuimus. A proximo Veneni gradu spiri-
tus quadantenus fracti, licet perciti & irritati,
toto suo usu & conamine hostem, unius vel al-
terius diei spatium, excutere nequeunt: Hinc
formatur Febrii Zymotici, ubi Ager continuo fe-
bricitat; exacerbationes tamen & remissiones,
statis periodis sentit: Licet enim Natura in
unoquoque certamine, quotidie superior eva-
dat, quia tamen victoriam admodum dimina-
tam, ob deficientem spirituum expansionem,
semper reportat, nusquam, in statu prorsus
erupta, de hoste triumphat. Si gradus Veneni
sit adhuc intensior, & spirituum expansio non
tantum valde deficiat, verum etiam cum multo
usu & labore ad metam elasticitatis, quam
assequitur, pertingat; spiritus inde excandes-
centes in statum explosionis adiguntur, varios
dolores in universo systemate, vel parte aliqua
singulari excitantes, aliquando Vomitus, vel
secessus enormes, vel utrosque simul efficientes.
Febrii hinc orta, pro diversitate symptoma-
tum vehementium, nunc Inflammatoria, nunc
colliquativa seu Glandulosa, jure merito deno-
minatur, & Typum Rheumatismi universalis
vel particularis, Pleuritidis, Peripneumoniarum,
Erysipelatis, Anginæ, Ophthalmiarum, Febrii Scar-
latinæ, Variolæ, Morbillorū, Diarrhoeæ, Dy-
senteriae, cholera morbi, colicæ ventriculi vel
intestinarum, &c. pro genio fermenti vario, &
partis affectæ debilitate simulat; Exacerbatio
insuper, & Remissio periodica ex hisce sympto-
matibus clarius quam a calore febrili aucto vel
diminuto dignoscitur. Calor enim, ferviente
symptomate, præ languore mitescit, remittente,
augetur, & evidentius se prodit. A gradu
Veneni intensissimo suboritur Febrii Zymotici, ubi,
utut initia sub initium cuncta appareant sym-
ptomata, quia spiritus primo ictu mortificati,
lucta instituenda impares redeuntur; Febrii
tamen plus minus maligna est: spiritibus enim
mortificatis, Antidotus febrifuga nullius usus
est, donec Arte vel Natura Venenum quadante-
nus subigatur, & febris typum benignæ, seu
Zymoticæ induere incipiat.

Varia hæc Venenata fermenta (utut febres
inde orta typo, symptomatibus, & Methodo Cu-
rationis toto cœlo dissent) non specie, sed
gradu tantum, ab invicem differre ulterius con-
stat; quia non tantum febres remittentes, ve-
rum etiam nonnunquam intermittentes, ex ma-
la Praxi, in vere continuas, Malignas, & Pestil-
lenciales n. utari contingit; Et e contra Mali-
gnas (praesertim Autumnales) non raro in Re-
mittentes vel Intermitteutes terminari. Nec-
non facile observatum est, Febres summè Mali-
gnas, idque in constitutione Epidemica (ubi
Venenum ab extra admissum; vel deleteria, si
quod aliud, maxime præpollere videatur) pri-
mo insultu typum Febrii Zymoticæ induere, atque
tertio die, si non etiam quinto, & septimo,

ducias dare, cum evidenti Diaphoresi ac Remissione conjunctas; A quo tempore, gradu Veneni jam aucto, & morbo ad statum properante, in *Septici* degenerant, & Petechia, Eruptio Miliaris, vel alia aliquæ Malignitatis notæ quam citissime efflorescunt. Ex adverso, Febres Petechiales, Purpureæ, & ipsæ Pestilentialia, prope Crisin (quoties eam contingit esse salutarem) Veneno quadantenus subacto, & spiritibus prius implicitis sese expandere incipientibus, in benignas & *Septici*, putridas dictas, transeunt, sudore sanguis vel alternis diebus, statâ hora, pro ratione paroxysmi antecedentis, plus minus copioso excipiuntur, quem sequitur somnus placidus, Delirium, cæterorumque id genus symptomatum remissio; Aliaque Naturæ victicis indicia ab Urina, pulsu, & temperie desumenda; donec tandem Æger, tota materia febris deflagrata, & Veneno penitus subacto, spiritibus inde pristinam expansionem recuperantibus, sensim in statum *crisis* restituatur. Insuper, febres *Septici*. Præsertim Infantum, uno tenore per quatrimum progredientes, non raro observari, quinto vel sexto die, Veneno ex regimine debito quadantenus dimiuto, in *Septici* vel ipsas Intermitteutes terminari. Imo nuperime in familia Vicini mei Domini *M.* (ubi octo ad minimum simul decumbebant, uno eodemque modo primum correpti) sex, quos invisi ante tertium diem Morbi, scil. priusquam venenum ex morâ exaltaretur, mera Corticis exhibitione, cum, vel sine Venæsectione, pro ratione symptomatum, spatio bidui vel tridui integrè restitui: Dominum vero ipsum, atque ejus conjugem (qui opem Medicam ad diem septimum vel octavum distulerunt) ex Orci faucibus, non nisi spatio Lunæ integræ, idque difficulter admodum, usu frequentium Venæsectionum, Alexipharmacorum, cæterorumque ejusmodi Anti-pestilentialium Remediorum liberare potui. Cortex hic nihil valebat; Delirabant enim, Lipothymia, subsultibus Tendinum, cæterisque diris in genere Nervoso symptomatis affliciebantur Patientes, Petechiis etiam, atque Eruptione Miliari quaquaversum interspersa notabantur.

Hoc concessio Theoria Februm continuarum generalis facile & breviter explicari potest. Venenum enim spiritibus implicitum (quod Naturam ad certamen irritando, hisce febribus ausam præbet) vis vel Debilius, vel fortius, vel Æquale est: Modò Debilius sit, Natura, unoquoque certamine, quadantenus superior evadit, indeque oritur febris continua benigna, dicta *Septici* seu putrida: ab evidenti Paroxysmo ac Remissione, singulis, vel alternis diebus periodicè recurrente, dignoscenda. Si verò Æquale sit, multo magis si fortius, febris insequitur *Septici*. unum tenorem servans.

Hinc sequitur febrem *Septici* simplicem, quâ talem, & quamdiu talem, nunquam esse funestam: Quippe Natura quovis certamine victori in reportat, imperfectam licet; Quoties autem a gradu Veneni aucto lethalis evadit; paulo ante funestum diem, typum suum mutando, in Malignam transit: Simplicem inquam *Septici*. Namque à nisu & luctâ spiri-

tuum haud raro funestum aliquod Symptoma suboritur, Rheumaticum, Pleuriticum, Peripneumonicum, Erysipelatodes, Dysentericum, vel Cholera Morbus, Diarrhæa torrida, Colica Ventriculi aut Intestini Symptomata, unde Æger interimitur, utur febris fuerit, utraque, putrida & benigna, & Venenum unoquoque certamine quadantenus dominum. E contra, affirmo, febrem quamcunque *Septici* semper alicujus Malignitatis participem esse, quia Venenum spiritibus superius, vel forte n. æquale est; nec unquam posse sanari, donec a subactione Veneni, & expansionis spirituum restitutione, Typum suum mutet, ac nat. *Septici* seu benigna. Quo igitur febris plus minus accedit ad naturam *Septici*, hoc est, pro ratione expansionis spirituum, Prognosticon ritè faciendum est, vel funestum vel salutare, atque Methodus Curationis (durante cursu unius ejusdemque morbi) rure merito varianda. Siquidem, quamdiu febris speciem continens inducit, spirituum robur superest, quod sufficiat ad vires Antidoti in actum deducendas, cujus exhibitio ad Veneni reliquias frangendas apprime necessaria est, Cortic. scil. Peruvian, cujus vires in hac, æquè certo & cito efficaces, ac in Intermitteute curandâ, multo usu, & communi Medicorum consensu comprobantur; Ubi autem Venenum magis deleterium est, & spiritus non sine nullo nisu & conamine sese expandere valent, unde variis ipsius, & prægrandes Excretiones, præsertim sub initium uniuscujusque Paroxysmi excitantur, utur febris sit revera *Septici*, speciem tamen exhibet alterius febris inflammationis scil. Colicæ, typhæ, &c. Unde fit, quod hæc febris, licet in se salutaris, & viribus Corticis victicibus, (quas spirituum robur ac vivacitas habentis superilles regere, ac in actum deducere valet) cessura; Propter symptomata tamen vehementia a nisu hoc & lucta difficili orta, ex accidente, lethalis sæpius evadit. Quapropter, præter subactionem fermenti venenati febrilis, multa alia Indicantur a nisu spirituum & parte affecta, quibus posthabita generali Indicatione) Medicus quivis sese prius satisficere debere noverit. Febris *Septici* unam tantum generalem Indicationem suppeditat, scil. ut expansione spirituum promota, Æger in extremo discrimine versans & quasi gradu quodam Mortuus, ab Orci faucibus liberetur. A Cortice Peruv. vel alia quacunque Antidoto nihil opis omnino jam expectandum est, donec spiritus Antidoti vires regere possint, & a veneno sopiti Cardiacis, Alexipharmacis, &c. Exsuscitentur, & munitis suis iterum fungantur. Quo facto, febris genium suum non mutare, & in *Septici* Benignam transire non potest, ejusque mutationis specimen exhibere in Exacerbationibus & Remissionibus periodicis, singulis vel alternis diebus recurrentibus, & pro ratione victoriæ partæ plus minus manifestis.

Quandoquidem hæc febres indole admodum diversæ sint, indeque Prognostica diversa suppeditent, & Methodum Curationis variam postulent, & eadem ipsa febris, brevi temporis spatio, genium suum sæpius mutare soleat, Medici interest, ante omnia, febrem curandam

dam ex certis Criteriis posse dignoscere, scilicet num Benigna, Maligna, vel Mixta sit, & varias Metamorphôses, quas eadem febris subit, animadvertere; ut inde, tanquam Cynosura ductus, non tenerariò & more Empiricorum febres omnigenas, vel eandem ipsam, in diversis suis Stadiis, heu quantum mutata! unâ methodo, absque discrimine tractare; Verum pro ratione Veneni aucti, vel diminuti, & expansivâ spirituum facultate inde plus minus læsâ, ad normam rationis, Prognostica sua dirigere, & Methodum Curationis, pro re natâ, multiplicem instituere valeat. Exempli gratia, si febris à primo insultu, mali Moris sit, & Mors quasi ab initio præforibus aditet; Prognosticon funestum faciendum est. Indicatur vero expansio spirituum, ab ipso initio, Alexipharmacis, Vesicatoriis, &c. Promovenda. Sin spiritus, qui primò prævalebant, ex malâ praxi, vel alio quovis accidente, durante certamine, deficiant, & venenum prope itatum Morbi spiritibus superius evadat; Febris, quæ primò fuerat *Remittens* in Malignam transit, facile Prognosticon suggerit, & Methodum Curationis mutandam postulat. Sin Artis vel Naturæ ope, spiritus, instante morbi statu, extremo nisu, quantum possunt, sese expandant, Veneno inde quadantenus subacto, febris quæ prius erat Maligna & *Remittens*, mutatur in Benignam *Remittentem*, evidentibus Exacerbationibus & Remissionibus inter punctam, & faultum eventum præficientem, præsertim quia Antidotis specificis utendi occasio datur, unde citò, ac certò, Venenum febrile subigi potest: Quocirca tam Prognosticon, quam Methodus menden si, pro præsentis Morbi genio, jure merito variari debet.

Ideam harum Febrium Graphicè depingere, ita ut certis quibusdam Criteriis ab invicem, & à cæteris morbis congeneribus discriminentur & dignoscantur; Fontes etiam variorum Prognosticorum ad normam rationis adaptatos ostendere; necnon Methodum Curationis ad diversas hæc febres accommodatam rationi innixam stabilire, qua in variis hujus morbi versatilis Stadiis, symptomata diversa sublevare possint, est pensum illud, quod adhuc superest filo sermonis jam texendo absolvendum: Id autem à febribus *Remittentibus* sive continuentibus consultò auspicamur; quoniam istæ Intermittebantibus magis affines videntur, quam Malignæ, vel Inflammatoriz aut Glandulosæ seu colloquativæ, quæ à fermento magis Deleterio, vel saltem magis irritante originem suam trahunt.

*De Febribus Continuis Remittentibus, ab Antiquis *Remittentibus* dictis, iisque tam simplicibus, quam spuris; earumque Naturâ, causâ Continente, ac Typo Vario.*

Febrem illam Remittentem, seu *Remittentem* voco, quæ licet continua sit, manifestò tamen, atque ut plurimum periodicè, exacerbatur & remittit. Hæc febris vel est simplex & pura, vel spuria seu mixta, vehementi quippe aliquo symptomate stipata.

Remittens Puræ & Simplicis Typus, ex manifestâ Exacerbatione & Remissione, singulis

ut plurimum, vel alternis diebus, statâ & certa horâ, Periodicè recurrentibus facillimè dignosci potest; Atque equidem, ab Intermittebantibus, inæ duntaxat discriminetur, quod calor febrilis in intervallis hujus febris nunquam penitus extinguatur; & primus sulmo paroxysmus cu in solenni Algore, Horrore & Rigore incipiat. Unde operæ pretium vix erit, in hujus morbi Criteriis, sive signis Diagnostice diu morari, postquam Typum ejus Graphicè descripserimus.

Cum primò spiritus, ex improvviso, aurâ Venenata incendantur & obruantur, tota Machina Algore universali corripitur, eoque durante, donec sese expandere iterum nitentes, hostem adorni incipiant; Quod sine Horrore, Rigore, Oscitatione frequenti, Pandiculatione, Vertigine, cæterisque id genus levioribus spirituum oppressorum & confusorum symptomatis (quæ in primo unius ujusque febris limine molesta sunt) fieri non potest. Urina etiam tenuis, pallida, & copiosa redditur, atque Pulsus in Celerem, verum debilem & suppressum mutatur (veluti in Hysteriis, cæterisque affectibus Nervosis accidere solet) donec spiritus nisu, & motu nonnunquam vehementi exardescant, atque inde præter solitum expansi, flammam febrilem in sanguine accendant: Totâ autem mæssâ jam flagrante, Temperies illico mutatur in fervidam & æstuosam, Pulsus in celerem, fortem & magnum, Urina multa rubedine tingi, & colliquatione facta, contentis saturari incipit: Poris à calore insolito constrictis, cutis arefcit; accedit sitis ingens, & Linguz summa ariditas; & quia Fermentum Ventriculi à mæssâ sanguinis flagrante secernitur, ipse Ventriculus Dysepisia, Aegritudine, Nauseâ & proclivitate ad vomendum derepentè afficitur: Cerebrum, à Veneno non adhuc penitus excusso, Gravitate molesta laborat; & Arcus Lassitudine premuntur: A motu spirituum inordinato sese ulterius expandere contententium, Vigiliæ perturbationes oriuntur, atque jactatio corporis inquietâ: A Fibrarum Membranacearum distensione Dolor Capitis prægrandis, & Lassitudo Ulcerosa totius Corporis; præsertim vero prope exitum Nervorum e Spina, insignis Lumbago, hanc Febrem fere semper comitari solita, ortum suum ducit. Atque omnia hæc symptomata vigent, & crescunt, donec spiritus, expansivam suam vim exercendo, Venenum quadantenus subegerint, postquam ad spatium unius vel alterius diei acriter certaverint: Tunc tandem Febris (subortis sudoribus) mitior evadit, Jactatio, Vigiliæ, Aegritudo, Sitis, Cephalalgia, Lassitudo, cæteraque omnia symptomata sensim atque ultro decrescunt, donec Venenum, vi potius suppressum quam subactum, novas vires rennat, & certamen de novo instituat, quod jam sine solenni Algore, Horrore, & Rigore incipit, quippe spiritus, durante remissione, ultra solitum expansi, ex improvviso non adeo deprimi possunt. Quamdiu febris hunc typum servet, jure merito *Remittens* seu continens audit: Ubi vero venenato Fermento aucto sponte, vel ab Evacuationibus, vel Opiatis, perperam & in larga nimis quantitate exhibitis, vel quocunque alio accidente,

febris typum suum mutet, & uno tenore progrediatur, illico maligna sit, prognostica diversam monstrat, & methodum curationis admodum diversam postulat. At de Maligna febre exercitat. quinta uberius loquemur.

De Febris Continentis Signis Diagnosticiis.

Criteria febris *simplicis* simplicis Diagnostica à quatuor fontibus potissimum petenda sunt. 1. scil. à manifesta symptomatum exacerbatione & remissione, singulis vel alternis diebus periodice revertente; Quo autem magis evidens sit exacerbatio & Remissio; quoque magis certa sit harum exacerbationum & remissionum periodus, eo genus *simplicis* clarius sese prodit. 2. à pulsu, qui utitur, durante remissione, mitis sit, vigente paroxysmo augeri solet, & mutari in fortem, magnum ac celerem, æquali & constanti tenore, pro vigore spirituum influorum, pergentem; Quo proprius autem pulsus ad hoc exemplar accedit, *simplicis* eo magis simplex & pura est. 3. Ab urina, quæ post primum insultum, durante paroxysmo, rubedine multa perpetuo tingitur, & contentis copiosis saturatur, durante vero Remissione hypostasim laudabilem ut plurimum deponit. 4. à sudoribus periodicis, quibus sub finem cujuscunque paroxysmi Ager perfunditur.

Spuriam autem *simplicis* non adeo facile est ad vivum depingere, ut non adhuc ingenia doctissimorum & exercitissimorum Medicorum, in ea exploranda & dignoscenda, torqueantur; Nam, urgente symptomate, quodcumque illud fuerit, haud raro Criteria febris prius memorata plurimum desiderantur; siquidem à miti violentiori, spiritus in statum explosivum quadantenus adiguntur: unde symptomata in genere Nervosa suboriuntur, Dolores in musculis, tendinibus & membranis Rheumaticum, Pleuritidem, Colicam, ceterosque id genus morbos inflammatorios & spasmodicos simulantia & e partibus Glandulosis enormes subsequuntur humorum Excretiones, vomitio scilicet immodica, Cholera morbus, Diarrhoea, Dysenteria, unde Natura jam prorsus languens, in veneno adoriendo, intra cancellos solitos sese circumscribere nequit, indeque typus *simplicis* spurie multum obscuratur, neque facile et notis prius descriptis dignosci potest, siquidem, præ vehementia Doloris, Inflammationis, vel Evacuationis comitantis, spiritus, utut adhuc contendere persistant, multum ramentum obruuntur, atque Natura inde labefacta plurimum deficit, adeo ut donec symptoma allevetur, & spiritus sese iterum expandere incipiant, calor febrilis uno tenore pergens (extremis jam fere semper frigentibus) remissus & mitis sentiat, pulsus sit debilis ac celer, urina pallida, tenuis & copiosa (sicut in febribus malignis) Typo febris genuino ex periodicis Exacerbationibus & Remissionibus dignoscendo, planè exulante: Vel ubi symptomata (quod sæpe fit) alternatim exacerbantur & remittunt, paroxysmi periodici inde incerto & nonnunquam sæpius eodem die recurrere solent, scilicet Evacuatione, vel dolore aucto, Calor & pulsus minuuntur: His autem diminutis, illi augentur. Donec hæc symptomata re-

levantur, non, sine maxima difficultate, experto & exercitato Medico typum & genium febris hariolari licet; Quocirca, ut jam necesse est methodo quadantenus diveris, quæ scilicet symptomata vehementiora adjuncta, æque ac morbum ipsum respiciat, febris curationem feliciter absolvere; Ita non minus ex aliis fontibus, quam ex typo ipsius febris signa ejus vere Diagnostica petenda sunt; præsertim scilicet à symptomatibus vehementioribus, quæ, si ejusmodi fuerint, quæ robur spirituum, utut jam obrutorum, aut saltem forte conamen arguunt, & si cum magna violentia invadentia, febrem inflammatoriam, vel Colliquativam denuntiant, præsertim, si hæc symptomata obierint, ventur post periodos certas recurrere; atque, saltem durante Remissione, urina reddatur, qualis in *simplicis* genuina reddi solet, & pulsus etiam congruat; admodum verisimile est hanc esse febrem (qualiscunque sit ejus typus) esse de genere *simplicis*, atque ejus Curationem usu Corticis. eruunt rite ministrati, respectu scilicet ad symptomata urgentia habito, feliciter absolvendam. Ex. gr. Ubi febris (quomodocunque typus ejus natus à symptomatibus suppressus obicuretur) insolita & intensa Nausea, vel vomitione illepetur, adeo ut Ager vix quicquam Medicamenti vel alimenti retinere, vel suscipere queat, quin illico vomitione sursum id rejiciat; vel, ubi iuxta alvi immodicus aditus, ita ut omnia ingesta confectim deorsum ejiciantur; vel ubi, sicut in Cholera morbo leviori, sursum ac deorsum propellantur; vel ubi prægrandi aliquo & spasmodico capitis, Autuum, vel cujuscunque partis dolore, Colico, Pleuritico, Rheumatico, &c. Patiens torqueatur, & de symptomatibus vehementia duntaxat conquatur; Expansione spirituum, unde febris typus se alias palam ostendisset, jam præpedita; vel denique, ubi circa Nares, Labia, aut aliam quamvis partem Efflorescentia quasi Erysipelatosa (quæ serè semper febrem Intermittemtem genuinam comitatur) in cute appareat; præsertim verò, si hæc symptomata singulis vel alternis diebus, post certas periodos, revirescere & declinare observentur; atque, saltem durante declinatione, Urina & pulsus sese habeant, ut in febre *simplicis*; febrem hancce in classem *simplicis* quæ viribus Corticis rite ministrati fugari solent, jure merito ascribere licet. Atque sane, ab hisce Criteriis, rarissime, si unquam Memet deceptum memini, in genio hujusce febris dignoscendo, (quomodocunque typus ejus à typo simplicis & pure *simplicis* differat: Vires etiam Corticis æque efficaces hic etiam ut plurimum senti, ac in Continente simplici, vel ipsa intermittente, modo methodo ad variantia symptomata accommodata exhibitus fuerit; suam methodum, proprio loco, sub hujus libri finem explicabo.

De Febris Continentis Causâ Evidenti.

Restat jam, ut de Causa harum febrium pro cathartica sermonem habeamus, quæ cum sit ut plurimum Atmosphæra, Sententia nostra de causa harum febrium continente non parum stabilitur, quandoquidem spiritus multo facilius & clarius ab ambientis Aeris in puritatibus, & injuriis infici posse ac turbari, quam humo-

rum segnem molem, ab omnibus libenter conceditur.

Ambientem autem Aërem reapse hisce febris primū anſam dare ſolere, exinde conſtat, quia ubique ſerè Endemiæ ſunt in Aëre Paluſtri, Maritimo vel Arboribus plurimū obſito, quia heterogeneis particulis reſertus & minus perſtatur, mirum in modum, non rarò ſtagnat & putreſcit: Atque quovis ſere loco Epidemice ſunt, tempeſtate Autumnali, cum Sole recedente, Aëris Temperies admodum inæqualis redditur, mane ſcil. & Veſperi gelida, meridie autem intenſè ſervida. Unde incauti, & eodem modo ſemper veſtiti, poſtquam medio die æſtuarunt & ſudarunt, non poſſunt horis matutinis; præſertim vero veſpertinis, in poros cutis, præcedente calore apertos, frigus non ſuſcipere, unde ſpiritus derepente Algentes, & à naturali Temperie recedentes, ex improviſo conturbantur; Et calor in Maſſa ſanguinis ab hoc motu accenditur, ſaltem Ephemerus, & pro ratione cacoſchymie prius congeſtæ, plus minus ad repullulandum proclivis.

De Febris Continentis ſignis Prognſtica.

Ex hac Febris Remittentis Aetiologia Prognſtica ſequentia veriſſima deſumuntur.

1. Febris *mixta* ſimplex, qua talis, & quamdiu talis, raro admodum, ſi unquam, ſineſta eſt.
2. Simplex *mixta*, priuſquam exitialis evadat, typum ac genuum ſuum mutat, ac tranſit in *mixta* malignam.
3. Febris hæc benigna prope ſtatum morbi (veneno vel ſpontè, vel ex mala Praxi aucto, & ſpiritus obruente) in malignam facillimè tranſit; Unde Methodus curandi admodum diverſa requiritur, & eventus vel dubius vel ſineſtus prædicendus eſt.
4. Ex temeraria & incauta ſymptomatum *mixta* ſpuriam comitantium ſublevatione, ſive ex nimio Evacuantium & Opiatorum uſu, ſive Venæſectione perperam & prodigè miniſtrata, ſapiſſime contingit, quovis Morbi tempore, Naturam adeò peſſundari, & ſpiritus inde labefactari, uti hæc Febris, naturaliter benigna, momento quali, malignæ ſpeciem induat; Quod Febris Eryſipelatoſis à frequenti & nimia ſanguinis detractatione; & aliis cum doloribus ſpaſmodicis vel fluxu Alvi nimio ſociatis, à profuſa Laudani exhibitione contigiſſe ſapius memini. Quocirca, uti cautela maxima in horum uſu vitè requiritur, ita, admiſſo hoc errore, qui ex ſubita Pulſus mutatione apprimè dignoſci poteſt; Naturæ languenti incunſtanter & aſſiduè Alexipharacorum & Veſicatoriorum uſu ſuccurrendum eſt, ut vis ſpiritus expansiva ſuſcitata jam demum, iterum promoveatur: Prognſticon etiam de eventu morbi à priori diverſum faciendum eſt.
5. Quo plura malignitatis indicia cum hac Febre conjunguntur, eo periculoſior eſt, & eventus eius incertior: Quò autem pauciora, eo major ſpes aſſulget; præſertim, quia Venenatum Fermentum, Corticis vel alterius cujuſcunque Antidoti vires non ita promptè eludere poteſt.
6. Spirituum robur, ex Pulſu ante omnia certiſſimè explorandum eſt: Modus enim influxus ſpiritus, atque expansionis eorum gradus,

ac Venenati Fermenti vis major aut minor, hac viâ, maximè ſeſe produnt: Indeque Pulſus fortis uno tenore pergens, utut Deliria, Tremores, Tendinum ſublultus, cæteraque dira in genere Nervoso ſymptomata ſubitan ruinam minari videantur, ſemper bene præſagit: Si contra verò, Pulſus celer, debilis ac vacillans, Mortem præ foribus adſtante indubitanter prædicat, utut reliqua ſymptomata adblandiantur. Quamobrem Medicus, qui ad hanc Cynofuram ſua Prognſtica dirigit, rareſſimè à ſcopo aberrabit. & qualicunq; fuerit eventus, ſeſe ipſum & Artem Medicam honeſtabit.

7. *mixta* ſpuria ſive Mixta, utut in ſe minus ſineſta ut, ope tamen ſymptomatum adiutorum Aegrotantes haud raro e vivis tollit. Quocirca, primo omnium ea ſymptomata auferenda ſunt.
8. Quò plura, vehementia, & curatu difficiliora ſint hæc ſymptomata, eo magis ſineſta (ex accidenti licet) rite habenda eſt ipſa febris.
9. Febris primo inſtanti *mixta* & maligna, ſi ſalutaris Crifis contingat, illico in *mixta* tranſit, & bonum Prognſticon ſuggerit: Et quo Paroxyſmorum & Remiſſionum alternatio conſpectior fuerit, & periodi certæ obſervantior, eo melius.
10. *mixta* nonnunquam, poſt ſtatum Morbi, in Intermittentem tranſire ſolet. Febris autem huiusmodi Intermitteſ, uti præ cæteris curatu difficilior, ita ad recidivationem præ cæteris, proclivis eſt.
11. Judicatio Febris *mixta*, utut mitis ac benigna, viribus Naturæ ſolummodo facta, admodum longa ac incerta eſt; Quippe, Veneno circa Morbi ſtatum aucto, Natura ſapiſſime ſuccumbit; Unde Febris facillimè in malignam tranſit: Cortex autem certius, atque citius, ſine dierum Criticorum expectatione, victoriam reportare ſolet.
12. Quò Exacerbationes & Remiſſiones diei horæ magis certa redeant, & quo Remiſſiones magis ſunt protenſæ, eo melius: è contra incerti Paroxyſmi ſapius in die recurrentes, atque Remiſſiones obſcuriores Prognſticon pejus, vel ſaltem magis dubium miniſtrant: Namque vel malignum quid deliteſcit, vel Natura vehementiori aliquo ſymptomate opprimitur.
13. *mixta* ſimplex viribus Corticis æque certò cedit, ac ipſa Intermitteſ; quippe gradus Veneni in utraque ſere idem eſt.
14. Efficacia Corticis febrifuga in *mixta* ſpuria debellanda eſt propemodum æque certa ac in ſimplici (modo rite miniſtretur, reſpectu ad ſymptomata vehementia habito) non autem adeo cita eſt; Quia, uti Venenum febrile in hac intenſus eſt quam in priori, ita paritè modo, nonnili exhibitione ejuſdem Antidoti in quantitate longè majori, ſubigi poteſt. Indeque, utut ſimplex *mixta* uncia Corticis genuini & vegeti una, æque certò ſubigitur ac ipſa Intermitteſ; Rheumatica tamen, Eryſipelatoſa, Dyſenterica, vel quæcunque alia inflammatoria, aut colliquativa, à Veneno intenſiori orta, haud raro quantitatem duplò majorem irritam reddit.
15. *mixta* ſimplex vel ſpuria, ſolus Naturæ ope ſanata rareſſimè recidivam habet; Cortice autem, vel alia quavis Antidoto ſubacta, non rarius quam ipſa Intermitteſ recrudescit (ſemper autem ſpeciem Intermitteſ ſimulat) ſi repetito

eiusdem speciei usu non preveniatur. Verum, hoc non obstat, hic modus curandi propter certitudinem & celeritatem, cuicunque alteri, jure merito, longè preferendus est. 16. Curatio *mixta*, quæ Cortice, vel aliâ (siqua sit) Antidoto perficitur, sicuti, quocunque Morbi tempore, Principio scilicet Augmento, statu, vel declinatione, sine longa dierum Criticorum expectatione ad unibilicum ducitur; Ita Vencatoria & multa alia excruciantia, minusque grata remedia supervenire reddit, necnon Egrotantem, brevissimo tempore, ad pristinum statum, vel forsitan magis Athleticum certissime restituit; Quo nomine omnibus aliis Methodis curandi, jure merito, antecedit. 17. *mixta* Cortice curata raro admodum cum evidenti aliqua Crisi terminatur: siqua vero Crisi per salivationem, & inde succrescentes Aphthas albas contigerit, Veneno evicto, sponte ac citò solet terminari. 18. Evacuationes in *mixta* a Natura institutz, scilicet Hæmorrhagia, Vomitus, & Fluxus Alvi, fere semper sunt iustæ, atque ut plurimum symptomaticæ, quippe à nimia irritatione ortæ. Evacuatio Critica & salutifera fit solummodo per sudores, vel salivationem Aphthas albas comitantem. Prior quidem est magis cita & acuta, paucarum enim horarum spatio finitur, arguitque præsentem spirituum expansionem vegetiorem; Altera verò est æque certa, licet tarda & molesta à robore spirituum minus vegeto orta. 19. *mixta* simplex (Ubi Curatio vi expansivæ spirituum solummodo perficitur) sæpènumquæ longa est, & Crisi ejus nonnunquam tarda, cum molesta salivatione, Aphthas, & singultu pertinaci conjuncta: Quæ symptomata durant, donec à Venenati Fermenti subactione Massa in statum integrum restituitur; saliva inde & sanguine reclusis, sponte ac citò cessant: spuria vero, ob Naturæ impenas, & symptomata vehementiora, magis acuta est, imò, pro ratione symptomatum, præsertim si sint de genere spasmodico vel lachrymatorio, & imitentur Pleuritidem, Peripneumoniam, Colicam, Choleeram Morbum, &c. peracuta; sin Diarrhæam, Vomitionem, &c. simulant, non adeo acuta. 20. Crisi Febris *mixta*, ubi Materia colliquativa per plures portas eliminatur, (utrum id simul, vel successive fiat) tardiùs procedit, quàm ubi unica via extruditur, & copia materiæ peccantis hinc arguitur, virumque defectus; unde spiritus massam non adeo constanti tenore, eodemque modo regere & disponere valent. 21. Febris *mixta*, ubi solis Naturæ viribus curatio perficitur, post statum morbi mutata in *mixta*, ut plurimum, sub secundi Paroxysmi finem. Criticis Sudoribus perfectè terminatur; Indeque dies iste Indicatorius habetur, in quo prima Remissio contingit, & Criticus, in quo secunda. 22. Febris, *mixta* speciem referens in primo morbi limine, scilicet ad triduum vel quatrimum, priusquam venenum valde auctum sit, facillimè ab Enemate injecto, & Venæsectione moderatâ inde celebratâ, atque Bolo Alexipharmaco & Theriacali demum exhibito in *mixta* mutari potest; unde occasio Corticem exhibendi datur, eoque Curationem perficiendi & accelerandi.

23. Durante Morbi Augmento, præsertim prope statum, pessimum lignum est, si Urina rubra & contentorum copia saturata, sensim in tenuem & pallidam mutetur; si Pulsus magis celer, debilis ac vacillans evadat, multo magis si subsultus Tendipum, loquacitas, insomnia terribilia, & Phantasmatum insularum accedant, quippe jam Coma, Vigilia, Deliria, cæteraque pessima Febris in Malignam transeuntis symptomata, jure merito, expectanda sunt, quibus Cortex impar est. Atque hoc Antiqui Prædici, Humorum latroni percepserunt, dum materiam in cerebrum transterri anerebant: E contra, Pulsus fortis & constans, Urina rubedine multum tincta & contentis saturata, multo magis quæ hypostasim lachryabilem deponit ubi Morbus ad statum pervenerit, uti Febrim genium suum primarium Benignum servaturam cum Paroxysmorum & Remissionum alternatione, gunt aut, ita eventum faustum ac prosperum brevi expectandum prænuntiant, utut reliqua symptomata contrarium prælagire videantur. 24. Omnis Febris Epidemica, Autumnalis, & Catarrhica, quando primum invadit, est ut plurimum *mixta* simplex scilicet vel spuria: utut, quovis morbi tempore, ex malo regimine, vel prope statum, suapte sponte ad d. generandum in Malignam mutum in modum apta sit.

De Febris Continentis Indicationibus Curativis.

Quo pacto hæc Febris sive simplex, sive spuria, tollenda sit, & quæ sint Indicationes Curativæ in hoc Morbo, restat inquirendum. In genere unice indicatur Delectio Fermenti Venenati, quod Naturam ad certum irritat atque provocat: Hoc eam sublatò, lucta febrilis sponte cessat; Spiritus enim non amplius lacerati tonum naturalem illicò recuperant, atque massa Humorum sponte quiescit, indeque nulla paroxysmorum revirescentia expectanda est.

Ubi verò spiritus veneno graviore irritati, à nisu suo immodico in explosionem adiguntur; aut humores inde colliquati & Glandulis immodice excernuntur, plures, eoque, pro ratione symptomatum, admodum diversæ Indicationes subministrantur, quas Medicum apprime respicere oportet; Quippe ab his symptomatis, haud raro, vita Egri in præsens discrimen adducitur, plus quàm à Veneno primario. Quo pacto hoc fieri debeat mox in Methodo curationis explicabimus.

Deletur Venenatum Fermentum, vel à naturali spirituum expansione sapienter repetitâ, donec ad extremam activitatis suæ Sphæram sensim perveniant; Vel Cortice Peruviano, aut altera (siqua sit) Antidoto incunctanter exhibita, quæ, cum spiritus adhuc vivaces sint, quocunque Morbi tempore illicò Venenum subigere valet. Prior Methodus magis incerta est: Atque, Febre jam in Inflammatoriam vel colliquativam mutata, Eger incendio intestino, vel evacuatione in modica confectus haud raro perit: Jam à spirituum nimia depressione Febris, nullo non tempore, præsertim prope Crisim, in Malignam & funestam facil-

facillimè transit; Medicus interea Naturæ tantum ancillatur, regimen universum ritè imperando, atque spiritus, ubi depressiores tebrem in malignam transtuturam indicant, Vesicatoriis, Alexipharmacis, ceterisque id genus stimulantibus excitando; Aut Venæsectione, Emetics, Catharticis Benignis, Emulsionibus, Apozematis, Julapiis contemperantibus, fervorem ac Orgasimum eorundem minuendo, quoties altum, ac Diathesin inflammatoriam moli humorum impertiant, unde dolores Spasmodici, & Rheumatici, & reliqua id genus dira symptomata non raro producantur: Vel denique Opiatis spirituum motum compescendo, quoties Vomitus enormis, Diarrhœa, aut alia quavis excretio colliquativa inordinata ac symptomatica id requirat. Medicum hac Methodo utentem oportet esse cautum admodum, atque sagacem; nihilque temere aut officiosè moliri, neque viam temper viam in febris sanandis pertinaciter calcare; verum, pro ratione symptomatum varia, atque præsentis Febris genio, in unum vel alterum extremum tendentis, Methodum suam sapius atque incunctanter, quoties opus fuerit, cum ratione mutare. Omnibus verò hisce Canonibus diligentissimè observatis, Eheu! quot a symptomatis ex improvviso subortis, vel ægrotantis idcirco ante non percepta, hac methodo, Arte Medicinali ad Orcum demittuntur, quamquam fidei exercitissimorum Medicorum commissi, qui sapissimè Scyllam evitantes in Charybdim incidunt? Tanta est Ingeniorum acutissimorum hebetudo, atque in morbis indagandis vel tollendis vacillatio, tamque fallax & lubrica est rationalis febris curandi Methodus! Utut verò hæc se habeant; in eorum gratiam, qui à modo febres curandi compendiaro, ex præconcepta opinione, abhorrent, lubet primum, pro virili, juxta nostram hypothesein, Methodum Curationis rationalem certam ac perspectam, multo usu mihi comprobata delineare: Siquidem, licet hac ratione non cum æquali certitudine optatum eventum consequatur Medicus, nunquam tamen, in toto morbi curriculo, Empirici partes sustinere cogitur, vel dubitanter Artem suam exercere; Ratio enim docet quid agendum sit, utut scopum assequi sapius non detur, atque meherculè animus noster haud parum oblectamenti capiat (qualiscunque fuerit eventus) quoties consensum nos ritè, atque ad normam rationis, unoquoque morbi tempore, quod nostrum est, præstitisse, *οὐδὲ τινὲς αὐτὸν παρεῖν.*

*De Methodo curandi Febrem Continentem
rationali.*

Ut Methodus hæc rationalis Febrem curandi clariùs innotescat, necessum duco, de variis hujus morbi stadiis, cum Naturæ soli committitur, atque Phænomena inde succrescentium diversâ indole aliquid præfari. Quamdiu spiritus veneno contaminati & depressi vigorem naturalem recuperare nisu quodam moliuntur, Augmentum morbi durat, atque inrerea omnia symptomata febrilia, Dolor scil. Lassitudo Ulcerosa. Ægrotudo, Jactatio, Vigilia, Calor intensus, Sitis, Celeritas & Forti-

tudo Pulsus, Tinctura & Contenta Urinæ, Ariditas oris, &c. juxta Naturæ leges, indices augentur; Paroxyismi magis protenti; Remissiones autem minus sensibiles observantur. Atque equidem hoc symptomatum incrementum ritè expectandum & optandum est. Natura hoc Stadium non uno eodemque temporis spatio pergit, verum quo minus venenum est, & spiritus vegetiores, eo citius percurrit, ante quintum scil. septimum vel nonum diem: quo gravius autem, & a veneno magis Deleterio pelluntur spiritus, eo diutius hoc morbi Stadium. (modo eventus salubris futurus sit) protrahitur, nimirum ad 11. vel 14. diem. Quamprimum spiritus ad activitatis suæ perveniunt, ultra quam sese amplius expandere haud valent, illico ut status morbi, in quo uique ad Crisin instantem, Paroxyismi & Remissiones uno eodemque tenore sere ad amulum procedunt; Urina, Rutilus, & Lingua plane eodem modo se habent: eadem symptomata, idem symptomatum gradus fixus manet, præter latitudinem Ulcerosam, Cephalalgiam, ceteroque dolores, sive fixos, sive versatiles, qui lege Naturæ jam sensim declinare incipiunt, qualicunque futurus sit eventus, Nisi enim spirituum sese expandere molientium jam sponte hinc, Fibrilla Membrarum, Musculorum, & Tendinum non diutius lacerantur, convelluntur aut distenduntur. Hoc etiam Stadium (neut de priori dictum est) spatio temporis determinato, quasi cancellis circumscribere haud tas est, siquidem, pro ratione spirituum plus minus vigentium, atque Veneni primarii magis minusve Deleterii, citius vel serius initur; Cum enim spiritus ad extremam expansionis, ut spheram exaltati, veneno longe superiores evadant, Status morbi adeò brevis & imperceptibilis redditur, ut, hypostasi laudabili prænumcia sese in Urinâ prodente, spiritus illico summe efferati, & hostem adorientes, Jactationem inquietam, varios dolores extemplo revirescentes, oculorum scintillationem, Pruritum narum, tumorem Hypochondriorum summam producant, & perfecta Crisi venenum eliminant. Lucta, victoria jam parta, cessante, Calor sponte nitescit, & Lympha in præcedenti agone Colliquata, ubique per poros cutis excernitur, & ductibus salivalibus a præternaturali contractione liberatis, Os scaturit saliva, sitis extinguitur, & spiritibus haud amplius laceratis, somnus placidus Ægrum invadit, Jactatio, Delirium (& siqua sint alia symptomata graviora) penitus remittunt, & febris finitur die septimo, nono, vel ad summum undecimo; Jamque declinationem sensibilem frustra expectamus, cum uno ita Critico, & perfecto, bellum decernitur. Parili modo, ubi spiritus, in statu morbi, ad ultimum expansos Venenum sponte, vel ex mala Praxi, aut quocunque alio accidente longè superet; Status morbi quamcitissime, funeste terminatur, cum Pulsu scil. admodum debili & celeri, Urina pallida & tenui, Lingua nigra & arida, subito Virium lapsu, subsultu Tendinum, Comate, Vigiliis, Deliriis, ceterisque id genus Vacillantibus & Encatorum spirituum indicis sociatus, Febre jam perpetim in malignam transeunte, idque non raro ante diem Morbi decimum, vel 12.

At, ubi parile est virium & Veneni Robor (quod ut plurimum fit) & æquali propè Marte dimicatur, in æquilibrio res diu pendet; atque proinde Status Morbi diutius protrahitur ad 17. 25. diem & ultra, de victoria intereaque ambigitur: Quo ipacio, Febris media esse inter *Inter & inter* videtur. Quin etiam ipsa Crisis, quæ hoc Morbi Stadium à tergo sequitur, sit æque tarda ac intida, non raro per dies 6. 8. 10. 11. protracta, quippe Natura non unâ dimicatione, verum Prælio sæpius inhaerato, semum & cum difficultate, victoriam jam reportat; Necnon Crisis, hoc modo feliciter cepta, sæpius ex improvviso interruptitur, ac funeliè terminatur. Lympha insuper colligata, non per unam portam confertim protruditur, verum, pro diverso veneni febris genio nunc hanc, nunc illam; nunc per Inspirationem insensibilem; nunc per Sudores paucos & periodicos; jam per Hæmorrhagiam sæpius recurrentem, jam per Fluxum Alvi lentum & periodicum e Membrana Intestinalium Glandulosa deturbatur; præsertim vero, ubi venenum sit de genere Mercurialium, Lympha, in tardâ hujusmodi Crisi, sæpius Glandulas salivales atque totam Membranam Os, œsophagum & ventriculum invadentem petit: Unde nova, eaque satis molesta symptomata hoc Morbi Stadium, ab initio usque ad finem constantur: scil. Salivatio, eaque interdum adeo copiosa atque diutina, ut rivulus acris & venenatæ Lymphæ ad tres hebdomadas continuo scaturiat; Et Aphthæ Albæ, sive ulcicula totam Membranam oris, Linguae, œsophagi, & nonnunquam ventriculi Glandulosam occupantia, ab acrimonia Lymphæ ex his partibus excreta orta, quæ continuo succrescunt & revirescunt, donec veneno, Crisi perfectâ, penitus subacto, tota Massa deferbuere: Denique singultus horridus, isque ferè perpetuus, atque cum præfocativâ strangulatione conjunctus, quamdiu scil. in Ventriculum Lymphæ hæc Venenata excreta, hanc partem inflammant atque exulceret.

Ubi salubris & fida futura est Crisis hujusmodi tarda, Febris ad Stadium suum ultimum, Declinationem scil. sensim pervenit, atque inde Remissiones redduntur longiores ac magis conspicuæ, Paroxysmi verò indies breviores & minus atroces: donec Ager tandem prorsus *Inter* evadat, vel saltem Febris Typum suum mutet, ac speciem verè Intermittentis referat. Tunc omnia sunt in vado, Pulsus magis constans ac vegetus fit, Urina rubedine satis tingitur, ac hypostasim vel saltem Enzorema præcipitat: Aphthæ magis albæ, ac deciduæ, neque amplius ad revirescendum aptæ sunt, Vigilæ, Deliria, sitis unâ cum reliquis id genus symptomatis indies decrescunt.

Ubi verò e contrâ, Febris jam fiat ferè continua, Urina sensim à rubrâ & turbatâ mutata, primum hypostasim levem, vel Eneorema ostendat, dein verò in claram & pellucidam transeat, Pulsus magis celer, debilis ac vacillans fiat, Aphthæ nigrescere incipiant & nimis inflammari, atque, deciduæ licet, iterum repullulare; Lingua fiat tremula, arida vel scabrosa; salivatio derepente sistatur, accedentibus subfultu Tendinibus, Comatu, Delirio, & ceteris id ge-

nus Febris malignæ symptomatis: Procul omni dubio, venenum in ultimo agone, de spiritibus victoriam reportavit, atque, utut Natura languens Crisin molatur, nullam tamen allequitur nisi inidam & imperfectam, quam Mors, brevi, exceptura est, si, assiduo Alexipharmacorum Velicatoriorum cæterorumque malignitatis Remediorum ulu, id non possit evitari.

Idea hujusce Febris, ex rei ipsius Naturâ, hoc modo ite formata, facile admodum quivis in Medicina mediocriter versatus, veram atque genuinam eam curandi Methodum, ratiocinando assequi potest, & cæterorum Præcutorum errores convellere.

Antequam igitur ulterius progrediamur, errores illorum, in Praxi admodum perniciosos levi Censura perstringere lubet, qui Humorum ac qualitatum evidentium doctrina: eadem dantes, in Provinciam ipsius Naturæ verè laticam sese audacter immittentes, atque propriæ *Inter* nescio quas Methodos hæc Febres, sine Antidoto aliqua, curandi, easque, pro ingeniorum suorum luxuriantium modulo, multiplices perperam excogitarunt, ad Phænomena ac Symptomata non vulgaria in humoribus orta duntaxat accommodatas, nec tam Naturæ Morborum medicatrici suppetias adterre, quàm ipsius vices agere gloriôsè venditant: Siquidem hi *Galen* Sectatores Calidum & hecun; frigido & humido regimine, lege contrariorum, rite subigendum ducunt, nescientes mercurule *Inter*, seu Venenatum illud fermentum lenius nosros longè superans, quod *Hippocrates* alterit Morbis inesse, & Calorem illum hecun & febrilem, à luctâ spirituum adversus venenum febrile ortum suum ducere; Quem, nni forte justos cancellos transgrediatur, & totius Machinæ ruinam & incendium minetur, Venæsectione profusâ, Opiatis, Catharticis, vel Emulsionibus, Julapiis & Apozematibus refrigerantibus officiosè minuere, durante Augmento, præsertim verò Morbi Statu, vel Crisi haud impune licet, ne Febris inde, à nimâ spirituum dissipatione in malignam & funestam degeneret. Illi verò, nescio cui Hypotheli innixi, igne ignem extinguere moluntur, dum paginam utramque in Curatione Februm (cujuscunque fuerint generis) non exceptis Inflammatoriis, Cardiacis, Alexipharmacis, atque Velicatoriis indiscriminatim adhibitis complent, ac si oleo flamma esset suppressenda; Unde Agri incendio Intestino, atque Symptomatis inde succrescentibus, haud raro confecti, miserrimè pereunt, qui forsan, debito regimine imperato, abique hæc officiosâ sedulitate prorsus evasisent. Alii, cæteroquin eruditi, quippe Spagiricâ Doctrinâ imbuti, atque Chymicæ nimium dediti, nil præter Salem fixum, Acidum, Volatilem, Alcali, Sulphur, cæteraque id genus Chymica crepant, atque ex diversis horum mixturis & effervescentiis in Sanguine factis, Universam Februm rationem explicant, atque inde Curationem instituunt, Cum equidem prædicta salia, &c. Formaliter Sanguinis massæ inesse, atque inibi varias hujusmodi effervescentias excitare, quales exterius Arte sunt, gratis admodum asserant; & licet forsan aliquid analogum, in sanguine etiam sano-

Sanorum semper reperiatur; Verum, ubi hæc Principia iustum modum excedant, indeque morboſo condimento maſſam imbuunt, Spiritus Venenati omnino in cauſa ſunt. Unde *Sisyphi* Saxum volvere mihi videntur, quotquot hæc Principiis innixi, poſthabito Veneno in ſpiritibus deliteſcente, Humores alterare ſolummodo moliantur, atque methodum febrifugam inde conſtare. Sæpiſſimè etiam Pharmacopœi, Chirurghi aliique nonnulli indocti, qui in mellem alienam ſalcem audacter intrudentes, atque Artem Medicinalem modo Empirico exercentes, quique Febres quaſcunque ſine delectu, eodem planè modo, curare ſatagunt, non raro in primo Curationis limine, ſive negligentia, ſive officioſa ſedulitate, Febres hæc reâple Benignas, Pharmacis Emeticis, Catharticis, Venæſectionibus, præſertim autem Opiatis (quæ, ad ſubitanæam ſymptomatum moleſtiorum releuationem, & opinione vulgi inde captandam profuſe perperam exhibent) depreſſis ſpiritibus, in Malignas citiſſimè immutant. (Quod ex ſubiuto Tendi-
num, cæteriſque id genus indi-
ciis immediatè conſequentibus liquidiffimè conſtat.) Aut, ex æque intempeſtivo ac exuberanti Cardiacorum, Alexipharmacorum, Velicatoriorumque uſu, ſpiritus nimium incitant, & hæc Febres in inflammatorias aut colliquativas adigunt. Neque mehercule! Medicus Exercitatus, ſerius advocatus (ut ſolet) hos Empiricorum errores facile corrigere poteſt, quorum poenas Æger vitæ ſuæ, Medicus verò famæ diſpendio tandem luere ſolet. Ut enim, pro ratione ſpirituum iusto plus minus expansorum, in Curatione Febres anxioſas, præſertim ſpurias, locum nonnunquam habeant Emetica, Cathartica, Venæſectiones eaq; repetitæ, Opiata, Emulſiones, Apoſtemata, & Julapia attemperantia, vel equidem Alexipharmaca, ſalia Volatilia & Velicatoria, non tamen, niſi ratione ſymptomatum vehementiorum, unde ſpiritus multum & diu laceſſuntur, in Naturæ Medicantis auxilium ea miniſtrari oportet: Raro enim aliquid huiusmodi officioſe committitur & impunè. Methodum autem certam febrifugam & conſtantem, his principiis inuicentem inſtituere, ſive hæc, ſive illam, planè delirare eſt; Siquidem methodus febrifuga rationalis univerſa duobus articulis comprehenditur; ſcil. Ut imperetur regimen iuſtum, & ut Natura varis Methodis reſocilletur, prout opus fuerit; Natura nimirum Medici partes hic ſuſtinet, Medicus ipſe duntaxat ancillatur.

Quod ad Regimen ſpectat, Oportet Ægro-
tanten ſtragulis moderatis coopertum, in loco tenebricoſo, in lecto ſeſe continere, inibi-
que, ſine Amicorum Colloquiis, vel Interpel-
lationibus, ſomnum, quantum poteſt, captare; Siquidem ab erecto corporis ſitu, multo magis à motu & exercitiis, à ſtragulis multis ad Sudores eliciendos perperam impoſitis, ab Aère luculento, & adſtantium conſabulationibus, ſpiritus ultro ſeſe expandere molientes, cum Ægro-
tantis damno evidenti, & laceſſentis alicuius ſymptomatis ſuperinductione, plus debito irritati faciliſſimè excaſceſcunt.

Viſtus, licet ad ſpiritus reſocillandos, ſæpius miniſtrari oporteat; inſuper quoque tamen

Paſtu ſit parcus admodum, iſque tenuiſſimus, maxime præſente exacerbatione, atque durante febris augumento; Veluti Avenacea, Panatella, Hordeacea, Liqueor Poſſeticus ſalvia alteratus, Cerevilia tenuis pane tolto calefacta, Ala maciata, Piſana, &c. Ne fermentum ventriculi Veneno prius peſſundatum, ab Alimenti copia, & ſarcina Chyli crudi ac indigeſti jam prius obruatur, atque Æger Naulæa & Vomitione inde provenientibus, ſimul ac Veneno Febrili conſtictetur. In ſtatu Morbi, præſertim prope Criſin, plurimum conſectis Viſtus manu liberaliori, atque quadantenus lautior, uti Juſculum Pulli, Vinum Lymphatum, vel ipſum Merum concedi poteſt, ne, in ultimo agone, ſpiritus prius contracti & diſſipati, præ languore, prorsus ſuccumbant. Atque equidem Regimine, à primo morbi inſultu, hoc modo imperato, quamplurimas Febres Benigniores ab ipſa Natura curatas, pluries novi hæc Remedio quocunque Officinali; multo magis abſque apparatu Medicaminum poſpoſito, quod cæteros etiam Exercitatos Medicos vix puto latere; E contra verò ab officioſa, repetita & profuſa Venæſectione, à Julapiis, Apoſtematis, & Emulſionibus refrigerantibus, præſertim verò ab Emeticis, Catharticis & Opiatis perperam exhibitis, Febres hæc minores jugiter in Malignas degeneraſſe, & à Cardiacis, Alexipharmacis & Velicatoriis officioſe miniſtratis, eas in Inflammatorias perpetim mutatas ſæpius apprehendi.

Quandoquidem autem a mole Fæcum in In-
teſtinis congeſta, Calor præternaturalis fruſtrà augetur, exploſio ſtatum præpeditur, & Æ-
gro-
tans inde moleſta tentatione afficitur, in hoc ſtatu, Alvus adſtricta, ſingulis vel alternis diebus lubricetur Enemate à Lacte Saccharato, Floribus Chamæmeli alterato.

Vel ꝯ. Decoct. Emollient. ꝯx. Sacchar. rubr. Mell. Mercurial. ana ꝯij. M. F. Enema. Ubi Alvus admodum difficile ſeſe reddit; inſuper addi poteſt Electuar. Lenitiv. Dracath. vel Caſſiæ ꝯß. & ad Fæcum induratarum lubricationem, Ol. Oliv. Violæ. Amygd. d. ꝯi. ſi opus fuerit. In alvo laxiori, Ubi iuxta nimis ab Enemate inſecutus ritè metuatur, ſufficit Glans ex Spec. Hier. Pier. ꝯß. Alumin. Mell. ana p. zq. in debitam conſiſtentiam concoctis, conſectus, qui oleo prius illitus, hora opportuna, durante ſcil. Remiſſione, intrudatur. Imò, ubi, ob conſtipationem Alvi inſolitam, Fæces neque Glante intruſo, nec Enemate educi queant, Decoctum Amarum cum Dup. Sen. extra tempus Paroxyſmi propinare licet.

Quoties vero Fluxus Alvi, præſertim tormi-
noſus ſupervenerit, qui non raro à primo Mor-
bi inſultu invadit ſymptomaticè, & cum ma-
ximo Ægro-
tantis damno (ſpiritibus enim inde multum diſſipatis, & à juſta expaſſione præpeditis, Febris facile in Malignam degenerat) neceſſaria eſt abſtinentia omnimoda à Cerevilia, Alla cruda vel cocta, imò liqueor Poſſetico, vel alio quocunque Floribus Cereviliæ fermentato, qui colliquativam hæc Diarrhoeam, præ omnibus aliis, vi peculiari promovere ſolent; Illorum verò loco, ad ſitum moderandam, propinetur Tinctura Roſarum Saccharo albiſſ. grātè edulcorat. Vinum Claretum multa aqua dilu-

dilutum, præ reliquis autem Decoctum Album, copiose, & ad libitum, calidiusculè verò hauriendum, quod non tantum ad humorum ferorem compescendum, & sitim minuendam grātè conducit, at insuper ex præpotenti Alcali C.C.C. quo saturatur, acorem lymphæ stimulantem plurimum obtundit. In eundem usum Testacea omnia, & Alcalizata hic locum sibi vendicant, quæ (modò largâ dosi & sæpius repetita exhibeantur) Acrimoniam tundendo, opiatæ partes felicissimè sustinent; Atque Tormenta hmulæ alvi fluxum, sine ullo Ægrotantis damno, sistunt. Quo Arcano palam facto clariss. noster collega D.D. Harris, pro Candore suo, in libro nuper edito de morbis infantum acutis facultatem nostram adauxit. Quo nomine gratias illi jam lubens refero. Ex gr.

℞ Ocul. Cancr. præparat. pulv. è Chel. cancror. simp. comp. coral. rub. præparat. ana ℥j. Margarit. præparat. ℥ij. M. pro Chartulis quatuor quarum unam capiat sexta quaque hora, una cum Cochlear. . vel 6. Julap. sequent. de quo etiam bibat ad libitum.

℞ Aqu. Lact. Alexiter. ℥viii. Aqu. Cinnam. Hordeat. Epidem. ana ℥ij. Syrup. Caryoph. ℥jss. M. F. Julap. Sin hoc modo fluxus alvi non sistatur, ad ipsa Opiata confugiendum est, quæ tamen parca manu, & repetitis vicibus ministrari debent, atque cum Alexipharmacis & *Alkalifatis*, quæ simul spirituum expansionem sustinent ac promovent, commixta; Nè, spiritibus inde obrutis, febris jugiter in M. lignam transeat. Ex. gr.

℞ Theriac. Androm. pulv. è Chel. cancror. comp. ana ℥ss. Coral. rub. præparat. gr. ij. Syrup. Caryoph. q. s. M. F. Bolus, illico sumendus, & sext. quaque hora (si opus fuerit) repetendus, superhibendo post singulos Bolos Coch. 4. vel 5. Julap. sequentis, de quo etiam ad spiritus refocillandos Æger bibat. ad libitum.

℞ Aqu. Meliss. Ceras. nigr. ana ℥iv. Aqu. cinnam. Hord. Epidem. ana ℥ij. Syrup. Caryoph. ℥x. M. F. Julap. Nec non (modò fluxus præsertim verò Tormenta adhuc urgeant) nocturno bolo addantur laudan. liq. Hem. gut. 12. vel laudan. Lond. gr. j. insuper Euema sequens ad Excretricem intestinorum facultatem sopiendam, & tonum eorundem confirmandum, semel in die injiciatur.

℞ Lactis Chalybeat. Flor. Ros. rub. saturat. ℥vj. Diacord. vel Theriac. Androm. ℥ss. M. & Cola pro usu.

Cum à crapula, vel alimento aliquo *humilis* febris ortum suum duxerit, unde ventriculus sarcina Chyli crudi, & inani vomitione jugiter lacebitur, curatio à leni vomitorio ritè auspicanda est v. g. Liquore Possético, foliis Card. Benedict. alterato copiosè ingesto, addendo inter vomendum (modò opus fuerit) bis, terve ℥ss. Salis Vitrioli, vel Oxy-mel. Scyllitic. Cochlear. unum vel alterum solut. in Haustu-liquoris. Religiosè autem ab Emeticis. Antimonialibus cæterisque ejusmodi violentioribus abstinendum est, ne in hac Crasi humorum venenata evacuatio nimia inde excite- tur, unde, spiritibus, immultum dissipatis & oppressis, febris in Malignæ speciem faciliè degenerare potest. Ubi verò Venenum febrile sit de genere Emeticorum, sponte petit ventricu-

lum, atque copiosè humores colliquatos inibi excernat, unæ aded enormes & continuatæ vomitiones Biliose & diversicolores excitantur, ut Ægrotans vix quicquam vel medicamenti vel alimenti retinere valeat; Hanc evacuationem, quippe symptomaticam, vel minimo quidem emetico promovere haud fas est. Verum potius Aqua pulli, loco cerevintæ copiose propinanda, venenatam & lacerantem humorum acrimoniam demulceri convenit, atque Remediis appropriatis, quæ etiam quadantenusiebrifuga sint, tonum ventriculi, jam nimium laxatum firmari. Ex. gr.

℞ Succ. Limon. ℥vj. Salis Absinth. ℥ss. M. Sumat. Coch. ij. singulis horis. Delicatis, Coch. 5. vel 6. Julap. sequentis singulis vel alternis horis propinentur.

℞ Aqu. Menth. Cinnam. Hord. ana ℥iij. Aqu. Stephan. ℥j. Sal. Absinth. ℥ij. Syrup. Limon. ℥jss. M. F. Ii. ad compescendum hunc ventriculi spasmodicum motum, ut saltem aliquam partem Remediorum & Alimentorum retinere valeat, laud. liquid. gutt. 12. (modò Æger Laud. num cum *loquax* toleret atque eidem jam allieverit) in Haustulo Julapii convenientis, sexta quaque hora conced. ntur, & Regio ventriculi Sacculis Aromaticis in Vino Claretto & Aqua terrata coctis, & calide expressis, his in die foveatur.

Sin dolor Capitis, Lumborum vel Artuum præcandis, à primo morbi insultu, vel durante ejus augmento, Ægrotantem p. us solito affligat, & simul ausint lactatio corporis, & Vigiliæ pertinaces, & à nimio spirituum in seipis expandendis nisu, febris genium inflammatorium ac Rheumaticum quadantenus fortiri videatur; apprimè convenit (modò cætera idferant) in ipso exacerbationis articulo, post rejectionem Enematis (si hoc indicetur) venam tundi, atque sanguinem ad ℥viij. 10. 12. pro gradu doloris, reliquorumque symptomatum exigentia, & præsentis Plethorico, vel Athletico Ægrotantis statu, è vena Jugulari, vel Brachii lateris maximè effecti detrahi, ut hæc symptomata vehementia diminuantur Quinetiam, durante morbi augmento, Venæsectionem, in subsequenribus Paroxysmis, iterum, iterumque celebrandam esse nonnunquam eadem ratio suadet; Cautè tamen admodum, atque, non sine urgenti necessitate, operatio hæc primum instituenda, multò minùs iterum repetenda est; unde scil. non febris curatio, vel Symptomatum sublatio, sed eorum tantum sublevatio expectetur: Nullatenus verò in statu, aut prope morbi Crisin, nisi, ob Symptomatum excessum, Vitalis indicatio id necessarium fecerit, Siquidem à detractione sanguinis officiosa, vel debito sæpius celebrata, præsertim prope Morbi Crisin, haud raro vis spirituum Elastica adeò præpeditur, ut, febre inde in Malignam transeunte, spiritus in posterum plane succumbant, neque amplius debito modo se expandere valeant, & Ægrotans vigiliis, Deliriis, tendinum subsultibus, &c. inde consequentibus confectus, cum magno Artis nostræ opprobrio, potius occidi, quàm sponte mori videatur. Eheu! quam sæpe Medici temeritatis pœnas luit misellus Æger? Quam circumspectè autem, & quanta cum animi applicatione oportet

ter medicum sagacem, pulsu prius diligentissime explorato, ceterisque Ægrotantis circumstantiis serio pensatis, hanc sui muneris partem obire, cum Ægri vita vel mors sexennimero à cuspide lanceolæ pendeat. Officiose, temere atque evidenti necessitate venam jam tundere, ac prodigium purpurei liquoris iacturam fere, quid aliud est nisi in Corio humano ludere, atque lanionis partes agere? venæsectione autem hoc modo peracta, æquum est, toties quoties, ope Cardiacorum & Alexipharmacorum Elasticitati iustæ spirituum succulentia prospicere, ne delitescens venenum, data hac occasione in eos grassetur. Tantillum etiam Opiati ad demulcendos spiritus, & sudores eliciendos adicere jam licet, modo sequenti.

℞. Theriac. Androm. pulv. c. Chel. cancr. comp. vel Goan. ana ʒss. Syrup. Caryoph. q. s. M. F. bolus mollis hora somni, post venæsectionem, deglutendus, superbibendi. Cochl. 4. vel ʒ. Julap. sequentis de quo bibat Æger ad libitum.

℞. Aqu. mellis. ceras. nigr. ana ʒiv. Aqu. epidem. ʒij. Syrup. caryoph. ʒx. M. F. Julap. vel.

℞. Aqu. cardu. Bened. lactis alexiter. ana ʒiv. cinnam. hord. ʒij. pzon. comp. epidem. ana ʒij. Margar. præparat. ʒss. Sacchar. Alb. ʒvj. M. F. Julap. de quo bibat cochl. ʒ. vel 6. (agitata phiala) tertia vel quarta quaque hora.

Si ob genus veneni admodum lacerantem & stimulantem, spiritus adhuc multo robore pollentes, a nisu, quo sese expandere moluntur, in motus adeo efferos adigantur, ut partes aliquas, præsertim præcordia, reliquasque vicinas respirationi inservientes, tempore exacerbationis, spasmis horrendis torqueri ac convelli contingat. Extremis jam præ atroci dolore frigentibus, atque pulsum vibratione depressa, adeo ut vita Ægrotantis in præsens discrimen inde adduci videatur: Necessè est, in ipsa exacerbatione, ad nilum huius spirituum insolitum minuendum, ac non tantum venatundatur, & sanguis liberali manu, toties quoties, detrahatur, verum etiam, ut copioso ac repetito laudani usu, effusus hic spirituum motus compefcat. Ix. gr. Tertia vel quarta quaque hora (quandiu opus fuerit) exhibeantur guttæ ʒ. vel ʒo. laudan. liqu. Helmout. in Haustu Julapi Antispasmodici sequentis.

℞. Aqu. Flor. Chamæmel. card. Benedict. Rut. ana ʒij. Aqu. Pzon. bryon. comp. ana ʒss. tinctur. castor. ʒj. spirit. Sal armon. ʒss. Syrup. pzon. comp. ʒss. M. F. Julap. Spasmi autem hoc modo solutis; bolum Alexipharmacum aut præscriptum, vel quodcumque aliud viribus isdem præditum, ad expansionem spirituum renovandum exhiberi convenit; ut illi Opiatis prius irretiti liberentur atque paroxysmus sudoribus, more solito, finiatur; ne febris, à nimia & diutina spirituum depressione (exulante omni Remissione & Exacerbatione) in continuam & malignam degeneret.

Ubi autem (ut in febre ardente) sanguis æstro spirituum flagrantium percitus atque agitato, plus iusto ebulliat, & ab Incendio, magis quam à veneno febrili vita Ægrotantis in discrimen duci videatur, Præter venæsectionem liberalem & repetitam (quæ jam apprimè necessaria est) nimius Maltæ fervor & Ebullitio copiosum ac frequente in usum Julapiorum, apo-

zematium, emulsionum, cæterorumque id genus attemperantium potulat. Ix. gr.

℞. C. C. ʒj. Crustæ panis alb. ʒij. Macis ʒj. Sacchar. albi. ʒss. Coq. leniter in aqu. F. ʒiv. ad ʒ. liquorem absque expressione colatum bibat Æger copiose ad libitum. Vel.

℞. Sem. melon. pepou. ana ʒij. Sem. papav. alb. ʒss. Amygd. d. decorticat. n. vii. His sensum attund. in mortario Marmor. continuo agitando, q. Hord. ʒss. F. emulsiō la. Cui add. aqu. Ros. rub. ʒj. Sacchar. alb. ʒss. bibat Æger Haustum prælargum sub tepide, saltem tertia vel quarta quaque hora.

Vel, ℞. Rad. scorzon. Hispan. ʒij. Rasur. C. C. labor. ana ʒss. Fol. lyur. saliv. ana Mj. flor. borag. buglos. ana Mss. U. ar. corinthiac ʒij. coq. in aqu. F. vel Hord. purincat. q. l. ad ʒij. sub tuem Ebullitionis addendo Glycyrriz. Hispan. ʒss. Colatura alium ovi clarincat. dd. aqu. Theriacal stil. ʒij. Sacchar. cant. alb. ʒss. Vel Syrup. ex Acetos. citr. violac. ana ʒss. M. F. Apozema, cujus cap. ʒiv. calicupulæ tertia quaque hora, vel sapius ad libitum.

Vel ℞. Aqu. lactis alexiter. ʒviij. aqu. cord. frig. Saxon. cinnam. Ho. d. ana ʒij. Marg. præparat. ʒij. Sacchar. alb. ʒvj. M. F. Julap. de quo bibat Æger cochl. 7. vel 8. (agitata phiala) ad libitum Apprimè autem cavendum est, ne, ex nimia attemperatione, spiritus elasticitate sua plus iusto orbentur, & ansa præbeat venenati fermenti augmento, unde febris ardens inopinato in malignam mutetur. Quocirca, si ex intumescencia aut Angustis Hypochondriorum, vel quocumque ejusmodi criterio, sas sit hunc eventum suspicari, Medicus vel ab idgenus attemperantibus prorsus absteineat, vel eorum usum parciolem imperet, & lul pio Perlato, aqu. Epidem. ʒij. adiciat; Apozemati vero sub tuem coctionis, Vin. Albi vel Rhenan. ʒss. Et Enulsioni aqu. cinnam. Hord ʒij. vel 4. Insuper, saltem singulis noctibus, Bolum sequentem ministret.

℞. Theriac. Androm. pulv. Goan. vel c. Chel. cancr. comp. ana ʒss. Syrup. caryoph. q. s. M. F. Bolus mollis. Post singulos Bolos superbibit Æger cochl. ʒ. vel 6. Julapi sequentis, atque etiam inter singulos Apozematis vel emulsionis Hultus. aut sapius ad libitum.

℞. Aqu. Mellis. Ceras. nigr. ana ʒiv. aqu. Pulleg Epidem. Pzon. comp. ana ʒi. Syrup. caryoph. ʒss. M. F. Julap.

Vel, ℞. Aqu. card. benedict. ceras. nigr. ana ʒiv. Epidem. ʒij. pulv. c. Chel. cancr. comp. Lap. Contr. yerv. ana ʒi. Sacchar. alb. ʒvi M. F. Julap. sumat exinde Æger cochl. ʒ. vel 6. (agitata phiala) quarta quaque hora.

Denique, ubi ex Elasticitate spirituum à vi Venenæ sponte sua, vel aliquo accidente aucti, multum depressa, febris ardens. Exacerbationibus & Remissionibus exulare jam incipientibus, recta via tendit ad curam. Methodus medendi prius tradita, pro gradu mutationis, plus minus alteranda est, donec ab usu repetito Alexipharmacorum Alcalium, Salium volatilium, vesicatoriorum, cæterorumque, curationis utranque paginam in febre maligna complentium, spirituum expansio iterum instauretur, idque incunctanter & sine mora, priusquam spiritus, vi veneni intensioris, in statum sphacellatum

latum (quod quam citissime fieri solet) adigantur ; Tunc enim de vita Ægrotantis pene clamatum est ; Quippe totum negotium extra artis nostræ Sphæram ponitur , ubi linguæ nigrities , tenuitas & pallor Urinæ , mentis vacillatio , subsultus tendinum , cæteraque id genus funesta symptomata sensim succrescentia hanc spirituum ^{vix} palam prodant. Atque ob hanc causam necesse est , ut medicus sæpius in die Ægrotantem inviset , præsertim statu morbi durante , & crisi ; Et. unoquoque congressu , summa cum animi applicatione pulsus patientis exploret , varias Urinæ alterationes serio pensitet , atque Adstantium relationes animadvertat , ut naturæ , pro gradu languoris , tempestive succurri queat , Hoc etenim in casu , si inquam alias , quod citò fit , bis fit.

Ubi a debilitate pulsus primum animadversa , paroxysmorum protensione , & æmulsionum incertitudine ac brevitate hanc tebris degenerationem inspicari liceat , ne prorsus corruant spiritus , Alcalia , quotquot sunt , in auxilium adfiscantur , quæ , licet nullo calore sensibili prædita sint , ex conflictu tamen , quem cum particulis acidis in ventriculo & sanguine delitescantibus instituunt , effervescentiam in massa retens excitant , atque inde spirituum expansionem resuscitant ac promovent. Ex. gr. infantibus sæpius propinentur cochl. iii. vel iv. julapii speciebus Alcalisatis saturati , quod comitate priori jamjam descripsimus , adultis autem hujusmodi lactaceorum alcalium dosis largior exhibeatur , & quarta quaque hora repetatur. Ex. gr..

℞. Pulv. è chel. canc. comp. vel pulv. Goan. ʒss. sumat. Æger è cochl. julap. sequentis superbibendo 4. vel 5. repetatque quarta vel sexta quaque hora.

℞. Aqu. meliss. ceras. nigr. scord. comp. ana ʒiij. aqu. epidem. præn. comp. syrup. caryoph. ʒiij. confect. Alkerm. ʒiij. M. f. julap. de quo bibat ad libitum

Vel, ℞. Ocul. cancr. præparat. pulv. è chel. c. nc. comp. ana ʒiss. l. p. Contrayerv. ʒi. coral. rub. præparat. ʒss. M. pro chartulis sex , quarum unam capiat sexta quaque hora ut prius.

Vel, ℞. Coral. rub. præparat. ʒij. Margar. præparat. spec. confect. de Hyacinth. ana ʒiss. bezoar. Oriental. ʒj. M. pro chartulis sex vel octo , sumendis ut antea. In eundem usum julap. Perlatum admodum gratum more sequenti parari potest , sumendum ad libitum (agitata phiala)

℞. Aqu. lact. Alexiter. cardu. benedict. cinnam. Hord. ana ʒiv. aqu. epidem. præn. comp. ana ʒiss. margar. præparat. ʒij. Sacchar. alb. ʒj. M. f. Julap. Post singulas autem hujusmodi doses , & Julapii Perlati singulos Haustus , Æger os & fauces gargarizando colluat lotionem aliquam absterfiva , vel saltem cerevisia tenui , ne ex adhæione pulveris ad partes oris exsiccata sitis augeatur , atque rigiditas ingrata ac molesta partibus deglutioni inservientibus superveniat.

Vesicatoria plurimum in hunc usum conducunt ; non ob copiam lymphæ quam eliciunt , quæ non magis morbosa mihi videtur , quàm urina , & reliqua colluvies serosa insensibili transpiratione aut sudoribus per poros cutis continuo excreta ; Verum ideo præsertim quod

partes subjectas corrodam ac inflamment , atque consequenter diathesin inflammatoriam massæ humorum impertiant ; Spiritus autem ab hac inflammatione artificiali non possunt non pro tempore expandi & excitari , indeque à vacillatione immunes , robore iis arte conciliato , conservari ; Adeo ut deliria , suolitus tendinum , reliquaque ejusmodi symptomata antevertantur , & jam suborta certius curentur , quam a quocunque alio Remedio intus vel extra adhibito. Ex quo constat magnum hoc Remedium perperam a vulgo medicorum in quibuscunque febribus indiscriminatim adhiberi , siquidem in inflammatoriis , nisi cum supapte sponte in malignas degeneraturæ sint , aut à profundis venæsectionibus præcedentibus , vel aliis evacuationibus nimis , vel saltem usu laudari immodico spiritus profligati imbelles reddantur ; plurimum nocent ac , inflammationem adjiciendo , curationi officiant. Neque equidem in quacunque febre , præter ^{vix} malignam , aut quæ nunc tendit , ubi a veneno , plus quam ab incendio Ægrotans in discrimine versatur , reapse indicantur. Neque in malignis ipsis , ad medici arbitrium , absque evidenti necessitate , fas est Æg. um imbellem ac confectum denuo iterum Epispasticorum tortura lancinari , verum pro exigentia naturæ , & spirituum majori , vel minori vacillatione , eorum applicatio primum imperanda est ; Medicus autem eorum numerum definiat , & magnitudinem , & durate cursu morbi , recentem eorum applicationem ad partes quicunque opportunas imperet V. G. ad Nucnam , brachia interna , carpos supra pulsus , pone aures , ad interna femora & denique (si opus fuerit) ad Tibias internas : Ad partes autem a corderemoras ac dependentes , ultimo loco , nec absque evidenti necessitate vesicatoria adhibere soleo ; sicuti enim serius , ac cum minori certitudine Epispastica in hisce partibus , à fonte itz longius distantibus scopum suum assequuntur ; Ità , in hisce artubus dependentibus , haud raro , à venenato humore trajecto , Ulcera maligna ac curatu admodum difficilia , & ipsæ gangræ , præsertim in senioribus , oriuntur , unde miscellus ægrotans , a medico manumissus in Chirurgorum ditionem redigitur , quod gloriam victoriæ arte medicinali prius partæ haud parum obscurat.

In eundem finem etiam Suppedanea acria & stimulantia , vel Spiritus soventia ac instaurantia , ad plantas pedum , vel ad pedes totos applicari convenit ; siquidem hæc cutis pars , præ cæteris , quippe ex filamentis nervorum extremis conflata , sensu pollet egregio , unde ad fibrillas cæterarum membranarum & musculorum , & exinde ad nervos ipsos , & tandem , continuitate quadam , ad Cerebrum , per hos poros cutaneos particulæ activæ facillime trajiciuntur. Unde Spiritus vel stimuli , vel confortati sese recolligunt , ac demum expandunt , indeque , cum majori robore ac constantia , in partes subjectas influunt. Horum formulas mihi familiares hic loci adicere non pigebit. Ex. gr. Ubi à Comatoso affectu Spiritus ad gradum ^{vix} seu stuporis deprimuntur , sequentia applicentur ad plantas pedum.

℞. Empl. Cephalic. cum dup. Euphorb. Gal.

Galban. ana q. s. Ol. Succin. gutt. 4. M. & extend. super alutam. F. Suppedanea duo.

Vel, ℥. Fol. Rut. Mij. Rad. recent. Tormentil. Aristoloch. Long. ana ʒß. Fæcul. Bryon. alb. ʒ iß. Sapon. nigr. q. s. M. & contund. in mortario, F. Cataplasma quo toti pedes calide involvantur, Renovando applicationem semel vel bis in die, quoties scil. ob calorem partitis, massa siccescere incipiat.

Vel, ℥. Fol. Rut. Chelidon. Maj. ana Mj. Rad. Raph. rustic. Contus. ʒ ij. Carnem. Halec. muriat. num. i. Sapon. nig. Salis Marin. ana ʒß. N. M. sciss. num. i. Ferment. acris. Acet. acerrim. ana q. s. Contund. & F. Cataplasma quo toti pedes calide involvantur.

Ubi vero, non tam extincti & dissipati, quam agitati & explosivi fuerint spiritus, unde ab æstho, quo periti ac irritati sunt, tota Machina spasmus variis hinc inde versatilibus torquetur ac convellitur (quod Phreneticis potè pertinaces Vigiliis accendere solet) Partes Animalium vivas, ceteraque ejusmodi, quæ, particulas congeneres ac amicas potius quam astantes aut irritantes communicando, spiritus demulcere atque resocillare queant, ad hæc partes applicanda censeo; Ex quibus somnum placidum febricitantibus, post pertinaces Vigiliis, spasmus, ac Deliria sæpissime conciliatum inveniri. Vegetus autem Pullorum Columbinorum calor Medicos suavit, quæ uno consensu, eos in hunc finem ceteris omnibus Animalibus antepone: Ut ut sint, qui ex applicatione Offæ bovinae calefactæ, aceto irroratæ, ac demum Pulvere N. M. aspersæ eundem scopum sese sæpius assecutos esse gloriantur. Procul omni dubio, cerebrum etiam vires Anodynas Pulmonum Agnorum, Vervecinorum vel Vitulinorum recens Extractorum, atque, dum adhuc naturaliter calent, ad plantas pedum applicatorum multo facilius ac commodius, atque cum minore frigoris inde exterius suscipiendi periculo percipit, quam cum ex jussu Medicorum solenni (quod heri solet) Capiti cum molestia prius raso imponantur. Omnia autem hujusmodi sive Animalia, sive Animalium partes, sicuti naturali calore prædita rite applicanda sunt, ita sæpius scil. sexta vel octava quaque hora renovari postulant, ne ex putrefactione contracta spiritibus animalibus potius officiant quam prosint: Ex. gr. Applicentur ad plantas pedum Pulli duo Columbini recens mastati, atque per spinam scissi, amputatis prius Capite, Alis & cruribus, & renoventur octava quaque hora: Vel toti pedes involvantur calidis Pulmonibus Agni, Vituli, aut Vervecis recens mastati, Renovando applicationem saltem ter in die. Vel Offæ duæ Bovinae recentes ad plantas pedum alligentur bis terve in die. Cataplasma etiam è Theriacâ Londinensi recens confectâ, cum pannis lineis duplicatis totis pedibus superinductum in hunc usum, scil. ad irritatos spiritus compescendos atque demulcendos plurimum confert.

Sin ab hisce tam intus quam exterius exhibitis, spirituum expansio, atque iustæ in Massa flammæ exsuscitatio illico non promoveatur, nè, à spiritibus penitus obrutis, atque inde quadam

rituum Elasticitatem, Alimentis & Medicamentis generoso calore imbutis, Alexipharmacis dictis, veluti Vino generoso, Spir. C. C. Diascord. Mithridat. Theriac. Androm. ceterisque id genus confectionibus, quæ ipsa radice serpentaria Virginiana, excitare necesse est. Siquidem jam non ab incendio, sed a Veneno Deleterio & Sphacelante metuendum est. Ex. gr. Concedatur Aegro sæpius juleculum Pulli, vel Vinum generosum, idque Spir. C. C. saturatum: Alexipharmaca etiam bis, ter, quaterve in die cum Alcalifatis commista. Ex. gr.

℥. Theriac. Androm. Mithridat. vel Diasc. ʒß. ʒ ij. Pulv. e Chel. Caner. comp. ʒß. Syrup. Caryoph. q. s. M. F. Bolus molli, hora somni una cum Haustu Julapii exhibendus atque mane sequenti repetendus, vel sæpius scil. octava vel sexta quaque hora, prout gradus Veneni Deleterius atque sphacelatio spirituum requirat. Imò, ubi linguæ nigrities, subsultus Tendinum ceteraque præsentis spirituum sphacelationis indicia exigant, gr. 8. 10. 12. Radic. Serpentar. Virgin. vel Electuarii de Ovo ad singulos Bolos adjiciantur; Quo pacto plurimos ab ipsius Orci faucibus liberatos memini. Phlogosi autem spirituum ac sanguinis hoc ritu restituta, ne incendiū functum inde suboritur, prorsus ab hujusmodi calidiorum usu tempestive abstinere oportet, aut saltem eorum dosis minuenda, & sæpius repetenda est. De hisce autem sermonem sulius habituri sumus in quinta, uretologiae nostræ Exercitatione, ubi ex professo de febribus continuis malignis & pestilentialibus tractaturi sumus.

Crisi Febris peractâ (quocunque modo cam fieri contigerit) Opiata, ut ut sub initium, in Statu, aut instante Crisi, noxia esse, atque lethifera (ubi nullum vehemens symptoma eorum ulum indicat) sæpissime observentur, quia Elasticitatem spirituum iustam ac debitam præpediunt, hæud raro, admodum proficua sunt, & symptomata quædam molesta, Tussim scil. Diarthoram & Vigiliis immodicas compescunt. Imò, ab Haustu sequenti, vel alio congeneri Aegrotantem prius hisce symptomatis plurimum læssitum atque confectum, spatio unius noctis, mirum in modum restitutum sæpius novi.

℥. Aq. Paralyf. ceras. nig. ana ʒß. Aq. Epidem. ʒ ij. Syrup. de Mecon. ʒ vi. ʒj M. l. Haustus.

Denique, quamprimum a perfectâ Febris judicatione vires Aegrotantis & Appetitus refarciri incipiant, appropinquare necessarium est saburram humorum effectorum in præcedentibus agonibus colligatorum, atque jam in habitu corporis delitescentium Catharticis repetitis, primum lenioribus, deinde acrioribus per alvum subducere atque deturbare, ne ex his diutius in habitu corporis congeitis Cachexia suboriat, quæ Tumores Artuum œdematosos, scorbuticam vel Hypochondriacam affectionem, aut gravio-rem aliquem Morbum Chronicum (ut sæpe fit) producat, & misellus Aeger novo morbo multatus, potius quam sanatus videatur. Formulas mihi usu comprobatas adjicere lubet.

℥. Fol. Senn. optim. ʒ ij. Cassiæ cum cannis contract. ʒß. ʒ vi. Semin. Anis. Coriand. præp. Cinnam. acut. ana ʒß. Coq. in Aq. Hord. ʒ xii. ad viii. In Colatura dissolve Mannæ selectissimæ ʒj.

3j. vel 3. i. M. F. Potio larga, ejus partem dimidiam sumat Ager calidiusculè primo mane, reliquam post bihorium (si opus fuerit.)

Vel ʒ. Pil. Ruff. Alaphang. Aloës rosat. & Succin. Stomach. cum Gum. ʒj. vel 3ß. Ol. Cinnam. Chym. vel Opopalsam gut. iij. M. F. Pil. iij. vel iv. deaurand. quas sumat hora somni, mane sequenti bibendo ʒ. iv. Aqu. Mineral. purgant ad ʒ. iij. coct. & ʒ. ʒ. Lactis alterat.

Vel ʒ. Decoct. Sennæ Geron. 3ij. Aqu. Cinnam. Hord. 3ß. Syrup. Cichor. cum Rheo 3j. vel M. M. 3 vi. vel Syrup. de Rhamno solutiv. 3ß. M. F. Potio.

Vel ʒ. Masl. Pil. foetid. coch. min. ana 3ß. Salis Tartar. gr. iv. Ol. Juniper. Chym. gut. iij. M. F. Pil. viij. deaurand. quas sumat mane, vel à primo somno cum Regimine.

Vel pro delicatulis, ʒ. Elect. Lenitiv. 3ß. 3vj. Pulv. semin. Anis. ʒß. Opopals. gut. iv. M. F. Bolus post mediam noctem exhibendus.

Vel ʒ. Cassia recens & Cannis extract. 3ß. 3vj. cum sacchar. aspers. F. Bolus, hora somni deglutendus cum libera custodia. Junioribus Pulverem sequentem & cochleari Lactis frigidi mane ministrandum, repetendumque semel in hebdomadâ cum regimine præscribere soleo, quippe minori cum tædio in os ingerendum, atque Vermibus (quibus Juniores obnoxii sunt) inimicum, unde post unam vel alteram Vomitionem, copiose atque cum *copiose* deiecere solent.

ʒ. Calomelan. Diagryd. Sulphurat. ana gr. v. vj. viij. vel ʒß. pro ætate, M. F. Pulvis.

Quod spectat ad reliqua symptomata particularia, & magis accidentalia, quæ varia hujus Morbi Itadia comitantur, quo pæcto scilicet tractanda sunt, Pæretologiæ nostræ Exercitationem sextam, ubi de febrium symptomatis *similibus* locuturi sumus, consulat Lector.

Ego (liceat sine jactatione profiteri) hæc methodo rationali innixus, Naturæ hæc febres Medicanti sæpius feliciter ancillatus sum, atque penes me habeo plures hujusmodi Curationum Historias, quas consulto omitto; Siquidem probè novi quas moras hæc methodus trahat, atque quam dolorifico Remediorum Apparatu miscellæ Agrotantes inde affligantur, ac quanto cum discrimine ac incertitudine optatum eventum tandem assequantur; dum ex relationibus Adstantium incertis Medicorum perspicacissimorum observationes ut plurimum pendeant, atque ex incertis istis conjecturis Methodus medendi primùm instituatur, dein vario mutetur. His addatur lubrica hujusce febris indoles, quæ suapte sponte, vel à minimâ Medici hallucinatione, aut quocunque alio accidente, unde Venenum augeatur, præsertim prope Crisin, in continuam malignam facillimè degenerat, quam in pristinum suum statum & magis benignum redigere (si non primo instanti obvium eatur) difficillimum est; Atque insuper, inadvertentia & hallucinatio, cui Medici Exercitissimi, quippe multis negotiis impliciti, in ratiocinando sæpenuerò obnoxii sunt, unde vitæ Agrotantium ab eorum calamo dependeant. Hisce (inquam) pensatis, à multis retroactis annis; scilicet à quo tempore vires Corticis in hisce febribus, æque ac in intermittentibus debellandis certas atque efficaces

multo usu comprobaveram; in hisce febribus tam Spuriis quam Genuinis curandis totus me contuli ad ulam Polychrestæ hujus Antidoti; Et cum felicissimo successu, in omni ætate, sexu ac temperamento cito ac tuto, si non jucundè eas profligavi. Idque facio conscientie causa, utut ex præconcepta opinione reclamant Amici, Medici, vel ipsi Agrotantes; Quorum enim Natura dubio Marte Venenum aggrediatur, cum penes nos sit Herculeæ Antidotus divinitus concessa, quæ vires ejus certò & citò frangere valet; Quantum dedecet probum ac misericordem Medicum adeò in Corio humano ludere, Artem nostram in Lanienam, frequenti Epispasticorum applicatione, convertere, atque tandem Agrotantis vitam incertis atque hallucinantibus ratiocinationibus nostris temere subicere, quarum pœnas Ager, crumenæ ac vitæ suæ dispendio, non rarò luit?

Methodus Exhibendi Corticem in Curatione Febris Continente.

Quocirca, missâ hæc Methodo rationali curandi febrem *mixtâ*, quippe longa ac incertâ; totus me demum accingam ad modum exhibendi Corticis, in *mixtâ* tam spuria quam legitima, describendum. Unde earum Causa, Venenatum scilicet fermentum, modò magis compendiaris tuto ac citò subigitur & deletur. Quid opus autem multa verborum ambage, ubi Natura potius quàm Arte res agenda sit? Siquidem Antidotus quocunque modo exhibita (modò exhibeatur) Venenum delet. Fomite autem subtracto, flamma sponte exstinguitur, atque, ubi Natura à Venenato fermento non ampliùs lacessitur, lubens quiescit. Ut totam rem paucis absolvam, simplex hujusce febris natura nihil præter Antidotum, formâ Agrotanti gratissimâ exhibendum exigit, idque partitis vicibus, & durante Remissione, ut spirituum regimini magis subjecta vires suas felicius exerceat. Indeque, quotiescunque ad Agram advocor, simplici *mixtâ* laborantem; ubi nulum insolitum symptomâ, aut gradum symptomatis solito vehementiorem deprehendo, si Exacerbationes & Remissiones statim ac certis periodis sese invicem excipiant, absque pomposo quocunque apparatu præcedenti, Prima scilicet Remissione opportune, illic Cortic. Peruv. elect. in subtilissimum Alcohol reduct. 3j 3ß. ʒj. ʒß. ʒß. pro ætate, forma Boli, Haultus, Pilul. vel Electuarii (prout Ager ipse maluerit) exhibendum jubeo, repetendumque tertia vel quarta quaque hora extra paroxysmum, dum opus fuerit. Atque ut verum dicam, vix aut ne vix unquam memini simplicem *mixtâ* post 3j. Antidoti exhibitam, superstitem fuisse.

Sin adventus meus differatur, donec febris hæc in augmento suo adeò provehatur, ut in continuam jam vergat, & paroxysmi fere aboliti fuerint, aut saltem periodos suas certas ac statas, ob Cephalalgiam, Lassitudinem ulcerosam, aut symptoma aliquod aliud solito vehementius subortum penè amiserit; post Clysteris (modò indicetur) rejectionem, sanguinis 3vj. viij. x. pro ætate, & symptomatum exigentia, in ipsa exacerbatione, illico brachio detrahendas jubeo, atque deinde Bolum Theriacalem cum

cum haustu Julapil cordialis exhibendum, qui ad libitum repetatur, ad spirituum Elasticitatem resuscitandam; Et Vescicatorium unum vel alterum, in eundem finem, ad Nucham vel Carpos internos applicandum prescribo; unde, uti Vigilium, Dolorum, cæterorumque Symptomatum diminutionem tere semper subsequutam esse memini, ita insuper inducias Remissionum magis certas ac protensas observavi; quâ occasione datâ, Antidotum incunctanter exhibeo, atque ejus repetitionem, durantibus Remissionibus, jugiter renovandam, cum felici successu & optato eventu impero, Quid? quod spatio bidui, scil. quâ primâ Corticis 3vj. vel 5j. Eger devoraverit, Eum ætatis fere semper inveni.

Sin, ob præsentem Vomitionem, hæc gustui parum grata Antidotus ægrè admodum in ventriculo retineatur, necesse est vel lene Vomitorium dare, vel Tonum Ventriculi corroborare, atque fermenti ejus acrimoniam prius demulcere mixtura e Sale Abinthii & succo Limonium, cochleatum & sæpius exhibita; Aqua Pulli in locum potus ordinarii substituta, atque Bolo Cardiaco & Opiato hora somni ministrato, cæterisque Cap. 2. Exercitationis quartæ memorandis; ubi ex professo de hoc symptomate tractaturi sumus. Quinetiam singulis vel alternis Corticis doibus tantillum Laudani adjici convenit, ut, Spasmus Ventriculi inde sopitis, Antidotus eo facilius retineri queat. donec, à Veneno inde subactò, Massa sanguinis, & consequenter Ventriculi fermentum in pristinum statum reducantur, & hoc symptoma unâ cum febre dometur.

Ubi verò, ob solitam Alvi lubricitatem, aut præsentem ejus fluxum nimium, rite metuendum sit, ne Antidotus stimulantem amaritiam prædita, Symptoma in Diarrhœam vel Dysenteriam exalteret, & non tantum Remedium ipsi festinanter unâ cum fecibus deturbarum, Intestina, reinfecta, præterlabatur; verum etiam, Egro Torminibus, cæterisque diris Symptomatis inde provenientibus confecto, Febris in Malignam transeat, appropinquè necesse est, Bolo Theriacali prius exhibitò, & Electuario adstringente & Opiato partitis vicibus sæpius ministrato, Enemate adstringente injectò, Decocto albo in locum potus ordinarii substitutò, cæterisque in Cap. 3. Exercitationis quartæ memorandis laxitatem Intestinorum quadantenus corrigere, atque liquoris glandulosi ex his excreti acrimoniam demulcere; & singulis vel alternis Pulveris dosibus Laudan. Liq. gutt. 10. 12. 14. pro ætate & symptomatis vehementia addere; donec Veneno usu Antidoti deletò, colliquatio inde sensim minuat, & Diarrhœa unâ cum febre jam demum auferatur.

Sin à veneno (pro genio suo peculiari) Ventriculum simul ac Intestina petente, ac utrobique humores colliquatos eliminante. Vomitiones enormes & dejectiones cum spasmis horrendis, velut in cholera morbo, adsint, Oportet prius humorum Venenatorum in Ventriculum & Intestina excretorum acrimoniam copiâ Aquæ Pulli in locum potus ordinarii substituta, atque Enemate ex eadem demulceri; Ventriculum foris aromatico externe calidè refocillari, atque Spasmos & evacuationes per os &

anum frænari Laudan. Liq. gutt. 12. 14. 16. singulis vel alternis horis in haustu Julapil accomodatè propinatis, dein verò singulis vel alternis dosibus Antidoti (pro ut opus fuerit) tantillum Laudani adjici. Quo pacto. Veneno febrili deletò, molesta hæc symptomata, quæ ab hoc fermento solummodo dependent, una cum Febre illico corruunt neque in posterum (modo repetitione Antidoti post debita intervalla præcaverentur) recrudescent. Verum de hoc symptomate fusius atque ex professo tractabimus Cap. 5. Exercitationis quartæ.

Quoties, ob spirituum in suis expansionibus exandescentiam ac nsum, hæc Febris propè accedat ad Inflammatoriam (sive Inflammatio more Rheumatismi versatilis totam machinam hic inde afficiat, sive Pleuram, Pulmones Oculos, Mammas, Testes sive aliam aliquam partem singularem præ cæteris occupet, atque itidem Paroxysmis & Remissionibus, certis aut incertis periodis recurrentibus insignatur, in primo Curationis limine, Doloris atque Inflammationis allevatio, Enematis, Venzelationibus in ipsa Exacerbatione celebratis, & (si opus fuerit) repetitis, atque reliquo apparatu (quem pro textura partis affectæ singulari, admodum varium esse, ex tertia Exercitatione abundè constabit) molienda est. In prima autem Remissione, atque deinceps, quoties subsequens Remissio occasionem ministrat opportunam, Antidotus partitis vicibus jugiter ingerenda est, usque dum a Veneno inde subactò Lucta finiatur, & Febris diro hoc Satellitio stipata sponte exeat. Venenum autem, quod spiritus in motu adeo efferos adigit, rarius ab una uncia Corticis deletur, sæpius duplam, tripulam quantitatem imperat, & Medicus, priusquam scopum hoc modo assequi queat, detractione sanguinis iterum, iterumque celebrata, organum spirituum compescere, nonnunquam etiam Cathartica lenia, & ipsa Emetica in iustis interstalliis adsciscere cogitur.

Ubi autem Venenum præter modum spiritus velut cæstro laçessit, & in statum Spasmodicum adigit, unde Ventriculus, Intestina, Præcordia, Diaphragma, cæteræque partes Cordis vicinæ adeò augmentantur & torquentur, ut Egger, vacillante jam Pulsu, atque extremis frigescentibus, suffocatus vel lipothymicus periturus illico videatur. (Quæ Symptomata tunc spiritum haud raro comitantur, & speciem Colicæ Ventriculi vel Intestinorum, aut Spasmi Thoracis & Abdominis universalem simulant) necesse est, primo loco, effertum hunc spirituum orgasmum tollere, atque nsum minuire, Enematis, detractione sanguinis copiosa (utut Symptomata contra indicare videantur) atque liberali & repetito Laudani usu; Cujus dosin duplo vel triplo majorem, ob præsentem spirituum iram, Eger cum impio tolerat, quàm quocunque alio tempore ubi spiritus quiescentes Elasticitate duntaxat naturali pollet. Turbis autem hoc modo sedatis, Eger, quamprimum scil. urinam rubedine tinctam reddat, atque Cutis sudoribus scateat, & inducitur a morbo impetratus sint, incunctanter Corticem Peruv. partitis vicibus jugiter deglutiat. Cujus singulis dosibus tantillum Laudani, ad revirescentiam Spasmodorum

antevertendam, adijcere fas est. A cujus usu Venenato somite deleta, febris exulat, nec in posterum repullulatio dirorum horum symptomatum amplius expectanda est.

Ubi denique, Venenum sponte, vel ex quocunque accidente adeo increverit, ut, spiritibus jam succumbentibus, Febris degenerare in continuam incipiat, & æquali tenore pergat, utut æquum sit in usu antidoti ad vires veneni frangendas (quantum Agrotans ferre potest) pertinaciter peristere, Expansionem tamen spirituum, ut vires Corticis inde depromantur & regantur, omnimodè Medicum promovere oportet Epispasticorum frequentium applicatione, commixtione Alcalium cum singulis Corticis dosibus, vel exhibitione Boli Alexipharmaci, atque ejusdem repetitione bis, ter, quaterve in die, prout gradus veneni & spirituum obrutorum imbecillitas indicet.

Verum quandoquidem multifaria hæc res melius Exemplis quàm Regulis dilucidatur, non pigebit, è multis, præsertim nuperrimis, quas Mihi observasse contigit, paucas Historias huc spectantes seligere, easque graphicè depingere, tam ad Theoriz nostræ ex rei ipsius naturâ petitz illustrationem promovendam, quàm ad divinæ Antidoti multiplicem efficaciam confirmandam.

De Proteiformi Febris Continentis Genio.

Historia I.

Uxor Domini Blackerby Jurisperiti habitantis in vico dicto *Chancery Lane*, Anno 1690. a suppressione purgationum menstruarum ad unam, vel alteram Lunam perseverante, Nausea & proclivitate ad vomendum per quinque ferè hebdomadas continuè moleste afficiebatur. Symptomata pro signis ingravidationis habita primum æquo animo ferebat Agra, donec tandem adeo prævalerent, uti appetitus inde prorsus prosterneretur, ac, Digestione eversa, Ventriculus ingesta quæcunque, illico rejiceret; unde, præ ægritudine, & languore, lecto perpetuò affixa jacebat debilis & insomnis, fuellum eventum indies expectans. Ego ab eximio Collega D.D. *Goodall* consultus, licet, primo adventu, nullum præsentis febris criterium in Urina, Lingua, Pulsu, vel Temperie deprehendere potuerim, à diuturnitate tamen & vehementiâ symptomatum (quod sæpius in aliis Me observasse memineram) multum suspicabar Venenatum febrile fermentum delitescens Vomitioni & ægritudini ansam dedisse, atque, præ gradu Veneni intenso, spiritus haud jam satis ad Paroxysmos legitimos formandos sese expandere potuisse. Indeque, irritum duxi adversus symptomata militare, neglecta causa, Veneno scil. Febrili, quo à propria sua Antidoto subacta, & sanguine inde in statum pristinum redacto, fermentum Ventriculi non posset non naturalem suum vigorem sponte recuperare, & symptomata urgentia illicò sublevari, Ideoque, ut Cortex Peruv. in hunc usum jugiter ministraretur, snasi. Quandoquidem, autem Agra, & Agra Amici ab usu hujus Pharmaci planè abhorrent, impræsentiarum, frequenti exhibitione Salis Absinthii & succi Limonum

Symptomata saltem diminuire tentavimus, atque Aqua Pulli in locum potus ordinarii substituta venenatam acrimoniam humoris biliosi, flavi & æruginosi, in ventriculum excreti demulcere; Sacculis etiam aromaticis ac Emplastris tonum stomachi contortare, & tandem frequenti exhibitione Antimonii Diaphoretici (ut pote febrifugi non ingrati) febrile fermentum aggressi sumus. Ab horum usu, humor vomitione rejectus, post tres vel quatuor dies, non fuit æruginosus & flavus ut prius; Spiritus etiam, ut ex Temperie, Pulsu, Lingua & Tinctura Urinæ liquidum erat, liberius sese expandere cœperunt. Quocirca, Lene Vomitorium è Sale Vitrioli & Oxymelite Scyllitico ministravimus, quod cum insipia ferebatur; dein ʒij. Sanguinis è Brachio detrahendas jussimus. At Agra, Nauseæ, Vomitionis, cæterorumque symptomatum vehementia, ac diuturnitate pressa, ac tandem à Corticis usu non amplius abhorrente, cum præscripsimus, singulis dosibus Laudanum, cui jam diu assueverat, addendo, ad præsentem Vomitionem sistendam, unde spatio tridui, ex Orci faucibus plane eripiebatur; à Febre, vomitione, Aegritudine, cæterisque horrendis symptomatis prorsus liberata, Appetitu & Digestione jam demum integrè restituta.

Historia II.

Advocatus Ego à Clariss. Collega D.D. *Carolo Goodall*, invili Mulierem Diarrhœa torminosa in puerperio excruciatam, ac pene jam contectam. A colore Urinæ lateritio, atque à periodica Diarrhœæ & torminum exacerbatione, illico deprehendi tertium Febris Intermittentis, aut saltem Remittentis delitescens, hisce symptomatis ansam dedisse, utut Indicia Febris præsentis neque Agra ipsi, neque anantibus prius perspecta fuissent. Ideoque nulliella Mulier, debito licet Dieta regimine instituto, Douibus Laudani largis & frequenter repetitis, hebetata languebat, ac M. dore frigido perfunde-batur, mente vacillabat, Pulsu interea tremulè ac inordinatè vibrato, tanquam in articulo Mortis. Statis attamen periodis, scil. tempore Paroxysmorum, torminibus, ac Fluxu Alvi immani torquebatur, quasi nihil Opii sumpisset, vel debitum regimen adhibitum non fuisset: Aut cum Alvus arte supprimeretur, prægrandem Ventriculi ægritudinem, usque ad deliquium, perpetiebatur; Siquidem Opiatorum, Adstringentium cæterorumque Diarrhœæ torminosa debitorum usu, prius contra symptomata urgentia pugnatum fuerat; Morbo ipso autem, seu causa morbi integra adhuc intus manente; quamprimum fermentum virosum, sequenti Paroxysmo, recens invigorari contingeret, non potuerunt Fluxus Alvi, Tormina, cæteraque congenera symptomata non inde illicò revirescere; Natura per glandulas, & glandulosam lutestinorum Tunicam iterum satagente virulentiz reliquias excernere, & uti sarcinam molestam, more solito deponere. Quam ob causam seriò monui, uti, durante Paroxysmi remissione, Haustus cum drachma una Pulv. Chin. Chin. tertia quaque hora, Agra propinaretur, addendo singulis Haustibus, gutt. 12. Laudani liq. Helmont. ad com-

compescendum fluxum Alvi præsentem, uti simul symptomati urgenti, & ejus causæ, terminato scil. febrili, in singulis paroxysmis humores colliquatos versus Intestina detrudenti prospiceretur. Indeque, spatio 30. horarum, quamprimum scil. uncia una Corticis hoc modo exhibita fuit, Agra, venenato fermento subacta, à paroxysmis febrilibus, Diarrhœa, Torminibus, reliquisque ejusmodi symptomatis periculosissimis integrè liberabatur, atque adhuc superstes ac sana manet; licet, duplò majori Laudani Dosi priùs præscripta fluxus alvi & tormina cohiberi non potuerint.

Historia III.

Domina Brent, habitans in Burgo dicto *South-wark*, Vidua sane proba ac elegans, ante sexennium, tempore autumnali, anno ætatis suæ tricennio, Diarrhœa torminosâ corripiebatur adeò atroci ac contumaci, ut fluxu enormi & spasmis excruciantibus confecta, lecto perpetuo affigeretur, non obstante debito regimine, ac multo apparatu Medicaminum adstringentium & Opiatorum à *Clariss. Collega*, *D. D. Blackmore* imperato, & ad plures dies continuato: Quippe contra symptoma adhuc duntaxat militatum erat, fomite venenato febrili, qui colliquationem effecerat, interea non animadverso quandoquidem à Langore ex hoc symptomate vehementi orto nullum caloris febrilis evidens indicium sese prodebat. Ego autem nono, vel decimo morbi die advocatus; ex Pulsu celeri, Urinâ rubra ac contentis saturatâ, & Linguz ariditate morbum primum illico deprehendi, Febrem scil. de genere Remittentium, quippe fluxus alvi inde ortus quotidie itatâ diei horâ, manifestò exacerbabatur, indeque consilium dedi, ut Bolus à Cortice Peruv. quarta quaque hora, durante Remissione, jugiter exhiberetur, una cum gutt. 10. vel 11. Laudani Liquid. ut inde Diarrhœa, ac fermento febrili colliquationis causæ, simul prospiceretur: Siquidem ab Opiatis & adstringentibus solis fluxus enormis non ita cohiberi poterat, quin proxima Exacerbatione recrudesceret, cum causâ ejus integra intus maneret, atque licet multo Laudano spiritus sopiti fuissent, & fluxus fortè fortitò cohibitus, Febre tamen intactâ, atque intus delitescente, Agra diris symptomatis in genere nervoso male multata nihilo secius peritura esset. Consensit Collega *Clariss.* & Agra, licet Remedii saporem moleste ferens, mandata nostra strenuè executâ est cum optato eventu. Spatio enim Bidui, postquam 5 vi. Corticis in varias formulas redactas devorasset, multò melius sese habuit, utut Aphthæ albæ & benignæ sub finem febris suppullarent; Tertio autem die, à febre, dirisque ejusdem symptomatis, ac Aphthis nuper subortis penitus liberata revaluit.

Historia IV.

Servus Domini Hall, Pharmacopolæ, in vico dicto *Pye-corner*, die 4. *Aprilis*, 1691. (Die præcedenti levem Brachii contusionem perpessus, quâ ratione, eodem ipso die, sanguinem è Brachio opposito detrahendum curaverat) horis tribus à prandio Spasmo Intestinalium

immaniter dolorifico, & Vomitione bilis diviticoloris, enormi corripiebatur; Quam ob causam mane sequenti scil. die 5. *Maii* 3ß. Extract. Rud. cum gr. i. Laudan. Lond. commixt. sibi ipsi ministravit; unde Diarrhœa torminosâ & levi singultu a spasmis ventriculi suborto totâ nocte sequenti continuo lacebatur. Die 6. Collega *Clariss. D. D. Torlesse* accerseretur, qui Enema sequens illico injiciendum imperabat,

℞. Decoct. commun. 3x. Electuar. lenitiv. 3j. c Baccis Laur. 3ß. Ol. chamæm. chym. 3 ij. M. Deinde 3 iv. Julap. sequentis tertia quaque hora propinavit,

℞. Aqu. Hord. 1b iij. confect. Fracastor. 3ß. coq. ad 1b j. colaturæ add. Aqu. Epidem. 3 iij. Syrup. Violac. e succo Lujul. ana 3j. Sp. sulphur. per campan. 3j. M. F. Julap. Bolum etiam sequentem cum Haultu hora somni exhibendum curavit,

℞. Dialcord. 3j. Methridat. 3ß. Pulv. è chel. cancr. comp. 3j. Syrup. caryoph. q. s. M. F. Bolus.

℞. Aqu. ceras. nigr. 3 ij. Epidem. 3j. Syrup. cardiac. 3ß M. F. Haultus. Ad molesti singultus levamen cochl. i. vel 3. Julap. sequentis, pro re natâ, ministranda jult.

℞. Julap. Rosat. 3 vi. Sacch. cant. 3j. Aqu. cardu. 3 vi. Mosch. Odorat. gr. 1ß. Amb. gris. gr. i. croc. in nodulo ligat. 3ß. M. F. Julap. A quo singultus quoadtenus allevabatur; Diarrhœa vero immaniter sæviebat, cum horrendis totius abdominis spasmis sociata; quocirca usus ante præscriptorum repetebatur; atque totum abdomen, ad excruciantes spasmos sublevandos, foris sequenti calide fovebatur:

℞. Flor. chamæm. Mij. coq. in Spir. Vin. tenuior. q. s. pro usu Abhinc materia (ut loqui amant) in cerebrum translata, illico Ager delirabat, indeque, de dolore abdominis non conquerebatur; sub vespere ejusdem diei, ad reversionem materiæ a cerebro, Velicatoria ad Brachia & Tibias internas, atque Emplastr. cephalic. ad plantas pedum applicabantur, & Bolus cum Haultu Julap. sequentis exhibebatur,

℞. Rad. Serpentar. Virg. 3ß. Pulv. è chel. cancr. comp. 3j. syr. caryoph. q. s. M. F. Bolus.

℞. Aqu. cord. saxon. 3 x. Epidem. 3 iij. syr. Rub. Idæ. 3 iß. M. cap. cochl. iij. ad libitum. *Maii* 8. & 9. cum singultus, Vomitus, Diarrhœa, & Tormina plurimum prævalerent; Aqu. Dulcaginis pro potu ordinario substituebatur; atque Alcalium Testaceorum Dosis larga sexta quaque hora ministrabatur, unde die decimo (quo ego primùm advocatus sum) utut Diarrhœa sublata videretur, & alvus potius contracta, Mens tamen adhuc vacillabat, Tormina Ventriculorum & Intestina dirissimè excruciant, atque vomitus porracei nigricantisque liquoris immanis, & tere perpetua aderat cum Nauseâ, ægritudine & singultu conjuncta. Ubi autem, ex Pulsus celeritate, colore Urinæ lateritio, siti urgenti, & Linguz mucositate febrem deprehenderam, quam periodice symptomatum Remissiones & Exacerbationes comitabantur; Conjiciebam Vomitionem, Diarrhœam, reliquaque omnia symptomata ab eodem venenato fomite ortum duxisse, atque incassum Remedii nescio quibus tractanda esse, dum venenum febrile, hujus

stragis fons & origo, integrum & intactum intactus remaneret. Indeque (annuente Clariss. Collega) post Enematis rejectionem, ob præsentem Alvi constipationem, & aquam Pulli ob Vomitionem enormem in locum potus ordinarii substitutam, Bolus ex Pulv. Cort. Peruv. subtiliss. ʒij. Ocul. Caner. præp. ʒj. & Syrup. Caryoph. q. s. præscribebatur illicò exhibendus, & jugiter reperendus quarta quaque hora, addendo gutt. xii. Laud. Liqu. Helmont. unicuique Bolo, tam ad spasmos cohibendos, quam ut, inde sopito ventriculi motu, Pharmacum eo melius retineri posset. Die undecimo, postquam Ager ʒvj. Chin. Chin. hoc modo devorasset, symptomata omnia sedabantur, Urina minus rubebat, & hypostasim laudabilem deponebat, ideoque cum Ager Bolorum tædio affectus esset, reliquam curationem perficiendam duxi Apozemate in fine Tractatus nostri de Cortice Peruv. descripto: addendo Haustui nocturno gutt. xii. Laud. Liquid. vel sæpius, si opus foret: Undè, idque brevi, integrè revaluit.

Historia V.

Domina *Maschall*, Juvenula, Pathematis animi gravioribus diu exagitata, ubi jam fere ad quatuor hebdomadas, a fermento venenato delitescente multa diraque symptomata sese invicem excipientia, Diarrhoeam scil. torminosam, Lienteriam, Vomitionem, colicam, &c. perpeffa esset; & quanquam ab eximio Doctore *Waisson Laudanum*, cathartica, & reliqua remedia à symptomatis indicata, ministrata essent, non tam sanitatem recuperavit, quam unum morbum pro alio commutavit, & continuata agrotatione confecta est. Ego nuperrimè accersitus ut cum Collega de Agra consulerem; Eam inveni in lecto decumbentem, perpetua suffocatione & Vomitione, spasmus ventriculi & Intestinatorum horrendis, & fere Animi deliquium inducentibus laborantem, ac frigido madore ubique persusam; Arteriarum super debilitate admodum & inordinate sese vibrabant; Urina verò intensè rubescebat, & sedimentum lateritium præcipitabat. Cum verò ab astantibus certiores facti sumus omnia hæc dira symptomata quotidie, licet non hora certa ac flata, exacerbari, Venenum febrile ab indole fermenti Remittentium febrium non diversum huic funellorum symptomatum cæterarum ausam dedisse non dubitavi. Ideoque primum Enemate injecto, aqua Pulli in locum Potus ordinarii substituta, frequenti Julapii Hysterici exhibitione, & Dosi Laudan. sæpius repetita, mitigationem symptomatum auspicato tentavimus, quæ potitæ, incunctanter iussimus ʒj. Corticis cum Laud. liq. gutt. xii. in formam Boli vel Haustui redactam, exhibendam, atque deinde tertia vel quarta hora repetendam: Unciani unam Corticis, utpote effecti atque omni amaritie privati incalsum devoravit Agra; Quam primum autem vegeta ac vera China China, ad spatium bidui, ministrata esset; A Febre ac diris omnibus symptomatis liberata revaluit, utut recidivationem aliqualem iterum, iterumque perpeteretur, quam, repetito Corticis usu, facillè superavit, atque jam superstes optimâ valetudine utitur.

Historia VI.

Uxor Dom. *Thornburg* Mercatoris in *Torverhill*. ad triduum a puerperio, spasmus dolorificis laborans, atque Vomitionibus adeo atrocibus correpta, ut languore ac suffocatione inde confecta, illico animam efflatura videretur, me nuperrimè accersivit, ut cum Medico suo ordinario Collega meo *Cl. D. D. Tyson* conluerem de sublevandis diris hisce symptomatis, quæ, utut ab usu Enematum, Opiatorum cæterorumque à Collega Eruditissimo excogitatorum læpius obtunderentur, quotidie tamen recrudescabant, & indices magis, magisque læviebant, spesque revalescentiæ vix am affugebat. Cum primum advenerim, Agra summè languebat, madore frigido perfundebatur, strangulatione fere suffocabatur, totum abdomen diris doloribus torquebatur; Pulsus erat admodum debilis & celer. Urina vero multum tincta & contentis saturata, Unde febrile fermentum, à fermento *Synxii* non diversum, sub horum symptomatum larva delitescere, jure merito, suspicabar. Quocirca, postquam ab Enematis repetitis, atque Dosi Laudan. sæpius exhibitæ, symptomata inducias dederant, Haustum febrifugum e ʒj. Cortic. Peruv. & gutt. xii. Laud. Liq. confect. statim propinandum præscripsimus, repetendumque quarta quaque hora, ad revalescentiam symptomatum avertendam; Die sequenti exacerbatio, sed levior, invadebat, & tamen, quæ imprimùm scil. ʒj. vel ʒx. Corticis in varias formas redactas Agra devorasset, sine cujuscunque alterius Remedii ope prorsus revaluit, atque eadem antidoto, post debita intervalla, repetitæ, à recrudescentiâ febris ac symptomatum immunis in posterum manebat.

Historia VII.

Collega *Cl. D. D. Carolus Goodall*, *Maii* 28. 1691. acceriebatur ad invisendam filiam Domini *Toncher* in vico dicto *Water-noffer-Kovv*, circiter annos .6. natam, juvenulam sanè elegantem, ac optimo ingenio præditam; unacque parentibus & amicis jure optimo charissimam, quæ jam ad triduum Febre *Synxii* laborans, & à Pharmacopola curata, demum Vomitione immani, doloribus, cæterisque id genus diris symptomatis adeo opprimebatur, ut Temperies non ampliùs indicia Febris proderet. Jussit Clariss. Medicus Vesicatorium amplum ad Nucham statim esse applicandum, & gr. xv. Pulv. e Chel. Cancr. comp. & cochl. Julap. seq. exhibenda.

24. Aqu. Meliss. ʒvi. Protheriaci. ʒij. Syrup. Caryoph. ʒj. M. F. Julap. de quo bibat ad libitum. Cortic. etiam Peruv. ʒj. in formam Boli cum Syrup. Caryoph. redact. sexta quaque hora deglutendam præscripsit. *Maii* vero 29. ob enormem vomitionem, gr. xv. salis absinth. sexta quaque hora è cochl. j. succ. Limon. exhibenda curavit; & singulis vicibus Haustulum sequentem propinavit.

24. Decoct. Cortic. Peruv. ʒss aq. Protheriaci. Gentian. comp. ana ʒij. Syrup. Caryoph. ʒss. M. *Maii* 30. Duo Vesicatoria ad interiora Brachia recens applicabantur. Decoctum album in locum Potus ordinarii substituebatur, de Julap. Perlat. ad libitum bibebat, Haustus febrifugos interea non omisit. *Maii* 30. sub vesperam, Ego in Consilium vocatus, miseram Agram Vomitione perpetuâ penè confectam, atque præ

præ Spasmodis Thoracis, & Abdominis horrendis, perpetuo ejulantem, & tantum non suffocatam deprehendi; Febre jam, præ vehementia symptomatum, vix ullo modo sese prodeunte: Urina etenim (ut in spasmodis vehementioribus solet) erat clara ac tenuis, Temperies mitis, Extrema frigescebant, Pulsus erat celer, sed debilis & inordinatus. Ad Spasmos hosce universales compescendos Emeticum ex Vin. Benedict. ʒij Oxymel. Scyllit. ʒß. Aqu. Card. Benedict. ʒj. illico exhibendum præscriptum; Liquorem Posseticum copiosè bibendum inter vomendum, & (si opus foret) Vitriol. alb. depurat. ʒß. in Haustu Liquoris Possetici solvendam: Finita vomitione Aquam Pulli tenuissimam pro potu ordinario propinavimus; Bolum sequentem hora somni Ægra deglutiebat cum cochl. iij. vel iv. Julap. sequentis de quo etiam bibit ad libitum,

℞. Theriac Androm. ʒß. Pulv. è Chel. Cancr. Comp. ʒj. Syrup. Caryoph. q.s. M. f. Bolus.

℞. Aq. Lact. Meliss. ana ʒij. Cinnam. hord. Epidem. ana ʒß. Sal. Absinth. gr. xij. Syrup. è succo Limon. ʒx. M. f. Julap. Vomebat Ægra cum inopie, atque à Bolo deglutito sonitum placide capossebat, à Vomitione & Spasmodis dolorificis liberata: Jam denuum vero, in hac symptomatum Remissione, Urina n. reddebat rubram ac in colorem lateritium præcipitatum, unde fermentum febrile subesse ritè suspicabar, atque inde repullulationem symptomatum brevi futuram. Ne autem, ingratum Remedium (quale est Cortex) præproperè ingereudo, Vomitioni & Spasmodis (quæ symptomata sponte recursum expectavimus) ausam dedisse videremur, præscriptum solummodò pulverem sequentem ad acrimoniam Humoris Ventriculi obtundendam, tertia quaque hora repetendum, cum haustu Apozematis sequentis,

℞. Margar. præp. Ocul. Cancr. præp. Pulv. è Chel. Cancr. simp. ana ʒj. Coral. rubr. præp. ʒß. M.

℞. Decoct. Alb. lb. ij. Aq. Cinnam. hord. ʒij. Ceras. nig. ʒiv. sacch. alb. ʒiß. M. Tertia hora pomeridiana, sine evidenti causa ultro recrudescabant symptomata, & plus quàm die præcedenti sæviebant; Miscella virgo suffocata pene ac delira, præ atroci dolore totam Thoracis & Abdominis regionem occupante, sese jactabat & perpetuò vociferabatur, Nec interea Vomitus cessabat; Indeque sub vespèram, ad dira hæc symptomata minuenda, sanguinis ʒvij. è brachio, post rejectionem Enematis sequentis, detrahendas jussimus:

℞. Decoct. commun. pro Clyst. ʒx. Elect. è Bacc. Laur. ʒß. Ol. Chamam. Chym. cum frustulo sacchar. solut. ʒj. sacch. rubr. Mell Mercurial. ana ʒiß. M. f. Enema. Exacerbatione symptomatum, hoc pacto diminuta, Haustum febrifugum sequentem statim exhibuimus, qui repetebatur quarta quaque hora, Primo haustui addebantur Laudan. liqu. gutt. xii. Imperavimus etiam ut persisteret in usu Decocti albi, Julap. Perlat. & Aqu. Pulli. Haustus febrifugus erat hujusmodi

℞. Aqu. Cardu. ʒij. Aq. Pæon. comp. Syrup. Caryoph. ana ʒij. Pulv. Peruv. ʒj. M. Junii 1. mane, delirio id postulante, Vesicatoria duo ad internas tibias applicabantur, & Suppeda-

nea ex Emplastr. Cephalic. cum dup. Euphorbio & Galban. in acet. solut. & colat. ana p. xq. ad plantas pedum; Et gutt. xij. Spir. C. C. in unoquoque haustu potius præscripti exhibebantur; & haustus febrifugi quarta quaque hora non mittebantur. Exacerbatione vero spasmodorum, reliquorumque symptomatum post meridiem iterum, hora solita, recrudescente, sub vespèram præscriptum Haustum sequentem anodynum, ad symptomata allevanda, illicò propinandum, repetendumque post tres horas, si dolores adhuc urgerent; si verò sedarentur, Haustus febrifugos repetendos jussimus. Haustus anodynus erat hujusmodi

℞. Aqu. Ceras. nigr. Rut. Meliss. Pæon. comp. ana ʒß. Spir. Castor. gutt. xii. Laud. liqu. gutt. xii. Syrup. Pæon. comp. ʒij. Totos pedes Cataplasmatibus Rad. Bryon. alb. fol. Rut. Sapon. nig. & sale marin. confectis, calidè involvendo curavimus; & nodulum ex ass. foetid. Galban. Castor. incis. confectum, & aceto irroratum, de collo suspendendum. Junii 2. Urina reddebatur laudabilis, atque symptomata plurimum levabantur; nihilominus Haustum anodynum in promptu esse jussimus; si paroxysmus recrudesceret, post meridiem ministrandum, & extra paroxysmos, Haustus febrifugos repetendos. Exacerbatione autem hora solita recrudescente, utut minùs jam sævierint symptomata, sub vespèram Pulv. è Chel. Cancr. comp. Lap. Goan. ana gr. xii. Sal. Prunel. sacchar. alb. ana gr. iv. lumpsit, è cochlear. primo Haustus anodynus, reliquum superbibendo; Unde sudore universali & calido perfusa, placide dormit, à symptomatis prorsus liberata, quæ die sequenti ut prius non revirescebant; Urina verò & appetitu integrè restitutis, quasi ex Orei sancibus erepta convaleuit. Quocirca postquam Emulsionem ex Sem. Cucum. Melon. ana ʒß. Sem. Papav. alb. ʒij. Amygd. d. num. 5. Aqu. Hord. lb. ʒi. Aqu. Ros. rubr. ʒij. & sacch. alb. ʒj. confect. præscriptilemus, & repetitionem Corticis ter, quaterve in die ad triduum; Et valediximus; atque equidem huc usque optima valetudine utitur, nisi quòd, ex præmatura aeris mutatione ante usum Corticis, post 5. vel 6. dies, levem priorum symptomatum revirescentiam passa est, quæ exhibitione Decocti amari purg. & repetitione Corticis faciliè profligabatur.

Historia VIII.

Dominus *Siradovik*, Vir quadragenarius, Amicus meus integerimus, habitans ad insignem Alvearis in platea dicta *Snorv. Hill*, qui à multis retro annis, ab hepatis imbecillitate sæpius in lèterum inciderat, & cujus pulmones phlegmate viscido quadantenus infarciebantur, sub initium Junii 1691 à frigore suscepto febricitare incipiens, dolore lateris admodum molesto corripiebatur, & post multa incassum à mulierculis intus & extra ad dolorem allevandum tentata, sese pleuritide laborare credens, Junii tertio ʒxij vel xiv. Sanguinis è cubito detrahendas jussit, dein hora somni, haustum aquæ theriacalis seu epidemiz à seipso peculiari modo paratz (quam semper laudibus tanquam Panaceam efferre solebat) deglutit. Ubi autem Junii 4. omnia inopèus essent, me

accersebat. Adveniens, cum inveni vestitum, obambulanti in arca domus, nullo Regimine dicta circumscriptum. Temperies mitis, pulsus vero erat celer, & Urina intense rubra atque in colorem lateritium præcipitata; Noctes cum multa jactatione in omnes transigebat, de dolore lateris, infarctione pulmonum, & tussiduntaxat conquerebatur; Sed febris mixta Spuria, cujus exacerbationes nocte recrudescabant (ut mihi expulsi, & urina liquido constabat) erat primarius morbus, atque tussis, infarctio pulmonum insolita, ac dolor lateris ab hac mixta Rheumatica ortum suum trahebant. Ideoque, ne febris, ob Regiminis neglectum, & celebratam Venæsectionem spiritibus pessundatis, in malignam degeneraret bolum ex theriac. Androm. & pulv. Gascon. ana ʒiʒ. coact. hora somni exhibendum jussi, cum cochl. 4. vel 5. julapii sequentis, quod etiam ad libitum propinabatur.

℞ Aqu. meliss. ceras. nigr. ana ʒiv. epidem. ʒij. Syrup. caryoph. ʒx. M. F. julap. Mane sequenti ʒj. pulv. peruv. in formam haustus redactam præscripti, quarta quaque hora repetendam; Ut phlegma viscidum facilius e bronchiis educeretur; linctum Co. hleatim ad libitum sumpsit. Die sequenti, julti sc. 5. a domo sua rusticana in Urbem reversus, collegam meum eximium D.D. Carolum Goodall, ut mecum consuleret advocavit, qui, tota re audita, lubentissime mecum consentiebat Cortice Peruv. fontem venenatum esse delendum, nec dubitavimus, quin symptomata inde orta vel sponte exularent, vel Remedii propriis facile cederent; Quandoquidem vero Ægrum jam haustum tadebat, idem Remedium in pilulas redactum exhibuimus modo sequenti.

℞ Cortic. peruv. subtiliss. pulverizat. ʒʒ. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. M. F. pilul. xlvij. deaurand. quarum xij. cap. quarta quaque hora, superbibendo haustum julap. prius præscripti. Ad diluendum Phlegma bronchiis impactum, apozema sequens copiose propinandum jussimus.

℞ aqu. Hord. cum Rad. Scorzon: Hispan. ʒiʒ. incoct. ʒij. Syrup. violac. è succo limon. ana ʒiʒ. M. F. Apozema. Ad linguam emolliendam Cochl. unum Mucilag. sequentis sæpius in ore tenendum jussimus.

℞ Mucilag. Sem. Cydon. aqu. plantag. extract. ʒvj. Diamor. ʒvj. M. junio. Urgente adhuc dolore lateris, sanguinis ʒix. illico à brachio detrahebantur, atque pulvis peruv. in formam boli cum Antipleuriticis sequentibus redactus ministrabatur, hora una à venæsectione, & repetebatur media nocte, & crastino mane, cum haustu julapii prius præscripti.

℞ Cortic. peruv. elect. subtiliss. pulverizat. ʒij. mandib. Lucii. Dene. Aprug. ana gr. v. Syrup. capil. Vener. q. s. M. F. bolus mollis. Sumpsit etiam Cochl. ix. Apozematis sequentis calide quarta quaque hora.

℞ Decoct. pectoral. depurat. ʒij. Syrup. è v. Rad. e. Succ. Citri, Capil. Ven. ana ʒʒ. M. F. Apozema. Pannus Wallicus insuper, oleo Palmicis calide unctus ad partes dolentes applicabatur, & illitiones bis in die repetebantur. Junii 7. Urinam copiosam cum laudabili hypostasi innatante reddidit, atque melius se-

se habuit, cunctis symptomatis jam sensim decrescentibus: Ideoque bolum ex ʒʒ. pulv. peruv. ad venenum penitus tollendum, quarta quaque hora ministrandum jussimus, & Cochl. unum vel alterum Syrup. sequentium in haustu largo Aquæ hordei solutorum sæpius propinandum, ad expectorationem facilitandam.

℞ Syrup. e Succ. Citri. Violac. e v. Rad. ana ʒij. M. Præscripsimus insuper Cochl. 4. vel 5. Julap. sequentis in languoribus ad libitum sumenda.

℞ Aqu. meliss. lactis Alexiter. ana ʒiv. Cinnam. hord. Epidem. ana ʒiʒ. marg. præparat. ʒiʒ. Sacchar. alb. ʒʒ. M. Junii 8. reversi, cum jam Ægrum bolorum, pitularum, & haustum taderet; Apozematis febrifugi sequentis Cochl. 9. quarta quaque hora ad curationem complendam præscripsimus.

℞ Cortic. peruv. elect. ʒij. Aqu. F. ʒxij. Coq. lento igne ad dimid. & cola, repetendo colaturam & coctionem ad omnimodam amaritudinis e cortice extractionem; Colaturis simul mixtis & depuratis add. Syrup. capil. ven. è v. Rad. ana ʒiʒ. M. F. Apozema. Sub noctis ingressum, ab haustu aqua sue theriacalis epoto, sudoribus Universalibus, quasi criticis persusus Æger placide dormit; mane sequenti eum invenimus æquum, à Dolore, Tussi, Dyspnœa, reliquisque symptomatis plane liberatum, Urina etiam integre restituebatur; Quocirca ei valediximus, postquam in mandatis ei dederamus, ut ʒj. Corticis, Prophylaxeos gratia, post intervallum octo dierum, in formam sibi gratissimam redactam repeteret. A quo tempore, hucusque optima valetudine utitur.

Historia I X.

Dominus Gumley, habitans ad insigne Cærulei Apris in Platea dicta *Le Strand*, Vir quinquagenarius, quadantenus obesus, atque a multis retroactis annis non nihil Asthmaticus, ubi jam per quadriduum ad minimum, dolore Punctorio regionem inter Hypochondrium & Ileum sinistram sitam occupante laborabat, nostram opem petiit, de hoc molesto symptomate unicè querens. Alvum deiecit, & Urinam more solito reddidit, neque Nausea, vel Vomitione afficiebatur, adeo ut Colicam vel Nephriticam affectionem jure merito suspicari non licuerit; Neque Tussis, aut Dyspnœa aliqua insolita Pleuritidis, vel Peripneumonix suspicionem fecerit: Neque equidem locus affectus huic conjecturæ minime favebat: Cum autem inspexissem Urinam multa rubedine tinctam, & turbatam, Febrile & Venenatum Fermentum spiritibus implicitum (utut neque à Pulsi. Siti, Lingua vel Temperie Febrem præsentem dignoscere potuerim) Causam doloris esse deprehendi, dum spiritus, in hisce partibus præsertim, depressi, nilu quodam sese expandere moliebantur. Cui sententiæ Exacerbatio doloris periodica multum favebat. Indeque, ad efferum & spasmodicum spirituum motum compescendum ʒxij. sanguinis e cubito lateris dolentis die Decemb. 29. 1689. illico detrahendas jussi; atque nocte sequenti bolum è theriac. Androm. & pulv. è chel. cancr. comp. ana ʒʒ. confectum, deglutendum, & julapium Cardiacum temperatum

tum ad libitum bibendum, quo vis spirituum elastica post venæsectionem promoveretur. Die tricesimo revertus, inveni Ægrum sudore persutum, placide dormientem, neque spalmis adeo horrendis ut prius lancinatum, urina vero adhuc erat plane febrilis. Quocirca, linctum pectoralem ex Ol. Amyg. d. rec. syrup. ex Erythim. ana ℥ss. Sacchar. Crystal. alb. ℥ss. confectum, ad expectorationem phlegmatis bronchii impacti promovendam præscripti Cochlearium sumendum, atque hauritum febrifugum cum ℥j. pulveris peruv. quarta quaque hora repetendum ad septimam usque vicem, ut inde seminium venenatum febrile spasmos jam efficiens, & deteriora symptomata denuntians, penitus deleteretur. Die Januarii primo, quandoquidem Æger tædio haurituum afficiebatur, ℥iij. pulveris febrifug. iussu in pilulas 36. redigendis, atque earum sex, quarta quaque hora, exhibendas. Januarii secundo Ægrum præterspem inveni evidenter febricitantem, inter somniamdum variis Phantaliniæ terrorem, atque penè delirantem. Indeque, ubi de viribus Corticis hoc in casu dubitare inceperam; & methodum tritam Antiquorum experiri, vacillante licet animo, decreveram; solum Diaphoreticum, una cum haustu cordiali, hora somni repetendum duxi, atque Alvum ℥ij. decocti Amari cum dup. sennæ, mane sequenti, leniter subducendam. Die tertio, purgatione jam finita, solum Theriacalem iterum repetendum iussi, atque emplastrum Cephalicum cum dup. Euphorb. Ad plantas pedum applicandum. Cum autem die quarto, ab hac leni evacuatione Dolorem lateris nullo modo relevatum, cerebrum autem vacillans, tendines subultu tremulo affectos, pulsuque debilem, aliaque triumphatæ naturæ, & malignitatis indicia observarem; multum dolebat mihi animus de Amico meo integerrimo ac antiquo, qui jam fere per viginti annos opem medicum à me unice petere solebat. Quum autem mente seriò revolvisssem methodum, cui in posterum insistere me oporteret; tandem, accerito pharmacopœo, iussi, ut portionem aliquam Corticis peruv. qui in Officina tunc prostabat venalis, mihi adferret. Quofacto, clare perspexi Ægrum non ex errore medici, verum pharmacopœæ inscitia vel incuria, in periculo versari. Bone Deus! Qualem corticem? Spuriū, effectum; insipidum, cariosum; Vix inter tres libras totidem uncias veri & vegeti corticis inveni. Utunque, amicitia ergo, ex hoc sterquilinio tres vel quatuor uncias selectissimi corticis, gustando, ac oculis explorando, separavi, atque in manus pharmacopœæ, in usum Ægrotantis, ad Apozemata & bolos conficiendos (quippe hauritus & pilulas jam fastidiebat) tradidi, ita ut ℥ss. in formam boli cum syrup. Caryoph. redacta, uā cum ℥iv. Apozematis febrifugi, quarta quaque hora ministraretur. Veficatoria etiam duo ad expansionem spirituum promovendam, atque genus nervosum inde sublevandum, ad internos Carpos applicanda curavi; Qua ratione, die sexto, in vado res erat; febris & dolor fere exulabant, appetitus & urina integre restituebantur: Ideoque, ad reliquias febrilis fermenti eradicandas, duntaxat ℥ij. corticis in bolos vel pilulas redigendu-

das (sicut Ægrotanti maxime placeret) una cum ℥bj. apozematis ℥ss. Corticis laturati, partitis vicibus, spatio bidui exhibendas iussi; & ad firmandas partes dolore spasmodico jam diu labefactatas Pannum Wallicium imbutum linimento ex unguent dialth. Ol. Lil. alb. & laterit. confecto, applicandum, atque sæpius renovandum. Die nono, ubi Ægrum integra valetudine utentem observarem, ei valedixi, postquam uium uncie unius pulveris ad recrudescentiam fermenti febrilis antevertendam, die 14. & 27. repetendum præscriptilem, atque etiam cum seriò monuisssem, uti primo instanti me certiore taceret, si forte unquam posthac hisce symptomatis sese correptum sentiret. Hujus sani consilii memor, die 19. Martii sequentis, scil. quamprimum, a frigore suscepto, sese ejusmodi spasmo dolorifico in latere correptum sensisset, me advocavit; Quandoquidem vero nullum symptomata febrile ex pulsu, Temperie, lingua, vel quidem Urina ipsa (quam claram & copiosam reddidit) deprehendere potui, ad efferum & dolorificum spirituum motum compescendum 3x. sanguinis illico è brachio extrahendas iussi, & Juspium Cordiale, ad spiritus refocillandos pro libitu sumendum præscripti: Atque insuper pil. Stomach. cum Gum. 3ß. cum Laudan. Lond. gr ʒss. commixtam, hora somni deglutendam; & ibiv. Aquæ Mineral. purgantium ad ℥viij. Coct. & ℥ss. Lactis alterat. mane sequenti bibendas. Die autem vigesimo, ubi observarem Urinam multa rubedine tinctam (utut nulla alia indicia febris præsentis apparuerint) fermentum prius venenatum recrudescens huic dolori insani, dedisse jure merito suspicatus sum: Ideoque, ut seminium hoc morbi deleteretur, hauritum febrifugum cum 3j. Corticis selectissimi illico propinandum, & quarta quaque hora ad octavam vicem repetendum iussi. Unde die 22. sine quocunque alio Remedio ministrato, à dolore penitus liberatus convaleuit, Urina, & appetitu jam iterum integre restitutus: Neque quidem hac vice, vel in lecto decubebat, aut quodcunque aliud febris sensibile symptomata patiebatur: Præscripti autem ad prophylaxin Potionem Amaram die 30. Martii propinandam, & 15. Aprilis repetendam, atque post unamquaque purgationem 3j. Corticis partitis vicibus sumendam. Die Junii undecimo 1690. (postquam ad triduum sese eodem dolore spasmodico affectum senserat) iterum me advocavit; ubi jam ex urina & pulsu indicia febris præsentis sese prodiderunt; Venæsectione autem, & applicatione linimenti cum Ol. Laterit. &c. atque exhibitione haurituum febrifugorum n. 18. (Bolo Theriacali nocte 15. 17. & 18. quoties scil. spirituum oppressio id requirebat; non omisso) spatio septem dierum plane convaleuit: Quocirca cum iterum dimissi, postquam potionem amaram die 25. sumendam, & Julii 6. repetendam iussissem, atque 3j. Corticis post singulas purgationes partitis vicibus exhibendam. Decimo quinto Novembris 1690. eodem dolore correptus iterum decubuit, febre etiam evidenti, atque Tussi & Anhelitu, ab infarctione bronchiorum plus quam antea affectus. Ideoque post detractionem 3x. sanguinis è cubito lateris affecti, & usum linimenti

anodyni, præscripti Haustus 14. Febrifugos cum Pulv. Peruv. & Linctum Pectoralem ad libitum sumendum. Deinde die 18. Linctum febrifugum, ex 3v. Cortic. Pulverisat. Ol. Amygd. d. 3iv. & sacch. cant. alb. 3vi. conficiendum iussu, quarta quaque hora cochlearium sumendum una cum Haustu Apozem. febrifugi, & Emplastr. Cephal. ad plantas pedum applicandum. Die vicelimo Julap. Perlat. & Bolo Theriacali Spiritus oppressos resuscitare moliebar. Die 21. & 22. Haustum febrifugum mane & vespere repetendum imperavi, & Apozema febrifugum horis intermedii; Unde a dolore, ac febre penitus liberabatur; Neque quicquam aliud præscripti præter repetitionem Haustum febrifugorum die 22. *Novembris*, & die primo *Decembris* sequentis. Prophylaxeos gratia. A quo tempore huc usque convaleuit, nisi quod nuperrimè eodem dolore stringeretur, ac primo fere momento, ex meo consilio, unctam unam Corticis devorabat partitis vicibus, & iterum illico convaleuit.

Eodem modo Dominus *Immins* habitans prope Templum Suecum in vico dicto *Little Trinity-Lane*, hoc ipso Anno, acutissimo dolore Hypochondrium sinistrum occupante correptus, præ vehementia symptomatis ejulans, & pene ad deliquium usque oppressus (frigentibus etiam extremis) tandem à Me open petiit. Celebrata Venæsectione, Bolo Theriacali, Julapio cordiali & Linctu Pectorali exhibitis, & Linimento Anodyno applicato, motu spirituum effero exinde quadantenus sedato, multò melius sese habuit. Nullum indicium Febris in Temperie, Lingua vel Pulsu se prodebat, Urinam verò multa rubedine tinctam, & in lateritium colorem præcipitatum reddebat. Quocirca, Pulverem febrifugum in formam Haustum, Bolorum, Apozematum, & Pilularum redactum, per plures dies præscripti; Venæsectione etiam repetitâ sapius, pro re natâ, atque Alvo tandem, post debita intervalla, iterum iterumque subducta; unde tandem, post Aphthas in Gutture & Ore succrescentes (licet vix aliud indicium febris evidens adfuerit) Dolore inter latus sinistrum & Scapulum dextram diu versatili, plurimum licet attenuatus & debilitatus, liberatus demum reconvalefcebat.

Historia X.

Uxor Domini *Patchin* Vitriarii habitantis in vico dicto *Broad-street*, nuper, scil. sub initium *Aprilis* 1691. cum Annum Etatis sue circiter trigessimum septimum ægeret, à frigore in puerperio suscepto febricitans, dolore primùm Maxillæ, dein Lateris spasmodico, horrendo ac atroci corripiebatur. Unde Medicus ejus ordinarius *D. D. Cress*, eam pro Pleuriticâ curavit; Indeque 3 viij. Sanguinis è cubito detraxit, Linimento ex Ol. Scorpionum partem affectam illinendam, atque Linctum ex Ol. Amygd. dulc. rec. syrup. capil. Ven. & sacch. crystal. alb. confectum, cochlearium sapius exhibendum iussit. Dolore autem inde à Latere ad Maxillam, & aurem dextram rursus translato, sanguinis 3 viij. vel x. iterum detrahebantur, & ad dolorem sedandum, 3ß. syrup. de Mecon. ministrabatur. Unde Maxilla & aure quadantenus relevatis, dolor in Latere recrudescebat una cum febre sa-

viebat ut prius; Vires autem languentes & lassæ, à repetitis Venæsectionibus, Dolore & Febre plurimum prosternebantur; Siquidem mulier erat elumbis, & systemate Nervoso admodum debili, licet ingenti acumine maximo prædita. Die 5. *Aprilis*, Ego accersitus ut de salute Forminæ cum *D. D. Cress* consilium caperem, Vires deprehendi multum deprellas, Pulsû debilem & celerem, Imperium mitè, faciem & Manus madore frigido perfusas, Urinam verò multum tinctam, & sedimentum lateritium deponentem; Dolores, utut verbos, versatiles tamen, ac periodicè recurrentes; Unde ritè conjecta febrim propriè esse *zozæ* spuriam ac Inflammatoriam, Rheumaticam vero potius quàm Pleuriticam; à repetita autem Venæsectione in Malignam mox transiturem; Siquidem Venenum inde auctum vim spirituum Elasticam plurimum obruisse videbatur. Quam ob causam, utut dolor Lateris excrucians urgeret, sanguinem non amplius detrahère ausus sum, verum solum externo, & solum Laudani interno nissum spirituum nimium, & spasmos dolorificos inde consequentes composcere felici cum eventu sategimus; donec Venenum, causam febris, & spasmorum, Cortice subigendi occasio daretur, modo sequenti.

℞. Rad. Petrosel. Fœnic. ana 3ij. Sem. Lin. sœnugrec. ana 3j. flor. Chamæm. Melilot. ana Mj coq. in Aq. l. q. f. Reponatur colatura in Vesica bubula recenti semiplena, & calide ad partem affectam admoveatur. Annota Vesica, pannus laneus mollis Linimento sequenti calide illitus applicetur.

℞. Unguent. Dialth 3ß. Ol. Lil. alb. Laterit ana 3ij M. f. Liniment.

℞. Aqu. cardu 3ij. Epulem. Syrup. caryoph. ana 3ij. Pulv. subtiliss. Cortic. Peruv. elect 3j. Laud. Lond. gr. j. M. f. Haustus statim ab usu solum propinendus, repetendusq; deinceps absque Laudano, quarta quaque hora ad 4. vices. Junii 6. invenimus Agram à dolore Lateris spasmodico liberatam, Urina verò multa rubedine tingeatur, & sedimentum lateritium deponebat, aderant etiam alia *zozæ* præsentis indicia. Indeque iussimus, ut perilliteret in usu Haustum febrifugorum adhuc ad 4. vices, & ut alternis Haustibus adderetur Laudani Lond. gr. j. ad revirescentiam spasmorum antevertendam. Decoctum album etiam pro potu ordinario præscriptum, ob nimiam Alvi lubricitatem. Junii 7. Febris profligata videbatur; Urina fere in sanum colorem restituebatur, Pulsus tamen erat languidus, atque Agra insomnis jacebat, perterrita, & quasi delira, unde facile deprehendi spirituum animalium vacillationem & imbecillitatem à debilitate systematis Nervosi ortam; Indeque in subsidium cerebri & generis Nervosi Emplastr. Cephalic. cum dup. Euphorb. ad plantas ledum, Epispastica ad Brachia & Iubias internas, Hystericum cum Galbano in margine, ad regionem Uteri applicabantur. Nodulus ex Sem. Rut. Pulv. Castor. Galban, & ass. scetid. confectus, & aceto irroratus parabatur, quem sapius oscit, aut ejus loco, spirit. Castor. & sal. armon. in phiala collo arcto & oblongo prædita. Insuper, frons & tempora sapius illinebantur Manu frigida Linimento ex Unguent. Popul. 3ij. Acet. Sambuc.

Sambuc. Aq. & Ol. Ros. ana ʒi. Detique iv. pilularum sequentium quarta quaque hora Agra deglutiit, superbibendo Cachl. ʒ. vel 4. Julap.

℞. Pulv. Chin. Chin. ʒij. Callor. Gum. Galban. ana ʒʒ. Añ. Fœtid. ʒis. Mithridat. q. l. M. F. Pil. mediocres deaurand.

℞. Aqu. Ceras. nigr. Flor. Paralyf. ana ʒij. Pzon. comp. comp. ʒj. Tinctur. Callor. ʒij. Sacch. Perlat. ʒis. Syrup. Flor. Paralyf. ʒis. M. F. Julap. Quandoquidem vero nihil protulerimus, lunu 8. ad spiritus excitandos imperavimus, ut toti pedes calide involverentur Cataplasmate ex Fol. Rut. Sapon. rug. & Sale commun. contulis confectis; Et ad tervorem Cerebri inquietum temperandum, Ut Frons & tempora sæpe frigide illinerentur linimento sequenti.

℞. Camphor. ʒij. Sacch. Saturn. ʒʒ. Ol. Nymph. Acer. Sambuc. ana tantillum. M. & terantur in formam linimenti; Insuper, ut bolus ex Ent. Veneris (cujus vires in Hypochondriacorum & Hyftericarum vigiliis & Deliriis temperandis efficaces sæpius expertus sum) gr. vij. & conserv. Flor. borag. ʒis. confectus, his terve in die exhiberetur cum Haustu przlargo Julapii sequentis.

℞. Aqu. Fl. Paralyf. Papav. Rhizad ana lbʒ. aqu. Pzon. Bryon. comp. ana ʒj. Tinctur. Callor. sp. sal. ammon. ana ʒʒ. Syrup. Flor. Paralyf. ʒij. M. F. Julap. Sub vesperam ejusdem diei hæc symptomata, non tam a debilitate Systematis Nervosi, quam a gradu veneni aucto ortum suum duxisse suspicari lunus, & sc. febre a repetita venæsectione, & usu laudavi in Malignam & mutata; Bolum igitur Alexipharmacum ex Theriac. Androm. Pulv. & Chel. Cancr. comp. & tantill. Syrup. Caryoph. confectum, hora somni exhibendum jussimus. ad expansionem spirituum promovendam, idque cum optato eventu, Somnum enim magis placidum inde capessibat Agra à Deliriis & Lipothymii plurimum liberata. Quocirca eundem Bolum Junii 9. ter in die repetendum duximus, unicuique bolo addendo Rad. Serpentar. Virgin. gr. 7. Insuper. 2. pilul. sequentium, in subsidium generis nervoli vacillantis, sextâ quaque horâ exhibuimus unâ cum coch. 4. vel 5. Julap. sequentis. quod etiam ad libitum bibendum erat.

℞. Gum. Galban. Ammoniac. ana ʒʒ. Callor. Añ. Fœtid. ana gr. xv. M. F. Pil. xxiv. optime deaurandæ.

℞. Aqu. Rut. meliss. cinnam. hord. ana ʒij. Epidem. Pzon. comp. ana ʒis. Confect. Alchem. ʒis. Syrup. caryoph. ʒj. M. Repetebatur Cataplasma. Die 10. eisdem bolos ter repetendos jussimus, itidemque undecimo, quo die Glans ex Melle & Alumne coctis, ob alvi Constipationem, intrudebatur. Die duodecimo repetebantur boli ut prius; Insuper, ad expansionem spirituum ulterius promovendam Vesicatoria duo pone anres applicabantur, & Suppedanea ex Gum. Galban. & Emplastr. Cephalico. Die 13. Urina rubescere iterum cœpit, & contentis saturari; atque Agra multo melius se habere. Ideoque bolum Alexipharmacum tantum bis in die exhibendum jussimus, atque (ob Alvi adstrictionem) Glandem ex Hierâ Pier. alum. & Melle simul coctis intrudendum. Cum sensim indies revalescere videretur, die 14.

& sic deinceps usque ad decimum nonum, bolum Alexipharmacum hora somni duntaxat deglutendum præscripsimus; Decimo nono autem Rad. serpentar a Bolo detraximus, & pilul. Hyftericas repetendas jussimus, Omissa autem bolo, nocte vigesima multum conquerebatur de Cerebri vacillatione & spirituum languore adeo ut bolum hora somni exhibendum iterum præscribere coacti essemus, & Glandem recens intrudendam, nec non Epispasticum ad Nucham de novo applicandum. Vigesimo tertio vero, cum & legitima cum paroxysmis, & Remissionibus periodicis sociata reverteretur, ʒj. Corticis ter in die, ad triduum exhibendam jussimus, atque bolum Alexipharmacum mane & vesperi. A quo tempore plane convaleuit, multa artis nostræ ope, eaque diu continuata, difficulter admodum ab Orci faucibus liberata. In aëre rusticano quidem, semel, vel bis levem Recidivationem, intra spatium duorum mensium perpessa est, illuc vero repetito Corticis usu liberabatur.

Historia XI.

Dominus Guttur Ludi Magister, habitans prope Hospitium Ecclesiæ Christi, vir habitu œdematoso, a frigore sæpius suscepto Anno 1690. subito algore, rigore ac horrore, deinde flagranti Aëtu correptus, lactatione, Vigiliis, siti immensa, Respiratione anhelosa, Hypochondriorum oppressione gravativa, vomitione immani, dolore horrendo ac Inflammatorio, ab uno artu in alterum versatili, reliquisque febris vere Rheumaticæ & inflammatoriæ Sympptomatis laborans, tertio Morbi die sub vesperam me accersivit. Cum advenissem, pulsus deprehendi fortem ac celerem, minam multa rubedine tinctam ac in colorem lateritium præcipitatum; Sympt. natum autem vehementi Aëgotatis adeo confectus erat, & madore colligativo peritius, ut lachrymantes Amici de sanitate ejus recuperandâ desperarent. Ab æstantibus autem probè intellexi exacerbationem horum dirorum symptomatum quavis nocte recrudescere solere, unde de spe, quam matutinis horis conceperat, sub noctis ingressum decidebat, & vix sese ad matutinam sequentem superstitem fore putabat. Præterea, in unoquoque paroxysmo, dolor Inflammatorius intactum adhuc artum indies corripere solebat, adeo ut manibus pedibusque mancus, præ dolore sere continuo ejularet, ac vociferaretur. Ad ætherum hunc nifum & Orgasimum demulcendum, post Enematis rejectionem, sanguinem copiose ad ʒxij. vel xiv. illico paroxysmi tempore detrahendas jussi. Tincturam Rosarum ad sitim relevandam, Haustum Hypnoticum cum ʒi. Syrup. de Mecon. ad spiritus ulterius compescendos, & Julapium Perlatum temperatum ad vires resocillandas ad libitum pitissandum præscripsi. Quo pacto, post somnum hoc modo conciliatum, mane sequenti, (cum sanguinem planè mucosum vidiissem,) Remissionem evidentiorē nactus, Haustum febrifugum cum ʒj. Corticis ad veneni extirpationem, quod spiritus stimulando, eos in hos tumultus adegerat, & prælium indies instaurando, idem in posterum sine fine facturum esset, tertiâ quaque horâ ministrandum sine

sine morâ jussi : Paroxysmo pro more suo recrudescente, omnia symptomata iterum exacerbari cœperunt, & aliud Membrum dolore & tumore inflammatorio recens invadente, immaniter excruciabatur. Has Exacerbationis vices ad triduum æquo animo tulit Ægrotans, siquidem curationem se brevi consecuturum hac Methodo expectavit; atque interea temporis probè novit Me (quantum poteram) symptomata sublevasse. Cum autem post tertium paroxysmum, atque 31β. Corticis in varias formas redacti deglutitam, nihil levaminis sensisset, atque dira symptomata, itato Exacerbationis tempore, indices potius augerentur, animo deipondebat; Neque minus ego ipse erubescens atque dolens, demum anceps hœsitabam. Denuo autem exploratione diligentiori factâ, inscitiam vel incuriam Phr. natopœi culpandam novi, qui Corticem nescio qua ingrata amaritie tuncum, viscidum, & plurimum effectum ministraverat. Quocirca, sanguinis 3 xii. iterum e brachio detrahendas jussi, atque 3 ij. vegeti ac veri Corticis Peruv. partitis vicibus extra paroxysmum ministrandas curavi; Unde Æger à febre prorsus liberabatur: Et dolores Rheumatici indices decreverant. Fomite autem febrili hoc modo subacto, cum vita Ægri in vado esset, neque amplius a tutura recrudescentiâ metuerem; Humores coliquatos, Artus debilitantes Decocto amaro & Syrup. de spin. cerv. per alvum *per imaginem* subduxi semel in hebdomada, post singulas purgationes vium Corticis iterum imperando, ne fomes febris inde resuscitaretur. Quo pacto, spatio trium hebdomadarum, à reliquo versatili dolore liberatus (Artubus sensu in indices restitutis) convaleuit, atque hucusque sine Recidivatione valet, nec adeo œdematoso corporis habitu est, ut prius.

Historia XII.

Dominus *Glascock*, Presbyter Reverendus, Vir valetudinarius, & systemate Nervoso admodum debili, habitans in *Le Strand*, à frigore, durante usu Aquarum Miner. lium Chalybeatarum, suscepto, febre ac dolore inflammatorio, hinc inde in Artubus versatili correptus, *Junii* 18. 1691. à Me opem petiit. Pulsus, exploratione factâ, deprehendi celerem & quadantenus fortem, Urinam rubram & contentis saturatam. Appetitus erat prostratus, Ventriculus Nauseâ & proclivitate ad vomendum affectus: Noctes transiebat infornes & inquietas, copioso dolore semper in lecto peritusus, Exacerbationem quippe sub vespere quotidie perpetiebatur. Quocirca, in subsidium virium ex perpetuis vigiliis languentium, Curationem, ab Haustu Pægorico sequenti, horâ somni propinando auspiciatus sum.

℞. Aqu. Meliss. Ceras. nigr. ana 3 i β. Epidem. 3 iij Syrup. de Mecon. 3 vi. M. F. Haustus. Mane sequenti 3 viii. vel ix. sanguinis (qui admodum gelatinosus erat) detrahendas jussi, atque dein 3 j. Pulv. subtiliss. Peruv. quarta quaque hora ad 8. vices exhibendam e cochl. Julap. sequentis, superbibendo ejusdem Haustum.

℞. Aqu. Meliss. ceras. nigr. ana 3 iv. Epidem. Pæon. comp. Syrup. Caryoph. ana 3 i β. M. F. Julap. *Junii* 20. Pulveris Chin. Chin. sex

novas Doses imperavi; Ad sedandam sitim, Tincturam Rosarum saccharo albisimo edulcoratam, ad libitum bibendam concessi, atque ante vespere, si Alvus prius non solveretur, Enema Lactis sacch. nqr. chamamel. alterat. injiciendum præscripsi. *Junii* autem 26. Æger à febre liberabatur ac doloribus; Urinam reddidit colore & quantitate sanæ similem, appetitus vero non integre restitutus erat, quocirca tres Haustus adhuc repetendos duxi ut prius; atque iterum, octo diebus elapsis, post exhibitionem 3 iv. Decocti amari cum dup. ien. & 3 β. Syrup. de Rhamno solut. ad reliquias Humoris colliquati, & in habitu corporis congesti subducendam. Die *Junii* 29. a concione, prorsus vires resarcitæ sunt, habitus, atque frigore inde in poros cutis suscepto, nullo recruduit febris, ac Dolores Artuum inflammationi & versatiles; Urinam intense rubram Æger iterum reddidit, Pulsus in celerem & quadantenus fortem mutabatur, appetitus prosternebatur, Ventriculus Nauseâ, Agitatione & Vomitione afficiebatur, itis aderat ingens, Vigilia & sudores coliquativi, tempore exacerbationis, scilicet per totam noctem durabant, & reliqua febris inflammatoria & Rheumatica symptomata: Ideoque *Junii* 30. 3 viii. sanguinis e crure vel Brachio Lateris maxime affecti iterum detrahendas jubeo, atque 10 Pilulas subsequentium (quia tædio Haustum Æger afficiebatur) quarta quaque hora, cum Haustu Julap. prius præscripti exhibendas.

℞. Cort. Peruv. subtiliss. pulveris. 3 vi. Mucilag. Gum Tragac. q. s. M. F. Pilul. mediocres deaurandæ. *Julii* 4. ob Nauseam immensam, & dolores mobiles in toto corpore, Emeticum sequens sub vespere cum Regimine exhibendum impetro, & Vomitione finita, Haustum Pægoricum sequentem; Die vero proximo 3 iij. Corticis in pilulis redacti.

℞. Aq. Cardu. Vin. Benedict. ana 3 j. Syrup. Viol. M. F. Potio Emetica.

℞. Aqu. Ros. Paralyt. 3 ij. Epidem. 3 β. Syrup. de Mecon. 3 vi. M. F. Haustus. *Julii* 7. reversus, inveni Ægrum plane *dropicis*, atque à doloribus immunem, licet ab humore coliquato congesto Artus adhuc rigiditate & Tumore afficerentur, Ideoque ad Humores demulcendos Decoctum Sarsæ sequens præscripsi pro potu ordinario.

℞. Sars. opt. 3 vi. Rad. Chin. 3 ij. Raf. C. C. Ebor. Santal. Rub. ana 3 β. Passul. maj. Exaccharat. 3 iij. Glycyrriz. raf. 3 β. coq. in Aqu. F. lbxii. ad 6. & cola pro usu. Post 6. dies elapsos, saburram humorum Decocto Amaro cum dup. Senn. per alvum subduxi, atque dein, ter in die pilulas febrifugas num. 12. quotidie exhibui, donec 3 j. Corticis absorberebatur; Idem Catharticum, atque postea Pilulas, post intervallum octo dierum, prophylaxeos gratiâ, iterum præscripsi; Interea temporis admonui Patientem, ut à concionando & omni alio vehementiori Exercitio protinus abstinere. Cui sano consilio morem gerens prorsus revaluit, & hactenus optimâ valetudine utitur.

Dominum *Blakey* Clericum admodum Reverendum, qui à multis retro annis, ex causâ levissimâ Rheumatismo inflammatorio sæpius obnoxius

noxius fuerat, eodem ferè modo, à tribus febribus Rheumaticis, spatio trium Annorum, recurrentibus, sine quocunque alio Remedio, brevi, atque integre restitui.

Historia XIII.

Dominus *Semyr*, habitans in vico dicto *S. Thomas Apostle*, Vir quadragenarius, à frigore in poros cutis sapius suscepto, dolore tandem versatili dextram maximè corporis partem occupante affectus, & in lecto ad tres septimanas detentus, Maii 15. 1690. Cum accersivisset, præ dolore, vix aut ne vix sese ab uno latere in alterum commovere poterat, Sudore pertuendebatur, urinam reddebat intensissimè rubram, ac lateritiam, lingua erat fœda ac arida, Sitis ingens, pulsus Celer, Vigiliæ pertinaces, temperies vero adeò mitis, ut nec æger, nec Pharmacopœia febrem suspicaretur. Æger febre laborabat *Συμψυκτική* spuria Rheumatica, cujus exacerbationes nocte quavis recrudescabant; Tumor cum hoc dolore, ut in vero Rheumatismo, non conjungebatur, quia spiritus irretiti ac impliciti, licet continuo lacesciti, ultimum expansionis suæ gradum non assecuti sunt: Unde etiam febris se minùs prodebat.

Postquam cortex ad aliquot vices exhibitus fuerat, respectu habito ad Symptomata vehementia, die 15. Æger à doloribus ac febre pene liberabatur, pulsus fortis, ac tardus, temperies mitis evasit, sitis pene exstinguebatur, appetitus rediit, lingua tamen quadantenus ardebat, & urina plus justo rubescebat, unde conjeci rem esse in vado, atque naturam veneni reliquias sponte deleturam. Quid sit? spatio unius hebdomadæ Aphthæ quasi criticæ cum Salivatione conjunctæ morbum terminabant, qui solito contumacior erat, vel quia à veneno intensiori producebatur, vel quia Æger nauseabundus vix dimidiam partem Remedii præscripti deglutiebat: Vel quia cortex parum vegetus ministrabatur.

Historia XIV.

Dominus *Kemp*, Mercator Londinensis, habitans in vico dicto *Franchurch-street*, Maii 14. 1690. me accersivit. Ægrotaverat per triduum; Horis antemeridianis e lecto surgebat, non multum sitiebat vel febricitabat, verum adeò Hebes erat ac mente captus, atque arteriarum vibratio adeò vacillabat, ut licet Urina esset ruberrima & lateritia, apoplexiam vel simile aliquod symptoma à veneno febrili subortum suspicaretur. Æger de Languore solo, ac animæ perturbatione conquerebatur. In tutamen cerebri (ut mihi videbatur) præcipuè obfessi, sanguinis 3x. aut xij. illico detrahebantur è brachio, vesicatoria applicabantur, Boli & Iulapia ad spirituum expansionem promovendam cum optato eventu exhidebantur; Die autem 15. hebetudo diminuta est, pulsus factus est æqualis, licet celer, Urina adhuc intensè rubescebat, ac turbabatur, dolor molestus ac Rheumaticus genu ac pedem sinistram occupavit à nisu spirituum venenum adorientium subortus. Sanguis iterum educitur (qui admodum gelatinosus erat) deinde cortex illico exhibetur, cum Laudano commixtus; cum dolor & vigiliæ id postulerent. Quia semur & Crus do-

lens grandi Tumore œdematoso afficiebantur, sequenti linimèto bis in die calide ungebantur.

℞. Unguent. Dialth. ʒβ. Ol. Lil. alb. Laterit. ana p. æqu. M. die 11. febris, dolor, ac Tumor Femoris evanuerunt; Ægerque de Dolo- re humeri conquerebatur. Repetebatur cortex & venæsectio, & die proximo nempe 12. Ægrum dimili perfecte sanatum. Corticem duntaxat, prophylaxeos gratiâ, præscripsi.

Verum, si singulas historias recenserem *Συμψυκτική*, non tantum legitimarum verum etiam spuriarum, quas nuperime, spatio sc. unius mensis, hoc pacto felicissime sanavi, in senili vel infanti ætate, atque in ipso puerperio, nimius essem. Fateor equidem, ubi spirituum Elasticitas à veneno ita opprimitur, ut vires Antidoti regi & in actum deduci inde non possint, & *Συμψυκτική* in *Σύννευ* Malignam degeneret, me haud raro fortem cæterorum Medicorum participasse, & restitutionem Elasticitatis spirituum Enecatorum fere, & sphacelatorum, methodo quacunque, sæpe incerto, sæpe incalsum tentasse. Palam autem affirmo me multò plures hujusmodi Ægrotantes, Deliriis, subsultibus tendinum, cæterisque id genus symptomatis Malignis obfessos, ab Orci faucibus arte liberaffe, ubi antidoti usus curationem auspicabatur, quàm cum ab initio, aliâ quacunque Methodo uterer; modò cum accersitus primò essem, umbra aliqua Remissionum & Exacerbationum superesset. Fundamentum Curationis in cortice semper jacio; Postea pro modulo ingenii, juxta Normam artis, quod à symptomatis indicatur efficio, atque haud rarò cum optato successu Curationem ad umbilicum duco: Coronidis loco, unum vel alterum hujusmodi curationum exemplum hic addam.

Historia XV.

Dominus *Shakel* Stannarius, habitans in Plateâ dicta *Faenchurch-street*, Vir quadragenarius, obeso quadantenus Habitu, & pulmonibus infarctis, qui jam per quadriennium, scilicet à quo tempore Rheumatismo universali correptus perperam Emplastris è linacibus contusis ferè ad totum corpus frigide applicatis, cæterisque ejusmodi, à medico suo ordinario præscriptis, Cerebri & Syllæmatis nervosi tanta debilitate laboravit, ut sapius in die, præsertim cum esset cogitabundus, attonitus reminiscentiâ omni planè orbatus sit; qui insuper ter, quaterve insultus Apoplecticos leves aut saltem Epilepticos passus est; Cum ad bihorium, Algore, Rigore, & horrore adeò vehementi corriperebatur, ut mane toto, in Lecto decumbere cogeretur, morbum aliquem novum, ac insolitum in genere nervoso expectans; Junii 15. 1691. Me accersebat. Eum autem (præudio Paroxyfmi finito) intensissimè febricitantem inveni, immensè sitientem, in Hypochondriis inflatum, anhelosâ respiratione oppressum. Sese inquietè è loco in locum jactabat, facies, quasi ex strangulatione, rubedine perfundebatur; Urina erat sanæ similis, quia Flamma in sanguine vix dum accendebatur; vibrationem Arteriarum (exploratione factâ) citissimam; constantem verò, ac fortem deprehendi: De genio igitur febris hæstans, utcunque ab info-

lita debilitate cerebri suavis, in ejusdem tutamen, durante hac effervescencia, \bar{z} x. Sanguinis e Brachio illico detrahendas jussi. Ne autem Venenum inde, de spiritibus prius debilibus victoriam reportaret, cochl. 4. vel 5. Julap. sequentis, ad eorum expansionem promovendam, quarta quaque hora exhibenda duxi.

\mathcal{L} . Aq. Melil. Ceras. nigr. ana \bar{z} iv. Epidem. \bar{z} ij. Pulv. e Chel. Cancr. comp. Lap. Contrayerv. ana \bar{z} is. Syrup. Caryoph. \bar{z} x. M. Bolum etiam sequentem hora somni deglutendum una cum Haustu Julap. præscripsi; atque tam ad præsentem Aivi fluxum sistendum, quam ad fervorem sanguinis moderandum Decoctum album sacchar. albiss, grate edulcoratum in locum potus ordinarii substitui.

\mathcal{L} . Theriac. Androm. Pulv. e Chel. Cancr. comp. ana gr. xv. Syr. Caryoph. q. s. M. F. Bolus. Cum die sequenti scil. 16. reversus essem, Ager sudore levi perfundebatur, atque Calor post somnum nocturnum remissior erat, Pulsus non ita celeriter ut prius, constanter verò, ac fortiter vibrabatur, Urina multa rubedine tinge-batur, & contentis saturabatur, Alvus adstringebatur. Ideoque, Exacerbatione finita, Enema sequens injiciebatur.

\mathcal{L} . Decoct. Emollient. \bar{z} x. Mel. Mercur. Sacchar. rub. ana \bar{z} ij. M. Atque dein Bolus Cardiacus repetebatur cum Haustu Julap. sequentis, quod etiam Aegro ad libitum propinabatur, agi ara phiala.

\mathcal{L} . Aqu. Lact. Alexiter. \bar{f} ij. Epidem. Cinnamon. Hord. ana \bar{z} j. Sacch. Perlat. \bar{z} j. M. Ager Decoctum album, loco potus ordinarii, adhuc hauriebat: Quippe a multis annis, ex consilio prioris Medici, ab usu Cerevisiæ prorsus abstinuerat. Suppedanea ex Emplastr. Cephalic. cum Dup. Euphorb. in cerebri tutamen, ad plantas pedum applicabantur: Sub noctem ejusdem diei reversus, Aegrum observavi post Exacerbationem, quæ eodem die recrudescebat, rursus sudore peritum; Cerebrum autem, ut ab altantibus didiceram, durante Exacerbatione, quantenus confundebatur; Ideoque Bolum Cardiacum hora somni repetendum duxi, atque Vesicatoria duo ampla & acria ad internos Carpos supra Pulsus applicanda, & Julap. cum speciebus denuo repetendum, & quarta quaque hora exhibendum. Die 17. manè, cum manifestior adesset Remissio, Haustum Febrifugum cum Pulv. Peruv. \bar{z} j. illico propinandum jussi, atque quarta quaque hora repetendum, donec Exacerbatio redintegrari inciperet, & Julap. Perlat. repetendum. Sub vespertam reversus, Remissionem nactus Paroxysmi, qui eodem die iterum recrudescebat, Haustus Febrifugos quarta quaque hora repetendos jussi, nec non Bolum Cardiacum hora somni exhibendum, & Decoctum album pro potu ordinario hauriendum. Die 18. ob Dysuriam, quam Vesicatoria effecerant \bar{z} iv. Emulsionis sequentis, quarta quaque hora propinavi.

\mathcal{L} . Sem. rv. frig. maj. ana \bar{z} j. Sem. Papav. alb. \bar{z} is. Amygd. d. decorticat. num. 9. cum Aqu. Hord. puriss. \bar{f} iij. F. Emulsio, cui add sacchar. alb. \bar{z} j. Aqu. Ros. \bar{z} ij. M. Persistebat Ager in usu Decocti Albi & Julapii; Atque Julapium cum speciebus, quarta quaque hora Exacerbationis exhibebatur, durante verò Remissione

Haustus Febrifugos Ager quarta quaque hora repetebat: Sub vespertam, ob Dolorem Lateris Spasmodicum, Pannum Wallicum Ol. Palmic. illitum ad Regionem Pulmonum applicandum jussi, necnon Bolum Cardiacum hora somni, & Haustum Febrifugum quarta quaque hora exhibendum. Die sequenti, scil. 19. Exacerbatio per totum diem non recruduit, Ager Urinam reddidit copiosam, Urinæ sanorum tere similem, ac laudabili hypostasi donatam, Dolor Lateris etiam obtundebatur; Attamen Phlegma Pulmonibus impauctum Aegrè admodum egerebatur. Ideoque cochl. 1. Lincus sequentis una cum \bar{z} iv. Apozem. subtepid. quarta quaque hora ministrandum jussi.

\mathcal{L} . Ol. Amygd. d. rec. Syrup. Cap. Ven. ana \bar{z} i \bar{z} Sacchar. Crysal. alb. \bar{z} is. M.

\mathcal{L} . Decoct. Pector. opt. depurat. \bar{f} iij. Tin-ctur. Croc. \bar{z} is. Syrup. de Elyum \bar{z} is. M. Duos etiam Haustus Febrifugos tempore diurno exhibendos curavi Sub vespertam Pulsus, Urina, &c. eodem fere modo, quo manè sese habebant: A mentis autem levi vacillatione, & Linguae sc-ditate ac ariditate aucta, suspicatus sum à veneno spiritus æquante Febrem in primum Malignitatis gradum transisse, ideoque præter usum Haustum Febrifugorum, Julapii cum speciebus, & Decocti Albi, Bolum Alexipharmacum ex Theriac. Androm. Pulv. Gasson. ana \bar{z} is. & tantillo Syrup. Caryoph. commatum, hora somni ministrandum jussi; necnon Vesicatorium amplum & acre ad Nucham applicandum, & Os Gargarismo sequenti sæpius oluendum.

\mathcal{L} . Aqu. Plantag. \bar{z} vi. Diam. or \bar{z} j. Mell. Ros. colat. \bar{z} is. M. Die 20. (Crisi. Colleg. D. D. Gerdall advocato) communi consensu præscriptus repetitionem Haustum Febrifugorum sexta quaque hora, ne non Lincus, Limentis, Apozematis, Pectoral. Julapii Perlati & Decocti albi, atque insuper (ratione Doloris Later. lis) \bar{z} ix. Sanguinis e Brachio Lateris affecti detrahi ius. Junii 21. Enema manè repetendum jussimus, ut prius, necnon Vesicatoria duo ampla & acria ad interna Brachia applicanda, & \bar{z} iij. Tincturæ seu Decocti Corticis quarta quaque hora exhibendas: Sub vespertam Bolum ex Theriac. Androm. & Pulv. e Chel. Cancr. comp. ana \bar{z} is. cum tantillo Syrup. Caryoph. confectum, hora somni exhibimus, una cum Haustu Julap. Perlat. atque post sudores finitos Bolum e Cortic. Peruv. \bar{z} is & Syrup. Caryoph. q. s. post mediam noctem & quinta & octava matutina repetendum, cum Haustu Decocti Corticis ante præscripti; Quippe Febris adhuc aliquomodo exacerbabatur, & remittebat; Atque cochl. unum Mucilaginis ad Linguam emolliendam sæpius in Ore tenendum, præsertim ante & post Bolum exhibitum; Et quoniam Aegrum tandem Julapii Perlati exderet, aliud substitui-mus, nempe.

\mathcal{L} . Aqu. Meliss. Ceras. nigr. ana \bar{z} iv. Cinnamon. Hord. \bar{z} ij. Pæon. comp. \bar{z} ij. Syrup. Caryoph. \bar{z} x. M. F. Julap. de quo bibat cochl. 3. vel 4. ad libitum. Die 22. reversi, Aegrum invenimus ferè sanum, Urinæ rubedinem iterum reducem, Pulsu fortem & regularem, & Temperiem mittem: Placide insuper dormiverat, sed efflorescentia Miliaris facis vivida & rubra per collum & pectus undiquaque spargebatur. Indeque.

ut efflorescentia hæc Critica promoveretur, vires spirituum sustentavimus Alcalibus & Alexipharmacis modo sequenti.

℞. Pulv. ē Chel. Cancr. comp. ℥j. Sal. Prunel. ℥ss. Sacch. alb. gr. xv. M. F. Pulv. sumend. ē cochl. uno Julap. cord. superbibendo ejusdem cochl. iij. repetendusque quartā pomeridianā. Hora somni Bolum Theriacalem repetendum jussimus, hora tertiā & octavā matutina Haustum Apozematis Febrifugi ministravimus. Perseverabat Ager in usu Linctus, Apozematis, Julapii Cordialis, & Mucilaginis. Die 23. Pulverem Cardiacum de noctua matutina & tertia pomeridiana repetendum jussimus, & Bolum Theriacalem hora somni exhibuimus, necnon Linctum, Apozema Pectorale, Julapium cordiale & mucilaginem prius præscripta ad infarctionem Pulmonum tollendam. Die 24. discedente jam Collegā, Ego solus præscripti Pulverem statim repetendum, & Bolum Theriacalem hora somni cum gutt. viij. Laudani liqu. ob dolorem Lateris Rheumaticum, de quo solummodo jam conquerebatur. Die 25. ad dolorem Lateris tollendum, quo adhuc, præsertim inter tussendum agebatur, præscripti Potum sequentem una cum Linimento ante præscripto ad partem affectam applicandum, atque cochl. unum Olei Lini recens sine igne extract. secunda vel tertia quaque hora cum Haustu Apozematis Pectoralis exhibendum, cujus vires anodynas, & deterivas jam sæpius expertus eram.

℞. Rad. Petrosel. Fœnic. Semin. Lin. Fœnugræc. ana ℥ij. Flor. Chamæm. Melilot. ana Mj. Coq. in Aqu. F. q. s. Colatura reponatur in Vesica bubula recenti, ita ut semiplena sit, & tepidè ad Latus affectum applicetur, ad horæ vel semihoræ spatium; Amota Vesica, applicetur Pannus Wallicus calidè illitus Linimento antè præscripto. Bolum Theriacalem hora somni, & Haustum Julapii repetendum jussi. Junii 26. præscripti cochl. unum vel alterum Mixturæ sequentis, omni nocte sub ingressum Lecti exhibendum, donec Tussis (quod symptoma solvūdo jã supererat) mitigaretur.

℞. Syrup. Balsam. ℥iv. Laudan. Liqu. Helmonit. ℥j. M. Appetitu verò restituto, & viribus jam resarcitis, tandem suboriebatur Tumor Crurum œdematosus, quem facillimè tribus vel quatuor purgationibus superavi, post quas tamen Corticem repetendum, & Vinum Chalybeatum præscripsi. Ex his Ager integrè restitutus, optimā valetudine hucusque utitur, plurimum etiam à veteri & afflicta cerebri & generis Nervosi mala affectione liberatus.

Historia XVI.

Domina Maria Lechmere, habitans in vico dicto *Walling-street*, Virgo prudens ac proba, quam ante sex annos *1781* simplici laborantem integrè, idque brevi, restitueram; nuperimè, scil. die Junii 2. 1691. circiter Annum Etatis suæ vicenimum sextum sæpius in die de Frigore & Calore alternatim se excipientibus querebatur. Quaquam noctes transigeret insomnes, quia tamen tempore diurno symptomata remittebant, quotidie Lecto surgebat, obambulabat, atque munis solitis quādamtenus fungebatur usque ad diem 16. Morbo autem

jam plurimum incrementum, Enema sibi ministrandum jussi, atque dein ℥ix. Sanguinis e Brachio detrahendas, atque Julapium Cordiale à Pharmacopœo petiit, ob præsentem linguam ad libitum sumendum. Die 17. in Lecto decumbebat, atque cum jam omnia symptomata eodem tenore pergerent, Febre *Intermittente*, à Veneno per detractionem sanguinis perperam celebratam aucto, mutatā in *Intermittentem*, sub vespertinam Me accersivit. Adveniens, Lunum deprehendi debilem & celerem, Urinam vero non multa rubedine tinctam, vel contentis saturatam. Caput Aegre vehementer ardebat, extrema frigebant; Unde plurimum de eventu dubitans, ad expansionem spirituum promovendam impræsentiarum duntaxat Bolum Theriacalem hora somni exhibendum, & Julapium Perlatum ad libitum sumendum, Emplastrum Cephalicum cum dup. Euphorb. ad plantas Pedum, & Epispastica duo acuta & ampla ad internos cubitos, propè Axillas applicanda jussi, & expectavi. In nocte, inane sequenti, remissio subsequeretur. Die 18. omnia symptomata remittebant, atque ab æquali ac moderato Capitis & Extremorum Calore reverso, expansionem spirituum quādamtenus redintegratam esse judicavi; Ideoque Haustum Febrifugum cum ℥j. Corticis illico exhibui, atque deinceps quarta quaque hora repebebam, & Gargarismum sequentem, ob Faucium rigiditatem & molestantem siccitatem, Siphone sæpius calidè ingerendum jussi.

℞. Fol. Plantag. Ros. rubr. Summit. Rub. ana Mj. Coq. in Aqu. F. q. s. ad ℥ss. Colatura adde Diamor. ℥ss. Mel. Ros. Colat. ℥vj. M. Ad expansionem spirituum adhuc deficientem promovendam Bolum Theriacalem hora somni repetendum atque Epispasticum ad Nucham applicandum duxi. Die 19. & 20. eisdem H. altus Febrifugos repebebam, & Bolum Cardiacum hora somni exhibebam; Julapii etiam sequentis cochl. 4. vel 5. ad libitum sumenda præscripsi, quod toto Morbi cursu Aegre maxime ardebat.

℞. Aqu. Meliss. Ceras. nigr. ana ℥iv. Poton. Comp. Epidem. ana ℥j. Confect. Alchem. sine Mosch. ℥ss. Syr. Caryoph. ℥ss. M. Die 20. sub vespertinam (exulante jam omni Exacerbationis & Remissionis vestigio, atque, Cute Colli, & Pectoris ubique Vesiculis aqueis, sine quacunque rubrâ efflorescentiâ, interpunctim notatâ, unde, spiritibus depressis ac tantum non delictis, febrem in *Intermittentem* purè Malignam degenerasse sentiebam) plurimum languebat Aegre, attonita erat, ac tantum non delirabat: Indeque, omisso usu Corticis in potterum, spirituum expansionem Alexipharmacis & Vesicatoriis duntaxat moliebar; Epispastica nova ad internos Carpos supra Pulsus illico applicanda jussi, & Bolum Cardiacum repetendum, cui addebatur Confect. Alchem. sine Mosch. ℥ss. Die 21. Bolum Cardiacum cum Confect. Alchem. absq; Theriaca (quippe Coma quādamtenus impendebat) mane repetendum jussi, eundem verò cum Theriaca sub vespertinam: Eodem modo die sequenti scil. 22. pergebat. Quandoquidem verò multum tussiebat, atque Phlegma viscidum Bronchiis impactum ægre admodum egerebat, ℥iv. Apozematis sequentis calidè, quarta quaque hora propinandas jussi.

℞. Decoct. Pectoral. depurat. lbij. Tiactur. Croc. syrup. Capil. Vener. ana ℥j. M. Die 23. Bolum Cardiacum, absque Theriaca, mane & quarta pomeridiana, ob languorem & deficientem spirituum expansionem; Et cum Theriaca hora somni Agra deglutiit, unde vires aliquantum instaurari videbantur. Ob Aphthas vero jam in ore subortas præter Gargaritium Cochl. unum Mucilaginis sequentis sapius super linguam tenendum jussi.

℞. Mucilag. tenuior. Semin. Cydon. Aqu. Plantag. Extract. ℥vj. syrup. e Rub. Idæ. ℥iij. M. Die 24. omittebantur Boli per totum diem in gratiam Adstantium, qui timebant ne agra inde nimium incalesceret, cujus neglectus pœnas vitæ suæ dispendio propemodum luebat sub vespertam languens & confusa, & adeo confecta, ut vix respirare poterat. Quocirca, ad expansionem spirituum resuscitandam, Cochl. iv. Julap. sequentis tertia quaque hora vel sapius in languore exhibenda jussit (agitata phiala.)

℞. Aqu. Meliss. Rut. Ceras. nigr. ana ℥iij. Epidem. Pron. comp. ana ℥iij. Pulv. e Chel. cancr. comp. Lap. Contrayerv. ana ℥ij. Rad. Serpentar. Virgin. ℥ij. Sacch. alb. ℥vj. M. Spiritus etiam Salis armoniaci in languoribus olfaciendus præbebatur. Singulis Bolis gr. iv. Serpentar. Virgin. adijcienda jussi, modo sequenti.

℞. Theriac. Androm. Confect. alchem. ana ℥ij. Pulv. Goan. gr. xxv. Serpentar. Virgin. gr. iv. M. F. Bolus. In horum Bolorum usu, cum, vel absque Theriaca, bis terve in die persisteret usque ad diem 27. & indies melius sese habuit: Pulsus quotidie fortior evasit, & tempestas mitior, Pustulae serosæ, quæ in pectore spargebantur, & sensim disparebant, Agra ab Orei faucibus erepta tandem *disrupta* ac sana evasit, nisi quod Tussis importuna somnum admodum interturbabat; ad quam minueudam primum præscripsi die 26. Linctum ex Ol. Amygd. d. syrup. capil. Vener. ana ℥j. & Sacch. Cant. alb. ℥j. confect. Cochleatim, urgente Tussi, ministrandum. Hoc autem nihil proficiente, die 27. Haustulum Paregoricum cum syrup. Paralyf. ℥ij. & Laud. liqu. gutt. viij. (Febris jam victa) cum magno successu hora somni propinandum jussi, & nocte diei 28. Pilulas sequentes.

℞. Pil. e Cynogloss. Extract. Glycyrriz. anagr. viij. M. F. Pilul. ii. A quo tempore hucusque optima valetudine utitur, nisi quod posth. bito sano meo consilio de Cortice repetendo, sub finem secundæ Hebdomadæ languere, appetitum privari, atque, statâ dici hora, bis vel ter Algore quodam perfundi cœpit, Repetita autem tandem ℥j. Corticis, illico convaluit, siue quocumque alio medicamento exhibito.

*Appendix Secunda Exercitationis, Historiam Febris *Συνεχῆς* compendiarium ab Anno 1698. ad Annum 1691. complexa.*

Ex quo Philosophiæ & Medicinæ Principiis mediocriter instructus, Observationibus Medicinalibus faciendis qualitercunque par fui, naturam atque Indolem Febris *Συνεχῆς* indagavi.

di studio magno opere incensus sum. Atque equidem, quantum memoria repetere præteritis possum, febrem eam, vel simplicem vel spuriam, frequentissimam semper fuisse deprehendi, & inter ceteras febres maxime vulgarem. In nonnullis locis, scil. Maritimis, Palustribus ac Nemorosis ferè perpetuo Endemia est, ubique vero, præsertim durante tempestate Autumnali, & in castris, ubi Corpus, externis aeris injuriis perpetuo obnoxium est, post ita- tas periodos Epidemia; neque in Constitutione ipsa pestilentiali penitus defecit. Necnon febres *Συνεχῆς*, quotquot sint, generaliter loquendo, vel primo insultu *Συνεχῆς*, speciem referunt, aut saltem in eas demum mutantur, quoties Crisi saluifera finiuntur.

Ut autem certior huic nostræ observationi fides adhibeatur, lubet Historiam hujusce morbi, per triginta Annos, & quod excurrit, ordine recensere, atque graphice pro virili depingere, ut penes Lectorem ita hac in re æquum judicium facere.

Incipiam ab anno 698. Æra (Mihî saltem) notabili, quo tempore febris hæc tam spuria quam simplex, præsertim Menibus autumnalibus, & nique per totam Angliam grassabatur. Quod etiam Cl. viri. noster *Willisius* in *Pæretologia* sua olim edita testatus est. *Osuarium Cromwelli*, qui tunc temporis rerum Britannicarum potitus est, & Pater meus Reverendus, idemque Medicus Exercitatus illo ipso anno, inenite Septembri, cum hæc constitutio ad *αὐγὴν* pervenisset, hac febre correpti fati cede- bant; *Συνεχῆς*. Natura in utroque succum- bente, in *Συνεχῆς* demum mutata, quam comi- tabantur deliria, spasmi, ceteraque funesta malignitatis indicia. Insuper, postquam con- spexeram matrem meam pientissimam, Fratres & sorores, Servos, ancillas, Nutrices con- ductitias, quotquot erant intra eosdem no- biscum parietes, ac ferè omnes ejusdem, ac vicinorum Pagorum Incolas hoc veneno in- fectos & decumbentes, ne forte ejus memoria mihi excideret, ego ipse eodem morbo cor- reptus sum, atque postquam a morte, in pri- mo ejus insultu, Agrè admodum evaseram, spatium trimestre valetudinario transegi; *Συνεχῆς* (qua primum affectus fueram) ubi venenum ex diuturna & repetita spirituum expansione quadantenus subactum fuerat, in intermit- tentem jam tertianam, jam Quotidianam de- mum facessente. Hoc tempore, si unquam ali- quando, fere tota hæc insula, saltem Menibus autumnalibus, Nosocomii publici speciem præse fere- bat, & in nonnullis locis, sani vix supererant, qui ad ministrandum valetudinariis sufficerent. Verissimum quidem est, hanc febre, utut Epidemiam & publicè grassantem, minus fu- nestam fuisse quam pestilentialis seu maligna esse solet, quippe à veneno mitiori ortam; Unde, vel spirituum sese expandentium vi, aut suppetiis, quales quales fuerint, ab arte mi- nistratis (Nondum enim vires Corticis in hoc veneno subigendo, saltem hic loci, compro- bata erant) plurimi licet agrè admodum ex morbo evaserunt. Multos autem passim vide- re fuit, post sextam vel septimam Exacer- bationem (ubi natura à veneno sensim aucto- demum victa fuerat), exultantibus omnibus

Paro-

paroxysmorum & Remissionum vestigiis, febre maligna Continua, quam dici spasmi, & deliria comitabantur, decimo septimo, vel vicesimo primo morbi die è vivis sublatis. Alios autem Diarrhœa & vomitione, vel doloribus quasi Pleuriticis, Peripneumoniacis aut Colicis, aut alio aliquo *veneno* spuria symptomate vehementiori attritos & confectos, die morbi septimo, nono vel undecimo, fato quasi pramaturis occisos. Insuper, qui ex morbo evaserunt, fere omnes, quos ego novi, Hyemem subsequenter valetudinario transigebant, Durante enim Bruma, Intermittentes, Quartanas, Tertianas, Quotidianas ab ejusdem veneni mitiori gradu oriundas fere quæ epidemias videre erat, ac in autumnno *veneno* seu Remittentes. Neque mehercule, sæviente gelu, penitus defecerunt istæ febres Continentes, & licet non, ut in præcedenti autumnno, publice grassarentur, ubique tamen subsequente vere ac æstate sporadicè caput suum tollebant, usque ad mensis Augustum. A quo tempore per totum Mensium autumnalium decursum, rursus ubique Epidemiarum fieri & revirescere cœperunt. Atque equidem hanc febrem hoc pacto sub typo *veneno*, præsertim simplicis & legitimæ, Quotidianæ scil. vel tertianæ maxime vulgare n fuisse, & tempore Autumnali plus minus Epidemiam usque ad Annum 1664. observavi; Necnon plurimos ab eâ demum in *veneno* degenerante in Orcum demissos, non obitante methodo medendi rationali & excruciante, quæ tunc adhibebatur; Siquidem efficacia Antidoti Peruvianæ ad hoc venenatum fermentum delendum, vulgus medicorum adhuc latebat.

Sub ingressum verò autumnii, Anno 1664. plane fiebat hæc febris; & fere omnes acuti morbi derepente exulabant, & salubris admodum erat istius tempestatis constitutio. Vere autem subsequenti, post brumale gelu præter modum atrox, & Cometam in Æthere calamitatis hujus quasi prænuncium, venenum sese recolligens, & mirum in modum auctum, hanc *veneno* in pestem funestissimam & dirissimam inopinato mutavit, quæ Epidemice grassata, spatio unius Anni plus quam quadraginta millia Hominum è vivis sustulit. Attamen, sæviente hac ipsa peste non penitus defecerunt vestigia nonnulla febris *veneno*; Quotquot enim ex Peste evaserunt, utpote mitiori Veneno infecti, vel robore Spirituum vegetiori præditi, quamprimum Natura sua sponte, vel Artis adminiculis Bubones, Parotidas, Carcinomata maturefcentia, vel quævis alia victoriæ monumenta seu trophæa de hoste constituere cœperit; Singulis vel alternis diebus in seipsis percipiebant symptomatum Exacerbationes & Remissiones statim horis alternatim sese excipientes. Unde non temeritatis jure merito inculandam censeo Facultatem Medicinalem Neapolitanam, quæ (referente Clariss. Bado, Anastas. lib. 1. cap. 20.) etiam Corticem Peruvianum in Pestis Curatione adhibendum jussit; Siquidem ad hoc ipsum venenum (quoties mitius esse contigerit) delendum, & deinceps ad curationum accelerandam plurimum con-

ferre queat.

Porro, Peste hac exitiosâ sub initium Anni 1666. exulante, rursus febris *veneno* a veneno mitiori orta, spuria autem & colliquativa, nimirum cum fluxu alvi torminoso aut Dysenterico sociata, sub initium mensis Augusti suum caput attollere incipiebat, quæ indies per omnes menses Autumnales magis magisque sæviebat, & publice grassabatur, nec mihi pepercit contagio, dum Mense Augusto, sedes Dysentericorum minis caute inspicerem; Et ex hoc morbo ægrè admodum evasi; Iterumque etiam sequenti autumnno, ex eadem occasione infectus sum; Adeo Epidemicè jam ubique Londini sentinnum hoc virulentum propagatum erat! Durante vero ejus *veneno* Mense scil. Septembri & Octobri, quo tempore *veneno* simplex grassari solebat, vix quinquam alium morbum videre erat. Civitas fere universa hoc morbo correpta videbatur, atque singulis septimanis tercenti, quadringenti, quingenti plus minus Fluxu & torminibus, cæterisque Dysentericæ excruciantis, vel Diarrhœæ colliquativæ diris symptomatis confecti, citius vel serius, die scil. 14. 17. 21. Fatis cedebant, non autem absque siti inexplebili: Aphthis albis vel nigris, pulsu celeri, Deliriis, cæterisque Febris Epidemicæ indicibus. Plurimi insuper, postquam colliquatio & tormina, & reliqua Dysentericæ symptomata nullo Opiatorum & astringentium vii supprimerentur, nihilo secius sentim languentes, & Hectico quasi calore emarcescentes demum exstinguiebantur. Alios (virulentia per ductus salivales criticè expulsa) ope Aphtharum & salivationis imminentis supervenientis (quod in crisi Februm *veneno* haud raro evenire solet) liberatos memini: Siquidem venenum huic Dysentericæ Epidemicæ ansam præbens, tanquam Colocynthidis, aut cujuscunque alterius Cathartici auxilium, Intestina sponte petens, eademque horrendis ac vellitantibus spasmis perpetuo laceffens, atque per eorum glandulosam Membranam Serum colliquatum & virulentum copiose effundens, vires tamen spirituum non adeo præpollenter ubique prostrernere videbatur, ut non natura saltem sub initium morbi, post statum, vel incertas periodos, vires suas plus minus colligeret, atque inde victoriam, saltem aliqualem, sapius reportaret; Quod facile observatu erat; Unde Remissio atque Exacerbatio torminum, colliquationis, cæterorumque truculentorum symptomatum, singulis vel alternis diebus recurrentes, evidenter sese in conspectum dabant. Durante enim Remissione, symptomata cuncta excruciantia nonnunquam ultro minuebantur; recrudescente autem paroxysmo Opiatorum ipsorum vires spernebant. Unde clarè deprehendi Dysentericam symptomatis duntaxat rationem habuisse, Febrim autem (utut ob externum calorem à Torminibus & Diarrhœâ suppressum cuivis intuenti sese non proderet) eamque vere *veneno* a veneno mitiori, Cathartico scil. oriundam Primarium fuisse Morbum. Atque demum hac observatione inuixus, ubi cum vulgo medicorum diu Sisyphi saxum volvendo, Rhabarbaro, Myrobalanis, Opiatis & Astringentibus intus exhibitis; & Enematis, fotibus anodynis,

cæterisque decantatis, quibus authores passim utranque paginam Curationis Dysentericæ impere solent, in truculentis hisce symptomatis iuvandis, frustra curationem tentaveram, cum interea venenatum fermentum intus delitesceret; Non sine ratione consilium novum ini, atque ad Opiata & Astringentia, quæ ad Symptomata Dysenterica spectant, febrifugum aliquod potentius (si modo ejusmodi febrifugi compos fieri possem) adjicere statui, quod venenatum fermentum febris ipsius ac colliquationis causam delendo, febrem simul tollere, & fluxum sistere, ac Tormina inde consequentia compescere posset. Atque eo potius ad hanc sententiam mens mea inclinata est, quia sæpius observaram miseros Egrotantes, non obstante diligentissimo Remediorum Antidysentericorum usu, sævissimis hisce symptomatis conlectos, tandem ad Orcum cacaturientes descendisse; Alios vero multis Astringentibus atque Opiatis usque ad delirium & deliquum adactos, atque inde inebriatos potius quam curatos, eosque haud raro inopinatam symptomatum Dysentericorum recrudescentiam perpessos esse, vel saltem cum Pulsu celeri, Calore Hæctico, cæterisque venenati fermenti delitescens indicis emarcescentes, quæta & stricta Alvo summum diem appetisse. Ex æternante autem Torminum & Fluxus Exacerbatione & Remissione (quam sæpenumero plus minus hunc morbum, saltem sub ejus initium comitari jam observaram) potius quam a calore febrili, quem pro ratione symptomatum molestorum quodantenus inæqualem deprehenderam, semper autem depressum ac mitem, monitus; hoc in casu vires Corticis Peruviani cum Laudano commixti tentando experiri decrevi. Neque temerario quidem, siquidem utut Cortex amaritie suæ tenera Intestina proritando, Fluxum Alvi adaugere aptus sit; cum Laudano tamen quod Humor colliquationem sistit, sensumque Intestinalium exquisitum stupefacit ac hebetat, commixtus & irritatus, venenatum fermentum colliquativum subigendo, ad Fluxum & Tormina simul ac febrem ipsam sistendum & compescendam jure merito idoneus haberi possit. Eventus votis respondebat. Primum autem vires decantatissimi hujus febrifugi Antidysentericas experiendo comprobavi in agro habitante in vico dicto Long-Lane, Dysenteria Tertiana laborante; Huiusmodi enim aliquæ mihi in Praxi occurrebant, ubi Tormina & Fluxus Alvi mucosus & sanguineus, tertio quoque die, hora statâ, non obstante diligentissimo Opiatorum usu, recrudescabant; Cum in intervallis, trutinata hæc Symptomata, adminiculante Laudani Dosi pusilla, vel sua sponte sæpius mitigarentur. Atcepta igitur prima Symptomatum Remissionis occasione, sinemora 3j. Corticis cum Laudano. Lond. gr. j. commixtam, in haustu exhibendam iussi, repetendamque deinceps quarta quaque hora ad sextam usque vicem. Quid sit? tantum abesse observavi ut Intestina ab amaritie Corticis proritarentur, ut illico senserim ea facilius à Laudano cum Cortice commixto, quam cum Astringentibus conjuncto compesci & demulceri; A quinto autem, vel sexto Haustu exhibito Fluxum ac Tormina, una cum febre re-

liquisque Symptomatis comitantibus, penitus exulasse, neque unquam in posterum. Periodis solitis recruduisse; Atque hæc observatio animos mihi addidit, ut in ipsis Quotidianis Dysentericis, quoties scilicet & quamdiu se de genere *Zuxiæ* ex quantulacunque alternante symptomatum exacerbatione & Remissione, & non malignas esse proderent, Pharmaci hujus Polychrestæ vires, modo jam memorato experiret: Neque eventus mehercule, spem meam fefellit. Et nullus dubito quin Diarrhœa quævis epidemia, & quæcunque alia cum febre juncta, imo febres Castrenses cum huiusmodi symptomatis ut plurimum sociatæ, nummum *Zuxiæ* spurix, hac methodo compendiarie multo certius sanari possint, quam magno illo apparatu Rhabarbari, Myrobalanorum, Astringentium & Opiatorum, quæ methodum curationis horum morborum hucusque implerunt. At de his posthac furius in exercitatione quinta de febribus colliquativis. In præsentia eam eas supremis labris (ut aiunt) duntaxat præhibeo, eo fine, ut ostendam Dysenteriam ac Diarrhœam torminosam, quæ tere per septennium vigeant, ac unoquoque autumno ab Anno 1666. usque ad annum 1672. solenniter hic Londini revirescentes ubique Epidemicè grassabantur, subortas fuisse à febre vere *Zuxiæ*, quam eo nomine appello *Zuxiæ* spuriam, quia cum vehementi Humor colliquatione, eorumque per intestina excretionem conjungebatur. Atque eisdem, ut à vera ac genuina idea hujus morbi formata, curativæ indicationes in posterum certiores desumantur, mihi in votis est, ut communi medicorum consensu Diarrhœa, & Dysenteria Castrensis, seu quæcunque alia epidemia, nomine proprio *Zuxiæ* spurix ac colliquativæ posthac designetur.

Quemadmodum febris *Zuxiæ* genuina ab Anno 1665. (in quo Pellis, veneno ad gradum summe deleterium provento, caput suum extulit) fere per biennium profligata disparuit, nec amplius recedente sole grassata est ut ante; Ad eundem modum *Zuxiæ* hæc spuria & colliquativa, Dysentericæ & Diarrhœæ torminosæ nomine designata, quæ post Pestem subintravit, unoquoque Autumno, fere per septennium repullulans & longè lateque serpens imperium suum hic loci exercuisset, penitus exulabat. At locum dedit morbillis epidemicis, qui ad instar pestis mitioris, nulli sexui vel ætati parcentes, adeo Mensibus Anni 1672. Autumnalibus Londini sæviebant, ut tercenti plus minus inde confecti, quaque hebdomada ad Orcum descenderent. At hi nunquam epidemicè in posterum hucusque grassati sunt. Quantum verò hæc ipsa Pestilentialis & Epidemica Febris Morbillofa, post *Zuxiæ* suam, (ubi scilicet salutarem eventum habitura fuit) speciem febris *Zuxiæ* referebat, atque quam egregie Cortex Peruvianus, eo nomine, in curatione ejus perficienda partibus suis sanctus sit, posthac suo loco enarrabitur; scilicet in exercitationis tertiæ Cap. ubi Morbillos & febrem scarlatinam ex professo tractaturi sumus.

Morbillofa autem hac Constitutione, post tyrannidem ad sex Menses durantem, jam demum sub finem hyemis sensim declinante, ac tandem

tandem penitus exulante, venenum febriferum deinceps proximo Autumno, scil. Anno 1673. quadantenus mitescere & cicurari videbatur, & mitius hucusque est. Unde febris, quæ unoquoque Anno à Menſe Auguſto uſque ad Solſtitiũ hyemale antea Epidemicè graſſabatur, non ampliùs Dyſenteriz vel Diarrhœæ Torminoſæ ſpeciem induit, vel cum quocunque altero vehementi ſymptomate conjuncta fuit; verùm typum eundem ad vicesimum uſque Annum gerit, quem ante Peſtem, quæ Annis 1665. & 1666. vigeat, præſe tulit: Et forſan eundem typum ſervatura eſt, donec à Peſte aliqua exitioſa in prociñctu ſtante venenatum fermentum mutari, & in gradum magis deleterium provehi contingat. Fateor equidem à gradu veneni mitiori, nonnullis Annis, præſertim ab Anno 1677. ad 1681. (quo tempore circumforaneus ille Tabor Corticem Peruvianum pro Arcano cæteris medicis ignoto venditans, ſeſe februm Aſculapium unicũ jactabunde gloriabatur) febres Intermittentes quotidianas, Tertianas, Quartanas, ſere paſſu cum *ſympt.* Epidemicè graſſatas eſſe; Atque Annis nuperis, præſertim durante *ſympt.* Conſtitutionis, Menſibus ſcil. Septembri & Octobri, à gradu veneni plus ſolito irritante, has ipſas *ſympt.* aliquando cum vehementi aliquo ſymptomate conjunctas, non tantum ſpeciem Diarrhœæ & Dyſenteriz periodicæ, verum etiam Cholera morbi, vomitionis immanis, Rheumatismi verſatilis, Pleuritidis, colicæ ventriculi & inteſtinorum, ſeu alterius alicujus morbi acutiſſimi induiſſe: Quinetiam has ipſas *ſympt.* non tempeſtively aut rite curatas, à veneni incremento, in Malignas & funeſtas ſæpenumerò degeneraſſe; & nonnunquam à gradu veneni præter modum deleterio, in primo inſultu malignas extitiſſe, Purpuratas ſcil. Petechiales, vel Morbilloſas Eſſeſcentiã, veſiculis aqueis per collum & Pectus Spartiſ, Parotidibus, Bubonibus, Anthracibus, cæterisque malignitatis indiiciis notatas. Verum cunctæ Hæ Febres, ſive *ſympt.* Spuriæ, ſive malignæ, Sporadicæ duntaxat fuerunt, neque contagione, ut in peſtilentiali Conſtitutione, ſeſe propagabant. Febris unica Epidemia, quam ſingulis Autumnis jam per quatuor Luſtra annorum ſolemniter repullulare obſervavi, fuit verè *ſympt.* ſimplex, & quæ Cortice tempeſtively exhibito ſemper cedere ſolebat. Neque conſtitutio Varioloſa, Eryſipelatoſa, Scarlatina, Rheumatica, Anginoſa, Pleuritica, vel ſi qua ſit alia, in una vel altera anni tempeſtate graſſata, adeò venenum autumnale mutavit, ut febris Epidemia, in tot annorum decurſu, a Typo ſolito quicquam deſlecteret, aut novo diverſoque tenore procederet. *Haſtenuſ Clariff. Richardus Morton.*

De Cortice Peruviano ejusque vi Febrifuga plura jam legimus, atque in ſequentibus ex Clariff. Thom. Sydenham, Joh. Jones, Gulielmo Cole &c. videbimus; interim tamen quædam hic rursus de eo adjungemus. Arbor unde hic cortex, Ganna-napeſide Ditionis Peruviana Incolis dicitur, & ut ſcribit Clar. Morton, nec non Clariff. Joh. Raius in ſua hiftoria Plantarum p. 1796. magnam habet ſimilitudinem cum quibusdam e noſtratibus, ſcilicet

ejus folia non parum accedunt ad folia arboris pruna rubea ferentis. Illorum iconem exhibet Nobiliſſ. ac Curioſiſſimus Rhedi in ſuis Experimentis circa res diverſas naturales; illaque ſpeciatur quæ ex Indiis adferuntur: verum adnotante D. Tancredo Robinſon apud præcitatum D. Raium hæc non bene quadrat cum iconem quæ in muſæo Clariff. Viri D. G. Courtine aſſervatur. Hactenus creditum fuit corticem qui vulgò in officiis proſtat à ramis ipſius arboris detrahi; verum Clariff. D. Carolus Spon in tractatu de Febris ac Febrifugis Galicè conſcripto, ſe accurata & diligenti inſpectione habitâ comperiſſe ait, Corticem Peruvianum dictum non trunci aut ramorum arboris eſſe, ſed radicem; illorum enim, ut in particulis quibusdam ad ſe miſſis expertus eſt, minime amarum eſſe. Quæ obſervatio, ut habet Clariff. Raius, alicujus uſus eſſe poteſt ut qui in noſtro orbe hujus Corticis ſuccedaneum quærit. Quò autem jure id aſſeratur à Clariff. Viro hactenus non ſatis perſpectum eſt, dum alii omnes, tum in quorum manibus frequens eſt admodum ejusmodi Cortex, aut ii etiam qui in Regno Peruviano, (in quo ipſius natales) per annos commemorati ſunt, nihil ſimile aſſerunt, ac potiùs undò pronunciant, e ramis eximi. Cortices autem illi ſunt craſſitie mediocri, foris ſcabri, paululum caneſcentes, ſæpe muſco obduſti; intus læves, colore ferrugineo, ſeu cinnamomio; ſaporis acris & amari. Hiſce patet quomodo diſſerant ab alio Cortice, qui etiam nomine Kinkina, ac Corticis Peruviani nobilitatur, eſt enim hic tenuior, foris cinereus ac caneſcens, intus ex ſulco aut obſcuro ferrugineus, ſaporis acris, amaricantis, ſubpinguis, odoris fragrantis. Ipſius arbor ſua ſponte naſcitur in Regno Peruviano. Cortex hic à plurimis præfertur Kinkina verè, quia major vis aromatica ei ineſt, & etiam à Clariff. Morton videtur præ alio ſeligi, dum in China China præter alios characteres odorem aromaticum exquirat, quò alius cortex omnino deſtituitur. Pro ejus vi febrifuga quidam acriter militarunt, dum alii nobile hoc medicamentum totis impugnarunt viribus, donec tandem ultimis hiſce annis ab omnibus prope Medicinæ Cultoribus, Aegrorum ſuorum ſolacium verè expetentibus, non tantum amice excipitur, ſed etiam, ut videre ſunt apud Clariff. Morton, pro panacea quædam quaſi ſpecie non immeritò ſalutatur. De methodo illum exhibendi ſuprà jam, ſcilicet in Notulis ad Tractatum de Febris Clariff. D. Piens hæc ſcripſeram. Ego ſæpiùs Corticem Peruvianum in febris proſligandis ſic uſurpavi.

℞. Cortic. Peruvian. ſubtiliſſ. triti ꝑj. Salis Tartar. Armoniaci fixo adjuncti ꝑij. pulveris viperini, antimon. diaphoretic. ana ꝑv. cum rob juniperi, vel ſyrup granorum Kermes q. ſ. F. Electuarium de quo tres bolos ter de die, temporibus à paroxyſmo liberis, & longè à paſſu, ſumat febricitans, donec totum fuerit abſumptum, ac etiam poſt aliquot dies iteretur. Uſurpavi etiam in aliis vinum febrifugum ſequens.

℞. Cortic. Peruvian. ſubtiliter triti ꝑj. iroretur ſpirit. vin. rectificatiſſ. ꝑiv. ac olei ſulph. per campan. ꝑij. Digerantur in vaſe bene clauſo per horas aliquot; poſt adde vini bene maturi ac tenuis pintas duas. Digere rursus per

dies aliquot, ac cola. Sumat mane & vespere §iv. corpore prius expurgato. Quandoquidem verò hæc ut & aliæ omnes hactenus descriptæ Corticis Peruviani præparationes, minus erant tutæ, ac dum in aliquibus bene cedebant, in plurimis aliis intentum non explebant, nisi ad tempus, aliam ipsius exhibendi rationem excogitavi, & per experimenta repetita ita confirmavi, ut de ea asserere possim; primò febrem intermittentem qualemcunque, sine ullo recidivæ metu suppressere. Secundò, die primâ quâ exhibetur corpus satis bene expurgare, subsequentibus alvum ut plurimum liberam facere, urinas in largissima quantitate pellere, transpirationem promovere, ciborum appetentiam ac digestionem, etiam in ventriculis debilissimis, & cibos maximè averfantibus, restituere, vultui colorem, toti corpori vires, reddere. Tertio, symptomata plurima febribus aliquando adjuncta profligare; quod inter alia testari possum de Iussi sicca, Hæmoptili & totius tumefactione in juvene annos 22. nato, & febre tertiana duplici afflicto; de doloribus infimi ventris & delirio in puerpera, tertiana laborante; de doloribus gravativis & lancinantibus orificii ventriculi superioris: de vomitu perpetuo & totali inappetentia; de doloribus etiam arthriticis paroxysmos exquisitè concomitantibus; de morositate, taciturnitate, catalepticis affectibus, cephalalgia, aliisque symptomatibus penè innumeris febres quartanas, itemque alias intermittentes, consequentibus. De quartana in specie, non cum Clariss. Franc. Piens 11. tantum ægros, aut cum Celeberr. Riverio 30. sed plures etiam centenos, cujuscunque ætatis & sexus, tum hic locorum, tum alibi, scilicet, tum me præsentem, tum absente etiam, per deportatum medicamentum cum præscriptionibus necessariis, citò curatos adferre quàm facillimum foret. Illic rursus addidi alia quædam de febrifugis quæ hic adjicere non pigebit. *Hæc autem sunt.* Clariss. Viri, Joh. Petr. Faber, Christianus Langius, Michael Ettmullerus alique, in febribus intermittentibus quibuscunque maximè commendant remedia emetica, tanquam curationis veras radices, eaque iteratis vicibus in febribus rebellioribus, aliquot ante paroxysmum horis, exhibent. De sale cichorii, ut & centaurei minoris ejusque extracto, de radice plantaginis, Zedoariæ, Chelidon. major. imperator. gentian. angelic. valerian. garyophyll. violarum, asari, item de tormentilla, vermiculari, de myrrha, alumine, sulphure, imò febrifugo illo militari pulvere pyrio, aliisque innumeris, quæ Autores multi celebrarunt, quibusque vim specificam pro febrium curatione insidere asseruerunt, nihil hic addimus. Non etiam moramur varia medicamenta composita tantopere à suis decantata Inventoribus, aquam v. g. febrifugam Poterii, ut & duplicem aquam, calidam unam, temperatam alteram Doctiss. D. de Mayerne, quarum parandi methodus à Clariss. Carolo Sponio in suo de febribus & febrifugis tractatu, aperitur. Pericarpia item non adducimus, quæ ex allio, sabina, ranunculo ardente, theriacâ terebinthinâ & mercurio adjunctâ, camphorâ, araneis, imò etiam ovi pelliculâ; ut nec composita ad eundem usum varia, apud Joh. Michaëlis, Schröderum, aliosque passim

reperibilia; quia scilicet illis, tanquam ex parte admodum futilibus, minus indendum credimus, quicquid demùm de ipsorum viribus garriant aliqui; unde etiam Artis nostræ quidam Myllæ, inter quos Celeberrimi Willitius, atque Jones, occasionem sumpsere, operandi rationem, & exquirere, & quod arbitrati sunt, manifestum facere. *Hæc in Notulis ad Clariss. Piens.* Jam de febrifugis hæc a me ipso non semel experta adjicio, cortices fraxini, mali persicæ, cerasi, ac illius præcipuè quæ nigrum præfert fructum, berberis, sive in substantia, sive in extracto, sive in decocto, aut tinctura aliterque ea exhibuerim, parum opis attulere; Radices gentianæ, succilæ, violariæ, caryophyllatæ, ac præcipuè viperinæ aut serpentariæ Virginianæ, in substantia, aut tincturâ convenienter extractâ, propriis quaque dosi, propinatæ, magnò fuere auxilio, non tamen semper pro voto cesserunt, ut nec etiam mercurius præcipitatus albus per digestionem longam in ipiritu vini rectificatissimo edulcoratus, cujus vires quantumvis eximæ, non semel interim me fefellerunt: nunquam vero Arboris Chinæ Chinæ cortex probe selectus ac secreto hactenus modo a me præparatus. Antequam autem de hac præparatione expatius eloquar non inutile fuerit si quædam ex iis quæ ab aliquot Autoribus, inque sane Celeberrimis ac mihi non parum suspiciendis, de modo & ratione operandi hujus corticis, asseruntur pro modulo expendam. Quidam totam vim Chinæ Chinæ in parte hujus corticis volatili reposuere: Verum non semel totam tincturam atque etiam amaritiam corticis, per iteratas, easque longas, tum coctiones, tum macerationes, in ipso ipiritu vini, aut aqua sale Tartari, vel Absinth. centaur. minor. aliisque acuata, extraxi, non sic tamen minus quod restabat corporis illius corticis, insipidum prorsus, ac tanquam caput mortuum febres reslinguebat, dum illud larga exhibebam dosi, imò minus molestiæ sæpius creabat stomacho quam si crudum corticem obtulissem, quia scilicet, coctione, ac digestionem solutus succis ventriculi facilius obediebat. Tincturæ autem omnes quas sive per coctionem longissimam, in aqua sale Tartari acuata, sive per digestionem in vino spiritu vitrioli, aut sulphuris animato, sive per ipsum vinu spiritum sale armoniaco imprægnatum, alique plures quas eliciui, effectum suum ad tempus tantum præbuere. Quidam in amaritie illam collocant: Verum, ut jam diximus, capite mortuo hujus corticis, omni prorsus amaritie spoliato, febres exulasse sæpius æquè certo vidimus, ac si corticem integrum vorandum dedissemus. Quidam tandem dum pro parte corticis terrestriori ac fixiori militant omnem volatiliu miscelam non parum extimescunt: Verum sanctè asserere possum me in millenis ægris exhibitionem corticis nunquam satis tutam observasse omnique prorsus recidivæ antevertendæ aptam, ni volatilia, etiam in largissima dosi admiscuerim. Quæ praxis non male responderet Ideæ quam plures Viri Celeberrimi, quos, suprà legere licuit, sibi de febribus faciunt, dum scilicet eas generi nervoso insidere non immerito credunt: nam quis nescit spiritus volatiles nervis esse quàm maximè amicos, spiritibusque animalibus ac succo nerveo excitandis non

non parum aptos, sicque fermentis febrilibus iisdem innidulantibus, impugnandis vere comparatos; idque cum exagitatione sanguinis satis modesta ut nihil inde turbarum in ipso cieatur. Credimus itaque partem nxiorem ac terrestriorem corticis in febribus profligandis primas omnino tenere, non tamen alias qualitates, amaritiam scilicet, aut aliud quodcumque quod per spiritus aut alios liquores affusos, imo per coctiones præmemoratas elicitur, floci faciendas volumus, dum toti suo coherent; Sed ab eodem separatas parum admodum virtutis possidere experti asserimus. Corticem autem ipsum quod attinet præterquam quod, vix genuinum illum reperias, cuiusque propterea dosis ad minimum duplicari non debeat, unde non parum gravatur stomachus; ni vel per coctionem longam vel alia ratione aperiatur, ut particularum ipsius pori succis ventriculi excipiendis magis pateant; quandoque per vomitum, quandoque per secesum, eicitur, imo iners quandoque in ipsis ventriculi rugis, vel intestinorum cellulis restitat, aut saltem si aliquid virium exerat, illæ infirmiores sunt quam quæ ad longum tempus tebrein arcere valeant, ac propterea tot recidivæ de quibus v. g. Clariss. Morton in maiori suarum historiarum parte, ac etiam de quibus querelæ apud omnes prope Medicos, & præcipue apud ipsum vulgus increbuerunt, unde multum de Nobilissimi, nunquamque satis laudandi corticis fama derogatum est; non unicuique enim datum est ægros ita faciles invenire quales illos habuit Empiricus ille Talbot, sive Labor, qui nescio quæ fortuna dum febrifugum suum ex Anglia ad Gallos deportavit, eò auctoritatis devenit, ut Chinam Chinam tum in substantia, si ita rebellior febris cogeret, tum præcipue in infuso, quod ordinarium ipsi erat, ad libras integras per iteratas vices hauriendam dare potuerit. Vidi tamen ego aliquot qui ipsius remedio febrifugo tantopere decantato, usi fuerant qui recidivam passi sunt, inter quos recensebo tortem quandam Capitaneum Cohorti Helveticæ in Galliis Præfectum, qui absumpto toto medicamento quod ipsi magno cum saltu præbuit prædictus Empiricus, per tres menses omni febre liber quidem vixit, verum illa post hoc intervallum revirescens per tres alios menses ipsum afflixit, quibus elapsis rursus per alios tres disparuit, sicque per duos annos integros, & recedebat & recrudescbat stans periodicis ac intervallis, donec tandem Virum Fortem, nihil proficientibus novis remedii dosibus, ad inscitias redigeret. Quò tempore curam ipsius tanto cum successu habui, ut brevi vires recuperaverit, ministeriisque suis gnaviter absolvendis, novisque magnò suo meritò adipiscendis, omnino par fuerit. Præparationem jam ipsam quod attinet eam hic, bono publicò, ut credo explicabo.

℞. Corticis Peruviani probè selecti ℥vj. Viperinæ, seu Serpentariæ Virginianæ ℥j. Diaphoretic. martial. albiss. ℥j. destilla desuper spiritus vini sale armoniaco acuati q. s. ad eminentiam trium circiter digitorum, post infusionem 30. dierum decanter liquor, ac seorsim asservetur, massa verò Corticis Peruviani spiritu prædicto imbuta, partim cum rob juniperi, addito pauco ejusdem oleo stillatitio, in for-

mam electuarii redigatur; partim in umbra siccet in pulverem, qui in vasis probè clausis postea asservetur, quo scilicet pro exigentia, vel forma pulveris cum saccharo, vel formâ pilularum cum mucilagine gummi tragacanthi confectarum, vel alia etiam forma exhiberi queat. Dosis remedii varia est pro ratione tebrum; pro Quartanis rebellioribus eam ingredi debent tres Corticis uncia, pro Tertianis autumnalibus, aut quæ post solstitium æstivum accedunt, uncia una cum dimidia; pro Tertianis vernis uncia una sufficit. In febribus horiticiis quales sunt Hemitritæ, dummodò cum inflammatione visceris alicujus principis illa non fuerint complicata, quod aliquando accidit; imò in omni lentarum genere quod cum exacerbationibus ac remissionibus, durisque symptomatis, divexat, tutum prorsus est hoc remedium, sed ipsius dosim, ut in Quartanis, Corticis uncia tres ingredi debent. Exhibetur autem ter de die temporibus a paroxysmo, aut febris exacerbatione vacuis, longe à pastu absumendo una quaque vice corticis drachmam ad minimum integram. In maximè rebellibus febribus, liquoris spirituosius per decantationem ut mox innuebamur separati, seorsim esservati, ac oleorum menthae crispæ, caryophyll. & cinnamomi particula aromatizati, aliquot guttula post devoratum medicamentum, in vino semper propinquantur. Cum verò ingratæ dosis cuique febrî necessariæ dimidia circiter pars absumpta est, medicamenti reliquiis ad dies 8. 10. aut 12. supersedendum, usque tantum elapsis ad remedium redeundum, continuando tum sine interruptione bis de die ad totalem absumptionem. Nec expectandum unquam pro absumenda ultima dimidia parte, (quæ ad dies præscriptos post primam absumptam differtur) donec febris de novo caput exuerit, sic enim renovanda veniret tota medicamenti dosis, quasi de eo nihil hæcenus voratum fuisset. Antequam febrifugum exhibeatur, & venæsectiones necessariæ, & purgantia viribus febricitantium accommodata, sunt administranda, nam in eo vix cum Clariss. Morton convenimus, quod fermento febrili venenato, antidotum suum, Corticem scilicet, sine ullâ præliminari præparatione, ut plurimum opponat: Hoc siquidem nobis feliciter non cessit, indeque recidivas non infrequentes atque perniciosissimas enatas vidimus, cujus ratio est sane in propatulo, scilicet fermentum febrile quantumvis subtile ac spirituosum, ex humorum saburra ac colluvie facillè ascendit ac perpetuatur, unde etiam ipsius vis per exhibitum corticem pro tempore dometur, exsuscitatur facile de novo febris, imò tandem cortici omnino surda fit. Præstiterit itaque, tum in febribus plurimis, sanguinis missionem celebrare pro totius massæ exagitatione, fermentisque profundiori, & ut ita dicam, secretiori loco, innidulantibus, in propatulum quasi proferendis, ut sic medicamento expugnanda facilius se offerant; tum purgantia medicamenta propinare, quò & humorum effusantium abundantia aliquid subtrahatur, ac antidoto aptè via aperiatur ac expeditior fiat. Itaque in primis bolis, pilulis, &c. purgantia accommodata admisceamus. Hic non mihi regeat aliquis spiritum vini

sale armoniaco acnatum parum præcipue profuturum in eo cortice qui postea exticcatur, ut sub forma vel pulveris, vel pilularum exhibeatur; per mille enim experimenta edoctus assero vim ipsius aliam prorsus esse postquam hoc spiritu saturatus fuerit, imo etiam majorem heri quò pluries iterabuntur affusiones ac defecationes, si modò in secundis nihil liquoris decantetur, seu potius si spiritus ad materiarum saturationem, non verò ad supereminentiam aliquam destilletur. Sic etiam Bolus Armena, sulphur, variaque alia mineralia per ejusdem spiritus affusiones facultatibus multò nobilioribus donantur, quàm quibus antea insigniebantur, sive quòd sic referatis mineralium horumceporis commodius in se fermenta morbifica recipiant, sive quòd ab incarceratis particulis salinis ac volatilibus motus promptiores acquirant, quibus particulis heterogeneis sanguinem de tono suo disturbantibus, obviam eant, ipsaque efficacius impugnent. Ex hisce omnibus patet quàm verè dixerimus de remedio nostro in præcætitis Notulis, illud triplici deberi regno, animali scilicet, vegetabili & minerali, quorum varia munia ignis digerentis beneficio uniantur. Hic addimus eas præcipue febres in quibus genus nervosum vel ab ipso vulgo affectum, dicitur, nostro remedio citissime iugari, quod de his omnibus quas affectiones cataleptica, convulsivæ, ac apoplecticæ concomitantæ sunt testari possumus, sed in his dosi liquoris paulò auctior, ac frequentior exhibenda est, donec sopiti spiritus exfuscati fuerint, ægerque vorandis bolis, pilulis aut pulveri, paratus. Quæ cum ita sint quis in Medicina tam hospes fuerit qui non videat, dum in omnibus prorsus febribus tam bene cedit hoc medicamentum, per viperinam Virginianam (remedio vere antispasmodico) volatiliæque, quibus saturatur, maximè nervinum, febrium fomitem in nervis exquirendum, sive demum eò è sanguine humoribus inquinato, ut cum Veteribus loquar, ascendat, sive in ipso succo nervo de genere formetur. Atque hæc satis de febrifugis in genere, nostroque, hætenus secreto, in specie. Unde abundè satisfactum credimus his qui ipsius præparationem nosce avidè exoptarunt, inter quos recensere possem beatæ jam memoriæ, Celeberrimum Dominum Carolum Sponium Medicum Lugdunensem, aliosque, sed inter eos unicum, feligam Nobilissimum ac Amplissimum Virum D. Joh. Christianum Tralles S. C. M. Medicum Aulicum qui me suis literis Freistadii Silesiorum die 23. Decembr. Anno 1689. datis super hoc me non parum honorificè compellavit propriis hisce verbis. Mentionem fecisti in illis tuis additamentis ad tractatum de febribus D. Piens, de febrifugo quodam, tantum non infallibili in febribus quibusvis intermittentibus debellandis, cujus tu unicè existas pater & possessor. Fateor ingenuè, Me perfectò hoc temperare Mihi haud potuisse, quin in effusissima diffuserim gaudia, dari scilicet Herculem, qui sit Hydræ isti Lernææ truncandæ. Nec potui coërrere intra Præcordiorum angusta hanc ipsam lætitiā; sed statim arripui calamum, gratulaturus tibi de tam nobili invento, & tibi, alterius instar Æsculapii Hecatomben oblaturus. Cum vero te haud fugiat omne bonum esse communicativum sui,

hinc à te summopere peto, per istam quidem necessitudinem, quæ invicem Medicos probos atque integros animi arcte conglutinat, digneris Mihi hanc gratiam exhibere, & non saltem pretium unius alteriusve uncie significare, verum etiam methodum utendi illo desideratissimo remedio candidè perscribere. Sic tuā pace faxo, ut copiam tam egregii medicaminis obtineam, cum religioni ducam ejus descriptionem integram precibus millenis emendicare. Quem enim tibi vel levissimi favoris indicem exhibui, ut in immeritum, tantum beneficium, veluti redhottimenti loco derives? Ni tibi grave, responde quantocius, num tibi arriserit, mihi votisque meis assurgendi. Oro te quàm qui maximè, digneris servulo tuo id paucillum amicitie dare, tibi que de Me reciproce officia quævis polliceri. Et rursus in aliis 8. JANUAR. 1690. Nuper audacior justò literas ad te dedi, Num advolârint nec ne anceps hæreo. Utinam expertæ sint Deos viales propitios! Vir equidem cui tradidi illas Berolini, sanctissimè juravit se omnem operam daturum, ut salvæ ad te perveniant. Hinc ad illas in dies summo cum desiderio responsoriam tuam gratissimam exspecto, quam tantò promptiorem Mihi polliceor, quanto facilius e scriptis tuis solidissimis colligere potui, in te humanitatem cum eruditione pari ambulare passu. Quòd si præter spem Meâ prior Epistola fuerit deperdita, hæc te edocebit illius contenta. Scilicet cum in primis in nuper editis tuis notis ad Piens tract. de febrib. pag. 674. legi, te possidere febrifugum fidum & infallibile per has ipsas literas denuò rogatam te venio, digneris Mihi perscribere num possim copiam tam egregii illius remedii habere? Adde si placeat pretium & simul modum & dosim utendi sufficienti explicatione amicè mihi trades. Rem facies Mihi gratissimam, nullò non tempore præconiis debitis à me mactandam, &c. Quibus quas tum Responsorias fecero dicere jam supersedebo, quia fusior jam hoc in articulo fui, continuoque procedendum venit ad

*Curationes, Consultationes, Observationes
& Anatomicas inspectiones
ex variis.*

Curationes.

Febres in Genere omnes.

In omnibus febribus propriè ità dictis rectè curandis maximopere respiciendum est eò, ut nec *autidui*, nec temerè curam auspicemus.

Quantumvis nimirum specifica utramque paginam absolvere dicuntur, in omnium morborum curatione, illa tamen vel sine ratione, hoc est, sine methodo & judicio exhibita parùm faciunt, stagnantibus nempe impuritatibus corporis contra specificorum innatas potestates mirabiliter dimicantibus.

Quæ ratio itaque in cæteris morbis omnibus, ea etiam hic nullò modò negligenda fuerit.

Evacuancia hoc loco esse possunt omnia illa, de quibus suprâ diximus: ità tamen ut temperamenta, ætas, sexus & vires probè considerentur.

Speci-

Specificum purgans omnium febrium est, excepta Hectica, Antimonium, cuius flores dextre parati & preparati febriles impuritates e corpore eliminant: flores autem illi redigendi sunt in oleum: per præcipationem redigitur in pulverem emeticum, si balis præcipationis fuerit aqua simplex: vel redigitur in pulverem purgantem tantum per inferiora, si balis præcipationis fuerit oleum tartari.

NB. An ol. Tartari post præcipationem diu relinquendum cum Crollio, an vero mox auferendum. Affirmatur posterius, alias nimirum natus tigitur Antimonium.

Uterque pulvis iusta sua dosi intermittentibus & continuis febribus legitime exhibitus medetur, præsertim, si ab initio certissime administratus mali mineram ex corpore exturbandam ratio ista suaserit.

Interdum Obstructiones pertinacissimæ in hepate, venis Mesaraicis, Splene, Mesenterio. Item in renibus fomitem mali propagando fovent, ubi sane una vel altera evacuatio sæpe irrita est.

Itaque Digestiva quæ sunt e tartaro vitriolato, cremore tartari, spiritu tartari, spiritu vitrioli, aperiente Penoti, spiritus salis maxime seligerenda sunt, eaque administranda in vehiculis convenientibus & obstructionibus expediendis nonnihil utilibus.

Hoc modo obstructionibus resolutis & mobilibus, mundificantia rectius operantur, febriumque curam magis prosperam reddunt.

Sunt etiam necessarii Vomitus, præsertim in febribus Ventriculi & quotidianis a phlegmate provenientius, ubi aqua Benedicta sæpius profuit.

Quinimò in Tertianis pilulæ Antimoniales Emeticæ dextre procurato vomitu, tandem subsequente secessu, rectius profuerunt.

In Ephemera, unde sæpe Hectica, post solum paroxysmum est excelsiens miltura simplex, ut morbi reliquæ ex habitu pellantur.

Specificum purgans in febribus intermittentibus initio morbi non in augmento, malo adhuc stabulante in ventriculo, ex vitro Antimonii est tale:

℞. Vitri Antimonii diligentissime & iusto, si fieri possit, tempore facti, prætereaque cum spir. vitrioli albificati & pulverisati ℥℥. sacchari Canarini ℥iv. farinæ triticeæ ℥iv. Croci ℥j. Coque cum aqua communi lento igne ad spissitudinem pulvis, cavendo tamen, ne in fine aduratur, sed penè panis formam habeat, fac inde globulos seu glomulos & diligentissime reconde. Servantur in integritate sua quadriennium, postea contrahit scabritiem, datur sub initium paroxysmi (in intermittentibus) cum prima vestigia horroris in artubus incipiunt. Datur in adultis ℥j. in feminis ℥ij. in pueris ℥j. vel ℥℥. Vide etiam infra de methodo curandi febres.

(Febres intermittentes facili negotio curo sequenti modo, primò do vomitorium inilante paroxysmo ut simul operentur)

℞. Tartari Emetici Mynf. gran. iij. Corall. rubr. præp. ℥℥. M. F. Pulvis. Postea spiritum salis armoniaci quotidie bis vel ter propino ad gut. 10. in sequentis vehiculi haustu ob penetrantem saporem & odorem

℞. Aqu. Cichorei, Verbenæ, Papav. Errat.

ana ℥ij. Syrup. Papav. Errat. ℥j. M D. Hæc mixtura, cum sit à Syrup. Papav. Errat. rubicundissima affuso spiritu statim intente nigrescit. Ex his Medicamentis vix tertium aut quartum febricitantes patiuntur paroxysmum, modo in tempore, antequam materia peccans totam sanguinis massam subierit, adhibeatur. (Quod Nota.)

Specificæ ad Febres tertianas intermittentes extant quam plurima tum simplicia, tum composita.

Simplicia sunt 1. Aqua Tabaci seu nicotianæ, quæ uno atque altero cochleari exhibita 3. vel 4. horis ante paroxysmum, præmissis præmittendis, tandem paroxysmum tollit.

Hæc aqua in febribus plerumque movet vomitus, quos nullos facit aliàs in alijs morbis data.

2. Radix Asari ℥j. vel ℥ij. in vino Malvatico (in quartana) 6. vel 7. horis ante paroxysmum vehementer sudores movet, & sæpius vomitum.

3. Alumen crûdum, cuius ℥j. vel ℥℥. in aqua vel decocto Centaurii minoris 5. horis ante paroxysmum, datur, sudoribus, si fieri potest, provocatis: quod satis laudare in Quartana nequeo.

4. Sal Absinthii seu ostrutii debitò modò paratum, cuius ℥℥. ad summum in aqua Centaurii minoris datur ante paroxysmum.

5. Oleum piperis nigri per Vesicam destillatum (cordiale eximium & refrigerans & dulce cum grata humiditate) cuius gutt. iij. vel v. in aqua Tabaci vel Centaurii minoris horis aliquot ante paroxysmum data febrem tollunt.

6. Testæ cochlearum, docente Crollio, in specifico febrili.

7. Spir. Salis Ammon. cuius gutt. iij. usque ad vij. in aq. Centaurii minoris vel Cichorii horis 5. vel 6. ante paroxysmum sudoribus inde proluentibus dantur.

Composita sunt: 1. Aqua radice Imperatoriz, quæ fit hõc modò:

℞. Radice ostrutii & vini generosi ana, digerantur in vicem in B. M. sub alembico exco, postea destill. ex alembico per arenam in sine, cavendo, ne Emphyreuma redoleat. Hujus exhibe patienti in die quietis & postero 3. horis ante paroxysmum, atque ita etiam tertiâ die jejuno ventriculo cochl. j. ut sudores, si possit, moveat. Rarò post specificum Paroxysmus redit.

2. Est compositum Crollii ex oleo vitrioli & sale Absinthii seu spir. ejus cum aqua Cichorii.

3. Est aqua formicarum composita, quæ fit hõc modò.

℞. Aqu. fragorum, Centaurii minoris ana ℥℥ij. Mellis ℥℥ij. vel iij. M. in cucurbita detruncata, eamque sine integumento in acervo formicarum sepeli usque ad summitatem, & formicæ confertim admodum irrudent in vasculum dulcedine mellis fest. allectæ. Post collectam harum sufficientem quantitatem, exime vas, omnia invicem probè munda agitando, per alembicum ex cineribus eliciatur aq. quæ diligenter servanda: dosis ejus est in principio cochlear. ℥. ad summum.

Hæc aqua (scilicet in febribus tantum, ista aqua Tabaci) interdum vehementius movet vomitus, operæ pretium itaque est, ut diligenter

rius natura patientis consideretur, an nempe ad Vomitiones sufferendas habilis sit necne: Et an causa morbifica febris per vomitum apte expurgari possit, præterea quoque, an vires patientis consent.

Licet nimirum hoc specificum febres intermittentes tollat, quod si tamen ad vomendum minus sit dispositus æger, hoc specificum potius intermittendum, quam temere periclitandum.

4. Sal. Centaurii minoris in formam compositi hoc modo redactus.

℞. Sal. Centaurii minoris probè facti ʒj. Conf. rosarum vitriolatæ, violarum ana ʒj. M. de hac mixtura exhibebis ʒij. quotidie, in primis vero ante paroxysmum 2. vel 3. horis datur etiam vesperti atque ita perge, donec declinet febris.

5. Mixtura simplex 4. vel 5. horis ante paroxysmum aliquando etiam intermediis.

Quartana eadem purgantia requirit, cautè tamen fuerit progrediendum.

Quartana nimirum quasi Indibrium Medicorum, nisi convenienter & molliter tractetur, sive jam recens nata fuerit, sive jam adoleverit, aut ad ætatem aliquam pervenerit, raro sui domitorum exactum relinquit.

Præterea multum sicut est in naturis Quartanarum, quæ sæpe medicamenta etiam cum summa mollietate exhibita elidunt.

Extractum Ellebori pro purgante, vel etiam pilulæ Antimoniales (de quo supra de purgantibus) per secessum tantum moventes, blandissime hujus febris mineram extrudunt, præterea si recens, aut si post aliquot menses sua sponte ad declinandum inclinata fuerit.

Sæpiissime enormes obstructions splenis & hypochondrii sinistri derivato subinde malo ad venam cavam, unde dolores dorsi, lumborum, Coccygis, plerumque dominantur: sæpe præcedit icterus niger, aut sequitur, aliæque graviora symptomata morbum vehementiorem faciunt. Ubi sanè aperiencia in primis sunt necessaria, quæ hoc loco nulla sunt alia, quam quæ antea tradidimus.

Vomitum in febre Quartana haud prodest. Etsi nimirum primam ventris regionem aliquantulum expurget, & circa loca vicina aliquid heterogenei depopuletur, nihil tamen attingit, quod proximè febrem continet.

A vomitu itaque sæpe repetito abstinendum (sufficit una Vomitio.)

Specificum etiam Paracelsi purgans, etsi Quartanam non tollat, est tamen insigne aperitivum, si ejus aliquid misceatur cum cæteris digestivis. Sæpius idem specificum purgans cum Extracto Ellebori (ana vel ultra) justâ dosi mixtum exhibitumque, paulatim mineram febrilem consumit, aliquoties, sed admodum leniter alvum expediendo: quæ sanè nullum aliud purgans in Quartana dari potest felicius. Hoc nimirum obstructions feliciter aperit, alvum subducit, febremque simul tollit. Extractum Lapidis Lazuli de quo supra de purgantibus.

Etsi autem post repetitas hæc evacuationes quandocunque propter profundius impactas mineras febris haud desinat: nihilominus tamen pergendum & tandem ad specifica deveniendum, (vesperi ante exhibitionem specifici abstineat æger à cibo,) quæ sunt:

1. Oleum Myrrhæ, cujus guttæ 4. ad 8. in vehiculo convenienti exhibeatur paulo ante paroxysmum.

2. Succus nasturtii aquatici cum ana aceti mixtus, & si terre possint, cum oleo communis distemperatus, cujus cochlearia 2. vel 3. cum guttis 6. vel 8. spiritus salis ablinthii (in ejus defectu salis ablinthii) paulo ante paroxysmum exhibeantur ter vel quater continuando statò paroxysmi tempore, etiam emaneat ille.

3. Pulvis serpentum seu Viperarum (de quo supra de asthma & elephantiasi) ex carne & spina dorsi, non solo corde curativus, cujus ʒj. ad ʒiij. in convenienti vehiculo ante paroxysmum datur ter vel quater continuando statò paroxysmi tempore, etiam emaneat ille.

Quandoque in febribus quartanis, tum in statu isto, tum etiam in declinatione vehementissimi sunt dolores dorsi, causam diximus supra.

Huic symptomati medetur sacculus oblongus ex hordeo integro in aqua simplici ulque ad crepaturam cocto, calide spinæ dorsi toti ante paroxysmum, vel etiam post eundem doloribus nempe aliquandiu subsistentibus applicatus.

In febre Hæctica eadem ferè necessaria, quæ supra in exulcerationibus pulmonum propolita fuerunt. Hanc nimirum tanquam comes in dividuus Hæctica sequitur, quæ sæpius majorem Medici operam requirere videtur, quam morbus ipse.

Humectantia & refrigerantia non quidem accidentaliter, sed essentialiter necessaria sunt. Sales Corallorum & perlarum hic multum valent.

Quandoque balnea dulcia habitum corporis exsiccum & aridum plurimum juvant.

Lac asininum (calide) in hæctica, præsertim à sumpto menstruo corpus infestante, mirifice restaurat.

Sunt etiam alia quamplurima ab autoribus descripta, quæ consulendi sunt.

Febres compositæ curantur ad modum simplicium, ita tamen, ut purgantia sint leviora.

Febres quotidianæ puræ maxime hospitantur in ventriculo, earum ergo cura sola vomitione absolvitur, quæ aqua benedicta vel aliis vomitoris intenditur.

Deinde corroborantia ventriculum sunt varia: in primis autem confortat conserva acetosellæ, rosarum, menthæ, cum acidulis numeralibus (spiritus vitrioli) distemperatæ.

Reliquum absolvit dixit: quandoque etiam interna ab impuritatibus viscosis & lentis liberanda sunt, cui sanè negotio suppetias ferunt Panchymagogum vegetabile, specificum purgans, & in primis Antimonium per secessum purgans.

Per malignas Febres intelligimus quasunque affectiones Epidemicas, ab initio rigorem, deinde verò calorem intensissimum incutientes non sine malignitate vel aëris vel etiam ab esculentis & potulentis aliquando causatas: tales sunt Petechiales, Hungaricæ, catharales febres. Item ardentes, quæ magnam partem Europæ hæcenus invaserunt & subinde exeunt.

In istis curandis feliciorem modum invenire fas non est, quam qui a vomitione incipit, & per media necessaria tandem in confortantibus desinit.

Vomitorium est aqua benedicta, cujus usus meritò laudatur.

De venæsectione aliquibus formidabili, à nobis disputatum est sæpius, necessaria an sit, necne.

Plethora intermissionem non admittit, sæpe in corporibus biliolis venæsectio temeraria fuit.

Nos cum Rulando Phlebotomiam ita distemperamus, ut urgente necessitate & indicationibus satis manifestis nusquam ab eadem tuto deflecti posse statuamus, vide tractatum de Ungaris Martini Rulandi filii. Videatur item Balthasar Conradinus de Febre Ungarica.

Aq. C. C. recentium sanguine adhuc rigidorum ad omnes Febres ardentes, malignas & Epidemicas supra de Confortantibus.

(Sic valet hic multum)

Oleum Anti-Paralyticum.

℞. Gut Scheidevasser vvirff darin etliche hueffnägell, doch nicht zuviel, damit die entzündung nicht zugros vverde. Gieß also fort darauf Baumöhl, oder *Oleum Thierbenhina* oder *Petra*, so vvirrd der *Sulphur Antimonius*, das öhl blutroht fermen, und dick machen. dieses öhl hat nicht seines gleichen in *Paralyse*, in Schwundung der glieder, oder vwann selbige durch fallen geschädiget, in geronnen geblüt &c. oft dam it geschmieret, vwann der schaden frisch, hilft es so bald, ist er aber alt, muß länger damit angehalten vwerden, Innerlich habe diß öhl zuvar noch zur zeit nicht gebraucht, zuveiffele aber nicht, das es auch innerlich sehöne Wirckungen thun solle.

Methodus curandi Febres.

In curandis Febribus sequens potest esse methodus principio statim, si sit febris continua, præmissis clystere, emolliente & refrigerante, vena aperiatur vel circa quartam vespertinam vel tempore matutino, cum vespere præcedente clyster injectus.

Hinc singulis diebus offeratur Julepus refrigerativus constans ex decocti refrigerantis ꝑ. iv. Syrupi violarum aut de Cichorio ꝑ. ij. M. & fiat Julepus, de quo sumat ad libitum pro potu. Aut.

℞. Aquæ Endivæ, Cichorii ana ꝑ. ss. Rosarum ꝑ. iv. salis Prunellæ ꝑ. ij. Syrup. Nymphææ, vel violarum aut de ꝑ. radic. ana ꝑ. ss. M.

Vel ℞. Rasuræ C. C. ꝑ. ij. Coq. in aqua hordei vel papaveris l. q.

℞. Hujus decocti ꝑ. ij. Syrup. de Tussilaginis, de Præssio, Capillorum Veneris ana ꝑ. ij. Spiritus Scordii sine additione gr. 8. Vitrioli gr. 12. M. F. Potio, quæ assumptâ aliud præscribatur, cui nonnunquam post purgationes Universales Sacchari Saturni ꝑ. ss. vel gr. 6. admisceri possunt.

Die sequente post venæsectionem detur Apozema aliquod aperiens & laxans, aut quod non incommodum, purgetur infusione Rhabarbari aut Extracto panchymagogo. Aut fiat Syrupus Magistralis ad naturam patientis & humoris peccantis accommodatus.

Hinc per duos dies utatur manè & tribus horis à prandio aperiens & laxans Apozema: quinto die iterum purgetur habito respectu ad dies Criticos: si febris non remittat, iterum aperiatur Vena die octavo, & ex indicantium ratione detrahatur sanguis, semper interim continuando Julepum dictum, cui etiam nonnunquam guttæ aliquot spiritus vitrioli aut tartari admisceri poterunt, aut ꝑ. succi limonium depurati.

Si vires labascant, interdum detur Confect. Alkermes aut de Hyacintho cum syrupo delimonibus & aqua Cordiali destillata.

Potest etiam fieri opiata, quæ ℞. Conserva nymphææ, rosarum, Cichorii ana ꝑ. ss. salis perlarum. spir. vitrioli ꝑ. ss. de qua capiat ad libitum. Item interdum vespere cum dictis confectiionibus & diebus criticis præsertim offerri possunt gr. vj. lapidis bezoardici aut ꝑ. ss. aquæ ctypois cervorum: imò, si dicto Julepio abhorreat, præsens incoquere licet rasuram CC. quam si rubeam intar vini desideres, adde radicis Oxalidis seu acetosæ ad libitum, sed tunc non oportet addere liquiritiam sed passillas, jujubas & radices utrybi, relinquatur donec refrigescat.

Interdum magno cum commodo in talibus febribus excitatur sudor, aut cum lapide bezoar, aut cum Antimonio fixo diaphoretico, aut cum Bezoardico minerali. Datur post sudorem in copia imò & in ipso sudore Julepus cum sale prunellæ, aut spir. vitr. vel sulphur. cum aqua hordei ad aciditatem gratam.

Si lingue ardor adsit, prodest extrahere mucilaginem e semine Cydoniorum aut mali granati, aut sal prunellæ in aqua dissolvere, ut talia æget in ore teneat. It. sæpius comedat malum granatum.

Si adsit magna lingue nigredo, convenit aperire venas sublinguales.

Si febris sit intermittens, eadem medicamenta quoque prodelle possunt, variata tamen pro constitutione materiæ, & morbi, modo observetur quotidiana si adsit, in qua plerumque de ventriculo conqueruntur, ut offeratur vomitorium semel atque iterum ex infuso florum aut Vitri Antimonii aut vitriolo albo. Hinc sine omni coctione medicamenti paulo fortioribus purgetur, quæ ut in aliis semper eo modo offerenda, ut ante paroxysmi accessum operationem suam pericere possint, verbi gratia, si accessus sit hora 9. matutina; dandum purgans hora tertia, & sic consequenter.

In fine Paroxysmi sudor, qui plerumque prorumpere solet sponte, largiter ut fluat permittatur, ægro bene cooperto, & cum largiter concedatur potus Julepi superius præscripti. Si non purgetur, semper ante paroxysmum hora j. assumat Julepum dictum, cui duplæ quantitas salis prunellæ addit sit, quantum voluerit, ad minus ꝑ. vj, aut si abhorreat, fiat emulsio.

Post primam purgationem die sequenti, si vires constant, aut si non, subsequente, vena secetur.

Si his medicamentis per tempus aliquod continuatis non cedat febris, utile est sub initio paroxysmi, cum prima vestigia horroris in artubus gliscunt, exhibere in adultis ꝑ. ij. in foeminis ꝑ. ij. vel ꝑ. ss. in pueris ꝑ. ss. vel ꝑ. j. sequentium pilularum, quæ mirifice morbos febriles expellunt, de quibus supra de intermittente febre.

℞. Vitri Antimon. per se facti & tenuissime pulverisati ꝑ. ss. sacchari canarii, farine tritici ꝑ. iij. Croci ꝑ. j. Coque in aq. communi igne lento ad formam pultis, ad plenam spissitudinem, cavendo ne in fine aduratur, sed fere panis formam habeat, fac inde globulos, &c. aut detur Cochlear ss. aquæ febrilis sequentis.

℞. Aq.

℥. Aq. Centaurii minoris, fragorum an ℥ij. mellis ℥iij. M. in Cucurbita &c. Hujus descriptionem vide in annotationibus in Crollium & alibi.

Aqua in omnibus febribus. ℥. Salis niri ℥j. sulphuris, sal. Ammon. ana ℥ss, ex sale & sulphure hat lapis prunella; in nne addendo sal. Ammon. hujus lapidis.

℥. ℥ij. Aquæ Cardui benedicti ℥iij, olei sulph. ℥ij. M. & F. aqua Cardui benedicti secundum artem. Hujus aquæ ℥iij, vesperi exhibeantur aliquoties in malignis Tertianis, &c.

Vidimus quoque alios curatos esse sale ablinthii a ℥j ad ℥ss cum spir. vitrioli guttis vj. aquæ Cichorii ℥j. ij. aut iij. ante paroxysmum tribus horis expectato sudore in lecto. Aut detur dosis ex spiritu tartari aut salis ammoniaci preparati, velut diximus in imbecillitate ventriculi, a gr. vj. ad viij. in aqua centaurii minoris vel decocto Cichorii 3. horis ante paroxysmum expectato in lecto sudore largius profuente, febrim tollit. Eadem dosis est iteranda, si prima vel secunda vice non satisfecerunt.

Multum quoque valet specificum febrile Crollii ex Conchis, cujus dosi, ℥j. ad ℥ij. in haultu vini.

In omnibus dictis febribus non intermittenda Epithemata, cordi, hepati, & testibus applicanda, de quibus vide apud Practicos.

tandem notetur, quod in omnibus intermittentibus diuturnis ad Antimoniata & Mercurialia confugere liceat, eo quod tomes absconditus sit in parte aliqua interna, in primis in Meenterio, unde, nisi uno e dictis medicamentis omnia percurrentibus excutatur, vix fomitem unquā recte expelles, nisi longo tempore.

In Quartana hat principio syrupus Magistralis liquidior ex aperientibus & splenticiis & Melancholiam expurgantibus, de quo singulis diebus matutinis alumat dosim, excepto die, quo laborat febris. Aut fiat Apozema aperiens & laxans, de quo capiat singulis diebus doses duas mane & horis tribus ante cenam: Empiatrum lieni applicetur semper ex ammoniaco gummate post universales evacuationes.

Sublatis obstructionibus ad Antimonialia accedere licet, quibus si malum non cedat, convenit offerre duobus diebus continuis bezoardicum minerale, cujus post absorptionem excutetur sudor in lecto.

Ante Paroxysmum cum signa presentis instant dantur olei Caryophyllorum gr. vj. vel viij. in conserva aliqua aut syrupo, aut detur succi expressi de sempervivo minori Cochlear cum vino, aut offeratur infusum Auri vel ind vomitorium. *Joh. Hartman. in Pract. Chymiatrica.*

Si febris tertiana intra breve tempus, nec sponte naturæ sensim declinet, ut intra 7. vel 10. periodos plane cesset, nec quovis a predictis modo judicatur, nec pharmacia ope tollitur, quin post 10. aut 12. paroxysmos agrotantes usque graviter affligat, curationis difficile admodum incumbit pensum: quippe sanguis a continua materie febrilis conglutinatione, crebrisque incendiis adeo depravatus tandem evadit, ut nihil rectè coquat pro corporis nutrimento, & ejus viribus sustentandis: nec impuritates & excrementa a sinu suo prorsus excutere valet, quod morbi crisin faciat: ac verò eodem in dies

prapollente, sanguis præter dyscrasiam ejus, in mixtione nonnihil lædi incipit; quare paroxysmi crebriores infestant, nec eis perfecta ~~curatio~~ intercedit, quin ægri valde imbecilles & languidi, cum siti & calore fere continuo febricitant. Quando res ad hunc statum deducitur, nisi remediis ab arte succurritur, aut soli & coeli ~~tempore~~ tempestive opem ferunt, non raro hic affectus in mortem terminatur.

Quoad curationem, medendi methodus vulgo in unicum hunc scopum dirigitur, nimirum ut morbi minera extirpetur, & sine fomite residuo aut recidivæ metu materia febrilis e corpore nostro eradiceatur; quare vomitoris & cathartici diligenter insititur, quæ cum nihil ad curam pronciant, quin plurimum frangantur vires; ægroti a medicis relinquuntur, & res tota naturæ committitur. Intentiones (uti mihi videtur) debent esse hujusmodi. Primò sanguinis ad temperiem naturalem restitutio. Secundò, depravationis succi nutritii (quantum heri potest) præcautio. Tertiò, fermentationis febrilis, ne paroxysmus suscitetur, inhibito. Atque hæ indicationes non tantum in febre tertiana, sed in quolibet præterea intermittente locum habent: quæ tamen non iisdem modis aut remediis, verum aliis & aliis pro diversitate morbi, conditionis ægri, & symptomatum maximè urgentium, sunt peragendæ. Utcunque in curatione hujus morbi plus naturæ & bene nutritæ victus rationi, quam pharmaciæ tribuendum est.

1. Circa primam intentionem, nimirum ut sanguis ad temperiem naturalem reducat, vomitoria, venæ sectio, & purgatio magni sunt usus, præcipue si in morbi principio celebrentur. Juvant vomitoria tum quatenus ventriculum expurgant, ut coctio primæva melius perficiatur, indeque chymus nutritius pro materia sanguinis purior suppeditetur; tum præcipue quatenus bilem e meatu choledochi copiose exprimendo cyllin felleam manant, ut exinde bilis e massa sanguinis plenius elutrietur, adeoque sanguis a recementis salis & sulphuris adultis depuretur. Venæ sectio sanguinem refrigerat & ventilat, ut propterea minus torrefiat, aut præstetur, atque liberius sine adustionis periculo in vasis circuletur. Item purgatio bilem e vasis felleis, & consequenter e cruoris massa libertim emulget, & proritando exprimit. In hunc finem (scilicet cruoris reductionem) conferunt digestiva, acetosa, attemperantia, quatenus sanguinem fundunt, & alterant, ejusque fervorem attemperant. Quandoque etiam soli & aëris mutatio malam sanguinis constitutionem præ cæteris quibuscunque remediis insigniter emendat.

Secunda intentio, dicta & exacta victus ratione optime perficitur; quæ in hoc morbo sit tenuis, & parca oportet. Quare vulgò dicitur fames optimum hujusce ægitudinis remedium: & communi constat experimento, a pariori victu accessionem febrilem ultra tempus consuetum sæpissime protelari. Duo sunt imprimis circa victum observanda: Primò, ut alimenta sint tenuia, nihil exhibeatur sulphureum aut spirituosum; sic enim conflagratio sanguinis minoratur; dein secundo, ut ingruente aut urgente paroxysmo, nihil alimenti inge-

ratur : quare in jejunis paroxysmus est levior, & citius finitur.

Quod tertio erat propositum, accessionis febris inhibito instituitur per remedia quæ sanguinis fermentationem sistunt. Licet autem hoc remedium Empiricum, amethodicum & valde indidm apud Medicos audiat, tamen mihi competenti est, has febres hoc modo sæpenumero curari, cum pharmaca non omnino prodesse. Qualia sint, & quo ritu, absque venetici suspitione, pro curando hoc morbo juvenem præstent, supra annotatum est. Hic solum advertimus, horum ulum post pharmaca & venæsectionem (si opus ea fuerit) esse maxime prolicuum; & nisi hæc rite præmittantur, itæ altera raro paroxysmum inhibere. Vomitus autem, purgatio, & venæsectio, nisi ab initio itatum celebrantur, parum opis præstent, imo læpius obesse solent : dum enim sanguis spiritu vitali pollet, ejus mala diathesis facili negotio corrigi aut emendari potest : quæ si bilis circa initia copiosè emulgetur, aut cruor ventilatur, ad crasin naturalem reducitur : postea tamen in morbi hujus progressu (spiritu jam plurimum exhausto, atque sale & sulphure nimium exaltatis) si hujusmodi evacuationes adhibentur, sanguinis crasin plus debilitant : ideoque observatione constat, ab his remediis sero admodum febrem tertianam raro aut vix omnino curari, & sæpe in quotidianam transire. Novi egomet verno tempore quosdam satis integra valetudine fretos, ab emetico fortiori præcautionis gratia sumpto & evacuationem violentam faciente, è velligio in febrem tertianam incidisse; atque alios à febre hac aliquandiu curatos, cum purgationem pro exterminandis materiæ febrilis reliquiis fortiolem inirent, illico recidivam passos. In promptu erit dicere, minorem morbi prius sopitam, hoc modo à pharmaco excitari, & in actum deduci : attamen si recte hanc rem consideres, potius dicendum videtur, quod à pharmacia fortiori sanguinis crasis plurimum lædatur; cumque prius fuerit in dyscrasiam biliosam pronus, ut succu n alibilem ægre assimilet, à causa hac evidenti illico magis degeneret, ut protinus nutrimentum in materiam fermentativam perverterit, adeoque diathesin febrilem susceperit. Vulgo increbuit opinio, febrem tertianam sine vomitorio vix sanari posse; quare solent nonnulli medicastri, sub necessitatibus prætextu, quibuscunque hoc morbo laborantibus (sanguis & infirmis licet) non sine magno vitæ periculo pharmacum emeticum propinare : & quos tali remedio omnino impares censent, tanquam non facile curabiles naturæ relinquunt. Verum (uti mihi sæpius contrarium experto satis constat) hujusmodi praxis perperam instituitur : quin potius existimo pro curatione febris tertianæ, nisi in corpore robusto & ad votum facile proclivi, & cum contigere ventriculum materia excrementitia aggravari, raro aut nunquam vomitoria requiri, sed vice hujus lenem purgationem, qua humorum saburra blande subducatur, rectius ex usu fore : quippe purgatio in hoc casu idem præstat quod vomitorium; nimirum vasa cholechoa evacuat, ut bile è sanguine uberius exhausta, dyscrasia febrilis emendetur. Cum autem humor felleus in ventriculum exantatus

sursum educitur, gravis inde noxa stomacho infertur, ac insignis perturbatio in toto corpore excitatur : si vero à leni cathartico humor ille deorsum proritetur, sine quavis molestia foras excernitur. Dein, si blanda purgationi semel aut bis iterata victus admodum tenuis & carni expers accedat, indicationi præservatoriz non raro satishet, ut pro causa morbi tollenda non aliis remediis opus fuerit; quin his rite præmissis in usum adhibeantur, quæ aut intus sumpta, aut exterius applicata accessionem febrilem sistant. Hujusmodi plano & facili medicinx instituto, scilicet purgatione ex infuso senæ & rhabarb. victu tenui, & topico febrifugio pectori aut carpi adposito, sine pharmaci cupulvis alterius deleterii usu febres tertianas brevi tempore sæpius curatas novi : quinimò gravidas, senes, item valde imbecilles, quorum vires purgationi non sufficerent, solum tenuis diæta cum periaptis tempestive adhibitis perquam feliciter sanavi. Illius methodi optatum successum ita crebrò expertus sum, ut minime dubitem, febrem tertianam, si ab initio hoc modo tractetur, scilicet priusquam mala victus ratione, aut pharmacia perperam adhibita sanguinis temperies plus lædatur, æque facile ac alium quemvis morbum persanatum iri. In hujus vero rei fidem liceat sequentem historiam proponere.

Juvenis quidam nobilis, bilioso temperamento præditus, febre tertiana intermittente corripiebatur; ingruente paroxysmo plurimum bilis flavæ & viridescens evomebat, dein cum insigni cardialgia, calore & siti intensissimis, per plures horas graviter molestabatur. Huic, intermissionis die, quo fortè aderam, ex præscripto meo sanguis ad uncias octo fuit missus, & post meridiem clyster emolliens injectus; etiam victu tenuissimo (scilicet tantum ex hordeatis) utebatur : cepit qualibet nocte hora somni hanc optatam, scilicet Conserv. rosarum vitriolat. sem. drac. dialcordii i. scrup. etiam qualibet mane salis absinthii i. scrup. & cochleari succi aurantii : sed cum hæc non succederent (redibat enim paroxysmus nonnihil remissior, seu cum vomitu atroci ut prius) insuper cum vomitorio hic æger valde perhorrescebat (quoniam antehac non ita pridem ab emetico admodum leni fere trigelies evomuerat, usque dum spulino & convulsionibus affectus in magnam virum prostrationem cum vitæ periculo adduceretur) ideo die prædictum paroxysmum sequenti potionem ex infus. Senæ, Rhabarb. & Santal. Citrin. cum sale absinthii in aq. fontan. exhibui, à qua decies purgabatur cum levamine : mane proximo 3. horis antequam paroxysmum expectaret, epithemata febrifuga carpi admovi, & sanguinem denuo misi ad 6. unc. ex quo accessione febrili caruit, & dein iterum eodem modo purgatus integrè convaleuit.

Quod si febris tertiana ob malam ægrotantis constitutionem, vel propter errata in victu, aut pharmaciā commissā, aliis radices egerit, ut post diuturnam affectionem paroxysmi usque ingrescant & cum viribus dejectis, siti, & æstu tere continuis, inappetentia, vigiliis, pulsu debili, urina rubicunda & contentis valde saturata, laborantes summe oblanguescant; me-

thodus therapeutica paulo aliter institui debet: in hoc casu primo entendum erit, ut sanguinis dyscrasia tollatur; quare alimentis solum tenuibus, uti sunt iuscula hordeacea, aut avenacea cum radicibus aperitivis incoctis (jure carnum omnino posthabito) ægri velantur: enematum emollientium usum (si opus fuerit) alvus soluta servetur; insuper (catharticis omissis) medicamentis solummodo digestivis, quæ sanguinem fundant, & serolas impuritates blande per urinas educant, necnon remediis confortativis, quæ viscera corroborent, & spiritus refocillent, præcipue insistendum esse videtur. In hunc finem apozemata ex herbis & radicibus leniter diureticis concinne parata, item opiata ex conservis temperatis, cum sale nitri, aut herbarum fixo, cumque pulveribus testaceis, & spiritu Vitrioli admixtis, adprimum conducunt. Quando sanguinis crasis non nihil emendatur, ut urina sit clarior & minus colorata, etiam somnus quietior, cum sitis & æstus remissione succedat; tunc remedia paroxysmum febrilem inhibentia utiliter adhiberi poterunt: quare Epithemata febrisfuga carpis, aut plantis pedum applicentur, etiam pulvis e Cortice Peruviano aut ex succedaneo ejus; aut etiam e corticibus fraxini. Tamarisci, vel gentianæ, cum salibus admixtis e vino albo propinetur: postquam accessiones tolluntur, & ægroti viribus constare, ac alimenta appetere, & aliquo modo concoquere incipiunt, purgantia lenitiva ex usu erunt; usque tamen à victu lautiori aut carnum participi ægroti abstineant: atque non dubitandum erit, quin absque catharsi violentiori, aut phlebotomia, ægrotantes integram valetudinem propediem sint recuperaturi.

Febris tertianæ, propter affinitatem & paroxysmi similitudinem, proximè succedit quotidiana, scilicet cujus accessio quolibet die redire solet. Quorundam opinio est, hujusmodi febrem esse solummodo tertianam duplicem; & à materia dispersa, & duplicem locum nata oriri; cui tamen non assentior, ejusque exitum peculiari sanguinis dyscrasiæ attribuendum duco. In hac frigoris & caloris symptomata sunt remissiora; verum accessio diutius protrahitur, & sæpè horas 18. aut 20. solet durare: hæc febris, ut plurimum, tertianæ succedit; cum enim spiritus vitalis à crebra sanguinis deflagratione plurimum avolarit, atque (diathesi febrili adhuc manente) cruor debiliior factus sit, succum nutritium minus coquit, aut maturat, & totum ferè in materiam fermentativam pervertit; quare citius ad incrementum pervenit, & sub duplo illius temporis, quo prius, ad turgescentiæ plenitudinem congeritur. Quoniam vero materia congesta cruditatis a que ac adustionis particeps est, ideo effervescentiæ calor est remissior & inæqualior, atque (instar ligni viridis foco superstrati) lentius deflagrat; quare paroxysmus est durationis longioris.

Quandoque accidit febrem quotidianam sine prævia tertiana primò oriri, scilicet cum in corpus cacochymicum, & pravis succis referatum diathesis febrilis incidit; tunc enim sanguis spirituum in ops, succum nutritium in majori copia pervertit, & breviori tempore ad turgescentiæ plenitudinem congerit: quæ au-

tem quotidianam incipit, non raro typum commutat, & tertiana evadit; non secus ac tertiana sæpè in quotidianam migrat, liquidem inter has febres, earumque causas magna est vicinitas; & constitutio sanguinis parum immutata, alterius in alteram præterire facit. Febris intermittens quotidiana non ita facile uti tertiana curatur, live enim illa simplex primò advenit, live alteri intermittenti succedit: utcumque à causa fortiori excitatur, & majorem arguit sanguinis dyscrasiam, quæ remediis haud statim cedit. Quin etiam hæc febris si diuturnior fuerit, aut morbo alii chronico supervenerit, præter sanguinis labem sapissimè adjunctas habet viscerum infirmitates: nimirum sanguis labefactus impuritates suas sensim congestas visceribus, dum eorum anfractus pertransit, facile affigit; (hinc cum febre quotidiana ventriculi aggravatio, hypochondriorum tensio, modo hepatis, modo lienis, aut mesenterii obstructions, aut tumores conjunguntur) sunt autem hujusmodi affectus non causa febris (ut vulgò creditum) sed tantum ejus producta. Quare in hac febre præter simplicem curationis methodum, quæ in tertiana indicatur, quamplures aliæ intentiones, sine coindicantia, in considerationem veniunt: nimirum ut ventriculus humotum saburra-expurgetur, viscerum infractions liberentur, infirmitates corroborentur, atque una cum his dyscrasia sanguinis emendari queat, & accessiones febriles inhiberi possint, omni ope niti decet; unde propter varias hujusmodi intentiones longiori via ad curationem proceditur; in hoc casu vomitoria (si vires ferant) erant præ cæteris ex usu: etiam purgantia, quibus assiduus materiæ excrementitiæ proventus eliminetur, sæpius iteranda; præter hæc, remedia digestiva, deobstruentia, quæ fermenta viscerum, & sanguinis restitunt, & dyscrasias corrigunt, erunt crebrò adhibenda. Quamobrem sales herbarum fixi, eorundem extracta, spiritus mineralium acidi, ac interduum chalybis præparata apprime conducunt: circa hac media difficile incumbit pensum, cum ob multiplex malum simul plura sint agenda, attamen ob paroxysmi febrilis assiduitatem paucioribus solum uti ægro vacat. In affectibus ita complicatis, licet methodi ratio postulet impedimenta primò amovere, & dein morbum sanare; tamen hujusmodi febrem in corpore cacochymico cum plerisque aliis affectibus mixtam sæpè *duplex* & Empirico modo curatam novi; scilicet, post levem totius provisionem remedia febrisfuga exterius applicata accessionem febrilem primò sublevarunt, ut dein reliquis affectibus curandis tempus, & medendi occasiones feliciter concederentur. Nuper invisi foeminam illustrem, quæ cachectico corporis habitu diu prædita, post mensem a puerperio languida, & imbecillis, febre intermittente quotidiana corripiebatur; à cujus sex, aut septem accessionibus vires in tantum erant prostratæ, ut lecto exsurgere, aut in eodem suscitari vix potuerit: alimenti, licet tenuissimi, ne tantillum capessere, quin maxime inde molestiæ stomacho cicerentur; insuper regio ventriculi, & hypochondrii sinistri erat tumore duro, renitente, & immaniter dolente, per totam obsita. propter vires summe

me prostratas præter enenatum usum nullus hic evacuationis vit locus; etiam alia quæque remedia, nisi pergrata, & in exigua tantum quantitate, stomachus valde imbecillis averfabatur. In difficili hoc casu, atque intra angustos medendi limites circumscripto pauca hæc consuli, nimirum ut bis in die sumeret hanc mixturam, scilicet A. j. Magistralis lumbricorum; unc. 2. Elixir proprietatis g. ll. vi. insuper forum ventriculo adhibendum innitui, ex solis absinthii Pontici, Centaurii, Abrotani, cum radicibus Gentianæ, vino albo in vase cooperco incocis: etiam ut post forum placenta ex pane tosto, & eidem liquori intincta, supra ventriculi regionem gestaretur; præterea Epithemata febrifuga carpis alliganda curavi; atque his iolummodo remediis die tertio paroxysmo febrili caruit, & ab eodem postea immunis perstitit: dein remedium chalybeatorum usu intra breve tempus integre convalevit.

In febre quartana, quàm in cæteris, periodus est longior, quæ nimirum inclusive in diem quartum extenditur. Etiam mora esse solet diuturnior, & curatio difficilior: quippe hic morbus ad plures menses, sæpe etiam annos protrahitur; & raro, aut vix omnino medicamentis cedit.

Paroxysmus ut plurimum à frigore, & rigore incipit, quibus calor succedit latis molestus, sed remissior quàm in tertiana: sudor plerumque accessione concludit. Quando morbus recens invadit, paroxysmi sunt graves, & admodum infelici, ægrosque lecto affigunt, necnon de robore, & vigore corporis decidere faciunt: postea verò leviori absolvuntur plaga, ut accessiones extra lectum quandoque in itinere, aut aliud quicquam agentes ferant. Longius si hæreat, affectionem scorbuticam, aut hypochondriacam inducit, hominesque statu in valetudinario implicat.

Causæ, quæ ad hunc morbum disponunt, sunt primò soli, & cæli constitutio; quippe tempus autumnale huic affectui ferè proprium est, ut raro observes febrem quartanam, nisi circa autumnum oriri: etiam in quibusdam locis, præcipuè juxta oram maritimam, hic affectus solet esse Endemius, quosvis illic degentes, aut aliorum advenas confestim occupare. Huc etiam faciunt ætas declinans, quæ in ægrotis constituitur; etiam melancholica temperies, & quæ ob malam victus rationem affectioni hypochondriacæ obnoxia est; insuper febres alius generis diuturnæ, & morbi chronici non raro in febrem quartanam transeunt.

His juxta positis, & rite pensatis, dicendum videtur, quod febris quartana, æque ac cæteræ intermittentes, à vitiosa sanguinis diathesi dependeat; quia nimirum succus nutritivus sensim in vasa delatus, in materiam fermentativam pervertitur; atque hujus usque ad turgescentiæ plenitudinem congestæ effervescentiæ febris quartanæ paroxysmum constituit. Cum verò in hac febre nonnulla sint à cæteris peculiaria, inquirendum erit, qualis sit in hoc morbo sanguinis dyscrasia, à reliquis distincta, & quo pacto symptomata præcipuè notabilia excitet.

Super hac re quæ vulgo perhibetur opinio à veritate multum recedit. Fere omnium

consensu febris quartanæ essentia, & origo humori melancholico alicubi in primis vis coacervato, & periodice illic putrescenti ascribitur. Vice hujus, asserimus nos, quod in hoc morbo sanguinis liquor à natura dulci, spirituosus, & balsamicus in acidum, & nonnihil auterum, instar vini accecentis tranierit: nimirum adeit spirituum penuria, atque sanguinis pars Terrestre, seu Tartarea (quæ contat in primis Sale, & Terra) nimis exaltatur, & in fluorem evecta acorem cruoris massæ inducit: non secus ac cum cervisia à tonitu commota, & sæpe turbida infecta acescit. Sanguis hoc modo ab indole nativa degener succum alibilem non rite coquit, & sibi assimilatur, sed in materiam extraneam pervertit; quæ cum ad plenitudinem in vasis saturatur, partesque nervosæ a succo illinc oriundo irrigantur, sequitur hujus materiæ fluor, & velut spontanea effervescencia, quæ nimirum accessio febrilis cum rigore, & calore, non secus, ac in tertiana, solet induci.

In febre quartana periodi longiora habent intervalla, quia cum sanguinis dyscrasia sit versus acidum, ideoque minus acris & calida, succum alibilem sine luctu & tumultu pervertit; quare ejus nonnihil assimilatur, & reliqui depravatio non ita longè, ut in tertiana, à statu naturali recedit: atque hinc ejus congestio ad plenitudinem fit tardior, & sere sesqui-altero istius temporis quo in tertiana ad turgescentiæ assurgit: ideoque hæc febre correpti mediocriter valent, & robusti sunt, quod indicium est succi nutritii minus depravati; etiam paroxysmi sine immani incallescencia sunt, quia tunc magna adulatione humor nutritivus in materiam fermentativam pervertitur.

Cur autem hic morbus tam difficilis sit curationis, adeoque pertinaciter ægros infestet, in causa est atrabilaria sanguinis constitutio, quæ non facile amoveretur, & ferè nullis cedit remediis. Diathesis biliosa crebra sanguinis delagratione emendatur, & sæpe sponte cessat; non secus ac vina nimis opulenta propria effervescencia deprimuntur, & in debitum statum reduci solent. Verum melancholica hæc sanguinis dyscrasia, in qua cum spirituum inopia & defectu, Sal & Terra nimis exaltantur (veluti cum vina acescunt) difficillime restituntur, & pene ejusdem laboris, & difficultatis est, ac in aceto vigorem, & spirituum vinosum redintegrare: etenim ut sanguis illo modo depravatus reducat, opus erit, ut tota ejus massa volatilifera, ac velut de novo spiritualescat. Quare in hoc casu evacuantia ne hilum prosunt, imò sanguinem magis depauperando, sine medela sæpe vires atterunt: quin opus est his quæ quod fixum est exaltent, & volatilifera, & in tota cruoris massa præparatio promoveant. Inde est quod in hoc morbo cæli solique mutatio præ cæteris quibuscunque remediis læpissimè juvamen præstat: etenim febres quartanas circa autumnum oriundas, ver sequens non raro tollit. Quod proculdubio contingit, quoniam immutata æris conditio malam sanguinis diathesin in melius alterare solet: ob eandem rationem etiam & loci mutatio huic affectum pharmaco cuiusvis inexpugnabilem sæpissimè curat.

Si adhuc inquiratur, quare hic morbus in Autumno potissimum oriatur, raro autem Vere, aut Ætate, dico, tempus autumnale huiusmodi febrilem sanguinis diathesin aptissime producere: cum enim ab æstivo calore plurimum Spiritus, & sulphuris avolarit, & quod reliquum est, à frigore contipari incœperit, sanguinis liquor (veluti vinum à nimia effervescencia æscens) in naturam ponticam, & acidulesculam facile degenerat. Hoc etiam aura maritima halitibus salinis, & Spiritus tigentibus inficiendo sanguinem, facile procurat. Quin etiam affinitas huius morbi cum scorbutico, & affectione hypochondriaca plane indicat, in vitio esse malam sanguinis diathesin, qua nimirum falsus, & terrestris, cum *induratus* defectu evaserit.

Circa febres quartanas fuit novissimus annus observationum adeo abunde ferax, ut nulli non liceret quæcunque ad hunc morbum spectant, *autopsia* colligere; cum enim ætas calidissima præcellerat, circa finem ejus febris epidemica (cujus alibi habetur descriptio) insequuta est: dein vergente Autumno, cum morbus ille cessaret, febris quartana plurimum increbrescere cœpit, ut pluribus in locis fere quarta pars mortalium eadem corriperetur: nec tantum senes, melancholicos, lienotos, sed cujusvis ætatis, aut temperamenti homines, etiam infantes, pueros, juvenesque hic morbus passim intestavit: quod planè indicio erat, hunc affectum non ab humore atrabiliario ob lienis vitium congesto, verum a sanguinis dyscrasia propter anni intemperiem inducta, ortum traxisse: etenim sanguinis massa post nuntios fervores non secus ac vina post immodicas effervescencias, nonnihil acescere, aut diathesin aulteram nancisci habilis est: adeoque in huiusmodi febrem etiam proclivis, uti superius innuitur.

Quæ propter hujus curationem, tum à Medicis, tum Empiricis tentabantur remedia, si unà colligerentur, eorum descriptio in magnum volumen excresceret; verum multiplex licet medicinz apparatus contra hoc malum institueretur, tamen pauci admodum intra Autumni terminum curati sunt. In nonnullis circa primæ ægtotationis initia, priusquam morbus radices egerat, vomitoria opem contulere, in plerisque autem pharmaca quovis modo cathartica, centies licet repetita, ne hilum protecerunt: quibus altius insederat labes, à remediis excogitatis per totum Autumnum usurpatis ægroti nequicquam levaminis receperunt. Cum verò hoc tempore vulgares medicinz methodos incautum adhiberi cernerem, virgini cuidam perillustri curationem subitam quovis licet modo perficiendam exigenti, proposui ut si à pharmaco minerali per aliquot dies oris fluorem pateretur, inde morbum brevi profligatum iri speraret. Cum huic facile assensit, pharmacum ei mitius, & omnino tutum exhibui; à quo sputatio tantum levior, eademque inter duodecim dies finita, ciebatur. A quo salivatio incepit, paroxysmis statim caruit, quibus vero temporibus accedere solebant, perturbationem in toto corpore cum cordis oppressione, & lipothymia metu pensensit; postea tamen sputatione finita, planè convalescere videbatur: cumque iterum post bimestre spatium hujus morbi

leviores quasdam accessiones pateretur, à pulvere emetico bis, aut ter exhibito, sine recidiva integrè curabatur.

Post solstitium hyemale hic morbus non ita grassari, verum in nonnullis sponte sedari, in plerisque aliis pharmacorum usu facilius expugnari cœpit: quippe hoc tempore dyscrasia sanguinis ab æstivo fervore contracta, propter brumæ frigus sensim deleri, & cruoris massa inveterascens, velut exuvias suas deponere, & verius statum naturalem reduci solet. Qui vero temperamenti erant melancholici, aut viscera, & imprimis lienem, malè affecta habebant, aut qui mala victus ratione utebantur, nullam ab hoc Tropico mutationem receperunt, quin ad proximam anni periodum, scilicet ad æquinoxium vernale morbum tulerunt; & tunc in quamplurimis sanguine aut ex se redintegrato, aut intemperie ejus remediorum ulu facilius emendata, hic affectus debellari visus est: interea tamen multi senes, cacoehymici, & alias invaletudinarii, toto hoc temporis tractu ab hoc morbo passim interibant: etiam nonnulli supersunt, qui solstitio æstivo licet præterito, ejus jugum nondum excusserunt. Quanquam vero per totum fere annum hac febre velut epidemia plures laboraverint, tamen nullus (quod scio) ipsam in vere primo contraxit, & pauci admodum durante Autumno ab eadem convalescebant, ut revera sanguinis dyscrasiam hujus causam esse, & in mutatione ejus curam consistere minime dubitem.

Remedia, quæ sapissimè opem contulerunt (uti nostræ saltem observationi constitit) fuerunt ejusmodi, quæ paroxysmum febrilem inhibent: etenim mala sanguinis diathesi à mutata tempestate nonnihil emendata, si modò habitualis paroxysmorum consuetudo abruptatur, natura se recolligit, & pristinum valetudinis statum proprio nisu facile recuperat. Atque huiusmodi intentio (scilicet paroxysmorum inhibitio) licet à vomitorio paulò ante accessiorem exhibitis interdum perficiatur (hæc enim motum sanguinis febrilem, motum alium huic contrarium ciendo, non raro sistunt) tamen hæc indicatio longè certius, & quidem felicius peragitur ejusmodi pharmacorum usu, quæ non omnino è visceribus evacuant, verum sanguini aut fixationem quendam, aut materiam febrilem præcipitationem pro tempore inducunt. Quare quos instante vere, & deinceps curandos suscepi, hac methodo (& in plerisque bono cum successu) tractavi: facta totius provisione cum pharmaco interdum emetico, interdum solutivo tribus horis ante paroxysmum, epithemata carpis admoventi, simulque pulverem febrifugum in vino generoso propinari, ac ægros intra lectum in levi diaphoresi detineri præcipere solebam: raro evenit, quin prima, aut secunda vice hoc modo accessio febrilis inhiberetur, & dein eodem remedio aliquoties iterato, eundem morbus integrè cessaret. Huiusmodi praxi (præter experientiam nostram) fidem, & probationem nonnullam adstruere videtur usus pulveris è cortice quadam nuper ab Indiis petita, quæ hunc morbum certissimè curare perhibetur; hujus tamen virtus, seu operatio sine quavis evacuatione solummodo in hoc consistit, quod paroxysmos febriles ingruentes inhibeat.

De Cortice isto Peruviano, quæ nuper quotidiani usus esse cœpit, erunt hæc nonnulla quæ observationi communi prostant dicenda. Vulgaris exhibendi modus est ut hujus in pulverem triti drachm. i. vino aut tenui, aut generoso in vase cooperto per duas horas infundantur; at dein, ingrante paroxysmo, ægroti intra lectum composito liquor cum pulvere propinetur. Hæc potio non raro accessiones imminuentem tollit, sæpe tamen illi hæc solito more habita, proximè succedentem præcavet: utcumque, sive prima, sive secunda, aut tertia periodo paroxysmus inhibeatur, atque morbus curari visus sit, intra viginti, aut triginta dies sæpissimè redire solet; dein pulvere hoc rursus exhibitio, pro temporis circiter ejusdem spatium, morbi insultus denuo protelatur, atque hoc ritu novi plures quartana laborantes, toto autumnno, & hyeme accessiones febriles tantum rariores pertulisse, hostemque ita in propectu detinuisse, donec verè incunte, tempestatis anni, & alius pharmaciz ope sanguinis diathesis in melius alteretur, adeoque affectus iste sensim evanesceret: qui hac ratione crebras inducias quartanæ procurabant, alacres & vividi & ad negotia quævis expediri degebant, cum secus enerves, & pallidi in languorem, & vitiosum corporis habitum redigerentur. Vix unus è centum hoc remedium incassum tentavit, imò si in dimidia, aut minori quantitate, scilicet ad drachm. i. aut sem. pondus sumatur, accessiones sæpissimè tollit, ac breviori tantum spatio easdem suspendit: nec interest utrum in vino tenui, aut generoso propinetur, nisi cum respectu ad crases ægotantium: quippe in temperie calidiori poterit in aqua destillata, aut sero lactis utiliter sumi. Etiam infusio ejus clara, substantiâ crassiori rejectâ, similem effectum, sed brevius duraturum producit: quibusdam hunc pulverem cum mucilagine tragacanthi in pilulas redactum, cum pari laborantium emolumento exhibendum curavi; quocumque modo sumatur, nisi nauseabundis, & quamvis pharmaciam horrescentibus nullam evacuationem inanitellam infert, & fere in omnibus paroxysmos tollit; nec tantum in febre quartana, verum in aliis intermittentium speciebus, quibuscumque nimirum *intermittentibus* quædam intercedit, cum fructu adhibetur: vulgò præcipitur ut hujus usui purgatio lenis præmittatur: at in quibusdam valde imbecillis, & lecto affixis, sine prævia pharmacâ hic pulvis solitariè sumptus effectus laudabiles procuravit: interim ingenue fatebor me nondum vidisse febrem intermittentem hac cortice semel exhibita penitus curatam: quinimò non tantum quartanæ, verum tertianæ, & quotidianæ febris paroxysmi aliis remediis facile in totum superabiles, hoc pulvere profligari vili, post breve tempus constanter redibant. Ob hanc rationem qui febres intermittentes aliàs facillè curabiles, non urgente necessitate, hoc pharmaco tantum brevi supprimunt, medicinam dolosam instituire videntur, nec in rem suam magis, quam qui ulceri cavo, & mox denuo erupturo cicatricem inducunt. In quibusdam revera casibus huius usus sat erit opportunus, scilicet cum paroxysmorum assiduitate nimia, ægotantium vires plurimum atteruntur, induciæ hoc ritu procurantur, quo

natura se recolligat, & deinceps hosti potentius adversetur: etiam ut febris quartana, durante Autumnno, & Hyeme, cum minori molestia transigatur, hic cortex commode adhibetur: qui autem à febris istius incursum longiorem seriationem expetunt, pulverem hunc in majori quantitate, & crebriori vico assumere jubentur, scilicet drachmas duas per tres continuo periodos capiunt, sive accessiones redeunt, necne; hæc ratione diutius immunes perstant, usque tamen hostem licet sopitum vitus latentem retinent.

Si de natura hujus corticis, ejusque in suppressendis febrium intermittentium paroxysmis virtute inquiratur, non dissimulandum videtur, difficile esse hujusmodi effectuum causas, & operandi modos explicare; quoniam in nullo præterea subjecto huiusmodi efficaciam adhuc reperire datum est; singulari autem experimento ratio generalis non rite adaptatur: utcumque è phaenomenis diligenter collatis Theses quasdam ordine deducemus, quæ hujus rei veritatem si non assequantur, ad illam saltem gradum aliquem faciant.

Notetur igitur primò, quod hoc pharmacum intus sumptum in sanguinis massam vim suam, & energiam præcipue exercet: quippe viscera non omnino irritat, neque excretionem quamvis, aut molestiam eis infert: insuper, dummodo sanguini virtus ejus communicetur, *diaporesis* non omnino eximitur: quare non semper paroxysmus proximè sequitur, aut secundus, aut tertius, deinceps ab eodem assumpto præcavetur: atque ob hanc rationem, quo citius cruorem afficiat, usitatum est, ut una cum pulvere liquor eodem valde in prægnatus propinetur, sic enim in sanguinis massam ejus particula facilius convehuntur. Secundo, Corticis istius virtus sanguini impressa aliquandiu in eodem manet, idque brevius, aut diutius, juxta quod major, aut minor medicamenti portio intus sumitur: etenim particula hujus cruore confusa, cum ipso circulantur, & quo plures adsunt, eo magis transiente ejus afficiunt, & affectum diuturniorem producant. Nam licet alimenta, & alia quædam ingesta, in quantum à calore nativo statim subiguntur, quicquid habent virium intra paucas horas exerunt: hæc dein assimilata, aut toras excreta operari cessant: tamen pharmaca nonnulla intus admissa, quia nec facile perdomantur, nec irritatione citata illico foras eliminantur, per plures dies valde activa perstant, atque sanguinem, & succos in hoc, aut illo fermentationis ritu dudum retinent: hoc observare licet de medicamentis quibusdam, item de venenis, & plerisque alexiteriis, quorum unica exhibitio per plures dies, eademque iterata, longiori tempore solet corpora nostra afficere: miratum enim est, à medicamentis catharticis, si quando per vomitum, aut sedem minus operantur, post plures hebdomadas pustulas, & exanthemata exterius erumpere, quin etiam si à toxico epoto mors evitetur, diu admodum in sanguine, & succis virulentiam delitescere, nemo est qui nesciat. Pariter etiam hic pulvis, & fortassis alia quamplurima intus sumpta, in spiritus, & humores, quantumvis sopita videantur, etiamnum agere perseverant.

Tertiò, licet medicamentum illud immediate in sanguinem, & humores agat, tamen dyscrasiam febrilem in iis sitam haud radicitus tollit; quam cito enim vis ejus abiūmitur, & particulae omnes a mixtione sanguinis avolarunt, affectus pro tempore solum suppressus, denuo emergit, & solito more accessiones reperit: quatenus verò natura hoc celsationis spatio fortior evaserit, ideo post recidivam paroxysmi (non uti prius) sed die tertio aut quarto, juxta primum morbi typum, redire solent.

Quarto annotetur, quod hoc remedium non quemadmodum vulgaria febrifuga sanguinem figendo, aut etiam tundendo, accessiones febriles sistit; tunc enim paroxysmus semper ingruens, & non secundus, aut tertius postea sequitur caveretur.

Quibus juxta positis, ut corollarii vice de ipso operandi modo, quo hoc pharmacum agere videatur, quaedam subnectamus; dicimus verisimile esse, quod cum particulae ab eodem ingesto procedentes sanguini permiscuntur, ipsum in novam quandam fermentationem compellent, qua dum cruoris particulae continuo agitantur, ne materiam excrementitiam congerant, aut turgescencias febriles ineant, omnino inhibentur: quemadmodum enim post mortuum canis rabidi, aut ictus venenatorum animalium, ipse sanguis, & succus nervosus diu venenatur; ne tamen magnas anomalias statim concipiant, alexiteria propinata eorum liquores in alia fermentatione detinendo prohibent; quorum usus si tamdiu continuetur donec corpuscula virulenta penitus avolarunt, a labe illa contracta nullum horrendum symptoma timetur; sin prius absumantur remedium nimis parce exhibiti vires, illico venenum repullulat, & virus pristinum explodi visum, denuo in actum deducitur: non absimili ritu, quando sanguis diathesis vitiosam inactus, succum alibilem pervertit, eumque ad plenitudinem congestum, quo rectius expellat, turgescencias febriles concipit. Cortex iste Peruvianus tritus, & exhibitus, particularum commercio sanguinem licet dyscrasiam affectum, fermentatione nova concitata, adeo exagitat, alteratque ut succum alibilem aliquatenus coquat, ejusque recrementa continuo evaporet, ut in paroxysmi materiem non uti prius congerantur. Cum vero è sanguinis consortio hujus remedii particulae penitus exhalant, totaque virtus absumpta fuerit, mala sanguinis diathesis prius contracta denuo emergit, ideoque paroxysmi febriles solito more redeunt: forsan aliquando accidit, ut dum usu istius pulveris accessiones supprimuntur, propter mutatam anni tempestatem, aut alios remedii ope, aut naturæ ipsius nisu ista dyscrasia sanguinis sensim emendetur, adeoque febris demum sponte dispareat; hoc tamen nonnisi raro contigisse novi, quoniam æquali fere certitudine, qua ab isto pulvere paroxysmos febriles supprimi, eosdem postea redire expectes.

Quod attinet ad qualitates sensibiles quibus hic cortex insignitur, constat ipsum amaritudine cum stipticitate quadam polere, ut gustu indice similem fere saporem referat, qualis in plerisque alexipharmacis, uti sunt radix gentianæ, serpentariæ, contrayervæ, &c. reperiri solet: quæ enim sunt a quæ amara, in supprimen-

dis fermentorum præternaturalium viribus maxima virtute pollet; quinimò radix gentianæ, quæ optime hunc corticem simulat, olim pro curatione februm quartanarum celeberrima erat illis. Nunc autem licet hic pulvis Peruvianus sit unicuique adhuc repertum febris quartanæ alexiterium, quod unicuique ipsius aliarumque intermittentium paroxysmos (licet solum pro tempore) inhibet: attamen dubitandum non est, quin alia in rerum natura extant medicamina, quæ sunt æquæ febrifuga; atque sperandum erit, ut novi hujus inventi exemplo ducti ad explorandas herbarum virtutes adiuverè ignotas excitemur: ita cum singularium tentaminum insitit us, & Medicinæ rationali Empirica adjungitur, proculdubio quartanæ aliorumque Herculeorum morborum curationes feliciter procedent: quod eo libentius seculo huic, aut saltem posteris spondeo, cum manu ducente Corticis istius analogia, medicamentum ad profligandas febres non contemnendi usus ipse non ita pridem varia percurrens adinvenimus; quod etiam pauperioribus quibusque succedaneis vice bono cum successu propinare soleo.

Circa febris Ephemera, & synochi non putridæ solutionem, sive crisi, tria sunt præcipue requisita: scilicet causæ evidentis remotio: secundò, materiæ depravatæ, sive excrementitiæ à sanguinis massa secretio, & diffusio: tertio, partium sanguinis sedatio, earumque ad motum, & situm naturalem ac æquabilem restitutio. Juxta quod hæc modo citius, modo tardius & magis difficulter succedunt, hic morbus brevi, aut longiori tempore finitur.

I. Causa evidens, quæ plerumque extrinseca est, faciliè amovetur, solentque ægri statim atque noxæ à re qualibet sensum percipiunt, istius rei præsentiam, seu assiduitatem vitare: nullus à vino febricitans, ejus potui adhuc indulget: quamprimum à balnei, aut solis æstu quispiam plus solito incalcescit, us diutius immorari tædet.

II. Quoad materiam excrementitiam, quæ à sanguine secerni, & dissilari debet, hæc vel ab extra conseritur, ut cum à crapula, vii potu, insolatione, aut balneo calidore, effluviis, seu corpusculis calidis & fermentativis cruor inficitur; vel isthæc materies intus progignitur, ut cum à sanguinis desagræatione ejus liquor recrementis seu particulis adultis referatur. Utraque hæc materies à sanguine discerni, dissilari, & vel sudore, vel insensibili alia debet foras protrudi, priusquam febris sedetur: quare cum pori sunt constricti, & transpiratio impeditur, febris Ephemera diutius prorogatur, & nonnunquam à synocha simplici in putridam transit.

III. Causa evidenti remota, ac materia hac degeneri dissilata, ad disruptionem requiritur partium sanguinis sedatio, & in ordinem reductio; etenim motus rapidior, & inordinatus in sanguine inceptus non statim sistitur, sed paulatim compesci debet; etiam diversæ sanguinis particulae hoc modo confusæ, & propter effervescentiam febrilem sursum deorsumque actæ, non itatim repetunt priorem situm & positionis ordinem: quin eas sensim extricari, & æquabili multatione paulatim restitui opus est.

Licet hic morbus post amotionem causæ evidentis postea sponte naturæ ut plurimum cesset, tamen remedia quædam medica bono cum fru-

Et in usum adhibentur; præsertim cum in periculum est, ne febris Ephemera in putridam transeat. Præcipue intentiones erunt, sanguinis fervorem compescere, & transpirationem liberam procurare; quibus conducunt in primis venæsectio, victus tenuissimus, seu potius abstinentia, potus refrigerantes, sæcum alvi per enema subductio: præ cæteris maximè juvant somnus & quies, quæ si deerint, opiatæ & anodynæ tempestivè procurentur.

Quinimo licet historiarum & observationes febre Ephemera affectorum nihil oppidò rarum in se contineant: libet tamen hic exemplum unum aut alterum, quo hujus morbi hypotyposis aliquantum illustretur, subungere.

Juvenis quidam illustris, viginti circiter annos natus, habitu corporis athletico præditus, ab immodico vini generosi potu in febrilem intemperiem, cum siti, calore, & insigni præcordiorum æstu incidit; phlebotomiam celebratâ, aquæ fontanæ ingentem quantitatem ebibit, indeque sudore copioso statim insequente, brevi convalescit: in hoc casu tenuior sanguinis portio à vini spiritibus effervescentia impetum fert, totam cruoris massam exagitari, ejusque compagem solito plus laxari coegit, atque id propter à cordis fermento istam plus dissolvi, & particulis activis & mixtionem solutis velut accendi contigit; donec valis à phlebotomia depletis, sanguis turgescens eventilaretur, & ab aquæ potu ejus fervor attemperaretur: deinde calidis effluviis unâ cum materia adusta sero copioso obvolutis, & per sudorem amandatis, cruor debitam temperiem tandem recuperabat. Insuper Juvenis ingenuus vitæ sedentariæ, simulque rei literariæ studio plurimum addictus, cum nuper in ætivo Sole supra modum se exercuisset, de capitis dolore, inappetentia, præcordiorum æstu, & intemperie febrili per totum suffusa queri cœpit, cui (cum pharmaciam omnem averfaretur) omnimodam abstinentiam, nisi à cervisia tenui & hordeatis præcepti: die secundo ac dein amplius tertio symptomata paulatim se remittebant, quarto demum sine quovis medicamine à febre immunis evasit.

Symptomatum, & signorum in febre putrida hæc agmen claudant, pulsus, & urina, quibus præcipue attenditur pro dignoscendis tum morbi statu, tum ægri viribus. cum enim duo sint, quibus vita nostra innititur, scilicet calor in corde accensus, & coctio in visceribus & vasis peragenda, quoniam pulsus, & urina alterationes in utroque à febre inductas optimè ostendunt, ideo hinc affectus in mortem, aut salutem cessuri certissimum desumitur criterion. Haud necesse arbitror de his fusè agere, aut singulas utriusque causas, & differentias recensere: sat erit de iis præcipua annotasse, quæ in febrium decursu consideratione digna occurrunt. Et primum consultitur pulsus, velut conflictum à natura thermometron, ut exinde mensuretur calor in febre accensus; qui si intensior fuerit, & magnam sanguinis ebullitionem concitet, arteria vehementius, & citatius vibratur, quamdiu spiritus vigore pollent; dein ipsis paulo exhaustis, validior pulsus remittitur; qui tamen celeritate compensatur, & sit celer & parvus. Si febris sit mitior, & minori incendio tumultuetur, etiam pulsus à naturali

statu minus deflectit: & in toto morbi decursu hujus moderatio naturæ inducias denotat. Nec tantum pulsus febris, veluti hostis, copias producit, sed & naturæ robur, & resistendi valorem planè ostendit. Quamdiu pulsus est laudabilis, res in vado est, & ipem optimam exhibet; sed ex malo hujus statu pessimum inferitur omen, & salutis desperatio. Ideo sine crebro & diligenti pulsus examine Medicus nec prognosticon tace faciet, nec pharmaciam tuto instituet.

1. Quoad primum, innotescat oportet (in quantum heri licet) qualis sit cujusque pulsus juxta naturalem constitutionem; his enim fortior, illis debilior existit: dein in singulis febrium momentis perpendendum est quibus gradibus à naturali statu distet, & modo enim est debito vehementior, & arguit febrem incendi; modo infra solitum deprimatur, & denotat spiritus & vires dejectas.

Quibus sanis debiliter, & languidè pulsant, eos febre correptos pulsum habere exilem & debilem non adeo malum est, ut statim de salute desperemus. Quibus pulsus à natura fortis, & vehemens est, si à morbi crisi vix mediocri pollet vigore, licet non sit omnino debilis, ægotantis rem suspectam, & minime tutam arguit.

Si ab initio febris, priusquam sanguis deflagavit; vel si facta crisi, cum pars oneris detrahitur; aut si alio tempore, sine causa evidenti, pulsus debilior evadat, multum portendit: si post longas vigilias, aut à magna evacuatione paulò debilior sit pulsus, non ideo de salute conclamatum erit, quoniam vires his modis dejectæ, aut labefactæ poterunt denuò restaurari, & spiritus refici.

Quando pulsus subito in deterius alteratur, licet æger quoad cætera symptomata se melius habere visus sit, triste mortis prognosticon edicas: & vice versa, licet horrenda urgent symptomata, & tamen pulsus sit laudabilis, adhuc salutem sperare liceat. Si in viro robusto febricitante pulsus valde exilis, & formicans evaserit, mors in propinquo est.

II. In exhibendis medicamentis cautiones, & regulæ non levis momenti à pulsu desumuntur. Purgatio, & vomitus prohibentur à pulsu nimis citato, & violento; etiam ab humili, & depresso: quippe dum sanguis nimis effervescit, evacuatio parum conducit; tum quia quod noxium est, minime fecernitur; tum etiam quod à perturbatione vires plus debilitantur. Cum vero spiritus sunt fracti, & vires dejectæ, pharmaciam eas magis prostermit, & quandoque penitus exsolvit. Quare cum Medicus evacuationem aut, vel ipsam meditatur, prius pulsus exploret, & hoc opus aggrediatur solummodò cum natura est fortis, & sedata, ut una medicamenti operationi vacare, & viribus possit sufficere.

Nec minori circumspectione opus est in diaphoreticis, & cardiacis: quæ si in febrili paroxysmo adhibentur, cordis motum prius violentum nimis intendunt, & sæpius ejus robur frangunt. Etiam cum pulsus valde languidus sit, si cardiaca calida, & validiora adhibentur (ut cum exilis flamma fortiori spiritus afflatu urgetur) facile vita extinguuntur: quare vulgaris observatio est, quod cardiaca non raro mortem

accelerant, eo quod cruorem nimis exagitando vires citius atterant.

Adhuc maxima opus est cautela & pulsus directione in exhibendis narcoticis; hæc enim (quia spiritus vitales nimium feroces extinguendo, & figendo opus suum perficiunt) si in pulsu debili, aut vacillante usurpentur; aut spiritus vitales diminuendo eos morbo omnino impares reddunt; aut eos nimis suffocando somnum perpetuum aeterunt: quare in pulsu languido, inæquali, aut formicante, caute pejus, & angue opiatæ vitentur.

Pulsus inæqualis, ac intermittens ex Medicorum scriptis pessime audiunt; tamen pravæ licet notæ, non uti pulsus debilis tam certo mortem portendunt: novi enim plures cum ejusmodi signis, licet sepulchro damnatos, evasisse: quippe multo certius, & facilius spirituum, & sanguinis inordinatio compesci, aut sedari poterit, quam eorum defectio restaurari.

2. Urinarum inspectio in febribus, præ exteris quibuscunque morbis, plus habet certitudinis, & maximi est usus: hinc enim agri, & morbi status optime cognoscuntur, & medicæ intentiones circa agenda melius diriguntur. Quæ super hac re vulgò prostant observationes & regulæ, adeo plurimæ sunt, ut singulas enumerare penè infiniti esset operis, & cedit: præcipua hic quædam annotasse sufficiat.

Circa urinas febricitantium præcipue advertenda sunt; color, consistentia, contenta, & subsidentia. Color urinx indicat modum, aut excessum caloris in sanguine: qui prout augetur, vel remissius se habet, etiam urina plus, & minus rubicunda existit: cujus causa est ebullitio, sive effervescencia cruori a febre inducitur, propter quam particule salis, & sulphuris sanguini, humoribus, & solidis partibus insite plus dissolvuntur, & sero incoquantur, eique rubedinem impertiunt; non aliter, ac cum sal Tartari, & Sulphur commune invicem commixta, & aquæ in octa, liquori rubedinem saturatam impertiunt.

Quorundam urinx summe rubescunt, quando parum, vel leviter febricitant: & e contra aliorum altu febrili laborantium urinx sunt minime coloratæ. Qui calore vegeto, & sanguine præfervido abundant, aut leorbuto, phthisi, aut affectioni hypochondriacæ sunt obnoxii: cum à frigore suscepto, remissio, crapula, aut vini potu febricula quavis tentantur, urinam intensè rubicundam reddunt, eo quod salis, & Sulphuris particule in sanguine eorum exaltatæ, & prius semisolutæ exluterunt; quare necesse est, ut febre urgente sero plus incoquantur. E contra, qui temperie frigida cum pulsu debili, & imbecillo præditi sunt, febre correpti cum majori sanguinis effervescencia urinam minus coloratam excernunt.

Urinarum consistentia, contenta, & subsidentia, velut in eodem filo posita, simul dependent à materia adusta, & recementitia, quæ à deflagratione febrili in sanguine residua est: hujus si copia adfuerit, urinx consistentia nonnihil spissior evadit; & postquam steterit, à frigore turbatur: si autem hujus sit minor quantitas, aut aliò quàm ad renes derivatur (nimirum si vel sudore, aut critica in hanc, vel illam partem metastasi vocetur) consistentia fit tenuior, &

liquor clarus persistit. Etiam hujus materiæ particule urinx contenta elaiuntur, quæ se diversimodè habent, juxta quod succus nutritius à sanguine modo nonnihil coquitur & assimilatur, modò omnino pervectitur, & in putrilaginem facessit. Coctionis, & assimilationis signa quædam exhibent in urinis febricitantium modò hypostasis laudabilis, modò ejusdem velligia quædam, & rudimenta: coctionem vitiatam denotant hypostaseos privatio, & partium urinx confusio, & perturbatio. Prout autem hæc materies plus, aut minus in sanguine allatur, contenta sunt modò pallidi, modò rufi coloris, instar ochreæ. Pro ratione qua recementa sanguini confusa vel spiritu præpollente subigi, & secerni incipiunt, vel eodem nimis depresso separari minus queunt, etiam contenta urinx plus, aut minus, citius, aut tardius à reliquo liquore secerni, & versùs fundum subsidere solent.

Quoad prognostica ab Urina desumenda annotamus, quod urinx color nonnihil remissior, consistentia mediocris, contenta pauciora sponte subsidentia, aut facile in nubeculam collecta bonum portendunt: è contra rubor intensus, consistentia spissa & turbida, contenta crassiora & opaca, quæ tardè, aut vix omnino versùs fundum subsidunt, effervescenciam magnam, materiæ adustæ copiam, ejusque subactionem, & secretionem difficilem, aut frustratam denotant.

Quoad directiones pharmaceuticas, res in hoc cardine versatur, ut crebrâ urinarum inspectione naturæ motum attendamus, eidemque obsequamur, nec cathartici, nec diaphoretici quidquam movendum, nisi cum hypostasis quædam in urinis coctionis, & separationis signa exhibet. Super hæc re, plura hic inserere supervacuum duxi, quoniam alibi, proprio in loco, quæ ad urinas spectant, fusiùs tractantur.

Circa Therapiam febrium putridarum, cujus, cumque generis, quatuor sunt intentiones generales, quibus totius negotii cardo innititur. *Primo*, ut sanguis (si fieri possit) ab incendio vendicetur, & prius supprimatur flamma, sive ignis in sulphurea ejus parte accensus; quod circa prima hujus morbi initia non raro fieri contingit. *Secundo*, ut cum sanguis incendio tactus protinus extinguere nequeat, saltem mitius, & cum minori noxa deflagrationem suam peragat. *Tertio*, ut deflagratione finita, materiæ concretæ & adustæ recementis liquor cruoris expediat, & postea ad crasin & vigorem naturalem rellitatur. *Quarto*, ut symptomatis præcipue urgentibus (quæ nisi tollantur, & naturæ & pharmaceuticæ opera frustra erunt) tempestive occurratur.

Quoad remedia particularia, quibus intentionibus istis satisfiat, varia sunt præscripta, & medicamentorum formulæ non solum apud Medicos, sed etiam mulierulas & Empiricos quosvis passim in usu; à quibus tamen, cum instar gladii in cæcutientis manu, sine discrimine, & exacta methodo medendi usurpentur, plus damni sæpius quàm emolumenti agris accrescit. Non opus erit hic purgantium, cardiacorum, aliorumve pharmacorum formulas apud plerosque authores satis eleganter traditas hoc in loco repetere præcipuas quædam indicationes, & cautiones medicas, quæ in decursu hujus

huius febris, juxta varia ejus tempora, & diversa symptomata observari debent, paucis subiciam.

I. Circa primum hujus morbi insultum, danda erit opera, ut febris protinus supprimatur, atque sulphuris effervescit inflammatio inhiberi possit, cui venæsectio imprimis conducit; hoc enim modo sanguis eventilatur, & particule calidæ nimis agglomerantur, & incendio jam proximæ ab invicem dissipantur; veluti cum fornax exardescere aptum, si aperto aëri exponatur, ejus accensio præcavetur. Insuper tenuis instituatur victus, in quo nihil spirituosum, aut sulphureum adhiberi debet. Viscera, & primæ viæ materiæ excrementitiæ saburra liberentur; quare enemata erunt usus necessarii, quandoque etiam vomitoria, & lenia cathartica, quibus aliquando tempestivè & cum judicio adhibitis, febris inter ipsa statim initia, detracto accensionis pabulo, exstinguitur. Quod si non obstant hac methodo, incendium latius serpit, & sulphureas sanguinis particulas magis indies, & magis corripit; procuretur (quæ heri possit) ut deflagratio sine magno tumultu leniter procedat.

II. Quare cum febris in augmento fuerit, si cruor nimis effervescat, & cum pulsu forti & vehementi vasa plurimum distendant; si vigilæ, phrenitis, aut dolor capitis immaniter urgeant, sanguinis missio denuò repetatur, & transpiratio (quantum licet) libera procuretur: quare in lecto ut plurimum ægri decumbant; victus sit parvus, ex alimentis admodum tenuibus, item potus tenuis & copiosus, ut sanguis exardescens sero uberiore diluatur: enemata satis tuto, & reverà commode adhibentur; pharmaca autem, sive cathartica, seu diaphoretica, & quæ sanguinem nimis exagitant, eadem industria vitentur, qua ventorum flumina adibus incendio flagrantibus. Quin potius opiata & anodyna, quæ sanguinem & spiritus figunt & constipant, erunt usurpanda: item Julepia, & decocta quæ viscera æstuantia refrigerant, cruorem attemperant, & spiritus refocillant, erunt crebro exhibenda: liquores acetosi vegetabilium, aut mineralium, necnon nitrum purificatum, quia sanguinis ætum cohibent, & sitim extinguunt, rite conveniunt. Aquæ ardentes, spirituosæ, pulveres cardiaci, & bezoartici (quamdiu morbus malignitate caret) procul habeantur: si modo sanguis inæqualiter circuletur, & magis impetuosè versus caput, quam pedes feratur, conducunt Epithemata ex tepidis animalium carnibus, aut visceribus plantis pedum applicanda.

III. Quando febris in statu est, diligenter attendatur naturæ motus, num sit crisis factura, necne? Quare nihil temerè à Medico tentandum. Venæsectio, aut fortis purgatio omnino prohibeantur; postquam vero a sanguinis deflagratione aliquatenus remittitur febrile incendium, & signa coctionis in urina apparent, si modo signior sit naturæ motus, diaphoresis aut lenis purgatio procuretur; quæ tamen melius & tutius à Medico peraguntur, cum prius natura motu critico materiæ morbificæ seclusionem fuerit aggressa. Quod si omnia sint cruda, & perturbata, urina adhuc turbida, absque sedimento, aut partium secretionibus; si vires sint

languidæ, pulsus imbecillis; si crisis nulla, aut tantum irrita præcessit, non sine manifesto vitæ periculo, aut sudore, aut cartharsi evacuatio quævis tentatur, quin diutius expectandum est, ut spiritus cruoris se recuperent, materiam excrementitiæ & adultam aliquo modo subigant, & dein paulatim secerant: interim cardiacis temperatis vires refocillantur, immodica sanguinis effervescencia (si adsit) inhibeatur, & debita ejus fermentatio sustentetur; quod reverà à corallis, margaritis & ejusmodi pulveribus optimè perficitur, quæ quidem à viscerum fermentis dissolvuntur, & dein cum sanguine fermentescunt, ejusque motum imbecillum & vacillantem valde restaurant. Interim (natura laborante,) obitacula quævis, & impedimenta removeantur, & præcipue excrementorum proventus in primis viis congestus crebro enematum usu subducatur.

IV. Qua ratione aut methodo symptomata maximè urgentia tractari debent, non facile erit certis regulis præscribere, quoniam ipsamet eadem aliquando protinus compesci & sedari, interdum citatius promoveri postulant, ac quorum majus quiddam est, alio forsitan tempore Naturæ erunt proflus relinquenda. Horum nonnullis cum remediis demulcentibus & lenitivis, aliis vero cum pharmacia asperiore & irritativa occurrere poterit. Interea tamen præceptum in omnibus tenendum sit, ut naturæ vestigiis religiose insitatur, quæ si perperam agat, ejus inordinatio reducenda; si rectè ac vehementer nimis, refraganda; si vero rectè, ac debito seignius aut debilius operetur, e re erit ut ejus nixus ope medica incitetur, atque adjuvetur.

V. In febris declinatione, cum a crisi perfecta natura fuerit morbo superior, res in vado est, nec multum negotii Medico relinquitur; solummodo restat exactam victus rationem proponere, ut sine recidivæ metu cito vires ægri recuperent. Etiam leni purgatione materiæ febrilis reliquias exterminare conducit. Circa victum recidivæ scopulo sapissimè alliditur, scilicet à præproprio carniū aut cibi fortioris comestū ægri in febrem relabuntur: cum enim viscera sunt debilia, & alimenta (nisi admodum tenuia) non facile coquunt, cumque & sanguinis crasis sit imbecillior, ut succum nutritium fortorem non assimilet, si alterutri quid improporionatum afferatur, iterum naturæ æconomia pervertitur, & omnia pessum eunt. Quare à carnibus convalescentes diu temperent, iisque demum utantur nonnisi postquam urina fuerit sanorum similis, neque amplius à frigore turbatur: & quidem cum satius erit à diluto carniū jusculo incipere, atque dein pedetentim ad alimenta fortiora ascendere.

VI. Cum à crisi imperfecta res in dubio versatur, & adhuc sub iudice lis est, tunc Medico difficile incumbit pensum. Sedulo attendantur naturæ motus, & vires, num morbo prævalere incipiat, an eidem succumbat. Si coctionis adsint signa, & vires consent, evacuatio lenis, & tantum per epicrasin erit celebranda. Interim symptomatis maximè urgentibus cum remediis idoneis succurratur, impedimenta quævis tollantur, cardiacis & recta victus ratione (quantum fieri possit) vires sustententur.

VII. Cum à crisi aut mala, aut nulla omnia in

in deterius vergunt, cumque de morbi curatione fere desperat Medicus, eventum ejus inspectum & valde timendum prædicat. Neque tamen nudo prognostico adeo utendum, ut reliqua omnia metus occupet: verum adhuc, quantum artis est medicæ, pro salute, conclamata licet, consulatur: symptomatis maxime infestis remedia adhibeantur, spiritus cruoris fere extincti cardiacis redintegrentur. Cum de sanitate despondemus, vita quamdiu potest proteletur, & saltem Euthanasia procuretur.

Juxta varios febris putridæ typos modo descriptos in promptu esset ægotantium historias, & observationes particulares circa curationem factas quamplurimas subungere, cum hujusmodi exempla in praxi quotidiana passim occurrant, ita ut ingens volumen implere sufficerent: ex his tamen pauciora quædam singulas febris prædictæ species respicientia, quibus earum doctrina atque medendi methodus superius tradita elucescant, candidi Lectoris bona cum venia breviter proponam.

Nobilis matrona 50. circiter annos nata, gracili corporis habita, statura humili, facie rubicunda prædita, cum Junii die decimoquinto ob altivum calorem vestes solito tenuiores indueret, vesperti male habuit, inde nausea, & oppressione ventriculi afficitur, dolores sentit vagos, modò in scapula, modo in dorso urgentes; sitibunda, sine calore tamen immodico: die secundo, & tertio fere ad eundem modum; die quarto post vomitorium, scilicet insul. croci metal. i. unc. exhibitum, quater evomit bilem flavam, ac ter alvo soluta alleviari visa est; nocte insequenti aliquantò melius dormivit: die autem proximo, febre per totum accensa, de siti, præcordiorum æstu, & dolore modò in latere, modò in dorso querebatur: protinus sanguis mittebatur ad 8. unc. erat urina rubellinis valde saturata, opaca, & turbida, sine hypostasi, aut contentorum subsidentia; pulsus inæqualis, & sæpe intermittens; nox insequens insonnis: die morbi sexto, primo mane erupit sudor exiguus, unde calor nonnihil sedatio, qui vesperti iterum intenditur: die septimo calor valde acutus, cum siti, æstu, pulsu mordinato, & intermittente, nonnihil summa inquietudine & jactatione totius corporis. Octavo symptomata erant nonnihil remissiora; etiam in urina hypostaseos vestigia quædam. Cepit isto die serum lactis cum foliis ulmaria incoctis: copiose sudavit, & febris juxcata est. Toto ægrorations tempore pro victu tantum exhibebantur cervisia tenuis, serum lactis, decocta hordeacea, aut avenacea. Ememata erant crebrius; potus & julepia refrigerantia pro libitu concedebantur.

Illustris hæc femina à *transpiratione*, seu transpiratione præpedita, in synochum putrem incidit: effluvia per cutem evaporare solita intus retenta (una cum bile & valis choledochis exundante) partim visceribus affixa eorum crates everterunt, & imprimis stomacho molestias fecerunt: partim musculis & membranis suffusa dolores & spasmos creabant. Erat pulsus inæqualis & intermittens, non propter morbi malignitatem, prout in peste, verum ob idiocrasiam quandam cordis, quæ nimirum fermento ejus non bene constituto, sanguis effervescent non statim æquabiliter accenditur, & totus exsilit, sed pars

cruoris induentis primò exigua, dein major, & post aliquot vices maxima in sinibus cordis pro momento temporis restitans, pulsus inæqualem & intermittentem producit. Novi in pluribus aliis planè similem pulsus affectionem: quamdiu scilicet ab intemperie tuerant minues, pulsus erat omnino æqualis, & ordinatus; sui verò subita animi passione aut corporis agitatione nimia solito intensius incalecebat, ita tunc pulsus inæqualis, & intra vibrationes toties 4. 7. 10. aut 20. intermittente afficiebatur; & quotiescunque febricitarent, pulsus irregulari modo ita se habuit. Cum nondum habitualis ista circa pulsus anomalia experientia crebra mihi innotuerit, solebam usque malignitatem in morbo suspicari, & eventum funestum augurari, qui secus evenit.

Die quinto in hac ægra febris, licet tardius accensa, ad augmentum pervenit, indeque celeriori motu reliqua pertransiit stadia. Sexto materiam adultæ ad plenitudinem asurgentis diaphoresi oborta, levis depletio, adeoque æstus febrilis quædam remissio inæquata est. die septimo materies ista adultæ ad summum incrementum asurgens morbi statum fecit, cui demum in octavo cum omnibus ad bonam crisin requisitis sudor copiosus successit, & febrim perfecte judicavit: quippe evacuationem hanc criticam (uti fieri debuit) hæc tria præcesserant. *Primò* scilicet sanguinis plena, & sufficiens desagratio, uti constat ex calore intensissimo, & plane igneo, per tres antea dies continuato. *Secundo* item materiam adultæ ad plenitudinem congestio, prout colligere erat ex summa inquietudine & jactatione in nocte præcedenti; ac dein ejusdem materiam pepsinus quidam & secretio in sanguine incepta, quod symptomatum sedatio & in urina coctionis signa ostendebant: quare sudor copiosus, *quoniam* tam laudabilis superveniens, quamdiu abluerit malignitatis suspicio, nil nisi bonum portendit.

Sub initium æstatis Anni 1656. vir Clarissimus, habitu corporis athletico præditus, sine causa manifesta (nisi quod rei literariæ studio addictissimus nullo in super exercitio uteretur) male habuit. *Primò* de nausea, inappetentia cum inhumani cephalalgia querebatur: die secundo modò rigore, modo calore identidem reciprocantibus, siti insuper & præcordiorum æstu, cum linguæ scabritie, & sapore ingrato afficiebatur. Ito die sumpsit liquoris emetici 10. drachm. à quo septies evomit, rejecitque bilis flavæ copiam ingentem, & quatuor habuit sedes: nox inquieta, & fere insonnis insequuta est, in qua æger calore adaucto intensius febricitavit. Die tertio cum symptomata prædicta ingravescerent, sanguis ad 10. unc. mittebatur: fuit urina rubicunda, crassa, cum sedimento copioso; pulsus citatus & vehemens: noctu parum sudavit, cum somno brevi, sed perturbato: mane sequenti parum alleviari visus est; vesperti tamen omnia exacerbabantur, cum vigiliis, calore ac siti intensissimis. Die quinto a levi sudore æstus nonnihil remisit, qui tamen solitâ atrociam paulò ante vespertinam rediit: nox iterum insonnis cum jactatione corporis fere continua; mane à diaphoresi blandicula sensit parum levaminis, vesperti rursus omnium exacerbatio sequuta est; nox etiam fuit valde inquieta.

Circa

Circa initium diei sequentis sudor uti prius successit, & paulo in majori copia: hoc die fuit ~~per~~ manifesta versus salutem, calor & litis paulatim deservescerebant: fuit urina minus rubicunda cum aliquantulum hypostasi; deinceps per tres dies febris lentim declinabat: qualibet tamen nocte paroxysmum quendam, remissionem vero quam prius habuit. die 11. uberius sudavit, & perfecte judicatus est. Toto agrotationis tempore victu parcissimo utebatur, utpote nihil alimenti capiens præter cervisiam tenuem, & serum lactis cum ea paratum. Potus & julepia refrigerantia ex decocto hordei, & aquis stillatitiis aliquoties sumebat: quotidie si alvus non sponte solveretur, clyster emolliens fuit injectus: nullo præterea pharmaco, scilicet nec cathartico, nec cardiaco usus est. Febre autem sedata, fuit bis purgatus, & dein citò convaluit.

Fuit hæc febris synochus putrida, prout ex rigore circa initia, & deinde calore continuo, aut vigilis, aliisque symptomatis per plures dies graviter insistentibus coniecere licebit: quatenus verò intemperies ista qualibet nocte exacerbabatur, dicenda erit continua quotidiana. Sine causa evidenti hic morbus primos insultus fecit, quia sanguis nimis eventilatus, veluti vinum sponte effervescens, a sulphure exaltato ardorem conceperat. Bilis vasis choledochis exundans, unaque sanguinis æliuantis purgantia interioribus suffusa (uti in febribus plerumque assolet) statim in primis viis magnas molestias, & inordinationes ciebant. Propter materię excrementitię hac ratione ibidem congestę depletionem, mox ab initio vomitionem procuravi, quę tamen evacuatio, uti & per alvi feces fortior Purgatio, si febre per totum accensa adhibeantur, quia sanguinem nimis exagitant, & materię febrilis adultę coctionem valde perturbant, exinde plus damni agris quam commodi plerumque adferunt. Primum hujus morbi stadium, scilicet dum totus cruor incendio corriperebatur, ad diem tertiam extendebatur; atque deinceps cum sanguis deslagrans recrementis adultis aggravaretur, major ejus ebullitio cum crebro per diaphoresin expuitionis nixu insequuta est. Die septimo, quando cruor maxima ex parte deslagraverat, & recrementa adulta in sinu ejus ad turgescentię plenitudinem congesta molesta esse coeperant, motus criticus ciebatur: quo tamen, materię isthac nondum penitus subacta, nec ad secretionem parata, morbus haud perfecte judicatus est; quin post alteram periodum eadem denuò succrescens, & die undecimo commotā sanguini turgescentiā alteram, & perfecte judicatoriam induxit. Diebus intercalariis, quia præter recrementa a deslagratione sanguinis residua, & in crisi reservata, etiam a succo nutritio haud statim incendio correpto, sed peculiari modo depravato altera in cruoris sinu materies ad turgescendum apta congereretur: idcirco à quotidiano hujus incremento, & fluore febris huic continuę paroxysmi (quales intermittentiū esse solent) statim diebus ac horis accesserunt.

Juvenis studiosus in ætate 25. circiter annorum, vultus luridi, & temperamenti melancholici, sine manifesta occasione, Augusto 1656. egrotare cepit. Primo de intemperie febris,

cum siti, lassitudine spontanea, & inappetentia querebatur: die secundo insuper de dolore in latere dextro, & distentione utriusque hypochondrii, item vomitu serè continuo, vigiliis & immani capitis dolore: die tertio Medico accersito, illico sanguis ad uncias 12. mittebatur; vespere magis incaluit, & deliravit; postea sudore, licet exiguo, succedente, mane proximo melius habuit: die quarto iterum ingesta quęvis statim rejecit, item continuo serè vomendi nixu tentabatur. Vomitioni exhibitionem a Medico propositam, cum æger, cum amici periculo prius edocti renuerunt. Ab enemate injecto sex habuit sedes, & parum alleviari visus est; etiam nocte insequenti aliquantulum dormivit: die quinto iterum vomitio crebra cum siti intolerabili adluit: latus æstunabat, sed calor inmodici sensus exterioris haud tactu perceptibilis erat; quoniam cruoris effervescens recrementa quę per cutem exhalare debuerant, intus restagnare, & in viscera exundare videbantur. Ideo vespere ad provocandam diaphoresin hic bolus exhibetur. Conserv. Rosar. vitriolat. 1. drach. pulv. Gasconici 1. scrup. Laudani soluti in aqua meliss. 1. gr. Ista nocte mediocriter dormivit, & a sudore copioso succedente symptomata mitigari visa: nihilominus die sexto cuncta iterum exacerbari; calor in toto, situs & præcordiorum æstus immaniter urgere: die septimo & octavo pulsus erat inæqualis & inordinatus, plerumque delirare loquebatur: & si in lecto commoveretur crebro in syncopen incidit. Die nono eadem restabant symptomata; insuper tendinum in carpis contractione, aliarumque partium motibus convulsivis tentabatur, ut penè de salute desperaremus. Isto mane quoniam natura victas manus tradidisse visa est, quantum erat artis, succurrendum restabat: quare diaphoresin copiosam velut ultimum refugium intendens Spirit. cornu cervi 1. drachm. in haustulo julepii cardiaci una vice propinavi; exinde per quatuor horas valde inquietus & sitidundus vix in lecto contineri potuit: postea tamen somno obrepente plurimum sudavit, & res extra periculi aleam subito constitit. Nocte insequenti pro continuanda diaphoresi, quibuscumque sex horis dosim pulveris contr. yervę exhibendam præcepi; & febris & affectiones nervosi generis brevi cessabant, & æger convaluit.

Hæc febris quoad typi rationem synochus putrida appellatur, quę in hoc agro a sanguine instar fœni incalcentis sponte effervescit, adeoque fermentationem immodicam concipiente originem sumebat: propter sanguinis temperiem melancholicam fuit calor minus intensus, licet symptomata aliàs pejora, atque imprimis nervolo generi inimica obtigerint: etenim cruor deslagrans, velut ignis in fumo cespitibus cooperto, incendio potissimum intestino gliscebatur: idcirco de præcordiorum æstu cum siti intolerabili æger conquellus est, cum interim exteriora minus incalcescerent: ob hanc rationem, & quoniam corpus fuit nimis perspirabile, sanguinis recrementa adulta crisi factura, & quę statis temporibus exterioribus diffuari solebant, interiorum suffusa (naturā scilicet valde oppressā & perpetuò irritatā) vomitus immanes, & serè continuos induxerunt; quare cum

materię

materia febrilis ante plenitudinem aut coctionem ejus ita crebro expulsionis nixu ad primas vias derivaretur, crisis minime insequuta est. Nec ab irregulari ista evacuatione æger se melius habuit, quinimo sanguis mixtione usque deterior factus, in se corrumpi, & liquorem nervosum omnino pervertere incepit: unde præter vomitiones assiduas crebræ lipothymiz, pulsus inæqualis, necnon deliria & motus convulsivi oriebantur: quatenus vero utriusque humoris mixtione & crasi nondum penitus solutis aut everfis diaphoreticum fuit exhibitum, quod pro insigni partium agilitate & cruore, & liquorem nervorum certissime trajecerit, eorumque impuritates & extraneas mixturas, fermentatione vegeta & festina de novo concitata, foras eliminavit, status morbi ad exitum tendens versus salutem reducebatur, atque hoc modo in criseos naturalis vicem medicina ope succenturiata, æger velut ab inferis revocatus brevi sanitatem recuperabat.

Mulier in ætate 30. circiter annorum, corpore robusto, & temperamento atrabiliario (uti ex moribus valde austeris conicere licebat) prædita, tertio post puerperium mense, cum noctu infantem lactaret, stragulis discooperta frigus contraxit, & deinde statim in rigorem incidit; huic calor solito auctor successit, qui postea (diaphoreti leni oborta) cito remittit. Die secundo & tertio erat sitibunda, ac cibi inappetens, sine æstu tamen immodico, ut vixdam se febricitare crederet: qualibet nocte quieta jacuit, verum fomii omnino expers: urina erat intensè rubicunda, à contentorum multitudine nonnihil spissa & opaca, quæ tamen à frigore minime turbata, sine hypostasi aut partium subsidencia usque eodem modo persistit. Die quarto calor in toto accenditur; quare Medico tunc primum accersito, sanguinis circiter 12. unc. e brachio detrahebantur: post sanguinis missionem, & alvum eodem die a clystere immisso copiose subductam vesperti in sudorem incidit, à quo tamen minime alleviata (medicamento licet anodyno exhibitio) noctem (uti prius) insomnem duxit. Die quinto ab enemate injecto tres habuit sedes, & levamen sensit: urina usque eadem persistit, rubicunda & turbida. Cum sanguinem e vena poplitæ nutri in præscripto esset, ægrotæ obnixè renuit, se convalescere existimans: noctu insequenti cum diu insomnis & inquieta jaceret, tandem paroxysmum, qualis vulgò hystericus perhibetur, gravi modo passa est; & primo stupore quodam, sive punctionis sensu extremas corporis partes (præcipue pedes, crura & femora) occupante, simulque statu intestina, ventriculum & hypochondria immaniter distendente afficiebatur: sensit in uno ventre velut molem quandam sursum obrepere; quæ cum ad cor, indeque ad cerebrum ascendisset, ægra statim intellectu vacillabat, & per totam exinde noctem delira & absurda loquens jacuit. Die sexto post alvum à clystere subductam ad se rediit, rectè animo constabat, & mediocriter habuisse visa est. Vesperti autem, cum in lecto commoveretur, ejusmodi (ut prius) paroxysmi insultum presentiscere cepit: nimirum in toto corpore habuit punctionis sensum, veluti si urticis stimularetur, simulque in ventre velut

globum convolutum, qui sursum obrepens interina & ventriculum distendebat, ut exinde statim & ructus copiosi efferrentur. Levaminis gratia aqua frigida potum postulabat. Insuper remedia in affectibus hysteriis usitata, uti castoreum, odor assa foetida, sulcus & piusillus, ligaturæ, & frictiones crurum, & similia adhibita sunt, quorum usu in præsens videbatur affectu prædicto libera, & prorsus immunis facta per horas quatuor. cum autem supina in lecto decubuit, ut somno capellendo se accingeret, derepente totum corpus eadem symptomata simul pervadere conquiescit, & mox inde in delirium incidit: tota nocte insomnis ejulans & clamans delirè loquebatur; die sequenti oculis apertis sine motu aut loquela jacuit. Vesperti iterum cum febre aucta fuit ægra suribunda, ut vix in lecto contineretur; atque ita per tres dies, modo delira, clamans & ejulans, modo velut stupida sine motu aut voce perstitit; usque tamen motibus convulsivis circa musculorum tendines percellabatur. Die decimo respirationem altam & anhelosam cum pulsu debili & velut fornicante duxit, media nocte obiit.

Erat hæc febris e putridarum censu, quæ tamen ob diathesin sanguinis atrabiliariam (uti supra innuitur) haud multum in endio, seu calore ingravescerebat; attamen solutu difficilior, etiam cerebro & nervoso generi fuit plurimum infesta: sanguis ad effervescendum prædispositus à frigore suscepto facile intemperiem contraxit; verumtamen a sale & faculentis terrestribus una cum sulphure commotis minus aperte in laetabatur: nondominus incendio interitino & velut clauso ardescens insignius depravabatur: hinc statim ab initio urina erat lumine rubicunda & turbida; etiam omnino insomnis debebat: die quinto sanguis delugans, & recrementis, seu materiæ adusta satur, plenitudine sua ad excretionem molendam irritabatur; quare isthac nocte turgescencia oborta sarcinam suam sudore minus dissolubilem in caput transtert, ibidemque cerebrum & nervorum generi affigit: inde statim spirituum animalium irradiatione solita in ipso fonte perturbata, eorum inordinationes in extremis partibus primò sentiri accidit: quare punctio adebat in toto corpore, venter inflatus, hypochondria distenta, & velut moles quædam sursum ascendens & successive ventrem, præcordia, & demum caput pervadens: hujusmodi enim symptomata non semper (uti vulgo creditur) à vaporibus ab utero elatis & sursum contendentibus oriuntur; verum non raro à cerebro & nervorum principiis maxime affectis: cum enim labes ibidem inuigitur, ut spiritus animales juxta originem suam immotu perturbentur, nec (uti prius) corpora nervosa indunt ac distendant; statim spiritus alii in nervorum extremitatibus siti miluxu solito privati, tumultuari incipiunt, & inordinare ac versus principia sua commoti, partibus quibus insident spasmos inducunt: hic motus irregularis & convulsivus in extremitatibus inceptus, continuo spirituum, & partium nervosarum ductu, mox in partes alias, & deinde alias usque cerebro propiores serpit; donec tandem (tota spirituum, velut militum, serie successivè in retrocessum acta) spasmi in ipsum motus fontem continuantur. Quod re-

verà hoc ritu motus convulsivi dilatissime à causa, seu affectus loco aliquando incipiunt, hoc unico argumento planum fiet; quoties scilicet in crure aut brachio ligatura strictioni, aut incubatu influxus spirituum animalium inhibetur, punctionis sensus, live spasmus cum stupore, primo in pede aut manu sentitur, qui postea successive verius partem affectam altius ascendit: quare in hac ægra ob materiam febrilem (scilicet recrementa adusta) & cruoris sine metallati critica in cerebro delixam, atque illic nervorum principia obsidentem, symptomata ista affectionem hysterica in matantia ciebantur: propter nervos (qui inediazente spinali medulla per totum corpus disperguntur) juxta originem affectos, punctionis sensus in extremis incipiens mox in toto percipitur, ubi sexti paris similes in fonte lachryem, primo in furculis ejus dilatissimis. (nimirum circa abdomen) spalmi & distentiones oriebantur, sunt ille velut molis cujusdam ascensus solummodo viscerum & musculorum abdominis a spalmi successive inflatorum tumefactio, deinceps eodem affectu (mediante ejusdem sexti paris ramo) superius usque & propius cerebrum perreptante, videbantur præcordia, & dein caput ipsum (velut a vapore quodam ab inferioribus sursum elato) corripit: die proximo, cum materia hæc febrilis primo leviter cerebro infixa à cruore denuo resarciretur, symptomata prædicta ad tempus cessabant; dein brevi posthac (sanguine iterum efflorescente & incrementa sua rursus in cerebro deponente) ejusmodi, uti prius, affectionem ingruere hæc ægra persentirent; quæ tamen frictionibus, fortentium odore, aliisque remediis in passione hysterica ulitatis per quatuor horas ab insultu retardabatur, quatenus nimirum spiritus animales ab externo objecto lacerati, & in motum violentum irritari impediuntur, ne motus convulsivos ita subito conciperent: postea vero cum ista spirituum incitatio externis adhibita cessaret, urgente adhuc causa morbifica, spiritus illi graviter oblecti non successive ab extremitatibus incipiendo (ut prius) sed de repente omnes tum in cerebro, tum in nervosa appendice una in confusionem aguntur. Crisi ad hunc modum tentata, scilicet materie febrilis ad cerebrum translatione, morbi eventus tum in hac ægra, tum in aliis, quorum ægritudines diligenter observavi, plerumque funestus successit. Etenim sanguis, nisi valde depravatus & impeditus, depurationem suam tali crisi vix unquam molitur: & quotiescunque hoc modo excretionem satagit, cerebro & nervoso generi labem nec cito, nec facile desepilem infligit: etiam ipsa cruoris massa raro admodum talis efflorescentia motu a materie febrilis impura mixtione immunis redditur.

Juvenis eruditus, gracilis habitus, & pallidi vultus, ineunte vere, nullius errati circa ærum conscius, queri cepit de lassitudine & impotentia ad ambulandum, etiam de capitis torpore & somnolentia: die secundo insuper siti, inappetentia, & præcordiorum æstu torquebatur: die tertio Medico accersito vomitorium sumebat, à quo cum ter evomuerat, & quinquies biliosa & calida dejecerat, nonnihil alacrior factus est, & nocte insequenti medio-

criter dormivit: die quarto fuit stillidium sanguinis in exigua quantitate; deinceps & calor plurimum aucti: erat urina rubicunda, cum sedimento copioso, & æquali hypostasi. Quoniam autem post signa coctionis in urinis apparebat natura velut oppressa ad excernendum conatus tunc evacuatione sufficiente, ideo sanguis ad 7. huc mittebatur, & ex inde plurimum alleviari visus est; vesperi tamen omnia exacerbabantur, & exinde per tres dies febris usque intendi videbatur. Die septimo de gravi torpore in capite, & caligine oculis obversante querebatur: post meridiem hæmorrhagia copiosissime successit, ut præ immenso sanguinis dispendio æger fere viribus exolveretur, atque opis medicæ pro sanguine sitendo maxima incumbere necesse esset: in hunc hunc cum venæsectio in brachio, ligaturæ, epithemata, tum capiti, tum imo venter adhibita, & quæ plurima alia remedia (urgente præcipuum mendendi occasione) à quibuslibet præscripta incassum tentabantur, tandem mulieris illuc easu occurrentis suavis, nati stantem ferrum ignitum admovebatur, & de repente a vapore sanguinis correpti mures suscepto, istius fluxus silebatur: hoc remedium postea in plerisque bono cum successu usurpatum novum. Copiosa ista hæmorrhagia febris continua judicata est; cui tamen intermittens quotidiana successit, quæ postea juxta medendi methodum superius traditam brevi curata est.

Hæc febris sine manifesta occasione incipiens, ac per plures dies cum siti & calore continuata, erit synochus putrida dicenda; quæ tamen sine quovis horrendo circa initium aut statum symptomata, facili decursu licet crisi denique periculosa, & difficili, judicata est, huic sanguinis verno tempore turgescencia, simulque in eodem ventilationis defectus originem præbuerunt: cruor incendio febrili delagrans, circa diem quartum aliquantulum materie adusta congescerat, ut efflorescens motum criticum (hæmorrhagiæ licet exigua) tentaret: evacuationis plenioris defectum venæsectio pro tempore supplevit; postea recrementis adustis in magna copia congestis, usdem in corpore non bene peripirabili per diaphoretin minus diluari aptis, quo tempore natura erat crisi molitura, hæmorrhagiæ ingens sequuta. Cum enim sanguis ob materie febrilis seclusionem motu critico agitur, ejus particula quæ plurimam a mixtione solvantur, ita ut turgescencia majori citata quodvis extraneum ipsis confusum eliminant, si hoc tempore cutis spiracula minus pateant, cruoris massa (velut multum utriusque liquoris oriscoli inclum) usque insignis turgescit; & quia materiam febrilem per sudorem excutere nequit, una cum ipso, quæ data portâ se foras proripit; quare cum per vasa in apertura narum debilitata sanguini ebullienti facilissimum pateat exitus, & ductu isto (instar ejusdem nulli quavis vas aperitur) spumosa rarefactione amplius copiose exsilit, febre continua hoc modo soluta, quotidiana intermittens successit, quia post longam sanguinis desagratiorem, ejusque ingens dispendium, qui residuus erat cruor spiritu plurimum orbatus, ac sale cum relicto sulphure perassato ejusmodi diathesin facile

contraheret, quā succum alibilem hand rite coquere, sed in materiam usque fermentativam pervertere aptus fuerit.

Matrona sexagenaria cum linteis non satis à madore exsiccatis lecto intratis quadam nocte discubisset, malè habere cœpit: primò afficiebatur catarrho suffocativo, ut præ serosa colluvie in laryngem exsudante, vix ei respirare, nedum dormire licuisset: postridie nausea & inappetentia, cum aliquali siti & caloris excessu iuborta est: die tertio dolor acutus in latere, cum tussi & febre aucta invaluit: urina fuit rubicunda & clara, cum hypostasi laudabili; pulsus inæqualis, & intermittens. Medico vocato sanguis ad 10. unc. detrahebatur, etiam isto die ab enemate immisso alvus copiosè soluta est: sub noctem dolor evanuit, & mediocriter dormivit; urina tunc erat rubicunda, turbida, & contentis saturata: die quarto febris nonnihil auctior: vesperi tussis valde molesta, succedente mox dolore acuto (ut prius) in eodem latere: urina iterum clara, cum hypostasi: dolor à sanguinis missione denuò celebrata brevi cessavit. Die quinto febris remissior, nox tamen inquieta, cum calore & iactatione corporis, verum sine dolore. Mane proximo copiosè sudavit, & alleviata est; dein victu adhuc tenui per aliquot dies usa, & semel purgata, sine recidiva convaleuit. Observatione dignum fuit, quod urgente dolore, urina erat clara, & cum hypostasi, nec à frigore turbata; quæ tamen, eodem sedato, statim crassa, magisque rubicunda, & contentis saturata evasit.

Hic morbus propter acutum lateris dolorem, velut symptoma pathognomonicum, pleuritis dicitur; verum hic febrem habemus dolori præcedaneam, & minime ipsius productum. Egritudinis causa evidens fuit à pororum constrictione transpiratio impedita. Propter effluvia retenta sanguis effervescebat, simulque seroso latice nimis leatens, plurimum ejus ex arteriis in laryngem terminatis quasi evomens, catarrhi suffocativi sensum inferebat; etenim hujusmodi affectus (uti & tussis cum sputo copioso) minime oriuntur, eo quod humor aquosus (prout vulgò perhibetur) è capite in guttur & pulmones depluit; sed quia latex serosus modo è vasis pneumonicis immediate in pulmones suffunditur, modò arteriis in laryngem dehiscantibus exsudans in pectus decumbit. Die tertio ab eodem humore seroso cum portione sanguinis in latere defixo dolor acutus oriebatur; etenim sanguis effervescebat incipiens, cum adhuc in se materiam à succo alibili degenerem, crudam, & (uti videtur) acidiusculam contineret, eandem (quia foras per diaphoresin rejicere nequiret) lustratione propiori per arterias intercostales in membranam costas succingentem deposuit; atque illic (uti sensum in pleuritide asselet) sive coagulatione, (quod suspicari fas sit) sive vasorum obturatione sanguis eadem materiâ implicitus in motu sistitur; dein novi usque sanguinis appulsu mole auctus solutionem continui, adeoque dolorem acutum inferebat. Quod in hac ægra ejusmodi materies sanguinis massam perturbans, cum portione ejus extravasati circa pleuram defigeretur, exinde constabat, quo-

niam urgente dolore urina erat clara & contentis minime saturata: dein cum vasa propter phlebotomiam inanita materiam istam prius è cruore exterminatam, in ejus massam denuò resorberent, urina statim turbida & contentis iterum gravida evasit: pulsus erat inæqualis & intermittens, propter idiocrasiam, quæ nimirum in qualibet intemperie ita se habere solebat: cum enim ante plures annos hanc mulierem febricitantem curarem, pulsus inæqualis & intermittens mihi aliisque circa morbi eventum tristis prælagii metum incusserat; qui tamen eo tempore (uti & in hac ægritudine) sine horrendo quovis symptomate prosperè cessit.

Juvenis robustus & *temperatus*, circa solstitium æstivum post immodica exercitia, indeque frigus subitaneum calori superveniens malè habuit: primò inappetentia, nausea, sævo capitis dolore, necnon siti, & calore solito intensiori afficiebatur: die secundo dolor acutus in latere dextro cum tussi & respiratione difficili invasit: sanguine statim è brachio ejusdem lateris copiosè detracto, dolor iste nonnihil remisit; qui tamen vesperi, cum tussi & sputo cruento atrocior factus, rediit. Nox insomnis & valde inquieta successit. Die tertio sanguis denuò mittebatur; insuper linimenta & fots lateri dolenti applicabantur; pulveres, Julepia, & decocta antipleuritica intus sumpta: sub noctem dolor ferè in totum cessavit; dein mox cephalalgia immani cum vertigine æger afficiebatur. Die quarto fuit sanguinis stillicidium è nare dextra ad 2. unc. à quo affectus isti capitis planè cessabant: vesperi autem dolor in latere prius affecto cum majori atrocitate rediit; interim pulsus erat parvus & debilis, ut cum de sanguine mittendo consuleretur, periculum esset ne vires dejectæ tale remedium non admitterent: quare in exigua tantum quantitate phlebotomia celebrata, fotum & cataplasmata lateri diligenter applicari, insuper spir. cornu cervi guttas 20. in cochleari Julepii cardiaci propinari, idemque sex horarum intervallo continuo repeti præscribitur: sudavit illa nocte copiosè, & dolor plurimum remisit; sputum erat parvum, cruore interspersum, quod intra diem (dolore etiam sensim evanescente) omnino cessavit. Cepit æger bis in die ejusdem spir. c. c. i. scrup. & sine recidiva intra paucos dies integrè convaleuit.

Fuit hæc febris synochus simplex à causa evidenti, scilicet pororum constrictione, excitata: quamcitò cruor recrementis adultis nonnihil saturari, adeoque magis turgescere cœpit, materies quæ secerui debuerat, propter peculiarem ejus labem in pleuram transfertur, ibidemque defixa sanguinem sibi adscitum coagulari, adeoque circuitu sisti, & cum à venis minus exciperetur, statim extravasari cœgit: hinc dolor acutus in latere, & sputum cruentum mox ab initio hujus morbi acciderunt: dein postea eadem materies foco isto quem adsciverat depulsa, & in cruoris massam resorpta in capite defigitur, atque illic similem cruoris stagnationem, & (uti probabile est) coagulationem inducens, vertiginem cum atroci dolore inferebat; qui tamen affectus (hæmorrhagia ob sanguinem extravasatum oborta) brevi solvebatur. Parte materię morbificæ hoc modo detracta, pars altera

altera à sanguine resumpta denuo ad focum ultimum (scilicet latus prius affectum) convehitur, ubi deposita laticem suum (scilicet cruoris portionem) rursus coagulat, & extravasari cogit: etenim dolor iste cum ipso cruento die quarto renovatus, à sanguinis ebullitione minima, ideoque e valis exundantia provenire nequibat; quoniam illo tempore pulsus erat parvus & debilis cum valorum concordantia, ut reverà cruorem valis exsudasse putandum sit, eo quod à materia morbifica coagulatus (ideoque licet arteriis expulsus, à venis tamen referri minus habilis) in circuitu stiteretur. Huic dolor acutus succedit, quoniam sanguis crebro appulsu congestus, & in tumorem elevatus continui solutionem fecit. Etiam mox ab initio sputum cruentum supervenit, quia sanguis intus in corpore alicubi in motu cohibitus, ob tenerrima & facile patentia vasorum oscula in cavitates exsudat; cum eidem exterius extravasato, propter cutim densiorem & obscurata vasorum oscula, nonnisi in abscessum facto & suppurato patebat exitus. Venæsectio in pleuritide incipiente prodest, eo quod sanguinem alicubi in circuitu prædeditum à nimia effervescencia cohibet; præcipue autem quia tum vasa hac ratione valde deplentur, immo et quoscunque prius exterminatos, adeoque sanguinem in parte affecta itagnare inceptum denuo excipiunt, & fluxilem reddunt. Etiam remedia circa initium huius morbi maxime juvantia sunt ejusmodi quæ sanguinis coagulationem impediunt, aut inter coagulandum dissolvunt; qualia sunt quæ tale volatili aut alcalisato plurimum abundant, nimirum spiritus fuliginis, sanguinis, cornu cervi, item spiritus & sal urinz, pulvis è chelis aut oculis canerorum, e dente aprugno, aut mandibula piscis lucii, egregii sunt usus. Inter vulgares mos est infusionem stercoreis equini propinare; quod equidem medicamentum in casibus fere deploratis non raro opem contulisse novi. Interim acida quæcumque, quia sanguinem plus coagulant, & expectorationem impediunt, in hoc morbo summe lædunt.

Pro curatione febrium, tum pestilentium, tum malignarum, quam in cæteris quibuscunque majori opus est iudicio, & circumspeditione: cum enim duo sint primaria indicantia, scilicet malignitas, & intemperies febrilis; tumque alteri sine alterius detrimento vix prospicere liceat, utri prius sit occurrendum, & potius consulendum, non facile erit discernere. Respectu febris, purgatio, venæsectio, & refrigerantia imprimis conducunt: dum vero hæc celebrantur, malignitas plerumque augetur, & neglecta venenum latius diffundit: contra malignitatem alexipharmaca, & diaphoretica requiruntur; verum hæc febrem valde intendunt, sanguinem, ac spiritus prius accensos velut flammam explosu plus exagitant, & toros quasi in flammam adigunt: quare hic magna opus est solertia, ut hæc ritè inter se conferantur, & unde plus periculi imminet, illinc intentiones curativæ immediatius designentur; ita tamen ut dum alteri consulitur, alterius neglectus non habeatur. Verum in his casibus, præter Medici cujusque privatum iudicium experientia potissimum medendi rationem suppeditat: cum enim

hæc febres primo grassantur, singuli ferè singula tentant remedia, & ex eorum successibus una collatis facile ediscitur, quali denuo methodo imitandum erit, donec ultimo crebro tentamine, seu transeuntium vestigiis, via quasi regia & lata ad huiusmodi affectuum rationem teritur, variisque observationibus monitisque unita.

Præter huiusmodi febres, quæ simul in plures grassantur, & propter contagium, perniciosæ, & conspicuas virulentia notas, pestilentes, aut malignæ dici merentur, dantur aliæ quædam epidemicæ, seu populares, quæ singulis fere annis, aut vere, aut autumnis in quibusdam regionibus deserviunt, à quibus incolæ quamplurimi ægrotare solent, & non pauci, præsertim e senioribus, occumbere; in quibus tamen nulla pestilentia, ut malignitatis signa apparent, nec tam contagio videtur morbus ab aliis subinde in alios grassari, quam ob prædispositionem ferè omnibus inprestatam una plures corripere. Huiusmodi autem affectus à prægressa anni constitutione potissimum dependent; si enim tempestas, propter excessus frigoris, aut caloris, siccitatis, aut humiditatis, valde intemperata præcesserit, adeoque diu persisterit, sanguinem nostrum ut plurimum à debita temperie immutat, qua postea effervescencias febriles concipere aptus sit; atque hinc febris modò huius, modò illius typi, ac idcirco producitur, quæ statim epidemica evadit, quoniam à causa communi, quæ simul omnium quodammodo afficiuntur corpora, originem ducit: tales vero febres, quatenus à sanguine diathesin modò acreni, modò auteræ, aut alius generis, propter anni temperiem nato dependent, ut plurimum sunt de intermittentiis censu: proprio tamen symptomatum apparatu, juxta peculiaritatem cujusque anni constitutionem insigniri solent. Has sub communi quadam norma, seu ratione formali, quæ singulis huius naturæ quadret, comprehendere non licet; quoniam ipsæ juxta pleraque accidentia quotannis variant. Utcunque tamen huiusmodi febrium nuperis annis in hac regione grassantium descriptiones tum temporis habitas in aliquale cæterarum specimen dabimus, & sub finem huius operis coronidis loco subiciemus.

Restat adhuc malignarum censui febres quædam alias privatas, & nullius contagii participes ascribere; cujusmodi sunt in primis quæ foeminis puerperis, ob partum difficilem, & laboriosum, vel propter lochia detenta accidere solent. Siquidem has valde periculosas, & non raro lethales esse, observatione communi satis constat: nam si læsis uteri partibus, aut frigore admissio, aut aliâ forsan causâ lochia sistantur, & qui excerni debuerat humor sanguinis massæ confusus fuerit, ipsum veluti mixturâ quadam venenata pessimè inquinat, ut exinde statim febris excitetur, quæ nullo symptomatum apparatu, scilicet calore, & siti immani, vomitu, cardialgia, & vigiliis ut plurimum stipatur, & plerumque crisin aut nullam, aut valde difficilem obtinet: quippe, nisi solitâ viâ lochiorum fluxus denuo restitatur, post sanguinis effervescenciam per aliquot dies habitam labes cerebri, & nervoso generi communicari solet; unde mox delirium, phrenitis, convulsiones, aliæque pessimæ affectiones sæpius inde-

inducuntur, quæ non raro in mortem terminantur: verum huiusmodi febres considerationem peculiarem merentur, quam inferius, discursu in hanc rem appropriato, plenius habere statuimus; subit interea febrium superius traditarum, scilicet pestilentis, ac malignæ, instantias, seu exempla quædam proponere.

Febris pestilentialis nuperis annis rarius quàm pestis ipsa in his regionibus grassata est: hujus generis unica, quæ nostræ observationi contigit, descriptionem brevi subjiciam. Anno 1643, cum incunte vere Essexiæ Comes Redingam præsidium Regio defensionem obsidione premeret, in utroque exercitu morbus admodum epidemicus exoriri cœperat; utcumque tamen operi insistente illo, donec inclusi ad deditiorem cogerentur, affectus ingravescebat adeo, ut brevi postea utrinque discessum, & deinceps per plures menses non cum hoste, sed morbo pugnatum fuerit, ac si exitiali ingruente lue, in aliud mortis genus, districtus jam, & velut huic uni incumbentibus fatis, divertere non esset otium. Essexius castra movens Thamæ locisque adjacentibus confedit, ubi magnam suorum partem brevi requiivit. Rex vero Oxonium rediit, ubi militibus primò in campo aperto, dein postea per oppida & vicos dispositis, non multò leviora passus est: pedites enim ejus (quos præcipuè invasit) gregatim in arctis contuberniis collocati, cum omnia squalore, tetra immunditie, & fædis odoribus complevisent (ut ipsum aëra inquinasse viderentur) catervatim, & quasi per manipulos agrotabant. Tandem febris jam plus quàm castrensis mermem, & imbellem turbam, militum nimirum hospites, aliosque quoslibet passim invasit, qui primò (lue adhuc mitius inflicta) licet gravi, & diuturno languore obsessi, plerique tamen evaserunt. Circa solstitium æstivum febris hæc cum peiori symptomatum apparatu etiam non in crebrescere, & plurimos colonos, aliosque ruri habitantes occupare cœpit. Dein postea in hac urbe nostra, & universa vicinia per decem utminus milliarium spatium grassabatur. Interim qui in aliis regionibus procul hinc degebant, velut extra contagii sphaeram, noxæ immunes persisterunt. Hic vero morbus ille in tantum epidemicus evasit, ut maxima pars mortalium eodem inficeretur: quaecumque domum intraverat, statim totam adornebatur, ut vix e sanis superessent, qui malè habentibus ministrarent. Adventæ, aut conducti in agrorum ministeria vocati, mox eadem corripiebantur lue; ut demùm præ contagii metu, ex hac febre decumbentes ferè ac peste laborantes à sanis vitarentur.

Nec minima quidem perniciēs, aut mortaliū strages hunc morbum comitata est; quippe senes, cachectici, phthisici, aut aliās invaletudinarii quamplurimi hoc fato interiere, etiam puerorum, juvenum, maturæ, & robustæ ætatis hominum non pauci. Memini in quibusdam villis seniores ferè omnes hoc anno vitæ abreptos, ut vix superessent qui traditionibus antiquitus acceptis Paræciæ mores, & privilegia tueri potuerint.

Quando hæc febris primò inæcepit, synochi putris typum nonnihil referebat; erat tamen judicatu difficilior; & cum sudore, aut diarrhœa solvi videretur, statim recrudescere solita erat.

plerumque verò post sanguinis deflagrationem per sex, aut septem dies continuatam, hac remittente, & crileos vice, materia adusta in cerebrum translata, cum furore nonnunquam, sæpius cum torpore, i nobilitate magna, & aliquando motibus convulsivis ægri longo tempore decumbentes vix tandem evaserunt. Circa mediam ætatem præter contagium, & funerum frequentiam, signis apertis, scilicet æanthematum, & macularum eruptione hic morbus vim suam malignam, & pestilentialem prodidit: quippe sub hoc tempus multis sine magno febris incendio pulsus inæqualis, debilis, & plurimum inordinatus, etiam sine manifesta spirituum expensa vires statim languidæ, & valde dejectæ evaserunt: aliis simili ritu decumbentibus papulæ modò exiguæ, rubræ, modò latæ ac lividæ apparebant: in multis bubones (uti in peste) circa adenes. Ex his nonnulli sine magna spirituum lucta, aut exaulescenti febrili in cruore citata tacite, & improvise emoriebantur: interim alii mox furibundi quoad vitæ participes fuerant, spirituum animalium distractiones horrendas perpessi sunt. Ex hoc morbo evasuri, sine crisi laudabili (nisi sudore ab arte provocato citius liberarentur) cerebro denum, ac nervoso genere affectis, cum sensuum stupore, tremoribus, vertigine, membrorum debilitate, ac motibus convulsivis, nonnulli post longum tempus convalescerunt. Durante Canicula hic morbus usque infestus, non uti febris, sed velut mitior pestis tractari, & remediis tantum Alexipharmacis expugnari cœpit: phlebotomia huic usque fatalis credita est; vomitoria, & purgationes interdum, licet non ita crebro, usus fuerunt; potissima autem medendi ratio in Alexiteriis, & diaphoresi tempestive procuranda statuebatur. In hunc finem præter Medicorum præscripta & pharmacopolis petita, remedia quædam Empirica laudem non exiguam merere. Tunc primùm in hac regione pulvis Comitissæ Cantii magni nominis esse cœpit: etiam non minimæ notæ fuit pulvis alter cineritii coloris, quem Aulicus quidam in hac urbe forte diversatus bono cum successu pluribus exhibuit, aliisque ejus usum probantibus, magno pretio venalem expoint. Solebant ægri ab hujus semidrachma in quovis liquore propinati in sudorem copiosissimum incidere, adeoque à morbi virulentia liberari. Fuit diaphoreticum illud (cujus præparationem ab Authoris consobрино postea edidici) solummodo Bufonum Sale expurgatorum, dein vino optimo lotorum, & in olla stili leviter calcinatorum pulvis. Vergente Autumno hic morbus de solita atrocità sensim remittebat, ut pauciores agrotarent, & eorum plurimi convalescerent; donec incumbente hyeme, febris ista ferè in totum evanidâ, status denovo salubris in hac urbe, & rure circumcirca in solidum reddebatur.

Liceat hic febris ab initio tantum castrensis, demùm pestilentialis, ac epidemicæ factæ exitum, progressum, & postremò exitum intueri. Quod primò in militum castris morbus inæcepit, non tantum eorum squalori & tætris odoribus, verum aliquatenus communi æris vitio imputandum videtur: cum enim hæc febres non quotannis eveniant, earum origo peculiari consiru-

stitutioni anni nonnihil adscribenda est. Quippe exinde contracta levior aura intemperies, licet salubriter degentes hand male adiciat; in exercitu tamen, ubi *epidemicæ* isti generali causa evidentes, scilicet errores in lex non naturalibus, quamplurimæ accedunt, ejusmodi ægitudines facilius concitari necesse est. Fuit autem hujus anni constitutio verna in hibernis fere continuo madentibus valde humida: cui dein Æstas calidior succedens contagii febrilis miasmata hic prius gliscentia usque in pejus evexit, & corpora quævis ad suscipiendum ista magis disposuit. Quare quod hic morbus fere hunc regionis proprius, & hoc tempore epidemicus extiterit, ejus seminario ab exercitu circumcirca confidente primitus oriundo debetur. In quantum vero pestilentialis, & valde epidemicus postea factus mortalium hic degentium plurimos infecerit, & non paucos interfecerit, in causa erat mala aeris affectio, qui propter anni intemperiem minus salubris, insuper halituum tetrorum a militum castris, & ægrotantium contuberniis expiratione continua ita demum vitiosus evaserit, ut in eo dispersa hujus febris miasmata exaltarentur valde, & fere ad pestilentiam virulentiam assurgerent. Refert *Dionysius* *brochii*, ab hujusmodi febre castrensi Noviomagi in æstate excitatam postea aliam malignam, & pestilentialem, ac dein pellem ipsam accrevisse. Etiam febrem hanc nostram ultimo ipsius pestis fuisse amulam, præter magnam vim contagii, & funerum frequentiam, indicio erant ab eadem in omnibus cruoris, & liquoris nervosi affectiones pessimæ statim inductæ; quippe vires subito dejectæ, pulsus debilis, intermittens, formicans, papularum, & bubonum eruptio sanguinis coagulationem, & dispositionem corruptivam arguebant: insuper delirium, mania, phrenitis, torpor, somnolentia, vertigo, tremores, motus convulsivi, alique diversimodi capitis affectus insignem cerebri, & nervosi generis læsionem ostendebant.

Ut febris malignæ typus, sive idea ad vivum depingatur, observationes, seu ægrotantium historiarum quamplurimæ satis ad manum prostant: e pluribus hujus morbi exemplis libet hic pauca tantum inferere, quæ ante aliquot annos in domo venerabilis viri ut cum clade luctuosa, ita non sine admiratione quadam obtrigerunt.

Circa solstitium hyemale, Anno 1655. puer in ætate circiter septem annorum, sine causa manifesta male habens, gravi capitis dolore, somnolentia, & insigni torpore afficiebatur: simul aderat febris, licet minus intensa, cum incendio mediocri; quæ tamen paroxysmis vagis, modo semel, modo bis in vigintiquatuor horarum spatio exacerbabatur: mox ab initio morbi fere continuo dormiebat, etiam in somnis ejulare, incongrue fabulari, & sæpius lecto exsilire solitus. Excitatus, ac interdum sponte evigilans, statim animo constare, & potam constanter requirere solebat. Urina fuit rubicunda, & contentis saturata; pulsus æqualis, & satis robustus; tendinum in carpis contracturæ leves; in collo aliisque partibus corporis maculæ quædam rubræ pulicæres apparebant. Primis diebus lenis purgatio, & (enematum usu) crebra alvi subductio instituebatur; Julepia

cardiaca cum Alexiteriis quotidie sumebantur; vesicatoria collo, aliæque emplastra pedum plantis fuerant adhibita: die sexto sanguis parum e naribus stillavit; seprinio line manicata diacrisi febris plurimum remisit; calor tantum mitis fuit tactu perceptibilis: etiam urina pallida, tenuis, sine quovis sedimento. Attamen somnolentia, & capitis torpore longè gravius molestabatur, ita ut urina, & excrementa alvi involuntarie effluerent: utcumque voce interpellatus adstantes novit, & interrogatis respondit. Affectiones istæ non obstantibus remediis indies ingravescebant: circa 14. diem æger adeo stupidus evasit, ut nec intelligere, nec loqui potuerit; usque tamen ori ingesta (licet intus) deglutivit, fuitque pulsus satis laudabilis: sub hoc tempore diarrhæam sponte naturæ excitatam per quatuor dies pulsus est: qua demum cessante, crusta albicans, & velut cretacea totam oris, & gutturis cavitatem oblinire cepit, qua sæpius in die deterfa, nova statim erupit. Cum deinde per quatuor dies hoc modo laborasset, circa intellectum, & sensationem melius habuit, ita ut parentes, & amicos dignoscere, dictis annuere, & iussa aliqua exequi potuerit. Igitur verò facultas sensitiva restituit, ita circa loquelæ, & deglutionis organa malum ingravescere cepit, proculdubio materia e cerebro in nervorum principia, & ductus prolapsa. Torpori ac stupiditati paralyticæ in lingua, ac gutture succederat; qui affectus brevi in tantum accrevit, ut postea ægrotus non omnino deglutire potuit. quin ore ingesta statim effluerent, nec quidquam in ventriculum illaberetur. Cum præter morbi atrociam periculum esset, ne hic fame enecaretur, instrumentum parabatur ex pinna cetacea in virgunculam flexilem efformata, ejusque apici nodulo bombycino adaptato; atque hoc gutturi intrusum clausuram ejus pro tempore referebat, quo alimentis ingestis transitus patefieret. Post hujus usum die uno, aut altero iterum deglutire, & dein satis alimenti ingerere potuit: atque intra paucos dies loqui, quidvis discernere, atque mirabiliter eluriens totis diebus esculenta cujuscunque generis postulare, & oblata quævis avidissime vorare cepit. Interim præ diuturna ægitudine, & partibus nervosis graviter læsis in tantum emaciabatur, ut demum ossibus vix cuti coherentibus, sceleton vivum exactissime repræsentaret. Postea tamen matris sedula, indefatigabili, & prudenti circa victum cura sanitatem perfectam recuperaverit, & adhuc sanus vivit.

Dum hic puer ægitudinis suæ vix *diu* transigisset, frater ejus binorum circiter annorum ætate major, Idibus *Januarii* fere simili ritu decubuit. Primo torpore, & capitis gravitate, perendie febricitans somnolentia, & stupiditate afficiebatur: in somnis delirè fabulari, dein evigilans vix animo constare cepit: post quatuor, aut quinque dies symptomata hæc ingravescebant: parum intelligere, nonnisi titubanter, & vix articulate loqui potuit. Urina fuit crassa, opaca; sine hypostasi, aut contentorum subsidentia: maculæ rubræ, exiguæ, pulicum morsui similes, prout in fratre apparebant. Excrementa tum alvi, tum vesicæ involuntarie effluebant. Pulsus verò adhuc robustus, & æqualis constabat. Hypochondria erant tensa, & inflata

cum tumore abdominis ; circa diem octavum stillicidium sanguinis exiguum erupit : die agrotationis undecimo in diarrhœam incidit , quæ intra quinque horas septies deiecit biliosa , tenuia , & summe putida , unde spes aliqua conditionem ægri meliorem fore : postmodum tamen fluore alvi cessante , dolor , ac tormina in ventre immaniter infestabant , ut clamans , ac ejulans die ac nocte querelas gravissimas misceret : hypochondria , & abdomen instar tympani erant tumida & valde distenta . Cum à nullis remediis plurium Medicorum opera exquisitissima tentatis quidquam levaminis recipere potuisset , die decimaquarta in his cruciatibus convulsus obiit .

Paulò post hujus mortem , scilicet 16. Idus *Februarii* , frater ejus senior , circiter undecim annos natus , spei optimæ puer , febricitare incœpit , torpore , & gravitate capitis , uti priores , licet minus intense , affectus : verum in sanguine , qui temperamenti erat calidioris , major effervescencia , & perturbatio apparebant , ut primis sex diebus præter calorem & sitim , continuo excretionis nixu , modo per sudorem , modo per alvi fluxum molestaretur . Urina erat rubicunda , & turbida : maculæ quædam rubræ , prout in cæteris , eruperunt : die septimo hæmorrhagia ad quinque uncias obtigit , qua cessante torpor ingens successit , ut per totum istum diem , & noctem sequentem vix oculos elevare potuerit . Die octavo hæmorrhagia narium iterum copiosissima insequuta est , ut periculum esset , ne una cum sanguine animam effunderet : cruor copiose adeo e nare sinistra exiit , ut pelvi exceptus casu suo in bullas ingentes efformaretur . Cum supra duas libras sanguinis amiserat , & sudore frigido perfusus viribus exsolvi incœperit , remediis demum adhibitis difficulter admodum fluxus sistebatur . Hæmorrhagia sedata puer altum dormivit , ac toto isto die somnolentus evasit : crebrò tamen evigilans , satis animo constabat , eratque sensu , & intellectu vegetis : de valetudine interrogatus , se mediocriter habere dixit . Urina , quæ prius erat rubicunda & turbida , tunc pallida , tenuis , & cum hypostasi laudabili apparebat , ut videretur æger (præsertim quia sitis , & inmodici caloris expertus) perfectè judicatus , & febre immunis . Mane sequenti die febris nono , adhuc torpidus mansit : excitatus verò , sine intemperie , & alacriter degens in convalescentiæ statu videbatur , nisi quod loquela parum vacillare cœperit . Vespere cum res minus essent suspectæ , febre denuò accensa , derepente in lethargum incidit , ut ægrè à somno excitari , vellicatus vix quemquam noscere , aut articulatè loqui valeret . Licet adeo immanis sanguinis jactura præcesserat , pulsus fuit denuò citatus , altus , & vehemens , etiam urina rubicunda . Post remedia derivantia , & revellentia tota isthac nocte usurpata , egregius hic juvenis paulò in meliori statu visus est , ita ut manè proximo diutius à somno continere , oculos huc illuc deflectere , & se parum exigere incœperit , sine loquela tamen , aut adstantium notitia . Ante meridiem oculis denuò clausis , cuiusque facultatis animalis usum penitus amisit : cum pulsu alto & vehementi , palpitatione cordis , respiratione anhelæ , & suspiriosa , triduo velut apoplecticus jacuit : pulsu demum sensum

diminutione facto , die febris decimotertio mortuus est .

Decimoquarto Calendas *Martii* hujus soror minuscule , cum intemperie febrili & ita , queri cœpit de dolore , & torminibus in ventre , tremore in manibus , & tentione dolorifica in musculis colli : ultimo *Februarii* apertius febricitans lecto abstinere nequivit ; insuper calore vago , modo in facie , modo circa partes inferiores afficiebatur : item torpida , & somnolenta evasit ; è somno evigilans haud statim animo constitit . *Martii* primo cum expressione Rhabarbari fuit leviter purgata , cum levamine : urina crassa , & rubicunda fuit : etiam maculæ rubræ petechiales (prout in cæteris) erant conspicuæ . Huic deinceps per quatuor dies crebris vicibus , nimirum sex horarum intervallo , exhibuimus spir. coram cervi guttas 10. e cochleari Julepi Cardiaci : symptomata prædicta postea sentim remiserunt , & sine manifesta diacrisi hæc agrotans salutem , licet tarde , recuperavit .

Sub eodem tempore fraterculus horum ætate minimus fere simili ritu agrotavit , qui tamen diarrhœa sponte naturæ oborta , per plures dies biliosa & viridia deiciens , facilius absoluebatur . Etiam in eadem familia plerique alii domestici , atque advenarum adinistrantium nonnulli , velut labe per contagium propagata , ex eodem morbo decubuerunt : qui tamen omnes difficili demum , & lenta convalescentia sine crisi regulariter facta evaserunt .

Hanc febrem fuisse malignam , ex contagio , pernicio , macularum pulicarium apparentia , multisque aliis indiciis constare videtur ; licet miasma illud inticiens , quo ab alio subinde in alium grassata est , torpidum & minoris efficaciæ extiterit : quippe inter singulorum agrotationes plures dies , ac sæpius hebdomadæ intercesserunt , ut morbi hujus , etiamsi acuti infectio , ac in plures disseminatio vix intra quadrimestre spatium in eadem domo finiretur . Febris circa prima initia visa est mitis , & blanda , haud multum incendio terribilis ; atramen materies à sanguinis deflagratione congesta , statim indomita , exterminatu difficilis , item cerebro , & nervoso generi inimica evasit : quare in singulis morbi initia torpore , & somnolentia , potius quam fervore , & æstu erant dignoscenda . Etiam crisis , licet variis modis , scilicet per sudorem , diarrhœam , hæmorrhagiam , tentata haud feliciter successit , quin plerumque sanguis motu critico turgescens materiam febrilem e propriis sinibus in spirituum animalium domicilia transferre cogebatur ; nec tamen ipse hoc ritu depuratus evasit , quin circa febris statum utrique humores (nimirum & cruor , & succus nervosus) impura mixtione simul vitiati , & graviter tacti , morbi eventum aut funestum , aut valde periculosum constituerunt .

Febris Læta.

Utrumque verò hujus morbi causa statuatur , circa curationem parum aut nihil intererit : hæc enim naturæ omnino committitur , & quamdiu lochia se rectè habent , sine ope medica ut plurimum sat feliciter procedit : quippe post effervescenciam sanguinis per 3. aut 4. dies peractam , aut sudor copiosus , aut transpiratio liberior hunc affectum solvit ; nimirum aut particula

ticulz humoris lactei inter assimilandum degeneres, aut recrementa adulta a sanguinis degradatione residua, aut simul utraque fontem febris suppeditantia paulatim subiguntur, & foras evaporantur; quibus exclusis, sanguis extranea mixtura liber factus, cito pristinum statum recuperat; interea tamen quædam regulæ vulgares circa lactis admissionem, aut ejusdem ex uberibus propulsionem observari solent. Si lac copiose nimis in mammas prosilit, ut earum inflammatio, necnon immodica sanguinis effervescencia præcaveantur, tunc temporis victus tenuior & parcius, nimirum ex jussulo carniū experte, & in minore quantitate imperatur; etiam ubera lactu crebriori depleantur. Similiter infantem lactare minus commodum fuerit, usitatum est primo, aut tertio a puerperio die ceratis modicè adstringentibus (utpote ex Emplastro de minio, &c.) totas mammas obtegere, sic enim spongiosa glandularum substantia nonnihil constringitur, quo humorem lacteum illuc scaturientem minus promptè suscipiant. Hoc tamen remedii genus caute adhiberi debet, ne si lac omnino excludatur, aut nimis confertim e mammas abigatur, in cruorem subito restagnans, ejusdem inordinationem, febris putrida, sive malignæ prodromam inducat: de qua proximè dicendum restat.

Puerperarum Febres putridæ.

Circa curationem hujusmodi febrium Medico difficile admodum incumbit pensum, quoniam puerperis pharmacia quævis non modò inutilis, ac insuper noxia admodum apud vulgus habetur: quare Medici raro accersuntur, nisi cum remediis nullus relinquatur locus, & utilis operæ omnino præterit occasio. Quod si forte circa prima morbi initia adfuerint, non facile erit vulgaribus remediis laborantibus salutem procurare; quodcumque vero tentaverint, nisi istud opiferum fuerit, à mulierculis, & adstantibus exitiale, & unica mortis causa perhibetur: ut revera circa nullius morbi curationem minus commodi, & plus opprobrii nobis obvenire soleant.

Methodus autem medendi (non secus ac in morbis contagiosis) duplex institui debet: nimirum prophylactica, & therapeutica. Prior harum tradit præcepta, & cautiones, quibus puerperæ a febrium incursum præserventur: altera intentiones curativas suggerit, quibus laborantes (si modò fieri poterit) salutem denuo recuperent.

1. Licet hæc febris, quantumvis maligna fuerit, contagio minimè accersatur, & decumbentibus nullus venenati miasmatis ab extra suscipiendi incumbat metus; attamen puerperæ omnes indulgentiam habent virulentiz mineræ, & ab hujus noxa, tanquam summi malignitatis fonte, cavere debent: quapropter iis exacto regimine opus est, quo nimirum à partu sine febris periculo impuritates sanguinis, & humorum vitæ expurgentur, necnon uteri malæ affectiones sanentur, atque vires à partu fractæ, & debilitatæ debito modo restitui possint. Propter hos fines erunt hæc tria præscriptis Medicis potissimum inculcanda. Primo exactissimam victus rationem puerperis imperari necessarium duco; nimirum ut jussulis avenaceis, modò ex cervi-

sia, modò ex aqua vino albo admixto paratis, necnon panatella, aliisque levioris nutritiis, per septimanam utminùs omnino vescantur: sed quia multum inaniantur, ideo crebrius eis forbere licebit; at nihil solidi, aut fortioris alimenti exhibeatur. Etenim diligenter observavi, quod has febres sæpissime induxit præpropera carniū, aut esculenti lautioris comestio. Quippe puerperæ non solum uti graviter vulnerati, verum sicut indispositionem febrilem ex perturbata sanguinis crasi, & temperie nacti tractari debent: apud ipsas enim cruor pridem nimium evectus, & velut impuro miasmate tæctus, pabuli cujusvis Sulphurei citissime inflammationem concipit. Secunda post victum erit cura, ne a frigore externo incautiùs admisso constipentur pori, aut instentur lochia: etenim à levissima occasione, immutato æstivæ modo, sanguis prius effervescens inordinationes concipit, necnon uterus auræ afflatu tæctus se contrahit, & vasorum ora, quò lochia minus fluant: quapropter per quinque utminùs à partu dies mulieres in lecto detineri omnino velim. Scio, quod vulgi mos sit quævis die tertio e lecto exsuscitare; verum exinde plures in febres incidisse novi: & revera si puerperas extra periculi aleam consistere cupiamus, tutissima erit ratio, ut diutiùs se lecto contineant. Tercia circa præsertationem restat scopus, ut puerperis, facta leni sanguinis proritatione, lochiorum fluxus continuetur: in hunc finem solent obstetrices (si quando à partu difficili id malum timeatur) sperma ceti, pulverem regulæ Hibernicæ, aut crocum vino albo intinctum exhibere. Porro jussula avenacea, ut sanguinem magis fundant, ex aqua vino albo, aut Rhenano admixto parare, quibus, aut etiam sero lactis, flores calendulæ, folia pulegii, aut artemisiæ incoquant. Extant pleraque alia administrationum genera circa puerperas habenda, quæ utpote vulgo nota hic libens prætereo.

Febris puerperium subsequens Therapeia à methodo in putridis usitata longè recedit: enimvero in ista non expectandum est, ut sanguis incendio febrili tactus gradatim deflagret, dein recrementa adulta in sinu ejus sensim congesta subigat, eademque crisi seceruat: quin potius (uti in maligna fieri amat) quamprimum immodice effervescit cruor, à remediis blande diaphoreticis ipsum exagitari, ejusque mixtiones heterogeneas, & impuras foras eliminari convenit: quare inter vulgares (idque haud perperam) in more est puerperis febricitantibus statim sudorifica exhibere: hoc ritu sanguine eventilato, ejus effervescencia sedatur; necnon propter agitationem ejus lochia cohiberi apta in effluxum proritantur. Inter auctores plurimum disceptatur, unde hujusmodi febrium initia computari debent, scilicet an ab ipso partu, an à primo febricitationis sensu? Attamen parum intererit, si hoc aut isto modo hujus solutio statuatur: nam si quidem hæc febris solita putridarum stadia haud æquabiliter decurrat, nec crisin habitura sit, neque remedii cathartici usum omnino admittat, non est ut de periodo ejus, aut mensuratione quoad dies omnino solerti simus: ac vero circa indicationes curativas solum ex usu erit distinguere de agendis in morbi hujus principio, augmen-

to, & sine; quid etiam, dum vires nonnihil constant; etiam quid in iisdem oppressis, & valde dejectis moliri debemus.

Cum itaque hac febre puerpera quæpiam primo afficitur (cujus insultus a lactea dignoscitur, quia cum rigore ut plurimum incipit) protinus dauda erit opera, ut sanguini flagranti uberius detrahatur pabulum, & ut superius monui, animalium carnes, aut juscula ex iisdem procul amandentur: interea tamen frigida quævis, & virtute styptica pollentia æqua sanctione arceantur: hæc enim sanguinem figunt, & constipant nimis, ejusque expurgationem valde requiritam tum per lochia, tum per transpirationem cutaneam, impediunt. Quin potius, febre licet urgente, decocta, pulveres, aut confectiones à moderate calidis exhibeantur: hujusmodi sunt (prout jam dictum) decocta, aut aquæ destillatæ florum calendulæ, foliorum pulegii, artemisiz, radic. scorzonæ, necnon pulveres Bezoartici, spir. cornu cervi, sales herbarum fixi, &c. Si lochia sistantur, ut eorum nuxus denud creatur, omni modo evitandum erit: huic promovendo conducunt frictions, & ligaturæ circa femora & crura, interdum cubitula, aut vesicatoria circa femora, aut coxas, necnon in plantis pedum; quandoque etiam venæsectio in talo convenit; interea totus ex decocto hysterico circa pubem applicetur, vel omentum vervecinum calide exemptum uno ventri imponatur. Pessaria, & injectiones uterinas aliquando prodesse experientia constitit: si alvus non respondeat, glande violaceo dicto, aut clythere emolliente blande subducatur. A pruritione fortiori cavendum erit, quoniam in puerperio, non secus ac in febre maligna, à copiosa dejectione cum spirituum deliquio vires subito exsolvi constat. Si quando cum lochiorum suppressione sanguinis perturbatio iniguus cum vomitu, siti, & vigiliis adfuerit, sæpe Laudanum croco admixtum felici successu exhibitum novi. Vice Julepii refrigerantis hujusmodi mixtura convenit, scilicet:

℞. Aq. pulegii, melissæ, an. unc. 3. hysteriz unc. 2. Syrupi Artemisiz unc. 1. sem. tincturæ croci drachm. 2. Castorei in petio ligati, & suspensi scrup. 1. Misce. Hujus cochlearia tria, aut quatuor aliquoties in die propinentur.

II. Si non obstante hujusmodi remediorum usu, febris usque ingravescat, & cum peiori symptomatum apparatu sensim augeatur, ut præter sanguinis inordinationes cerebrum, & nervosæ partes percelli incæperint, medicamina, licet plurima cujusque generis tentantur, sæpissime minus profunt: quinimò in hoc calu indicationes cum istis in ipsa peste adhibendis ferè coincidunt; siquidem lochia, aliquandiu suppressa haud faciliè, aut vix omnino, in magna sanguinis, & humorum confusione reduci poterunt, ideo diaphoresin citatius movere convenit; nimirum ut corruptelæ sanguini, & succo nervoso impressæ, & ab utero restagnantes per sudorem & transpirationem insensilem quodammodo eliminari possint. Quare hic pulveres, & confectiones Bezoarticz, spir. cornu cervi, aut fuliginis, tincturæ à coralliis, aut margaritis conducunt. Vidi aliquoties hujusmodi medicamentorum ope in casu deplorato, cum pulsu, aliisque symptomatis paulisper melius se habeo.

tibus aliquantulum spei affulsisse; curatio tamen rariùs successit, quin cum ille cardiacorum usus remitteretur, cum pulsu debili, & diarrhœa statim oborta laborantes in lethum præcipites ivere.

III. Cum adhuc in deterius res ægrotantium vergant, ut cum febre aucta pulsus debilis, & inæqualis fuerit, ac crebri horrores, & motus convulsivi in toto corpore cum delirio, aut stupore intellat; tunc Medicus facto prius lethi prognostico, remediis paucioribus, usque ferè tantum cardiacis insitat: & à sanguinis missione, scarificatione, vesicatoriis, aut cucurbitularum usu omnino abtineat; tales enim administrationes solum odium, & opprobrium accersunt, ut propterea a fœminis quibulvis malefici, & crudeles habeamur.

Febres puerperarum symptomaticæ.

Acuti puerperarum morbi non modò juxta febris prædictæ typum se habent, sed nonnunquam symptomate quodam insigni, scilicet angina, pleuritide, peripneumonia, dysenteria, variolis, aut alius generis stipantur; & tunc temporis affectuum istorum appellationes fortiuntur. Non erit opportunum quæ ad naturas, & essentias singulorum latè pertinet, hoc in loco repetere: quid vero ægritudines istæ cum puerperæ affectionibus complicata, circa causas, aut curationes peculiare habent, breviter subijciam.

Cuncta isthæc symptomatica à sanguinis coagulatione quadam, & exinde ejus extravasatione procedere arbitramur: dum vero sanguis extravasatur in una parte, ejus effluxus quilibet naturalis, & criticus cohibetur in alia: quod re periculum est, ne dum cruor aut in particulari assuetoque congelationis foco, aut universim in tota ejus massa coagulari incipiat, protinus lochiorum diminutio sistatur, quod revera ut plurimum accidit, ideoque affectus isti puerperæ sæpissime lethales existunt: attamen exitii causa cum aliquo discrimine plerumque evenit, scilicet in variolis lochia fluentia malignitatem exterius eliminari cœptam intus revocant, ejusque labe sanguinis massam, & cor ipsum prius venenari cogunt: ideoque in variolis purgantia isthæc uterina lilli conveniunt: in pleuritide autem, angina, & cæteris, cum morbi stimulus hic, aut illic particulari loco defixus, impuritates sanguinis per lochia secernei debitas sibi accersat, & prius ab utero deriveret, propter istam rationem cruoris inquinamentum adauget. Lochia in variolis cohibita universaliori excretionis modo cum particulis morbi venenatis foras excludi poterunt; quod quidem in cæteris ob minutulam, & parciorem sanguinis viam non succedit.

Ex his Angina, Pleuritis, & Peripneumonia, propter magnam & causæ similitudinem, & curationis analogiam, unà considerari poterunt. Cum puerpera qualibet harum afficitur, putandum est quod præter miasmata ingravitationis tempore congesta accedit sanguinis diathesis quædam acidiuscula, cujus ratione, dum ipse febriliter effervesceat, ejus particulæ quædam acore perfusæ in hoc, aut illo loco congelationem, instar lactis aciescentis, & proinde coagulati, subeunt; cruor ibidem gelatus, & in circuitu

cuitu præpeditus reliqui transitum inhibet: sanguis autem motu obstructus in obicem suum arietat, adeoque circumcirca congestus, & extra vasa propulsus in tumorem accrescit: inde statim quidquid in ejus massa heterogeneum, & secernibile continetur, in partem affectam velut cloacani deponitur; quare sanguinis corruptela per uterum expurgari debet: illuc versus morbi hujus focum derivantur, quæ cum hac via satis expurgari nequeant, & cruoris liquor insignius corrumpitur, & affectus istius particularis, scilicet angina, pleuritidis, aut alterius judicium redditur difficilius.

Pro curatione complicatarum hujusmodi ægritudinum à primis statim incensendum erit, ut sanguis alicubi detensus, & extravasati coeptus circulationi restituantur, nec apostema faciat, quoniam raro admodum puerperæ febribus istis symptomaticis correptæ, materiz abscessu, aut sputo sanantur: quapropter remedia interna, quæ sanguinem tundunt, & à coagulatione liberant, erunt usurpanda, cujusmodi sunt imprimis Diaphoretica Sale volatili referta, ut sp. c. cervi, fuliginis, urinae, necnon Sales ipsi. item pulveres testacei, & Bezoartici, lapis prunellæ, decocta, & julepia à vegetabilibus menses, aut urinam moventibus: quibus omnibus admisceri debent quæ experientia duce, uterinis affectibus appropriata reperiuntur. Insuper parti affecta remedia discutientia, quæ materiem impactam abigant, & discescant (cujusmodi sunt linimenta, lotus, & cataplasmata) sedulo erunt applicanda. Interim sanguinis impetuosior motus, & effervescencia immodica procul inde amandentur, & purgamenta ejus, quibus fieri possit modis usque inferius transferantur. In hunc finem frictions, ligaturæ, epispastica, & (si opus fuerit) cucurbitulæ circa pedes, & crura adhiberi poterunt. Si affectu plurimum ingravescente sanguinis missio indicatur, nisi ingens plethora in toto corpore, & inflaturatio valde acuta in parte affecta adfuerint, venam in pede secari, aut vasa hæmorrhoidalia hirudinum sucu aperiri præstabit; sin vero necessitas urgeat, ipsam in brachio fieri. Post isthac habitam phlebotomiam, altera (si admitti poterit) in crure subsequatur: verumtamen moneudum erit, venæsectionem caute admodum in his casibus institui debere; nisi enim juvamen præstat (quod raro contigisse novi) statim pulsu debiliore facto, res agrotantium in pejus ruit.

Dysenteria à simili fere causa cum prædictis affectibus ortum ducit: verum in hac, quia sanguis extravasatus illico profunditur, nec in corpore retentus illic molestiam facit, & plus adhuc corrumpitur; cumque hæc ~~causa~~ via prope uterum effluxum fiat, eumque postea non alio derivat, hinc minus ab hoc morbo, quam ab aliis prædictis periculi timetur: sæpe numero tamen hic affectus puerperis lethalis est: eo quidem potius, quoniam à dysenteria sanguinem attemperantia, & modicè adstringentia indicantur; hæc verò lochiorum fluxum inhibere nimis apta reperiuntur: quare in hoc casu, donec puerperæ diutino fluore fere satis expurgantur, alterius morbi curatio omittatur, & tantum demulcentibus symptomatum lærocia compescatur.

Variolarum indicationes non modo ab istis supra descriptis dissident, at vero sibimetipsis contrariis stipantur; etenim lochiorum fluxus modice cohiberi (quemadmodum dictum est) possulant; interea tamen ut sanguinis efflorescentia, & blanda diaphoretis continuari debeant: cum enim in hoc morbo fermentum venenatum duplex exititerit, & particulæ sanguinis corruptæ in duplicem extrinsecus ferantur viam, cavendum est, ne minor, & angustior porta materiam aut totam, aut plus quam extramittere poterit, ad lumen suum attrahat: itaque ne lochia copiosius fluentia venenatum exterius efflorescere aptum intus revocent, erit ratio vicus nonnihil immutanda; atque imprimis agrotantium jusculis, quæ vi alexiteria, simulque adstringenti possent (uti sunt radix tormentillæ, & bistortæ) incoquantur: etiam pulveres, julepia, & opiata tali virtute præditas debitis intervallis exhiberi convenit; quinetiam in hoc casu nullo modo feminis indulgeatur, ut carnibus, earumque jusculo vescantur, aut lecto exsurgant: verum quiete (quo neri possit modo) tum animi, tum corporis procurata, & dicta ex his quæ sanguinem minime exagitant imperata, res fere in totum Deo & Naturæ committatur.

Quæ superius de acutis puerperarum morbis dicta sunt, facile esset historis & observationibus illustrare: verum exempla, quæ hac in re adduci potuerint, maxima ex parte luctuosa, & mali ominis erunt; quippe febres istæ in mortem ut plurimum cedunt. Hujusmodi verò ægritudines describere nec Medici confirmabit operam, nec Medicina methodum in us usurpatam omnino probatam reddet; utcumque siquidem harum notitia ad meliorem morbi istius diagnosis facit, liber hic puerperarum singulares quoddam casus, & symptomatum varietates proponere; in quibus licet curationum formulae, & rationes parcius occurrant, saltem præcautionis regulæ quædam non contemnendi usus habebuntur.

Clarissima mulier in ætate viginti sex circiter annorum, sexti fortis partum difficulter admodum, nec sine vitæ discrimine enixa est: postea tamen statim se mediocriter habuit. Die secundo carnem totius pulli comedit; tertio lecto excitata per quatuor horas in cathedra sedit: nocte insequenti se male habuit, quo tempore lac in mammas profudit; quod tamen emplastris è diachylo applicitis cito disparuit. Mane proximo de lassitudine, & dolore velut ulceroso totius corporis, necnon de vomitu, nausea, ac plenitudine circa ventriculum, & hypochondria querebatur: nox valde perturbata sequuta est. Die quinto apertius febricitavit; modo rigorem, modo æstum undique gliscentem persensit: erat nauseabunda, stomacho aggravata, insuper irrequieta, & insomnis: lochia minime fluebant, humor verò albicans (vulgò lactis fluor dictus) emanabat. Vespero circa frontem & tempora velut somnolenta gravamen habuit, & parum dormire cepit: post sesquihoram cum phantasmate perturbato evigilans, quæstia est de capite velut in molem ingentem aucto, etiam de maxillis obferatis, ut dentes recludere nequiret, & pugnis ante contractis porta superam in toto corpore

re quasi pungitivum sentire visa est. Ventriculus & hypochondria usque tensa, & inflata persistabant. Huic trictiones, ligaturæ, cucurbitulæ, aliaque remedia tum interius, tum exterius adhibebantur, quæ lochia revocarent, & sanguinis recrementa a capite derivarent. Venæsectionem pulsus debiliior & inordinatus non admittebat: pulveres, & julepia quæ diaphoresin blande moverent, sanguinemque & succum nervosum fuiderent, & a restagnationibus impedirent, diligenter fuerant adhibita: quin etiam foris imo ventri modo ex panis laneis decocto emollienti intinctis, modo ex tepidis animalium visceribus applicabantur: interim fortida (uti in hysteriis aîsolet) naribus admota erant, quæ spirituum & sanguinis impetuosum in caput raptum arcerent: his verò, aliisque per plures horas sedulo peractis, quiddam levaminis sentire visa est; usque tamen oculos claudere, aut somno se accingere verebatur; etenim palpebris obductis cum sonitu & tinnitu in toto capite, mille phantasmata animo incurfabant: noctem fere insomnem ducebat. Quamprimum dormire cœperat, statim perterrita, & in præcordiis aggravata expergefcebat: die sexto circa meridiem rigorem magnum, seu potius horrorem cum totius corporis concussionem valida perpessa est; cui velut in febris intermittentis paroxysmo, mox calor, & dein sudor copiosus succellere: inde vero nihil levaminis laboranti advenit; quippe statim a sudore, febrilis calor redintegratus est, & affectus convulsivi ipsam plus infestabant: nocte insequenti cum & reliqua symptomata ingravescerent, primo in lingua, dein mox in gutture paralysis excitata est, ut minime loqui, & vix omnino deglutire potuerit. die septimo circa eandem horam, iterum rigor cum calore, & sudore; inde pulsus longe debiliior, & inæqualis; item respiratio difficilis cum anhelitu crebro, & pectore elato invaserunt; adstantes non agnovit. Die octavo emoriæbatur.

In illustri hujus scemina perniciem, propter ingravitationem in febrem prædispositæ, multiplex armabatur occasio, morbi que malignitatem impendio auxerat: nam & uteri a partu difficili laxisio, lactis subitanea a mammis exclusio, carnis comestio, & cita nimis è lecto exsuscitatio in majorem noxam velut conjuratione facta convenere; sanguis febrili incendio tactus statim inordinationes concepit: lochia, aliaque forsan uteri inquinamenta in se rapuit, indeque labem majorem, & diathesin plane venenatam acquisivit; viscerum membranae sive succo nervoso degeneri persusæ, sive spasmis us ab utero continuatis, motibus convulsivis percellabantur: etenim ejusmodi circa abdomen inflationes, & distensiones revera convulsionum effectus sunt: nam licet fibræ directæ, membrum contrahentes, sæpe illud comprimunt; tamen cum fibræ simul rectæ, & transversæ, alioque vario situ positæ in membrana cavitatem ambiente unsi convelluntur, pars tantquam vesica inflata intumescit, in cujus vacuitatem, aer rarefactus secundario se proripit: tantum abest (quod vulgo fertur) aerem, sive statum ibi primo congestum, distensionis causam esse. In egrotante nostra sanguis effe-

vescens, atque cito materia adusta atque maligna satur, ipsam subigi, & per sudorem secerni inhabilem, protinus in cerebro defigere conabatur; prima ejusdem materię in capite suffusio propter spiritus animales semiobrutos sensum intulit magnitudinis ipsius capitis plurimum auctæ; quod simili ritu accidit, ac cum pes stupore correptus se ipso longe major perferenti videretur. Quod vero post levamen quoddam, in dormitatione, & oculorum clausura affectus recrudesceret, ratio est; quia vigiliæ, & sensuum excitatio materiem cerebrum & nervos obsidentem aliquatenus excutunt, & a se amovent; quæ tamen prope, & in procinctu sita, itrepente somno, ab ipsis quasi imbibitur, eorumque corpora unâ cum succo alibili penitus subit. Cruor autem, licet recrementa cerebro copiose suffuderat, haud tamen ipse immunis evasit; quin impura saburra usque impletus, efflorescentiam velut criticam concepit, & cum rigore, subsequen-
tibus calore & sudore (prout in magna *cæpiet* aîsolet) semel atque iterum, sarcinam suam excutere tentavit; quo tamen nisu nihil ultra proficiebatur, quam quod materies cerebro adhærescens, altius ipsi impingeretur, nervorumque surculis quibusdam infixæ, loquelam, & deglutitionem, dein postea sensationem adimeret; atque sanguinis massa sensim magis magisque depravata, tandem vitæ sustentandæ inhabilis evaserit.

I scemina perillustri paulo infra vicenarium ætatis annum nupta, uterum gestans, cum, durante ingravitatione victu parvo, & exercitio fere nullo uteretur, in partu labores, & tormenta cum intermissione tamen, & crebro levamine per duodecim horas passa, filium enixa est: fortis cum secundina abscessit, omniaque recte circa uterum constitere: diebus primo & secundo mediocriter habuit, tertio autem post levem rigorem de siti, & incalescentia queri cœpit; quibus diarrhœa successit, ut illo die quatuor sedes habuerit: nox fere insomnis sequuta est, intemperies febrilis deinceps per biduum eodem modo persistit. Quotidie alvum, ter, aut quater deiecit, lochiis adhuc modice fluentibus. Die sexto cum, mulierum suavis, ad moderandum alvi fluxum quiddam adstringens cepisset, purgamenta uteri fere in totum sistebantur: quo tempore febris intensior evasit, & symptomata velut hysterica emergebant: etenim in præcordiis oppressiones habuit magnas, & crebras, atque in gutture præfocationis sensum perpessa est. Die septimo erat calor intensus, & respiratio difficilis, ac laboriosior; tum vero ex præscripto Medici, tum primo accersiti, sanguis è pede ad unc. j. erat detractus, è quo per quatuor horas se melius habuit: etenim somnus placidus cum sudore copioso successit; lochia in exigua licet quantitate denuo apparebant: vesperti iterum omnia exacerbabantur, vires plurimum exsolutes, pulsus debiliior, & inæqualis evasit: quæstæ est etiam de sonitu, & tinnitu aurium, cum plenitudine capitis. Porro tendinum in cæpis subsultus, necnon totius corporis subitas concussionem habuit; usque tamen diarrhœa ipsam exercuit: huic cardiaca, aliaque remedia, & administrationum genera ex plurimum Medi-

Medicorum præscriptis sedulo adhibita ne hilum profuere, pulsu debiliore facto, & viribus sensum diminutis die nono à partu obiit.

Hæc febris à vitioso corporis apparatu, velut causa procacitæ plurimum dependebat: etenim sæpius observavi quod male ut puerperis, quæ cum gravidæ fuerint, fructus, & cibaria quævis insalubria ingerunt, atque sine motu, ac exercitio degentes, tantum otio, & quieti indulgent: sanguis ob præviam ~~excessum~~, sine evidenti occasione, velut sponte incendium concepit: effervescens autem recrementa sua, & impuritates usque interius deponens, diarrhœam intulit: nec tamen ab ista fere continua excretionem ejus massa depuratio facta est, quin mixtione sive crasi ejus usque magis depravata, tandem à propria indole omnino descivit cruor, & ad fermentescendum in corde, quo calor, & spiritus undique dispescantur, inhabilis evasit. Diarrhœa naturæ motu excitata perperam erat cohibita, præsertim adstringentium usu; hæc enim non impune tentari sæpius observavi. Quippe alvi fluor nonnullas male habentes sanavit, atque in ista Domina plurimisque aliis (uti experientia nostra abunde constitit) etiam si febrem non sustulerit, tamen à gravioribus cerebri, & nervosi generis affectibus eas liberavit: unde hæc ægotans delirio omnino caruit, nec motibus convulsivis, donec fere ad extremum redacta, percelleretur.

Mater-familias non ignobilis, triginta sex, aut quod excurret, annos nata, decimum septimum fœtum gestans fuit mœsta admodum atque anxiosa, ne ab instanti puerperio interiret: sed (Deo favente) sat feliciter filium enixa est, & per tres inde dies alacriter habuit: die quarto cum ex carne pulli plus debito comedisset, paulo ante noctem in febrilem intemperiem cum vomitu, & lochiis cohibitis incidit: tota nocte insomnis, & irrequieta jacuit, mane proximo spatium unius horæ quatuor habuit sedes, & alleviari visa est: circa meridiem (quo tempore adveneram) rursus de calore, & siti, nec non palpitatione cordis, & molis cujusdam in guttur ascensu conquesta est: pulsus erat celer, & parvus, urina erat rubicunda, lochia vix apparebant: huic Julapia, cardiaca, & purgationem uterinam moventia exhiberi, insuper foris imo ventri adhiberi, etiam crura, & pedes pannis excelsis sæpius confricari præcepi: hora somni laudam gr. i. cum croci pul. sculp. sem. in cochleari aquæ Theriacalis propinabam; placide dormivit, & lochia ubertim descenderunt: indeque, victu tenui, & fluxum uterinum modice proritante per paucos dies usa, plane convaleuit.

Huic sine magno apparatu, aut prædispositione multum vitiosa immoderatus carniū esus, velut causa evidens, & sola fere sufficiens, febrem induxit: lochia in massam sanguineam restagnantia ejus intemperiem auxerunt, atque nervoso generi statim molestias intulere: interea tamen cruor, licet effervescens corruptionem, haud magnam subibat: quin cum recrementa à crapula congesta diarrhœa excernerentur, atque sanguis fluxu lochiorum restituto rursus solito more expurgari cœperat, febris ista, fermento adhuc plurimum maligno carens, cito disparuit.

Fœmina prænobilis, juvenis, & venusta, filiola secundæ partum satisfacilem obtinuit; & per sex dies circa lochia aliaque accidentia recte habens, cujusvis intemperici suspitione omnino caruit: carnibus quotidie vescabatur, & lecto excitata in cubili alacris versabatur. Die septimo sine causa manifesta rigor supervenit, cum febre, & lochiis diminutis, verum non suppressis: ad diem verò à partu decimum modicè tantum febricitans, cum purgamentis uterinis adhuc fluentibus, symptomate quovis graviore immunis degebat: tunc verò licet valde febricitans, solito hilarior, & de salute sua confidentior visa est. Noctē parum, aut vix omnino dormivit; mane sequenti (quo tempore eam primò invisi) apertè deliravit, lochia sistebantur, horrore etiam totum corpus concutiebatur, tendines in carnis convellebantur, adeo ut vix liceret pulsum dignoscere, qui interea debilis, inæqualis, & valde creber fuit. Hanc, nisi divina manus imperatò, & quasi è machina intervenerit, brevi emorituram pronunciaui: uterque Bezoar Orientalis g. 6. in cochleari julepii cardiaci exhibita sudorem copiosum cum pulsu meliori inducentia, dein alia cardiaca debitis intervallis propinata spem salutis aliqualem, dubiam licet, sibi què minimè constantem fecere. Post quatuor horas à quo intraveram, languida sponte naturæ sedem ingentem habuit; inde statim omnino conciderunt vires, atque intra sesquihoram mortua est.

Huic Domina, cum circa partum, aut uterum nihil mali contigisset, sine magna atque insuper maligna sanguinis & humorum ~~corruptione~~ febris ita perniciofa, & subito lethalis obvenire non potuit: utrum plenior victus, an frigus susceptum, aut alia quæpiam causa evidens, huic originem præbuerit, incertum est: quippe mulieres & nutriculæ ministrantes nullam manifestam ægritudinis occasionem agnovere: febre accensa, sanguinis labes purgatione uterina etiam diu continuata, haud in totum eliminari poterat; licet propterea symptomata tetriora, haud statim ingruerent: usque tamen malum intus latitabat, atque morbo valde acuto, ejusque motu celeri existente, die quarto, cum natura crisin moliri debuisset, materia febrilis commota, necdum vero subacta, cerebrum, & partes nervosas semel & quasi momento obruit, ipsamque sanguinis crasin subito perfundedit, unde mors inexpectata, atque præceps subsequuta est.

Mulier eximia vicesimum vitæ annum vix prætergressa, vultus floridi, & gracilis corporis, post partum cum lochia immoderate fluere, remediis quibusdam attrahentibus ex ministrantium consilio usa est, unde omnino sistebantur: fluxus vero alvi successit; qui cum per tres dies incrudesceret, mulieres alia propinant remedia ad sistendam diarrhœam: nec quidem successu frustratæ sunt: interim febrem periculosam, & affectus quasi hystericos, in prioris mali locum advocare: etenim siti, & calore cum vigiliis, dein crebra vice syncope, & sudoribus frigidis infelix puerpera afficiebatur; hoc tempore accersitus, remedia cardiaca, & purgationes uterinas moventia hauriri, atque insuper clysterem immitti præcepi: alvi fluxu

fluxu denuo provocato, etiam lochia descenderunt, atque ægrotans nostra prædictis symptomatis, & graviori morbo, scilicet nutricularum remediis libera, cito a febre convaleuit.

Huiusmodi fluxus uterinus copiosior contingens, morbi graviore procataxin amoverat: quare cum tot errata circa regimen ejus committerentur, (scilicet primo in sistendis lochiis, dein, quo illorum defectus compensari debuit, in conibendo alvi fluxu) febris tantum levior sine miasmate venenato sanguini impresso accendebatur: simile huic frequenter accidisse novi, nimirum si quando primis diebus purgationes uterinz admodum copiosæ dimanant, postea cum parviori earum profluvio, ac interdum defectu puerperæ evadunt. Atque hoc in loco obiter notetur, periculosum omnino esse quemvis naturæ motum licet anomalis incitatum, aut inhibere, aut saltem deflectere, atque in transversum agere.

Illustissima mulier viginti & circiter annos nata, habitu corporis pleno & toroso prædicta, intra anni spatium bis abortum passa est: cum postea utero conceperat, ex præscripto Medici sui, semel in mense ferro lactis copiosè epoto vomitum provocavit, quo multum pituitæ crassæ, & tenacis rejicere solebat: etiam gravidationis tempore quinquies sanguinem misit. Gestationis spatio transacto, cum difficili admodum partu puerum enixa est: secundina integrè abscissit, & egregiè purgabatur. Die secundo, dum in lecto super pedes erigebatur, ut linthea, atque stragula melius componerentur, frigus suscepit, indeque lochia sanguinea omnino sistebantur, & tantum aquæ ferosæ parum dimanavit. Die tertio queri cæpit de dolore acuto in latere dextro: quæ aderant mulieres, admovent sacculos ex camomilla cum lateribus excalescentis; verum tamen affectus plurimum exacerbabatur, cum sputo cruento. Die puerperii quarto dolor acutissimus cum respiratione difficillima & valde laboriosa invasit. Ex præscripto Medici tunc primum ex vicinia adventantis sanguis à basilica ad unc. 6. detrahebatur, & levamen subito persensit, & per horas decem melius habuit: media nocte dolor pungitivus cum solita atrocitate rediit. Tandem Medicis aliis in consilium vocatis, venæ sectionem in brachio lateris affecti denuo necessariam esse communi omnium suffragio pronuntiatur. Sanguine ad unc. 4. misso dolor remisit, & ægrotans melius respiravit: dein à remediis diaphoreticis in sudorem copiosum cum somno quieto incidit; pulsus verò crebrior, & debilior factus est; etiam in carpis tendinum contr. curæ emicere: postea statim incongrua loquebatur, atque intra viginti quatuor horas è quo sanguis ultimò mittebatur è vivis excedebat.

Quod hæc Domina à lochiis suppressis una cum f. bre in pleuritidem inciderit, in causâ aliquatenus fuisse videtur sanguinis misso gestationis tempore ita crebrò adhibita: etenim hac ratione sanguis in brachio eventulari assuetus, postea effervescens, utero relicto versùs solitum extramissionis locum rapitur; ubi cum exitum non invenerit, in latere vicino, velut proximo extravasationis foco defigitur: quin-

imo, præter ulitum pleuritidis in eodem huic morbo malignitas haud minima accesserat; nam sanguis ab extravasatione vindicatus ita- tum in crasisua corrumpi incepit, atque tertio febris die in tantum depravabatur, ut in corde ulterius fermentescere, adeoque vitam prorogare nequiret.

Non ita pridem uxor cuiusdam fabri ferrarii parturit, quo tempore in eadem domo nati ejus variolis afficerentur; atque ipsa, uti videtur, ejusdem morbi contagium suscepit: namque secundo à partu die cum incallescenza febrili, & dolore in lumbis pustulæ erumpere coeperunt, quæ quidem per triduum, lochiis moderate fluentibus, in moleculas rite assurgebant. Tamen purgatio uterina eo tempore copiosa obtigisset, variolas in toto corpore constitissimas habuit; nec tantum in cutis superficie, verum etiam oris, & gutturis cavitatem impleverunt, adeo ut vix loqui, aut deglutire potuerit: diei puerperii sexto lochia immoderate fluebant, unde statim cum variolis flaccidis syncope, convulsionibus crebris, aliisque mali moris symptomata ægram incessere, quæ mortem brevi minabantur. Accersitis præscripti pulveris hujus semidrachmam e cochleari Julepii sequentis trium horarum intervallis constantiter assumendam, scilicet

℞. Radic. tormentillæ pul. drach. 2. boli armeni opt. drachm. 1. specierum de hyacintho drach. sem. f. pulvis.

℞. Aqu. scordii composit. Dracontii, ulmariz an. unc. 3. Aceti Theriacalis unc. 1. Syrupi e corallio unc. 2. Cornu Cervi usli drach. sem. f. Julepium. Insuper jusculis, & potulentis quibulvis radices tormentillæ incoqui præceperamus: his remediis purgatio uterina mox in totum sistebatur, & variolæ sine graviore symptomate sensim maturatè excidebant.

Casus hic fuit reverà difficilis, & magno cum discrimine solvebatur: scilicet aut lochia, aut variolas intus cohiberi periculosum erat; & tamen alterutrius plenior eruptio alterius motum impediebat: quamdiu utraque moderate procedebant, res naturæ ductui permixta moderate se habuit: cum verò altera invalescente, artis opera requirebatur, lochiis frenata, variolis autem stimulos adhiberi ex usu fuerat.

De Febris Epidemicis.

Hic ultimam dissertationi nostræ de febribus munus imponere animo statueram; commentarium potius, quam integrum tractatum meditatus. Quatenus verò febres quædam epidemicæ non raro grassantur, quæ nullas observant leges, neque ad certam doctrinæ normam revocari possunt, verum anomala prorsus quotannis variant, & propterea quoties earum aliqua increbrescat, statim morbus novus appellatur: ideo operæ pretium duxi, quoniam de his febribus generalia præcepta non sunt tradenda, historias particulares de quibusdam hujus farinae subiungere; etenim ex vario symptomatum apparatu quo insigniri solent, natura & tota formalis ratio hujusmodi affectionum non nihil elucescet. Cum itaque nuperis annis intra brevem temporis tractum tres morbi populares in his regionibus grassati sint; singulas eorum descriptiones temporibus quibus febres ipsæ

ingravescebant, olim factas huic operi coronidis loco subijciam.

Febris Epidemica circa autumnum Anni 1657. interbrevescens descriptio medio Septembris habita.

Dum febris hoc tempore inhumaniter grassantis descriptionem meditamur, æquum est ut Hippocratis exemplo ducti, prægressam anni constitutionem, ejusque intemperies, & qualitatum excessus prius expendamus. Etenim morbi epidemici, & communiter inter populum excitati erit causa communis, qualis Anni habitudo, & exinde contracta sanguinis nostri diathesis (quæ pariter complures afficiantur) assignanda. Ut autem ab initio rem deducamus, Ver novissimum, atque exinde succedens tempus usque ad finem Æstatis, scilicet totum hoc semestris spatium impensè calidum, siccumque fuerat: præcipuè vero post solstitium Æstivum fervores adeo intensi per plures hebdomadas insequuti sunt, ut dies & noctes nullus non quereretur de aëris calore, & ferè continuo sudore, quo maderet, quodque liberè respirare non liceret: circa Calendas sextiles hæc febris primum sporadica in quibusdam locis erumpere cœpit, ut forsitan unus, aut alter in Urbe, aut Vico eadem corripere: in plurimis tertianæ intermittentis typum imitata est, scilicet diebus alternis paroxysmi redierunt: qui tamen sine frigoris, aut rigoris præmio cum calore intensissimo ægros infestant. Vomitus, & dejectiones bilioz in plerisque copiose venerunt, sudore nonnisi difficili, & sæpe interrupto succedente, quo febrilis accessio rarè in æstivum solvebatur: quin toto interstitii tempore cum siti & inquietudine languidi, & imbecilles Ægri transeunt: in quibusdam cum res in melius vergeret, post tres, aut quatuor paroxysmos frigus & rigor accessionem inchoabant, & febris exacte tertiana intermittens facta est: in plerisque autem morbus usque in deterius cessit, & statim mali moris, & difficilis solutionis cum pravo symptomatum apparatu evasit; cum enim ægri in paroxysmis summe incalcescerent, & difficulter sudarent, errores committi solebant, qui morbi vires quotidie intendere: quippe ob ægrorum impatientiam, & ministrantium imperitiam, sudore qui accessionem febrilem finire debuerat, interrupto, post unum paroxysmum vix finitum statim alter successit, indeque morbus periodos vagas & incertas, sine intercessu habere, & postea in febrem velut continuam transire solebat; cujus status aliquando valde periculosus cum mala cerebri, & nervosi generis affectione fuerat, ut non rarè lethargus, aut delirium, sæpe autem spasmi, & motus convulsivi excitarentur. Circa mensem Augusti hæc febris longè, lateque in populum grassari cœpit, ut in nulla non regione, & vico plures ex eadem decumberent; erat tamen ruri, & in villis minoribus longè frequentior, quàm in urbium, aut oppidorum confiniis. Usque febris intermittentis typum referebat, nisi quod paroxysmorum atrocitas, & intermissionis brevitate solito infestior visa sit; ideoque morbus novus passim vocabatur: insuper malignitatis cujusdam subibat notam, & certa satis contagii atque perniciæ suæ documenta dederat. In quantum de domo

in domum serpebat, plures ejusdem familiz, & præsertim cum ægris familiaribus versantes eadem labe infecit: quinetiam senes, ac maturæ ætatis homines passim e medio sustulit.

Affectus naturam ac essentiam si spectes, erit hæc febris proprie in intermittentiū ceniū referenda: etenim paroxysmi statim temporibus redeunt: necnon ut plurimum cum frigore, & rigore, sapissime cum vomitu incipiunt, & mox calore intensissimo procedentes demum sudore finiuntur. Urina in plerisque apparet coloris flammei, in paroxysmo tenuis, cum aliquali hypostasi: extra hunc crassior, cum sedimento lubrifico. Sudore licet copiosissimo, & sæpius iterato, morbus non judicabatur, quod in febre continua expectare liceret: qui per plures dies, aliquando & menses affectus diutissime perstat, licet plurima evacuatio per vomitum, & sudorem quotidie fere contingat: quod in febre intermittente frequenter, in continua rarè accidere observamus. Extra paroxysmum, quovis morbi tempore purgatio commode instituebatur, quod in lynocho ante signa coctionis esset netas moliri. Præterea esse hanc febrem de intermittentiū genere, vel hinc constare videtur, quia plurimū ex eadem convalescunt, ut ægrotantium vix millesimus intereat, quod de lynocho Epidemica vix auditum censeo. Circa prima hujus morbi initia tertianæ intermittenti perquam similis apparet, licet postea in aliquibus ob vitiosum corporis apparatus, & errores in victu & diaphoresi commissos, in continuum migrasse videatur: quibus enim paroxysmi non rite concluduntur, nec in ægypticam desinunt, propter materiam morbiicam non penitus distillatam, iis sanguis jugiter effervescebat: unde factum est, ut accessiones celerius redeant, & diutius infestent: donec tandem ob materiæ copiam, & naturæ languorem cruor debilior factus, non amplius turgescere, & statis horis materiam febrilem secernere potis sit, quin ipsam paulatim, & continua effervescencia subigere nitatur.

Circa causas hujus morbi inquirendum erit, quæ sit causa ~~concreta~~, evidens & conjuncta, scilicet cujus ratione adeo nunc passim grassetur, ut per totam Angliam Epidemicus evaserit; quibus modis, & ob quas ~~concreta~~ in quibuslibet hominibus soleat prius excitari: ultimo demum, qualis alteratio sanguinis & humoribus inducta hujusmodi febrem cum tali symptomatum apparatu pariat, & in actu conservet.

Scio in promptu esse hujus morbi adeo popularis causam in maligna aëris constitutione omnino collocare; quod nimirum auræ quæ vescebantur, particulæ miasmatis quodam extraneo, & naturæ nostræ minus congruo infectæ fuerant; cujus miasmatis corpuscula intus admixta cum sanguine & humoribus fermentescebant, adeoque in plurimis cum eadem fere symptomatum apparentia hanc febrem inducere. Quis enim morbi adeo communiter grassantis originem à minus publico fonte deducere audebit: aut aliunde morborum causas acceptas referre, quàm fomiti isti vitalis auræ quem universi jugiter depascuntur? At mihi rem attentius consideranti, paulo altius ejusdem stemma, & prima quasi rudimenta repetenda videntur. Quod nimirum hæc febris nata sit, non contageo

gio quodam ab aëre communicato, & immediate hominibus labem inhingente; sed potius à diathesi, seu prædispositione quadam terribili, propter anni intemperiem antehac corporibus nostris impressa, quæ demum maturitatem adæpta, levi occasione in actum deducitur, & in hanc febrem non erumpit, deo, quam excrevit.

Cum enim circa *Julii* Calendas ætate intensissimo per plures dies aer immodicè incalesceret, facilè sanguinem nostrum versus calidam & biliosam intemperiem alteravit, quia nimirum (uti in vino plus debito effervescente) pars dulcis, & spirituosâ multum abluuntur, interim salina & sulphurea nimis exhalant, ut exinde rancorem, aut acorem liquor facilè contrahat: hujusmodi sanguinis diathesin, quæ quidem à temperie dulci, & spirituosâ, propter nimiam assationem in biliosam vergit, ad febres intermittentes aptissimam esse alibi ostendimus; hinc succus alibilis, qui in cruoris naturam continuo defertur, non rite coquitur, nec in sanguinem assimilatur, sed in materiam velut extraneam & fermentativam pervertitur; quæ in ipso sanguinis sinu ad plenitudinem assurgens, juxta incrementa sua stasis periodis turgescens, quemadmodum supra docuimus, febris intermittens paroxysmos inducit: cum itaque à retorrido hujus ætatis fervore sanguis iterè omnium plus debito incalescens plurimum exassaretur, nihil mirum est, si exinde ad febres intermittentes maximam aptitudinem contraxerit: cur autem non urgente adhuc cæli fervore, sed paulò postea hic morbus increbuerit ratio est, quoniam hæc indispositio non semel & una vice, sed paulatim, & nonnisi longo tempore cruori nostro imprimitur: ideoque morbi, velut fructus, post prægressum ætatis calorem potissimum in autumno maturantur.

Hanc aptitudinem, seu diathesin febrilem haud omnes ex æquo contrahunt: illi quorum sanguis à natura calidior plus sulphure abundat, & proinde citius assationem patitur, etiam qui laboribus dediti, aut sub dio morati, ætatis fervorem magis perpassi sunt, ob cruorem insignius torrefactum facilius in hunc morbum inciderunt: quare inter colonos, & ruri potissimum primo defævit: ex his qui a sanguine perassato aptitudinem ad hanc febrem acquisiverant, forsitan alii in hanc sponte inciderant, diathesi febrili sensim ad maturitatem evecta; alii ob levem occasionem, seu causam evidentem, quæ alias febrilem effervescentiam solet concitare, uti à frigore suscepto, crapula, vini potu, & similibus: atque alii ægrotarunt propter contagium ab aliis susceptum, siquidem ab ægrotis effluvia constanter emanant, quæ cum in corpora ad similem affectum prædisposita impingunt, *diathesin* latentes facilè in actum suscitant.

Quod erat terciò propositum, nempe ut hujus morbi causa conjuncta, ejusque ratio formalis innoscescant, in memoriam revocanda sunt, quæ de febrium intermittentium natura alibi habentur: supponimus nimirum hujus affectus velut basin, constitutionem sanguinis retorridam & biliosam, propter quam succus alibilis, velut in dumento quotidie suppeditatus, non rite coquitur, sed assatione in materiam fermentativam, & cum cruore non miscibilem facessit. Quando hæc materia sanguis ad plenitudinem

saturatur (quod stasis temporum in ætate contingit, quia succus alibilis in stasi velut mensura suppletur) sponte turgescentiam concipit, & effervescencia hujus materię eliminanda gratia citata paroxysmum febrilem intert, qui eo usque perdurat, donec hæc materia febrilis in corde accensa, & velut combusta cum sudore penitus dissipetur.

Ex hisce præmissis p. lam fiet, nonnulla esse quæ in hoc, de quo agimus affectu, à communis intermittentium genere peculiari ritu contingunt, ideoque febris novæ appellatione eam non immerito insigniri; cujusmodi sunt primo quod circa morbi initia paroxysmi sine frigore, aut rigore incipiunt, sed cum vomitu atroci, siti, & calore intensissimo ægros diu affligunt, quibus sudor ægre plerumque, & partialis, ac sæpe interruptus succedit, quo accessio nonnisi longo tempore finitur. Quorum ratio unice poni debet in diathesi sanguinis valde biliosa, & supra modum perassata: hæc enim a sulphure præpollente procedens solitum sanguinis acorem, qui turgescentiam ejus sequitur, & rigorem aut frigus solet concitare, omnino inhiberi; atque ob hujusmodi temperiem sanguinis succum alibilem nimis assantis, & velut comburentis, cruor una cum succo isto turgescens, & in motum concitus, plus solito in corde accenditur, & deflagratione sua calorem cum siti intensissimum, & ægris molestissimum inducit. Vomitus biliosi non tantum ab initio, sed & medio paroxysmo contingunt ob illius exundantiam, quæ valvæ choledocha subinde nimis oppleta ipsam intestinis sustundunt; quæ dein, spasio in visceribus concitato, facile in ventriculum exantlat. Sudor ægre succedit, quoniam bilis plus sero abundat: quare materia febrilis combusta diaphoresi non facile discernitur, quin vel cruori commissa effervescentiam diuturnam intert, aut versus intestina delata vomitum aut diarrhæam producit. *Secundo* differt hæc febris à vulgari intermittente, quia post initum paroxysmum non datur plena intermissio usque ad *anapnoen*: quin ægroti usque manent languidi, & tribundi, quoad appetitum, somnum & cætera accidentia se male habentes: quod revera accidit quoniam ab intenso paroxysmi calore plus sanguinis, & materię febrilis accenditur, quàm ut recrementa à deflagratione ejus reliqua possint cito dissilari: præsertim quia sudor ob materię siccitatem ægre admodum succedit, nec satis materia febrilis excernenda seroso latice diluitur: quare sanguis ab ejus contagio paroxysmi tempore haud perfectè liberatus, adhuc effervesceit, neque accessione finita à morbo plenas inducias sortitur: interea dum cruor effervescencia iterè continua hoc modo urgetur, a synocha differt; quoniam in hac pars sanguinis sulphurea nimis evecta velut inflammatur, & deflagratione sua febrem facit: continua autem ebullitio, quæ hoc modo febrili huic intermittenti supervenit, à materię non miscibilis confusione, ejusque à sanguine ægra secretionem omnino dependet. Synochus instar vini ob opulentiam suam sponte effervescens contingit; altera instar ejusdem, propter heterogeneum aliquod confusum, organum concipit: quare advertimus cum febris nostra jam in continuam migrasse vix est, eam

tamen nec sudore, nec alvi fluxu, copiose licet & crebro obvenientibus, judicari; quia a sanguine depauperato potius quam immutato dependens diutissime persistat, agrosque versus cachexiam disponit.

3^a Erit tertia discriminis ratio, qua hæc febris à communis intermittentium cœnu discepat, in hoc sita, quod facile per contagium in alios subinde propagatur; cujus ratio est, quoniam corpora hic plurima sunt eodem modo ad eundem affectum prædisposita, quod alio tempore minime contingit: quare n.era effluvia à corpore morbofo in subiecto facile capaci similem effectum concitare valent; non secus ac flammæ radii quidam in materia valde combustibili flammam accendunt: interim hujus febris labem haud omnes pariter contrahunt: quin aliqui minus ad ipsam parati impune cum aëris conversantur.

4^a Occurrit aliud symptoma huic febre haud constans, sed aliquibus tantum locis contingens, quod ipsam non tantum à communi discriminat, sed proprium sui ipsius typum variat: nimirum aliquando accedit, affectus dysentericus huic morbo comitari; in quibusdam ad modum cholera, vomitus & dejectiones biliosæ plurimum infestant; ac in aliis sedes cruentæ cum atroci dolore ac alvi torminibus succedunt. Pius in nostra hæc vicinia sæpius adverti, ejusque ratio à temperie sanguinis insigniter biliosa deauri potest: propter hanc enim materies adusta diaphoresi minus distillabilis copiose in jecore seceratur; dein ob vasa choledocha ad exundantiam repleta ventriculo & intestinis demandatur. Alter dysentericæ affectus in quibusdam tantum locis reperitur, ibidemque sporadicus potius quam communis nonnullos solum ægrotantes occupavit. Ejus origo ad peculiare quorundam corporum crases, aut vitiosos apparatus, necnon locorum situs, aut aëris conditionem referri potest. Dein morbum, non sine misamatis cujusdam communicatione subinde ad alios translatus suspicari est.

Circa hunc morbum duplex prognosticon haberi debet. *Primo* ipsius febris in genere, qualem & quando habitura sit finem: quid Terræ nostræ minetur; an non pestem, aut ægritudines *zoonotice* (quod vulgò timetur) præcedat. *Secundo* poni debent signa, quibus salutem aut periculum in variis ægrotum catibus præfigere solemus.

Quoad primum, quoniam hujus affectus originem non ab aëre contagio, aut venenato miasmate infecta, nec à maligno vaporum semine per aërem diffuso petendum ostendimus, sed tantum à temperie, seu diathesi corporum nostrorum insigniter biliosa cum sanguine adusto, & ob æstivos fervores summe præasato; puto hic nullam subesse metus rationem, qua vereamur ne febris hæc vitio aëris in pejus evecta, tandem in malignam aut pestilentem excreseat. Quin potius (quod mutata anni tempestas, & sanguinis nostri alteratio expectanda pollicetur) timere debemus, ne febris hæc, quæ modò tertianæ intermittentis typum imitatur, postea sanguine attrahilicente in quartanam transeat: quod quidem in aliquibus jam jam contigisse adverto; & ne posthac autumno ad finem vergente in pluribus obveniat, præcipue metuendum duco.

Quoad particulare prognosticon, signa, quæ in hujus febris decursu maxime notabilia occurrunt, ejusque statum & eventum quodammodo prænuunt, sunt hujusmodi: si morbus in corpore humo, bene temperato, & facile perspirabili contingat: si vomitio cum euphoria succedat, sitque alvus soluta: si paroxysmus cum levi rigore incipiat, & post calorem moderatum cum sudore finiatur, sitque intervallum cum *tranquillitate* vel tolerantia: si pulsus sit fortis, urina coloris flammei, pellucida, cum hypostasi laudabili, non orbem citra periculum brevi desitutum prædicimus. Sin hæc febris in corpore pingui & habitus vitiosi exciteretur, si cum vomitu molesto calor esseretur & sitis intolerabilis ægrotum diu exerceant, si calori sudor difficilis, partialis, sæpe interruptus, & crebris vomitionibus intercalatus succedat, ac minime in apyrexiam desinat, morbum hic longum & periculosum aëre subjectum pronunciamus. Sin tamen viribus æger constet, & urina signa coctionis exhibet, de salute numime desperamus; præsertim si post quatuor aut quinque periodos morbus, quod fieri solet, de solita atrocitate remiserit. *Tertio* observamus, si morbus hic in corpore senili aut aliis ægritudinibus fracto, aut debilitato exciteretur; si præter vomitiones horrendas, & caloris atrociam, crebra syncope, lipothymia, deliria, aut affectus lethargici accedant; si post plures accessiones, prostratis ægri viribus, morbus nihil remittat, quin effervescencia continua sanguinem exerceat, ac spiritus vitales plurimum disperdit: si appetitus dejectus, vigiliae pertinales, motus convulsivi, cum pulsu debili, urina turbida, aut crassa obveniant, rem periculo plenam judicamus: nec tamen æger velut deploratus relinquatur, quia morbus hic minime præceps haud citò & affatim jugulat: sed diu protrahitur, & naturæ se recolligendi, & Medico remedia exhibendi tempora & occasiones concedit.

Indicationes therapeuticæ, quæ in curatione hujus febris locum habent, sunt præcipue quatuor. *Primo* ut sanguis jam retorridus, & nimis biliosus factus ad debitam temperiem reducatur. *Secundo*, ut succi alibilis depravatio, ejusque in materiam fermentativam alteratio inhibeatur, aut saltem minuatur. *Tertio*, ut circa morbi declinationem sanguis crebrâ delagratione depauperatus, & materis morbosæ seu adultæ confusione impurius factus restitueretur, atque uti par est, volatilis reddatur. *Quarto*, ut symptomatis, quæ in morbi decursu maxime infestant, cum remediis idoneis tempestive succurratur: quò his intentionibus satisfiat, methodo sequenti utendum consulto.

Circa prima morbi initia, si humore bilioso & vasis choledochis exundante, & in ventriculum suffuso æger sit in vomitum proclivis, instante paroxysmo uberius ejusdem evacuatio leni emetico proritetur. Venæsectio, & purgatio non nisi paroxysmorum interstitio debet adhiberi: dum enim sanguis immaniter effervescit, aut in sudorem exsolvitur, natura ab opere incepto non debet avocari, nec molimina ejus à Medicorum præscriptis interturbari: quare post accessionem præteritam, & sudorem integrè finitum, leni cathartico purgatio instituitur,

eademque postea simili occasione aliquoties repetatur: hac enim methode non solum materiz excrementitiz proventus primis viis subducitur, sed præcipue vasis choledochi inanitis, è massa sanguinis bilis copiose emulgetur, indeque versus crasiam naturalem cruor restituitur. Sanguinis missio si indicatur, statim ab initio celebretur; sic enim liquor ejus nimis turgescens eventilatur, quo & succum nutritium minus pervertat, & urgente paroxysmo minori incendio una cum materia morbinica deflagret: secus autem si post longam ægrotationem vena secatur, quando sanguis depauperatus, & aquosior factus plus materiz morbinicæ congerit, ipsamque minus recte coquit & excernit, multum de naturæ viribus detrahitur, de morbi potentia nihil. Accessionum intervallo, cum nec venæ sectioni, nec purgationi locus sit, constanti enematum ulu alvus soluta fervetur: etiam remedia digestiva ex liquoribus & pulveribus acetosis, aut salinis exhibeantur: cujusmodi sunt cremor Tartari, sales herbarum fixi, Tartarus vitriolatus, Corbu Cervi ultum, Spiritus Vitrioli & Salis, &c. Hæc enim viscerum fermenta annula, aut consopita restaurant, sanguinem fundendo depurant, necnon materiam morbinicam secernunt, ac velut præcipitant: etiam hoc tempore intercalari, si quando vigilie pertinaces insistant, & ægri vires atterunt, liceat remedia anodyna, & blandè narcotica exhibere: in accessione verò nequaquam; tunc enim febrilis materiz subactionem, & secretionem valde impediunt, & paroxysmum citius desitutum diu protelant.

Hæc de agendis circa accessionum interstitia: urgente autem paroxysmo, licet ægri potissimum accerant ac inclament Medicos, attamen eorum præscripta hoc tempore breviori limitantur scopo. Si Vomitus (licet emetico prius adhibito) usque infellet, a liquore posseti, aut simplici, aut cum herbis amaris incoctis, liberius provocetur: potissima autem juraminis ratio sit in contemperandis calore & siti, quæ in hac febre solent ægros graviter torquere: dum enim sanguis cum materia morbinica effervescens, ac in corde accensus in pulmones exsilit, immanissimam illic phlogosin concitat, quæ frigidi humoris veluti pro flamma extinguenda perfusionem exigit: quare potum sine modo & mensura ingerere appetunt, quo destituti præ nimio fervore ægri exsolvantur, eorumque sanguis ferè totus, velut in flammam & fumum rarefactus circulationis filum haud facile continuat; quare potus febricitantibus omnino concedi debet: qui tamen, si largà nimis quantitate ingeratur, sanguinem æstuantem primo magis exagitat, & materiz febrilis secerni inceptæ denuò confusionem parit; ut proinde subactionis & secretionis opus diutius pertrahatur, & paroxysmus fiat longior, præterea item magna potus ingestio ventriculo molestias facit, ipsumque perturbando, & sæpe vomitum ciendo diaphoresin impedit, & sudorem erumpentem, aut forsan eruptum intus revocat: quare accenso primùm febris calore, ægri licet sitibundi, solum pitifando bibant, & quantum licet se contineant: postea cum materia combusta, & subacta sudo-

re incipit diffari, genio hac ex parte liberius indulgeant; sic enim diaphoresis valde promovetur, & paroxysmus citius mititur: quoad naturam potus, modo liquor posseti, modo cerevisia tenuis, aut aqua hordei propinetur: quandoque aqua fontana, aut simplex, aut succo limonium acidulata: in hoc casu merito laudatur usus Salis prunellæ in quovis liquore exhiberi; hic enim nitrositate sua sanguinem æstuantem mire compefcit, & sudores potenter movet: sæpius observavi, medio paroxysmo ægros in lipothymiam, aut syncopem incidisse, ubi quæ statim infundi solent, cardiaca & liquores ardentes, febris violentiam plurimum adaugent, & solito majores molestias pariunt, ut paroxysmus difficilior mitigetur: verum hæc deliqua ut plurimum contrariant, vel ab humore bilioso in ventriculum suffusio, vel propter sudorem derepente abruptum: & contra hæc remedium præsentissimum semper expertus sum, ut vel pluma gutturi inserta vomitus provocetur, vel liquore tenui ubertim epoto sudor denuò suscitetur. Etiam in toto hujus febris decursu nulla omnino cardiaca aut alexiteria exhibere soleo.

Vicius in hac febre solummodo tenuis, & minime opimus mitari debet; edulia quævis ex carnibus animalium parata omnino vitentur: hæc enim sulphure cum abundant, sanguini effervescenti, seu accenso pabulum (velut oleum flammæ suffusum) uberius præstant: nihil præterea spirituosum, ut sunt aquæ ardentes, cerevisia fortis, ut vitum, concedatur; quia decocta aut juscula avenacea aut hordeacea herbis refrigerantibus alterata in maximo sint usu: item liquor posseti, & cerevisia tenuis aut serum lactis pro ægrotum libitu propinentur: etenim hac ratione, cum succus alibilis admodum tenuis & aquosus sanguinis massæ convehitur, soluta sulphuris particulæ citius, & cum minori tumultu deflagrant: etiam materiz adultæ recrementa & cruoris non facilius eliminantur: sin è contra diutior & uberior nutritus adhihetur, effervescencia cruoris inde plurimum augetur, & materiz adultæ confusione sanguis magis inficitur.

Postquam a crebris paroxysmis sanguine plurimum deflagrato, febris in declinatione posita de fervore ac atrocitate remittit, cavendum est ne ægroti tandem adhuc convalescentes in cachexiam aut affectum scorbuticum impingant: etenim læsæ viscerum crassi, & cruore valde depauperato, quamvis succus alibilis, licet non uti prius, existeret; haud tamen ritè coquitur & in sanguinem perfectum maturatur: quoniam ob defectum excrementa serosa sale fixo imbuta valde congeriuntur, & modò in visceribus, modo in extremis partibus defixa varios effectus pariunt. Quare in diuturno ægrotum languore, aut aliàs, citioris convalescentiæ gratia exhibeantur remedia quæ sanguinem volatiliscent, viscerum infarctiones aut inhibeant, aut factas referent, eorumque fermenta velut extincta restituant: huic usui imprimis conducunt remedia, & præparata, quæ vulgò digestiva & anti-scorbutica appellantur; quibus tempestive adhibitis, novi plures imbecilles, pallidos, & quasi exsangues citò vim vegetam, & vigorem recuperasse.

Febris Catarrhalis, Anno 1658. medio Vere Epidemica descriptio, prid. Calend. Junii habita.

Novissimæ ætatis calorem immodicum, hyeme insequente æque intensum gelu excepit, adeo ut similem huic annum, propter utrumque, cum ætus, cum frigoris excessum, haud quilibet modò viventium facile inveniret. Ab Idibus Decemb. fere ad Æquinoctium verum erat tellus nive oblecta, & Borea jugiter sufflante cuncta sub dio posita constanter obrigescebant: etiam postea ab initio Veris fere ad Calendas Junii eodem vento adhuc spirante tempestas erat brunnæ quàm veri similior; nisi quod interdum die fortan uno aut altero præfervido intercalaretur. Durante hyeme inter nostrates (nisi quod febris quartana in Autumno contracta quosdam infestaret) status erat medioeriter salubris, & populari quovis morbo immunis. Incunte Vere, febris intermittens tertiana, (uti quolibet præterea anno assolet,) nonnullos incescit. Circa finem Aprilis derepente emicuit affectus, qui velut afflatus quodam à sideribus immensus quamplurimos una corripuit: ut in quibusdam oppidis unius septimanæ spatio plusquam mille homines simul decumberent. Symptoma hujus morbi pathognomonicum, & quod primò ægrotantes invasit, fuit tussis molesta cum sputo copioso, necnon catarrho in palatum, gulam, & nares decumbente: adest etiam intemperies febrilis, quæ cum calore & siti, inappetentia, lassitudine spontanea, & dolore gravativo in dorso & artubus ut plurimum conjungitur: quæ tamen febris in nonnullis erat remissior, ut foras obambulant, & circa consueta vitæ munia toto ægrotationis tempore occuparentur, interim de virium defectu & languore, cibifastidio, tussi, & catarrho querentes: in quibusdam vero calida intemperies plurimum emicabat, ut lecto affixi ardore & siti ingenti, vigiliis, rauedine, ac tussi fere continua molestantur: interdum hæmorrhagia narium in aliquibus sputum eruentium, & non raro dejectiones sanguinolentæ huic affectui supervenerunt: qui corpore infirmo prædicti, aut prope ætatis homines hoc morbo corripiebantur, haud pauci interibant; robusti autem & constitutionis sanioris fere omnes convalescebant: qui huic morbo succumbentes interibant, plerumque ob vires sensim labefactatas & colluviem serosam magis in pectore coarctatam, cum febre adaucta & respiratione didicili, instar febre hectica laborantium emoriebantur. Circa hunc morbum inquirere oportet, qualem habuerit causam procatarrhicam, ut medio vere derepente emergeret, eodemque infra mensis spatium fere tertia pars hominum afficeretur: deum signis & symptomatibus sedulo collatis, assignari debent hujus morbi ratio formalis, item craseos & curationis modî.

Ventum Borealem producendis catarrhis aptissimum esse, præter Hippocratis testimonium experientia communis suffragatur: cur autem non toto hyemis ac veris tractu catarrhi, saltem sporadicè increbuisent; sed tantum unius mensis spatio, & tunc cum febre conjunctus hic affectus epidemice grassaretur, ratio inaud plane constat. Scio plures causam deducere

ab inæquali (pro isto tempore) aeris intemperie: qui licet plerumque frigidior, tamen quando remittente Borea die uno aut altero præfervidus extabat: quare ab hac causa, velut à frigore post incalescentiam suscepto, homines communiter ægrotare poterint: hujusmodi causa evidens fortan pro nonnullis hac ægritudine afficiendis sufficeret; at vero pro excitando affectu ita derepente exorto, & communissime grassante, præter talem occasionem magna procatarrhis, seu prædispositio requirebatur: namque supponi debet, quod cuncti tere homines ad hunc morbum suscipiendum tum sicut proclives, secus nulla causa evidens vim suam ita potenter in plurimos exerceret: quare verisimilius videtur, quod ab anni intemperie, & maxima inordinatione hic morbus originem duxerit: & sicut febris intermittens Autumnalis superius descripta fuit productum immodici caloris præcedanei, ita hæc febris catarrhalis ab anni tractu succedente nimis impense frigido omnino dependeret: enimvero sanguis ab æstate præfervida jam retorridus, & in febrem superius descriptam proclivis, dein urgente autumno acetosior factus, & in febrem quartanam aptus, postea ob intentum brunnæ frigus parum eventilatus, & à debita perspiratione prohibitus dyscrasiam adhuc retinuit, eandemque produta occasione luere in promptu habuit: quare cum medio vere sanguis (uti vegetabilium succus) vegetior factus, necnon efflorescere, & luxuriari inceptus, ob vim adhuc continuatam, inter circulandum angustaretur, in febriles effervescencias erat facile proclivis: cumque latex serosus in cruore redundans, propter poros usque e frigore strictos extus evaporare nequiret, intus restagnans & præcipue in pulmones (ubi *Alveolus* externæ aliquid succedaneum peragitur) decumbens tussim ita crebram & molestantem excitabat.

Hujus itaque morbi origo, & formalis ratio in duobus præcipue fundantur: quod nimirum una contigerint sanguinis effervescencia solito major, à tempestate verna inducta; sin uque *viscositas*, sive magna pororum contractio, à tractu temporis præcedaneo nimis impense frigido excitato, ut propterea sanguini in vasis efflorescenti haud liberum concederetur spatium. Res ita se habuit, ac si vinum effervescere inceptum, vasis strictim oculis imponderetur; namque hac ratione, tum vasa, tum liquor disperdi periclitantur.

Quare ut rei summam brevi contraham, quod hic morbus medio vere exortus statim latissime grassatus quamplurimos occuparet, in causa tum haud maligni aeris afflatus, quo velut sideratione percussæ ægri afficiebantur, prout nonnulli volunt, verum quod hoc tempore sanguis à constitutione verna inspiratus, adeoque luxuriari, & effervescere aptus in motu coarctaretur, ac effluviis intus cohibitis non satis eventilari potuerit. Quolibet anno, licet temperato, usitatum est vere & autumno morbos quosdam epidemicè regnare; quoniam scilicet hoc tempore sanguis redintegratus veluti de novo efflorescit, ideoque febres intermittentes, ac interdum variolæ hac tempestate passim increbrescunt: quare nihil mirum, post anni constitutionem maximè inæqualem, & à naturali dissimam,

cum hoc Vere sanguis vegetius intra vasa ebulliens propter *Alagelæ* impeditam libere circulari, & satis ventilari nequiret, si exinde magnæ inordinationes sequantur, & à communissima hac causa affectus valde epidemicus excitetur.

Quoad symptomata huic morbo adjuncta, intemperies febrilis, quæque huic appenduntur, precordiorum æstus, hirs, lassitudo spontanea, dolor in capite, lumbis aut artubus gravativus, à sanguine plus effervescente, nec satis ventilato inducebantur: hinc in plerisque tenuioris cruoris parte excalescata, ac reliquo liquore solummodo in confusionem acto, synochus simplex, sive plurium dierum inducebatur, atque hæc intra paucos dies plerumque cessabat: in nonnullis autem vitiosa sanguinis diathesi, aut malo corporis habitu prædictis huiusmodi febris propter eandem causam exorta, cito in putridâ valde periculosam, & non raro lethalem transit.

Tussis cum catarrho hanc febrem comitata ab humore seroso, propter transpirationem præpeditam diu in sanguine coacervato, & dein effervescencia oborta, arterioli intus dehiscantibus magis exsudante originem traxit: cum enim pori constringuntur, serositates in sanguine superflue exteriori evaporari solite, propiori sanguinis lustratione in pulmones suffunduntur: quare à frigore (uti vulgò dictum est) suscepto, hoc est à transpiratione extus præpedita tussis ne plurimum concitatur; atque in procataxi ad hunc affectum seri in cruoris massa exundantia locum ferè primum obtinuit: namque à frigore diuturno sanguinis assationem, seu hiliis proventum impediens, atque laticis aquosi *Alagelæ* prohibente necesse erat plurimum serosi humoris in sanguine coacervari: quare cum sanguis à Vere efflorescens effervescenciam concepit, seri exundantia, ejusque in partes interiores suffusio, primo tussim, velut proprium huius morbi symptoma, inferre solebat: ac in quibus sanguis à seri mixtione dilutior factus tussi, & affectioni Rheumaticæ fuit maximè obnoxius, ipsi ab intemperie febrili cum leviori plaga absolvebantur.

Huius morbi prognosis circa privatas personas plerumque facilis est. ut à primo statim insultu eventum producat: nam si in corpore robusto, & prius sano hæc ægritudo excitetur, sitque intemperies febrilis moderata, & sine gravi, & horrendo quovis symptomate, res periculo vacet, & affectus ita levis momenti reputatur, ut vulgò tantum frigus contractum audiat; & plerumque nec Medicus consulatur, nec remedia, nisi trita, & faciliè parabilia adhibeantur. Sin verò hic affectus in corpore imbecillo, & invalecudinario cum malo apparatu contigerit, sitque aut febris in putridam evecta, aut tussis ingravescent respiracionem difficilem, & constitutionem velut tabidam inducat, morbi eventus plurimum suspectus est, & non raro in mortem terminatur. Prognosticon commune, quod hinc circa anni statum futurum defumitur, nihil valde timendum continet, aut insigniter malum ominatur, ut propter inæqualem anni intemperiem, ac magnos æstus, ac dein frigoris excessus morbos à dyscrasia sanguinis oriundos liceat timere; verumtamen à præfenti statu neque auram insigniter depravatam, aut venenatis halitibus infectam suspicamus, ut hinc pestis, aut malignioris morbi imminens criterium habeatur:

Quod ad therapeiam attinet, quando hic morbus levius intelligitur, ejus cura ut plurimum naturæ relinquitur: etenim hæc febris, cum sit tantum synochus simplex, intra paucos dies per diaphoresin judicari solet: quare à sudore copioso plerumque circa tertium diem, aut quartum calor & hirs, lassitudo ac dolores gravativi sedantur: deinde tussis diutius protracta postea paulatim remittitur, & demum ægri sensim convalescunt. Si quando hic affectus altiores radices egerit, remediis idoneis & exacta medendi methodo opus est. Febris ingravescent juxta leges in putrida observandas sanetur: verumtamen cum hoc discrimine, ut quoniam transpiratio præpedita, & humoris serosi in pulmones suffusio præcipue in culpa sint, ideo diaphoretica, & remedia dicta thoracica crebrioris sint usus: hæc enim seri e vasibus intus exundantiam cohibent, ipsumque aut poros referando foras convehunt, ut à cruoris sinu præcipitando per ductus urinarios amandant. Itaque medicinz methodus pro hoc morbo in pejus evecto respiciat tum intemperiem febrilem, cuius sanandæ gratia juxta intentiones in febre putrida adhibitas dirigatur: tum affectionem Rheumaticam, quæ tamen sit indicans secundarium; & remedia non quælibet expectorantia, aut contra tussim ulcra, sed ejusmodi tantum admittit, quæ febrem minimè intendunt. Horum formulæ, & medendi occasiones & præceptis pro curatione febris putridæ, & tussis passim traditis petantur: auxilia, quæ nunc crebra experientia in hoc morbo opem præcipuam contulisse vulgò perhibentur, sunt diaphoresis, sive procuratio sudoris, & sanguinis missio; etenim vasibus hoc aut illo modo depletis, tum immodica sanguinis effervescencia, tum seri exuberantia cohibentur.

Febris Epidemica sub initium Autumni, Anno 1658. exorta descriptio habita Idibus Septembris.

Febris vernalis modo descripta vix ultra sesquimensem duravit, ut plane videretur ea tantum levior sanguinis efflorescentia, quæ nimirum in vere turgescens simulque ob ventilationis defectum spatio coarctatus auttar vultu utribus inclusi impetuosius ebullivit, ac dein sponte cessavit. Exinde tamen, prout neque annus, ita nec sanguis noster debitam temperiem recuperabat, adeoque in novam usque febrem ton es alter cito congestus est. Quippe post solstitium æstivum, Borea adhuc flante, tempestas frigida diu persistit, ita ut fruges ac legetes hoc anno vix ad maturitatem perducere possent agricolæ vererentur: posthac autem, paulo ante calendas sextiles, calor intensissimus per plures dies insequutus est; & jam regnante Sirio ær impensè æstuabat, ut sub dio versari plurimum tæderet. Propter huiusmodi æstus ac frigoris excessus, huius anni temperatura fuit maximè inæqualis: quapropter sanguinem nostrum modo hgi, ac velut congelari; modo præassari nimis, ideoque à crasi naturali in retorridam, aut atrabiliariam perverti necesse fuit; etiam poros cutis à constitutione recta plurimum alterari. ut proinde transpiratio insensibilis hand solito more perageretur.

A quo deliit febris superior ferè ad occasum Caniculæ fuit status salubris, & morbi cujusque popularis immunis: deinceps verò pauci primò

primò in villis ac vicis minoribus sparsim ægrotarunt; postea autem circa finem mensis *Augusti* febris nova derepente exorta per totas regiones undequaque in vicinia nostra grassari cepit. Hæc etiam, prout altera, quæ novissimo autumnino increbuit, in pagis, & villis rusticis præcipue desævit; interea tamen urbium & oppidorum majorum incolæ rariores decubuerunt. Eodem tempore in aliis regionibus procul hinc distitis, imò per totam fere Angliam, febris epidemica grassarierebatur; etiam in aliis quibusdam locis longè erebriora funera, quam hic inter nostrates audiebantur. Forsan hujus febris modo regnantis idea, ejusque symptomatum apparatus haud ubique locorum per omnia similis exiit, aut iisdem prorsus phaenomenis & accidentibus insignitur: quicquid tamen circa naturam ejus, prout in vicinia nostra se habuit, observatione propria, aut ab aliis communicata edidici, succincte ac breviter subijciam.

Circa prima hujus morbi initia fuit typus ejus vagus, & valde incertus; quippe in nonnullis aderat effervescencia continua, in aliis intermittens, & paroxysmis itatis interpolata: quamplurimis vero ægrotantibus velut symptoma hoc tempore pathognomonicum accidit, in cerebro & nervoso genere se male habere, ut statim à febris hujusce primordiis de capite graviter affecto fere omnes quererentur; quippe alios cephalalgia immanis, alios gravitas auditus cum tinnitu aurium infestant: plerisque verò aut torpor, & somnolentia gravis, cum affectu vertiginoso, aut vigilis perturbationes cum delirio & spirituum animalium distractionibus accidere solebant. Observavi in nonnullis, quod primo, aut secundo ægrotationis die maculae late & rubicundæ morbillis similes in toto corpore sensim eruperint, quibus brevi postea evanidis, febris itatim intentior, & præcipue affectiones capitis longè graviores evaserunt. Exinde quosdam torpor sensum, & somnolentia per plures dies interferunt, ut sine loquela, aut amicorum notitia velut moribundi diu jacuerint. Novi alios hinc in lethargum, aliosque in apoplexiam conjectos; quosdam in deliria, & phrenesim incidi se. Ex his juniores, & robustæ ætatis homines (non sine diuturno tamen languore, & dubia convalescentia) complures evaserunt: interea senes, alias imbecilles, ac invaletudinarii passim interibant. Qui febre velut continua cum istis malignitatis notis decubuerunt, rariis, & in quibusdam tantum ædibus sporadicè affecti extiterunt. Quæ verò in nostra vicinia ægritudo communissime grassata plurimos incescit, atque etiamnum graviter desævit, typum febris intermittens, scilicet aut tertianæ, aut Quotidianæ imitari videbatur: siquidem in diebus aut singulis, aut (quod sæpius observatur) alternis, ægri paroxysmos habent, qui cum frigore, æstu, ac sudore ordine succedentibus eos diu ac graviter infestant: hujusmodi verò accessiones, necnon totius morbi decursus, pro diversis ægrorum ætate, ac temperamento, cum varia symptomatum & accidentium ordine insigniri solent. Hoc tamen plerisque (pene dixerim omnibus) decumbentibus commune est, unà cum hac febre affectibus cephalicis ac p. lecti.

Cum itaque hoc morbo quispiam afficitur (sive ex causa evidenti, aut contagio, sive abque occasione manifesta ægritudo excitetur) dolor in capite, & non raro in lumbis, cum siti, inappetentia, lassitudine spontanea, ac calore, licet minus intenso, ejus adventum produnt. Si in corpore juvenili, sanguinis floridi, & temperamenti calidioris accidat, circa ejus initia paroxysmi frigore, aut rigore carent, æstu tamen diuturno & acri sunt plurimum molesti: ægri vomitu sæpe tentantur,isque caput plerumque immaniter dolet: sudor difficulter succedit, qui sæpe partialis, ac cito interruptus paroxysmum raro solvit; quin cum sudore doluerunt, denuo incalescunt, ut vix intra horas 18. aut 24. in quibusdam accessio finiatur. Interim à cruore admodum effervescente phantasia perturbatur, ut sæpe delirium, fabulatio absurda, vigilæ, & summa inquietudo durante paroxysmo concitentur; eodem verò finito, interstitii tempore adhuc sitis molesta, calor lentus, virium languor, & spirituum magna debilitas, cum cephalalgia & affectu vertiginoso plerumque infestant. Raro inveniuntur, qui prout in tertiana communi, accessionum intervallis se mediocriter habent. Circa morbi principia exacerbationes febriles paulò mitiores existunt, quæ postea qualibet vice sensim ingravescunt, & dein cum frigore, aut rigore incipiunt: cui tamen post æstum diuturnum & valde molestum sudor ægrè in plerisque succedit, ita ut paroxysmus raro in temperiem debitam finiatur. Intra sex, aut septem periodos ægrotantium vires plurimum æteruntur, ut languidi & imbecilles facti difficile habeant pensum cum morbo colluctari; quippe nisi ab arte naturæ succurratur, febris usque prævalet, & raro aut nunquam intra breve tempus aut crisi solvitur, aut sensim remittit: quin affectos diuturna obsidione in summas angustias adducit, eo usque nimium persistens, donec sanguis à crebra desagratiōe valde effectus & aquosior factus, sponte in vasis nimium effervescere, aut in corde uberius accendit omnino inhabilis; & tunc non raro ita vappidus, & spirituum inops evadit, ut lampadi vitali proroganda insufficientem mortem accersat. Interdum verò cruoris massa ab hoc morbo depravata, & inops facta ignem vitalem semiextinctum (ægrè licet) percutare, ipsumque dein cum spiritu & vigore paulatim, & diutino tempore reintegrare valet: interea tamen post statum hujus morbi, cum sanguis debilior, simulque impurius factus materiam febrilem, seu recrementa adusta motu critico foras expellere nequit, eadem cerebro transfert; ideoque circa febris hujus tempore spirituum torpor, & stupiditas, somnolentia, vertigo, aurium tinnitus, tremores, & motus convulsivi cum magna totius facultatis animalis oppressionem sæpius inducuntur.

Qui frigidioris temperamenti, aut provecioris ætatis homines hoc morbo corripiuntur, licet minus acute febricitent, cum majori tamen vitæ periculo decumbere solent: quippe in his præter sanguinis diathesin haud facile reducibilem, etiam in paroxysmis, quod extraneum & non miscibile congeritur, ægrè subigitur, & difficulter à cruoris massa seceratur: quare & sanguis in crati sua usque insignis depravatur.

vatur, & in sanguis paroxysmus in partem mixtione magis innititur: insuper liquor nervosus à debita temperie valde pervertitur, & recte mentis aditus cerebro continuo lusuus pessime inquinatur. Cum itaque senes, melancholici, aut alias inveterudinarum in hanc febrem incidunt, à primo ejus insultu statim torpidi, & plerumque vertiginosi evadunt: in paroxysmis licet calor sit minus & mordax, inquieti tamen, & plurimum jactantur degunt: saepe incongrue, & delirè fabulantur. Post diuturnam incallescantiam sudor aut nullus, aut tantum partialis, & crebro interruptus succedit, quo paroxysmus non plene solvitur: quin totis intervallis agri sitibundi, cum oris siccitate, linguæ scabritie, & amureæ viscosæ suffusione male habere possunt. Post aliquot paroxysmos viribus summe defectis, aut lecto assurgunt penitus, aut parumper interdum suscitati vix stare, aut e loco in locum, pedetentim licet, incedere valent: interim languore, respiratione difficili, sensuum torpore, & totius nervosi generis imbecillitate magna laborant. Urina in plurimis intense rubicunda est, coloris saturati nigris, & consistentiæ crassioris, quam interitialia communia: pulsus, dum vires non omnino prostrata sunt, plerumque robustus est, & æqualis: postea cum ægroti valde oblanguescunt, debilis, inæqualis, ac saepe intermittens exsistit, cui etiam tendinum contractura, & motus convulsivi in corporis adjunctis, prognostici ut plurimum lethalis occasionem præbent. Qui sensim debilitati versus mortem declinant, aliquo ante obitum spatio, plerumque sine loquela, aut altantium agnitione, velut stupidi decumbunt. Raro accidit in hac febre, ut quispiam moribundus memoriæ & intellectu vegetis res familiaris suæ disponat, aut amicis valde dicat. Quos vero è languore summo, & statu fere deplorato evadere contingit, haud subita & manifesta diacrisi cito emergunt, verum diu vacillantes, torpidi, ac enerves jacent, ut non nisi post dubium & difficile certamen natura tandem vix ac ne vix quidem morbo potior extiterit, & deinceps ac diuturna convalescentia vires gradatim recuperet.

Si natura, & formalis ratio febris epidemice modo descriptæ inquiratur, dicimus hanc (prout illam prioris anni) esse propriè intermittentem: quæ enim communiter grassatur, hujusmodi typum gerit; licet continuæ quædam rariores interpersæ sint, quas etiam mox obiter perstringemus. Hujus seminarium non opus erit ab aere miasmate quodam infecto derivare, quin potius causam ejus à constitutione à debita anni constitutione, & exinde sanguinis nostri indispositione à quâ sita petere. Quippe vere, & autumnio febres intermittentes quotannis increbrescunt: quia nimirum sanguis noster æque ac vegetabilium succus, his temporibus solito vegetius commoveri, ac efflorescere solet. Quare si cruoris massa ob prægressam ætatis aut hyemis tempestatem à debita temperie alteretur, & diathesim aut acrem, aut atrabiliariam, aut alius generis contraxerit, ejus dyscrasiam prius inceptam circa æquinoctia potissimum maturantur; quando nimirum sanguis uberius fermentescens (si modo à crasi na-

turali desciscit) non ita facillè sanguificat, quin succum alibilem ei confusum in materiam extraneam, & febrilem pervertere aptus fuerit. Cum itaque hic annus à constitutione recta plurimum deflecterit, ut non solum Cunicula præcedens, sed binæ retro solstitia, totidemque Equinoctia omnino imtemperata extiterint, nihil mirum est, si febres intermittentes solito crebriores, æque symptomatis quibusdam insitatis insignita sub Autumno ingravescant. Quod igitur febris Epidemica intermittens hoc tempore desaviet, haud aeris præsentis vitio, sed tempestatis prægressæ anomaliæ attribuendum duco: à quibus tamen causis, & occasionum momentis symptomata in hac febre propria quædam, & à communium intermittentium nomina distincta orientur, inquisitu erit dignum. Dixi superius apparatus, quo hæc febris in mortalium perniciem instruebatur, in duobus præcipuè consistisse: scilicet anni temperies modo impensè frigida, dein succedens calidissima, tum sanguinis nostri crasin varie perverterat, tum poros cutis constitutione indebita affecerat: Juxta rationes ab utrisque petitas hujus morbi accidentia explicare, ejusque phaenomenon causas assignare satagam.

I. Primò observamus quod febris hujus typus fuit varius, nimirum in his cum effervescencia continua, in aliis cum macularum eruptione, in plerisque autem intermittens, & instar tertianæ, ac interdum (licet rarius) quotidianæ, diebus singulis, aut alternis paroxysmos repetens. Diversitatis hujus causam assignamus, quoniam hoc anno *1755* fortior & potentior erat, quam ut solummodo febrem intermittentem in Autumno communiter assuetam produceret: quare in aliquibus præviore fortiori corporis habitu præditis febres nonnihil malignas concitavit, & quibus juxta solitum tempestatis morem intermittentes accersivit, eas peculiari symptomatum apparentia notari fecit.

II. A febre hoc tempore Epidemica (sive ea sit continua, sive intermittens) correpti, protinus malas capitis affectiones patiuntur; scilicet modo cephalalgia immani, modo spirituum animalium aut stupore, aut distractione nimia infestari solent. Hujus ratio est, quod succus nervosus æque ac sanguis, propter anni imtemperiem, à crasi debita, scilicet natura dulci, ac spirituosâ, plurimum alteretur, ac modo hebes & ferè vapidus, modo acris nimium & pungitivus evaserit. Præterea item ipsa cruoris massa huic malo valde contribuit, dum enim effervesceat, effluvia vaporosa, quæ exterius diffundi oportuit, ob poros contractos capitis membranarum, ac cerebro suffunduntur: atque propter hujusmodi *retentionem* ferè omnibus impressam sudor agrè, & non nisi partialis, & saepe interruptus in paroxysmis succedit: hinc etiam in morbi statu crisis perfecta, aut spontanea ejus solutio raro & vix omnino contingit, quin vice hujus, si res natura committitur, materies adusta, seu recrementa in cruore congeita capiti transferuntur, ibidemque affectus modo comatosos, modo phreneticos, eosque diuturnos ac continuos concitant.

III. Quod paroxysmi interdum sine frigore, aut rigore inipiunt, cum astu tamen molesto, & sudore difficili, partiali ac saepius interrupto diu

diu protelentur; dein quatenus eodem finito ægroti rursus incallescant, ut non nui longa halitus sicci evaporatione accessiones finiantur, in causa est nimis aeris & biliosa sanguinis diathesis, qua Sale & sulphure adustis potius quàm seroso latice refertus, quando turgescit, sine prævio nigrosæ materiæ fluore protinus incendium concipit; ideoque ob seri defectum, & poros oclusos, exhalatione ferè tantum sicci, deflagratio ejus longo tempore continuatur, & vix tandem in ~~extinguere~~ desinit. Atque ideo paroxysmorum interiticia calore, & titi, cephalalgia, vertigine, aliisque affectibus sunt plurimum molesta: quia scilicet materia febrilis in sanguine congesta singulis Paroxysmis haud tota discedit, quin pars ejus post accessioneis relicta velut extranea, & non miscibilis, effervescentiam ferè continuam inaudit.

IV. Observare est, quod hac febre affecti viribus suis, & solita corporis firmitate confestim decidant, ut post unum aut alterum paroxysmum anhelosi, & valde imbecilles vix pedibus stare, aut absque sustentaculo ambulare valeant; cum ulitatom sit, febre intermittente communi correptos in accessionum intervallis satis vegete & alacriter se habere. Discriminis ratio est, quoniam in hac febre cruoris massa tum succi degeneris impura mixtione plus depravatur, tum præcipue quod eadem à crassi naturali magis pervertitur; & propterea quando extra paroxysmos minus ebullit, in cordis tamen sinibus haud rite, & æquabiliter fermentescit: quare cum à motu citatiori, aut corporis agitatione quavis sanguis in cordis sinus impetuosius urgetur, quoniam illic non totus statim accenditur, & foras exilit, stagnatione sua cordis oppressionem, & spirituum vitalium exsolutiones magnas intert. Propter hujusmodi cruoris dyscrasiam, qua nimirum fermentationi, seu accensioni debet in corde sit inidoneus, etiam jumenta quædam, ac præsertim equi, tempore verno, aut autumnali sunt anhelosi, atque ad motum rapidiorem valde inepti.

V. Super hac febre ultimò inquirendum restat, quare in villis, pagis minoribus, ac cruri potissimum increbrescat: quando urbes, ac oppida majora leviori plaga feriantur. Videri autem posset, quod hic affectus ab halitibus paludosis, aliisque noxiis in hoc aut illo aeris tractu uberius congestis excitetur: verum ratio melius constat, asserendo istiusmodi locorum incolæ frigori vernali, ac dein caloribus æstivis magis expositos dyscrasiam sanguinis majorem, adeoque in hanc febrem diathesin aptiorem contraxisse. Enimverò rure habitantes vix ædibus egrediuntur, quin solis radiis, aut aeris æstuantis fervori exponantur. Insuper agricolæ, & rustici durioribus negotiis assueti (inter quos hæc febris maxime sævit) à labore & exercitiis immodicis sub dio habitant. simulque victu prævio & aspero utentes, sanguinis diathesin adustam & retorridam, ideoque huic morbo aptiorem, citius acquirunt, quàm cives, & oppidani, qui otio & victu salubri fruente in contuberniis, aut plateis ædificiorum umbra refrigeratis sapissime degunt. Huic assertioni fides attrahitur, eo quod non solum febris Epidemica

modo deficiens, verum & altera prioris Autumni propter sanguinis dyscrasiam excitata, inter colones & ruris incolæ potissimum increbuit: quæ autem medio Vere febris popularis exorta est, a transpiratione præpedita præcipue dependens cives, & oppidanos maxime infestavit: interim rustici exercitio & laboribus ~~assueti~~ liberiores procurare soliti in-punius debebant.

Hujus morbi prognosticon generale tantum ominari videtur, similem ferè plagam huic succelluram, ac ob eam quæ febrem prioris Autumni Epidemicam sequuta est, scilicet (augurio a sanguinis nostri intemperie potius, quàm ab aeris labe desumpto) haud pestem, sed febrem quartanam denno imminentem vereri liceat. Quoad ~~quædam~~ particularem, ut signa quæ mortem, aut salutem promittunt, brevis contraham, ea præcipue respiciunt vel sanguinis cum spiritu vitali, vel etiam succi nervosi cum spiritu animali temperiem, & regimen. Si a pullu, urinis, actionibus minus læsis, aliorumque symptomatum apparentia planè indicetur, quod sanguine quoad diathesin febrilem, à crassi naturali haud valde pervertitur, quod in paroxysmis modicè tantum deflagret, & materiæ febrilis fæcinam in qualibet lucta facile subigat, & consortio suo penitus excutiat; quod post aliquot accessiones ejusdem sanguinis massa verò sus temperiem debitam nonnihil restituatur; quod minus succum alibilem pervertat, & mitiori turgescencia quod extraneum est, & non miscibile excernat: atque interea si liquor alter spirituosus cerebrum ac corpora nervosa rite inflat, ac irrigat, ut somnus, vigiliæ, sensatio, & motus bene, aut saltem mediocriter peraguntur, de ægroto liceat omnia bona sperare. Sin vero ex istis indiciorum fontibus contabit, quod sanguis in hac febre crassum à naturali difficilissimam acquirat, si plurimum succi alibilis pervertat, & dem ab extranea & incongrua ejus mixtura cruoris liquor valde turbatur, & spiritus in confusionem aguntur, Si in paroxysmis cruor intense nimis, & longo tempore deflagret, nec tamen materiam febrilem rite subigat, aut totam toras excludat, quin impura ejus miscela adhuc magis (& in qualibet accessione febrili) usque magis inheciatur, simulque spiritibus continuo assumptis pauperior evaserit, vitam ægotantis periculosa subiectam alea pronuntiare possumus. Super his si liquoris nervosi accedant vitia, ut à debita temperie alteratus, aut hebes nimium, & quasi vapidus cerebrum, & nervosum genus minus actuet, aut supra modum aeris eadem in spasmus, & distractiones continuo irriter, ac si præterea effluvia vaporosa à sanguine continuo decidentia, aut recrementa adusta sudore critico secerni solita in caput transferantur, ibidemque affectus lethargicos, aut maniacos inducant, salutis ipse admodum in præcipiti versatur, & eventum valde incertum timere licebit.

Circa hujus morbi therapiam intentiones curativæ præcipue tres in considerationem veniunt. Primò sanguinis, & liquoris nervosi ad crases naturales (quantum fieri potest) citareductio, vel saltem istorum depravationis nimis præcautio. Secundo, ægotantium circa paroxysmos recta tractatio, quæ procurare debet:

Primò,

Primo, ut minus succi degeneris in paroxysmi materiam congeratur. *Secundo*, ut congesti penus qualibet accessione in totum diffusetur, quo in intervallis ægroti melius habeant. *Tertio*, ut corpore in melius alterato, remediis anti-febrilibus paroxysmi inhibeantur. Tertia intentio respicit symptomata præcipue urgentia, quibus tempestive occurratur, quo natura minime impedita quicquid in visceribus, aut vasis contentum intemperatum sit, reducat; extraneum subigat, & excernat, atque cito demum vim vegetam, & vigorem pristinum recuperet.

Primo igitur pro sanguinis & succi nervosi reductione, & emendatione diversimodæ evacuationes circa initia ægrotationis in hoc morbo bono cum fructu adhiberi solent. Vomitoria in hoc affectu potius quam in tertiana communi insigniter ex usu esse, e praxi moderna satis constat: quare in corpore robusto, ac in vomitionem proclivi, sub initium secundi aut tertii paroxysmi pharmacum emeticum propinari convenit. Hujus operatio in hac febre magis prodesse videtur, & quatenus è ventriculo sordes, ac valis choledochis bilem flavam uberius evacuat, & quoniam serosum laticem e nervosi generis emunctoriis circa pancreas, & intestina confitis copiosè exprimit, & proritando emulget. Quare observamus, à vomitorio adhibito circa capitis affectus ægrotantes se melius habere. Purgatio (quibus vomitio non convenit) die paroxysmi sequenti velut succedaneum instituitur, etiam emetico licet præmissio; dein post unam, aut alteram accessionem rite succedat: verumtamen cum pharmaco tantum miti, & benigno, quod sanguinem minime perturbet, aut exagitet, peragatur. Nobis solenne est in his febribus medicamine quovis Aloëtico, aut Diagridiato polihabito, tantum infusionem, aut pulverem ex Senna, Rhabarb. & Santal. Citrin. cum Tartaro, ac Sale Absinthii exhibere, atque hujusmodi purgationem haud longè nimis à morbi initiis celebrare: aliis verò temporibus crebro enematum usu alvum solutam reddere. Venæsectionem in hoc morbo apprimè utilem crebra experientia satis edocuit: cum enim ob poros in omnibus solito contrictiores sanguis à febre effervescens ventilatione indigeat, sanguinis missio liberioris vicem supplet, præcavetque, ne effluvia cohibita adeo prompte cerebro, & nervoso generi suffundantur. Attamen hoc remedium præcipue indicatur à sanguine præservido, & temperamento calidiori; neque indifferenter à senibus, pituitosis, aliisque valde imbecillis usurpari debet, nisi forsan in exigua quantitate, ut cruoris massa nonnihil eventiletur, & materiz febrilis in cerebrum metastasis inhiberi possit. Si venam secari convenit, circa febris initia, aut saltem ante quartam, aut quintam accessionem fiat; scilicet priusquam cruor à desagratiōe crebra effusus valde, atque materiz adultæ confusione impurus nimium reddatur: quippe si cruore insigniter labefactato phlebotomia celebretur, spiritus vitales, ac ægroti vires inde plus debilitantur, nec tamen de morbi potentia, aut causa ejus quidquam detrahitur. Restat aliud evacuationis modus in hac febre celebris, per emplastra nimium vesicatoria variis corporis partibus adhibita, hæc adeo juva-

men præstare vulgò observantur, ut inviti, ac tale remedium valde perhorrescentes, alioquin exinde melius habentium exemplo ducti illud faciliè admittant. Quo ritu cuticulam a cute segregent, & quasi in vesicam aquæ plenam attollant; an humorem illum aquosum, & limpidum ex arteriis, an ex nervis exprimant, non est hujus loci disquirere: ea tamen in hoc morbo utiliter adhiberi, præter experientiam, ratio hæc nonnihil suadere videtur; quia nimirum hujusmodi serosi laticis larga protulio transpirationis liberioris defectum quoadtenus compensat: insuper hoc remedii genus velut fores, & ostia patefacit, quibus & sanguis, & succus nervosus materiam extraneam ipsis confusam purgamento propiore illico excernant; quare in peste, & affectibus malignis vesicatoria valde proficua æstimantur. Etiam communi observatione constat, quod in hac, aliisque febribus eadem tempestive habita graviores capitis affectus præcaveant, atque iisdem prius inductis opitulari soleant: quare in pituitosis, senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus emplastra epispastica circa primum hujus morbi insultum præservationis causâ applicari possunt, atque in aliis quibusvis torpore, vertigine, aut cephalalgia immani laborantibus; propter eorundem affectuum curationem utiliter adhiberi solent. In constitutionibus vero impense calidis, ubi cum feri defectu sanguis adurit nimum, atque si febricitantes cum æstu intolerabili, vigilis, aut phrenesi sunt obnoxii, vesicatoria minus ex usu esse videntur.

Pro sanguinis crasi, necnon viscerum tenore emendandis, temporibus intermediis, quando ab evacuationibus modò citatis parumper vacat, locum habent remedia attemperantia, atque digestiva, quæ nimirum sanguinis liquorem fundunt, ejusque sæculentias segregant, & velut præcipitando versus emunctoria deturbant; propter ejusmodi intentiones propinari solent Julepia, & decocta refrigerantia, spiritu Vitrioli, Salis, Tamarindis, succo Aurantiorum, aut Limonum acidulata, quorum formulæ satis elegantes vulgò prostant. Etiam in hunc finem conducunt pulveres acetosi, salini, testacei, scilicet ex Tartaro, Halinitro, salibus herbarum fixis, è Cornu Cervi ulso, item chelis, aut oculis cancrorum parati. V g.

℞. Cremoris Tartari drach. 3. Salis absinthii, drach. 1. cum semiss. dosis drachm. sem. in decocto aperiente, bis in die extra paroxysmum.

Vel, ℞. Cremoris Tartari drachm. 2. pulv. oculorum Cancr. drach. 1. nitri purificati drach. semiss. Misce, propinetur eodem modo.

Vel, ℞. Cornu Cervi ulsi drach. 2. Spiritus Vitrioli quantumpulvis imbibendo excipiet, dosis est scrup. unus. Egregii usus est, cum febricitantes lumbricis infestantur. Hujusmodi remedia materiz febrilis secretionem promonent, necnon sanguinis, & viscerum fermenta ferè deperdita restitunt.

Secunda intentio, scilicet ægrotum circa paroxysmos recta tractatio, plura comprehendit. *Primo* institui debet idonea victus ratio, quò succi degeneris in paroxysmi materiam congestio plenior inhibeatur; quare alimentis solum tenuibus ægri vescantur; carne (aut ipsius iusculo) ovis, potu generoso, & esculentis quibulvis

bulvis opiparis omnino abstineant; solum decoctis hordeatis, aut avenaceis, panatella, sero lactis, & cervisia tenuiori contenti: liquidum uberius alimentum minime coquitur, aut assimilatur, quin ventriculum aggravat, & citius confusum ejus liquorem perturbat, & impetuosius effervescente cogit. Ingruente paroxysmo, & pro tempore durationis ipsius, nisi pro siti restinguenda, nullum alimentum ore assumatur. pro temperandis vero calore, & siti julepia, & decocta refrigerantia, & imprimis cervisia tenuis, & serum lactis concedi debeat. *Secundo*, paulo antequam accessio febrilis expectatur, pharmacum lene exhibeatur, quod paroxysmum vel præcavendo arceat, vel diaphoresin facilius procurando facilius: in hunc usum confert Doctissimi *Riverii* portio febrifuga, ex aqua Cardui, cum oleo sulphuris, & Sale Absinthii:

Vel, ℞. Cremoris Tartari, Salis Absinthii, sem. urticæ, an. scrup. i. detur in decocto radicis Acetolæ. Cum febris declinare incæperit, & paroxysmi paulo remissius habeant, epithemata febrifuga exterius applicata accessiones febriles non raro inhihent. Interea tamen, quandiu paroxysmi repetunt, ægri tractentur adeo, ut qualibet accessione materia febrilis in sanguine congesta penitus distilletur: quare cum sudor ægrè succedit, Medicamentis temperatis paulò excitetur; etiam in lecto cum blanda diaphoresi ægri se detineant per plures horas, nec citò nimis excitari permittantur: etenim sæpius observavi ægrotantes usque deterius habuisse, quoniam lecti impatientes, priusquam effluvia vaporosa satis exhalarent, velles inderunt.

Tertiò, quoad symptomata, & accidentia particularia, quibus ægri in hac febre infestari solent, eorum quamplurimis cum remediis, & curationis methodo hactenus descripta satis prospicitur: contra sitim, ardorem, oris & linguæ scabritiem, vomitus, diarrhæam, syncopen, aut lipothymiz metum præscriptiones in aliis febribus vulgo usitatæ satis commode huc transferri possunt: quæ autem peculiarem medendi methodum in hoc morbo exigere videntur, sunt imprimis capitis, & cerebri cum nervoso genere affectiones, quibus in tempestive occurratur, exinde in magnam vitæ discrimen ægrotantes citò adducuntur. Circa hujusmodi capitis mala indicationes sunt duplicis generis: si ex torpore, somnolentia, vertigine, aut cephalalgia consistet, succum nervosum nimis hebetem, & quasi vapidum existere, ideoque cerebrum & corpora nervosa non vegetè satis actuare, præter remedia superius tradita, & imprimis vesicatoria, in hoc casu optimè conducunt medicamina Sale volatili resecta: quare spiritus Cornu Cervi, sanguinis, necnon sales eorundem, egregii sunt usus: si vero liquor nervosus sit nimium acris, aut effluvia à sanguine æfluante suffusa spiritus animales in distractiones agant, ejusmodi e Sale volatili remedia paulò in minori quantitate cum fructu adhibentur. Insuper crebra sanguinis missio, & medicamina ejus fervorem demulcentia conducunt, uti emulsiones, serum lactis, aqua simplex uberius propinata. Opiata in hac febre cavè admodum usurpentur: nam phrenesis ab eis sedata sæpius in lethargum, aut altum stuporem commu-

tatur. *Thomas Willisius Tractatu de Fermentatione & febrili, quem supius hic excerptimus ne aliquid hac in parte nobis deesset.*

1. Primo adverte inordinatam illam massæ sanguinæ commotionem leoris continuæ seu caulæ, seu comitem, à natura concitari, vel ut heterogenea quædam materia in eadem conclusa, ac ipsi inimica seceratur; vel ut sanguis in novam aliquam diathesin immutetur.

Atque in hoc negotio magis arridet latius & generalius Commotionis vocabulum, quam vel fermentationis, vel Ebullitionis, quippe quod manis ~~admodum~~ occasionem præscindat, quam fortassis utriusmodi voces (quæ etiam si explicationem non incommodam admittant, tamen minus propriæ, ac nonnihil deteriores nonnullis videntur) hand satis caverent. Quamvis enim Cruoris in febribus commotio, liquorum vegetabilium aliàs fermentationem, aliàs etiam ebullitionem æmuletur, non desunt nihilominus qui eandem non uno modo ab utraque plurimum disterre arbitrantur. De Fermentatione unum alterumve ab illis sumatur exemplum. Primo, licet fermentescencia liquida vinosam quandam indolem ita nancisci soleant, ut spiritum ardentem ex ista destillatio eliciat, atque in acetum facile descendant, quod ipsum igni acore pollet, & spiritum acidum destillando exhibet; neutram tamen ejusmodi mutationem in sanguine hactenus observatam fuisse contendunt.

Deinde adverti volunt quòd cum in liquoribus vinosis fermentatio & depuratio eodem tempore peragantur, & quasi paribus passibus procedant, depuratio tamen sanguinis in febribus ejusdem situationem non comitetur, sed consequatur, id quod in paroxysmo febrili per sudores soluto, vel oculorum testimonio, patere existimant.

Quod autem ad Ebullitionem attinet, difficilior illis hæc videtur analogia, quæque experientiam habet tum opere retragantem, in multis nimirum casibus, quoties non adeò estranis est cruoris orgasmus, ut Ebullitionis appellationem mereri possit. Verum utut sit, (neque enim hisce controversiis me ullatenus immisceri patiar;) quandoquidem Fermentationis & Ebullitionis vocabula apud recentiores Medicos plurimum invaluerunt, ego quoque eadem subinde usurpare non dubitaverim, dummodo ex jam dictis satis constet voces istas in hoc Tractatu clariori solutionem dicendorum explanationi inservire.

Porro febrilem hanc sanguinis commotionem ob materiam ejusmodi heterogeneam, ipsique naturæ adversantis, secretionem ab eadem concitari, omne genus febrium quæ eruptionibus stipantur testatum facit; utpote in quibus, istius ebullitionis sanguinis beneficio, fit excretio ad cutem excrementi in eodem latitantis, & prava qualitate affecti.

Quinimò nec, meâ quidem sententiâ, minus liquet febrilem sanguinis commotionem sæpe (ne dicam sæpius) non aliò collineare, quam ut ipse sese in novum quendam statum, & diathesin immutet, hominemque etiam, cui sanguis purus, & intaminatus perstat, febrì corripì posse; sicuti in corporibus sanis evenire frequenti observatione compertum est, in quibus nullus

nullus apparatus morbosus, vel quoad plethoram, vel quoad cacochymiam fuerit, nulla insalubris aeris, anomalia, quæ febri occasionem subministraret. Nihilominus etiam hujusmodi homines, præcedente insigni aliqua aeris, victus, cæterarumque rerum nonnaturalium (ut vocant) mutatione, identidem febre corripuntur, propterea quod eorum sanguis novum statum, & conditionem adipisci gessit, qualem ejusmodi aer aut victus postulaverint; minime vero quod particularum vitiosarum in sanguine stabulantium irritatio, febrem procreet. Etenim nequaquam dubitem materiam in sanguinis despumatione post febrilem commotionem, solenniter excretam, vitiosam esse; quamvis sanguis laudabilem antea diathesin obtinuerat: id quod vix magis mirandum est quam quod esculentorum portiones aliquot corruptæ, & foetidæ evadant, postquam insignem in corpore alterationem subierint, ac jam à reliquis segregatæ fuerint.

II. Secundò ita mecum reputo, Indicationes veras, ac genuinas, quæ in hoc morbo consurgunt, in eo versari, ut sanguinis commotio intra modum naturæ proposito congruentem, sistatur; ea nimirum ratione, ut nec hinc plus æquo gliscat, unde periculosa symptomata insequi solent, nec illinc nimium torpeat, quo pacto vel materiæ morbosæ protrusio impediretur, vel sanguinis novum statum affectantis labefactarentur conatus. Adeo ut sive materiæ heterogenæ irritanti, sive cruentæ res novas molienti febris ortus debeat, Indicatio utrobique eadem existat. Hisce positis fundamentis Therapiz methodum hoc ritu instituo.

Quoties mihi cum ægris res est, quorum sanguis vel per se imbecillior existit, (uti sæpe in pueris) vel iusta spirituum copia destituitur, (ut in decliviori ætate, atque etiam in juvenibus diuturno aliquo morbo confectis) a venesectione manum tempero. Enimverò si Phlebotomiam his imperarem, sanguis etiamnum citra ejusmodi imminutionem plus satis debilis, despumationi suæ obeundæ prorsus impar redderetur; unde totius massæ perverio, ac proinde forsitan ipsius ægri interitus sequeretur, (quemadmodum si cervicis aut alius cujusvis muhi fermentatio intempestivè sistatur, liquores illi vitium plerumque contrahunt.) Quippe particularum, quas semel exterminare cœperit, quæque, tametsi dum reliquæ cruentæ massæ æquabiliter immiscerentur, puræ extiterant, jam verò putredinem deterrimam acquirere, & cæteros humores gravi inquinamento inficere habiles evaserint, consortium naturæ ferre amplius non potest. Quanquam haud me latet ægros temerariâ sanguinis missione mulctatos, convenientium Cardiacorum usu aliquando servari, sanguinemque ad tenorem defæcationi suæ peragendæ idoneum restitui posse. Sed præstiterat plagam non infligi, quam sanari.

Artamen ubi in contrariæ indolis sanguinem incido, qualis in juvenibus athletico habitu & temperamento sanguineo præditis reperiri consuevit, primum in curatione locum Phlebotomiæ attribuo; quæ (præterquam in casibus inferius memorandis) sine salutis periculo hic omitti nequit. Nam aliàs non solum præ nimia sanguinis ebullitione, Phrenitidum, Pleuritidum, alia-

rumque id genus inflammationum periculum immineret, sed præ copia etiam, impeditio omnimodæ Circulationis, & totius massæ quasi strangulatus consequeretur.

Mensuram quod attinet, mihi solenne est cautè duntaxat sanguinis quantitatem detrahere, quantum conjicere liceat, quæ ægrum ab incommodis quibus immoicam ejusdem commotionem obnoxiam esse diximus, incolumem præstet. Aëituationem vero illam deinceps rego ac moderor, Phlebotomiam vel repetendò, vel omittendo, Cardiacis calidis vel insistenti, vel parcendo, ac denique alvum vel laxando, vel compescendo, prout motum illum vel efferrari, vel languescere animadverto.

Post Venæsectionem (liquidem ipsa juxta casus præme: oratos necessaria fuerit) sollicitus sedulusque inquirò nunquid ægrum vel vomitus, vel inanis aliqua vomendi propensio sub febris initium interturbaverit. Id si contigerit omnino medicamen Emeticum præscribo, nisi vel ætas tenella, vel insignis aliqua debilitas ægri ab eo temperandum iussit. Sane Vomitorium propinare, ubi istiusmodi prægressa est vomendi proclivitas adeò est necessarium, ut nisi humor ille expellatur, in sentinam complurium malorum difficilium sit abiturus, quæ crucem hîgent Medico toto durante medicationis tempore, ægrumque in haud leve periculum conjicient. Ex horum præcipuis, & maximè solitis est Diarrhœa; quæ ut plurimum in deservescencia Febris consequitur, quotiescunque Emetica, quando ea suadebat indicatio, omissa fuere. In febris quippe progressu, ubi malignum in ventriculo humorem nonnihil subegerit Natura, & ad intellina amandayerit, illa ab ætri humore ex hoc in stomacho fonte perpetim scaturiente usque adeò corroquuntur, ut non possit non insequi Diarrhœa.

Observavi nihilominus in Febribus inflammationis quæ malignæ vulgò habentur omissionem Vomitorii, tametsi talis vomendi propensio præcesserit, Diarrhœam, quemadmodum in aliis quibusvis Febribus, necessario non inferre; sed de ista re plura in sequentibus.

Jam autem in eo versatur istiusmodi Diarrhœæ periculum, quòd æger satis jam morbo debilitatus, enervatur ulterius, & præterea (id quod majoris est in ipsius noxam momenti) in febris declinatione, quo tempore contrahere se sanguis, ac vim suam exerere debebat ad despumationis officium peragendum, penitus præpeditur hac emissionem.

Jam verò nequid dubites humorem hunc in ventriculo nidulantem, nisi fortè vomitu eliminetur, hanc Tragœdiani (Diarrhœam dico) quasi ex insidiis aliquanto post daturum, inquisitione institutâ, nunquam sæpe non conperies, siquando Febrim hanc Diarrhœa comitetur, ægrum in morbi principio in vomitum proclivem fuisse, nec tamen Emeticum fuisse propinatum. Porro etiam compertum habebis etiam si proclivitas illa ad vomendum jam pridem præterierit. Diarrhœam tamen quamprimum Vomitorium exhibueris plerumque cessaturam; dummodo Emetico ferendo pares fuerint ægri vires: Sæpius autem observavi Diarrhœam semel obortâ, medicamenta adstringentia vel nihil omnino, vel parum admodum ad eandem sistendam

dam conferre, sive introsumpta, sive externis applicata.

Emeticum quale passim à me propinatur huiusmodi tere est.

℞. Infus. Croc. Metall. ʒvj. Oxytel. Scillit. & Syrup. Scabios. comp. ana ʒss. M. F. Emet. Quod hauriri jubeo tempore pomeridiano, duabus horis post leve prandium. Verum quod tutius, ac felicius vomitio subsequatur succedat, illud etiam in mandatis habetur, ut ʒy hogalæ ʒvj. vel viij, sint in promptu, quippe quod periculosa sint ista medicamenta nisi copiose diluantur: Ideoque quoties vomuerit æger, aut alvum exoneraverit, e vestigio sumendus erit haustus: quo facto, & inania illa tormina præventur, & vomendi conatus auspiciato procedunt.

Sæpe miratus sum dum fortè materiam vomitu rejectam aliquando curiose contemplabar, eamque neque mole valde spectabilem, nec pravis qualitatibus insignem, qui factum fuerit ut ægri tantum levaminis exinde senserint; Nempe vomitu peracto, sæva illa symptomata (nausea v. c. anxietas, jactationes, suspiria luctuosa, linguæ nigredo, &c.) quæ & ipsos excruciant, & adstantes perterrefecerant, mitigari solent ac solvi, quodque morbi reliquum est *insuper* tollerari.

Illud hic loci non omittendum erit, Si ægri conditio utrumque auxilium postulaverit, (Venæsectionem intelligo, & Vomitorium) tutum omnino esse, ut Venæsectio, Emetici exhibitionem præcedat; alias enim dum vasa sanguine distenta sunt, periculum imminet ne ex violentis illis vomendi conatibus vel rumpantur vasa pulmonum, vel Cerebrum lædatur, anulo cum impetu sanguine atque effuso, adeoque æger Apoplexia correptus pereat. Cujus rei quamvis historias aliquot commemorare possim, illis tamen hic supersedere visum est, monuisse contentus maxima hac in re cautela utendum esse.

Siquis autem quærat, quo tempore Febris Vomitorium exhiberi velim; dico, In ipso plane Febris initio, siquidem optio daretur, Emeticum propinarem: ita enim fiet, ut ab horrendis illis symptomatibus, ex humorum in ventriculo, locisque vicinis delitescentium illuvie ortum ducentibus, ægrum præmuniamus; imò verò & fortasse in ipsis quasi incunabulis opprimamus morbum, qui alias cum ægroti periculo grandescet, ac longævus evadet: nutritus nimirum dictis illis humoribus, qui vel substantiâ suâ in penitiores corporis partes transmissi cum sanguinis massa commiscuntur, vel ex ipsa mora pejores facti, atque venenata pravitate inquinati, ex foco suo jugiter pertranseunt sanguini malignam auram afflabunt. Hujus rei (ne longius abeamus) Cholera morbus exemplum nobis exhibet, sit enim aliquando ut intemperstiva opera vomitum in illo morbo cohibere sagragente, (sive illud Laudano fiat, sive adstringentibus medicamentis) eo cohibito non minus periculosam malorum catervam invehant. Humores enim acres corruptique, quorum exclusionem tantisper permittere oportuerat ut satis evacuantur, hoc pacto repulsi, vires suas, ac sævitiam in sanguine exercent, febremque accendunt, quæ ut mali moris, & gravibus symptomatibus litata esse solet, ita nisi propinato

Emetico, tolli vix poterit, etiam ægro jam ne quidem vomituriente.

Quod si nobis (ut sæpe fit) serò accersitis non licuerit Emeticum propinando, ægrorum saluti sub febris initium consulere; certe tamen convenire existimaverim ut quovis morbi tempore illud fiat, modò vires eo usque morbus non attriverit, ut Emetici vim ferre jam amplius nequeant. Equidem ego die febris duodecimo vomitum imperare non dubitavi, etiam cum æger vomiturire desisset, neque sine fructu: Eo namque Diarrhœam sustuli, quæ sanguinem in peragenda despumatione impedivit; quin & serius idem facere minimè dubitarem, nisi virium attritarum ratio prohiberet.

Vesperis, celebrata jam vomitione, semper illud ago ut tumultum ab Emetico in humoribus excitatum consopiam, & quietem conciliem; ideoque sub noctem, vel hora somni Paregoricum quoniampiam haustum exhibere jubeo. Ex. gr.

℞. Aq. papav. rhæad. ʒij. Aq. Mirab. ʒiij. Syrup. de mecon. & papav. errat. ana ʒss. M. F. Haustus.

At si vel ob copiosam sanguinis jacuram, quam curationis decursu passus est æger, vel ex vomendi frequentia, dejectionibusque in Emetici hujus usu tactis, vel ex præsentis ejusdem *insuper*, vel ex debilitate ejus, vel ex febris jam declinantis vetuitate, nullum jam super sit in posterum concitandæ nimæ Ebullitionis periculum; tum metu procul habito, vice haustus præscripti, Discordii satis largam dosin vel impermixti, vel aquæ alicui Cardiacæ sociati exhibere jubeo. Præclarum sane Medicamentum, modò ea quantitate exhibueris, quæ remedi potius quam tituli mensuram impleat.

Hic autem loci, priusquam de Emeticis dicendi finem faciam, prætereundum non est, omnino tutum non esse saltem in hac febre, Vomitoria ex infus. Croc. Metall. parata puerulis, ulivse infra adolescentiam constitutis; vel minima quantitate exhibere. Optarem equidem ut illius loco alia nobis tutiora, sed satis interim efficacia suppeterent, quæ humorem hunc, in febris declinatione, fere semper, Diarrhœam minuantem, radicatus extirpare possit; vel saltem ut medicamento aliquo idoneo acrem istam materiam, ejusque vim corrosivam ita mutare liceret, ac retexere, ut commovere Diarrhœam nequiret. Sæpius profectò mihi molestum illud accidit, quod ad infantes, puerosque febre correptos, accersitis, indicationem conspexi, quæ quidem medicamento usum suavit, cujus ope extra periculum collocari potuissent, quod tamen exhibere, veritus infelicem exitum, non sum ausus. Verum in adultis nullam inde noxam hæcenus observavi, modò cum cautionibus prædictis Emeticum propinetur.

Vomitum exantlato negotio, illud mecum ulterius disquirere soleo, utrum evacuationibus prægressis non obstantibus, sanguis etiamnum adeò exstuet, ut illius effervescentiæ limites adhuc ponendi sint, ac sufflantiæ addendum; an verò eo usque elanguerit ut indigeat incitamento; vel denique, an Fermentatio ad gradum idoneum, ac debitum reducta permitti sibi absque ægri periculo possit. De horum singulis nonnulla mihi dicenda sunt.

1. Itaque si sanguis eousque exstuet ut meried
 adhuc

adhuc suspicari liceat, agrum vel Phrenitidi, vel alii alicui molesto symptomatici, ex nimia sanguinis ebullitione prognato, obnoxium esse, postmodum Emetici exhibiti Enema prescribo, ut

℞. Decoct. commun. pro clyst. ℥j. Symp. viol. & facch. culinar. ana ꝑ ij. M. f. Enema. Idemque repeti, pro re nata juceat; quo saepe fit ut sanguine nonnihil ventilato refrigeratoque, illius effervescentia satis compescatur. Interdum tamen viū venit, ut Venæsectionem etiam semel adhuc atque iterum repetere necesse sit, nempe in temperamenti admodum sanguineis, & ætate florentibus, aut in iis qui nimio vini usu, inflammationem quandam diathesin sanguini suo impresserunt. Verum plerumque tanto, tanque insigni remedio (quale quidem est repetita Venæsectio) non opus est; ac proinde, si prædictos casus exceperis, effervescentiam illam Enematum adminiculo satis reprimemus. Quare si sanguis nimium æstuet, atque effervescat, singulis, vel alternis diebus, prout res postulat, Clysterem injici jubeo, idque ita fieri ad decimum usque morbi diem vel circiter. Verumtamen si magna vis sanguinis missa fuerit, vel æger sit ætate provecus, tunc temporis Enemata nulla impero, etiamsi sanguis multum effervuerit. In his etenim casibus, uti metuendum non est, ne omnis Clysteribus, ebullitio concepta eo usque procedat, ut insignis alicujus, & intesti symptomatici periculum imminuat; ita certissimum est, eorundem usu sanguinis robur, ac vim, atque (ut ita dicam, etiam minus proprie) tonum relaxari, eatenus quidem ut, in senibus præcipue (neque enim illis Enemata tam prosperè ac juvenibus cedere solent) Naturæ opus inturbetur, atque impediatur. Quod si vena secta quidem fuerit, sed non multum sanguinis emissum, tunc, uti dixi, Clysteres adusque decimum, plus minus diem impero; nonnunquam etiam adusque duodecimum; quod in illis præsertim obtinet, quibus sanguinem demere non audeo. Sunt enim, qui post Intermitteutes Autumnales (sive Tertiana fuerint illæ, sive Quartana) febribus continuis, ex purgationis, in præcedentis morbi fine, defectu, corripuntur; His si sanguinem miseris, periculum est, ne sedimentum illud, quod prægressa fermentatio deposuerat, in massam sanguineam resorbeatur, novasque turbas excitet: Venæsectionis itaque loco, rebus ita se habentibus, Clysteribus utor, & quidem ad diem usque duodecimum, modo æger sit juvenis, atque fermentatio nimis exaltata.

II. Verum e contrario, si Venæsectionem adhibueris, si ve omiseris, si sanguinis effervescencia nimis elanguescat, adeoque stimulo egeat, ne Naturæ juvanda in partem fuerit; tunc equidem a Clysteribus etiam ante diem decimum, multoque magis eo præterlapso, prorsus abstinendum arbitror. Quorsum enim jacentem jam, & nimis elanguidam fermentationem ulterius compescere atque reprimere conremur? Quod si vero post tempus illud, in morbi nempe declinatione, Clysteribus utaris, profecto non minus absolum id fuerit, atque ab omni ratione alienum quam si quis effervescenti Cerevisiæ nimis amplum spiritum aperuerit. Etenim aperto illo spiraculo prædictur Natura, quo minus ad morbi causam materiam separa-

tionem unitis viribus incumbat, postquam igitur vel mediantibus evacuationibus idoneis, atque opportunis, æger se quasi positus fuerit, quantum ad illa symptomatica attinet quæ ex nimia ebullitione nascuntur, vel morbus jam declinaverit; quanto magis attrictam illi alvum præstitero, tanto magis eam extra periculum aleam colloco: nempe febrili materia ad suam concoctionem suaviter, ac blande propendente. Quocirca si præcedentes evacuationes, sanguinem massam quasi laxitatem quandam induxerint, vel inducere minentur, vel æger ante debitum tempus febre levatus fuerit, vel etiam febris ad ultimum suam periodum pervenerit, non solum Enemata procul haberi volo, sed & Cardiacorum opem atque auxilium suggerendum arbitror, atque non ad alvum adurientem memet accingo.

Cardiaca vero quod spectat, quoniam usu mihi compertum est, eadem propere nimis exhibita non contemnendam noxam inferre, (vena scilicet nondum secta metuendum est ne materia cruda adhuc existens in Cerebri membranas, &c. aut pleuram decumbat) ideo curæ mihi semper est, ne Cardiaca exhibeantur, dummodo vel nihil omnino, vel parum sanguinis emissum, nullaque alia insignior evacuatio facta fuerit, aut æger ætatis vigorem nondum exegerit: neque enim video, quorsum sanguis ejus per se satis locuples, ulterius in ipsius perniciem distenderet: Locuples autem atque opulentus satis est, neque succendiculis eget, quamdiu evacuationes insignes calorem ejus insitum non prostraverint. Hujusmodi ægri domi nascuntur Cardiaca, & quæ foris adduntur, aut frustranea sunt, aut etiam damnosa: quapropter ego vel nulla omnino, vel saltem levissima, permiserim. Interim vero si æger ex profusis evacuationibus lassus & languidus, vel ætate fuerit provecus, solenne mihi est, Cardiaca vel in ipso febris initio propinare: Morbi autem die duodecimo, negotio tunc temporis ad secretionem vergente, medicamentis calidioribus liberalius indulgendum censeo, (imò paulo maturius idem fieri potest, modo non metuendum sit, ne febrilis materia in partes principes præeps agatur.) Namque hoc tempore quo magis calefecerim, eo magis concoctionem accelerabo. Neque revera cogitando assequi possum, quid tibi velint Medici, cum sua præcepta toties ingemant, de remediis ad promovendam febrilis materiam concoctionem adjuvantibus, id quod in morbi initio accessit saepe faciunt: nihilominus tamen eodem ipso tempore medicamenta ejusmodi imperare non dubitant, quæ febrem scilicet attemperare possint. Profecto enim est Febris ipsa Naturæ instrumentum, quo partes impuras à puris seceruat: hoc illa modo plane imperceptibili præstat ab initio, atque etiam in ^{duplex} morbi, verum in ejusdem declinatione apertius, atque manifestius idem opus aggredditur, id quod ex urina cernere licet. Materiam febrilis concoctio nihil aliud revera significat, quam peccantis materiam a sana separationem: Hanc igitur ut acceleres, non satagendum necio quibus, attemperantibus, sed Febris effervescencia tandem permittenda est, quamdiu salus ægri passim fuerit; cum autem finem spectat, atque declinationem, secretionem jam conspicuas,

tunc

tunc quidem calidioribus medicamentis illam à tergo insequemur, ad rem eo celerius ac certius perniciendam. Atque hoc reip̃a est, febrilis materiam concoctionem promovere; cum evacuationes, & refrigerantia moras neceant, & curationem impediunt, ipsamque sanitatem jam appropinquantem abigunt, uti sæpius à me fuit observatum.

Si fermentatio satis progrediatur, despumatio circa diem decimum quartum peragetur: Verum si refrigerantia quælibet serius adhibeantur, atque ita eorum ope effervescentia sufflaminetur, mirum non est, si febris ad diem vicissimum primum, quin & in effectis corporibus male tractatis multo longius excurrat.

Illud porro observatu dignum est, quandoque accidere, ut æger Clysterum, aliorumve catharticonum usu circa declinationem morbi intempestive præscriptorum, parum alleviari videatur, imò nonnunquam apyrexia omnimoda frui, post diem autem unum alterumve lenties, non tam pristinam febrem vires suas redintegrasse, quam novam accendi; rigor nimirum, atque horror subito invadet, quem mox excipiet calor atque febris, idem stadium (nisi forsitan in intermittentium classem se reponat) decursura, quod in præcedentibus monstratum fuit. Cum ita se res habeat, non aliter tractandus est æger, quam si antea febre non detentus fuisset, verum quoad res agendas calcata jam vestigia repetenda; despumatio enim, quæ cæptæ jam ebullitioni debetur, nonnulli prædicti temporis, scilicet 14. dierum spatio peragetur, utcumque molestum fuerit ægro, à prægresso morbo satis jam debilitato, consueque sanitatem expectare.

Cardiaca, quæ adhibeo, passim sunt ejusmodi, quæ statim subindicabo, quorum moderatioribus utor in morbi principio, æstuatione maxime fervente; gradatim ad ulum calidiorum, juxta morbi progressum, vel ebullitionis gradus pergens; semper memor licere, siquidem multum sanguinis missum, vel æger senex fuerit, ut Cardiaca fortiora administrentur, quam cum vel nulla præcesserit Venæsectio, vel æger ætate floruerit:

Moderata autem illa quæ dixi. Cardiaca sunt ex aquis stillatitiis (verb. gr.) Borag. Citri. Scord. compos. fragor. Theriacal. cum admixtis Syrup. Melissophyll. Fernel. Caryophyll. & de succo Citri. &c. fortiora verò ex pulver. è Chel. Cancr. Comp. Bezoar. Confect. de Hyacinth. Theriac. Androm. aliive ejusdem indolis. Quæ sequuntur in frequenti usu sunt.

℞. Aq. Borag. Citri. Scordii compos. & ceras. nigr. ana ℥ij. Aq. cinamomi hordeati ℥j. Margarit. præparat. ℥ij. Sacchari Crystallini ℥i℥. Misce, sumat cochl. iv. sæpius in die, præcipue in languoribus.

℞. Aqu. totius citri, & fragor. ana ℥iij. Aqu. cord. frig. Saxon. ℥j. Aq. theriac. stillat. syr. Melissophyll. Fernel. Caryophyll. & de succo citri ana ℥℥. Misce, F. Julapium, de quo capiat sæpius.

℞. Pulv. è Chelis Cancrorum compos. lap. Bezoardici Oriental. & Occidental. contrayervæ ana ℥j. fol. auri n. j. Misce, f. pulvis subtilissimus: Capiat ad quant. gr. xii. quoties opus fuerit; ex syr. & succo citri, Caryophyll. ana ℥ij. superbibendo cochl. aliquot Julap. præscript.

℞. Aq. Theriac. stillat. ℥iv. semin. citri ℥ij. contundantur simul & f. Emulsio. Colatura adde sacchari perlati q. s. ad gratum saporem, sumat cochl. ij. ter in die.

Plures verò formulas recensere supervacaneum arbitror, quoniam & innumerae sunt aut esse saltem possunt, & in morbi decursu juxta varia ejus tempora, ac diversa symptomata, variandæ sunt.

III. At si Fermentatione que nimium æstuet, neque langueat, eam in illo gradu relinquo, nec ullis remediis utor, nisi ægrotum vel amicorum, quibus supantur, importunitas à me aliquid extorqueat, quod ipsis citra insultu, & scopi mei fraudem placeat.

Atque hoc loco non prætermittam, me sæpius ad tenuis conditionis homines, quorum crumena prolixo apparatus Medico serendo non erat, accessitum, ul fecisse aliud post Venæsectionem, & vomitionem peractam, (siquidem eas postulasset indicatio) nisi quod ipsis præscriberem, ut toto morbi tempore lecto defixi, nonnulli juscula avenacea, & hordeacea vel similia haurirent; tenuem cerevitiā (dempto frigore) moderate biberent ad sitim sedandam; Enema ex lacte sacchar. singulis, vel alternis diebus usque ad diem decimum, vel undecimum injici curarent. & versùs febris finem cæptæ jam separatione, siquidem segnior esset, ad eam juvandam fortiozem subinde potum, Cardiacorum loco, bibere ipsis permittit: Atque ita sine ulteriore aliquo apparatu, nisi quod leve Catharticum in fine morbi addere soleam, eos salvos, & incolumes dimissi.

Sed ut ad institutum meum revertar, si prædicta methodus sollicite observata fuerit, usitato circa 15. diem, tum ex laudabilis in Urinæ separationis signis, tum etiam ex manifestâ omnium symptomatum remissione, percipio tempellivum tunc esse potionem purgantem exhibere, quæ sedimentum in prægressa fermentatione hic illic depositum subducatur; quod nisi tempellive factum fuerit, periculum est, ne in sanguinis massam remigret; ejusdemque febris recidivam conciliet; vel etiam sua in partibus naturalibus, ad quas amandatum fuit, mora, in numeram, tenacium deinceps in corpore malorum seracem abeat. Nimirum, separatione jam factâ, humores crassi ac impuri ex arteriis sanguini in venis refluuo, immixti, regressum ejus facile impediunt, ex quo varia obstructionum ac tandem fermentorum genera nascuntur.

Ubi tamen animadvertendum, non adeò plane necessarium esse post febres Vernales, atque post Autumnales purgationem celebrare; idque propterea quod sedimentum à Venalibus depositum tum copia, tum qualitate terrea, malignaque ab autumnali superetur. Quod ipsum etiam in Variolis obtinet, multisque morbis aliis Verno tempore grassantibus, in quibus Purgantium omissio non tam grave periculum (quod ego quidem observaverim) quam in casibus prius memoratis, inferre solet.

Et sanè non multum is à veritatis scopo aberraverit, qui affirmaret ab hoc capite (purgandi sc. post morbos Autumnales ommissione) plurimum morborum colluviem, quam ab ullo alio. quo demumcunque causarum fonte, dependere.

Si valde debilis sit æger, vel alioquin perfecta adeo depuratio facta non fuerit ut audacter possim purgans exhibere die decimo quinto, rem differo ad decimam septimam; quo tempore sequentem, vel similem, pro ratione ægri virium, potionem propino.

℞. Thamarind. ʒʒ. Fol. sennæ ʒ ij. Rhabarb. ʒ iʒ. Coq. s. q. aq. Colaturæ ʒ iij. dissolve manna & syr. rosac. an. ʒ i. Misce, f. potio cap. mane.

Purgatione peracta, ægrum, h. ctenus lecto, ex præscripto meo, delixum, surgere, & paulatim ad prillinam victus rationem reverti jubeo. Ea quippe, quam ad hoc usque tempus præscripsi, eadem propemodum est cum illa quam modo commemorabam; Uti juscula avenacea, & hordeacea; panatellæ ex pane & vitello ovi, in aqua cum saccharo confectæ; juscula tenuia ex decocto pulli; Cerevisia tenuis lupulata, cui quandoque æstuante ardore febrili, immisceri potest succus Aurantiorum recens expressus, & super ignem ad cruditatis tantummodo sublationem coctus; & his similia, quamvis juscula Avecanæ sint instar omnium. Negare vero cerevisiam tenuem, quæ subinde in mediocri quantitate sumatur, severitas est minime necessaria, imo expensum etiam detrimentosa.

Accidit interdum (maxime in senibus) ægrum febris jam curata, & corpore satis jam superque purgato, nihilominus valde debilem esse; & quandoque tussi, interdum etiam sereatu, magnam glutinoli, viscosique phlegmatis copiam expectorare; quod symptoma non tantum agro terrorem iniecit, sed & ipsi Medico, præsertim minus cauto, imposuit, eumque in opinionem induxit, quasi affectus iste Phthisi viam sterneret; licet observaverim ego, rem adeo periculosam non esse. Hoc in casu ægrum jubeo Vinum Malaganum annosum, vel Falernum, sive Mulcatum, cum pano tosto ei immisso, bibere; quod crasin multum prægressa æstuatione sanguinis debilitati (proindeque nuper ingestorum succis assimilandis impari) corroborans, symptoma illud paucorum admodum dierum spatium abigit, ut crebrâ experientia mihi constat.

Hac ipsâ, quam proposuimus ratione, ægrum à multis affectibus, symptomatibusque, quæ malignitati tribui solent, tutum præstabimus; cum nihil magis solitum sit Medicis in arte suâ minis exercitatis, quam, quando medicamenti nimis refrigerantibus, vel usu Enematum intempestivo, crasin sanguinis ita relaxarint, Naturamque in perficiendâ sanguinis depuratione adeo debilitarint, ut animi deliquia, aliaque symptomata (quæ genuina sunt ejusmodi impedimentorum arte positorum effecta) contingant, malignitati culpam transcribere: at si diuturnitas in quam abierit morbus, cum ab hoc vitio vindicet, tum quicquid eos in medelâ deinceps fatigat, id Scorbuti acceptum referunt: quamvis re ipsâ neque symptomata, quæ accidebant, quamdiu vigebat morbus, malignitatis erant effecta, neque ea, quæ contigerunt in declinatione ejus, Scorbuti, sed utrumque rei malè geltæ debetur, quemadmodum crebrò id à me observatum est.

Non quod ego, aut quisquam alius, qui Morborum historiam vel delibaverit, nescius esse possit, Febres esse, quæ non intemperie solâ,

aut putrido tantum calore, sed etiam maligna qualitate (cujus signa evidentissima in ægris non possunt non apparere) contentæ: vel etiam quod inuicias eam, complicari aliquando cum febre Scorbutum & complures alios morbos posse; hoc tantum dico, has affectiones inmerito sæpe in litem vocari.

Si fermentatio sanguinis ritè processerit, fiet omnino materiæ morbificæ despumatio intra tempus modo dictum. At si remedia refrigerantia, vel Enemata seriùs exhibita fuerint, multo, longius excurret febris, præcipue in hominibus grandævus, malè a medico curatis; ad quos quandoque accersitus, postquam febris per quadraginta dies & amplius laboraverant, nihil non expertus fui quo despumationem sanguini inducerem: sed nempe usque adeo debilitatus erat sanguis, partim senio, partim enematis, & medicamentis refrigerantibus, ut neque Cardiacis, neque ullis aliis corroborantibus remediis scopum meum assequi possem; sed vel illorum febris, virium suarum tenax permanebat, vel alioqui, si adesse videretur *anorexia*, vires ægrorum admodum prostratæ erant, & tantum non mortuæ.

Aliorum autem remediorum successu frustratus, alio consilium vertere sæpe coactus fui, cum successu non vulgari; nempe adolescentulorum vivum vegetumque calorem ægris applicando. Nec est quod quis multum miretur, hæc methodo, licet multatâ, ægrum tantopere corroborari, naturamque debilitatam juvari, ut semet à materiæ secernendâ, eliminandâque reliquiis exoneret; cum proclive sit intelligere, insignem effluviis vegetorum copiam à sano, & athletico corpore in corpus ægri exhaustum transfundi. Neque unquam comperi iteratam calentium linteorum applicationem ullatenus id præstare valuisse, quod modo præscripta methodus præstitit; ubi calor applicatus tum magis est humano corpori congener, tum simul blandus, humidus, æqualis, perennisque. Atque hæc ratio, spiritus, & halitus, forsitan Balsamicos, in ægri corpus immittendi, ex eo quo ipse illam adhibui tempore, licet aliena primum videretur, ab aliis cum successu felici fuit adhibita: neque profectò me pudet hujus remedi memuisse, tamen petulci quidam homines, atque arrogantes, omniaque vulgaria ingenti supercilio contemnentes, me forsitan hoc ipso nomine aspernabuntur. Ego enim proximi mei commodum, ac salutem vanis illorum opinionibus longe anteferendam censeo.

Methodus hæcenus enarrata, si quis illam prudenter, & cum destinato animi consilio observaverit, ægros, si non ab omnibus, saltem à plerisque molestis illis symptomatibus immunes præstabit, quæ hanc Febrem vel comitari, vel eidem supervenire solent, quæque Medicum animi ancipitem, atque sæpe in curationis decursu consilii penè expertem reddunt, in id & illius curæ commissos non raro è medio auferunt, etiam si morbi natura mortem non interminari visa sit. Sed quandoquidem vel ægrorum culpâ, Medicum non satis opportune accersentium, vel ipsius Medici minori live peritiâ sive cautelâ, ejusmodi accidentia sæpius oborta cernuntur, non gravabimur peculiarem eorundem curam summam hic attingere; verum ad ea tantum

tum, ymaginatio, nec reſtrictam, quæ, tamenſi ſapienter, & cunctis potuerint, modo viâ, atque ordine prædicto, quis uſus ſunſet, cum tamen ſe vel acciderint, diuerſam quandam, ſibi que propriam etiam poſſulant.

Phreſis. Atque (ut hinc ordiar) ſi æger, vel calidiora medicamenta nimis propere atque intempeſtively ſumendo, vel calido nimis temperamento ſua natura ſtreus, in Phrenitidem præcipue fuerit; vel (quod proxime illuc accedit) ſi non omnino dormiat, ſepe exclamet, aut inconditis vocibus utatur, ſi vultu ac loquela ferociat, ſi medicamenta, potumve communem avidè & qualiſi raptim bibat, vel denique uſum non habeat ſuppreſſam; in hoc, inquam, caſu, liberaliori manu, quam ſuprà inuſſi, ad veniſſectionem, clyſteres, ac medicamenta refrigerantia me accingo, verno tempore præſertim, (quo etiam aliâs ſymptomate hoc non apparente, iuvenes atque vegeto calore prædicti, ejuſmodi auxilia ſine mul. o diſcrimine admittunt) atque talibus remediis utens, ægrum conſequi ſolentem conor, donec in diuturnitatem aliquam affectus excurrat, quo tempore non admodum difficile erit eum & a morbo & a ſymptomate una eademque operâ liberare: id quod nec Narcoticum aliquod medicamentum in largiori paulo doſi exhibendo. Quamvis enim febre vigente, quæ *ſapienter* vi prædicta ſunt non omnino proſint, neque æſtinentia a Medico ſcopum feriant; tamen opportune, & in declinatione morbi adhibita, præclaros effectus edunt: antea vero prodeſſe non poſſunt, partim quia fermentationem vi atque impetu procurrentem ſiſtere nequeunt, etiam in maxima doſi exhibitâ, partim verò (quod quidem majoris adhuc momenti eſt) materię peccanti tunc temporis maſſæ ſanguineæ æquabiliter admixtæ neque verſus ſeparationem adhuc vergenti, ab exhibitio huiſmodi medicamento manus injicitur, adeoque depuratio illa tantopere expetenda impeditur. Verùm ſive hæc ratio ſit huiſce phænomeni, ſive alia aliqua magis abſtruſa, judicent illi, quibus animus atque otium eſt talia ſpeculari. Interim ex fideli atque idoneo obſervationum plurimarum complexu rem ipſam certiffimam eſſe pronuncio, *Laudanum*, vel alia quævis Narcotica in principio, augmento, vel ſtatu huius febris ad ſymptoma hoc levandum, vel non prodeſſe omnino vel quod ſæpe accidit, etiam obelle; verùm in ejuſdem morbi declinatione eadem mediocri doſi adhibita non ſine ſuccellu uſurpari. Scinſel equidem Narcotico die morbi duodecimo uſus ſum, nec fruſtra; citius autem nunquam proſpere exhibitum novi. Quòd ſi autem illius uſum ad decimum quartum uſque diem diſtuleris, tanto magis proficuum evadet, ſeparatione nimirum perfectiori tum factâ. Neque vero hæc mora, tamenſi fortè aſtantes magnopere perterrefaciet horrendum hoc ſymptoma, mortem ſtatim ſubinfert; cum ſæpe obſervaverim, hanc rem plerumque inducias terre poſſe ac ſolere, donec ad Narcotica deſcendere fuerit opportunum; ſaltem ſi caveatur nè Cardiacis, calidiſque medicamentis adhibitis, intemperies cæpta accendatur uberius, quo caſu ægri ſubito pereunt. Narcotica, quibus ego uti ſoleo, ſunt vel *Laudanum Lond.* ad gr. 16. vel ſequens.

℞. Flor. Paralyſ. M. i. Coq. ſ. q. aq. Ceraſor. nigr. Colaturæ 3 ij. Diſſolve ſyrup. de meconio 3 ſſ. ſucci lunonum Cochlear. 3. Miſce.

Vel ℞. Aqu. Ceraſ. nigr. 3 ſſ. epidem. 3 ij. Laudan. liqu. gutt. xvi. Sy. Caryoph. 3j. M.

Illud unicum hic addere placet, quod ad hanc rem obſervallè non inconſultum arbitror; nempe ſi ſymptoma hoc conſequi inducias ferat, & febris adeo in diuturnitatem abeat, ut æger ante aſſumptum Narcoticum commodè purgari poſſit, medicamentum illud tantò felicius effectum ſuum editurum. Quocirca ego imperare ſoleo Pil. cochl. ma. 3 ij. in aq. Beto-nicæ diſſolut. atque hoc 10. vel 12. horis ante Narcotici exhibitionem. Neque metuendum eſt a tumultu illo, quem calidior illa maſſa pil. alias excitare ſolet; ſubſequentis enim Narcotici viſ penſabit illas turbas, & quietem ſuaviſſimam, blandiſſimamque inducet.

Quòd ſi vigilia ultra febrem excurrant, ceſſantibus aliis ſymptomatibus, obſervavi, linteam in aqua roſar. immerſum, & frigidè ſincipiti, ac temporibus applicatum, plus quam Narcotica quævis prodeſſe.

Tuſſis. Sæpe accidit, ægrum per totum morbi decurſum tuſſi moleſtiâ divexari; nimirum commota vehementer ac tumultuante ſanguineâ mole, omnibus jam ad ſeditionem & partium ſtudia ſpectantibus, ſit ut humores quidam ſoluti, diſſuſcentique e maſſâ ſanguinis per vascula pulmonaria, vel etiam per diapedeſin in tracheæ membranâ interiorem, teneriorem ſcilicet atque exquisito ſenſu præditam, transferantur: hinc tuſſis oboritur; quæ prius ſicca eſt, quoniam tenuis adhuc materia vim expultricem eludit; mox craſceſcit, atque expectoratu difficilis evadit, eò quòd ſenſim febrili calore torreatur, atque aſſetur: hinc ſit, ut ſuffocationis metu percellatur æger, utpote cui vires deſunt ad lentam hanc viſcidamque materiam tuſſi eliminandam. Ego in hoc affectu raro alio aliquo medicamento utor præter oleum amygdalarum dulcium recentè expreſſum, niſi forſan acciderit (accidit autem aliquoties) ut ægrotus oleum proſus averſetur; tunc enim vulgaribus illis pectoralibus, ut licet, opem ferre conamur. Interim oleum illud amygdalarum, ſiquidem illo per ægrum uti licuerit, Bechicis aliis antepoſendum cenſeo, ob eam cauſam præcipue, quòd cum necelle ſit hæc liberalius, & majori quantitate exhibere: modò prodeſſe velimus, hoc pacto ventriculum jam ſatis ſuperque debilem & ad nauleam proclivem oneramus; nonnunquam etiam eadem operâ præpedimur, ne reliqua, eodem ipſo tempore tranſigenda, procuremus. Neque verò ſatis aut intellectu aſſequor, aut experienciâ edoctus ſum, cur ab huius olei, quod jam diximus, uſu in febris abhorreamus, eo quòd ſcilicet inflammabile ſit, adeoque metuendum ne febrim adaugeat. Fac enim, illud ſua naturâ calidum eſſe, certè tamen calor ille tantus non eſt, ut aliundè non abundè penſetur: præ cæteris enim manifeſta vi pectori conducit, aperitque vias, ac lenit, adeoque expectorationem promovet, quâ (præſertim ſi copioſior acciderit) tum exoneratur ſanguis à moleſto humore, commodè jam excreto, tum eadem operâ nonnihil refrigeratur; adeoque me non admodum malè habet.

si quando viderim symptoma hoc intercurrere, cuius beneficio non parum etiam agro beneficii accedit. Illud unicum nunc moneo, una, eademque vice tutum non esse, totis cochlearibus hoc oleum exhibere, periculum enim est ne & ventriculo nauseam & alvo duxum inducamus: parce itaque sed frequenter interdium, noctuque propinandum erit, quo non solum expectoratione facta tussim leniemus, verum etiam, quod alicujus momenti est, attritas agri vires blando nutrimento nonnihil solabimur.

Narium hæmorrhagia. Fit nonnunquam, ut hæmorrhagia narium superveniat, siue quod medicamenta nimis calida in morbi initio merant exhibita, siue quod ebullitio non satis coercita fuerit, agro nempe vel in florenti ætate constituto, vel anni tempestate coadjuvante. Hoc si fiat, non admodum juvabunt ea, quæ ad sistendum sanguinis motum vulgo neri consueverunt, quæ sunt venæsectiones, ligaturæ, medicamenta adstringentia, atque agglutinantia, vel etiam sanguinis æternum in contempnantis, &c. quamvis enim pro Medicorum consilio, ac prudentia, his atque huiusmodi aliis uti liceat; in eo tamen cardo rei vertitur, ut idoneo aliquo medicamento sanguinis ebullitioni framm imponatur, quod sistat, negatque illius impetum in præcipitia quæque ruentem. Verum quidem est, si symptoma seorsim spectetur, ea quæ supra enumeravimus (ac venæsectionem potissimum) accommodata satis esse; nec ego ipse dubitarem, illdem uti; sed nempe symptomaticis hujus causam (saltem si phlebotomiam exceperis) non satis attingunt, quam profectò non majori ratione per prædicta tollere, quam si gladio ignem extinguere satageres. Ego itaque in hoc casu, frustra aliis tentatis, tale quidpiam adhibere soleo, quale nunc subnectam.

℞. Aq. Portulacæ, & papaveris ceratici ana ʒiʒ. Syrup. de meconio ʒvi. Syrup. paralyseos ʒʒ. M. F. Haustus. Noli n. autem hæc ita intelligi, quasi hæmorrhagiam quamlibet ita statim curari velim; quin potius illa sæpe permittenda est, atque agro plurimum prodesse potest, partim nimiam ebullitionem reprimendo, partim etiam critice aliquando morbum solvendo. Atque revera parum proderit huic symptomatico framm prædictum aptare, priusquam illud aliquantisper excurrit, vel etiam priusquam vena in brachio secta fuerit. Illud diligenter advertendum est, hanc ipsam, atque alias omnes immodicas hæmorrhagias peculiare illud obtinere, quod quamprimum illæ quomodocunque sedatæ fuerint, nisi leniens aliqua purgatio celebretur, metus est ne recidivam æger patiatur; proindeque purgandum erit, quamvis (si Febris tempora spectentur) serius aliquanto id fieri soleat, atque debeat, nisi symptoma hoc acciderit.

Singultus. Hoc symptoma plerumque senibus accidit post copiosas evacuationes, vel per secessum ex diarrhœa, vel maxime per vomitiones, atque sæpe numero mortem præ foribus adesse denunciat. Ingenue fateor, me mihi met ipsi de Singultus causa, disquirenti satisfacere non posse; nihilominus observavi, sæpe illum ex turbis, ac tumultu ab asperioribus medicamentis in ventriculo, locisque vicinis excitato, ortum

ducere, quibus sedandis atque in pristinam pacem reducendis cum naturæ vires non sufficerint, ut ut ingens periculum imminet. proindeque consentaneum existinavi, curam eo dirigere, ut quod natura per se nequibat, artis adminiculo iussu periceret. Dialcordium igitur largi dosi exhibitum, nempe ad ʒij. à scopo meo non aberravit; cum semine anethi, alutque, quæ tanquam specifica decantantur, usus nihil protulerit.

Diarrhœa. Si in morbi hujus decursu Diarrhœam obortam contempneris, quæ (uti jam alicubi supra notavimus) accidere tum solet, cum in morbi initio vomitorii propinandi indicatio se obtulit, neque tamen illud propinatum fuit; dico in hoc casu convenire, ut quovis morbi tempore (nisi vires contra indicaverint) Emeticum exhibeatur, etiam si unpridem illa ad vomendum propensio præterierit. Quoniam autem hac de re latis, opinor in superioribus pagellis à nobis dictum est, illud hoc in loco duntaxat annexam, quid facto sit opus, si exhibitio licet emetico nihilominus Diarrhœa supervenerit. Quod tamen oppido ratum est, nisi in Febre inflammationis ubi vomitorium, hoc symptoma non solum non impedit sed quandoque creat; quod notatu dignum est. Itaque cum sic se res habuerit, præ quovisvis attringentibus huiusmodi clysterem profuisse comperi.

℞. Cort. granator. ʒi. ros. rubr. p. ij. Coq. in lactis vaccini s. q. Colaturæ it. ʒ. dissolve Dialcordii ʒij. M. F. Enema. Non suaserim ut majori quantitate Clysterem injicias, quamvis enim propria vi adstrictionem polliceatur, metuendum tamen est, ne sui mole laceat intestina, adeoque fluxum alvi, quem consopire animus erat, uberius provocat.

Sed forsitan objiciet his aliquis, magis è re videri, ut, præsertim declinante morbo, diarrhœam, siquidem acciderit, permittas potius quam sistas, quandoquidem fluxus ille alvi nonnunquam criticus est, morbumque solvit. Respondeo, me non inicias iturum, neri aliquando, ut febris per hanc portam sibi viam taciatur, atque effugiat; verum illud rarius accidit, quam ut illius spe quicquam moliamur: quin & ratio illa, quæ de medela februm universim loquuti, fluxus hujusce sistendi necessitatem ostendere conati sumus, etiam hic omnino locum obtinet. Nunc autem illud addendum est, mea quidem sententia animadversione non indignum, nempe ad genuinam sanguinis depurationem non tantum necessarium esse illam quarondam partium secretionem, quæ per sæges fit, sed requiritur etiam ut secerentur alia, tanquam flores, id quod in aliis etiam liquoribus opulentis atque heterogeneis quotidie cernimus. Itaque si Diarrhœa nimium induleris, mediam solummodo depurationem, tantopere expetitam, procurabis atque etiam forsitan, quod postremo in loco rejiciendum erat primo excerneretur. Fateor equidem separationem illam per flores jam factam (quæ, ut obiter id attingam, sensim & sine sensu peragi solet, atque plerumque paulo pleniori alacritate potius quam sudore manifesto) Diarrhœam, si fortè acciderit, periculi non multum interminari. Sciendum tamen est, illam tum non aliunde accidere, quam quod purgatio subducendis facibus dicata, non opportune

tunc exhibita fuerit; quæ quidem fæces morâ sua fermenti alicujus maligni indolem adeptæ, intestina jam ad excretionem irritant, stimulantque; ut omittam dicere, liquidissimam illam excrementorum consistentiam (tali enim formâ plerumque visuntur) satis indicare ea pro critica morbi solutione habenda non esse.

Item. Forſan etiam inter symptomata Febribus supervenientia recenseri potest iliaca passio, eo quod vomitus enormes qui initio Febrium accidere solent, huic occasionem quandoque subministrant.

Horrenda hæc affectio est, & huc usque omnium ferè judicio funesta, ex intestinorum motu inversio, ac præpoltero originem ducens. Nimirum intestinorum fibræ, quæ a superioribus versus inferiora contrahi debent, contrahuntur ad superiora, & quæcunque in intestinis continentur non versus alvum sed ventriculum protruduntur, & impetu facto ad os regurgitant; adeo ut Enemata, quantumcunque acuta, emetica evadant, uti etiam cathartica per os assumpta per vomitum subito excernuntur. Et, meâ quidem sententiâ, exquisitus ille, ac intolerandus dolor huic morbo superveniens, non aliunde oritur quàm ex præpoltero intestinorum motu modo dicto. Cum enim sinus illi quos multiplices intestinorum circumvolutiones constituunt, ita à natura formati sint ut ad descensum tæcum quàm aptissimè conducerent, cum ii, inquam, motui suis fibris contrario cedere cogantur, exoritur inde prædictus dolor; qui quidem uni parti instar terebelli inagitur, cum aut valvula quæ ad initium coli appositæ excrementorum ad ileon regressum impedit, aut alia quævis membrana ad sinum pertineas, vim hujus præpolteri impulsus sola sustinet.

Hujus verò inversionis unde dolor ille exoritur duplicem causam assignare licet. Obstructionem nempe, vel irritationem.

Primo igitur quæcunque intestina vehementer obstruunt ut nihil per inferiora descendere valeat, hunc contrarium in intestinis motum ut producant necesse est, & nemini non notum. In horum censum ab Authoribus refertur solent fæces induratae, flatus crassi magnâ copiam collecti, ac intestina velut in nodum convolventes, constrictio intestinorum in hernia, inflammatio denique, alique tumores magni, qui cavitatem internam intestini occludunt. Interim verò haud negandum quod motus contrarius hisce causis originem debens, potius ingestorum, quàm intestinorum motus habendus, neque hæc totius intestinorum ductus inversio est, sed illorum tantum quæ supra sedem istius obstructionis sita sunt. Quam ob causam affectus iliaca hinc perfecta, à me notha appellatur.

Secundo verò opinor, quod in affectu iliaco causa inversionis peristaltici intestinorum motus ut plurimum ita se habet. Nimirum ex tumultuante sanguine in Febre nuper conceptâ, in ventriculum & proxima intestina deponuntur humores acres & maligni, ex quibus ventriculus primò motum suum invertit ac violento impetu materiam molestantem in eo contentam per os rejicere cogitur: Ventriculi tandem motui validiori, intestina tenuia ipsi continua jam debilitata cedunt, & cum his demum majora in consensum trahuntur, vomituriente ventriculo quasi

chorem ducente. Hunc affectum verum ileum voco, & ille hujus loci est. Methodus cum curandi hætenus fere incognita fuit, quicquid nonnulli jacent de usu argenti vivi, & globulorum, quæ præterquam quod parum conducunt, noxam sæpe haud continentendam merentur. Ego cum felici successu hæc methodo utor.

Quando liquet ex Clysteribus per os rejectis & aliis signis verum esse ileum, tunc in hæc tria entor. 1. Ut contrarius ille ventriculi motus, qui similem motum in intestinis efficit, impediatur. 2. Ut intestina acri humore debilitata corroborentur. 3. Ut ventriculus ac intestina ab istis humoribus liberentur. Quibus indicationibus ut satisfaciam, curationem hoc ritu instituo. Primo sili absinthii ℥j. ex cochleari uno succi linonum mane, & sero sumendum præscribo, intermediis vero temporibus aquæ Menthae stillatitiæ sine saccharo, autove quovis additamento cochlearia aliquot bis quæque hora propino, cujus vel solius repetito usu & vomitus & dolor ex eo natus subito evanescent. Dum hæc sunt catulum viventem nudo ventri indefinenter accumbere jubeo. Postquam verò dolor cum vomitu per spatium bidui triduive omnino cessaverit, tum pil. coch. ma. ʒj. in aqua Menthae, dissolutam exhibeo, quam etiam aquam (quæ certis vomitus recursus prævertam) toto cathartico tempore sæpius sumendam injungo. Neque catulus removendus antequam usum pilularum ager aggrediatur.

Observavi frustra pilulas istas vel quodvis aliud catharticum, utcumque forte, propinari, donec ventriculo corroborato, atque adeo ad motum naturalem reducto, intestina etiam ad proprium motum æque reducta fuerint. Alias enim cathartica omnia intus assumpta emetica evadent, & plus damni quam commodi inferent. Inde est quod remediis purgantibus vim facere non aggredior donec per spatium quoddam medicamentis istis ventriculum inspicientibus usus fuerim.

Vicium valde tenue in ægro præscribo, ita ut nonnisi cochlearia aliquot jusculi ex pullo Gallinaceo parati sorbendi bis vel ter in die permittam. Interim vero ut per totam ægrotationem in lecto decumbat jubeo, donec perfectæ sanationis signa appareant, ac etiam post sanationem per longum tempus in prædictæ aquæ usu persistere & lancis duplicatis ventrem, a frigore bene defendere impero, quo minus recidiva fiat. cui hic affectus præ omnibus aliis est obnoxius.

Pauca hæc universam meam in curando hoc affectu methodum exhaustiunt, quam a nemine consulto ob simplicitatem suam & splendidioris, sive verborum sive pharmacorum apparatus defectum aspernatum iri confido.

Atque hæc sunt illa symptomata, quæ in febre hac occurrere solent. Sunt autem & alia quædam, quibus memorandis nunc supersedebimus, partim quidem, quoniam ea minoris momenti sunt; partim vero, quod peculiarem nullam curationem postulent, febre enim rite tractatâ sponte sua cessant.

De Febre continua hujus Constitutionis, ac de symptomatibus ejus hætenus.

Quandoquidem, ut jam sumus præfati, quæ

prædidos annos omnes Constitutio pervasit, producendis omnium generum Intermittentibus tam egregie favit, quas tum de illis teci observationes haud indiligentes, hic impertiam: Addam insuper & quæ de paucis illis intermittentibus observavi, quæ ab illo deinceps tempore sporadice contigerunt, quo minus orationi solum insequentium deinceps annorum historiam complectentis, cogar interciderè.

Primo loco, quo naturam illarum atque generum conjecturâ saltem assequamur, advertendum est, quòd in paroxysmus febrium intermittentium hæc tria tempora spectanda sunt. 1. Tempus Exhorrescentiæ. 2. Tempus Ebullitionis. 3. Tempus Despumationis. Et quidem ad exhorrescentiam quod attinet (ut de his rebus summam loquar) ego illam exinde oriundam arbitror, quòd materia febrilis, quæ nondum turgescens à massa sanguinea utcumque assimilata fuerat, jam tandem non solum inutilis verum & inimica naturæ facta, illam exagitat quodammodo atque lacessit: ex quo fit ut naturali quodam sensu irritata & quasi fugam mota, rigorem in corpore excitet atque horrorem, aversationis suæ testem & indicem. Eodem plane modo, quo portiones purgantes à delicatius assumptis, aut etiam toxica incaute deglutita, horrores statim interire solent, aliæque id genus symptomata. Natura itaque hoc pacto irritata (ut ad tempus ebullitionis jam transeamus) quo facilius hunc hostem à suis cervicibus depellat, fermentationem aggreditur, solemnem nempe machinam, qua in febris & quibusdam aliis acutis morbis uti consuevit, cum sanguinis molem ab intestinis inimicis liberare conetur: hujus enim effervescentiæ beneficio disjuncta peccantis illius materiæ partes, quæ sanguini æquabiliter admixtæ fuerant, aggregari quodammodo incipiunt, atque adeo leviori operâ subigi possunt, ut ad despumationem opportune evadant. Et quidem ut hoc fiat, vel ex eo plurimum referre constat, quòd qui ex febris intermittentibus moriuntur, siquidem in paroxysmo pereant, in primo illo tempore (exhorrescentiæ scilicet) fato fungantur, nam si ad tempus effervescentiæ pertigerint, saltem pro illa vice non moriuntur. Atque per hæc duo tempora res ægrorum in angusto versantur; quibus elapsis, tertium tempus quod despumationi dicatum est, insequitur, quo succedente, symptomata omnia primo leviora fiunt, atque tandem plane evanescent. Despumationis autem nomine nihil aliud significatum volo, quàm materiæ febrilis jam subactæ, & quasi devictæ, expulsionem, seu separationem; atque illud quod separatur, partim (ut in aliis liquoribus cernere licet) florum, partim sæcum rationem & sortem obtinet.

His ita positis, videamus quomodo hæc, ut redeat Paroxysmus, quandoquidem ægrorum fors in vado jam constituta videtur. Nimirum febrilis materia nondum tota emigravit, sed quemadmodum apud Embrya statim temporibus sensim succrescunt, ita latens hæc materia pro tyorum ratione denuò caput effert, ac novum negotium naturæ facessit, idem stadium decurrens quod, in præcedentibus modo ostendimus. Nunc autem si quis à me causam quaesiverit, cur scomes ille delitescens effervescentiæ

præcedenti non satis subactus, ac proinde cum reliqua materia peccante non expulsus, proindeque novas tragedias daturus, non eodem modo in omni febre intermittenti progredietur (nam nunc unum, nunc duos, nunc tres dies exigit, priusquam ad maturitatem perveniat novumque Paroxysmum excitet) de hac re, inquam, si quis mihi negotium exhibeat, ego plane me nescire fateor. Neque vero ququam alius, quod sciam, in hac causa tam præclare se gessit, ut arcanum hoc opus naturæ satis enarrare videatur: Ego Philosophi non en non ambio, & quicquid mihi se mereri existimant, atque me tortassis hoc nonnunc culpandum putabunt, quòd in hæc penetralia non irrumpere conatus sim; moneo illos, ut in aliis naturæ operibus, quæ ubique nobis obversantur, vires suas experiri velint, antequam aliis dicam scribant. Libenter enim quasierim, cur equus ad *caput* suam pertingat septem annorum spatio, homo 21. cur in plantarum regno, hæc *Mense Maio*, illa *Junio*, illa alio, florere soleat, ut innumera alia nunc sileam. Quòd si doctissimos quosque viros non pudeat suam ignorantiam in his rebus palam fateri, non video, cur mihi vitio verti debeat, si in re non minus difficulti, atque forsitan prorsus inexplicabili, manus ab *involuntariis* abstinere: quippe cum persuasissimus sim, naturam non minus hic loci quàm in aliis quibuscunque, methodo quadam certâ, atque ordine progredi: quartanosa enim (ut sic dicam) ac tertianosa materia non minus naturæ legibus subjacet, illique regitur, quàm alia corpora quælibet.

Cum rigore atque horrore in universum Intermittentibus omnes incipiunt, cui mox calor succedit, atque huic deinceps sudor; Per unumque paroxysmum, tum illum quo riget æger, tum quo plus satis incalescit, vomitur ut plurimum, vehementer ægrotat, cum siti & lingua arida, &c. Quæ quidem symptomata insensim omnino gradibus recedunt quibus provehitur sudor, quo uberius prorumpente Paroxysmus solvi videtur. Satis rectè valet qui modo ægrotabat, donec Paroxysmus periodo sibi consuetâ denuò recrudescat; in Quotidianâ scilicet quolibet *nocturnis*, in Tertianâ alternis diebus, in Quartana tertio quoque die, calculatione videlicet facta ab unius Paroxysmi initio, ad initium subsequens. Licet haud rarò ingeminetur posteriores duo, ita ut Tertiana quolibet die invadat, Quartana per duos dies continuo, tertio quidem ab insultu libero manente; quandoque etiam ter tribus diebus continuis infestet, cum Triplex Quartana est; morbo ab isto, quem primum assumpsit, Typo nomen sortiente.

Quæ sanè Paroxysmorum reduplicatio nonnunquam a materiæ febrilis excessu activitate, quæ nimis producit, quo in casu Paroxysmus adventitius primarium antevertit; nonnunquam etiam à virium prostratione, cum in ægro nempe nimium illa fuerint dejectæ, & Paroxysmi vigor retusus, sive refrigeratione intensiore, sive etiam evacuationibus præter modum effusis: in hoc verò casu cum Paroxysmus adventitius primarium insequitur, mitius insuper, neque ita prorsus diu atque alter ægrum affligit. In priori instantia, materiæ turgescentiæ sive

ἀρροῦν tardius revertentem sibi debitam periodum nequaquam prætolatur, ac proinde aliquanto præmaturius deipumatione sua adiungitur: in posteriore autem cum sanguis non jam ea vi polleat, quæ materiam febrili uno impetu excutiendæ iuviciat, mox alium de novo Paroxysmum substituit, quo ejus reliquias è sinu suo exturbet. Quinimò e duabus hinc causis sibi invicem adversantibus forte etiam pendet tam Paroxysmorum Anticipatio in Febre Intermittente ordinaria atque regulari, quam eorundem tardior accessio; quarum utraque in his febris frequententer occurrit, quæ, ut jam dictum, *καὶ ἄλλοις* omne percurrunt, vel solum Paroxysmi tempus anticipantes, vel eo serius accedentes.

Februm autem Intermittentium quædam Veris sunt, quædam Autumnii: quanvis enim in tempestatibus intermediis nonnullæ oboriantur, quoniam tamen illæ & minus frequentes sunt, & ad prædictas reduci possunt (illas nempe quibus magis appropinquunt) idcirco omnes sub duobus hinc generibus, Vernilibus nempe atque Autumnaliis, complectar. Tempora ad quæ particulariter *ὡς ἐν τῷ πάλῳ* referuntur, menses sunt *Februarii* atque *Augusti*, licet quandoque maturius invadant, tardius etiam nonnunquam; prout scilicet uberior parciorve in aere apparatus, vel ad easdem producendas facit, vel officit, & ex coniequenti magis etiam minusve Epidemicè deprædantur. Cujus rei exemplum habemus satis obvium in Febris Intermittentibus Autumnalibus Anni 1661. quo anno nemini feminam quandam ædibus meis vicinam primo Quartanæ suæ Paroxysmo, ipso scilicet *Joanne festo* correptam fuisse. Et complures alii circa idem tempus præmaturum Febris illis correpti fuere, quæ postmodum adeo Epidemicæ evaserunt; quod argumento est magnum tum fuisse in illa quæ tunc obtrinebat aeris temperie, ad istos morbos apparatus, qui deinceps procedente anno stipatiores grassabantur.

Et quidem usque adeo necessaria est hæc Februm distinctio, ut mihi eandem in praxi sedulo contemplemur, neque de earum duratione prognostico aliquo rite facto quicquam pronunciare, neque commodo regimine ægrotum corpora curare poterimus, habitâ tum tempestatum, tum naturæ Februm diversæ ratione. Verum quidem est Febres utriusque tempestatis ingenium non planè dissimile nascisci, sive modum spectes primi insultus, qui cum horrore primum incipit, mox in calorem erumpit, ac tandem per sudorem solvitur; sive typorum discrimina, quorum respectu quædam Tertianæ sunt, tum Vere, tum etiam Autumno. Interim tamen non dubito, quin Febres istæ totâ suâ naturâ sive essentialiter distinguantur.

Intermittentes Vernales. Atque ut de Vernilibus primò dicam, illæ ferè omnes vel Quotidianæ sunt vel Tertianæ, & vel serius vel o. y. s. ingruunt pro vario tempestatis apparatu. Nam per brumale frigus spiritus concentrati vires in suo recessu sibi acquirunt, quos appropinquantis postea solis calor jam vegetos evocat, qui cum viscidis humoribus (minus tamen viscidis sunt hi, quàm quos in Autumno prægressi fervores excoxerunt ac torrefecerunt) commissi,

quos durante hyeme natura in sanguinis massa congenerat, dum avolare nituntur implexi detinentur, & quasi irretiti, adeoque vernam hanc ebullitionem concitant. Eodem planè modo quo vasa cerevisia repleta atque in arena vel cella frigida diutius reposita, si igni admoveantur, tumultum statim concipiunt, & liquor ad volatum pronus est. Sanguis hoc modo affectus purgationem sui molitur, atque spirituum volatiliu ope negotium hoc sat citò peragit, nisi fortè nimia viscidorum succorum vi instructus fuerit, qui fermentationem coeptam remorentur; & licet hoc ipsum accidat, effervescencia tamen verna raro continua sui que similis manet, verum dissilire atque in diversos Paroxysmos quasi findi solet. Sanguine enim opulentis hinc spiritibus jam turgido, natura negotium suum quati præceps aggreditur, & quarundam partium secretionem ad modum perfectæ solutionis per Paroxysmos particulares peragit, priusquam universalis separatione defungatur: Atque hæc mihi quidem ratio non inidonea videtur, quod verna tempestate, præsertim illa quæ ætatem propius attingit, paucæ Febres continuæ occurrant, nisi forte constitutio fuerit Epidemica. Fermentationes enim tunc temporis obortæ vel subito consopiantur, vel ad intermissionem properant; vel denique partes humorum ad separationem proniores, præmaturè & cum vi quadam aliò transferuntur; ex quo mox Anginæ, Peripneumoniz, Pleuritides, aliæque id genus pestes succrescunt, quæ desinente potissimum vere caput suum exerunt.

Aniadverti Febres Intermittentes Vernales rarissimè fuisse diuturnas, semper verò salutares; ita ut vel maxime senex vel debilis quispiam, officiosissimâ damnotissimâque imperitissimi cujuslibet *ἀγῆρας*, modò probus is fuerit, e medio vix queat tolli. Contigit mihi tamen videre Tertianas Vernales, quæ ob Phlebotomiam & Catharsin indebite celebratas, & regimen insuper cum morbo malè quadrans, moras traxere etiam usque ad tempus illud quo Autumnales solent invadere; quæ tempestas, eundem continenter exstinguit; ægro interim frequenti Paroxysmorum reduplicatione, & duratione longiore ita pene confecto, ut in extremis versari videatur; quæ nihilominus (quate nus mihi hactenus observare licuit) semper est eluctatus. Neque in convalescentibus ab hoc morbo mihi adhuc subiit videre gravissima illa symptomata, quæ, ut infra diceretur, Intermittentes Autumnales diuturniores sequuntur; Lethalem intelligo tonsillarum inflammationem, ventrem induratum, tumores Hydropicos, &c. Plus semel tamen adverti ægros a morbi diuturnitate & Paroxysmorum ingeminatione (accedentibus ad malorum cumulum evacuationibus repetitis) ad summam debilitatem reductos, ubi primum ceperint convalescere, in Maniam incidisse, quæ pari cum illo passu recessit, quo eorundem vires de novo redintegrabantur.

Intermittentes verò Autumnales longè aliter se habent. Primo enim Tertiana, licet quibus annis Epidemica non est, & sanos invadit, citò nonnunquam se proripit, neque pluribus stipatur Symptomatis, quàm quæ Verno tempore

re contingere solent Tertianæ, ubi tamen Epideiæ grauius, & ætate proveciores, aut pravo corporis habitu præditos ferit, haud vacat periculo; quin etiam ad menses duos vel tres, fortè etiam insequenturum usque Ver tianidem exercet. Deinde Quartanæ & periculosiores sunt, & obstinatiores longe quam sunt illæ de quibus ultimò diximus: Ubi enim natu grandiores impetunt, eosdem paucis adhuc Paroxysmis mutatos quandoque jugulant; quo in casu æger tempore exhorrescentiæ, incunteque adeo Paroxysmo, ut plurimum moritur, quod jam dictum. Quod si æger in senectutis tantum fuerit confinio, necdum ejus lumen prætergressus, licet non in eodem versetur discrimine ne inter Paroxysmos primò lacessentes luce privetur, haud tamen facilè à Febre hac elabatur, nisi vertente anno, appetenteque illo tempore quo primò corripiebatur. Nonnunquam etiam hæres lateri lethalis arundo, nec, nisi à morte, languescenti decutitur. Quartana interim Typum subinde variat, plurima etiam parit Symptomata, Scorbutum v. gr. Ventrem induratum, Hydropem, &c. Juniores verò ferendo huic morbo pares sunt, à quo nonnunquam circa Solstitium Brumale liberantur, frequentius tamen nonnulli adveniente Verno Equinoctio, vel etiam Autumno insequent, ubi scilicet venæsectionem aut Catharsin admiserint. Sæpe non que stupore sum intuitus, Infantes tenellos cum hoc morbo per totos menses sex commissos, nec oppressos tamen, sed de eodem, Herculis instar pueri, in cunis triumphantes.

Hic notandum, quòd cu usunque demum ætatis aut temperamenti fuerit, is qui Quartana corripitur, si quolibet alio vitæ tempore (vel etiam ab hoc remotissimo) eadem semel laboraverit, non diu admodum cum secundà hanc vice fatigabit morbus, sed post paucos aliquot Paroxysmos sponte suà solvetur, quod scitum dignum erat.

Intermittentium Vernalium Curatio. Intermittentium autem Vernalium curationem quod spectat, licet illas suo semper arbitrio permitendas existimaverim, & nihil prorsus movendum, cum nemo quisquam, quod sciam, earum unquam operâ facis concesserit; atque ex adverso, qui illas abigere satagerunt, remediis præsertim evacuantibus, id tantum egerint, ut morbus inde confirmatioi pertinaciùs obstitere, si tamen importuna ægri impatientia Medici opem obnixè efflagitet, Intermittentes Vernales variis modis, & quidem cum oprato exitu aggredi licet, uti mihi non infrequenti observatione abundè constitit.

Nonnunquam Emeticum tempestivè propinatum, ut nempe ante Paroxysmum negotio suo desungi possit, felicissime successit; præsertim si quantitatem mediocrem Syr. de Meconio vel cujusvis Narcotici post finitam Emetici operationem, exhibueris immediatè ante Paroxysmi insultum.

Est ubi sanitatem videas restitutam per diaphoretica, quæ sudorem in Paroxysmi solutione obortum promoveant, ægro interim optimè stragulis cooperto, id quod tantopere ac tamdiu faciendum est, quamdiu vires ægri patiantur. Atque hoc in Veris Intermittentibus,

præcipuè Quotidianis, sæpe obtinuit: humoribus enim in hac tempestate non admodum crassis existentibus, solutio alias imperfecta futura, in perfectam adolefcit, quod quidem in Autumno nunquam accidit.

Quid quod Clysteris in diebus intermittentibus per triduum vel quadriduum adhibiti beneficio, Tertianas aliquando curaverim.

Interim, si ob Phlebotomiam, liberiori manu celebratam, quò tempestat ipsa parum cautos facilè inclinat; vel ob ægri debilitatem antecedentem, spiritus illi qui subito ad despumationem se accingerent, pauperiores facti minis valeant; accidere potest, ut hujusmodi Febres Vernales, auxiliis quibuscunque frustra tentatis, Autumnalium diuturnitatem æmulentur. Sed sanè non solent illæ eousque durare; quippe quæ vel sponte suà desinant, vel leviori remedium opè facilè in fugam vertantur.

Intermittentes Autumnales. Intermittentes autem Autumnales non tam levi operâ se amoveri patiuntur. De illis igitur nonnulla mihi dicenda sunt. Si Autumnalis Constitutio fuerit Epidemica, circa Junium adultum solent invadere. Sin minus, Augustum præstolantur & Septembris initium: in subsequens verò mensibus rariùs occurrunt.

Cum earum ingens aliquod agmen simul invaserit, observare licebit earum Paroxysmos plerumque unâ eademque diei horâ contingere, accessionibus nunc prævertentibus, nunc postponentibus, simili planè modo, atque eodem tenore, nisi quod accidere queat ut ordo ille medicamentis adhibitis, quæ retardandi vel præcipitandi vi pollent, in quibusdam corporibus immutetur vel pervertatur.

Observandum est etiam quòd in principio Febrium Intermittentium (Epidemicarum præcipuè quæ Autumno contingent) haud ita in proclivi est Typum sub primis Invasionis diebus ritè distinguere, quandoquidem febre continuâ adscitâ primum, adoriuntur, neque facile est aliquandiu, nisi diligenter adverteris animum, quicquam aliud præter aliqualem morbi remissionem deprehendere, quæ tamen paulatim in perfectam desinit Intermisionem, & Typum anni tempestat aptè respondentem.

Typorum ratione vel Tertianæ sunt vel Quartanæ. Atque de Quartanis quidem illud merito affirmari potest, eas genuinam esse Autumnali sobolem. Utræque profectò ea affinitate inter se connexæ sunt, & sæpenumero vices permutare, saltem ad tempus, deprehendantur, mox fortassis ad pristinum genus rediunt. Sed Tertianæ Vernales, Quartanarum typos nunquam induunt, cum toto (ut ita dicam) cœlo à se invicem distinguantur. Neque porro observavi unquam, hac tempestate, Quotidianam contigisse, nisi quis Tertianam duplicem, vel triplicem Quartanam hoc nomine censuerit *intermittentes* appellandam.

Has autem febres intermittentes eo ferè modo suam originem nascisci arbitror, quem nunc summatim attingemus, Nempe anno surgente atque progresso, sanguis etiam pro rata proportionem exaltatur (haud secùs ac vegetabilia quævis augmentis atque declinationibus suis anni cursum referunt) donec ad *crassum* suam ultimumque vigorem pervenerit; hinc

hinc parallelis motibus cum tempestatibus anni pergens, eo declinante relaxari tandem & ipse incipit, ac tum præcipue cum ab accidentali aliqua causa promotus fuerit, puta sanguinis immodicâ pectura, frigore admisso, cibis crudis atque excrementitiis, balnearum usu intempestivo, aliisque non paucis. Jam verò sanguis in hoc decedentis statu constitutus, impressioni morbinæ cuicumque obnoxius est, quam in illum faciet quilibet aeris constitutus, quæ hoc tempore dictis laternulentis us est Epizemica. Atque hûc spectat ebullitio mox induci, quæ liquorem sanguineum quandoque valde degenerem corripientem, Febris inde oriunda nali moris esse solet, & malignis atque horrentis symptomatibus plonissima. Illud utrumque accidit ut sanguis spiritibus suis magnam partem exutus, & ab æstate præcedenti plurimum adustus, ebullitione sua nonnisi tardissimis motibus defungatur, suæquæ despumationi longissimam periodum postulet.

Jam vero ut manifestum eradat quàm difficulter hæc Febres (Autumnales puta) curationem admittant, hoc loco perpendendum est: Continuarum hujus tempestatum, atque intermittentium disciplinam in eo maxime consisti, quod Continuas conceptam semel effervescentiam unoque renore perneant, Intermittentes autem partitis vicibus ac diversis temporibus eadem defungantur. Interim in utriusque fermentatio naturæ ductu peragitur spatio horarum 336. aut circiter, neque enim citius aut tardius massa sanguinea in humano corpore ordinario repurgatur, si negotium naturæ permiseris; haud secus ac pōnatiunivium, vinum atque cerevisia suam, ac peculiarem habet periodum quâ depurentur. Quamvis autem in Febribus intermittentibus sanguis nonnunquam (ut in Quartana contingit) sex mensium spatio despumationem suam molitur, ac tandem perficiat; non tamen (si rite calculum ponas) plus temporis in eadem absolvenda impenditur, quàm quod in continuis impendi naturaliter solent; quatuordecim enim continuas sive dies naturales efficiunt horas 336, tribuendo nempe horas quinque cum dimidia cuilibet Paroxysmo Quartanarum, habebis in Quartana valorem 14. dierum h. e. horas 336. Jam si quis dixerit quartanam, verbi causa, (eadem enim reliquarum intermittentium ratio subintelligenda est) ultra sex mensium spatium aliquando excurrere, antequam periodum suam absolvat; respondeo idem etiam non raro in continuis Febris hujus constitutionis spectari, quæ sæpe ultra dies quatuordecim protrahuntur: in utroque nimirum casu si effervescentiam (præsertim circa Februm finem) rite atque ordine decurrere, ac sustineri vegetam curaveris, despumatio intra prædicti temporis spatium hoc est quatuordecim dierum, vel 336. horarum peragetur: quod si vero effervescentiam illam, seu fermentationem refrigerantium medicamentorum aut Clysterum usu tunc temporis (scilicet versus Februm declinationem) importune inhibueris, & quasi frantum illi injeccris, irrum non est si in longum evagentur, ordine quippe naturæ perturbato. Namque hoc modo relaxatur quodammodo sanguinis humani tonus, unde se ad despumationem accingere

cum effectu nequit. Imò verò in corporibus debilibus & ætatis idem aliquando vel sponte accidit, nisi cardiacorum ope naturam in illis languentem adjuveris, quo sanguini despumatio par sit.

Verum illud hic jam porro notandum arbitror, ea quæ de fermentationis spatio atque continuatione supra tradimus, de illis solummodo Febribus intelligenda esse, quæ itatam quandam naturam, atque habitum naturæ sunt. Scendum enim est, neque me præterit, Febres quædam esse, tum continuas, tum intermittentes, quæ transcurrentis & incerti generis sunt, neque in suis effervescentiis ad destinatam periodum pertingunt. Hujus generis sunt quæ a levi aliquâ offensa ex re rerum non naturalium quas appellant, ut cibi, potus, aeris, & his similibus, abusu, nonnunquam ortum ducunt, his enim morbis correpti subito sæpe convalescunt. Idem etiam in adolescentulis, sanguine puro, ac multis spiritibus repleto præditis, aliquando accidit: nimirum Febres illorum spirituosas quædam ac nimis tenui, volucrique materiâ mixtæ fermentationes suas citius perficiunt, ac celeri gradu spatium suum emensæ, evanescent. Ad fermentationem enim illud primo requiritur, ut materia tenuitercibilis, sive illa sanguis sit, sive vinum aut alius aliquis liquor quilibet, ea tenacitate & viscositate polleat, ut spiritus implexos, atque inertitos eatenus detinere valeat, ut in liquoris massa moveri atque agitari possint eodem fere modo, quo aves visco capte, aut muscæ atque apiculæ melle detentæ, moritare quidem, & murmurare sua peragere possunt, avolare interim non valentes. Neque tamen, (ut obiter illud dicam) eam tenacitatem obtinere debent liquores memorati, ut spiritus prorsus obruant opprimantque, adeo ut non omnino moveantur.

His jactis fundamentis (quæ quidem nescio an aliis, mihi certe ratione non contemnenda niti videntur) mirum non erit, si illis non aliam medendi methodum superflueam, quam quæ in Febribus continuis ad despumationis debitum opus rite perficiendum, adhibenda videatur: cum nimirum illæ a continuis nullo discrimine sejungantur, si ordinem species quo natura eandem materiam expellere solet, scilicet per effervescentiam certa periodo comprehensam. Et si quod ad earum speciem, atque naturam proprietatem attinet, illas & a continuis, & a se invicem plurimum differre non diffitear. Itaque vel methodum, quâ se natura liberare ab hoc morbo solet, caute, solliciteque observando indicium sumere oportet, quo fermentationem abortam acceleremus, atque ita ad sanitatem agros perducamus; vel in ipsam causam specificam penetrando, danda erit opera ut remediis efficacibus, ac specificis morbo obviam eatur. Ab horum alterotro indicationes sumendæ sunt. Ego utramque viam ingressus aliquando fui, atque illas (uti opinor) verecundiâ profiteri possum, non sine summâ curâ, atque attentione animi indefessa, sed nondum eam felicitatem adeptus sum, ut Autumnæ Febres intermittentes certa aliquâ praxi, atque medicandi ratione tollere possim, antequam statas illas fermentationes (de quibus supra locuti sumus) peregerint, utcunque molestem hoc febricitantibus videam.

videatur, qui eoque sanitatem suam expectari inviti coguntur. Revera autem si quis inter mortales reperitur, qui sive methode aliqua certâ, sive remedio specinco adhibito, Februm harum intermittentium cursum non solum inhibere, sed etiam omnino abrumpere novit, exultimo cum omni jure teneri, ut humano generi rem illam summopere expetendam patetaciat: quod si non fecerit, ego illum nec boni civis, nec prudentis viri nomen mereri pronunciare aulam; neque enim civis boni est, illud in rem suam vertere, quod toti generi humano tam ingens beneficium apportet; nec viri prudentis, divina benedictione senectutem privare, quam a summa bonitate liceret expectare, si ad publicum bonum promovendum se accingeret. Honoris autem, ac divitiarum longe minor apud probos, ratio habetur, quam virtutis & sapientiz.

Quantumlibet autem fuerit difficile, Intermittentes has Autumnales certo tigare, tradam tamen quicquid ad earundem curationem præ reliquis facere mihi visum est.

Intermittentium Autumnalium Curatione. Intermittentium Autumnalium curationem non sine ingenti discrimine per Catharsin tentari. (nisi eo, quem mox dicemus, modo instituitur) præsertim verò Phlebotomia, frequenter annis observatione jam olim didici. Et enim in Tertianis (maximè si ea Constitutio admodum fuerit Epidemica) hac methode sanandis, nisi Chirurghi gladiolus eodem ictu quo venam percutit, ipsam etiam febrem confodiat, dictæ Febres, etiam in vegetioribus & Athleticis cæterâ valentibus, non nisi longo temporis tractu expugnari se patiuntur: in provecutionibus autem, diuturnum Febris cruciatum tandem etiam mors exceperit, quam præfortibus jam esse haud rarò denunciat lethalis illa Toniliarum inflammatio, cujus fecimus mentionem. Adde quod Venæsectio alia etiam symptomata illa maturius acervit, quæ Febres Autumnales Intermittentes in statu declinationis vel comitari diximus, vel à tergo sequi. Quartanariis verò in tantum obest Phlebotomia ut Juvenes qui à morbo alias intra sex menses fuissent liberati, per sex adhuc alios ab eodem detineantur: Etateque proveciores, qui, nisi sanguinem detraxissent, intra annum poterant sanari, morbum etiam ultra statum illud tempus alere periclitantur, ac denique ab eodem victi succumbere. Quæ de Venæsectione jam dixi, levi opera ad Catharsin possunt transferri, nisi quod hæc non usque adeò perniciosa sit, nisi crebrò repetita.

Intermittentes Tertianas Autumnales hoc pacto aggredior. Egro in lectulo composito, & stragulis undique cooperto, sudores provoco sero lactis Cerevisiato, cui salvia folia incocta fuere, quatuor circiter horis ante Paroxysmi adventum; quibus jam obortis mox præcipio, ut devoret ʒij. Pilularum Cochiarum majorum solutarum in ʒj sequentis melle.

℞. Aq. vitæ ℥ij. Theriac. Andromach. ʒiij. Croci Angl. ʒi. M. lteut simul pro usu. Hæc ubi assumpsit, in sudoribus continuò eliciendis persistat, donec elapsa fuerint aliquot horæ ab illo tempore quo Paroxysmus ingruere debuerat, magnâ cum cautela se muniens contra illas sudationis interruptiones quas illi fortè crea-

bunt dejectiones aliquot à medicamento Cathartico protectæ. Sæpius mihi ex auni voto cessit medicamentum hoc in iugandis Tertianarum Paroxysmis, quam usu receptum illud ad eundem scopum tendens, Decoctum scilicet Rad. Gentian. Summit. Centaur. &c. cum paucâ Senaz atque Agarici quantitate. Cum enim duos illos contrarios sudandi ac desipiendi motus eodem tempore excitet, eundem cum vulgari illo effectum obtinet, ordinatum sc. Paroxysmi processum confundendo atque interturbando; idque efficacius, nec tamen tutò minus. Atque hac sane methode Intermittentes Autumnales Tertianas bene multas pepuli; necdum præstantiorem aliam experiri his annis mihi licuit.

In tertiana duplici, quæ typum variavit, ob ægrum vel evacuationibus vel alio quovis modo debilitatum, sudor pari etiam modo provocandus, & pari temporis intervallo à futura Paroxysmi invasione, vel medicamento jam laudato, (omittantur verò Pilulæ Cochiz, cum nec tutum sit, nec ad rem faciat, Cathartico, jam ab eodem fractas ægri vires amplius deicere, & Paroxysmis ejusdem ope ingeminaris suppetias ferre) vel diaphoretico alio aliquo *deperant* atque efficaci, quod etiam repeti potest Paroxysmo genuino proxime subsequente: In summa ægri debilitate à dicta Paroxysmi ingeminatione, Electuarium, quod jam sequitur, præscribo:

℞. Conserv. flor. Borag. Buglos. ana ʒj. Conserv. Anthos. ʒss. Cortic. citri condit. Nucis Mosch. cond. Theriac. Andromachi ana ʒiij. Consec. Akerites ʒij. M. F. Opiata, de qua capiat ad magnitudinem avellanæ mane & vespere, superbibendo cochl. 6. sequentis Julepi.

℞. Aquæ Ulinariæ & Theriacalis stillat. ana ʒiij. Syrup. Caryophil. ʒj. M. vel hujus loco Aquam aliquam Epidemicam simpliciorum saccharo dulcoratam exhibeo, Interdicto Enematum usu; ægro Juscula e pullorum caribus, Avenacea, &c. concedo.

Quartanarum quod attinet Curationem, nemo est, opinor, in hac arte vel mediocriter versatus, qui nesciat quam parum votis respondeant methodi istæ omnes, quæ huic Medicorum opprobrio eluendo hætenus destinantur, si Cortex *Peruvianum* excipiantur, qui tamen inducias sæpius impetrat morbo, quam eundem debellat, cum postquam ad septimanas duas vel tres delituerit, magno cum ægri emolumento, qui ab illo male multatus paululum interim respirat, mox de novo recrudescens haud segnius quam prius lacescit; atque ut plurimum, quotiescunque demum repetatur illud medicamentum, non nisi longo temporis tractu expugnatur. Referam tamen quicquid de methode ejusdem exhibendi habeo compertum.

Curandum est ante omnia ne præmaturè nimis hic Cortex ingeratur, ante sc. quam morbus suo se Marte aliquantisper protriverit, (nisi colabescens & jam fractæ ægri vires eundem temporis sumendum esse dicaverint) neque enim illud solum est metuendum ne à præpropere ejus usu inefficax iste reddatur, & spem ægri fallat, sed etiam ne de ægri vitâ agatur, si sanguini omni fermentationis nisu se despumanti eam derepente injiciamus remoram. Proximo loco, neque Catharsi, multò minùs Venæsectione,

ne, subducenda est materia febrilis pars aliqua, quo liberius cortex suo fungatur munere: cum enim ab utraque labefactetur quadantenus œconomia corporis, eo promptius certiusque recrudescunt Paroxyfmi, evanescente semel pulveris vj. Mihi etiam magis e re fore videtur ut sanguinem dicto medicamine sensim, longioreque a Paroxyfmi intervallo, leviter inficiamus, quam ut uno omnino ictu Paroxyfmi jam instantem tentemus confodere; hoc enim pacto & plus temporis remedio conceditur quo sum opus plenius absolvat, & evitatur quicquid id est periculi quod agro poterit oriri ex subito isto atque intemptivo nimis suffamine, quo Paroxyfmi jam invalescentem atque omni se ope exercentem conamur opprimere. Postremo brevibus istis temporis intervallis repetendus est pulvis, ut non protinus evanescat prioris dosis virtus, antequam altera exhibeatur: crebra enim repetitione ista tandem recuperabitur, profligato in solidum morbo. His adductis rationibus hanc ego methodum cæteris antepono, peruviani corticis ꝑj. cum conservæ rosar. rub. ꝑij. misceatur; æger vero quantitatē nucis moschatæ majoris mane & sero quotidie devoret diebus a genuino Paroxyfmo vacuis, donec confectionem omnem absumperit. Repetatur porro ad tres alias vices interfectis semper diebus quatuordecim.

Neque forte cum minori fructu usurpari poterit cortex hic in tertianis, qua vernis, qua autumnalibus, quam in quartanis adhibetur. Sed ut vera loquamur, nec artem *æque diuina* ostentemus; si harum febrium alterutra correptus æger vel infans sit, vel ætate floreat, convenit omnino (quantum ego hactenus edoctus sum) nihil medicamentorum quorumvis ope, aut aëris, ac dictæ mutatione moliri: Nihil enim hinc mali naturæ hucusque intellexi, si modo totam rem naturæ permiserim. Id quod ego non sine admiratione, præcipue in infantibus, sæpe observavi; sanguine namque depuratione sua defuncto, febres illæ sponte sua evanuerunt. Quod si autem e contrario vel strictiori aliquo regimine utaris, vel medicamenta purgantia subinde adhibeas, (adhiberi scilicet solent eo prætextu, ut obstructions expediantur, atque humores in primis viis stabulantē exturbentur) vel si, quod præcipuum est, in constitutione epidemica venæsectio celebretur, hec ut morbus in longissimum tempus procurrat, atque interim ut ægri mille symptomatis, iisque periculosissimis exponantur.

Si vero febricitantes præcætoris ætatis sint, ex utroque morbo (tertianas dico, autumnales, ac quartanas) non solum diuturnitatis, verum etiam ipsius mortis grave periculum imminet.

Hic itaque Medicum illud agere oportet, si neque cortice peruviano, nec alia quavis methodo morbum submovere valuerit, ut naturæ autem suppetias ferat, eamque illis adminiculis sublevet quibus ad negotium suum peragendum opus habuerit. Certè enim inefficis corporibus, nisi fermentatio cardiacorum & corroborantis diætæ, ut vini absynthitis ac id genus similibus, beneficio sustineatur, illud accidet, ut ægri incertis atque frustraneis Paroxyfmiis divexati debilitentur, atque morbus eo-

usque duret, donec languida prius natura, Paroxyfmo aliquo graviore correpta, ad ebullitionis tempus pertingere non possit, adeoque in ipso exhorrescentiæ tempore diem suum ob-eant ægroti. Atque in senibus non raro vii venit, qui longa catharticonum serie debilitati fuerunt, imo; ut aliquando visum est, in ipso vel primorum Paroxyfminorum rigore, penitus defecerunt, cum exhibitio cardiaco satis torti saltem ad tempus aliquod sustineri possent.

Cum sanguis tempus illud exegerit quod ad depurationem suam perniciendam requiratur, necessarium est ut præcætoris ætatis ægri, eodem ipso tempore, vel paulo antea, insignem aliquam aeris mutationem subeant, sive (quod potius optandum esset) in calidiorē aliquam regionem commigrando, sive mutando saltem locum in quo primum hoc morbo correpti sunt. Mirum sanè est quantum valeat hæc aeris mutatio ad morbum hunc prorsus abigendum. Interim ut ante hunc temporis articulum aer mutetur, non tantum non necessarium est ad sanitatem ex hoc morbo restituentiam, sed & minus convenit. Etiam si enim quis in regionem quantumcunque australem & calidam migraverit, sanguis tamen ejus in morbo hoc motu semel constitutus, depurationem suam ut peragat necesse est, quod quidem beneficii frustra expectabitur ab inutilitate novæque aëre, priusquam procedente atque adulto jam sanguis motu, sanitatis recuperandæ capax fuerit. Insignis ergo illa aeris mutatio tum demum adeunda est, cum primum æger a Paroxyfmo liberari potest: Exempli causa. In quartana quæ primum in autumno invasit, non citius aer mutandus est, quam circa februarii initium. Interim si æger mutare locum vel nolit, vel commode nequeat, oportebit ut hoc ipsius temporis articulo, forti aliquo medicamento utatur, cujus ex sint vires, ut uno quasi ictu languescētem illam depurationem potenter promoveat, & si fieri poterit perficiat. Ad hanc rem contulerem, ego, ut electuarii de ovo, vel Theriacæ Andromachi sesqui-drachma in aquæ cœlestis, vel aquæ vitæ communis uncis duabus dissoluta exhibeatur. Id quod a me, cum successu non infelici, in morborum hujusmodi declinatione factum est. Licet agnoscam calidiora hæc citius exhibitâ vel morbum duplicare, vel in febrem continuam mutare, quod aliis jamdudum observatum est. Idem in juvenibus hoc morbo detentis fieri potest, cautela adhibita: Ut autem in puerili ætate idem fiat, non tantum non convenit, verum etiam periculo non vacare dudum observavi.

Priusquam huic argumento clausulam addamus illud monendum venit. Ea quæ de febrium autumnalium intermittentium duratione, atque de tempore ad sanguinis depurationem requisita, jam dicta sunt, ita intelligenda esse, ut nos solum illud nunc spectemus quod natura vulgaribus atque usitatis tantum medicamentis suffulta, præstare soleat. Nequaquam enim eo consilio de his rebus ita locuti sumus, ac si doctos ac solertes Medicos despondere animum velimus, atque de melioribus medendi rationibus excogitandis, vel nobilioribus remediis

inveniendis spem tota n abjicere, quorum ope huiusmodi morborum sanationem accelerent; tantum enim ego protecto ab hoc proposito absum, ut non desperem vel a incipio tale quippiam live methodi, live remedi aliquando repertum iri.

Sublato morbo ager sedulo purgandus est; incredibile enim dicam quanta morborum vis ex purgationis defectu post febres autumnales subnascatur. Miror autem hoc a Medicis minus caveri, minus etiam admoneri. Quandoquidem enim horum morborum alterutrum paulo provecioris ætatis hominibus accidisse, vidi, atque purgationem etiam omittam, certo prædicere potui periculosum aliquem morbum eisdem postea adoriturum, de quo tamen illi nondum somnauerant quasi perfectè jam sanati.

Omnino interim cavendum est, ne purgetur ager nisi morbo penitus depulso. Quamvis enim partes naturales illuc ita quam in illis congestis, febris, hoc pacto quadantenus sublevari videantur, nova tamen materia de repente succrescet, febre scilicet a cathartici impetu atque humorum agitatione jam revocata, eandem suppediet, uti ac proinde id tantum a purgatione lueri fecerimus, ut morbus contumaciore evadat. Quotidiana id nos docent eorum exempla, qui in morbi æstus, ut theoricæ isti morem gerant quæ in tollendis obstructions, & evacuando humore melancholico, qui mali tons & origo vulgo habetur, curationis spem omnem ponit, repetitis purgationibus minere plectuntur; quibus sanè quicquid id demum est humorum quod à corpore divellitur atque emanatur, compertissimum est nobis febrem altiores exinde radices agere, & pertinacius stationem suam tueri, quam si non fuerit proritata. Quapropter religio mihi est catharticum propinare ante tempus illud, quo non tantum Paroxysmi perceptibiles, sed etiam alteratio ista qualis qualis ea fuerit, quæ diebus illis in quos Paroxysmus incidere debuerat, persenscitur, omnino evanuerint, atque unus insuper mensis fuerit elapsus: quo quidem effluxo, potionem aliquam ex lenitivis vulgaribus præscribo, atque eandem semel in septimana ad menses duos tresve subsequentes repetendam impero; addito etiam singulis vicibus haustulo aliquo paregorico, hora somni assumendo, finita jam medicamenti operatione; ut nempe Paroxysmo se de novo ingerendi ansam præcindamus, quam aliter forte arripere ex occasione tum ultus atque orgasmus, quos vel iustissima excitant cathartica.

Purgationibus instituendis idcirco spatia ista ampla interpono, ut sc. ager à recidivæ metu liberetur, quæ quidem à nimis crebra & conterrita repetita sanguinis atque humorum exaggeratione, de facili poterat induci. Ac cum jam illi res vacet periculo, apozema sequens sequenter usurpari poterit.

℞. Rad. Rhabarb. Monachor. ʒij. Rad. Asparag. Brusci, Petrosel. & Polypod. quer. an. ʒj. Corric. Median. fraxini, & Lemnisci an. ʒss. sol. Agrimon. Ceterach, & capill. Ven. an. M. j. Sennæ munda. ʒij. (istorat. ʒij. vini albi) Epithymi ʒij. agarici troch. ʒij. sem. fœniculi ʒiv. Coq. in aqua fontana ʒss. sub

linem adde succi aurantiorum ʒij. In colatura dissolve syr. Cichor. cum Rheo, & Magistral. ad melancholiam una ʒij. I. Apozema, de quo capiat ʒss. singulis matutini & per triduum, & repetatur quoties opus fuerit.

Ut tandem Symptomata illa memoremus, quæ febres intermittentes in declinationis statu comitantur, observandum est, verum paucissima esse. si ad illa comparentur quæ autumnalibus accidunt, tum quia non ita diuturnæ istæ, tum etiam quia in humoribus non inque adeo terrenis, & minus etiam malignis luantur.

Hydrops. Primum hic sibi locum vendicat, subinde occurrens hydrops; unde primo quidem crura intumescunt, deinde etiam venter; qui exinde nascatur quod sc. sanguis crebris alistermentationibus, quas peperit morbi diuturnitas (præcipue in natu grandioribus) plures spirituum manipulos prodegit, unde summa eorundem inopia jam laborans, succos cum alimentis ingellos non amplius valet assimilare, quorum cruda adhuc indigestaque moles in crura tandem deponitur, atque his jam distentis, neque ulterius quicquam admittentibus, in ventrem etiam, unde verus hydrops formatur. Raro autem juvenes obidet hæc malorum liliæ, nisi cathartici per febris decursum, sepe numero iteratis, eandem inconsulto nimis sibi accessiverint.

Verum hydrops ex causa memorata superveniens aperientium & catharticonum usu facile sanatur, si modò recens fuerit. Neque mihi molestum est, quoties hunc natum in orbem audio atque intelligo, nempe de rei exitu omnia bona tunc temporis animo concipiens: Nonnullos enim usu apozematis jam præscripti, vel sine admittione hydropi magis appropriatorum, pertransivi.

Verum tamen observavi, frustra esse, si quis hydropem ex febre intermittenti natum, medicamentis purgantibus tollere conetur, febre illa adhuc durante: Febris enim hoc pacto radices profundius agere deprehenderet, non autem amovebitur hydrops; expectandum itaque donec febris exudet, ac tum demum negotium prospere suscipiendum.

Verum enim verò si tam importunè atque acriter instet symptoma hoc, ut ejus curatio non eo usque videatur differenda donec febris recessus catharticonum usum permittat, aggredienda omnino illa est infusionibus rad. R. phanistruciani, lummit. absinth. & centaur. min. baccarum Juniperi, Cinerum Genistæ, &c. in vino factis, quæ non solum symptomati obstant, effusas sanguinis vires de novo instaurando, sed naturæ etiam de morbo jam triumphaturæ tempori subveniunt.

Rachitis. Infantes autem post febres autumnales tum continuas, tum intermittentes, hecici aliquando sunt. Ventres eorum inflati, tumentes, ac duri evadunt; sæpe etiam tussis, aliaque tabidorum symptomata subnascuntur, quæ rachitidem plane mentiantur. Hos ego sequenti modo tractandos consulo. Paretur portio cathartica quam in febrium continuarum sine assumendam præscripsi. Hujus capiat infantulus cochl. j. vel ij. plus minus pro ætate,

mane

mane per 9. dies, uno atque altero die, si opus fuerit, intermisso. Interim vero purgatio ita moderari debet ac regi, dosim vel augendo vel minuendo; ut ultra 5. vel 6. sedes singulis diebus non procedat. Post nuntiam cathartum totus venter iungatur lini nento aliquo aperitivo per aliquot dies. Sequenti uti soleo.

℞. Ol. lilior. & tamarisci an. ʒij. Succirad. brionæ & apii an. ʒj. bulliant ad succorum consumptionem, addendo unguenti de althæa & butiri insuli an. ʒj. gummi ammoniaci in aceto soluti ʒʒ. ceræ flavæ q. s. f. linimentum. Sane quamplurimi infantes, etiam verâ Rachitide laborantes, hac methodo à me liberati fuerunt.

Veruntamen (ut antè monuimus) cavendum sedulo ne purgationem aggrediamur, nisi febre jam perfectè fugata; licet enim hoc pacto humoris in partes naturales am. n. dati portio quædam evacuari non sine causâ videri possit, nihilominus ab ipsâ febre nova subinde prava materia copia suggeretur, quæ non solum purgationem reddet frustra, verum & ipsum morbum diuturniorem præstabit, ob rationes antea memoratis.

Observatu non indignum est, quòd cum febres autumnales teneram ætatem diu cruciant, nulla spes sit easdem abigendi, donec abdominis regio, circa lienem præcipuè, induratur atque tumescere occupaverit, isdem enim gradibus quibus hoc symptoma supervenerit, febris etiam fugam meditatur. Neque forte ex meliori aliquo prognostico morbum hunc brevi abiturum dixeris, quàm si sedulâ animadversione suboriri hoc symptoma perspexeris. Idem porro in crurum tumoribus obtinet, quia in adultis aliquando spectantur.

Ventris tumor qui infantibus accidit post has febres, quibus annis aeris constitutio intermittentibus autumnalibus progignendis epidemicè determinatur, tangentis digitum haud aliter ferit, ac si materiam aliquam continerent viscera in scirrhum indurata; cum qui aliis annis, simili licet ætate, contingit, tactu non ita afficit, seu tensio hypochondriorum a subiectis statibus. Hinc, nisi annis quibus intermittentes autumnales prædominium habent, veræ rachitides rarius occurrunt, quod observatu dignum.

Ton illi rum dolor & inflammatio post febres sive continuas, sive intermittentes, cum deglutendi primùm difficultate & molestiâ, supervenientibus deinceps raucedine, oculis cavis, & hippocraticâ facie, mortem certò imminentem præmonstrant, intercisâ planè omni redintegrandæ sanitatis spe. Iuncto huic symptomati producendo evacuationes iusto copiosiores in agris vi morbi jam ferè attritis, longiori febris moræ sociam operam ut plurimum commo- dâsse observavi.

Multæ species quædam. Multa alia sunt accidentia quæ morbos hosce consequi solent ob purgationem vel non omnino, vel non ritè celebratam, quibus in præsentiarum enumerandis supersedebimus, cum curationis eadem ferè ratio sit utrobique, nempe sedimenti ab effervescentia præcedentæ depositi repurgatio, quippe quòd suâ morâ malis huiusmodi materiam præbuerit. Quanquam licet hic loci non

contemnendum symptomatis genus referre, quod non tantum purgationibus & evacuationibus aliis quibuscunque, Venæ-sectioni præsertim, cedere designatur, verum & ab illis vires sibi acquirit. Illud autem peculiaris quædam est ac sui generis Mania intermittentes diuturniores (quartanas præcipuè) nonnunquam excipiens, quæ communem medicandi rationem aspernatur, & post evacuationes fortiores adhibitas in miseram quandam stultitiam degenerans, non nisi cum ipsa agrorum vita terminatur. Miraturque sæpenumero sum nullam huius rei mentionem ab Autoribus factam fuisse, cum non raro accidisse viderim. Cum reliquæ amentię species copiosis evacuationibus, & Venæ-sectione, & cathartis ut plurimum persanentur, hæc neutram potest ferre. Sed cum jam æger in sanitatis limine est, si vel enema ex lacte saccharato semel inieceris, statim de novo recrudescet malum. Et si reiteratis purgationibus, venæ-sectioneque contranitamur, ejusmodi evacuationes morbi quidem ferociam possunt domare, agrum verò certissimè non tantum satuum, sed & incurabilem omnino reddent. Quod quidem nemo mirabitur, qui secum reputaverit, alteram amentię speciem à nimis exaltata & vivida sanguinis crasi produci, hanc vero ab ejusdem debilitate, & ut ita dicam, vapidity te à diutina fermentatione quam invexit febris, qua mediante spiritus functionibus animalibus obeundis impares plane sunt.

Huic malo ad hunc modum mederi soleo, ægro ter in die cardiacum aliquod à generosioribus exhibeo dosi paulò liberaliori, e. g. Theriacam Andromachi. Elect. de ovo. pulverem Comitissæ. pul. Gualteri Raleigh, vel similem in Aq. Epidemica, Theriacali, vel aliâ. Possunt etiam in aliâ quavis formâ exhiberi cardiaca medicamenta. Æger interim victu quidem moderato, analeptico tamen, & potu generosiore reficiendus est; foras ne exeat, in lecto se diu multumque contineat. Alvus sub hoc regimine iusto erit strictior, unde ut etiam à calidorum medicamentorum usu à febre quis sibi metuat, sed vano prorsus timore; cum spiritus antecedente morbo penè exhausti novum deinceps non valeant accendere. Post aliquot septimanas paulatim in melius proficiet, quo tempore omitti possunt cardiaca ad dies pauculos, dicta vero analeptica jugiter instituenda, & post brevem intermissionem repetendus est denuo cardiacorum usus, atque in eo persistendum donec integrâ sanitate fruatur.

Dicta methodus maniam etiam quæ has febres minimè excepit, quandoque sanavit, frigidiori sc. atque infirmiori temperamento præditis. Anno nuper elapso Sarisburiam accersabar, ut cum Medico erudito & sagaci, mihiq; conjunctissimo, Domino Doctore Thomas scemine nobili consulerem, cui imaginatio haud parum fuit laesa. Verum adhibitis, etiam cum jam prægnans esset, remediis modò dictis, ad sanam omnino mentem rediit.

Attamen Mania communis, quæ vegetis hominibus atque etiam nulla febre prægressâ, accidere solet, alius sanè prosapiz est, ac proinde longè diversâ quoad evacuationes, methodo tractanda tamen vel in hac specie, ea quæ cerebrum atq; spiritus animales corroborant, haud

omitti debent. Curationem autem ejus, etsi non sit hujus loci, obiter tamen prædictæ speciei subnectere non gravabor, ne quis fortè præ similitudine morborum in errorem illabatur.

In junioribus ac sanguineo habitu præditis, mittatur sanguis ex brachio ad uncias octo vel novem bis vel ter, diebus tribus inter singulas venæsectiones interpositis: Deinde semel extrahatur sanguis ex venis jugularibus. Ultra hunc modum repetitæ venæsectiones ægrum potius in tutitiam ducunt, quam curationem absolvent. Postea aggrediatur usum pil. ex duobus, quarum drachmam semis vel scrupulos duos (pro ratione operationis) capiat semel singulis septimanis statò die, ita ut si, verbi gratiâ, die lunæ primò pilulas assumpserit, præcisè eodem ipso die, nec frequentius, sequentibus septimanis eadem repetantur per longum tempus, usque dum perfectè convalescat. Hæc methodo humores qui in hoc morbo mentis arcem impetere solerent, sensim in inferiores sedes dilabentur, aliâ quasi vi eis inductâ.

Diebus à purgatione liberis per totum decursum electuario sequenti, vel alio medicamento eadem virtute prædito, utatur.

℞. Conf. Absinth. Rom. Anthos, & Theriac. Androm. ana ʒj. conf. flaved. Aurant. Angelic. condit. nuc. mosch. condit. ana ʒβ. cum s. q. syrup. Caryophil. f. Electuarium, capiat ad magnitudinem nucis moschatæ bis in die, superbibendo haustulum vini Canarini, cū fuerint frigide infusi flores Paralyseos.

Si à Fermentatione sanguinis varia, variz febres oriuntur, atque illa à diversi generis fermento, certè Curatio febrium universè perficietur, aut remediis, quæ fermentum ipsum moderentur, & compescant; aut iis, quæ Fermentationem ocysus promoveant, & fermentantem succum veluti à sanguine alienum repurgent, secretumque per consentaneos naturæ ductus depellant, præsertim vero per sudorem, qui videtur in febrientibus frequentior, & salubrior. Cumque modus non adeò tutus quibusdam visus sit, cū subinde febres à fermento deinceps reviviscere soleant ac vehementius invadere, factum est ut posterior Medentum pars posteriori methodo inhaerit: Imò Helmontius propria & specialia febrium remedia inquit esse diaphoretica, præcipue vero suum Mercurium. Verum tamen est quandoque sudorifica parum aut nihil profuisse, præsertim cū fermentum febris alicubi in primis ductibus hæsit; vomitum autem momento temporis abstulisse ex vino emetico, aliove promotum. Hinc animadversione dignum censeo, an febres à fermento aliunde sanguine suggesto, vel à restagnante humore circa pylorum in pancreate, ipsoque ventriculo originem ducant: illæ enim desinent ab assumpto vomitorio, quod una simul blande alvum movebit, ut pluries experimento confirmatum. In idipsum convenire video Thomam Sydenham in methodo Curandarum febrium quæ ex infuso croci metallorum, oxymelle scilicet, & syr. scabiosæ emeticum conficit, atque in ipso febris initio exhibet.

At in ratione victus febrientium nostra ætate longe admodum à veterum præceptis Medici recedunt. Et quidem si febres acutæ

sint, sive chronicæ, & sive intermittentes, sive continuæ, eadem prorsus & invariata ciborum conditio, & quantitas apud illos semper est, cum mane contusa, vespere vero consumpta & expressæ carnes pullorum indiscriminatim offerantur. Neque ista solum, sed & elixæ cum oleribus, quæ calorem infringere creduntur, itemque assa, & multifariam condita, præter bellaria omnis generis. Verum hæc cibandi norma his summiopere nocua est, cū exinde gravetur potius natura quàm juvetur, excrementa plurima cumulentur, & febris ipsa saltem protrahitur, nisi etiam deterior fiat. Si quis etenim, inquit Hipp. cibum febricitanti dederit, sicut sano robur, ita laboranti morbus fit.

Tametsi tam larga cibandi ægrotos ratio perperam nostratibus instituta videatur; non tamen illos laudandos arbitror, qui indistinctè febricitantibus omnibus extremam inediam præscribunt. Porro observanda est corporum affectorum varietas, num pueri, graciles, imbeciles, senes; an adultis, succi pleni, robusti sint ægrotantes, & pro eorumdem ratione, nunc paulò plenior, nunc parciore offeratur. Gracilibus enim, & picrocholis adhuc instante paroxysmo, & inter ipsius febris initia cibum in gratiam virium, & languentis stomachi, exhibendum esse suadet Galenus; quamquam Hippocrati per id temporis nocuus videatur. A viribus itaque victus ratio mensuranda. Unum quippe illud est, inquit Celsus, quod semper ubique servandum est, ut ægri vires subinde assidens Medicus inspiciat, & quandiu supererunt abstinentia pugnet, si imbecillitatem vereri cœperit, cibo subveniat: id enim ejus officium est, ut ægrum neque supervacua materia oneret, neque imbecillitatem se prodar. Nec insuper statim victum permutare conveniet, documento ejusdem Hippoc. nisi tamen præcedens illius ratio morbi causa extiterit.

Mirum verò quàm plerique nostratium vinum usum damnent, ut nec illud gustare permittant, hinc factum est ut adhuc ab ejus nomine vulgus hominum deterreatur. Verum Hippocrates innumeris ferè in locis vinum febricitantibus commendat, & exhibendum esse præcipit similiter & Galenus. Neque de illius calore verendum: nam præterquam quod in horum corpore calor exoptatur, utroque exquirunt, præsertim si syncope copuletur, ex docum. ento ejusdem Galeni, qui vino utendum docet adhuc in febre ardente, quam syncope comitatur, ex bile amara progenita; ab ejus usu moderato diuresis, & diaphoresis sollicitatur, & præterea stomacho succurritur.

Quod denique plerique putant præcipuum, & præsentaneum febrium omnium remedium esse sanguinis missionem, autoritate Galeni dicentis, saluberrimum esse in omnibus putridis febribus sanguinem mittere: tam est ab Hippocrat. mente alienum, ut potius in quolibet affectu, cui febris juncta foret, à venæsectione is abstinendum esse voluerit. Ut notat etiam Prosper Martianus comm. in Coac. 79. sect. 3. A sanguinis etiam detractio abstinendum docet Zacutus, Pereda, alique licet Hispani, quibus cæteroqui sanguinis missio familiaris

miliaris admodum esse consuevit. Atqui longe graviora obstant argumenta, alias à nobis recensita.

Pleraque intermittentes febres non raro certis tempestatibus contingunt, quæ sponte sua absque ullo medicamentorum vii sentim remittuntur, ac tandem salubriter desinunt, sudore, dejectione, ut urina copiosiori; ab adhibitis vero remediis potissimum evacuanti- bus, in longius tempus protrahuntur, aut in peiores commutantur, impedito nimirum ter- mentationis, & secretionis motu. Aliquando vero omnino expediet congruum propinare medicamentum, quod febrile fermentum aut exturbet, aut corrigat, & refrenet; imò & san- guinem ipsum à contracto vitio depuret, repur- getque. Inter ea, quæ febrile fermentum, seu degenerem à sanguine humorem extra corpus eliminant, tutiora plerumque sunt vomitoria ex infuso croci metallorum, reguli, autini, aliulve similis. Jucundum autem, & perquam accom- modum experti sumus aliquoties oxysaccha- rum emeticum Angeli Salæ. Post finitam eme- tici operationem, exhibendam laudet Thomas Sydenham paulò ante paroxysmum largam dialcordii quantitatem, ut ejus impetus intrin- gatur; si tamen febres istiusmodi vere & ætate contingant. Neque solum inter initia, & in febribus acutis, sed etiam in chronicis, & con- tumacibus unice prodesse vomitum testatur Galenus lib. 1. ad Glauc. ipsumque alii plurimi salutarem se expertos continentur. Quod si ali- cui vomitus inluctus sit, aut non ferendo vi- deatur, maxime utilis erit pulvis Comitris de Wervich, qui solus plurimas intermittentes, imò & continuas febres, adhuc in principio solvit per ætatem, & autumnum. Caven- dum autem, ne ab intempetivo, & incon- venienti medicamento purgante vires deji- ciantur, agitentur magis humores, aut alii, quam qui peccant, inutiliter educantur, suc- cedente etiam hypercatharsi. Nec præterea fidendum us, quæ vulgò benedicta appellan- tur, quasi quod solum leniant alvum, & pri- mos, ut ipsi dicunt, ducius abstergunt, ideo- que innocuè sumi possint, ut Manna, Vio- la, Rosa. Hæc enim tam nocua sunt in fe- bribus, quam quæ alia, cum facile contum- pantur, stomachum relaxent, & febrile fer- mentum augeant; unde Diarrhœa, cardial- gia, cibifastidium, & ingens sitis, præter alia, sapissime suboriuntur. Quare Riverius in his febribus, etiam diuturnis, ipsaque quartana usus est Mercurio dulci sexies subli- mato cum resina jalapæ; vel scammonio va- pore sulphuris correcto, seque opratum ex hoc remedio eventum, ac propositum af- sequutum, innumeris planè exemplis testa- tur, in *Centuriis Observationum Medica- rum*.

Cum à glutinosis, crassisque succis foveri febres videbuntur, Diata attenuans sit, & medicamenta quæcumque diuresim, aut dia- phoresim quoque moveant, unaque simul Ro- macho opitulentur. Verumtamen non statim à principio sudorifica exhibeantur præsertim potentiora, cum non facile crassi humores sudore possint educi; juvabit propterea pri- mum illos sensim attenuare, deinde per cu-

tim educere, nisi tamen à vomitu fuerint tri- gna ex parte discussi, & excreti. Si vero hu- mores acres sint, illos temperabunt partim ali- menta molliora, partim etiam medicamenta humectantia levioribus acidis commista, ut etiam anodyna, & narcotica blandiora; quæ etiam acidum infringent, si id præcellere vi- deatur, præter ea quæ sale volatili sunt prædi- ta, minime vero oleosa, ne inde æstus, & sitis inducatur. Quibus vero signis ejusmodi humo- rum vitia dignoscantur alibi dictum.

A sanguinis missione nil quidquam juveni- vis unquam sperare licebit in febribus inter- mittentibus, cum hæc fomitem extra venas, & arterias habeant in imo ventre. Nec insuper illa videtur Galeno commendata, nec nunc Actio Agnetæ, aliisque Græcis Authoribus; ita nec Arabibus plerisque, præsertim Avicen- næ & Averrhoi, cæterisque ex Latinis Scrip- toribus innumeris. Inde enim nullum febrien- tibus juvamen evenire ratio, & experimentum pluries evicit, infracto scilicet robore vitali, quo natura causam morbosam debellat. Not- tissima est Historia Cardinalis Toletani ab Hel- montio memorata, cui sanguis licet ad om- nem venarum depletionem fuisset exhaustus, numquam tamen potuit tertiana febris quies- cere, ut tandem infelicitè perierit.

Quoniam verò sæpè sæpius sponte natura solent febres copioso sudore desinere, post- quam illæ aliquatenus deslagaverint, iudori- ficis sine ullo metu utendum; attento autem præprimis motu naturæ. Inter varia tamen, & innumera, ex carduo benedicto, dictam- no, scordio, contrayerva, angelica, carlina, scorzonera, vipera, cornu cervi, campho- ra, succino, nitro, sale ammoniaco, vitriolo, tartaro, limbo, mercurio parata, salia, pulve- res, electaria, spiritus, elixires, tincturas, a- quas, magisteria, tutiora, jucundiora, & effi- caciora tuere hæc hætenus observata: sal car- dui benedicti, absinthii, & prunellæ, tartarum vitriolatum, sal volatile succini, & viperinum, spiritus salis ammoniaci dulcis redduus, sti- bium diaphoreticum, & omnia bezoardica, & mercurialia fixa, ritè præparata. Summis laudibus extollitur ab Helmontio mercurius diaphoreticus; at ejus præparatio inter arca- na reservatur; decoctum tamen Asari ad fe- bres chronicas, & ad quartanum spiritus salis marini commendatur. Ex sale polychrestito è fu- liginè camini elicto, sale prunellæ, & subio diaphoretico pulvis efficacissimus conficitur, quo non solum febres intermittentes, sed etiam continuæ mirabiliter curantur, promo- to sudore, aut diuresi. Febrifugum Riverii cre- ditur Rolfinchio componi ex mercur. sublim. auro & vitro antim. solutis, cohobatione ite- rata destillatis, & in pulverem redactis, cui additur diagridium cum alvi solutio desidera- tur. Apud Crullingium describitur sal quod- dam antifebrile, cujus usu ad 3j. duabus, vel tribus horis ante accessionem in aqua centa- urii minoris, vel simili sudor sub declinatione paroxysmi manare dicitur, & febris aboleri. Conficitur id ex sale ammoniaco sublimato, nitro præparato, sale cardui benedicti, absin- thii, & centaury minoris in aqua eichorii so- lutis, atque in salem crystallinum secundum

autem commutatis. Proponitur quoque ab eodem pulvis ad febres omnis generis ex septem rebus compositus, qui ualde utilis observatus est. Jam nunc frequentissimus est apud omnes usus pulveris corticis Peruviani in vino primum infusi, mox ante accessionem exhibiti, quo ingruens paroxysmus coercetur, & fermentatio impeditur, licet post aliquot dies redire soleat. Tanta autem nonnullis in hoc pulvere fiducia est, ut etiam in continuis febribus illum offerre non dubitent: at non semper res ex voto succedit, ut subinde febris, quæ continua est intermittat, quamquam his temporibus genuinus cortex vix invenitur. Quare in ejus locum substitutus est in publico Noocomio D. Virginis M. Annunciatæ alius ex corticibus cupressi, & malorum aureorum dulcium, cum radice, gentianæ cui prout necessitas postulaverit etiam addere solemus tartarum vitriolatum, & stibium diaphoreticum: eo autem ter exhibitio febris desinere solet. Idipsum etiam experti sumus ex pulvere corticis radice arboris Perlicæ pari modo in vino albo veteri exhibitio cum sale absinthii, vel centaurei minoris. Meminit alterius pulveris Bartholinus de gannaperide dicti, ad eundem usum. Commendatur etiam à Frederico Deckers pulvis alius ex corticibus ligni guajaci, & fraxini, extracto radice gentianæ & Angelicæ, stibio diaphoretico, sale volatili ammoniaco, seu floribus ejusdem cum myrrha. Franciscus Piens multos a tertiana liberasse fatetur haultu febrifugo Croliano aquæ cichorii ad ʒij. salis absinthii ad ʒß. & spiritus sulphuris ad ʒj. Ad quartanam vero memorat medicamentum sibi à Jacobo Cochio communicatum, quod habet: aq. card. bened. ʒij. alum. crud. pulv. ʒj. olei sulphur. per campanam elicti ʒj. sal. centaur. minor. ʒß. fiat haultus calidus. Hoc & ipse sæpius feliciter usus sum, etiam si quartana hyemem attigisset. Hydrodiaphoreticum, & Hydrocatharticum Turqueti, quo nil præstantius ad ejusmodi febres debellandas inveniri idem Piens testatur, voluit ut alios lateret. Alia plurima proponuntur ab aliis, quæ consulo omittere visum est, sicut & externa medicamenta carpi manuum applicanda, ut est emplastrum Strobelbergeri descriptum à Schrodero in sua Pharmacopœia, & à Grullingio in suo Florilegio; itemque cataplasma febrifugum Principis Anhaltini: fortis à Lotichio relatus; & oleum febrifugum ejusdem Strobelbergeri. A spinæ Inunctione cum oleo seminum colocynthidis tertianam aliquando curatam vidi; sicut etiam à cataplasmate lumbis admoto ex albumine ovi, croco, & myrrha, cum modico camphoræ. Quo autem pacto ista febrim tollant explicare conatus est. *Thom. Willisus de febribus intermitentibus cap. 3.*

Febres continuæ ac continentes: ut salutarem nanciscantur eventum, fermentum febrile removendum, corrigendumque est. Hinc plerique diaphoreticis insistant, quibus possint illud dissolvere, & repurgare, unaque simul per diaphoresin protrudere, quæ sane in febribus universis familiaris naturæ esse consuevit, interea nec oppressis, nec exsolutis agri-

viribus per pharmaca, phlebotomias, catartasque similes evacuationes natura motum vel impediens, vel distrahentes. Utile tamen fuerit, si ductu symptomatum, præsertim in excretis, aut retentis, & in qualitatibus mutatis quænam sit causa febrilis fermentationis, concipi possit, ut in eam exhibenda remedia constent.

Verumtamen in curandis febribus Ephemericis, seu Diariis hæc notitia contemni solet, cum illæ suapte natura sæpius, unica die salubriter terminentur, & satis sit aerem temperatum querere, si fortasse ab illo febris ortum duxerit: moderatam dixit; si a crapula, & eruditatibus; quietem, ac somnum: si diuturna vigilia, & immoderatum exercitium præcellerit: itemque consuetas evacuationes promovere, si ex iisdem suppressis, vel retardatis proficiantur.

Protractas autem diarias, synochos, & ardentes febres retundere, ac tollere oportebit, vel compescendo fermentationem in sanguine inductam, vel particulas ejusdem actionis fermentum excitantes in præcipitationem disponendo per diaphoresin, aut diuresin. Et sane cum videbitur vehemens in sanguine commotio a partibus ejusdem mobilibus nimium exaltatis, ea quæ diluunt, & acido moderate temperant peropportuna sunt, ut portiones ex aquis diaphoreticis, vel diureticis, præsertim vero cardui benedicti, scorzonæ, vaccetoxici, cornu cervi, rutæ capraræ cum spiritu salis dulci, vitrioli, sulphuris; itemque expressiones ex seminibus peponum, papaverum, cydoniorum: sales quoque nitri in crystallos redacti, tartari, prunellæ, atque ex lotionibus cerullæ, stibii elicti, aliæ. Ab his enim sæpe febres cateroqui exurentissimæ statim desiere, partibus in sanguine fermentescentibus coercitis, aut per sudorem, & urinam propulsis aut etiam insensibiliter dissatis; atque hac ratione, quia nitro sunt saturata, gelidæ aquæ largius epotæ, non raro ardentem febricitantibus profunt. Neque vero acida moderate sumpta semper sunt fugienda, cum sæpenumero etiam contulerint, cum scilicet tenuiores sanguinis partes in motum nimium conceitæ quodammodo coerceri debent, & cum crassioribus, & glutinosis consociari, pari modo ac Helmontius ab acido mali citri minime cavet in lithuasi, nec acida in febribus reformidant Sylvius Leboe, Paulus Barbette, Piens, aliique, si præsertim cum potionibus commista, & temperata fuerint.

Acrementis vero cum sanguine mistis inducta fermentatio sedabitur, iisdem seceris, & in sua conceptacula, vel extra corpus expulsis. Fæces blandè clysteribus subducentur: una per diuretica alibi tradita promovebitur; sicut pariter sudor. Detenti halitus, & vapores cute rarefacta frictionibus, atque diaphoresi excitata, aere calido, integumentis, & attenuantibus medicamentis sale volatili præditis elicientur. Venena assumpta, per alexipharmaca, & antidota propria. Concretus restagnansque sanguis ope dissolventium multo alkali abundantium, sanguinis hircini, C. C. dictamni, scordii, contrayervæ, angelicæ, carlinæ, stibii diaphoretici, oculorum cancr. salis

absinthii

ablinthii volatilis succini, cornu C. & vipera-
rum, quorum ne unumque bezoardicorum, spirituum
theriacalium, & similia. At vero in pus con-
versus purgabitur potionibus vulnerariis cum
balsamo sulphuris, atque remediis ex Mercurio
paratis.

Si præterea fermentescat sanguis fermentis
aliunde suggestis potissimum è pancreate, cylli
fellea, aquæ, & chyli ductibus, aliisque, eadem
fere Methodus servanda erit, quam superius in
intermittentibus proposuimus, educto pri-
mum, si licuerit, degenerare illo humore unde
fermentationem promoveri conjectabimur;
mox verò repurgato sanguine à communi succo
in eundem inserto usu ren ediorum sudorem
moventium, & impuritates secermentum in
consuetâ corporis emunctoria.

Peculiaris autem ratio habenda semper erit
de ventriculo ejusque succis cibum continen-
tibus, ut exinde chylus progignatur sedans, &
obstundens fermentationem à confluxu succo-
rum in intestinis tenuibus excitatam. Siqui-
dem eludetur omnis opera in usu cæterorum
medicamentorum, nisi ventriculus suo munere
fungatur: eo namque languido, cruditates eu-
mulantur, quæ febri fomitem addunt, vel saltem
ejus resolutionem impediunt, & retardant.

Providendum quoque symptomatis febres
hæcæ comitantibus, cum illa plerumque his
longè graviora esse soleant; quin & ab illis rite
perceptis in causæ morbi conjecturam adducit-
mur.

Cæterum in reliquis febribus continuis scire
refert num vitiosus humor fermentationem in-
debitam in sanguine promovens, acer, acidus,
auterus, salus, tenuis, crassus, volatilis, fi-
xus, aquosus, rartareus, aliusve sit itemque an
multus, vel paucus, an unus & simplex, aut mul-
tiplex, & implexus, an hærens, aut fluens, & va-
gus, an alicubi stagnet, aut cum sanguine cir-
cumeat; an partes ventriculo proximiores aut
potius remotiores occupet, & an præterea so-
lidarum partium vitium affectionemque conie-
quatur, præsertim in ductibus obstructis, aut
compressis, relaxatis, aut erosis. Ab his enim
variant plurimum indicationes exhibitionesque
remediorum.

Verum enim vero feliciter, & facilius febris
fere omnibus prodelle in dies experimur
salem polychrestum, sibi diaphoreticum,
& mercurium præcipitatum mixtum, qui vomitu-
m non movet, nec dejectionem, nisi cum ca-
tharticis jungatur, illamque blandam nimis,
& moderatam. Colore is rubet, ut corallio-
rum pulvere utitur, etur, comminuitur in polli-
nem, & instar cinnabaris tingit, igni resistit,
neque à lixivio reviviscit, aut permutatur: le-
vis est, nec temporis diuturnitate quicquam aut
mole, aut virtute diminuitur. Mirabiliter autem
operatur per diaphoresin in dosi trium, aut
quatuor granorum cum aliquo electario com-
mixtus; vel cum modico extracti catholici, si
exinde alvi subductio desideretur. Luem etiam
veneream quæ nris diuturnam, & inveteratam,
doloribus articulariis, ulceribus, tumoribus,
cæterisque symptomatis comitatam brevi de-
pellit, & curat, nec unquam memini septies
ejus dosim repetisse, quin certo morbum hun-
cunditus debellaverit.

Quandoquidem in febribus malignis sanguis
veneno macetur aut coagulante, aut exsolven-
te, certe Medela omnis ad illius correctionem
dirigenda erit per ea, quæ Alexipharmaca, &
Alexiteria dicuntur, dummodo coagulans, aut
exsolvens fermentum evertant, ac præcipi-
tent; sanguinem concretum solvant, avo-
lantem vero frænent, & in sua naturali compage
derineant.

Quamquam autem coagulans acidumque
fermentum emendari, & repurgari potest di-
luentibus aqueis, obtundentibus alkalicis, &
opiatis; congruentiora tamen & potiora sem-
per erunt, quæ tale volatili sunt prædita, quæ
que sua energia valent floridum vegetumque
sanguinem reddere, ac vitale robur adaugere,
unaque simul alexiteria vi veneno resistere, &
fermentum febrile præcipitare, ac secerne-
re. Cujus generis sunt omnia Theriacalia dicta,
Bezoardica, & Diaphoretica, Diascordium
Fracastorii, & Sylvii, Theriaca vetus, & Ger-
manorum, antidotus Orvietani, spiritus The-
riacalis, aqua salii, strapedii, & Riverii, aqua
vitæ Mattioli, & Magnanimitatis, Bezoardi-
cum Minerale, Joviale, Martiale, solare, dictum
lapis Bezoar, sal volatile succini, cornu cervi,
& viperae, extractum ligni Aloes, hyperici,
juniperi, oleum cinnamomi, & ambari, tinctu-
ra Tartari essentialis dicta, idque genus alia,
ex quibus componi poterunt potiones, pilulæ,
conditus, pro libitu agrotantium & sympto-
matum varietate. Lotus etiam externi ejus-
dem census erunt. Margaritæ, sinaragdi, coral-
lia, & gemmæ quæcumque, eatenus convenire
poterunt, quatenus alkali fixo prædita aci-
dum, quod exorbitat in ventriculo adjunctis-
que partibus absorbere valent; quaniobrem
satius erit in illorum locum pulverem cornu
cervi, oculorum cancrorum, boli Armeniæ, ter-
ræ sigillata, terræ Samiæ, & Melitenis subro-
gere; sicut etiam contrayervam, scordium, di-
ctamnium, carlinam, angelicam, rutam capra-
riam, carduum, vincetoxicum, veronicam, va-
lerianam.

Epithemata adeo vulgo commendata in ma-
lignis febribus cavenda suadent Mercatus, &
Wedelius, ne scilicet ab illis diaphoresis impe-
diatur, eoque magis si frigida adhibeantur
Verum si quandoque applicanda videntur, ca-
lida sunt; ex spiritibus, tenuibusque liquoribus
concinata. Idipsum admonet Riverius in usu
oxyrhodinatorum. Multo autem utiliora sunt ca-
lida epithemata, & balnea plantis pedum ad-
mota ex vino calenti, ejusque spiritu, elixire
quolibet, & similibus: ab his enim universum
corpus roboratur, sanguinis motus promove-
tur, futuri abscessus, delirium, aut sopor immi-
nens præcaventur: quod etiam adnotavit Hof-
mannus in Schroderum.

Frictiones utiles erunt, si præsertim adhi-
beantur, cum cutis laxanda est, ad faciliorem
halituum perspirationem, atque ad promoven-
dam exanthematum eruptionem, quæ sæpe-
pius febres istas salubriter comitantur.

Dixitæ denique quod spectat, illam quàm
optimè institutam esse oportet, perpurcato
inprimis aëre à cujusvis generis inquinamentis,
adhibito quoque, si fuerit opus, igne, ex plan-
tis odoriferis. Cibis laudabilis sit, facilis di-

gestionis, & mediocri quantitate. Vinum perquam optimum, sed modicum, & dilutum; vel ejus loco, si æger sit abstemius, aqua C. C. in balneo Roris parata, scorzonæ, vel cardui benedicti. Solo quippe vinu usu plerique a febribus malignis liberati referuntur: est enim cardiacum, simulque alexiterium, & sudorificum. Cætera prout prudenti, ac sagaci Medico visum fuerit, resque ipsa tulerit, opportune præscribantur, ut in cæteris febribus dictum est.

In dissolvente fermento febrili alexipharmaca temperatè acidis jungantur. Acræ enim, & salia volatilia nocua sunt, nisi aceto, aut acidis temperentur, & commisceantur: expertum autem in his febribus sanguinem eductum minimè concretiscere, sed liquidum, fluidumque diutius perseverare. Utile ideo est aqua prophylactica Sylvii, & Barbette, atque extractum ex relictis sæcibus ejusdem; itemque spiritus vitrioli volatilis, & antiepilepticus Hartmanni, Arcanum duplicatum Myrsichti, Tinctura violarum, aut rosarum cum spiritu vitrioli, vel sulphuris parata. addita confectio alchermes, vel de hyacinthis. In pestilenti, & contagiosa febre efficacissimum dicitur hoc acetum, quod ex his sit: Summatum scordii, cum floribus m. j. verbenæ. & galegæ singul. m. j. rutæ ʒ. j. corticum mali citri ʒ. iij. malorum aureorum ʒ. ij. ligni aloës optimi, macis, & caryophyllorum singul. ʒ. iv. santalorum rubrorum ʒ. ij. radiceis zedoariæ ʒ. j. petasitis, carlinæ, & angelicæ singul. ʒ. vj. seu oslenicæ, scorzonæ, di-ſtami albi, & imperatoris singul. ʒ. ʒ. enulæ ʒ. ij. myrrhæ rubræ electæ ʒ. ij. theriacæ mithridati, & diascordii Fracastorii singul. ʒ. vj. camphoræ ʒ. i. baccarum juniperi ʒ. ʒ. lauri ʒ. i. croci ʒ. j. Hæc incisa, & contusa infund. in aceti vini acerrimi canthar. ij. & vase clauso detineantur in loco tepido. Sumitur ad cohibere unum.

Describitur etiam à Crollio, & Hartmanno elixir adversus Pestem, atque aliud à Tycho Brahe summo sui temporis Astronomo, cujus meminit Thomas Bartholinus in Cisti Medica. Apud Isbrandum Diemerbroeck notatur & aqua Theriacalis, quæ mirabilis dicitur simul cum extracto quodam magistrali. Aliæ referuntur à Cratone, & Sennerto. Inquit Helmontius Hippocratem Peltis antidotum habuisse vinum fumo sulphuris suffitum, vel vinum salsum fervidum cum sulphure: sul etenim abstergit, & à putredine tæatur; sulphur vero venenum cohibet. Promoto deinde sudore patientes alebat cremore hordei, & pro potu exhibebat vinum græcum picatum, cui inerant aliquot grana salis, & sulphuris: folia autem Asari aceto marcerata calida superponebat bubombus, itemque plantis pedum, & manuum, quæ post singulas horas duodecim humo contegendas præcipiebat. Ab usu quoque vini picati, subdit, Hispaniam raro peste affici, cum ibi vina cortis picatis conserventur. Ad stigmata admovebat lintea calida generoso vino intincta, cui sulphur incoxerat. Postremò exhibebat electarium viperinum ex carne, & corde, & hepate compositum; ut lætus apud eundem Helmontium. Insignes pariter vires

ad pellendam pestem tribuit Mindererus sulphuri ac vitriolo: nullam enim putredinem, nullam infectionem, nullam humorum depravationem ab his non corrigi fateretur. A vitriolo etiam præstantissimum remedium deduxerunt alii, teste Roderico a Fonseca. Vitriolum album in pulverem conteritur, & ter infunditur in aqua rosarum, totiesque liccatur ad solem, adjecto modico camphoræ; deinde cum æquis portionibus dictamini albi, & radiceis tormen-tilis commiscetur, & in tenuissimum pulverem redigitur. Datur ad ʒ. j. cum ʒ. ij. aquæ plantaginis, rosarum, vel acetosellæ, mane, & vespere. Commendatur à nonnullis veluti summum remedium Muria carnis porcine despumata; & à Parzo Muria Encraicholorum piscium. At Crato certissimo experimento sibi constare ait ad præcautionem, tincturam succini; ipsamque luccinum, si eo tempora, carpi, malleoli, & sinistra manna ad ruborem usque contricentur, unicum fuisse amuletum cuidam Chirurgo Hispano testatur Helmontius. Hartmannus electarium ex saccharo candido cum spiritu salis per spiritum vini dulci reddito conficit, & commendat.

Merique Arsenicum, aut sublimatum linco-lio inclusum, & sub sinistra mamma appensum homines à Peste tueri affirmant. Addunt aut pulverem bufonum, cujus præparationem memorat Helmontius. A pelibus quoque bufonum siccatis, & ulceribus pestilentibus applicitis venenum extrahi scribit Kirkerius: idque in communem usum verti apud Germanos. Includunt alii Mercurium crudum in cortice avellanæ, & collo suspendunt, ut cordis regionem tangat ex Marilio Ficino. Et alii radicem plantaginis majoris sacculo contentam gestant. At quis unquam his solum fides? sicut neque fumo tabaci ab Isbrando Diemerbroeck plurimum commendato, aut olenti urinae hirci, quam magnificat Avenzoar.

Postremò bubonibus, anthracibus, pustulis, ulceribus, maculis, aliisque symptomatis, notisque pestilentibus, quæ in cute erumpunt, specialibus quoque medicamentis occurrere consueverunt emplastris, cerotis, lituris, oleis, quæ multa præsertim referuntur à Sennerto, & Hartmanno. Illud vero potissimum videtur adnotandum non statim ulcera ista ad cicatricem esse perducenda, nisi postquam pestilens virus omnino fuerit resolutum, & expurgatum.

In Curatione Febris Hæcticæ distinguendi sunt ejus status varii. Etenim primis diebus tractanda est febris hæc more febrium diarium protractarum, remotis tamen primum causis externis, inde ipsa originem ducit; mox verò adhibitis us, quæ sanguinem fermento febrili infectum repurgare valent. Cumque sæpiissime febris hæc ardentes, & acutas consequatur, sanè illa eadem erunt exhibenda, quæ in ardentibus sunt memorata, consideratis tamen viribus, & propria agrotantis constitutione. Tunc enim sicuti marcor nullus, vel insensibilis est, ita febris vix Hæctica nomen meretur, nisi tantum ex suspitione habitudinis patientis, & febris aequalitate.

Commendant potissimum Medici congruam victus rationem, aeris mutationem, & lactis usum. Et quidem victus rationem ejus generis instituunt, ut modice refrigeret, valenter vero humectet, & efficacius impinguet; unde jura & confusa testudinum, linacum, & ranarum à plerisque præscribuntur, itemque aqua ex his medicata, electaria, & similia. At congruentiora sunt jura ex carnibus viperarum, & cancrorum fluviatilium. Cerebella quoque & interanea animalium, carnes hædinarum, vitulinæ, gallinacæ; Et si namque ab illis glutinosior chylus exoriatur, vegetior tamen ventriculus in ipsis conficiendis exquiratur; quamobrem satius erit delicatioribus alimentis hæticorum corpora alere, iisque nec immodicis, sed per intervalla assumptis: nam quæ longo tempore extenuata sunt corpora, lente retere oportet ex Hippoc. 2. Aphor. 7. Pro potu utile erit vinum stomacho gratum congruenter dilutum & temperate epotum. Saluberrima erit quies cum somno; neque multum de evacuationibus adhuc consuetis sollicitum esse decet, cum satis sit alternis diebus ventris onera deponere: alvus quippe lubrica nocua est in ejusmodi ægitudinibus.

Aeris mutationem, si præsertim in cælum patrium nat, vel in salubrius maximeque purum omnes in hoc affectu commendarunt. Cavendum autem ab eo, qui subinde variat, ac ventris plurimum agitur: si enim aultrii illi sint, sive borei, mali sunt, ægreque feruntur ab hæticis. In nostris regionibus præ cæteris magni sit aer stabienfis in agro pompejano ad radices montis Vævi, & litus maris, quo Galenus suos ægros mittere consuevit.

A lacte plerique tabidi convalere, illo usi pro cibo potuque sine alterius alimenti mixtura. Præcellere dicitur humanum, succedit asinum, tertio caprillum, postremo loco habetur ovium, vel vaccinum. Statim ac è mammis fuerit expressum potari debet, ne coaguletur, & ace scat; quare stomacho vacuo, & omni humore repurgato sumendum est, aliter acorem contrahit, & concrevit in caseum, vel etiam corrumpitur, & ventrem solvit non sine vite periculo. Docet præterea Hippocrat. 5. Aphor. 64. abstinere illo oportere capitis doloribus obnoxios, insigniter febriçitantes, & siticulosos, murmura, dolores, tumores, obstructions, aliasque ægitudines in alterutro hypochondrio patientes, eosque omnes, quibus multa sanguinis dejectio facta est. Quantum enim utilitatis ex ejus usu sperare licet, cum bene cedit, tantundem & irreparabilis nocuenti accidet, si ace scat, & corrumpatur in ventriculo; quamobrem ex Galeno admiscet præciji vel, saccharum, vel sal. Caute igitur illo utendum erit, etenim res est solliciti plena timoris; quamvis plerique nil mali ab illo vereantur, ac temere adhuc empyicis, & phthisicis exhibeant. Pro eo nonnulli lacte amygdalarum dulcium, nucleorum pineorum, & seminum melopeponum utuntur eventus feliciore. Et alii aquis ex carnibus vituli, capri, aut viperarum, itemque ex pulmone vervecis recenter exempto, sicut etiam ex serpentibus, quos nostrates cervones vocant,

per alembicum elicitis, qualis præcipue est aqua illa, quæ ab Authore suo capocetali, dicitur; pariterque sanguinis lactentis vituli, vel agni ex B. M. testana etiam hordeacea in frequenti usu est, necnon syrupus ex cancris fluviatilibus concinnatus. Fertur Zacuto summe profuisse cuidam tabido, cui nec balneum, nec lac, nec aliud quippiam humectans, & reticiens contulerat, aqua ranarum per B. M. elicta, & cum syrupo violaceo permista, atque in potum quotidianam exhibita; iisque elixis cum oleo, sale, saccharo, & balsamenti in cœna, & prandio una simul assumptis, ac præterea interdum jure ex illarum carne confusa parato, cum amygdalis, lacte, butyro, farina hordei, saccharo, & vitellis ovorum, ac denique cinnamomo, & aqua rosacea irroratis, lenique igne una decoctis.

Verum præter ea, quæ humectant, & alunt, glutinosamque sanguinis portionem restaurant commendantur quoque quæ acritudinem ejusdem maritaticam corrigere, & emendare possunt. Et quidem ex Hartmanno efficax proponitur sal coralliorum, & unionum ritè præparatus; itemque pulvis cachecticus Quercetani, saccharum e Margaritis in condituram redactis cum ebore, & oculis cancrorum. Ceresa etiam stibi in aqua plantaginis, vel rhapontici mira quoque præstat, si tamen opportune detur saltem per mensem.

Tabes demum à reliquis causis inductas, obstructione, apostemate, ulcere, evacuatione, pervigilio, vermibus, pathematis animi, cæterisque, curare oportebit remediis ad hæc congruenter comparatis, de quibus alibi actum est. *Lucas Tonz Medic. Pract. lib. 2.*

Curationem febris hæticæ quod attinet: Dietæ primò & præcipue attendendum, propterea aer sit temperatus, talisque exquiratur, si non adsit ubi versatur æger, cum præcipue videamus itinera suscepta multum proficere iis qui chronicis affliguntur morbis, dum modo non peccetur in excessu. Alimenta sint sanguini edulcorando apta, & bene nutriencia, hinc pulces tum ex oryza, tum ex avena hordeoque excorticatis, tum amygdalata, conferunt; item carnes vitulinæ, perdices, phasiani, omnesque monticolæ aves, lepusculi, pisces imò saxatiles admittuntur, sed præcipue cancri fluviatiles, & quorum succo butyro non salito misto antihæticum egregium parat Ettmullerus, nos verò juscula ex iisdem cancris brodio carnis vitulinæ pullorumque columbinorum, incoctis, magnæ efficaciz conficimus, si sola coctione in aqua vel vino fuerint præparati, videntium ad eos ferat ventriculus. Ranæ, ostreae, testudines, à pluribus laudantur, atque Lindanus super Hartmannum historiam habet virginis Hætica desperata laborantis quæ per ostreas comestas sanata fuit, ut & Amatus Lusitanus curæ per pullos gallinaceos testudinibus nemoralibus saginatos, & potum lactis asinini, peractæ. Nos experientia edocti, viperas recentes jusculo pullorum gallinaceorum incoctas maxime facimus, ut & lactum asinum, tum caprinum, tum vaccinum, quibus admiscemus ad correctionem, & ad arcendam coagulationem salia volatilia mitiora, quale è terra catechu patratus, item balsamum sulphuris essentielle sum;

neque volatile, cui refranenda & obtundenda feri acrimoniz, indeque ortis aut oriendis exulcerationibus, tum impediendis, tum curandis, par remedium nunquam vidimus.

Conducunt etiam Gelatinæ tum C. C. tum aliz simplices, quam varic compositæ, quarum præscriptiones & formulæ passim occurrunt.

Potus sit decoctum radic. chinæ, pallulis item additis, quarum in sanguinis dyscrasia acriter temperanda, & sanguine renovando vires maxime extollit Ettmullerus. Nos si nihil obstat aliquid vini bene maturi cum decocto chinæ simplici concedimus. Aquam betulæ incitæ commendat Clar. Dolz in sua Encyclopædia Medica, ut & alii aquam mille florum.

Sonitus sit mediocris; alius pigrior proritur enematibus ex emollientibus, laxior vero refruanda, remediis cydoniatis, tincturis rosarum rubr. papaver. rhæad. flor. altitæ, & malvæ roseæ, ut & gelatinis lenioribus adstringentibus varic impræguatis, item pilulis & tabellis è terra catechu imò hic forsitan præcipue faciet ros vitrioli; seu phlegma vitrioli roridum iteratis digestionibus à vitriolo abstractum; quod remedium non tantum in omnibus alvi fluxibus, ardoribusque viscerum conducere videmus, sed etiam in hectica magni sit propter sulphur vitrioli anodynum quo imprægnatum creditur. Corpus mediocriter exerceatur, frictionesque leniores, frequentius celebrentur.

Animi pathemata vitentur, interque ea maxime moror & tristitia.

Venus nimium non exerceatur, si enim in alio quopiam casu, hic maxime valet quod asserit Cornelius Celsus ipsaque experientia, frequentiore nempe concubitu corpus solvere.

Remedia quod spectat, nihil reperimus de usulactis, viperarum, &c. de quibus jam in dicta. Illa autem debent sero attemperando esse accommodata, ut & viis eidem apericulis. Talia sunt terra foli. tartari ejusque liquor quæ inter volatilia & fixa medium tenent locum, bezoardicum joviale, antimonium diaphoreticum volatilibus per plures affusiones & abstractiones artificiosè maritatum, antihæcticum Poterii cum conserva rosarum, ex quo magnum commodum videre non potuit Dolz, quia forsitan per trinam calcinationem aliaque in ejus præparatione curiosius observanda ex mente Autoris, nobis à Clariss. quodam & amicissimo viro communicata, satis accuratè non fuerat confectum; oculi cancri, ut & perla, per solutionem in aceto destillato in magisterium butyrosi præcipitati, quamvis tamen sic non obtineant quod exquirat Helmontius pro cura absoluta tabis, scilicet ut solvantur in primum suum concretum lacteum, liquoremque primogenitum. De terra catechu, ejusque sale volatili ut & de sulphure, variique itidem illius præparationibus atque præcipue volatili, nihil addimus, quia de istis jam supra.

Sequens destillatum antihæcticum nonnullos sanitati pristina restituisse asserit Clar. Dolz, qui propterea Lectorem admonet ne farragine simplicium ipsum componentium deterreatur.

℥. Caponem evisceratum quem coque in diplomate ossibus prius contulis cum aq. lbviii.

infunde rasuræ ligni sassafras ʒβ. rasuræ cranii humani, cornu alcis ana ʒ iij rad. china ʒ j. to. scabios. hepatic. nobil. veron. n. ont. torminal. flor. pæoniz, tilia, scabios. tussilag. bellid. n. in. ana M. β. rasuræ subtilis visci pyror. ʒβ. miz panis alb. filigin. conterv. rolar. rubr. antiq. an. ʒ iij. pulmon. vulpis calid. exempt. num j. secur. gallin. limacum exenterat. ana num. x. ranarum num. xv. succi beccabung. lbj. aut tempore hyberno ejus loco aq. e succo de pill. lbj. fiat lege artis destillatum quod educorari potest manu Christi perlata. Addit idem. Ex hoc destillato possunt parari emulsiones modo sequenti.

℥. Sem. melon. recent. ʒ iij. aq. antihæct. nostræ, sc. mox descriptæ, ʒ vi. f. emulsiō facinari perlata q. s. educoranda, atque circa vesperam exhibenda.

Vel ℥. Nucleor. pineor. ʒ iij. sem. cannab. ʒj. aq. antihæct. nostræ ʒ iij. f. emulsiō cui adde lactis sulphur. ʒβ. pulver. cordial. pretios. gr. xi. sacch. perlat. ʒ j. pro una vice.

Idem laudat pro calore acris in manuum & pedum volis maxime observabili temperando & minuendo tincturam è florib. violar. bellid. min. borrag. bugloss. per rorem majal. extractam, & ad liquor cochlearia bis vel ter de die exhibitam; nos pluris facinus eandem aut similem tincturam cum rore vitrioli extractam.

In exulcerationibus maxime commendamus remedium jam bis memoratum, scilicet balsam. sulphur. essentielle volatile, ex lacte, vel emulsionibus ad paucas guttas exhibitum. Dolz vero hocce in casu alumen sic præparat.

℥. Alumin. pulver. q. v.

Destilla calore arenæ: phlegma destillatum suo corpori redde, idque septies repete, aut donec totum phlegma in corpore suo remaneat. Sic paratum alumen tere, atque in loco humido per deliquium in liquorem solve. Liquorem balnei calore per duodecim aut quindecim dies digere; & postea filtratum lento igne coagula. dulcis usus, h. bet præterea Clar. Dolz, non tantum in febribus, sed & in pectoralibus morbis, præcipue autem in hectica venit commendandus. Dos. a gr. x. ad xv. in vehiculo convenienti.

Febris Maligna in specie. De variis declinandi modis, quorum ope febris maligna castrensis epidemia præcaveri potest.

Morbum hunc divina assistente gratia tribus modis præcaveri posse, quotidiana nos docet experientia.

1. Observatione debiti ac decentis vite regiminis, quod in observatione sex rerum necessarium, nonnaturalium à medicis appellatarum, quæ non tam ad esse, quam ad bene esse hominis spectant, consistit. hæcque sunt 1. aer, 2. cibus & potus, 3. motus & quies, 4. somnus & vigilia, 5. excreta & retenta, 6. ac animi pathemata.

2. Debita medicamentorum applicatione, quæ iis, qui vel dispositionem ad hanc luem in corpus suscipiendam præsentunt, vel in quibus una aut altera sex modo recensitarum rerum necessarium, seu evidentium corrigi debet, cito, tuto & jucunde exhibenda sunt.

3. Mutatione loci, quo is morbus ferocit:

at: quotquot autem alienum solum, gra-
næ hujus luis virulentiam evitaturi perunt, ti-
miditatem prius exuere, bonoque & pacifico
esse animo, atque omnes excensu enormes vi-
tare, anice rogantur: nisi enim hoc sciant, in
locis longe distitis nihilominus ab hoc morbo
corripientur, & sic patrios lares fugiendo, vi-
mox Parcarum furæque mortis præceptis obe-
dire adigantur; diu tamen lecto teneantur.

*Quomodo animi affectus sint sapiendi ac
moderandi.*

Videmur quidem à consuetudine medicorum via
recedere, quod mox in principio, quomodo
animi pathemata dirigenda sint, docere noli-
mus: quem etiam ordinem Raymundus Min-
dererus in libro de medicina militari olim
quoque observabat. Sed quoniam constat,
absque animi placatione, nec aer purissimum
inspiratum, nec laudabilem cibum ac potum
sumum exercitationes aut requiem, nec som-
num & vigilias, neque excreta & retenta quic-
quam ad corporis vigorem, sanitatisque con-
servationem conferre: ideo prudentiores hoc
vobis vitio hanc versuros fore persuasi sumus,
quod animum tranquillare ante omnia decre-
verimus.

Quotquot igitur loca febribus malignis epi-
demus, seu hac castrensi inquinata inhabitare
coacti, aliò se conferre non possunt, primario
omnium peccatorum scelerumque commisso-
rum memores, verapenitentia inducunt, relapsi-
cant, horumque ventium à summo rerum Gu-
bernatore devotissimis suspiriis, precibusque
ardentissimis in genua procumbentes efflagi-
tent; & virtuti ac pietati posthac litaturi, à
vita perversa desistant, peccandique illecebras
fugiant, necesse est; quod ubi præstabunt, ve-
ramque in D. O. M. fiduciam collocabunt,
cumque huiusmodi mente colent providentiam
ac singularem ejus tutelam per omnem vitam
suam; etiam in omnibus actionibus, expe-
rientur, ut inde summa animi tranquillitas spe-
randa veniat; cum ex adverso pervicaces Nu-
minis contemptores, quia se omnibus flagitiis
nobilitate unice student, semet ipsos supremæ
Judicis clementia defraudent, variaque men-
tis inquietatione, animi angore, ac conscien-
tiæ moribus conficiantur; quæ certe haud pa-
rum ad harum febrium productionem conferre
solent.

Ideirco, quisquis es mortalium, spem tuam,
& dum Sol justitiæ animi nubia serenat, & ur-
gentibus angustiis in Deum tuum colloca, qui
te nunquam deferet, sed saluum te eruit, quo-
ties peccata, suppetias terente Deo, rugere, in-
teger vitæ scelerisque purus vivere, atque ne-
quitiæ viis relictis, tramite recto & ad vitam
æternam ducente insistere tibi curæ cordique
est: non enim Deum omnipotentem & ubi-
que præsentem, imò & summe sapientem, quin-
qua providentem ac misericordem credere suf-
ficiat, nisi eundem scelerum simul vindicem ac
justum revereri velimus.

Posthæc igitur quilibet omnem melancholiam,
mœrorem ac vanum periculi mortisque
imminentis metu non excutiat, isdem vale di-
cat, lataque mente seipsum erigat, quo cor-
pori robur non deficiat, ac spiritus inde susci-

rentur; & pro certissimo habeat, se sub Nomi-
nis clementissimi tutamine esse, ut ut medicos
inter egros grassante lue versari teneatur. Ni-
hil enim huic morbum exhorrescentes, solo
sepius metu, solaque forti sepius animi impres-
sione hujus mali crudelitatem experiuntur.

Spiritus namque animales ab angore ac ti-
miditate, modum excedente, ita angustantur
& contrahuntur, ut virtute sua dilatare, par-
teique nobiliores pereunt suo transitu robo-
rante, quo felicius videm sua munia obeant,
mirum quantum defraudentur: hunc singulis
humorum, alias laudabilium, coctionibus tur-
batis ac vitiatis, moribusque corporis perver-
tis deleteria colluvies, hujus luis causa, profici-
citur; atque tandem propter omnimodam ha-
morum corruptionem omnia naturæ præsidia
corruunt.

*Qualis aer eligendus, & quomodo vitiosus fulli-
ginibus refertus corrigendus.*

Est quidem aer vitæ & morborum auctor
juxta Hippocratis de flatibus libro effatum: qui
si purus, lucidus, ac ventis salubribus perflatur,
non potest non magnum sanitati condimentum
esse.

Aëra igitur, sine quo ne per momentum vi-
vere possumus, accuratius pensitantes, in illo oc-
cultum vitæ nostræ cibum esse deprehendimus:
id quod felix ille, sic dictus Cosmopolites, *Alexander Seihonius*, observans in novi luminis che-
mici tract. 12. epologo his verbis expressit: Crea-
tus homo de terra, ex aëre vivit: est enim in aë-
re occultus vitæ cibus, quem nos rorem de nocte
de die aquam vocamus rarefactam, cujus
spiritus invisibilis congelatus melior est, quam
terra universa. De quo pluribus videri possunt
nobis de *Nysimeno* libro de sale philosophico,
seu spiritu mundi universali, *Joh. Ristii Holstii*
Phoenix philosophicus, *Hygini à Barma Saturnia*
regna, *Koberini Boyle* de aëris vi elastica, cum
aliis hujus viri celebrandis scriptis, *Johannis*
Mayeri quatuor primi libri tractatus medico
physici, *Sebastiani Wirdigii* medicina spirituum
curio. 2, *Joh. Henrici Kœsserlini* disquisitionis phy-
sico-medicae de spiritibus, *Andrea Nimeri* tra-
ctatus de spiritu mundi, seu nobili aqua car-
diaca, & tandem *Christiani Adolphi Baldini*
aurum auræ cum phosphoro Hermetico, qui
quali in compendio omnia de spiritu mundi,
in aëre nativitate, notatu digna luci publicæ
exposuit.

Cum itaque aer spiritu mundi seu sale volatili
æthereo imprægnatur, ac ab omnibus veneficis
& peregrinis exhalationibus aut vaporibus de-
puratus, ad vitam prolongandam, sanitatemque
conservandam, quam maxime, necessarius sit;
sepius autem tum à variis ejus è terra,
ac montium cavernis exhalantibus fumis, ab
insipientis hominum, ac bestiarum cadaveribus
oriundis fetoribus corruptis, (quod supra jam
in primæ sectionis capite §. 1. innuimus) in-
ficiatur, sanitati nostræ si velimus consulere,
hæc loca deserere, aut in salubriorem nos reci-
pere; aut si hoc commode fieri non possit, de-
bitis remediis aer corrigi atque depurari op-
porteret.

Humidum, pessimeque olentem in arduis
vel angustis contentum aëra, interdum bis,
ter

ter vel pluries, mane scilicet, circa meridiem, vespere & noctu, flamma e probe prius exsiccat lignis juniperi, abiegno, aut picco succitata purgamus; huic scopo etiam pulvis pyrius parum humectatus, sulfur itidem commune, chalcanthum, resina, cornua caprina, acetum & similia in prunas coniecta aut accensa inferviunt.

Sanitati nostræ omnino consultum foret, si sterquilinia cuncta, sordesque a porcis, gallinis, anseribus, aliisque animalibus domesticis ex ædibus ac plateis arcerentur. Eluvies in plateis, aut angustioribus ædium areolis, decliviores factæ canali in cisternas, aut profluentem rivum deducatur, ne stagnando putorem contrahat. Neque etiam tolerandus est perversus mos impudicæ pubis, & puellarum vestibus muros fricantium, alvique coacta ad ædes, sepimenta, pomeria, derelictosque urbis angulos deponentium, unde proximi vici fetore inquinantur. Pariter quoque sordidi homines, ac ancillæ urinam matulis noctu collectam in plateas non effundant. Ne fetor excrementorum è sella familiar, aut cloacis publicis totam domum, totaque areas inficiat, ea probe obtegantur, aut in locum abditum transponantur, aut etiam a foris tempestive purgentur.

Carnificibus senatusconsulto serio interdicatur, ne fetidas cadaverum quorumcunque detractas pelles, antequam in altiori, ab urbe tamen remoto, loco bene exsiccatæ fuerint, ædium superioribus contignationibus suspendant, alias per totam viciniam teterrimus inde exhalans squalor maximo cum sanitatis detrimento dispergeretur, nareque illic degentium perpetim ferret: imo grassante pecorum lue pelles nullo modo detrahant, sed ista cadavera profundioribus fossis integra occultent.

Pannos, lectisternia, lintea, vestimenta; ut & alia ægotantium utensilia non statim ab aliis usurpentur, nisi prius probe lota, suffumigiis correctæ, ærique puriori ad tempus exposita fuerint: quod etiam de omnibus aliis rebus, quæ nos ambire solent, intelligi debet, ne aer inde magis conspurcetur, sed munditiæ opera detur.

Vita sordida luxuque dedita æra in ædibus ac plateis, homines proxime ambientem, contaminare solet; ita ut, experientia teste, eundem non possint non ejusmodi dira mala variique morbi excipere.

Horis pomeridianis, hiernoque tempore, si cælum faveat, fenestras valvasque parum patefacito, liberalemque flammam e junipero in conclavi aito; ut aëre udo inquinato, felidoque expulso recens, ac spiritu æthereo turgidus inter, locumque perfleret: quo facto mox iterum fores atque luminaria claudito.

Ægros invisiuri, aut aliorum nebuloso aëre domo exeuntes, caveant sibi, ne per plateas festinando spicula nociva in aëre volitantia concitatus inspirantes attrahant; atque ægotantium ædes vix ingressi hauritatem ad lectum sublimi anheliu properent, ne malignam dormientium auram sudoremque exhalantem per respirationem in semetipsum recipiant, ne per ejusmodi contagium inheantur.

Curiosum est, inquit Tullius ea scire velle, quæ

ad nos non pertinent: idcirco nullus, nisi vocatus, aut munere devinctus qui tetricum ægotantium vultum exhorret, aut a nauseabunda ægros ambiante mephiti contremiscit, febri maligna detentos adeat. Sed hoc eo tutius expediet, ubi ante accessum vel aliquot grana juniperi, vel parum de radice angelicæ aut zedæriæ, corticibus pomi citrei vel aurei aut caryophyllum manserint.

Hunc etiam in finem hauri parum emolumentum dabit casura f. b. magnitudine sindoni infusa, si naribus sæpe admoveatur. vel sequentes res serico includantur.

26. Rad. angelicæ rec. siccatæ, myrrhæ rubræ selectæ, casuræ, caryophyllor. ana ʒj. baccar. junip. gr. 60. cymas ruta rec. tres. nucem myristicam totam.

Incisa & contusa in unicum saltem vel duos globulos coacta sindoni aut linteo involvantur, ac aceto rutato vel rosaceo intincta naribus frequenter applicentur; quibus etiam tempora & carpi simul frigentur. Necessitate urgente, si cuncta hæc ad manus non essent, rutam viridem manibus contritam, cum aliquot contractis juniperi granis itidem aceto humectam dictio n. odo adhibe; aut caryophyllos, nucem myristicam, rutam viridem, baccasque juniperi simul contusas, acetoque madefactas temporibus ac carpis sæpius attricato, naribus admove.

Quomodo victus ratio hic sit observanda.

Non minus elegantèr quam scite Hieronymus Mercurialis opus de arte gymnastica cædore dignissimum a victus erroribus auspiciatus est hoc modo: Quamdiu homines paucissimis rebus contenti lautas mensas & opipara convivia non cognoverunt, propinationisque post inductam paulatim consuetudinem penitus ignorarunt, (id quod primis illis seculis extitisse, memoriz proditum est) morbi neque apparuerunt, neque eorum nomina innotuerunt; sicut usque ad tempora Socratis distillationum, quas Græci *κλίμα* dicunt, nomen, quo nunc hodie frequentius est, ignoratum esse tradidit Plato: quæ de re tunc temporis medicinz aut paucos omnino, aut nullos vix nullaque principia extitisse certum est. Hæc etiam antiquissimus Auctor scripserit. Ægyptum multas herbas, multa que medicamenta habuisse. Postquam vero inter perantia notanda lues, coquorum exquisitæ artes, delicatissima epularum condimenta, vinorumque peregrina temperaturæ inter homines irrepere, morborum simul varia continuo genera succrescentia ad invenendam medicinam eos coegerunt: quæ semper carere profecto licuisset, nisi humana, vel potius ferina ingluvies, omnium maxime necessaria in effectisset.

Ne igitur hi, qui sanitatis vitæque integritatis studiosi sunt, ad eos scopulos navim suam afflictam videant, cum pro perverso seculi more intemperanter vivunt, assidue tuberculantur, uno somnoque sepeliuntur, iidem tuasores esse, ut medicorum innocua hygieines præcepta strictim observant; & hisce tempestatibus certe morbi tot ac tantas litages hauri eederent. Quo itaque medium in hac retineant, consultum duxi locum ex Plutarchi præceptis sanitatis, to. . operum Græco-Latinorum Parisiis 1624. editorum sat utilem iidem comprehendere:

Non

Non igitur, inquit, imitari debemus bonos naviculatores, corpusque subinde impletum & oneratum, purgando sursum & proluendo evacuare: sicut illi ob avaritiam, multa in naves cum ingesserunt, assiduo deinceps aquam exhaurire coguntur, sed corpora nostraabilia & expedita fervare, ut etiam aliquando premantur, ob levitatem suberis instar sursum sese efferant.

Qualem vero selectionem in cibo ac potu sumere, quemque modum in illis capiendis observare debeant, ipsis celebriores, qui de alimentorum facultatibus ac re cibaria scripserunt, auctores præcipient: ex quibus *Simeon Sethi* de alimentorum facultatibus interprete *Martino Bogdano Bernatium* Archiatro, *Melch. Sebizzi* ac *Balthasaris Pisanelli* libri de alimentorum facultatibus, *Ludovicum Nonnum* ac *Johannes Brayerinus* de re cibaria, *Leonardus Lessius S. I.* in hygiastico seu vera ratione valetudinis bonæ & vitæ, cum subjuncto tractatu *Ludovici Cornari* eodem pertinente, præsertim vero omni exceptione majores *Paulus Nencranzius* de purpura cap. 20. ac *Johannes Sigismundus Elsholzius* in dietetico nuper patrio sermone typis exarato; necnon *Gregorium Horstium* ac *Engelbertum Holsterhoffium* de tuenda sanitate legi ac imitari merentur.

Ne igitur sine symbolo dato hunc discedamus, paucis tantum, qualiter homo cibi ac potus debita administratione febrium castrensem malignam declinare queat, iisdemque necessariis regulis lectorem instruere volumus.

Cibus & potus, licet bonæ notæ sint, ac laudabile nutrimentum suppedirent, sæpius tamen de die, & magna copia non ingerendus, quia succi nutritii elaboratio hoc modo turbatur; ita etiam esculeuta sanguinem feculentum, spiritibusque orbem progenerantia interdicta volumus, qualia sunt caro recens suilla vel putrida aut corrupta alia, pisces palustres putrescentes vel emortui, ova ad duritiem cocta, butyro fixa ac vetula, massæ ex arina & spumo lactis pinxæ, non fermentatæ, lagana, poma immatura, fructus dulces bilemque augentes, ut sunt pruna, mala persica, cucumeres, pepones & similia: sic etiam nec vinum largius ad ebrietatem usque, neque sulphuris fumo inquinatum, aut recens, acidum, austerum, pendulum ac rancidum, nec cervisia haut bene defecata. non vetus, nec acescens bibenda. Vitam sedentariam exigentes, quia exercitationibus corpus non multum fatigant, nec assidua manuum opera viduum queritant, cibis, alimonium bonum præbentibus, concoctu facilius parcius demensis hora debita vescantur, vinum generosum vetus, vel zythum probe fermentatum beneque defecatum superbibendo.

Cæna semper prandio parcior sit, nec statim à pastu, ventriculo cibis onusto, nisi prius steterint, aut passus mille mearint, lectum petant; inter prandendum aut cœnandum, vel sub vesperam pro sanguinis refectione ac refrigeratione, embammatis loco, fructus acidiusculi, simulque nonnihil adstringentes, attamen, maturissimi, ut sunt ribesia Europæa, fræga, bacæ rubi idææ, cerasa acida, mala, pruna Damascena, ac uvæ modice gustari possunt, cumque his, ne acor eorundem crudior ventriculo obfit, panis tantillum comedatur.

Quorum corpora nimio calore æstuant, ab esu lactis, tonnina sævissima, diarrhoeam vel vomitus biliosos excitante sibi temperent; operatiorum & crebrioribus exercitationibus defessa corpora, quia vitiosorum humorum congestum sudore mox eliminant, non tantum lac, sed & alia interdicta edulia facilius ferunt.

Quotquot autem ventriculum, ab hesternæ cœnæ, cibo potuque nimium gravarunt, si postridie à quoque victu abstineant, nullo incommodo erunt obnoxii.

Quicumque prima statim luce Medici ægros contagio furente inviscere debent, ostiam cepe ac ovo sorbili auctam assumant, vel panem butyro illitum solisque rutæ conspersum edant; vel ad minimum frutulum panis rutato vel alio aceto intinctum deglutiant, ne virus inspiratione attractum ventriculo vacuo diu inhæreat.

Jentaculis non assueti, vel ea ob nauseam formidantes, grana aliquot juniperi, vel angelicæ, zedoariæ aut imperatoriæ radicem, corticesque mali citrei, caryophyllos, cinamomum aliaque spiritus suscitantia manducando sanitati suæ consulere possunt: cepæ aliæque esits hoc tempore multum conferret, modo ea deglutientes pessimum ex ore halitum non spirarent. Ego graveolentium horum loco sumerem panem martium aromatibus conditum aut biscoctum saccaro onustum.

Horum etiam perversa consuetudo merito detestari debet, qui vix orto sole vinum sublimatum, aliosque generosiores latices liberalioribus, aut duntaxat brevioribus haustibus ingurgitant, vel absinthiten, aut aliud vinum integrum fere mensuris hauriunt: quorum in usu diutius perseverando ventriculi habituulo sensim relaxatur, flaccescit, ac ciborum digestio depravatur.

Quid de abominando atque nocentissimo tabaci abusu statuendum sit, supra *sect. 1. cap. 5. §. 2.* abunde explicatum est: hoc unicum saltem hic concedimus, quod aëre præsertim nebuloso & humido, aut si caput distillationibus sit obnoxium, summo mane ac cubitum ituri unicam tantummodo fistulam fumificam exsugant: caveant tamen sibi omnes ab intemperato ejus usu.

Ultimo non ab re foret Medicos castrenses, si à scripto tactum hauserint, ad *Raymundi Mindereri* Medicinam militarem notis *Johannis Hickæ Cardilucci* novis auctam, ac *Johannes Valentini Willisii*, quem ob præmaturam mortem merito lugemus, tractatum Medicum de morbis castrensisibus internis cap. 4. §. 3. re-nittere.

De modo gubernandi exercitationes, ac requiem.

Quemadmodum moderatæ corporis exercitationes naturam à multis molestiis, intra cutis spiracula hærentibus sordibus liberando, sanguinemque, (ne particulæ hujus duriores, crudiores & minus mobiles in vasis tenuissimis varios morbos producturæ subsistant) in naturali motu juvando, ad sanitatis conservationem plurimum faciunt: ita motus vehementior ac diuturnior sanitati humanæ quàm maxime officit, quia

quia omnes in corpore spiritus exhauriuntur, singula membra cum visceribus debilitantur; ita ut particulae, sanguini ægre uniendae, ad cutis reticulum glandulasque miliarias rejectae, ibique subsistentes per sudorem aut exhalationem expirare nequeant.

Otiola similiter segnisque vita, qua fuligines copiosae in corpore accumulantur, propter motum autem partibus denegatum exhalare non possunt, valetudinis firmitati summe nocet: sic itaque suppressis spiritibus laudabiles etiam humores sordibus istis conspurcantur, ac deleteria qualitate imbuuntur: quapropter, si sanitati viribusque nostris prospicere contendimus, in motu & quiete medium teneamus necesse est.

Sudor à laboribus, vel aliis corporis exercitationibus in cutis ambitu frigus contrahens, & ad interiora pulsus, sanitatem vehementer lædit. Hinc quibus hoc accidit, cutim universam confestim satque diu pannis calidis asperioribus, ad poros patulos reddendos, perfricari sibi patiantur; quibus hoc non arridet, in lecto probe recti sudorem proliciant, quo id, quod frigoris impetu sub cute congelarat, expellatur; alias feбри quadam infestari possent, & si sudor præter omnem spem non excitetur, eundem cochleari rob sambuci, acetii aut aquæ, vel etiam poscæ modico diluti, à voto provocabis.

Qui prolixior de his institutionem desiderant, attenta mente Hieronymi Mercurialis totum de arte gymnastica opus perlegant, cum huic elegantissimo scripto, quod ad corporis exercitationes pertineat, nil omnino desit.

De modo regendi somnum & vigilias.

Quia capite præcedenti, quomodo corporis exercitationes grassante hac feбри sint instituendae, aut moderandae, explicuimus, haud diffculter illinc quoque somni ac vigiliarum regimen desumi posse existimamus; nihilominus tamen viam vel alteram animadversionem addendo, commentarium hac de re magis intelligibilem reddemus, ex quo etiam nonnihil pateat, quomodo & quando somnum vel vigilias capessere sanitati conducatur.

Cavendum itaque, ne in excessu, aut defectu eorundem peccemus, sed, sicuti in motu & quiete, medium teneamus. Ab immodicis namque ac intempestivis vigiliis spiritus fugantur, sanguis acrior ac crudor, evadit, calor nativus obtunditur, ciborum concoctio depravatur, vires labefaciuntur, sensusque omnes obscurantur. Contra somnus nimius, meridianus præsertim modum excedens, alimentorum digestionem retardat, imperfectamque relinquit, ac excrementorum egestionem remoratur; dumque ventriculus denuo cibo ac potu, prioribus nondum digestis, oneratur, chylus certe à fecum inutilium magmate haut decenter secernitur, sed turbidus crudusque ac feculentus permanet, & postquam sanguini commiscetur, peregrinam atque hostilem eidem larvam inducit, motuque corporis deficiente bona malis tam diu commixta permanent, donec humores omnes putrescant, cruditatem limosam, vasa angustiora obstruentem, contrahant, atque acrimonia corrodente partes singulas sensim sensimque depascant.

Ægrorum curam habentes, totasque noctes insomnes traducentes interdiu per unam aut alteram horam dormiant, ciboque coctu faciles capiant. Ne quoque ab ægris exhalantes malignae fuligines tam facile contagionis ope per respirationem sese influant, neu ipicula tua profundius in pulmones, ventriculum aut cerebri meningas adigantur, jejunus ad ægrum appropinquet nullus sive Medicus sit, sive alius, sed semper aliquid præstent necesse est; vini autem potui largiori non indulgeant, quia ebrii partim lecto affixis non recte prospicere, & partem faciliorem ad suam hanc per contagionem hauriendam dispositionem nanciscuntur.

De modo excrementa in corpore præter naturam retenta, expellendi, probosque humores retinendi.

Venter quotidie ad minimum semel ministerio officioque suo fungatur, necesse est: quod majori valetudinis levamento mane mox à somno sit; si autem quotidie ciborum recrementa tam mature deponi non possunt, sella cum egrediendi usu sapius insidendo, (qua consuetudine non neglecta tandem adstrictissima alvus obediet) ventris coacta è corpore extrudentur.

Pessime sanitati suae consulunt, qui in pertinaci alvi segnitie purgationibus extemplo, clysterum injectionibus, ac glandibus perpetim se macerant: à binis enim posterioribus excretionum modis, si nimis acria immixta sint, ani sphincter, sedisque venæ nonnunquam ita intumescunt, ut sordes ventris, licet ex intestinis reliquis ad rectum usque protrusae sint, excerni tamen nequeant; & sic alvi contumacia, quam his remediis tollere male satagunt, eo magis augeatur.

Æque boni, quam vitiosi humores cum ipsa bile in cylli tua, magna vi e corpore per medicamenta purgantia tortiora expelluntur, ita ut deinceps magna versus inferiora detrudendum, ac per alvum eliminandum partim non satis humectetur nec lubricum reddatur, partimque ob exhaustam bilem stimulo ac nisu debito, quo feliciter & facilius egeratur, careat.

Improvidae purgationes, experientia teste, novas contrictiones spasticas ac inde oriundas inflammationes in ventriculo, intestinis, pulmonibus partibusque aliis internis frequentissime excitant: proinde prudens Medicus tam temporis, quam loci symptomatumve circumstantias probe observet; ne alium hostem, quam antea morbus fuerat, magis favientem, detestandis hisce evacuationum officiis, in corpus illiciat, quam exturbet: cuius etiam in *scilicet*, i. cap. 10. paucis mentio facta est.

Plurima à purgantibus remediis damna exhibentur in doctissimo venerandi *Wesperi* nostratis libro de cicuta aquaticæ historia ac noxis, qui infinitis fere ditatus est observationibus, quarum aliquot jure meas, bona cum auctoris celeberrimi gratia appellare possum; quod experimentis illis non solum frequenter interfuerim, sed etiam iisdem suppetias ultro tulerim; quod & alii viri solertissimi, ut ex ipsomet opere patet, ingenuè præstiterunt.

Quam

Quam ob rem æquum lectorem ad scriptum illud elegantissimum, pro asserto nostro vindicando, evolvendum obsecro.

Quoties autem alvum adstrictum nonnisi remedium opera ad excrimentorum egestionem sollicitate possumus, natiura nobis sufficiant, inter quæ sequens usus externo conducit.

℞. Butyri rec. unc. ij. vitellum ovi. croci triti, gr. x.

Hæc probe subacta (quibus ad placitum de luteo sambuci pulvere ʒj. commisceri potest) crassitie nucis myristicæ vel juglandis ano intrudantur; vel globuli e panis termento, sale conspersio formantur & exiccantur, quos postea in usum vocando, unum, duos, vel tres butyro aut olivo illitos podici intrudimus. Qui a flatibus ventri inclusis obstructions alvi incurrunt, pari modo globulis e saccharo moschum spirantibus, oleo communi vel butyro intinctis utantur. Hoc in casu quoque tutissime glandes, (non sæpe tamen repetendæ,) ex melle cocto, salis communis addito pauxillo, confectæ applicantur. Globulis autem atque glandibus propter excrimentorum nimiam duritiem nihil proficientibus, clysteres emollientes domestici cum tractu injiciuntur, qui ex libra lactis dulcis tepidi, cui vitella ovorum duorum, mellis cochlearia duo, vel saccha. un. tritum admixta sint, componuntur; vel lactis loco, aquæ fontanæ aut juris carniū mensura media substituitur, cui fursurum, herba malvæ aut altheæ, florum chamæmeli singulorum manipulus, seminis anisi ʒij. incoquantur, colato juri postea butyri recentis unc. ij. mellisque recentis cochlearia duo addendo; quoties aquam fontanam assumplimus, parum adhuc salis communis insperimus.

Infantes à sola candelæ cera, aut syringes clysteris butyro vel oleo illitæ in anum lenta intrusionem sæpius alvum exonerant; quibus etiam externa remedia superius recensita, commode applicari.

Unguenta, cataplasmata, ac olea hic epomphalina egregie alvum movere solent: uti est unguentum de cyclamine seu de artanita, oleum epomphalinum Fioravanti, cataplasma ex cumino cum felle tauri mixtum *Seb. Astrucii Rubæguensis*, descriptum à G. H. Welsch in *exoter. cur. & observ. chil.* 2. 501. Linimentum e salvia recenti cum butyro coctum, ac hujus plantæ pulvere aspersum, ac unguentum contra vermes correctum in Noctibus nostris hibernis; ut & sequens mixtura, quæ conficitur ex olei e lathyride Fernelii, ac linimenti e salvia singulorum uncia, oleique epomphalini ʒj. Cuncta hæc vel ventri toto, vel si fortiora sint, umbilici regioni illinuntur. Huc quoque spectant unctiones pedum cum helleboro utroque, hermodactylis, hyoscyamo, sempervivo, succo pæoniae ac sebo paratæ, ac ab eodem *Welsch* in *exoter. cur. & observ. chil.* 2. 506. descriptæ. Si oleum lini calide linteis exceptum sæpius ventri toto imponatur, etiam pertinacissimæ ventris obstructions reserabuntur.

Alvus externa remedia respiciens, lenientibus & emollientibus internis medicamentis ad officium compellenda est: quod fiet, quando ma-

ne ac vespere horis duabus ante prandium & cenam cremoris tartari probe t. it. ʒj. in jure carniū parum ebulliens assumitur; vel præsentente biliosa in ventriculo coarctata sequens pulvis eodem tempore cum jure tepido sorbetur.

℞. Crem. tartar. 1j. Ocul. cancror. 1ʒ. Antimon. diaphor. c. nitro. gr. ʒ. Dacryd. sulphur. par. gr. ij. Ol. nucis myristicæ expi. gr. j. M. t. p. f.

Pulvis cholagogus celeberrimus *Wesperi* huic intentioni etiam satisfacit, cujus hæc est descriptio.

℞. Cremor. tartar. 1ʒ. Dacryd. c. sulphur. p. r. gr. ij. Nitri preparat. gr. j. Misce.

Felicem effectum in contumacissimis aliis alvi obstructionibus à passularum laxantium usu, de quibus mane ac vespere bonum cochlear assumitur, experti sumus, & infantibus etiam, ut ut minori dosi, tutissime exhibuimus: modus illos parandi sequens est.

℞. Prunor. Damascen. maturor. à nucleis liberat. ʒiv. Folior. sennæ sine stipit. select. ʒij. Tartar. alb. puriss. ʒj. Sem. feniculi ʒij.

Incisa & contusa in aquæ fontanæ mensura media ad dimidii consumit. lente coquantur; colato juri add.

Passular. minor. probe lotor. & select. ʒviii. Sacchar. albi. ʒiv.

Hæc iterum coquantur, donec mellis fere spilitudinem labeant; postea ab igne remotis, & tandem, donec refrigerant, agitatæ commisce cinamomi selecti pulveris ʒj. atque ita in pyxide pura ad usum servetur.

Sola folia sennæ cum prunis Damascenis urgente necessitate, coqui, jusque calide, addito saccharo, hauriri potest.

Sambuci flores nondum aperti, aceto, pipere ac macere conditi, & saccharo oleove aspersi embammatis instar in mensa assumpti alvum laxare solent.

Lactuca junior cum jure carniū bullita ac butyro recenti, salivæ, piperis macerisque pauxillo aucta pariter alvum sollicitat.

Succus nasturtii aquatici cum jure sumptus, ventrem laxat, si mane ac vespere repetatur, ac per aliquot dies continetur: quod & præstat succus cochlearis eodem modo ingestus.

Imo quotidie secunda hora ante prandium de sequenti pulvere dosi in jure salis experte sumi poterit.

℞. CrySTALLOR. tartari, Antim. diaphor. florum salis ammoniaci cum hamatite, salis abinthii singulorum ʒiv. F. pulvis tenuis, divisus in doses 8. æquales.

Quomodo ex adverso in diarrhœis aliisque alvi profluviiis procedendum sit, infra *sect. 3. c. 14.* satis explicabitur.

Sudoris quidem in hujus *sect. cap. 5.* aliqualem mentionem fecimus; nihilominus tamen delictuli, si qualemcunque mutationem percipiunt, frigidusque eorundem membra horror quatit, de extracto nostro theriacali grana ʒ. in catapotiis, vel bezoardici mineralis grana 10. cum syrupo oxyacanthæ seu berberum, vel citri, aut mica panis, vel conditura rosarum subacta deglutire, vel etiam aliud diaphoreticum, quorum infra descriptiones aliquot exhibebuntur, sumere poterunt.

Cerebri sordium, ut dicunt, in naribus extillatio, propter ductuum in iisdem à spissiore blenna oppilationem, intercepta, citius ac ptarmicis optime resolvitur & educitur: quo varii pulveres & tabaco, aromatibus ac plantis odoratis compositi pertinent, quorum copiam nobis *Dn. Pradem* nobilis Gallus in eleganti tractatu de tabaci per nares attrahendi præparatione primum Gallicè edito, nunc vero Germanicam in linguam verso à *G.K.M.D.* exhibuit: quibus hic subungere volumus pulverem tabaci compositum, communicatum ab Illustrissimo Comite *Maximiliano Francisco à Furstenberg*, unde hodie apud nos sub nomine pulveris tabaci Comitum *Maximiliani* venum exponitur, cuius hæc est descriptio,

℞. Tabaci virginiani ℥ ij. Iridis florentinæ ℥ ij. Ligni rhodii ℥ ss. Cyperi rotundi ℥ iv. Cinamomi, styracis calamitæ, summitatum amaraci, rorismarini, lavendulæ singul. ℥ ij. Caryophyllorum, maceris, florum rosarum rubearum singulor. ℥ ij. Radic. Ellebori albi ℥ ss. Zibethi, Moschi Orientalis spiritu rosarum soluti sing. ℥ ss.

Fiat ex omnibus pulvis non admodum tenuis: verum malus mos, pulveres ptarmicos liberalius ac frequentius attrahendi, hic merito rejicitur.

Huc quoque sequens pulvis ad roborandum caput efficacissimus viribus accedit, si quantitas lentis subinde naribus attrahatur; qui ab amico communicatus hoc modo, ut sequitur, paratur.

℞. Tabaci virginiani ℥ j. florum Betonicæ, caryophyllorum, nucis myristicæ singul. ℥ j. Moschi Orientalis spiritu rosarum soluti, ambræ chryseæ singul. ℥ j.

℞. Secundum artem pollen probe in vase custodiendum clauso.

Huc quoque elæosaccharum nostrum ptarmicum pertinet, quod usu frequenti probatum quoque propalare volumus, & sic componitur.

℞. Sacchari candi albi, radicis piperitidis siccata singul. ℥ ij. Balsami apoplectici optimi ℥ j. Olei Thymii, amaraci utriusque distillati singul. ℥ ss.

M. F. Pulvis subtilis, qui in vitro optime clauso asservandus.

Sic aliquoties hac tinctura ptarmica, quæ *Excell. Job. Sophronicum à Kozak* auctorem habet, satis antiquas ac pervicaces cephalæas post purgatum corpus cum extracto catholico ac Mercurio dulci persanavi, & hoc modo componitur.

℞. Radicis Ellebori albi ℥ j. pyrethri, amaraci floriferi siccati singul. ℥ ss. Spiritus vini optimi, quantum sufficit, ut tres digitos supereminet.

Stent aliquandiu in loco tepido probe vitro inclusa, donec inde tinctura fortior extrahatur, quæ per phyltrum ut clarescat trajicienda: in hanc postea penna immergenda, qua nares, quoties inibi blennam stagnantem resolvere ac expellere studes, illinere poteris. Nos interdum quoque aquam amaraci in qua Ellebori albi fibra bullierit, siphunculo vel rhinenchyte in nares infantum oppletos injecimus, & ita eodem à suffocatione liberavimus.

Modum, quo à variolis obstructæ nares mature referari queant, nobiscum olim communicavit *Emanuel Stimmer*, Senator amplissimus,

compater & amicus integerrimus, quem propter egregias animi dotes ingenique, quo pollet, acumine, honoris causa hic nominamus: quod sciam, eundem ad omnia instantibus ac pueris suis obvientiæ morborum symptomata, accuratè semper attendere. *Πυρρὸς* enim *Cælio Aureliano* auctore est specillum seu instrumentum, per quod aliquid in nares infunditur, sive infundibuli sive siphonis formam habeat; ac ferreum aut corneum sit, perinde est: oriturque à verbo *πυρρὸς*, naribus intillo; quo usus est *Dioscorides* aliquot locis; ut & *πυρρὸς* ac *πυρρὸς* ibidem occurrit.

Hodie pariter in Gallis aqua Reginz Hungariæ in nares attracta utilatissima est, ita ut plurimum, cum à limpido hoc liquore tunica in naribus foramina confestim referentur, tabaci pulverem deferant.

Salivam deficientem mallichis, caryophyllorum vel radicis pyrethri manducatione prolicimus: at si in locis infectis contagii tempore versaris, à salivæ deglutitione sedulo tibi caveas, ut cui forsitan jam spicula lethifera ex aëre attracta inherere, & in ventriculum detrudi, illicque facillimè inflammationem aut gangrenam excitare possunt; ideo semper eandem expuere conducit, uti id diffusius à Nobilissimo *Jacobo Johanne Wenceslao Dobrzenski de Nigroponte* in præservativo Universalis naturali demonstratum est, quem videbis. Urina suppressa aqua petroselinæ vel raphani rustici, cui guttæ aliquot olei distillati succini albi instillantur, provocatur; aut in hunc finem mane ac vespere de tinctura salis tartari guttæ 10. vel 12. in jure vel aqua fragorum assumuntur.

Mensilivus fluxus in feminis utero non gerentibus deficiens per sequens infusum emmenagogum, prius ab *Excell. Wessero* longo usu probatum, postmodum vero à nobis hoc modo præscriptum, excitabitur.

℞. Scobis chalyb. ℥ j. Cinamomi, acuti, cort. pomor. aur. extract. sicc. rhabarb. electi singul. ℥ ij. Caryophyllorum, maceris sing. ℥ ss. Cortic. Winteran. salis absinthii, sem. lenic. singulor. ℥ ij. Melissæ, pulegii singulor. Man. ss. Sacchari ℥ ij. Contusis in pulverem crassum affunde vini albi veteris mensuram, aquæ melissæ mensur. mediam.

Stent per biduum infusa; postea quotidie mane ac vespere de claro liquore bibant ℥ ij. quo sumpto, corpus per horam movendo, sese calefaciant, omniaque frigida fugiant.

Similiter Antimonii diaphoretici martialis grana 10. vel 15. cum pauxillo Cinamomi in vino vel jure mane ac vespere deglutitæ, perque 14. dies continuare conducit.

Et quia grassante hoc malo virium quam maxime conservationi studendum est, sudores etiam in laconicis prolekti, Venusque immoderata plurimum nocent.

De animi pathematibus, quæ potissimum aliz enormes evacuationes, vires una cum spirituum cohorte prosternentes, consequuntur, in superioribus sufficienter dictum est. Hisce temporibus quoque post purgationes vituperatas, venarum etiam incisio, scarificatio & similes evacuandi ritus æque noxii ac omnes errores in sex rebus necessariis deprehenduntur.

Quibus

Quibus remediis hic morbus præcaveri possit.

Quotquot, licet nullam in corpore mutationem, se ab hac lue correptos esse, percipiant, copiosis in sanguine stagnantibus corruptis humoribus repleti sunt. secumque harum superfusum colluvie vere & autumnus per leniter purgantia, superiori capite indicata medicamenta evacuare debent; plethorici vero, & quorum arteriæ ac venæ turgent, si ad id assuerint, nec inde expavecant, secunda vel tertia ab assumpto pharmaco die, ad sanguinem immuendum ac ventilandum, observato simul debito victus regimine, quinque vel sex aut septem ejusdem uncias & lecta vena emittant. Hanc qui, ut & remedia purgantia reformidant, de die in diem a cibo & potu sibi detrahant, usque dum se melius habere, atque ventriculum & intestina à superfluis excrementis, corpusque ab humorum corruptela liberum esse senserint. Nec media ætate, præsertim diebus canicularibus, nec hieme horrida in partes sæviente purgatio aut venæsectio instituenda: his namque anni tempestatibus varios morbos, hac non sæviente malignitate, incurrere possumus, si ejusmodi adminiculis abuti velimus.

Qui vel leviter febris catrensi se tactos esse existimant, purgantibus omnino abstineant, atque scammonium, colocynthida, jalappam, agaricum, aliaque his similia cane pejus & angue fugiant: mox vero in principio, si cardialgia addit, aut ventriculus ingestis corruptis scatet, mitius aliquod vomitorium assumant, v.g. de oxysaccharo emetico *Danielis Ludovici* ʒβ. vel de tartaro emetico ejusdem auctoris duo vel tria grana in cochleari aquæ fontanæ aut juris calidi, postero mane diaphoresin instituunt, Antimonii diaphoretici ʒβ. vel bezoardici mineralis ʒβ. cum pauxillo condituræ rosarum, aut rob sambuci subactorem sumendo; utque sudor velocius atque liberalius profiliat, bonum haultum decocti cornu cervi aut alterius superbibant: absente autem emeticorum indicante, Antimonii diaphoret. ʒj. nitro adhuc gaudentis aquæ distillatæ aut fontanæ uncias aliquot dilutam, ac syrupo violarum ad placitum auctam uno haultu ebibere, aut salis polychrestii sem unciam in jure largiori solutam absumere poterunt; postea sudoris expulsio tractari videtur, & ita sæpius à diaphoretico efficaciori semel aut bis sumpto æger convalescit penitusque restituitur.

Infantes propter pituitæ tenacioris, verumque in ventriculo ac intestinis collectionem, potissimum, quando variolorum vel morbillorum indicia adsunt, commodissime ac securissime trochiscis nostris hermeticis laxantur, quorum compositio hæc est.

ʒ℥. Mercurii dulcis aliquoties sublimando optime purgati ʒβ. Diacrydii sulphuris fumo non infracti gr. 48. Cornu Cervi Philosophice præparati ʒij. Cinamomi acuti ʒj. Sacchari albulini ʒβ.

Misce fiant cum lentore tragacanthi ac conditura rosarum trochisci No. 64. fabæ magnitudinis, æquales; de quibus infanti unius anni uncias, bimulo & trimulo duo, quatuor aut quinque annos habenti tres, sex ad decem usque annorum pueritiam extendentium quatuor, vel

triti in pulicula, aut alio quocunque modo exubeantur.

Præter hæc, licet præmissis purgationibus, beneque instituta victus ratione corpus satis deterium, atque colluvie vitiosorum humorum liberatum sit, alia etiam medicamenta huic veneno e diametro opposita in usum vocanda sunt, quando majori securitate minori que infectionis metu inter hac lue detentos vivere volumus; ex quibus sequentia excellent.

Quis itaque forma pulveris arridet, his sequens præscribatur.

ʒ℥. Radicum angelicæ, carlinæ, zedoariæ, radicis fraxinellæ, helenii, boli Armen. singul. ʒβ. Myrrhæ rubræ selectæ, cinamomi optimi, caryophyllorum, nucis myristicæ singul. ʒj. Sacchari albulini ʒ viii.

Misce hæc pulvis subtilis, de quo mane ac vespere cochlear dimidium comedant, vel vino aut melie dilutum potent.

Condituram vel eclegma desiderantes hunc pulverem uni vel duabus libris rob baccarum juniperi vel sambuc. commixtum mane ac vespere, quantum apex cultri capit, deglutiant.

In forma pilularum aut condituræ sequens probatur.

ʒ℥. Aloës Soccoterinæ, gummi ammoniaci, Myrrhæ rubræ, terræ signatæ singul. ʒij. Croci Orientalis ʒj.

Misce nant cum Theriaca Andromachi catapotia pili magnitudine, de quibus duo mane ac vespere sumenda: aliarum etiam pilularum theriacon tuendi se contra febres malignas gratia e rebus ad theriacam necessariis artificiosa virium extractione paratarum duo vel tria grana in unam pilulam redacta felici successu quotidie deglutiantur.

Compositionem extracti theriaci licet satis laboriosam sequenti modo, *sect. 3. cap. 2.* sæpius feliciter obtinui, ausimque affirmare, eandem omnes alias longo post se intervallo relinquere, cum summo studio vires earundem rerum in hoc extracto conserventur, exaltentur, ac in exiguum moleculam contrahantur.

Qui liquidis delectantur, mane in cochleari cum vino guttas sex ad decem usque de elixyri proprietatis Paracelsi debite secundum *Johannem Franciscum Vigani* parato, vel loco hujus de sequenti mane ac vespere 12. 15. ad 20. guttas in vino, jusculo, aut aqua scabiosa sumant; cujus hæc est compositio:

ʒ℥. Aloës Soccoterinæ, myrrhæ rubræ, Croci Orientalis, rhabbarbari veri, radicis zedoariæ, angelicæ, enulæ, corticis citri siccati flavi extenu singul. ʒβ.

His contusis & concisis affunde aceti acerri mi ʒ iv. & spiritus vini a phlegmate liberi mensuram mediam: stent per dies aliquot in loco calido, vitro probe nunito, inclusa; essentia postea clara servetur ad usum.

Quibus acida grata sunt, de sequenti aceto alexipharmaco cochlear unum mane ac vespere assumant, vel frustulum panis in eo madefactum deglutiant, aut offæ, jusculo, vel cibis commixtum hauriant:

ʒ℥. Radicum angelicæ, enulæ, carlinæ, fraxinellæ, tormentillæ singul. ʒj. baccarum juniperi ʒij. zedoariæ, zingiberis albi singul. ʒβ. corticis citri, Winterani, cinamomi optimi, nucis

myristicæ, caryophyllorum; myrtæ selectæ, singulor. ʒij. Croci Orientalis, casuræ singulor. ʒj. toliorum rutæ, herbæ scordii, rorismarini, florum centaurei minoris, rosarum rubearum, calendulæ singulor. Mj. seminis citri, feniculi singulor. ʒj).

Incisis & contusis affunde aceti acerrimi ac fragrantissimi mensuras tres & ubi in loco calido per duas hebdomadas in vitro capaciore probe clauso iterare, acetum, reliquo magmate post prelum rejecto, clarum in aliud vitrum effundatur, & ut supra dictum fuit, capiatur.

Nonnulli quoque domo egressuri orbiculum de pomo citri recenti cum ipso Cortice comedunt: qui commanducatus meo iudicio haut contemnendus; in peste Viennensi eodem cum fructu usi fuerunt.

Tria trium celeberrimorum Physicorum Amstelædamensium *Francisci de le Boë Sylvi, Pauli Barbetæ, & Francisci van der Schagen* prophylactica medicamenta intra corpus juxta eorundem præscriptum assumpta, maximo cum fructu virtutes suas exerunt; qualia sunt aqua prophylactica vel acetum antiloimicum, conditura prophylactica & pulvis alexipharmacus.

Nullis aliis balsamis aut aquis distillatis, aliisque operosis compositionibus contra hanc lucem opus habent, qui in modo descriptis, & *sect. 3. cap. 3.* adductis remediis acquiescunt. Lectorem autem his non contentum ad Auctores eos, qui de peste scripsere, remittimus, nosque ad curationem harum febrium, tertiamque sectionem accingimus.

De optima medendi methodo in curatione hujus morbi attendenda.

Quoniam inter omnes medicinarum partes genuina medendi methodus primas tenet, liquidem illa modum docet, quo deperdita jam sanitas per certas indicationes iterum restitui possit; ideo etiam hic nobis probe observandum venit, ut ex veris artis fundamentis curationem hujus mali tutam desumamus; quam obtinebimus, ubi secundum certas indicationes, indicata remedia ex infallilibus hujus luis indicantibus c. usis desumimus.

Cum itaque Universalis methodi medendi scopus sit, ut contraria contrariis curentur, atque indicationes curationis generatim in hoc consistant, ut omnium morborum causæ inhibeantur; inde sequitur per remedia iisdem contraria, partimque nocentis sublacione, & partim deficientis additione hoc fieri debere: sublata enim alicujus rei causa tollitur etiam effectus.

Merito igitur reprehendendi sunt omnes qui empiricorum more, minus perspectis causis, imò vix animadversis morborum phænomenis, mox se ad persanandos quosvis affectus accingunt, quo jurata sua remedia secreta sat caro pretio misere afflictis ægrotis venundare possint.

Ut autem ad propositum nostrum eo commodius perveniamus, occasione febris castrensis malignæ epidemiæ certæ indicationes ad inveniendæ, quæ ad triplicem hujus luis causarum numerum dirigi queant; atque ut decentem curationem obtineamus, sequentia peragenda sunt.

I. Ut acidum volatile, corrodens, effervens, sulphureum, seu realgarinum sal virulentum, internarum istiusmodi inflammationum sæpiusque gangrænæ causa, evacuando, infringendo, invertendo, absorbendo, dispergendo, præcipitando, aut figendo viribus suis orbetur.

II. Ut sanguis, ejusque serum, succus nervorum seu spirituum vehiculum, ac omnes, quocunque nomine veniant, in corpore peccantes aut in putorem abeuntes, vel etiam ob lentorem stagnantes humores immutentur & emendentur, naturalemque dulcorem, systasin debitam, ac motum convenientem redispiscantur; & si qua cruditate laborant digerantur, ac ad maturitatem perducantur, lentoremque deponant.

III. Ut inordinata vivendi victusque ratio deferatur; ex adverso autem hygienæ præcepta, quæ in debito sex rerum necessariorum usu consistunt, & partim ad opprimendum morbum, partim ad pristinam sanitatem recuperandam necessaria sunt, observentur.

Nihilominus tamen diligenter hæc tria notatu digna sunt. 1. Ut curatio tuta, circa & jucunda nar. 2. Ut à mitioribus ad fortiora remedia gradatim ascendamus. 3. Ut communia auxilia singularibus præferamus.

De inventionem remedium, ex tribus hisce indicationibus provenientium.

Quum in præcedente capite, inque prima indicatione, malignitatem hanc corrodentem evacuando curari posse statuerimus, plurimi forsitan existimabunt, nos per purgationes sæpius repetitas aut sanguinis missionem crebriorem ac largiorem hoc effecturos esse: quod tamen nequaquam intendimus. Candidus quippe lector ex supradictis satis colligere potest, quantopere fortiores & inflammantes purgationes, qualia sunt agaricus, scammonium, turbed, esula, jalappa, colocynthis, atque ex his paratæ pilulæ, eclegmata, alique formulæ fugiendæ sint, ut per quæ partes jam tum debiles magis irritantur & indanantur.

Sic etiam quam maxime reprehendendi sunt illi, qui nullam febrem malignam absque semel instituta, ut de sæpius repetita taceamus, ventresctione curari posse existimant; cum tamen in febribus castrensis duo duntaxat casus, iique rarius observentur, & in quibus sæpius nullus Medicus præsens, vel tunc nondum vocatus est, in quibus selecta vena locum habeat, abundantia scilicet sanguinis & veneni corrodentis revulsio ac derivatio, antequam profundius partibus, quod vel in principio erumpentis horroris aut rigoris, vel eodem finito contingit, sese insinaverit. Quapropter Chirurgus confestim vel horrore aut rigore durante, vel mox eodem peractò, dum vires adhuc constant, ægerque plethoricus aliàs sit, venam tundat, sibi que, ne sanguinem nimis profundat, caveat; imò multo minus, ut plures ex Medicorum filiis perperam consuevere, in tertium, vel quartum, à morbi assultu, diem laborem hunc differat.

Haut vero arbitrari debemus, eos, qui in sanitatis statu sanguinei reperti sunt, hoc morbo postea prehenso, ejusdem purpurei liquoris uber-

ubertate refertos esse; fastidium enim ciborum, ut plurimum, præcedens, ac per aliquot dies durans, omnem hanc sanguinis affluentiam, imo & ipsum corporis vigorem consumere atque tollere potest, ut deinde hanc ob causam detractione sanguinis non opus sit: præsertim vero depravata ciborum digestio, chylive turbata secretio, ira, terroris ac pavoris imago, virium conservatio, atque iterata venenifera, acidæ ac stagnantis malignæ causæ in sanguinem commixtio penitus dissuadent, ut agrum in majus adhuc vitæ periculum præcipitemus, ac una cum sanguine spirituum reliquias provocemus.

Nota. De sanguinis missione ejusque necessitate in febribus non tantum simpliciter malignis, sed etiam vere pestilentibus, multa scribit, Leonardus Botallus in suo de curatione per sanguinis missionem Tractatu, quorum hæc est conclusio. His observatis nemo rationis capax, jure in his morbis vituperare sanguinis missionem potest, sed mirifice, & tanquam divinum auxilium commendare, extollere, & confidenter usurpare: quod ipse profecto ab annis quindecim facio. Ideo in morbis pestilentibus in obsidione Rupellarum, & Montibus Hannoniæ ab hinc quadriennium, & Parisiis toto hoc biennio, & Cameraci anno proxime acto, in omnibus meis agrotis (qui innumeri fuerunt) nullum præsentius ac salutarius reperi ipsa larga & tempestiva sanguinis missio. Hujus rei testes esse possunt, & rhedarius Clarissimi Viri Domini *Bellevre*, à Secretiore Regis Consilio, qui Montibus Hannoniæ & exanthematis, & carbunculis amplissimis & profundissimis, & angina vehementi fuit obsepsus, cui sanguis nostro consilio quater fuit missus ex brachiis, nunquam infra sesquilibrium, præter aliquot uncias quæ fuerunt detractæ ex venis sub lingua, & præter cucurbitulas cum scarificatu scapulis applicitas. Et præfectus Chamvis, cui in dicta urbe mane circiter libram cum dimidia detrahi fecimus, & à meridie ex eodem vulnere libram, idque ex brachio partis quæ bubo insignis pridie ejus diei ceperat apparere, & statim post matutinam sanguinis missionem pyroticum apponi jussimus. Quartus hic jam erat dies morbi, nec illum antea videram, & nisi febris die sequenti magna ex parte remissa fuisset, de novo detraxissem sanguinem, at septimo, sudore multo liberatus est.

Sed unum exemplum afferam dignum relatu. *Lutetia* Capluanum, Hic Philosophus & Medicus candidatus erat qui praxeos adipiscendæ causâ Botallum sequebatur, quique testis fuerat curationum Cameraci & in exercitiis à Clarissimo hoc viro per sanguinis educationem institutarum, in iis omnibus febribus in quibus nares stillabant, quamvis de genere pestilentium essent, cum capitis & lumborum doloribus gravissimis, & urinarum turbulencia & confusione, atque etiam cum exanthematis, aut parotydis, quas mors excipiebat nisi largè ab initio sanguis fuisset missus) quem superius nominavi, ad me venientem in vicum Bethysi, insignis febris corripuit; quem dum lassum, & longè distantem à suo domicilio video, in meum hospitium accubare facio; cui postridie mane insigniter febricitanti, cum exanthematis minutulis & purpureis, venam aperui basilicam

dextram ad sesquilibrium, sanguine puro exiliente: postridie purgavi corpus ex syrupo rosarum laxativo, & decocto tolorum leniaz. Sequenti die, qui erat tunc tertius, ingravescerebat febris, & abscessus erupit supra cubitum dextrum, ex quo iterum tantundem sanguinis detraho impurissimi; à meridie iterum circiter libram ex eodem vulnere, & pyroticum abicessui appono. Die sequenti, qui erat quartus, mane, dum me videt, quasi desens, me obsecrat, ut illi injuriam & noxam a qua me affecerat ignoscere velim, interim ut illum domo eicerem ageremque quicquid velun tanquam de homine multis modis perditissimo, tum præ morte, cui se proximum putabat, tum præ infamia & periculo, quod videbat imminere domui & familiæ meæ toti ejus causâ. Ego ex eo rogo unde hæc verba? Ille, Peste gravissima me correptum video. Unde hoc colligat postulo? Ad inguen sinistrum, inquit ille, erupit mihi hac nocte insignis pestis. Retegit; attingo, illumque in spem erigo, significans illi genus mali jam mihi patuisse primo ipso die, dum exanthemata eruperunt. Quare reduco illi in memoriam, me illo die ab eo petivisse, num nocte pulices habuisset molestas: cui respondit, ne unam quidem, quamvis tota nocte pervigil fuisset. Quod verum esse ille intelligens, in meliorem spem se erigere cepit. Ego consideratis, bubonis magnitudine, & febris incrementa, & urinarum incendio, crassitie, confusione, & cruditate, venam aperui basilicam ex ea parte, sinistra scilicet, ad libram unam sanguinis putridissimi (nam ipse hæc omnia præstabam, ne genere morbi aperto Chirurgis, domus mea infamaretur, utque pestilens; ut mos erat, concluderetur) statim post pyroticum buboni applicui. Vespero aliquid coctionis urinae exhibere ceperunt. Die sequenti mane, quæ erat quinta, alius bubo sub axilla dextra insurgit, febris remissior, urinae meliores: hoc ipso die, imo etiam pridie, duo ex meis famulis qui illum inserviebant, & mali speciem subolebant, rogant me, ut illis liceat, aut ad eum non amplius redire, aut à me penitus recedere. Quod Capluanus fortè intelligens, dum ad illum accedo, me statim sic alloqui cepit. Non ignoro quanta animi molestia debeas opprimi mea causa, qui jam videor mihi ita morbo levatus, & viribus restitutus, ut non diffidam me posse in equum proficisci ad meum hospitium, vel rus. Qui sermo fuit mihi jucundissimus. Itaque jubeo parari illi gradarium equum, & à duobus meis famulis comitari, qui paucis diebus ter quaterve, Sanguinis missione repetita, pristinae sanitati divina gratia fuit restitutus, ut patet ex binis ejus epistolis quas ad me postea scripsit. (eas in sequentibus adfert vir Clariss. verum nos brevitatis gratia hic omittimus) Non ignoro me à multis hoc loco accusatum iri temeritatis; quod jure quidem fieret, si ipse hoc alibi, quam in meo hospitio præstitissem, aut jam illam manifesta peste correptum, ad me duxissem; sed amicum agrotantem, domi meæ receptum, sua in extrema angustia explodere, quæ fuisset immanitas? Nam neque ipsa prima luce in pedes, neque in equum consistere ullo modo potuisset, propter frequentes nauseas, gravissimos capitis & lumborum dolores, ar-

dentissimamque febrem : quis illum sic laborantem, ac morbum dissimulare minime valentem, eo tempore quo pestis per totam urbem luxuriabat, recepit? Perisset ille, & ego infamiam non effugissem. Ita & illum, & me cum tota familia, Deus optimus maximus incolumes servavit. Quod illum sæpius viderem, & confidentissimè ter quaterque in die tractarem, venam tunderem, bubonibus caustica apponerem, hanc confidentiam (præter Dei gratiam) exhibuit artis usus, quo didici, Pestilentium febrium & earum symptomatum vim omnem extinguere tempestiva & iusta sanguinis missione, quam ipse in me æque ut in meam familiam posse & solere exequi sciebam. Cæterum etsi de aliis remediis in illo usurpatis nihil dixerimus, utebatur tamen ille apozematis refrigerantibus, & detergentibus & cardiacis. Sed scopus propositus est tantum dicere de sanguinis missione.

Habes igitur hic mirandum exemplum, sed profectò primum (rhedarii scilicet) non minus mirum fuit, quamvis is non tam citò fuerit restitutus, in illo enim parcius ac tardius iusto sanguis fuit missus: nam primo die quo ad illum accessi, qui erat secundus a morbo, etsi sanguinem mitti imperaverim, id tamen minime tunc factum, quoniam accessiverant quendam Chirurghi: qui dixit lunam esse in signo infanto, nec id fieri debere ante biduum, sicque discessit. Quare postridie mane alterum Chirurgum accessiri iussi, qui, me præsentem, venam aperuit ad sesquilibrium, & à meridie ad parem modum.

In Episcopo Sisternensi nepote meo (biennium agitur) pestilenti, eaque ardenti febre correpto, ante diem quintum circiter libras quatuor sanguinis detraxi, & cum in aulam mihi tunc proficisci necesse fuerit, curam ejus commisi Marsicoto eruditissimo Medico, qui illi adhuc bis terve sanguinem misit: unde ad me scripsit ultimam spem se ponere in phlebotomia te tidò à se celebranda, qua præstita liberatus est. Et Henrico uni ex meis famulis, Montibus Hamonix eodem febris genere, pestilenti scilicet, prehensio, septies saltem sanguinem misit, & nunquam libra una sanguinis fuit detracta, his vero supra libras duas uno die.

Multa sanè alia nobis exstant exempla, ad hoc nostrum institutum pertinentia: verum quia res est de qua latius seorsim agere instituimus, ideo plura nunc dicere desinemus: dicentes denuò febrem nullam pestilentem esse, cui non conveniat æque, vel potius missio sanguinis, quam Synocha putrida. Hactenus ille.

Sic Petrus à Castro in febris malignæ puncticularis curatione admonet sanguinem per venam sectam statim esse detrahendum, & maxime quantum fieri possit ab initio. Est enim, inquit, hæc operatio tanti momenti, ut illa neglecta vix faustum eventum in hac febre vobis sperare liceat, quantumcunque blateret indoctum vulgus, cujus perniciofa petulantia licentiam in hoc sibi arripit, peritiorum etiam medicorum operationem arguendi ac coercendi. Non vos ista deterreant, & à recto medendi tramite latum unguem avertant. Extrahite in principio alacriter sanguinem, pro plenitudine & virium ratione, summam vero ad quartum usque; quinimò etiam & illo toto tempore,

quo non admodum diffusa fuerint contagionis semina: cum plethora autem etiam post dispersionem. In sequentibus postquam de variis nominibus, (pro ratione philosophiz iuxta) tundendis verba fecit, tandem addit: Nec tamen semper sola plenitudinis præsentia debet esse inviolabilis norma ad tundendam venam in hac febre: multa enim occurrunt quæ istam operationem impedire valeant: alia quæ illam, si non omnino tollant, saltem minuant & coercant. Illud facient symptomata prava & gravissima, quæ in principiis solent quandoque præ malignitate apparere, facientia colliquationes, syncopes, exsolutiones, anxietates, & alia quæ aureo illo *cap. 14. lib. 1. de arte curativ. ad glaucon.* fusc vos docebit Galen. Hoc verò iusta libratio virium ægrotantis, multitudinis plethoræ, accessionum, consuetudinis, ætatis, habitus corporis, causæ alicujus procacioris violentiæ, & aeris ambientis; circa quem alta mente reponite auream Hippocrat. sententiam *lib. 4. de ratione victus 1. 19.* Cum fuerit aer abundè calidus & siccus, ita ut citò ab eo corpus evaporet, nempe tum à sanguinis missione abstinemus, etiam si morbus magnus sit, vigensque ætate homo. Licet non semper ætate media grassari soleat hic morbus, sed sæpe atrocius irruat hyeme, ut nunc experimur.

Tandem & post alios multos Clariss. *Sidenham*, non tantum ea quæ de venæsectione in peste celebranda attulimus, scribit; sed etiam hæc habet in schedula sua admonitoria de novæ febris ingressu nuperimè edita. Malignitatis in febribus opinio humano generi ipsa pulveris pyriti inventionem lethalior fuit. Cum enim ex febres præsertim malignæ dicantur in quibus intensioris præ cæteris inflammationis gradus conspiciuntur, hinc Medici se ad usum Cardiacorum, & Alexipharmacorum nescio quorum contulerunt, quò scilicet per cutis poros expellant quod somniant venenum (hoc enim est dicendum, nisi malint verbis ludere, quam illud quod potest intelligi seriò proponere) ex quo factum est ut regimen calidissimum, methodumque hæc parem iis morbis adaptaverint, quæ frigidissima tu n remedia, tum regimen præ cæteris sibi postulabant. Quod quidem satis arguitur, tum in variolarum, qui ex calidissimis in rerum natura affectibus est, tum in febrium aliarum curatione. In quem errorem forte inciderunt ex conspectu petechiarum, macularum purpurearum, & cæterorum idgenus *contaminum*. Quæ tamen omnia in plerisque subjectis, inflammationi, ægri sanguini jam diu plus satis à febre accenso, superinductæ, omnino debentur. Utpote quæ raro sponte sua efflorescunt, præterquam sub adventu pestis ipsius, atque in initio invasionis istarum variolarum confluentium quæ summæ inflammationis participes sunt.

In hoc enim morbi genere maculæ liventes in variis corporis partibus una cum pustulis primum erumpentibus, comparent; atque æger eodem tempore sanguinis excretionem, vel per meatus urinarios, vel cum tussi per pulmones, fatigabitur; cum ita valida exagitatione, atque orgasmo ab inflammatione orto, sanguis ferociat, ut distractis jam repagulis, in cavitates corporis præceps ruat. Et licet maculæ istæ purpureæ in hac febre non à tam intenso sanguinis

guinis calore, quilibet is est qui istiusmodi hæmorrhagias excitat, ortum ducunt, ab eadem inflammatione, sed gradu remissiori producuntur; & quoties ista sanguinis excretio (unicum in variolis symptoma cui devincendo nondum par est ars medica) non accedit, refrigeranti regimine facile cedunt. Quod si malignitatis præsentiam non tantum e maculis purpureis colligunt, sed etiam ex eo quod observaverint febris symptomata subinde tuisse mitiora quam quæ ejus naturæ competere viderentur, ægrum tamen magis viribus occisum fuisse quam pro ratione temporis a quo coepit ægrotare; Respondeo omnia hæc exinde tantum procedere, quod natura a primo morbi impetu quasi oppressa, divictaque, non satis valida est, ut symptomata regularia, & magnitudini morbi consona exerat, omnia vero prænomina prorsus sunt anomala. Etenim perturbata æconomia animali, & quasi disjecta, febris exinde deprimitur, quæ obtinente genuino naturæ ductu vigere solet. Cujus rei experimentum haud vulgare occurrisse mihi meminimus multis ab hinc annis in Juvene quodam ad quem accersabar. Quanvis enim ferme animum agere videretur ille, calor tamen in externis partibus ita ad tactum sentiebatur temperatus, ut idem mihi derogarent adstantes amici, quoties asserbam eum febre laborare, quæ ob sanguinis oppressionem (cujus mole, exitu negato, quasi strangularetur) se explicare & ostendere palam nequibat: quod si venam inciderent, febrem illico satis violentam statim animadvertent. Aperta vena, & sanguine paulo copiosius educto emicuit febris, quæ vehementiorem nondum mihi videre contigit; quæ non nisi tertix, quartæve demum phlebotomix cessit. Hæc omnia adfert vir de re Medica quam optime meritis ut probe importuno diaphoreticorum molimine, febrem, malignæ, si placet, nomine venientem; quæque vel sua sponte, vel in ipsis morbi principiis eductis aliquot uncias sanguinis evanescere potuerat, vehementius accendi, & in morbum jam radicatum confirmatumque abire; atque ea propter sanguinis missionem potiori multo jure apud veros medicos sub februm initia mereri, quam aliud quodvis præsidii genus.

Non est sanè quod hic quæ in cap. de Peste jam attulimus, recinamus; imò tum nihil ex proprio usu suppetebat unde hujus, vel illius Practici firmaretur sententia; at circa febres malignas multiplex experientia edoctis satis superque constat, venæsectionem iteratam, nulli nocumento, at omnibus magno cessisse bono; Itaque etiam si non unica methodo ad eundem scopum plures collimare posse concedamus, non minus interim confidenter phlebotomiam, remediis, tum à Clariss. Autore mox recensendis, tum etiam in sequentibus ulterius explicandis, intermiscemus, cum de februm anomalarum cura apud nos agatur: dummodo contraindicantia prorsus non prævaleant; quod nobis hæcenus videre vix contigit. Consultò hic abstinemus ab adducendis exemplis eorum qui in febribus mali moris, cum pulsu admodum depresso, alvi fluxu seroso, madore corporis universo & dejectione virium totali, per sanguinis missionem aliis præsidiis oportune inter-

jectam restituti sunt, dum alii eodem tempore & loco timidioribus communi Medicis cardiaceis medicamentis quasi prægnantes acherontæ cito nimis transierunt. Omittimus præterea pleuritides purpuræ adjunctas cum imminente suffocatione, ut & febres enormioribus stipatas symptomatibus, in quibus eadem methodus omnino pro votis cessit. Hæc, inquam, omnia omittimus ne nimis hoc in capite simus. Sufficiat Lectori Doctissimo Clarissimos Viros pronunciantes, jam audivisse. *Atque hic nota finis.*

Nos in hac parte per vocem evacuare nihil aliud intellectum volumus, quam ut hujus morbi fomes, potissimum in pectore, ventriculo ac partibus vicinis latens, inque bilioso, lixivo, tenaci & amaro liquamine consistens, securiori vomitorio, sale nempe vitrioli, oxysaccharo emetico *Dan, Ludovici*, vel ejusdem tartaro emetico ejiciatur, simulque etiam venenum volatile corrodens, quamvis internis partibus jam inhæreat, hac concussionem extricetur, ac superveniente sudore expellatur; vel ut virus hoc volatile, & quidem omnium optime per diaphoretica ac alexipharmaca & invertentia eliminetur. Ne vero per diaphoresin laudabiles simul & noxii humores expellantur, artis opus est, ut hoc venenum prius infringatur, invertatur, retundatur, seu præcipitetur, vel absorbeatur seu imbibatur, aut involvatur ac lentiori implicetur, aut dispergatur ac diluatur, interceptiatur, aut hægatur, ac ligetur, aut spirituum ferocia demulceatur, vel defectus eorundem refarciatur, sanguinis ac lymphæ motus restituitur, aut humorum putredo inhibeatur, vel omni possibili modo virulentia hæc evertatur.

Tam diversis igitur huic veneno resistendi modis diversa quoque, variasque virtutes habentia remedia experuntur: Speciminis ergo loco sequentia sint.

Omnia ergo, quæ hoc acidum corrodensque volatile venenatum sal infringere, invertere, ac retundere valent, omnino contrarias acido qualitates habeant, necesse est: hæc itaque cuncta partim præcipitando, ac partim absorbendo aut imbibendo spicula hujus veneni inania reddunt.

Ex præcipitantium strictum sumptorum numero huc pertinentium, sequentia haut infimæ erunt notæ: sicuti sunt ostracodemata pleraque, lapides è triplici regno desumpti, ac gemmæ, corallia scilicet margaritæ, conchæ margaritiferae aut aliarum ostrearum testæ, chelæ lapidesve cancrorum, Bezoar Orientalis ex animalibus desumptus, aut in agris Siculis collectus, Occidentalis dictus; necnon crystallus, smaragdus, hyacinthus, amethystus, granatus, aliæque gemmæ; & si quis hæmatiten, silices, aliæque viliores lapides ad hanc classem referre vellet, huic certe nullo modo refragatur.

Quo etiam citius ac majori impetu quicquid est hujus veneni infringatur ac invertatur, simulque obstructions arteriarum à crudiore, viscidior, ac ad motum inepta lymphæ ortæ, tanquam inflammationis causæ referentur: necesse est, ut in subsidium veniant omnes sales spiritusque volatiles: uti sunt sal & spiritus cornu cervi volatilis, sal viperarum, serpentum, lumbricorum, ungulæ alcis, sanguinis ac cranii hominis, eboris, tartari, fuliginis, urinæ, omnia volatilia;

lactia; nec non spiritus urinæ aut salis ammoniaci, ejusdemque flores ab hæmatite, chalcantho ulto, sulphure aut chalybis scobe elevati: quibus jure merito annuere debemus causam, tanquam excellentissimum sal volatile oleosum aromaticum.

Huc quoque pertinent omnia remedia, quæ luxuriam ac spicula hujus venenati salis occultare, absorbere ac imbibere possunt: ex quorum numero ante omnia terræ simplex elementum, seu terra virginea aut magnetica est, ubertimque in plurimis corporibus terrestribus reperitur, sicuti est terra lignata, bolus Armena, terra Lemnia, Melitenis, unicornu fossile, margas ac creta; cujus indolis quoque sunt ex animalium classe cornua, ossa, ut & cornu cervi ultum, ossa hominum cremata; imo etiam omnes metallorum ac venarum metallicarum calces, quæ perieruntque nil aliud sunt, quam talis terra primæva ramentis metallicis ac paucillo salis sociata: uti sunt antimonium diaphoreticum, pulvis fixus antimonii albus, cerusa antimonii, specineum itomachicum Poterii, bezoardicum minerale, Solare, Lunare, joviale, Martiale, Saturninum; necnon diaphoreticum Martiale *Dan. Lnd.* ac diaphoreticum joviale seu antihecticum Poterii, sulphur Antimonii fixum diaphoreticum, crocus Martis, diaphoreticum magnum Fabri antipestiferum *Frid. Hofmanni* & similia.

Ex involventium ac implicantium classe hæc, quorum vel glutini spicula hujus corrodentis salis involvuntur, vel ramolis pinguium particulis implicantur, sunt: ut tanquam glutini seu visco virus hoc inhærescat, in usum vocanda sunt animalium cornu, ossa, dentes ac ungues; necnon eorundem partes membranaceæ, & ex quibus gelatum jus excoqui potest. Frequentius tamen sequentibus uti solemus, cornu cervi videlicet, cornu alces, rhinocerotis, unicornu marino, dente hippopotami, & apri, mandibula ac ossibus lucii piscis; ungula alces, caballina, gummi Arabico, ceraforum, lacruma draconis arboris, tragacantho; ac imprimis multis succis concretis e plantarum classe, uti sunt sapa, extracta, rob, gummi.

Ex oleosis implicantibus excellunt butyrum, olivum, adeps humanus, catulorum: necnon amygdalæ, pistachia, nuclei pini, semina frigida majora, & minora, semen Cardui benedicti ac lactei, papaveris, cannabis, lini, violarum, napi, nasturtii, urticæ, sesami ac plura alia, cum eorundem oleis expressis ac pinguedinibus.

In dispergentium ac discutientium censum primario veniunt, spiritus ac sales volatiles antea dicti; quibus & sequentia, quæ simul balsamina virtute ac fragrante odore suo suppressos & tenebricosos spiritus suscitare, refocillare ac erigere queunt, accensenda; quo postmodum tam remedium horum ope, quam etiam spirituum subsidio ad hujus veneni e suo nido expulsionem conjunctis viribus se accingant, ac ejusdem impetum superent: ut sunt anula, angelica, valeriana, imperatoria, chamæleon, sinarinus, amaracus, scordium, dictamnium Creticum, serpillum, thymus, calamintha, origanum, ruta, absinthium, calendula, sambucus, cortices pomi citrei & aurei, semen feniculi, anisi, fœlicios, grana juniperi, cinamomum,

cortex Winteranus, Kinkinna celebre antipyreticum, caryophylli, nux myrtica, macer, crocus, & sexcenta alia, quæ propter sal volatile oleosum suaveolentius virtute aperiendi & penetrandi superbiunt, ut eo facilius felicitiusque sudorem elicere valeant, seroque immensas particulas veneni per cutis spiracula eluunt. Et quia hic videmus fragrantia hæc salia oleosa prodesset, merito etiam operam impendamus, quo omnes spiritus, olea atque salia volatilia, chimica arte parata, per sæpius iteratas elevationes ac admixtione cinerum, cornu cervi uti, vini sublimati, aliarumque rerum, quibus scorix adhæreant a sordibus quicquidive empyreuma, fuliginem, rancorem, ac fetorem spirantibus purgentur, donec tales nitido ac sincero suo colore niveni aut glaciem purissimam æmulentur, spiritusque pelluciditate ac candore ipsum æthera fere superent: alias hæc retrimenta, si iisdem immixta permanerent, a core suo hæc inflammationes multum augerent, partesque adhuc magis lacefferent. Unda nulli suasores essent, ut spiritum cornu cervi non bene depuratum, & cui ferens oleum adhuc supernatat, vel sulphuris balsamum ab optimis licet cultorum fabris smalcaldæ confectum, & hæc morbis intra corpus assumeret, si velit majoris periculi exors vivere.

Quo etiam adhuc magis virulentum hoc sal dispergatur, omnium optime largiori aquæ potu aut alijs potulentis convenientibus a se invicem separari ac dilui poterit; quam ob rem aquæ potus adeo necessarius est, ita ut per totum morbi decursum eadem carere haut possimus, & si fontana aut putealis virio quodam labore, bullitione solitaria, aut cum alijs rebus corrigi debet, cui postea immiscemus sapa, rob, syrupos, succosve acidos ac refrigerantes; vel eidem immergere solenus, cerasa acida, pruna, fructus oxyacantha, pomum citreum, nitrum vitriolatum & similia. Nec ullo jure hic acidulas reticere possumus, tanquam excellentissimum hujus veneni diluens: quarum in febribus malignis usum ego olim, cum in illis oris degerem, summe salutarem expertus fui; ac in hac re forsitan nobiscum sentiet *Elia Rudolphi Cameracensis*, Archiater ac Professor Wittenbergicus celeberrimus, in suis de acidulis dissertationibus, Hisce etiam addamus serum lactis caprilli, bubuli, aut alterius probæ notæ, quod teste Excellentissimo *Christophoro Hardero* Poliatro nostro felicissimo egregiam in diluenda acrimonia hujus veneni operam præstare solet; hic enim vir optimus primum nobis serum lactis caprilli in febribus malignis commendavit: quibus tandem adjungenda sunt jura carniu suaviora; quibus hic pingua ac oleosa merito associari possunt.

Quo etiam hujus veneni impetus intercipiatur, ac ejusdem penetratio impediatur, in usum quoque vocanda erunt adstringentia e plantis desumpta, quæ plurima terra virginea referta sunt: exempli loco sint radix cormontilla pentaphylli, bistortæ, rumicui, plantago, pyrola, virga aurea, dens leonis, fanticula, flores papaveris rheados, rosa rubra, balauftia, gallæ, forba, cydonia, mespila, bacca myrti; itemque succorum spissamenta e spina Egyptiaca seu akakia, hypocisthida, ac catechu Nardingenfi confata.

Ad ligendum ac ligandum hoc venenum acida requiruntur, quæ simul spiritus suppressos odore jucundo suavitent, virtuteque sua suaviter adstrictoria ventriculum flaccidum ac relaxatum roborant, hujus fermentum seu magis volatilem salsamve lympha partem à biliosa blenna corruptum corrigant, putredini resistant, & inde sanguini in iolis arteriis resoluto debitam & æquabilem spissitudinem largiantur, sitimque iniuper intensiorem extinguant, hæcque sunt mala citrea, aurea, berberes, seu fructus oxyacanthæ, cydonia poma acidiuscula, mala granatorum, cerasia acida, baccæ rubi idæi, oxytriphylloa, acetosa, exque his expressi succi, aut aliz inde paratæ gustui grata compositiones; itemque acetum, nitrum vitriolatum, nitrum præparatum, vel ejus spiritus, spiritus sulfuris acidus, spiritus vitrioli; quibus etiam sulfur vivum crudum, aut sulphur pellucidum Lausanense, vel hujus flores sublimati annumerari possunt.

Ne autem quidam existiment, nos nobismetipsis contradicere, dum in præcedentibus contraria contrariis tollenda esse asserimus; jam autem acidum ipsius veneni aliis quoque acidis expellere nitamur, ceu per quæ morbus, stante priori & maxime plausibili sententia, magis augetur, quam auferretur; illi responsi loco habeant, ab usu acidorum modico in febrium castrensi curatione nullum omnino formidandum esse periculum, cum per acida hæc fixa veneni luxuries volatilis ac erratica magis, ne nocere possit, ligetur. Quemadmodum enim acetum, nitrum, hujusque spiritus, ac alii acidi latices, venenatum, effertur, acidum, volatile realgarinumque sal in stibio, hydrargyro, mercurio sublimato, aliisve virulentis fossilibus ac plantis figunt ipsique omnem nocendi vim adimunt: simili prorsus modo hæc eundem in corpore humano præstant effectum, dum non tantum hujus luis virus corrodens hebetant, ligant, spiculaque ejusdem obtundunt; sed & insuper ventriculum à bilioso liquamine liberant, sanguinemque depurant, ejusque systasin in æquilibrium redigunt; ut & universum corpus cum humoribus in illo fluctuantibus à graviore putredine ac corruptione defendunt; præsertim autem impetuosiores sanguinis à corde propulsi motum aliquo modo mitiorem reddunt.

Huc etiam illa pertinent, quæ propter salis volatilis, ceu terrestribus fecibus in hærentis, copiam, (ita ut quamdiu humidæ sint, à nullo calore sal hoc volatile avolet, sed ipsis constanter in hæreat) putredinem vehementer arcent, sudoremque vi sua penetranti procurant: inter quæ gentiana, zedoaria, zingiber, myrrha, nuxes immaturæ, fumaria, Carduus benedictus, scabiosa, centaurium minus, & ex his herbis distillatæ aquæ, vel è cineribus producta salia excellent: ex modo recensitis medicamentis *Nathanaël Hodges* in sua Loimologia sive pestis nuper Londini grassantis narratione Historica *sect. 7.* Zingiber miris laudibus extollit, & quomodo pulvis ejus ad sudandum, conditura verò tanquam prophylacticum in peste conducatur, fufius pertractat.

Tandem ejusmodi quoque requiruntur me-

dicamenta, quæ ope oleosarum partium seu sulphuris sui facile dissolubilis (quod tamen terrestribus scoriis seu innato limo circumdatum est, ac inde agere separari potest) vim hæbeant sudorem non solum egregie promouendi, venenumque expellendi, sed etiam spiritus animales irritatos perturbatosque & inordinate commotos sedandi atque ad æquilibrium reducendi, omnes peregrinas in corpore humorum fluctuationes erraticas ac resolutiones in sanguine, aliorumque liquorum, in ductibus aquosis aut ipsis nervorum canaliculis contentorum, compescendi, dolores mitigandi, simulque optatam homini tranquillitatem conciliandi. Robur tamen horum medicamentorum in eo consistit, quod lubricis ac oleosis suis particulis cerebri poros ac meatus leniter oblinant ac obstruant, & cancellis quasi sanguinem includant, somnum creent, & præterea exortum, medium aut extremitatem nervorum, per quas vias spiritus animales influunt, feruntur ac egrediuntur, litu suo oppilent, ut vel circa nervorum fines spiritus coerceantur, & à causa dolorifica removeantur; vel circa eundem principium influxus spirituum uberior inhibeat, ne inde magis ad furorem agantur, dispergantur ac perturbentur. Oleosa n. hæc seu sulphurea, quia, ut dictum, facile dissolvuntur, mox in omnibus humoribus ac succis corporis humani intus permiscuntur; unde tam exigua quantitate assumpta magnam feri secretionem, & inde frequentem sudorem promovent. Quamobrem à veteribus Medicis nulla fere antidotus, nullum phlogonium, nullum alexipharmacum, imo nullum etiam compositum exhibitum fuit, quin de hisce rebus, opio scilicet aliisve anodynis abundenter factum esset; huic autem eorundem remedium dissolutioni sal in sanguine fluitans volatilis, ac ipsum serum quoque superpetas ferunt. Hæc medicamenta tam interne quam externe, non sine magno & ægroti & Medici emolumento applicari possunt. Interne omnia, quæ ex variis papaveris speciebus conficiuntur remedia conducunt, ut sunt semen papaveris albi, capita papaveris, papaver erraticum, opium, diacodium, syrupus papaveris erratici, ac essentia ejus, laudanum (potius laudandum opiatum) crocus, castoreum & sexcenta alia. Omnibus hisce palmam mihi videtur præripere artificiose elaborata ac efficacissima essentia opii *Johannis Langelotti*, quam in epistola ad præcellentissimos Naturæ Curiosos descripsit: hanc secundum viri celeberrimi præscriptum sæpius paravi, eademque adhuc summo cum fructu in multivariis affectibus utor: inde tamen has quatuor remedium formularum commodioris exhibitionis gratia constare volui.

I. *Pilula anodyna Regia viris exhibenda.*

℞. Essentia opii Langelotti ℥j. Cinnabaris Antimonii purificata, unicornu fossilis albisimi singul. ℥ij. Pulveris croci Orientalis. sanguinis draconis veri singul. ℥j. Ambræ chryseæ gr. 16. Moschi Orientalis gr. 8. Olei cinamomi distillati guttas 8. Fiat massa pro pilulis ponere gr. j.

II. *Pilula anodyna hysterica.*

℞. Essentia opii Langelotti ℥j. extr. croci, extr. castorei singul. ℥j. Cinnabaris nativæ præparatæ,

paratz, diaphoretici Iovialis singul. \mathfrak{z} iij. olei succini albi gutt. 20. Fiant pilulæ pondere grani unius.

III. Pulvis anodynum.

\mathfrak{z} l. Coralliorum rubeorum præparat. \mathfrak{z} ij. sanguinis draconis veri, unicornu fossilis singul. \mathfrak{z} ß. Essentiz opii Langelotti \mathfrak{z} j. Fiat pulvis subtilis.

IV. Elixir anodynum.

\mathfrak{z} l. Essentiz opii Langelotti \mathfrak{z} j. Spiritus vini tartarisati \mathfrak{z} iv. Misceantur bene.

Soluta per filtrum trajiciantur, & in vitro probe munito asserventur. Dosis à gutta 1. ad 2. 3. ad 8. usque.

Attamen essentiz opii Langelotti dictæ Laudanum opiatum *Franc. Merc. van Helmont. Joh. Baptista F.* hanc inferius est: cujus descriptionem *Robertus Boyle* à jam laudato *Helmontio* sibi communicatam per *Henn. Oldenburgium* in actis Philosophicis 26. *Octobris* 1674. N. 107. fol. 194. luci publicæ exposuit; quam etiam hic æquo lectori non invidere volui, sic enim se habet:

\mathfrak{z} l. Opium minutim ac frustillatim concisi \mathfrak{z} iv. Succa cydoniorum tepidi recentis lbiv. vel lbv. pond. civ.

Stent in loco moderate calido per octiduum, aut decem & amplius dies, donec penitus termentarint, postea tincturæ per colum trajectæ adde.

Cinnamomi opt. caryophyllorum, nucis myrticæ singul. \mathfrak{z} j. vel \mathfrak{z} iß.

Stent bene clausa per tritulum, quatrimum, vel, quod melius, integram hebdomadam in digestionem; perque filtrum trajectus liquor in vase terreo super vaporis balneo ad extracti fere spissitudinem, aut quamcunque tenuiorem, si stillatim exhiberi debeat, evaporet; tandem adde quoque.

Croci optimi tenuissime triti \mathfrak{z} ij. vel \mathfrak{z} iij. aut ejusdem extracti, quantum tot unciz suppediant.

Fiantque inde, si spissius sit extractum pilulæ, quarum dosis à gr. 1. usque ad 4. si vero liquidius sit, ejusdem guttæ 5. 6. usque ad 10. & amplius sumantur.

Nihilominus tamen præ omnibus ex regno animali ac vegetabili paratis anodynis, metallo- & fossilium in supremum puritatis gradum evecta & fixata aurea sulphura laudanda veniunt.

Externe bono cum fructu omnia emollientia & humectantia medicamenta cum dictis adhiberi possunt, qualia sunt flores chamæmeli, radix ac folia althææ, flores liliorum alborum cum radicibus, folia & semen hyoscyami, nuclei persicorum, semen melonum, papaveris, crocus, castoreum, pinguedo canina, humana, butyrum, lac, meconium s. opium, galbanum cum variis oleis, unguentis, emplastris & cataplasmatibus, ex his vel aliis simili modo operantibus simplicibus confecta.

Ex his jam adductis variis remediis, plurimæ, præter jam citatas, medicamentorum formulæ & compositiones in commodiorem & temporalem etiam usum, secundum artem paratz, in officinis pharmaceuticis prostant: e. g. Theriaca Andromachi, Mithridatum Dama-

cratis, electuarium de ovo *Maximiliani Imperatoris*, diascordium *Eracaltorii confect.* alcherimes, confectio *Orvietana*, pulvis rubeus *Pannonicus*, confectio & species de hyacintho, species liberantis, pulvis comitis *Heroinæ de Kent* in *Monconysii* itinerum tom. 3. ac Medicinæ experimentalis *Digbeanæ* tom. 1. descriptus; hujus æmulæ pilæ regiz *Wepferi*, aqua theriacalis refrigerans *Riverii*, spiritus theriacalis *Paracelsi*, tinctura bezoardica *Michaelis* aut *Danielis Ludovici*, hujusque mixtura simplex, aqua prophylactica *Amstelædamenium*, & alia plurima, ut hic recensentur, minus necessaria.

Verum quia egregias quoque virtutes possidet confectio nostra alexipharmaca, ejusdem conficiendi modum hic inferere nobis placuit, ut sequitur:

\mathfrak{z} l. Radicum angelicæ, chamæleonis, fraxinellæ singul. \mathfrak{z} iij. Radicum inulæ, zedoariæ, tormentillæ singul. \mathfrak{z} ij. Corticis citri extimi siccati, Winterani, foliorum dictamni Cretici, scordii, rutæ, florum rosarum rubearum singul. \mathfrak{z} j. Baccarum herbæ *Paridis*, seminis feniculi singul. \mathfrak{z} ij. Gummi ammoniaci, galbani, myrrhæ amaræ selectæ, cinamomi acuti, Croci Orientalis singul. \mathfrak{z} j. Zingiberis, caryophyllorum singul. \mathfrak{z} ß Terræ signatæ, florum Sulphuris, unicornu fossilis, cornu cervi Philosophice præparati singul. \mathfrak{z} iß. Antimonii diaphoret. \mathfrak{z} iij. Opium correcti, casuræ, salis cornu cervi volat. salis succini oleosi singul. \mathfrak{z} ß. succi citri recentis q. s. ad humectationem pulverum omnium melis juniperini, rob ribesiorum, rubi idæi, cydoniorum singul. \mathfrak{z} xxxii.

Misce diligenter & pone ad fermentandum per aliquot dies, pro dosi exhibetur in convenienti vehiculo \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} iv. ad \mathfrak{z} ij.

Diffusio-rem pulveris rubei *Pannonici* utriusque descriptionem hoc sequenti modo contraximus, quo nunc uti solemus:

\mathfrak{z} l. Terræ signatæ optimæ \mathfrak{z} vi. radices tormentillæ, fraxinellæ, smaragdi præparati singul. \mathfrak{z} iv. boli Armenatis præparatæ, coralliorum alborum præparatorum, rubrorum præparatorum, conchæ margariferæ præparatæ singul. \mathfrak{z} x. Unicornu fossilis, rasuræ eboris, cornu cervi Philosophice præparati, radices doronici veri singul. \mathfrak{z} vi. Santali albi vel citrini, corticis citri extimi flavi siccati, seminis acetosæ, opii, casuræ, croci optimi singul. \mathfrak{z} ij.

Fiat pulvis subtilis, qui servetur ad usum, dosis est à \mathfrak{z} ß. ad \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} ß. ad \mathfrak{z} j. in convenienti vehiculo ad sudoris elicium.

Supra *sect. 1. cap. 8.* pluribus extractum theriacon egregium nostræ compositionis commendavimus, cujus accuratam parandi methodum æquis rerum utilium censoribus hanc invidere volui: conficitur ergo sequenti modo:

Extractum theriacon egregium nostræ compositionis.

Classis I. \mathfrak{z} l. Radicum fraxinellæ \mathfrak{z} iij. indis Florentinæ \mathfrak{z} iß. Rhabarbari vel Pontici, zingiberis, tormentillæ, pentaphylli singulorum \mathfrak{z} vi. Calami aromatici seu acori odorati, phu Pontici utriusque \mathfrak{z} v. angelicæ, gentianæ utriusque \mathfrak{z} ß. Aristolochiæ longæ veræ \mathfrak{z} ij. Asari \mathfrak{z} ij. Incis & contusis affunde aquæ pluviz distillatæ, ac aceti distillati purioris, de utroque quantum sufficiet ad debitam extractionem obrinendam;

vel

vel horum loco aceti distillati prius prodeuntis aquam volatilem (quam imperitiores phlegma vocant) ac rorem mineralem. Extrahatur tinctura in loco calido, atque bis vel ter hosce liquores maginate post prelum relicto attundas, quo omnis virtus ex his rebus extrahendo acquiritur; a collecta hac tinctura nimis balneo seorsim asserua; aqua vero per distillationem proleeta ad extrahenda sequentia utrumque potest.

Classis II. ℞. Rosarum rubearum exsiccatarum, scordii nostratis sicci utriusque ʒiʒ. Prælii albi florum itechadis Arabice de utroque ʒvi. Calaminthæ montanæ, Chamædryos, polii Cretici vel montani nostratis, Chamæpityos, florum hyperici singulorum ʒʒ. Centaurii minoris ʒij. Incisis & contusis affunde pariter tunc quam prima distillatione partam; & si ejusdem quantitas vix sufficiat adde liquorum prima classe nominatorum suffenam quantitatem. Eodem modo, ut primo in labore observatum, aliquandiu in loco calido digerantur, donec tinctura extracta sit, quam ut prius exprimere, novis infusionibus angere, colligere, per filtrum depurgare, ac in maris balneo ex cucurbita vitrea humidum distillando in spissamentum cogere debes. Extractum inde prodiens spissamento *Classis I.* addatur; aqua vero seorsim collecta prosequentibus rebus extrahendis usurpetur.

Classis III. ℞. Piperis long. ʒij. albi ac nigri, seminis petroleli Macedonici singulorum ʒvi. seminis ammis, anisi, feniculi Florentini, seselios Cretici vel nostratis, dauci Cretici de quolibet ʒij. Cardamomi minoris, cubebarum utriusque ʒiʒ. Pinsa hæc eodem modo, ut superiores Classes, tractanda, ut extractum spissamenti dictarum Classium addi, & latex distillando acquisitus ad reliquas Classes extrahendas assuam queat.

Classis IV. ℞. Cinamomi veterum, seu cariophyllor. qui ipiomet cortice excellentiores, ʒxiii. Cassia, seu Cinamomi recentiorum acuti ʒi. Costi odorati, vel Corticis Winteram ʒvii. Maceris ʒv. Incisis & contractis affunde liquores, uti in præcedentibus Classibus factum fuit, quo tandem extractum reliquis jam collectis addi queat; & si quæ aqua a distillatione super sit, seorsim asservetur.

Classis V. ℞. Myrrhæ r. sel. sale tart. reser. ʒj. Asphalti, seu resinæ succini. Cattorei medullosi utriusque ʒij. Xylobalsami, Aspalathi de utroque ʒij. Incisis & contusis affunde spiritus vini absq; phlegmate quantum satis erit. Fiat harum rerum extractio ut decet; & spirituum vini dein post tincturas collectas abstrahere; Resinaceum verò spissamentum superius junctis extractis commisceatur.

Classis VI. ℞. Seminis napi ʒiʒ. Seminis thlaspios ʒʒ. Cum pauxillo aquæ, ab antecedente *Classis IV.* Residua, fiat emulsio, quæ fortiter per linteum expressa spissamenti collectis exactissime immisceri debet.

Classis VII. ℞. Seminis citri decorticati, Nardi Indice utriusque ʒj. Schœnanthi ʒvii. Distamni Cretici a stipite purgati ʒvi. Nardi Costicæ ʒʒ. Mari veri, amaraci de utroque ʒij. Hæc Classis meo saltem iudicio, subtilissime teratur, ac per cribrum absque ulla alia præparatione trajiciatur, addaturque reliquis extractis

collectis; cum harum rerum virtus balsamina volatilis vix extrahendo, ob levissimam partium texturam, conservari possit.

Classis VIII. ℞. Salis viperarum aut serpentum nostratum, vel in horum defectu, salis cornu cervi aut lumbricorum terrestrium, volatilis candidissimi, ac optime cum spiritu vini à scoris fetidis sublimati unc. ij. quod cum spiritus vitrioli Martis suffena quantitate ad saturitatis punctum ligetur, donec strepitus, inter instillandum omnino cesserit.

Classis IX. ℞. Terebinthinæ Chizæ, thuris masculi triti utriusque ʒvi. Maltiches selectæ ʒj. Quæ simul lenibus lignis solvenda ac reliquis extractis commiscenda sunt.

Classis X. ℞. Succii hypocistheos, succii acacia seu spinæ Egyptiacæ, gummi Arabici splendidi singulorum unc. ʒ. Hæc tria simul in succo pomorum, citreorum limpidi, aut vino cydoniorum, vel etiam in aqua distillata, a superioribus speciebus proleeta, solvantur, depurgentur, ac in spissamentum, ut prius, cogantur, ut extemplo reliquæ massa addi ac immisceri queant.

Classis XI. ℞. Styracis Calamitæ in lacrimis, sagapeni in lacrimis, terræ Lemniæ, aut Meitenis S. Pauli de quolibet unc. ʒ. opopanax selecti in lacrimis, galbani puri in lacrimis utriusque ʒij. quæ omnia vel seorsim, maxime vero hiberno tempore, terenda, vel junctim in pollen impalpabile redigenda, ac cum pulveribus *Classis VII.* Permiscenda sunt, quo sic reliquo spissamento jungantur.

Classis XII. Iste quæ omnes antecedentes Classes sic elaboratæ, ac invicem mixtæ sunt, adde juxta artis pyrotechnicæ leges sequentia seorsim præparanda, videlicet: Extracti scillæ recentis in cibano cum pane assatæ, expressæ ac in viscosum spissamentum exhalatæ ʒij. vel quantum scillæ præparatæ sicæ ʒij. cum aqua fontana extractæ suppeditant; extracti ab opii Thebaici ʒij. cum aceti distillati & spiritus vini purioris Partibus æqualibus parati, ac denuo spissati; Opobalsami Arabici genuini, vel ejus loco, olei nucis myristicæ expressi, vel utriusq; ad compositionem assumpti ʒxiii. Extracti glycyrrhiæ pellucidi, & recenti radice cum aqua simplici juxta Angelum Salerni, seu optimum extractiones rerum parandi magistrum, facti ʒiʒ. Extracti ex agarici ʒiʒ. ope spiritus vini confecti; ac tandem extracti croci cum liquoribus acidulis parati ʒj. Singula hæc per vices toti massæ æqualiter commisceantur, ne grumi minus pertritum dispersi coalescant.

Classis XIII. Tandem cuncta simul juncta in mortario calido, cum pistillo similiter calente, tandem probe commiscere oportet, donec omnia diligentissime dispertita sint; & quia hoc spissamentum aliquomodo liquidius remaneret, ni crassitudinem ab aliis siccioribus rebus acquireret, ideo addere solemus pulveris Antimonij fixi albi Bal. Valentini, seu magisterii Antimonij diaphoretici ʒiv. Boli Armeniaci ʒij. Misce hæc exactissime cum integra massa; ne autem pinguisculum hoc pollen intermiscendum in globulas vix separabiles ardeat, sindoni aut linteo raro includi debet, ut instar amyli aut farinis inspergi possit.

Classis XIV. Operatione ad hanc metam proleeta, totum extractum adhuc diu manibus

malacissimum erit; cui tandem paritidis stillis addantur oleorum anaraci, anisi, feniculi, cinamomi, cariophyllorum, rosarum veri, omnium distillatorum de quolibet Guttæ decem: quæ deinde omnia probe unita, ac per aliquot horas malacissata in pyxide metallica ex auro, argento, plumbo candido Anglico, aut lamina confata usui ulteriori asserventur. Hujus extracti seu spissamenti dosis postmodum erit a grano hordei ad duo, tria, quatuor ad quinque; quod catapotiorum forma exhibendum, aut in convenienti vehiculo dissolvendum.

Extractum theriacon ita paratum etiam basis est sequentium compositionum; quæ similiter in hujusmodi affectibus summo cum sanitatis emolumento potui dari possunt, v. g. Pilulæ seu Extractum bezoardicum nostrum:

℞. Extracti theriaci nostri, bezoardici mineralis utriusque ʒij. Misce hæc probe; cujus dosis in feb. malignis erit a granis decem ad duodecim pro adultis. Pilulæ bezoardicæ anodynæ sic fiant:

℞. Extracti nostri, antihectici Pot. de quolibet ʒj. Cinnabaris summios vel nativæ, sulphuris antimonii fixi utriusque ʒvi. resinz succini ʒβ. Misce fiat massa; cujus dosis a granis 5. ad 10. usque ad 15. erit.

Illæ remedia, quæ pro symptomatum varia in hoc morbo sævientium indole multivaria quoque esse debent, infra in singulis symptomatum capitibus reperientur.

*Quæ remedia statim in prima hujus morbi ag-
gressionē agri sint adhibenda.*

Si penitus extra dubium est, hominem hæc febris catrensi maligna prehensum ac infectum esse, quod ex omnium membrorum lassitudine, gravibus animi deliquiis, capitis doloribus atrocissimis, vehementique cardialgia cognoscitur; adeoque infirmi videntur ægri, ut præ debilitate hanc amplius erecti stare queant; si nunquam, vel turbate saltem dormiant, interno æstu & siti intensa premantur, oris amaritinem incusent, debilis aut laboriosa respiratio, pulsus frequens ac celer, & urina turbida atque lixiva sit; ciborum summo fastidio ac nausea, quam vomitus enormes excipiunt, vexentur; vel in potissimis tantum membris dolores lancinantes ventrisque tormina sentiant, alvi profluvio torqueantur, rigor aut horror morbum procedat, & subsequens calor post vespertam ingravescat, alternisque diebus ægrum magis lacescat.

Quis itaque hæc accidunt; non statim absque ullo observato temperamenti aut sexus discrimine purgans remedium, aut sanguinem mittere convenit: quemadmodum hisce tempestatibus maligna sæviens febris non tantummodo veterinarii, sed etiam plures ex Doctoribus Medicis, antiquo Barbarorum more, hæc præsidia adhuc plerisque ægris mox præscribere, medicationemque suam auspiciari consueverunt.

Ante omnia vero, ut jam dictum est, distinguenda sunt ipsa ægrorum temperamenta, ætas, ac sexus, imo quoque distinguendi ipsi affectus: cum longe alia ratione curatio in majori humorum putrore ac resolutione, quam in minore, requiritur, seu ubi sanguis

ac lymphæ plurimo acido fixo seu melancholico succo scatet: quorum hæc longe facilius spirituum ac salium volatilium applicationem fert, eorundemque continuum utrum postulat, dum in magnis humorum resolutionibus a putrore ortis acida ac terrestria fixa, seu alcalia insipida cum adstringentibus ac opiatis omnem medicandi scopum absolunt. Supponimus tamen, impeditum sanguinis circuitum mox è primo morbi insultu spirituum ac salium volatilium usu prius restitutum, aut ventriculum a crudis, indigestis, viscidis, biliosisque sordibus lenioris vomitorii ope purgatum esse.

Ne autem quicquam, quod in hujus morbi medela necessario observari debet, omittamus; ideo absque ulla interposita mora ægri non tantum in lecto stragulis bene cooperti decinendi sunt; imo per totum morbi decursum hoc modo requiescant in lecto lecti, quo ab aura frigidioris injuriis tuti degere queant: ubi simul provideant adstantes ac Medici, ne frequentius, intempestivius, vel tempore aliàs minus convenienti ægroti stratis exiliant, ac corporis membrorumque jactatione contra sua sibi met ipsis labores arceant; ne multa loquantur, sed taciturni sint: quam garrulitatem *M. Valerius Marialis in Mathone* salte perstrinxit lib. 4. epigr. Si. his versibus.

Declamas in febre Mathon: hanc esse phrenesin.

Si nescis, non es sanus, amice Mathon!

Declamas æger, declamas hemitritæus:

Si sudare aliter non potes, est ratio.

Magna tamen res est: errans cum viscera febris

Exaruit, res est magna tacere, Mathon.

Si enim juxta *Nicolai Tulpii Amstelædamsium* Consulis amplissimi monita observationibus suis subnexa hemicrania laborantibus tacere convenit, multo magis hoc effatum ad ipsas febres malignas, quæ hemicrania periculosiores, extendi poterit.

Neque minus noxium esse nimium corporis aut membrorum motum ex ipsa *Galenii* Medicorum antesignani sententia verum esse comperimus, statuentis febris acuta laborantes ab omni motu esse removendos; quo etiam referre possumus nobilem questionem ab *Hieronymo Mercuriali de arte Gymnastica lib. 4. cap. 7.* motam, an corpora ægra ullo pacto exerceri conveniat? unde locum, qui maxime ad nos spectat, huc inferere consuevit duximus.

Quocirca secundum istos corpora, quæ immodica intemperie calida laborant, nullis vehementibus remissive exercitationibus accommodantur; quod calor, qui diminui debet, ab illis potius augmentum suscipit: quemadmodum *Galenus de Premigene*, summa caliditate laborante, narrat, qui nedum a vehementioribus exercitationibus, imo & ab exiguis deambulationibus in porticu, ante balneum factis, magnopere lædebantur. Unde merito condemnandus est *Aselepiades Prutiensis*, qui in ardentibus febribus, referente *Cello*, gestationibus utebatur: in aliis vero febribus, & morbis, medicatione ac vomitiones tollens, inedia, siti, vigilia, luce primis diebus ægrotantes, instar tortoris, excruciat; aliis autem diebus ambulationibus, gestationibus, balneis lectulisque pensilibus exercebat.

Multo

Multo minus febrī maligna atrocius detenti abſque manifefſta leſione viriūque detrimento erecti in lecto aut ſella ſiſtere; imo adhuc dimenſius ſtare aut ambulare poſſunt: quam ob cauſam eo magis ſolliciti ſumus, ad ægrum quocitius eo melius ac tutius lecto aſſigendum.

Quo itaque juxta propoſitum noſtrum geminamque medendi artem curationem rite proſequamur, ante omnia examinabimus, num ſanguinis niſſio, ut quibuſdam placet, in principio hujus febris locum inveniat, adæquatumque ac ſufficientem in nō orto hoc expellendo auxilium præbet: quod inſtitutum in iis duntaxat aliquomodo valet, qui plethora, ſeu ſanguinis, & quidem laudabilis, abundantia, polent, quibique vires adhuc integræ, vel nondum omnes dejectæ ſunt: ubi mox durante febris horrore aut rigore, vel conſeſſim ab eodem initio in brachio alterutro, ſub lingua, aut in pedibus aliquot ſanguinis unciz, nec forſan ultra quatuor aut quinque detrahuntur: & ne ullum animi deliquium aut ſyncope ſuperveniāt, ante & poſt venam ſectam ſequens alexipharmaca refrigerans potiuncula duobus partitis hauſtibus aſſumatur.

℞. Aquæ ſcabioſæ ꝑ. iv. aceti antiloinici, ſyrupi rubi idæi, ſingul. ꝑ. j. Antimon. diaph. ꝑ. ꝑ. ſalis abſinth. ꝑ. j. Millec ad vitrum.

Poſt venam ſectam ac epotum alterum hauſum æger in lecto ad ſudandum ſollicitandus eſt. Cavendum autem quā nō maxime, ne hominibus valde debilibus, aut jam nimium ægritudine conſectis, urgente cardialgia, inque ſanguinis penuria, ac morbo jam ad aliquot dies ſæviente venam tundamus; alius in præſentiſſimum vitæ diſcrimen hac ſiniſtre adnota operatione ægri præcipitentur. Haſ igitur ob rationes, quantum potuimus, in febrī catrenſi aut alia maligna, imo in cunctis intermittentiſus, a ſectiōne venæ abſtinemus ideo, quod ne nullum quidem felicem effectum inde obtinuerimus, niſi in vere ſanguineis mox in prima morbi acceſſione, & quibus vires nondum exhaustæ fuerunt.

Supra dudum diverſis in locis pernicioſam iſtam medendi methodum detectatū ſumus, quæ ægrotantium plurimi in principio ſtatim cuſcuſque affectus medicamentis fortioribus purgantibus, in acriori atque irritante reſina conſiſtentibus, dilaniari ſolent: at nos hæc, niſi urgente duro neceſſitatis telo, nec in præſenti, neque aliis morbis in uſum adhibere conſuevimus; cum pyrotechniæ ſolertia nobis multo ſæviora, tutiora ac certiora remedia primas vias detergentia ſuppeditet, quæ in huiusmodi inſtitutiōibus valetudinis maximo cum fructu exhiberi poſſunt.

Verum eſſim vero, ſi quis ex omnibus circumſtañtiis perſuaſus ſit, medicatione per inferius guttur purgante hic opus eſſe, iſ vulgarioribus reſectis purgantibus omnibus, mox poſt morbi exortum pilulas ſequentes una vice deglutiat.

℞. Mercurii dulcis optime mitigati ꝑ. j. Antimon. diaph. cum nitro ꝑ. ꝑ. Extracti hellebori nigri diaphor. gr. iv. Mercurii vitæ per exhalationem ſumi virulenti correcti gr. j.

M. F. cum pauxillo theriacæ pilulæ No. 5. vel 10.

Vel in jure calido in tinctura ſalis tartari ſibiata *Frid. Hofmanni* 10. vel 30. aſſumat guttas.

Uno Antimonium diaphoreticum ad integram drachmam in aquæ ſcabioſæ ꝑ. iv. ac ſyrup. violar. purp. ꝑ. ꝑ. una vice inſtar potus refrigerantis aſſumptum ſecuriſſimum detergens ac purgans, bilioſam corruptamve aut alias crudam viſcidamque coluviam e ventriculo ac in teſtiniſ expellens, erit: quo dein lumine volatilia, ac maxime penetrantia diaphoretica eo liberius radios ſuos per quovis corporis cunctos trajicere, vaſorum ſanguinem ſerentiū obſtrucciones cæptas referare, interceptumque purpurei laticis circuitum ad perennem ſuum motum, naturæ congruum, reducere queant: dicta potio nonnunquam etiam, ſi fauces ac gula blenna tenaciori obſinita ſint, vomitum mover; & cum utrum ab Antimonio diaph. nondum elotum eſt, adultis ad quatuor ſcrupulos in jure non ſalito exhiberi poterit. Sic etiam Antimonii diaphoretici ꝑ. j. ac ſorum ſalis ammoniaci cum hamatite ſublimator. ꝑ. j. inter ſe mixta cum juſculo ſalis experte ſumi ſolent.

Pari modo ſal polychreſtus à ꝑ. j. ꝑ. j. ad ꝑ. j. in jure largiori non ſalito, vel aquæ fontanæ gelidæ, aut decocti hordei menſura media ſolutus, ac intra horæ ſpatium brevioribus aliquot hauſtibus ſumptus, ſufficienter & abſque noxa primas vias, ſi plurimis fecibus ſint reſectæ, expurgat; quibus vero dulcia arrident, huic jentaculo detergenti immiſceant ſyrupi violarum purpurei ꝑ. j. eodemque recensito modo utantur.

Non hic reticere debet diaceltateſſon, à *Moſe Charac Helmontio* adſcriptum, ſub ſinem pharmacopœiæ ſuæ chemiæ expoſitum; quod à ꝑ. j. ad ꝑ. j. & ꝑ. j. in conditura roſarum, aut rob domeſtico, vel aqua convenienti diſſolutum dari poſſe, cujus deſcriptio hæc eſt.

℞. Antimonii crudi, & ſalis ammoniaci, tritorum & ſimul mixtorum ſingul. ꝑ. vi.

Sublimentur ex arte flores inflammabiles rubri: horum ℞. ꝑ. iv. Nitri puriſſimi ꝑ. viii. detonentur in ollis ſublimatibus, & flores abſque ulla ſui perditione colligatur: flores detonatos elue aqua calida, donec nulla amplius ſalfugo gultu deprehendatur. Sicco huic leni calore pulveri aſfunde ſpiritum vini puriſſimum, ad quatuor tranſverſorum digitorum eminentiam, omniaque vaſi vitreo excepta, agglutinato recipiente, diſtillantur igne primum lento; qui tandem ita urgeatur, ut materia ebulliat ad ſiccitatem uſque. Relictus vero pulvis perfecte exiccatus per dimidiam adhuc horam igni exponatur, & ad uſum ſervetur.

Huic modo recensito medicamento procul omni dubio haut abſimilis erit *Georgii Thomſoni*, Angli ac chemiatri celeberrimi pulvis emetodiaphoreticus; quem olim in hamatiſi, nuper vero in epilogiſmiſ chemicis ampliter commendabat. Nec quoad operandi modum ac dignitatem inferius erit viri expertiſſimi ac humaniſſimi *Petri Gabrieliſ*, Præſecti hortorum ſereniſſimi Ducis Wirtembergici arcanum emetodiaphoreticum, quod æque ac ſal antiloinicum *Journelli* certiffima contra peſtem, aliæve lues epidemias peſtilentes antidota, eodem auctore, ſint: at quia utrumque hoc remedium, tam quoad præparandi modum,

quam quoad exhibendi rationem à laudato *Gabriele*, tanquam singulare secretum obfignata manu dehinc 5. annis *ap. m.* Wirtembergico legatum fuit; ideo illud, invito auctore, propagare noluimus.

Quod vomitoria concernit, eadem in principio hujus luis in plurimis agris non tantum summe prolicua, sed & maxime necessaria experti sumus: ex quibus nos tutiora tantum eligimus. In quibus itaque ægrotantibus vehemens cardialgia, oris amaror, appetentia ciborum omnino dejecta, ac nausea animadvertitur, illis statim tutius aliquod emeticum propinamus; urgente necessitate parum curantes, siue mane siue vespert hoc fiat. e. g. de tartaro emetico *Dan. Ludovici*, (*Myschitani* incertius operetur) grana duo, robustioribus autem tria, vel in pauxillo juris, aut in cochleari aquæ fontanæ, in qua mox funditur, vel in forma boli cum tantillo condituræ rosarum rubrarum exhibemus; dumque ventriculus valde exagitari incipit, nulloque adhuc præsentem vomitu vehementius laceratur, sorbitionem juris, aut seri lactis caprilli calidorum largius frequentiusve hauriendo idem rejectus provocabitur: cujus etiam remedii ope nonnunquam simul assellandi conatus augetur.

Si autem intentio sit, obtenta vomitione simul per inferiora corpus detergere, huic pulvericulo emetico 15. vel 20. grana cremoris tartari commixta exoptatum effectum præstabit: quo augmento omnium prius celeberrimus *Christophorus Harder* nostras usus fuit; cujus luculento testimonio fultus eodem modo illud remedium postmodum propinare incepti. Vtrem hac tempestate adhuc securus reddi solet vomitio, ac sordium in febrii principio per alvum deturbatio, si de Antimonio diaphoretico, tartaro tartarificato, floribus salis ammoniaci cum hæmatite sublimatis singul. gr. 10. cum tartari emetici Grano unico permixta in jusculo salis experte simul exhibeantur. Nos huic scopo insistentes sæpissime summo cum ægrorum levamine sulphuris limmios aurati cum sale ammoniaco ac terra Tripolitana sublimati, atque à fælugine iterum, ope filtri, aut requiei, liberi ac correcti grana duo vel tria cum tantillo theriacæ in pilulam redacta dedimus.

Quibus liquida potius arident medicamenta, eandem virtutem in oxy-sacchari emetici *Danielis Ludovici* 3ß. experientur, quod ex croco metallorum, non autem ex vitro Antimonii, ut syrupus emeticus Angeli Salæ paratum sit: vomitiones à jusculorum sæpius iterato haultu, uti superius, promoventur. Quibus res angusta domi est, chalcanthi grunum seu attramenti futorii aut tinctorii frustulum fæbe quantitate, in aqua vel jusculo solutum, ad vomitum stimulandum assumant: chalcanthum enim, teste *Kizerio in obs. cap. 4. § 99.* Etiam in peste melle & aqua dissolutum, admodum profuisse constat. At nonnisi maxime urgente necessitate illis, qui graciliores aut alias non solido temperamento sunt, vomitoria exubeantur; qui v. ad phlegmā inclinant, aut angustius pectus, latissimasque in macie scapulas habent, iidem vomitus interdici sint, oportet.

Quamprimum etiam hac lue infectus quis apprehenditur, vinum, zythum, aliosque mēbriantes potus, cibosque pipere aut aromaticis aspersos, vel etiam pingua edulia cum piscibus, lacte, ac ovis butyro trixis ceu peltem fugiant. Corpus autem, juxta *Plutarchum* in præceptis sanitatis, ita validum est nullum, cui conturbato & inflammato vinum adhibitum non adferat aliquid damni. Quam vini noxam *M. Tullius Cicero lib. 3. de natura Deorum* hac quoque sententia firmavit: Quia ægrotis, vinum scilicet, prodest raro, nocet sæpissime, melius est, non adhibere omnino, quam spe dubiæ salutis in apertam perniciem incurrere. Extemplo igitur vini, aut interditi potus loco bibant audacter nectar è pomis citreis ac saccharo paratum, vel fontanæ syrupis refrigerantibus, aut rob ex succis acidis auctam, vel cui immixta sint cerasa acida, pruna alba ferotina, racemi oxyacanthæ, aliive fructus acidulculi; necnon decoctum hordei, cornu cervi, acidulasque, si in promptu sint, bibere convenit; nonnunquam & serum lactis caprilli prodest, cautius tamen exhiberi. Ex cibis tantum jus bubuluni aut gallinarum, vel ossa farinacea, aceto nonnihil aut succo citri diluta laudantur; interdum etiam pilulas minores, poma aut pruna cocta, cremorem hordei aceto aut succo citri recenti imprægnatum & similia concedimus; corpus ægri ab ære externo frigidoque ambiente, ne venenum introsum repellatur, diligenter præmuniendum est.

Quomodo ager in augmento hujus morbi tractandus.

Omnes illi, qui propter cardialgiam prægressam, oris amarorem, conatumque vomendi, emetico, ad colluviem biliozæ, sordium ac crudelitatum in ventriculo fluctuantium (in quibus etiam potior materiz virulentæ pars letitare solet) expulsionem jam usi fuerunt, neque hac operatione omnem vitioziam saburram ejecerunt, aut qui ab hæc symptomatibus liberi vomitione haut indigent, cuncti hi certe bis quotidie, mane videlicet hora quinta vel sexta, ac vespert hora quarta vel quinta a medicamento astabre alexipharmaco assumpto unam vel duas, pro virium ratione, horas in lecto probe recti sudorem proliciant; sitimque intensam, quæ sæpissime eisdem mirum quantum affligit, non diu ferant; sed illam vel potu decocti ordinarii, vel alius julebi cardiaci refrigerantis, non tamen admodum gelidi, extinguere nitantur: etiam subinde refectionis gratia assumi queunt orbiculus ex pomo citreo discisso, pruna aliquot Hispanica, aut cerasa acida in aliqua fontana emollita, vel cydonia condita, aut berberes seu oxyacanthæ racemi conditi; singulis duobus aut tribus horis elapsis cochlearia duo egregiæ alicujus mixturæ alexipharmacæ & cardiacæ ægro exhibeantur; noctu autem, seu tempore somni julebus alexipharmacus epotetur, interdum noctuque sæpius sphaera seu globus spiritus resocillans *feld. 2. cap. 3.* descriptus, vel fasciculus foliorum rutæ recentium aceto antiloinico aut alio probe nota imbutus naribus admoveantur, atque iisdem tempora, carpi ac præcordia sæpissime quoque illinantur.

Quo-

Quolibet peractio sudore, aut alias singulis tribus horis cochlearia aliquot pilularum hordei aut iusculi corroborantis succo citri, vel aceto sive simplici, sive alexipharmaco anove fragran- te conditorum, aut quibus acetosa hortensis vel oxytriphylon bullierit, sorbeant; ac stragula duabus horis post tantum sudorem matu- tum, ten ante meridiem hora octava iteran- tur; circa vespere autem hic labor intermit- tatur; quoniam anxietudines tunc propter quotidianas exacerbationes ingravescent. Te- ste enim experientia in omnibus morbis acutis febribusve malignis pieraque symptomata as- susque interni propter majores sanguinis per arterias propuli retentiones, tempore distri- butionis chyli contingentes, crebrius ac cru- delius, quam aliis horis, agrum sollicitant: quæ etiam symptomata a quocunque pleniori aut minus convenienti victu, aut potulentorum inebriantium abusu arcessi solent. Cubiculum, ca- sa, tentorium, aut alius locus, in quo æger de- cumbit, semper summo mane, post meridiem, ac noctu, sic etiam post sudorem, elictum ag- gestis flammis e ligno juniperino, abiegno, aut pineo ab exhalationibus putidis, dumtores ac lenestræ patent, expurgetur; dein mox iterum, præsertim aere frigido & nebuloso claudantur. Ætate vero aut flagrantæ camœnia ædes pervia sint vento, quo miasmatæ pestifera eo melius atque liberius è conclavibus abripiantur; ali- quoties namque dum

Urit & exsiccet sitientes Julius ager, propter liberioris auras, spiritu æthereo imprægnatæ, interdictionem, ægri in effeto ac putido aere languidam exhaluere animam, qui sine dubio in recenti spiritibusque turgida aura refocillari, imo servari potuissent: Cui enim bono inclusus aer, cujus pestilens ac gravis, ut Tullius loqui- tur, est respiratio. Similem affecti aeris noxam nobis suggerunt elegantissima experimenta *Joh. Mayovv* in tract. 1. de sale, nitro, ac spiritu ni- tro, ac spiritu nitro aëreo cap. 9. descripta, quem legere, eademque experimenta absque magis sumptibus imitari instituire poteris.

Valde efficax nobilisque aqua spiritus nostros relictus aeri nos proxime ambienti innatat; quæ si artificiosa manu colligatur, & ab adhæ- rentibus sordibus dextre purgetur, plurimas certe suaviter olentes latices effectu suo felici superat. De qua legi certe meretur *Andrea Nimeri* dissertatio de spiritu nunci, seu aqua roborante Universali; necnō & hi, qui jam superius *sect. 2. cap. 3.* allegati sunt Viri Clarissimi.

Et quamvis in aere frigido undique nos cin- gente restauratio ac cibus pro vita nostra su- stentanda lateat, cavendum tamen, ne durante aut incrementum sumente morbo, æger nimium auræ frigidiori, excepta facie, alter utroque brachio se exponat; inde enim pervium cutis reticulum glandulæque iterum occiderentur, ut ab impedita exhalatione venenum hoc cor- rodens ac luxurians ad interiora retrocedere cogeretur; atque corpus male affectum denuo morbis conflictaretur.

Sequentia igitur medicamenta ad sudorem expellendum in hoc morbo efficacissima depre- hendimus.

℞. Antimonii diaphoretici ℥j. Florum salis Ammoniaci cum sulphure sublimator. ℥ss. Be-

zoardici mineral. gr. v. casura gr. 1.

Misce fiat pulvis subtilis, qui pauxillo rob- sambuci, vel conditura rosarum rubrarum com- nixtus in tota boli deglutitur; vel cum aquæ Cardui benedicti, tumaria aut scabiosæ cochlea- ribus iv. ac syrupi ex acido citri ℥ss. in potiun- culam redactus, exhaustatur: eodem modo etiam sequens pollen parari ac exhiberi poterit:

℞. Antim. diaphoret. ℥j. Cornu cervi Philos. prepar. Bezoar. occid. singul. ℥ss. Bezoardici miner. gr. v. M. F. Pulvis subtr. pro unica dosi.

Vel, ℞. Florum salis Ammoniaci cum sul- phure elev. ℥j. Bez. mineralis gr. v. M. F. Pulvis subtr. qui vel in decocto ordinario, aut iusculo calido hauriendus.

Si natura hisce medicamentis ad sudoris expulsionem incitari vix potest, quod melan- cholicis, hypochondriaca affectione, scelo- tyrbe, ac lue Veneria laborantibus sæpissime accidit, atque aliis nulla præsens sit diar- rhœa aut dysenteria, sequentia certe condu- cunt, si in eorundem vii tam diu perseve- remus, donec sudorem illum lentum, mellis- que instar cuti ac manibus adhaerentem, ut pererumque est, nacti simus.

Salis volatilis puriss. cervi, aut viperarum ℥ss. gr. xv. ℥j. vel 3 ss. cum conditura rosa- rum ac pauxillo sacchari in bolum cogatur; vel quod si elius, aquæ distillatæ fragrantis un- ciis duabus vel tribus dilutus, sirupoque com- petenti sociatus uno haustu sorbeatur. Horum salium loco autem spiritus volatilis cornu cervi purissimi 3j. substituatur: sic & mixturæ sim- plici *Danielis Ludovici*, aut *Frid. Hofmanni* tan- tundem cochlearibus aliquot aquæ cardui bene- ci vel scabiosæ commixtum, & cum syrupo rubi idæi aut acido citri suavius redditum, ebibitur; cui etiam pro ratione morbi antim. diaphor. & salis abinthii singul. ℥ss. addi poterit. Volatilibus atque summe penetrantibus ejusmodi re- mediis, sudorem provocantibus, tam diu insi- stendum erit, quam diu pulsum rythmi inæqua- les percipiuntur; aut per aliquot intervalla pul- sus penitus deficiat, manumque tangentis non ferit; aut malignitas morbi partibus profun- dius implicata est, ac inhæret.

Qui difficiliore ad medicamenta sunt, illi bezoardici min. gr. x. vel de sulfure stimulos diaphor. fixo gr. iij. cum pauxillo theriacæ, diascordii Fracastorii, mica panis vel conditu- ræ rosarum rubrarum pilulas redacta deglutiant; imo de pilulis nostris bezoardicis ℥ss. devorent, aut etiam tantundem de pilulis bezoardicis anodynis; sic quoque proderit extractum the- riæ nostrum, aut theriaca cœlestis Greiffii vel Hostadii ad gr. v. pro sudore eliciendo una vice deglutire, vel in aqua cardui bened. ac syr. ex acido citri soluta haurire, præsertim si ven- tris profluvium metuatur, aut jam ægrum laces- sat. Ab assumptis mox alexipharmacis, è spiriti- bus salibusve volatilibus, aut extractis, essen- tiis ac tincturis pyrotechnias ope productis, ad sudorem eo felicius promovendum, bonus hau- stus potus consueti, aut julepi refrigerantis su- perbibatur.

Potest etiam confect. alexipharmacæ rubræ, diascordii Fracastorii, vel confectiois de hya- cintho 3j. ℥iv. aut 3ss. aut pulv. rubei Panno- nici, vel specierum liberantis aut pulv. conf. de

hyacintho gr. 30. vel 60. Aquæ Cardui benedicti, scabiosæ aut sumaria cochlearibus aliquot, aceti antimonici cochlearibus duobus, ac sirupi cydoniorum, rubi idæi, aut e succo citri uno cochleari potiuncula instar hidrortice exhiberi. Sic etiam, si diutius adstet, sequentem bolum mane ac vespere deglutire poterunt, ut sudorem inde expectent: qui conficiatur è theriacæ Venetæ 3j ac terræ signatæ 3ss. invicem mixtis, addendo parum sacchari; vel de extracto theriaco aut theriaca cœlesti gr. v. in pilulis devorare queunt.

Pauperiores, vel quibus alias nimium curta suppellex est, cochlear unum rob sambuci aut juniperi, cum aquæ fontanæ & aceti probi cochlearibus duobus in potiunculam redigant & bibant, vel pulv. pyri 3ij. aut sulphuris nativi 3j. in aqua solutam: sic quoque pulv. Card. bened. ut radicis gentianæ contusæ, vel chamæleonis, traxinellæ, angelicæ, inulæ aut petasitidis cochlear unum, cum vel absque rob sambuci in modico aceti, misculo, aut aquæ fontanæ assumant, sudoremque inde expectent. Imo pulvis alexipharmacus popularis *fest. n. cap. 8.* descriptus hoc modo exhibitus similiter proficius erit.

In extremo necessitatis casu summaque remedium penuria sulphuris citrini triti, aut nitri depurati, vel etiam salis communis 3ij. boli rubri, aut rubricæ fabrilis, aut etiam hæmatitis 3j. rob sambuci, aceto & aquæ commixta conferunt: sed juxta præscriptam methodum hæc remedia iterari debent, ut sudor exoptatus singulis vicibus inde erumpat.

Abhinc pluribus annis sequenti pulvere diaphoretico ad febrem malignam expellendam summo cum ægrotum levamine usi sumus, de quo durante morbo quotidie bis dosim in convenienti vehiculo liquido, mane nempe hora quinta vel sexta, ac vespere circa horam quartam vel quintam, ægrotanti exhibere solemus; utque inde per horam integram, aut amplius sudorem in lecto stragulis probe coopertus provocet, curamus: hujus pulveris permittendi modus hic est, ac in officinis nostris pharmaceuticis semper paratus invenitur:

℞. Antimonii diaphor. 3iv. Bezoardici mineralis, Cornu cervi Philol. præp. singulor. 3j. Misce fiat pulvis tenuis, de quo, pro qualibet dosi adultis propinanda, drachma media in preparatam chartam appendi debet.

Quæcumque data opportunitate, quotiescunque aliquot chartulæ hujus pulveris diaphoretici ægris distribuuntur, simul sequentem mixturam liquidam, ad diluendos pulveres vehiculi loco, hoc modo paratam transmittimus.

℞. Aquæ Cardui bened. scabiosæ, vel sumariæ 3vi. vel de singula 3ij. Syrupi de rubo idæo, berberum, cerasorum acidorum, aut e succo citri pro lubitu 3ij. Misce ad vitrum.

De sequentibus aquis cardiacis spiritusque refocillantibus singulis fere horis duo cochlearia exhibeantur.

℞. Aquæ florum acaciæ, melissæ singul. 3ij. Syrupi ex succo pomi citrei, vel rubi idæi 3j. Antim. diaph. 3j. Bezoard. occid. 3j. Misce ad vitrum.

Vel 2. Aquæ Cardui bened. 3iv. Prophylact. A. itelædamentium, mentium, syrup. rubi idæi

singul. 3j. Confect. de hyacintho 3ij. Misce ad vitrum.

Vel 3. Aquæ florum persicorum, fragorum, singul. 3ij. Cinam. lue vino distillatæ 3ss. Corall. rubr. præparat. Cornu cervi Philol. præpar. singul. 3ss. Bezoard. occid. 3j. Sacchari diamargaritu 3ss. Misce ad vitrum.

Vel 4. Aquæ florum acaciæ, rosarum, melissæ singul. 3j. Cinam. lue vino distillatæ 3ss. Antim. diaph. 3j. Bezoard. numer. unicum totum sing. 3j. Sacchar. diamargaritu 3ss. Confect. alchermes compl. 3ij. Misce ad vitrum.

Vel 5. Aquæ scabiosæ, sumariæ, singul. 3ij. Syrup. florum cinæ 3j. Sal. c. c. vol. purul. 3ss. Unicornu fo. i. Margaritarum Orient. luum præp. singul. 3j. Misce ad vitrum.

Vel 6. Aquæ acetosæ, Card. bened. singul. 3ss. florum acaciæ 3j. Corall. rubr. præpar. conchæ margarititeræ præp. singul. 3ss. Sacch. diamargaritu 3ss. Misce ad vitrum.

Vel 7. Aquæ cichorei, acetosæ singul. 3ss. Cinam. lue vino distill. menthæ crispæ sing. 3ss. diaph. lov. seu antihæctici Poterii 3i. Eliz. propr. cum spir. salis tart. par. 3j. Syrupi rubi idæi 3j. Misce ad vitrum.

Qualibet certe ex hisce aquis cardiacis adhuc multo efficacior fiet, si eidem de spiritu cornu cervi ab omni phlegmatelibero ac subtilissimo 3j. vel 3ij. aut amplius, vel de ejusdem sale volatili nitidissimo, ac ope vini sublimati a scoriis adultis per elevationem purgato 3j. 3ss. aut 3ij. immisceantur: imo spiritus salis tartari, spiritus ac flores salis Ammoniaci volatiles ad 3j. additi, eisdem pariter efficaces reddunt. Cuncti enim hi spiritus ac sales volatiles potentissime quavis internas inflammationes resolvere ac dissipare solent: quæ etiam de aliis quibuscunque volatilibus medicamentis tam balsaminis ac aromaticis, quam urinarum redolentibus intelligenda esse, autumamus, quemadmodum haut absimilem ob rationem calura, tanquam egregium sal volatile oleosum aromaticum, in vinu subtilissimo spiritu soluta, ac crocus eodem vino sublimato distillatissime extractus, salisque balsamini seu sulphuris aurei anodyni particeps, absque ullo sanitatis detrimento in morbis hisce acutis, etiam crasseos tempore, inter se commixta integris cochlearibus exhiberi possunt.

Julepi cardiaci sequenti modo parari poterunt, quos postmodum, ut & mixturas cardiacas alternatim ægro propinare debemus: ad syruporum igitur e toto citro, aut simplici hujus mali succo, rubi idæi, cydoniorum, cerasorum acidorum, oxyacanthæ seu berberum solitarie, vel junctim sumptorum 3ij. aquæ scabiosæ, Card. bened. vel sumariæ, vel unius, vel inter se mixtarum 3ij. Aquæ prophylactice Amstelædamentium 3j. nitri purissimi ab Antim. diaphoret. elutriati 3j. & spiritu sulphuris aut chalcanti quantum satis est, ad gratum acorem obtinendum, bene inter se invicem commisceantur. Quibus itaque consultius videbitur, condita aut eclegmata mollia corroborantia ac refrigerantia prædictis medicamentis superaddere, ægros itidem sequentibus felicissime operantibus solabuntur, quæ sic parari solent.

℞. Conditura ros. rubr. 3iv. Succus ex integro malo citreo cum extimo cortice flavo, Confect.

Confect. alchermes compl. Antimon. diaphor. singul. ꝑ iv. Misce nat mixtura mollis, detur ad hæc.

Vel, ꝥ. Condituræ oxytriphylli ꝑ iv. Succus ex integro malo citreo cum extremo cortice flavo, diaph. lov. seu antinectici Poterii, Confect. alcherm. compl. singul. ꝑ j. Misce nat pariter mixtura mollis, cui interdum de theriaca Androm. ut Confect. de hyacintho ꝑ ij. addere possumus. Vel etiam hoc Conditum exhibeatur.

ꝥ. Condituræ ros. rubr. oxytriphylli, syrupi ex toto citro, singul. ꝑ ꝑ. Confect. alcherm. compl. specierum consecrationis de hyacintho, Antim. diaph. singul. ꝑ iv. Misce diligenter ad usum.

De his conditis inter diu sæpius quantitatem medix, cubitum autem ituri totius juglandis capiant.

Ne igitur in proliciendo sudore oleum & operam perdamus, dum sæpe sæpius ab omnibus narratis remediis in adorem vix obtinere possumus, alia certe adminicula huic scopo interventus adhibere necesse est. Est gita: & quibus frictions meo saltem censu, optima erunt, vel pedibus etiam lutea cunctata, aut lateres calidi, aut sacci piceis vel ceræ fori in ossiculis repleti ac fori supponuntur; imo quandoque sub alas, ac ad inguina ventres, aut utriculi aqua calida, vel tepido lacte repleti applicentur. Hæcque eo magis urgeo, ne præter spem ager morbo hoc succumbat, cum sudor in omnibus febribus malignis adeo necessarius esse iudicetur, ut eundem etiam in ipsis morbis, sudore colliquecente corpus perfundantibus, sicuti Anglicus sudor est, (cui similem sæpius inter ipsas malignas observavimus) haud declinare queamus; quia curatio ipsius sudoris Anglici juxta *Leviæum Fieberum* Medicum celebrem, quoque consistit in dextra tenuissima, bezoardicorum usu, ac tempestiva sudorum extractione: si enim sudores, inquit viri largiori encomio dignus, subsistunt, mors præforibus est; si uberior effunduntur, sudore fetido æger exolvitur. *Corp. Medic. Imperial. lib. 3. tit. 1. §. 2.*

Quid circa statum hujus morbi, ac circa crisin agendum,

Quotiescunque ergo medicamentorum dictorum debita ac diligens administratio observatur, altantesque simul etiam apud ægrum officio suo decenter funguntur, de felice hujus morbi crisi, & hanc subsequente salutari eventu bene sperare jubemur; & quanquam febris hæc ob versipellem suam indolem plerumque statim diebus indicibus criticisque difficulter includi queat, nihilominus tamen septimo, nono, vel decimo quarto die morbus in melius mutatur: quod præcedentes horum indices, quartus videlicet, sextus aut undecimus forsitan signis suis salubribus ostendent. Quas ob causas sedulo attendendum, dum morbus jam augeri desiit, ac in statu est, utrum natura, seu totius corporis temperies per corruptos humores, ac virulentas impuritates oppressa, & in furorem adacta hidrosi, diuresi, diarrhœa, hæmorrhagia narium, excreatione, vomitu, hæmorrhoidibus, abscessibus, ac in feminis purgationibus mensuis ab hisce febribus se liberare omnibus viri-

bus contendat? quæ nocte crisin præcedente ex certis signis, quorum uberiores enumerationem superius *sect. 1. cap. 9. 10. & 11.* invenies, cognoscuntur; an vero harum secretionum ac evacuationum nulla eveniat? quæ ex contrariis certe signis addiscuntur.

Interim cuncta, quæ, dum morbus in statu versatur penes ægrum observatu digna sunt, octo his regulis includimus.

I. Ægrum circa statum pleniori victu non onerandum esse.

II. Medicamenta alexipharmaca sudoremque pellentia statim suis horis, ad tempus usque cruceos, continuanda esse, ut ita natura eo melius in expellenda hac malignitate per sudorem occupatissimæ succu ramus.

III. Sudorem potius criticum, haut absque remediis alexipharmacorum etiam efficacissimorum ope, quam diu adhuc manentia eruptionis suæ indicia animadvertuntur, utut tota die ac nocte durer, promovendum, nulloque modo remorandum esse.

IV. Ventris profluvium criticum, ante diem tertium non suppressendum esse.

V. In vomitibus criticis longiora juscula potumque largiorem mox in principio hujus conatus data, eluere virulentas sordes ac biliola liquamina è ventriculo ac intestinis; ac diutius & frequentius ea exhibere, nefas esse.

VI. Excreationes criticas bechicis detergentibus ac dissolventibus juvandas esse.

VII. Narium aut alias hæmorrhagias, nisi diutius durent, ægrique animi deliquia superveniant, non sistendas esse: quibus tamen in casibus remedia cardiaca refrigerantia, simulque modice adstringentia plurimum præstare possent: interne de sequenti mixtura singulis fere momentis cochlear unum exhibere conveniret, cujus est descriptio.

ꝥ. Aquæ flor. acaciæ acetosæ, plantagininis, syrupi coralliorum Zuelleri singul. ꝑ j. lap. hæmatit. præp. croci vitrioli Mercurialis probe eloti, sanguin. dracon. arboris veri singul. ꝑ ij. Misce ad vitrum.

Externe acetum rosaceum luteo exceptum, carpis, fronti, temporibus & pudendis, vel cataplasma ex rubrica fabrilis aut hæmatite, vel etiam terra vitrioli dulcis cum aceto in pulvem redactum temporibus ac fronti in narium hæmorrhagia, in nimio autem mensum fluxu hypogastrio applicentur.

VIII. Ulcera, bubones, aliosque tempore criseos erumpentes tumores, ne malignitas hæc retrorsum pellatur, maturantibus cataplasmatibus, aut emplastris convenientibus emolliendos esse.

Hic tamen ulteriori silentio minime prætereundum, quod fere plerique, & ex iisdem Medicorum antesignani, in scholis nuper docentes, discipulis suis, seu dogma summe necessarium, inculcarunt, ægrotantes in statu febrium acutarum criseolve tempore remedium multitudinem quocunque nomine audiant, nullo modo aggravandos esse; sed naturæ, ac cujusvis constitutioni totum hunc laborem committi debere: eandem enim propria virtute resistentes sordes è sede sua dimovere, ac cum ægrorum levamento expellere valere. Cui sententiæ nos quidem olim fere subscribebamus, ni quotidiana experi-

rientia ac dura necessitas nos contrarium edocuisse. Quoniam, quæso! fundamento tunc vires miseri ægroti iunguntur, quando easdem plane suppressas, ac morbi violentia superatas conspicimus. Quotiescunque igitur morbi sævities eo perveniret, ac crisis nullatenus erumpere posset, anæ tunc Medicum à recta discedere conscientia oportere opinamini? Ut tantummodo iudum spectatorem, non autem valetudinis strenuum vindicem sese exhibeat, donec subrito naturæ robore æger tandem in conspectu sui morbo penitus conficiatur. Verum enim vero, si unquam salutaria consilia, & efficacissima remedia prodesse queunt, ea profecto febribus malignis ~~immo~~ tendentibus maxime necessaria fore asserimus: & præsertim pyrotechnias ope purificati spiritus oleosi, saleque volatiles liberaliori dosi exhibiti tunc laudabiles, ac egregias suas virtutes in pene moribundis monstrare poterunt: quemadmodum spiritus vini casura ac croco prægnans, tinctura bezoardica *Michælis*, mixtura simplex *Dan. Ludovici*, spiritus theriacalis Paracelsi, spiritus cornu cervi purissimus, alique efficacissimi liquores integris cochlearibus absque ullo metu subsequenti symptomaton morti luctantibus intundi queunt: unde confestim insignis immutatio percipietur; quia æger non tantum in faucibus, aut trachea hærentem viscidam, crudam, tenacemque blennam, suffocationem eidem minitantem, ampla excreatione, aut mitiore vomitu, aut consequente alvi profluvio, vel largiore sudoris imbre, non sine manifesto levamine, ejiciet; sed etiam inde spiritibus animalibus propemodum expressis nova supplementa scribentur, ut natura fere succumbens victoriam ab atra Parca reportare queat. Recensitorum veritatem quidem innumeris exemplis, quibus ipsimet sæpenumero interfuimus, abundanter confirmare possemus, si instituti ratio id exposceret, aut brevitatis studium nos inde non absterret. At loco omnium quarumcunque potentissimarum probationum hic sufficiens furtissima testimonia collegarum ac amicorum integerrimorum, qui in semetipsis, dum febribus perversissimi moris, purpuraque laborarent, excellentes penetrandi vires spiritus cornu cervi defecatiissimi, aliorum vel alium volatilium, me suppetias ferente, plus vice simplicii experti fuerunt: ex quorum numero præ aliis erunt Vir Nobilissimus. Amplissimus ac Excellentissimus, *Joh. Henr. Koefferlinus*, Augustissimus Induperatori à Consiliis ac Professor P. Medicinæ olim Friburgi celeberrimus; necnon *Matthæus Harder*, *Johann. Conradus Peyer*, ac *Johann. Conradus Wepfer*, Philosophorum, Anatomicorum atque Medicorum nostratium triga exoptatissima.

Exinde igitur benevolus lector procul omni dubio judicabit, nostram de febribus malignis cognoscendis ac curandis sententiam à nuda, nuper in scholis docentium, auctoritate, atque ab inani conjectura, aut contemplatione consilii experte minime dependere; sed rationi ac experientiz unice subnixam residere: inque eodem asserto eo magis confirmamur, quo certiores sumus, non paucos celeberrimorum Medicorum, è breviario ante decennium vernacule à nobis edito, in veram febres malignas medendis me-

thodum pertractatos fuisse, qui antehac se undum vulgatius receptas opiniones rebus Medicis operam darunt.

Quæ porro in criticis hujusmodi expulsionibus, si æger nimium delataretur, summeque debilis heiet, observanda sunt, inferius in curatione symptomatum suis explicabuntur.

Quomodo æger in declinatione morbi tractandus.

Postquam per dictas crises luis hujus contagiosæ causa penitus e corpore expulsa fuit, extemplo ab ulteriori remediorum superius præscriptorum usu abstinendum; excepta mixtura qua cardiaca, de qua sæpius cochlear unum exhibeatur: ne ab impetuosius proritato iuore contumacior alvus, sudores colliquescentes, vel ob humoris largius ab intus profusi dispendium ipsa tabes contrahatur.

Crisin vero munus suum absolvisse partim ex symptomatum remissione constat, partim ex pulsu, urina, respiratione, ac læto vultu, aliisque circumstantiis naturaliter se habentibus colligitur. Vires interea moderato ciborum boni succi, seu laudabile nutrimentum suppeditantium, ac conloctu facilius usu restaurentur: summopere autem, ne agri esca nimium intar-ciantur, caveamus; sic n. ventriculi temperies ac functio denuo turbaretur, ita ut appetentia ciborum prorsus deiceretur, vel etiam viribus adhuc fatiscentibus recidivæ supervenirent.

Quoniam autem sæpius ab ejusmodi secretionibus virus hoc omnino expellitur, neque plane consumitur, quod ex pulsu celeri, urina flammea, perseverante siti æstuque nimio ægrum adhuc molestantibus, observatur; ideo quotidie semel duntaxat unum ex supra dictis nobilioribus diaphoreticis sumere, atque sic reliquias virulentiz atterere ac funditus profligare oportet. Quamprimum vero æger de die in diem melius se habere incipit, alternis tantum diebus, ac parciori manu sudorem ciens remedium propinare, mixturamque simul cardiacam ac alia corroborantia & refrigerantia non negligere conducit, donec venenum hoc radicitus extirpatum sit; quilibet tamen prudens Medicus ex supra memoratis satis superque colligere poterit, quomodo omnibus symptomatibus succurrendum sit.

Quomodo curatio in gravidis aliisque debilioris constitutionis hominibus instituenda.

Quandoque evenire solet, ut etiam infirmæ constitutionis homines, rarioris texturæ virgines, aut gravidæ mulierculæ febri hac maligna corripiantur; attamen mox à quovis sudore syncopas atque animi deliquia pati solent, ut singulis fere momentis à nimia membrorum concitatione medios inter amplexus extremum halitum efflare videantur: quam ob rem ad sudorem fortius eliciendum plane non sunt compellendi; quod etiam de gravidis alias intelligi debet. Præsertim autem spiritus salesque volatiles, atque oleosa aromatica penetrantiora assumpta gravidis obsunt, quia inde perlevi momento non tantum abortire, sed haut raro vitam amittere possent: nihilominus tamen ejusmodi

agris mitiora remedia alexipharmaca statim horis, ut sæpius inculcavimus, exhibere quam necessarium est, inter quæ sequens potiuncula excellit.

℞. Aquæ scabiosæ vel Card. bened. ℥j. Syrupi e succo citri, vel rubi idzi ℥ss. unic. foss. bezoar. occid. cornu cervi phil. præp. sing. ℥ss. Misce pro unico haustu.

Vel ℞. Antim. diaph. ℥j. cornu cervi philos. præpar. unicornu fossil. singul. ℥ss. M. F. Pulvis subit. in juscuto aut decocto ordinario totus sumendus, donec lenis malor cum ægrotantis levamine per cutis spiracula sensim exudet.

Huic quoque intentioni sequentia, videlicet bezoardicum minerale, Lunare, Solire, aut sudoriferum maximum P. Joh. Fabri, seu Dav. Ludovici ad gr. x. specificum stomachicum Poterii ad gr. xx. in pauxillo condituræ rosarum aut oxytriphylli sumpta, congruentia sunt.

Cæterum iisdem agris quoque mixturæ cardiaca ac refocillantes enixa diligentia frequentissime sunt exhibendæ; at quia à suaviter & vehementer olentibus mox læduntur, etiam nec confedionem alchermes ferre queunt: ubi & reliquas ægrarum circumstantias apud imbecilles hæsere advertere oportet. Maxime vero tunc omnes refrigerantes ac mixturæ cardiaca syrupis aut coagulatis acidis exaltandæ sunt, quo in foemelles menstruus fluxus intempestive erupturus compesci aut in gravidis embryo conservari queat.

Quomodo infantes hac lue correpti tractandi.

Infantes ab uno ad sex annos difficulter ad sudorem persuadentur: quapropter in hujus defectu sæpius nonnihil ex alexipharmacis mitioribus ac jucundioribus porrigendum; aut si medicamenta penitus respuerent, iisdem cibo vel potui commixtis fallendi sunt: ex quibus mixturam sequentem sæpius felicem experti sumus, singulis duabus horis cochlearia duo exhibendo.

℞. Aquæ flor. acaciz, Card. bened. singul. ℥ss. Syrup. e succo citri, aut rubo idzo ℥j. Antimonii diaphor. bezoard. occid. singul. ℥ss. Misce ad vitrum.

Vel ℞. Syrup. citri ℥ij. Bezoard. Orient. unicornu marini, Marg. Orient. præp. singul. ℥j. Aquæ flor. acac. ℥j. Misce ad vitrum.

Hæc aqua corroborans spiritusque illustrans pariter conducit.

℞. Aquæ Card. bened. scabiosæ, fumariz, Syrupi acidi citri, aut de rubo idzo singul. ℥j. Antimonii diaphoretici ℥ij. Bezoard. mineral. salis cornu cervi volat. singul. ℥ss. Misce ad vitrum.

Vel de sequenti pulvere quotidie ter quantum apex cultri capit, in pulce vel syrupo rub. idzi dandum,

℞. Antim. diaph. ℥ij. unicornu foss. cornu cervi phil. præpar. singul. ℥j. Succu albi præpar. Cinnab. Antimon. vel nat. singul. ℥ss. Sacchar. albr. ℥j. M. F. Pulvis subtilis.

Mensuræ dimidia decocti cornu cervi aut alterius ordinarii Antimonii diaphoretici ℥ss. ad ℥j. semper addi, ac quoties infanti potus exhibetur, probe agitari potest; deque eodem Antim. diaph. gr. 5. vel 6. in iure exhiberi.

Adeo consuetæ nobis est methodus, saga-

ciores delicatulosve infantes fallendi, dum iisdem recensita aliaque alexipharmaca in offis, jusculis, aut in ipsomet potu exhibemus. Jam diu hæc delicatulis omneque remedium formidantibus sequentem potum summo cum fructu præscripsimus:

℞. Sacchari albi, Antimon. diaphor. cornu cervi phil. præpar. ℥ij. vel ℥j. bezoardici min. ℥j. aquæ fontanæ mensuram integr. bulliant aliquamdiu; ac turbide potus præbeatur.

Sic etiam de magisterio antimonii diaphor. ℥j. vel de bezoar orientali ℥j. ad ℥ij. probe trito aquæ fontanæ aut potui assueto permisceri, ac ad sitim æstunisque febrilem compescendum dari solet; quamadmodum nuper etiam summo cum emolumento hæc serenissimo Principi Wirtembergico hæreditario ab Archiatriis tunc presentibus consulta & applicata fuerunt.

Adultiore ætate pueris media saltem pars remediorum hujus sect. iii. cap. 4. recensitorum convenit: qui quoad reliqua, ut maturæ ætatis homines, tractandi sunt.

Quomodo capitis doloribus, delirio, & phrenitidi hoc morbo durante succurrendum.

Quotiescunque in acutis morbis, aut febris malignis ægri capitis atrocissimis doloribus vexarentur, sequente epithemate frontis summo cum fructu notabilique dolorum remissione uti fuimus.

℞. Nucleorum Persicorum ℥ss. aut horum loco nucleorum malorum Armeniacorum, vel amygdalarum amararum tantundem, seminis peponum decorticati, papav. alb. singul. ℥ij. aquæ fontanæ ℥iv. vel hujus loco aquæ betonicæ, & verbenæ singulor. ℥ij. M. F. lege artis emulsio; cui adde aquæ ros. fragrantis, aceti antiloimici, aut in hujus defectu rutacei, vel aliius singul. ℥j. nitri puri ℥ij. casuræ, croci Orient. singul. ℥ss. Misce ad vitrum.

Hoc emulsio tepescito lintea rara complicata imbuuntur, quæ mox fronti atque temporibus applicantur, & quamprimum exsiccantur, iterum renovellanda sunt; quod opus diemque continuetur, usque dum capitis dolores prorsus evacuerint. At sedulo cavere debemus, ne quicquam ipso actu frigidum fronti adhibeatur, alias perquam levi negotio pejora symptomata in capite aut ipso cerebro, qualia sunt morbus attonicus, lethargus, hypocophosis, vel omnimoda surditas, aut etiam oculorum caligo seu visus hebetudo & abolitio succrescere possent.

In hujus epithematis defectu sequentia substitui possunt: brassica capitata sale condita, sempervivum contusum, folia vitis vel salicis, flores sambuci vel rosarum rubrarum aceto conspersi, panis domesticus cum sale culinari, vel sal aceto commixtum, puls pomorum putridorum nigrorum, aut fungi rosæ caninz aceto aut alii liquori immersi ad tempora ac frontem applicantur; imo & gallina nigra aut alia sana, vel columba vivens per medium dissecta cruore ac interaneis adhuc calida capiti imponatur. Sic etiam in summis debilitatibus, dum animam quasi agere videntur ægri, epithemata pone carpos, ac in cordis, seu potius ventriculi, scrobiculo applicari possunt; ex quibus forsitan subjunctum præ aliis excelleret:

℞. Rad.

℞. Rad. Angelic. irid. Florent. singul. ʒij. Corticis pomi citrei recentis extimi flavi ʒß. flor. rosar. rubr. sambuci, cymarum ruta recentis, amarici, seminis melanthii, caryophyllorum, cinamomi, nucis myristicæ, baccarum juniperi singul. ʒj. Casuræ, Croci Orient. lib. singul. ʒß.

Quæ incisa & contusa tribus latioribus sacculis includantur, & aceto antiloinico, rosaceo, rutato, aut calthæ hortenſis intincta brachiis ac præcordiis alligantur; ac quoties sicantur, denuo mox liquore dicto immersa adhibeantur. Pariter prodest pomum citreum vel aureum orbiculatum discissum, aceto conspersum ac iisdem locis applicatum; infantibus vero pauxillum de confecta alchermes in vino solutum ventriculo ac brachiis imponi solet.

Pedum plantis acie panis fermentum, baccæ juniperi, ruta, aut semen erucæ cum aceto in pulvere redacta, vel fermentum ac allium aut cæpæ cum aceto trita, raphanus item rusticus recens radula comminutus cum fermento ac aceto, vel lutum salis & aceto commixtum sæpius adnota prolunt.

Quando vero tales ægroti intensius delirii aut phrenitide vexantur, præter diligentem horum epithematum applicationem in utroque brachio ac pedibus, & phreneticis etiam pone aures, cantharidum aut aliorum acrium, quasi cauteriorum ope, ulcuscula pellucida excitantur: oportet autem hæc tandem tenere exulcerata, neque pati cicatricem ducere, donec vesania (connata hic non intellectam volumus) penitus extincta sint, mentisque iterum compotes fiant ægri: quem effectum ab applicatione emplastri de meliloto, cui quarta pars emplastri exulcerantis, vesicatorii dicti; addatur, obtinebis.

Ad exulcerandam ergo cutim, nobis familiare est emplastrum exulceratorium Augustanum, hoc modo à nobis correctum & concretum:

℞. Cantharidum, ceræ flavæ, singul. ʒij. Ol. rosacei, resinæ larignæ seu terebinthinæ sing. ʒj. Thuris, myrrhæ, mastiches, casuræ sing. ʒj. Thuris ac myrrhæ pulveres subtilissimi in terebinthina liquentur; mastiche & casura in oleo rosaceo solvantur; ceræ tuxæ adde terebinthinam, in qua thus & myrrha jam liquata, dein oleum rosarum cum adjectis, ac tandem pulverem cantharidum; & sic conflabitur emplastrum efficacissimum.

Hujus emplastri laudes vix satis prædicari possunt, uti plurimis observationibus constat.

Hoc emplastrum interdum Imperialis monetz, nonnunquam palmæ mediæ latitudine ac cultri dorſi crassitie alutæ aut linteæ superinductum, locisque debitis applicatum post elapsas horas duodecim detrahatur; deinde ulcusculum, nisi ultro rumpatur, forſice aut lanceola incidendum, serum profiliens linteolo rariori sicco excipiendum, & quoties hæc ulcuscula, ut supra indicavimus, aperta tenere non opus est, mane ac vespere, donec consolidentur, foliis brassicæ, betæ aut hederæ butyro recenti obductis tegenda sunt; verno ac æstivo sole, dum solitæ plantæ recentes non habentur, auctore Excellentissimo Johanne Ammono, percelebri Doctore Medico nostrate, cuti læsæ folia calthæ palustris cum butyro, maximo ægrotum commodo, imponantur.

Quod si vero celerior cutis exulceratio in hisce affectibus desideretur, pro efficacia emplastri hujus exaltanda, ejusdem uncie medicæ integræ cantharidum tritarum drachmam adjicere solemus. Quibus hoc emplastrum non suppetit, cantharides ac semen erucæ contusa pauxillo fermenti panis commisceant, aut tithymalum, ranunculum, vel flammulam lavis recens contusam, donec in pustulam elevetur, applicent, ceteraque ut præcedentia tractentur.

Solertissimus Johannes Conradus Hollander, Medicinæ Doctor apud nos Excellentissimus, ac in secretiori pyrotechnia versatissimus summo cum fructu spiritum cornu cervi aquis temperationibus intracum capiti in phrenitide applicare solet.

Quæ remedia in sopore gravi, lethargo, & ex adverso, quæ in nimia vigiliis conducant.

Quotquot autem in hoc morbo sopore gravi, aut veterno seu lethargo corripuntur, iisdem, uti superiori capite modo diximus, statim in brachiis, pedibus, cervice, aut inter scapulas exulcerationes fortiores fiant necesse est: postmodum sequentes sacculi in vino & aceto rosaceo æquali mensura junctis calefacti capiti imponantur, & antequam refrigerint, mox iterum hisce liquoribus calidis immergantur, & tan diu applicentur, usque dum æger ab hac narcoli liberetur.

℞. Herbarum betonicæ, cymar. origani, amaraci, flor. spicæ hortensis, rosar. rubear. sambuci singul. Mj nitri puri, sulphuris flavi sing. ʒj. sem. cumini, feni. uli singul. ʒij. Incisa & contusa duobus sacculis latis insuantur.

Hi sacculi nonnunquam ita sicci super formam aut operculum alternatim calefacti summo cum ægri levamine adhibentur; quia crebra experientia compertum est, humidos sæpe sæpius, cum gelidi herent majorem noxam, quam fructum attulisse: hanc igitur cautelam ubique in ejusmodi remediorum applicatione, si caput aliquo labore affectu, cautiores Medici observent. Nonnunquam lethargo detentis solutare est emplastrum, exulceratorium, de rasis capillis toti capiti impositum: hoc enim modo serum in aufractus cerebri fluctuans potentissime e latibulo elicitur.

Vertex & tempora frequenter oleo succini albi, aut roſismarini distillatis illinantur; interne de sequenti mixtura ant-apoplectica sæpius interdum ac nocturnum vel duo cochlearia exhibeantur:

℞. Aqu. flor. lilior. convall. & flor. spicæ hortensis cum vino simul distillatarum, amarici singul. ʒj. spir. cochleariæ ʒß. salis cornu cervi vol. purissimi, spir. salis ammoniaci vol. sing. ʒß. Essentiæ Callores ʒj. Misce ad vitrum cæratum obturandum.

Naribus quoque spiritus salis ammoniaci volatilis, spiritus fuliginis, aut sal ammoniacum in lixivio fortiori solutum, vel superius scdm. cap. 3. descripti noduli admoveantur: interdum corium antiquum, aut scindia sulphure illita præ naribus accendi solent, donec ægrotantes e sopore expergiscantur.

Et quia in febribus malignis, imprimis cum morbus increſcit, vigilias ægri moleste ferunt. ita

ita ut ab earundem diuturnitate quandoque interdum delabantur, necessario auxilia ad illas arigendas in usum trahi debent: ex quibus præterito cap. recensita epithemata, lintea in spiritu cornu cervi madefacta, ac capiti imposita, atque venice in cute, per emplastrum exulceratorium excitata, valdopere conducunt; præsertim si papaver aut opium extus non deficiat; intus enim opio fartis remediis, nisi diaphoreticos causa, morbo incrementum capessente, ad vigilias arcendas uti velle, esset certe languentem ad immanes ac desperabundas mentis aberrationes, præsertim si æstantes torve aspectent, cogere; ac tempora iisdem sequenti linimento anodyno sæpius calide unguantur.

℞. Ungu. de hyoscyamo, vel olei populi ℥ij. Olei nucis myristicæ expressi ℥ij. opii aceto soluti ℥j. ol. chamæmeli distillari, succini albi distill. singul. gr. iv. M. f. absque igne linimentum, quod detur in pyxide.

Quamprimum v. morbus declinare incepit, ut nihilominus vigilis invalidis magnas adhuc creent molestias, totum tempore sequens emulsum anodynum uno haustu epotetur.

℞. Sem. peponum vel cucumer. decorticati ℥ss. lactucæ, papav. albi singulor. ℥ij. decocti corvi ℥iv. M. f. lege artis emulsum: cui adde sacchari diamargariti ℥ij. autem. diaph. lapid. cancr. præp. sing. ℥j. Misce ad vitrum.

Sic etiam tunc profunt gr. 3. vel 4. de theriaca celesti, aut de nostris pilulis bezoardicis anodynis ad somnum capessendum, deglutita.

Quomodo oris fauciumq. inflammationi, aphthis ac angina prospiciendum.

Quibus agris lingua ac os intus tenaci & viscida crusta, ab illicita salivæ orta, obducta sunt, insensibiliter quam ullum cibum, potum vel medicamentum sumunt primo spatula, vel cochleari eandem defricent, simulque salivæ folio viridi fontanæ innatante lingua & sordibus curatius detergatur; deinde os atque fauces aqua limpida, in cuius sextario nitri purissimi, aut sulphure, aut sale ammoniaco præparati, vel quod adhuc efficacius, nitri vitriolati ℥ij. soluta sint, diligenter gargarizent atque eluant.

Hoc in casu, antequam inflammatio harum partium mortem alicui minuetur, venas sub lingua, ramias vulgo appellatas, absque ulla mora tundere proficuum erit: sed maxime cavendum, ne a chirurgo fortiter ac profunde scalpello feriantur; alias sanguis tanta quantitate profluere posset, ut ipsius animæ cum sanguine exputio metuenda foret; cui mature sistendo nil aliud, quam candentis ferri attractus, frustra aliis ischamis prius applicatis, necessarius est.

Si v. post hæc omnia rite applicata nihilominus linguæ, oris ac faucium inflammatio nimis ingravesceret, eaque in oris siccitate, lingua arida filia ac nigra aut squalida cinerea crusta obducta, inque faucium ac gulæ exulceratione, fissuris ac ardore furoris suum ostenderet, ab æcribus, acidis salisque, ac omnibus quæ spiculis pungentibus horrent (qualia sunt nitrum, chalcanthum ac ejus spiritus, spiritus sulphuris, alumen, acetum, diamorion, sirupi acidi) plane abstinendum esse, ipsa hujus affectus neces-

sitas exigit; è contraria autem parte os lacte tepido, aut ejusdem sero, aut hordei cremore, vel succo e gammaris fluviatilibus, aut succo raparum sapissime detergi ac elui debet.

Sequens etiam gargarismus, seu potius apozema, de quo interdum calide haultulum capiat æger, quam maxime conducit.

℞. Hordei mundati manipulum, cornu cervirasi ℥ij. herbæ solidaginis medicæ, florum malva arborese singul. manip. medium, fol. sedi major. recent. manipulum, gammarorum fluvi. contrus. No. 12. sem. cydonior. plantag. singul. ℥ij. Incisa & contusa cum aqu. font. ℞ ij. vel sextariis duobus ad tertiæ partis exhalationem coquantur; dein jure hoc colato os sæpius eluatur; ac subinde sorbando ℥j. vel ℥ij. æger lente deglutiat.

Post singulam gargarisationem de sequenti mixtura medium vel integrum cochlear lenim frequenter delingat, cujus descriptio sic se habet:

℞. Lentoris sem. cydon. aqua ros. facti, mellis rosacei, vel sir. de siliquis singul. ℥ij. succi sempervivi recent. cochlearia iv. Misceantur probe ad fictile.

Vel de hac butyri compositione interdum frustillum fabæ majoris quantitate capiat:

℞. Butyri rec. probe loti ℥ij. diacod. Mont. ℥j. Pulv. diatragacanthi frig. ℥ss. boli Armen. præp. ℥ij. Misceantur diligenter ad ollam.

Nonnunquam in fuscule calido pulveris à creta compositi Mynsichti, aut diatragacanthi frig. ℥ss. singulis sex horis hauriat: quæ egregie ardori faucium, gulæ ac ventriculi medentur.

Sic quoque profunt radix althææ saccharo condita, succus raparum cum pauxillo sacchari ad spissitudinem sirupi decoctus, ac cochlearim haultus; oleum seminis raparum cum saccharo cando linctum; item oleum amygdalarum dulce cum sirupo sempervivi mixtum, sæpiusque deglutitum injurias faucium lassarum abigere solet.

Tonsillæ viscida quandoque lympha ita infarciuntur, faucesque eadem simul oblinuntur, ut collum enormiter inde tumescat, ægerque vix, ac ne vix quidem deglutire quicquam valeat, (imprimis si phlegmone easdemprehendat.) extus ergo collum circumquaque frequenter oleo linendum erit oleo chamæmeli vel liliorum alborum per infusionem paratis, aut etiam summe anodyno oleo e floribus composito Cosmæ Stotani; ab inunctione qualibet collum superius inducto emplastro incognito seu santalino, diachilo cum gummis, ac cataplasmate de meliloto cingendum; pariter & bono cum fructu unguentum lovis magmate suo non spoliatum cataplasmatibus instar usurpari hic poterit; proluviem ventris calide applicare pauperum ac rusticorum euporiston, non tamen contemnendum remedium est; aut epithema à nido hirundinum, albo Græco, butyro, melle & lacte conficiatur & imponatur; vel butyrum recens cum floribus chamæmeli aut hyoscyamo in linimentum coctum calide admoveatur: intus os ac fauces quoque sæpius lacte tepido, in quo ficus ac althææ radices aut folia bullierint, atque parum sacchari solutum sit, vel alio liquore emolliente gargarizent.

*Quomodo pleuritidi, asthma, peripneumonia
& tussi medendum.*

In singulo horum quatuor symptomaton semper post mediam horam ab assumpto medicamento diaphoretico (in cuius exhibitione nimis calida videntur) bonus haustus sequentis apozematis bechici calide bibendus, cuius descriptio hic subijuncta est:

℞. Rad. inula, tussilag. singul. ʒj. Glycyrrhiza, irid. Florent. sing. ʒss. herb. hyssopi, veronica, scabiosa, flor. papav. rhodod. sing. manipulum, passular. min. ʒij. sem. fenic. ʒij. ficum pinguium No. 10.

Incisa & contrita coquantur in aqua fontanæ Mij. ad quartæ partis consumptionem, de colato dein jure scyphus mane ac vesperti mox post sumptum diaphoreticum seu alexipharmacum, ac noctu circa nonam horam exhaustatur, usque dum respiratio difficilis & tussis cessaverint.

Quod si vero lymphæ in ipsismet bronchiis ac vesiculis pulmonum ob summum lentorem, obque summam cruditatem, aut inflammationem eandem exsiccantem stagnet, ex magis incidentibus ac resolventibus apozema bechicum confici, ac eodem, ut superius, modo exhiberi debet; quod juxta hanc formulam parari poterit.

℞. Rad. Imperatoriz, Angelicæ singul. ʒj. Irid. Florent. inula, Aristoloch. veræ sing. ʒss. Scilla siccatæ ʒij. Cort. ligni sancti ʒj. Herb. prasil. albi. Hyssopi, pulegii, salvia sing. manipulum, bacc. junip. ʒij. Sem. fenic. ʒss. ficum pingui. No. 16. passul. mai. ʒiv. Mellis recent. ʒvi. Aqu. font. tb vi. Coquantur in caldario, in vase exacte clauso recondita per trihorium, juri per colum trajecto, si refrigerit, adde syrupi de peto ʒiij. spiritus salis ammoniaci vol. ʒj. Misce diligenter.

Externe interea sæpius de die adipe capi aut inseris, oleo chamæmeli per triplam infusionem parato, unguento de cynoglossa, pectorali August. vel unguento de hyoscyamo pectus calide applicatur; vel diachylon cum gummi parti affectæ imponatur, si dolor pungens in alterutro latere se prodit. Nonnulli lateri dolenti lac tepidum in vesica bubula aut suilla inclusum applicant; vel poma putrida cum lacte caprillo in pulverem decoquunt, crociq. pulveris tantillum inspergunt, quam linteis exceptam calide parti affectæ sæpius imponunt.

Alias in principio febrium malignarum, si statim hæc symptomata in pectore laborem ægro faciant, mixtura simplex *Dan. Ludovici* spiritus diapento, seu spir. theriacalis, spir. vini croco ac casura satiatas, tinctura bezoardica, spir. cornu cervi, ac sal ejus vol. purissimum, spiritus ac flores salis ammoniaci volatiles largiori dosi exhibita, aut aliis alexipharmacis ac bechicis juncta quam maxime conducunt, quibus & fixiora, ut antin. diaph. bezoardicum minerale, Ioviale, flores sulfuris, aliæque sexcenta, aliorum diaphoreticorum loco, ante apozematis bechici usum assumpta, miram opem præstant; sique in suffocationis periculo versentur ægri, etiam spiritum cornu cervi ad integra drachma ad ʒij. in convenienti

vehiculo præbere, aut de mixtura simplici *Dan. Lud.* vel spir. theriacali *Paracelli* a ʒij. ad ʒss. uno haustu ebibere, vel etiam cum albumine duorum ovorum de spiritu vini croco & casura facto cochlear unum vel duo; ac florum salis ammoniaci cum hæmatite, sulphure aut cinl. cantho sublimatorum ʒss. inter se mixtis potui dare, est quasi ægrum ex Erebi faucibus eripere: subinde quoque in spiritus, si ægri alto prententur veterno, soli cochlearim ori infunduntur.

In communi v. thoracis phlegmone, si cruentum pus in resolvendo moram trahit, de sequenti pulvere singulis sex horis ægri drachm. integram assument.

℞. Sangu. hirci juxta *Helmontium* exsiccati, lap. Cancr. præparatorum, mandib. lucii piscis, sulphur. vivi, singul. or. partes æquales. M. l. Pulv. subt. ad scutulam.

Interdum ad iputi excreationem eo melius promovendam, passulæ Corinthiæ aqua emolliat, vel harum lapa, aut parum rob buccarum sambuci sanantur; nonnunquam saccharum candum in ore dissolutum idem præstat.

Quod si autem febris decrescat maligna, coluviesque humorum vitiosorum tamen in pectore magna copia stagnet: unde ab eodem infarcto difficultas spirandi & alia mala inferuntur: niligitur melius sequenti linctu materiam viscidam resolvit, attenuat, atque maturat, subinde cochlearim deglutiat.

℞. Syrupi scelorybici, de peto olei amygd. dulc. singul. ʒij. spir. cochleariæ ʒss. spir. salis ammon. vol. ʒj. Aquæ florum acaciæ ʒj. Misce ad vitrum.

Rusticis autem, ac pauperibus subsequens hæc mixtura egregia erit.

℞. Ol. lini rec. expressi, oxym. helleborati *Gesneri* utriusque partes æquales. Misce fiat linctus; de utrovis duo cochlearia singulis horis æger delingat.

Quibus hæ formulæ non attrident, hanc sibi parari curent.

℞. Olei amygd. dulc. recens expressi, syrup. de erysimo *Lobeli* singul. ʒij. Antimonii diaph. ʒj. vel hujus loco diaph. lov. ʒss. Aqu. hyssopi ʒj. Misceantur, & ut superiora in usum vocentur.

Olim tanquam secretissimum euporiston habitum fuit stercoris caballini succus expressus, calide in pleuritide, peripneumonia ac colicis doloribus epotus, & per iudorem iterum expulsus. Nos eodem pariter summo cum fructu hoc modo uti solemus.

℞. Hippenteron, seu scybalorum recentium stercoris equini No. 5. Aquæ Card. bened. florum acaciæ singul. ʒij.

Stent per trihorium in loco calido, dein succus inde exprimitur; cui adde.

Lauk de scilla ʒj. spir. cornu cervi volat. purissimi ʒj. Misce, ut duobus haustibus post sex horarum intervallum epotari queat.

Ne igitur reliquiæ viscidioris pituitæ in bronchiis hærentes tandem vomitum aut empiema efficiant, quod ex perpetua tussi sicca divinandum esset, conducet secretum hoc lac sulphuris verum, si inde mane ac vesperti integrum qualibet vice cochlear æger assumeret: Cujus parandi modum nobiscum ultro communicavit *Celeberrimus Job. Henr. Kœßerlinus* amicus singularis; qui sic se habet.

℞. Sul-

℞. Sulphuris vivi aut crudi optimæ notæ ℞. j. salis tartari purissimi ac siccissimi ℞. ij. Misceantur, ut nat inde pollen tenuissimum; quod in lebetes ferreo super igne carbonum tandiu agitetur, donec imitar hepatis, colorem rufum adipiscatur: massæ huic liquefactæ, ac in mortario calido tuz affundatur spiritus vini, ab omni phlegmate liberi, sufficiens quantitas, & in leu cinerum balneo mox extrahetur tinctura saturæ; quæ repetitis vicibus cum vino sublimato collecta postea aquæ fontanæ affusione præcipitetur: Pulvis dein præcipitatus cis hlerum hærens, probe prius exsiccatus, denuo cum salis tartari duplo in lebetes terreo urendus, vinique spiritu extrahendus, ac fontana præcipitandus est bis aut ter. Ultima autem vice spiritus vini ab hac sulphuris tinctura per alembicum, absque præcipitatione, ad siccitatem abstrahendus est; atque relicto, in cucurbitæ vitreæ fundo, pulveri mox spiritus roris majalis, vel aqua æquinoctialis pluvie, aut grandinis putrefactæ distillatæ debita quantitas affundend: quæ postmodum è maris balneo iterum in vas recipiens evehantur, & videbis si rui sulphuris scobem tenuissimam in oleum transmutari; quod tamen mox liquor permiscebitur, eidemque turbidum lacteum colorem, ac gratum saporem imperiatur.

Quæ remedia in vomitione enormi & singultu conveniant.

Quia vomitus, licet crebrius ægrum molestant, quandoque critici sunt, seu in quibus universa colluvies virulenta, singularis secretionis ope, è toto corpore ad ventriculum è tubulis extillans per superiora, seu proximam viam largiori imbre ejicitur, non statim ab exortu sistendi sunt; diutius autem perseverantes sequentibus remediis linteolo mundo vel corio exceptis, ac extensis, & scrobiculo cordis applicatis compescuntur.

℞. Fermenti pro panificio nucis juglandis quantitatem, theriacæ Andromachi ℞. j. Nucis myristicæ radula trita ℞. ℞. Misceantur omnia probe ad emplastrum ipsitudinem.

Similiter etiam sequens emplastrum stomacho extus impositum conducit.

℞. Empl. diaph. halcit. compl. Hildani nostræ correctionis ℞. j. Theriacæ Andromachi ℞. i. Ol. Nucis myristicæ express. ℞. ℞. Menth. distillati gutt. 10. Fiat mollius emplastrum alutæ super inducendum.

Sic quoque haut contemnuendam in vomitu, nauseante stomacho, ac singultu, operam præstare solet hoc balsamum, præ stomachicis aliis, utilissimum.

℞. Olei ros. rubr. per triplam infusionem parati, myrtini comp. nostræ correctionis singulor. ℞. ij. Tacamahacæ purissima, Ilyracis in lacrymis, mastiches selectæ, alæ dulcis singul. ℞. j. Soluta lenibus lignis, ac per linteum colata agitentur, donec pene refrigerint; quibus dein adde theriacæ Andromachi ℞. iij. Bals. Peruviani, Olei nucis myrist. expr. singul. ℞. j. Ol. absinthii distill. caryoph. distill. Menthæ distill. chamæmeli distill. singul. ℞. j. Secundum artis regulas hæc omnia exactissime commisceantur, postea ferventur in pyxide aut vitro probe munita; &

quoties opus erit, inde aliquid alutæ superinducatur, ac stomachi cavo extus imponatur: si autem plus aquo liquidius sit hoc balsamum, potest rosis rubris, balaustris ac bolo Armenate tritis ad desideratam crassitiem cogi.

Musculus pruni sylvestris, aut panis nuce myristica frictus, & aceto humectatus; vel sacculi absinthio, mentha crispa; floribus ros. rubr. repleti, vinoque madefacti, & cordis scrobiculo impositi, multum præstant.

In hisce casibus (aliter ac in principio vomitus critici) ægri à crebra iusculorum aut aliorum potulentorum sorbitione summa opere sibi temperent; ac virium conservandarum gratia cerata acida, syrupi subacidi, cydonia, mespila, pruna sylvest. & condita, & alia nonnihil astringentia modice sumantur: quæ etiam omnia remedia in singultu, per totum præceos non ultra tempus summa proficua esse deprehendimus: interne hisce symptomatibus præter theriacam cælestem, extractum theriacon nostrum, pilulas bezoardicas anodytas, anodynas regias, ac hystericas fere nulla alia remedia adhiberi queunt. cum nauseans ventriculus tam largiores potus, quam titillantes res prorsus respuit; unde his contenti plura ad horum symptomaton mitigationem addere supercedemus.

Quid in diarrhæa & dysenteria agendum.

Diarrhææ criticæ ante triduum non sistendæ sunt: quod si autem diutius durando ægrotantis vires nimis exauriant, remediis acidis nullo modo intermissis, etiam sequentia leniter adstringentia & constipantia in usum trahantur medicamentis.

℞. Theriacæ Andromachi ℞. j. terræ signatæ ℞. j. Syrupi cydonior. ℞. ℞. Fiat cum potu consueto nautilus una vice exhibendus.

Vel ℞. Condituræ ros. rubrarum ℞. j. terræ signatæ ℞. j. essentia opii Langelotti gr. j. Misce fiat cum pauxillo sacchari bolus, totus simul deglutendus.

Coram cervi ustum, radices tormentillæ pulvis, pulvis coralliorum, vel semen plantaginis ad ℞. sumpta etiam profunt: præsertim si debito tempore, quo sudores alias in his ægris provocare solemus, sumantur, ut hydrofin inde expectent.

Si vero profluvia hæc ventris ab ubere colluvie biliosa ex colliquescentibus humoribus ad ventriculum & intestina tendentibus oriatur, acidi certe potus acidæque mixtura corroborantes frequenter exhibendæ; quarum hæc sequenti modo in usum vocari possunt.

℞. Aq. flor. acaciæ, cerasorum nigr. mellisæ, fragorum singul. ℞. ℞. Syrupi rubi idæi, berberum, ribesiorum singul. ℞. j. Antim. diaph. ℞. ℞. Bezoar. min. ℞. ℞. Misceantur ad vitrum, & inde æger singulis fere horis cochlearia duo sorbeat.

Si quis autem lacteo colore magis afficiatur, huic talis compositio ut supra exhiberi potest; cujus parandi modus sic esto.

℞. Aqu. Card. bened. scabiosæ, syrupi ex toto citro sing. ℞. iv. Antimonii diaph. ℞. ℞. Smaragdi præp. bezoar. occid. bezoardici min. an. ℞. ℞. Misceantur ad vitrum.

Externe venter singulo trihorio elapso hac viciorum miscela calido torus inungatur necesse est.

℞ Olei cydoniorum cocti, malthiches sing. ʒj. Nucis myrist. expr. ʒj. soluta dentur ad tactile.

Non minus salutare est cataplasma ex diacydonite cum vino rubro in pulcem cocto, ventri calide inpositum, cui pro re nata pulverem hæmatitis, malthichen, nucem myristicam, ac rosas rubeas immiscere poteris.

Dum hæc ita commendamus, tacite omnem volatiliū usum tanquam suspectum, & ad humorum totam resolutionem plurimum stimulantem rejicimus; quibus tñ. per intervalla carere haut possumus, cum nil magis spirituum penuriam extemplo refarciat, ac lymphæ coagula impediāt, præ hisce salibus ac spiritibus volatilibus. Sed. oporata medicamenta præcedenti capite indicata etiam hæc cum emolumento assumi queunt.

Pro potu ordinario emulsum amygdalispum cum decocto radicū bistortæ vel tormentillæ paratum inserviet; pauperiores decoctum radicū bistortæ vel tormentillæ solitarie, aut aquam ferrariorum, aut in qua argilla vel silicis candentes extincti sunt, bibant. In coquendo jure bubulo, gallinæ, agnino semper de ichthyocolla ʒij. olla indantur, de quo postmodum mane hora septima, circa meridiem, vespere hora quarta, ac hora septima, noctu nona hora ac sub mediam noctem aliquot cochlearia præbeantur. In contumaciori profluvio alvi Carduus benedictus in aqua coctus, & interdum aliquoties sorbtus egregium remedium erit; delicatiores vero solam aquam ejus distillatam decocti loco bibere poterunt.

In dysenteria eadem convertiunt medicamenta; vel de sequenti pulvere ʒß. singulis sex horis in emulso amygdalino exhibeatur.

℞. Croci vitrioli Chalybeatis dulc. sanguin. drac. arboris veri, corall. rubr. præp. unicornu foss. cornu cervi phil. præp. terræ signatæ singul. ʒj. essent. opii Langelotti gr. 4. M. F. Pulvis subtr. ad scat.

Huic quadrat, ut etiam hic inferatur, uterque pulvis, quo in difficultate intestinorum utimur, & sic paratur.

Pulvis antidyntericus.

℞. Sacch. alb. terræ Lemn. sing. ʒij. unic. foss. corall. rubr. præpar. singul. ʒj. sangu. drac. veri, smaragdi præpar. boli Arm. præpar. cornu cervi phil. præp. sing. ʒß. essent. opii Langelotti, ol. nuc. myr. sing. ʒj. M. F. Pulvis subtr. cujus dosis ʒß. quæ singulis sex horis in emulso amygdalino dulci assumatur.

Pulvis stipticus pro pauperioribus.

℞. Rad. tormentillæ, bistortæ, consol. maj. flor. ros. rub. balauit. sem. papav. alb. singul. ʒß. Terræ signatæ, boli Arm. singul. ʒiß. Nucis myrist. ʒij. opii ʒß. sacch. alb. ʒij. M. F. Pulvis subtr. ut superior sumendus.

Durante dysenteria conveniens potus pariter erit quodlibet ex decoctis superioribus; vel lac bubulum in quo chalybs extinctus sit, iisdem ad sitim inserviat, vel suberis aut prunorum silvestrium decoctum in aqua fontana. Cydo-

nia, mespila, cynosbatus, corna, rubi Idæi fructus, ac ribes condita, aut eorundem gelata coagula frequenter sumpta profunt. Venter inungatur nuxura oleorum hoc capite descripta, aut cataplasma illic allegatum imponatur; vel theriacæ Andromachi ʒß. cum vitrioli Martis ʒj. rosbambuci commisceatur, triheli inungatur, ac ventri imponatur.

Quibus remediis ventris durities disturnior, tormina ac flatuum inclusiones tollenda.

Alvus ad triduum adstricta externe glande ex melle, sapone, sale gemmæ, aut larai saliti frustulo ad officium compellitur, interne idem præstant pruna Damascena cocta, cremor tartari, haustus aquæ, cui manipulis florum acaciæ nostratis aut florum cerasi vel perlicorum tantundem incoctum sit; bonus feri caprilli, in quo nitri puri ʒj. soluta sit, haustus, aut pilulæ Rusi aliquot deglutitæ. Ubi tormina atrocissima simul ventrem infestant, statim clyster e solo jure calido, cui oxylacch. emet. ʒj. & but. recent. ʒij. commixta, vel lac tepidum, cui de oleo lini cochlearia sex ac vitella duo ovorum addita sint, injiciatur. Venter interea unguento de hyosc. yamo, cujus unciiis duabus Antim. diaphor ʒij. Olive anisi, vel succini singulorum ʒß. Addita sint, calidæ inungantur.

Clysteribus nil proficientibus ex electro metallico antihectici Poteru globuli, magnitudine pisi, foriati deglutiantur, a quibus ingestis semper exoptatum obtinebis effectum.

Etiam ventrem laxat Antim. diaph. nitro non spoliatum, ac flores salis ammoniaci, si de quolibet horum gr. 20. vel 30. mane ac vespere in jure insulso hauriantur; neque etiam reticere debemus succum cochleariæ, aut nasturtii aqu. si de utrovis recenti cochlearia tria in jure salis experte bibantur: a quorum usu appetentia ciborum dejecta redit, spiritusque omnes agiores, sanguisque ac lymphæ ad motum aptiores redduntur; deinde ad aliquot dies de tinctura tartari stibiata *Frider. Hofmanni* gutt. 10. sumantur.

Contra colicos dolores, pertinaciter affligentes, in hujus morbi declinatione, associatis enematis ac unguento anodyno ante descriptis, hæc potio duobus haustibus evacuata summe proficua est:

℞. Hippenter. rec. No. 5. Aquæ rosarum, flor. acaciæ singul. ʒß. stent per aliquot horas in loco calido; succo dein expresso adde olei amygd. dulc. syrupi papav. err. singul. ʒj. sperm. ceti rec. Antim. diaph. sing. ʒij. Cinnab. antim. sal cornu cervi vol. sing. ʒß. Confect. alchem. compl. ʒij. Misceantur probe ad vitrum.

Quibus remediis exanthemata, anihrales, bubones, morbilli aque varioli tractandi.

Quocunque morbi tempore exanthemata cutem fedare incipiant, siue id paribus siue imparibus diebus contingat, in diligenti supra jam præscriptorum medicamentorum alexipharmacō usu perseverent necesse est: iisdem enim malignitas maximo cum ægri levamine, nobiliora viscera deferendo, ab interioribus ad exteriora per sudorem propellitur. Quamprimum tamen

tamen suspicio de variolis aut morbillis prorupturis adest, naturam officio suo rite turgentem fortioribus sudorem pellentibus non obruamus; quod si autem veneno huic eliminando impar, & affectibus illis quasi succumbere, vel saltem aliquo modo opprimi videatur, remediis modo supra *sect. 3. cap. 8.* recentibus utendum erit; emulsi quoque pro sunt e seminibus napi, nasturtii, cochlearia, melonum, violarum, urticae & simil. necnon decoctum ficuum cum sacchi, cando. At horum ope nullum sudorem per vim evocare instituant: tunc enim sudor limpidiorem lympham vitiatam, non autem crassiorem ac purulentam ejus portionem expellit: unde plus damni, quam fructus sudorem magno altu ac vi expulsum sequitur; atque varicem inter sudandum difficilius, aut ne vix quidem erumpunt, quam cute sicca, attamen molli, uti id quotidiana experientia compertum est. Videatur de huic affectibus celeberr. *Tb. Sydenham in variis opusculis.*

Bubones, parotides, ac carbunculi apparentes per repellentia, ac jure siccantia retro agenda non sunt; sed extorsum, quo felicius prorumpant, per optima remedia alexipharmica promovendi: externe v. resolventibus, maturantibus seu suppuratoriis, ac emollientibus cataplasmatibus aut emplastris constanter tractandi: ex quibus conducunt unguent. Iovis una cum magnate suo cataplasmatibus mutar impositum; puri etiam & lacte cocta, cui mel crudum ac succus cneidonii majoris additur; fermentum (aut massa pro panaceo) quod alium, cepas aut scillam contusam in mixtam habet; Cataplasma e lupino aut faba fressa, radice althae, mercuriali, malva, floribus chamemeli, meliloto, semine lini, foeniculi, aliisve maturantibus cum lacte aut aqua coctum, cui butyrum recens, unguentum populeum, aut de hyoscyamo additum; Radix lili albi vel martagi recens cum cepis contusa, ac pauxillo fermenti & butyro iuncta, cui aliquid, dicis caussa, de theriaca permisceri potest; Item medulla panis siliginis, aut alius albi, falsitamen, cum lacte vaccino aut caprillo tamdiu excoqui solet, donec in pulmentum vertatur, cui sub huius coctionis florum chamemeli manu tritorum bonam quantitatem, & pro lubrico pauxillum croci inspergere poteris: si vero adhuc fortius hoc cataplasma expetes, adde alium, cepas, aut radices lili albi recentes contusas: Emplastrum deinde post usum cataplasmatum convenientia erunt, emplastrum de meliloto, diachylum cum gummi, magneticum Angeli Salis, ac emplastrum de cicuta nostrae descriptionis, & exulcerans Augustinum, aliaque plura.

Emplastri de cicuta haec est descriptio:

℞. Resina flavae recentis, succi cicutae spissati singul. ℥j. Galbani puri ℥ss. Olei e lateribus, olei cereae, vel ol. de cornu cervi ℥ij. M. F. empl. mollius.

Interea satis mirari nequeo, doctissimos aliquos viros reperiri, qui emplastrum magneticum ob arsenicum additum tuto in usum vocari non posse existimant, cum tamen virulentia arsenici a sulphuris ac immixtis acido penitus fracta & fixata sit, ut ejusdem spicula, alias luxuriantia, schematicum ob horum accessum jam mutatur, & retusa sine.

Horum certe remedium opera crustae putridae ac corruptae, nisi cum pure bene cocto in anthracibus ac bubonibus facilius ad separationem & exitum disponantur, ut minori postea negotio decidant. Quamdiu vero materia ad perfectam suppurationem nondum pervenit, Unguentum tuscum *Felcis Wurzi*, aut *Egyptiacum Hildani* illinatur, cavumque deinde uicis ris unguento maturante repurgetur.

Bubones nonnunquam profundius intra cutem latentes lapide caustico ex argento vel salibus lixivis composito, aut ferro candente, vel scalpello ad puris effluxum aperiri debent, postea ut alia ulcera matura tractandi sunt: potest etiam, ne malignitas latius serpat, magnete arsenicali dicto saepius circum anthraces aut bubones circulus duci.

Quid in convulsionibus ac morbis spasticis agendum.

Variae convulsionum species febri castrensi epidemia laborantibus, in diversis corporis partibus, facie, manibus, pedibus aliisque erumpentes, quandoque superveniunt: quando itaque motus spastici faciem mire distorquent, vertex, & cervix; quando brachia, cervix ac spina dorsii inter scapulas; quando pedes aut aliae partes spasmo corripuntur, universa spina dorsii cum osse sacro sequenti oleorum mixtura calide inungantur;

℞. Olei vel pingued. castorei, e floribus Stortani, umbelic. terrest. singul. ℥ss. succini albi distilli. ℥j. Misce ad hucile.

Interne mane ac vespere quotidie ℥ss. vel ℥j. Pulveris huius antispasmodici pauxillo condituræ rosarum compositæ deglutatur:

℞. Antim. diaph. unic. toll. cornu cervi phil. prepar. succini albi prepar. singul. ℥ss. Cinnab. Antim. vel nat. ℥j. sacchar. albi. ℥ij. M. F. Pulv. subt. ad scaturam.

Quibus res angusta domi, mane ac vespere radices valerianae tritae ℥j. in aqua aut jusculo lumant.

Quomodo sitis intensa restringenda.

Quia vinum in febribus continuis malignis cane pejus & angue fugiendum est, variis potus cocti ex aqua parari debent, quibus sitim egrotantes mitigent: interea luxuriosi Bacchi nepotes mutata scena aqua sitim restringere coguntur, nisi Hygieas abire ad undas veniat. Conducunt itaque decoctum hordei, cornu cervi crudi, vel usti; vel bibatur aqua in qua cerasa acida, racemi oxyacanthae, pruna alba, aut pastilae Corinthiae aliquandiu immerse sint; aut spira, vel panis e simila, aliave crusta panis tota nucceque myristica trita aqua injiciatur, ut pro potu ordinario inserviat; praesente diarrhoea in aqua fontana silices, chalybs, ferrum aut argilla ignita extinguantur: cussi simul assilgentes in aqua fontana sextariis quatuor manipulis fursuris vel avenae mundatae coquantur: in siti intensissima, absente diarrhoea, nitrum preparatum, nitrum vitriolatum, vel pulv. pyrius in aqua solutus, aut, quod in oris fauciumve inflammatione praestantissimum audit remedium, albumina aliquot ovorum aqua fontanae exacte commixta bibantur.

Opulentiores ex syrupis è succo citri, rubi Idzi, acetosæ, berberum, oxytriphylli, ribesiorum, cerasorum acidorum vel cydoniorum, refrigerantes & cardiacos ubi parari eurent potus, quibus ad gratum acorem conciliandum spiritus chalcanthi vel sulphuris guttas aliquot pro lubitu instillare, atque sæpius bonum hauritum pro siti extinguenda capere possunt.

Extemporalis quoque potus è pomis citreis recentibus ac saccharo paratus fere omnibus aliis liquoribus hic, ob suavem acorem ac summam fragrantiam a corticibus communicatam, palmam præripit, quia acido succo ferociam tumultuantis colluviei biliosæ in ventriculo fluctuantis, lymphamque putrescentem ac colliquescentem compescit, simulque ob sal vol. oleosum, excellens spiritus reficiens ac cardiacum remedium est: hanc tamen efficaciam aliis quoque acidis, quæ ad gustum grata existunt, inesse, notum est: quibus pleraque e cydoniis ac rubo Idzo parata remedia accenseri possunt.

℞. Aquæ fontanæ mens. i. cui infunde radula detritum corticem flavum pomi citrei majoris succulenti, dein discisso pomo manu succum fortiter exprellum aquæ instilla, addendo sacchari integri ʒ ij. vel ʒ iij. & hic potus siti sedandæ proderit.

Vel ℞. Flor. ros. ʒ ij. vel 3 vi. pom. citrei cum cortice discit. No. i. spir. sulph. q. s. ad grat. acor. obtinendum, aquæ fontanæ serv. mens. i. stent per 8. vel 12. horas intusa; dein colentur, addendo sacchari ʒ ij. vel ʒ iij. f. tintura sapidißima.

Vel ℞. Condit. ros. rub. ʒ ij. vel ʒ iij. succum & deraßum corticem pomi citrei, aquæ fontanæ frig. mens. i. ex commixtis fiat potus extemporalis. Plures condituri rosarum rubear. vel oxytriphylli ʒ ij. vel ʒ iij. in aqua gelida diluunt, ac potant. Ros vitrioli aliorumque fossilium, necnon stimulos latices acidi co. hieatim exhibiti intensam sitim restinguunt; rarius tamen exhibendi.

Poma, pyra, rapæ, cuncta condita, ac à rusticis comesta, nulli febri maligna laboranti exitio sunt, sitim enim maguam, ardoremque in faucibus extinguere solent; quare haur absque ratione *Plinius histor. natural. l. 13.* Uvas in aqua coelesti servatas commendat his verbis: Saluberrimas putant Medici uvas in aqua coelesti servatas, etiam si minime jucundas: sed voluptatem earum in stomachi ardore sentiri, & in amaritudine jecoris, fellisque vomitione in choleris, eum ardore febrium ægotantibus. Imo declinante jam morbo, si alvus adstricta est, uvæ in vino aromatico asservatæ profunt.

Quomodo ager in victus ratione, decubitu, ac aëris moderamine tractandus.

Præter juscula gallinarum aut è carne bubula ac agnina confecta, aliaque efficaciora vix quicquam ciborum sine molestia ægri sumunt; diarrhoea vero ægrum insellante ossæ farinariz, quæ tamen ex jure carnis parari possunt; aut cremor hordei succo citri vel aceto auctus; quibus & profunt gelu gallinaceum succo citri ubertim conditum, quo & cremor hordei gratior redditur, si tantum hujus, quantum illius commisceatur; pruna Damascena cocta, pul-

menta ex pomis, & quæ sunt alia facili digestione esculenta concedantur: vitandi contra cum piscibus omnes cibi præpingues. aromati- bus vel pipere nimium conditi, flatulenti, ac cruditatibus auctores.

In lecto ita æger decumbat, ut aëra antea ten-tem proximum excludere, ac facilius ad sedandum se componere queat; torale autem pinnus admodum repletum non sit, ne propter gravius sibi impositum pondus difficiliter æger respiret: ab externo aere frigido omnino arcendum est ægri corpus; licet aëris recentis spiritibusque æthereis turgidi flamen in cubiculum introitus- sum conducatur; neque propter syncopes aut animi deliquiorum metum languens crebrius è lecto surgat aut allevetur: satius ergo erit æ- grotanti lectum ante Meridiem, dum rebrum ætus aliaque imbecillitates aliquantum remi- serunt, sternere; nullo enim tam citius tunc ex- tra lectum per exiguum moram sedere potest, quam sub vespere, quando tunc ætus, quam alia symptomata majus incrementum reitun- sere; vel si debilitates majores sint, quam ut erectus esse possit, mox ex uno lecto in alium transferatur; ac quotiescunque vesam aut al- vum exonerare cupit, eidem pelvis ex orichal- co, aut ea quam *Gr. Fabr. Hildanus* descripsit, supponatur; & hoc modo animi deliquia eo certius declinabuntur.

Aër in conclavi vel cubiculo sæpius suffumi- gando accensis ignis juniperinis aut abiegis corrigendus est, ut supra *sect. 11. cap. 3.* jam pro- tulimus.

Quomodo ager in statu convalescentiæ tractandus.

Quamprimum morbus declinare incipit, ap- petentiaque ciborum ægro redit, ventriculus non statim multis crudis concoctisque diffici- libus, aut supra jam interdictis cibis onerari debet, aliàs per facile recidivas efficere febris; sed de die in diem ita paulatim dimensus cibis augendus, usque dum tandem ventriculus libe- riora ingesta absque omni molestia ferat, nulloque labore digerat.

Vinum non concedatur, donec stomachus modicam ciborum quantitatē retinere possit; quod si fiat, in prandio & cena aqua dilutum modica quantitate hauriendum; extra autem hoc tempus vitari debet. Non dandum in febre, nisi veteribus, vinum, nec nisi declinante mor- bo *Plinius histor. nat. lib. 23. cap. 1.* memoria prodidit.

Si post uberem nutritionem scrotum intumescat inflammatione, unguentum Iovis cum magnate suo calide sæpius imponatur; intus vero profunt diaphoretica, ut in morbo præ- gressio.

Si vero decumbenti in statu convalescentiæ pedes intumescant cedente, mane ac vespere hæc fomentatio pedibus prodest, si per mediam horam vaporem calidum inde emanantem exci- piat, quæ sic paratur:

℞. Salvia, flor. Chamæmeli, serpilli, origa- ni, ramul. pinastri, baccar. unip. singul. manip. 2. vel 3. decoquantur in aqua aut vino albo aliquandiu; dein omnia incul in stulam fun- dantur; utque vapor fervidus pedes ubertim lambat, silices, lateres, aut recementa ferri igitur

ignita per vices immergenda, pedes operculo trula cancellato non infittant, ac linteis circum quaque muniuntur, quo vapor eo fortior versus pedes feratur.

Interne, corpore intumefcente, prodest salis polychrestis ꝑß. vel Antim. diaphor. ac flor. salis ammoniaci sing. ꝑj. si in iure talis experite assumantur.

Moderatæ corporis motiones instituantur; æque diutius ob virium debilitatem extra lectum non ambulet; vires tamen omnes brevi tempore, ubi aëre simul exteriore iterum trui datur, recolligantur.

Alvus quotidie suum faciat officium, necesse est. Veneri immaturus non litent; ira, tumor, ac terror vitentur.

Si corpus omni humido spoliatum sit, conducat per 3. hebdomadas serum lactis caprilli, mane ac vespere calide ad 3xii. potum; in effluo spiritibusque orbo sanguine, plerique sensus hebeicente, appetentiam sitimque naturalem suspendente, succus naturæ recens ad cochlearia 3. vel 4. in iure non salito, mane ac vespere, per duas hebdomadas calide potus admodum efficax erit.

Intertrigo emplastro saturnino aut spermatis ranarum eliditur; si vero sub cute sphacelus deliteat, excindendus, ac unguento Ægyptiaco separandus, & sicut aliud ulcus sanandus est.

Quod reliquum est, ex se igitur ubi vitæ victusque ratio præscribitur, hic repetatur.

Faxit D. O. M. ut omnia, quæ hic proposuimus, in gloriam ejus sempiternam, miserorum salutem, Medicæque artis honorem cedant. Cujus sanctissimæ voluntati, æternæ providentiæ, imperferutabili sapientiæ, ac infinitæ misericordiæ nos, ac nostra studia, haut fucata mente, supplices commendamus. *Henric. Secreta Trall. de Febre Castrensi in digesta.*

Febres Intermitteutes in specie.

Neminem in re Medicæ medio-riter versatum latet, medicamenta ad febres intermittentes curandas numerosissima circumferri: Quilibet *Neo-doliorculus*, *Agyptia*, vaniloqua & delira muliercula, tresilique impostor; qui bullatis nugis, & strophis, quæritum capiet, ementum suum lebrifugum (quod vitiosa nuce non ementem) in calum attollit, ac innatis buccis proclamat. Quanta pericarpiorum, periaptorum, amuletorum, carminum, sigillorum, & veneficiorum circumvolitant dira, & insulsa agmina; Quanta emplastrosum, epithematum, & cataplasmatum inquinamenta, dorli, splenis & cordis regionibus; plantis pedum, temporibus, &c. admoventur? Pharmaca etiam interna omni, quæ in Pharmacopæus prolat, forma ab his vel illis decantantur, & vix datur vergerabile, minerale, aut animale, quod non febrifugi titulo decoratum fuit, & amplissimis elogis evectum: Februm enim causa non perspecta, universi in tenebris errabundi (suavissimæ sanitatis restituendæ causa) cuiusvis ferè rei, quæ ad manum fuit, periculum fecere, donec aliquid illis (ut opinabantur) ex animo cessit, quod protinus tanquam donum cœlitus delapsum coluere. licet reverà Febris ex se, aut aliâ aliquâ de causâ (non animadversa) evanuerit; & quamvis, errore tandem comperto,

aut impollutæ larvâ detractâ, inanes magniloqui aurículas sæpenumero demittebant, nihilominus febrifuga per fas, necisque innumensum numerum excrevere, quæ dies deticeret percurrere.

Nos autem despectis popelli levitate, scotomate, & brutâ temeritate, meliora (pro facilitate nostra) meditantem, indigestam, & distulicam febrifugorum sarraginem in meliorem & contractiorem ordinem redigere conabimur: supervacanea ergo, futilia, inanisque experta & usitata rejicientes, cætera in unum quasi manipulum colligemus, & intra certum modum coercebimus.

De humano genere pessimè meritori simus, si stolidæ plebeculæ, hominumque quisquiliis plures medicamentorum formulas, (ceu gladium furenti) permittamus; eadem igitur parcius proferemus; non enim imperitum vulgus, sed Medicinâ & Philosophiâ ornatos ambimus.

Intentiones curativa in hac re genuina, & generatior, hæ sunt.

1. A Febris intermitteutes præservare.
2. Easdem (cum res postulaverit) palliare.
3. Easdem radicitus evellere.
4. Diathesin febrilem emendare.
5. Damna ab his Febris illata refarcire.

De Præservatione.

Præservationis munus absolvitur, (1.) Sanguinem a cruditatibus liberum, & sincerum servando. (2.) Cruditates, si quando sanguini suggerantur, inhibendo, quò minus in angustis hæreant, & paroxysmos febriles pariant.

Sanguis a cruditatibus immunis servabitur, (1.) Causas præcatarticas in hujus opusculi lumine edicas tanquam peltem refugiendo, & res iis contrarias in consuetudinem addiscendo, ex gr. Aeris humido-frigidi vice calido-siccus, dyspeptorum eupepta, & debilitantium vice corroborantia in ulum adducenda sunt. (2.) Si casu eveniat, aut vitæ ratio exigat, ut causas aliquas non orbicas vitare nequeamus, iis protinus obviantur diæta & medicamenta, quæ earundem effectibus vires suas opponunt; ex gr. si quis cogatur aërem humido-frigidum subire, aliave humectantia in primâ causarum præcatarticarum classe comprehensa usurpare; hæc de causa.

Aër luculentis ignibus, hypocaustis, aromaticis & odoratorum suffimentis (quantum fieri potest) emendetur.

Mensa intruatur cibus pipere, zinzibere, caryophyllis aliisque aromaticis conditis, carnibus percoctis, aut probe allatis, pane biscocto, aliove penitus fermentato, percocto, & non-nihil siccato: Avibus ferinis aridam colentibus, cujusmodi sunt alaudæ, passeræ, perdices, phasiani, urogalli majores & minores, turdi, rusticulæ, gallinagines, merulæ, coturnices, &c. Avibus etiam aquatilibus ferè omnibus præter anates, anseres, aliasque planipedes. Inter manuctas eidem usui inserviunt gallinæ, capones, pipiones, galli & gallinæ Numidici. Ex quadrupedibus in mensis commodius apponuntur cuniculi, lepores, vervecæ, aliaque animalia fir-

miori, & minus mucosâ carne prædita, modo non sint nimis annosa. Inter animalium partes caro musculosa, corda, jecora, & linguae exsiccata cæteris, anteponenda.

Præmissis annumerandæ sunt Radices barta, palinacæ, bulboeasani, sive grandis terræ; Argentina, lisari, symphyti, eleo elimi, raphani rusticani; Cephæ, porri, alii, eringii, angelicæ, zinziberis, & si quæ aliæ sint calidæ, aut siccæ & sui aptæ.

Cortices aurantiorum, limoniorum, citreorum, sassaparillæ; Cassia lignea, cum monum, nucis myrsiticæ involucra, &c.

Herbæ & folia; ut Cerefolium, nasturtium aquaticum, hortense, & hyemale; Beccabunga, petroselinum, piperitis, pulegium, serpillum, porrum, cepula, allium ursinum, hortense, & sylvestre, alliaria, hyposelinum, tanacetum, draco herba, hederæ terrestris, rosmarinus, ruta, mentha, salvia, majorana, satureia, fœniculum, absinthium, hominum, anisum, balsamita, pimpinella, omniaque calidiora, quorum vapor gustui aridet.

Semina anisi, coriandri, fœniculi comitunis & dulcis, carui, dauci, erucæ, sinapeo, anethi; Cardamomum, grana paradisi, caryophylli, aliaque calefacientia & siccantia quæ eliciunt, & palatum permulcent.

Fructus & bacca, ut nuces moschata, cubebæ, bacca juniperi, piper, mespili, corna, amygdalæ, cunæ, nuclei pini, capicum, bacca Buxæ arboris (vulgo *Coffe-benies*) mala cydonia, cerasa nigra, mora, nuces juglandis, pyra sicciore, olivæ fructus exsiccati, &c.

Flores Croci, salviæ calendulæ, menthæ, sambuci, paralyseos, nasturtii aquatici, & Indici; primulæ Veris, lupuli, lavendulæ, anthos, &c.

Aromatica omnia, & quævis alia calidofica alimentaria, & salubria.

Ex præmissis quisque arbitrato suo parare potest convivia, dapes, secundas mensas, embammata, acetaria, condimenta, prout vitum fuerit, locique & convivarum consuetudo fert.

Potus sit vinum, præsertim austriusculum & stomachicum, ut Rhenanum, rubrum, vel album Gallicum, &c. Cerevisiæ fortiores lupulata, probè coctæ, penitus fermentatæ, & claræ; Hydromel, cerevisia, & vina absinthio, centauro, vel herbis, fructibus, seminibus, & floribus modò memoratis alterata.

Animus sit hilaris, nullo mœrore, aut solitudine cruciatus.

Exercitationes frequentes, eâ tamen lege, ut spiritus potius reficiant, quàm dissipent, & defatigent.

Alvus sit satis laxa; & subinde sudor, urina, & sedes (catharticis lenioribus mox enarrandis) provocentur. Vigilæ paulò protractiores.

Medicamenta efficacissima sunt amara, ut Cortex Peruvianus, centaurium minus, radix gentianæ, serpentariæ Virginianæ, & contrayervæ; Semina & folia Cardui benedicti, absinthium, chamæmelum, ejusque flores, summitates abietis, cupressi, &c. Salia absinthii, Cardui benedicti, rutæ, genistæ, thymi, tartari, veronice, scordii, & viperarum; Sal Ammoniacus, &c. Omnia exsiccantia, calefacientia, diaphoretica, diuretica, & anti-hydrotica, ut lignum sassaparillæ, guiaci, buxi, fraxini, santala omnia,

lignum Lentiscinum, &c. Radix sassaparillæ, emulz campanæ, fœniculi, petroselin, apii, &c. Summitates pini, juniperi, &c. Aqua calcis vivæ, &c.

Secundæ causarum procatacticarum classi, nimium debilitantibus, utpote hæmorrhagiis, &c. opponenda sunt corroborantia, anæptica, spiritumque & sulphur restituantia, & stomachica præstantiora ex præmissis tere deligenda; quibus adhibere licet cupedias lautiores, & generosiores ex vinis & euechymis collectas, ova sorbilia, avenæ gelatinam (*Anglicæ Finurp*) cum vino Canarino & lactecharo devoratam, cinarum, animalium juniorum testiculos, glandulas, & linguas, radices tagopogi, consummata & expressa omnia minus n. u. o. s. a. cum vinis coniecta, pastacia nucleos pini; &c.

Lotus consistet ex vinis opulentioribus, & cerevisiis fortioribus, præsertim superius laudatis.

Aër sit serenus, tenuis, & perflatus. Exercitationes moderatæ. Animus erectus, omnimodaci cura, aut molitua vacuus. Excreta & retenta mediocria. Somnus refectioni idoneus.

Tertiæ causarum procatacticarum classi, quæ ex dyspeptis coarctat, adveniunt omnia stomachica præsertim an ara modo recensita.

Potus consistet ex vinis austriusculis, cerevisiis satis vetustis, absinthiatis, centaureis, &c.

Aër sit purus, & serenus. Exercitationes frequentiores. Animus n. u. m. ne perturbatus, & cura solutus.

Excretio satis libera; convenit purgantia stomachica leniora subinde usurpare, quæ sunt Tinctura sacra, decoctum amarum, hiera picra, Aloë rosata, pilulæ stomachicæ cum gum. Pil. hieræ cum Agarico, vel Tertoræ Quercetani. Vigilæ non nihil producantur.

Cruditates jam sanguini suggestæ (quæ ex causis procatacticis, appetitus dejectione, urinae cruditate, aliisque cacoehymis huius deprehenduntur) inhibentur, quo minus in angustias hæreant, & paroxysmos febriles evocent, si in eo statu servantur, quo sunt, priusquam Febris in actum educatur; hoc est (uti ex cap. de Quotidianis apparet) si cruditates satis comminutæ in sanguine tranquilliori, & compactioni detineantur, ut angustias permeare queant: Et tandem profus tollantur.

Cruditates eo statu custodiantur. (1.) Si earum incrementis obtemus, ne (uti in cap. de Quotidianis ostenditur) redundantes, & sanguinem superantes corporis angustias occupent; aut crassiores de novo suppeditare easdem trajicere nequeant.

(2.) Si sanguis ab omni perturbatione (graviori saltem) immunis perstet, ne (uti in cap. de Tert. Vernal. monstratum fuit) coalescentes angustias oppilent.

Cruditatum incrementis occurrit, qui omnes febrium intermittentium Causas Procatacticas devitat, & contrarius se affluere ut supra.

Si cathartica primis viis detergendis visa fuerint commoda, præstantiora stomachica, abstersiva, & cruditatibus adversantia seligenda sunt, cujusmodi sunt, quæ in hoc cap. propolita fuere.

Notandum tamen, quod catharsis blandè saburram subducens institienda est. (1.) Quia metuendum est, ne vehementiora sanguinem exa-

exagitando, referando, & fundendo latentem diathesin in actum deducant. (2.) Ne vires, & spiritus diminuendo sanguificationi derogent, & cruditatibus generandis non parum tribuant: Quinetiam primarum viarum sordes faciliori catharsi dejiciuntur.

Consultum duco, ut hujusmodi cathartica in forma solida sub ingredientum lecti exhibeantur, quoniam hujusmodi forma, somno & quiete insequentibus, mitius, & serius operantur; & ut plurimum, proxima prius affulget Aurora, solitque insit surgendi hora, quam turbas ciant; quod tamen, ut adhuc securius præstetur, omnisque perturbatio, & intempestiva noctu molestia avertantur, expedit Laudani opiat. g. j. (plus minus) necnon *Corticis Peruvian* tantillum dictis blandioribus catharticis adjicere.

Cathartici formula.

℞. Mas. Pil. hier. cum Agaric. Tartar. Quercetan. ana gr. 16. *Cori. Peruvian.* subtilissime super Marmorelævigati ℞. Laudan. Opiat. gr. j. Syrup. Absinth. q. s. M. f. Pil. num. 6. sumend. sub lecti ingreditum; repetantur quoties opus fuerit primas vias detergere.

Pari ratione in vomitoriis præscribendis, vix ultra Zythogalam carduatam affatim hautitam oxymellititis scillit. aut vin. scillit. ℞. j. aut saltem Vitrioli ℞. j. vel ℞. j. assurgendum est, nec Medico excedat paregoricum ab emetici operatione semper propinandum, quo exhibitio, somnus & quies imperentur, ut, si qua a vomitorio perturbatio oritur, e vestigio, priusquam furibunda evaserit, & diathesin febrilem in actum excuscitaverit, sedetur.

Formula paregorici.

℞. Aq. papav. rhead. ℞. j. Cinnamom. hordeat. Mentha ana ℞. j. Diacod. ℞. j. M. f. Haustus, huius vomitori operatione, sumendus.

Sanguis debitam contententiam, & tranquillam suam statum retinebit, si nullæ causæ excitantes (quæ *cap. de Tert. Ver. al.* recensentur) interveniant; proinde oportet, ut in eis vitandis omnem operam locemus. Et, si necesse fuerit, paregorica, refrigerantia, & allringentia, ut alumen, bol. Armen. corall. rubr. Margaritas, rad. tormentill. bistort. &c. Usurpemus, vel styptico-amara, quæ (experientia testante) eximie virtutis sunt ad sanguinis tumultus consopios; ut *Cori. Peruvian.* aut rad. tormentillæ, cum rad. gentianæ, aut summitat. centaurei minoris iuxta, &c.

℞. *Cori. Peruvian.* in alcohol redact. ℞. j. Syrup. è corall. è ros. siccis ana q. s. M. f. Bolus horâ somni sumendus.

Maxime convenit, ubi vigilæ urgent, aut perturbationis in sanguine orientis suspicio habetur, huic Bolo addere Laudan. opiat. g. j.

Cruditates penitus tolluntur earum coctione, & evacuatione, sedulo tamen cavendum, ne, (cum omnis coctio a calore fiat) sanguine nimis rarefacto, & agitato, cruditates dimittantur, & paroxysmos excitent. Quare in caloris gradu moderando omne Medici studium ponendum est, omnesque cogitationes ejus confingendæ; Calorem Vernalem, qui cruditates Hyeme congestas sensim, & placide (nisi san-

guis à causâ aliquâ excitante inquietetur) sine febre absumit, tanquam debiti caloris aptissimum exemplar proponimus; Vere ergo (evitatis solummodo causis excitantibus) totum opus naturæ (sive potius benigno ejusdem calori) concedatur, ni tempestas sit, aut constitutio humido-trigida, aut dispositio cacoehymica subit, tum enim temperare calidis, & liquoribus paulo generosioribus (multo verò magis autumnis & Hyeme) indulgendum est; prudenter tamen & caute cum eis mercandum, interpositis nimirum styptico-amaris, ut *Cori. Peruvian.* &c. Paregoricis, & allringentibus, & his ultimis convenit pericarpia modico sale imbuta continuo gestare; nec addubitet Medicus hujusmodi tempestatibus, & constitutionibus paulo calidiora permittere, cum sanguis ex se legior sit, pacatior, & compactior, quam ut statim (sine gravissimâ causâ) in furorem erumpat; ac si nihilominus eundem gliscentem deprehendas, prædicta mitigantia in auxilium evocanda sunt, uti & venæsectio, clysteres, omniaque refrigerantia. Hoc pacto plures febres tam intermittentes, quam continuas avertere potes, quamvis hæc methodus raro aut nunquam usurpatur, imo vix quidem advertitur. *Vid. hujus Partis cap. 3. U. 1.* materiæ morbificæ coctio & institutio tractatur.

Curatio persunctoria, seu palliativa, quâ paroxysmi, materiæ morbificæ non subductæ, sistuntur.

Non raro ob labascentes, fractasque vires, & Febris acerbitatem, agri in summum vitæ discrimen conjiciuntur, tum Medici prohi, & prudentis est, quali passis velis contendere, ut eos ex fati faucibus eripiat, ne mors morbum occupans omnem curandi ansam præscindat; quapropter paroxysmi temporibus, & quali tumultuarie inhibendi sunt, & ad efficacissima palliativa, quæ contestim paroxysmos prosterunt, tanquam ad sacram anchoram (in quâ unica spes est) confugiendum, sunt enim ex illis aliqua, quæ pene inter mortuos quasi ab inferis revocant.

Porro, operæ erit pretium paroxysmos suppressimere, cum agri itinera (non aliter commode conficienda) suscipere, ac res momentosas (alias insuperabiles) transigere cupiant; & ut induciz, & levamen gravius excruciatas afferantur; ac non raro, ut absolutiorem curam felicius auspicaremur, uti sequentibus patebit.

Paroxysmi, non sublata materiâ, morbificâ, inhibentur, omnia ad eum statum, quo constituta erant, priusquam diathesis febrilis in actum evocata fuerit, redigendo; dictus autem status (uti sæpius innuimus) in hoc consistit, ut cruditates satis comminutæ angustias pervadant, & sanguine firmiori crasi prædito conclusæ nullas perturbationes ciant. Quapropter,

Ad paroxysmos abigendos,

1. Cruditates coalitæ denuò conterendæ sunt. Quò expeditius sanguine, & sero permixtæ, angustiores meatus pervadant.

2. Sanguis compescendus est, & ad constantem, firmamque compagem reducendus; Si enim, hoc posthabito, & neglecto, cruditates (sine debita earum coctione & evacuatione)

comminuantur; aut impensius sanguinem referentes, libereque per angustias trajectæ, febrem proritabunt; aut (uti ostendimus) ubi invicem occurrentes coalescent, in angustias hærebunt, & recidivam accersent.

Quæ maximè quascunque res comminuant, sunt ignis, sive calor; fermentatio, corpora asperiora, & duriore motu prædita. Unde fit quòd ignis fere nihil non in cineres, fumum, calces subtiliores, &c. redigit; Calor tincturas elicit, digerit, coquit, &c. Fermentatio sales, & olea in spiritus comminuit, &c. Quòd lima, radula, serax, lapides molares, &c. res illis admotas in pulveres redigunt; & sabulum, arena, lapidum pulveres, pumex, cineres, &c. sordes conterendo, & abradendo vasis ligneis, metallicis, &c. nitorem afferunt; quod pulvis corallii, fictilium, Chimenium, sales, (inprimis austiores, magisque styptici, ut alumen, vitriolum, &c.) plantæ atringentes asperiores linguam, fauces, dentes, ac alia quæcunque à squaloribus suis vindicant; quòd optime detergunt; & Onosmariz, Coqui, Icthyopolæ, &c. intestinorum, carniū, linacum, angillarum limositates sale absumunt, quod viscosa, & mucosa vix sine cinerum, calcium, aliorumve pulverum, aut salium admittance, quibus plurimū conteruntur, dividuntur, & distrahuntur, destillari queunt.

Lubentissimè agnoscimus ignem, calorem, & fermentationem corpora penitissimè comminuerè, materizque moribicæ cotionem (quæ nihil aliud est, quam consummatio ejusdem comminutio) absolvere; nihilosecius paroxysmis solummodo palliandis ineptissima sunt. (1.) Quia sanguinem magis, quam res fert, exagitant, & rarefaciunt, adeoque intentioni eundem pacandi, & confirmandi, obnituntur. (2.) Alitum promovendo ægris plurimū attritis extremam debilitatem afferunt (3.) Cum solà cotione operantur, quæ tardius (unà forsan aut alterà septimanà & quandoque pluribus) perficitur, evenire potest, ut morbus calore exacerbatus prius febricitanti vitam adimat, quam cruditates hoc pacto debite subigantur, & evacuentur. Nec hæc quidem palliatio, sed integra dicenda erit curatio; quæ ad cap. seq. spectat.

Aspera ergò, & dura, ut terrea, salina, aut terreo salina, eaque sola nostro scopo respondent.

Sales verò cruditates efficacius comminuant, quoniam promptius sanguinem ingrediuntur, & in corporis angustias (ubi cruditates delitescunt) citius admittuntur, quippe è ventriculo ob eorum fusionem, & acrimoniam, quæ ejus membranz irritantur, illico ejiciuntur; dein ob vim suam penetrativam in venas lacteas oxyus se insinuant, nullaque morâ factâ sanguinem subeunt, ubi aquosiori feri parte (ceteris omnibus in vasis sanguiferis contentis tenuiori) soluti, & delati, motus arterialis adminiculo quosvis (vel angustissimos) corporis meatus rimentur; ac cruditates inibi stabulantes conterunt, & abstergunt; nec utique mirum; cum in carnibus inanimis, & frigidis sale conditis, (quarum pori calore deficiente, constinguntur; quibusque nulla arteriarum protrusio, aut sanguinis fermentatio, penetrationem adjuvat, aut

naturalis excretio cruditates amandat) limosas sordes absumunt. Hac ratione salia lixivialia, sal tartari, vitriolum Martis, &c. (dum inuimodi sordes meatus obstruentes conterunt & abstergunt) tanquam egregia aperitiva nectis enconius evehuntur, unde leucopalegnatias, cacoehymias, hydropes, alioque morbos a crassis, & lentis humoribus entos radicatus evellunt; Quoniam dictos humores conterunt, fundunt, & sequaciores reddunt; poros excretorios expurgant, & corporis stagna per sudorem, urinam, sedes, &c. eiciunt; Promde probatissima etiam sunt exsiccantia, cum eorundem ope omnes superflui humores excernuntur.

Sic mucum, quo intestina muniuntur abradentes, & membranas sollicitantes sedes movent, & tormina excitant: Infusis, & decoctis dissoluta (penetrando, & abstergendo) medicamentorum vires eliciunt, crassiores, ac tardiores mulieres, agrosque palustres (humiditates exsiccando) tæcundant. Hinc fit, quòd cineres, & calces egregia sunt hujusmodi terrarum lztamina.

Concesso itaque, quòd luxuriantes humores salum vi e corpore derivantur, sanguis tenuis magis, & compactior necessariò evadit. (1.) Qualiquidior ejus pars, quæ dilutus fuit, deest, & propriæ ejus partes magis exsiccantur. (2.) Aliquantenus etiam ob infixos salum cuneos obrigescunt. (3.) Sublatis interfluis humoribus, sibi invicem propius accedunt, & sanguis confirmatur, quælibet enim res, absumpta ejus humiditate, in ex partibus rigidissimis constrictur, contrahitur, & firmiorem compagem acquirit; uti in spongiâ, lignis, caulibus, fructibus, granis, seminibus, &c. Necnon in ipso cruore emissio & frige facto conspicitur. Concludimus ergò salia (præterquam, quòd cruditates comminuant) sanguini firmiorem crasin (alterum nimirum ad paroxysmos tollendos requisitum) largiuntur; propterea nonnunquam ex se paroxysmos tollunt.

Terreæ ramen particule (quæ & ipsæ asperitate suâ cruditates conterunt) sanguinis consistentiam à salinis particulis (modo præfatis) inchoatam consummant; his enim stypticitas, omnisque insignis contractio debentur; quæ ideo rarefactioni, & dilatationi (sine quibus fermentatio institui nequit) validissime resistunt, & tumultus ferè omnes restringunt. Hac ratione materiz moribicæ a salinis & terreis particulis comminutæ, ut angustias pervadat, a stypticis & astringentibus framm injicitur, ne perturbationes pariat, aut sanguinem transiens in angustias congeratur; omniaque simili statu, quo, dum Febris in fieri erat constituitur; & paroxysmi evanescent.

Tam salinas, quam terreas particulas materiam moribicam comminuerè plane cernimus; illæ vero magis comminuant; hæc potentius astringunt, ab utrisque vero simul junctis debitam cruditatum comminutionem justamque sanguinis coactionem allequentes scopum destinatum attingimus; & paroxysmi inhibentur, donec aut medicamenti vires conficiantur, aut causerum Febrem excitantium aliqua (ut purgatio, vomitio, intempertiva exercitatio, &c.) Sanguinem denuò exagitans, & reserans (eadem

dem planè ratione ac insolatio, purgatio, &c. ubi diatnesis subit, tertianam Verualem inferunt) rectivam evocat; quæ alias in terreo-salinarum uni persistendo, & causas excitantes fugiendo, certissime anteverti potuit. Sed hoc magis ad perfectam curationem (seq. cap. proferentiam) spectat.

Ex his cinere est, terreo-salina in paroxysmis abigendis primas tenere. Sani enim in terreis particulis non latis cito acriter sanguinis comp. gem constringunt, & cito dissoluta oculus se e sanguine surripiunt; ac, pro eorum vi penetrativa per diaphoretin, diurem, ac sedes, faciles exitus inveniunt. Terres idem particule sine salinis cum durescunt, sicciores, ac indomabiliore, & pylorum constringunt, nimis in ventriculo moras trahunt, vixque ob crassitiem suam sine optimis illis viz ducibus venas lacteas (ab eisdem etiam constrictas) ingrediuntur. Porro, sales ad terreorum vires melius eliciendas conducunt; & terrea humoribus, & cruditatibus non adeo se immiscant, & implicent, ac salia; nec in angustiores meatus, quos cruditates occupant, promptè a se se minuunt.

Ubi vero major comminutio, & minor constrictio requiritur, uti in sanguine torpidiori, & brumali tempore, salia quandoque paroxysmos tugant. Quandoque etiam mera terrea, ubi nempe major constrictio, minor comminutio delinatur, uti in sanguine rarefacto, ubi cruditates satis sunt comminutæ, sive semi-subactæ. Tamen tum hæc, tum illa seorsim sumpta minus fida sunt, quàm terreo-salina, quæ adhibitis cautelis mox subiiciendis, vix unquam optato eventu nos destituent.

Ad sanguinem pacandum, ejusque perturbationes consopandas egregie sane conducunt narcotica, & paretgorica. Sed, cum humores condensent potius, quàm comminuant, eorumque vires illico evanescent, medicamenta tantum subsidia sunt, quæ, urgentibus nimis sanguinis fermentationibus, vigilis, doloribus, diarrhæis, &c. Usui esse debent; & tum quidem (quatenus tumultus sedant & sanguinis constrictioni non parum afferunt) plurimum estimanda sunt.

Nostram de terreo-salinis sententiam ratione & veritate niti ipsa palliativa evincunt, tum interna, quorum præcipua sunt *Cortex Peruvianum*, alumen, vitriolum Martis, radix tormentillæ cum amaris, & salibus exhibitæ: tum externa, ut pericarpia ex bursâ pastoris, plantagine, radicibus tortillæ, bistortæ, pentaphylli; pilosellâ, visco oxycanthæ quercifoliis, gemmis, visco, aut cortice teneriori; equisetis, floribus balaustrii, rosis rubris, fructu cynosbati, prunis sylvestribus, mespitis, malis Cydoniis, & multis aliis astringentibus cum sale communi, alunine, aut alio quovis sale, vel aceto contulis, & in cataplasmatum formam reductis; vel ex conservis astringentibus, rosarum nempe rubrarum, prunorum sylvestrium, &c. Quæ cum saccharo (salis unâ specie) conticiuntur: Astringentia autem unanimi omnium consensu à terreis particulis, & an ara à terreo-salinis vim suam mutantur, præclara ergo, & præstantissima (si non omnia) palliativa sunt terreo-salina. Alia cataplasmata, emplastra, &c. Ex discussis, & ca-

lidis composita, materiæ morbificæ coctioni, adeoque febris curationi abolutiori, non vero paliationi (uti in seq. cap. patebit) inserviunt.

Cataplasmata terreo-salina hac ratione operantur. Salia cataplasmatum humore dissoluta quoddam muræ genus efficiunt, quæ astringentium (scilicet terreorum) vim potenter elicit ubique accendit; eadem n. uria ob dissolutas salium particulas validissime penetrat, quare cataplasmatibus carpis, ubi pullus micant, aliive teneriori parti, tenui, & r. ra cute vestita, & vasis sanguiferis distinctæ admotis, dictæ muræ (quæ qualvis vel solidiores & inanimatas carnes penetrare valet) facilis ad sanguinem patet aditus, eoque magis, quoniam partes cataplasmatibus subjectæ humido eorum tepore tenerescunt; Proinde, cataplasmatibus nocte dieque gestatis, salinæ, & terræ particule sanguini continuo suppeditantur, donec earundem sufficiens (ad cruditates comminuendas & sanguinem compellendum) quantitas suggeritur, unde paroxysmi (eadem ratione, ac si terreo-salina per eos introsumpta fuissent) sistuntur.

Nihilominus nullus dubito, quàm pericarpiorum, &c. stricta ligatio auxilii aliquid adferat; quandoquidem (rarissime licet) ipsæ ligaturæ paroxysmos inhibent; non quia (uti vulgo traditur) sanguinis motum interrumpentes febrilem fermentationem sedant, (quæ enim sanguinis motum impediunt eundem in furorem adigunt) sed quia dolor, qui à ligaturis fit, partes sensiles indefinenter lacerans, continuam earum contractionem (quæ etiam evenit à gravi, & permanente formidine, ab immersione in aqua, &c.) parit; quæ miræ ejus communicatione in *Part. prim.* exposita, totam membranarum seriem pervadit, vasæque sanguifera & omnes partes contractioni aptæ, dolore persistente, coarctantur; crudæ ergo particule in sanguine (non secus ac si ab astringente fiat) compressæ (ad tempus saltem) detinentur.

Quod celeberrimus *Cortex Peruvianum*, cujus effectus, & præstantiæ omnes summâ cum admiratione intuentur, terreo-salinus sit, sole Meridiano clariùs elucet. Nemini ignotum est stypticitatem terreis, amaritudinem terreo-salinis particulis deberi; sed *Cortex Peruvianum* est styptico-amarus: Ergo.

Non oleosus est, aut sulphureus, cum minùs sit inflammabilis; nec spirituosus, quoniam non tanquam corpus spiritibus refertum sensus ferit; nec aquosus, quia impense siccus est; Ergo terreo-salinus est.

Quinetiam arte Chymicâ sollicitatus terræ & salis multum, spiritus, olei, aut aquæ exiguum quantitatem præbet.

Quo magis alia palliantia terreo-salina sunt, eò certius paroxysmos tollunt; at *Cortex Peruvianum* omnibus aliis longè antecellit; quapropter necessarium videtur, ut terreo-salinus sit.

Sic tandem proditur quâ ratione præclarus ille *Cortex* ab India peritus, & astringentiæ salibus, vel amatis junctis, tum internè, tum externè adhibita accessione febriles supprimunt.

Quod autem *Cortex* inter terreo-salina facile palmam præripit, & paroxysmos febriles quam certissime fugat, Medicos penè omnes in admirationem rapit. Sed advertendum, Quod in quibusdam terreo-salinis particulis salinæ terreis laxæ,

laxe, & dissolutè alligantur, horum terreæ particulæ in ventriculo cunctantur, vixque venas lacteas subintrant, sed tr.jectis per intestinorum foraminula munitioribus, & acrioribus salinis, crassioribus his particulis introitus denegatur, & salinæ à terreis liberatæ in sanguine minus efficiunt. Hujusmodi terreo-salina faciliè dignoscuntur, quia gustui vix aliud quam salinum saporem, relicto circa linguam, & fauces stypticis sensu, suppeditant; solæ enim salinæ particulæ, terreis exterius relictis, quæ stypticitate suâ fauces afficiunt, percolantur, & linguæ poros penetrant. Hujus generis sunt alumen, vitriolum commune, vitriolum Martis, & salia cum astringentibus arte tantum coagmentata; quæ ideo alvum etiam magis constipant, propterea quod, salinis particulis per venarum lactearum oscula tr.jectis, terreæ magna ex parte in intestinis restant.

In aliis terreo-salinis terreæ & salinæ particulæ firmiter coherant, & arctius se invicem amplectuntur; tum e ventriculo simul ejiciuntur, & venas lacteas subeunt, junctisque viribus paroxysmos debellant. Hæc amaritudine suâ dignoscuntur, quæ (in nos nostra fallit conjectura) ideo sentitur, quia terreæ & salinæ particulæ arctiori nexu combinatæ linguæ poros una permeantes, ob terrearum asperitatem sensum rudiori modo, & ingratiùs feriunt, aliter non reddi potest ratio, cur non, (cùm amara sint terreo-salina) omnia terreo-salina sint amara; & cur non amara (saltem magis terrea) non perindè, ac Vitriolum Martis, aut alumen alvum constiparent.

Ex his demum alia magis, alia minus terrea sunt; hæc quia sal in illis prædominatur amaritudine suâ citius, illa tardius gustus sensorium afficiunt, & amaritudinem suam aliquatenus reservare videntur; quia terræ copia requisitam penetrationem retardat. Quamvis hæc, & illa cruditates comminuere valent, amara tamen magis terrea sanguinem potentius constriungunt, adeoque palliationi summum fastigium imponunt, & in hoc *Cortex Peruvianus* omnibus aliis amaris antecellit.

His præmissis, exigui erit negotii, quamvis maximi momenti, omnium phenomenon à Corticis Peruviani usu provenientium rationes patefacere. Quamobrem, cùm sit omnium palliativorum præstantissimum, cæterorumque scientia ex ejusdem consideratione elucescat, eis brevitatè causâ valedicemus, & ad hunc palliativorum faciliè principem calamum restringemus.

Obiter notandum, quod, præmissis ritè perpensis, optima corticis succedaneum investigandi ratio apparet. Aliquid nempe querendum est terreo-salinum, sed styptico amarum, quod amaritudinem asperiores quasi in recessu habet, cujus compages, quoad salis & terræ nexum, stabilis est, & firma. Inter Cortices (uti nobis videtur) disquisitio instituenda est, quia Corticis Peruviano magis sunt analogi, & ut plurimum admodum terreæ; ac præterea sal & terra in eis (qui aëris, venti, caloris, & frigoris injuriis, calli instar, obdurefcunt) arctius sibi invicem alligantur. Minus denique oleosa sunt, spiritiosa, & aquea.

Phænomena à Corticis Peruviani usu se præferentia explicantur.

1. Corticis Peruviani vires in sanguine diutius persistunt ob firmiorem illum terræ & salis nexum, qui non facile resolvitur, præsertim vero ob terrearum particularum (quæ post cruditatem commutationem ex se ad paroxysmos inhibendos sufficiunt) indolem indolentem.

2. Præ omnibus aliis, ob rationes modo allatas, paroxysmos sistit.

3. Si fugatis a cortice paroxysinis, ejus usus non continuabitur, morbus post aliquot septimanas ut plurimum recrudescit. Quia, cruditatibus in sanguine remanentibus, adhuc reliis subest diathesis; quæ, aut absumpta corticis vi, aut, sanguine purgantibus, aliis e causis excitantibus agitato, & reietato, ciuitates denud (modo in *Part. 2. cap. 5.* exposito) dimittuntur, in angustiis coacervantur, &c. Unde recidiva fit.

4. Purgatoria, vomitoria, aliaque sanguinem exagitantia, & rarefacientia recidivas parant, ob rationem in præcedenti paragrapho propositam.

5. Regimen calidum, decubitus in lectulo, vinorum & cardiacorum generosiorum usus, &c. Corticis operationem aut elidunt, aut plurimum retardant. Quia sanguinis dilatatio, & rarefactio, quæ à calore consiliantur, constrictioni, quæ à cortice expectatur, strenue se opponunt.

6. Sic ulcus internum, pulmonum putæ, renum, &c. non solum corticis effectum protelat, sed nonnunquam eludit, & paroxysmos prius abactos paucis diebus revocat. Quoniam heterogeneus, & sordibus ulceris ichor sanguinis se immiscens ejus compagem reietat, & perturbat, & febrem (quam Heeticam nominamus) excitat, quæ (uti decubitus in lecto, molatio, purgatio, &c.) dum sanguinem rarefacit, & exagitat, corticis vim contrictivam anollit; & (ichore sanguinis perpetim suggesto) paroxysmos prius abactos denovo accerit.

7. In Febris calidioribus, quorum remissiones obscuræ sunt, non raro perniciosis est, & quandoque fatalis, præsertim si febricitantes lecto atixi sint, juvenes, temperamenti sulphurei, &c. aut tempestas calidior. Ratio quidem in promptu est, quia minimam sanguinis rarefactio ejus constrictioni, & quæ obest; & interea materia morbifica tam ab intenso calore, quam a corticis particulis plurimum subitoque comminuta sanguinem impensius dividit, in furorem adigit, funestosque tumultus ciat; quare materia non dum coacta, ut evacuari possit, magis tamen comminuta, quam ut in angustiis hæreat, vehementiori sanguinis motu altius in cerebrum impingitur; unde fit, quod febricitantes hæc infausa, & lugubri methodo extincti (qui ob incautam, & solidam medicamentorum temeritatem haud pauci sunt) convulsionibus, spasmodis, aut deliriis tentantur. Medico itaque piaculum sit corticis Peruviani promiscuus usus, quamvis opinio increbuit; Quod omnes Febres præcellentis ejusdem vi debellantur.

8. Ab ejus usu paroxysmus vehementior quan-

quandoque observatur, ob materię morbiſicę præcipitem comminutionem priuſquã sanguis ad nimias fermentationes inhibendas componatur, & conſtringatur.

9. Huiusmodi paroxyſmus Febriſ (ni ex genere calidiorum ſit) diſceſſum plerumque præſagit. Significat enim ſanguinem à cortice plurimũ affici, licet non adhuc debitam conſtrictionem aſſequatur, quam, continuato corticis uſu, & paroxyſmi declinatione, ac intermiſſionis ſuperuenientis frigore, & quiete ad ſanguinis contractionem concurrentibus, ante paroxyſmi futuri adventum ſatis certo adipiſcitur.

10. Paroxyſmus à corticis uſu imminutus, aut in melius alteratus, agris in cuius uſu perſiſtentibus, idem prænuntiat. Quia hoc non tantũ materię morbiſicę comminutionem, ſed & ſanguinis contractionem inchoatam denotat, alias enim fermentatio à ſolâ materię comminutione exacerbaretur; declinatione idẽ, & intermiſſione (modo prædicto) conſpirantibus, ſanguis à cortice latius conſtringitur, priuſquã Proximus paroxyſmus inuaſerit.

11. Diaphoreſin parit. Quia partes ejus ſalinę ſerum fundunt, attenuant, & penetrare faciunt, ac poros a limoſis obſtructionibus expediunt: Et præterea terreę particulę ſanguinem coarctantes ſerum exprimunt. Unde etiam omnia ferẽ aſtringentia alexipharmaca ſunt, & ſudorem movent.

12. Ab eodem fonte profluunt illa copioſa, & limpida urina, quę corticis uſum excipere (à *Clar. Sydenhamo*, à nobis, aliſque non paucis) obſervatur, Eò autem promouetur, quò magis diaphoreſis à frigore, &c. præpeditur; unde lectulo affixis, aut quouſmodo calentibus minùs competit. Ideò limpida eſt, quia ſerum citiùs à ſanguine contracto exprimitur, quam ut ſiturationi colore imbuatur; hæc de cauſa urina copioſiùs reddita ſemper ferẽ limpida eſt.

13. Liberaliores ſudores, aut urina copioſa, & limpida paroxyſmorum diſceſſum ſignificant, quia à ſanguine contracto (uti priùs dictum fuit) proveniunt.

14. Quandoque ſedes movet. Quia humores à ſeri, & limoſitatum fuſione, & ſanguinis compreſſione defluentes inteſtina lubricant, & ſtercus fluidius reddunt; necnon ſalinis corticis particulis inſtructi inteſtinorum membranas ad excernendum irritant, & mucum abradunt.

15. In ſubſtantia exhibitus longas in ventriculo moras trahit ob terream ejusdem compagem, & indolem indomabiliorem, aliasque rationes ſuperiùs allatas. Paroxyſmos nihilo minus tollit, propterea quòd omnia liquida ab agris hauſta ejus tincturam (quę in ventriculo optime elicitur) in ſanguinem deferunt.

16. In ſubſtantia ſumptus certius & citiùs paroxyſmos ſiſtit. Non tantum quia liquidis omnibus ſanguinem verſus tendentibus vires ſuas impertit, ſed & ejus tinctura (uti modò diximus) in ventriculo optime elicitur: Præſtantiſſima eſt tincturę extrahendi ratio, ut commodum menſtrum vaſi idoneo inditum in calido loco collocetur, & ſæpiùs agitur; at ventriculus ſemper calidus eſt, continuo mo-

vetur, & menſtruo efficaciffimo gaudet. Ergo.

17. Primi in recidiuis paroxyſmi plerumque calidiores ſunt. Quia ob inducias datas ſpiritus & ſulphur reſiciuntur, & cruditates magis adhuc diſgregatę ſanguinem penitus diuidunt.

18. Liquores aciduſculi, & aſteriuſculi (ut vinum Rhenanum, rubrum Gallicum, granatorum, &c.) cum cortice exhibitu feliciter ſuccedunt. Quoniam ejus tincturam pronptiùs extrahunt, & cruditatum comminutioni plurimũ conferunt, nec ſanguinis conſtrictioni obſunt.

16. E contra, liquores molliuſculi, lenes, & aquoſi (ut ſerum lactis, zythogala, piſanę &c.) malè cedunt, cùm ineptiſſima ſint ad vires ejus educendas menſtrua, & inſuper corticis aſperitatem leniunt, & obtundunt.

20. Cortex non tantum Febrem, ſed nonnumquam etiam Hydropem inde ortum depellit. Quia ſalinis ſuis particulis humores fundit, & poros excretorios detergit, partesque ſenſiles ad excernendum ſolicitat; & præterea (quatenus terreus) ſerum, dum ſanguinem conſtringit, exturbat; ac (quã ſtyptico amarus) digeſtionem confirmat.

21. Hecticis puerorum Febribus occurrit. Haſ enim, cùm à cruditatibus proveniant, quæ cortex abſumit, extirpat, Porro fermentationis enormitates reſſimit, & digeſtione ad eodem emendatã, ſincerus & copioſus chylus lactis amulus, hecticoque ſanguini maxime proficiuus, conſtituitur.

Cautiones & canones circa Corticis Peruvianæ uſum Obſervandi.

Ex præmiſſis liquet; (1.) Continuatũ corticis uſum recidivas avertere, (2.) Purgationes, vomitiones, regimen calidum, ulcus internum, decubitus in lecto, omneſque cauſas excitantes corticis viribus aduerſari, & paroxyſmos priùs abactos revocare. (3.) Eundem in Febribus calidioribus minùs ſaultum eſſe, & quandoque lethalem. (4.) Paroxyſmorum alterationem, aut imminutionem eorundem fugam ſæpe numero præſagire. (5.) Corticem in ſubſtantia efficaciorẽ eſſe. (6.) Aciduſcula, & aſteriuſcula commodiſſima ejus vehicula eſſe, aquoſa verò & molliã ineptiſſima.

7. Inſuper notandum eſt, Quòd, ſi in Febribus calidioribus obſcurè remittentibus (quæ continuas redolent) calidis temperamentiſ, &c. Urgenti aliqua de cauſa, corticem uſurpare uſum fuerit; ut melioribus auſpiciis curationem aggrediamur, diurnus in lecto decubitus interdicitur; nec, cùm æger ſe in lectum recipiat, craſſis, aut nimis integumentis oneretur; Aer ad frigidum potiùs, quam ad calidum vergat, Cortex aciduſculo, & frigido vehiculo propinetur; potus ſit refrigerans (ut piſana, &c. Succo limoniorum, aurantiorum, ſpiritu vitrioli, ſulphuris, &c. ad levem, gratumque acorem alteratus; venæſectio etiam, ubi plethora ſub eſt, celebretur. & ſi alvus non benè reſpondeat, injiciantur clyſteres emollientes. Hæc ratione Febrem veriùs intermittentem reddes, & periculum à corticis uſu aliàs formidandum amolieris. Præſtat tamen, ut cortici per aliquod

tempus praeferatur huiusmodi regimen, quod æger adversus illius injurias magis præmuniat. Quamvis cortex in his Febris res quidem lubrica est, & suspiciosa, nihilominus a prudenti Medico, adhibitis cautelis in hoc capite propositis, satis tuto exhiberi potest, ac in hac re multum quidem studii, & iudicii ponendum. Agyrtis ergo, & mulierculis nefas sit, nullâ circumstantiarum ratione habita, universis febricitantibus (quamvis apud Nostrates in more positum est) corticem indiscriminatum obtrudere.

8. Ubi magna cruditarum congeries, corticis usus periculosus est. Magna enim moles non facile comminuitur, nec comminuta intra sanguinem coërcetur, sed redundans, & liberius jactata diras metastases semper minatur, & non raro producit. Quinetiam pituitosæ sordes in ventriculo stabulantes corticis particulas oblinunt, & quasi visco implicant; eaque de causa plurimum obtunditur, & impeditur; & quandoque gravissimæ & insuperabiles in ventriculo massæ efformantur, quæ eundem opprimentes febricitantibus vitam eripiunt.

9. In Quotidianis igitur, duplicibus præsertim, & triplicibus, aliisque ingeminantibus Febris convenit aliquid de cruditarum cumulo detrahere, priusquam cortex sumatur. Cruditates diminuantur, (1.) Emeticis & catharticis phlegmagogis & abstersivis, quales sunt inter emetica sal Vitrioli, oxymel Scilliticum, acetum Scilliticum, &c. Inter cathartica Filulæ tartaræ Quercetani, aliæque in capite præcedenti enarrata, quibus semper adjiciendus est cremor tartari, vel tartarum vitriolatum, vel salum lixiviale superius laudatorum unum. (2.) Horum salium usu temporibus inter cathartes intervenientibus. (3.) Partiali materiæ coctione, & evacuatione, quarum ratio *seq. cap.* edocetur.

10. In minorativis usurpandis ratio habenda est cruditarum quantitatis, & plus, minusve earundem subducendum, prout in corpore magis aut minus searant. Ex *Cap. de Quotidianis*, & *Cap. de Febris ingeminantibus in P. 1.* Manifestum est, quâ proportionem in his, vel illis Febris abundat.

11. In Febris diutius, & perspicue intermittentibus cortex tutissimus est, & commodissimus. Quia præmissorum discriminum nullum subest, & sanguinis paciori, & compatiore conditioni à corticis usu expectandæ, harum Febris intermissiones non parum tribuunt. Unde.

12. In Quartanis, & Tertianis Autumnalibus necnon Vernalibus minus exquisitis, & clarius intermittentibus, optato eventu vix unquam destituitur.

13. Si in Febre ardentiori, ut pote Tertianâ exquisitâ, continuâ remittenti, &c. Cortice ad 3vi. vel vii. Sumpto, nullum levamen, aut notabilis in melius alteratio sentiat, sed Febris potius excandescat, à corticis usu omnino desistendum est, & ad regimen refrigerans & pægoricum confugiendum; usquedum Febris ad caloris gradum satis remissum (à sagaci solummodo Medico dignoscendum) redigatur; & tunc quidem (cautè tamen, regiminis frigidi præsidis non omissis) cortex resumi potest.

14. In segnioribus, & frigidioribus Febris, ubi materia crassa est, & torpida, tempestas numida, aut frigida, & constitutio minus spirituosâ, & sulphurea, ægis cum vinis tartareis, & austeriusculis, ut Rhenanis, &c. potest. Quia corticis virtutem expeditius eliciunt, & cruditarum comminutionem promoveant. Et subinde vini haustulus illis propinetur.

15. Illiusmodi vinis non incommode substituantur alia vina salibus lixivialibus, aut tale tartari imbuta.

16. Consultum est corticis exhibitionem à Paroxysmi declinatione auspicari. Quia sanguis à declinatione plurimum contractus, & pacatus, corticis contractioni facilius patet, nullumque intermissionis tempus incassum elabitur; quod in brevioribus intermissionibus magni quidem momenti est. Nihilominus hoc non impedit, quò minus quovis tempore, nisi paroxysmus urgeat, aut ingruat, dari possit.

17. Si Febricitantes in summum vitæ periculum conjiciantur, aut alia aliqua causa morbi palliationem raptim peragendam suadeat, cortex majori quantitate, tenuissimo pulvere, vinique austeriusculis infusus, & cum eisdem agitatus, sæpius repetatur; interpositâ ejusdem corticis tincturâ saturatissimâ.

18. Ubi ægrorum res in discrimine non versatur, sufficit unius intermissionis spatium corticis 3ß. 3v. aut vi. exhibere. Detur ergo interdiu.

19. In Quartanis quæque quarta hora ad 3ij.

20. In Tertianis quæque tertia hora ad 3j.

21. In Quotidianis & ingeminantibus (præmissis minorativis) quæque secunda hora ad 3j. vel quæque tertia ad 3iv. & quò intermissio brevior sit, eò sæpius, & majori quantitate concedatur.

22. Tinctura saturata multoties repetita substantiæ ferè æquivalere, magisque convenit, ubi ventriculus plurimum fœdescit. Quia non (uti pulvis) in ventriculo impeditur.

23. Si quando ejus solummodo infusio Febricitantibus arrideat, expedit, ut sit omnino potus ordinarius; sic enim (haud secus, ac à substantiâ assumptâ,) omnis liquor sanguinem versus iter faciens ejus virtute imbuitur.

24. Si alvi laxitas palliationem impediat, aut eludat, astringentia, & opiata in usum vocanda sunt; Ut tinctura rosarum, tormentilla, bolus Armena, diascordium; Laudanum opiatum, liquidum, &c.

25. Si catharsis à corticis usu exigatur, lenioribus catharticis cum Laudano, & cortice mixtis (uti in capite præcedenti habetur) instituantur; ne paroxysmi denuo evocentur.

26. Opiata & pægorica summo sunt usui, ubi vigiliæ, nimix fermentationes, perturbationes, & dolores, deliria, diarrhoeæ, aut dysenteriae febricitantibus molestiam afferunt; necnon ubi sanguis tenuis est, acris, aut calidus.

27. Ubi plethora, aut enormes effervescentiæ ægros infestant, & in discrimen adducunt (& non aliter) sanguinem mittere licet.

28. A medicamentis quibuscunque, præterquam memoratis, vix ulla cortici accedit virtus, multa sæpe detrahitur.

29. Cortici optimè substituantur amara magis styptica (ut centaurium minus, &c.) cum astringentibus sumpta, & pericarpis terreo-salinis adjuta.

Curatio consummata, quæ Febres intermittentes radicitus evelluntur.

Febres intermittentes radicitus evelluntur, si materia morbifica penitus tollatur; quod solummodo fit, eandem adeò subtiliter comminuendo, ut poros excretorios pervadere queat.

Huiusmodi penitior comminutio solo calore (quæ ideo materiæ Coctio dicitur) absolvitur; quæ enim a terreo-salinis fit (uti ex recidivis, urina crudiori, &c. constat) inchoata est, & imperfecta, nec cruditates evacuationi aptas reddit; quæ calore debite coctæ facile eliminantur.

Verumenimvero non contemnenda est rudior illa à salinis & terreo-salinis comminutio: (1.) Quod materia aliquatenus hoc pacto confecta à calore promptius subigitur, pari plane ratione, ac digestio in ventriculo sanguinis calori ad alimenta prorsus coquenda subservit. (2.) Quod comminutio à salinis, & terreo-salinis, utpote salibus lixivialibus, amaris, &c. expeditissima est, uti digestionem, quæ paucis horis; paroxysmorum palliatione, quæ non raro uno, aut altero die absolvitur, manifestum est.

Quamvis materia morbifica sola coctione prorsus tollitur; illud tamen fieri potest præmissa, vel non præmissa, paroxysmorum palliatione.

Prima Methodus.

Si paroxysmis prius abactis, materiam morbiicam coquere instituas, tum curandum est, (1.) Ut recidivæ inhibeantur. (2.) Sanguis ad coctionis munus obeundum debite calefacat.

Recidivæ avertuntur. (1.) In Terreo-salinorum (sive palliativorum) usu persisterendo. (2.) Errores graviores vitando.

Palliativa superiori capite continentur; quod vide.

Omnis in hac re error necessarius provenit, vel à causis disponentibus, quo novas cruditates suppeditant; vel excitantibus, quæ diathesin adhuc latentem excitant; Illæ l'art. 1. cap. 1. Hæ Part. 2. cap. 5. recensentur; quibus vitatis. exigui erit laboris, aut consilii materiæ morbificæ coctionem sensim assequi, quoniam cruditates à terreo-salinis jam plurimum comminutæ, & in sanguine caloris fonte detentæ, & fortè indies magis subiguntur, præsertim cum causas disponentes, quæ ex humectantibus, refrigerantibus, debilitantibus; & dyspeptis consistunt, avertentes non tantum res omnes coctioni inimicas declinamus, sed & eas declinando necessario ad meliores nos recipimus. Quinetiam terreo-salina (præsertim styptico-amara) quæ per totum huius curationis decursum usurpantur, omnibus, quæ diathesin fovent, opponuntur: Primæ nempe causarum procacitætarum classis, quæ ex humido-frigidis consistit, quia (modo prius enarrato) valde exsiccant. Secundæ, (debilitantibus nempe) quod digestionem maximè confirmant, & chylum penitus comminuentia sanguifica-

tioni plurimum ministrant, eaque de causâ vires reficiunt. Tertiæ ex dyspeptis consistenti, quoniam eadem conterunt. Et denique sanguinem constringendo causis excitantibus adversantur. Quapropter styptico-amaris (ut Corrice Peruviano, &c.) continuo adhibitis, parum aut nihil negotii superest.

Sanguis igitur ad coctionem absolvendam terreo-salinorum usu, & causarum disponentium amolitione, satis calefcit; nisi aut tempestas adversa, frigida constitutio, febris algida, & diuturna, calidiorum adminiculum postulaverint; tum quidem, habito moderamine, concedenda sunt vina generosa, cerevisiæ fortiores, cardiaca sulphureo-spirituosa; & id genus alia cap. de præservatione proposita. Nec metuenda est ab horum usu sanguinis nimia referatio, cum palliativa, cæteraque omnia eadem obstant.

Cortex igitur Peruvianus, cum sit terreo-salinorum, & styptico-amarorum præcipuum, non tantum ad paroxysmos tollendos, sed & ad diathesin emendandam, causas excitantes frustrandas, & coctionem maturandam, tantis pollet viribus, ut ad febres curandas (ut plurimum) unice sufficiat, & remedium præstantissimum, maximeque specificum (penè dixeram adequatum) jure merito habeatur; cujus repetitione, usque diu continuatâ innititur Arcanum Talborianum, tantopere per totam ferè Europam celebratum; Quod ob ejus famam longè, lateque disseminatam, expertam in febribus intermittensibus fugandis certitudinem, & exactissimam cum nostrâ hypothese congruitatem subicere visum est.

Arcanum Talborianum.

℞. Quinquæ opt. (i.e. Cortis Peruviani) subtilissime pulverizat. ℞j. inspergatur alternatim decoctione anisi, & succo petroselinæ per diem unum, aut alterum; dein indatur urceo siglino cong. viii. capaci; vas, pulvere jugiter agitato, sensim impleatur vino rubro Gallico; fiat infusio frigida per viii. dies, bacillo, spatula, aut alio idoneo instrumento ter quotidie funditus agitetur: & colatura demum in ampullis vitreis probè obturatis reponatur.

Vinum hoc medicatum febricitantibus propinavit ad ʒ v. vel vi. quaque tertiâ horâ, nisi somnus obstitit, à paroxysmi præcedentis declinatione ad sequentis accessionem, usque dum paroxysmi evanescere; & deinde (ventriculo jejuno) per sex dies continuos manè, & horis ad minimum duabus à cena.

℞. Magma infusionis prioris, additoque Quinquæ recentis pulverizat. ℞ß. fiat (modo prædicto) infusio per decem dies, &c.

Colatura propinavit ʒ v. aut vi. alternis diebus manè tantum per octo dies continuos à sex prioribus numerandos.

℞. Magma secundæ infusionis, & infundetur [ut prius] per alios decem dies, &c.

Hujus dedit ʒ vi. alternis diebus manè, per alios 14. dies, & dein per 14. dies quaque tertiâ Aurora.

℞. Quinquæ levigatione super matmore

in alcool redactæ ꝑ ij. pulveri in ampulla vitrea recondito attunde Spir. vin. opt. ꝑ viii. vas radiis solaribus per quindecim dies expontum quotidie agitur. Linctura decantata reponatur in vase vitreo fidelius obturato.

Ubi febris contumacior præmissis infusionibus non parer, singulis eundem donbus infillantur hujus linctura gut. v. vi. vii. aut viii.

℞. Quinquina tenuissime pulverizata. q. v. & cum Syrup. e succ. Limon. F. Electuarium.

Primâ infusione successu carente, hoc Electuarium (quia, uti præmittitur, cortex in substantia efficacior est) in usum vocavit.

Cum ob nimiam repletionem, alvumve non debite respondentem, visum fuerit sedes movere, infusionum prædictarum ꝑ ij. vini sequentis ꝑ iv. plus minus, prout infusiones rariis, aut sæpius sumebantur, ægrique conditio postulabat, adjecit.

℞. Hieræ opt. ꝑ j. infunde per 8. dies in vin. rubr. Gallic. ꝑ ß. vase tribus prioribus diebus semel quotidie agitato: Linctura decantata in ampulla vitrea obturata reponatur.

Ubi non insignis est repletio, nec alvus enormiter attrita, magis expedit clysterem ex emollientibus injicere; quia cathartica sanguinem perturbant.

Methodus Talboriana, salvis regulis, & cautionibus à nobis traditis, commodè satis instituitur.

Secunda curationis methodum, quâ nempe, paroxysmus non prius fugatis, materia coctio acquiritur.

In hac curatione sanguinis calor utramque paginam facit: Hæc ergo morbum promigandi ratio omnia calefacientia, & discussiva (quæ innunera sunt) suo ambitu complectitur; aquas nimirum ardentes, & spiritus vinosos quoscunque, cerevisias fortiores, vina generosa, aromata; stirpes, caules, herbas, fructus, flores, folia, semina, mineralia, &c. calidiora interne, vel externe in pericarpis, &c. adhibenda. In eo coctioni plurimum inserviunt salia lixivialia, amara, & quæcunque materie comminutioni, attenuationi, aut fusioni, conferunt, ut Mercurialia, Antimonialia, Saturnina &c. quæ nativi, febrilisque caloris adminiculo, cruditates efficacissime, & citissime attenuant & fundunt.

Nunc tuam (candide Lector) memoriam reficiens, quæ à nobis narratæ sunt, in animum reducas, & sine Lyncea acie facile cernes, quo pacto Terra, Salina, Sulphurea, & Spirituosa, varietate ex his (infinitum penè) composita febres intermittentes, earumve paroxysmos tollunt; unde, prout cuilibet de his, vel illis observationes suppetebant, febrifugorum nomina sortita sunt; quod perplexæ eorum turbæ in immensum augendæ minuitravit. Et ne cuiquam ex principis naturalibus suis desit honos, etiam ipsa aquea, quod æstum restinguunt, & in febribus ardentibus aliquid levaminis afferunt, ac sudori materiam suppeditant, à quibusdam in febrifugorum album referuntur.

Cautiones, & canones circa hanc curationem observandi.

Calida, & comminuentia eo moderamine

concedenda, ut materie morbificæ coctio debite provehatur, & febris non excandescat, & iuribunda evadens gravioribus symptomatibus superetur. Non videmus, qua ratione Medicus hallucinabitur, aut errore abducetur, si hanc regulam perspectam habeat, & sedulo animadvertat. Inus ergo pectoribus infideat hic canonum Coryphæus, nequando ex animo elabatur.

2. Propterea si Febrem nimis incitatem deprehendas à calefacientibus abstineas, & ad frigida, paregorica, & aliæ id genus contagias, donec febris permisceatur.

3. Febris nimium proritata à calore intensiori, remissione obscuriori, pulsu majori & citiori, vigiliis magis importunis, somno inrequieto, deliriis, siti ingruelcenti, aliisque symptomatibus ab æstu enatis dignoscitur.

4. Tanquam debiti caloris exemplar, & normam Tertianæ Vernalis moderatioris auspiciorem æstum proponimus. Proinde.

5. In hujusmodi Tertianis nihil prorsus tentandum, sed naturæ [hoc est, sanguinis calori] totum permittatur opus; ni febris errore aliquo exacerbatur; aut dimissis, quam par est, subsidens coctionis muneri succumbat; aut paroxysmos sistere statuas, priusquam materie coctionem aggrediaris.

6. In calefacientibus adhibendis accurata tempestatis, constitutionis, materie quantitatibus ratio habenda. Quapropter.

7. In Autumno, aut Hyeme, tempestate, aut constitutione humido-frigida, & ubi materia gravis sit & torpida (uti in Quartanis, &c.) minus addubites aut extimescas febricitantibus liquores generosiores indulgere, aliæque calefacientia concedere.

8. Æstate verò, aut tempestate calido-sicca; vegeta, juvenili, aut florida ætate, constitutione sulphureo-spirituosa, & ubi materia tenuior est, & levior [uti in Tertiana Vernali exquisita, &c.] nō prorsus quidem, (aut saltem multo parcius, omnibusque circumstantiis attentius libratis) concedenda sunt.

9. Cathartica & emetica in hac, quam in priori curandi methodo magis ex usu sunt, quoniam nullus subest paroxysmos revocandi metus; cum non, nisi curatione absoluta, sistantur.

10. Cathartica & emetica commoda sunt, ubi magna cruditatum congeries ventriculum gravat, & digestionem, & curationem plurimum obest; uti in Quotidianis simplicibus, duplicibus, & triplicibus; Tertianis duplicibus, Quartanis triplicibus, &c. Et in omni febre ad cruditates prius coctas evacuandum.

Notandum, Quod vomitoria (quamvis à nonnullis tanquam febrifuga insigni laude celebrantur) febres intermittentes nulla alia de causa eradicare videntur, quam quod, quassatis omnibus vasibus, & humoribus, materia morbifica tenuior, aut multum subacta, & cocta è sanguine per musculos ventriculi poros, quovis vomendi nisu (haud secus ac saliva musculorum ad os spectantium agitatione, & contractione) exantlatur, citius (quam aliis fieri potuit) elutriatur, & ejicitur. Unde emetica in Quartanis (quarum materia crassa est) nequaquam (nisi forsitan sub eundem

dem discessu, cruditatibus plurimum jam coctis) proficua sunt; & in Tertianis Vermalibus, (quarum materia tenuior est) ab emeticis ubiores fructus sæpiusculè percipimus; quin etiam rationi minimè consentaneum est, ut medicamentum evacuativum, quod vix unquam ventriculum præterit, aut pylorum superat, duabus aut tribus horis materiam morbosicam per totum corpus sparsam perquirat, ac tantopere (uti nonnulli imaginantur) attenuet, & alteret; ut illico excernatur. Ex præmissis satis liquet, quâ ratione emetica Febres intermittentes nonnunquam (rarò licet) funditus extinguunt; & quibus Febricitantibus tempestivè, quibus intempestivè propinantur.

11. Studiosè animadvertat Medicus, ut neque vomitoriis, neque catharticis nec quovis alio pacto, venæ-sectione puta, &c. ægrorum vires labefactet & spiritus exhauriat; omne enim virium & spirituum dispendium cruditatum coctioni officit, & morbum protrahit.

12. Ubi magna subest, cruditatum moles coctio præpropæra, & nimis præceps suspiciosa est, cruditates enim majori copia coctæ, quàm ut promptè eliminari possint, subinde funestas patiuntur metastases; quare in Quotidianis, &c. coctio, præmissis minorativis, sensum promoveatur, & prout materię morbosicę pars aliqua coqui deprehenditur, diaphoresi, diuresi, sedibus, & (si res postulet) vomitoriis amandetur.

13. Cruditatum coctio salium lixivialium, amarorum, &c. ope, quia ocysimè (quamvis iuchoatè) easdem comminuunt, accelerantur.

14. Eandem etiam expediuntur vina austeriuscula, quoniam particulis salinis, & sulphureis comminuunt.

15. Materię morbosicę reliquię (quasi tot Febris demolitæ rudera) à morbi discessu diaphoresi, diuresi, & leniori catharsi asportentur.

De diabeseus Febrilis emendatione.

Diathesis Febrilis in melius provehitur, si causas eandem foventes amoliaris; & ad emendantes te recipias. Has Part. 3. cap. 1. illas Part. 8. cap. 1. palam fecimus.

De damnis à Febre intermittente illatis resarciendis.

A Febre intermittente, quamvis probè curata, carnis, virium, sulphuris & spirituum jactura evenit. Quæ omnia (subductis prius, & expurgatis morbi sæcibus) resarciuntur. (1.) Digestionem validam & sanam reddendo, & appetitum acuendo: Appetitus dejectus, digestioque dubia, & elanguescens vinis, & cerevisiis absynthiatis, centauriatis, aliisque amaris non ita pridem memoratis pristinæ sanitati, & vigori restituntur. (2.) Si convalescentes eupeptis & euchymis (cap. de Præservatione recensitis) vescantur, & subinde (spirituum & sulphuris resarciendi, & restaurandi causa) vini generosioris haustulum absorbent.

A Febris verò malè judicatis oriuntur

præterea cacochymia, leucophlegmatia, aliaque affectiones cruditatibus scateutes (Part. 1. cap. 1. tradita) quæ, (cùm materia morbosica planè eadem sit) haud secus ac clauturni & pessimi moris Febres intermittentes, cruditates comminuendo, coquendo, & eliminando, sulphurque & spiritus suppeditando, digestio-nem & appetitum erigendo, &c. profligantur; quare medicamenta probatissima his morbis debita, utpote salia, lixivialia, amara, cathartica, &c. ex præmissis petenda. *Joh. Jones Tract. de Febr. Intermit.*

Februm Intermitentium Cura.

Adumbratâ symptomatum & typorum ratione proximum est ut Curandi methodum proponam, administrationibusque singulis ætiologiam, juxta allatam hypothesin, pro modulo meo affigam. Quippe cùm pluribus præfidiis ad eundem scopum assequendum utantur auctores, incumbit ut ubi constiterit eventum votis respondisse, illarum singularum ratio, quæ licet, assignetur.

Inprimis autem attingendum est (id quod omnes Medici norunt) non prorsus unâ eademque methodo (licet forsitan non admodum diversa) singulas tractandas. Cum enim præ constitutionum, quæ annorum, quæ singulorum hominum, varietate liquorum, imò & solidarum partium crasis, non uno semper modo se habeant, palam est variari debere intentiones, atque unâ administrationes quæ has complent: cuius sane causa nulla omnino methodus, in quacunque februm istarum specie, præscribi potest, quæ singulis individuis eâ laborantibus aptari valet. Adde quod multæ circumstantiæ subvenire possint ad istam qualemcunque variandam, utpote ætas, sexus, aliorum morborum complicatio, tempus morbi quo advocatur Medicus, plurimæque alia: Idcirco juxta prudentis Medici judicium ad particulares casus accommodandæ sunt administrationes.

Quandoquidem igitur tres anni constitutiones habeantur, prout supra notavi in quibus tot pullulare solent februm intermittendum species, quæ genio ab invicem sat longè distant singulis ea propter sua medendi methodus aptanda venit. At quoniam quædam dantur, quæ omnes fere indiscriminatim percurrunt administrationes, par est ut generalibus designatis medendi indicationibus, has primum in genere proponamus, una cum agendi rationibus, quas deinceps ad singulas species, juxta indicationes debitas, accommodare facilius erit.

In genere igitur (donec talia, si quæ sint, medicamenta, quæ secretioris Chymia cultores venditant, atque unico ictu munitos indiscriminatim morbos debellare asserunt, quæ proinde nullis præviis ratiocinationibus aut indicationibus ad sui exhibitionem indigent. publice innotescant) indicationibus hisce insistendum videtur; viz. Primò materię morbosicę organici contemperatiōi; Secundò, spirituum in ordinem reductioni; Tertio, Toni partium affectarum, præcipuè cerebri, corroboratiōi. Quibus omnibus quamvis eadem forsitan quandoque sufficiant administrationes, speciatim tamen.

Primæ adimplendæ convenire videntur, tum evacuationes, fomitem subtrahendo, eaque qua generales, quâ particulares utpote inter illas, per Phlebotomiam, vomitionem, cathartism, diaphoresin, diuresin; per vesicatoria autem; sputum moventia, & si quæ sint aliæ, inter has; tum digestiva & attemperantia, ut & forsam Topica. Secundæ quamvis & evacuantia ex accidenti conducant, causas nempe inordinatæ spirituum agitationis removendo, immediatius tamen tum digestiva & attemperantia, tum quandoque Opiata conferant, ut proinde maximâ ex parte coincidunt duæ istæ indicationes. Tertiæ specifica dicta potissimum deberi censeo.

Ideo primo loco (ut dictas percurram administrationes) attendendum, quod vix ulla Februm intermittentium species occurrat, in qua, saltem sub primam invasionem, sanguinem, modo sat tempestive advocetur Medicus, mittere non conveniat. Nisi forsitan in ægrotis valde debilibus, vel quibus prævere hamorrhægiæ cujuscunque generis copiosæ, aliive morbi qui vires multum exhaurerunt; vel etiam ejusmodi idiosyncrasia laborantibus (quos aliquando convenire datur) ut prosternantur itatum à levicula quavis sanguinis eruptione vires: Quæ tamen postrema contraindicatio, quandoquidem perraro occurrit, nec nisi experiendo dignoscitur, à culpâ Medicum, qui obviis indicationibus judicium suum regere tenetur, absolvi videretur.

Hanc alius administrationibus præmittendam censeo, quo & pacatius effervescat sanguis, & minori impetu in cerebrum arietet: quo fieri expectandum est ut & deliria, phrenitides, capitis dolores &c. præcaveantur, vel, si adsint, magna ex parte tollantur; & minori copia heterogenea materia Paroxysmum in posterum inducatur in systema nervosum deponatur: Quippe sanguine aliquatenus diminuto contractius aliquanto redditur cerebrum, unde minus hiare necesse habent admittura radicum oscula. Et quidem in ipso Paroxysmi caloris ardore potius administrandam, quam in intermissione, suaderem; quoniam (ut tacerem me frequenti experientia hanc praxin suffultam habere) turgescenti tunc temporis maximè sanguini alteratio hinc efficacius imprimitur, quàm sedato induceretur; quin partim exhausto, partim alio sum derivato sanguine, subsidit, ut modo dixi, cerebrum, seque contrahit, efficaciusque dum sic a turgescente lacessitur sanguine ex intimis suis recessibus congeri aptum extrudit cruorem; unde magna ex parte præcaveatur quo minus in posterum materia in ultiores paroxysmos seceretur: Porro cum præ Febrili calore fortius isto quam alio tempore invigoretur, atque arctius subducto sanguine, se compingat, citius proinde ad tonum debitum redit: cum, ex adverso, si in intermissione sanguinem mittamus, nisi vel multum quantitate luxuriaverit, vel plurimum tunc conturbatus fuerit: quod non omnibus, imò nec plurimis contingit, saltem proportionaliter ad conturbationem quæ in paroxysmo habetur) parum omnino alterationis à tali expectandum esse praxi censeo; utpote quoniam congestionem, quam toties memoravi, in cerebro ne-

quaquam impedire potest; eo quod circulatio sanguinis eodem fere tenore procedat, quandoquidem perraro tantum detrahimus quantum huic eatenus minuendæ sufficiat, ut cerebri contringatur tonus ad ingremum iudicem crassiorem materiam arcendam. Quin insuper sanguinis missio vomitioni (postmodum, si cætera consentiant, adnuntianda) præmissa, & periculum ruptionis vel apertionis vasorum sanguiferorum præcaveat, & libertiorem, sanguine sic quadantenus sedato atque hinc reliquis succis, secessionem particularum depravatarum, tum ex ejus alveo, tum nervis, glandularum ministerio, in ventriculum deponendum permittit. Hæc quo minus in sequentium Paroxysmorum uno vel altero forsan repetatur non video quid veret, modo vel immanis turgescencia vel capitis affectus periclitent vel redeant; cum sic identidem cerebro sese constit. ingendo, detracto per vices sonate (quod turgescencia tempore commodissime præstandum mihi videtur) otium concedatur.

Post Phlebotomiam vomitoria, ut plurimum in usum ducenda sunt, Horum ulus tanti periculum est momenti, ut sæpenumero observari poterit, debite exhibita febres intermittentes cujuscunque generis in totum, abique his sublequentibus administratis, & sine recidiva, sustulisse; saltem in utrum ad curationem conferre in universali consensu constat; præcipue in taburra oneretur ventriculus, nulla vero profluentia agunt; utpote pectoris angustia, cranique l. thifica, vomendi magna difficultas, tenera nimis corporis, præsertim vero ventriculi nervorumque constitutio &c. atque modum opitulundi hunc mihi propono; nempe præterquam quod saburram in ventriculo delitescentem, inque mineram morbi hanc secus cellulam, elinquent, viscerumque obliuione, præsertim hepatis, expediant, atque sic & sanguinem & nervorum succum novis ad illa copiose satis delatos ab impuritatibus liberent, maxime opus esse iudicio ad tonum nervorum ipsiusque cerebri, roborandum: Quippe cum hunc quadantenus laxari supponam, videtur mihi quod, ab irritationibus convulsivis in ventriculo inceptis, contractivus ad nervorum usque originem, ipsiusque radículas in corrice fundatas, propagatur motus, qui non solum quod in eorum conceptaculis continetur ex primò, sed & laxitatem corrigit, tonumque restituit, utpote quoniam tensione semel illis hac arte reddita, eandem, & conon. az animalis lege illis debitam, retinere apte dispositæ videntur.

Porro cathartica quandoque (sed non semper) febres intermittentes fugare, authorum testimonio liquet, saltem aliquando indicari leges artis docent, idque & sub earum initia & in progressu; Et quidem eò efficacius, si paucis ante Paroxysmum horis exhibita fuerint. Quorum ratio, ubi speratus procedit effectus, hinc forsan peti potest; quod nempe quando (in priori casu) laxiora in sanguinis massa (sive à retentis effluviis, sive, à quavis heterogenea materia per chyli vias admittæ proveniant) recrementa fluitent, unde in cerebrum deposita Paroxysmum forsan unum vel alterum induxerint, eveniant, quod, quamdiu vel sanguinis crassi, vel cerebri nervorumque tonus non multum vitiatur, ista medicamenti purgantis vi in propria

pria vasa secretoria (directione quamvis quotidie observabili, quoad intimum tamen agendi modum impendio abstrusa) secedere cogantur, unde nil vetat quin brevi ledetur affectus, glandulis cerebralibus nondum magnopere laxatis. Ubi porro in progressu morbi quandoque propinatum fuerit huiusmodi medicamentum, dum materia Paroxysmum jam inducitur, jam maturata in procinctu ad eruptionem stat, superinductæ fermentativæ particulæ tum huic, fermentativam pariter indolem jam nactæ, admixtæ magis eam exagitant, inque novas & insolitas commotiones, crasin ejus admixtione turbando, concitant, unde inter binas hæc substantias orgasmus promptè (lenior licet, lætamen ad effectum fortis) instituitur, quo ex conceptaculis suis se expediant; tum cerebri nervorumque laxatorum, ut dixi, fibras præter solitum vellicando, arcuiss se constringere faciunt, unde non solum vegetius exterminant inclusum hospitem, sed & ulteriorem novæ materiæ admissionem, ad proprium tonum (nisi supra modum labefactatæ) constrictione isthac quadantenus restituta, præcavent. Verum non semper hunc effectum eorum exhibitionem sequi, imò quandoque contumaciores reddi hæc sic tractatas febres, non dubito quin cunctorum fere medicorum experientia, non minus quam mea constet; nec absque ratione. Quippe si vel multum perverti sanguinis crasin contigerit (sive hoc in nimia partium eum intime constituentium laxitate, sive eandem strictiori æquo textura, sive heterogeneitate consistat) vel multum labefactetur tonus cerebri, corticalis præsertim ejus partis, vel die intermissionis longe ab initio secuturi Paroxysmi, quando omnia sedata fuerint, nullaque ad organum propensio adest, exhibeantur purgantia, tantum abesse videtur, ut juvent ut potius multum nocere debeant, idque vel sanguinis particulas confundendo, vel tonum cerebri, quod in debitas contractiones non statim adigere valent, oborta conturbatione debilitando. Si ergo inducentur, censuerim vel lenientia solummodo; quæ nec sanguinem nimium exagitant, nec systema nervosum supra modum lancinant, exhibenda esse, vel (modo contumacior sit febris, nervoso scilicet genere gravius affecto) talia quæ in nervos admitti habilia, per eorum tractus sæpè perniciose serpente nata sunt, atque una heterogeneam, quam inibi offendunt, materiam in itinere resolvere, & abstergere, pleni interea tantum quasi titillatione ipsos ad familiares contractiones sollicitare apta, qualia me iudice Calomelan, aliaque forsitan mixta mercurialia, audire merentur; in quorum nunquam refertur forsitan potest celebratum illud olim Riverii febrisfugum. Sin vero eveniat, ut ab exhibitio Drastico aliquo cathartico dispareant affectus, hoc isti causa adscribere liceat; quod scilicet talis medicamenti particulæ, aculeatæ cum sint, ferociter adeo in cerebrum inter circulandum, idque derepente, impingentes, partim insolitam imprimant vellicationem, partim humidiorum, quæ sæcet, confertim exhauriant materiam, unde aliqualem corrugationem subire necesse habet; quo fit ut proxime secus secuturus Paroxysmus præcaveatur, aditu minus morbosæ

ingredi solitæ hinc denegato: cumque non ita tunc redimpleantur (prout supra evincere conatus sum) sic exhausta conceptacula, hinc in solidum redire desinunt Paroxysmi, cerebro ad nativam tensionem, ubi semel ita fortis (quod in hoc casu evenire ex ante dictis concipiatur) accesserit instinctus, sponte redeunte. Utcumque sit, quamvis forsitan aliquando Drastica hæc talibus quibus robustior cerebri adest tonus, conveniant, vix dubito tamen quin tenera corpora constitutione donatis exhibita periculossima deprehendantur.

Diaphoretica ante Paroxysmum exhibita quandoque febres intermittentes sustulisse notum est. Cujus rationem hanc forsitan comminisci licebit; Quod nempe partim laxatis stragulorum (tunc temporis admoventorum) tota glandularum incute poris, quo copius apud ostia stantibus detur exitus, imò toto librarum habitu ubique hinc intenerato; partim impulsu particularum medicamenti cito sanguinem trajicientis, adque cerebri ad ejus poros congruitatem obtinere concipiatur; utpote vel ex salibus volatilibus, constantis, prout in spiritu salis armoniaci aut similibus cernere est; vel ex activis cujuscunque generis particulis fermentatione, ut in Theriaca &c. aliove modo multum exaltatis & comminutis confatis) pertingentis, morbosæ materiæ, nondum plene ad requisitum acrimoniæ pro Paroxysmo concitando gradum evecta, per tractus librarum prona labatur, quo fieri potest ut nulla hinc molestia conceptaculis impressa, sicut mox secus erupturus præcaveatur Paroxysmus, sic otium datur tum cerebro, tum librarum universo systemati, sese usque adeo contrahendi, ut imposterum admittendæ materiæ heterogeneæ minus apta evadant. Adde quod admixtæ medicamenti summè exaltatæ particulæ texturam forsitan mineræ morbificæ ad acorem vergentis tantopere mutant, ut hinc etiam prohibeant, ne librarum continentium tunicas lancinent. Verum non sen per hanc methodum votis respondere, quin quandoque contumaciorem hinc evadere morbum, vel in alium transire, deprehendatur. Quippe si tonus cerebri ante fuerit multum laxatus, vix hinc contrahetur adeo; uti hæc forsitan diffusa, nova postmodum (assignato modo) succedat; saltem valde elumbes evadant ægrotantes, scorbutusque, aliive à depressis, depravatisque spiritibus tono partium nimium laxato, profluentes hujus vice in scenam prodeant affectus.

Diurctica quod spectat: Hæc securius, imò & efficacius, febribus hisce edomandis adhibentur, ut pote quæ tam digestivorum quam evacuantium munere funguntur. Atque inter hæc, Acidinsecula, vel saltem ex acidis & alcalinis combinatis confata, ita aximè efficacia deprehendantur; Quæ quidem officium hoc præstare forsitan concipiantur, partim sanguinis, sulphurei liquoris, turgescencias reprimendo, adeoque ad æquabiliorem crasin redigendo, partim secum materiam morbificæ particulis associando, & sic majores grumos diversæque figuræ concinnando, unde tum ex liquoris poris elabendi propriam induriam induant, tum congruitatem ad secretorum vasorum porulos nanciscantur, partim denique lancinatione partes solidas ad molles adigendos contractiones.

Verum, præter istum, quem præstant evacuan-

tiā, magnum imò forsan maximum, effectum alterantibus, in febribus intermittentibus debellandis, elegerunt Medici, ut raro illis tota lingua curatio, quin ista in subidium advocari soleant.

Ex his quædam digestiva (mihi) dicenda videntur, quædam ulitato vocabulo specifica audiunt, utpote quæ (debite saltem adhibita) ad Paroxysmos sitendos, at modo non vulgo obvio, imò forsan vix, uti creditur, explicabili, colunt.

Accuratam horum distinctionem prætexere velle pro temerario sugilletur aurū; quandoquidem abstruxit adeo sunt operationis medicamentorum, vel maxime familiarium, rationes, ut nemo sanus sibi arrogaverit dogmatice hac in re pronuntiare; unde quoque; tā discordes ubivis inter autores circa singulas tere observentur sententiæ, si tamen meam in re obscura dubitandum proferre, aliorum exemplo, liceat, censuerim.

Digestiva applicari posse quæ (sive naturæ sunt producta, sive artis effecta) partim sanguinis aliorumve in corpore liquorum particulas placide comminuendo & transponendo, partim taliter hunc aptando, ut per urinæ vias leniter secedant, partim solidas partes mollioriter, imò imperceptibiliter, quo debitam contractionem labant, velicando, atque tum liquorum crassi depravatam, tum partium tonum amissum corrigendo, vim suam exerunt. Hinc fieri quidem potest, ut Paroxysmos quandoque; sistant, verum non sub hac consideratione quod digestiva, sed quoniam necesse est ut, illis ad debitum redactis ita, ut febres intermittentes (non secus ac reliqui omnes morbi) sponte evanescant & quamvis vel specifica sat longa in corpore mora, hoc ipsum tandem satagent utpote energia ad hunc scopum forsan columante, segnius licet, se prodeunte, donata; ut plurimum tamen proprie talia obicem Paroxysmis ante ponunt quam vere restituatur corporis œconomia; id quod hinc liquet quod non raro ab istis sedati post intervallum non admodum longum redeant.

Digestiva hæc salina, pleraque saltem, profapia, quin simplicioris esse texturæ (quæ scilicet minus nata sunt eorum particula) deprehendantur, atque angulis, usque rigidiusculis, prædita, quorum ratione non statim ab occurrentibus, cujuscunque tere generis, absque aliqua lucta, subigi & dissolvi possunt. Proinde ubi, intra corpus suscepta, à spiritibus fermentive, quibus occurrunt, actuata fuerint, sese per liquorem in quibus ista scatent naturaliter explicare gestiant, atque sic præstatis operationes producant. Sub hunc censum cadunt, non solum quæ acida saturant atque inde incongrua secedere faciunt, quæ ratione Ch. tremulæ præcipitantia potissimum agere ceniet, sed & quæ qualvis sanguinis aliorumve liquorum irregularitates, sive sub turgescencia vel effervescentia complectendæ sint, sive in strictiori illorum crassi consistent, subigendo corrigunt; ad exclusionem vero particulas reductioni ineptas, idque potissimum, ut dixi, per urinæ vias disponunt. Quamvis hujusmodi medicamenta; pro variante substantiarum in sanguine quæ reductione indigent, varii generis esse possint, adeo ut alia acidis, alia sulphureis in eo abundantibus debeantur, alia in lixiviali ejus statu offerenda sint, ista tamen quæ vel moderatè

acida nitrosa sunt, vel ex acidis & alcalibus una maritatis, ut in tartaro vitriolato, confata, unde nova & blande incidens emergenti concreto accidit crasis, communissima esse indicationis cenleo; tum quoniam nitroso paulo, hoc est, inter acidum & salso volatile quodammodo ambigente, magna ex parte consistere & refarciri activas corporis nonnullas vias, atque a talium defectu vel irregularitate earum enormitates, quas patimur, maxima ex parte profluere, credendum mihi videtur; ut proinde talia supplenda sint medicamenta quæ illis facultatibus dotentur; tum quoniam ubi sulphureus nimium exaltari contigerit particulas, prout in statu febrili usu venit, eorum alterutro, debite administrata, his coercendis aptissima, communis Medicorum consensu, deprehenduntur. Quin porro, præ aculeis quibus stipantur, maxime ad tonum solidarum partium, prout supra indigitavi roborandum, (quod nisi fiat, ix debite comminui, & subigi possunt liquores) accommodata videntur. Et quidem ab hac, toni partium invigoratione deduci (ex parte saltem) potest solutio effectus, quem quandoque observavi; spiritus salis armoniaci, paulo ante Paroxysmum, quo sistatur, exhibiti. Quippe conjectari fas sit hunc, celeriter distributum, adque nervosi systematis tam radices, quam propaggines citissime pertingentem, tonum eorum levi lancinatione usque adeo corroborare, ut hinc texturæ contentorum mutatio, novo & insolito his in pressu motu, succedat; unde Paroxysmus mox citius, autus derepente sufflammetur.

Objeat forsan aliquis, nec degeneratio succi nervi versus aciditatem vel nitrositatem, productionem Quartanæ & Tertianæ (quæ duæ longè maxime febrium intermittentium numerum complent) adscribere, ut proinde digestiva, sive nitrosa, sive acida his curandis minime competere, concipiantur, verum potius augendis.

Cui repono, quod quamvis (ut hoc obiter dicam) horum usum in omnibus indiscriminatum febrium intermittentium casibus neutiquam suaderem, magnum tamen intercedere discrimen censeam inter aciditatem medicamentorum, & istam quam morbus producit, tam quoad genus, quam effectus. Illius materia summa, cujus ad hoc munus capax est, exaltationem subit; hujus tantum est in heri, utque evolvantur & exaltentur particulae ex quibus constat, altiore usque activitatis gradum acquirunt fomes; unde multum diversos à consummata effectus producere disponitur: Illa quædammodo similis est; Hæc multum diversi invicem generis sociatas habet particulas, quarum scilicet miscella atque actione ad hunc statum in foco suo assurgit, itaque; hoc adeptu erumpit: Illa à natura præstituta est; Hæc degenerans, & depravati liquoris, effectus. Illa confertim ingegritur, inque ventriculo, & primis viis actionem suam orditur; Hæc sensim inque remotis regionibus, nervosi systematis ramis, progignitur: Illa antecedenti morbi causæ edamanda debetur; Hæc ipsa pro continente habenda est. Proinde multum alterutrius diversificandos fore affectus palam est: Quippe cum ventriculum, ut jam modo innui, primam actionis suæ scenam obtrineat medicamentum, sicut in illum, multum à fomitis morbofo foco distans,

tum ejusque contenta, primum vim suam exercere necesse habet; sic magna ex parte exantlari verisimiliter concipitur, antequam tam longinquum iter emetiri possit, ut morbidam mineram, etiam si ejusdem omnino prolapsa foret, integram attingere, eamque augere queat. Idcirco conjectari subit, quod ventriculi cono, si vitiatum esse contigerit, restituendo, n. edicamenta hujus generis aliquatenus conferant, cum sint attractoria, quò sic aptior vitæ munus paretur materia, quàm in sanguinem admittit turgecentias reprimendo debitam ejus fermentationem promoveant; tandem vero ad nervorum origines inter circulandum, portione aliqua, quantumvis perexigua, delata, eos pauulum, ut dixi laesendo (nec enim hactenus a vasis suis, licet aliquatenus retuli evadant, orbiati conjicio) in lenes adigant contractiones; quo incongruam arceant materiam secus subingressuram. Cum è contra morbida minera jamjam deposita, inque ultima hac regione in acidam, ulterius indidem in vasculis suis serpendo, maturat, et nunc absit, ut juxta normam medicamenti agat, ut potius conceptacula sua, à quorum bene constituto tono omne corporis robur functionumque integritas pendet, delasset, spiritusque una conclusos deprimat: atque hoc tantum benefici invenere concipitur, quod, ubi ad debitam aciem perducta fuerit, nervosas partes quibus includitur ad sui, hospitis scilicet ingrati, extrusionem proritet, quo facto morbus [ad tempus saltem quoddam] cessat.

Digestiva hæc non uno tantum morbi tempore, initio scilicet usurpanda censeo, sed toto tere decursu, quoniam & longam mineram morbitica subactionem requirit, & nova usque pullulat ab omnibus alimentis leges, quæ ab illius contagio insimilem, ad longum quaque tempus, recessit, ideoque ab his medicamentis pertinaciter exhibitis corrigi potulat.

Specificæ, quæ vocant, Antipyretæ quod spectat; hæc complexæ naturæ mihi videntur, atque nec salium, nec aliorum, uti chymicis appellate placet, Principiorum tutum conceditur, tortas illis ex his consilari) ratione emergenti suam, in febribus intermittentibus demandis exercere, sed crasis & textura: adeo ut in liquorum nonnorum gremium admittit, licet multum comminui necesse habeant, non tamen in ista principia dissolvi, verum texturem suam satiam rectam per totam agendi sphaeram servare conjiciam. Texture hujus ratione cum ex vegetabilibus ut plurimum, content, non admodum duræ & lancinantes, licet figuræ irregularis, sortiri possunt particulas, sed tamen solidiusculas; unde non statim subigi in totum valent a mollioribus, quibus admiscendæ veniunt, liquorum particulis, sed partim hos peragrandò a coctionibus indebitis arceant, partim interpolatione sua, eas, si nimis magno numero admittere contigerit, quaquavertim explicatæ dissolvant, utpote mole & qualiquali soliditate majorem ad agendum, quam illæ ad resistendum vim natæ; partim porro (imo præcipue,) ad cerebrum, inter circulandum delatæ in illud agant, modo inferius ex iis quæ de cortice Peruviano verba faciens tradam, intelligendo. Horum sat magnum numerum habuerunt majores; atque alia uno, alia alio seculo & jamjam & neglectum

subiere: Et revera pauca, omnino ante præiens seculum, seu inventa sive reperta iuere, quæ votis efficaciter in multis ægrotantibus responderunt; nolo vero, ubi innotuit Cortex Peruvianus vix est ut de altiori solliciti sumus, quandoquidem hic, modo debita cautione exhibitus fuerit, raro Medici expectationem fallit, ut promde propius considerari mereatur, quod integro capitulo mox fiet.

De opiatorum viribus si quærat; quæ ratione nempe febribus huic titendis conferunt; augurari licet quod, quandoquidem hæc, tunciorum animalium exertionem cohibendo, in cerebrum indubitate agant, quædam eorum p. r. t. in nantes vasculorum secretoriorum (quas ene nervorum arboris radices supposui) meatus inter circulandum deponit, partim eos aliquatenus obstruant, partim succum alibi in sanguine adhuc comorantem quadantenus increment, deoque ineptum ad tantillos poros (quantum ut dixi ampliatos) statim subingrediendos recludunt; quibus porro cum succus ille ex sanguine hic ubique secretus accumbit, ipsis quoque subtilissimis sui stantiis, quæ spirituum nomine innotescunt, magna ex p. r. te ingressum denegat: quo ne ut una cum supplem. eorum nervorum prohibitò commicatu, vel ipsa materia quæ nervorum systema ad motum & sensum præstandum acquare solet ab introitu arceatur, obrepitque hinc somnus: In quo quidem (ut hoc obiter notem) cor solito more puls. t, function. s. que viscerum parum solui modo minuantur, interea ut reliquarum partium satis languide perniciantur; quod forsitan hunc causæ imputare datur, quod quandoquidem has partes ad vitam apprime necessarias summo artifice construere placuit, quæ propterea perpetim moveri necesse habent, hanc nervis ad eas tendentibus atque vectigalia deferentibus, præsertim Pari v. go, sive amplitudinem sive conformationem donare voverit, quæ sat liber ad hæc munia idoneæ substantiæ transcurfus concedatur, dum reliquis aliter constitutis denegatur: & quidem hujus Paris tubulos cæteris patentiores esse à multifaria Hypochondriacorum affectuum & symptomatum, quæ homines numerosius multo, ni fallor, quam reliqui morbi incessunt; turba colligere est; Cujus ratio, vix forsitan aliunde sat mechanice, quàm ab hac nervorum istorum ampliatæ cavitate, deduci potest; quippe cujus medio & incongruas substantias facilius admittant, & spatium in debitis harum, noxiisque exaltationibus præbent. Postquam vero illæ opiatorum particule inducias nervis, quæ se contrahere incipiant, sic paululum dederint, quidni fieri potest ut solito repletionis motus brevi ad debitam mensuram redeant, atque sic impolterum desinant Paroxysmi. Revera opiatorum tot tamque stupendi, ubi debita cautione adhibita fuerint, ubi vis observantur effectus, maxime vero quoad organum humorum qua sedandum qua præcavendum, ut sicut multis nominibus prius, scire, in medicamentorum classe forsitan mereantur, sic quandoquidem constat succos, quibus perluitur corpus, in debitas subire fermentationes, dum in febriles Paroxysmos maturantur, hæc insuper sub ratione ea in febris fugorum censum, dum has compefcunt, transferre haud dubitavero.

Porro non exiguum Pericarpis efficaciam in febribus intermittentibus curandis quidam adscribunt, atq; practici ferè omnes horum formulas libris suis inserunt. Et quidem si Helmontii & Kergeri autoritate standum foret, vix aliis febrilugis opus eilet, modo eorum quæ illi adhibuerunt compotes fieremus. Mihi sane nunquam, quantum memini, tam felici esse contigit, ut notabilem ab ullorum applicatione effectum cernerem; licet quædam satis decantata aliquoties admoverim. Et quamvis suspicari forsitan subeat effectum internis una adhibitis remediis debitum externis hisce ascribi (quippe putaverim paucos vel Medicos vel agytas febres intermittentes tractantes hisce solis, absque internorum exhibitione, niti) si tamen revera talis iis competat vis, huiusmodi solutionem aptare forsitan non incongruum erit. Nimirum cum eorum materia vel ex atrictorius vel salibus volatilibus, vel resolutivis constet (prout ex formulis quas afferunt authores colligendum esse censeo) conjectari liceat alterutrum ex duobus prioribus genus (licet forsitan aliquantulum dicendo agendi modo) tendines quibus applicantur in contractiones quales quales adigere, utpote prompte poros cutis in vitali corpore permeantia, & calore atque madore partis actuatæ: Quæ quidem contractio quo minus ad cerebrum ipsum brevi propageetur non video; cum ubivis plus vel minus tenias esse omnium partium ad sensationem motumque (saltem ad motus promptitudinem) fibras nemo Medicorum negaverit, illas vero tendinum præ reliquis hac diathesi pollere, quin & valde sentiles esse. Quo dato, ubi hic loci qualem dixi facta fuerit impressio, analoga ad usque fibrillas cerebrum comitantes propagari necesse habet, eaque sat fortis ob multitudinem & consensum fibrarum quæ primitus afficiuntur. Unde laxatus quodammodo huius corrigitur tonus, atque tum quod incongrui in universarum tractibus congestum erat leniter extruditur, tum obex secus ingressuro ponitur. Tonus autem naturalis hinc semel restitutus non facile, uti supra notavi, nisi à causa violenta, statim iterum deficit. Quod autem ad modum quo resolutiva se exerunt, attinet; istorum particularum nonnullæ præ calore partis, halituum erupturientium medio, dissolutæ, inque venularum cuticularium oscula asportatæ (utpote extrinsecus præ involucris ab avolatione coercitæ) sanguinis texturam intus delatæ aliquatenus alterent; imò forsitan & sat efficaciter, quandoquidem à nullis vel ventriculi, vel intestinorum, vel aliarum quas devorata peragrarè tenentur, partium fermentis refractæ in sanguinem illibatæ ferantur, ipsæ vero sanguini pro adoptivo ad hunc usum fermento inserviant. Dum verò cum hoc circulantur, quidni ad cerebrum pars delatæ, tum ejus tono roborando conducant tum in illius tubulos admissæ eorum contenta pari modo ac de sanguine dictum est, afficiant.

Horum non secus ac cæterorum medicamentorum, formulas quamvis mihi non propositum sit cumulare; unum tamen, quod novitatis quadam gratia forsitan arridebit, attere non pigebit ex relatu eruditissimi Medici D. Wellsted; qui mihi edixit se primo successu expertum esse cataplasmata ex Cortice Peruviano

subtilissime pulverisato cum sapone nigro in debitam consistentiam redacto, carpis admotæ.

Administrationibus Medicis in genere sic illustratis, par est ut eas ad medendi usum accommodemus, & quædam in singulis febrium intermittentium species us, quove ordine usurpandas censeamus exponamus; sed breviter. Quippe si ea sit, quam attruxi, inter singularum causas affinitatis, indicationes generales plurimum coincidere debere par est coniectari. Nec formulas, ut modo dixi, attere necesse videtur, cum apud omnes practicos abundè prostant; imò unci Corticis Peruviani debita (præmissis universalibus) nec præmatura, exhibitione nullam non, ferme earum speciem tandem proteriti notum sit. Ut promæ longis hic circa singulas deductionibus opus non videatur.

Ideirco in quotidianis (ut ab his ordinibus universim ferè (sub conditionibus allatis) sanguinem mittendum censeo; quous minus magis heterogenea materia retentam esse ejus nullam coniecto, unde majori cura de effervescentia præcavenda prospiciendum. Lein ad vomitoria, ut plurimum, accedendum maxime si nausea, vel vomitatio, vel ventriculi oppressio intellet. Atque si facile vomat ægorans, sale vitrioli, vel oxymelite scyllitico, imò forsitan scio lactis carniliato carduo benedictio alterato sufficiat vomitionem concitare; secus, infusum croci metallicorum, vel antimoniæ quoddam aliud, in usum trahatur. Vomitione peracta digestiva exhibere conveniat, quò sic & reprimatur sanguinis organus, & pars morbificæ materiæ ab hisce maturatæ per urinæ vias amanderetur: Hæc ex creniore tartari, sale mirabili Glauberi, sale absinthii, corallio, aliisve aliquibus alcalinis (vel eorum exhibitionis, vel acido alicui maritatis, prout indicatio seu acidorum, seu salium horum, seu particularum sulphurearum in corpore luxuriantium, edomandorum tulerit) concinnari possunt, atque vel unâ cum decocto aliquo aperiente addito quandoque vino albo, vel cum jusculis avenaceis exhiberi, idque bis terve de die; persistendo donec coctio in urinis, si obtineri possit, appareat. Sin præ inquietudinibus, aliisve gravibus symptomatibus, magnam, & laxius hærentem, intus stabulari saburram colligi possit, ex usu erit minorativum aliquod purgans, utpote decoctum amarum, sennæ, Gereonis, vel tale aliquod exhibere: imò, si usque perisset vel redeat ventriculi oppressio vomitorium repetere. At insuper quoniam nimis irrigari, atque hiuc obrui, periclitatur systema nervosum, quâ præ ipso materiæ morbificæ genio, quâ anni tempore quo maxime istæ ingruere solent, hinc tum veticatoria in usum ducenda veniunt, tum salibus volatilibus, utpote sp. C. C. salis Armoniacis &c. roborari convenit spiritus animales quo digestio & citius & efficacius inducatur. Verum si contigerit hæc per quinque vel sex paroxysmorum decursum incassum adhiberi, opportunum erit ad specifica, inter quæ præcellit, cortex peruvianus, confugere, quorum (huius præsertim) post evacuationes efficacia major deprehenditur.

quo

Tertianæ curationem quod spectat; hæc non multum disparem. quotidianæ medicandi rationem, non solum quoad magna, uti vocant, remedia, sanguinis scil. missionem, & vomitoria, sed & reliqua exigit; hoc tantum discrimine, quod quandoquidem vere, quando hæc maxime ingruere solent febres, tum sanguis magis spirituosus existit, saltem particulis magis exaltatis atque fermentativis, quàm hyeme posset, magisque proinde ad turgescencias, ubi data fuerit ausa, pronus est, majori, hac tempestate, industria reprimendus sit, ne noxias cerebro suppeditare persister substantias, tum nervosum genus hinc ferocius lacessitum, majorem circa contentorum suorum efferationes sedandas curam exigit. Idcirco majore, ceteris paribus, copia celebranda venit phlebotomia, si frequentius iteranda, si usque se viat morbus habito tamen respectu ad corporis habitum, ætatem, euphoriam aliasque circumstantias, porro cum bilis nunc temporis promptius & copiosius generari & ferocire inque ventriculum exundare soleat, unde magna, paroxysmorum initio, ad vomendum propensio plerumque invadit, hinc quoque de emeticis propinandis magis curandum, nisi labe aliqui, sive nativæ, sive adventitiæ (quales cuncti ferè notant practici) quæ eorum contraindiceret exhibitioni, addit; imò minorativis purgantibus, si magna scatent saburra, uti convenit. Digestivis intemper insistendum, usque vel nitrosis vel acidis, quandoquidem hæc tum sulphureis sanguinis exaltationibus, tum bilis, quæ multum lixivialis est profapiz, nimis productioni, & efferationi adyersantur. Ante vero paroxysmos aliquot, si redeant, commodè exhibeatur haustus Crollianus (ex aq. Cardui benedicti sale Absynthii, & ol. citrioli) vel tale aliquod precipitatorium, quod maturata & jam erumpere gestienti mineræ commixtum, partim quædam dissimilitudine energetica morificas alteret particulas: partim his in grana posita actionem hanc grandiores (mutata insuper hinc figurâ) invicem coarctantibus tantò efficacius eliminandis conterat; partim insuper vegetiori hinc irritatione glandulas cerebrales ad debitas contractions adigat, quò in posterum heterogeneæ admisioni minus pateant. Sin post sex vel septem paroxysmos sic tractatos usque persister morbus, opportunum erit ad Corticis peruviani usum, perinde ac in quotidiana, pervenire, cujus tamen sub initium vel irritus, vel periculosus, sentiatur usus, ob rationes infra sudendas; hoc autem tempore (maximè si præmissum fuerit vomitorium) raro spem fraudat.

Ad quartanas quod attinet; hæc minus exigere sanguinis missionem videntur eo quod magis effectus iste, hoc quo invadere solent anni tempore, deprehendatur, saltem non tantâ copiam, quantâ vere vel æstate (nisi aliter aliter suadeant circumstantiæ) licet, detrahendus venit; verum pro ratione sive orgasmi, sive affluxus ad aliquam peculiarem partem, determinanda quantitas. Vomitoriis autem non minus hac, quàm quavis alia tempestate locus est, imò aliquoties repetitis; quoniam labefactato magis hoc tempore cerebri tono, quin ab acescentibus magis contentis fermentativis usque læsionem reti-

nente excitatio fortior requiritur ad noxiam impressionem efficacius corrigendam. Porro digestiva alcalina, saliaque volatilia, magis hic exiunt ad acorem edomandum, usque diutius inquirandum, quin decoctis amaris, quæ & huic intentioni satisfaciant, & crassi sanguinis restituant, obstinatius insistendum; si vero his ad septem vel octo paroxysmos propinatis non cedat morbus, tandem ad certissimum illud specificum, corticem peruvianum (vel si quod aliud parit us instructum doctoribus sive inter vegetabilia tælix aut docta sagacitas, sive & chylicorum furni suppeditaverint) perfugere oportet, quod quidem præmature nec debitis præmissis evacuationibus, exhibitum, frequenter incassum, imò quandoque noxiè, propinari. multis ubique observationibus, si rem ad trutinam revocare velimus, constare, ni fallor, poterit.

Superest ut de famoso illo, & multiplici experientia comprobato, in his afflictiis remedio Cortice Peruviano, aliquanto lufus differamus. tum quia reliquis vim febrilugam nullo certius exerens altiore proinde considerationem meretur, tum quod, si monstretur operandi modum ad allatam hypothesin, quadrare, uti hemanæ pro tulcemento aliquo fortassis intersiat.

Ut de natali ejus loco, descriptionem & verba facere nattam.

In hac disquisitione, primò, ex notis ejus effectibus potissimos proferendos censuimus; cum & valde arduum sit in genere in abstrusis rerum naturas a priori penetrare, & speciatim, quandoquidem relativè hic medicamenti vires perpendendæ veniunt, non alio ritu ad earum rationem reddendam procedendum videtur, quam ut observatis effectibus in corpora quibus adhibetur, ad modum efficiendi progrediamur. Deinde qualis sit texturæ, quantum conjectando harrolari valeamus, inquiremus, postea scenam operationis investigare conabimur. Dehinc modum agendi ex prædictorum collatione pro virili indigabimus. Tandem videbimus an huic responsura sint observanda.

Quoad primum, ubi is notum est, imprimis, paroxysmum, si non proximum ab exhibitione, saltem sequentem si sit largis dosibus offeratur medicamentum, ut plurimum, præcaveri; modo non admodum prope à morbi initio, vel etiam corporibus valde cacochymicis propinetur: quippe non raro contingit ut, si dum cruda sunt omnia, hoc est, nulla particularum morbificarum ab invicem vel à purioribus disjunctio debita habetur (uti fit in morbi initio, vel etiam ubi magna humorum saburra intus lateat) exhibeatur, non solum pessundet effectus, sed & multum noceat, febre scil. vel auctâ in seq. paroxysmis, vel in longum excurrente, vel in continuam versa, vel cerebro nervosoque generi labem haud facile emendabilem affigente, unde languores, comatosi affectus, motus convulsivi, &c. emergunt.

Deinde observari potest nullam evacuationem notabilem seu per vomitum, seu sedem, seu urinam, seu sudorem, ordinarie ab isto cortice excitari solere, imò non raro, sedari, si affecti prius ad tales evacuationes propensi fuerint. Ordinarie, dixi, quoniam nonnunquam, licet rari evenit, ut tali aliqua ejus vi superveniente li-

bere-

beretur ægrotans. porro aliquando, imò sæpe frequenter observari potest paroxysmo, postquam per sex vel septem vices ab usu Corticis destiterint tandem redire, eundemque quem ante cursum, eadem pariter ferocia, repetere: & hoc non solum irregulariter se gerentibus (licet istis magis quamvis qui majori cura sanitati suæ litant) sed vel cautissimè viventibus contingit. maxime vero sub epidemica, ad febres intermittentes disponente, constitutione aeris hoc usu venit, vel etiam his evenit qui longo, antequam hujus remediï usu aggressi sunt, tempore in ultus illos passi sunt. Insuper, observatione frequenti constat, à catharticis (scilicet fortioribus utpote quæ in remotiores corporis recessus penetrant) præproperè administratis recrudescere istos affectus non minus ægrè nunc domabiles quàm ab initio fuerant. Adhuc (notaute primùm puto Cel. Sydenhamio) si lecto se, in usu Corticis multum addicat ægrotus, raro levamen speratum inde percipit unde non mirum si (quandoquidem delitiam tantopere colimus magna pars hominum) apud multos malè audiat: ut mos est plurimis, qui sua licet culpa instructuose haulta universim damnant remedia, porro majorem vim exerere deprehenditur cortex si unà cum austeris vel acidis exhibeatur, quo modo famosus ille non ita pridem, febrifugus Talburius propinatis peribetur, addito scilicet singulis dosibus succo limonium atque hinc forsitan obtinuit usus, inter nostrates Medicos frequens, decoctum amarum, superbibendum offerendis, cum pleraque amara stypticitate & austeritate polleant. Tandem (ne plura congeram) frequenti observatione habetur, multos hujus medicamenti usu à febribus hisce liberatos citius vigorem pristinum recuperare (quantum mini saltem observasse contingit) quàm qui aliorum plerorumque febrifugorum ope convalescerent.

Quoad secundum, texturam scilicet particularum Corticis, videtur hæc valde stricta esse; hoc est, particulas salis, sulphuris, spiritus (si quæ hujusmodi actu sint ex quibus concreta consistant) tam arctè cum terrestris implexas esse, ut ægrè extricabiles sint, seu mavis, usque adeo ramosas esse constituentes particulas atque invicem implicatas, ut nexum illorum solutio, non parum negotii facessat. Atque hoc colligere licet ex usu naturali maxime obvio quem plantæ, cuius est, præbet, quæ prope cui datus est (perinde ac cæteris plantis sui cortices) ut tegumini vice partes penitus reconditas, in quibus earum vita potissimum residet, ab aeris, pluviarum &c. injuriis muniri cui quidem usui parum aptus esset, nisi particule ex quibus componatur satis arctè, præ reliquis quas involuit, implicarentur, atque sic à prompta dissolutione prohiberentur. Quin insuper constat cum h. ud promptè in ullis liquoribus (nisi fortè talibus qui magna corrodingi vi præditi sunt, dissolvi, imò nec tincturam deponere aliam, quam quæ colligatur esse tantummodo decilio integralium particularum minutionum, quæ intra poros liquorum ad hanc rem adhibitorum contineri valent, id quod arguitur tum ex sapore, eodem cum integro pulvere degustato, tum quod talis tinctura efficaciz ejusdem cum illo generis esse deprehenditur, licet debiliior, nisi ea quantitate propinetur quæ pulveris in substantia exhibiti dosi respondeat. Si

objiciatur, amaritudinem satis laxum, juxta Chymicos, principiorum nexum arguere, atque valde compacta nullum, priusquam laxata fuerit eorum intima compages, saporem præbere, prout in metallis lapidibus, aliisque similibus texturæ experiri datur; Respondeo, primum, istam amaritudinem in cortice nec valde notabilem, nec obviam esse, nisi vel aliquandiu in ore detineatur pulvis vel prævia maceratione in liquore aliquo idoneo eliciatur, unde scilicet interre licet texturam non esse valde laxatam (nec enim compactissimam omnino volumus) verum, secundo, qualitatem hanc non à principio aliquo chymico mihi videri necessario deducendam, alio potius à determinata quadam figura & mole corporis efficientis, quorum gratia, hoc vel illo modo seniorum terrens diversam sensationem ab ea quam efficiunt aliter modificata, in primum; & quid vetat complexa corpora tales induere figuras, sub valde exigua quidem mole, unde in poros corporum lenium, (quos in nobis sæpe patulos esse quis concesserit) intrautes eos eodem modo afficiant, quo principiorum chymicorum patroni simpliciorum suarum substantiarum particulas volunt? Ratione hujus compaginationis necesse videtur, ut à friabiles sint ejus particule, & præ comminationibus, quæ vel intra vel extra corpus subire contingat irregulares atque angulosas multo maxima earum pars induunt figuras, unde hæc, ut non solum interneros ad quos delinuntur se sæpe promptè ingerant in eorum, verum & illorum latera, quodammodo lancient, atque sic si sensibilibus esse contigerit, in corrugationes, ac contractiones aliquales cogant.

Quoad tertium: inquirere oportet non solum in ipsam palestram, in qua, sed & antagonistas quibus cum, insilendis febribus intermittentibus strenuus hic athleta colluctetur. Idcirco quatuor lustrandæ veniunt regiones, quas ejus particule vel pertransire vel saltem afficere (quocumque tandem modo id fiat) censeantur, ut in quamvis ex his energiam suam potissimum exerceat dignoscamus; chylosæ scilicet massæ officina & viz à ventriculo ad usque vasorum lacteorum thoracicorum in venis subclaviis ossiola; vasorum sanguiferorum tractus, in quibus cum sanguine includuntur, atque una circulantur, habitus corporis ubi vis ultra vasa, isthæc constitutus, ex quo fomitem morbi ad paroxysmum concitandum erumpere concipiatur, & tandem nervosum genus (hoc est tam cerebrum quàm nervorum tractus, & propaggines fibras partium constituentes) America ut ita dicam Microcosmi, quam tot ditionibus nobilem, tot provinciis, onustam, per transennam tantum veteribus quasi notam nostro primum seculo celeb. Glissonius & Willisius & plenius monstravit & quod in ea (exiguam sane) conspectum eorum effugit ad penitus indagandum polteris viam cæmen indigitarunt.

Dum verò regiones istas nomino haud quàm ita intelligendas vellem, ac si unice supponerem vasa continentia esse objectum immediatum actionis medicamenti; verum & succos inclisios sub hæc nomenclaturâ comprehendere volo, quandoquidem hujus influentia & actio in hoc pariter determinari videtur, utpote quibus immediate

mediate admiscetur, & ad quos sese moti tam ationis, quam fermentativo identidem varie applicant ejus particulae: interea tamen & illa una officii concipiantur, atque ad effectum, si non primario producendum, saltem complendum concurrere; in quantum scilicet tonus eorum sine quo nulla functio animalis rite obiri valet, tandem illarum actione roboretur.

Primo, in chylum quidem corticem hunc agere aliquo modo posse nil vetat, cui & illibatis viribus admiscetur, & quocum iter tam longum una emittitur: Quin & amaritudine aliqua, ut modo notatum erat, pollet; atqui notum est concreta hac qualitate donata, à Medicis & usitata (saltem ex iis pleraque) & efficaciter adhiberi ad plerasque chylosæ massæ inordinationes corrigendas, præsertim ubi acidis scæret particulis, quales cum in quartanaria diathesi (ad quam & primitus usurpatus fuit cortex, & in qua efficacissimum vinum exercere cuncti norunt) dominium obtinere vulgo censeantur, in ventriculo, chyli officina, se vomitionibus acidis sæpè numero produunt. Porro dum ulterius cum chilo provehuntur ejus particulae, atque exactiorem cum ea subeunt miscellam, accessu biliosi & pancreatici in duodeno liquorum, & lymphæ in glandulis mesentericis & receptaculo communi, usque adeo exaltari concipiantur, ut notabilem in eum, inertem satis & viscosum liquorem, vim toto itinere imprimant, vel saltem reagenti alterationem inducant: unde fieri vix potest quin sanguis ex illo resarciendus, & reliqui inde coniciendi liquores, imò tota animalis œconomia, multo melius impofterum habeant. An vero hoc sufficiat ad rationem quæsitæ effectus reddendam mox dispiciemus.

Secundò, nec quidem negandum admissas medicamentis particulas afficere posse sanguinem laticem. Utunque enim strictior illis (quod modò deducere conati sumus) sit compages, quandoquidem tamen cum multiformi adeo massa commiscetur & gyrantur, haud fieri potest quam quibusdam ex hujus partibus alterationem, siue id agendo fiat, siue earum actionem recipiendo, saltem eas ab associationibus indebitis interpositione sua arcendo, inducant, præsertim quando vegetiori ejus motu & calore eas magis invigorari contigerit. Porro febrilis calor, quem formaliter in sanguine fundari (undeunque tandem instinctum habeat) uno ore fatentur Medici, cessatio, multorumque inde profluentium symptomatum sedatio, quæ illarum admissionem brevi subsequuntur, sanguinem ab iis quodammodo affici fidem aliquam faciunt. Qui quidem effectus, quamvis potissimum ulteriori alicui actioni (uti inferius astruere conabimur) forsan debeatur; nil vetat tamen quò minus ab istius contubernalis cum sanguine consortio ex parte pendeat; si non alia de causa, hac saltem, quod robur deperditum ejus crasi hinc restituitur; quod citius ab hujus, quam aliorum febrifugorum efficaci usû redire, ut plurimum, prout supra innui, observetur.

Tertiò, tertiam quod attinet regionem, habitum scilicet corporis, quandoquidem cavernulis plurimis abundat (tales nempe dari ipsa rara & cedens partium compages, ponderisque, præ multis aliis ejusdem molis corporibus, carentia si nulla ab autopsia suppetere argumenta, si-

dem faciunt) vix dubitari potest, quin si in eas corticis particulis ingressus detur (quod quin faciant nulla vetat ratio) afficiant. Quippe cum hæc ex membranis vel hbris, si non in totum, saltem maxima ex parte, consistunt (siue propriæ sint, siue vasorum quibus universa singulorum partium stamina continent, & quas interjacere multis in locis spatiola necesse est) quas omnes sensibiles esse credibile est, par est ut censeamus rigidiusculas hæc particulas subintrantes, in motus, saltem contractiles, ad amolendum hinc ortam molestiam, eas urgeant: unde saltem ingruentium symptomatum probabilis ratio assignari potest.

Quarto, de ultima ex memoratis regione major forsitan his moveri potest, non solum scilicet an afficiant succum nervosum, sed insuper an vel admittantur in nervosi systematis tractus corticis particulae: Quippe tortassis suggeratur, angustiores esse tubulos istos, quam ut quidvis, nisi subtilissimum, illæsi capiant; particulas verò hujus medicamenti, irregulares & rigidiusculæ cum sint, prout ex supra allata de textura suppositione constat, si admitti contigerit, nimis arctandas fore, quam ut se explicare valeant, vimque suam, quæcunque illa fuerit, exerant; saltem molestiam asperitate sua parietibus indefinenter inducant: quin insuper hæc tot liquorum quos pertranseunt, actionem passas, ante forsitan exantlandas fore, quam ad originem nervorum pertingant. Verum neutrum mihi concedendum videtur: Quod enim spectat ad admissionem, si inde conferamus innumeros (magitudinis dicam, an minutie?) gradus inter vascula insectorum, nervosque nostros, hinc vero corporum, nulla vel attentissima mentis acie assequendam, divisibilitatem (præsertim ubi concurrerint efficaces comminutionis causæ, quales in corporibus animalium adesse nemo, opinor, negaverit) facile concident priores suggestiones. Actionem verò, si admitti contigerit, quod attinet, multa cerebrum & nervosum genus afficere posse illæsi sanguine (imò forsitan multos cum eo circuitus absolvere) suadet nervosorum quorundam affectuum ab assumptis aliquibus, infesta vi pollentibus, productio, sanguine interrim parum tacto: sic Pastinacæ Sylvæstris radices in affectum maniaco similem (licet brevi cessaturum) comedentes sæpè compulerunt; sic cicutæ aquaticæ & hyosciami radices, nuxvomica, aliaque plura hujusmodi comesta, in nervosum genus potissimum vires suas exerce deprehendantur; uti palam fit ex iis quæ circa hanc rem protulit Celeberrimus Wepferus, hist. cicut. aquat. Ut taceam Hydrargyrum non solum auribris, inque mineris veritatis, sed etiam assummentibus, & salivationem movere, & pertinaces quandoque artuum tremores, aliaque nervosi generis gravissima symptomata, integra sanguinis crasi persistente, inducere. Porro idem evincit specificorum medicamentorum in convulsivis, aliisve nervosis affectibus exhibitorum, ad eos debellandos efficacia; quorum quamvis singulis, pro talibus habitis, immerito forsitan titulus iste & effectus adscribendi sint, si tamen etiam uni vel alteri, collatis debite rationibus, jure competere deprehendantur, sat erit ad evincendum medicamenta viribus non penitus destructis ad cerebrum pertingere posse. Quo minus forsitan

De tertia regione suggeratur: quod, quandoquidem & necessario cum sanguine in corporis ubivis habitum deferantur & cavernulas, ut supra notavi, in eo numerosissimas, in quas deflectant, offendunt medicamenti particulas, illic usque adeo, præ otio quo hic frui possint, maturentur, ut tandem materiz morbiticæ (sive isthic illius focus habeatur, unde communis hic eam aggrediantur, sive alibi resideat, quò fiat ut, post maturationem in venas regeltz, ad eundem ubivis situm eam sanguine transferantur,) debellandæ pares evadant. Verù præterquam quod supra ostendere conati sumus materiz morbiticæ sedem non hic primitus inveniendam, nec proinde medicamentum energiam suam isthic adæquate exercere, quæri insuper poterit, quomodo si daretur isthic hostem congredi, tantillum quod admittitur medicamenti, nec admodum ex se agilis, nec in omnium minutissimas propter texturam tantopere compactam, prout modo deduxi, cito dirigi habilis particulas, univèrsæ ne præcaveat symptomata; quandoquidem & sanguinis copia immeniter adeo particularum hujus numerum superet; ut non detur proportio inter medicamentum & morbum, & arteriarum per quas deportatur ramificationes tam numerosæ sunt, ut minime concipiendum, mea sententia, sit istas ad omnes corporis partes distribuendas sufficere, nec proinde hac ratione ad morbiticæ materiz eruptionem reprimendam: ut taceam magnam earum partem unum fortasse capessere vasorum tractum, neglectis reliquis (id quod non improbabile illi habebitur, qui perpenderit quàm difformis sæpe observetur cruoris emissi, & pluribus scutellis excepti, facies, ut nempe una portio coccineum sortiatur colorem, alia lividum, reciprocantibus quandoque in variis vasculis hisce thasibus) quo modo fieri potest ut suffaminata forsitan in una corporis regione eruptio, procedat nihilominus solito tenore in alteris, quæ vim medicamenti, siquidem illo haud perventis, non persentiunt; adeoque & partiales hinc excitentur rigores, & postmodum materia hac in sanguineum rivum ex loculis istis effusa, febris solitum repetat cursum, totà sanguinis massa febrilem commotionem, ibi impressam, mox concipiente. Verùm nullo minus probabile est medicamentum hic maturatum ad mineram alibi sitam transiretandum destinari: cum præterquam quod multas ejus particulas transpirationis lege foras expelli contingat, vix in promptu habebitur ratio, quæ & reliquas, consuadente sanguinis motu, ubi ab eo resorptæ fuerint, agitatae ad focum ubicunque locatum dirigendas fore.

Restat ergo: Quarto, ut in cerebro & systemate nervoso quærat, operationis ratio adæquata, quam mihi (probabiliter) inveniendam esse ut monstrare satagam, non abs re videntur observanda quædam paucula generaliora (ex se quidem pleraque satis forsitan obvia) circa relativam medicamentorum ad corpora nostra, succosque inclusos, actionem (quantum ad præsens institutum spectat) præfari, quò clarius evincatur suppositionis istius probabilitas.

Primo, igitur, quandoquidem constat nul-

la concreta indiscriminatim in cuncta alia agere, verum singula, prout texturæ, tam agentis quam corporis in quod acuo imprimatur, ratio permittit; notari poterit ea, quorum laxior est compages, intus suscepta, promptius vim exercere, quibus vero strictior competit, lentius. Hinc multum discriminis interest inter actiones liquidorum & solidorum alumporum; ut nempe illæ & liquoribus quibus obviam hunt, facile se per totum adnascant, & in solidarum partium poros, modo satis hient, promptè insinuent, unde levi negotio in alterutra immutando agant, modo cætera contentiant; hæc vero, prius quam vires suas exercere, notabiliter saltem, ponunt, vel prævia quâdam præparatione compagem solui exigunt, vel saltem multum comminunt, maxime si compactioris, nec facile solubilis, sint texturæ.

Secundò, notari poterit ea, quorum particula molliores sunt, laxiorque compages, intra corpus aduista, (in quo motu progressivo continuo urgentur) sicut compactioribus citius vires suas exerunt, sic citius exolui adeo ut nisi vel intime possideant particulas valde energeticas, (hoc est, sicut valde minutas, sic & solidas & angulosas) vel sat magna copia exhibeantur, vel etiam talia non offendant quæ earum vim retundant, ultra primas vias, vel saltem sanguinem, actionem suam extendere nequeant, ad remotiores vero regiones fatiscunt. Compactiora vero ad has, integris ferme viribus proveli possunt, imò debent; quandoquidem & magis resistunt actioni liquorum quibus primo admiscuntur, & istorum commeatu profundi usque ad eas feruntur: imò quæ eas primo impetu perlambuntur, repetitis usque & usque circuitibus tandem postliminio attingant.

Tertio, ad actionem medicamenti determinandam (talis præsertim quod in longinquum deportandum est, adque solidas partes afficiendas, destinatum) particulariter consideranda est figuræ & soliditatis ratio, ut nempe quorum cum notabili soliditate multum irregularis, figuræ sint particulae, præterquam quod fortius & inter fluidas substantias vibrentur, & in partium ad quas appellant meatus impingant, viam insuper aliis vel subtilioribus, vel mollioribus, sit facile inter eorum prominentias & meatuum latera, ubi semel in eos admissæ fuerint, concedere concipiantur, cum interea quæ molliores, & flexilis sunt genii, maxime si minus sint irregulares, paucisque angulis præditæ, hoc nomine vasa, vel obturare, vel præterlabi, aptæ natæ sint, unde nulla in ea impressio habere potest.

Quarto, nec minus ad hoc momenti habet aptitudo, seu fluidarum substantiarum quibus admiscendum venit medicamentum, seu solidarum partium ad quas deportandum est, ad actionem hanc recipiendam: sicut enim inter illas & medicamenti particulas, vel repugnantia, ratione figuræ & molis, esse debet, quæ luctæ occasionem det, vel similitudo, cujus gratiâ congruè coeant, sic meatuum, quoad mensuram, figuras, aliaque requisita, apta habenda est ratio; cum secus vel in

torum istæ ab ingressu arceantur, vel indebito modo præ incongruitate efficiant.

Quinto, perpendendum est, illuc ad morbum quemvis perdomandum deportari debere medicamentum, ubi fomes residet; adeo ut si viscus aliquod, vel artus, vel particularis aliqua alia pars afficiatur, universum consulant Medici, nec fallaci eventu, ut remedium ad locum sic affectum, si morbi illi stabuletur causa, dirigatur, vel, secus, ad partem unde insuit. Parimodo, si universum corpus afficiatur, sicut rationi congruum est illuc, quæ licet, dirigendum esse medicamentum, unde in totum influere possit, sic ubi talibus dolibus aliquod pollereprehenditur, ut universalem utilitate, debellet morbum, quidni concipiamus & hic deponi, & potissimum agere, unde influentia isthæ propagatur, eoque magis si sat subitaneus effectus subsequatur.

Ab istorum consideratione colligere licet, primo, corticem Peruvianum, quandoquidem, ut supra deduxi, particulæ ejus pro solidis, etiam ad ultimam suam scenam, habendæ sunt, atque hinc ægre dissipabiles, ultimam suam in sanguinem activitatem statim impendere non posse, verum multos cum eo circuitus absolvere, antequam vires suas disperdat [id quod paulo ante notavi;] Secundo, ejus particulæ, dum partium habitum permeant, sat facile illic deponi posse, prout ad cavernulas (vel, si mavis, poros,) iis admittendis aptas natas, in transcurso suo appulerint; quarum quidem permultas nequeunt non ubivis, præ insigni corporis raritate, ostendere: Ex his vero, Tercio, nullis æquè huic muneri paribus occurrere posse, ac istis quæ in Cortice cerebri habentur, idque duplici ratione; 1. Quia tenerrima est isthæ pars, & proinde facile crassiusculis & solidiusculis hisce corporibus cedens, quæ quia à sanguine minime subigi, nec cum eo exacte misceri queunt, facile divortium subeunt, inque tales (ubi eo per circulationem delatæ fuerint) meatus, qui minus iis resistunt, facile penetrant; 2. quia angustiora (uti saltem æquum videtur suspicari) sunt capillaria vasa sanguifera quæ hic terminantur, quam quæ uspiam alibi invenire datur, quandoquidem isthic loci fecerendus est succus nervosus (imo si molles spiritus animales) subtilissimus in toto corpore liquor; quo fit ut ex arteriis cum suo vehiculo, sanguine, elapsæ istæ particulæ, ægre præ mole & figurâ [quam quadantenus angulosam & irregularem esse comminutionis ratio suadet] venularum cavitates hic loci arctissimas, subintrare valeant, quin potius in juxta adlitos Glandillarum cerebralium, præfato succo admittendo dicatos, poros dellectere in proclivi habent, quoniam eos quàm venarum (quarum, etiam capillarum, parietes præ istis rigidiusculis audire merentur) magis cedentes inveniunt, imò & præ sua teneritudine magis se figuris istarum particularum accommodare aptos. Si quaratur quomodo, quandoquidem longe maxima medicamenti pars (si in substantia exhibeatur) per sedem amandatur, reliqua vero quæ venas subit, usque adeo distrahitur, perque totam distribuitur sanguinis massam, ut valde exigua, arteriarum considerata proportionem, ejus portio ad cerebrum

deferri possit, tantilla ejus, (& quidem satis, ut videtur, inertis) quantitas, quæ inter sanguinem illo deportatur, tanto effectui producendo par esse possit; Responderi forsitan haud prorsus incongrue, poterit quod, quoniam juxta nervorum originem deponitur (qui licet angustis cancellis hic coercentur, toti tamen corpori notissimam, & quidem instantaneam terminem influentiam imprimunt) perpulilla medicamenti quantitas hic deposita ad grandes effectus in partibus hinc actuatim producendos sufficiat: si enim effectus ratio à nervorum contrictione, unde ad debitum tonum prius laxati redeunt, deducenda sit, hoc facile, ubi omnes compinguntur & conpatuntur, præstari potest, si a particularum medicamenti in eorum tubulos admissione pendeat, constat pauculas admodum in tam exilia vasa receptas grandi effectui producendo pares esse posse, quoniam singulæ totam fere cavitatem (exceptis quæ puro succo nervoso & spiritibus transmittendis inter earum angulos interjacent spatiosis) saltem statim ab ingressu, occupant, atque hinc materiam morbinæ introitum negant, unde si vel unica in singulos nervulos particula forsitan penetret, sat erit ad effectum, qui per totum eorum tractum sentitur, inducendum. Quin insuper nil impedire videtur quominus, quæ uno circuitu aliò deferuntur, ejus particulæ, huc postmodum, rata circulationis lege, perducì possint, atque sic tandem ut, repetitis & circulatione & pulveris exhibitione, præfata ratione compleatur effectus.

Designato sic operationis stadio, proximum est ut aliquanto enucleatius tradam quoniam, juxta præfatum suppositionem agendi modo vires tam notabiles exerat Cortex: Quod quamvis jam prælitum quis censere; quoniam tamen minus aptè forsitan contexta habentur, quæ Hypothelin constituunt, utque propositæ methodo satisfiat, par est ut saltem in summam totum negotium redigam, unoque sic quasi intuitu videndum ob oculos ponam. Idcirco conjicio, quòd, ubi primum in ventriculum admissum isthoc medicamentum, actione stomachalis fermenti, (succi scilicet ex glandulosâ tunica in ejus cavum exudantis) quod cuncta statim adoritur, assumptæ, comminuantur laxiores, facilius proinde cedentes, ejus particulæ; ex quibus, quot ad trajiciendos chylicos meatus in intestina hiantes aptitudinem hinc nanciscuntur, intus solito Chyli itinere in sanguinis feruntur gurgitem, ab hoc (non secus ac lymphâ quæ cum in transitu suo congressæ sunt) ulteriorem identidem comminutionem passæ, pariter ac ipsi robur, ut supra innui, affluentes, ejusve forsitan crasin quovis modo immutantes. Sanguinis commeatu istæ, quibus contigerit cum hac ejus portione quæ ad cerebrum tendit commisceri, illo delato, in glandulas ejus corticales, si earum osculis satis aptè respondeant, modo novissime explicato deponuntur, atque inde passæ, more succi nervosi, in ipsum cerebri medullium (exprimi nervorum, staminibus, exinde identidem amplificandis, constatum in sequentium protrusione, & motu partium Symplicitico, urgen-

urgentur; in quo præ ductam angustia, lentaque illa protrusione lentissime moveri necesse habent; pars crassior aliquandiu in ipsis Glandillarum istarum de meaculis hærent. Dum illuc commorantur, partim præ angulis, quæ ex soliditate & constructionis lege fortiri supposuimus, leniter partes ambientes ad contractiones sollicitant (quas membranosæ coactæ textura nemo opinor, negaverint, & proinde aliquantulum ad has ab irritatione proclives) unde laxior earum tonus emendatur: partim, insuper subingressuris crassioribus & heterogeneis e sanguine particulis, quas (ut in aërata de his affectibus producendis hypothesi monstrare conati sumus) materiam morbificam constituisse arbitramur, hinc aditum denegant: Interea ut præ irregularitate sua sat vix, inter earum intersticia & vasorum horum latera, subtilioribus ex sanguine particulis, quales in liquorem nervolum facillere solent, ad perennanda sensus & animalitatis munia concedant partim denique, quæ ex illis maxime subtiliantur, se succo nervoso continuo progredienti associant, interque illius particulas motitæ, & ab indebitis cohesionibus interpositione sua arcent, & motu æquabili, cum sat illis congruant, urgent; quin insuper, præ majori soliditate quam quæ illis competit, atque angulis, quorum ministerio ad corpora minus compacta continuenda aptantur, ipsas ulterius dividant, atque hinc subtiliores, & usibus designatis aptiores reddunt. Hoc facta quamvis, ut quandoque sit proximè secus invaditur Paroxysmus non inhibeatur (maximè si paulo ante Paroxysmum primâ vice detur) quandoquidem materia morbifica, prius admissa & maturata, ad eruptionem parata in profectio itabat: sequens tamen, ut plurimum, vel præcavetur, vel saltem mitius invadit (nisi nimis propè, ut dixi, ad morbi initio, quando omnia sunt cruda, vel etiam sanguine multum impuro, propinetur) eo quod isti abingressu præ ludantur vix à medicamento particulis, & tonum partis quadantenus hic intercapedine roborari credibile sit. Unde tandem fit, ut continuatâ exhibitione, (imò quandoque post unicam dosin) ad constitutionem debitam redeant vascula ista, atque hinc ut, præciso sic sonite, statim, vel saltem brevi, in totum evanescant Paroxysmi.

Supra quidem innui medicamento particulæ adhuc in ventriculo commorantes multum ad sistendum Paroxysmum opis conferre posse, nervos illic sitos, & eorum consensu, totum systema nervosum invigorando. Verum cum ista nimis evanida sit agendi ratio, ad constantem sanitatem inde expectandam: cum porro motis in ventriculo medicamento particulis, nisi quid ulterius præstarent in corporis penetralia delatæ, suspicio oboritur & nervos tensionem illam brevi remissuros; cumque insuper ratio modo assignata & facilis, & constans, videatur naturæ regula ad effectum solidum producendum, huic potissimum innitimur.

Disquiramus jam tandem an huic hypothesi quadrent de usu corticis in linum observata,

quæ si inde probabiliter explicari valeant pro argumento forsitan erunt eam non prius incepte excogitatam tulle.

Ex his primo aliqua parte satisfactum censo ex novissime dictis. Quod vero ad limitationes assignatas spectat; videtur quod cum in morbi initio, crudioribus existentibus, hoc est, non satis in compage laxatis succis, vel etiam ubi magna adeit humorum saburra, exhibetur cortex, nequaquam vel prima dosi satis ubigi, & comminui possit, vel si quibus ex ejus particulis id obtinuisse contigerit, se in cerebro ad crudorum istorum, vel aliter vitiatorum in sanguine luxurantium, confortio extricare valeant, ut in meatus cerebrales vel debite, vel sat magno numero ad effectum producendum, viam inveniant: quin eveniat quandoque ut, cum istis humoribus subintrantes, paxillorum ritu eos tanto artius loculis his compungant; unde nec spirituioli destinati succi (quem par est comminui ad functiones animales explicandas) per ipsum cerebrum commineatus, nec ejus in systema nervosum debita distributio haberi potest, sicque necesse erit, ut nervosa quamplurima hinc emergant symptomata. Imò dum in sanguine massa adhuc hospitantur istius medicamenti particule, conicere licet, quod materię heterogeneę copiose in ea congelatæ debita maturationem (inter ejus particulas spiculis suis se ingerendo, sicque a multis congressibus ad hoc opus necessariis arcendo) atque hinc exterminationem, impediendo, eam proinde tantisper detineant, donec laxata universum sanguinis crassi febris continua, vice intermittens, inde tandem excite-

Ex eo quod nulla notabilis evacuatio ejus exhibitionem subsequi soleat, interea ut sedetur morbus, deducere forsitan licebit. Primo, quod, quandoquidem, evacuationem materia ex sanguine, maximam partem, proveniat, vix verisimile videatur illic materiam morbificam formaliter stabulari, cum si ita res esset, vix vix sedaretur morbus nisi extrusâ causâ; atque parum probabile apparet tantulum (satis inertis, ut supra stabilire conati sumus) medicamento quantitatem in sanguinem, & per magna id proportionem superantem, & in vasis valde amplis (comparatione ad alia habitâ) contentum & gyrantem, admissam hanc corrigendo solum rem præstare posse; Secundo, proinde, quod in talem substantiam agat, quæ & in evacuationibus concitandis efficientis munere fungitur (quod quidem succo nervoso competere, olim Tr. de secretionem Animalis adstruere conati sumus) cujus propterea pacationi, ubi ad has ultra modum invehendas ab admixta quibus irritante materia instinctum nata fuerit, allaborandum; & cui propriorem aliquam gerat proportionem ratione quantitatis, quam, ut dixi, ad sanguinem habet; quâ cum porro in ejusmodi vasis coercetur unde nec ipsæ ejus particule ab invicem nimium disgregentur, nec facilis & subitus nimis, vel illis quibusvis ante reconditis substantiis, egressus detur: quo fiat ut sat illis, genio à commotionibus molestis, ciendis, alieno præditis, moræ ad un-

vires, exercere observantur, maxime quoniam, si in liquida forma propinentur, vehiculi loco inserviant quo citius & certius intus, ubi itativa ponit morbus, devehant: Quin contemptus veterum est novitatis invidiam, à quibusdam quibus nil fore sapit nisi quod ex libris Hippocratis, Galeni aliorumve ex antiquis (quorum sane, utpote primorum Medicinæ luminum, veneranda semper esse debet memoria) hauritur, imputari solitam amolietur secutum, dum ab us transmissa neutiquam repudiare notabitur.

Quod tandem citius post intermittentes quam continuas redeat pristinus vigor, pro argumento haberi potest (obiter) illas in nervoso genere fundari, non vero in sanguine, harum ratione; cum vigor corporis à debita solidarum partium, ex nervis oriundarum, constitutione potissimum pendeat; illius ergo correctis anomalus, non mirum est restituendum cito fore robur. Quod vero in ipsis intermittentibus ab hoc, quam aliis febrifugis salutariter exhibitis celerius redintegrentur vires, hinc pendere videtur, quod ejus particulæ in nervis & præfatis cellulis diutius commorantes, continuo eos ad sese contrahendos placide sollicitent, atque ita ad perfectam toni firmitudinem saltem simulandum; quæ tandem nisi gravius impedimenti quidquam obiter, præ nuxus illius assiduitate, his exturbatis, brevi in perfectum redit. Quin porro & hac mora puriori solum succo inter particularum medicamenti (figuræ multum irregularis, ut sapius notavi) & vasorum latera transitus, ut etiam innui, conceditur; inde indidem grato & familiari liquore remotiores eorum tractus referuntur, quo & tensitas & cætera animalia munia celerrime restituantur. Cum interea quæ alia quavis medendi ratione rem præstant, quoniam statim nervos deserunt, opem cito evanidam solum præbent. Unde tono, licet aliquantum constricto, nondum tamen confirmato, verum se subinde laxante, pusculum heterogenearum particularum cum succo laudabili necesse habet unâ subingredi; quo pacto & diutulè impediatur debita istarum partium constrictio, & ipsi succo nervoso, minus hinc puro, non licebit functiones animales ritè mox obire; donec tandem natura, aliis plerumque subli diis adjuncta, debilitatem hanc lentè superaverit.

Si quæ alia circa corticis administrationem peculiari observatione digna censeantur, vix dubitavero quin æque facilem, atque hæc, solutionem ab eadem Hypothesi juxta hanc normam admittant.

Ut vero tandem hæc, quæ de grandi hoc specifico theoretice sic protuli, ad praxin quadantenus accommodem, subnectere liceat, rationi congruum videri (id quod vix dubito quin à quorumvis Medicorum experientia comprobetur) evacuationes, maxime vero per vomitionem, corticis exhibitioni præmittendas esse: nisi forsan vel magna debilitas, vel urgentia symptomata maturandam esse suadeant: tam nempe ad alvendam faburram quæ in primis viis, potissimum vero ventriculo, non raro hospitari solet, atque

efficaciam ejus secus pessundet, quam ad laxiora recrementa sanguinis exturbanda.

Idcirco, quod ad vomitoria attinet, quandoquidem non omnes homines æque facile vomitionem subeunt, his antimonialia utpote infusum croci metallorum, sulphur antimonii, tartarus emeticus, &c. illis sal vitrioli, oxymel scylliticum &c. pro cujuscvis euphoria, porrigantur. Quod verò ad purgantia; leniora solum propinanda suaderem, utpote decoctum amarum, Sennæ Gereonis, infusum Rhabbari, Tamarindorum, Cassiam, Mannam, juxta vulgo notas formulas; quin pilulari formâ, Pilulas Tartareas, Stomachicas, vel similia, Drastica vitando, quæ nimiam forsan conturbationem cieant.

Modum exhibendi quod spectat; Quamvis Medici, quæ forsan, ut solertiam suam ostendent, quæ ut ægrotorum sive palato, sive antipathius morem gerant, varias excogitarint ejus præparaciones atque formulas; efficacissima tamen in substantia datur (sive in pulvere vehiculo alicui admiscendo, sive in boli vel pilularum forma) quemadmodum primitus exhiberi solebat. Quippe hoc modo diutius in ventriculo commoratur; quò fit, ut particulæ ejus à fermento stomachali jugiter & comminuantur, & cum ingestis alimentis & liquoribus commisceantur, cum chylo usque & usque intus convehendæ, quo pleniora pro morbo edomando supplementa cerebro suppeditantur. Cui quoque usui decocta ex amaris specificis (prout supra notavi) aliave vehicula quæ, forsan ipsa comminutas particula corticis debite saltem diluant, multum conferent, & quidem mos obtinuit, nec absque ratione, ut & sat largis dosibus, utpote drachma pondere adultis, propinetur, & eadem dosi tertiâ vel quartâ qualibet horâ iteretur, quo effectus producendo & idonea intus deportetur quantitas, & jugi tenore suggeratur, ut sic novarum usque copiarum superinductione tanto certius opprimatur hostis. Cum vero plures ubique dentur qui in specie assumere nolunt, hi decoctum ejus (in aqua factum) haurire poterunt, sed bene saturatum; quippe quod paucas tantum particulas, præ comparativa earum crassitie, in poris suis recondere valet. Cui effectui conducere mihi videtur, ut in subtilissimum pollinam hic redigatur antequam coctioni exponatur, quò sic copiosius minutiores ejus particulæ ab aquâ excipiantur. Et quidem nisi dupla ad minimum, imo forsan tripla, quadrupla, quantitate (nisi exquisite ante comminuas) qua in substantia exhibetur, coquendum exponas, vix ulti compos fies; quamvis enim promptius forsan in sanguinem coctura præparatus admittatur, paucissimæ tandem hinc ad sedem morbi, cerebrum scilicet pertingere possunt ejus particulæ; cum paucæ omnino si in sanguinem ipsum ferantur, quarum & maxima pars ab eodem retinetur vel ad alias corporis regiones deflectit. Huic decocto si vel vinum in subtriplo forsan, vel sub quadruplo proportionem addatur, vel aqua aliqua spirituosâ, utpote aq. Gentianæ composita, at in minor; imo quandoque acidum aliquod, nempe succus Limonum, Aurantiorum, Spir. Vitrioli, Gas sulphuris, &c. vel sal aliquod Alcalinum

utpote Tartari, Absynthii, &c. prudenter juxta debitas indicationes admisceatur, Ventriculo flaccido, vel depressis aut exaltatis Fermentis, pro variis eorum dyscrasiis, commodius subveniat. Si ad Diarrhoeam pronus fuerit ægrotans, par erit ut vel Laudanum, vel Hypticum aliquod una propinetur.

Porro opportunum videtur, ut, post devictos Paroxysmos, ad plures, dies duarum scilicet vel trium periodorum, quæ invadere solebant decursum continetur medicamento exhibitio: quo sic prælio sint in sanguine novæ copiæ, in priorum conceptacula, quæ dixi, in radicibus nervorum per corticem sparsis admittenda, si antequam debite roborata fuerint has extrudi contigerit: Imò & post decendium repeti non sine causa in usu est; ne defectu Antidotum in prociñctu diversantis recrudescat morbus.

Quamquam vero primitus solis febribus intermittentibus sanandis adhibicum fuit hoc medicamentum, nunc dierum tamen ad pleoroscque chronicos morbos curandos, præsertim qui intermissionem subeunt, in usum trahitur; & non raro exoptato successu. Quod quidem mihi saltem arguere videtur, (ignoscite hypothesein propriam, ut solent parentes liberos, nimium forsan adamanti) nedum intermissionis, quæ in morbis deprehenditur causas in nervoso genere querendas esse, sed & vel eorum (pleororumque saltem) mineram hic sitam esse; nisi aliis, & fortioribus argumentis constiterit alibi delitescere.

Coronidis loco unam vel alteram historiam attexare placet, quæ vel ad medicamenti allatum rationale, vel morbi sedem assignatum stabilis faciunt.

Primam retulit mihi Reverendissimus Præsul D. D. Gilbertus Ionsider Episcopus Herefordiensis. Scilicet, cum olim Rev. Vir. febre intermittente diu laboraverat, pluraque alia incassum tentaverat remedia, tandem ad corticem Peruvianum, Medici sui consilio, perventum erat. Quo vesperi sumpto, somnoque mox obrepente, non ita multa post in insolitum insomnium incidit, quod quidem vividam adeo mentis ejus ideam impressit & reliquit, ut distinctissime, imo satis moleste, ejus recordationem a somno excitatus recerneret, quod per raro alias unquam contigit, ab illo vero tempore febris prorsus evanuit.

Quæ quidem observatio scenam actionis hujusce medicamenti in cerebro haberi mihi non obscure indicat, imò mea jam modo pro lata sensa cumulatissime confirmare videtur. Quippe (ut rationem aliquam hujus Phænomeni assignem) ubi medicamenti particula ad cerebrum cum sanguine inter circulandum delata, inibique ab isto in corticali regione secretæ fuerint, atque in angustiores ejus recessus penetraverint, tum parietes vasculorum aliquatenus irritant, adeoque tanto fortius ideas eorum quæ inter dormiendum observantur impingunt; quo fit ut æque firmiter fere excitatum hæc afficiant, ac si ab externis objectis immediate injectæ fuerint, tum hac impressione, quicquid incongrui has cerebri, ubi agunt, regiones obfederat, exturbari faciunt; unde molestia, diem hoc transigitur, sensatio interna de-

quit non inveni: Dum verò ulterius in nervorum propagines traduntur, sicut penitiorum animæ aïam ab earum lacerantibus vibrationibus liberam linquentes quietem magno incolæ reddunt, sic porro crassiusculis, quas pluries memoravi, & heterogeneis particulis in nervos ingressuris viam præpedientes invasiones secus subsequaturas præcavent.

Alteram Historiam Celeberrimus Doctissimisque D. Blackmore mihi narravit de quodam tertianario: cui, cum paroxysmi febribus corticis Peruviani repetita exhibitione sublati fuissent, dein vero post mensem, circiter, recrudescerent, eodemque remedio iterum fugarentur; Periodo immediate sequenti moræ convulsionis epilepticarum æmula, successerunt, eundem omnino, quem febris tertianæ, typum ad plures periodos servantes, æque horas, præter propter, quatuor singulis vicibus durantes: Quas tandem ille in arte versatissimus, partim evacuantibus, partim antispasmodicis brevi sustulit.

Quæ insuper Historia Hypothesein meam supra exaratam, de intermittenti sede, non parum confirmare videtur, unde enim fit quod, mutatis tantummodo symptomatibus, spasmi (quos omnium secuniorum consensus in cerebro locavit) parilia cum febre intermittente studia observaverint, nisi eadem utrinque affectui competat sedes? cujus (insolite sane) metamorphoseos rationem ut breviter, secundum supra allata reddere coner; in memoriam revocandum est, velle Hypothesein meam, materiam febrilibus Paroxysmos producendis dicatam, postquam cerebrum trajecerit, in omnes nervorum fibrorumque tractus sat libere dispensari debere, atque in illis lente ad mensuram tumescentiæ maturefcere, quo fiat ut, cum latè dispergatur isthæc minera, non usque adeo in cerebrum ipsum sæviat, quandoquidem tumescentiæ initinctus, quantumlibet isthuc inceptus, facili negotio extrorsum ad ipsos vasorum horum, cundo ampliatorum, & materia uniformiter maturata refertorum, terminos brevi propagari valet. Atque hinc sicut Paroxysmorum solitum, juxta modo dicta, recursum, sic pariter symptomatum seriem regularem, sat facile explicari posse censuerim. Horum medelam a particularum corticis in radiculis nervorum intrusionem haberi supposui; dum scilicet crassiori materiæ paroxysmos imposterum inducturæ aditum sic negant: ubi tantisper hæreere autumem, donec tono sensim restituito & hæc prorsum latè extrudantur.

Quibus sic habentibus, ut ad casus solutionem accedam, supponere liceat, quod, si ultimo, admittæ corticis particule non quidem in radicum meatibus, nimis adhuc, præ tono nondum restituito, (id quod recursus morbi post mentem indicat) patentibus, sed illos prætervectæ in nervorum spinalem medullam conflantium principio hæserint, quamquam aditum morbi hæc materiæ cerebrum ingressuræ minusve negant, ulterius tamen progressuræ obicem (juxta leges assignatas) ponant; adeo ut nulla ejus, utpote neutrquam admittæ, congestio in fibrarum totius memoratis tractibus habere possit, nec proinde ad usitata symptomata dispositio. Interea isthæc in cerebro partim

partim in parvum deposita (cujus quidem tumorum cæteris amplior cavitas facilem corticis quas admiserant particulis transitum præbeat, quæ ad eorum extrema serpentes inibi coarctantur; quemadmodum suspicari licet Paroxysmos Hytæicos in longum productos obstruenti alicui materiz circa nervorum horum continua hærenti durationem suam debere.) aciditatem solito modo acquirat. Cumque ad eruptionis acmen (juxta præfatam protypis solvendis rationem) pervenerit, quandoquidem in spinalem medullam præ corticis particulis, illic, sicuti suppositi, aditum nunciis, erumpere non potest, in ipsum primo cerebrum, dein, instinctu hinc dato, in præcordia cæteraque quas parvum perrepat partes lancinando scire concipiatur; unde eadem symptomata, quæ in epilepticis affectibus hinc hujusmodi prophasi emergentibus obveniunt, producta in quid vetat? Quæ quidem symptomata tantisper persistere & redintegrare totum concipiatur, donec partim idonearum purgantium vi e oculis suis extrusæ fuerint corticis particule, partim antispasmodicorum aliorumve corroborantium energia, tam reliquæ fermenti convulsivi post paroxysmos delitescens, subactæ fuerint, quam tonus cerebri restituatur, ad quæ ambo penam subeunda hujusmodi medicamenta multum aptata videntur. *Gulielm. Cole Traët. de Febris Intermitte.*

Consultationes.

Pro quodam in Aula Imperatoris Febre diurnâ & sæpe recurrente affecta.

Dilucida luculentaque signorum & symptomatum, quæ in laborante Domino observantur, enumeratio, expressam morbi speciem, omneque illius, tum interiores, tum evidentiores causas nobis ob oculos posuit. Corporis forma, figura, habitudo, omnisque constitutio; deinde functionum tum naturalium, tum animalium integritas, nativum temperamentum laudabile commonstrant: sed quod paulum in calidius divergere ostendit venarum amplitudo. Id ætate annorumque, decursu sensim calidius evasit. Tandem etiam naturæ convenientem modum excessit, magnis animi perturbationibus, vigiliis, curis, sollicitudinibus, quas Dominus tedulo in rerum magnarum administratione subiit. Ab his similibusque causis evidentibus jecur incensum, multæ bili gignende accommodatum est, quæ tempore coarctata & exaltans, omnium quæ traduntur symptomatum effectrix est. Hæc vel in secunda valetudine celeres vehementesque animi perturbationes, crebramque exardescientiam gignit. Hæc eadem causa est cur alio adstrictiore, acri vapore caput tentetur, reliquumque corpus non excretabile sentiat inæqualitatem, & maximum volæ plantæque pedum exsulent, quod etiam jecoris calidioris est indicium. Itaque bilis retroactis annis tempore exuperans effectit, ut corpus universum, quasi liquefens, in quandam extenuationem collapsum sit, atque etiam ut bilis tempestive non expurgata, sed coarctata

ac subinde putrescens sæpiusculè sui generis febris excitavit: idque multo crebrius potrennis annis, quibus illa copiosior cumulabatur. Et cum corpus proclive sit & præparatum, ut ex levissimis quibuslibet occasionibus caloris, frigoris, laboris, perturbationum animi, atque victus in ejusmodi febres incidat; hisque prompte corripitur, argumentum sanè est exuperantis causæ interioris, maximeque redundantiz, quod sit naturæ gravis, & supra modum molesta. Quinetiam febris species invasionisque inodus interiorem causam demonstrent atque expriment: nam rigor initio, calor aeris, faciei rubor & inflammata cum levi mentis alienatione, pulsus creber, similisque respiratio, urina rufa atque crassa, excretiones sub morbi sinem biliosæ, omnes quidem notæ sunt exuperantis flavæ bilis, quæ ex permissione sanguinem tenuissimum fervidumque reddit. Itaque & febris, & omnium quæ narrantur symptomatum causam non alio quam ad bilis exuperantiam, & ad jecoris immoderatum calorem referri potest. Eodem etiam erysipelatis & omnium fluxionum, quæ in crura procumbunt cura pertinet: quandoquidem erysipelas febre continuo succedit, quasi illius quædam indicatio, ex eo nimirum humore qui febrem accenderat. Cæterum, si quis tumor pedum œdematosus erysipelata discussisse deprehenditur, etiam si per sanieatem adesse conlueverat, & familiaris putetur, suspectus tamen esse debet, & metuendum ne inimicæ cachexiæ sit prænuncius; ferè enim jecur multa crassaque bile obstructum, obsecræ scirrhi rudimenta contrahit, quæ dum sensim & sine sensu adolescunt, in cachexiam, hydropemque præcipitant.

Licet autem febrium reversiones, & crurum inflammationes defluxionesque ægrius inveteratæ sint, atque laborantis jam inclinet. Si quis tamen tempus diligentiamque sumet, poterit in illa valida robustaque senectute, vel integram sanationem, vel certe summam levationem sperare: maxime verò si in dextro hypochondrio nihil sentiens, aut durum, contactu, decubituve deprehenditur.

Medendi autem scopus erit jecoris obstructionis expedire, exuperantem illius bilem sensim expurgare, ipsumque viscus refrigerare & corroborare: quæ qui opportune præstabit, omnem certè febris causam adimet, defluxionum fontem exhauriet & in multos annos vitam producet.

Primum igitur decernatur purgatio ex diluto ℞ij. rheubarbari, ut docet, apparato, quod omnis illa redundantia, & crudorum ac semiputrum humorum in ventriculo, & circa mesenterii ad venas fluctuans, abigatur, aut emendetur. Deinde jecoris lionisque obstructions referendo his remediis quæ dum extenuant & referant: simul obstructionis materiam in alvum sensim deducunt: Hujusmodi est syr. de ciclor. compos. qui pro dosi habeat ℞ij. rheubarbari. Hic diebus alteris, aut tertio quoque die offerendus tribus horis antecibum sine custodia. Si longius erit intervallum irrita erunt omnia, nec quem sperabamus effectum assequemur: ita enim laxatis apertisque viis sensum natura assuescet bili in alvum expurganda.

Syrupus ad retorridam bilem.

℞. Rad. cichor. acet. gramin. aspar. ana ʒiβ. agrim. ceter. cuscutz, lupulor. adiant. capill. vener. ana man. j. fol. lenn. mund. ʒiij. F. decoctio ad lbβ. In colatura dissolve succorum depuratorum buglossi, borrag. fumar. & acetos. ana ʒiβ. sacch. alb. lbj. paretur syr. perfectè coctus. Et cum decoquetur adde expressioni ʒvj. rheubarbari electi in aq. endivix infusi cum ʒij. cinnam. electi. Capiat bis in hebdomada ʒiβ. vel ʒij. pro dosi, cum aquis hordei, vel melissæ, sine custodia. Diebus interjectis alvus molliente clydere promittetur.

Ad cruditatem pituitosam, quæ aliquando per hiemem contingit.

℞. Rhabarb. elect. ʒiβ. aloës optimæ, pulver. hieræ simpl. agar. recentè præparat. ana ʒj. cum syrup. absinth. formetur massa. Hæc evacuationum genera omnem bilis exuperantiam sensim detrahent per alvum, nec febrem accendi, nec fluxionem in crura procumbere sinent: nec tamen vires frangunt, sed potius augent, dum naturam humorum noxiorum sarcinâ, veluti pondere gravi, relevant. Hæc æstas residua, dum æstu corporis humores adhuc fluxi sunt, & quasi fusi, in hanc curationem incumbendum.

Scopus alter curationis erat jecur, universumque corpus refrigerare & corroborare: id autem præstabitur victus ratione potius quam medicamentis. Sit igitur victus tenuis initiô curationis, qui modicè refrigeret. ac humectet: jura gallinarum ex lactuca, acetosa, omphacio, buglossio, boragine. Carnes assæ macerentur condimento refrigerante, ut succo acetosæ, omphacio, succo mali putici, citrei, vel arantii. Vitet salsa, piperata, aromate condita, quæ jecur & humores adurunt, saccharata omnia quæ promptissimè in bilem facescunt: allium, porrum, cepam, sinapi, nasturtium, hujusque classis omnia. Vitet etiam vina generosa, debilia diluere assuescat, nec timeat stomachi imbecillitatem. Cerevisia interdum utilis, sed quæ nec multum actis sit nec admodum crassa. Corpore puriore jam factô cibis augeatur, servatâ quantitate. Peractis viginti diebus curationis, sorbeat manè hordeum mundatum paratum ut decet; hinc si potest indormiat, continuetque in duos aut tres menses, aut si velit in omnem vitam, eorum exemplo qui hoc salubriter & magna valetudinis commodo uti assueverunt.

Cruribus nihil adhibendum censeo præter aquas aut succos solani, plantaginis, & rosarum cum aceti octava parte dummodò quantum fieri poterit, illa sublimem locum obtineant. *Johan. Fermilus in Consiliis Medicis.*

De Febre Intermittente dolorifica.

Laborans de qua scribitur gravissima febre intermittente afflicta, cum vomitione crebra, cum syncope, & cum summa corporis totius, sed maximè viscerum imbecillitate, quoniam omnium remediorum opem neglexit, nec tempestivè medicamentis paruit, in gravissimas ventris torsiones merito incidit, quibus diu ac vehementer cruciata est. Febris enim peccans materia, è visceribus (in quibus febris omnis intermittens fomes consistit) inter peritonæi & ventris membranas devoluta, febrim finivit, sed dolorem accersivit. Ex his postea membranæ, cum minimè excidere possent, nec viam expeditam inveniret quâ in alvum illaberetur, velut furiosa, alio tandem impetum faciens, transfiliit in caput, & in corporis altus, ubi & novos cruciatus movet. Metuendum, ne tandem nervos occupans & tendones, paralysis speciem ingeneret, quæ ex colico dolore fieri traditur à Paulo, & de qua non pauca scriptis notavi.

Hæc sunt sanè omnium malorum gravissima, quæ neglectis, & perperam curatis febribus intermittentibus supervenire solent: his autem remedia querenda. Licet autem minùs quam olim purgationes nunc pro futuræ sint, imperandæ tamen sunt, exque satis validæ, ut noxium humorem è summis partibus revelant in alvum: aut si minimè paritura est laborans, his saltem levioribus, sed identidem repetitis purgetur, quibus jam aliquoties est usa. A purgationibus conferent unctiones dolentium partium, anodynæ & discutientes, quales comparari possunt ex oleo lumbricorum, & irino, & oleo de terebinthina, his tandem adjectis, quæ ad paralysis conferunt; conferent quoque balnea in quibus incoxerint herbæ cephalicæ, multoque magis vaporaria, aut æstuaris sicca, si modò ea perferre queant laborantis vires.

Porro morbus pervicacissimus in laborante male obtemperante, dubium, aut etiam finistrum plerumque exitum expectat. *Idem ibidem.*

De febre lenta & variis affectibus à Gallico.

Ut certò satisfacere possim quæsitis ad me missis de febre lenta, operæ pretium est ejus veram causam & originem investigare, quæ quoniam aliis febribus intermittens & à erraticis successit, in ea sum sententia, fontem ejus latere, vel in renibus, vel in jecoris aut lienis prava qualitate est enim symptomatice. Cujus ut planum haberi possit indicium, urinæ sunt perpendendæ. Si enim crassæ, spissæ, albæ, purulentæ sunt, aut si quando aliàs cruentæ fuerunt; indicium est, abscessum aliquem, aut ulcus in renibus subesse. Quòd si nihil alienum in illis conspicitur, à jecore vel liene causa repetenda. Non enim doloris colici, vel nephritici quibus D. Laborans contligatus est, hæc confectaria esse videretur. Sitis correvisumque bibendi luben-

tius quàm vinum cupiditas, quàm tenetur, ciborum averfatio, præcipue efculentorum, rugitus ventriculi stridor, & ad concoquendum absurditas, cum lipothymia ad syncope usque, manifestum ejus & ab eo noxam demonstrent, tum proprio vitiò, tum hepatis & splenis vicinâ ac sympathia. Neque verò pleniori (si quæ in ventriculum decumbit) tantopere niens adjicienda: non enim tam læva accidentia solus catarrhus parit.

Remedia tum ad febrim, tum ad alios affectus blanda & epicrotica esse debent, de ætate, diuturnitate, debilitate, considerationis partem ad se trahentibus. Alternis ergo diebus, si alvus non respondeat, injiciatur clyster ex formula.

℞. Radic. alth. ʒj. flor. chamæmeli, meliloti, anethi, absinth. fursur. macri, ana m. j. sem. unili & fenic. ana ʒij. F. decoctio. In colatura ad lbj. dissolve mell. rosat. ʒij. olei comm. ʒiij. Et clyster. Si non satis detrahat crassa & lenæ pituitæ addes hieræ simpl. ʒvj. vel ʒj. Per hebdomadas syrupum infra præscriptum hauriet, ut sensim ventriculus detergeatur, cæteræque partes hujus mali fontes. Quod si læpiusculæ uteretur largius, prodesset. Nullo enim pacto debilitat, imo valenter roborat.

℞. Radic. acetos. cichor. gram. & petroselini, polypod. querc. ana ʒß. agrum. ceter. cusc. ana m. ß. fol. senn. mund. ʒij. fiat decoctio ad lbß. in colat. dissolve sacch. alb. lbj. fiat syrup. perfecte coctus, cui inter bulliendum adde expressionem ʒij. rheubarbari elect. infusi in vino albo cum ʒj. cinnam. electi. Capiet ʒiß. pro dosi in aq. hordei mane, tribus horis nec pluribus ante cibum. Nonnunquam loco syrupi uti poterit pilulis sequentis descriptionis.

℞. Aloës optim. rheubarb. elect. pulver. hier. simpl. ana ʒj. agar. præparat. ʒß. malaxentur cum syr. absint. Capiat pilulas v. pro 3. mane horis 4. ante cibum.

Diebus interjectis ad roborandum ventriculum & firmandâ viscera expediet condito sequenti liberaliter indulgere.

℞. Cortic. citr. conditi ʒj. myrobal. conserv. rosar. ana ʒß. pulver. elect. rosati aromatici maj. ʒß. cinnam. elect. santal. citrin. rasur. ebor. & C. C. ana ʒj. sacch. rosat. q. s. F. conditum aurò coopertum. Coopertum. Capiat cochleare unum mane, & per horam ante cenam.

Ad sitim bibet julepum similis descriptionis.

℞. Aqua rosar. lbß. succi granat. ʒiv. succi limonum ʒij. sacch. alb. ʒviii. Fiat Julep. Utatur in siti longè à cibo, cum triplo vel quadruplo aquæ coctæ. Neque alii potui indugebit, aut aquam vel pitisanam vulgarem, ven. cerevisiam hauriet: sed supradictò julepo contentus erit, vel syrup. granator. vel succo citri, aut auranti, extra cibum, atque etiam cum cibo. Quod si cum lipothymia quædam incesse præstaret multò hæc superiora illi propinari, quàm vinum. Eo tamen in palatu gustare mediocriter poterit, ut

nulla postea sitis consequatur. Ad ventriculi autem labores, dum cibis coquendis incumbit, erit ex usu pauca & pauiatim præbere. Quod si esca solida sit, succis supra dictis irroretur. Neque te victus refrigerans magnopere deterreat: placidiùs enim ad frigida quàm ad calida ejus se affectus habebunt. *Idem ibidem.*

De Febre Quartana pro Regina Leonora.

Ab annis teneris, & à priore usque pueritia deprehensa est obnoxia asthmati, quod humidioræ cælo, & quoties Luna illucescit, nova destillatio vehementius fatigat, magnò & periculoso uteri strangulatu sæpe coriepta est; in quo & mens & sensus omnes pereunt, & suffocationis vehementia, cervicis, oculorum, & faciei venulæ dehiscunt, ut hinc rubræ maculæ diutius persistant viscerum, maximeque jecoris, illæ numerosæ intunt obstructions, ex quibus sæpe in continuæ & in tertianas febres, easque diuturnas, sæpe & in icterum admodum contumacem incidit. Quum tali esset constitutione, annum superiorem totum in otio transiegit, nec tamen quidquam detraxit de victu, qui uberrimus esse consueverat. Hinc crudorum humorum, omnisque generis excrementorum ingens proventus, & obstructions geminatæ, quæ tandem effecerunt ut mentium hæmorrhoidumque evacuationes parcius, nec statò tempore procederent. Quibus ex causis tandem universum corpus capit ingravescere, & quindecim diebus antequam morbo prehenderetur, mirâ lassitudine spontaneâ fatigari. Simul & appetentiam sentit dejici, quam tamen vario obsoniorum genere, variisque gulæ irritamentis conabatur excitare, ut non minùs intemperanter quàm olim viveret.

Ab his causis quartana invasit secundâ Septembris, ex se ipsa, non ex alio antecedente morbo: sed principiis aded tenuibus, atque obscuris, vix ut à quoquam deprehenderetur. Secunda accessio manifestè exhibuit intermittētis febris speciem, in qua omnis generis vomitiones eruperunt. Tunc capimus & syrupis & clysteribus, & tenuiore victu corporis humores præparare. Tertia tamen accessio multò vehementior evasit, tum frigore, tum vomitione, tum suffocatione ex asthmatis permissione, tum jactatione corporis atque siti. Proinde medio accessionum intervallo, & proximò die minoris accessionis blandè purgavimus. Licet autem evacuationes undique & pituitosæ & biliosæ arte sponteque procederent, febris tamen manifestè increvit, habuitque quartam, sextamque accessionem, & acerrimam, & longissimam, ut jam nulla integritas, aut intermissio deprehenderetur. Nullus enim sudor unquam erupit, qui accessionem finiret. Quum igitur febris non minus continuæ quàm quartanæ particeps videretur, ne fortè in deteriorē degeneraret, utile visum est venam secare basilicam sinistram, è qua corrupti sanguinis unciz circiter octo detractæ sunt magno

magnò quidem usu & facili tolerantia. Nam præter febris continuæ suspicionem, id faciendum suadebant mentium, hæmorrhoidumque suppressio, victus in otio intemperantior, faciei rubor, & venarum ingens ac turgens plenitudo, ob quam sanguis e naribus subinde emanabat. Ab eo tempore corporis integritas, & intermissionis puritas major apparuit, sed par tere accessionum vehementia, cum cibi fastidio & nausea, cum vomitione & oris amarore. Quæ symptomata, cum nec victus ratione, nec syrupis, nec clystere mitescerent, secundò medicamento, eoque blandò purgandam duximus post accessionem novam. Ceteræ accessiones hinc leviores insequentæ sunt, sensimque decreverunt, ut neque frigus molestum sit, nec calor interpellet. Quo circa toto mense Octobris solâ victus ratione idonea, & emollientibus clysteribus occursum est, nisi quoddam semel, dum gravi nausea & linguæ amarore premeretur, sorbitioni incocti sunt folliculi fennæ, & paucis ante diebus ad levem ex destillatione cussi syrupus adhibitus jujubinus.

Quæcunque posthac ad reliquam curationem idonea videbuntur, horum imitatione prudenter decernent ii, quibus id munus erit commissum. *Idem ibidem.*

Ad Quartanam destillationi implexam.

Cum multis ac variis affectibus, fereque assidua destillatione, jam diu constiteretur Generosus D. Cathalaunensis, centum non soli quartanæ febrî, quæ torquetur, sed aliis quoque implicitis affectibus succurrendum: quod his præsentibus ægre possit quartana febris proligari, quodque ea proligata variis nihilominus querelis futurus sit obnoxius, itaque omnibus quæ licuit animadversione æstimatis, duximus non differendam, sed summa diligentia suscipiendam curationem; quæ tum medicamentis, tum victus ratione, & veteres morbos, & hanc vitiosam corporis constitutionem immutet.

Victus ratio prorsus sicca sit & attenuans, moderateque calida, ut hanc frigidum mucosumque habitum emendet. A sorbitionibus prorsus abstinendum, à liquidis omnibus, ab elixis carnibus, à piscibus, à caseo, à fructibus ab immoderato potu. Carnibus vescendum eûchymis, hisce omnibus assis, aut per raro elixis, quas tamen si volet condimentis intingat ex pipere, gingibere, cingamomo, nucè moschata, interdum & sinapi. Vinum generosum sit ac minimè vaporosum, album, aut subrubrum, tenue, non supra modum diuturnum, quò & parcè utetur in pastu.

Medicamentorum, sed blandorum frequens sit usus, & quæ crudos noxiosque humores sensim, nullaque vi detrahant. Alvus sæpe clystere sollicitetur, qui in decocto emollientium habeat hieræ simplicis, diaphanici ana 3 vi. mellis anthos. 3 ij. olei rutæ & anethi

ana 3 i β. sextò aut octavò quòque die, pridie accessionis dentur catapota, quæ consent ex pulvere hieræ simplic. rheubarbari, aloës & agarici, quæ paribus portionibus malaxantur in syrupo absinth. sumatque pro dosi 3 i. vel 3 iv. Nonnunquam vice pilularum purgetur hoc syrupo.

4. Rad. apii, petrosel. fœniculi, & capparum, polypod. quercin. semin. carthani ana 3 β. agrimon. beton. hyssop. origan. lupul. ceter. thymi, epithymi ana manip. j. sem. anis. fœnic. & melon. ana 3 i β. fiat decoctio ad 3 xv. in qua infunde per noctem solior. fenn. mundator. 3 iv. agarici albi 3 ij. gingiber. 3 ij. bulliant mane parum & fiat expressio in qua dissolve sacch. albi lbj. Pareatur syrup. coctus ad perfectionem, & non clarificatus. Capiat 3 ij. pro dosi cum aqua bugiossi vel alia convenienti. Convenit interdum dissolvere in eo expressionem 3 j. rheubarbari electi infusi in vinò albo, ut sensim genus omne humoris separetur, vacueturque. Ita igitur istorum usus continuandus est alternis diebus, ut vix ulla prætereant, quin pridie vel clyster, vel pilula, vel syrupus adhibeatur.

Præparantibus syrupis non admodum fatigandus est D. Laborans, sed omnis præparatio idonea victus ratione tentanda. At quoniam interdum per accessiones bibendi necessitas urget, locò prisanæ aut aquæ hordei, vel alterius potus refrigerantis, & compingentis humores propiandum est oxymeli simplici Galeni, aut syrup. sacetous aquâ multâ dilutus: sed tamen parcus potus apprime utilis est, omnemque morbum breviorē reddit, at liberalior naturam occupat, revocatque ab humorum coctione. *Idem ibidem.*

Pro Juvene egregio tertiana intermittente exquisita laborante.

Juvenem propositum laborare febre nemo esset sanæ mentis, qui denegaret, corripitur namque calore quodam extraneo supra naturæ modum ad modum excedente, ac per totum diffuso. Verum cum ex febribus alia sit diaria, alia hectica, alia putrida; febris hæc erit de genere putridarum, quoniam symptomata, quæ spectantur in hoc patiente non ad febres diarias, non ad hecticas, sed ad putridas attinent. Et quoniam febrium putridarum alia est continua, alia vero intermittit, hæc quia rigorem sibi conjunctum habet, est de serie intermittentium, ac tertiana intermittens existit, non quidem notha, sed exquisita. Hoc autem ex forma, causis, & symptomatibus cum Galeno secundo de Crisi, secundo, facile deprehendo; Et forma priuam, quoniam æstus adest insignis, calor est acris, idemque cito movetur, atque durat circiter octo horas (hujusmodi enim tebris duodecimam horam non transcendit) ita causis secundo quoniam bilis dura peccat, quem-

quemadmodum vita antea acta, tempus anni æstivum, temperies biliosa, ætates Juventutis patientis ipsius persuadent; Ex symptomatibus demum, sicuti dolor capitis, sitis clamosa, rigor intensus, & non extensus, vomitus bilis tævæ sincera, ac urinx bilem flavam attestantes manifeste docent.

Causa interim immediata hujus febris est fuligo putrida cordi communicata, elevataque ex minera biliosa syncera putrescente in venis ambitus corporis, & quod ibi putrescat non solum sudor, verum etiam rigor in singulis suadere videntur, putrescit autem ob prohibitum transpiratum ab obstructione, generatur vero in hepate calidiori ob errores in sex rebus nonnaturalibus insignes perpetratos ad unicam bilis generationem idoneos.

Ut propterea scopi curativi sint refrigerare, & humectare, non solum ratione febris, verum etiam ratione jecoris fervidioris, præterea, & materiam putridam eradicare, putrescentem per refrigerantia, atque siccantia corrigere, obstructionsque refrigerare.

Quos scopos obtinere non erit impossibile, nec arduum quantum ego existimo. quoniam febris intermittit, itenique symptomata omnia, finita accessione finiuntur.

Deveniens itaque ad curationem, statuo venæ sectionem non probare, quoniam deficit sanguis, nihilominus occasione doloris capitis cucurbituli scarificatæ partibus internis applicietur, sicuti & frictiones, deligationes, & lavationes earundem non improbantur.

Quantum vero, ad pharmaca attinet primum lenienda est alvus syrupo violato solutivo cum decocto tamarindorum, præparandi sunt humores decocto endivivæ, acetosæ, lactucæ, ac hordei, addito in fine tantillo aceti propter obstructions; Purgandi denique sunt infuso Rhabar. & syrupo violato dicto, dummodo tamen sudor non prohibeat, prohiberet autem, ubi cum aliqua morbi remissione prosequeretur, quo in casu naturæ tanquam per se bene operanti totum esset opus curationis hujus febris committendum, Quod si forte fortuna progredietur quidem sudor, sed imminute admodum absque insigni alleviatione morbi, tunc ab aqua hordei cum cortice copiose in fine accessionis assumpta pro sudoris vigoratione, nullo pacto esset desistendum.

Atqui pro alteranti conveniet demum serum cum succo endivivæ, & lactucæ sumptum, exteriusque succo endivivæ, & serper vini cum aceto jecur persundi poterit.

Sed quoniam patientis de dolore capitis insigni, de sitique clamosa præsertim querelas habet, ideo pro dolore capitis frontale ex lacte cum succo limonum, vel ex oleo rosato completo cum aqua rosacea, & aceto addito ovo integro mihi videtur opportunum, & eo magis si syncipiti quoque hoc remedii genus adhibeatur.

Pro siti mihi arident stillicidium supra linguam ex aqua cisternæ frigida factum, aqua hordacea sumpta, quantum unico haultu sumi potest, vel aqua acetosæ, & violarum cum succo limonis; Huc pertinet loco ex mucilaginibus seminum psilii atque coroneorum cum succo limonis, & saccharo candido ex juleb

violato, frustra etiam cucurbitæ, & caules lactucæ saccharo condita, & in aqua cisternæ macerata supra linguam detenta mirum vaalent.

Sed inter cætera victus refrigerans est addendus, locetur igitur patientis in aere frigido, cujus census, si naturalis haberi minime poterit, arte erit præparandus, cujus occasione patientem inspirare supra vas magnum aqua frigida repletum maxime proncuium erit, quemadmodum & eundem vesci pitifana cum lacte seminum majorum frigidorum, necnon pane ex jure, lactuca, endivia, acetosa, & similibus alterato; Potus sit vini granatorum cum aqua cisternæ necesse est, reliqua vero omnia respondeant secundum proportionem. Et Deus patienti succurrat, sic etenim tuto, citoque, & non injucunde prædia modica operabuntur. *Julius Caesar Clandium in Consultationib. Medicin.*

Pro quodam Nobili Juvene febre tertiana continua notha proportionata correpto.

Quod juvenis propositus laboret febre ita de se constat, ut nulla penitus indigeat confirmatione, calet enim in toto pliusquam conveniat secundum naturam; Quod rursus febris hæc sit putrida ex præsentibus symptomatibus colligitur, quæ sunt perpetui comites febris putridæ, non autem diariæ, neque hecticæ. Et quoniam febrium putridarum aliz sunt continuæ, aliz intermittentes, febrem, de qua interim agitur esse continuam, quia est immunis a rigore, dignoscitur; Quoniam rursus continuarum aliz sunt continentes, aliz proportionatæ, febris nostra est proportionata, nam alternis diebus habet exacerbationem, sine qua febris continua continens existit, ut unica accessione contineatur; Denum quoniam febris proportionata, vel est tertiana, vel quotidiana, vel quartana, febris præsens est tertiana, nam pendet à bile, quod cognosco ab agri temperie, dolore capitis, siti, inquietudine, ac tempore anni æstivo, quæ omnia in unius bilis generationem, & collectionem conspirant; Verum ob vitam antea actam pituitæ, ac humoris crudi feracem (plurimum enim in usu fructuum, ac lactentiorum patientis deliquit) puto febrem hanc non legitimam, sed spuram esse constituendam.

Utrumque tamen causa immediata ejusdem est fuligo putrida cordi communicata, causa vero remota est minera biliosa, & aliquo modo pituitosa, à qua fuligo illa putrida elevatur, quæ quidem minera putrescit in venis mediis ob prohibitum transpiratum inductum ab obstructione illarum venarum, atque hanc obstructionem oriri tum à multitudine sanguinis, tum à crassitie, & lentore humorum existimo; A multitudine quidem sanguinis, quoniam patientis est temperamenti sanguinei subdominantis, hinc excremit quoque urinas crassas, & rubras; A crassitie, & lentore humorum ob vitam prægressam. Tandem causa remotissima est intemperies calida jecoris bilem multiplicans.

Quibus ita constitutis, ad Medicum attinebit refrigerare, & humectare, materiam putrefactam eradicare, putrescentem per refrigerantia, & siccantia corrigere obstructions per
eva.

evacuantiâ, attenuantiâ, & detergentiâ auferre, jecurque attemperare.

Cæterum intentum assequi, non erit undequaque tutum, febris namque est continua, nulla autem febris continua periculo vacat, & summa cura ratione, quoniam sub ea major est recessus a statu naturali, putredo est in venis, plura sympt. nata conjunguntur, imminet tabes, & vires læpius non reſtitunt.

Ideo (quintum ad materias medicas attinet) omnis prorsus diligentia est necessaria, quare lenita prius alvo clysteri venam cubiti dextri secandam esse statueram, & si febris ultro progrediretur, ita ut vigesimum diem transcenderet, & salvetelam sinistra manus secari posse non absque fructu putarem. At si opus fuerit ob capitis dolorem, extrema fricari, deligari, atque lavari poterunt.

De medicamentis verò statuo, ut leniatur alvus ante venæsectionem clystere ex decocto hordei, & herbarum communium, oleo, melleque violaceis, saccharoque rubro parato; post venæsectionem cum syrupo rosato solutivo, & fero, addito modico mellis rosati solventis. Deinde pro humorum præparatione probò decoctum ex sonco, endivia, acetosa, hordeo, & boragine, adjecto modico aceti in hunc, interdum verò serum depuratum copiosum, & cum succo cicorii, ac acetosa datum ad remittendum fervorem febilem non improbo. Et ad humorum evacuationem omnibus præfero infusum Rhabbarbari, & modicum Agarici troscicati cum syrupo rosato solvente, postquam evacuationem alterantibus uti licebit, inter quæ ego primum omnibus præfero idem serum cum succo sonchi deinde laudo conservam cicoraceam cum pulvere confectiõis ex tribus sandalis. Exterius valet irrigatio hypochondrii dextri cum succo sonchi, endivie, & aceto cum pulvere sandalorum. His non conferentibus, ac febre ultro progrediente, necesse erit deobstruentia mediocriter propinare, inter quæ mihi arridet, vel p̄isana facta cum radice Apii rec. vel oxymel simplex cum jure pulli decoctionis agrimonii, vel decoctum agrimonii, Capillorum ven. citrac, radicis Apii rec. cicorii, & boraginis cum aceto, quibus non conterentibus, ad trosciscos de Rhabbarbaro, de eupatorio, de rosis, & de absinthio deveniendum, tandem repetenda purgatio pilulis de Rhabbarbaro, vel aggregativis, adjecto item Rhab. Febreque progrediente, & absente prohibente, balneum aquæ dulcis omnino laudarem; Ac viscera tandem corroboranda Diarrhodone Abbatis, & confectiõne ex tribus sandalis.

Pro victu autem primum eligendus est aer frigidus, deinde nutriendus est æger P̄isana, & panis ex jure pulli; pro potu vero dandum est vinum granatorum aqua dilutum, quo pertinet & decoctum prunorum, vel passulorum. Alvus mollis est servanda clysteri jam dicto, somnus (si fuerit opus) lacte seminum papaveris cibariis immixto conciliari poterit, Demumque corporis, & animi quies imperabitur. Et hæc Deo auspice cedant in salutem ægrotantis. *Idem ibidem.*

Pro Illustrissima Beatrice Estensi de Bentivolis Parvo hemitriteo, febre inquam putrida quotidiana continua, necnon tertiana intermittenti, ac puerperio imminuto laborante.

Postquam à viris clarissimis constitutum fuit, Excellentissimam Matronam a sexdecim diebus febre laborare, & a septem jam puerperam esse, habuisseque partum in mense octavo, qui per bi-duum tantum vixit, mihi interim meas partes agenti quatuor erunt examinanda. Primum qualesnam sint illi proprie affectus, qui eam infestant. Secundum an sint sanabiles, Tertium quibus remediis. Quartum quibus remediorum materiis.

De primo statuo febrem, & hanc ipsam putridam (ut fatentur omnes) necnon puerperium valde imminutum esse vitæ, quæ Illustrissimam Matronam affligunt, & circa quæ mihi interea est digrediendum, ea tamen ratione, ut cum Galeno initio primi ad Glauconem ex incedendi Methodo remediis illis convenientia invenire, inventisque recte uti possim: sed cum remedia varientur pro varietate essentiz, ac existentiz morborum, idcirco morbi propositi considerandi erunt quoad propriam tum generationem, tum lesionem, nam illa ad essentiam, hæc verò ad existentiam attinet; Ad hæc quoniam generatio supponit quidditatem, & morbi cadunt cum intentione, seu remissione, sub aliquo nomine, ac in tempore præfixito, ideo non tantum mihi de quidditate, & principis generationis horum morborum est agendum, verum etiam de intentione, more, ac tempore, seu motu, nam tempus, ut numerus morus, ex motu innoscitur.

Ut igitur a primo exordiar, ad febrem me convertito, quam tanquam putridam ab omnibus receptam & ipse recipio; verum quoniam febrium putridarum aliz continuæ, aliz cum intervallo affligunt, febrem hanc nunc esse mixtam naturæ puto continuæ namque affligit, ut nemo jugi pulsus frequentia, celeritate, ac inæqualitate febrium putridarum proprius ductus negare potest, cum intervallo autem, quoniam alternis diebus horror quidam invadit, qui à continuis, ex Galeno, non modò si intensus, sed etiam perseveret est sejungendus. Ut ex his pateat, febrem hanc interim esse de genere hæmitriteorum, nam primis diebus fuit febris tertiana simplex interpolata, sed valde extensa.

Et si quis objiceret nunc forsan etiam extensam esse, ac paroxysmum alterum alteri subin-gredi. Dicerem primum non dari tertianam quæ novum paroxysmum attingat, nam accessi-tertianæ ad quadraginta horas tantum extenditur, & amplius extensa dicitur. Secundo, dato quod hoc esset, jam non appareret ratio, cur ea die, qua horror non accedit, febris præsens circa Vesperas exacerbaretur, cum accessionem præcedentem cum horrore ingruentem suam exacerbationem citius habuisse par sit.

Febris igitur nostra est composita ex quotidiana continua proportionatæ, ac tertiana intermittenti, qui complexus semitertiana etiam, atq; parvus hæmitriteus vocari solet ad medii, & majoris hæmitritei, differentiam ille enim ex tertiana continua, & quotidiana intermittente, hic

vero

verò ex tertiana continua, & quartana intermittente componitur. Nostri autem parvi hæmorrhæi meminit Hippocrates primo Epid. Commentario primo to II. 13. & primo ejusdem Comm. 3. Tex. 1. qui cum duplex sit, exquiritus, & non exquiritus, ille sit ex pituita, ac bile ex æquo putrescentibus, hic verò ex eisdem humoribus, quorum unus alteri dominatur.

Pituita. n in Illustrissima Matrona prædominari, ab hora motus, nam febris quotidiana putrescentis pituitæ soboles circa Vesperas (quo tempore pituita movetur) exacerbatur, item ab urinis, & alvi excrementis pituitosis facile est intelligere, in cujus confirmationem facit sitis non molesta, & mador quidam lentus, ac viscidus per totum erumpens, vita sedentaria, atque etiam totius habitus sub pituitosis, quinimo (ut accepi à Viris Doctissimis) non tantum excrementa potissimum alvi sunt succo pituitoso, & hoc ipso vitreo referta, verum etiam & vomitus, quem superioribus, diebus Nobilissima Patiens habuit, eodem penè humore scatebat, quibus omnibus & illud addo, quod Mulieres utero gerentes hujusmodi succi coluviam ob menstrui retentionem vitiata prima coctione sibi comparare solent, ut ex his alieni mirum videri non debeat, si Nobilissima Matrona utero gerens in fine septimi mensis, generationem prædicti humoris excrementitii, & ab hujus generatione febrem quotidianam incurrit, quæ (ut illud etiam non omitam) videtur quoque sapere naturam illarum febrium quas Galenus contra Lichum, Iphodes, & Siles vocabat, sub quibus ægrotantes fere jugiter sudant.

Ceterum, tertianæ febris notæ, sunt quæ bilem putrescentem ostendunt, calor inquam satis mordens, qui alioquin mitis esse ob pituitæ copiam deberet, atque hic circa meridiem, qua hora bilis movetur, accedere solet, dolor etiam capitis punctorius, vomitus biliosus, sitis aliqua, quamquam non molesta ob pituitæ præsentiam, ætas primi floris, atque Archigenis conjectura, quoniam scilicet istis diebus tertianæ vagatæ fuerunt.

Atqui dicet ille tertiana hæc dubio procul erit de genere notharum propter pituitæ redundantiam, ita ut tertiana majoris famæ dici mereatur, quo dato jam insignis occurrit difficultas, quod videlicet cum denominatio fiat à prædominanti, & pituita, ut statutum fuit, longe, lateque prædominetur, potius febris hæc intermittens quotidiana, quam tertiana vocanda erit.

Dico respectu febris quotidianæ pituitam non tantum copia, sed etiam virtute dominari, respectu autem tertianæ copia tantum, bilem verò virtute; modò denominatio à prædominio virtutis fieri debet, & summa cum ratione, idè cum bilis in casu nostro secundum virtutem prævaleat, jure febrem propositam tertianam dixi.

De puerperio ita sentio, ut citra omnem controversiam sit imminutum, quia tametsi Illustrissima Fœmina non sit sanguine repleta, ut hæc ratione non videretur hoc mali genus pati posse, nihilominus, quia jam septem tantum dies à die partus distat, puerperium adhuc emanare debere rationi esset consentaneum, &

eò magis, quoniam corpus illius valde cacochimicum pravisque succis redundans observo, quibus accedit quòd ultra solitum multa Nobilissima Patiens existit, quæ duo hoc morbi genus insequi solent.

Cum igitur hæc sint vitia curanda, puto ea ipsa à communis causa, unica nempe pituita pendere, hæc enim in venis ad uterum attinentibus recepta parit obstructions, à quibus expultrix uteri impedita in proprio opere frustratur, atque sic puerperium, quod est symptoma secundarium in genere excretorum in quantitate decenti non expellitur. Rursus eadem pituita in venis mediis totius corporis suscepta pariter illas obstruit, transpiratum prohibet, putredinem in pituita, in eisdem venis existente, parit, à putredineque tum exultanti cordi communicantur, hinc occasio febris quotidianæ continua proportionata; nam, ut omnes norunt, in febribus continuis proportionatis locus putredinis sunt venæ mediæ; Ad hæc eadem pituita per venas capillares ad ambitum corporis attinentes propagata, similiter illas obstruit, & modo jam dicto febrem in humoribus pituitoso, ac bilioso simul mixtis accendit.

Et si quis quæreret, quo modo fieri possit, quod in venis mediis aliqua bilis portio non subsit, quoniam in his febribus absque dubio humores ii simul mixti transmittuntur à venis majoribus ad medias & capillares, nam febres cum accessionibus pro majori parte ortum habent à transmissione materiæ.

Dicere. n id contingere, quoniam transmissio bilis, & pituitæ simul non fit eadem hora, quæ transmissio pituitæ tantum, quoniam bilis propter sui acrimoniam facultatem expultricem irritando, est sibi met causa, ut ad venas usque extremas expellatur, cui favet & agilitas ejusdem humoris ad motum, necnon habitus corporis admodum rarus.

Et si rursus aliquis quæreret, cur non fiat rigor, sed parvus horror, ac frigus, quando bilis ob rationes dictas soleat rigores efficere.

Dicerem hoc evenire, quoniam portio bilis, quæ à venis capillaribus ob concitatum motum expultrici egredietur, ac per partes sentientes discurrit, permixta est cum aliqua pituitæ tenuioris portione, à qua & ipsius acrimonia, & ad motum promptitudine imminuta rigor de more non succedit.

Jam verò febrem hanc ratione saltem Symptomatum concomitantium nullam intensiorem habere existimo, quando hæc ipsa in casu nostro nullam magnitudinem præ se ferant; non nego tamen ratione essentia, qua scilicet febris duplex est, atque altera continua existit, magnam dici posse.

De more illud pro certo habeo, quòd nimirum febris proposita sit bene morata, atque à malitia immunis, nulla namque Symptomata, quæ pravitati attestantur, hucusque magna supervenerunt, magna inquam, & in propria essentia, & ratione præstantia partis laborantis, ac malæ tolerantia.

Tempus autem ejusdem febris ex motu morbi, motus ex alteratione; & coctione materiæ, coctio autem, ex Galeno nono Meth. capite quinto, non tantum ex urinis à posteriori, verum etiam à priori ex pulsu innotescit; Quare

Cinamomo, absinthio, & maniche in duplici vase ebullito, & facta colatura adjectis lacto absinthii concreto, & cera. Ceratum quoque ex mastiche cum aromatis antiquot maxime proderit; Atque his non contentis ad stillicidium ex oleis cum simplicibus stomaticis, ac aromatibus, bezoino, myrrha, & ligno sassafras medicatum erit deveniendum.

Quibus omnibus & victus compar adjiciatur oportet, quare maxime aridet, ut prosequatur in usu pituitum. quam audio pipere medicatum esse, laudo etiam ut ferculis utatur cum ovo, atque acetario cichoraceo cum floribus boraginis, in progressu autem ex Capparis salitis erit opportunum, & sicuti nunc juribus sunt incoquenda pimpinella, & acetosa, ita posthac petroselinum, feniculum; Bibat interim Nobilissima Patiens jusculum tenue, febris enim, & materix copia, atque cruditas, vinum prohibent, sicuti puerperum aquam verat; At febre remittente, cocta materia, atque etiam minorata vinum fuvum, aut etiam sububrum propter consuetudinem tenue, pauciferum, & non auterum concedatur: Alvus in proprio munere servetur clysteribus alternis diebus injectis, paratis ex decocto communi adjecto turture in linteamine deligato, ex melle ros. sol. o. eo communi, saccharo rubro, ac similibus, quibus in progressu & hieram simplicem adhibere præstabit.

Amplius danda est opera, ut animo, & corpore Illustrissima Femina quietetur, & si aliquando sub hoc morbo corpus eliet exercitum, exercitio substituantur tractiones, quæ meo iudicio, sicuti & alia omnia Deo annuente Nobilissimæ Matronæ sanitatem restituent. *Idem ibidem.*

De Febre Lenta, dolore ventriculi, & macie insigni totius corporis Pro Nobili Matrona.

Ex disertissimis scriptis Viri Præclarissimi conitat apertissime, Nobilem Matronam quadragenariam de duobus præcipuis affectibus conquestam esse, dolore scilicet ventriculi cum rugitu, & febre lenta cum insigni corporis macie. Pro quorum dejectione pura Medici præsidia successivis temporibus tuerunt à Viro Præclarissimo ex methodo proposita, summaque cum utilitate administrata; sed ob inordinatam victus rationem omnia in deterius lapsa sunt, perseverante febre cum macie, & forsitan cum dolore ventriculi & rugitu; itaque de agendis consultitur.

Quod ut pro virili præstemus, statuendum censemus, non solum ab incomposita victus ratione, sed & ab inordinata mensium purgatione, omnimodaque eorundem suppressione in tempestiva, omnia cum præsentia, tum præterita mala originem traxisse, reducere, & adhuc foveri, & conservari: Mensibus enim deficientibus, morbi sunt ex utero, Divini senis testimonio. Impurus namque sanguis, & à prædominio melancholicus in Nobili Patientæ genitus à jecore præcalido, & in corpore detentus, labefactare potest calidum innatum, non ventriculi tantummodo, cui maxime consentit uter, sed & totius venosi generis, hincque dolores, rugitus, febres, totiusque corporis ma-

cies, non sine suspitione melancholix hypochondriacæ.

Qui provide affectus cum ex sui natura, tum ex victus incontinentia difficillimæ curationis erunt. Veru tamen cum antehac beneficio remedium administratorum semel atque iterum recesserint, sperare quinetiam possumus, fore ut iisdem repetitis omnino tolli possint, cum habeamus ex Avicenna, quod illa remedia, quæ semel assumpta juverunt, repetita sanare possint. Dubitare tamen quis facile posset, utrum ventriculi dolor à viginti annis per intervalia recurrens, proveniret à materia pituitosa, & cruda, vel ab humore melancholico ad ventriculum transmissio: ab utroque etenim morbi diuturni provenire possunt. habitusque corporis, & aversio à vino id suadere possent. Attamen si à juvenibus & lædentibus indicia sunt deservenda, cum referat Vir Excellentissimus, quod in juventute dolores accesserunt abque ulla mentium imminutione, vel inordinato cursu, quodque aqua Teturtiana, Chinæ decoctum & stillicidium stomacho his administratum quam maxime juverunt, cum filiam pepererit, dolorque omnino remiserit, & ad proprias functiones absque ullo impedimento redierit, in eam inclino sententiam, quod potius proveniret à materia pituitosa: non negando tamen jecoris fervorem, ventriculi imbecillitatem, & sanguinis impuritatem, ac obstructions venarum uteri, placiei, & febriculæ lentæ occasionem desiste.

Quare suaderem, ut Nobilis Patiens præmissa corporis expiatione, sanguinis detractione tum ex saphena, tum ex hæmorrhoidibus, repeteret aquam Teturtianam, & decoctum radicis Chinæ cum santalis & lentisco, paratum cum columba turricola, utque iterum fiat stillicidium ventriculo ex oleis stomachicis, dum sumus in hoc anni tempore ad frigidum properante. Interim tamen laudarem ut singulis mensibus aperirentur venæ sedales in plenilunio; & tandem, ut vere ad ætatem vergente, repetita purgatione, daretur serum lactis caprini, modo depuratum, cum syrup. de pol. tanquam dejectorium, modo destillatum cum syrup. capillorum ven. tanquam diureticum, pergendo in missione sanguinis ex venis sedalibus; & post horum usum, ut denuò admitteret lac humanum: in morbis enim longis, longa quinetiam medicatione opus esse censeo. Et hæc sunt, quæ annotanda duxi. Faxit Deus, ut sine cum juvamento Nobilis Patientis, alvo interim lubrica servata familiari aliquo medicamento. *Benéd. Silvaticus Consil. & Respons. Medicin. Cent. 1.*

De Febre Mali Moris. Pro Illustrissimo Abbate Gualtiero.

Illustrissimus Abbas quinquagenarius, habitus gracilis, hirsutus, venosus, gravibus negotiis addictus, diuturnæ scripturæ, hacque occasione cutis constipationem perpeffus, ob ambientis frigiditatem, hora vigesima secunda, parum riguit, & incaluit; die secunda bene habuit; tertia pransus cum Eminentiissimo Legato, à prandio in curru cum eodem riguit, evomit cibum, & pituitosa excrementa, decubuit, & magis incaluit; quarta dies quæta: in quinta rigor vehemens circa deci-

nam quintam horam, febrisque valde calida, urinx crassæ, rubræ, non subidentes; sexta vesperti sine rigore incaluit, accessitque dolor o tocopos in femoribus, & cruribus valde molestus, ictericus fuit, cui tamen ictericæ dicitur obnoxius: septima rediit febris cum rigore, & cum levi lipothymia, urinx fuere copiosæ: octava sponte biliosa deiecit, vespertine magis incaluit sine rigore; nona levis rigor, horror, refrigeratio postponens per quatuor horas circiter; ac deinde incaluit, denique biliosa deiecit; decima perseveravit febris cum obscura annotatione; undecima visus est melius habere, nulla observata manifesta accessione, febre tamen semper durante, quæ continuè diebus subsequenter perstitit, ita tamen ut horis matutinis visus sit magis febricitare quam vespertinis, lingux siccitas ferè continua: urinx modo minus coloratæ, modò colorem intensiorem habentes, hæque vel sine contentis, vel cum obscuro suspensio, vel cum crasso, & inæquali sedimento: pulsus modò parvi, modò majores, inæquales, celes, & frequentes: somni in primis diebus insomniis turbati, mox quieti, & ita faciles, ut comatosus videretur; quando tamen excitatur à somno promptissimus est ad actiones omnes animales cum principales, tum sensitivas & motivas; post decimanquartam urinx sanorum similes, pulsus minores, & sic protractus est affectus usque ad vigesimum cum febre continua, obscurissimis accessionibus, extenuatione corporis, & cum imbecillitate virium.

Pro ipsius curatione sexta die leniens exhibitum biliosa purgavit; octava sanguis eductus ex venis fedalibus; decima præmisso Clystere cucurbitulæ scarificatæ dorso, & lumbis fuerunt applicatæ. Alterantia, & Bezoartica non omissa; undecima Clyster mollis denuò præscriptus, a quo tardè, & parum purgatus fuit; decimatertia syrup. ros. solut. clarificatus præscriptus nil purgavit: propterea vesperti præscriptus fuit Clyster acris ex pulpa Colocynthi cum centaury, melle rosat. solut. & hiera Logadii, ex quo habuit dejectiones biliosas in copia; decimasexta iterum Clyster acris injectus, præmissa unc. i. flor. Cassiæ, & scrup. ii. pilularum ex Aloe, hincque etiam copiosæ dejectiones biliosæ; duo etiam adhibita vesicantia; decima octava ante diluculum sumpsit serum caprinum depuratum ad libras duas: postea denuò præscriptus Clyster acris cum electuario de succo colarum, loco hieræ, & cum aliis jam præscriptis, vomuit biliosa, & pituitosa, & deiecit biliosa valde corrupta, & foetida, hincque major virium prostratio, quæ tamen decimanona die parùm refectæ sunt.

Febris hæc quemadmodum communi Clarissimorum Virorum consensu, duplex tertiana continua spuria iudicata fuit, ita in dubium revocatum an continua essentialiter, & maligna semper fuerit, an primis saltem diebus fuerit continua per subingressum paroxysmorum, non autem essentialiter talis, & benigna: communior tamen fuit opinio ipsam fuisse in tribus primis paroxysmis tertianam, & subsequentibus, usque ad undecimam, duplicem tertianam continuam per subingressum paroxysmorum, non autem essentialiter, quod

ex rigore in paroxysmorum principio apparente fuit continuatum, juxta Hippocratis doctrinam in Aphorismis dicentis: Quibus quotidie rigores sunt, quotidie febres solvantur. Etenim rigor in febribus apparet vel invadit in principio ipsarum accessionum, vel in progressu febrium continuarum, vel perseverat inæqualiter per totum paroxysmum, & febris progressum. Quando invadit in principio singularum accessionum, non potest non arguere febrem ex natura sua intermittentem fore, propter transiitionem materiæ morbinæ per partes sentientes, quæ possunt esse tum ambitus corporis, cum Alimento, tum viscera naturalia, cum Fœtulo, præsertim si repetat singulis paroxysmis. Nam aliquando incipit febris cum rigore, quæ tamen est continua, & symptomatice, dependens scilicet ab inflammatione pleuræ, vel alii tum partium sensilium: siquidem in principio ipsarum inflammationum, dum materia transmittitur a venis ad partem affectam, rigorem inter; sed talis rigor non amplius repetit: ac quando rigor ipsas febres subiequitur, id fit vel critice in febribus ardentibus salutibus, juxta Hippocr. in Aphor. A febre ardente habito rigor superveniens bonus; vel symptomatice in lethaliibus, de quibus idem Hippocrates. In febre non intermitte rigore superveniens ægro jam debili, lethale. Quod si rigor inæqualiter invadat, hoc utique fieri potest etiam in continuis malignis, quas horricas vocat Galenus, necnon in febribus semitertianis, à Græcis Hemitertianis dictis.

Cum itaque in casu nostro rigor per quinque paroxysmos tertio quoque die sese manifestaverit, luce clarius constat, febrem hanc de genere biliosarum periodicarum intermittentium fuisse, ideoque non immerito vocatam fuisse duplicem tertianam spuriam, continuam per subingressum, ex sua tamen natura intermittentem, a bile prædominante, cum magno subdominio cum pituita, tum melancholæ: humoresque hos non putruisse tunc temporis in venoso genere; quoniam habemus ex Galeno in secundo de differ. febr. ultime, quod quibus per circuitus ægritudinum accessiones sunt, in his partem aliquam esse affectam necesse est. Pars autem affecta in casu nostro fuit hypochondrium dextrum, & fuere viscera naturalia. Propterea dejectiones fuere biliosæ, & continuò apparuit lipothymia, quæ successit transmissa prædictæ materiæ portione ad os ventriculi. Imò & lingux siccitas aliqua ex parte id confirmat, quamquam & narum angustia respirationem impediens possit esse causa quod lingua, & fauces siccescant. Tunc autem temporis, quando febris fuit de genere intermittentium, benigna quoque censenda fuit, saltem quoad excellentiam putredinis: siquidem si respiciamus symptomata assidentia, & supervenientia, negari non potest quin mali moris extiterit. Illa enim ictericia ante septimam apparens, illa urinarum crassities, lipothymia, & dolor ostocopos non possunt non præ se ferre malum aliquem morem prædictæ febris. Cæterum sicuti usque ad undecimam sapuit naturam intermittentis, ita in illa die, dum melius habere visus fuit, de-

generavit febris in continuam essentialem. Natura enim gravata à sarcina materiz, qua premebatur, & à mala qualitate humorum atrabiliarium, quibus leatet hoc corpus, non potuit amplius detrudere materiam extra venas, prout antea fecerat, cum præsertim serositates in septima pro majori parte fuerint evacuatz: ideoque facta fuit febris continua, periodica tamen, sed ex illis, quæ accedunt magis ad naturam continentium, propter obscurissimas annotationes: propterea licet remiserint accidentia præterita, quo nomine melius habere videbatur, non tamen melius habuit; sed Illustrissimo Patienti evenit id, quod & Hermocrati ab Hippocrate descripto tertio Epidem. qui undecima melius habere visus fuit, & decima quarta fuit immunis à febre, nihilominus in vigesima septima obiit. Dum autem facta est continua, dumque natura gravata fuit ab humorum prædictorum copia, & mala qualitate, destitit ut plurimum a concoctione humorum peccantium, languente calore nativo, ideoque remisit quinque tantum calor febrilis, & vehementia symptomatum.

Nihilominus tamen in dies vires magis labuntur, ut propterea suspicari possimus de Hermocratis eventu, quod Deus avertat.

Interimque agendum, & intelligendum primo & principaliter virium conservationi, cum natura sit morborum medicatrix; & quia virium imbecillitas provenit à copia, & mala qualitate humorum, incumbendum erit revellentibus, evacuantibus, & bezoarticis corroborantibus cor.

Atque ideo præmissa sanguinis detractione antea à Viris Præclarissimis præscripta, non erit abs re cucurbitulas cum flamma infernis partibus aliquando repetere: vesicantia femoribus, & brachis applicare, frictioneque toti corpori, cum inunctione Aethi administrare, non omnia repetita alvi purgatione, etiam cum acris clysteribus horis minoris afflictionis. Bezoartica tamen temperatiora principem locum obtinebunt. Cujus generis erit aqua ex succo acetosæ, de ruta capraria, ex scorcionera; Juleb genimatum, lapis bezoar, aqua cordialis Magistralis Saxoniana; conferva ex acido citri cum cornu cervi uto, & margaritis præparatis; aliquando Mithridatica confectio in parva quantitate, confectioque de hyacintho, abstinendo ab omnibus adstringentibus, ab impense calefacientibus, & exsiccantibus, ob continuam linguæ siccitatem, internam phlogosim indicantem; ob quam serum lactis caprini destillatum cum succo citri, pitana hordeacea, emulsionisque seminum frigidorum proficient summopere; sicuti potus loco aqua hordeacea, aqua fragorum, & humectantium in ore detenta ex usu erunt; non omnis externis epithematibus, & inunctionibus cordi, & jecori appositis Viris, Præclarissimis notissimis, quæ propterea lubens & volens omittenda duxi. Faxit Deus ut ad vota succedant. *Idem ibidem.*

De Febre Populariter Bergomi Grassante ad Excell. Medicorum Catum jussu Illustrissimi Johannis Grimani Urbis Prætoris, Responsum.

Temporibus inconstantibus morbi equidem

sunt inconstantes, dummodo illorum perduraverit inconstantia: sed quando ipsorum inæqualitas uniformis aliquandiu perstiterit, prout factum est per duos annos fere continuos, ut qui plurimum fuerunt aultrini, ventoli, frigidi, pluvii & cum maxima aquarum illuvie, morbi supervenientes constantes apparent, & fere uniformes: cujusmodi sunt febres hoc tempore grassantes, non Bergomi tantum, sed Bononiæ, Venetiis, in Foro-Julienti, agro Patavii, Vicentiæ, & fere ubique locorum. In his enim omnibus locis populariter sævierunt febres, non quidem verè pestilentes, quia licet multos intertulerint, ut plurimum tamen fuerint salutare, nec alicui (quod fuerit observatum) communicatum sint contagium: sed sunt ardentes spuriz, ad continentium naturam accedentes, invadentes cum dolore capitis, colli, lumborum, & totius corporis, perseverantes cum siti, vigiliis, comate vigili, paraphrenitide, & aliquando cum vera phrenitide, vermibus, & cum peticulis erumpentibus plerumque rubris, aliquando violaceis, nigris, diversis temporibus, ut plurimum circa septimam & in puerulis; cum morbillis & variolis, & urinis tenuibus, aliquando crassis, & turbatis, & cum aliis accidentibus malum morem harum febrium committentibus; hæque febres viros magis quam mulieres affligunt, eosque ut plurimum intra secundum senium constitutos, si præsertim plethorici, biliosi, aut melancholici fuerint, si locorum humidorum fuerint incolæ, si incompositè vixerint, immodicè incaluerint, veneri indulserint, vitiosæve succis redundaverint, raro claustrales, tanquam minus incompotè viventes.

Harumque febrium sicuti causa adæquata fuit vel insignis exustio, vel excellens & vera humorum peccantium corruptio, aliquando superante natura, aliquando eadem superata: ita causa communis fuit inæqualis aeris intemperies, quoad activas qualitates, cum excessu humiditatis quoad passivas; Hinc enim accidit ut caput pluribus humidius sit redditum quam conveniat, & interna viscera vitiosis humoribus cujuscumque generis, a prædominio tamen serosis & binosis fuerint repleta, impeditaque ipsorum ventilatione cum à cutis consolidatione, propter ambientis frigiditatem, tum ab internis obstructionibus, computruerint, & putrescendo febrium prædictarum causæ fuerint, cum enarratis symptomatibus, pro varia parte affecta, & diversitate dispositionis viscerum principalium. Foveri quidem potest hæc febris ab annonæ charitate, cuius merito facta est maior congestio vitiosorum humorum: hancque ob causam pauperes febricitant magis quam divites, & frequentius intereunt: non tamen annonæ charitas fuit causa principalis harum febrium, ut quispiam fortitan suspicari posset, non enim divites his febribus fuissent correpti, ut potè qui annonæ charitatem non fuerunt experti.

Originem autem habuerunt hæc febres ut plurimum à putredine circa viscera naturalia, ideoque & vermes fuerunt excreti, & diarrhoeæ non raro subsecutz, cum criticæ, tum symptomaticæ: fere tamen semper sese insinavit putredo in totum venosum genus, non sine aliqua pul-

pulmonum inflammatione, ut apparuit ex dissectione cadaverum: hincque factum fuit, ut fere in omnibus apparuerint peticulæ, pluribus supervenerint sudores aliquando diaphoretici, non raro salutare, & fere omnes indicati sunt per urinas copiosas.

Quæ cum ita sint, sperandum etiam est, morbum hunc pestilentem non futurum, dummodo austriacæ constitutiones tamdiu non perdurent, ut hinc aer non solum intemperatus fiat, verum etiam corruptionem & putredinem concipiat per admixtionem vaporum putridorum. Quod ne fiat, ventilationes, ignis accensionem, viarum mundities, & diligentes cadaverum humationes erunt necessariæ.

Pro curatione autem harum febrium, instendum duximus refrigerantibus, exsiccantibus, divertentibus a partibus principalibus, deobstruentibus, bezoarticis, & vires conservantibus.

Ideoque inter Chirurgica præsidia principem locum deberi censuimus venæsectioni, dummodo vocati fuerimus statim in principio, in ætate vigente, non præcedenti immo dico veneris usu, vel simili quopiam vires prosterne, & hoc nomine sectionem prohibente. In febribus enim omnibus putridis, internis inflammationibus incipientibus, & obstructionibus internorum viscerum, nullum magis accommodatum remedium excogitarunt veteres venæsectione. Neque obstat, incipere putredinem a visceribus naturalibus, vel in his febribus adesse exanthemata, aut superventura. Per venæsectionem neque trahuntur humores a visceribus naturalibus ad venas, neque impeditur transmissio ad cutem, quando pauca sanguinis copia detrahitur, ut faciendum censemus; imò potius sequitur id quod dixit *Galenus 2. Aphor. 29.* quod scilicet natura levata ab eo, quo veluti pondere premebatur, reliquum materia facilius vincere valet. Si enim *Galenus 2. in 6. epidem. 30.* expendens historiam Simonis ab Hippocrate descriptam, in qua apparet quod Simoni lata apparuerunt exanthemata, dixit, etiam in hoc casu convenire purgantia, & venæsectionem, non quidem ad evacuandam materiam ad cutem transmissam, sed ad tollendam humorum superfluitatem in venoso genere existentium, antequam topicis evacuetur materia ad cutem transmissa, cur & nos venam secandam non censuimus in febre ardente, acuta, viribus permittentibus, antequam materia transmissa fuerit ad cutem: eligimus tamen potius salvatellam dextræ manus quam jecorariam, ob minus virium dispendium. Quod si vires non permiserint venæsectionem, in hoc casu venarum sedalium apertionem laudamus, quamquam non fuerint innata, cum ratione revulsionis a partibus principalibus, tum ratione evacuationis à venoso genere, antequam ad topica deveniamus; paulò tamen postea cucurbitulas cum scarificatis tum non scarificatis lumbis, & infernis partibus sæpius applicandas censemus; frictiones & inunctiones iungimus, dummodo natura non tendat excretionem materiae per alias partes corporis. Vesicantia præsentaneum & tutissimum remedium semper fuisse: ideoque nullo modo prætermittenda, si præsertim materia impetum habuerit ad caput, ad cor, & par-

tes spirituales, dummodo non adsit aliquod urinae impedimentum, tunc etenim vel non applicanda, vel non ex cantharidibus, sed ex ranunculo, aut flammula.

Inter pharmaceutica laudamus quam maxime blandas alvi subductiones, quando natura non transmittit cum in petu ad cutem, omniumque maxime largas potationes aquæ hordeaceæ, aut feri lactis caprini, cum spiritu chalcanti: refrigerant enim, sitim sedant, urini movent, sudorem alliciunt, & omnibus intentionibus mirifice satisfaciunt, non omittis bezoarticis illis, quæ vel non sint calida, vel parum, nec sint valde adstringentia: inter quæ unusquisque sibi eligit illa quæ sunt magis familiaria. Medicamenta ex citro sunt tutissima, ideo Venetiis paratam habent aquam ex toto citro, qua familiariter utuntur: Margaritæ præparatæ, cornu cervi, sunt exsiccantia.

Diuretica, sudorifica, temperatissima. Conf. hyacinthina sine anibra, Aqua cordialis Saxoniæ: Pulveres Bergomenses Masticiales, Juleb. gemmatum magnum D. Gelatina ex cornu cervi, & alia. Inter externa oleum scorpionum Matthioli, vel quid tale.

Victum non exquisitè tenuem laudamus, præ cæteris commendatur ab omnibus præstans hordeacea. & in progressu morbi, facta corporis evacuatione, vinum oligophorum interdiciendum non censuimus, sicque progrediuntur in harum febrium curatione. *Idem ibidem.*

De Morbo Epidemico Luca Grassante. Ad Præclarissimum Virum Franciscum Mariam Florentinum, Medicum Lucensem, pro Republica Responsum. Anno 1648. mense Augusto.

Morbi grassantes in Nobilissima Urbe Lucensi, ipsiusque agro, necnon & in Hetruria, inter epidemicos absque dubio sunt reponendi, si non ratione essentia, quo nomine sporadici potius dicendi forent, cum plures afficiant sub diversa forma, synochi scilicet, hemitritici, ardentes, tertianæ, ephemeræ cum variis quintæ symptomatibus: ratione tamen causæ, epidemici & communes sunt dicendi, utpote qui à causa communis ortum duxerunt, aëre scilicet valde humido, & in ætatis inæquali, modo calido, modo frigido, qualis ab autumno præterito ad hodiernam usque diem perduravit.

Et quia hic affectus magis viguit in planicie, quam in montibus, ubi magis ventilatur aer, hinc factum est quod in montibus degentes non ægrotaverunt; ægritudinesque variæ extiterunt, pro diversa patientium temperatura, & varia victus ratione. Sicut enim excedens aëris humiditas corpora afficiens ea disposuit ad putredinem, cum humiditas sit putredinis subjectum, putredoque hæc sese insinuavit in humores in corporibus prædominantes, eosque vel sanguineos, hinc synochi putridæ, vel biliosos, hinc ardentes, & tritrophes, vel cum pituitosis putrescentes, hinc hemitritici. Nec solum variæ fuerunt febres, pro diversitate humorum, sed etiam, pro diversitate loci, in quo putrescunt. Hanc ob causam bile prædominante, modo facta fuit ardens, dum putruit in venis, modo tertianæ naturam referens, dum putruit in parte determinata, vel in carnibus ipsi;

circa

circa quas serositas biliosa inventa fuit in copia, dum facta fuit cadaverum dissectio. Nec solum variz febres fuerunt iustortæ, varia etiam symptomata fuisse, concomitantia, & supervenientia, pro varietate loci in consensum trahi à materia putrescente. Dum enim impetum habuit ad e put, dolores ejus, comatoz affectiones, vigiliz, deliria successerunt, & hemorrhagiz narium: dum irruit in ventriculum, cardialgias, anxietates, sitim, Anorexiam, vomitum bilis portaceæ, æruginosæ induxit: dum ad intestina, venres, diarrhoas, dysenterias, ad renes, varias urinas; ad ambitum, lassitudines, sudores modo indicantes, modo non. Dubium tamen est, cur morbi prædicti non apparuerint hyeme præterita, quo tempore aer erat utique humidus & pluvius. Secundo cur ex pluribus graviter infectis pauci interierunt. Tertio cur deterius habuerunt euchymia abundantes, quam vitiosis succis scatentes. Quarto quid prædicendum. Et quinto quid agendum.

Prima difficultas contigit etiam tempore Hippocratis. Refert enim 2. in primum Epid. 2. quod totus annus fuit humidus, frigidus, & borealis, & nihilominus quod per hyemem salubriter degerunt. Ratio est quia non ita ac tempestas aliqua incipit intempestiva fieri, afficit adeo corpora, ut morbis corripiantur: sed tunc tantum, quando intemperies aeris ea tali intemperie afficit; quod sane in instanti fieri non potest. Ad secundum quod attinet, ratio propter quam major pars affectorum evasit duplex est, prima quia aer fuit tantum alteratus, non corruptus, nec putridus, ut contigit in peste Thucydidis, propterea morbi isti non sunt pestilentes; secunda causa est, quia putredo in humido genita, non semper magna fuit, sed aliquando benigna. & quando maligna, nec semper provenit à venenata, & occulta qualitate; talis enim plures interficit, sed tantum ab illa putredine, quæ fuit proposita à Galeno primo de differ. febr. 6. quam duplicem esse dixit; aliam superante natura, aliam ea superata, addita tertia facta partim superante, & partim superata natura. Fit autem superante natura, quando est juncta cum concottione facta à calido nativo dominante calori extraneo, prout fit in inflammationibus ad suppurationem devenientibus: pus enim album, læve, & æquale fit à calore naturali prædominante: superata verò natura, quando calor extraneus ita dominatur naturali, ut hic pugnare non possit cum causa morbifica; quod Hermocrati contigisse retulit Hippocrates primo in tertium epid. qui decima quarta immunis fuit à febre, & non ludavit 17. redit febris, 20. ab ea immunis, sed sine sudore, 27. obiit. Dicit Galenus ipsum immunem extitisse à febre, quia natura non pugnavit cum morbo, & propterea non supervenit aliqua evacuatio, hæcque est vera illa excellens, & summa putredo, quæ interficit, extincto calore nativo, non secus ac fit in gangrenis, nunc verò quibuldam ex febribus prædictis, plerisque tamen ipsarum contigit cum domino naturæ: propterea patientes evaserunt, superveniente vomitu, diarrhœa, dysenteria, vel sudore, dummodo is non fuerit diaphoreticus, ob nimiam raritatem corporis, & virium imbecillitatem; qualis contigit aere præterito, &

præsenti. Quod si quis febre intermittente obiit, hoc necessario evenire debuit ex vehementia symptomatum, aut ex nimia spirituum dissolutione: cum febres intermittentes ex sui natura sint semper salutares. Si quis tertio querat, cur boni succi pleni interierint facilius, quam succis vitiosis repleti? Responderi potest dupliciter: primo quia vitiosis succis redundantes facile à levi quacunque causa affici possunt, cum in symbolo facilis sit transitus; plethorici vero nonnulli à violentiori causa, propter robur calidi innati: causa autem valida magis officium quam debiles. Secundo dici potest, quod humores vitiosi, ut plurimum protruduntur ad partes remotiores, ac inde ipsorum putredo minus afficit: boni autem succi retinentur in toto venoso genere, ideoque ipsorum putredo facilius irruit in viscera principalia, & cor ipsum.

Ex his elici potest quid sit prædicendum. Vereri enim debemus, ne in dies magis ingravescat affectus. Si enim aer æstivus ex sui natura calidus resistere non potuit corruptioni, cum aliocum febres pestilentes ætate cessare soleant, quando æstivum tempus servat propriam naturam, longè facilius extinguatur vel remittere saltem debuissent affectus præsentis. Nec ab autumnali præsentis tempore quidquam sperandum, utpote valde inæquali. Paxit Deus ne ita contingat.

Pro curatione corpus expiandum erit diligentissime etiam cum sanguinis missione, quantum vires permiserint, nec adfuerint symptomata ipsam impediencia. Nec omittenda sunt bezoartica medicamenta, quorum sylvia habetur apud scriptores: præ cæteris tamen debent esse refrigerantia, & exsiccantia, utpote quæ contraria, febrî ratione refrigerationis, putredini vero per exsiccationem. Pro præservatione autem habitatio sit in locis montosis. Quod si fieri non possit, vitandus saltem aer austrius. Provocandus somnus, & alvus continuo lubrica servanda. *Idem ibidem.*

Febris Synocha.

Omnia mala, tum præterita gestationis tempore & à partu in puerperio, tum præsentia; Matronam Excell. instantia, à sanguinis vitio produisse & procedere, non est in Arte verè satis qui dubitare possit: id enim apertissime demonstrant ea quæ tum à priori, tum à posteriori elici possunt: sanguinem enim est ipsius temperamentum, hinc vitium in quantitate & submelancholica dispositione consideratur unde mala qualitas, acris nimirum & quodammodo adusta atque acida; cujus sanguinis effectus pravi non adeo manifestabantur ante uteræ gestationem, dum natura per uterum exonerabatur, secus autem in uteri gestatione, ejusdem evacuatione suppressa, & præsertim primis mensibus: cum enim parvulus fœtus abundantem sanguinis molem consumere nequireret, Medicus ejusdem per venam sectam evacuationem moliri coactus fuit, ut à tot molestiis Mulier Excellentissima vindicaretur. Et quoniam à partu non satis, quinimò valde imminute expurgata fuit, deteriora successerunt, sicut Lochia deterioris, quam Menstrua, conditionis existunt, dum absumpto à fœtu utiliori sanguine,

guine, vitiosior permanet, qui sicut singulis mensibus antea per uterum excernebatur, ita in puerperio sub lochiorum titulo expurgari necesse est, alioquin, ait Gal. aut uterus phlegmone corripitur, vel ad superiorem aliquam partem irrepens sanguis varios affectus producit; & nisi aptissima & quàm celerissima medela præstita fuisset, ad evidens vitæ periculum Matronam Excellentiss. deduxisset: Galenus enim memoria tenendum esse monet, in omnibus Mulieribus in quibus à partu impeditur purgatio, nonnullas in extremum mortis discrimen devenire, perpaucas vero modice laborare, dum considerabat Philiini Uxorem quæ filiam pepererat, quia non bene expurgata fuerat, die vigesima à partu obiisse: quod idem repetebat in Historia Mulieris in Cizico decima septima defunctæ. Verum quia per sanguinis missionem diminuitur quidem ejusdem quantitas, remittitur quoque prava qualitas, at portio vere peccans ex toto à massa sanguinea evelli & educi non potest, ideo factum est ut à puerperio melius quidem habuerit Excell. Mulier, at non omnino convalescit, & ideo contigit quod divinus prædixit nollet Senex, Ipsam nimirum febrile & horrorem habere, quia partus purgamenta non fuerunt expurgata, nec postea satis Menses prodierunt: sic & magna febre correpta fuit, quæ Synocha naturam sapit, & gulæ inflammatione atque ulcusculis. Febris tamen cito remissa est, quia peracuta; & quoniam congruis & magnis remediis adhibitis cessit, ut ipse Hippocr. innuebat dicens, quod Nisi à partu Mulier repurgetur, magno morbo tentabitur, vitæque periculum incurret, nisi quis celeri adhibita curatione convenientem purgationem promoveat. Et licet excrementas quasdam febrem habere observetur, id evenit, quoniam ut Continens sit febris, sit est sanguinem feruescere & fermentari in venis alicujus partis cum corde, pulmonibus, faucibus, in & venis communibus magnum consensum habentis.

Quibus ita se habentibus, cum febris ista non modo acuta, sed peracuta censeatur, cito & bene terminaturam sperandum, quia cito & apte auxilia medica administrata fuere. Restant autem indicationes considerandæ, nimirum vitiosi sanguinis correctio, qui quatenus adhuc quantitate peccat, imminutionem indicat; quatenus qualitate, commodationem; quatenus motu, revulsionem & diversionem; calor vero febrilis, si perseveret, contemperationem exposulat viriumque sui conservationem.

Et à fonte Chirurgico repetenda adhuc esset sanguinis missio, si Viro Prudentissimo Adstanti opus visum fuerit; sicut frequentes partium infernarum frictions, necnon calidæ lotiones non sunt omittendæ.

Ex Pharmacia reliqua sunt depromenda pauca remedia, hæcque alterantia evacuantia & ab affectis partibus repellentia; ideo opportunissimus esset exigua Cassia ad drachmas quotidianus usus, superepoto copioso sero, aut saltem aqua Nocer. matutinis horis; sicuti in statu febrilis caloris aqua stillat. de succo citri. & acetosæ cum syr. vel Conserva de acido citri, de succo limonum aptissimæ erunt; & gargarismi repellentes jam propositi & admi-

nistrati, ex aqua plantag. cum sale prunellæ, vel succo granat. vel succo agrestæ, vel mororum immatur. à dulcibus omnino abstinendo, & ulcuscula spiritu chalcanti tangendo. Meliora proponenda pro statu præsentis non habeo, congrua victus ratione Prudentiss. Viro commissa. Verum exacto convalescentiæ tempore, Patavium ut se conferat Excellentissima Matrona consulo, ut levi præmissa primarum viarum expurgatione, ad aquas B. V. epotandas disponatur, ut jecoris teruor contemperetur, ne forsitan impotenter valetudinariam vitam ducat, Hæcque sint dicta potius, ut acta & proposita continerentur, quàm ut nova agenda proponantur. *Raym. Joh. Fortis Consultation. & Respons. Medic. Tom. 2. Cent. 2.*

Febris continua.

Quoniam primis diebus febris Illustriss. Comitum cum refrigeratione invalit, nec adeo sensibilibiter operationes laesit, cum domo exiit, neque à consuetis muneribus destitit, ideo acutam nondum fuisse censendum, sed neglectam, acutiem quarta die acquisivisse credendum, sicque continuum primo per subingressum, mox non modo periodicam proportionatam, verum & essentialiter continuum redditam esse existimo. Quare biliosam mineram putrescentem cum sanguine, eoque crudo atque melancholico (unde lassitudo, si non phlegmonosa, saltem tensiva) in venis majoribus supra jecur cum Viris Excellentiss. reperi credo, ut facile ex urinis turbatis cum sedimento inæquali & obscuro, pulsusque frequentia atque celeritate conjici potest. Dolor autem capitis, aurium tinnitus, somnus parvus atque turbatus, si febrem comitentur, magnitudinem seu ejusdem vehementiam arguunt; sicut malum morem, si supervenerint & mox apparuerint; vapores enim à toto venoso genere turbato atque confuso, vel auram malignam atque venenam ab eodem ad caput elevari significant, quæ in capite continuum solvendo, dolores: spiritus agitando & cerebrum calefaciendo, somnos exiguos atque turbatos: & aerem implantatum commovendo, aurium tinnitum excitare valent. Putredinis autem occasionem præbuerunt humoribus jam dictis errores prægressi, in assistentia Illustrissimæ defunctæ peracta: à vigiliis enim cruditates multiplicantur; ab animi moribus utpote corpus calefacientibus bilis adaugetur, & ab hisdem perseverantibus exultiones atque animi motus tandem oriuntur; unde sanguis totus exalectus quoad illam partem facile putredinem nactus fuit, & eo facilius, remorata & tardiori reddita ab ejusdem crassitie totius circulatione, non parum ad hæc omnia conspirantibus imminutibus Menstruis, pravi sanguinis congelationem in promptu significantibus.

Sed circa jam dicta considerandum occurrit, cur modo accessiones, non solum refrigeratione, verum etiam cum horripilationibus invadant, nec tamen febris ulla declinatio observetur, quinimo semper magis in vigore sustineatur, quod non ratione febris contingere credendum, sed verendum potius ne aliqua portio sanguinis à venis ad partem aliquam deponatur, quæ in exitu per partes sentientes discut-

discurrendo, horripilationes inchoantibus inflammationibus familiares excitet, quod confirmare quoque videtur alvus turbata, biliosa, cruda & tenuia excrementis, naturæ irritata marcio.

Quibus omnibus ita constitutis & consideratis, nil certi præsertim abiens prædicere possum: affectus enim adhuc in fieri, in augmentum iterum reperitur, cum hinculque vix apparuerit coctionis rudimentum, febrisque pravis symptomatibus comitata sit; vires tamen in hac florenti ætate, proba temperie & anni tempore saluberrimo forsitan valere possunt, quousque natura dominari & coctiones peragere valeat: acutus enim cum sit, celeres mutationes ad utramque partem suscipere potest.

Ideo ad agenda deveniendum, ut indicationibus a Viris Excell. propositis satisfacere nitamur. Et ut ordine executivo procedamus, cras summo mane sanguis ex altera Saphena omnino erit educendus ad septem uncias, si pulsus permittant: non enim dierum numero, sed uni virium robori attentos esse oportere jubet Galenus; assit itaque Vir Excell. Illustrissimæ Patienti in ipsa sanguinis educatione. Nec alvus irritata cum exigua materiæ expulsiōe hoc genus remedii vetare poterit, nisi fortasse pluribus vicibus & copiosam exereverit peccantem materiam. Duo Venicantia coxis, à Viris Excell. proposita, jam appo-
ita suppono; nec factiones sunt infernis partibus omittendæ, toti corpori vero caute administrandæ in præsentis alvi commotione; licet enim cruda existat materia, ideoque motus criticus esse non possit, quandoque tamen ut motus huiusmodi, mediū paulatim critici tandem evadant, & ideo post sanguinis educationem, nocte sequenti exigua portio noris Cassiæ præberi poterit, superaddito sero.

Alterantia erunt aqua stillat. de succo acetosæ, addita quoque portione scorzonæ. cum syr. vel conserva de acido citri. Alexipharmaca cordialia necessaria sunt, non tamen diaphoretica, tum propter alvi motum præsentem, tum propter Menstruorum imminuentem. Verum si alvus supprimatur, nec Menses erumpant, & lassitudo totius perseveret vel augeatur, adeo ut humores ad ambitum corporis vergant, tunc diaphoretica intrinsecus, ut lapis Bezoar, cornu cervi phil. Extractum Contrayervæ in aquis cordialibus; & extrinsecus cucurbitulæ sicæ & incisæ, frictiones & Aëthi inunctiones erunt exercendæ. Omnibus congruam vicius rationem addendo Viris Doctissimis notissimam, sicut reliqua quoque omnia ab iisdem proposita, & à me confirmata. *Idem ibid. m.*

Febris Chronica.

Vestalis Illustrissima temperamenti calidi & humidi, annum agens trigelimum sextum, jam septimus annus est ex quo post improvium mortis dulcissimi fratris nuncium, mœstissima facta, post varios animi angores, febre etiam correpta fuit, qua per totum fere hoc temporis spatium divexata est. Principio febris continua, proportionata evidens fuit, quæ eadem hora per hebdomadas quotidie invasit, mox vero medicamentorum ope evanuit, sed brevi interjecto intervallo, absque manifesta causa

Nobilissima Virgo iterum febricitavit eodem febris ordine, sed typo non adeo distincto, ita ut aliquando non solum ab accessione, sed ab ipsa febre liberaretur, à qua etiam repetitis medicamentis omnino evadit. Caterum vix convalescens, male servata victus ratione, in o neglecta, Ipse quoque Medicorum consilio, non solum inproportionata munera obeundo, sed præcipue jejunando, & piscibus pravisque aliis edulis vescendo, maxime in suo, ut vocant, Adventu, iterum in febrem incidit, à qua usque in hodiernam diem continuo affligitur. Febris hæc quotidie nocturno tempore invadit, accessione satis obscura, nullo prævio rigore, sed aliqua tantummodo universalī lassitudine, quæ per multas horas perdurat, nec integre dissolvitur, nisi in fine augmenti ipsius paroxysmi, quo tempore vehementem calorem utparum percipit, & præcipue circa caput de quo non leviter conqueritur. Toto hoc molestissimo morbi curriculo, corpus ejus permansit, ut vix ex aspectu qui fere naturalis est & nativo roseo decore præditus, aliqua à naturali statu declinatio desumatur. Pulsus satis firmus, urina non multum tenuis, calor satis mitis, hypochondria mollia, somni breves, appetitus potius dejectus, maxime pharmacorum tempore, à quibus semper affligitur, corporis vigor satis acutis, ut à quocunque faciliiori motu offendantur; menstrua purgationes ordinatæ, non in minutæ. In hac pertinacissimi morbi naturæ, frustra de Perississimo un Medicorum Vincentiæ repetito consilio, & de meo pluries expertis remediis, graviora exitia metuens, alienam, me jubente, requirit opem, ut tandem, Diis juvantibus, evadat.

Virginem Illustrissimam multis abhinc annis claudatam vitam dicatam, ob dilectissimi fratris obitum septem jam annis cum intensissimo perseverante ejusdem animi mœrore secutum, melancholicam tulle redditam, quinimò & affectu melancholico correptam pro certo habeo: distractis namque spiritibus, cum naturali calore à ventriculo ad caput ob intensas & diurnas & nocturnas continuas meditationes, chylosi imminuta, cruditates genitæ, & in venis lacteis atque mesentericis diutius detentæ, à jecoris calore terreæ, arefactæ & in melancholicam naturam conversæ, affectum hypochondriacum illegitimum excitare potuerunt, cui brevi temporis tractu succedere solet melancholicus, dum ab huiusmodi clausuris, hypochondriorum & jecoris calor non ventilatus acuitur, intensiorque redditur, qui postea sanguinem à ramo cœliaco & mesenterico emanantem, ac mesentericas & splenicæ portæ venas ingressum, ut ad hepar, indeque per cavam ad cor circulando, feratur, magis magisque excalescendo, crassiores & ad motum ineptum reddit, ut propterea in eodem loco stabulans, symptomata aliqua melancholica, vel in corde, vel in cerebro excitare soleat, à quibus omnino immunem esse Virginem Illustrissimam vix credere possum, sicuti hypochondriaca affectione detineri pro certo habeo. Quoniam vero per consensum ab hypochondriis ventriculi læsio perseverat, juges ideo quotidianas cruditates emergentes, & à jam dictis obstructionibus detentas, ab æstuantē calore non solum effervescentes, verum & fermentatas,

mentatas, febriculæ causam esse non est mirandum: sicut enim illarum portio quotidie consumitur, ita quotidie quoque reproducitur, eoque magis, prava addita victus ratione. Putridum vero tangens non putridum, putridum illud reddit, sicque febriculæ perseverant horis vespertinis aut nocturnis obscure intendentes, quia licet in ignobili loco cruditates fermententur atque putrescant, quia tamen clausa per partes sentientes dimoveri non possunt, ideo neque manifestas accessiones prodere.

Neque viscera obstructa & inquinata esse credere possum, adeo ut Ferneliana febris ex labefactatis visceribus enascatur; siquidem neque floridus faciei color, neque totum corpus adeo nutritum conservari possent: hucusque enim si non cachecticum, cacochymum saltem fuisset redditum, insigniter læso jecore, nutritionis principio: sed pulsus alterationes febri-les facile foveri censeo ab æstu hypochondriaco, ut observare solemus in Hypochondriacis. præsertim à cibo, & in hac Nob. Virgine potissimum horis vespertinis atque nocturnis, dum cæna licet levis, prandio non adhuc bene confecto, superingeritur.

Ab hoc febrili & valetudinario statu vindicari posse Patientem Illustrissimam non dubito; & licet non adeo facile nec brevi, quia in febribus corpus pro ratione non imminui & contabescere, morbi diuturnitatem, sicut plus justo periculum minari solet: attramen congruis repetitis remediis febrem cessuram in hac gratiosâ ætate optimoque temperamento pro certo habeo.

Quod assequi poterit, primas vias expiando; Obstructiones, licet non adeo tactu manifestas, referando; Hypochondriorum & jecoris calorem contemperando; Et tandem ventriculum, licet non positive, sed privative affectum, non-nihil corroborando.

Pro quibus explendis intentionibus, à fonte Chirurgico sanguinis missio petenda ex superioribus potius, quàm inferioribus venis, ad evitandum jecoris totiusque venosi generis calorem, & ad conditionem sanguinis explorandam, ne forsan adeo diuturni temporis tractu, totum quoque succo melancholico sit inquinatum. Et cum in Utero nulla sanguinis portio commoretur, quæ derivatione indigeat, ideo ex venarum sedalium apertione, ab utero recte operante diversio verenda esset.

Præcipua remedia à Pharmacia sunt desumenda; & pro primis viis expiandis, electuarium lenit. pro prima & secunda evacuatione sufficiens erit: sicut quinque intermediis diebus erit quoque sufficiens julapium acet. cortic. citri aromatizatum, quod exigua aqua totius citri dilui poterit. Inde ad ulteriora Præparantia & Aperientia erit deveniendum, quæ semper exsiccatam materiam humectare valeant, & meo judicio, succi depur. opportunissimi erunt: mellita namque & saccharata Hypochondriacis non valde conferunt; quare parabitur Syrupus præparans ex succo depurato cichor. borag. & pom. dulc. ad ʒ iij. in decoct. borag. endiu. malvæ, violariæ & agrimonie. Sex autem transactis diebus, aliquod benigne Purgans erit exhibendum ex flore cass. & semidrach. extracti senæ & pilularum de tribus, cui superbibat Jus pullæ tenuæ, hordeo vel malva alteratum. Mox

iterum succorum usus repetendus, succum agrimonie vice pomorum dulc. addendo, quinnis & tartari vitriol. grava in decoctione erunt dissolvenda; sequenti vero die nos cassie ad ʒ ij. addito scrupulo rhabarb. opt. præbeatur, & post horam superbibat sem. capr. aut ann. destill. cyathum, tribus vero horis ab assumpto sero prandeat; Tertia die repetat succos, ut supra, quarta rhabarb. cum cassia, & ita alternatim perseveret supra viginti dies; præbendo interim, si opus fuerit, duobus diebus succos ipsos, & quarto quoque die cassiam cum rhabarb. si evacuatio sequeretur abundans.

His peractis, ut venula in hypochondriis jam excalefacta contemperentur, & removeatur licitas, serum copiosum caprinum aut asinum depur. si non bis aut ter, semel saltem ad libras propinare optimum erit, cum vehiculo syrupi ros. solut. vel potionis ex man. clarif. ut inde jecoris & sanguinis quoque fervor remitti possit: lactis usu, quod poterit primo artifice parari ex emulsione seminum melon. & amygdalarum dulcium, sero capr. destillat. aut aqua de succo cichor. extrahenda, addita uncia syrup. de succo linonum, ut pollea si Viri Excellentiss. prudentiæ visum fuerit, ad lactis quoque asini usum cum saccharo Illustrissima Patiens ducatur: refrigeratis enim prius hypochondriis & visceribus, non adeo facile corruptetur. Nec à febricula prohibetur, cum ab Hippocr. iis qui non multum febricitant, concedatur.

Et si interim ventriculo quoque aliquam corroborationem asferre placuerit, à cibo duo grana mastiches deglutire poterit, vel rotulas ex aromat. ros. aut aquæ cinnam. cochlear.

Quibus omnibus congrua victus ratio erit addenda, ab Eximio Viro in Axte versatissimo præscribenda, cui etiam reliqua omnis corrigenda libenter relinquo. *Idem ibidem.*

Febris Chronica, & decumbendi difficultas ab Hypochondriis.

Illustrissimus Comes annorum sexaginta trium; temperamenti calidi & humidî, cum prædominio tamen ipsius caloris; jecoris & capitis fervidioris, pituitosis destillationibus obnoxius, ob quas transactis temporibus aliquando febricitavit, pyalissimo subditus, Autumno præterito magno totius corporis æstu correptus fuit, cui succedere in universa cute multæ efflorescentiæ; & hæc in aliquam molem elevata cum pruritu (vulgo Effere) à quibus sola victus ratione convaleuit. Incipiente Vere incidit in capitis gravedinem & febrem, quam catarrhalem putavit, & ideo sine Medici assistentia per aliquot dies decubuit; postea vero ingravescente morbo, ad medicam opem confugit, à qua licet medicamentis secundum rationem præscriptis, & sanguinis missione è venis superioribus instituta levare non potuit: imò observatum fuit febrem ipsam potius adaugeri, licet naturæ intermittentis & erraticæ, cum etiam circa quadragesimam, post usum lactis caprini per tres dies in ferculis usurpari, lapsus sit in passionem statuofam molestissimo symptomate ipsum divexantem, à qua frequentissima nidorosa eructatio exorta est, & aliqua per inferiora crepituum emissio, cum aliquo ventris rugitu & ventriculi ex-

extensione, cum impotentia decumbendi, adeo ut sere nactus spatium erecta cervice & somnum capere, & integrum diem sedens degere coactus fuerit: cum enim solitum decubitus vel primum, vel supinum, vel ad latus tentat, statim surgere conatur ob imminuentem suffocationem, quam fortit. Ager potius tinet, quam nos credamus, cum nulla in ipso pulsu vel interceptio, vel internatio, vel inæqualitas percipitur. Quibus tamen non obstantibus, licet secundum rationem & propositis & adhibitis, febris adhuc perseverat sine internatione: perseverat & status qui gravior sit in assumptione cibi, & ingruente febre, licet nunc remissior appareat. Ceterum febris magis ordinata ac determinata periodo patientem aggreditur vespertinis horis absque notabili refrigeratione, sed sensim inrepat alternis diebus gravior, pauci pulsum coarctatione & urinarum mutatione, quæ potius crassæ sunt & rubræ cum sedimento copioso: quæ tamen febris matutinis horis manifeste declinat sine ulla evacuatione, quo tempore etiam status remittit. His omnibus accedit feruens sanguinis stilla, præcipue e nare dextera, coloris satis vividi. Medicamenta quæ ex tuo consilio exhibita hæcenus sunt, fuerunt potiones ex manna clarificatis repetitæ cum sero caprino depurato, à quibus copiosa successit evacuatio materię potius biliosa tenuis, non sine aliqua pituitæ permissione, quod evacuationis genus etiam in ipsis clysteribus sæpius apparuit, & aliis levioribus medicamentis observatum fuit, omnis succis depuratis, & horum loco decoctionibus earundem herbarum substitutis, quæ ventriculo ipsius Pat. in his amica vitæ sunt. In hoc rerum statu, cum febris & difficilissimus decubitus Aegrum ipsum & nos torqueant, & cum tum ratione stilla sanguinis, tum effervescentiæ ipsius capitis, conveniret sanguinis missio, hæc ex hæc orthoidibus perfectus. De salute autem Illustrissimi Viri anxii, ut par est, perdurante præcipue utraq; affectione, tam universali, quam particulari, tum ipsa decumbendi impotentia, à quibus majora infortunia metuemus, ipso Hippocrate teste, ad Te Nobilissimi Aegri iussu confugimus, ut salubriora consilia recipientes, optatum finem qui salus Aegri est, consequi valeamus.

Ab exacta relatione status Illustrissimi Comititis à Viris Præclariss. descripta, mihi quæ transmissa constat, duos esse affectus præcipuos Virum Illustrissimum affligentes, febriculam nempe & decumbendi difficultatem, quibus alii accedunt considerandi, perseverantes nimirum in hypochondriis flatuositates, à cibo præsertim invalescentes, & forsitan aliqua à capite destillatio eidem Comiti familiaris & ferè conaturalis, si non in partes spirituales, saltem in naturales, quæ sicut utriusque affectus fons & origo fuit, ita in præsens eosdem foveat atque conservet. Sed quamvis res ita se haberet, nobis tamen causæ proximiores & immediatæ præcipuorum affectuum occurrunt curandæ, hypochondriorum nimirum obstructions jam diu factæ & confirmatæ, necnon phlogosis aliqua in hypochondriis iisdem excitata: etenim dubitari non potest, quin febricula prima autumnalis à catarrhali destillatione, una cum crudita-

tibus à libertate vivendi productis originem primam traxerit, nempe alteratis & putrefactis iisdem humiditatibus in ignobili loco à corde distante, ut propterea sine Medicis auxiliis diu degere & manere potuerit: sed tractu tenoris pituitosa huiusmodi & cruda materia ab hypochondriorum calore clauis & intensiori reddito in terream naturam conversa, copiosa flatuositatis in causa fuit, quæ exhalationis potius, utpote ex terrea materia elevata, quam vaporis naturam obtinet, & idem haud facile dissolubilis: hinc ab iisdem clausuris & à calore intensiori reddito nidorulentæ ciborum corruptiones procedebant, depravatæ concoctionis indicium, quam tamen & imminutam in ventriculo sequi quotidie credendum, adeo ut quotidianæ cruditates emergant, addita facile catarrhali materię portione, à quibus febricula pendet, quæ vespertinis horis sine sensibili annotatione, pulsive contractione exacerbari observatur, cum urinis tamen colorationibus, ob calorem in jecore adactum, & crassioribus ob cruditates ab hypochondriis ad jecur & venas delatas; jecur enim præcalidum habuisse Virum Illustrissimum significabant quoque tum efflorescentiæ universales, tum frequens vividi sanguinis e nare dextera stilla, & idcirco facilius hypochondriorum calor intensior fuit redditus, qui nunquam cessat tum recentes humidas cruditates, tum antiquas jam exsiccatas in halitus levare atque convertere, à quibus compresso diaphragmate, respiratio ipsa læditur, eoque magis in decubitu, tum quia facilius ad septi compressionem concurrat, tum quia maxime in decubitu à flatuositatibus ipsis copiosis facilius comprimuntur vasa lævia, quæ compressione spiritibus liber transitus impeditur, sicque difficilis, in eo intolerabilis redditur decubitus ipse; neque huius decumbendi difficultatis alia mihi causa suppetere potest, nisi forsitan quantitas aliqua subtilioris materię catarrhali à capite in pulmonum cavitates paulatim sese insinuasset, quod etiam sine tussi evenire potest, ut monebat Gal. dum scilicet per parietes asperæ arteriæ non affatim & confertim, sed sensim ac sensim delapsa fuisset, quo modo frequenter pulmonum hydropes fieri solent: quæ tamen causa si adesset, Præclariss. Virorum notitiam subterfugere non potuisset.

Hic igitur ita se habentibus non est qui non videat pro salute Comititis Illustrissimi necessarium esse ut cruditates evacuentur, obstructions referantur, & hypochondriorum atque jecoris fervor contemperetur, dum interim flatuum discussio non est negligenda, sed capitis destillatio tantummodo consideranda, & aliquo modo divertenda, alioquin vel in Hydropein siccam, vel in Cachexiam labi posset status Comititis Illustrissimi, ut omittam repentinæ suffocationis periculum.

Idcirco omnia agenda, ut Vir Illustrissimus pristinam sanitatem recuperet; in quem finem rursus primæ viæ à recentibus cruditatibus sunt expediendæ manna clarificata, serocopioso supereposito. Mox ad validiora Aperiens deveniendum, quæ prohibere non potest febricula, imo indicare: paranda itaque decoctio aperiens horis matutinis exhibenda, Parcant autem mihi Præstantissimi Viri, si descriptio-

nem subdam, ut Pat. Illustrissimo morem geram, quæ tamen descriptio ab iisdem Viris Adstantibus alterabitur, prout melius his visum fuerit.

℞. Salsæ paril. electæ, Chinæ opt. an. ʒʒ. Radic. althææ ʒj. Aqu. stillat. lat. cichor. malv. agrim. an. ℥ʒ. M. F. iuss. per horas 24. deinde adde quartam partem pulli junioris, & bull. ad consumpt. dimidii, deinde nat. colat. pro duob. vicib. matutino tempore exhibenda in qua dissolvantur gr. x. salis tart. fixi, & tertio quoque die purum ante prandium præbeatur calida, aut elect. lenit. ad ʒ iij. Altero vero die injiciatur clyster ex lact. cum syr. ros. solutivo, adeo ut quotidie & obstructionum apertio, & humorum evacuatio procuraretur, sed blandioribus jam dictis remediis, cum præcipuorum malorum minera in distantibus partibus non sit quærentia. Quod si forsitan dubitari posset de melancholici humoris subministratio à toto, ideo progressu aperiri poterit Jecoraria dextra, Medico præsentem, ad explorandum potius, quam educendum sanguinem, nisi forsitan niger & crassus appareret, tunc enim ad aliquot unc. educi posset ad sanguinem ipsum depurandum Jecorique calorem contemperandum, in memores quod Gal. etiam in quartana intermittente venam aperiri jubet sanguinemque educi, si niger fuerit. non ratione causæ conjunctæ febrem facientis, sed ratione causæ antecedentis, ne scil. a toto venoso genere melancholica minera foecetur, & materia suppedietur.

His caute administratis, & obstructionibus magna ex parte reclusis, libenter devenirem ad usum aquæ Nocerianæ, primis quatuor aut quinque diebus cum vehiculo dejectorio. reliquis vero cum diuretico, quale esse posset spiritus tart. ter rectif. ad semidrachmam in primis cyathis: sicut pro vehiculo dejectorio portio ex manna clarif. ut minus insuavis; quo bene cedente remedio Comitum Illustrissimum ducerem ad usum lactis asinini, ut quod residuum exsiccatæ materię emollire, hypochondriorum æstum & jecoris fervorem contemperare, totum nutrire, neque caput tentare valeat; & dum jam dicta omnia fiunt, totum abdomen humectantibus & laxantibus illinire non parum proderit. victus rationem addendo cum intentionibus nostris proportionem habentem: quæ optatum finem habitura spero sub Præstantissimorum Virorum accuratissima assistentia & infallibili iudicio, quibus ideo omnia & alteranda & immutanda libenter relinquo. *Idem ibidem.*

Plures febres Chronica.

Febris quæ Illustrissima Mulier decem abhinc mensibus per intervalla divexatur, longa quidem æque chronica in genere dicenda est, in specie autem erratica, si totum tempus à quo febricitat, consideretur. Verum si in particularia intervalla ingruentis febris eximientur, plures febres. non unica tantum censende erunt: si quidem erraticæ febris natura est, errando suis accessionibus perseverare, sed febres istæ aliquot diebus intermittunt, rursus repetunt quatuor aut quinque dierum spatio recedunt, aliquot post dies denuo invadunt, qui procedendi mos me ad credendum inducit,

quod sicut febres hujusmodi causam unam stabilem habeant à qua foveantur, ita altera iisdem per intervalla paretur & addatur, per quam excitari possint. Igitur ego judico obstructiones repetiri in aliquo viscerum naturalium, hæcque contumaces, quæ ætrentis sive imminutis Menibus sanguinis puritatem arguentibus, foveantur & conserventur; non tamen ab his febrem hanc excitari credo, quoniam si, ut siemata manent obstructiones ipsæ, continuè quoque inturgerent febres, & aut tertianæ, aut quotidianæ, aut quartanæ naturam retinentes perseverarent; verum per intervalla repetunt, dum alia superadditur causâ, quam in visceribus potius naturalibus, quam spiritalibus excitari arbitror, forsitan & facile ex incongrua vitæ ratione, gentis nimirum cruditatibus, vel ex prava eorum qualitate, necnon à ventriculi imbecillitate in adeo diuturno morbo contracta, & à catarrhali destillatione valde adaugeta, quæ cruditates antiquis obstructionibus super dicit, utpote obstructionibus ipsis humidiores existentes, & idcirco ad putredinem paratiores, e. iore præter naturam afficiuntur, & febriculas excitant cum aliquo horrore, quia jam reperitur circa viscera naturalia, nimirum circa partes sentientes, quarum naturæ & conationi conveniunt & competunt pulsus non valde frequentes, urinx crudæ & albicantes, moderatæque titis cum calore remisso; his autem cruditatibus tribus aut quatuor diebus consumptis, consumitur & ipsa febris, donec alix cruditates cumulentur, ut febris iterum quatuor aut quinque dierum excitetur. Non autem adeo facile accenditur febris ex catarrho in pulmonibus corrupto & putrefacto, sicut excitata non adeo facile cederet: præterquam quod senibus potius, vel Juvenibus hæmoptoicis familiaris esse solet; & ita tres omnes causas diuturnarum febrium à Galeno cum Hipp. 3. *Prognost. 23.* propositas, ad hanc quoque febrem constituendam concurrere existimo, nimirum partem curatu difficilem, humores crassos, viscidos & lentos, evacuationi resistentes, & errorem aliquem in victu.

Ita de præsentī febre decerno; & idcirco Curationem à Viro Excellentissimo propositam, quæ præsentim ad obstructiones aperiendas, ad sanguinem depurandum & ad Menstruæ consuetæ revocanda dirigitur, profuturam spero, cui & ego libenter subscribo, sanguinem ex venis superioribus opportuno tempore educendo, atque tandem, sed tarde ex pede, peracta nimirum expurgatione & valorum refectione: iteratam enim sanguinis missionem, sicut permittit calidum & humidum temperamentum, ita non reclamare ignotam aetatem suppono. Cauterium suspendo, præsertim si viridis fuerit ætas, verum Excellent. Viro adstanti & copiam majorem, vel minorem destillationis ad pectus delabentis observanti, illud ipsum remitto.

Quoniam vero in adeo diuturno morbo jam primas vias satis expiatis suppono, ideo ad obstructiones aperiendas statim descendendum esse existimo, quæ si quodammodo exsiccatæ censeantur, prius humectatione præparandæ, præbendo per 15. dies alternatim calidam ad ʒij. aut iij. cum uno scrupulo rhabarb. opt. quatuor horis ante cibum, cui post horam superbibat

jus malvæ, borag. & cortice citri alteratum; diebus vero intermediis hauriat jus malvæ, borag. endiv. alteratum, in quo dissolvatur semidrachma salis prunellæ. Quindecim vero transactis diebus ad usum syrupi Fernelianî à Viro Excellentissimo propositi, tuto deveniri poterit, secundum nostram descriptionem cum rhab. parati, quem assumet 10. aut 12. vicibus, alternis diebus ad 3ij. in jure endiviæ, & borag. alterato, diebus autem intermediis præberi poterit jus alteratum radice cichorii, petroselin. foliis borag. endiv. capill. Veneris, agrim. omitendo penthaphyllum, deficientibus Menstruis valde noxiis, in quo dissolvantur grana x. tart. vitr. aut gutt. xii. spiritus tart. rectif. Quod si fortasse fura alterata respuat Illustrissima Pat. præbeatur cyachus aq. stillat. agrim. & capill. Veneris, æisdem addendo spir. tart. rectif. guttulas.

His peractis febrem jam recessisse, viscerum naturalium obstructions satis ablatas, satque bene massam sanguineam deputatam fore sperandum, adeo ut ad uteri vasa aperienda devenire possimus hysterico potius, quam diaphoretico aliquo medicamento. Propterea in aqua artemisiz, capill. Veneris & agrim. stillatitia infundi poterit lignum sassafras ad 3ß. pro duabus vicibus, quotidie summo mane exhibendo hujusmodi decoctionis 3 vii. quibus affundi poterit oleum sabinæ ad gutt. iij. in cujus defectu substituatur uncia una aut altera aquæ ejusdem (sabinæ) erit enim validum hystericum Aperiens. Quo eodem tempore extrinsecus quoque spongia magna bis in die utero erit apponenda, decoctione aperiente hysterica madefacta & expressa, quæ parari poterit ex radice lib. alb. cyclamin. foliis origani, pulegii, calamenthi montani, mercurialis, leucioii, sabinæ, addito quoque calamo aromatico, imo & cyatho vini albi generosi faciliorem foras penetrationem: remota vero spongiâ, tota regio uteri abunde illuminatur oleo lil. alb. cum aromatibus.

Et his omnibus congrua addatur victus ratio, sine qua nihil; suspicor enim Illustrissimæ Pat. ventriculum magis appetere, quam concoquere possit. & iuges cruentates febrium mineris subministrare: nec enim nos latet quam difficilis sit in morbis diuturnis continentia. De hac igitur sit valde sollicitus, tum quoad quantitatem, tum quoad qualitatem Excellentissimus Adstant, ut Illustrissima M. optatam sanitatem quamprimum consequi possit, quam eidem, servatis jam dictis servandis, polliceri possum. *Idem ibidem.*

Recidiva Febris.

Illustrissimus Comes duodecima Aprilis de more annuam exercuit corporis expurgationem, duobus assumptis medicamentis, sex interpositis syrupis, & unica desumpta sanguinis evacuatione ex basilica hirudinum ope; phlebotomiam etenim absque vitæ discrimine admittere non potest. In quorum usu observavi (sicuti & alias) excrementa prodixisse se, tota ut plurimum, crassa & viscida pro aliqua parte, ultimo tandem biliosa, calida valde, ut igneam præ se ferrent conditionem. Post actos hos expurgationis dies, cum ulteriorem non admitteret Illustrissimus Vir corporis emundationem, in usu tamen refrigerantium

& humectantium interne & externe exhibiturum, non parvo tempore perseveravit, in Autumnum ob negotiorum seriem differens ulteriorem corporis expiationem. Interim Venetias se confert: ibi die noctuque animo & corpore negotiis deditus, assiduo Marte versatur. Somnum vix capescit; Victum ex oleis familiaribus, necnon oistreaceis sibi comparat. Gelidum mox vinum, & quidem generosum, nunc aquam pro potu admittit. Tandem rediturus in Patriam, noctes sub dio auræ maritimæ expositus insomnis transigit, donumque reversus, binas repletiones ex necessitate in conviviis sibi adjungit: à quarum ultima, febre superveniente, lecto decumbere Illustrissimus Comes fuit coactus. Febris erat de genere tertianarum spuriarum, sat lenta, per subingressum continua: Pro cujus cura cum bis unciam cremor. tart. sumpsisset, & salvatella dextera adaperita fuisset, copiose expurgatus, liber evasit. At vix è lecto Illustrissimus Pater prodiit, demum se gravibus negotiis mente & corpore objicit, nunc paucos post dies inappetentia, lassitudo, & demum febris ex recidiva supervenit. Hujus febris diem assignare adeo exacte ego non audeam, cum non statim Illustriss. Pat. decubuerit: puto tamen diem Veneris quæ fuit 19. mensis elapsi, febris exordium dedisse, cujus norma erat de genere duplicium tertianarum spuriarum, protensatum, & per subingressum saltem continuum, invadens hora quarta post meridiem cum extremorum refrigeratione, paucis capitis dolore, interno calore parum molesto, corporis aliqua jactatione & potus appetentia, necnon genarum per morbi decursum rubore. Hanc ego die lunæ sumpsi curandam, & quidem cum omnia medicamenta hucusque dulcia respuerit, syrupum ros. solut. aur. exhibui, cui libenter adcessissem serum capr. depurat. nisi experientia doctus fuisset, facile illi vomitum ex quocunque liquore superbibito contingere. Ab haustu bona successit evacuatio & copiosa, serosorum, pituitosorum, necnon ultimo biliosorum succorum; illi quidem à stomacho & capite catarrho obnoxio, & continua destillatione ventriculi verante; isti ab hepate calido ac magis accenso ab obstructionibus, quas frigidi & crassi, vias intercipientes, illi peperere humores. (Ex tactu enim non solum obstructio in parte gibba, verum & dolor aliquis emicat) Et quia vespere deiectioni aliqua cupiditas Illustrissimum Pat. infestabat, levi clystere intromisso, denuo calidarum & exurentium materierum aperuit exitus, flavæ coloris partim, sed magis æruginosi. Nox fuit illi molesta, inquieta, somni turbati, sed his præbuit manum & alia causa externa. Mane sitiebat, fauces aride, tales etiam ob angustiam in naso obortam. Capitis dolor, pulsus celeriores, urina colorata, crassiusculæ substantiæ cum nube divulsa, crassa, atomis crassiusculis circumfusa. Quibus in considerationem habitis, ne febris essentialis continua & mali moris tandem evaderet, jussi sanguinem ex salvatella dextera educi, blando præmisso clystere: Basilicam enim tundere ob convulsivos motus in quos dilabatur, ei plane formidolosum accidit. Sequens accessio invasit hora con-

fueta, quarta nampe à meridie, cum eadem extremorum frigiditate per tres horas durante: Noctu moderate quievit & dormivit, ita ut mane omnia remissa invenirem. Sed nova accessio hora consuetâ die Mercurii invasit: noxque fuit sat laboriosa, non tamen ut nudius tertius, namque dormivit, sed cum insomniis & aliqua corporis iactatione. Mane die Jovis quæ apud me erat sexta, præbui bolum ex calli cum crem. tart. difficillima industria illi exhibitum, & duas post horas seri capr. depur. lib. ij. & quamvis paulo post maiorem seri partem evomisset, nihilominus subscuta fuit bona evacuatio, heterogeneorum, crudorum, pituitosorum, & tandem struginosorum humorum. Febris accessio ea die postposuit plus hora, invadens cum majori extremorum frigiditate, quæ etiam plus consueto protrahabatur, forsitan quia non se cooperiebat: ex qua cum calor tarde excitari videretur, non solum leves fricationes, sed & unctionem Aetii in usum duxi, à qua rediit æqualis calor, & nocte, si non perfecte, saltem competenter se gessit, cum paucio sudore mane oborto, sed non universali. Accessio quæ supervenit de more die Veneris, fuit paulo laboriosior. Die Sabbati itaque quia hæmorrhoides intus nesciebant, præmisso simplicissimo clystere ex lacte, ex quo vitellinæ bilis non parva copia prodit, sanguis ab illis eductus est, ex quo visus est calor febrilis, & color faciei tanquam refractus. Verum accessio ea die, tertia post meridiem invasit: noxque fuit sat molesta, tussisque exsiccata. Mane injecto simplici clystere, magna vitellinæ bilis copia exivit, in vase ebulliens & spumans. Eadem die quæ fuit Dominica, accessio anticipavit hora una, fuitque mitis, nox quæta, & mane omnia meliora, nam vitellinæ bilis copiam ex haultu seri capr. depur. deiecit. tam ardens & calidæ conditionis, ut ignem ex corpore effluere exclamaret. Die Lunæ quæ fuit nuperrima dies, & forsitan undecima, accessio invaluit ut alias: nox magis molesta. hinc mane pulsus celerior, & cætera magis illustri. Patientem assidua, in qua ex sero capr. depur. epoto magna exivit vitellinæ copiam, & adhuc magis calens, ita ut ex lacte clysterem imponere ad humoris effusionem mordacitatem & calorem fuerit opus. Hoc igitur mane viscera pertracto, nullamque labem, nisi in jecoris gibba reperio, obstructionsque & succos ex primis viis depulsos esse non solum tactus, sed biliosi excrementi conditio mihi fidem facere videntur. Fomitum duplicis huius tertianæ in uni o-hepate statuerem: vitellinam autem bilem, non solum per assationem bilis flavæ, verum & pro parte per misturam frigidorum & crassiorum succorum, tanquam causam agnoscerem. Urinam quoad substantiam mediocrem invenio, vel saltem mediocri similem, nubeculæ crassæ, divulsæ, coloris citrini excellentis, & corpusculis sive atomis à succis crassis emanantibus circumfusam. Pulsus non multum unquam fuisse celeres; frequentes, frequentia sentiente ex parte dialloles, & parum duriores. Hucusque, Illustrissime & Excellentissime Domine, morbi huius progressum devenimus, cuius ideam ea qua potui diligentia & pro temporis angustia descripsi, & quidem aliqua fusius recensere potuissim, quæ tamen præterivi.

Sunt etenim hæc & alia Sapientie tuæ præforibus, cum ex ungue Leonem tibi inter multos noicere Dii concernerent. Quid autem posthac sit agendum, à tua, Vir Illustrissime, examina Virtute expectabo. Interim ego aperientia, non tamen calida & humectantia quam maxime, ut test, in usum ducam; evacuationesque cum tam copiosa ex solo injecto clystere appareant, vix de simplici medicamento cogitabo: Vires conservabo, hepatisque regionem exterius etiam fovebo. Quibus si accesserint tua prudentissima monita, quorum præstantiam, tuum Vir Illustrissimum ego tanti facimus, sperabo, temporis ducum eundem sanitati restitu posse.

Quoniam a peractis Purgationibus, viscera naturalia nonnulli labefactari necesse est, ideo ut retractas vires à medicamentis resiliant, diligenti custodia opus habent, ne nimirum aut nimium cibis onerentur, neve calor naturalis ventriculi, præsertim adito alio errore minuat; alioquin excrementa facile rursus multiplicantur, & sæpe multo maiora & deteriora reproduuntur, quæ nisi à natura, aut vomitu, aut diarrhæa expelluntur. Obstructions in visceribus, aut non solum ferretia, sed fermentata, febres accendant; quod quidem, Conradi Illustrissimo contigit, dum statim ab exacta purgatione Venetias se contulit; errata in viæ ratione commisit, excrementa cumulavit, quorum quantitas, dum unum reverso, à repetitis repletionibus ad usum fuit, & inde prorsus utrique successit effectus, non parum nimis pathematibus adinimulavit: Obstructionibus enim jecur repletum est, à quibus impedita ventilatione calor naturalis fervere & in ignem naturam converti cepit, unde febris, quæ Medicis auxiliis opportune ad ministratis extincta & superata fuit. Verum quia quæ relinquuntur in morbis, recidivas facere solent; ideo cum adhuc in hepate stagnantes humores, licet non fermentati, nec putrefacti, relicti fuerint, rursus à novis reproductis cruditatibus, usdem additis & calorem p. n. adeptis, nova quoque febris germinavit, & priori deterior: adeo ut cum Avicenna recidiva peior sua radice successerit; duplex tertiana nimirum spuria, à bile vitellina copiosa, ex bilis flavæ & cruditatum missione exorta, & in jecoris vasis sedem habente; quæ nisi rite & recte à Medica manu tractata fuisset, non solum per subingressum, sed essentialiter continua reddita esset: nec mirum ab illo æstu in viscere existente & corporis iactationes, & bibendi desiderium, & faciei ruborem, & vigilias primò enatas fuisse: sunt enim symptomata huiusmodi febri propria.

Hoc die Sabbati 13. currentis ingreditur febris diem decimum sextum, quæ cum ex relatione mitior visa fuerit undecima die, optatus eventus sperari potest, nisi aliqua inquinati sanguinis portio è vasis in parenchyma jecoris hucusque effusa sit, adeo ut aliqua lateat in jecore spuria inflammatio, cujus dubitandi animum nobis præbuerant extremarum partium diuturna perfrigeratio, sive saltem tepor, genarum rubor, excrementorum biliosorum copia cum urinarum crassitie quæ nonnisi à corrupto sanguine ex nimio fervore procedit; atque tandem ipsius visceris dolorosa tensio, quæ

utinam

utinam intra limites tantum obstructionum sese contineat : hanc tamen excitatam non fuisse, considerare possumus, ob repetitam sanguinis extractionem atque Medica prædicia opportune administrata.

Et ideo in calorem contemperantibus, simulque obstructiones aperientibus insistendum, quouique febris adhuc mitior fiat & ad chronicam vergat : tunc enim magis attenuantia, incidentia & aperientia in usum duci poterunt.

Quibus ut satisfaciamus, pauca mihi proponenda restant, siquidem majora remedia ab initio administrata fuisse, juxta Hippocr. monitum, In principis morborum, si quid videtur movendum, move; ideo sanguinis missionem iterandam proponere absens non audeo, quæ tamen conveniens non esset sine inflammationis præsentia. Jecori epithema ex succo cichor. cum succo limon. addita quoque exigua aceti ros. portione, tepidum appositum prodesse poterit : sicut etiam illinitiones unguent. ros. Mes. succo cichorei condensato misto, ut reformari possit.

Per os quotidie flos cass. ad ℥ij. exhiberi poterit, cui superbibat, hora transacta feri capr. destill. lib. j. idque tribus horis ante prandium. Pro alterante, in vigore febris exhibendo, succo cich. depur. & per arenam trajecto, erit utendum ad ℥ij. in decoct. cichorac. addita quoque uncia succi lim. vel offeratur aq. stillat. de succo cich. cum succo lim. vel 3℔. Salis prunellæ; sicque erit procedendum, evacuando & alterando, donec inflammationis suspicio omnino evanuerit. Tunc enim unguentum ros. Mes. usurpari poterit, exiguo ol. de abinth. & portio succi abinth. epithemati erit addenda. Cassia vero gr. v. aut vj. tartari vitriol. erunt commiscenda; sicut succo quoque cichor. ad gr. x. cum jul.p. aceti. & reliqua dulcia abhorreat. Aquæ vero stillat. pro alterante, esse poterunt de succo cichor. & de succo agrim. addito pariter tartaro vitriolato. Atque tandem contumacioribus se præbentibus obstructionibus, ad usum rhabarb. esset deveniendum, primo in substantia, vel cassiæ mistum, vel comansum, superpræbendo serum destill. post horam, ad concavam jecoris expandam; sicut progressu in aqua cichor. & agrim. infusum, ut ad gibbam quoque aperientiam pervadat.

Hisque omnibus congrua pro tempore erit addenda victus ratio, à Peritissimo Viro præscribenda, cujus Judicio reliqua quoque jam dicta administranda remitto, pro salute Illustrissimi Comitæ, quam eidem à Deo Opt. Max. enixe precor. *Idem ibidem.*

Hæctica febris, cum catarrhali destillatione.

Tres abierunt anni postquam Vir iste Illustrissimus quibusdam tempestatibus tussi infestatur, quæ sicca fuit, nullo vel admodum exiguo sputo insequente : inde humidior facta est, cum sputo tamen admodum tenui. At proxima Æstate non solum sputum aliquod sanguinis tussim secutum est, sed semel & iterum copiosa floridi & spumosi sanguinis excretio, ad quinque vel sex uncias qualibet vice, à qua pluribus transactis diebus, tandem, serò tamen ad Medica præsi-

dia confugit, quæ sanguinis sputa omnino suppressere. Modo tribus abhinc mensibus crassiora sputa cum tussi ejicit, & aliquando etiam livida & putrida. Corpus multo gracilius evasit, continuaque febre detinetur, nec ab ipso Pat. non sentitur, nisi quod à cibo manente incalcescit, & vesperi febris cum frigore aperte invadit, cui nocte postea non modicus calor succedit, præsertim in partibus spiritalibus, cum insigni rubore faciei. Quamobrem de his malis sententiam tuam Vir, sapientissime, Patiens Illustriss. enixe exposcit.

Træceps & perennis pituitosæ materiæ à capite destillatio in partes tum spirituales, tum naturales, quæ Illustrissimum Virum angit, non alio quam catarrhi nomine cum Gal. appellari potest, symptoma vere in excretis immodice fluentibus, cujus essentia in motu consistit. Quoniam vero ad quemlibet motum quinque concurrere solent, Motor scil. Mobile, Terminus à quo, Terminus ad quem, & spatium per quod, in nostro casu Motor dici potest retractoris capitis facultas à copiosa humida materia imbecillior facta, genita ab intemperie capitis insigniter humida, & per consequens destillationibus maxime obnoxia. Ab hac igitur intemperie Mobile producit, nempe materia pituitosa tenuis, quæ à capite tanquam à termino à quo, per asperam arteriam & œsophagum, ut per spatium, in pulmones & stomachum, & inde in mesenterium tanquam ad terminum ad quem, copiose descendit. Partes igitur istæ quas diximus esse terminum ad quem hujus motus, sunt partes affectæ, materia namque ista in pulmones recepta, ut objectum noxium, expultricem irritat ad sui expulsionem; frustra tamen ob materiæ ejusdem tenuitatem, aëris impulsu effugientis, quæ ideo in pulmonum substantiam se se minuans, ibique diu immorans, ab eorundem calore salsifacit, aliquam ex illis venulis corrodit, unde excretio illa & copiosa, & repetita sanguinis secuta est, non quidem per Anastomosis, nam Patientis habitus plethoricus non est, non per Diapedesin, quia excretio adeo copiosa non fuisse. sed per Diæresin, ut dictum est, eroso scil. à materia jam dicta pulmonum vasculo, quod postea callo obducto, coarctat iterum unde nullus postea sanguis apparuit.

At ab ista putrida materia in pulmonibus inhaerente vapores in cor elewantur, quod dum eosdem repellere conatur, celerius & frequentius movetur : cumque omnis motus sit causa caloris, calidam & siccam intemperiem cor idem acquisivisse censeo, ejusdemque substantiam esse modo in calefacto esse, sicque toti corpori communicato calore; jam fixam & habitualement febre constitutam esse, quam cum hæcenus non roridas solum humiditates, sed adiposam & carnosam substantiam absumpserit, ad finem secundi gradus jam pervenisse credendum; quæ omnia facile confirmari possunt à prava corporis conformatione, pectoris scil. angustia, collo oblongo, & prominentibus scapulis, & à juvenili ætate, cujus hujusmodi mala ex Hippocr. propria sunt : præterquam quod febrile continuo, nec febre percipere, & calor à cibo, sunt hæctica febris pathognomonica signa.

Alia vero ejusdem materiz portio in ventriculum, & inde in mesaraicas venas delapsa obstructions facit, quas prohibita transpiratio, & hanc postea calor extraneus necessario conlequitur, sicque febricula illa catarrhalis, quæ vesperi manifeste invadit; adeo ut febris hectica putrida quoque adjungatur.

Ut horum malorum Curatio instituat, ex dictis necessariis sunt eliciendæ indicationes, quæ duplicis generis erunt, Curativæ pro febre hectica, Curativæ & Præservativæ pro putrida. Primis satisfaciendum erit medicamentis refrigerantibus & humectantibus substantificis; secundis, refrigerantibus quidem & humectantibus, sed etiam moderate attenuantibus & incidentibus: hoc tamen ordine, ut prius febris putridæ occurramus, & catarrhali destillationi tanquam causis sine quibus non, & postea fixam ipsam febrem curare tentemus.

Intentiones quidem maximæ utilitatis, sed quæ fortasse adimpleri non poterunt, dicente ipso Galeno quod caliditatem hujusmodi cum siccitate conjunctam tollere impossibile est; & eo magis quod a sanguinis sputo Phtisis ait Hippocr. quod clarius etiam expressit Gal. his verbis, Cum vas in pulmone ruptum est, nisi statim glutinatum sit, antequam plegmon excitetur, scire aperte licet, id postea inanimabile fore. Sed in hoc casu etiam medicamenta adhibita sunt, ergo, &c. Difficultatem præterea auget virium debilitas, & ipsarum indicationum repugnantia. Attamen ne solo Prognostico Patientis illustrissimus relinquitur, cum præsertim omnia acturus sit quæ Medici imperaverint, aliqua sunt proponenda, quorum ope diutius salutem vitam protrahatur.

In Chirurgico igitur fonte, nisi prostratæ adeo essent vires, & totum corpus macie confectum, aliquam sanguinis portionem ex Salvatella juberem, ratione phlogosis aut inflammationis quæ circa corrosum vas in pectore supponitur, & ratione etiam putridæ febris; quia tamen ex dictis prohibetur, omitti potest. Cauterium vero in altero brachio infigatur, ad revellendam & divertendam materiam quæ in pulmones cadit, quæ quoniam præceps quoque labitur, opportunissimum esset Ceratum utitur coronali applicitum, quod tamen Sinapismo omnino similis non sit, ratione caliditatis capitis, sed compositum potius ex rosis, myrto, santalis, mastiche, tragacantho, thure, betonica, & similibus. Lotiones etiam crurum in aqua dulci tepida convenient, ad diversionem vaporum qui in caput ex infernis partibus ascendentibus destillationem fovent.

In Pharmacia, expiandæ prius primæ viæ modica cassia & modico agarici trochiscati. Humores præparandi syrupo de farsara, julapio acer. & syr. de hyssopo; repetito postea eodem medicamento, cum validiora & calor, & macies, & vires nullo modo permittant. Facta hac levi primarum viarum expurgatione, quæ sufficiens fuerit, cum antehac aliquod semper medicamentum subinde Patientis assumpserit, quod corpus purum servaverit. Decoctum Chinæ, santal. & exigui lentisci, cum beton farsara, cichor. hyssopo in jure pulli, tentarem per 10. aut 25. dies, & amplius etiam, si opus fuerit. Quod si interea tussis urgeret, & somnum noctu impe-

diret, necessarium erit uti pilula aliqua Cynoglossæ, aut Ladani Nepenth. quæ non solum somnum conciliare valeat, sed destillationem etiam in pulmones intercipere. Nec interim materia jam in pectore hærens negligenda erit, sed sæpe Lambitivo utendum parato ex oxymel. simpl. syrup. de farsara, de aquir. de hyssopo, pulvere Ireos & rid. enulæ. Suffumigium ex myrrha per os attractum, non exigui jumenti esset, prout in Patientis quoque cubiculo alterum parari posset ex aqua rosac. myrrha, lantalis, rosis, thure.

Hoc tempore, si cessasset destillatio, & putrida febris sanata esset, opportunus foret lactis usus, quod omnium maxime in hisce casibus G leno placuit, cum ex eodem l. c. frigidum & humidum sit, facillime concoctionis, optimi nutrimenti, & substantieas humiditates mirifice repararet. Irius itaque eligatur lac humanum, & assumatur ad 3 iiij. vel iv. donec appareat, num toleretur a stomacho, cui postea succedat aliminum majori etiam quantitate.

Antequam tamen lac assumatur, Balneum aquæ dulcis ab ipso Gal. summopere probatur. vel saltem universalis inunctio oleo anagydaio & violaceo.

His addendus exactissimus vivendi modus. Aër itaque cubiculi temperatus servetur. Quies convenit, non vero exercitium. Alvus lubrica semper sit, vel humidis alimentis, vel etiam aliquando drachmis aliquot cassiæ recentis. Somnus diurnus laderet potius, nisi nocturnum suppleat. Cibi sint refrigerantes & humectantes. Vinum sit tenue, album, dulce; & cœna parvissima. Post cibum utatur aliquo atrigenti, ut saccharo ros. & alacriter vivat. Idem ibidem.

Febris Ferneliana.

Illustrissimus Comes temperamenti calidi & humidi, cum subdominio bilioso & melancholico, olim mediocriter carnosus, ætatis annorum quinquaginta quatuor, cui caput negotiosum, non tunc notis hypochondriacæ affectionis, pro quibus multoties Veris tempore, purgato corpore, acidulas Sancti Mauriti sumplit. Modo hoc Autumnali tempore fructibus horariis summopere delectatus, ac etiam in aliis sex rebus non naturalibus non leviter errans, septem abhinc septimanis febre continua conflictatur, licet singulis diebus cum portione de tertia in tertiam fiat exacerbatio, cum levi & obscura extremorum refrigeratione. Primis duabus septimanis, vehemens atque adeo acutus capitis dolor torfit Illustriss. Patientem, ut de Apostemate in capite latente sæpe ac sæpius dubitatum fuerit. De ingenti hypochondriorum æstu & tensione, præcipue dextri, etiam antiqua; de siti inexhausta, necnon de maxima ciborum abominatione serè toto morbi decursu conquestus est. Tribus vicibus, singulis octo vel novem diebus in considerabilem lapsum facultatis vitalis incidit, ut pulsus vix perciperetur, & serè semper inconstans, & hoc cum intensa extremorum refrigeratione & somno satis profundo præter solitum molestante. Novem abhinc diebus dolore maximo circa hypochondrium dextrum prope hepatis regionem molestante, plurima & per superiora, & per inferiora dejecit, pituitæ crassæ substantiam,

& bilis porraceæ & æruginosæ colorem præ se ferentia. Hodie Illustrissimus Comes pluribus abhinc diebus absque ullo capitis dolore vivit, necnon cum reliquorum symptomatum remissione, febrilis tamen calor singulis diebus mutata hora percipiuntur leves adnotationes cum robore facultatum principum. Urget jam diu, & nunc totius corporis insignis extenuatio, cum maxima hypochondriorum & totius abdominis depressione, & cum colore nescio quid cachectici præ se ferente. Alvus rarissime sponte respondet, arte semper, ope nempe Clysterium: flore Cassiæ parumper ante cibum in parva dosi sumpto. Urina primis septem Morbi diebus visa fuit quasi laudabilis, in substantia, colore & contentis; de cætero modo cruda, modo subviridis, modo tenuis, modo crassa, semper copiosa; nunc cum aliqua materia crassa, semper copiosa; nunc cum aliqua materia crassa in fundo matulæ existente. Pulsus observantur paulo validiores, magis æquales & constantes. Plurima tentata sunt medicamenta, evacuantia, alterantia a qualitate manifesta, & occulta pretiosiora, non neglectis roborantibus, derivantibus & revellentibus præsidis: Multoties namque sanguis missus fuit ex hæmorrhoidibus, applicitis hirudinibus, & per Cucurbitulas scarificatas: imo etiam Vesicantia primis diebus coxis fuerunt applicita. Evacuatum fuit totum corpus per syrupum rosatum solutivum Magistraleni variis vicibus & tempore congruo. Deinde per epicrasin cum syrupo de cichorio Nicoli cum rhabarbaro, cum flore Cassiæ & cremore tartari: imo etiam variis Clysteribus, cum lenitivo lacte atque aliis. Inter Alterantia ex usu fuerunt destillata Magistralia cum sero lactis, serum ipsum copiosum, cum syrupo acetoso simplici, Emulsiones seminum trigidorum, aqua Noceriana, hordei; Jus puræ pullæ alteratum Cichoraceis & aperientibus; succus cichorii depuratus, cremor tartari. In praxi etiam posita fuit unctio totius corporis cum oleo amygdalino & violato, non sine illinitione etiam cordis regioni, cordialibus appropriatis. Balneum universale aquæ fluvialis tepidæ, alteratæ refrigerantibus & humectantibus, cum lacte quatuor vicibus; ultimo lac ipsum Asininum sumptum secundum leges Medicas. Perdurante igitur febre supra descripta, cum siti adhuc molesta & totius corporis insigni extenuatione, petit Illustrissimus Comes a singulari tua humanitate & ab eximio Virtutis tuæ candore responsum: Primò An usus lactis Asinini aliquo temporis spatio adhibitus possit proficere, una cum Balneo. Secundò An cortex Chinæ, vel quædam alia Medicina febrifuga passim apud Authores descripta, possit esse salutaris. Tertiò An purgatio per epicrasin, vel cum Cassia, aut lenitivo cum portione rhabarbari vel syrupo de pomis Regis Sabor, vel syrupo cachectico Fernelii, vel alio consimili Morbum possit extirpare. Ultimò An quid peculiare pretiosum ex arcanorum tuorum thesauro depromere valeas atque digneris, quod falcem ad radicem mittat, pro omnimoda istius morbi profligatione.

Si Galeno difficile visum fuit, Aëris absentibus consilium dare, difficillimum utique id mihi videtur in febricitantibus; ut propterea raro

& ægre pro illis scribere consueverim. Nihilominus quoniam statum Comitis Illustrissimi à Doctissimo Medico Adstante adeo exacte delineatum video, ut tactu excepto sub sensus cadere videatur; idcirco quid sentiam, describere, & Viris Excellentissimis considerandum proponere non recusabo.

Febris itaque quæ Comitem Illustrissimum primò invasit, sicut biliola spuria, cum subaunio pituitosi & melancholici humoris statuenda fuit, ita semper aliquo maligno characterisino comitatum fuisse credendum, accidentali & symptomatico saltem, si non essentiali, cum cerebrum ab initio vehementer doloribus infestaverit, progressu vero cum vitalium virium lapsu cor occupaverit, & tandem cum hypochondri dextri dolore, & forsan duritie, hepar obsiderit: quas quidem febres cum hypochondriorum dolore, malignas appellabat Hippocrates. At cum jam quadragesima dies hujus febris præterierit, conditionem mutasse non est quod dubitemus, sedemque propriam in hypochondriis sibi firmasse, & præteritum ut ego judico, in hepate, adeo ut in febrém Fernelianam degeneraverit. Hujus autem affecti visceris indicia non desunt, nempe prægressa vivendi ratio: longi temporis hypochondriaca affectio: dolor mox superveniens in eadem parte: cibi fastidium: sitis perseverans: & quod magis est, imminuta non solum, sed depravata quoque totius corporis nutritio, macies videlicet etiam præter rationem insignis cum sordo totius cachectico colore. Verum quoniam Febrem Fernelianam non unicam semper & eandem in visceribus naturalibus labem habere voluit ipse Fernelius, sed nonnunquam solas obstructions in hepatis vasis: nonnunquam humores excrementitios in parenchymate ipso reperiri, substantiam ejusdem visceris labefactantes, & quodammodo corrumpentes, ut nobis intinuit quoque Avicennas ante Fernelium: Propterea utra hujus visceris pars sit febris minera dubitari potest. Et quamvis hanc determinare, parum Curationem alterare aut mutare possit, non tamen idem de Prognostico asserendum: Medicæ namque intentiones in unum conspirant, in obstructionum scil. refectionem: peccantium humorum evacuationem: visceris roborationem, & universi corporis renutritionem, caloris febrilis semper habita ratione, de quo dicebat Galenus, refrigerandum esse quantum sufficit. Sed cum ab Excellentissimis Viris, tot tantisque remediis rite & recte administratis, adversus hanc febrem incassum hucusque pugnatum fuerit, ideo spem salutis in angusto positam esse video, cum etiam lethales affectus, hepar diutius, quam cor & cerebrum, tolerare soleat: Non ideo tamen dura provincia deferenda est. Et licet Medicamentorum Sylva, ad jam propositas intentiones explendas, nobis offeratur considerata, præcipua tamen fiducia in rhabarbari usu reponenda mihi videtur, ut quod aperiendi, educendi, & hepar ipsum roborandi facultatem obtineat: & propterea jure merito *Pater hepatis* à Medicorum Schola dictum fuit. Quoniam vero ad intimas & penitiores hepatis partes, ad substantiam scil. pervadere debet, ideo ejusdem infusio aptissima erit, quæ partes tenuiores ipsius

Rhabarbari magis penetrantes & aperientes in se continet : & ita parari posset

℞. Aquæ stillat. de succo cichor. de succo agrim. an. \mathfrak{z} iij. Succo limon. \mathfrak{z} j. Rhabarb. maturi incisi & in petia alligati, \mathfrak{z} iij. M. F. inf. per horas 12. & colatura tertio quoque die præbeatur, cui si placeat, sacchari semicochlear, ad gustum Illustrissimi Patientis, immisceri poterit. Intermediis vero diebus aliquod validum Aperiens, non tamen valde calefaciens, licet exiccans, adversus putrilaginem erit offerendum; nec efficacius, nec aptius excogitare valeo, spiritu tartari alchalizato ad 12. vel 15. guttulas in iisdem aquis exhibendo. Et interim ad uberiorem humorum evacuationem, si opus fuerit, semel in hebdomada Syrupum Fernelianum, secundum descriptionem nostram ad \mathfrak{z} iij. cum sero destillato exhiberem : etenim humorum eductionem per vias urinarias, forsan ab infusione Rhabarbari inceptam, divertere minime poterit. Et si fortasse calor febrilis urgeat (quamvis magis causæ quam febris modo sit incumbendum) sola aqua cichorii infusio fieri poterit, & serum destillatum copiosius cum syrupo propinandum. Extrinsecus quoque Medicamenta hepatica, moderate calefacientia, discutientia & aperientia erunt apponenda, ut succi cichorii, eupatorii & absinthii simul mixti, quibus addi potest unguentum malvinum vel rosaceum, & cum cera fieri linimentum. Pro Alterante vero in accessionis vigore, succus cichorii depuratus, imo & per arenam trajectus ad \mathfrak{z} ij. vel iij. in jure Cichoraceis alterato, vel in aqua stillat. additis granis salis absinthii & tartari, opportunus fore mihi videtur. Quibus omnibus, si febris non cedat, tunc tutior esse posset pulvis Peruvianus, China Chinorum dictus, ut febrifugus & visceribus naturalibus amicus; moxque sedata, aut valde imminuta febre, lactis asinini usus locum non habebit, cum non valde multum febricitantibus ab Hippocrate concedatur. Et dum jam dicta omnia administrantur, virium ratio præcipua habenda est, & virium ratio præcipua habenda est, & vinum album pauciferum, tenue & oligophorum facile concedendum. Pro potu vero consueto, aqua carnis stillat. herbis & radicibus aperientibus alterata parabitur; & lactis usum alia Edulia facilis coctionis, distributionis & optimæ nutritionis supplere debebunt: sicut Balneum inunctiones universales jam propositæ. Meliora & tutiora mihi absenti proponenda non suppetunt. Ita Summus Deus Illustrissimi Comitum meritis assistens omnia salutaria reddat. *Idem ibidem.*

Febris Ferneliana ab Hepate.

Illustrissima hæc Matrona sexagesimum circiter annum agens, temperamenti hepatis & totius calidi & humidissimi, habitus mediocriter carni & nonnulli obesi, colorisque ad album vergentis, a naturæ primordiis usque ad annum quinquagesimum sextum inculpata valetudine degit; quæ olim Viro nupta, fecunda fuit, & multos feliciter peperit filios, semperque sæ bene menstruata. Sed quoniam postremis annis ob laxatum peritonæum in inguine dextro vitam sedentariam ducere coepit, non mutata vivendi libertate, alimentis crassius succi comedens, & vina crassiora bibens, additis etiam

animi pathematibus, tribus abhinc annis conqueri coepit de dolore in hypochondrio dextro ad ventriculi regionem sese extendente, a Patientis Illustrissima semper neglecto; & cum his in anno gravissima Pleuritide concepta fuerit, fuit etiam nobis concessa abdominis exploratio, & tumor in hepate considerabilis observatus, ventriculi quoque litum occupans. A jam dictis acutis morbis evadens, nunquam tamen primum statum recuperare potuit: imo paucos post menses adeo copiosa narium hæmorrhagia supervenit, ut animi deliquium induxerit, quæ remediis multis administratis suppressa, vitium tamen languorem per multos menses reliquit. Interim aliqua semper spirandi difficultate cum tussicula laboravit, quæ Autumno proxime præterito magnopere invaluit cum ita molesta quam extinguere conabatur pomorum atque pyrorum comestione; & quoniam existimabat Illustrissima Patiens dolores spirandi difficultatem inducentes à flatibus provenire, ideo vinis generosioribus in mensa utebatur. Vere autem proxime præterito pedum tumores œdematosi supervenire, tuncque ad Medicos confugere coacta fuit, & observata insigni tumore in hepate, non sine ventriculi quoque læsione, cum ad mucronatam ulque cartilagineum tumor cum dolore sese extenderet, initum fuit consilium, & statutum symptomata omnia ab hepatis tumore pendere, & hydropem imminere, quo morbi genere affectis visceribus etiam ipsius Miter defuncta est. Quare infausto præmissis Prognostico, ad majora præsidia statim deveniendum esse decretum fuit. Ad hunc finem præscripta est illi statim potio Magistralis solutiva, inde Præparans ex julap. acet. cum crem. tartari, & modico aquæ cinnamomi. Interim missus est sanguis ex salvatella, in modica tamen quantitate, postea applicitæ sunt hirudines hæmorrhoidibus. Deinde expurgatum est denuo corpus eadem potione Magistrali, addita infus. rhabarb. & agarici. Post hanc corporis evacuationem, opportunum duximus præscribere illi Syrupum cachecticum Fernelianum quem caperet alternis diebus, deinde Tetticianam aquam experiri mens erat, ut inde ad medicamentum aliquod ex chalybe confectum devenire possemus. Sed vix coeperat uti prædicto syrupo Ferneliano, dum morbus hic qui hucusque ex propria natura chronicus fuerat, repente fere in acutum mutatus est: nam febris quæ antea levius percipiebatur, magnum incrementum sumpsit cum ingenti extremorum calore; urinæ quæ antea potius tenues & aquosæ erant, valde flavæ & subrubræ crassique subitantiæ evadere coeperunt; sed quod majus faciebat negotium, respiratio adeo difficilis reddebatur, ut fere suffocari se crederet. Quare supradictorum remedium usum intermittere coacti fuimus, cum non levis suspicio adesset, ne phlogosis aliqua in hepate superveniret. Cumque per decem aut duodecim dies tam gravibus conflictata esset symptomatis, postremis hisce diebus morbus paulatim ad consuetum statum rediit.

Matrona Illustrissima cum optimum ab ortu naturæ sortita fuerit totius & viscerum temperamentum, fecundaque extiterit, & abundantibus Menstruis semper adjuta, quamvis errores in vivendiratione, & præsertim in ciborum crassi

succi

lucii comestione, & vinorum promiscu potatione commiserit, attamen semper incommensurabilem vitam duxit usque ad quinquagesimum sextum suæ ætatis annum. Verum quoniam tunc in toto Menstruorum tempore & declinante ætate, vivendi modum mutare non animadvertit, nunc factum fuit quod viciato sanguine, pleuriticis aliisque affectibus obnoxia reddita fuerit, & copiosa inmodica narum hæmorrhagia successerit, atque tandem humiditates excrementitiz redundantes corpus totum obesum reddiderint, & ab iisdem peritonæo laxato, Hernia intestinalis, Bubonocèle dicta, excitata fuerit. Quoniam vero abyssus abyssum invocat, ob hanc ideo, cum vitæ sedentaria se dederit, cruditates multiplicatæ in jecoris valis stagnare cœperunt, in quo viscere, ut dicebat Galenus, ob vasorum angustiam & permeantis subitantiæ copiam crebræ sunt obstructions; facilius vero, ut notat Mercurialis, in Mulieribus quam in Viris, eo quod eadem vasa angustiora habeant, adeo ut nonnunquam crassi succi in si. a jecoris parte instar colicæ adhæreant. Et quia medica auxilia renuit, obstructions ejusdem visceris quotidie magis magisque adauctæ fuere, & progressu humores extra vasa duci & in parenchyma impelli, & cum Avicenna, obstructions in eodem viscere continere cœperunt. At nos dicamus quod potius tumorem constituerunt. Verum tamen est quod si huic tumori nomen imponere velimus, scirrhusus quidem non est, quoniam magnopere dolet: minus cancerosus, temperamento, parti & peccantibus humoribus humoribus minime consonus: nec œdematosus, cum Galenus crediderit, Oedema in hepate fieri non posse. Inflammatorius igitur esse deberet, qui tamen non sine febre acuta brevis esse consuevit. Quare crediderim ego, tractu temporis hujus visceris subitantiæ heterogeneis excrementis refertam, adeo inquinatam fuisse, ut labem Fernelianam contraxerit, levi febricula perpetuo comitatam. Non tamen hoc fuisse Fernelii inventum ego judico, sed a Galeno excerptum, dum primo ait quod consequitur impedita distributio & plenitudinis collectio in Mesarzo & simis venis, unde vel concoqui necesse est, vel phlegmonem, vel corruptionem sequi: & alibi adhuc melius habet, quod Humores in obstructionibus non possunt tales manere, sed aut concoquuntur, aut assimilantur, aut corrumpuntur, putrescunt & febrem faciunt. Quoniam vero hepatis obstructio, ex Avicenna, est omnium Ægitudinum Mater, idcirco mirum non sit, si viciato sanguine pedum tumores successerint, cachexiz & hydropis nunci; præterea si repletum viscus dolore afficiatur, & septum suo pondere deorsum trahendo difficillimam reddiderit respirationem: Lobum enim hepatis superiorem, ventriculo in omnibus supererequantem, etiam citra ipsius ventriculi læsionem, circa ejusdem regionem Illustrissimæ Patienti molestiam potius asserere credo, cum ventriculi operationes læsas non audiam. Ex jam vero dictis facile ratio elici potest, cur medicamentis deobstruentibus, parumper calidioribus exhibitis, hepar exasperatum fuerit, & cum adaucto dolore febris ita increverit, ut verè imminens inflammationis Adstantibus Excellentissimis suspicionem & metum intulerit: ab

iisdem enim Medicamentis humores jam fermentati & semicorrupti, ut. uliorem effervescentiam adepti, ipsius parenchyma magis magisque excalefacere & ad inflammationem ducere cœperant, quæ omissione eorundem medicamentorum rursus remissa fuit.

Quibus ita se habentibus, spem salutis in angusto positam esse, imo vitæ discrimen præponderare & ad perniciem tendere, non est in Arte versatus qui non videat: ultimas enim radices malum hoc ab Illustrissima Patienti diu neglectum sibi jecit: pro quibus extirpandis pars ipsa læsa propria medicamenta jam tolerare non potuit, ut ideo vel tractu temporis Hydrops, vel potius brevi hepatis inflammatio lethalis imminere. Non est tamen solo Prognostico deferenda Illustrissima Patienti, sed in iisdem intentionibus aptissime ab Excellentissimis Viris illis sibi propositis insistendum, remedium materiam tantum alterando, quæ sine multo calore aperiendi & putredini resistendi, atque quandoque evacuandi facultatem habeant. Quibus intentionibus satisfaciendis, succus cichorii depur. aptissimus mihi videtur, si ad ʒij. in jure pullæ tenui Cichoraceis & malva alterato, tertio quoque die exhibeatur, cum apud Galenum prærogativam habeat, ut hepati valde prolit, nec ventriculo noceat; cui progressu dierum addi poterunt grana tartari vitriolati, utpote aperiendi, & putredini magis resistendi. Intermediis vero diebus idoneis mihi videtur Cassiæ usus ad ʒ. ij. addito unico scrup. rhabarb. maturi, cui post horam superbibat Patienti seri destill. cyathum, & duabus horis ab epoto sero prandeat. In quorum omnium usu pluribus diebus perseverandum erit, facta diligenti successus observatione. Et interim quinto aut sexto quoque die Minorativum aliquod præscribi poterit ex florè cassiæ, cum semidrach. pilul. de trib. cum rhabarb. cui serum depur. superbibendum offeratur; ut inde, si dabit Deus, ad validiora deobstruentia deveniri possit, nempe vel rursus ad syrupum Fernelianum, cum sero destillato, aut cum aqua de succo cich. exhibendum, vel saltem ad rhabarb. infusionem in aqua de succo cich. paratam, tertio quoque die præbendam: diebus vero intermediis ad spiritum tartari alchalizatum, qui ad penitiores visceris partes permeare & pervadere poterit, si aqua de succo cichorii & agrimoniz offeratur. Non omittendo externa auxilia, inunctionem scilicet ex unguentoroseo, cui superponatur Epithema ex succo cichorii cum exiguo succo absinthii, addito quoque succo limonum. Et hæc pauca Eximiis Viris consideranda propono; quibus congruam victus rationem instituendam relinquo: illud unum addendo pro siti remittenda, quod stillatum è jure pullæ Cichoraceis, malva & frustulis pomorum dulcium alterato parari poterit. Quibus omnibus assistat Divina Clementia. *Idem ibidem.*

Febris Hæctico-Gallica.

Nob. Juvenis annorum unius & viginti circiter, temperamenti ex constitutione naturali sanguinei quidem, sed excedentis caliditatis, ut etiam habitus, ex primæva constitutione, moderate carnosus, nunc vero multum à prio-

ris differentis & exsiccatis à quatuor jam mensibus ex multis in sex rebus naturalibus commisis erroribus, præcipue vero circa frequentes Veneris illecebras, quibus impurus contraxit Gonorrhœas, in manifestam totius corporis imminutionem incidit, extenuari enim universaliter cœpit, vividum vegetumque amittere colorem, pro ipsoque pallido fuscoque indui, viribus destitui, consueto appetitu spoliari, & quadam difficultate etiam cibaria assumere, obnoxiumque catarrhalibus fieri destillationibus, licet non falsis nec diu perdurantibus: & ex duobus circiter mensibus continua detineri febre, sed lenta, & ad vespèram maxime ingravescente: quo tempore dolore satis molesto in summitate humeri sinistri correptus est, qui tamen post quinque vel sex dies ex remedium usu & topicis inunctionibus evanuit. Remansit vigetque adhuc descripta febris, & cum ipsa, descripta universalis emaciatio chlorosisque descripta. Quæ omnia Sapientissimo Iudicio tuo subjicio, ut ab hoc labyrintho Nob. Adolescentem eruiere valeam.

Arduus quidem, gravis & periculi plus est casus Illustrissimi Adolescentis, à Te, Vir Excellentissime, exacte & eleganter delineatus: siquidem, dum totius corporis macies insignis substantificam humectationem desiderat, hanc ipsam vetabunt, maciemque adaugebunt medicamenta exsiccantia; ex petita à lue gallica, cuius characterissimus quamvis sit ipsa adultio, ipsa tamen fundatur in corruptione putrilaginosâ & humida: ut propterea difficillimum sit, substantificas humiditates servare magisque reparare, simulque excrementas absorbere. Nihilominus in his angustiis & contraindicationibus audio summam Prudentiam tuam scopum attigisse, nam febriculam hectico-gallicam, à putrilagine multo magis occulta, quam manifesta procedens tecum & ego sentio. Et ideo post jam præmissam necessariam excrementorum expurgationem, Alexipharmacis propriis tabum gallicum expugnare tentandum esse censeo. cum impossibile sit quod ex pravo ac venenato sanguine caro gigni, & corpus totum nutrirî possit, nisi prius venenum ipsum ab ipso sanguine, imo & ab ipsis visceribus segregetur & adimatur. Statim igitur dura huiusmodi provincia suscipienda, Decoctum sudorificum ita parando

℞. Salsæ parillæ el. incisæ, pulpæ guajaci pinguis & rec. Chinæ opt. an. ʒʒ. Aq. stillat. cich. borag. an. ℥j. Cardui sancti ℥ʒ. M. F. inf. per horas 24. deinde adde quartam partem pulli junioris, ranarum mundatarum, caudarum altacorum an. n. 4. m. bull. ad consumpt. dim. & colatura fervetur pro duabus vicibus, matutino tempore una hora ante sudorem exhibenda. Sudor autem in Balneo provocari debet, aquæ dulcis alteratæ foliis malv. viol. salicis & pentaph. in quo non valde fervido, & potius linteo cooperto, maneat per horæ quadrantem circiter: etenim & in lecto perficietur ipse sudor. Tribus transactis diebus, libenter experirer hypocaustum, ut mox ad Balneum revertatur, & quarto aut quinto quoque die sudorem in eodem hypocausto provocarem. Quod si fortasse cum difficultate erumperet sudor, præmitti poterit ante Decoctum bolus ex uno scrupulo Ex-

tracti salsæ granis 4. Mercurii dulcis. Victus ratio interim nec tenuis, nec multum extenuans esse debet: etenim caro pullæ junioris, etiam elixa concedi debet: permitti quoque ova recentia, ptisanæ hordeacea, præsertim in cœna ex ferculo Excellentissimi Saxoniz parata. Emulsionem quoque amygdalarum rec. & pineorum in panatellis; sed una cum carne ebulliant semper caudæ cancerorum, ranæ, in o & portio carnis Testitudinis nemoralis, una cum taleolis optinz Chinæ. Pro potu consueto, secunda parari poterit ex residuis, addito saccharo & frustulis citri recentis: in prandio tamen, & cœna cyathum quoque vini albi tenuis subdulcis libenter permitterem, ad vires recreandas, & ut vehiculum ad alimentum distribuendum. In quem hinc manibus inunctis, cutis hinc inde sublevatio & levis frictio erit quotidie administranda. Nec medicamentis, quamvis levioribus, ventrem solventibus, ut mos esse solet, utendum, sed potius Clysteribus ex lacte, butyro & saccharo paratis alvus erit excitanda: vel ad summum Cassia ad ʒ iij. vel iv. erit offerenda. Absoluto vero sudore, ad usum lactis & Balnei aquæ dulcis alteratæ ducendum esse Nob. Patientem existimo. Quæ pauca dictavi, sed appropriata ut à senili Prudentia in Juventute tua recto usu executioni mandentur. *Idem ibidem.*

Febris post Colicam cum lue Gallica & Suspicionem ulceris in Mesenterio.

Ex erudita & eleganti relatione Præclarissimi Viri in Arte consummati, quam ore tenus confirmavi, & auxit Excellentissimus Medicus, Hippocraticæ atque Galenicæ Doctrinæ fidelis Cultor, colligi posse mihi videtur quod Illustrissimus Co. annum agens quinquagesimum quintum, temperamenti secundum totum calidi & humidi, capitis, humida intemperie affecti, & ideo rheumatismis obnoxius; mollioris habitus, & præsertim abdominis, propterea herniosus jam factus fuerit, qui negotiis implicatus, in reliquis liberam vitam semper duxit, & Veneri præsertim indulgit, à qua fructus Celticos reportavit, quos propriis medicamentis alexipharmacis semel dimittit, sed rursus cum eadem infecta Muliere repetito congressu, resumpsit, nec amplius dimittere valuit, præceptis Medicis obtemperare renuens. Interim copiosior multo quam antea, apparuit materiæ catarrhalis destillatio, præsertim in ventriculum: sed ob ejusdem redundantiam, non solum ad vias deglutitionis, sed & respirationis irruere cœperat, cum metu potius, quam sensu suffocationis, erumpentibus interim variis in locis etiam nonnullis gummatibus & pustulis Gallicis. Tandem multis abhinc mensibus Colici dolores invadere cœperunt cum febriculis & Ictero, ab initio fere nigro, deinde progressu, flavo: cedebant autem evacuantibus medicamentis, non omissa sanguinis ex venis sedalibus extractione; sed revertebantur, & eodem modo cessabant, & paucis post mensibus (ut retulit Excellentissimus Medicus ex auditu) pus verum atque legitimum, multum, ab Excellentissimis Adstantibus per alvum excretum visum fuit, ob idque abscessum abruptum fuisse unanimes

nimes judicarunt; post cujus excretionem Illustriss. Co: melius habuisse sibi visus est. Sed duobus circiter transactis mensibus, redit Colica febre comitata, ut supra, evacuationibus cedens; mox octava die pluries reversa, inde nono quoque die, & denique cedente Colica, mansit ipsa febris, quotidie vespertinas & non adeo manifestas habens exacerbationes, sine ingenti calore, cum modica siti, & abique aliis symptomatibus, acutiem comitari consuevit. Modo Illustrissim. Co: itatus hujusmodi mihi considerandus proponitur, de quo quid sentiam paucis perstringam, & ad agenda deveniam, cum rebus magis quam verbis Illustrissim. Egredi & agitudinis conditio opus habeat.

Febrem itaque omnium primo considerandam atque curandam, cum Viro Excellentissimo & ego senio, quæ ab initio Colicos dolores comitabatur: non quia a doloribus ipsis accenderetur, sed quoniam ab eadem causa dolorum, nimirum a copia catarrhalis materię a capite delabentis, ad asperam arteriam ingressum quidem tentantis, sed per asaphagum ad ventriculum, indeque ad intestina pervenientis, in cavitatibus, non in venis fermentata excitabatur. facile autem medicamentis evacuantibus cedebat, quia loci conditio facile evacuationem admittebat; Octava vero & Nonana facta fuit Colicæ periodus, & inde eodem modo octava & nonana febris, quoniam tantum temporis requirebatur pro crudæ & catarrhalis materię novo apparatu atque provenitu, ut Colicam & febrem ipsam excitare valeret. Verum quoniam progressu materia quæ prius in cavitatibus manebat, & a debili calore in flatu conuersa, intestina extendebat Colicamque excitabat, & utriusque bilis ductus comprimens, brevem iterum inducebat, facileque evacuationibus cedebat, tandem ad vasa aliqua ex parte sese insinuavit; idcirco non amplius spatia distendens, sed in vasis fermentata & alterata moram faciens, non amplius ideo Colicam excitat, sed febrem conservat, quam quidem putridam, sed catarrhalem potius, quam humoralem ceniendam esse crediderim, quotidianam simulantem: cum magis a catarrhali materia continuo a capite in ventriculum delabente, quam a vera & legitima pituita proveniat; cui tamen exiguam quoque bilis portionem a jecore transmissam immisceri negandum non est, pro frigida materię accensione; Unde Hippocr. omnes febres a bile, id est, non sine bile fieri pronuntiavit. Sed interim oblivisci non oportet copiosæ evacuationis materię per alvum excretæ, ab abscessu in mesenterio disrupto emanantis, ut afferebant Viri Excellentiss. Adstantes: spatium namque quod antea purulentam materiam continebat, est supponendum: nescio vero quomodo deterfum, unitum & curatum fuerit, nisi forsan materia illa non fere purulenta, sed catarrhalis & cruda in intestinorum cavitate diu detenta & corrupta fuisset: scitu namque mihi necessarium esset, num progressi fuerint continui & diuturni ventris dolores: cum ab Hippocr. habeamus, A ventris dolore diuturno, suppuratio; Præterea continuæ febres una cum doloribus necessario progressæ essent, juxta illud vulgatum Hippocr. dictum, Dum pus conficitur, dolor & febris ma-

gis, quam pure jam confecto; de quibus omnibus certiores non reddere non potui Excellent. Medicus ut inperitine acertus. Ad febrem redeo, & præter rationem non esse ex animo, circa materiam dubitare, materiam catarrhalem fermentatam hæere in mesenterio, relicto ulteri additam. Nec nos tutos reddit levamen post puris evacuationem, aliquo tempore a Viro Illustrissimo perceptum: si quidem post purulentæ materię excretionem levamen ipsius respectivum, non absolutum forsitan fuit, ita ut mox spatium, sive ulcus relictum, quotidie magis sordidum reddi potuerit, pro evidenti febricula postea gignenda: & multo facilius, addita Gallici præsentia. Horum omnium malorum authorem fuisse copiosam a capite in subjectas partes detillationem, ab intemperie quidem naturali scaturientem, quæ tamen non leve augmentum suscepit a Gallica lue contracta, a qua viscera quoque naturalia non parum labefactata fuerunt, non est qui non videat.

Utinam materia superioribus mensibus per alvum excreta, vere purulenta non fuisset, sed fuisset cruda & catarrhalis in intestinis potius corrupta, & ad formam sive speciem puris reducta; & si purulenta, spatium relictum, deterfum, satis exiccatum, unitum & cicatrizatum fuerit: ita enim de Illustriss. Viri salute dubitandum non esset; superata namque febre, expeditis intestinis, etiam hoc tempore incongruo, & Gallica lues, & materię catarrhalis provenit non parum remitti poterunt, sicque arceri Colicæ iterati insultus. Quod ut assequamur, intestinorum spatia mundanda; humores viscidi & lenti in vasis mesenterii, & forsan etiam cavæ viscerum, sunt attenuatione & deterfione præparandi, atque per Epicrasin educendi; mox alexipharmaco aliquo medicamento vis Gallici retinenda, simul humida capitis intemperies corrigenda, & si fortasse ulcus relictum adesset, exiccandum.

His autem ut satisfaciamus, a fonte Chirurgico aliqua sanguinis missio ex salvatella dextera esset petenda, nisi Pharmaceuticis remediis cessaret febris. Cauteriū autem brachio sinistro affixum, iam indicavit copiosæ materię catarrhalis in capite perennis reproductio. Interim quotidiani Clysteres laxantes & detergentes in usum ducendi, dum per os assumptis materię præparatio erit incunda, nimirum melle ros. simpl. addita, si placet, portione iulap. acet. cum vehiculo, sive diluto ex aq. aut iure hordei, in quo cochlear crem. tart. cum frustulo cinnam. ebullierit, facta colat. post secutam imprægnationem. Quarto autem aut quinto quoque die Minorativum erit exhibendum ex semine. elect. lenit. addita semidrach. pilul. de tribus cum thab. ut vis medicamenti ad vasa perveniat; cui medicamento superbibendum dari potest ius hord. & rad. cich. alteratum. Ita progrediendum esse præparando & evacuando, xv. saltem diebus exillimo, ut inde ablata, aut saltem valde remissa febricula, aqua Tettuciana propinari possit, tribus, aut saltem duabus vicibus. Sicque tandem ad postremam intentionem exequendam devenire possimus usu aquæ nostræ stibiatæ, quæ ita parari poterit

℞. Salsæ parillæ electæ, visci querc. veri, Chinz opt. ʒij. Aq. font. lb̄ vi. M. F. usq. per hora

horas 24. deinde adde antim. crudi electi rud. contusi, lapidis pumicis rud. contusi sacculo simul cum antimon. repositi, an. ʒ iij. m. bull. omnia ad consum. duarum partium, ita ut remaneant lib. ij. & colatura servetur pro tribus syrupis matutinis. Aqua vero pro potu consueto ita paretur

℞. Salsæ electæ, visci querc. veri an. ʒ iß. Chinæ optim. ʒ ß. Aqu. font. lib. xv. M. F. infus. per horas 24. deinde adde antimon. crudi electi, lapid. pum. an. ʒ vi. contund. crasso modo, & ponantur in sacculo, deinde bull. ad consumpt. tertiar, in fine adde cinnam. integri ʒ ij. bull. parvum, & colaturæ adhuc ferv. adde sacchari albi ad libitum, & frustula citri rec. ut agitando f. aqua vulgo dicta Cedrata. In hujus autem usu quadraginta diebus insistendum erit: & decimo quoque die potio ex manna clarif. exhibenda, interdicens omnino vini potum, sicut comestionem piscium, lactis, eduliorum ex pasta, fructuum & olerum; Potus sit aqua præscripta ad libitum. Toto vero hoc tempore sub ingressum lecti Conservam aliquam capitalem in usum ducere poterit, è floribus rosarum, betoniæ, salviz, tor. mar. additis speciebus aromat. rosarum, & aliquot guttulis tincturæ coral. chymicæ. Pauca hæc suppetunt mihi proponenda, à Sapientibus Viris potius consideranda, quam executioni mandanda, cum selectiora iisdem non desint, pro meliori statu Illustrissimi Co. comparando, ut, Deo dante, Vere venturo ex toto perfici possit. *Idem ibidem.*

Febris Ephemera.

Nobilis Juvenis, 25. annum agens, temperamenti totius ad calidum & humidum vergentis, rari habitus, in victus ratione non valde aberrans, sed moderatè vivens; cum æstivo tempore, triduo abesset ab hac Urbe, matrem acuto morbo laborare per certum nuntium accepisset, nulla interpolata mora, jejuno ventriculo, per dispositos equos, sub radiis solaribus, cum exiguo cibo, domum versus iter suscepit, quò perveniens, matrem animam ægerem invenit, quæ paulò post expiravit. Interim Juvenis ex itinere defessus, parum nutritus, & animi mœrore confectus, decubuit, febricitare incipiens; ob idque Medicus statim accersitus, ab adstantibus accepit febrem cepisse absque ullo rigore, pulsive coarctatione, ipse autem observavit liberum caloris ascensum, absque ullo pravo symptomate: præterea pulsus æquales & celeriores in dilatatione quàm in constrictione: urinam, cum naturali suspensio, omnino coctionem ostendentem: calorem suavem & halituosum, sed cum cutis siccitate: status clementiam, ægrique facilem tolerantiam. Perterriti autem Consanguinei, celeri matris interitu, postridiè me ad consilium de agendis accersiverunt, qui postquam jam dicta, à Medico observata, audivissem, & juvenem, cum febre decrescente madentem, invenissem, absque ulla de reditu febris suspitione, meam ita sententiam in medium protuli.

Licet aut nulla, aut valde exigua ope Medica indigeat Nobilis iste Juvenis, attamen, quia tempus non operandi, æquè ac operandi, Medicus cognoscere tenetur: remedia vero, non à medicamentorum, sed affectuum cognitione

sumuntur, ideo tenetur quoque Medicus affectus cognitionem habere (& quidem prima die) ut præstantissima hujusce facultatis peritum semetipsum ostendat. Quare jure gloriabatur, Gal. nullius Diariz cognitionem prima die ipsum aufugere potuisse. Et quidem Diariam existimo hanc esse febrem, quia unius diei febris etiam ab Hippocr. dicta est, ideo & ephemera appellari solet, sumpta denominatione ab ephemeris quibusdam animalibus, apud Hypanim fluvium, qui ab Europæ parte in Pontum defluit, nascentibus, & unico die viventibus. Neque exercitato Medico difficile erit, hanc febrem statim cognoscere, si ea, quæ à Viro Excellentissimo accuratissime observata fuere, examinentur.

Et primò, quod febris sine rigore & horrore inceperit, citraque pulsus coarctationem; cum enim rigor impetuofum motum humoris, aut crassi vaporis, per musculos requirit, extra febres humores non reperitur, sicuti sine his neque opprimi, neque gravari potest pulsifica facultas: horripilationes autem quædam contingere possunt, quando Diaria ex cutis obstructione provenit, quæ tamen faciliè solvuntur & evanescent.

Secundò, ipse observavit liberum caloris ascensum, quia à materia non opprimitur, sed liberè augetur; substantia enim spirituum subtilissima cum sit, facile inflammatur atque resolvitur.

Tertiò, pulsus æqualem & celerem in diastole tardiozem in systole, quia refrigerium, magis quam excrementorum expulsionem, Diaria desiderat.

Quarto, urinam statim concoctionem distendentem, quoniam nulla in venis humorum putredo reperitur, quod signum proprium & inseparabile est ab ipsa diaria.

Quintò, calorem suavem & halituosum; sicut enim ephemerarum calor suavis est, ita putridarum acris & mordax, ut aridus hecticarum.

Sextò, status clementiam, à facili ægri tolerantia desumptam.

Septimò, videre mihi videor terminandam hanc febrem cum madore quodam universalis; quia temperamentum est calidum & humidum, non autem cum sudore, ob prægressam lassitudinem & inedia. Et licet febris humoralis non sit, spiritus tamen cum content ex tenuissima sanguinis parte, & subtilissima aëris inspirati portione, dum in accensione attenuantur, crassior ipsorum portio in sudorem abit.

Et tandem incepit à procatarctica causa, quod est omnibus ephemeris proprium, facta namque fuit, ut notissimum est, ab insolatu, lassitudine, inedia & animi mœrore, prout ex lassitudine non semel Diaria fuit correptus ipse Gal. Has omnes, occasiones appellabat Gal. sicut causa, est accensio spirituum, non naturalium, quia non dantur, nec animalium, quia contingeret delirium, sed vitalium, non tamen semper immediate, sed nonnunquam mediante jecoris vel cerebri accensione, & ita sibi constat ipse Avicennas.

Quibus omnibus addamus cutis siccitatem, quæ in lassitudine major est quam in reliquis ephemeris omnibus, ætatem, spirituum accen-

sioni

fioni idoneam : temperamentum , ad calidum & humidum vergens , in quo spiritus accensione suspiciunt & conservant , cum in bilioso si spiritus accendantur , accensione non conservent , sed illico ad exultationem transeant , & tandem vitam anteactam , ab impuritatibus & excrementis immunem , quibus presentibus non adeo facile ephemeræ accendantur , sed potius excitantur.

Ephemeræ omnes , ex sui natura , sunt salutes , quæ 14. horarum spatio terminari solent , & licet adeo breves sint , non tamen inter acutissimos morbos collocandæ , quas ne vix quidem inter morbos ponendas esse existimabat Celsus , unde moderatissimas has appellabat Actuarius . Et hæc quidem talis censenda , hoc anni tempore calido , & diatritaria victus ratione à prudenti Medico omiſſa , ex Medicorum enim insensitæ ephemeræ , ab huius causis , non solum ad hecticas , verum & ad tabem ipsam atque marasimum transeunt .

Quod ut averteret peritissimus Medicus , in statu oribitionem , & portionem in declinatione Patienti obtulit , liquidem in hac febre curanda duplex debet esse Medicus scopus , alter febrem ipsam , alter partem affectam , cujus causa febris fuit inducæ , respiciens . Proprii satisfaciendum remediis universalibus , refrigerantibus & humectantibus , posteriori vero particularibus , affectæ parti appropriatis .

Universalia remedia tria proponuntur ab Avicenna . Potio frigida . Balneum & unctio , ne non congrua victus ratio .

Potio frigida offerenda in vigoris principio , ad lib. ʒ. 7. & 8. Aquæ fontanæ dulcissimæ , non mineralis , sed cavendum ne aut aliquod prohibens . Prohibentia autem quinque esse possunt , corporis gracilitas & extenuatio , cruditas præsentia , alicujus visceris imbecillitas , iniectio & anni tempus frigidum , quibus absentibus est certe remedium ingentis profectus , quod quidem in præsentis casu alioquin convenire potuisset , nisi præverso ordine , sorbitio refrigerans potioni præmissa fuisset , ut in cura coacta se gessit Gal. etenim præter inediam , & ab ea accidentalem quandam corporis extenuationem , reliquæ omnes aderant pro frigida potu conditiones , sed quoniam remedium hoc hisce nostris temporibus fere prorsus obsolevit , ut ego puto ob climatis qualitatem , & ob aquarum impuritatem , ideo Excellentissimus Adstant , frigida substituit serum asinum ad lib. ʒ. & quidem depuratum , ut quadam lactea evaporatione caput quoque humectaret . Propinari quinetiam possunt aquæ stillatitæ cichor. sonci , endiv. acetos. cucurbitulæ , cum julap. viol. ros. syr. de ribes , de berberibus & hujusmodi aliis .

Balneum aquæ dulcis secundum est remedium quod antiquitus sanis quoque familiare esse solebat , quodque ex quatuor constabat , aëre calido , aqua calida , aqua frigida , & loco deterfioni apto . Hoc administrari potest calidum & frigidum , calidum in ephemeræ curandæ , convenit in cutis constitutione , otiosis , somniculosis , ebriis & hujus ordinis aliis , sicut perniciosissimum in ephemeræ ab inedia , vigiliis , mœrore , insolatu , verbo , à causis omnibus digerentibus & exsiccantibus excitata . Frigidum vero contra , sicut prioribus causis

insensum , ita utile posterioribus , quod tamen gracilibus & valde extenuatis corporibus , ab initio tepidum , & sub finem frigidum institui debet , cum ut humectatio facilius ad internas partes pervadere valeat , cum quia actu frigidum nervosis & membranosis partibus parum amicum esse monuit Hippocr. quod quidem in casu nostro usurpari poterit , prout in Menandro Gal. sub cibo brevi exhibendo , cui post leves deterfiones , inunctiones ex oleo amygdal. & viol. succedere debent , hocque remediū genus triduo continuato administrandum .

Victus ratio tandem sit refrigerans & humectans , citoque nutrens . Cubiculum ad Septentrionem , vel saltem ad Orientem sit expolitum . Quoniam vero facilius est impleri potu quam cibo , ideo convenient prisana hordeacea Panatellæ , cum emuls. sem. mel. & amygd. dulc. Ova recentia , Panis vino madefactus , vinum enim sine formidine præbet Gal. Somnus sit consueto diuturnior . Quies omnium maximè ne cessaria . Alvus , si fuerit opus , clystere ex lacte , butyro & saccharo sollicitetur , & tandem alacri animo æger degat .

Partem affectam quod attinet , hæc particularia postulat auxilia , potest autem affici in ephemeræ febre cerebrum , cor , jecur aut ventriculus , at in præsentis casu afficitur cerebrum ab insolatu & cogitationibus intensis . Cor verò à mœrore . Caput igitur refrigerantibus & humectantibus irrigandum , ol. ros. viol. & vigiliis urgentibus , copioso nenupharino . Ab urtione quoque capiti parari possunt , ex aqua dulci , violis , malva , lactuca , nenuphare , foliis vitis & salicis alterata , quibus , æstu existente majori , adduntur quoque papaveris capita . Cordi vero ephithemata parentur ex aqua florum citri , aurantiorum , rosarum , addito aceto rosaceo & speciebus cordialibus temperatis , frigidiora namque in mœoribus , cor non postulat . Quæ satis , superque . *Idem Tom. 1. de Febris.*

Synocha.

Juvenis Nobilis , 25. annum agens , temperamenti totius calidi & humidi , plethoricus , & densi habitus , otio , somno & ventri magnopere indulgens , cum temporibus hisce bacchanalium , in suburbani recessum , ad convivium , cum commensalibus amicis , pedibus incedens concessisset , post prandium , & fecundissimos calices , eodem modo domum reversus , valde excaletatus , rursus cum iisdem compotatoribus potavit largius , ac interim mador , licet exiguus , qui per totum eruperat corpus , perfrigeratus est . Cubitum ivit , nec unquam somnum capere potuit , sed æstu intolerabili interno correptus , huc & illuc se jactabat , & de universali lassitudine , dolore capitis gravativo , & nonnunquam pulsativo , conquerebatur . Accersitus ego , in Pat. observavi rubram faciem , & quodammodo tumentem , cum delatione in somnum , nec sine aliqua respirationis lassione , calor tactui erat minimè mordax , pulsus maximus , æqualis & vehemens , urina & crassitie , & colore , à naturali non multum aliena , ac ipsi nares valde pruriebant . Medico autem domestico his perterrefacto , ita pro salute Pat. sum allocutus .

Mor.

Morborum primis aspectibus non statim fi-
dendum est. Excellent. Vir, siquidem, sicut ali-
quando debiles & parvæ febres, malignæ sunt
atque lethales, ita vehementes & magnæ, non-
nunquam simplices & longè minus pericu-
losæ evadunt, & quæ cum numero erit præsens,
febris sanguinea & synocha dicenda, quoniam
ex sola sanguinis effervescencia, citra putredi-
nem, sui se excitatam fac nobis superque per-
fendere possunt res, non solum præter naturam,
sed & naturales & nonnaturales. etenim, si
formam calorem consideremus, est habituosus,
fonsus & minime mordax, benigni humoris
accendi, sed non putrescentis indicium; si pul-
sum contrectemus, æqualem invenimus. ut-
pote qui non à fuligine is vaporibus, à putrida
minera inæqualiter elevatis, agitur, unde
Gal. hanc febrem in diariarum numero reposuit,
maximum præterea ob sanguinis accendi redun-
dantis copiam, vehementem atque frequentem,
obcurvi caloris maximum incendium. Urinam
inspicimus, à naturali statu parum distantem,
ac solum paulo consueto crassiorem, & rubram,
quia ex multo, crasso & accenso sanguine pro-
ducta est, somnum verò ab initio hujus febris
capere non potuit, ob ætium internum, angore
quendam inducentem, licet ad somnum
adiit proclivitas, quæ in febris progressu sem-
per augebitur, ita solum in lenis, & quodam-
modo soporoso evadet Patientis, ob multas fu-
migationes ab universo sanguine accenso eleva-
tas, quæ caput gravant, & replent pectus at-
que pulmones, unde aliqua respirandi difficul-
tas, quoniam totum corpus replent & inflant,
& ideo ab aliquibus, febris inflativa dicta fuit,
atque ab Avicenna febris profundi somni, ob
multitudinem vaporum condensatorum, as-
cendentium, & cerebrum humectantium. Ab aliis,
cum Gal. ephemeram plurimum dierum appellat,
nisi quoniam, non ineptè, hanc potius numerale-
m non putridam appellare maluit, tum ut ab
ephemera, quæ à solis spiritibus, tum ut à pu-
tridis distinguatur, & hac ratione non multi-
plicentur genera febrium.

Sic causa immediata hujus febris, est evapo-
ratio in cor & totum corpus, à sanguine multo,
non putrefacto sed solum accenso, elevata.
Quantitatis autem sanguinis causæ sunt in Pa-
tiente nostro, naturales & nonnaturales, tem-
peramentum scilicet calidum & humidum, ha-
bitus plethoricus, & otiosa, ac in cibo & potu
libera vivendi ratio, prout accensio in sanguine
fuit excitata à motu in itinere facto huic pleno
corpori laborioso, sed multo magis à prohibita
transpiratione, quæ copioso sanguini, & cutis
densitati, tum naturali, tum à perfrigerato ma-
dore adaucta, successit, copia namque sangui-
nis prægravat naturam, qui ideo depurari non
potest plurimi vero vapores à sanguine eleva-
ti nec dissipati, eundem, & una spiritus natu-
rales ac vitales, in arteriis & venis contentos
excalfaciunt, sicque, cum vapores eleventur,
& ob cutis densitatem non dissolventur aut resol-
vantur ab his fit ebullitio sanguinis, prout mu-
sti in dolio, ad quam non adeo faciliè consequi-
tur putredo ipsius sanguinis, quoniam à natura
custoditur ob vitæ necessitatem, nisi interim in-
tercedat prohibita transpiratio, ab humoribus
crassis ac lentis, sic in hujusmodi febribus ac-

cendi posse universum sanguinem, assererat Gal.
experientia siquidem sæpe videmus frumentum,
propter denegatam transpirationem, sine pu-
treddine multum incallescere; quæ synocha, sine
putredine, detinebatur Liber ille juvenis, à Gal.
descriptus, ex otio & intermisso exercitio, cui
aderant reliqua symptomata, in nostro Patientem
quoque appetentia, nempe intolerabilis æstus,
lassitudo totius tensiva, capitis pulsationes, vi-
gilæ, jactationes, & narium pruritus, synochis
omnibus communis; quibus rursus adduntur
considerandæ res naturales & nonnaturales, ni-
mirum totius temperamentum calidum & hu-
midum, habitus plethoricus, copioso sanguine
abundans, & juvenis, otio, comestationibus &
comotationibus deditus, pleno corpore exer-
citatus.

Unicam itaque habebit accessionem febris
hæc, si benè tractetur, ne transeat in putridam,
in quam valde propensa est, ob cutis densitatem
& plenitudinem totius, ac præterea, quia non
paracraftica & decrescens, nec homotona &
æqualiter affligens, sed epacraftica, hoc est
semper increscens observatur, idque, quoniam
plus est quod evaporat quam quod resolvitur, &
ideo non unius sed plurimum dierum erit hujus-
modi accessio.

Febris hæc, cum sit continua & continens,
periculo vacare non potest; eo magis cum sit
epacraftica, nimirum semper increscens, ho-
motona & paracraftica periculosior. Et licet
mitior, ac cæteris simplicior nominetur à Gal.
locutus tamen fuit respectu ad putridas, sit
enim ex sanguine, inter humores benignissimo
& non putrido. Hæc paucis diebus terminanda,
nunquam enim hebdomadam excedit febris hu-
jusmodi, & benè judicabitur rectè tractata,
non enim tolerat pigritiam, aut Medicorum
ignorantiam, quin degeneret in putridam, aut in
phrenitidem, anginam, vel pleuritidem.

Ideo nihil cunctandum, sed Medicis scopis
illico satisfaciendum, sanguinem evacuando,
alterando, & meatus totius corporis aperiendo.
Quapropter tria proponuntur à Gal. potissi-
ma remedia, sanguinis missio, usque ad ani-
mi deliquium, frigida potio, & balneum.

Et primo à sanguinis missione curationem esse
inchoandam, idem præcipit, quia nullo modo
differenda, & licet nonnulli Gal. arguant, quod
in curando juvene illo libero, sanguinis missio-
nem distulerit in tertium diem, attamen ipse
spontè in secundum tantum eam distulit, ut
certior fieret de natura febris, dilatio vero in
tertium, non ab ipso Gal. ut patet ex ejus ver-
bis, sed à cæteris vincentibus Medicis decre-
ta fuit.

Quamprimum igitur, injectio clystere, ad
sanguinis missionem deveniendum, nulla ex-
pectata febris declinatione, quæ in epacraftica
futura non est usque ad integram ipsius febris
solutionem. Educatur autem usque ad animi
deliquium, quidquid dicat Averr. contra Gal.
& Hippocr. ipsum, forsitan non distinguens ani-
mi deliquium à syncope, ut distinxit Gal. di-
cens, quod dum educitur sanguis usque ad ani-
mi deliquium, pulsus mutationi attentos esse
oportet, ne syncopen incurrant. Hac igitur
evacuatione abundans ferventis sanguinis co-
pia minuitur, totum corpus perfrigeratur, & ad
natu-

naturalem temperiem deducitur, unde sublevata natura, residuum expellere ac superare valet, adeo ut eorum qui ex cutis obstructione hac febre correpti fuerunt, nemo in putridam inciderit, hoc administrato præsidio, cujus, in casu nostro, adest omnino permittens, & abest quodcumque prohibens, quod item remedii genus indicatur magis à præsentis epacmastica, ab homotona minus, & adhuc minus à paracmastica.

Secundum, continentium febrium maximum remedium, est frigida potio, quam omisit Gal. in curando juvene illo libero, quia tota sanguinis missio sufficiens fuit. Hoc autem remedium ægro, copiosa sanguinis evacuatione indigenti, perniciosum esset, quia copiam intra corpus incrassando, coerceret atque firmaret, & immixtus calor, à multo & crasso sanguine veluti suffocatus, à frigida potu obrueretur, cum tamen aliqui Medici Hamophobi, falso crediderunt frigida potum esse remedium venæsectioni substituendum, licet sine detractio sanguinis administrari non possit, adeo ut venæsectio sine frigida potu admitti quidem possit, ut in juvene libero, non autem frigida potus sine precedente sanguinis missione.

Propinetur itaque Patienti nostro frigida, levis & copiosa, ad pallorem; egregius enim potator est, & omnium prohibentium expertus, corpus etenim gracile non est, robur habet omnium viscerum naturalium, abunt tumor es & obstructions, nec deest consuetudo, & licet tempus ætivum non sit, hæc tamen parvi momenti conditio prohibens, præsentibus cæteris omnibus permittentibus.

Quod si, aut Medicus Psychrophobus, aut Patiens Hydrophobus fuerit, absentibus quoque frigida potum prohibentibus, tunc frigida potioni substituenda est potio aquæ stillicior. acet. end. aquæ hordei, feri capr. aut asinini destill. quibus addi poterit julap. ros. violac. syr. de succo lim. de acido cit. de succ. acetosæ.

Interim flos cass. cum pulpa tamarind. locum habebit, cum sero capr. aut aqua Nocera, si febris protrahatur.

Balneum aquæ dulcis, tertium est medicamentum in casu nostro administrandum, calidum scilicet tum ad meatus recludendos, tum ad vapores expurgandos ac discutiendos.

A balneo absterisiones non adeo leves fiant, & ab his, frictiones panno calido, inunctionibus omissis, utpote quæ poros cutis obturant & totum humectent.

Extra balneum refrigerantia conveniunt, hepatis, Cordi, Renibus & Testibus. Si pro hepate, ℞. Succ. cichor. depur. lib. j. succ. lim. unc. iij. acet. ros. unc. j. specier. triumfandal. drachm. ij. m. pro epith. hepatis. Pro corde.

℞. Aq. melissæ, borraginis an. lib. j. Aq. flor. cit. ros. an. unc. iij. succi cit. acet. ros. an. unc. j. f. specier. cord. temp. drachm. iij. m. pro epith. Cordis.

Pro Renibus, ℞. Unguent. ros. Mes. infrigid. an. unc. j. sandal. popul. an. unc. f. m. pro renum illitu. Sic testibus aqua rosacea, cum aceto frigida applicata, magnum affert toti refrigerium.

Victus ratio sit refrigerans & humectans, tenuis, ita ut sola ptisana sufficiat, vel lactuca cocta, vel cucurbitula, cum aliquo ex fructibus

refrigerantibus. Potus sit aqua hordeacea, vel stillatitia acet. aut end. Vinum oligophorum. dilutum, tandem concedit Serapio in declinatione. Et hæc pro salute Nobiliss. Patient. satis. *Idem ibidem.*

Synocha Putrida.

Juvenis Illustrissimus, 25. annum agens, temperamenti totius & hepatis, calidi & humidi, densi, carnosi atque plethorici habitus, valde edax & bibax, vinis dulcibus & substantiæ crassioris usus, otiosam vitam ducens, tandem, adventante Vere, ut sibi extremas partes, imo totum corpus excelsaceret, frigisque illius diei importunum fugaret, ad parvæ pilæ ludum cum solus se contulit, ita excalescens sudavit, vinum potavit, nec indulum jam madefactum mutavit; coenavit, & nocte sequenti febricitavit, cum quibusdam horroribus inxqualibus, & totius corporis lassitudine phlegmonosa, manè autem parentes Medicos statim advocarunt, ut de agendis consulerent. Invenimus Nobilissimum patientem ætuantem, huc illic per lectum se. e. jactantem, cum intenso rubore faciei & oculorum, capitis gravitate, & dolore circa fauces. Calor ad tactum multus erat, non adeo acris & mordax, ut vulgo in cæteris putridis observari solet, nec tamen adeo suavis & halituosus, ut in ephemeris, semper autem æqualem manum tangenti se. e. offerebat. Pulsus erat magnus, frequens, mollis, vehemens, & major in systole quam in diastole. Urina rubra, & crassa. Quibus à nobis observatis, alterans ex refrigerantibus aquis stillatitiis, mox ptisanæ cremorem præscripsimus, & ut interim natura febris clarius nobis innotesceret, in vespere consul-tationem distulimus tuncque Patientem observamus eodem febris tenore divexatum, atque inde symptomatibus afflictum, absque ulla status mutatione aut alteratione. Quare pro ipsius salute ita consulitum fuit.

Magnam & acutam febrem affligere Juvenem hunc Illustrissimum, statim coniecimus ex ætli magno, & quoniam statim extremos habuit labores, dum illico ad statum pervenit, synocham eandem judicavimus, quæ continens, à continuo fervore, à Gal. & Antiquioribus dicta fuit, & ab Avic. conclusa, est, quæ illa febris quæ nullas habet exacerbationes, sed à principio usque ad finem uniformiter progrediendo, unica accessione terminatur, de qua Gal. dicebat quod unicam habet accessi-onem, quia nulla est corporis pars quæ præcipue sit offensa, quæ vel mittat, vel suscipiat, vel generet, vel attrahat superfluitates, sed humores habeat in venis omnibus & arteriis, præsertim maximis, & plurimo calore abundantibus, putrefactos. Ex quibus Gal. verbis patere potest sanguinem, pro tota massa sanguinea sumptum, putrescere in hac febre, & æqualiter in cor evaporare, quidquid dicant Avic. Averr. Argentarius, Mercatus, Capivaccius & alii, Gal. redarguentes quod asseruerit sanguinem, dum putrescit, secundum partem tenuiorem, in bilem, secundum crassiorem vero, in melancholiam converti, & ita non dari febrem sanguineam. Etenim si ita sensisset Gal. febrem synocham dari negasset, neque eandem ab ardente distinxisset, ac potissimum febrem sanguineam sanguinis

missione usque ad animi deliquium non curasset, quam in biliosa febre nunquam admittere ausus esset, & præterea, sanguinem corruptum, putrescere, & febrem accendere, iisdem verbis attulit Gal. ipse: credidit tamen dari synocham, & legitimam, & spuriam, legitimam quidem, à tota massa sanguinea, omnes humores æquali proportionem continente, ut in illo Juvene; spuriam, ab eadem cum bilis exuberantia putrescente, quam ideo quodammodo biliosam appellabat ipse Galenus.

Hanc autem legitimam synocham existimamus, & homotomiam, tanquam æqualiter affligentem, & quia peccantis sanguinis nullum nobis detulit indicium, quia ætas juvenilis est, temperamentum totius calidum & humidum, habitus plenioris, sanguine refertus, necnon vita antea cuncta sanguinem multiplicans, sic dicebat Gal. bene haberi corporis, ac valentis ætatis propria est, & ideo nec in frigida ætate, nec in frigido temperamento fieri solet.

Præterea, altus inguis cum corporis iactatione, copiam fervidi ac putrescentis sanguinis indicare possunt, sicut calor ille, multus quidem, verum suavis & semper æqualis, non acris, mordax & inæqualis, ut in cæteris putridis, benignum humorem, sanguinem scilicet putrescere significat. Pulsus magnus, ob copiam spirituum arteriam dilatantium, frequens, ob usum adauctum à caloris intensione, mollis, ob sanguinis copiosi præsentiam, vehemens, ob virium robur, procedens à copia sanguinis & spirituum, majorem autem habet contractionem quam dilatationem, ob majorem necessitatem expellendi fuligines.

Urina rubra & crassa, copiosi sanguinis peccantis indicium, prout esset biliosa, rufa & flava. Lassitudinem totius phlegmonosam & capitis gravitatem, à copioso sanguine, & multo magis à nimia vaporum copia provenisse credendum, necnon facies rubra, cum rubris oculis & venis, veluti sanguine suffusis, ac faucium glandulis intumescens, exuberantis sanguinis indicia existunt.

Sanguis autem iste copiosus, à parvæ pilæ ludio, utpote violento exercitio commotus & excalesfactus, nec à venis repletis ventilatus, putredinem concepit, & quidem facilius ex prægressa totius corporis cutis densitate, sudore perfrigerato, & inde prohibita universali transpiratione, ob quam retrocesserunt excrementa, adauctus est calor internus, & præterea ex retentis vaporosis excrementis, universali horripilatione, febris jam dicta synocha putrida, eaque homotona secuta est.

Febrem hanc inter simpliciores enumerabat Gal. unde, nisi accidat error, sperari potest crisis, in quarta aut per hæmorrhagiam aut per sudorem, ad summum vero in septimana: synochus enim vel incipit à vigore, vel tribus aut quatuor horis, ad vigorem pervenit, imò totus synochorum decursus, status est. Error autem, qui maximus in continentibus committi potest, est curationis dilatio, apud nos vero, præter dictum, secundus & frequens est, omissa sanguinis missio, aut quia timidi sint Patientes, aut quia Medici imperiti, hæmophobi & cucurbitularii, & ideo, si febrilis hæc hebdomadam pertranseat, acutissimi, maximi & gravissimi morbi contingere poterunt, unde & ipse Hippocr. dicebat,

quod morbi qui ad febres continentes consequuntur, sunt maxime acuti, & accidunt laboriosissimi, qui plurima tutela & exactissima curatione egent.

Protractionem autem, imò & exitum infelicem, nobis plurimum præmonstrant urina, quæ si ab initio ad albedinem vergant diuturniorem fore febrem significant, si alba & tenues, plerumque mortem prædicunt. Cum itaque in calu noctuo, ubra & crassæ appareant, & quia nullus in curatione error admittitur, salutarem ac brevem fore speramus, cum vero densus sit Patientis habitus, hæmorrhagia facilius quam sudor expectari poterit.

Utrumque, statim ineunda curatio, quæ quatuor periculi debet. Refrigerantibus & humectantibus, ratione febris. Refrigerantibus & exsiccantibus, ratione putredinis. Attenuantibus & incidentibus, ratione obstructionis. Et tandem evacuantibus, ratione materiæ peccantis. Inter has autem indicationes, illa quæ à febre desumitur dignior est & cæteras obscurat, ut Galeno visum fuit.

Et in Chirurgico fonte, in primis consideranda sanguinis missio, quæ si in ulla alia febre conveniat, in hac necessaria censeatur à Gal. dicente, saluberrimum autem est in febribus venam incidere, non modo continentibus, verum etiam aliis omnibus quas humor putrescens concitat, ubi nec ætas nec vires prohibent. Ratio autem est, quoniam adest vitium in sanguine, & morbus est magnus: sic servus, synocha putrida laborans, nullo sanguine à Gal. septima omnino liberatus fuit.

Quantitas autem, sit usque ad animi deliquium, quam evacuationem admisissent quoque Averroes, Celsus, Brasavolus, si inter se distinxissent exsolutionem, animi deliquium, & syncopen. Exsolutionem quippe distinxit Hipp. ab animi deliquio, dum dixit, A tuberculi intus ruptione, exolutio, vomitio, aut animi defectus. Deliquium autem distinxit Gal. dicens. Quod si crassi succi, neque obstruant, neque onerent, syncopen certe non inferunt, sed animi deliquium. Sanguinem itaque mittit Gal. usque ad animi deliquium, non usque ad syncopen, nimirum usque ad incipientem pulsus mutationem, non ablationem, ita enim totum corpus refrigeratur, & ad pristinum temperiem deducitur, ac natura copiam peccantis humoris, per nares, vomitum, alvum, urinam aut sudorem expellit, eoque audacius in tali casu molienda evacuatio, cum Juvenis sit plethorici habitus, neque cruditates prohibeant, quæ si omitteretur, periculum incurreret suffocationis, aut syncopes, nisi plurimus sudor, aut largum sanguinis profluvium, ipsum à morte vindicarent, atque ita miseri ægrotantis vita, non in manu Medici, sed naturæ suffocata posita esset. Tempus sit, quamprimum, immisso clystere, antequam sanguis majorem putredinem nanciscatur. Quod si ob metum patientis, aut Medici, nonnunquam differatur sanguinis missio, sexto, septimo, ac sequentibus diebus erit usurpanda, non enim dierum numero, sed virium robori in hujusmodi febribus attentos esse oportet.

At si fortè ægri parentes sanguinis missionem usque ad animi deliquium reformidarent, repetatur

tatur bis auster, adeo ut cum Avic. multiplicatio numeri quantitatem suppleat. Conveniunt præterea frictiones totius corporis, nec non cucurbitulae leves, ad cutis obstructions referandas, & liberam transpirationem ac diaphoresin conservandam.

Et quoniam, maxima continentium febrium remedia duo sunt detractio sanguinis, & potio frigida, ideo, si sanguinis nihil sufficiens non fuerit, frigidam propinandam esse, præcipit, sic Rusticum quendam, synocha laborantem, gelidæ potu post venesectionem sanavit ipse Gal. & ideo hoc quoque remedium patienti nostro conveniet, ut qui nativi caloris robore gaudeat, viscera omnia ab obstruccionibus, tumoribus & inflammationibus immunda habeat, copiosis gelidæ potibus sit assuetus, nec græcile sit ipsi corpus. Quare, aliqua tunc, licet non perfecta, sed incipiens saltem concoctio expectanda foret, & primæ viæ ab excrementis mundandæ. Hoc autem statim ab educto sanguine curandum, syr. ros. sol. & manna, cum decoct. pulpæ tamarindorum, flore cass. cum tart. quibus superbibat seri depurati lib. ij.

Dum autem expectatur concoctio, cæteris indicationibus satisfaciendum, attenuantibus & incidentibus, juleb scil. acet. vel cum Avic. acido cit. in aqua hordeacea, vel syr. de acido citri, de succ. lim. in aquis stillat. de succo cich. acet. endiv. imo & jusculis ci. horaceis alteratis.

Frigida propinata, observanda naturæ propensio; quæ plurimum solet esse ad sudorem vel ad urinam, nisi hæmorrhagia secuta fuerit, ideo parari poterit pulvis, repetendus, qui, ut explicans, putredini quoque resistere valebit.

℞. Corn. cerv. philosoph. drachm. j. lapid. Bezoar. occid. drachm. sem. m. pro dualis vicibus, & præbeatur in aqua Card. sanct. & scorzonæ, cum gutt. spirit. vit. mane & vespere. Clysteres quoque frequentes injiciendi, continentantes, & ad alvum allicientes ex decoct. malv. viol. mercurial. nordeac. cum cass. & syr. rosar. solut.

Tandem, ad rhabarb. exhibitionem cum cass. vel. syr. rosar. solut. cum copioso sero capr. depur. deveniri poterit, caute tamen, & non nisi apparantibus manifestissimis signis coctionis, nimirum sub linem, ne reliquantur in morbo quæ recidivam facere possint, alioquin, antè signa coctionis, calor febrilis augetur, turbatur concoctio, neque sequitur humorum evacuatio.

Extrinsæc interim, refrigerantia, Jecori, Cordi, Renibus, & testibus, apponi debent.

Et pro jecore, ℞. Aq. de succ. cichor. lib. j. de succ. hepat. lib. s. succi lim. vel aurantiorum unc. iij. acet. ros. unc. j. s. specier. trium sandal. drachm. iij. m. pro epith. jecoris.

Pro Corde, ℞. Aqu. viol. ros. an. lib. j. Aq. flor. cit. unc. iij. succ. cit. acet. ros. an. unc. j. s. specier. cord. temp. drachm. iij. m. pro epith.

Cordis. Pro renibus, ℞. Aq. nymphæ lib. j. plantag. ros. an. lib. s. album. ovor. rec. n. ij. m.

Pro testibus, ℞. Aq. ros. unc. vi. Aq. sempervivi, acet. ros. an. unc. iij. m.

Victus sit refrigerans & humectans, tenuis, ut emulsio sem. mel. cum pauxillo pane, vel ptisana sola, jubet enim Hippocr. in forbitionibus & potionibus degendum esse donec fe-

bris imminuta fuerit. Vinum omnino interdicitur. Et hæc pro salute Nobilis Patientis dixisse, satis. *Idem ibidem.*

Ardens.

Mercator Nobilis æt. annuum agens, temperamenti totius, & jecoris, calidi & seci, gracilis habitus, & ut ad operationes omnes exercendas promptissimus, ita ad iram facile pronus, cum sub Cane, ut Nundinas adiret, pluribus diebus sub radiis solaribus iter fecisset, diuturnum iterum passus, vina meraciora abundè potavit, iisdemque diebus, domum reversus, inexhausta siti detinebatur, & totius corporis lassitudine dolorosa corripitur, cui paulo post succedit vehementissima febris, cum ingenti calore & inextinguibili siti, quæ prima & secunda die continuè perseveravit, absque ulla declinatione cum linguæ ariditate, oris amaritudine, vigiliis, inquietatione corporis, aliqua interpolata mentis alienatione, & dejectionibus per alvum biliosis non sine aliquo morbo, modo ad tertium pervenimus diem, in quo, pro febris, & symptomatum declinatione, potius omnium exacerbatio, licet non cuilibet evidens, a nobis Medicis convocatis observatur, cum respiratione magna, celeri atque frequenti, pulsu pariter celeri & frequenti, temporum pulsatione & urina flammea, cum aliquotamen apparente suspensio. Quare de agendis pro salute consult.

Calor exurens & sitis inextinguibilis, sunt duo symptomata pathognomonica, adeo ardenti febrim propriam, ut omni, soli & semper ipsi conveniant, biliosarum enim omnium maxima est ardens, si magnitudo febris à magnitudine caloris est desumenda; Deurentem enim & Cautonam, sive Causonidem, ab incendio, eam Græci dixere, quam proprie & peculiariter ignem appellavit Hippocr. in Sileno, Philini Uxore, Metone, & Erasmo. Talis est quidem præsens febris, quæ torquetur egregius ille juvenis, in quo, pro abundantissima bilis generatione concurrunt causæ omnes internæ & externæ, naturales & nonnaturales. Juvenis enim est Patiens, temperamenti totius & jecoris, imo & ipsius cordis, calidi & seci, cum & ad operationes omnes & ad iram promptissimus sit, habitus quoque gracilis, quæterositatibus biliosis, non probo langvine abundat, unde carnosus evadere potuerit, iter longum fecit sub radiis solaribus, & firim diutius passus est, quam extinguere credidit potibus meracioribus, sed præterea copiosa bilis in venis putrescentis, & ardentem febrem excitantis, præsentiam sat superque attestantur, lassitudo ulcerosa, quæ primò futuram febrem pronuntiabat, modo præsentem ostendit, biliosorum enim ac tenuium humorum acrimoniam significat.

Pariter reliqua signa ab Hippocr. & Gal. proposita, necnon à Paulo, Oribasio & Aetio recepta, nimirum lingua aspera & sicca, dejectiones liquidæ & pallidæ, ventris morbus, vigilia, interdum mentis alienatio. Et primò quidem lingua aspera, & sicca, ob insignem exustionem; biliosæ dejectiones & liquidæ, à calore colliquantur; ventris morbus, ex confluxu acrimiarum humorum ad ventrem, à quibus elevati vapores.

ad ventriculū, inquietudinē & angorem inducunt; vigilz, ob vaporum acrimoniā caput pet. ntium & exsiccantium, mentis alienatio, à raptis in cerebrum, non vaporibus solū, sed biliosis humoribus, spiritus agitantibus & cerebrum calefacientibus, nondum tamen inflammantibus. Respiratio est magna, celer & frequens, quia os aperientes continuò respirant, ut majori exsufflatione spiritus ignei levetur ipse Patient. Pulsus celer & frequens, ob necessitatem calorem eventilandi & fuligines expellendi, prout temporum pullatio, ex spiritu, a vehementi calore impulsio atque commoto. Urina tandem flammea & lucida, utpotè ignea & biliosa, & in ardentibus perniciosus, aut nigra, aut alba, nigra, ob flavam bilem superadditam, alba, & omnino cruda, dum tota bilis ad caput tertur & phrenitidem facit.

Quibus omnibus in copiosa bilis præsentiam conspirantibus, a nobis consideratis, ardentem febrem necessario recutam vidimus, cum hoc ætli o tempore, venulæ exsiccata a toto ad sese biliosos humores attraxerunt, sicut enim siticulosus quipiam ætli o tempore redditus, si liberatius aquam salitam, vel vinum purum bibat siticulosior evadit, ita attractrix vaforum facultas ac res humiditates attrahit, quæ in uno membro, erysipelas, in toto, causam faciunt. Hæ autem biliosæ humiditates sunt præd. , bilis excrementitia, utpote magis putredini obnoxia, progressu verò & alimentalis, quæ ratione ignis prius in aridioribus stipulis accenditur, mox in virgultis, & lignis, tum quæ pulvis & umiz peiores evadunt. Sic de Ichoribus loquuti fuerunt. Hipp. & Gal. 4. Acut. 1. 1. de M. rb. 27. & 4. Aph. 57. De humoribus verò, 4. Aph. 58. & 59. 2. de Crisib. 3. & 1. de Diff. Feb. 9. Bilis autem huiusmodi tertio quoque die accessionem non excitat, quia putrescit in venis maximis & cordi proximis, annot. tionem, & exacerbationem quandam præbet, licet obscurissimam tum ob ejus insignem activitatem, tum quia solet putrescere in venis, maximum consensum habentibus cum corde & faucibus, & ideo calor exurens, & sitis inextinguibilis, sunt signa ab hac febre inseparabilia, quas partes voluit esse Gal. ventriculū, hepar & pulmones.

Ardentem febrem acutissimam & perniciosissimam appellabat Gal. quæ, si exquisita intra hebdomadam terminatur, quia adeo ingentem calorem, & symptomatum vehementiam, diutius natura tolerare non potest, quare statim aut vincit aut vincitur. Hæmorrh. gia expectari potest, cum huiusmodi febre & familiaris & salutaria esse soleat, familiaris quidem, quia sicut in musto effervescente, ob spirituum copiam, dirumpuntur & utres & dolia, quid mirum si in ardentibus aperiantur venarum? Salutaris vero adeo esse solet, ut Hippocr. dixerit, quod maximè servabantur illi quibus ritè & largiter sanguis per n. res erumpebat, quorum nullum vidit mortuum. Philiscus vero, Epaminondas & Silenus, quibus parum, quarto & quinto die de naribus stillavit, mortem obierunt. Gal. addit in Comm. quod servati quoque nonnulli sunt, quibus aliæ hebant excretiones, aut per sudorem, aut per urinam. Heraclides autem, apud Aristoclidem, ardente febre detentus, auriginosus factus, etiam ante septimam quia

has tres habuit omnes evacuationes, servatus est, sed per arum servari fuerunt Bion, Critonis puer, & ipse Mito.

Exitalem autem, & omnino perniciosum eventum, in ardentibus pronuntiavit liberè Hippocr. ex quo mors futura a sex potioribus signis tuto prædici poterit. Et primo quidem si diebus paribus intensior febris hat. Secundo si adsit necitas linguæ, nec tamen æger illam persentiat. Tercio si nulla meri sanguinis appareat. Quarto si rigor ægro jam debili superveniat. Quinto si superveni t icteritia ante septimum. Sexto, extremarum partium refrigeratio.

Cum igitur nullum horum adsit in Patientem nostro, & remedia tempestive admittuntur cum ægri obtemperantia, & sedulitate assidentium, speranda sanus.

Pro curanda hac febre, à nobis considerandus modus quo pere. nt ardente febre correpti, exsiccantiamque moriuntur. Quare, indicationes sunt desumendæ, ab ipsa febre, a causa, & a viribus. Et primo quidem febris validissima postulat refrigerantia. Causa, bilis nimirum, & ipsa refrigerantia quidem primo, verum & secundo evacuantia. Vires vero tertio indicant sui conservationem, aimentis refrigerantibus & humectantibus, neque sunt negligenda symptomata.

Pro explendis intentionibus jam dictis, tria præcipua ab Antiquioribus considerantur remedia. Venæsecutio, frigida potio, & Bala. um.

Venæsecutionem in curatione ardentis febris proposuit Gal. cum Hipp. quam tamen damnat Avic. & Arabes a Græcis dimentire videntur. Verum neque Græci in vera, legitima & exquisita ardente curanda, sanguinis missionem proponunt, sic neque Paulus, neque Trall. neque Aëtius ullam de sanguinis missione mentionem fecerunt, pariter Hipp. & Gal. hoc remedii genus omnino prætermiserunt, & ratio est quoniam dum sit à pura bile excrementitia, cum defectu sanguinis, in temperamento calido & sicco, habitu gracili, facileque resolvable, cum prægressa viciis ratione calida, in regione & anni tempore calido, vires constare non possunt. At si hæc à sanguine bilioso, aut à bile sanguini mista, mittitur sanguis ad caloris ventilationem, sanguinis effervescentis moderationem, fuliginum dissolutionem, & ad calidi humoris à corde diversionem. Animos autem addit ad sanguinem mittendum, crisis, seu judicium, per longum ex naribus sanguinis profluvium, quod ardentibus febribus san. iare esse solet. Nec valet Avic. object. quod effrenetur bilis, quoniam æqualiter educitur effrenans ac effrenatum, nam in divisione misti, unaqueque pars illius divisionis, constat ex omni simplici constituyente totum mistum. Unde Avic. in non exquisita sanguinis missionem admittit, dicens, & non phlebotometur, fortasse enim inflammabit, in pura scil. & exquisita, non inflammabit, in impura & non exquisita. Quantitas tamen nullo modo sit usque ad animi deliquium, licet talis evacuatio proponi videatur à Gal. in febribus ardentissimis, intendit enim, ut Brasavolus, & cum eo omnes Professores interpretantur, per ardentissimas febres, fortissimas & vehementissimas, quales sunt synochi. Educatur itaque, habita virium & humoris peccantis ratione, parçè tamen semper; imò, non con-

constantibus viribus, venæsectioni substituantur cucurbitulæ, vel hirudines venis fedalibus admotæ, præsertim urgente delirio, in quo casu phœnigmi quoque applicantur.

In nostro autem casu, cum omnes adsint ardentis puræ, legitimæ atque exquisitæ conditiones, à sanguinis missione erit omnino abstinendum, & ad frigidæ potionis considerationem deveniendum, est enim secundum principale remedium, in curatione febris ardentis, à Gal. propositum, his verbis. Nullus, cui frigidam propinavi, mortuus est, quia opportunè propinavi: neque perniciosè habentibus eam administrare unquam sum conatus. Hoc autem remedium genus satisfacere poterit Medicis intentionibus, non solum curativis, quatenus æstuantem calorem febrilem contemperat & extinguit, verum etiam præservativis, quatenus bilis mordacitatem & acrimoniam moderari, demulcere, ejusdem tenuitatem incrassare, & non raro eandem per vomitum, alvum aut sudorem evacuare solet.

Caute tamen frigida præbenda, etenim, licet adsit indicans, sæpè tamen adest prohibens. Prohibentia autem plurima sunt, gracilitas corporis, imbecillitas caloris nativi, viscerum obstructions, tumor, vel inflammatorius vel scirrhorius, vel œdematosus, inluctudo, tempus non ætivum, & signa crudelitatis, quàm tamen admittit Trall. in inflammationibus erysipelaceis. Sed quoniam prævidit Gal. difficillimum fore, ut omnia dicta prohibentia à febricitante abesse possint, & ideo egregium hoc remedium genus rarissimè usurpari posse, restrinxit ad tres conditiones. Prima est, quod febris sit ardentissima, & est indicans. Secunda, quod adsit totius & viscerum robur, & est permittens. Tertia quod appareant signa coctionis, & sic non adest prohibens. Et quoniam scio multos instare, quod si expectentur signa coctionis, tunc æger in tuto est, & ideo frustra futurum remedium, si vero non appareant, nunquam locum habebit, unde contra Gal. Aver. insurgit, pluresque adducit rationes, concludens exhibendam esse antequam ad exsiccationem ducatur, sicque moriatur æger: Hanc ob causam, Galenum explicando, dico sufficere quod aliqua appareant signa coctionis, quæ observantur in augmento, antequam æger exsiccetur, nec in tuto reperiatur, brevissimum enim est febris ardentis principium.

Quantitas sit ita copiosa, ut potentior ipsa febre evadat, ad extinctionem sitis, quantam unico haustu haurire potest Pateriens, ad extinctionem vero febrilis caloris usque ad mutationem coloris ad plumbeum, ad lib. 6. 7. & 8. gelida autem in assuetis sit, naturalis vero frigiditatis, in desuetis.

Tempus universale sit, transacto principio, nimirum in augmento, præsumpto medicamento leniente, vel syrup. ros. solut. cum sero capri aut flore cass. cum eodem sero, non autem purgante, quidquid dicant Averr. Trall. & Paul. Et licet Hippocr. proposuerit sorbitiones attractorias, non novit nostra lenientia, sed præterea cibum medicamento commiscendum innuit, ad siccitatem arcendam, quod nos etiam in leventibus exhibendis observare tenemur, & adeo serum copiosum superbibendum præbemus.

Particulare vero tempus sit, horis minõris afflictionis, recedente statu, tuncque tegatur Pateriens, quiescat, & somnus imperetur ut sudor provocetur. Ac pròinde in Pateriente nostro, frigidis potibus assuetis, cum adsint conditiones requiritæ, ad gelidam exhibendam, & aliqua signa coctionis apparere cœperint in urina, frigida propinari poterit, in præsentis exacerbationis status declinatione, jam dictis omnibus observatis, & alvo prius flore cassiæ lenita.

Quibus concedi non potest frigida potio, alia refrigerantia, & bilem ac calorem contemperantia substitui possunt. Hippocr. Causo laboranti, aquæ muliæ coctæ & aquosæ, quantum æger voluerit præbendum jubet, imò & lac asinæ concedit, sed Gal. in Comm. serum præfert. Ægyptii utebantur aquis stillatitiis anguriæ, cucumeris & melonum. Trall. narrat se frequenter ardentem febrem sanasse succo peponum, & aqua copiosa superhausta. Sennertus, dat emulsionem seminum melonum, cum sero asinino. Fonsæca, copiosam aquam hordei, cum drach. j. salis prunellæ. Nos, potionem ex aquis de succo cich. acet. endiv. cum syr. de succo lim. Mox pro secundo alterante, decoct. viol. lactucæ, portulacæ, hepaticæ, nymphæ, sempervivi, cum, succis acidis refrigerantibus. Et licet Masfarias reproboverit acida, ut adstringentia, forsitan non cognovit quod stypticorum alia sunt crassæ substantiæ, ut pontica & aultera, sorba, corna & hujusmodi alia adstringentia, alia tenuioris, ut acida, succus citri, limoni. acetum, vitriolata omnia, hæcque non adstringentia, sed aperientia sunt, quæ ideo potionibus refrigerantibus, imò & aperientibus immisceri possunt.

Balneum tandem, est ardentis febris tertium præcipuum remedium, ex aqua dulci, malva, violis, lactuca, nenuphare alterata, paratum; tepidum initio, pro resolutione acrium humorum, ulcerosam lassitudinem causantium: frigidum in fine administrandum, licet robustis corporibus, ætivo tempore, frigidum quoque statim & semper permittat Gal. Sed quoniam Balnei usus hisce nostris temporibus jam obsolet, ideo in nostro casu omittatur, & capiti, cordi, jecori, renibus & testibus refrigerantia apponenda substituantur. Sic capiti applicentur lintea, aqua rosarum, violarum, lactucæ. salicis & papaveris imbuta.

Cordi, ℞. Aquæ nymphæ, viol. ros. buglossi an. unc. iv. flor. cit. unc. ij. aceti ros. succ. lim. an. unc. j. specierum cord. temp. drachm. ij. diamargarit. frigid. drachm. j. camphoræ gr. ij. m. pro epith. cordis sæpius repetendò.

Hepati, ℞. Succis depuratis cich. lib. j. end. lib. f. lactucæ unc. ij. succi lim. unc. ij. aceti ros. unc. j. specier. trium sandal. drachm. iij. m. pro epith. jecoris. Renibus applicentur folia nymphæ, aqua frigida lota, vel lintea lacte madentia,

Vel ℞. Unguent. ros. Mes. infrig. Gal. an. unc. ij. m. illinantur renes, mox folia vitis, aqua lota, superponantur. Testibus applicentur lintea aqua ros. frigida, cum aceto ros. imbuta.

Dum hæc omnia sunt, frequentes sint clysteres refrigerantes & humectantes, ex decoct. malv. viol. hordei, cum oleo violac. butyro & flore cassiæ, vel ex lacte, butyro & saccharo parati. Sit hæc pro febre satis.

Symptomatibus præterea occurrendum, quorum frequentiora & principaliora solent esse, sitis, vigilia, delirium & ventriculi angor ac æstus.

Sitim quod attrahet, primò observandum præceptum Hippocraticum. Siti carentem, os claudere, tacere, ventum, cum potu, frigidum introducere, quo non sufficiente, aquæ potum & quietem addidit. Frequentes itaque sunt oris collutiones aqua frigida, vel emulsione quatuor sem. frigidorum, cum aqua hordei. ut cucurbitæ extracta. In ore detineat Crystallum, Achatem, vel alios lapillos, nive refrigeratos. Illinatur ventriculi regio unguent. ros. Mes.

Ad vigilias, præbeatur unc. j. syrup de papav.

Vel ℞. Sem. papav. albi dra. hm. iij. aq. lactucæ unc. iv. M. f. emulsio, vel Nepenth. Querc. à gr. j. ad gr. ij. Extrinsecus illinantur nares & tempora. Nep. Querc. aqua ros. vel viol. Vel, de more Rhafis, totum synciput oleo nenuph. illinatur. Pedibus lotiones tepidæ, ab assumpto cibo, administrandæ, ex decoctione fol. lactucæ, nymphæ, vitis & salicis, necnon capitum papav. albi.

Ad delirium præcavendum, est revellendum repellendum & refrigerandum. Revellunt pedum lotiones, aqua calente, ante cenam, frictiones, cucurbitulæ siccæ, & urgente delirio, cruribus su. pisni, & phænig. i. coxis. Clysteres quoque quodammodo aciores, ex decoct. malv. bet. mercur. chamæm. addito syr. ros. sol. imo & elect. de succo ros.

Repellunt hæc, ℞. Ol. ros. omph. unc. iij. succi lim. unc. j. m. pro oxyrhod. frigido apponendo. & quibus caput est nnum, nec destillationibus obnoxium, capiti applicari poterit etiam linxum aqua frigida imbutum.

Ad ventriculi æstum & anxietatem, calor ad inferiora trahendus, frictionibus, siccis cucurbitulis, Deinde sub exacerbationis tempus,

℞. Aqu. scorzon. tot. cit. succi granat. an. unc. ij. Margarit. præparat. drachm. j. m. & per os cochleari præbeantur. Sed potio frigida sat esse solet.

Extrinsecus ventriculus illinatur ol. ros. vel succo portul. aut agrestis, ut Trall. à quo proposita vesica, gelida aqua semiplena, est reprobanda, ne difficultas spirandi, singultus & interitus accidant, ut observavit Benivenius.

Victus rationem quod attinet, decumbat æger in lecto amplo & molli, cum linteis nitidis. Aer cubiculi frigidus sit & arte refrigeretur, tectus tamen maneat æger adeo ut tangat calidum, & inspiret frigidum. Victus sit refrigerans & humectans, tenuis; quia morbus peracutus est, non tamen tenuissimus, hæc recordatione, quod Gal. contra Diatritarios, in juvene calido & sicco, in accessione, cibum præbere coactus fuit. Unde & Rhafis non probat in Causonide victus rationem ab Hipp. in acutis præscriptam, nimis enim calor febrilis accenderetur, qua ratione etiam sani, calidi & sicci, ex inedia febricitant. Sic parum & sæpe, potiones & sorbitiones, suo tempore, actu & potentia frigida offerendæ, opportunè scilicet, & propè declinationem, etenim Philonius Filia, septima die interpellivè, cœnata, defuncta est, licet è naribus sanguis profluxerit, cum tamen Gal. in Com. asserat quod omnes, quibus copiose san-

guis è naribus profluxerat, servati fuerint. Potus sit aqua lullatitia cich. end. acet. & cucurbit. Nec potus adeo deneg. natus, ne miser Patiens ducatur in hecticam, ut notat Gal. contra Medicos ignaros, & perperam rigidos. Somnus omni industria procurandus, ita & quies. Alvus clysteribus ex lacte, butyro, & saccharo, vel flore calf. sollicitanda, & an. i. commotiones, ira præsertim, arceantur. Hæcque hinc dicta pro salute Patientis. *Idem ibidem.*

Ardens Spuria.

Vir quinquagenarius, temperamenti totius & jecoris, calidi & sicci, gracilis habitus, & vorax, cui juveni alvus lubrica fuit, nunc verò exsiccata est, diebus bacchanantius lautulimis, cum juvenibus, cœnis interluit, & noctes insomnes duxit, à quibus ingenti febre correptus fuit, cum ingenti & acri, at non exurenti dolore, sitique molesta, cui, cum citius ante, ut quatuor diebus, alvus omnino adstricta fuisset, prima febris die soluta est, & excreta erant, non biliosa, sed potius corrupta & cruda deiecit, lingua tamen non nigra, sed potius albicans, cum sapore non amaro, sed salio, & statim cum delatione in somnum, pulsus celer quidem & frequens, at non adeo ut in ardente legitima, sicut urina crassa sunt & crura, non flammæa. Modo, tertia voluitur dies hinc nova repetita accessione, die secunda à Medico assistente flor. calf. cum crem. tart. exhibitio. In præiens de agendis pro salute consulit.

Febris hæc, quæ nudius tertius invasit, absque ulla repetita accessione, cum ingenti calore, & si molesta, necessario inter conclusas & continentes collocanda venit, nec ob ætatem, temperamentum, habitum Patientis, inter sanguineas & synochos, sed potius inter biliosas enumeranda videtur, præsertim, si calorem insignem & acrem, sitimque molestant, ac pulsus celeritatem & frequentiam consideremus, sicque Causonidem, & ardentem eandem constituemus. Verum quoniam neque calor adeo exurens, neque sitis adeo magna, nec lingua, adeo aspera & nigra, imò albicans observatur, neque urinae alvique excrementa biliosa apparent, & loco vigilæ, delatio in somnum, ideo ardentem notham & spuriam hanc omnino dicimus. Et licet Hippocr. in descriptione Causi nothi, posuerit alvum solutam, sitim magnam, linguam asperam, siccam, saliam, urinae, interceptionem, vigiliam, extremitatum refrigerationem, ipse tamen descripsit Causum malignum, non enim perpetuo nothus est talis Causus, nec tamen posuit linguam nigram, quippe cui non competat, ut ardenti legitima, sitis magna & inextinguibilis.

Hunc autem nobis confirmant ætas inclinans & vita antea, voracitatibus dedita, cum spontaneis vigiliis, ad crudos & pituitosos humores coacervandos maxime idonea, unde dicebat Hippocrat. febrem ardentem pituitosos quoque corripere, & hyeme magis, hoc est, vehementius, non autem frequentius, ardentem febres fieri asseruit Aristot. nec sine ratione, cum spurie ardentes sint germanis periculosiores, ut observavit Trall. At quoniam, Patientis temperamentum totius & jecoris, calidum & siccum, habitusque gracilis est, ideo in eodem quo-

quoque bilis affata proventus eſt ſupponendus, quæ iuxta pituita allocata, ſalſam eandem reducit, & in venis maximis, cum corde & faucibus conſenſum habentibus, copioſa nimata, nec ut aſcendentibus annis, per alvum excreta, putredinem concepit, majorem ſalſedinem acquirit, ac febrem ardentem notham excitavit. Quibus enim juvenibus alvus humecta eſt, iis ſenſcentibus exſiccatur. Spuria autem eſt, ratione materia, non ratione loci, ſit enim & cauſus ille nothus, ex phlegmate ſalſo, putrefacto, & quidem in venis, quæ ſequuntur partes cordis, ut Avic. verbis utar.

Febris hæc notha, legitima ardente periculoſior à Trall. cenſetur, eoque magis ſi in ſene fiat, tunc enim lethalis habetur, & ratio eſt, quoniam cum à materia craſſiori procedat, naturæ viribus eget, tum ad concoctionem, tum ad expulſionem eiſdem perficiendam, quæ ut plurimum & terè ſemper, per abſceſſum ſequi ſolet ad aures, ut Antiphonti, Critobuli filio, cui 24. abſceſſus fiebant, & 40. proſus liberatus eſt. Aliquando tamen & ad crura, aliæve corporis partes abſceſſus ſunt, unde & Averr. ab ardente febre fuit liberatus, materia noxia ad artus tranſmiſſa, frequentiffimè tamen per paronidas judicantur, quæ ſi apparuerint, & non erumpant ſuppuratæ, pereunt, niſi horum alterum ſuperveniat, aut ſanguinis fluxus copioſus è naribus, aut craſſa & copioſa in urinis ſubſidentia. Noſter autem Patiens, cum non ſit adeo ſenex, viribus valeat, & tempeſtivè ſe ipſum obſequentem Medico præbeat, fore ut ſanitati reſtituatur ſperandum eſt.

Curatur autem ab Avic. eo modo quo tertiana continua notha, evacuantibus, præparantibus, & modicè contemperantibus.

Ad ſanguinis miſſionem quod attinet, convenire non videtur, niſi multo ſanguine æger abundaret, tuncque parce, & potius ad eventilationem quam ad evacuationem. In caſu noſtro, ſi in progreſſu caput lædatur, & ſomnus proſundior evadat, vena ſedales aperiri poterunt, nec tamen id differendum quouſque natura deponere inceperit, narrat enim Rhaliſ quod Cæſio correptus, ex puriſſimo humore ad partes extremas, judicatus, facta phlebotomia intempeſtiva, mortuus eſt.

Evacuanda quod ſpectat, cum leniens jam fuerit exhibitum, ad humorum præparationem erit ſtatim deveniendum iis quæ attenuandi, detergendi, at non multum calefaciendi facultatem obtineant. Pavius, & Oribalius muſſam proponunt, imo & Hippocr. quæ ut vim quoque acquirat incidendi, acetofa reddetur, addendo duodecimam partem aceti, præberique poterit ad lib. i. vel julapium acet. cum decoct. borrag. end. meliſſæ & betonicæ.

Ad caloris verò remiſſionem, quoniam potio frigida huic ardenti non competit, utpote nothæ ideo ſubſtitui poterit aqua hordei cum ſaccharo ut quæ & attemperandi, & abſtergendi facultatem obtineat, ſic pariter ſua nitroſitate ſerum aſininum, aut capr. depur. quod facilius ad alvum ducetur addito julap. acet. ad unc. iij. ſicent, ſi ad urinæ vias natura vergere videatur, emulſ. ſem. melon. cum ſucc. limonum & pauxillo ſaccharo, Vel talis parabitur convenientiſſima potio,

℞. Sem. mel. mundat. unc. iv. anguriz, cucurbitæ, cucum. an. unc. i. liquiritiz ruſæ unc. ſ. ſemin. ſœniculi drachm. iij. ſacchari ſini unc. j. in conterantur omnia in mortario, & aqua roſacea irrorata in linteis colligantur, & cum aqua hordei lib. ij. fiat emulſ. quæ bibenda præbeatur, ſit enim extinguit, calorem febrilem ſatis contemperat, & urinam provocat.

Interim clyſteres injiciantur, ex decoct. malv. betæ, mercurial. addito melle roſ. ſol. & oleis. Vel repetatur minorans, ex caſi. lenit. & tart. vel ex ſyrup. roſ. ſolut. mel. roſ. ſolut. quibus ſuperbibat Patiens ſer. depur. lib. ij.

Et apparentibus maniſeſtis ſignis coctionis, nimirum febre declinante, aliquod leve purgans exhiberi poterit, audacius quum in legitima, & in hac potiſſimum exiſtimarem Hippocr. propoſuiſſe ſorbitiones attractorias, ita ut attractanti pharmaco ſorbitiones miſceamus, vel ſtatim poſt medicamentum eas præbeamus, ad calefactionem nimiam & exſiccationem evitandam. Itaque ſic parari poterit potio,

℞. Pot. Magiſt. ex manna clarif. unc. v. addendo ſolutioni coniectæ agari. troch. drach. ij. Rhab. opt. drach. ſ. fiat potio, tribus autem horis ab hac aſſumpta, præbeantur aquæ hordei, aut ieri capri lib. ij. & duabus horis ab aſſumpto ſero prandeat.

Vel boli, ℞. Flor. caſi. recent. extr. elect. lenit. diacath. an. drachm. iij. pil. de tribus, vel de agari. drachm. j. M. F. Bol. & poſt horam præbeatur ſerum, quatuor verò ab hoc, prandeat.

Balneum, pro tertio remedio febris ardentis, jam fuit ab Hipp. Gal. Avic. ac omnibus Medicinæ Principibus propoſitum, utpote, quod poſſit calorem contemperare, & humorum coctionem, ſimulque reſolutionem adjuvare. Sed in ardenti ſpuria, dubium eſt, an conveniat necne, & dubitandi occasionem præbent Gal. & Avic. non concordantes. Gal. enim ait, quod Balneum, corpore evacuato, prodeſt, ſi à bile, non adeo, ſi à ſalſa pituita putrefacta oriatur febris ardens, cui ſubſcripſit & Paul. Avic. vero docet, Balneum, in ardente notha utiliſſe eſſe quam in exquiſita. Conciliantur autem dicendo, quod ſuiſ & effectus Balnei duplex eſt, alter ad ardorem contemperandum & compeſcendam bilis efferveſcentiam, alter vero ad reliquias humorum diſcutiendas & evacuandas. Pro prima intentione, convenit in ardente exquiſita, non ſolum apparentibus ſignis coctionis, verum & antè, tuncque convenit frigidum; in ardente verò noſtra notha, convenit calidum ut quod poſſit ſalſam pituitam, quæ difficiliſſis, eſt reſolutionis, attenuare atque reſolvere, in quem finem Avic. Balneum in ardente notha commendat, ſed calidum, Gal. verò & Paulus damnant, ſed frigidum. At quoniam balneum in febribus putridis apud nos adminiſtrari non ſolet, ideo ejus loco, in hac febre notha frictiones univerſales quotidie, in remiſſione febris, uſurpentur, manibus tali oleo inunctis.

℞. Olei amygdal. dulc. cum igne ext. unc. ij. vini albi dulcis unc. j. nitri drachm. j. m. bull. ad conſumpt. vini pro frictione totius.

Victus rationem quod attinet, cum ardens notha adeo acuta non ſit, neque victum adeo tenuem poſtulari, licet magis extenuantem, ſi

diuturna evadat. Et hæc pro salute nostri Patientis considerata iudicant. *Idem ibidem.*

Tertiana Exquisita.

Nobilis juvenis, 30. annum agens, temperamenti calidi & licci, gracilis, & rari habitus, libere vivens, biliosis diarrhoeis quolibet mense obnoxius, quæ sex abhinc mensibus suppressæ cessarunt, post iter unius diei, celeriter, ætivo tempore, sub radius solaribus peractum, sitibundus factus, domum reversus, ita æstuans, in cellam vinariam descendit, & abunde vinum dulce generosum potavit, à quo, nocte sequenti, inquietus, nihil dormivit, & totius corporis lassitudine defessus, decubuit, circa vero meridiem in petuoso rigore fuit correptus per horam, cui calor successit multus, acris & mordax, cum molestissima siti, oris anaritudie, æstuationibus, renum & capitis doloribus. Accersitus Medicus jam dicta omnia observavit, & præterea, pulsus magnos, celeres, frequentes & inæquales, juxta diastolem, urinam subrusam & subnavam, moderate crassam. Præscripsit autem ei alterans, ex sero capræ depur. in statu febris propinando, & recessit mox, hora 14. ad visitationem reversus, invenit Patientem totum mutatum, cum exiguo febris residuo post quatuor biliosas spontaneas per alvum evacuationes, cui psisanam, cum ovo sorbili, pro cæna, hora tertia noctis, præbendam præcepit, & abiit. Nocte autem sequenti quietè dormivit, sequentem diem omnino sine febre transiegit, sumpsit tamen syrroi. solut. cum sero depur. cui copiosæ, biliosæ, & terrosæ materię successit evacuatio, in le noctem sequentem insomnem duxit, & die tertio, duabus horis antè meridiem, rediit febris, eodem, imò vehementiori modo, tuncque me quoque accersiverunt, ut de agendis, pro salute acri consuleremus.

Vehementissimam apparere febrem tertianam, quid mirum? si de genere ardentium esse, licet intermittentem, expressit Gal. Tertiana autem dicenda febris hæc, quia tertio quoque die invadit, hæcque exquisita, quia non protrahitur ultra duodecimam horam, sicut spuria foret si ultra 24. extenderetur, tuncque protensa, sive extensa dicitur, prout quæ intra 12. & 24. horam concluditur, simplex tertiana à Gal. appellatur, quæ quidem, neque exquisita, neque notha est, sed inter utramque media. Fit autem hæc febris, à flava bile per totum corpus affluente, quæ sincera est, non quidem sinceritate permissionis, talis enim in solo folliculo fellis reperitur, sed sinceritate qualitatis, etenim ubi adest copia bilis putrescentis, & plurimus calor, reliqua excrementa in bilis naturam convertuntur, cum in illo loco biliosa vis adeo vigeat, ut si quidpiam alterius humoris ei misceatur, pro nihilo habeatur, sicque purus atque sincerus dicatur, prout si vino exiguo & meraco aliqua portio aquæ superfundatur, adhuc tamen vini puri conditiones, quoad colorem, saporem, & odorem servabit, quia aquæ portio iam in vini naturam transit. Et idem, toto tempore quo tertianæ accessio durat, febris ardentis symptomata observantur, quæ ratione omnium februm maximè biliosas Valeus appellabat tertianas, imò biliosissimas,

ab ardentibus enim in eo tantum differunt, quod ardens habet flavam bilem ebullientem in venis, tertiana vero eandem in totum corpus discurrentem, sicque non ratione materię, sed solum ratione loci, differt hæc nostra febris tertiana exquisita ab ardente. Focus autem putredinis, in casu nostro, sunt inania spatia viscerum naturalium, quem nobis demonstrat copiosæ bilis flavæ per alvum spontanea excretio. Non tamen semper bilis in hoc loco putrescit, in exquisita tertiana, ut falso credidit Fernelius, nec in solo ambitu corporis, ut perperam existimavit Altimarus, sed in utroque, ut facile deducere possemus ex locis duobus, per quæ natura bilem flavam peccantem excernit, alvum nimirum & vomitum, vel per sudorem. Et propterea non minus in ambitu corporis, quam circa viscera naturalia, bilem in exquisita tertiana putrescere posse cenavit Galenus, & ipse, dum non à jecore, ut Fernelius, sed à venis majoribus ad minimas, & à minimis ad spatia aut totius corporis, aut abdomen, bilis exuberans à natura transmittitur, quo impetu quoniam à bile ipsa vellicantur partes sentientes, ideo rigores excitantur.

Exquisita autem tertianæ signa elegantissimè proponuntur à Gal. quæ octo enumerata, omnia observantur in nostro Patiente. Et primum quidem, rigor vehemens, veluti à re quapiam acuta & pungente procedens, ad differentiam rigoris tertianæ nothæ, quotidianæ, atque quartanæ in quibus rigor, ab initio, nec tantus, nec talis observatur concurrunt enim omnia in hac febre, quæ ad vehementem & magnum rigorem puncturiorum statim exercitandum, necessaria sunt, nimirum quantitas bilis sufficiens, qualitas acris ejusdem, facultas movens robusta, & partium sensibilitas.

Secundum signum desumitur à calore, qui statim multus, acris & mordax percipitur, adeo ut à calore ardentium non distinguatur, paulo post tamen sub manu remittitur, cum in ardentibus, quanto diutius manus imposita detinetur, tanto molestior & acutior percipitur, idque quoniam in tertiana humor quidem tenuis est, sed per univerium corpus dispersus, & ideo facile dissipatur atque resolvitur, in ardentibus vero non dissipatur, cum copiosus intra vasa contineatur.

Tertium signum desumitur à pulsu, est enim magnum, celer, frequens, ingentis caloris indicium, sicut inæqualis, inæqualitate spectante cordis ventilationem, nam inspiratio, quæ diastole fit, systole & expiratione longior.

Quartum signum est ab urina, quæ subrusa, subflava moderateque crassa est, bilis copia in venoso genere redundante significans.

Quintum signum desumitur ab accessionibus, accessiones enim sunt de tertio in tertium, nec protrahuntur ultra duodecim horas, quanquam citius terminari possunt, unde Avic. septem horis id fieri posse asseveravit. Varietas autem durationis, pendet ab humoris quantitate & qualitate, facultatis robore, aut imbecillitate, cutis raritate vel densitate, & ab aliis causis externis.

Sextum signum dependet à modo solutionis paroxysmorum, solvuntur enim cum sudore, vomitu, aut bilis per inferiora evacuatione. Per vomitum quidem & alvum, si bilis circa viscera natu-

naturalia putrescat, per sudorem verò, si in ambitu corporis, unde Avic. dicebat quod vomitus in principio, aut aufert, aut minuit febre, & Gal. quod morbi materiales, qui humidi sunt, hoc est, habent evacuationem annexam, salubriores ac breviores evadunt.

Septimum signum definitur à symptomatibus, hanc febre concomitantibus, suntque sitis, oris amaritudo, æstuationes, renum dolores, dolorque capitis pungitivus, non gravativus: quæ omnia ab humore bilioso necessario provenire nemo est qui facile non videat.

Octavum signum constituitur à prægressis, quæ interna & externa sunt. Interna, temperamentum calidum & siccum, habitus gracilis, ætas juvenilis, & suppressa bilis consuetæ, ut in casu nostro, evacuatio. Externa vero sunt, anni tempus æstivum, nimia exercitia potissimum, ut in casu nostro, sub radiis solaribus, & inde statim vini meracioris copiosa potatio, ac tandem, totius obstructio ab ambiente frigido in cella vinaria contracta. Sicut autem omnia superius allata signa in nostro Patientè tertianam exquisitam significant, ita omnia, ab octavo signo deducta, bilis flavæ redundantiam necessario demonstrant, quæ tandem naturæ molesta, à genere venoso successit, & facilius ad centrum, nimirum ad viscera naturalia, quam ad circumferentiam & ambitum corporis delata fuit, tum quia ad alvum jam antea eandem deponere consueverat ipsa natura, tum quia ab ambiente frigido repellente, una cum excrementis retrocedentibus, vias occludente atque intercipienti, bilis ad centrum repulsa fuit, & circa viscera concitato motu discurrens, rigorem, & inde quiescens atque putrescens, febre hanc excitavit.

Si de eventu hujus febris loquamur, nunquam de se lethalis est, idque confirmat cum Hipp. Gal. dicens. Solæ febres, quæ in quietem febre vacantem desinunt, periculo vacant, etiam si vehementissimam, & valde longam habuerint accessionem, si vero adeo brevis fuerit, ut in tertianis exquisitis, minori duodenis horis tempore circumscripta, non modo sine periculo talis est febris, sed etiam cito judicatur. Neque obstat, quod sincerus humor sit periculosus, & pessimus, quia biliosus multam caliditatem, pituitosus multam frigiditatem significant, id enim tenet de bile sincera, cujus humiditas ab ardenti calore fuerit exusta, ut in ardentibus, non autem in tertianis. Longam, aut lethalem vocavit Hipp. si vel non curetur, aut malè curetur.

At quoniam magni Viri, Collierius & Mercatus, tertianas intermittentes lethales viderunt, quinque proponunt casus, in quibus lethalis reddi potest. Primus, quando biliosus humor, ad aliquod principale membrum impetuosè decumbit. Secundus, quando nimis tenuis & summe putridus est. Tertius, quando bilis flava non est, sed vitellina, porracea & æruginosa. Quartus quando tenuis crassis humoribus commiscetur. Quintus, quando habet aliquod symptoma perniciosum annexum.

Si de longitudine aut brevitate loquamur, & primo de tempore particulari. Quibus in febrilibus quotidie rigores fiunt, quotidie solvun-

tur, ita & tertiana. De universali, tertiana brevissima, quartana longissima, utraque sine periculo, unde tertiana exquisita septenis circuitibus, quod longissimum est, terminatur, ait, quod longissimum, namque si prima die in urinis appareat subsidentia alba, levis & æqualis, tertium circuitum non transcendit, si vero nubecula alba, pendens, ut in casu nostro, conspicitur, in quarto paroxysmo terminandam sperandum, sicut, si urina potius rubicundior, sine nebula & suspensa, ad septimum usque protraheretur. Nec tamen unquam est morbus acutus, quia brevis, ut falso Altimarus fuit opinatus, acutus enim morbus, cum Gal. & Archigene, ille est, qui habet cum brevitate periculum.

Si de modo. Tertiana & ardens, ut plurimum sudoribus terminari solent, maxime vero si bilis, totius carnes & ambitum corporis occupaverit, ut si circa viscera naturalia extiterit, facilius per vomitum aut per alvum expurgabitur, namque, delationis impetu, ipsa bilis per seipsam expurgatur.

Curatur hæc febris, alterantibus potius quam evacuantibus, nimirum summe refrigerantibus & humectantibus, cum flava bilis calidissima & siccissima sit. Secundo, evacuantibus. At quoniam, ut diximus, delationis impetu ipsa per seipsam expurgari solet, ideo attente observandum quo vergat, an per vomitum, alvum, sudorem, urinam expurgari desideret. Tertio symptomatibus occurrendum. Quarto vires conservandæ. Quæ intentiones ut executioni mandentur, consideranda sunt remedia Chirurgica, Pharmaceutica & Listerica.

Et in Chirurgico fonte, primo sanguinis missio consideranda venit, nun scilicet conveniat, quando, & ex qua parte. De convenientia, dicant quid velint Mercatus, Mercurialis cum Actuarius, ex usu esse posse, auctoritates enim & rationes eam non admittendam persuadent. Et primo quidem Gal. in erysipelate curando sanguinis missionem dimittit, & purgationem instituit, ita in herpete & quod magis est, in curatione tertianæ exquisitæ, onusit omnino sanguinis missionem, cum tamen in cura tertianæ nothæ, & quartanæ, eandem proposuerit. Et licet Gal. sanguinis missionem non admisit, dicant, eo quod non sit morbus magnus, vel quia non sit periculosus, vel quia in exquisita tertiana vires constare non possint, ratio tamen potissima est, quia sanguinis missione exquisita tertiana in continuam, imò in ardentem migrare posset. Ardens enim, & exquisita tertiana intermittens, conveniunt in materia, differunt tantum loco. Quod si in tertiana exquisita sanguinem detrahamus, exinanitis venis, eadem bilem à toto ad se attrahere poterunt, & febre continuam, imò ardentem excitare: etenim, nullo alio modo sic febris ardens, nisi, quando a quo tempore venæ exsiccata ad se biliosos humores attraxerint: hæc autem venarum exinanitio & exsiccatio, sanguinis missione facillimè induci potest, in corpore exquisita tertiana laborante: cujus temperamentum, habitus corporis, ætas, anni tempus, regio, sunt omnes conditiones exinanientes: ideo bilis per universum dispersa facillimè à venis exinanitis attrahi poterit. Excusari

culari verò possunt Aëniarius, Mercatus atque Mercurialis: eo quod sanguinem esse educendum proposuerint in tertiana, ab exquisita recedente. At quomodo defendi possit Avic. non video, qui, & circa quid, & circa quando, omnino errasse videtur, dum ait: phlebotomiam post tertiam accessionem exercendam esse: primo enim non convenit, & si conveniret, in principis morborum, si quid videtur movendum, move, quando consistunt, melius est quiescere, neque contortiones turbate. Sed status exquisita tertiana est circa tertiam accessionem. Ergo &c. Quare, in casu nostro, cum omnes adint exquisita tertianæ conditiones, omnino a sanguinis missione erit abstinendum. Et quoniam raro omnes simul uniuntur, adeo ut exquisitam tertianam constituere omnino possint: ideo quanto magis ab exquisita recedet, tanto minus prohibebitur sanguinis educio, maxime ex venis sedalibus, in doloribus capitis & renum, ut fiat à capite revulso, & a renibus, per venam cavam derivatio. Vel, applicitis cucurbitulis incisis, dum in ambitu corporis putrescit bilis: vel siccis, dum ab ambiente frigido cutis densata fuerit: quo casu & frictiones, ut in ægro nostro, toti convenientes erunt. Ita, ex hoc fonte, pedum lotiones à capite revellentes, ex aqua calente, ante cibum: somnum vero concilians, à cœna, ex aqua tepente, malva, viola, lactuca, salice & capitibus papaveris alterata.

A pharmaceutico præcipua desumenda remedia, in quorum administratione, mirum quo modo Mercatus & Sennertus adeo male senserunt. Statim itaque à nobis erit consideranda facilitas materiæ educendæ, naturæque inclinatio: etenim, si materia circa viscera naturalia putrescit, per vomitum, aut per alvum: si in ambitu corporis, per sudorem est educenda: adeo aptissime Vir Excellentissimus, præ omnibus, alvum leniens exhibuit. Per vomitum autem nunquam est educenda materia, adeo mordax, ob oris ventriculi sensum exquisitum: nisi quando natura eo vergat, ut nimirum celerius e ventriculo educatur: & tunc utendum aqua tepida, ut Tral. vel parietur vomitorium epicetasticum, ex jure pullæ malva alterato: ad dictis oleo amygd. & julap. acer. onussis antimonalibus & valentioribus vomitoriis à Chymicis propolis, atque à Sennerto admissis. Per alvum autem tutior evadet humoris peccantis excretio. Et licet Hippocr. pharmacum deorsum purgans exhibendum proponat, tertia solum transacta accessione: cui subscribit quoque Celsus; eo tamen utebantur magni illi Viri, aliqua tantum coctione prægressi; cum nostra lenientia & minorantia non cognoscerent, quibus & in principio nonnunquam copiam biliosorum humorum, cum tennes sint, & ad expurgationem paratissimi, mira cum utilitate educimus. Nec tamen ob id purgans ab initio exhibendum; ut perperam Rhasis, quem carpit Avic. Et licet tennes humores purganti medicamento educi posse asserere videatur Gal. intelligit tamen tennes, serosos & aquosos; imò & nos, neque post tertiam accessionem, exhibere purgans audent, nisi appareant manifesta signa coctionis; tuncque rhaz. infusum usurpamus, cum syrup. rosar. solut. superhausto sero capr. aut aqua hordeacea, ad libras.

Tutius autem fuerit, in nostro casu, minorativum repetere, & quidem die intermissionis, non vero accessionis; ne afflictio addatur; ut quidam perperam, exemplo Hippocr. in quartanæ curatione, purgans, duabus horis ante accessionem, præscribens; id enim fecit ob humoris peccantis pertinaciam; quia facilius educitur dum a natura movetur; quæ pertinacia in tertiana exquisita non reperitur.

Interim, præparandi humores, refrigerantibus & humectantibus, decoct. cichor. acet. end. viol. lactucæ, nenuph. cum julap. viol. rosar. & syr. de acido citri; vel, quod melius, cum succis depuratis acetosæ, & end. dulcia namque & saccharata, in hac biliosissima febre, suspecta censenda. Præbeatur autem matutinis horis diei intermissionis; in die verò afflictionis, sicut frigidæ potio conceditur ab Hipp. ita nos hujusmodi alterantia propinare poterimus.

℞. Aq. itil. ex succo cich. acet. end. cucurbitæ an lib. ss. syr. de acido cit. de succo lim. an. unc. ij. m.

Vel, ℞. seri capr. aur. afin. depur. lib. ij. Julap. acet. syrup. de acido citri an. unc. j. m. pro potu, in statu febris, quando scilicet extrema fuerint æque ac præcordia calida, propinando; tribus vero transactis horis ab hac frigida assumpta portione, sorbitio, nimirum jus cichorac. alteratum, erit offerenda; nec perperam, contra Hippocr. mentem, ut multi faciunt, sorbitio potioni præferenda.

Dum biliosi humores refrigerantibus & humectantibus alterantur atque præparantur, clysteribus ex lacte, butyro, saccharo & flore cassiæ; frequenter sunt alliciendi. Die verò accessionis, cum Ferro Salio, sub ejus principium acrior injiciatur; addendo syrup. rosar. solut. imò & elect. de succo rolarum.

Apparentibus signis coctionis, absinthium pro rhaz. cum melierato proponit Gal. utpote quod ad inferiora biliosos propellat humores, & ventriculum à morfu egregie defendat. Et licet Tral. asserat se uti absinthio tantum in nothis tertianis, ob pituitæ nulluram; hic tamen Gal. semper adeo impugnat, ut sæpe veritatem non cognoscat; qui certe in hac re se ignarum demonstrat: absinthium enim bilem contentam expurgat, quæ etiam stomacho & ventri inhzret. Pariter, de urinam moventibus carpit Gal. eo quod anethum proposuerit, ut minus calefaciens: cum in secundo gradu calidum & siccum sit; permittit verò apium, calidum & siccum in tertio. Non desunt autem, si opus fuerit, urinam moventia temperata; ut aqua hordei, cui, media ebullitione, addatur radix graminis; & sub finem, semina melonum mundata & costosa; colaturæ verò, addendo succi limonum ad libitum. In nostro vero Patientem facile locum non habebunt; sicut neque sudorifica; quæ verò bilioso humore in ambitu corporis putrescente, administrantur, temperata esse debent, neque calefaciendi, neque humores liquandi vi prædita;

Ut ℞. Cornu cervi philosoph. drachm. j. Aq. Card. sanct. unc. ij. m. & exhibeatur; a quo statim præbeatur potio hujusmodi;

℞. Aq. acet. lib. j. scorzon. unc. ij. m. & cooperiatur æger, sed moderatè. Fernelius enim vidit aliquos vestibus multis, siti & sudoribus extinctos.

Vel,

Vel, ℥. Aq. acet. unc. x. card. sanct. scorzon. an. unc. iij. spirit. vitrioli gut. v. m. pro sudorifico.

Extrinsæcus Antiqui ad biliosum humorem, atque febrilem calorem contemperandum, Balneo utebantur; nos autem, Balnei vice, epith. apponimus & inunctiones.

Sic pro hepate, ℥. Succ. depur. cich. end. an. lib. i. succi lim. unc. iij. aceti ros. unc. iij. specier. trium sandal. unc. f. m. pro epith.

Pro renibus, ℥. Ung. ros. Mef. unc. ij. infrig. Gal. unc. j. camphoræ gr. v. m.

Pro toto abdomine, ℥. Decoct. cich. end. hordei lib. vi. succi aurantiorum lib. i. m. & lint. teum madefactum tepidū abdomini applicetur.

Symptomata, quæ urgeant, non habemus in casu nostro, excepta siti. & quodam angore. Pro siti itaque sedanda, folia acetosæ, aqua gelida refrigerata, ore detenta in usu esse poterunt, sicut pruna parva, rotunda, recentia (vulgo amoli dicta) decorticata, aqua gelida imbuta, & in ore diu cum suo nucleo detenta, mirifice sitim sedant, & id genus alia Excellentissimi Viri prudentiæ notissima. Ad angores autem arcendos, panem lotum, frigida agrestia aspersum, offerebat ante accessionem Amatus. Tralliani vero experimentum temerarium quodammodo mihi videtur; qui, hora una ante accessiones pepones impensè refrigeratos comedendos offerebat; mox statim aquam frigidam copiosam propinabat; atque se frequenter accessionem præcavisse, dum alius sudor; aliis copiosa bilis per alvum fuit excreta.

Victus rationem quod attinet, refrigerans & humectans esse debet. Aër. frigidus arte paratur, ut inspiret frigidum, & tangat calidum. Cibi sint cucurbitæ, lactuca, ptisana, pisces saxatiles; volatiliū caro tenerrima, cerebra animalium, ova recentia: solam autem ptisanam, usque ad statum, non valde delictiosis propouit Gal. Cibandi tempus, apud veteres erat dies intermissionis. Apud Avic. novem horis ante accessionem. Apud nos, potissimum in hoc Patientem, facilè resolvable, hocque anni tempore æstivo, quatuor horis ante febris insultum; ut à cibi præsentia etiam bili sortè ascendenti iter intercipiatur. Potus sit aqua still. cich. aut acer. cum succo ribes, granatorum, citri, limonum. Apparente coctione vinum concedit Gal. tenue, aquosum & paucum. Album autem acerbum magis refrigerare quam aquam solam asseruit idem, & confirmat Ætius; æque namque refrigerat; sed ad refrigerandas omnes corporis partes, magis quam aqua sola permeare atque penetrare valet. Ex metho. do autem, in principio accessionis, nec cibus, nec potus ullus est offerendus; nisi vires Patienti deficiant, aut angor corripiat; tunc enim, etiam in principio cibum offerebat Gal. Ptisana autem tunc concedenda, vel panis agrestia, aut vino granatorum imbutus. Hæcque pro curanda hac febre, dicta satis superque. *Idem Ibidem.*

Tertiana Notha.

Adolescens quidam dives, 20. annum agens, temperamenti totius calidi & humid. frigidioris ventriculi, & hepatis plus æquo calidioris; carnosus & obesus habitus, coloris potius albican-

tis, in deliciis educatus, æstivo tempore proximè præterito, de more, gelidis comotationibus vini meracioris, & aquarum odoratarum, ac frequentibus comestationibus usus, otio omnino indulgens, febre tertiana correptus fuit, septenis circuitibus judicata. Sed quoniam febricitationis tempore, & aquæ frigida, & sericopiam, non solum Medici jussu, sed multo majorem clandestino potavit, pondus in utroque, sed præcipuè in dextero hypochondrio, a convalescentia emerit, cum manifesta tangenti, tensione; quæ consueta prava vivendi ratione semper augmentum suscepit; & tandem, cum hoc anni tempore autumnali, ambiente licet refrigerato, exutus vestibus incederet, languente interim cibi appetentia, noctem in omnem ac inquietam duxit, & in aurora, spontaneo, sed difficili excitato vomitu, pauca pituitosa rejecit; ac tertia post hora perfrigeratus, horrore diuturno correptus fuit, cui paulatim successit calor, non adeo acris & mordax, satis moderata sitis; nec pulsus adeo venemens, potiusque tardus & rarus ac inæqualis, picius, cum quadam tamen duritie, digito tangenti obvia. Urina cruda, & tenuis. Hæc febrilis accessio tota sequenti nocte perduravit, qua tamen æger utcumque dormitavit. Mane sequenti accersitus, jam dicta omnia ab Excellentiss. Viro adstanti accepi, & simul visitantes Patientem, cum invenimus febricitantem adhuc, cum insigni tamen declinatione, toto corpore madentem; sic autem nostrum discessum, cibum circa meridiem offerendum jussimus, mox hora 12. ad visitationem reversi, illum ferè profusus febre vacantem, post sudorem in somno, à prandio secutum, invenimus. Præmissis clystere communi, addito mel. ros. solut. cœnam instituimus. Subsequentem noctem insomnem transegit, & mane sequenti, eadem hora, eodemque modo febricitavit. Nos autem accedentes, patientem ægre vomentem invenimus, cui vomitorium ex jure, seminibus citri & oxymelite paratum obtulimus, quo viscidam pituitam & crudam excretam vidimus, cum quodam, sub finem vomitus, amarore. Inde ad aliud cubiculum abducti, consilium pro salute infrascripti tenoris inivimus.

Febrem hanc Typus, qui jam tertianarius fuit observatus, tertianam esse nobis aperte demonstrat; & quoniam accessiones habet, non solum ultra 12. horas perdurantes, verum usque ad 30. horam protractas, ideo non solum simpliciter notham, verum & extensam, sive protensam jure merito eandem appellabimus; quod enim longior est accessio, eo febris impurius, & exquisitè tertianæ magis contraria; & ideo dicebat Gal. dari febres intermedias, ex extremis constitutas, adeo ut exquisitè tertianæ accessio, intra 12. horam terminetur quod si ad 18. extendatur, tertiana notha simpliciter appellatur; si ultra, semper dicitur extensa, sed si extensio producatur ad 24. horam, dicitur simpliciter extensa; si ad 30. parum extensa; si ad 36. multum extensa; si ad 40. horam, & ultra, dicitur plurimum extensa. Hanc igitur nos propriè Tertianam exquisitè notham sed parum extensam appellabimus.

Notha autem redditur hæc tertiana à permissione, & unione perfectâ pituitæ cum bile ipsa;

si enim fieret sola superadditio, non una tantum, sed plures suborirentur febres; in hac vero multitudine prædominatur bilis, ratione activitatis; sicut pituita, ratione molis; cum febris usque ad 30. horam protrahatur. Et licet aliquando in huiusmodi febre, bilis melancholicæ quoque, non pituitæ misceatur, à qua multitudine, tertiana notha non exquisita producitur; de hac tamen non est quod cogitemus in præsentī Patientē nostro, temperamenti calidi & humidī, cum obeso habitu, & albicantis coloris, ex frequentibus comestationibus, gelidisque potibus, sicque, non solum à frigida ventriculi intemperie, sed multo magis objectis improprietatibus, cruditates continuo congerente, nec ullo exercitio easdem attenuante aut resolvente; quæ omnia in pituitosi humoris, non melancholici præsentiam conspirant. Et licet calidius sit hepar, bili producendæ aptum; non tamen adeo fervet ut sanguinem atrium reddere, aut humorem melancholicum producere possit; quod si superioribus mensibus præcessit febris tertiana exquisita, quæ humores adurere potuerit; attamen tanta fuit humectantium assumptorum copia, ut quæcumque exsiccationem inhibere & superare valuerit. Quare, à bile vitellina majoris famæ, nimirum ex bilis cum pituita permissione, non ex vitellina minoris famæ, ex permissione scilicet bilis cum melancholia, præsentem febrem ortam censemus. Hæc autem vitellina bilis, nota non Arabibus tantum, ut quidam falso crediderunt, sed & Gal. quam citrinam seu croceam appellavit; imò & ipsi Hippocr. qui in historia filii Cydis, dixit, quod in eo prodit subbiliosum, viscosum, & velut ex ovo conquisato subpallidum; ad differentiam vitellinæ bilis, per affationem in venis genitæ, quæ crassa est non viscosa, prout hæc per commitionem extra venas genita, & in hac præsentī febre, circa viscera naturalia putrescens, præcipue circa jecur, ubi tensio major, majorque obstructio percipitur, quæ naturalis caloris ventilationem prohibendo, antecedentium excrementorum putredinem acceleravit, cui febris hæc tertiana notha extensa mox necessarîo successit.

Hanc commodè nobis significare possunt, primò horror in principio, inter rigorem & frigus, medius: nam sicut rigor bilis est proprius, ita pituitæ proprium frigus. Secundò, calor mitior, & in vigore non adeo mordax: nec ita confestim per totum corpus diffusus, ut in tertiana exquisita: quia à pituitæ præsentia incipitur. Tertiò, pulsus non adeo vehemens, tardus & rarus, cum pulsu tertianæ exquisitæ comparatus, & inæqualis, non solum febrili, verum & collectiva inæqualitate: quia vitalis facultas ab humorum putredine oppressa est: durus etiam percipitur, potissimum in principio, cruda existente materia, cujus coctione incipiente mollior redditur: huius autem durities fit, non à siccitate condensante, nec à frigidityte congelante, sed à copia humorum replente, & arteriam distendente. Quarto, urinae sunt crudæ & tenues, pituitæ & bilis præsentiam ostendentes. Quinto, modus invasionis & solutionis: invadit quippe cum vomitu pituitoso, & solvitur cum crasso & lento sudore. Sextò, tempus durationis, & primò quidem particulare, quod non solum 12. horam pertransit, sed attingit 30.

Universale verò, quia ultra septimum circuitum progredi solet. Septimo tandem, res naturales, non naturales & præter naturam præteritæ, utriusque humoris exuberantiam nobis significare possunt: ut totius temperamentum calidum & humidum, habitus obesus, ventriculi frigiditas, jecoris caliditas, vita anteacta otiosa, delicis, gelidis meri & aquæ comotationibus ac comestationibus dedita: & tandem tertiana exquisita præterita: cujus occasione, ex potibus copiosis, cruditates, indeque in visceribus obstructions genitæ ac relicte fuerunt.

Febris hæc, propria ratione, periculo caret, cum sit intermittens: longa tamen esse solet, ob viscosi humoris commitionem. At si errores, aut ab ægro, aut à Medico committantur, non solum longa, sed periculosa evadit. Hinc Gal. dicebat, quod si quis eam incipientem curet, neque longa, neque periculosa est: si vero non curet, aut malè curet, & longior fit, & sæpe occidit: nam vel transit in quartanam: vel, prægressis obstructionibus cachexiæ succedunt: & sic periculosam existimavit hanc febrem Gal. in illo Adolescentulo 18. annum agente: quia delinquebat, nec satis obsequens erat. Quibus consideratis, verendum ne in hoc Nobili Patientē hæc diuturnæ & periculosa quoque evadat: Primò, quia ipsum in deliciis educatum habemus: prout ille Galen: sed præterea adsunt obstructions in visceribus, & potissimum in hepate, febrem ipsam foventes; quæ si augeantur, viscera naturalia semper in agis intemperata reddunt, unde cachexiæ & hydrops.

Pro curatione itaque, in primis protestandum huic Adolescentulo ut obsequentem se præbeat: alioquin Medicus aut parum, aut nihil proficere poterit. Deinde à nobis considerandum quod intentiones, in huius febris curatione, valde diversæ sunt à scopis curandæ tertianæ legitimæ exquisitæ: & ideo, non sine ratione, tertiana notha exquisitæ maxime contraria dicta fuit: in exquisita enim omnino refrigerare & humectare oportet: quia coincidunt indicationes cum febre, & causa febris: at hæc febris indicat refrigerantia, causa verò calefacientia. Quare refrigerandum & humectandum, ratione febris, moderatè tamen: calefaciendum, attenuandum, incidendum & evacuandum, ratione causæ: deobstruendum, ratione obstructionum; & tandem, magna diligentia & observatione, vires conservandæ.

Et in Chirurgico fonte, in primis consideratur sanguinis missio; quæ in Patientē nostro, præmisso clystere & lenienti medicamento, necessaria erit, ex jecoraria dextera, parçè sanguinem educendo; incisiones enim, & detersiones, purgant obstructions, non venesectio; educitur tamen ratione causæ foventis. Unde & Gal. dicebat; quibus sanguinem mittere opus est, his statim, in primis diebus mittendus, servatis conditionibus; & evacuandum quantum convenit. Sic Paulus & Oribasius, cum conditione, si opus fuerit. Aëtius limitat, moderatè sanguinem esse mittendum. Avic. autem ait; quod dum phlebotomaveris clysteribus non indigebis; ita clyster contrà, erit succedaneum venesectionis remedium. Et si caput coafficeretur, hirudines quoque venis sedalibus applicari possent, revulsivis gratia; sicut frictions quoti-

quotidianæ non sunt omittendæ, & Balneo sub-
lituendæ, manibus inunctis oleo amygd. lino
& chamæmelino. Laudat præterea Gal. ut hy-
pochondria foveantur, supposuit enim in visceri-
bus naturalibus obstructions. De his autem
infra dicemus.

Ex Pharmacentico fonte, sunt desumenda
Lenientia, Preparantia, Contemperantia, Eva-
cuationia, per vomitum, alvum, urinam, sudo-
rem, prout opus fuerit, Deobstruentia, viscera
Roborantia; & tandem, a proprietate Juvantia.

Leniens crastino mane exhibendum, potest
esse cast. cum lenit. & tart. vel syr. ros. solut. cum
lenit. quibus superbibat jus, aut aquam hordei.
Secundo, præparantia sunt ab initio leviora, ut
julap. acet. ad unc. iij. cum acetum multum
proponat Aëtius. In progressu efficacius red-
derit, macerando in aqua agrimoniz & ace-
to, radicem petroselin. pentaph. cich. form. u-
li; & expressioni addendo sacchari q. s. pro
julapio, cui superbibat succum cich. ad unc.
iii. in decoct. cich. borrag. end. agrim. beton.
Tertio, refrigerantia valde moderata esse de-
bent; quare, facile sufficient succus cich. de-
pur. jam propositus; vel, urgente calore, feri
depur. lib. cum copioso julap. acet. Quarto,
evacuantia consideranda, & primo quidem vo-
mitoria; solis namque vomitionibus a cibo,
Gal. asserit se hujusmodi febres diurnas sanasse;
ita Paulus, Aëtius, & Oribasius. At notan-
da illa verba, in longis hujusmodi febribus; cum
enim per vomitum materia conjuncta eva-
nuat, nequeat, evacuat antecedens, quæ quotidie
ab imbecillo ventriculo generatur, ne evadat
conjuncta & febrem foveat. Ab initio autem, sola
prima die vomitus ciendus, ut factum fuit; in
progressu vero vomitorum parabitur ex jure
sem. cit. alterato, cum oxymel. & succo raphani.

Per alvum purgantia præbeantur, ex Tral.
verum coctione apparente, ex Oribasio, quæ
benigna sint, humores enim purgandi non sunt
distantes; & præterea. ne calor febrilis augea-
tur. Inter ea vero rhab. primas tenet; sed &
agaric. Aloë, folia Sennæ. Quare parentur bol.
ex cast. lenit. & pil. de tribus cum rhab. Vel inf.
rhab. agar. Sennæ, cinnamomi integri; addito
syrup. ros. solut. quibus superbibat aqua mulsæ,
ex aqua hordei paratæ lib. ij. At quoniam mate-
ria hujusmodi requirit evacuationem per epi-
crasin factam; ideo tutius erit, quarto quoque
die, castæ unc. sem. cum drachm. l. pil. de tribus
exhibere; cui hora transacta, superbibat jus
hordei, & prandeat.

Si ad urinam materia tendat, ita ut crassas
easdem reddat;

℞. Decoct. agrim. petrosel. apii, capill. ven.
unc. vj. spirit. ammoniaci gutt. v. m. Egyptii
utebantur chamæmelo, Soli consecrato, ad fe-
bres fugandas.

Si sudor moveatur, ut in brevibus, non in
diuturnis aliquando evenire videmus, præbeatur
decoctio verbenæ & Cardui sancti, cum aqua
cord. præ. Sax. addito cornu cerv. philoph.

Quinto, deobstruentia & aperientia sunt ne-
cessaria; obstructions enim, licet febris mine-
ra non essent, caloris tamen ventilationem pro-
hibendo, aliorum humorum putredinem foveant.
In hanc rem hyssopum & origanum proponit
Gal. Nos uti solemus troch. de eupat. de rhab.

de absinth. in jure aperientibus alterato. Pari-
ter, syrup. de cichor. cum rhab. & in contumaci-
bus, decocto salis, cum attenuantibus & inci-
dentibus; habet enim salis subtilissimas partes
& maxime permeabiles, quibus angustulinas
quoque vias pervadere potest; neque verenda
ejusdem caliditas, calidiora quippe sunt apium,
hyssopus & origanum; ipsa vero in acutis tem-
perata censetur.

Quare; ℞. Salis optime incisa unc. j. radic.
petrosel. form. an. unc. l. Aq. cich. lib. ij. agrim.
lib. j. m. fiat. inf. per hor. 14. deinde bul. ad con-
sumpt. dimidii; in hinc ebull. addendo fol. capil.
ven. rec. agrim. pentaph. an. pug. j. bul. parum,
& colat. servetur pro duabus vicibus; cui præ-
natatur bol.

℞. Succu condens. eupatorii, sich. troch. de
rhab. an. drach. l. tart. vitriol. scrup. j. m. & cum
vino albo reformetur bol. iv. & aur. quorum
unus ante decoct. exhibeatur.

Sexto, viscera roborandi, in quem finem
præstantissimum est absinth. ponticum, si ex eo
paretur conserva; vel sal absinthu, vel vinum
absinthites.

Extrinfecus verò, pro ventriculo; ℞. Ol. de
absinth. malic. de mentha an. unc. j. pulv. malic.
diarhod. Abb. an. drachm. j. vini albi generosi
unc. j. l. m. bull. ad consumpt. vini; in hinc, ad-
dendo ceræ parum, ut fiat linum. molle.

Pro hepate; ℞. Ung. ros. Mei. unc. j. l. ol. de
absinth. unc. l. suc. cich. depur. unc. ij. pulv. absinth.
agrim. an. drachm. j. m. bul. ad consumpt. succi;
sub hunc, addendo ceræ parum, pro linum.

Pro splene; ℞. Ol. de cappar. amygdal.
amar. de cyclamine an. unc. j. pulv. tamaricis,
cort. radic. cappar. an. drachm. j. succ. fumar.
depur. unc. ij. aceti acerrimi unc. j. l. m. bul. ad
consumpt. aceti; in hinc, addendo ceræ parum,
pro linum. lienis.

Ultimo, a proprietate juvantia, in hac tertia-
na notha, solent esse decoct. verbenæ & Cardui
benedicti, centaureum minus, febrifuga dictum.
Chymici præbent salem Centaurii in moris, ad
gr. v. in aqua ejusdem. Egyptii utebantur Cha-
mædry. Extrinfecus apponitur pullibus manuum
apium silvestre tulum.

Victus ratio sit moderatè refrigerans & hu-
mectans, sed attenuans; ideo psianam cum
pipere offerebat Galenus. Nos autem cum in-
tegro cinnam. Crassior verò in hac quam in ex-
quisita tertiana; quia diuturnior est. Non ta-
men, more Galen. & Avic. alterius tantum die-
bus est æger nutriendus; nostris enim temporibus,
qui multo cibo assueti sumus, tantam ci-
borum dilationem vires terre nequeunt; sed die
quoque accessionis, quinque horis ante eandem,
cibus, sed consueti tenuior est offereendus, &
Galen. verò & Avic. forsitan plenior prohibebatur.
Vinum non conceditur nisi apparentibus signis
manifestæ coctionis, ne cruditates deducantur
ad venas, quod in legitima tertiana minus ve-
rendum. Et hæc sint satis pro hac tertiana notha
curanda. Idem ibidem.

Tertiana Duplex.

Vir quadragenarius, temperamenti, secun-
dum totum & secundum jecur, calidi & sicci
gracilis habitus, & multis ab hinc annis hypo-
chondriacus, libere vivens, potissimum in potu

copioso & fructuum usu delinquens, in eunte autumno, post vomitum continuato triduo, multiplicium & heterogeneorum humorum, amari, acidi & insipidi saporis, cum alvi lyp-ticitate, hora xx. febricitare cepit, cum totius corporis horripilationibus. Calor tactui erat ab initio non adeo mordax qui in progressu acior percipiebatur; cum siti molesta, ventriculi angore, capitis dolore. Pulsus non magnus, non vehemens, non adeo frequens in diastole; sed valde inæqualis, & systole frequenter. Urina cruda & tenuis, quoad substantiam; sed quoad contentum, crassa & confusa. Perseveravit febris, cum corporis jactatione tota nocte, quam solo jure cichorac. alterato transegit, tummo vero mane sequenti, præbuit illi Medicus cassiam cum tart. Et quia valde iuuebat æger, & ipsius hypochondria maxime æstuabant, serum depur. superbibendum concessit; mox pisan. cum ovo sorbili sumplit pro prandio; & inde somno se tradidit, capite tamen adhuc dolore vexato. Paulò post meridiem expers factus est, cum adaucto calore in toto, capitisque majori dolore, molestiori siti, hypochondriorum æstu, corporis jactationibus atque inquietudine. Quare Medicus accersitus, ægrum cum novo febris aditu invenit, cujus prog. cilius præterito valde abstinis, imò molestior tunc observatus. Ideo tertio die, maturius horis, præmisso clystere, sanguinem ex jecoraria dextera educendum; mox prandium præcepit Excell. Aditans, somnumque imperavit, quem quidem cepit, sed capite semper gravato. Hora autem 10. refrigeratis parumper extremitatibus, intensius totum incaluit, cum aliqua mentis alienatione, molestiori siti, & corporis jactationibus: tunc vero me ad consiliu accersiverunt, qui, cum omnia jam præterita, & acta à Viro Excellentiss. accepissem, observato pulsu valde inæquali, calore ad tactu perdurante multum acri, urinis crassis, confusis & ferè turbulentis, quæ mox clarescebant, ita sum factus.

Quod excrementorum varietate abundet Nobiliss. ille Vir, indicio sat est quod hypochondriaco affectu detineatur: in quo cum terreat jecur, hypochondriaque æstuent multis abhinc annis, coctiones in ventriculo, tum imminutæ, tum depravatæ sequutæ fuerunt, unde modò nidorulentæ, modò acidæ, modò pituitosæ & insipidæ materiæ proventus, non quidem, ut vulgus Medicorum falsò credit, ob frigidam ventriculi intemperiem, sed ob impropor-tionatum objectum, sive potius, ob calorem excedentem, à jecore & hypochondriis ventriculo communicatum, qui, utpote impropor-tionatus, cum coctio à moderato & halituoso calore perficiatur, ciborum corruptiones, vel saltem concoctiones imminutæ, efficere solet; atque ita ferè perpetua est excrementorum productio, quæ tractu temporis, & obstru-ctiones in mesaraicis, atque lacteis venis adauget, & venosum genus conspurcat, dum interim nec cessat biliosi humoris generatio; tum à jecore fervidiori, tum à copiosis vini potibus, & fructuum dulcium consueto usu. Quapropter biliosorum, pituitosorum & melancholicorum excrementorum colluvies, in venis viscerum & totius acervata atque commista, nec amplius à natura moderata, mediantibus obstru-ctio-

bus, liberam transpirationem prohibentibus, putredinem, nondum quidem in venis commu-nibus, quia febris continens sive conclusa non est, sed in venis viscerum, scilicet hepatis & cavæ principio, concepit, unde febris continua sequuta est, non per subingressum paroxysmo-rum; quia accessiones, neque declinationes adeò manifestæ sunt, neque continuæ omnino essentialis, quia exacerbationes habet, Medi-co & Patienti notas, sed est continua periodice proportionata. Prior quidem manifestior; quia in venis hepatis magis particularibus seden-tibus; secunda vero obcurior, quia in trunco venæ cavæ magis communibus hæret: duplex enim requiritur putredinis locus, cum duplex sit tertianarius typus, tertio quoque die sit i corre-spondens, quæ ideo tertiana duplex continua, sive dux tertianæ continuæ nominantur, & quidem ipsarum, ratione materiæ, ob aliorum humorum cum bile nutritionem: unde pulsus, urina, calor & syn. promota omnia, ab exquisitis declinant.

Symptomata concomitantia sunt, sitis, ob ingentem febrilem calorem; capitis dolores, ob evaporationes e venoso genere sursum elatas: angoris autem, & hypochondriorum æstus causa, potius hypochondriacus affectus quam febris censenda est. Delirium verò, licet in vigore febris solum observatum fuerit, & ideo paraphrenitis, & pseudodelirium sit existiman-dum, nihilominus in acutis semper malum & exitiale signum fuit; ut in Hermocrate Adoles-cente, in Melibæa, & aliis, ab Hippocr. fuit observatum.

Quare acutus quidem morbus est, qui acutissimos, maximos atque gravissimos antecus secum ducere potest, & ideo valde periculosus, eoque magis cum non exiguus excrementorum apparatus argui possit, ex vita antea acta, natura-lium viscerum constitutione, accessionum vehementia, & pulsus inæqualitate, qui in systole ce-lesior est quam in diastole, copiosas expellendi fuligines necessitatem significans, ac tandem, ex urinis crassis ac turbulentis, quæ crudorum hu-morum copiam in venis, à calore non modera-tam significantes, aliquem capitis affectum in-dicare solent.

Pro hujus febris curatione tribus est prospiciendum. Morbo, Causæ & Symptomatibus. Morbo quidem, refrigerantibus & humectantibus. Causæ, attenuantibus & incidentibus; nec non detergentibus & evacuantibus. Sympto-matibus, Cor, Cerebrum & Hepar præmunien-tibus, nè aliquis in hisce partibus affectus inducatur; observando semper quò putredo vergat; namque si ad adustionem, alexipharmaca retri-gerantia & humectantia convenient; si ad to-talem corruptionem, frigida exsiccantia.

In Chirurgico fonte, sanguinis missio neces-saria fuit; quoniam putredo in vena cava & he-pate viget, ad jecoris refrigerationem & venti-lationem; ita enim major inhibetur putredo, & calor febrilis remittitur; sicque febris formæ & materiæ medemur; imò, si in progressu caput magis coafficiatur, venæ quoque sedales ape-riendæ erunt; ut vaporum & humorum, caput petentium, fiat revulsio, & forsan aliqua ab hy-pochondriis derivatio. Et si non solum coafficia-tur, sed essentialiter quoque caput ipsum læda-

ur, adeo ut dolor fevior evaderet, & delirium diutius perseveraret, phoenigmi duo coxis apponenda essent, & de duobus aliis, brachius applicandis, cogitandum foret.

Ex pharmaceutico fonte, depromenda sunt, Lenientia, Præparantia, frigida aperientia, Alterantia, Evacuantia & Symptomatibus occurrentia.

Leniens jam fuit exhibitum; modò præparantibus & alterantibus, suo loco & tempore est insistendum.

Et pro præparante, saltem duabus horis ante prandium, julap. acet. ad unc. iij. opportunissimum erit, in jure pullæ in quo ebullierit semuncia crem. tart. laxigati, tacta prius colatura. Secundum præparans, ordine executivo, proponam.

Alterantia in vigore febrilis caloris sunt omnino necessaria, ne exurantur & contendantur in venis humores; hoc enim remisso, coctiones à naturali calore facilius neri possunt in quem finem, in febribus biliosis & sanguineis, Hipp. & Gal. aquam libenter propinabant. Sic Hipp. 3. Acut. 40. & 41. & Gal. pluribus in locis, aquæ potionem commendat; ut in Lib. de Caus. Procat. cum suo Gorgi., contra Erasit. 1. Meth. contra Theisalum. 7. Meth. ventriculo male affectos, frigida potione, unica die sanatos testatur. 8. 9. 10. & 11. Meth. gelidæ potum probat in febribus biliosis & sanguineis, sive putridis, sive non putridis; servatis tamen servandis, præsentibus nimirum conditionibus ad frigidæ potum necessarius; quæ plures enumerantur à Gal. sed omnes tamen ad tres redigendæ, dicente. Ergo, si vires cunctæ valentes sint, febris ardentissima, & coctionis notæ appareant, frigida propinari poterit; quæ quoniam in casu nostro non adfuit, ideo frigidæ potio, licet à Patientæ expectata, à nobis tamen non est admittenda. Quare substituenda potio alterans, ex aquis stillatitiis cich. acet. borrag. end. ad lib. iij. cum syr. de acido cit. vel de suc. lim. vel cum conserva de acid. cit. quæ potio in febris vigore, quando nimirum calor major ad pedes descenderit, est offerenda. Quatuor deinde transactis horis, præbeat alterans, quod præparandi quoque & aperiendi vim obtineat; alterum scil. duorum, aut jus cich. borrag. end. acet. pentaph. malva alteratum, addito suc. depur. cich. ad unc. iij. aut unc. iv. Julap. acet. si humores ad alvum vergant; quod si ad urinam, præberi poterit, pro sorbitione, emuls. sem. mel. mundat. extracta in jure pullæ, si nutrimento sit opus; sin minus in aqu. cich. & endiv. addendo utrique syrup. de succ. lim. ad unc. ij. vel iij. Inde in remissione (qualisennique ea fuerit) ptisana hordeacea, cum ovo sorbili, aut jure pullæ instaurante, erit offerenda. Sed hora una ante cibum, aliquod cordiale exhibendum; quale esse poterit jul. gemm. M. D. ad gutt. x. in aq. scorzon. & tot. cit. Vel julap. perlatum, in iisdem aquis, ad scrup. j. utpote minus calefaciens & vaporosum, cum sine moscho & ambra paretur. Nec ad efficaciora cordialia, diaphoretica scil. deveniendum; nisi præcedant, & coctionis signa, & naturæ ad sudorem propensio.

Eodem ordine erit sequentibus diebus procedendum; sed interim clysteres frequentes

erunt injiciendi ex lacte, butyro, syr. ros. solus, vel n. el. rosar. solut. parati. Et ante septimanam, minorativum medicamentum erit repetendum, ex flor. cali. & tart. vel ex syr. ros. loi. & manna; quibus superbibendæ præbeantur leni capræ aut aq. hord. lib. ij.

Transacta septima, facile apparete poterunt aliqua signa coctionis, febre nimirum augumentum properante; & ideo tunc observanda erit naturæ propensio, ad expeliendam materiam concoctam; quæ propensio ante coctionem expectanda non est. nulla enim excretio ante coctionem apparens, critica esse potest; ac promde, neque à natura vincente tentata; & ideo irridendi Medici illi qui, ante signa coctionis, de evacuationibus solliciti sunt, cum tamen naturam operantem, & bene operantem imitari debeant, sive ad sudorem, sive ad alvum, sive ad urinam ipsa moveat.

Et si ad sudorem, sudorifera sint temperata, ut Corn. Cerv. philosophi. spirit. vitr. Bezoar. Orient. pulvis Contrayervæ, vel ejus extractum, Aq. pa. Cord. sax. Aqua Card. sancti, Aq. scorzonæ, & quotidianæ leves frictiones.

Si ad urinam, spirit. vitr. qui ad urinam & sudorem promiscuè se habet, sicut pariter Bezoar. Occidentalis, in aqua capii. Ven. agrimon. gram. hord. addito aliquo cordiali, ut aqua totius citri, cum succ. cit. aut. lim.

Si ad alvum: exigua cassiæ portio sat erit, vel ser. cap. j. depur. cum portione crem. tart. vel aq. hord. cum julap. acet. naturæ namque momenti exiguum sufficit auxilium, operanti verò, nullum, juxta Gal. dicentem. Neque si febris fuerit cum profluvio alvi, alia opus est evacuatione, verum hæc sola sufficit, etiam si non fuerit pro multitudinis ratione, quicumque enim, aut sanguinem mittere, aut ventrem movere tentaverunt, in gravissima pericula ægros duxerunt. Hæc Gal. qui licet de purgante medicamento sit intelligendus, attamen & lenientia valde caute sunt admittenda.

Externa interim non sunt omittenda, cordialia, & Hepatica.

Sic cordi, ℞. Ung. ros. Mef. unc. ij. specierum cord. temp. drachm. ij. camph. gr. ij. acet. rosar. succ. cit. an. q. s. M. f. lin. pro Corde. Pro hepate refrigerando, valet ung. rosar. Mef. cum suc. cich. aut totum illinatur abdomen; proderit enim & æstuantibus hypochondriis, Symptoma cum si aliquod superveniret, illi occurrendum propriis remediis, de quibus suo loco.

Victus ratio tenuis esse debet; quia morbus acutus est; memores tamen quod latitudinem habet ipsa tenuitas; sit autem refrigerans & humectans. Ita, ptisana hordeacea, si ad alvum materia vergat; sicut si ad urinam, panatellæ cum emuls. sem. mel. ova sorbilia, contusum pulli, jus instaurans. Lactuca quoque in jure cocta concedi potest; sic & cucurbita, & deficiente somno, ptisanæ addatur emuls. amygdal. dulc. Fernel. exemplo.

Potus sit aqua hord. ex qua parari etiam poterit emuls. sem. mel. valde diluta; vel eidem addatur julap. acet. aut de suc. limon. Hæcque in casu præsentis satis. Idem ibidem.

Tertianæ continua.

Vir Nobilis, 35. annum agens, temperamenti totius, & jecoris calidi & licci, gracilis habitus, pallidi coloris, Hyeme sicca & aquilonia præcedente, Vere autem pluvioso & australi, hoc anni tempore caniculari, post immodicæ exercitiæ & mei. i. computationes, ex tempore febre correptus fuit, circa meridiem, cum ingenti calore, siti molesta, oris amaritudine, ciborum abominatione, & ad vomitum propensione; iracundia item præter consuetum, vigiliis & levibus somnis. Pullus statim leuens & celer fuit observatus; urinae flammæ, lucidæ & tennes. Accersitus Medicus consuetus illico excitavit vomitum, levissimo vomitorio; qui humorem, exiguum quidem, sed flavum ac viridem, valde amarum vidit excretum; & alterans ex cichorac. paratum, vespertinis horis, ptisanamque exhibendam mandavit; postridiè, matutinis horis, syrup. ros. solut. cum copioso ser. capr. præscripsit, à quo biliosorum humorum evacuatio fuit observata; vesperi verò rursus seri lib. ij. cum julap. acet. & pro cœna, ptisanam. Interim vigiles noctes, vel cum levissimo somno transegit; & usque ad hunc tertium diem, febris ferè semper ejusdem tenoris, sine ulla accessione fuit observata. Accersitus ego, simul cum ægri Medico, decrevimus unguines clysterem ex lacte, butyro & saccharo injiciendum; ptisanam inde esse dandam, & novam febris accessionem, circa horas meridianas esse observandam; vesperi verò, de agendis consulendum. Hora itaque 21. reversi, invenimus Patientem intensius febricitantem, & quodammodo aliena loquentem, omnibus jam dictis symptomatibus adauctis; licet adstantes nullum signum accessionis observare potuerint. Modò de agendis cogitandum.

Febrem hanc, tribus abhinc diebus Nob. Virum affigentem, ab Excellent. Medico, primis horis, in genere putridam atque biliosam esse, summa cum ratione creditum fuit; dum excrementa omnia, per vomitum, alvum, urinam, biliosa visa fuere, simulque observata reliqua omnia symptomata, nimirum oris amaritudo, vigilie, somni leves, facilis excalescencia; quæ peccantis bilis faciliè nobis certissimum testimonium præbent; ut idèò adversus bilem aptissimè Medica auxilia direxerit. Speciatim verò, tertiana continua essentialis observatur; quia tertio quoque die invalescit, nunquam recedit; quinimò, declinationem insensibilem habet, cum imperceptibili exacerbatione; quam de genere ardentium esse Gal. existimavit, acutam proindè eandem appellans, sicque delinens. Si qua febris tertio quoque die exacerbatur, neque per minimum intervallum ita mitescat, & in ea febricitans eò deveniat, ut propè sinceram integritatem esse videatur, hanc febrim acutam nominabimus, ex illis videlicet quæ tertio quoque die exacerbantur.

Hujus autem febris causa, est bilis, eaque excrementitia; etenim à sanguine bilioso, sit biliosa synocha; nec tantum flava, sed vitellina; imò & porracea, ex dictarum exultione, in venoso genere producta; conspirantibus rebus omnibus, & naturalibus, & nonnaturalibus, ad bilis exultæ procreationem; atque nimirum, in qua

exultiones sunt, temperamento torius & jecoris, calido & licco, habituque gracili, atque pallido, bilem non solum, verum & exultam significantibus. Sic præterita hyems, sicca & aquilonia, in siccitatibus enim febres acutæ sunt; & præterea anni tempus æstivum; ac tandem immodicum exercitium, & meri vini potus. Sic Puer quidam, ex meri potu, apud Grammaticum, acute febricitans, subortis vigiliis & delirio, interit. Quæ omnia simul juncta, & quidem eodem tempore concurrentia, non solum bilem producere & coacervare, verum etiam jam antea producta, aliquam portionem allare potuerunt; quæ simul ab adaucto & præternaturali calore, in vena cava putrefactæ, hanc febrim excitare valuerunt, & quidem circa meridiem semper exacerbata, quia a bile fit, quam exacerbationem, non solum a loco, eo quod non in omnibus venis, sed in cava, statim supra jecur putrescat humor; sed etiam à copia & acuitate ejusdem humoris provenire credendum. Verum, quoniam causæ omnes, calorem & exultionem inferentes, simul concurrunt, & sævis symptomatibus, solius flavæ bilis non adeò proprius, comitata observatur, ut vomitu porraceo, contumacibus vigiliis, delirio; idèò, non flavam tantum, sed pejoris conditionis quoque bilem, ut diximus, putrescere arbitramur.

Febris hæc periculosa est, non solum quia continua; sed quia habet hanc conditionem, ut tertia die fortior fiat; estque illa de qua propriè loquutus est Hippocr. Febres quæcunque non intermittentes, tertia fortiores sunt, magis periculosa, hoc est, quam reliquæ continuæ, quod idem confirmavit in Coacis. Et nos semper hujusmodi febres formidavimus; cum in praxi à nobis observatum fuerit, malignas ut plurimum, evasile: facta nimirum in venis biliosi humoris superaffatione, adeo ut flava vitellina evadat ex superaffata verò vitellina, prasina; & ex superaffata prasina, æruginosa. Malignam autem, non ob excellentem putredinem, quæ ab excedenti humiditate, cum deficiente calore procedat, cujus finis est factor; sed propter exultionem, quæ provenit ab excedenti calore, in humido deficiente, cujus finis est cinis & exultio: utroque namque modo humores coctionem respuunt, & in urina signa præbent contraria coctionis; tuncque actum est de salute Patientis, quoniam à privatione ad habitum non datur regressus. Datur verò tertia putredo humorum, quæ ad maturationem tendit, cujus finis est concoctio; quam vix admittere potest bilis prasina & æruginosa; non quia prasina juxta Aponensem, putrescere non possint; sed quia putrefactæ secundò modo, ob earum crassitatem & adustionem, concoctionem non admittunt, sicque maligna febris suboritur, de qua dicebat Hippocr. quod si quis in febre continua, quarta die, & septima affligatur, & undecima judicatus non fuerit, plerumque perit.

Incerti itaque de hujus Patientis salute, curationem aggrediemur, quæ valde convenit cum curatione febris ardentis; in eo autem differt, quod non adeò intensè refrigerandum sit. Sunt autem petenda à fonte Chirurgico, Pharmaceutico, & Dietetico, medicamenta, recto ordine administranda; adeo ut, Primò bilis putrida evacuetur. Secundò, ejusdè calor contemperetur. Tertiò,

Tertiò, attenuantibus, incidentibus ac detergentibus, obstructions auferantur, ut sic libera reddatur transpiratio, & ulterior putredo inhibeatur. Quarto, cardiacis utendum, refrigerantibus & exsiccantibus, ut cor roboretur. Quintò, symptomatibus occurrendum. Et tandem vires custodienda.

Et à fonte Chirurgico, in hac febre curanda convenire solet sanguinis missio, dummodo abundet, ex jecoraria; ad totius veni generis ventilationem, & exurentis caloris modulationem. In hoc autem casu valde caute procedendum; cum ægri eo pus fere squalidum videantur; tempus sit canaliculare: & bilis prava conditionis reperiatur in venis, quæ sanguinis missione semper deterior evadit. Quare possumus, ante quartam jecorariam aperire, & sanguinem ad quatuor vel quinque uncias educere; ad jecoris & sanguinis ventilationem atque moderationem; moxque delirio, alioque capitis affectu invalescente, venæ fedales referantur, præcave tamen, & ad solam revulsionem sanguine nullo; quo casu phœnigmi quoque coxis erunt apponendi.

Ad Pharmaciam devenientes considerandum Gal. documentum, quod non liceat valde retrigere & humectare bilem, nisi prius putrida evacuetur. At quoniam peccat in venis supra jecur, non video quomodo absque eleative purgantibus educi possit; quæ tamen ab initio non conveniunt. Verum crediderim ego de sola indicatione, ab humoribus putrescentibus deducta, Gal. eo loci loquutum fuisse, dum ait: At vero, in humorum putredine, & excretio, & refrigeratio, & ventilatio, & semiputridorum concoctio; ipsius verò febris retrigatio, opposita est. Sicque etiam, ante putridæ bilis crassæ evacuationem ratione febris, refrigerandum est; præterquam quod lenientibus quoque excitatur natura ad humorum in venis redundantium evacuationem tentandam; & ideo in acutorum principio, sæpe videmus solo syr. ros. solut. bilis quantitatem & qualitatem evacuari, quam vasa infra jecur procul dubio capere non poterant. Leniens itaque erit à nobis repetendum, ex cass. & tart. vel ex syr. ros. viol. solut. quibus superbibat seri depur. lb. ij. Et interim biliosi humores præparentur, & eorundem fervor contemperetur, ne ulteriori allatione crassiores reddantur.

℞. Aqu. still. de succ. cichor. end. acet. an. lib. f. Julap. viol. rosac. an. unc. j. m. pro syrup. exhibendo, quando major calor ad extrema descenderit.

Vel, ℞. Seri capr. aut asin. depur. lib. ij. Julap. ros. viol. an. unc. j. m. pro pot. ut supra, præbendo.

Vel, ℞. Aq. nocer. legit. lib. ij. Julap. viol. ros. syrup. de ribes an. unc. j. m. pro potu ut supra. Declinante accessionis vigore, nimirum quatuor horis ab assumpta potione, sorbitio aliqua poterit exhiberi; sic parabitur emulsió sem. mel. in jure pullæ, aut in decoct. ex jure cich. borag. end. acet. hepaticæ, sonci & portulacæ, ad unc. 8. addendo julap. ros. & viol. In declinatione verò præbeatur ptisana, cum pulli junioris confuso, aut jure instaurante. Hunc ordinem nobis proponit Hippocr. dicens. Detur aqua mulsa aquosa, altera autem die qua febris

detinet, aquam frigidam quantum bibere volet, dabis; ubi vero remiserit febris, ptisanæ succum sorbeat. Unde perperam faciunt Medici illi qui sorbitionem potioni anteponunt. Interim diebus sequentibus aliquod minoratum erit repetendum, & refrigerantibus insistendum.

Et quoniam bilis refrigerata coctionem admittere potest, qua natura ad ejus expulsionem moveri solet, ideo tunc ejusdem nature propositio observanda, quæ solet esse vel ad alvum, vel ad urinam, & frequenter ad sudorem. Si ad alvum inclinet, sola aqua hordei copiosa, ut detergens & gravis, vel ser. capr. depur. ut nitrosum, poterit alvi motum jam ceptum conservare; maxime si is addatur julap. acet. quo in hoc casu uti possumus; namque ex Avic. bilem in pituitam, & pituitam in bilem vertit. Si ad urinæ vias natura tendit, præbeatur serum asinum destillatum syr. de succo lim. & de acido cit. vel emulsió sem. mel. extracta cum j. m. dictæ sero destillato. Parari quoque poterit decoctio in aqua hordei, ex cin. borrag. acet. endiv. capill. ven. & radice pentaph. Gal. addit quoque anethum, quem reprehendit Iral. cum tamen ipse in eodem casu, utatur apii radice, calidiori. Si ad sudorem fuerit natura propensa coadjuvetur tali potione.

℞. Aq. acet. borrag. tormentillæ an. lib. f. Aq. cord. Sax. unc. ij. spirit. vitr. gut. v. m. pro potu.

Vel, ℞. Aqu. acet. borrag. Card. sancti an. unc. v. scorz. unc. ij. butyri sulph. aut aq. sulph. gut. v. m. & est eximium sudorificum, ab Hartmanno propositum, maxime præsentis bile prave conditionis.

Quod si natura nullam promoveat evacuationem, alvus sollicitanda blandis clysteribus ex lacte, butyro & saccharo paratis. Interim cardiacis medicamentis, & a proprietate juvenilibus utendum: & in hoc casu, diamargarito frigido; Margaritæ quippe præparatæ habent adversus has biles singularem proprietatem; sicut alexipharmacum & prasinx & æruginosæ bilis, à tota substantia, est pulvis levigatissimi Crystalli, à drach. f. ad drach. j. ut observavit Aponensis. Præbeantur autem hi pulveres, cum aqua totius citri & rosarum.

Extrinsæcus quoque convenientissima erunt epith. jecori & cordi.

Jecori itaque. ℞. Succu cich. depur. lib. f. Succu portul. unc. iv. Succu lim. unc. ij. Succu absinth. acet. ros. unc. j. specier. trium santal. drachm. ij. m. pro epith. jecoris.

Cordis; ℞. Aquam mellis, buglossi, an. lib. f. Aqu. è floribus cit. totius citri, rosar. an. unc. ij. Succu lim. unc. ij. acet. ros. unc. j. Camphoræ gr. v. spec. cord. temp. drach. ij. m. pro epith. cordis.

Superest tandem symptomatibus, necnon morbis supervenientibus occurrere, quæ solent esse Coma vigil, Coma somnolentum, Phrenitis, Lethargus, Parotides & alii abscessus, de quibus suo loco, à Medicinæ roseis oribus agitur.

Visus ratio sit refrigerans & humectans. Potus, sit tinctura rosarum, extracta cum succo lim. in aqua acetosæ parata, sed longa & valde diluta, vel aqua hordeacea, vel aqua secunda Saxon. aquæ acetosæ mista. Quæ pro præsentis curatione satis, Idem ibidem.

Febris Tritaphyes.

Juvenis Nob. calidioris hepatis, mediocris habitus, delicate vivens, ventri, gulæ, otio & Veneri indulgens; dum tota ætate præfenti, vina generosa, nive refrigerata potavit, & fructus pariter eadem refrigeratos uberrimè comedit; tandem, modo ætate cadente, in febrem incidit; quæ cum horripilationibus invasit inæqualibus, atque ingenti & acri calore succrevit, necnon siti & amaritudine oris; sequenti die declinavit quidem, at nunquam intermisit. Tertia verò die rediit; at cum minori horrore, & postponens, cum eodem calore iisdemque symptomatibus jam dictis. Medicus domesticus accersitus, præmissio leniente, sanguinem ex jecoraria mitti iussit; alterantia præscripsit, quibus adhibitis, post septimam febris ipsa remisit, verum modò, decima quarta, eodem typo perseverat, sed inordinato, plurimum tamen circa vespèram. Et licet non adeo intensa, magis tamen extensa est, non enim gaudet remissione febris, & symptomatum, quæ remissa vehementer sit proportionata; conqueritur enim de capitis gravitate, somno profundo, sed turbato. Pulsus non adeo frequentes, ut antea, urina non adeo colorata, sed crassiores observantur; alvi excrementa, non amplius flava & tenuia, sed remissi coloris, viscida atque mucosa; febrisque eadem tertianarium servat typum, Quare de agendis pro salute consulit.

Febrèm Nob. Juvenem affligentem, de genere biliosarum esse, & in specie, tertianam, significat nobis typus tertianarius; sicut eandem confirmant res naturales, ætas nimirum, atque calidior jecoris intemperies; necnon res præter naturam, nempe calor acris & mordax, sitis non exigua, oris amaritudo & excrementa, ab initio biliosa. Hanc verò acutam statim fuisse censeamus, quia continua, calor acris & ingens, sitis non levis; ex quibus conjectare licebat, futurum cum brevitate aliquod periculum, quæ sunt acuti morbi conditiones. Verùm, acutam adhucnum, saltem ex decidentia, perseverare putamus; accessit enim capitis gravitas, ad somnum nimia propensio, cum somnis turbatis atque confusis, quæ symptomata prava & consideratione digna sunt habenda.

Verum, quia hujusmodi, & alia, in tertiana notha contingunt, bile nimirum tenuiori resoluta & evacuata, crassiori verò remanente, pituitæ commista, idèò forsitan tertiana notha appellari poterit; vel si symptomata perseverantia, & accedentia, prava censeantur, facile tertiana continua nuncupanda fuerit.

At si propriè de hac febre loqui velimus, neutra tertiana verè est; sed tertianæ naturam referetis, Tritaphyes ab Hippocr. & Galen. dicta; de qua dicebat Gal. Quæ tertio quoque die invalescunt, ego quidem nominare consuevi Tritaphyes, hoc est tertianarum naturam referentes; quæ ad declinationem quidem, sed non ad infebrecitationem terminantur. Hæc Gal. Subdamus nos. Si hæc febris, tertianæ naturam refert, ergo tertiana non est. De hujusmodi autem febribus ita loquutus fuit Hippocr. Continuae febres grassabantur, quæ invadebant omnes morte febris naturam tertianæ referentis; & uno die aliquantum remittebantur, altero ingravesc-

cebant. Mox subdit. Rigores autem omnes inordinati & errantes erant, & paucissimi in his, in aliis verò febribus, majores; diebus verò decretoriis deteriores nebant.

Facta fuit febris hæc ab humores bilioso, à jecore calidiori, ex vini meracioris consueto potu & fructuum usu, genito; necnon à pituitoso, dum a nivis abusu, otio, & potissimum à nimia venere, labelactato ventriculi calore innato, quotidianæ cruditates jugiter productæ fuere. Ex quibus omnibus, in vena hepatis, & infra, putrescentibus, febris cum horripilationibus invalit, commotis nonnihil per partes lentientes humoribus ipsis, inæqualiter tamen & inordinate, ob viscida atque tenacis humoris præsentiam, à quo tandem, saltem quoad molem, prædominante, & diathesin quandam pravam atque narcoticam continente, crassi & narcotici vapores in caput elevati, qua ratione gravitatem, in somnum delationem, & biliosis vaporibus mistis, somnos confusos induxerint, unicuique notum esse potest.

Modum verò remissionis istius febris, & ejusdem durationis, præclare recenset ipse Gal. dicens. Generantur Tritaphyes, non ex succo uno, sed pluribus, quorum calidior febrem acutam succendit, statimque discutitur; quæ dum corpus tenet, contingit frigidioribus corrumpi ac putrescere, itaque, iterum accendi ex illa remissione, quod est, veluti requie & immutatione febris, atque ita febris deterior evadit priore, videlicet, quod vires à prioribus molestiis defatigatas ostendat. Hæc Gal. Et in hoc statu modo sumus, unde non adeo tuta salus videtur; atque ideo, violentissimæ, longissimæ atque laboriosissimæ ab Hippocr. dicebantur, licet lenes ab initio viderentur hujusmodi febres. Nihilominus, Patientis viribus, cum Medici quoque accedat peritia, febrem hanc expugnari posse sperandum; eoque magis cum opportuna hucusque, à Viro excellentissimo Medica auxilia adhibita fuerint.

Instituendum itaque in humorum evacuatione, præparatione, eorundem à capite revulsionem, caloris febrilis remissione, aliqua cordialium alexipharmacorum exhibitione, & virium conservatione.

Pro quibus adimplendis, à fonte Chirurgico nova sanguinis missio depromenda erit; eaque ex venis fedalibus, ad revulsionem vaporum & humorum caput petentium; quo satis non obstante auxilio, si caput magis adhuc repleatur, ita ut sopor adaugeatur, phlegmigi duo coxis apponendi erunt, & quotidianæ inferne frictiones; atque calentes pedum lotiones administrandæ. Clysteres acriores, tum à capite revelendi, tum præparatorum humorum portionem per epicrasin evacuandi vim obtinebunt, parati ex decoct. malv. mercur. betæ, parietariæ; addito melle ros. sol. vel hiera magna, vel elect. diaphæn. Neque oxyrhodina repellentia, eo casu erunt omittenda, ex oleo ros. acetoque parata.

À fonte Pharmaceutico, sunt desumenda minorantia, attenuantia, incidentia, ac detergentia, calorem febrilem, pro usu remittentia, & alexipharmaca, vim etiam narcoticam respicientia.

Minorantia erunt, in præfens, elect. lenit. cum crem. tart. & si febris ultra viginti dies ex-

tendatur, ut credibile, addi poterunt pil. de trib. cum rhaz. vel elect. diacath. Attenuans, prout hucusque fuit julap. acet. ita deinceps esse poterit oxymel simpl. & nonnunquam, duabus horis ante prandium, semiuncia pollinis crem. tart. in jure cort. cit. alterato, dissoluti. Calorem febri-lem sat contemperare poterit, decoctio in jure, cich. borrag. endiv. petroselino & agrimonia alterato, parata; dissolutis in progressu, gr. x. tart. vitriol. ut cum alteratione attenuationem quoque, & viarum refectionem obtineamus. Tandem, vapores narcoticos reprimere & infringere valet cochlear aceti squillit. in aqua agrim. Spiritus vitrioli in eadem aqua, aut in aqua totius citri, cum prima cord. Sax. Cochlear quoque aquæ theriacalis, in iisdem aquis, ad pravam in humoribus occultam qualitatem oppugnandam. In usum duci poterunt etiam confectiones hyacinth. Alchermes quoque, cum succis citri, aut lim. parata; tamen cum Magisterio fragmentorum pretiosorum.

Vicius ratio potius tenuis esse debet, & non-nihil attenuans. Sic convenit prafana cum succo citri aut lim. vitelli quinetiam ovorum in jure dissoluti, addita aceti portione. Aviculæ montanæ concedendæ. Potus sit aqua hordeacea, sive Noceriana, cum julap. acetoso; vel cum syrup. de acido citri; vel desucco lim. Hæcque pro hujusce febris cognitione & curatione, satis. *Idem ibidem.*

Lipyrria Febris.

Nobilis Juvenis, ætatem circiter 30. agens, temperamenti totius & jecoris, ad calidum & humidum vergentis, habitus carnosus, liberè vivens, & pravis alimentis potius usus, postquam noctes quasdam exiguo somno transegit, & diu negotiis domesticis, rursus sub radiis solaribus intentus; atque cum sodalibus, hoc anni tempore caniculari, convivatus, & vina meraciore, nive refrigerata copiosè bibens; tandem febre correptus, cum exiguo horrore, decubuit, cui calor intensus, cum siti molesta successit, tepidis tamen semper externis manentibus partibus, noctemque satis inquietam duxit; sequenti mane accessit Medicus. Patientem Nob. invenit adhuc valde febricitantem, cum pulsu parvo & languido, urinisque flavis atque tenuibus. Quoniam verò quandoque ephemeris febribus erat obnoxius, ideo secundam diem sine ullo Medico auxilio præterierunt. Interim, circa meridiem febris rursus exacerbari visa est; non tamen adeò evidenter increvit ut prima die, & sequenti tertia, quæ accessit anticipans, cum in-explebili siti, æstuque interno intensissimo, & partium extremarum tepore; imò, in accessio-nis progressu, cum refrigeratione, & universali tenui atque tepido sudore, ac insigni anxietate & inquietatione; adeò ut nec ullam corporis positionem locumve ferre posset ipse Patiens. Urina verò crassior & biliosior visa est. Aquæ Nocerianæ copiam in vigore præbuerat Excell. adstans; nec tamen quicquam sitis sedari videbatur. Nos itaque statim, post aquæ potionem, accessisti, ita consulimus.

Lipyrriæ febris. Nob. Patientem modo affligentis, natura adeò dubia fuit, ob Græcorum & Arabum discordiam; quinimò & ipsiusmet Gal. inconstantiam, ut nonnullos gravissimos viros,

& potissimum Fernelium, ad credendum induxerit quod proprium genus ipsa non habeat, neque sit febris per se; sed esse malignarum & ardentium differentiam; idque desumptum videretur ab Hippocrat. dicente; quod in febribus non intermittentibus, si exteriores partes frigida, interiores urantur, & sitim habeant, letinale est. Quod generatim de quacunque febre, ab eodem pronuntiatum fuisse videtur, & potissimum de malignis & ardentibus. Verum accipitur in hoc Fernelius; Lipyrria namque febris habet suam propriam essentiam, ab ardentibus distinctam; unde Galen. dicebat. Si intus & in ipsis visceribus calorem sentiant ægri, in externis vero partibus universis, frigus, tales sunt Lipyrriæ; & præterea, quoddam ardentium febrium perniciosum genus. Ergo lipyrria ab ardentibus differt; ut differt quoque, non solum Græci, sed multò magis Avic. cum Arabibus voluerunt; dum ille lipyrrias collocavit inter febres pituitosas intermittentes; voluitque, modo heri a pituita vitrea putrescente, a qua vapores eleventur crassi, nec adeo fervidi, qui possint exteriora calefacere eoque minus, si adsint frigidi humores in ambitu corporis, caloris expansionem inhibentes; modo vult fieri a bile pauciori & crassiori; cujus propterea vapores non possint ad ambitum corporis pervenire, & ita partes externas calefacere. Galen. autem, Lipyrriam febrem malignam appellare consuevit, quæ, non ob viscerum inflammationem internam, sed ob humorum, à quibus pendet, malignitatem, ita dici meretur; idque duplici ratione, vel primo, ob putrescentes humores prava & maligna qualitate præditos, ut sunt bilis prafina & æruginosa; qui cum à calore nativo vix concoqui possint, natura omnibus viribus totoque conatu contendit ad eos, non modo concoquendos, sed multo magis expellendos, sicque spiritus, & humores, & calorem, hoc fine, ad interiora revocat, & exteriora frigida relinquit. Vel secundo, ob eorundem humorum veneficam qualitatem; cum enim veneni proprium sit officere cordi, ideo natura, ut partem nobilissimam tueatur, ipsique auxilium afferat, unde quaque spiritus & sanguinem, ad cor, ut ad partem nobiliorem transmittit, sicque per accidens interiora urantur, & exteriora frigescent. Quoniam verò ab intenso calore liquantur humores; ideo sudores tenues & calidi erumpunt; diaphoretici tamen, non autem syncoptici, ex liquatione scil. solidarium partium; tunc enim & crassi & frigidi fuissent. Utramque verò causam, in præsentem lipyrria constituenda, locum habere credibile est; cum Patiens liberam vitam duxerit, & ex consuetudine, pravis alimentis, potibusque meracioribus fuerit usus, bilis peccantis pravae conditionis, in venis magnis putrescentis indicio; & ideo urinæ valde flavæ, valdeque tenues, & insignis præcordiorum æstus, cum molestissima sit observantur; ac tertia quaque die, simul cum febre, omnia magis exacerbantur; adeò ut licet verè ardens febris non sit, ardentis tamen naturam sapiat atque referat.

Veneficæ verò qualitatis indicium præbent pulsus, statim ab initio parvi atque languidi; verum atque præcipuum malignæ & veneficæ qualitatis signum; sic angor, inquietatio, & difficilis unius situs tolerantia permanens, auræ

Febriſ Typhodes.

Nob. Adoleſcens, temperamenti totius & Jecoris calidi & ſicci, gracilis habitus, abſtemius, & valdè edax, poſt valida exercitia, ſolatii gratia, remigando peracta, hoc anni tempore caniculari, circa meridiem, præcipitavit in febrem, terriſtico modo illico invadentem; quandoquidem pulſus proſus inæqualis & ſyncopizans obſervatus fuit, atque deſiciens, cum aphonia & in ſoporem inclinatione; ingruente ipſa febre, levïs horripilatio, ac non in ambitu corporis, verùm in abdomine, circa viſcera naturalia, ab ipſo Patiente percepta fuit; cui calor ingens ſucceſſit, cum ſiti moleſta, totius corporis ariditate atque ſqualore. Febriſ tota ſequenti die perſeveravit, cum exigua declinatione, & nocte vigili; tertia verò die ruriſ eodem modo iſdemque ſymptomatibus exacerbata eſt; quinimo in augmento & ſtatu deliravit Patiens. Urinæ interim valde flavæ & pellucidæ apparuerunt. Secunda die leniens medicamentum præbuit Medicus aſſiſtens. Modo in tertia, de agendis, pro ſalute conſulitur.

De bilioſarum genere febrem eſſe, quæ Nob. Adoleſcentem aſſigit, unicuique, vel mediocriter in arte verſato, facile patere poteſt, conſiderata tertianaria exacerbationum periodo, ingenti & acri calore, ſiti moleſta, vigiliis, urinæ valde flavis atque pellucidis; & præterea rebus naturalibus, ætate nimirum adoleſcentiæ, temperamento totius calido & ſecco, & anni tempore Caniculari: necnon rebus nonnaturalibus, violentis ſcilicet exercitiis prægreſſis omnibus bilioſi humoris præſentiam, & febrem ipſam bilioſam ſimul atteſtanteſ. Verùm adeò facile patet ſpecies ejuſdem; licet enim cum Ardente, Tertiana continua, & Tritæophye non exiguam ſimilitudinem habere videatur, ab his omnibuſ tamen, rectè conſideranti, diverſa apparebit; calorem enim adeò exurentem, nec ſitim adeò inextinguiſibilem, ut ardens inducit. Hæc cum horripilationibuſ exacerbatur; quæ conditio mineram, ſive focum putredinis, à continua febre diverſum ſignificat; hæcque acuta potius, quoniam ſæva ſymptomata ſtatim ab initio ſecum ducit. Tertiana verò continua, ſtatim ab initio acuta eſt, potius ratione cauſæ, & loci affecti, quam ſymptomatum. Tritæophyes tandem, lenes à principio eſſe ſolent; in progreſſu verò violentiſſimæ, longiſſimæ atque laborioſiſſimæ evadunt. Typhodem igitur & ſiccam, non humidam hanc appellabimus febrem; quam inter acutas & Ardentes reſenſit ipſe Galen. iſdem tamen paulo longiorem; inter quas mediæ ſunt ſemitertiana. Ratio autem jam dictorum eſt; quoniam in Ardente peccat pura bilis flava, in majoribuſ venis; in ſemitertiæ, putreſcit flava bilis extra venas, & intra venas pituita; in hac verò Typhode febre, bilis, non modo flava, verùm & crocea, craſſæ pituitæ miſta, in ramis venæ portæ, cava ſcil. jecoris parte; à quorum humorum putredine adeò exandefcit Jecur ipſum. ut inde, ab eodem, varia ac ſæva ſymptomata procedant, etenim, præter ingentem calorem per venas cordi communicatum, ingens quoque evadit calor ipſe febrilis, ſitis moleſtiſſima aſſigit, & vigiliæ, quinimò æcenſis atque

turbatiſ ſpiritibus animalibuſ, excaleſcuntque cerebro, etiam paraphrenitides excitantur. Et quoniam non minus craſſi quam calidi vapores, à putredinali minera ad Cor & cerebrum elevantur, arterias leves & nervos quodam modo obſtruentes, caputque gravantes, hinc pulſus valde inæquales atque ſyncopizantes, in exacerbationis principio & augmento, necnon ſopores & aphoniæ obſervantur.

Ad humorum autem jam dictorum generationem, quam maxime concurrere poterunt ætas, temperamentum totius & jecoris calidum & ſiccum, habitus gracilitas & lenis reſolutio, anni tempus æſtivum, & inmodica atque violenta exercitia; ſicut ad pituitæ generationem, potus aquarum & ciborum voracitas; à quibuſ omnibuſ jam dicti humores originem non ſolum, ſed & augmentum, naturæ limites excedens, habuerunt; qui in jecoris cava parte coacti, & mediis ſibi obſtructionibuſ putreſcunt, ac in acceſſionis principio ad partes abdominiſ ſentientes deſtruſi, horripilationem excitare valent, quæ ab ipſo quoque Patiente in abdomine percipitur, non autem rigorem; quia pituitæ tenacitas impedit, quominus bilis conſertim & concitate, per partes ſentientes moveri poſſit. Cauſa verò adeò intenſi caloris, eſt ipſius materiæ peccantiſ craſſities; ignis enim in denſioribuſ corporibuſ, majorem activitatem obtinet.

Acuta cum ſit febrilis hæc, periculosa quoque cenſenda, huic enim ſæpè ſuccedere ſolet hepatis inflammatio, tuncque lethaliſ evadit. Quare accuratiſſimè tractanda eſt, & quam citiſſimè auxilia medica adhibenda ſunt, nec obſtens pulſus ſyncopizantes, & languorem oſtendentes; utpotè qui virium oppreſſionem potius quam reſolutionem ſignificent.

Quare, humorum evacuatio eſt procuranda, calor intenſus remittendus, ſymptomatibuſ occurrendum, jecoriſ inflammatio inhibenda, & vires conſervandæ.

Pro quibuſ explendis intentionibuſ, aliqua ſanguiniſ miſſio neceſſaria videtur, ad febrilem calorem contemperandum, & jecoriſ inflammationem arcendam, Et licet anni tempus ſit Caniculare, & corpus gracile, cum quodam ſqualore, prægreſſæque ſint immodica exercitia; vires attamen conſtant, unde jam dicta omnia, non miſſionem ſanguiniſ, ſed quantitatem educationis prohibere ſolum valent. Aperiatur itaque ſalvatella dextera, & ſanguis ad uncias ſex educatur. Ad revellendos autem vapores, cor & caput infeſtantes, opportuniſſimi erunt duo phænigmi, coxis appoſiti. In acceſſionis verò principio atque augmento, repellens oxÿrhodinum ſuturæ coronaliſ ad moveri poterit, ex ol. roſaceo & aceto paratum. Sic & hepati epithema refrigerans, ex ſucco cich. depur. ſucco lim. & aceto roſato compoſitum.

Reliqua auxilia à fonte Pharmaceutico petenda, Et primo quidem, evacuatio ruriſ tentanda, ſlore caſſiæ & tartaro, aquam hordaceam ſuperbibendo. Præparantia eſſe poterunt, julap. acet. & tart. cremor, adeo ut julap. ad unc. iii. præbeat, ſemel, aut bis, cum alterantibuſ, cremor verò tart. ad drach. v. vel drach. vi. duabuſ vel tribuſ horis ante cibum,

in iure, vel aqua totius citri dissolutus, vim enim habet julapium incidendi, cremor vero tartari magis attenuandi, & viscidos humores liquandi. Sit autem primum alterans, aqua hordacea ad lib. ii. & lisopor, aphonis & pulvis syncopizantes cedant, serum quoque depuratum propinari poterit, vel saltem detulatum. Secundum vero alterans, sit decoctio ex cichoraceis parum ebullitis, in lacteo colligatis & expressis parata.

Interim per epiciasin preparatorum humorum evacuatio erit repetenda, modo clysteribus ex decoctione conium, cum mele ros. solut. paratis, modo ex flore cassiæ, cum crem. tart. & semi drach. pul. de tribus. bolis paratis, super præbendo semper potionem, quæ refrigerandi, exsiccationem prohibendi & abluendi vim habeat, & potest esse serum depur. aqua hordacea jus, vel malva alteratum.

Ut autem vires cordis foveantur, parum ante cibum, aqua scorzonæ, totius citri, cord. Sax. cum julapio gemm. offerri poterit.

Victus interim sit potius tenuis, non valde tamen, habitus ætatis, anni temporis, consuetudinis, temperamentis & habitus corporis ratione, imò, quoniam febris hæc protrahi solet, ratio victus mediocrius tutior erit, & pro potu aqua hord. cum saccharo, aut julap. acetoso præbeatur. Hæcque pro præsentis febris curatione, dicta satis. *Idem ibidem.*

Hemitritæus.

Juvenis Nobiliss. 30. annum agens, temperamenti totius & jecoris, calidi & sicci, ventriculi vero frigidi, deliciis affluens. Veris præteriti, pluviosi & australis occasione, cum domi fere semper se contineret, sicque ocio, simulque crapulis, superingestionibus & computationibus indulgens, nec veneri parcens, modo, hoc anni tempore ætivo, frequenter spirantibus austris, quibus libenter se ipsum exposuit, tandem non sine aliqua hypochondriorum tensione, quatuor abhinc diebus, correptus fuit febre, quæ incepit cum horrore, ad statum usque inæqualiter perseverante, adeo ut modo in summo esse, modo retardari visus sit. Calor in statu statim multus, acris & mordax observatur, cum tamen, paulo post, fumosus, humidus & vaporosus percipitur, tardè ad statum perveniebat, eundemque percurrebat, cum siti satis molesta, unde tarda quoque in diem sequentem declinatio. Sicuti vero incepit cum ventriculi angore, & biliosis atque pituitosis materiæ vomitu, in declinatione terminari visa est cum mediocri sudore, licet ad infestationem non devenerit. Pulsus non adeo magni, celeris & frequentes, ut in tertiana, sed neque debiles, parvi ac tardi, ut in quotidiana. Urinæ subflavæ, & non adeo tenues. Adventante vero nocte, nova observata fuit febrilis accessio, cum extremarum partium perfrigeratione potius quam horrore, calor vero succrevit humidus & halituosus, neque acris aut mordax, nisi diuturno tactu, percipiebatur, semper tamen inæqualis usque ad statum, ad quem tardius quam in præcedenti accessione pervenire potuit, cum minori siti, verum cum inclinatione ad somnum. Pulsus observati fuerunt tardi, parvi, debiles ac inæquales. Urinæ subflavæ & moderatè crassæ, ac tandem decli-

nato, sequenti die, cum exiguo calore usque ad vespertinam, quo tempore nova apparuit accessio, a prima nunquam abstinens, imò ejusdem tenoris usque in quartam diem, in qua, propè noviciam, quarta fuit observata accessio, secunda omnino similis. Cum autem febris hæc patientem Nob. agnoscere torqueat, ac ejusdem vires atterat, modo in quinta, de agendis, pro salute consulit.

Equidem febris hæc ex illis est quæ, utporè scita ex plurium febrium combinatione, cognitionem difficilem habet, adeo ut non modo primam, sed secundam, tertiam, & omnino quartam diem requirat ad sui cognitionem, cujus difficultatis exemplum adaucebat Gal. semitertianam, in illo Adolescentente, qualis est hæc Juvenem Nob. affligens, Latine, Semitertiana, Græcis vero Hemitritæos appellata. His quippe Hemi, dimidium, Tritæos vero, tertianam significat, quasi esset febre tertiana minor, sicut seminalium minus malum significat, cum tamen diverso, imò contrario modo se habeat, & ideo hunc impropriè loquendi modum Hippocr. ab antiquioribus deinere noluit, sed de hac loquutus, dicebat. In febre, quam semitertianam vocant. Placuit autem ipsi potius horridicam nominare. A Gal. tamen, nomen hoc semitertianæ, sive Hemitritæi, usurpatum fuit, etenim, cum ejus natura confusa, ex quotidiana & tertiana intermittente constituitur, dimidiam partem ex utraque retinens, ab evidentiori tamen, efficaciori & activiori nomen sumpsit humore, prout enim à Deo, non ab homine, semideus: ita febris hæc, à tertiana potius quam à quotidiana denominari debuit.

Quatuor autem modis complicari potest Tertiana cum Quotidiana. Primo, tertiana intermittens cum intermittente quotidiana. Secundo tertiana continua cum continua quotidiana. Tertio, continua tertiana cum intermittente quotidiana. Ultimo, intermittens tertiana cum continua quotidiana. Et hoc ultimo tantum modo sit verus atque legitimus hemitritæus, aliis enim tribus modis deficerent conditiones ad hemitritæum necessariæ, ut infra considerabimus, & ideo nonnisi impropriè & abusive hemitritæus dici poterit. Quare rejicienda Sennerii & Zacuti opinio, qui existimarunt quod ad hemitritæum constituendum, sufficiat alteram harum quamlibet continuam esse, alteram vero intermittentem; liquido namque patet, quod si tertiana fuerit continua, decrit horror, nec amplius, cum Hippocr. horridica dici poterit. Nec ullo modo admittendus Spigelius, qui Semitertianas semper ab aliqua interna inflammatione proficisci crediderit, nec viderit quod diebus paribus, quibus sola quotidiana succenditur, remitti non posset, quinimò acutissima æqualiter semper esset.

Componitur igitur legitimus ac exquisitus hic hemitritæus, ex Tertiana intermittente & Quotidiana continua, ab humore bilioso extra venas, & à pituitoso æqualiter in venis putrescentibus; tanta enim debet esse pituitæ, quæ bilis rigorem compescat, quanta vis ipsius bilis, quæ rigorem remissum, horrorem scilicet excitare valeat, inæqualem ad statum usque; dum enim utriusque humoris vires æquales, diuturno tempore pugnant, modo unus vincit, modo alter,

alter, & ita inæqualis quoque horror ipse observatur.

Neque hoc sufficit ad legitimi & exquisiti hæmitritæ constitutionem, verum necesse est ut tertio quoque die simul moveantur bilis & pituita, uno & eodem tempore, atque Tertiana pariter cum quotidiana coeat & confundatur, unde confusa a Gal. dicebantur, sicut si diverso tempore, complicata forent, nec legitimus esset, nec exquisitus hæmitritæus. Et licet, ex hac bilis & pituitæ commixtione, heri possit etiam tertiana notha, erit tamen unica febris, unica humoris forma, ac in unico loco putrescens: in hæmitritæo vero duo humores, forma distincti duas excitant febres, uno eodemque tempore invadentes.

Sed hic instat Cardanus, at non solvit. Si in hac febre alter humor reperitur in venis, alter vero extra venas, quomodo simul putrescunt, simulque ununtur? Et si respondeatur, satis esse quod simul moveantur & putrescant, licet simul non uniantur, rursus urget instanti. Si non uniantur, quomodo pituita in venis putrescens, poterit bilem extra venas putrescentem cohibere ne rigorem, sed potius horrorem excitet? Cui quæsitio frustra conatur satisfacere Amatus, dicens, horum humorum fuligines misceri, calidas & humidas, nec vidit fungues omnes adustam obtinere naturam, neque ideo affectum jam dictum producere posse. Quare dicamus, quod dum tempore accessus pelitur bilis ab intra ad extra venas, secum ducit portionem aliquam pituitæ putridæ, quæ potest bilis activitatem adeo femittere, ut p. rigore horror exci-
tetur, lex quæ sit etiam ut ipsa, tertiana producat, quod non contingeret, nisi aliqua adisset mixtio, sive pituitæ superadditio, cessante autem tertiana, quoniam minora vera pituita in venis stabulatur, ideo perseverat ipsa quotidiana, & continua persistit.

Tensiones vero hypochondriorum à flatibus, & aliquibus quoque obstruccionibus, provenire possunt, quæ prout etiam sine febre observantur sæpe ita ab his foveri quidem, at omnino pendere febrem non est asserendum.

Licet autem febris hujus semitertianæ, legitimæ & exquisitæ cognitio apud omnes difficilis sit, facilis tamen nobis redditur, considerantibus quatuor conditiones ejusdem, ab Hipp. traditas, nempe, quod sit horrida, continua, acuta & periculosa: & quod altera die gravior, altera levior sit.

Primo horrida, non quod solum cum horrore incipit, sed quia perseverat inæqualiter horror, vel tota accessione, vel saltem usque ad statum. Ex quo elicitur componi ex tertiana intermittente & quotidiana continua.

Secunda conditio, quod sit continua, & ideo ex duabus intermittentibus componi non potest. Et licet dari semitertianam intermittentem asseruerit ipse Gal. loquutus tamen non fuit de vera atque legitima semitertiana, qualis est hæc præsens, & ab Hipp. descripta.

Tertia conditio, quod sit acuta, immo & lethalis. Nec obstat, quod Tabidis fiant semitertianæ, & ideo non acutæ, sed longæ esse possint, nam licet tabes sint morbi diurni, non implicat quod iidem morbi acuti supervenire possint, ut semitertianæ febres.

Quarta conditio, quod altera die gravior, altera levior nat, gravior quidem ea die quæ duæ simul ununtur accessiones, tertiana scilicet & quotidiana, levior vero quæ sola quotidiana invadit; ut enim sit legitima & exquisita semitertiana, ambæ accessiones in unum & idem tempus coincidere debent, ut horror inæqualis diu perseveret, unde horrida dici possit, & ideo confusa quoque dicebatur: quod si diverso tempore hant accessiones, non erit amplius exquisita, sed spuria semitertiana dicenda.

Quibus jam dictis, rerum naturalium & non-naturalium consideratio erit addenda a nobis in casu nostro, quæ æqualiter concurrunt ab bilis & pituitæ generationem. dum ex una parte ætas est juvenilis, temperamentum totius & jecoris calidum & siccum, anni tempus æstivum; ex altera vero, temperamentum ventriculi frigidum, Ver pluviosum, Aëtas australis, prægreulium ocium, Venus, comestiones, com-potationes & crapula, ob quam causarum diversitatem Romæ incolis semitertianæ familiarissimæ sunt, ubi Regio calida, & constitutiones humida observantur, pariter, & quidem magis in Aethiopia, ubi aer calidior est, constitutiones vero humidissimæ vagari solent. Et tandem urinæ, pulvis, cæteraque syn. promata, bilis & pituitæ præsentiam æqualiter nobis confirmant.

Febrem hanc lethalem appellavit Hipp. periculosiorem vero Gal. miratus quod omnium deterrima sit, ideoque vix super. bilis, quinque de causis: Primo quia est composita ex causis specie diversis, ægre superabilibus. Secundo quia ipsi sæpe inflammatio aliqua interna supervenire solet. Tertio quia alia symptomata sæva ei non raro succedunt. Quarto, quia frequenter epidemicam malignitatem in se continet, quomobrem, hanc, feram Gal. & Serenus mortiferam appellabant. Quinto, quando diuturnis aliis morbis succedit.

Noltra tamen, cum statim ab initio invaserit, non adeo periculosa erit ac si aliis morbis diuturnis supervenisset, tunc enim lethalis omnino est, longitudo tamen timenda, cum nonnunquam ultra semestrem extendatur.

Quare, magna industria atque diligentia curanda, cum enim bilis & pituita in unum coeant, dum adversus bilem refrigerantia adhibemus, pituita pertinacior redditur & augetur dum vero calefacientibus contra pituitam pugnare intendimus, bilis fervidior fit & copiosior, sicque, dum adversus neutram causarum vires Medicas integras adhibere possumus, fit ut febris diuturnior evadat, & ab humore vincente prava symptomata superveniant, sicque ægri vita periclitetur. Et ideo duo illa communia axiomata, in hac potissimum febre, sunt observanda, urgentiori scil. incumbendum, altero non neglecto, utque prodesse festinemus, ita non noceamus.

Et licet medela hujus febris eliciatur ex curatione tertianæ & quotidianæ, in his tamen componendis plures sunt necessariæ cautiones, quas omnes suo loco attingemus, dum indicationibus satisfaciemus. Sunt autem primò utrumque humorem præparare & evacuare. Secundo, vias referare. Tertio, calorem febrilem contemperare. Quarto, symptomatibus occurrere. Ultimo, æstas partes roborare.

Et primò, si de sanguinis missione loquamur, nulla hujus apud Græcos, nec apud Arabas, mentio fit, conceditur tamen à Celso inter initia, si corpus plethoricum fuerit, ne servidior tota massa sanguinea reddatur, sicque putredo augeatur. Parce tamen educatur, quia humores peccantes in venis, pituitosi sunt, extra venas vero, biliosi, parcissime autem in Patiente nostro, ex jecoraria dextera, quod si ætas declinans esset, venæ fedales aperirentur.

A fonte Pharmaceutico desumenda Lenientia, Præparantia, Purgantia, Contemperantia, Aperientia, Symptomatibus occurrentia, Viscera roborantia, & tandem à proprietate Juvantia.

Lenientia erunt, vel assumpta, vel injecta. Assumpta, vel dejectoria, vel vomitoria. Vomitorium itaque primo præscribitur leve, ex jure seminibus cit. alterato, & julap. acet. Et mox clyster injicitur, ex decoct. malv. mercurialis, betæ, hordei, syr. ros. sol. ol. chamæmel. sale & ovi vitello. Medicamentum per os sit, syr. ros. sol. & mel. ros. sol. cum aqua flor. cit. Vel caust. & lenit. cum tart.

Secundò, præparatio est procuranda, ut inde frequens, & per epicrasin sequatur humorum minoratio, eoque ordine, ut prius præparetur & minoretur bilis, mox pituita, vicissim tamen & alternatim, ut tantundem bilis quantum pituitæ, utpote æqualiter peccantes, præparentur & evacuentur. Verùm, quod potissimum est, non sunt miscenda simul, uno eodemque tempore, præparantia & purgantia bilem atque pituitam, ac si illi essent humores, ut in tertiana notha fieri solet, utque decepti multi faciunt; sunt enim hi diversi atque contrarii, duobus in locis putrescentes, quibus uno eodemque medicamento, ex calefacientibus & refrigerantibus composito, utrumque præstare minimè possemus.

In nostro tamen casu, julap. acet. utrumque humorem respicere poterit, ut quod bilem in pituitam, & pituitam in bilem vertat, narrat etiam Rhasi, se paucis diebus semitertianam malignam curasse & sanasse, prisana. julap. acet. & vomitu. Bis igitur de die exhibeatur, ad unc. iij. manè duabus horis ante prandium, & noctu in statu febris, cum jure pullæ, alterato cich. borrag. endivia, acetosa, pentaphyllo, quibus absinthium addit Avic. ad statum properante febre. Quod si julapium respuat Pateriens, substituitur trem. tart. ad drach. iij. bilem enim compescit, & pituitam attenuat, fundit atque detergit, & urgente calore, cum Avic. acida tenuium partium sunt usurpanda, ut syrup. de acido cit. de succo lim.

Alterantia, sive febrilem calorem contemperantia, varia esse possunt, pro caloris majoris vel minoris indigentia, refrigerandum enim quantum sufficit. Quare in Patiente nostro, cum calor febrilis multum excedat, sitque tempus æstivum, aquam hordei propinare possumus, vel mulsam dilutam acetosam, vel aqua hordei paratam, qua uti solebat Hippocr. in curatione ardentis spuræ, etenim calorem febrilem contemperat, & materiam pituitosam attenuat.

Quod si fortè aliquæ latitarent, in cavo viscerum, obstructions, egregium remedium aperiens & alterans fuerit, succus cichor. depur. ad unc. iij. in jure præscripto propinandus, cui addi quoque poterunt grana tart. vitriol. si manifesta

obstructions adessent, sicuti gutt. spiritus tart. purius rectificati, si ad urinæ vias tendat ipsa natura.

Apparentibus signis coctionis, observandum in hac febre curanda, cujus humoris in urinis appareat coctio, licet bilis prius apparere soleat, tuncque leviora purgantia lenientibus commiscenda, ut rhab. vel pil. de tribus cum rhab. & cassia, vel pro pituita, agaricus, sive potius aliqua portio pil. de hiera cum agarico, vel de agarico Mesues, cum cassia, aut elect. lenit.

Symptomatibus interim occurrendum, solent esse inflammationes, internæ, vel externæ, quibus, cæteris omnibus posthabitis, est incumbendum. Et si internæ, revellentia, repellentia & alterantia conveniunt, & ideo sanguinis missione, subtypicorum appositione, & internis refrigerantibus opus erit. Si vero externæ ex humorum metastasi, aut ex crisi, per decubitus à natura procurata, sive materia, ex continuato decubitu diuturno, ad partem aliquam attracta, hæc quam maxime à Medico erit observanda, à diversionibus abstinendo, cum sanguinis missione, tum medicamentis, præcipue purgantibus, procuratis, sed levioribus præparantibus, alterantibus, & clysteribus insilendo. Interim Chirurgus partis recipientis cura incumbit, ne inflammatio in gangrenam migret, nativo totius & partis calore, in febre diuturna, imbecilli reddito.

Viscera facillè roborantur. Ventriculus quidem, conserva menthæ, vel sale ejusdem. Jecur, conserva absinthii, vel sale ejusdem, & sic Diarrhæod. Abb. Extrinsecus, illitionibus, fomentis, epithematibus, quæ Viris Excellentiss. hic non sunt præscribenda.

A proprietate juvantia in diuturnis adhiberi solent. Sic apud Variguanam, valet decoctum lissymbrii. Apud alios, decoctum centaurei minoris. A Chymicis, sal ejusdem in eadem aqua. Smaragdum proponunt collo appensum.

Victus ratio non adeo facilis est, unde dicebat Celsus, quod sub errore perperam cibati ægri, facillè moriuntur, & ideo subdit, quod talis esse debet ut non incitet febrem, sed longum ejus spatium sustineat. Sic die alterius paroxysmi copiosior cibus exhibendus, sequenti vero parcior, memores quod error major committitur in tenuiori, quam in paulo pleniori victu. Alimenta sint boni succi facilisque coctionis. Vinum in duobus casibus conceditur, primò, viribus deficientibus, secundò, apparentibus signis coctionis, paucum, tenue & oligophorum, hæcque satis, curando huic legitimo hemitriæo. *Idem ibidem.*

Quotidiana.

Puella Nob. 10. annum agens, temperamenti, secundum totum & jecur, ad calidum remissum, sed valdè humidum vergentis, obesi habitus, albidantis coloris, vitam sedentariam, acu pingendo ducens, & fructibus, autumnio proxime præterito, copiosioribus usa, ac intempestivè cibis, superingestioni scilicet assueta, hoc anni tempore hyemali, septem abhinc diebus, febricitare coepit circa vespem, & quidem, hucusque eadem hora, eodemque modo quotidie, quæ febris, ut Medicus domesticus observavit, incipit cum extremorum perfrigeratione, pro-

sequitur

sequitur cum calore fumoso, valdè humido, & magis vaporoso quam acris, tamen tactu diuturno percipitur mordax, semperque inæqualis. Pulsus parvus, debilis & inæqualis. Urina alba & tenuis primis diebus, nunc verò subpallida & obscura incipit apparere. Et sicut calor, neque in vigore adeo vehemens est; ita neque sitis valde molesta, ructus nonnunquam acidus edit, & capitis percipitur gravitatem, cum delatione ad somnum, quinimo somnolenta est, ejusque facies pallida, & quod immo sublivida apparere incipit. Protrahitur autem quolibet accessio ad 18. horas, & cum madore terminatur. Modo & ego sum accersitus, ut simul de agendis pro salute consulamus.

Febris hæc, quæ quotidie Puellam Nob. septem abhinc diebus, invadit, ideo vere quotidiana est, quoniam quotidie, eadem hora, eodem ordine, eademque proportionem accedit: etenim dicebat Gal. quod circuitus 24. horarum, dicuntur quidem quotidiani. Alibi verò subdit, dummodo eodem modo hant. Rationem autem reddit, dicens, dantur enim plures alie febres, quotidie invadentes, quæ quotidianæ non sunt, dum tertianariam, aut quartanariam servantes proportionem atque correspondentiam i duplices tertianæ, aut triplices quartanæ sunt, nuncupantur. Est autem quotidiana, non solum exquisita, sed & exacte exquisita, quæ à Grecis Amphemerina appellatur, quia dici & noctis particeps, ut expressit Aet. sicuti, si continua esset, Catamerina proprius diceretur, quam rarissime dari credidit Fern. sicut falso nunquam Platerus. Talem hanc designant omnia signa, nullo deficiente, a rebus naturalibus, nonnaturalibus & præter naturam desumpta.

Et primo quidem, inter res præter naturam, consideretur modus invasionis, dum incipit cum extremorum perfrigeratione, non cum rigore cum enim hæc ab insipida pituita, quæ omni caret acrimonia, rigorem non inter, sicut acida & salsa, a quibus quotidiana quidem, sed non legitima provenit.

Secundo, calor tumosus & valdè humidus tactu percipitur, magis quidem vaporosus quam acris, ob humiditatem a minera effusantem, & inæqualis, est enim veluti ignis a multa humiditate suffocatus, qui eandem superare tentat, secuta vero victoria, mordax & æqualis magis evadit.

Tertio, pulsus debilis, parvus & inæqualis, tum quia ob excessum pituitæ virtus opprimitur & velut suffocata jacet, tum quia, febris hæc fieri solet affecto ventriculo, quo læso facillimè trahitur in consensum cor ipsum.

Quarto, urina est alba, tenuis, propter obstructions, & præsentem frigiditatem, sicut in progressu, fieri solet crassa & rubra.

Quinto, sicut calor neque in vigore vehemens est, ita nec sitis molesta, totum enim corpus præhumidum est, liquatæ pituitæ ratione.

Sexto, ructus acidi hunc, ob imperfectam concoctionem, à pituitæ præsentia, & imbecillo ventriculo provenientes, somnolenta item sit, ob humidos vapores, caput potentes & occupantes.

Septimo, facies pallida & sublivida apparere incipit, quia patitur ventriculus, & compati-
tur hepatis.

Octavo, accessio protrahitur ad 18. horas, licet valdè paucos ad totalem integritatem pervenire asserat ipse Gal. quia pituita tenax, glutinosa atque copiosa est, & ideo exquisitam quotidianam intermittentem, semel se vididisse asserit idem Gal.

Tandem terminatur cum madore, in progressu vero, cum sudore desitura, humore attenuato atque concocto.

Quod si secundo loco, res naturales consideremus, puerilem scilicet ætatem, ob ingluviem ciborum huic febri obnoxiam, totius & jecoris temperamentum humidum, obesum habitum & albicantem calorem, anni tempus hyemale: omnia ad pituitæ productionem, proinde ad quotidianam exquisitam constituendam prorsus conspirasse manifestissimum sit. Quibus adduntur quoque res naturales, nimirum fructuum usus, superingestiones, & vita otiosa sive sedentaria, quæ causæ omnes pituitæ naturalis excrementitiæ copiam accumulare valuerunt, quam insipidam Avic. dulcem vero Gal. appellare solent, cujus generationis locus, ventriculus est, putredinis vero, extra venas, circa viscera naturalia. Intermittens autem est, licet non habeat sinceritatem illam, & purum intervallum, prout febres biliozæ & melancholicæ, ut observant cum Gal. quoque Tral. & Paul. & ratio est, quia materia pituitosa non modo crassa, sed summè viscida est, adeo ut non possit nisi cum maxima difficultate resolvi, & vineo agrè potest febris ad exquisitam integritatem devenire.

Febris hæc, licet intermittens, excipitur tamen ab Hippocratica sententia, quoniam habet intervallum breve, & illud quidem satis imperfectum & obscurum, unde Avic. dicebat, quod sicut raro contingit quartanam continuam esse, ita raro reperitur quotidiana intermittens. Quare asserbat Gal. quod ex intermittens, brevissima & mitissima est tertiana, longior, & de se, sine periculo, quotidiana, eoque periculosior quia legitima est, quæ ut solvatur, multum pituitæ externi oportet, & multos in toto corpore sudores erumpere, & ideo quoque longior ad 40. enim, imò 60. diem protrahi solet, interdum & ad sex menses. Habet autem principium valde longum, longam quoque declinationem, augmentum longissimum, & brevem statum. Periculosior autem, quia est diurna, ita censente Hipp. & ratio est, quia status & declinationes, diurnæ, incidunt in noctem, in qua remissio difficilior est, nam habitus corporis densatur, color putredinis ad viscera contrahitur, putrida excrementa retinentur, & ita diuturnior evadit, tum quoque accessionem, tum quoad tempus universale, & in diuturnitate periculosior.

Attamen, quia principium coctionis jam apparere incipit, cum urina ex alba tenui, subpallida & sublivida fieri incipiat, coctionis signa erunt evidentiora si nebula alba apparebit, evidentissima verò, quando nebulam rubentem videmus, cum subsidit bene colorata, & mediocris consistentiæ, ut nos docet Gal. ideo salutis spes concipienda,

Pro hac autem febre curanda, 1. materia pituitosa attenuanda. 2. eadem per varias vias evacuanda. 3. ratio caloris febrilis

habenda. 4. partes producentes roborandæ. Et 5. vires totius conservandæ. Nec audiendus Tral. dum carpit Gal. eo quod differentiam non posuerit inter attenuantia, pro pituitæ varietate, hoc enim prudenti iudicio Medici assentis commisit, præterquam quo Pro. ad Glau. 12. exquisitæ quotidianæ curationem tradidit, qualis nostra est.

Iam dictis intentionibus explendis; in Chirurgico fonte, si sanguinis missionem confideremus, omissa fuit hæc a Gal. quia neque adest indicans, neque permittens, nisi adesset plenitudo in toto, quæ in puella nostra non est, tunc enim in omnibus febribus sanguinis missionem commendat Gal. ipse, dum scilicet apparet rubor non consuetus, tumor in toto, venæ eminentes, quibus addit Avic. ruborem in urina, omnia totius plenitudinem denotantia. Fomentationes quoque circa viscera naturalia conveniunt, ad quas tamen, consilio Tral. non est festinandum corpore plano, ne fusi humores a visceribus excelsatibus attrahantur, & inflammationes, ut saltem obstructions excitentur. Toti corpori leves frictiones, universalem transpirationem ad humorum resolutionem præstare poterunt.

A pharmacia præcipua sunt desumenda remedia. Et primo quidem, ventriculus exonerandus leni vomitorio. Secundo, clystere. Tercio, lenienti medicamento. Vomitus procuratur decoct. mercurial. malv. betæ, pariet. additis melle ros. solut. oleo chamæmel. ovi vitello & sale.

Leniens erit elect. lenit. cum tart. & modico hieræ. Vel mel. ros. sol. cum manna & decoctione cordi li.

Pro præparante, primis diebus, oxymel præscribit Gal. mox urinam cientia, & interim victus rationem attenuantem & incidentem. Hæc omnia quoque Paul. Tral. & Aet. Avic. prout Gelenabini, hoc est mel rosaceum usque ad septimum diem. Præscribitur igitur ita.

℞. Oxymel. simpl. vnc. ii. mel. ros. simpl. vnc. i. aquæ cinnam. cochlear. m. pro syr. & sic pro alijs. Materia in ventriculo præparata, leni purgante educatur, in quem finem agaricum laudat Avic.

Sic. ℞. Elect. lenit. drach. vi. crem. tart. drach. ii. pil. de hiera cum agarico drach. i. m. f. bol. Vel fiat inf. agarici, cum modico rhab. in aqua melissæ & melle ros. solut. fiat portio. A quibus, si sitis infestet, propinetur mulla, ex aqua hordei parata.

Secunda validior, non tamen validissima præparatio, ita procuretur.

℞. Decoct. agrim. cichorii, capil. V. ner. borrag. absinthii, eni. sem. cit. vnc. v. oxymel. simpl. vnc. i. syr. de cortic. cit. de duabus rad. an. vnc. f. m. pro syr. & sic pro alijs.

Præparata vero materia expurgabitur ita.

℞. Electuar. lenit. diacathol. an. unc. f. pil. de hiera cum agaric. de tribus cum rhab. an. drach. f. m. f. bol.

Vel. ℞. Agaric. trochisc. drach. iii. fol. leniz mund. drach. ii. cinnam. drach. i. aq. agrim. q. f. m. f. inf. per horas xii. expressioni addendo mel. ros. sol. vnc. v. m. f. Pot.

Quibus si non cedat febris, ad validiora attenuantia, incidentia, aperientia, & inde pur-

gantia erit deveniendum. Sic Syr. Fernel. aptissimus erit, eidem addendo rhab. præbeatur autem ad vnc. ii. vino albo tenui, aut jure diuretico, decem aut duodecim diebus. Quod si id genus medicamenti rucillæ non placeat, aliud substituitur.

Ut, ℞. Pil. de tribus cum rhab. de hiera cum agaric. aggregat. an. drach. i. m. & cum syr. de quinque radicibus, ref. pil. n. xii. & aurentur, quarum quatuor præbeantur quarto quoque die: diebus vero intermedium.

℞. Troch. de eupat. de rhab. de capil. Ven. an. drach. i. m. & cum syr. bizant. q. f. f. pil. n. 12. & aurentur, quarum quatuor præbeantur, hisque superbibat jus alte:atum cich. borrag. ena. petrosel. agrim. capil. Ven. rad. gram. feniculi, apii, & in adultis, ut efficacior evadat, additur syr. quoque de cich. cum rhab. oxymel. simpl. an. unc. f. m. pro syr. diebus intermedijs, declinatione febris ostendendo. Dum omnia jam dicta sunt, vomitus in usu inducendus, ut consilium Gal. & omnes Medicinæ Principes cum eo, ab assumpto cibo, radiculis comestis, præsertim in hac Puella, quæ ad vomitum prona & facilis est, & in qua ventriculus est causæ morbilicæ minera, proderit enim educendo materiam antecedentem, antequam febris causa conjuncta evadat.

Et nisi jam propositis febris cedat, ad jus columbæ, & salia & ligno sassafras alteratum deveniri poterit, ita parandum.

℞. Salsæ elect. incisæ. unc. i. f. liqui sassafras incisæ unc. f. aq. comm. lib. iiii. m. f. inf. per horas 24. deinde adde dividuum columbæ turritolæ, & bul. ad consumpt. medietatis, in hinc addendo chamædryos, tantopere a Tral. commendata, cardui benedicti an. pug. i. bull. par. & colat. servetur pro tribus vicibus maturinis horis assumenda, cui præmitti poterit, si ad sudorem fuerit propensa, bol. hujusmodi.

℞. Pulv. corn. Cerv. Philosoph. præparati scrup. i. salis card. sancti gr. vi. julap. gemmati q. f. m. ref. bol. & aur. Quod si ad urinam vergat, hic paretur.

℞. Tereb. nostræ, lotæ in aqua agrim. drach. f. salis theriacalis gr. vi. m. ref. bol. & aur. quotidie jure jam dicto præmittendus. Et interim, singula hebdomada alvus moveatur ita.

℞. Pil. mastich. vel de tribus cum rhab. drach. f. magist. mechoac. gr. xx. m. ref. pro una vice tantum.

Tandem ventriculus, utpotè hujus febris minera, erit teborandus, ideo Gal. utebatur absint. Nos conf. vino, vel sale absint. utebatur & diacal. diatrium pipereo. Avic. ad magnas antidotos ascendebat. Nos, ad confect. aromat. ros. & diarrhod. Abb. dissoluto saccharo cum aqua cinnamoni.

Extrinsicis quoque fomenta & inunctiones parari poterunt. Fomenta quidem, ex decoct. absinth. mentæ, rosmarini, salviæ coriandr. præparat. cortic. citri, in vino nigro subaustero. Inunctiones, ex oleo mastichino, de absinthio, de menta, addita cera, vel oleo M. D. de corticibus citri. Et in diuturna, ventriculo valde frigido existente, ætate senili, cachexia imminente stillicidium quoque administrari posset, ita parandum.

℞. Col. amygdal. dulc. mastich. an. lib. i. f. vini

vini albi montani lib. i. spicæ, absinthii, mentæ an. pugn. i. caryophyl. macis, cinnam. gingib. an. drach. i. m. inf. omnia per diem naturalem, deinde bul. ad consumptionem vini, & facta colat. servetur pro stillicidio.

A proprietate commendat Tral. chama dryos decoctionem. Potens est etia n aqua stillat. chamæmeli, unde chamæmelum ab Egyptiis soli fuit consecratum, tanquam eximium inter febrifuga medicamentum. Extrinsecus Tral. laudat lapidem æcitem, idest Aquinum, alligatum. Ex Aliis, inunxio spinæ oleo de scorpionibus. Mathioli. Ex Avic. frictiones ex telis araneorum in oleo maceratis.

Victus ratio sit attenuans, calefaciens & exsiccans, primis diebus quodammodo tenuis, ut pituita dulcis ad naturam sanguinis reduci possit, quod in cæteris pituitæ speciebus succedere non potest, & ideo dicebat Tral. quod sicut una non est pituitæ species, ita nec una victus ratio, fames tamen in universum commendatur ab omnibus in hac febre. Sic Hipp. consulit ut patiens febrem hyemalem custodiatur in fame. Rhasis, quod nil melius sit longa fame. Celsus, quod triduo primo a cibi abstinenceat. Cautè tamen in nostra puella agendum, primò, quia victus humidus pueris confert, secundò, quia qui crescunt plurimum habent calidi nati, & ideo plurimo egent alimento.

Potus sit mulla cum cinnam. Vinum non admittit Gal. in hac exquisita quotidiana, sicut concedit Avic. in non exquisitis. pituita nimirum valde frigide existente, & apparentibus signis coctionis. Vigilæ & motus magis in hac febre quam in nulla alia putrida conveniunt. Sic, pro exercitio, frictionibus utendum. Clysteribus alvus lubrica servetur, & nonnunquam ventriculus, vomitu leniter excitato, euacuetur, ac tandem alacri animo recreetur & blandè tractetur. *Idem ibidem.*

Febris Quotidiana Nocturna.

Excellentiss. Sen. tor, annum agens 65. temperamenti calidi & humidum, boni habitus, dum elapsis annis. podagram pati cepisset, medicorum consilio, cymbæ usum deseruit, & pedibus incedere, corpusque continuo exercere cepit, verum, anno præterito, sereniss. Principis creatus Consiliarius, ac proinde habito dignitatis respectu. rursus cymba vectus, & præterea in Magistratibus, vitam sedentariam agere coactus, hoc autumnali tempore in febriculam incidit, noctu semper invadentem, cum aliqua horripilatione. sive extremorum perfrigeratione. cui calor succedit, sensim ac tardè accensus, cum pulsu inæquali. at raro potius, & parvo, molli, non tamen undoso. Urina alba & cruda primis diebus, modo crassa, & quodammodo turbata conspicitur, de totius corporis gravitate, & articulorum laxitate conqueritur. Celsatis horribus somnus supervenit qui non adeo facile præverti aut prohiberi potest, & horis vespertinis sequentis diei, exigua valde percipitur ipsa febris, nunquam tamen Excellentissimus Par. ad ejus immunitatem pervenit. Modo de agendis, ut liberetur, & ut in posterum degat incolumis, auxilium petitur.

Febris quæ paucis abhinc diebus Senatorem Excellentiss. corripuit, quotidie, eadem hora

eodem modo ac ordine invadit, quotidiana dicenda, & quia nocturno tempore accedit, quotidiana nocturna propriè appellanda; eaque continua, rarissimè namque ene potest intermittere, quia, cum à pituitoso, lento, & tenaci humore excitetur, vix prorsus destrui potest in quinamentum in minera relictum. Fit igitur ab humore caudo, pituitoso, in ventri. uo genito, & in venis congesto, a libera vivendi ratione, ætatis mutatione nunquam mutata, qui humor, superiori. us annis, ad articulos decumbens & podagram Patient. Excell. interens, exerciti benevolentia coercitus est, atque consumptus, quo, ab eodem interitio, ut patriæ inserviret, rursus in venis coacervatus, mediæ ætatis promissa transpiratione, ab aliqua obstruktionē excitata, modo tandem putredinem contraxit, & jam etiam febrem excitavit. Cuius non celum propria signa, siquidem cum horrore atque refrigeratione incipit, nunquam enim cum rigore invadit, dum humor ad partes lentius & decurritur & per easdem lente movetur. Calor autem tardè accenditur, quia humor. temperatura frigida & humidus est, consistentia vero lentus & tenax. Pulsus autem inæqualis valde observatur, quoniam inæqualiter evaporationes a putrida minera elevarunt in cor, rarus & inolis, propter materiæ peccantis humidam conditionem, parvus item, veluti ignis a lignis viridibus suffocatus, non tamen adhuc unumquodque, ut evadere solet in progressu, quando attenuata materia futuros sudores prædicat. Urin. in principio alba & cruda, crudo omino, & nihil profus segregato humore peccante, in ut modo in progressu, crassa & turbulenta observatur, cum aliqua ex parte segregatur, quæ etiam ratione, & de totius corporis gravitate, & articulorum laxitate conqueritur Senator Excellentiss. dum redundantis humoris portio, tum ad malleolos, tum & ad articulos decumbit, potius quam critice ab ipsa natura expellitur. Quod autem somnus, inno & sopor sit hujus febris proprium symptoma, qualitas humoris peccantis facile docet, quod a Gal. ipse confirmat.

Febris hæc, ut quotidiana, longa esse solet, nec sine periculo, ex ipso Gal. It. Hippoc. dicebat, quod febris nocturna non admodum lethalis est, ergo mediocriter lethalis. Subdit autem in Tex. Hipp. quod diurna longior est: Nec mirum, siquidem resolutio peccantis materiæ, quæ fit in declinatione, cadit in noctem, nostræ vero nocturnæ cadit in diem, & ideo brevior prædicti potest.

Curati debet febris hæc ut quotidiana, verum, cum nocturna magis pituitosa quam diurna censetur, efficacioribus quoque eget medicamentis. Incidendum itaque, detergendum evacuandum & roborandum.

Et primò quidem, ex fonte Chirurgico, in casu nostro, aliqua est de promenda sanguinis missio, licet a Gal. omilla, idque quoniam Excellentissimi Patientis corpus calidum & humidum, atque succis repletum est, unde sanguis, si non ut causa principalis, saltem ut fovens concurret, præter revulsionem a capite, ne ideo facile in accessibus repleatur, & ad soporem deducatur, in quem linem, ratione quæmetiam ætatis, aperiri poterunt venæ sedæ es. Frictiones etiam convenientes erunt, non solum universi corporis,

ris, verum & articulorum, qui à fluxionibus olim infestari solebant, ut, si possibile fuerit, ipsa podagra revocetur.

Et quoniam, statim ab initio, à medico domesticorum primæ viæ fuerunt expiata, melle ros. solut. cum tart. & momento aquæ cinnam. & postmodum, per integram hebdomadam, humores præparati oxymelite simplici, melle ros. commito, repetito quinetiam jam dicto medicamento, & præmissis bolis ex hiera, cum exiguo lenitivo reformatis, duabus horis ante medicamenti exhibitionem, ideo in præsens, de ulteriori præparatione cogitandum, quæ bis per diem naturalem procuranda erit. Sic primo in vigore febris, oxymel. tantum erit præbendum, ad unc. ii. cum gr. tart. vitriol. in decoct. cich. borrag. end. beton. n. elissæ & sem. cit. Et quoniam calor difficulter diffunditur ad partes externas, & nonnisi post multas horas, ideo, ut promptius & citius succendatur & se exerat, præbeatur huiusmodi. aqua.

℞. Aq. tot. cit. scorz. cord. pæ. Sax. an. unc. i. julap. gemm. MD. gutt. x. m. & exhibeatur. In augmento verò febris, abstinendum omnino à jure sem. cit. alterato, & qualibet alia potione alimentali, utpote quæ potius calorem ad interiora revocandi, quam ad exteriora expellendi vim obtineret.

Præterea, eodem tempore spinali medullæ injunctio fieri poterit, ol. de scorpionibus Matthioli, exiguo vino malvatico dissoluto.

Alterum verò præparans, magis attenuans atque incidens, exhiberi poterit tribus horis ante cœnam, nimirum in febris declinatione, quod poterit esse oxym. cum syr. de prassio & de cich. cum rhab. in decoct. cich. borrag. agrim. beton. chamædryos, radicis petroselinæ atque fœniculi. In quorum præparantium usu ita pergendum erit, & quarta quoque die, per epicrasin, præparati humores sic evacuentur.

℞. ℥. ii. de hiera cum agarico scrup. ii. elect. lenit. drach. iii. m. f. bol. & præbeantur hora una ante cœnam, ut ab his operatio sequatur hora accessionis. Vomitus, quoniam difficilis est ipsi Patienti, omnino omittatur.

Quod si appareat signa coctionis, & nihilominus perseveret febris, ad fortiora medicamenta purgantia deveniendum.

Ut ℞. Elect. diaph. ros. Mef. an. drach. i. flor. cass. drach. v. m. f. bol. quibus superbibat mulsam dilutam, ex aqua hordei paratam.

Vel. ℞. Pil. de hiera cum agarico, de tribus cum rhab. aggreg. an. scrup. i. flor. cass. rec. ext. drach. vi. m. f. bol. quibus pariter superbibat jus, solo hordeo alteratum.

Dum hæc fiunt ventriculi potissimum cura est habenda, siquidem quotidiana ventriculo male affecto fieri solet, ideo absinthii conserva, vel sal absinthii in usum duci poterunt. Confectiones quoque ex aromatico ros. & diarrhodone Abbat. dissolvendo saccharum cum aqua cinnam. & manifestis apparentibus signis coctionis, magnæ antidoti quoque locum habere poterunt, Michridatica scil. confectio, & Theriaca ipsa, exigua tamen dosi.

Quibus omnibus congrua victus ratio erit addenda, quæ attenuans quidem, at non tenuis esse debet, idque pace ipsius Celsi, qui alternis diebus tantum cibum offerebat. Potus sit mul-

sa, coriandro, vel cinnam. alterata, & apparentibus signis coctionis, vinum libenter concedatur. Quæ, pro curatione hujus febris dicta sunt satis. *Idem ibidem.*

Febris Lumbricalis.

Nob. Puer, decem annorum, temperamentum totius, calidi & humidi, habitus carnosus, subrosei & albicantis coloris, sanus alioquin, se d repletionibus frequenter distentus, à quibus tum vomitu, tum alvi defectione spontanea se exonerabat, cum excretionem, non modo cruditarum & materiæ pituitosæ, verum etiam sæpè vermium, qui albi coloris, rotundi, palmarique longitudine, materiæ jam dictæ immiscebantur, quia, ut unigenitus, prave quoque educatur, namque fructus, carnes, lac, & ex eodem parata, aliaque prava alimenta quolibet tempore eidem conceduntur, modo, prava eadem educatione perseverante, postremis hisce præteritis diebus decurrentis autumnus, coniuncta appetentia deijci & nauseare incepit, tandemque febrile, præcedente anhelitus calore, dentium stridore, quinque & clamoribus, & motibus convulsivis, in somnis. Febris autem, nudius tertius, circa vespertinam, cum inæquali extremarum partium refrigeratione invadit, & hesternæ die, plures accessiones passum esse ab assistentibus creditum fuit, licet exacerbatio vera à Medico pariter circa vespertinam fuerit observata, sicut & hodiè nos accessit observavimus. Clysterem ex lacte, butyro & saccharo paratum, huic injiciendum fuit, quem nulla subsequuta fuit evacuatio, ideo hoc mane tartari cremorem præscripsit, cui successit cruditarum & pituitosæ materiæ copiosa excretio, quatuor rotundis, albis commista vermibus, vivis adhuc. Puer interim quietus, & potius soporosus jacet, cujus pulsus non adeo frequentes sunt, valde tamen inæquales, urina pallidæ & tenues, frequentes item mutationes observantur & coloris, & caloris, præsertim faciei, qui calor, nec principio, nec augmento accessionis, acris percipitur, sed potius fumosus, & salivatio in tota accessione copiosa perdurat. Modò sub noctem, ita de Pueri statu consultum fuit.

Febrem hanc Puerum Nob. divexantem, Lumbricalem & Vermicularem appellare placuit vobis, Excellen. Viri, quod nec mihi certè displicet, si vermium, qui eam comitantur, copiam consideremus, non vero quod à vermibus febris ipsa procedat, siquidem vermes, in febribus, ut signum, non ut causa, locum habent. Unde Hipp. de his pronuntiavit, quod eunte in judicacionem morbo, lumbricos quoque teretes descendisse, nihil nocet. Siquidem, dum cum aliis excrementis sub finem morbi excernuntur, tunc sit ex naturæ judicio, si verò in vigore, malignitatem in humoribus præsentem, à qua fugantur, significant, prout, si in principio morbi prodant, ut in casu nostro, ex subiecta materia potius contingit, atque ita semper rationem signi, non autem causæ, in febribus subeunt, non enim ubi vermes, ibi febris necessario reperitur. Quare ideo hujusce febris prius investiganda, mox vermium præsentia consideranda.

Febris igitur, hucusque quotidie horis vespertinis, eodem modo, eademque proportionem invadens, quotidiana dicenda jure videtur, quæ

invadens, quotidiana dicenda jure videtur, quæ & confirmatur a rebus naturalibus, à non naturalibus, & præter naturam. Et primo quidem, ætas puerilis, ad pituitæ subdulcis generationem aptissima observatur, ob cruditates a ciborum ingluvie procedentes, temperamentum præterea calidum & humidum, anni tempus autumnale, prægressa dissoluta vivendi ratio, ad crudos & pituitosos humores congerendos opportunissima sunt, ac tandem, hoc idem continent res præternaturam; etenim, cum extremorum refrigeratione invadat, pituitosis febribus propria, præterea calor febrilis, prius horis accessions, non adeo acris & mordax percipitur, imo potius fumosus, ad instar ignis in viridibus liguis accensi. Urinæ sunt pallidæ & tenues, pueris quidem consuetæ, modo, crudæ pituitæ, indicio. Pulsus inæquales, ob pugnam caloris febrilis cum pituitosa materia gravante, & putridos vapores ad cor elevatos, à putrida minera, à vermibus inæqualiter commota. Lingua salivosa, siue copiosa saliva madens, à cujus præsentia oris ventriculi suctio atque corrugatio inhibetur, unde non solum inappetentia, verum & nausea febre ipsam præcessit. Et tandem copiosi adsunt cum hac febre vermes, qui non nisi à pituita excaletacta & putrefacta gigni possunt, ut asseruit Avic. & ante ipsum Gal. dum probat amara, neque facile putrescere, nec vermes generare posse, prius tamen Arist. idipsum affirmavit, asserens unumquodque nutriri iis ex quibus constat, vermes autem, nec acidis, neque amaris nutriuntur, quia nec ex iis constant. Quibus subscriperunt quoque Aet. & Paul. Quare, cum neque ex acidis melancholia, neque ex amara bile, neque ex sanguine, à natura tantopere cultodito, vermes generentur, asserendum omnino quod à pituita putrefacta ortum ducant, à qua procedit quoque hæc quotidiana febris.

Et licet in febribus quoque acutis, biliosis, atque malignis, vermes generari ac excerni frequenter videamus, non tamen à biliosis & malignis excrementis, nec in eodem loco, ubi putrescunt, generantur (quanquam & in pluribus corporis partibus generari posse negandum non sit,) sed in primis viis, intestinorum scilicet regione, ex pituitosis & crudis excrementis, in casu nostro producuntur, quummo, si portio, vel exigua, aut biliosa aut maligni humoris, à venis superioribus, per ductum cholidochum ad intestina feratur, fugantur ipsi vermes, & vel per alvum deiciuntur, vel ventriculum petentes, per vomitum excernuntur.

Sed, cur ad vermium putredinem non semper sequitur febris? An quia licet vermes ex Arist. generentur ex putredine terræ, nihil tamen, ex eodem, generatur putrescens, sed concoctum, quasi dicat, quod ex integra & consummata, vel excellenti putredine, vermes non generentur, unde dicebat, quod vivencia in rebus putridis generantur, cum naturalis calor facultatem eorum cogendorum acquirit; quamvis enim materia putrida sit, oportet tamen vermibus generandis, ut à naturali calore coquatur, quam concoctionem Avic. rectificationem vocavit. Hinc Gal. ait, quod sola putredo non est ad generandos vermes sufficiens, sed & calore plurimo indiget, sicque vermes, & per putre-

dinem, & per concoctionem generantur: per putredinem quidem, quoniam ut multi putredo præcedat necesse est: per concoctionem quoniam opus quoque est, ut postea calor ejusdem multi reviviscat, ut & coquere & in unum cogere valeat, quam vim ac facultatem suscipit à celesti calore accedente, dum multi calor nondum permittit integram humidi à sicco dissolutionem, ac proinde neque integram putredinem, cum aliquam ex hac non solum vermes generari non possint, sed ab ipsa intensiori reddita, vel necentur, vel rugeant, atque ab hac quidem febris generatur, non autem à priori putredine vermes producente. Ideo, pluries vermes excreti, sine febre, à Pueris, & ab aliis visi fuere, cum ex corruptione ciborum, tum ex pituitosa materia, à lactis usu carniuin & fructuum, atque dulcium alimenterum genita, dulcia cum in humidis temperaturis, & puerili ætate potissimum, non adeo facile bilefcunt. Horum autem signa patentia sunt, nimirum oris fœtor, à putredine in primis viis, dentium stridor, morusque convulsivi in somnis, è vaporibus, vel nervorum principium, vel os ventriculi vellicatibus, unde & clamores. Quoniam vero ex vermium copia, frequenter febris minera commovetur, & agitur, hinc plures singulo die repetere videntur febrium accessiones, cum frequenti coloris & caloris mutatione, ab eadem causa procedente.

Febris hæc periculo non vacat, licet in primis viis putredinis mineram habeat, vix enim heri potest ut pituitosa materia, viscida atque lenta, & potissimum hoc casu copiosa viginti quatuor horarum spatio febrilem calorem exuat. Vnde Avic. dicebat, quod sicut raro datur quartana continua, ita raro reperitur quotidiana intermittens. Augetur autem periculum in casu nostro, à copia vermium, qui sen per mali, quia putredinem, si non intensam, extensam tamen significant, quæ ipsius febris causa tovens evadit.

Attamen quoniam statim ob initio accersitum, Puer satis obsequens, & assidentes solliciti de ejus salute observantur, hæc speranda est, eoque magis, cum, & morbus, & symptoma ætati, temperamento, anni tempori, & vivendi rationi convenient. Neque ut Medicorum vulgus, juxta cum mulierculis, vermium præsentia, ut signum malignum, formidanda, nisi fortasse iisdem in morbi progressu, mortui, aut vivi, fugientes excernerentur, intensiori nimirum putredine reddita, atque loco mutato; verbo, mutata febris natura. Sicut magui faciendi quoque teretes, morsu lædentes, præsertim os ventriculi, quoniam & lipothymiam, syncopen, & interitum inferunt.

Intentiones medicæ, pro hac febre curanda, atque Pueris sanando, sunt, dirigendæ adversus febre primo, secundo vero adversus vermes; non quia sunt febris causa, sed quod alia symptomata inducere possunt. Quare, primo materia pituitosa, attenuatione, incisione & detersione præparanda. Secundo, eadem evacuanda. Tertio, calor febrilis, pro usu, con-temperandus. Quarto, partes producentes roborandæ. Ultimo, vires totius, congrua victus ratione conservandæ.

Vermes vero prius deturbandi atque necandi. Secundo expellendi. Tertio, si irritati, morsum,

aut aliquod aliud pratum symptoma inducant, eorum ferocia mitiganda.

Quibus intentionibus ut satisfaciamus, in fonte Chirurgico, non est quod de sanguinis missione loquamur, non solum febris ipsius ratione, & causæ ejusdem, quia nimirum non adest indicans, verum etiam ratione ætatis, quia non adest permittens, prout & ab ipso Gal. omissa fuit.

Ex Pharmacia itaque sunt desumenda remedia. Et primo, pro ventriculi & primarum viarum exinanitione, injectus fuit clyster ex lacte, butyro & saccharo, à vermium præsentia facile absorptus atque consumptus, mox exhibitus cremor tartari, quem crudorum & pituitosorum excrementorum iusta excretio sequuta est. Quare alterantibus & præparantibus modo insistentium.

Alterantia esse possent jura, cich. borrag. end. ruta capraria & gramine alterata, quibus oxymel dilutum aqua de succo rutæ capr. & aceto paratum, ad unc. ii. immisceri poterit. Verum quoniam jura hujusmodi, utpotè amara, respuit ipse Pateriens, ideo substitui possunt aquæ stillat. de succo cichor. acetosæ, rutæ caprariz & graminis, & oxymeliti, julapium acetosum, noctu in febris vigore offerendum. Mane vero solum præparans exhiberi poterit, julap. nimirum jam dictum, ad unc. ii. vel iii. vel eius loco cremoris tart. & sacchari fini an. unc. f. vel in jure, vel in aqua rutæ capr. aut scorzonæ dissoluti. Interim, quotidie clyster injiciendus, non solum ex lacte, butyro, & saccharo, verum & ex lacte, cum syr. vel melle ros. solut. Et septima transacta die, minorativum præbendum ex cassia, tartaro, & semi scrupulo aloes. si possibile fuerit, sin minus, substituitur illi syr. ros. solut. aureus; vel pot. ex manna clarif. addendo tamen infusioni agaricum, ab Avic. tantopere commendatum.

Quod si forsan in progressu, calor febrilis augeatur, alterantis loco eligi poterunt aquæ stillat. cich. & acet. vel aqua hordei, cum melle ros. simpl. quod Avic. proponit, sub nomine Geleniabin, ut eodem tempore & alterationem & præparationem obtineamus, quibus omnibus in gratiam Pueri. nonnunquam & acidum citri, aut lim. commisceri poterit, licet enim acida hujusmodi frigida sint, attenuandi tamen & putredini resistendi facultatem obtinent.

Sed in progressu, perseverante febre, aliquod cochlear. syr. de cich. cum rhab. in aquis, vel decoct. jam dictis, opportunissimum erit, atque ita, quæ alterando, quæ præparando, & per epistasin. evacuando, pilulæ alitujus, vel mastice, vel de tribus, necnon clysteris frequentiori usu, erit procedendum usque ad febris consumptionem. Facilis quippe tunc fuerit ventriculi roboratio, confectio aromatici rosati, vel sale absinthii & mentæ.

Dum jam dicta omnia sunt, vermibus semper prospiciendum, & primò enecantibus internis & externis. Secundò educentibus.

Enecantia, in hoc Puerotenellæ ætatis atque delicato, poterunt esse aquæ, succi, spiritus, pulveres. Aquæ stillat. nimirum absinthii, rutæ capr. citri, scorzon. card. sandi, & omnium maxime, cordial. præclariss. Saxon. Succu suaviores, citri, limon. Spiritus salis, ad gutt. in aquis jam dictis.

Sed calcanthi spiritus celeberrimus habetur ad vermes enecandos, nec unquam fallit.

Pulverem ex corallina, sive musco marino, quem circumforanei in Flareis vendunt, mirabilem deprædicant Matthiolus, Brasavolus, Mercurialis. Celsus præbet nitrum bibendum. Nos vero paremus pulverem ex corallina, cornu C. phil. præpar. cum cort. citri, nec non margaritis præparatis, quibus addantur quoque grana mercurii dulcificati, & exhibeantur in aquis cordialibus jam dictis.

Extrinfecus enecat vermes linimentum ab Act. Paulo, & Orib. propositum, ex succo absinthii, bryonia, aloë & felle taurino, verum in Pueri hoc febricitante, sufficiat oleum Abacuc, Venetiis paratum, vel de scorpionibus Matthioli, aceto squillitico dissolutum.

Educentia in casu nostro, poterunt esse crem. tart. repetitus, vel aloë lota, tantopere à Paulo commendata. In fine rhabatbarum quoque, in minutissima fragmenta redactum, & saccharo incrutatum, prout Venetiis paratum habetur, valde utile, sic & conserva è floribus persicorum, enecat simul & expellit.

At si forte fortuna vermes ori ventriculi, morfu pertinaci adhæreant, tunc minime sunt irritandi, sed potius à morfu revocandi, atque alliciendi, hinc Act. utebatur oleo, quod tamen nos non adeo tutum putamus, cum ab Arist. proditum habeamus, quod olei tactus insecta omnia interficiat, ideo Avic. carnes, & carniū contusam offerebat, mox carniū enecantia commiscebat, ut vermes deciperet. Nos autem, lac, omnium præstantissimum existimamus, vel cum saccharo ipso, & quidem copiosum, ut ventriculum distendere, & diutius in eodem manere possit, simulque vermes proleat valeat, sicque ad lac conversi ventriculum mordere desistant, quod etiam clysteribus erit injiciendum.

Quibus omnibus congrua erit addenda victus ratio, non adeo tenuis, ut in reliquis quotidianis, licet pituita sit dulcis, ob vermium præsentiam, & puerilem ætatem. Potus consuetus solet esse mulla cum cinna. qui in casu nostro poterit esse aqua hordei, cum saccharo, & cortice citri, imo, & nonnunquam, cum acido, cæteraque proportionem respondeant curationi quotidiana, superius tradita. Idem ibidem.

Epjala Febris.

Vir quidam dives, sexagenarius, temperamenti olim calidi & humidi, habitusque carnosus, modo ad obesitatem tendentis, qui semper deliciosam vitam duxit, cujus causa, aliquando colicis doloribus fuit obnoxius, qui solvebantur pituitæ vitæ evacuatione, per clysteres sollicitata, tandem multis abhinc mensibus, ob rixam & hostile dissidium, ab Urbis Prætoris domi se continere jussus, in qua adhuc haret, comestitionibus, compositionibus & otio omnino indulgens, tandem hoc hyemali tempore, quo colica tentari solebat. febre correptus est, horis nocturnis, quæ cum quodam horrore incepit, non tamen recedente calore, adeo ut usque in subsequenter diem, toto corpore, simul eodemque tempore, & calorem & frigus se percipere affer-

rueris

ruerit ipse Pat. & per totam diem usque ad novum febris insultum. Accersitus Medicus invenit Patientem de algore & calore simul conquerentem, sed sine siti, cum pulsu parvo, tardo & raro, urinisque crudis & aquosis. Statim iussit ei offerendum jus sem. citri alteratum, tribus additis uncis aquæ cord. Sax. in eum finem ut totum tandem, in toto febris progressu, incalesceret corpus, quod tamen non successit, sed adventante nocte, novaque accedente febris accessione, invaluerunt & calor & frigus, uno eodemque tempore, per universum corpus, & utraque affectio pariter usque ad matutinam Medici visitationem perseveravit, quam rem miratus Medicus, cum domesticis, consilium à nobis capiendum decreverunt. Interim tamen optimè se gessit Medicus ipse, etenim summo mane, primo hoc præscripsit vomitorium.

℞. Juris carniū, raphano & sem. cit. alterati unc. x. oxym. simpl. unc. iii. m. pro vomitorio. Secundo, clysterem hujusmodi injiciendum iussit.

℞. Decoctionis utriusque centaur. mercurialis, chamæmeli, parietariæ lib. i. m. mel. ros. solut. ol. rutac. an. unc. iii. elect. diaph. unc. f. vit. ovi m. pro clyst. Tertio, præscripsit leniens, quod tamen duntulit in crastinum sequentem diem, ita quoque rogâte Patientem, à duabus secutis evacuationibus nonnihil defenso à quibus pituitosi & crudi humoris copia excretauit.

Quotiescunque febricitant ægri & rigent simul, atque eodem tempore in toto corpore, per totam accessionem, utrumque sentiunt effectum, epiala febre laborant, ita Gal. Patiens iste ita se habet, ergo epiala febre tenetur. Et licet ab epias & alos, à maris nimirum tranquillitate, ita dicta fuerit, eo quod insignem calorem non excitet, & ideo tranquilla. Hinc, ut mare, licet tranquillum, horrendum semper est, sic & in Epiala, licet calor tranquillitatem ostendat, utpote misis, horrida tamen evadit, ob rigorem perpetuum ejusdem, unde à quibusdam, febris Algida dicta fuit.

De causâ hujus febris convenire videntur Avic. & Arabes omnes, cum Gal. & Græcis omnibus, sicut & de modo omnino dissentiant, omnes enim voluerunt causam esse pituitam acidam, crassam, quam vitream appellat Praxagoras, circa viscera naturalia putrescentem. Modum hujusmodi admisit Avic. ut scilicet pituita vitrea, putrescens, vapores ex putredine calidos mittat ad ambitum corporis, & ita exteriora caleant, cum vero materia sit frigida & lenta, interiores partes refrigeret, non secus ac dum pomum crudum in ignem projectum incalescit, quod quidem ferventem ac vaporosam exhalationem in aerem de se transmittit, quam ideo calefacit, ignem vero proximum & sibi circumpositum adeo refrigerat, ut illum ad extinctionem ferè deducat. Gal. vero voluit quod Patientes febricitent & rigent simul, eodem tempore, in quavis corporis parte, & in tota accessione, idque quoniam frigidissima ac densissima acida pituita, si per partes sentientes moveatur, sine putredine, rigorem sine febre excitat, si verò modicè putrescat, præcedit quidem rigor, sed postea subsequitur calor, devicto nimirum frige-

re à putredinalis caloris vigore. Verum tamen est quod humor iste, cum sit frigidus & tenax vix potest æqualiter & totus putrescere, & ideo ex parte putrescit, & ex parte non putrescit, atque ea quidem qua putrescit, excitat calorem, qua vero non putrescit, frigus; & ita, uno eodemque tempore, & una eademque in parte, & calor & frigus perferuntur.

Quam Græcorum sententiam nos libenter amplectimur, cum febris sit calor in corde accensus, & à corde in totum corpus diffusus, unde interiora algere, & exteriora incalescere non possunt, ut credit Avic. quia unumquodque fortius agit in proximum quam in remotum, quare calefieri non possunt externæ corporis partes quin prius internæ caleant. Et quamvis Philosophantes quidam Gal. opinionem arguant, eo quod duo contraria, simul uno & eodem tempore, in unico subjecto reperiri nequeant, solvit tamen objectionem ipse Gal. dictum hoc scilicet. verum esse quoad sensum, non quoad rationem, & quoad partes dissimilares atque organicas: non quoad similes, etenim, manus frigida & calida, ut pars organica, ad sensum esse videtur, cum tamen similiarum partium, eandem constituentium, alia frigida, alia calida verè sint.

Igitur à pituita vitrea, inæqualiter extra venas putrescente, hæc febris hæc, Patientem hunc attingens, cujus productio difficilis non fuit, hac ætate sexagenaria, humido temperamento, habitu corporis obeso, delicata vita, à quo olim colici excitabantur dolores, quorum causam ostendebat pituitæ vitreæ copiosa per alvum excretio, quæ tandem ab intermisso exercitio, imo ab omnimoda quiete, & erroribus in cibo & potu adauctis, adeo multiplicata est, ut crassior etiam consuetudo reddita, ad intestina à natura detrudi nequirit, quoniam in mesenterio firmata atque putrefacta, febrem hanc epialam excitaverit, quam in genere quotidianarum collocavit ipse Gal. cum tota Græcorum Arabumque schola, & in qua, nulla sitis, calor mitis, pulsus parvus, tardus & rarus, cum urinæ crudis & aquosis, jure merito observantur.

Neque huic Galenicæ veritati refragatur ejusdem auctoritas, Lib. de Inæquali Intemperie Cap. ii. ubi asserit, epialam ab amara bile, simul cum pituita vitrea putrescentibus fieri posse; rationi quippe consentaneum, quod sicut in cæteris omnibus, ita & in hoc genere febrium, & legitimæ & spurie dentur species, dum legitima ab uno simplicique humore, spuria vero, à duobus simul commistis producit. In hac tamen frigus usque ad finem accessionis non perdurat, sed, vincente calore, in progressu cedere solet, secus ac in legitima.

Febris hæc, licet inter quotidianas intermittentes reponatur, cum humor per partes sentientes moveatur, ad rigorem vel horrorem excitandum, nihilominus, quoniam vera quotidiana non est, adhuc minus sincerum habet intervallum, ob materiæ lentorem, atque temporis brevitatem, unde si illa, non sine periculo fuit judicata, tantò minus tuta erit hæc epiala, ut quæ à densissima omnium, atque frigidissima pituita, vitrea scilicet, exciteretur. Idèd & Gal. inter febres continuas epialas colloca-

vit, quæ tamen continuitas, per subingressum paroxysmorum est intelligenda.

Sperandum tamen, cum Patientis vires validæ sint, ut attenuata materia, vel in veram quotidianam degeneret, vel sequuta ejusdem pituitæ ad intestina metastasi superveniente colica, febris ipsa recedat.

Quare confidenti animo curatio est aggredienda, quæ potius causam quam febrem ipsam respiciat. Sic primò materia pituitosa calefacienda, attenuanda, incidenda, & evacuanda. Secundo, calor febrilis modicè contemperandus. Tertiò, ventriculo afflicto prospiciendum, cum ex eo animi defectiones contingere soleant. Quartò tandem, vires totius conservandæ.

Quibus intentionibus satisfaciendum remediis à tribus fontibus desumptis. Et primò quidem à Chirurgico, non est quod ullam sanguinis missionem deprecemur, etenim, si Gal. in quotidianæ curatione nullam sanguinis missionis mentionem fecit; sicut neque Avic. (nisi rubedo in urinis observata fuerit) hoc est, nisi subsit sanguinis plenitudo, quantò minus indicatur sanguinis missio in epiala hac febre, in qua pituita adeò tenax & frigida peccat, quæ majori calore pro concoctione eget? Quare nec indicans adest, nec, nisi vix, adesse potest permittens. Frictiones asperæ, in progressu febris, locum habere poterunt, ad porositates rarefaciendas, atque pituitosos humores attenuandos ac resolvendos, imò & inunctiones, quæ parari solent ex oleo chamæmelino, ad cuius tamen evitauidam odoris insuavitatem.

℞. Ol. lilior. alb. unc. iii. mtri drach. ii. vini albi odoriferi unc. i. m. bul. omnia ad consumpt. vini & madefactis manibus, post frictiones, fiat universalis inunctio. Spinali verò medulla.

℞. Ol. lil. alb. cum aromat. unc. ii. ol. de spica drach. i. m.

Ex fonte Pharmaceutico præcipua sunt desumenda remedia, lenientia, præparantia, purgantia, animi defectionem prohibentia, & ventriculum roborantia. Lenientia possunt esse assumpta, & injecta. Assumpta vomitoria, & dejectoria. Vomitorium aptissimum, jam ab Excell. Adstante fuit præscriptum, sicut & clyster acris opportunissimus. Præscripsit quoque leniens hujusmodi, per os exhibendum.

℞. Elect. lenit. unc. i. crem. tart. drach. ii. specier. hieræ simpl. drach. i. m. f. bol. Et si potio, talis erit.

℞. Mel. ros. solut. unc. vi. crem. tart. tenuiss. pulveriz. unc. f. m. f. potio. Præparantia secundo loco consideranda veniunt, eaque multo validiora quam in quotidiana, ut ratio, atque Aetii & Pauli auctoritates suadent; observando tamen, cum Avic. quod paulatim ad fortiora sit ascendendum. Primum igitur præparans sit.

Oxym. simpl. mel. ros. colatian. unc. i. salis mentæ gr. vi. vel aq. cinnam. unc. f. m. pro syr. matutino tempore, duabus horis ante prandium exhibendum. quod attenuandi quoque & incidendi facultatem obtineant, hoc esse poterit.

℞. Decoct. cich. borrag. buglossi, beton. mentæ, cort. citri unc. vi. julap. acet. syr. de cort. cit. aa. unc. i. m. pro alterante.

Interim clysteribus acrioribus erit materia subducenda, & apparentibus aliquibus signis coctionis, purganti medicamento erit minoranda, & quidem potius bolo quam potione, præscribendo, cum minus crudam materiam exagitet.

Ut ℞. Elect. lenit. drach. i. m. f. boli.

Inde ad validiora præparantia, attenuantia & incidentia erit deveniendum: unde Dioscorides seseli semen cum vino bibendum dabat in Epialis, nos vero, pro syr. matutino.

℞. Oxym. comp. unc. i. syrup. de hyssopo de prassio, bizantini cum aceto, an. unc. f. m. f. acetosæ, cum aqua agrim. paratæ unc. v. m. pro syr. matutino.

Pro nocturno vero, ℞. Oxymel. simpl. unc. i. syr. de cort. cit. de menta, sive de absinth. an. unc. f. decoct. cich. borrag. buglossi, beton. agrim. petrosel. salvia unc. v. m. pro syr. Et ita per epicrasin, dum materia peccans præparatur, eadem, vel clysteribus acrioribus, vel præscripto medicamento erit educenda. Frustra autem, quod aliqui perperam faciunt, diureticis ejusdem materiæ per urinam evacuatio tentatur.

Ventriculo afflicto corroboratio tandem procuranda: & potissimum post assumpta medicamenta purgantia. Sic Paul. diatrium pipeleon, succum cyrenaicum, imò & castoreum exhibebat. Nos autem contenti sumus confessionibus, ex aromatico ros. oleo de citro, anisoforum, sale absinthii & mentæ.

Ad animi defectiones autem arcendas, aqua cord. præclarat. Sax. a. i. unc. i. cum unc. f. aq. cinnam. efficacissima erit.

Victus ratio debet esse quidem attenuans, ac non adeo tenuis, unde Gal. dicebat, quod sicut non una est pituitæ species, ita non una debet esse victus ratio. Decipiuntur autem qui credunt tenuiorem victum esse debere in hac epiala, quam in quotidiana simplici, cum tamen omnino debeat esse plenior, & ratio est, quia in quotidiana, peccat pituita dulcis, quæ per ulteriorem coctionem in sanguinem & nutritionem converti potest, quod de vitrea sperandum non est, eademque ratio est habenda in reliquis pituitæ speciebus præter naturam. Potus sit aqua mulla, aniso & cinnamomo alterata, vinumque addatur, apparentibus signis coctionis. Hæcque pro hac febre curanda dicta satis. *Idem ibidem.*

Febris Singultuosa.

Vir quinquagenarius, delicatè vivens temperamenti secundum totum, subfrigidi & humididi, frigidi & humididi ventriculi, denli & obeti habitus, vitam otiosam & de more sedentariam ducens, copiosis, frigidis & crassis alimentis usus, quotidianis vomitibus pituitosæ materiæ, multis abhinc annis obnoxius, sex autem abhinc mensibus, suppressis, postquam hoc autumnali tempore, frequentibus conviviis interfuit, eduliaque copiosa, ex lacte parata, & fructus comedit, incidit in febrem, quæ sub vesperam, sine evidenti rigore, horrore & frigore, quotidie, eodem modo invadit, cujus calor paulatim increvit & augetur, nec unquam valde excedens observatur, fumosus potius quam acris & aridus, cum inquietatione, siti molesta, & singultu in principio febris, continuo, usque ad finem.

nem status ejusdem perdurante, qui eidem omnino somnum eo tempore terdit. Pulsus observati fuerunt non adeo celeres & frequentes, urina crudæ, sed quodammodo crassiores. Modo intertia nos de agendis pro salute consulit.

Febris hæc quotidie, eodem modo, horis vespertinis invadens, cui fumosus nec vehemens calor succedit, in Patiente humido atque obeso, de genere pituitosarum, sive quotidianarum esse asserendum, & cum statim ab initio singultus accedat, sive potius, cum eadem febre invadat, & usq; ad statum semper, inclusive, eandem comitetur, ab hoc symptomate febris hæc denominationem suscipere solet, & quotidiana singultuosa, sive potius tantum singultuosa appellari, cum nulli alii febris singultus perpetuo, usq; ad declinationem associetur, in hepatis namq; inflammatione, à calore inflammatorio, per nervos ventriculo communicato, singultus excitatur, nec tamen febris illa singultuosa dicenda. Pariter, si in eadem inflammatione, ab hepate, humores biliosi ad ventriculum transmittantur, singultus quidem fit non autem febris singultuosa, sed necesse est ut singultus statim ab initio, cum ipsa febre quotidie invadat, & fere tota accessione febris perseveret, ut febris singultuosa nomen mereatur. Quod expressis verbis prodidit cum Hipp. Gal. dicens, Fuerunt etiam in febricitantibus, qui in singultu erodentem accerrimumq; vomuerunt humorem & vomitu à symptomate liberati fuerunt, verum, febris huiusmodi nequaquam singultuosa appellatur, namq; ut singultuosa vocitetur, permanere amplius debet singultus, vel etiam per totum morbum simul cum febre exacerbari. Hæc Galenus.

Fit autem huiusmodi febris à pituita in ventriculo putrescente, & facultatem ejusdem expultricem irritante. Hæc vero nonnunquam putrescit, ori ventriculi adhærescens, & si in cavitate, halitus tamen putridos, corruptos, acres vel acidos, atque malignos ori ventriculi communicans, vel putrescit in venis ejusdem ventriculi, & potissimum in gastrica, coronaria dicta, prout in casu præsentis dubitandum videtur, dum totum corpus obesum & humoribus pituitosis refertum est, atque antea actam ejusdem vitæ expendimus, ad copiosam atque redundantem pituitam generandam omnino idoneam.

Hæc autem pituita, non est succus ille pituitosus, qui per ulteriorem coctionem succus sanguineus evadit, in venis contentus, ad partes frigidas & humidas nutriendas destinatus, neque excrementitia illa pituita, propriè naturalis, succus scil. à sanguinis perfectione declinans, crudus & incoctus, qui in ventriculo generatur, nec naturalis improprie, ut sputa & mucositates, sed est pituita præter naturam, non per excessum caliditatis, à qua fit salsa, sed per frigiditatis exuberantiam, acida dicta, quæ tamen tantam in se frigiditatem non continet ut vitrea reddita sit, cujus copiam atque præsentiam facile attestari possunt ætas, anni tempus, temperamentum, habitus corporis, vita antea otiosa, ventrigulæque dedita, hæc autem superioribus annis, vomitu quotidie ab ipso Patienti excerni consuevit, modo vero pluribus abhinc mensibus suppressa, & in venis coacervata, ac per venas ipsas ad os ventriculi delata, ibidemque putrefacta, præsentem parit febrem,

prout & valde acida ac facultatem expultricem irritans, continuum in hac febre, usque ad declinationem, singultum excitat, donec scilicet pituita ipsa in vigore febris, à calore febrili attenuata fuerit, & os ventriculi excalefactum, tunc enim, vel insensibiliter digeritur, vel a loco dimovetur, unde cessat singultus, ut in casu nostro, cum tamen quandoque contingat, ut frigida existentente eadem pituita, debili vero febrili calore, cum ventriculi ore valde refrigerato singultus per totam accessionem quoque perseveret.

Singultum autem excitat hæc materia, non repletionem, aut inanitionem, quemadmodum fit convulsio, sed irritamento, quod est proxima causa singultus, alioquin, si concedatur repletio, & servetur Hipp. tanta hæc non est quæ continuum solvere, & dolorem excitare possit, ut in convulsione, ea tamen quæ simul cum aciditate irritamentum facere, & singultum sine dolore excitare valeat.

Febris hæc periculosa censenda est, quoniam continua, & quoniam perpetuam habet adjunctum singultum, vires debilitantem, eoque periculosior quia materiam, non ori ventriculi hærescentem, verum in venis putrescentem habet. Attamen, quoniam vires validæ sunt nec adest propensio ad vomitum ægrum nostrum defatigans & ventriculo inflammationem inducens, nec animi deliquium conjunctum habet minera, quæ non adest maligna, salus sperari potest prout quendam alium, hac febre laborantem, sanitati restitutum vidi. Sic & Cardanus duos febre singultuosa laborantes vidit & sanavit, quorum alter juvenis, alter octogenarius erat. Quod si sternutamentum superveniret, facilius evaderet curatio. A singultu enim habito, sternutamentum superveniens, liberat. Plenitudo enim violento motu opus habet ut moveatur, ait Gal. in Com. Iudicari autem solet, aut sudoribus, aut urinis crassis & acribus, aut abscessibus.

Pro curatione itaque, primo calor febrilis moderate contemperandus. Secundo materia peccans attenuanda, incidenda, detergenda & evacuanda. Tertiò singultui occurrendum. Et tandem ventriculus roborandus, quibusdam alexipharmacis non omissis.

In Chirurgico fonte, missioni sanguinis locus non est, nisi suppressa fuerint menstrua; tunc enim saphena, aut, si consuevit hæmorrhoidalis evacuatio, venæ sedales essent aperiendæ; parca tamen semper sanguinem mittendo. Cucurbitula sicca ventriculo repetita, tanquam remedium ingentis profectus proponitur ab Aët. ut quæ possit materiam impactam ventriculo, suo calore attenuare, & motu deturbare atque dimovere. Avic. verò sinapismum proponit; nisi tamen obstat calor febrilis, aut imminens inflammatio. Revulsiones, ut frictiones, ligaturæ, pedum lotiones, sinapismi & phœnigmi, convenire solent, dum halitus à minera maligna ad os ventriculi ascendunt.

Ex Pharmaceutico fonte desumenda sunt Lenientia; Præparantia, Evacuantia, calorem febrilem Contemperantia, Singultum sedantia, à proprietate Juvantia, & ventriculū Roborantia.

Primò lenientia, per superiora & inferiora exhibenda; atque in primis vomitus leniter ita provocandus.

℞. Juris carniū sem. cit. alterati unc. x. oxym. simpl.

suppl. ol. amygd. dulc. an. unc. , iii. m. pro vomit. Inde eadem crattina die præbeatur leniens.

℞. Elect. lenit. drach. vii. crem. tart. drach. iii. m. f. bol. quibus, transacta hora, superbibat Par. mulfam dilutam, ad lib. ii. vel potu.

℞. Mell. ros. solut. manna cum crem. tart. clarif. an. unc. iii. aq. cinnam. unt. f. m. f. P. & tribus tr. nactis horis, superbibat mulfam; à mulfâ verò, duabus post horis, prandeat.

Præparantia fiat ab initio leviora, deinde validiora. Oxymel statim suspectum habetur apud Hipp. & Gal. qui in singultuosa febre acetum formidandum esse præcepit.

Quare, ℞. Mel. ros. colati unc. ii. aq. cinnam. unc. i. m. pro syr. In progressu verò ad validiora procedendum. Sic Hipp. proponit laserpitii succum oxymel. daucum, cuminum. Laserpitii verò aut succus Cyrenaicus, lacryma illa est à nobis belzoinum appellata, quæ à Cyrenaica provincia ad nos transferebatur, Silphium quoque dicta; quanquam legitima nostris temporibus non habeatur. Attamen tale paretur præparans.

℞. Oxymel. simpl. diluti unc. ii. belzoini. pulv. cymini an scrup. f. aq. cinnam. unc. f. m. pro syr. matutino tempore exhibendo; sicuti nocturno.

℞. Decoct. cich. borrag. beton. agrim. pentaph. malvæ unc. vi. oxymel. simpl. unc. ii. m. pro syr. alterante & præpar. Quod si calor febrilis urgeat, addatur succus cichorei depuratus, cum minori decoctionis quantitate.

Præparati humores commodissime evacuari poterunt hiera picra; nisi calor febrilis obster.

Ut ℞. Elect. lenit. flor. cass. rec. an. unc. f. hieræ picræ drach. f. m.

Vel ℞. Elect. lenit. flor. cass. rec. an. unc. f. pil. de hiera cum agar. scrup. ii. m. f. bol. quibus omnibus superbibat aquam hordeaceam, ad lib. ii.

Evacuatur quoque materia peccans, per urinam & sudorem, si illuc vergat natura ipsa; idè ad urinam ducere poterit aqua hordei, dauco & sceniculo alterata, ex qua emuls. sem melon. diluta commodè parari poterit. Ad sudorem verò eadem aqua, cum uncia aquæ cinnam. vel semi uncia aq. vitæ, addito cornu Cer. philosoph.

Et licet in casu nostro maligna minera manifesta non adsit, aliqua tamen alexipharmaca, utilia esse poterunt; quale erit extractum de scorzon. in aqua cord. sancti, totius citri; Aqua Excellentiss. saxon. Confectio alkermes; & in progressu, aqua quoque theriacalis.

Singultum contumacè respiciunt opiata, quæ tamen in causa calida, tutiora sunt; idè in frigida cautè valde adhibenda. Philonium Romanum, apud Galen. quam maximè commendatur, sicut à nobis theriaca recens, vel laudan. nepenth. cum pulvere tormentillæ, bolus reformando.

A proprietate juvantia interna, & externa esse possunt. Inter interna, validissima sunt elixir vitæ, cum cochleari aqu. cinnam. Item rotulæ ex oleo anisor. vel ocymi, vel potissimum cymini, cum saccharo paratæ. Tertiò, balsamum naturale, ad scrup. i. in vino malvatico; vel urgente febrili calore, in aqua cord. Sax. dissolutum. Quartò, ginhiber conditum, sed recens, ad castaneæ quantitatem Extrinsecus ol. de spica, de pipere, scutella cinere quercus repleta, & vino malvatico aspersa, ventriculoque applicata.

Ventriculum roborantia erunt jam dicta, idè repetenda non sunt.

Videtur rationem quod attinet, ab initio ad tenuem vergat, sic ptisanam, cum melle dabat Hippocrat. nos cum pipere, in globulo ebullito; panatellam quoque cum cinnam. integro coctam, emulsionem amygdal. dulc. cum ptisana. Vinum album vinosum Hipp. Nos autem utimur oña panis, vino imbuta, vini tamen potu interdicto, in progressu condiendi cibis, saliva, lactureia, origano. Hæque satis pro hac febre curanda. *Idem ibidem.*

Febris Syncopalis Humorosa.

Vir quadragenarius, pinguis habitus & albi coloris, ventriculi frigidi & humidissimi, humidique capitis, delicatè vivens, multum deliquit in victus ratione; & primò æstivo tempore nuper elapso, fructus copiosos comedit, gelidas aquas, variis saporibus conditas, indulgentius potavit, & vina nive refrigerata. In prandio & cœna, de more hausit; alimenta præterea crassi succi, ut lacticia, juniores aures, anates, pisces atque conchylia, ad mensam, ut plurimum usurpavit; piscium quinetiam venatione delectatus, frequenter ante lucem surgens, sibi sonnum necessarium subripuit, sub dio, in navicula eorum capturæ hamo intentus; tandem hoc autumnii tempore, post prægressam iuappetentiam, & totius corporis lassitudinem insolitas, suppressumque pituitosæ materiæ vomitum, fere quotidianum, horis vespertinis febricitare cepit, cum extremarum partium refrigeratione, febrili tamen calore valde remisso, quod vero magni faciendum, frequens lipothymia, imo syncope, cum absoluta asphyxia, extremarum partium perfrigeratione, & sudoribus frigidis, crassis atque lentis; in quam lapsus est Patiens, non semel, sed pluries, nec solum in accessione, verum & in toto febris decursu, præcedente semper ventriculi angore, sine morfu tamen. Accessit rursus febris eadem, in eisdem horis, eodem modo & ordine, cum frequenti syncope, pulsu valde inæquali, obscuro raro & tardo, urinæ tendi, aquosæ, hypochondriorum inflatione, & facie quodammodò tumida, nonnunquam pallida ac livida, cum delatione in somnum; quæ omnia declinare videntur in ipsius febris remissione. Modo in fine secundæ accessionis, Medicus adstans, remedium administrandum anceps, ob syncopen frequenter ingruentem, Nos, de agendis consult.

Duo magni affectus, quibus Nob. noster Patiens duobus abhinc diebus conflictatur, quorum alter febris est, alter verò syncope vera atque legitima; num unius tantum radicis ambo germina sint, an diversam causam agnoscant, & a loco diverso sobolescant, non levis hucusque apud nos hæsitatio fuit; attamen, dum consideramus hanc febrem de quotidianarum genere esse, ut accessio horis vespertinis, uno eodemque modo, eodem ordine, eademque proportionem corripit, nobis significat; (quæ enim quotidie invadunt sine his conditionibus quotidianæ non sunt; dum tertianariam, aut quartanariam servantem periodum, aut duplices tertianæ, aut triplices quartanæ sunt, & nuncupantur); & præterea, ut res omnes naturales & nonnaturales; necnon syncope hæc frequens, quam à ventriculo ortam conjicimus, unde &

syncopes hæc stomachicæ, ab eodem Gal. jure merito appellantur, continent; ideo unam, & eandem habere causam, eundemque locum, quotidianam hanc febrem & syncopen ipsam obtinere credimus; licet ordine primum locum febris habeat; prout ratione dignitatis & urgentiæ, syncope ipsa; unde non hinc ratione à Medicinæ scriptoribus, febris syncopalis humorosa appellari solita fuit, ad differentiam alterius syncopalis minutæ.

Fit enim hæc febris à tanta crudorum & pituitosorum humorum copia, ut obstruant, obruant & nativum calorem onerent, ita ut syncopen inducant; alioquin ait Gal. si crassi succi, nec obstruunt, nec obruunt ac onerent, lipothymiam potius quam syncopen inducere possunt. Et licet universum corpus, una cum ventriculo, crudis hisce humoribus abundet; portio tamen putrescens, & febrem hanc quotidianam producat, intra ventriculum circa viscera naturalia reperitur ac itabulatur, cum perpetua ventriculi imbecillitate atque angore. Unde hujus febris essentia erit, quod sit continua, quotidianas accessiones, eodem modo, horis & septinis habens, cum facili & frequenti syncope; dependens ab humorum crudorum sarcina, in ventriculo potissimum sed & in toto existente, cum ventriculi maxima imbecillitate.

Crudus autem humor, à quo febris ista procedit non est ille crudus, latius modo ita dictus, quem Galen. viscoat esse sanguinem semicoctum, per ulteriorem coctionem ad sanguinis naturam pervenientem; nec est humor ille, latissimo modo ita vocatus, quem biliosum quoque crudum appellabat, nondum scilicet à natura viscoat, sed est humor ille crudus lato modo, copiosa scilicet pituita crassa & viscida, quæ obstruere, obruere atque onerare valet calorem nativum, sicque syncopen frequentem facere in tota fere febris accessione. Ad tantam autem crudi hujus humoris copiam cumulandam, non defuerunt res omnes, tum naturales, tum non naturales; Patiens quippe pinguis est habitus, ventriculi frigidi & humidi, humidi que capitis, fructibus, aquis & vinis refrigeratis atque alimentis, pituitosos humores multiplicandis usus, somnumque concoctionibus necessarium sibi met subtrahens, sub dio, matutinis crepusculis, seipsum frequenter exponens; & quod consideratione dignum, multis abhinc mensibus suppressam per vomitum pituitosæ materię evocationem passus; à quibus omnibus facilis fuit copiosæ pituitæ, crassæ, viscidæ & lentæ productio atque retentio, ex qua & febris, & grave symptoma, syncope scilicet, tandem ortum duxerunt; hinc calor febrilis non adeo intensus; hinc pulsus, valde quidem inæqualis, obscurus tamen, rarus & tardus; hinc urina tenuis & aquosa, hypocondriorum inflationes, facies quodammodo tumens, nonnunquam vero pallida ac livida, cum delatione in somnum; quæ omnia hanc febrem reliquis omnibus quotidianis pituitosiores ostendunt; sicut veram atque legitimam syncopen, præceps omnium virium lapsus, cum perfecta asphyxia, externarum partium omnium perfrigeratione, & sudoribus frigidis, crassis atque lentis, utpote non diaphoreticis, sed verè syncopæicis.

Febris hæc semper periculi plena est; etenim,

si cum Gal. longa, nec sine periculo est quotidiana quid erit pronuntiandum de hac febre, quæ omnium maxime pituitosa est, & syncopen mortis imaginem habet adjunctam? Periculum autem patet, tum ex parte causæ febris, insignis enim adeit cruditas, unde cibus exhiberi non potest, ut inducatur concoctio, vires vero ipsius ægri sine cibo labuntur; tum ex parte remedium, quæ administrari nequeunt ob syncopen frequentem, non abscedente interim ipsa febre. Lethalis autem, & omnino impossibilis curatio, evadit, tribus casibus. Primus, dum totum corpus fuerit crudis humoribus plenum; tunc enim adeit causa letalis. Secundus casus, quando succi non modo crudi, sed corrupti sunt adeo, ut appareant signa contraria coctioni. Tertius, quando languentibus viribus, aliquis visceris inflammationis superveniat. Quæ in casu nostro, febris hæc parum à lethali abesse videtur; cum in toto quoque humorum cruditas reperitur.

Verum, quoniam in febris declinatione syncope nonnulli cedere videtur; ideo omnino explorata salus non est, quanquam spes augeretur, si urinx crassiiores & pallidiores redierint.

Pro regulari curatione. Primo, materia cruda frigida & pituitosa esset attenuanda, laceranda & detergenda. Secundo, evacuanda. Tertio, ventriculus roborandus. Quarto, vires ejusdem & totius conservandæ.

Verum, quoniam hic, symptoma, nimirum syncope urget, coacta non regularis adhibetur curatio, symptomati occurrendo, unde Gal. spem totam collocat in frictionibus, quiete & inedia; quod desumpsisse videtur ab Hippocrate, à quibus dissentiunt Arabes, Avic. Rhassidus & Averroes. Tral. quoque, & c. Recentioribus Mercatus, Saxon. & alii, quorum aliqui voluerunt cibum esse offerendum, alii medicamenta evacuantia præbenda; nonnulli quinetiam sanguinis missionem admiserunt, & tandem frictiones propositas, alii tanquam suspectas, omnino damnaverunt.

Nos autem, pro tuta ac methodica hujus febris curatione, circa tres scopos perpetuo versandum censemus. Et primo quidem considerandum esse partem affectam, nimirum ventriculum ipsum. Secundo, materiam peccantem, pituitosam scilicet & frigidam. Tertio, vires ipsas. Ex quibus omnibus, urgentiori semper incumbendum, cæteris omnino non neglectis.

quod si itaque ventriculi passio urgeat, & frequentem syncopen inducat, adversus hanc nostra intentio dirigenda; cum legitimæ curationi, quæ est causarum ablatio, locus non detur, nec tempus concedatur; ideo præsentem syncopen, cum à caloris & spirituum suffocatione proveniat, calor in corde suffocatus, foras est evocandus; facultas excitanda, & spiritus vivificandi, internis & externis. Inter interna, liquida sunt eligenda; tum ad faciliorem introductionem, tum ad celeriores operationem. Sic præstantissima est aqua theriacalis; aqua totius citri mista: Pariter aqua cord. prima Sax. Oleum cinnam. ad gurt. ii. in aqua scorzon. Quinta essentia rosis marini. Omnium maxime spiritus revocat, & vires restituit vinum; utpote quod quam celerrimè nutrire dicat Galen. citissimè namque concoquitur atque distribuitur, quia minima indiget alteratione;

ratione; unde maximum penetratorem hoc appellabat Avic. ut jure merito Aret. in solo vino refrigeratis spem vitæ reponat. Sit autem, neque aqua frigida dilutum, quo uti solebat Gal. neque meracum. Non primum, ob insignem ventriculi imbecillitatem, & frigida materiz præsentiam; non secundum, ob febrilem calorem, metum inflammationis internæ. Sit insuper nigrum, austerum & subitpticum, non generosum. Quandoque tamen syncope adeo diuturna atque pertinax est, ob crudi humoris copiam, frigiditatem atque lentorem, ut posthabito febrili calore, ad validiorem attenuationem & calefactionem, aqua vitæ quoque uti cogamur; quæ ita paranda.

℞. fol. melissæ, pulegii, majoranæ, an. hos, ros. rub. an. pug. i. caryophyl. cinnam. macis, cardam. an. drach. i. officulor. cord. Cer. n. ii. santal. citrin. drach. ii. moschi gr. v. incidantur incidenda, contundantur contundenda, & macerentur in sufficienti quantitate vini albi optimi; mox destill. B. M. cujus cochlearia frequenter præbeantur.

Extrinsecus, mos invaluit ut in syncope fiat aspersio in faciem, vel aqua frigida simplici, vel rosacea, vel vino albo adstringenti; quam proponit Gal. reprobatur vero Avic. Gal. quidem, in defectu spirituum, ut retrahatur in auxilium cordis. Avic. vero eam jure merito reprobatur, quando à spirituum suffocatione procedit syncope, ut in casu nostro.

Conveniunt itaque potius cucurbitula sicca, frictiones, calorem nativum excitantes, cutim universam rarefacientes, & humores crudos attenuantes, ac in halitus digerentes, oleis laxantibus, prius in vino malvatico fervefactis. Sic extremarum partium madefactiones, aqua vitæ caryophyllata, calidis manibus factæ: Cordi quoque epithemata & inunctiones conveniunt.

Ut ℞. Aquæ melissæ lib. i. aquæ Flor. citri, ros. vini malvatic. an. lib. s. aceti ros. unc. iii. troch. de gallia mosch. scrup. s. camphoræ gr. v. m. pro epithemate cordis.

℞. Ol. de scorpionib. Matthioli drach. ii. Troch. de gallia mosch. scrup. s. aceti ros. par. m. fiat linum. amoto epith.

Secundo loco materia consideranda venit, quæ evacuationibus, calefactionibus & attenuationibus egerit sed in his intentionibus explendis, tanta semper fuit inter medicinarum Principes dissensio atque diversitas, ut apud Recentiores adhuc sub iudice lis esse videatur.

Primo enim, in fonte Chirurgico, sanguinis missio à Gal. aureis verbis omissa fuit, dicente. Nulli talium sanguis mitti sine maximo dispendio solet; cum tamen evacuationem desiderant; verum nec sanguinis missionem, nec purgationem sustinent, utpote quod sine his syncope facile adoritur, multò verò facilius cum his. Tral. verò, quem sequuti sunt & Rhafis & Averr. sanguinis missionem convenire contendunt. At tamen, parum aut nihil à Gal. jam dicti magni Viri dissentire videntur, dum conveniunt omnes in indicante, quod scilicet conveniret; sed neque discrepant in permittente; etenim & ipse Tral. subdit, quod si vires imbecilles fuerint sit abstinendum. Quoniam verò vires neque præsentis, neque futuræ, in syncope, & insigni humorum cruditate constare possunt; idcirco in

casu nostro, ut & frequentissimè in omnibus hisce febribus, à sanguinis missione abstinendum; relicta Recentiorum inepta illa decimone, quod humor considerari debeat, num crudus, vel semicrudus, vel extreme crudus fuerit, ad sanguinis missionem statuendam.

De medicamento exhibendo, pro minoratione pituitosæ atque crudæ materiz, pariter dubitatur. Gal. enim apertis verbis, ut superius visum fuit, neque minorationem per medicamentum admittit, quod accepit ab Hippoc. cujus quineriam opinionis fuit Orib. & Paul. dicentes. Neque venæ sectionem, neque purgationem terunt; namque sine his derepente in syncope cadunt. Quos sequuti fuerunt Arculanus & Recentiores multi; imò & hoc idem experientia comprobavit ipse Gal. dum ventriculo afflicto, & nondum ad synopen perducto, multos vidit defunctos, quibus medicamentum fuerat exhibitum; Quid igitur dicendum erit præsentis syncope?

Sunt tamen non pauci, Tral. Rhafis, Averr. Mercatus, Sax. & alii plurimi, qui medicamentum minorativum libenter exhibent, dicentes, quod leniter imminuta humorum copia, recedit syncope; & ita reliqui crudi humores commodius præparari possunt; additque Tral. quod cum vires à copia suffocentur, de copia modicum subtrahere est necesse, cum frictionibus, cæterisque à Gal. propositis, humores adeo copiosos & crassos attenuari & discuti posse, impossibile videatur, & si fieri possit, non nisi longo tempore; quam diuturnitatem febris hæc cum syncope tolerare nequit.

Decisio itaque adeo gravis controversiæ sit, quod cautiissime, in hoc magni momenti negotio sit procedendum; ab Hipp. edocti, quod absolutissima tum custodia, tum diligentia in hac febre curanda opus sit; adeo ut si syncope toto paroxysmo perseveret, impossibile sit medicamentum solutivum exhibere, qualecunque fuerit; ventriculo namque perpetuò afflicto afflictio addenda non est, alioquin stomachicæ syncope irrevocabiles sunt atque lethales, ut observavit Gal. At si in accessionis declinatione cedat ipsa syncope, ut in casu nostro, & ut frequentissime accidit, prius roborato ventriculo, aliqua crudæ materiz minoratio procuranda, clystere prius, mox etiam vomitu, si ad vomitum pronus sit Patiens. Interim attenuantia, & concoquentia præbeantur, ut medicamentum leniens, si non antè quartam, paulò post tamen exhiberi possit. Exercitatum autem Medicum, vel saltem valde cautum desiderat huiusmodi febres.

Ad praxin itaque ut revocentur omnia; primò Clyster paretur ex decoct. malv. mercur. betæ, chamæm. in aqua hordei; addito melle ros. cum oleo amygdal. virello ovi & sale. Primò autem, mel ros. non sit solut. & adhuc minus, addenda hiera, diaphcen. quæ in progressu, concocta & attenuata materia adhiberi poterunt; injiciatur verò extra accessionem syncope. Secundò, vomitus provocatio dubia esse solet; cum enim materia valde cruda, viscida & tenax sit, à debili vomitorio procul dubio educi non poterit, sicut à validiori valida quoque agitatio excitabitur cui facillius syncope succedit. Nihilominus, provocandus vomitus si prius spontè procedat, vel saltem Patiens, ut in nostro casu

asū ad eum sic pronus; eò enim evacuatur saltem materia inuacans, & manus adhærens. Quare, leve vomitorium sufficiet.

Ut ℞. Juris carniū sem. citri alterati unc. viii. oxymel. simpl. ℥vi. m. In progressu verò, magis concocta materia, succus raphani addi poterit, vel pulvis asari, vel semi uncia diarsari Fernelii. Tertiò, medicamentum poterit esse mel. ros. solut. cum manna clarif. & tart. aqua cinnam. aromatiz. vel lenit. cum tart. cassia quoque, urgente febrili calore, cum tartaro; suo namque lentore & ipsi m. pituitam quoque ducit, ut notabat Mel. In progressu vero, additur hiera, imò & pul. de hiera ipsa, cum agarico; quibus omnibus mulla diluta, ex aqua hordei parata, ad lib. i. s. vel ii. superbibenda, ut ab ea sequatur ablutio. Circa medicamentum exhibendum, observatione dignum est quod à potione, quantum fieri potest, sit abstinendum, & potius forma solida exhibendum sit; potio namque majori vehementia operatur, si que maiorem in humoribus commotionem excitat, & ventriculum exolvit, unde facilius in yacuum lapsus.

Præparantia sint attenuantia, incidentia, detergentia, & quidem calida quantum febrilis calor perterre potest. Sic Hipp. oxymel aquosum proponit. Gal. mullam crudam, ut ut magis subducentem, & minus nutrientem, proponit etiam oxymel cum hyssopo. Oribasio placuit mulla diluta, decocta; imò & ipsi Pau. o. Nobis autem hæc sunt in usu.

℞. Oxymel. simpl. unc. ii. syr. de cortic. citri unc. i. vel.

℞. Oxymel. simpl. mel. ros. colat. an. unc. j. s. aq. emulsi. unc. s. m. pro syr. & sic pro aliis; cui in progressu addatur modicum juris, hyssopo prælio & menta alterati.

Hæc agend. in casu nostro, quoniam in febris declinatione syncope cedit, at si in tota accessione perseveraret, vix clyster. nedum vomitorium. minusque medicamentum administrari posset, quo um loco, in frictionibus potissimum & in dia, totam curationis spem reponit Galen.

Li et autem iste quintetiam curandi modus suas nibeat objectiones, & primo quidem, cum redonditibus crudis humoribus prohibeat Galen. frictiones, exercitationes. & quemvis corporis motum. Secundò, quod corporibus impuris exercitationes prohibet Hipp. Tertiò, quia in diarrhœa ex cruditate, prohibet Gal. abstergentia & cutem deobstruentia, attamen, omnibus concessis, quoniam longè majus ex his sequitur beneficium quàm danum, ideo frictiones sunt adhibendæ.

Sed ne error aliquis committatur circa frictionum usum, in hac febre, quæ nullum vel minimum errorem admittere potest, quinque sunt consideranda. Primum, finis ob quem instituntur. Secundum, quæ partes corporis sint fricandæ. Tertiū, quales frictiones esse debeant. Quartum, quo instrumento. Quintum, quantum.

Primum quod attinet; frictiones primò facultatem emorientem excitant. Secundò, humores crudos & copiosos, spiritus & calorem suffocantes, à corde divertunt. Tertiò, eosdem humores attenuando ac resolvendo, diminuant.

Quarto porositates aperiunt, ut facilius insensibiliter resolvantur.

Quantum ad secundum, in primis crura & coxas fricare oportet, ad interiora trahendo, ut major har divertio. Secundo, brachia & manus, à spatula incipiendo. Tertiò, à collo ad spatulas, per latera.

Quoad tertium, incipiendum à fortioribus; nam materia in principio frigidior & crassior est; prout & porositates obstruitur valde; unde Avic. usque ad abrasionem cutis, nos autem usque ad ruborem; in progressu verò, materia magis attenuata leviores sunt.

Quarto, sicut panno aspero, fumigato potius suffumigio ex ligno aloes, nioicho & cinnam. ex Avic. vel cum Gal. laxantibus oleis atque digerentibus; quibus nos & spiritum vini addi posse credimus.

Quintò, licet Avic. iubeat perpetuò frictiones esse faciendæ, vel cum somni exclusiones; cautè tamen agendum, ne acri pereant iracundum insensitia, ut observavit Ital.

Tertiò & tandem, vires ventriculi, cordis & totius sunt conservandæ; in quem huiusmodi præstantissimum atque suavissimum huiusmodi p. retur.

℞. Vini medicinalis lib. j. aq. ros. unc. iii. caryophyl. cont. drach. s. cinnam. contul. drach. j. in sindone ligentur; mox adde sacchari huius unc. iv. & bull. lento igne, ad ulapii consistentiam, cujus cochlearia frequenter assumat latiens. Pro ventriculo verò, potissimum erit ol. juniperinum; vel cinnam. ad gutt. j. in cochleariaque cinnam. pariter & ol. zedoariz, cum intrinsecus, tum extrinsecus.

Vires totius congrua victus ratione conservandæ. Et primò aer, nec valde calidus, nec valde frigidus sit, suffumigio alteratus ex ligno aloes, santalis citrini, cortic. citri & cinn. m. in aqua ros. & è flor. citri fervefactis. Victus ratio valde tenuis, cum Hipp. cui subs. ripit quoque Gal. nihil enim ab initio, præter oxymel aquosum afferebat; addunt tamen, dum vires consent. Nos, tribus primis diebus, solam prisanam offeramus; secundis, addamus pulli inflaurans; postremis, attenuata valde materia, ova recentia & pulli contusa. Vinum quoque conceditur, dilutum, etiam in cibo. Juscula alterentur quoque cinnam. caryoph. nuce n. yristica. Somnus, licet concoquat, tempore tamen præsentis & imminens syncope, interdiciendus. Quies omnino necessaria; adeò ut neque ad ventrem exonerandum neque ad meiendum surgat; domumque obscuram, & lectum mollem habeat, ex Hipp. Venter clysteribus sollicitetur, & tandem animi accidentia, quæ possint virtutem exolvere atque agitare, sunt devitanda, licet nonnulli iram moderatam juvare crediderint. Et hæc, pro tantæ febris curatione dicta sufficiant. *Idem ibidem.*

Febris Syncopalis Minuta.

Vir 40. annum agens, ten peramenti totius & jecoris, calidi & sicci, gracilis habitus, & quodammodo squalido aspectu, post siccam præteritam anni constitutionem, & longum iter sub radiis solaribus, vina meraciore pot. ns, & vigiliis nimis indulgens; suppressa quoque frequentia diarrhœa biliosa, plurimum salubri, tandem

primò est impedienda; & secundò, eorum regeneratio procuranda. Sic itatim aspergatur facies, vel aqua frigida simplici, vel aqua rosar. vel aqua, vino adstringenti mista, ut cutis densetur, spiritus retrahantur, & effluvium prohibeatur. Secundò spirituum regeneratio procuranda odoribus. Sic naribus admoveatur panis calens, vino, vel aqua cinnam. aspersus. Sed quoniam ententia virium, quibus regitur corpus, non in spiritibus solis, sed in solidorum temperamento quoque consistit, ideo utraque integra conservanda. Et ideo partes solidæ quam celeritè instaurandæ; etenim, quæ longo tempore extenuantur corpora, lente recedere oportet; quæ vero brevi, breviter. Cum itaque odore solos spiritus, non solida nutrant; ideo solidis, alimento succurrendum & quidem potius; facilius enim est impleri potus, quam cibo; sic præbeatur vinum, frigida dilutum. Interim facultas excitanda extremorum contorsionibus, pilorum evulsionibus, vociferationibus & huiusmodi aliis spiritus non dissolventibus.

Remota syncope, febrilis calor contemperandus, & biliosi ac tenues humores præparandi hac potione.

℞. Aq. de succo acet. de cucurbita, de anguria an. ℥ss. syr. de ribes, de agresta, de portulaca an. ℥ss. m. pro primo alterante. Pro secundo vero, in majori declinatione.

℞. Juris alterati cich. endiv. acet. portulaca, violis. nenuph. hepat. ℥vj. succi cit. ℥ij. instaurantis pullæ cochlear. j. m. tribus autem trajectis horis ab hoc iure, offeratur cibus plenior, præmittendo bolum hyacinthium, cum aqua totius citri & scorz. Cibus autem sit pristina hordeacea acida, scil. cum agresta, cum pullæ instaurantis, & ossa panis, in vino nigro austero imbuta, vinum quippe dilutum necessarium maxime exultimant Medicinæ Principes: p. uis vero horis ante novam accessionem, cibus rursus exhibendus, ut necessarium censuit Gal.

Et nisi virium lapsus ægro interitum minetur, sub pleniori cibo, exhiberi poterit cassia cum pulpa Tamarind.

℞. flor. cass. rec. extr. drachm. vii. pulpæ Tamarind. drach. iij. m. f. bol. hora una ante cibum exhibendi.

Jam dictis omnibus congrua & accurata vitæ ratio addenda. Sic aer frigidus paretur, infusione frigida putealis, cum frondibus, virtute & acie frigidis. Cibus sit jam præscriptus, sed præterea, concedi possunt fructus aliqui austeri, ut mora, cerasa austera, & nostro potissimum Patienti, perlica cocta. Potus consuetus, ita aqua acetosa, cum julap. ros. aut vino granati præter ossam panis, vino austero imbutam. Somnus, sicut præsentè syncope, interdicens, ita extra syncopem erit omni arte procurandus. Quies quam maxime conducit. Inanitio semper in hac febre est repletionis periculosior, & ideo ut dixi, parum & sæpe Patientis nutriendus. Excrementa, clysteribus ex lacte butyro & saccharo paratis, educenda. omnibus animi passionibus est ablegandus, & confidenti animo recreandus. Quæ pro hac syncopali minuta simpliciter, curanda dicta sunt. *Idem ibidem.*

Febris Amatoria, sive Ictericia alba.

Nobil. & formosa Juvenis, 25. annum agens, temperamenti calidi & humidicarnosi habitus, & antehac rosei coloris, tribus abhinc annis cogitabunda & molta præter consuetudinem esse cepit, cum ob egestatem Patris, Viro nubere non posset: hinc vigiliis subortis, & querelis de ventriculo male affecto, rugitibus hypochondriorum, mentis quoque interim immutatis: roieus faciei color in album, & mox in pallidum conversus est, timores ac motores accesserunt, cum capitis gravitate, necnon pulsatione spirandi difficultas, cordis tremores, cibi fastidium, stupor & torpor, cum febre inordinate repetente, in dies quinetiam leniper magis magisque immutata, imò tandem omnino suppressa menstrua fuerunt: supervenientibus totius colore livido atque plumbeo, palpebrarum & crurum intumescencia, omnium membrorum gravitate, & virium languore: quibus demum accesserunt strangulatio, sive prætoratio, & Delirata phantasmata. Tandem a Religiosorum exorcismis & signis nullam operam experta, ad Medicorum manus confugit: quibus & mihi accersito, abdomine contractato occurrerunt in uteri regione ac mesenterii, obstructions: febricula circa vesperam quotidie, cum horrore invadente, non adeo intenso calore: molesta tamen, nec sine aliqua, nocturno potissimum tempore, mentis alienatione. Modo Parentes moliti insignem adeo mutationem admirante, causamque horum ignotam existimantes, nos omnes in subsidium advocant.

Hanc febrem, quam Hipp. erroneam, non sine ratione: alii febrem albam, sive albam ictericam nuncuparunt: albi namque & frigidi humoris plurima symptomata indicium præbent. Primo siquidem menstrua suppressa, in juvenili ætate, temperamento calido & humido, nativum calorem suffocando, in toto frigiditatem induxerunt, non parum ad id conspirantibus obstructionibus in mesenterio & utero, forsitan etiam in cava jecoris observatis, quæ naturalis caloris ventilationem prohibentes, ejusdem suffocationem fovant, unde horum symptomatum plurima frigidam intemperiem attestantur.

Hujus autem affectus Virginei causa primitiva, fuit intensa meditatio hujus Virginis, quæ a vocato nativo calore & spiritibus a ventriculo, cruditates genitæ fuere, obstructionum in venis lacteis & mesentericis origo: unde hypochondriaci affectus ortus, & de ventriculo male affecto, & hypochondriorum rugitibus querelæ: inquinata quinetiam universa massa sanguinea: quæ crassior reddita, nec uteri venas statutis temporibus libere permeans, ac in iisdem stibulans, obstructions in utero quoque congestit, & mensuram purgationem diminutam reddidit: quibus adjectis, perfecta eorumdem suppressio subsequuta fuit: sanguis enim effluxum non habens præ multitudine, resilit in cor & septum. Quando vero hæc repleta fuerint, cor satuum litidum de ex satuitate, torpedit, postea ex torpedine delirium apprehendit: sicut, cum aliquo longo tempore delidente, sanguis ex coxis & femoribus depressus, in tibia ac pedes, torporem inducit: a torpore autem pedes ad iter faciendum.

impotentes sunt, donec sanguis ad se ipsum revocatur. Hæc habet Hippoc. quibus subdit. Revertitur autem celerius; cito enim propter venarum rectitudinem refluit, & locus corporis non est periculosus; at ex corde & septo tardè refluit; venæ enim obliquæ sunt, & locus periculosus, & ad delirium ac insaniam paratus. quum enim hæ partes repletæ fuerint, & horror cum febre ingruit; quas febres emoneas appellant. His autem ita se habentibus, præ aducto calore insanit, præ caligine timet atque formidat; præ compressione circa cor, strangulationem & præocationem patitur; præ sanguinis multitia, animus mortens & anxius, malum attrahit.

Nos verò addamus, quod totum, non solum cacochymum, sed cachecticum quinetiam redditur; ut patet ex colore totius adeò vitiato, virum languore, & palpebrarum ac pedum intumescencia.

Verum, nec à solis suppressis menstruis; sed à retento quoque semine malum hoc provenire posse, innuere videtur Hippoc. dum, Virgines liberari a se, si aut Viro cohabitent, aut menses suboriantur; præsertim verò in hac Virgine, temperamenti calidi & humidum, & boni habitus. Verum, cum jam menstruorum suppressionem, tanquam causam evidentissimam habeamus; adeò seminis retentioni uteri præocationem, potius quam febrem hanc erroneam tribuamus.

Ue autem ab hac febre vindicetur Nob. ista Juvenis, & in pristinum redigatur status, res adeo negotiosa atque difficilis est, ut exercitatus quoque Medicus, in tota curatione anceps & dubius, medica semper auxilia sit administraturus; totum eam habitum renovare, & menstrua revocare oportet, metu alioquin, ne ad hydropem præceps ruat infelix Juvenis.

Nec in præsens Hippoc. monitum locum habere poterit, nisi prius massa sanguinea purificetur, & ad laudabiliorem statum redigatur.

Quod ut assequi valeamus. Primo ventriculi & primarum viarum expiatio præmittenda. Secundo, mesenterii & lactearum obstructions referenda. Tertiò totius venosi generis cacochymia est auferenda. Quarto, incipienti cachexia insuper prospiciendum. Quintò, menstrua hystericeis aperientibus sollicitanda, necnon interim iisdem a proprietate juvantibus, symptomatibus occurrendum. Ac tandem viscera roboranda. Quæ omnia jam præscripto ordine sunt executioni mandanda. medicis auxiliis à tribus fontibus desumendis.

Et in fonte Chirurgico, de sanguinis missione sicut dubitari non potest, cum hic peccet copia, substantia & motu; ita in præsentis statu, cautè agendum circa quantitatem; jam enim sanguis in cacochymiam deservit. Et licet Hipp. doceat, quod huius affectus curatio, sit sanguinis detractio; id tamen jubet in principio esse faciendum antequam totum corpus cacochymum, & minus adhuc cachecticum reddatur, unde in diuturna & confirmata suppressione, idem Hipp. ventrem sursum atque deorsum purgat; quoniam cacochymia non sanguinis missione sed purgatione tollitur. Hinc à copiosa diarrhœa Ancilla illa restituta fuit. Quod videns Gal. carnosus & albicantibus, scarificationes potius

quam venæ sectionem præscribat.

Locus autem sit jecoraria dextera, ut detrahatur, non subtrahatur sanguis, prius quam obstructions uteri referantur, & perviæ reddantur; tunc enim & saphena aperiri poterit, sanguinem educendo tantum, ratione motus.

Interim cauterium coxæ inurendum. Dereliquis autem topicis infra.

1. ro ventriculi exinanitione, Pot. ex manna clarif. vel elect. lenit. cum tart. Ad primarum viarum præparationem, oxym. simp. mel. ros. simp. an. unc. j. f. aq. cum. unc. f. m. pro syr. & sic pro aliis v. Mox repetatur alterutrum jam dictorum medicamentorum.

Indè mesenterii & lactearum obstructions, attenuantibus, aperientibus, & evacuantibus sunt curandæ. Præparans igitur ita pareatur.

℞. Succ. cich. depur. unc. ii. succi borag. unc. j. tart. vitriol. gr. x. decoct. cich. borrag. end. pentaphyli, petroselini, agrim. unc. v. m. pro syr. ante auroram exhibendo; cui præmutatur oxymel dilutum, ad unc. ii. quibus decem dies insitendum; atque intermedio intervallo. præbeatur hoc.

℞. pil. de Tribus cum rhab. de hiera cum agarico, an. scrup. ii. elect. lenit. drach. vi. m. f. b. Decem verò transactis diebus.

℞. electuar. diacathol. drach. iv. rosat. Mes. drach. iv. pil. de Tribus drach. j. m. ref. bol. quibus, transacta hora, superbibat jus hordeo alteratum; vel aquam hordeaceam.

Ad accuratam vero ventriculi & intestiorum detersionem, & abluionem, aqua Tetruciana, tribus diebus, cum vehiculo mell. ros. sol. de more offeratur.

Cacochymia, à sanguine, per epicrasin auferenda, præparatione, atque frequenti expurgatione; neque febricula pertimescenda; in hoc enim casu causa omnino incunabendum, habita febris perexigua ratione. Instituaturs itaque tale præparans,

℞. Succ. depur. cich. borrag. agrim. fumariæ an. unc. j. decoct. cich. borrag. mellissæ, beton. agrim. cardui sancti, absinth. unc. iv. m. pro syr. & sic pro aliis; & nisi renuat Nob. Virgo, addatur quoque oxymel. squillit. unc. j. His autem duodecim diebus insitendum; sed quarto quoque die hoc præbendum.

℞. Decoct. epith. Mes. unc. vi. vel, si bolos potius eligat.

℞. Extracti sennæ drach. j. helleb. nigri drach. f. elect. lenit. vel flor. cass. rec. unc. f. m. f. b. quibus superbibat serum deput. quippe veratrum vin in se obtinet valde exurentem.

Tribus hæc purgantibus assumptis, totam venosum genus ab impuritatibus defæcatum esse fidendum non est. Quare repetenda purgantia, quæ aperiendi quoque facultatem habeant. Instituaturs itaque huius liquoris usus.

℞. Radic. petroselini, sceniculi, asparagor. apii an. unc. ii. fol. agrim. capil. ven. hyssopi, prassii, pulegii, calamenti montani, an. m. j. agarici troch. unc. i. f. fol. sennæ rec. mund. unc. v. epith. unc. ii. radic. veratri nigri unc. f. cinnam. integri unc. f. aquæ agrim. capil. ven. an. lib. j. m. inaccet. tur omnia viginti quatuor horas: deinde fiat fortis expressio; & colat. adde sacchari fini q. f. bull. ad syr. consistenti. m

tiam, cui mox infunde rhab. opt. unc. j. spicæ scrup. j.

Hujus autem unc. ii. præbeantur quotidie, in semi cyatho vini albi, tribus vel quatuor horis ante prandium, persistendo in hujus usu ad dies x.

Hinc ad cachexiam intenti, carnosam partem depurantia, & à pravis humiditatibus vindicantia administranda forent, diaphoretica scilicet sensibilibus evacuantia, & insensibilibus digerentia; cui intentioni satisfacere poterit sudor, præmisso convenienti decocto; vel viperini pulveris diuturnus usus. Verum, quoniam uteri venas aperire, menstrua provocare, & universum corpus, per vias illas naturæ proprias atque consuetas expurgare, potissimum noster debet esse scopus: ideo, ne a centro divertantur ad circumferentiam humores, hac posthabita intentione, hysteriæcorum aperientium & menses moventium usus erit prius usurpandus.

Ad uteri contumaces obstructions referandas, chalybis usus ab omnibus medicinarum Professoribus extolli solet, & præsertim potabilis M. D. cujus vis ut ad uterum perveniat, vehiculo uterino indiget. Paretur itaque decoctum, quod & id præstandi, & totum exsiccandi facultatem obtineat.

Uc ℞. Salsæ optimæ unc. j. guajaci pinguis, radic. gentianæ, ligni assafras an. unc. f. aq. stillac. cich. capit. ven. artemisiz an. lib. j. m. f. inf. per horas xxjv. deinde bull. ad consumpt. dimidui, & colat. servetur pro duabus vicibus, summo mane exhibenda; cui addantur chalybis potabilis M. D. gutt. aquæ sabinæ cochlearium; vel ol. ejusd. gutt. v. cujus loco, præmitti posset bolus ita paratus.

℞. Troch. de myrrha scrup. j. salis artemisiz gr. vi. m. ref. b. j.

Extrinsicus quoque venarum apertio procurari debet, non quidem pislariis aut injectis, sed forinsecus admotis. Tale igitur paretur fomentum.

℞. Fol. malv. meliloti, origani, pulegii, calamenti, mercurialis, matricariæ. an. m. f. sem. fœnic. apii. ameos, an. unc. f. radic. altheæ, lil. alb. cyclam. an. unc. j. aquæ comm. lib. x. m. bull. ad consumpt. quartæ partis; cui in fine, adde vini albi generosi cyathum unum, & spongia magna foveatur uteri regio: eandem partem, post solum, illinendo ol. lil. alb. aromatizato. Infusiones quoque in aqua sulphurea Aponensi, efficacissimæ erunt.

Hysteriæ symptomatibus occurrentia esse poterunt, aqua theriacalis, cum aqua totius citri. Oleum succini ad gutt. ii. in aqua cinnam. Theriaca mediæ ætatis: vel Triphera sine opio, cum aqua pulegii, aut matricariæ.

Tandem viscera roborabunt magni antidotæ, sales theriacales, sal absinthii, mentæ. Vinum ad mensam, roremarino, ligno indico, assafras, medicatum sit.

Quibus omnibus congrua addenda victus ratio, non tenuis, sed attenuans. Hæcque dixisse satis, pro exacta cognitione, & curatione hujus febris. Idem idem ibi.

Febris Lenta.

Mulier quinquagenaria, temperamenti co-

tius & jecoris, ad calidum vergentis, potius carnosa: cui jam menses abunde fluxere, quatuordecim abhinc mensibus, isdem omnino suppressis, valetudinariam semper vitam duxit: & potissimum circa hypochondria frequentes molellias percepit, cum appetitus prostratione: cujus causa edulsi pravi succi, de more usa est: unde floridum totius colorem deperdere, & pondus quoddam in hypochondrio dextro percipere, ac tandem, tribus abhinc mensibus, leviter febricitare cepit: qua tamen non obstante febricula, ad amœnissimum suburbanum secessit, ubi solutam adhuc magis vitam agens, fructus & herbas frequentissimè comedit, vina bibens dum quandoque à febre se immunem crederet: & ideo non nisi transacto integro mense donum, in urbe, reversa, medico se tradidit: qui febrem tollere curavit lenientibus & præparantibus: sanguinem quoque misit ex pede: quod tamen ex voto non successit, hepate adhuc tenso atque repleto, cum dolore ad tactum, muliere forsitan continuo in eadem victus ratione peccante. Idcirco, pro hac febricula sananda, ad consilium accessit fuimus.

Si morbi qui omni periculo vacant, multis magnisque deinceps erroribus commissi in lethali naturam vertuntur, quid mirum si febricula, Mulierem hanc Nob. molestant, ob errores committos diuturna evaserit? quinimo mirandum quod acuta atque lethalis facta non fuerit: cum non levem causam ab initio quoque habuerit. ab intempestiva menstruorum suppressione ortam, siquidem, cum in Patientem, calido & humido temperamento à natura prædita, & sanguine abundanti, supra quinquagesimum quatuor annuum expurgari debuissent, immaturè suppressa, non quidem in venis uteri, cum non appareant hysteriæ affectiones: sed in toto venoso genere, regurgitarunt ad hepar, in cujus vasibus obstructions coacervare cœperunt. Et quoniam ex vaporibus, ab isdem, ad ventriculum elatis, & appetitus & coctiones labem aliquam acquisiverunt, hinc Pat. ad appetitum excitandum, alimentis prava conditionis usa est; à quibus, cruditatibus congestis, obstructions in dies majus semper incrementum susceperunt; quæ tandem, impedita libera ventilatione, putredinem contraxerunt, & febriculam excitarunt: ut mirum non sit si antehac affecto jecore & pravis edulis nutrita, floridus totius color fuerit corruptus: ex cujus solo vitio Gal. primo aspectu hepaticos cognovit. Hepaticam autem mulierem hanc nuncupamus: quia non solum obstructions, ex humoribus crassis atque tenacibus, in vasibus existentibus, verum & in ipsa carne, sive hepatis parenchymate reperiuntur: ubi temporis progressu, vel inflammationem excitare solent: vel corruptæ, febriculam, ut in casu nostro, quæ non solum à Patientibus, verum & ab imperitis medicis non raro negligitur.

Hæc autem febris, lenta appellari solet: de qua fusè verba fecit Fernel. quam fieri asserit ex latente obstructione atque putredine, quæ viscera contumaciter adhaerere impaetque est: adeo ut substantia visceris plerumque labefactetur. Hæcque, innuere voluit Gal. dum dixit, quod sæpe splenis aut hepatis affectus febres inferunt.

tus neque coacervatus est: à quo tandem lien infectus, obstructus & durus evasit. Crudos vero humores facile congellos fuisse credendum: cum liberam vitam semper duxerit. Patiens in omnibus rebus nonnaturalibus, & potissimum cibo, potu & venere. Errores autem in potu, primis diebus, in cibis, potterioribus, novas cruditates adauxerunt, & antiquarum coctionem retardarunt atque impediverunt: non parum quinetiam prohibente anni tempore autumnali, quippe a jam dictis humoribus, sanguine nistis, antehac per venas sedales expurgari consuetis, nunc vero suppressis, & in venis putrescentibus, febris hæc ab initio ortum duxit: qui cum biliosi, melancholici & pituitosi fuerint, non adeo facile à natura attenuari, legregari, concoqui, & excerni potuerunt. sed in progressu ad venas interiores, ramos scilicet venæ portæ, imò & ad lienem transmissi, febris conditionem mutarunt, & cum antea brachychroniam, tandem polychroniam induxerunt: quam non parum foverunt errores in vivendi ratione. Cujus futuræ diuturnitatis nec signi detuerunt: urina namque ab initio tenuis, sine ullo sedimento apparuerunt: prout & Cleonacidi, usque in diem 40. qui, 80. judicatus fuit; & cui, quoniam post 40. subintravit, cum sedimento rubro se prodiderunt, ideo diuturniorem, sed perquam salutem se fore existimavit Gal. prout pariter, & accessiones, quæ eadem hora quotidianè revertebantur, iudicium difficile prædicebant: longitudo in quinetiam sudores, diebus indicatoris supervenientes, nec febrem judicantes: tuæ enim eam prorogari, & multam si iudicare humilitatem, proferebat Hippoc. S. a, quid dicendum de frequentibus illis mutationibus, modo ad frigus, modo ad calorem? quæ cum multis variisque humorum redundantum in corpore dispositiones significant, à natura proinde exiguo tempore non conticiendas, longitudinem ideo iudicare allerebat cum Hipp. Gal. à quorum humorum varietate, febris quoque erraticum ordinem contraxit. Postremis autem hisce præteritis diebus, pulsus duriores, angulati & humiles, longi morbi indicium præbent, & diuturnioris quinetiam urina, cum sedimento crasso atque farinaceo, quæ non solum præsentem, sed futuram longam affectionem significant, cum longe à concoctionibus sint alienæ: quam diuturnitatem tandem nobis confirmavit totius corporis status, non valde à naturali mutatus, partium densitatis, & humorum crassitiei signum evidens, qui chronicam proinde, ac diuturnam fore febrem significat: unde à ratione alienum non est, si labores, & intumescentiæ in crurum articulis fiant: cum redundantes serofos humores, quos natura extra corpus expellere non potest, veluti per abscessum ad crura seponat.

Hujus autem febris eventus anceps foret, si ejus longitudo ab erroribus non penderet: exolutionis enim virium ante coctionem periculum immineret: neque mirum videretur vel ob solos commissos errores diuturna evasisset: cum in sanis quoque gravia delicta morborum lethaliū causa fiant. Cum igitur apparere incipiant signa coctionis, vires satis consent, nec totum corpus sit valde consumptum, & potissimum imus venter non adeo extenuatus, speranda utique salus. Ita, qui in Dealcis, horto ja-

cebat, sedimenta instar farinæ crassioris in urinis ostendens, die tamen 40. judicatus fuit: quia exitialis signa non habuit, prout juvenis qui obiit.

Judicium tamen per crisin expectandum non est, sed, vel per concoctionem, vel per abscessum, diuturnorum alioquin morborum proprium. De abscessu veteri posset, ne scilicet febris hæc in quartam migret: quoniam in erratico modo procedere videtur: & præterea, quia tumet lien: congrua tamen adhibita curatione, aliqua spes est per concoctionem terminandam fore: etenim dolores in articulis qui supervenerunt, licet febrem judicare non potuerint, multum tamen non sunt.

Medicæ autem intentiones, pro hac curanda febre atque extirpanda, dirigi debent potissimum ad verius causas, excreta entiosos humores, tum præparandum evacuando: obviata viscera aperiendo: deinde adversus febrem, ejus calorem satis remittendo: tandem, & ventriculi, & reliquorum viscerum, atque totius viæ conservando.

Ex fonte Chirurgico, aut parva, aut nullum superest desumendum remedium: jam enim ab Excellentiss. Adstante, ex vena sunt sanguis eductus: & ex hamorrhoidibus repetitus. Quare, illud solum considerandum venit, ut una aut altera hirudo venis sedalibus, bis per venientem apponatur, non quidem sanguinem educendo: sed ut ad partem illam rursus proiciatur, & spontanea hamorrhoidalis evacuacutio revocetur. Frictiones quoque leviores toti corpori utiles erunt, ut transpirabile servetur, neque tamen extenuetur.

Ex Pharmaceutico quoque fonte à Viro Excellentiss. propria & adæquata remedia deprompta fuere: in posterum autem, ad validiora attenuantia & aperiencia erit progrediendum, quæ tamen humectandi quoque vim obtineant: tum ad exultionem; tum ad maciem totius corporis evitandam, quas partes satis implet sumaria; nam facultatem humidam habet, detergentem, aperienciam, & moderate calefacientem, ac quodammodo ipsa viscera firmantem; prærogativam autem in hisce febribus longis obtinere solet syr. de cich. cum rhab. Nicol. sic & byzantius cum aceto. Quare in casu nostro, tale præparans parari poterit.

℞. Decoct. cich. borrag. end. petrosel. agim. scolopendrii ʒiv. succi sum. depur. ʒj. syr. de cich. cum rhab. byzantini cum aceto an. ʒss. m. pro syr. matutino tempore, in febris declinatione exhibendo; sicut pro alterante, in accessione vigore, hic præscribi poterit.

℞. Decoct. cich. borrag. end. viæ, sumar. ʒv. succi depur. cich. borrag. pom. dulc. an. ʒj. n. pro syr. & sic pro aliis.

Vel ℞. Aq. still. agrim. ʒiv. cich. ʒiij. tart. vitriol. gr. vi. m.

Dum præparantia hujusmodi, & alterantia administrantur, per epistasin diminuendi atque evacuandi sunt humores, exhibendo singulis, quatuor aut quinque diebus, pilul. de tribus cum rhab. ad drach. j. cum ʒss. flor. cass. aut elect. lenit. Clysteres quoque, diebus præparationis, locum habebunt, parati cum melle ros. solut. elect. diaph. oleo & sale, in decoct. malv. betz, mercur. & parietariæ.

Quod si quindecim dierum spatio non cedat febris, ad usum syr. Ferncl. erit deveniendum; cuius elegans & congrua descriptio talis esse poterit.

℞. Radic. cich. petrosel. fenic. cappar. polypod. querc. seminum carthami an. ʒss. sol. hyssopi, prassii albi, origani, agrim. cetrach. cucutæ. adianti an. m. j. sem. anil. fenic. endiviz, melon. an. drach. j. aq. agrim. ℥iij. m. bull. ad consump. tertiz, colat. postea infunde per hor. 12. tol. fennæ mund. ʒiv. agarici albi ʒij. epith. ʒss. radic. helleb. nigri drach. iij. gingib. drach. ij. postea bull. parum, & expressioni adde sacchari lini ℥j. bol. ad syr. consistentiam deinde adde rhab. in sindone ligati ʒj. & servetur ad usum. Exhibendus autem ad ʒij. in febris declinatione, tribus horis ante prandium, dissolvendus in jure cich. vel end. alterato. Et si forte ab eo evacuatio sequatur nimia copiosa, tertio quoque die solum exhibeatur, non omisso, diebus intermediis, præscripto præparante. In hujus autem syr. usu perseverandum ad xv. & xx. dies, cedente licet ipsa febre, ad obstructions omnino expediendus. Quem modum magis compendium existimo, magisque proprium, adversus fibræ pertinaciam mirabilis quippe ab hoc, in his casibus, effectus observavi. quos non comperi ex jure columbæ, aut perdicis, chuna & herbis aperientibus alterato, minusque ex jure Galli, quod si calidis aperientibus, & non evacuantibus, ex more alteratum offeratur, humorum exustionem potius adauget, obstructions, contumaciores reddit, & facile quartanam inducit.

Omitto quæ peculiari facultate adversus has febres longas pollere tradiderunt graves Medicinæ Scriptores Aqu. in scil. cuscuz Avic. Eupatorium. Mel. Ioniculum, Rhasis. Chamamelum, ab Ægyptio boli consecratum; omnia tanquam febrifuga ab iisdem proposita.

Extrinsecus addo ego lienis illitus, ex oleo de capparibus, de cyclamine, & amygdal. dulc. adipe anseris & anaris, ad ignem. cum cera, ad exigui acerrimi aceti consumpt. linim. reformando.

Et quoniam in loco putredinis, in diuturnis febribus inquinamentum quoddam fermento simile produci & relinqui solet, à quo humores, licet non adeo pravi, fermentantur & corrumpuntur, ideo ad hujusmodi fermentationem detendam, humoresque sistendos, congruis, præmissis evacuationibus, ut in casu nostro, evenire licet ad Chinam Chinæ, in principio accensionis, cum vino malvatico exhibendam, modo & quantitate jam cuilibet Medicorum notissimam.

Quibus omnibus congrua victus ratio cedat. non quidem tenuis; quia in morbis longis dum victu tenui ægri delinquant; sed attenuans & incidens. Sic betam cum sinapi, concedebat Galen. Nos autem aliquando mustardam & salitos pisciculos. Pariter & acetum pro condimento concedi poterit; cum passulis ebullitum, & pro acerarum condiendis, potissimum ex capparibus, prout & ex radicibus cich. & petroselini. Pro potu consueto; paretur stillatum ex pulla, prius radice cich. petrosel. gramin. pentaphyl. foliisque borrag. & endiviz alteratum; licet vinum quoque album, paucum & di-

lutum concedi possit; apparentibus enim signis coctionis, eadem adjuvat, & urinas movet; quod ideo in his casibus aqua utilius esse dicebat Gal. Hæcque pro præsentī febre curanda, dicta satis. *Idem ibidem.*

Febris catarrhalis à Capite.

Excellentiss. Senex Patricius, annum agens 65. temperamenti totius & jecoris, calidi & humidum, humidioris tamen capitis, boni habitus; qui, præterquam quod fere toto vitæ curiu, caput semper plurimis & maximis negotiis habuit implicitum, in cæteris omnibus etiam libere vixit, lacustribus volucrum venationibus delectatus, quotannis capitis destillationibus divexatus est: dum postremo hoc hyberno tempore iisdem vacaret venationibus, plurima incommoda perpessus fuit; potissimum vero a nocturnis algoribus, dolore capitis fuit correptus, cum delatione in somnum, capitis gravitate, ad motum pigritia & inappetentia. Caput interim nihil per nares aut os, ut solebat antea, trans mittebat, quibus omnibus, paucis transactis diebus febricula quotidie horis vespertinis accessit, cum somnis turbatis: & post paucos dies catarrhalis materia à capite in pulmones decumbere coepit, quæ Nob. Patientis gustui falsa, olfactui graveolens, & Medici oculis atq; iudicio, corrupta & putrida observata fuit. Interim capitis dolore remisso, perseveravit tamen febricula, quotidie circa vespem invadens, eum tussi & jam dictæ materia, tum per os, tum per nares expurgatione, totius quinetiam corporis macie accedente. Modo lecto decumbens, coactus, vos de agendis pro salute consulit.

Nob. Senex, semel saltem in anno, destillationibus autem obnoxius fuit: tum quia præ humidum & calidum caput à natura sortitus, quod ab injuriis ab illis facile læditur: tum maxime quia aeris, inclementiæ, potissimum hyemali tempore, in venationibus illud exposuit. licet in pristinum statum, domum reversus, redigeretur, solo congruo vivendi modo, absque ullo Medici auxilio: robusta namq; ipsius natura genitam, in capite intemperato, materiam expellebat, & ejusdem intemperiem facile corripiebat: quod tandem in hac senili ætate præstare non valuit: cum eum capitis temperies, postremo ab injuriis veris externi valde alterata non exiguum labem contraxerit, non modo facultas concoctrix catarrhalem materiam, ab intemperie in capite genitam coquere, & à corruptela tueri non potuit: sed neque ipsa expultrix eandem à capite propellere: unde accidit ut genita, & in capite detenta, neque à calore nativo ejusdem custodita putredinem in eodem conceperit, à qua febricula, circa vespem exacerbati solita, catarrhalis se suborta: prægressis prius ab ejusdem materiæ præsentia, capitis gravitate, in somnum delatione, ad motum pigritia, gravato scil. & tumefacto cerebro: & præterea inappetentia, ob consensum non exiguum inter cerebrum & ventriculum ipsum: quibus, post febris accessione, somni turbati supervenere, exalefacti. n. cum cerebro spiritibus ipsis, materia ipsa catarrhalis, à febrili calore quodammodo tusa atque liquata, ad motum proclivior facta est: quæ putrefacta, ac proinde falsa reddita, facultatem expul.

expultricem irritando, ad subiectas partes, pulmones scilicet, expulsa atque detrusa fuit: & ita, nec tussis oborta est, sic capitis dolor gravativus, ex ipsius decubitu non parum fuit diminutus. Perseverat tamen febricula: quia in capite nova regeneratur & putrebit materia catarrhalis: quæ ideo salta & graveolens à Patientē Excellentiss. observatur, prout à nobis per tussim à pulmonibus rejecta, corrupta & putrida conspicitur. Neque credendum putredinis mineram in pulmonibus esse: quia febricula aliquot diebus molesta fuit ante tussim. Cuius catarrhalis materię putredinem in capite observavit quoque Hipp. ipse, dum ab eadem putrefacta ad pulmones delabentē, tabem fieri posse existimavit, & ideo mirum non videatur, si modo totius aliqua consumptio & macies observetur, quæ ibidem super præcedere & anteire solet.

Quare statim opem medicam Seni Excellent. præstare convenit, antequam pulmones vel à salta corruptave materia exulceretur; vel ab ejusdem copia flacciditatem non solum, verum & frigiditatem concipiant: sique vel prima, vel secunda Hippocratis tabe afficiuntur.

Id autem non consequi posse speramus; omniā Senex Excellentiss. robustus est, macies parum progressa, & affectus adeo recens, ut pulmones nondum laxitatem & flacciditatem contraxerunt.

Dirigantur itaque medici scopi contra causam, multo magis quam contra febrem ipsam, primas vias primo expiando. Secundo, otum & cagut purgando. Tertio catarrhalem materiam à pulmonibus divertendo atque intercipiendo. Quarto, pulmones & caput exsiccaudo non neglecto febrili calore, quoniam sufficit, contemperando.

Quibus ut satisfaciamus, à fonte Chirurgico aliqua sanguinis nullo est deprimenda, non quidem ex venis superioribus; quia id non requirit morbus, neque ideo benepermittit ætas, sed ex penis sedalibus. Et quoniam caput destillationibus obnoxium est, non solum pro curatione, verum & pro præservatione, cauterium brachio inuri poterit. Frictiones quotidianæ, à nuch. incipientes, per dorsum descendentes, valde conterent; prout pedum calentes lotiones & Clysteres acres. Capiti quoque pulveres exsiccentes aspergantur, ex ligno carioso, radice Iridis Florentinæ, cornu Cervino ulso, ossibus sepiarum combustis, rolis rubris, majorana & roremarino parati.

Ex Pharmacia reliqua sunt petenda medica auxilia; & primo quidem pro ventriculi & primarum viarum expiatione, præbeatur potio ex manna clarif. Inde per quinque dies, oxymel simplex dilutum ad $\frac{3}{4}$ iij. vel iv. quolibet mane; mox repetatur eadem potio manna clarif. addendo parum agarici infusioni consuetæ; cui superbibat mullam dilutam, ex aqua hordei paratam. Deinde ad validiora præparantia erit procedendum, ex decoct. in jure, cich. borrag. end. malv. beton. præmittendo oxymel. iratum ad $\frac{3}{4}$ iij. In quorum præparantium, usu persistat, saltem octo vel decem dies; quibus transactis, purgans conveniens erit ex infus. agarici, rhab. & sennæ, in aqua beton. addito melle ros. solut. & manna. Vel, ita permittente febre, ut sperari po-

test, parentur pil. de agarico Mes. de hiera cum agarico, & aggreg. an. drach. β . & m. ret. Quibus omnibus superbibat Patientē Excellent. mullam dilutam jam dictam, ex aqua quinetiam stillatitia malvæ paratam.

His peractis, ad capitis expurgationem deveniendum, quæ commode pil. obtineri solet itaque.

\mathcal{R} . Pil. cochiar. aurear. an. drach. β . mastich. \mathcal{D} j. m. ret. pil. & aur. Quod si hucusque administratis febricula non cesserit, casta erit addenda, & pilular. dosis minuenda, iisdemque serum alinum depuratum, aut aqua hordeacea, sive ex malva destillata, ad \mathcal{I} bj. erunt super præbenda. Pilulæ autem tribus vicibus sunt repetendæ, quarto aut quinto quoque die; & diebus intermediis præparans tale exhiberi poterit.

\mathcal{R} . Succ. depur. malv. pom. dulc. beton. an. $\frac{3}{4}$ j. decoct. cich. borrag. beton. itæchados, malv. $\frac{3}{4}$ v. m. pro syr. & sic pro aliis. Interim m. tutinis horis, ante prandium, pro errhino utatur hoc.

\mathcal{R} . Pulv. majoranæ, ireos an. drach. i. nigellæ drach. j. m. & attrahatur per nares, ad modum tabacci.

Dum jam dicta administrantur, catarrhalis materia est quoque intercipienda, nocturnis horis in ore detinendo diatragacantum irrigidum cum bolo; vel rosarum conservam tabulatam cum eodem bolo; penidiorum quoque usus spernendus non est.

Sed jam fluxa materia expectoranda erit, usu oxymelitis irati, syrupo de ibisco committi.

Et tandem perseverante materię in capite productione, & inde ejusdem ad pulmones destillatione: humida ipsius capitis intemperies exsiccantibus, erit remittenda, pulmonique ipsi roborandi. In quem finem decoctum in jure ita parari poterit.

\mathcal{R} . Ligni rosimarini, radic. chinæ optimæ an. $\frac{3}{4}$ j. radic. ros. damascen. santal. citinorum, radic. enulæ campanæ an. $\frac{3}{4}$ β . aquæ still. cich. \mathcal{I} bj. β . beton. pulmon. an. \mathcal{I} bj. m. f. inf. per hor. 4. deinde adde quartam partem pulli junoris, & bull. ad consumpt. dimidii; colatura verò servetur ad usum pro tribus vicibus; cui infundantur spirit. sulphuris gutt. ij. præmissio bolo ex terbinthina nostra, & pulvere liquiritiæ ref. In cuius usu perseverandum ad dies triginta, nisi antea sistatur fluxio, cessante licet febre.

Hujus autem calor moderatè centemperandus, cichoraceorum decoctione, additis malva atque beton. in febris vigore, circa noctis nimirum medium offerenda, cui præmitti poterit julap. acetosum.

Quibus congrua vivendi ratio addenda, non crassa; quia catarrhalis materia per sputum educenda eget attenuatione; non tenuis, quia affectus hujusmodi protrahi poterit ad quadraginta, imò & ad sexaginta dies; sit igitur mediocris. Uratur ferculo Sax. Vin. m. album, tenue, subdulce, sed modicum concedatur, cum Hipp. ad materię expectorationem, & ad ejusdem coctionem. Interim de more bibat mullam dilutam acetosam, ex aqua malvæ vel hordeacea paratam. Cibum claudat conserva rosarum, & persistentibus somnis turbatis, exhibeatur conserva viol. lactuca condita. Quies, tum corporis tum animi procuretur. Quæ pro hac curanda catarrhali febre, dicta satis; *Idem ibidem*

Febris Catarrhalis in Pulmonibus.

Nob. Senex, 60. annum attingens, temperamenti totius ad calidum & humidum vergentis capitis humidioris, sicut & calidioris hepatis atque pulmonis, liberam vitam ducere consuetus, hyberno tempore aucupis volatilium palutrium immoderatus occupatus, incidit in tussim, diu noctuque molestant, nullo Medici auxilio duobus mētib; sanata; & quia supra modum siccabat, copiose quoque vina meraciora bibit. Interim, materia per tussim excreta, crassa, abunde colorata, imò & graveolens observata fuit, superveniente febricula quadam, horis vespertinis invalecente, & tota nocte perdurante, aliquot diebus, à Patientē ipso neglecta. Tandem à nobis consilium petere decrevit, qui invenimus Nob. Patientem, matutinis horis adhuc febricitantem, cum aliqua, sed exigua spirandi difficultate, roseo genarum colore, pulsum molli & mediocriter sequenti, urinis crassioribus, ruborem potius quandam præ se ferentibus. Materia, quæ tussim excernitur, crassa est, non valde viscida, diversicolor, flava nimirum, viridis quinetiam & alba, pallens, & cujus substantia facile dissolvitur, atque disjungitur; totum corpus quodammodo emaciatum, consueto tamen probò colore præditum. Modo, hoc Veris tempore, de agendis pro salute consulit.

Catarrhus est omnium morborum fons & origo; cujus vi totum corpus languere dicebat Gal. quod forsitan desumpsit ab Hipp. asserente, fluxiones magno tædio atque molestia naturam frangere. Fiunt autem, valde perfrigerata & excalefacta carne, dum à frigiditate exprimitur humiditas: à caliditate vero raret & tenuior redditur, idque, quoniam ab utraque intemperie introducitur imbecillitas, quæ immutata catarrhi causa existit. Ita Nob. iste Senex, in omnibus liberam vitam ducens, hyeme præterita ante lucem surgens in aquis palutribus volucrum capturæ intentus, ipse captus fuit; frigidam enim intemperiem, in capite alioquin valde humido contraxit, unde multo major, quam antea, catarrhi proventus ab eodem fuit observatus: qui ad fauces, imò ad tracheam defluxus, indeque ad pulmones, facultatem expultricem irritando, molestissimam tussim induxit: ita enim se habet Rheumatismus affectus, & generatur, ut in ventre diarrhœa ex mala coctione.

Ad pulmones autem defluxit, qui ut tatura iusto calidiores, unde quaque à toto corpore materiam attrahere solent, imò & ab eorundem calore, ex potionibus quoque meracioribus ad-aucto, catarrhalis ipsa, materia facile putredinem concepit: unde febris suborta, totum corpus jure merito gracilius reddens, horis vespertinis invadens, quod materię ejusmodi proprium: prout & pulsus quoque molles, nec adeò frequentes. Urinæ autem, nec albæ, nec tenues apparent, sed potius rubræ & crassiores: quoniam putredo, & putridus calor, non longè distat à majoribus vasis; de qua putredine, sicut & de loco, non est quod dubitemus; cum iam materia, quæ per tussim excernitur, varii coloris observetur, & potissimum graveolens, & ut facilè stylo dividitur, cum colore ex albo &

cineritio composito, putridæ pituitæ indicio minime fallaci: sed præterea adest ponderosa quædam respiratio, & genarum rubor, affecti, aut excalefacti pulmonis certissima signa, juxta cum aliorum syndrome.

Status Patientis hujus periculo plenus est: destillationes enim ad pulmones, sicut à Cælio pestiferæ, ita ab Hipp. malignissimæ dictæ fuere, maximè in casu nostro, dum catarrhalis materia in pulmonibus delitescens, pravam qualitatem, imò putredinem jam contraxit, pulmonibus adversariam quam maximè. Et licet gravedini & raucedini febris superveniens, ad eam coctionem non inutilis sit, unde febris suspirium sanat: id tamen verum de catarrho solum, adhuc in capite hærente, non autem in pulmonibus jam firmato & putrescente: tunc enim facile ad tabem inducit: staccescunt enim temporis progressu pulmones, & tandem fracidi hunt, unde secunda suboritur tabes, ab Hipp. descripta: tuncque affectus quidem protrahi potest etiam in tertium annum: sed postea moriuntur omnes. Quem infelicem eventum, in Patientē nostro vereri oportet: cum pulmones laxos & excalefactos habeat, à quibus catarrhum vix removeri posse dubium putamus, potissimum cum senex sit: nam et si raucedines & gravedines in valde senibus coctionem non admittant, Gal. tamen in Comm. subdit, quod si ex humore frigidus fiant, nec facile in juvenibus. Nihilominus, cum non valde senex & robustus sit, neque pulmones adhuc labem contraxerint: nunquam enim sputum ullum cruentum fuit observatum, quod pulmonum substantiam fracidam atque exesam significare possit: ideo desperanda salus non est: difficillima tamen sanatio futura censenda.

Quoniam vero in fluxionibus, omnium primò fontem mali tollere oportet: caput ipsum firmando, id assequi difficillimum fore credendum, non præcedente totius, capitis & pectoris expurgatione, nec non caloris febrilis convenienti remissione.

Quibus intentionibus ut satisfacianus, ex fonte Chirurgico primo est desumenda aliqua sanguinis missio: quæ ex venis sedalibus, in his casibus, institui solet, utpote pulmonibus valde utilis. Verum, quoniam pulmones ex motu concitato, in diuturna tussi, & ex catarrhi putredine, ac tandem ex febrili calore multo magis incaluisse existimandum est: ideo ut ventilentur atque refrigerentur, ex venis superioribus potius sanguis fuerit mittendus, mediana nimirum brachii dextri: parè tamen, ut secundò, si opus fuerit, ex venis sedalibus mitti possit. Cautione præterea duo brachia inurenda, ut divertatur à pulmonibus catarrhalis ipsa materia, quousque fons ejusdem exsicceetur. Nec omittenda quotidiana frictions ante prandium, à nucha, per dorsum: sicut vespertinæ, aut nocturnæ pedum lotiones, ante levem cœnam. Quod si forte contingat ut expurgatione peracta, catarrhalis ad pulmones à capite destillatio sisti nequeat, ad seraccum in occipite trajiciendum confugere opus erit.

Ex fonte Pharmaceutico depromenda erunt: lenientia, præparantia, calorem febrilem contemperantia, catarrhalem fluxionem sistentia, totum & caput evacuantia, expectorantia, & hume-

humidam intemperiem, tum capitis, tum pulmonum exsiccantia. Lenientia erunt pot. ex manna clarif. cassia, elect. diafebell. Trochisc. de viol. sive scammon. cremor tartari. Præparantia primas vias tantum, sine diluto præscribenda, oxymel, & mel. rosac. sin. pl. ad ʒ iij. Et quinque, aut sex transactis diebus, præparata materia, evacuanda, melle ros. & syr. viol. solut. potione quinetiam ex manna clarif. flor. cass. cum Troch. de viol. & lenit. Interim alterantia, calori febrili & pulmonum, quotidie contemperando, in statu febris exhibenda, parata ex decoct. cichorac. additis foliis malv. viol. pulmon. & frutulo pomii; cui decoctioni præmittatur julap. acet. ad ʒ ij.

Hoc tempore, accuratior humorum præparatio procuranda, syrupis, quatuor horis ante prandium exhibendis, paratis ex decoct. malv. viol. pulmon. pomorum dulcium, filiquarum, & hytiopi, in aqua hordeacea; cui decoctioni præmittendum oxymel ireatum, duabus additis aquæ sulphuris guttulis; vel, si magis Patienti ipsi arriserit, mulla, in aqua hordei vel malvæ, & pulmonariæ, cum melle Hispanico parata, & mox ireata, atque acet. portione acetosa reddita; cui pariter, aut julap. acet. aut oxymel præmittendum. Et dum hujusmodi instituitur præparatio, clysteres frequentes injiciendi non solum molliores, ex decoct. malv. mercurial. betæ, parietariæ, addito melle ros. fol. &c. verum & acriores, addita utraque centaurea, nec non elect. diaphœnicone.

Præparati humores erunt expurgandi, agaricum addendo infusioni consuetæ pro potione clarif. vel elect. lenit. & cassiæ addendo Troch. de viol. cum scammon. cum scrup. j. aut drach. ʒ. pil. de agarico Mesues; quibus superbibat Patientis, vel mullam dilutam, ex aqua hordei paratam, vel aquam ipsam hordeaceam. Agaricus quoque pulverizatus, in oxymelite dissolutus, à drach. ʒ. ad drach. j. tertio quoque die, pluribus vicibus exhibitus, pulmones commodè solet expurgare, diebus intermediis. præbendo succos depur. malv. & pomorum dulcium, in decoctione jam præscripta.

Si hucusque febris aliquantulum erit remissa, pil. caput & totum expurgantes præberi poterunt: aut ex scil. aggregat. & de agarico Mesues, ad drach. ʒ. an. superbibendo aquam hordeaceam, vel malvarum stillatitiam, ad calorem remittendum; quæ ter saltem poterunt repeti, quarto quoque die; diebus verò intermediis, præbeantur succi depur. malv. beton. & pomorum dulcium, in decoctione præscripta.

Quo tempore per nares quoque caput expurgandum, ethino ex pulv. major. ireos & nigellæ parato. Nec tamen toto hoc tempore expectoratio negligenda erit; imò quotidie, matutinis horis, ante syrupos aut alia medicamenta, sollicitanda, & quidem oxymelite ireato, cum aliquot guttulis olei sulphuris. Egregium quoque expectorans experti sumus, ex oleo sacchi. & julap. acet. paratum.

Tempore somni, aliquod medicamentum sistens, & fluxioni viam interceptans, erit à Patientie in ore tenendum, quod esse poterit diatragacantum frigidum cum bolo, prout & conserva rosarum & violarum; à cibo assumen-

Tandem humida capitis intemperies, ut malitiosa, est auferenda, & pulmones, pro virili, exsiccandi; in quem finem decoctum cum sudore erit instituendum, ex china radice, visco quercino, ligno guajaco pingui recenti: quo solo Erasistratus, Tracalorius, Vega, Zacutus, pulmones quoque flaccidos, imò & fracosos, integræ sanitati restituerunt. Excitandus autem sudor in hypocausto quidem, ratione ipsius capitis, sed perticiendus mox in lecto, capitis quoque cura potissimum habita, & quidem primis diebus; in progressu vero addi poterunt ipsi decocto gut. aquæ sulphuris, vel grana butyri, aut lacus ejusdem, cum pulvere puimonis vulpis præparati, bolum formando, ipsi decocto præmittendum. In cujus usu mensem saltem erit persistendum. Quibus actis, si pulmo majori indigeret exsiccatione, ad aquas sulphureas Aponitanas se conferat Patientis; & conservis interim utatur, ex flor. beton. salviæ, roris-marini, botradis, potissimum sub ingressum lecti.

Victusque ratio congrua addatur, quæ alia debet esse præsentis febre, alia eadem recedente, catarrho residuo extirpando. Sic, primis diebus, febre præsentis, pituita familiaris sit usus, cum saccharo, eadem verò recedente, ferculum Sax. addito china pollinæ, erit opportunum. Vinum autem omnino interdicitur; cum Celsus jubeat a sole, balneo, vino & Venere esse abstinendum, & mulla diluta sit pro potu consuetos in progressu vero, febre recedente, vinum album, tenue, subdulce concedi poterit; materiæ namque catarrhalis concoctionem & expectorationem non parum juvare potest; ut considerabat Hippoc. ipse. Et licet attenuans & exsiccans generatim convenire videatur, cavendum tamen ne in pulmonibus materia crassescat & exsicceat; tunc enim maxime resistit; unde Tral. dicebat, quod anhelosis semper copiosus potus est exhibendus, quod non de potu solum, verum & de cibo accipiendum; Reliqua verò, ad victus rationem attinentia, Medici assistentis summæ prudentiæ committimus. *Idem ibidem.*

Febris Catarrhalis in Mesenterio.

Adolescens 18. annum agens, temperamentis, secundum totum & jecur, ad calidum & siccum vergentis, capitis verò calidi & humidus, mense Maio proximè præterito, febre tertiana duplici correptus fuit, à qua liberatus, externa quadam præcedente occasione, tussim contraxit, cum copiosa materiæ catarrhalis & tenuis à capite destillatione, quæ nunquam salsa, aut acida, minus amara ab eodem Patientie observata fuit. Interim, paucis transactis diebus, rursus febricitare cœpit, paulo post liberatus, secutis evacuationibus per alvum à Medico procuratis; nunquam tamen vires omnino reintegrare potuit, forsitan quia non aded congrua victus ratione usus; unde obstructions in visceribus, & potissimum mesenterio congestæ fuere; à quibus quodammodo emaciari cœpit, & totius corporis color corruptus, semper tamen perseverante tussi, cum excretionibus copiosis jam dictæ materiæ, quandoque tamen paulò crassioris & flavescens. Modo quatuor præ-

præterierunt menses, quibus adhucnum jam dicta molestissima tussi laborat; & præterea febriculis, inordinato & erratico modo invadentibus, quæ, evacuatione per alvum sollicitata, intercipi solent, adeo ut nonnunquam matutinis horis, à Medico sine febre observatus fuerit, superstitibus tamen in hypochondriis obstructionibus. Modò ut sanitati restituatur consilium petit.

Equidem rectè dicebat Gal. quod destillationibus obnoxii, in multos & varios morbos proni sunt, pro variarum partium imbecillitate; ac proinde, cum præsens Adolescens invalidos pulmones à natura sortitus fuerit, cum laxitate quadam musculorum laryngem constringentium, quos Thyroarytænoideos & Cricoarytænoideos cum Anatomicis appellabimus: cerebrum enim, dum ipsum de se ipso plurimum liquefecit, in prægressis febribus imbecillum redditum fuit, & catarrhali materiæ producendæ maximè idoneum; unde & Gal. dicebat, catarrhum fieri, dum cerebrum, vel nimis perfrigeratum, vel nimis æstuans, imbecillum redditur, & ita male concoquit, & plurima excrementa generat, quibus retentrix facultas cedere cogitur, unde necessario fluxio ad inferiora concitatur, quæ per tracheam ad pulmones delabens, & eorum facultatem expultricem irritans, tussim excitat, & quidem molestiorem, si destillatio aquea, tenuis & copiosa fuerit; tunc enim extremè cruda est, adeo ut à pulmonibus cogi, extolli & excerni nequeat; prout ab initio conspectum in Adolescente nostro. Molestissima quoque tussis evadere solet in nonnullis, dum acris & salsa, licet exigua; tunc enim continuo expultricem irritans, tussim siccam potius quam humidam excitat. Verùm, quoniam jam dictæ contumaci & confirmatæ destillationi febriculae successerunt, quæ in præsens erratico modo invadere non desinunt; de his consideratione dignum, num à catarrho proveniant; & si à catarrho, minera necessario indaganda. Neque enim nos latet, quibus caput facile impletur, & in pectus destillationes præcipitat, non solum febriculas, sed & tabem suboriri, maximè si fluxiones diurnæ fuerint; unde à pituita copiosa in capite existente, putrefacta, in pulmones delabente, tabem fieri protulit etiam Hippoc. de Internis Affect. Si tabes, ergo facilius febricula. Verùm quomodo febris à catarrho, non adhuc putrefacto atque corrupto excitari possit, non videmus: cum tamen, qui ab Adolescente nostro per tussim excernitur, neque consistentia, neque colore putridus observetur; neque ab eodem acris, acidus, aut graveolens percipiatur: præterquam quod à Medico, immunis à febre Patiens ipse, non adeo facile sæpius observatus fuisset, non diminuta catarrhi copia, & ejusdem prava qualitate semper in deteriorius labente. Quare, sicut febrem hanc, putridam quidem, at catarrhalem, non humoralem statuimus: ita catarrhi mineram putridam, non in spiritalibus, sed naturalibus cavitatibus delitescere credimus: siquidem, longè major catarrhi quantitas per œsophagum, in ventriculum & mesenterium illabitur, quam per tracheam in pulmones. In mesenterio autem hæc diuturno tempore detenta, nec ventilata, calorem putrefacientem frequenter concipit, &

febrem excitat: non parum ad putredinem adimulantibus obstructionibus, ab improba vitæ ratione contractis, accedente eadem catarrhali destillatione, quæ eas fovet. Quod confirmare videntur evacuationes per alvum, arte procuratæ, quæ febrem ipsam pellere, & adolescentem non semel à febre inhumanem reddere valuerunt: quod cerè evacuationibus non successisset, si febris minera in pulmonibus extitisset. A partibus autem infernis naturalibus vapores, tum per venas, tum per spatia, in caput terri non est dubitandum: sicut de cruditatibus quoque à toto venoso genere non levis suspicio: non enim adeo probus esse potest sanguis, dum corpus totum & emaciatum & pravi coloris conspicitur: qui circulus est ab Hipp. deterimus habitus.

Nec cuiquam forsitan mirum videatur febrem hanc, putridam at non humoralem dici debere: siquidem alimenti aquolum sputum, & serositates à cerebro destillantes, Gal. humiditates excrementitias, at nunquam pituitam appellare voluit, & ratio est, quoniam pituita definitur, quod sit succus à sanguinis perfectione declinans, crudus scilicet & imperfectus sanguis: cerebri vero succus, siue impropria pituita, est tertie coctionis excrementum: & ideo inter humores pituitosos recenseri non potest. Sed dantur quoque aliæ febres putridæ, non humorales, ut quæ ab interno aliquo ulcere procedunt, omnes tamen propriè symptomaticæ dicendæ.

Celsus dicere solebat, quod destillatio neglecta longa est: quæ si ad pulmones delabatur, pestifera ab eodem dicebatur: unde in nares, leve malum, in fauces, pejus, in pulmonem, pessimum: nec præter rationem, dum Mto existimavit pituitam acidam & salsam, omnium morborum à destillatione provenientium originem esse: idè in adolescente nostro, neglecta destillatio longa facta est, quæ si salsa aut acida fuisset, pestiferos, in pulmones delapsa, effectus peperisset: sicuti non levia mala toti corpori intulit, coctiones vitiando & obstructiones producendo: febrem quippe & cacoehymiam toti corpori induxit. Hoc autem magnum nobis facessit negotium: cum destillatio auferri non possit, impuristum hypochondriis, tum toto venoso genere manentibus, tanquam prohibentibus & causam foventibus. Auget præterea difficultatem febris, vel quotidie, vel frequenter invadens, quæ in præsens vires prostermit, & in futurum, ulum medicamentorum quodammodo prohibere poterit. Nihilominus, quia Patiens Juvenis est propria & generosa remedia nondum expertus, non est omnino desperanda salus, sed congruo ordine instituenta curatio.

Primò, primas vias mundando. Secundò, obstructiones aperiendo. Tertiò, calorem febrilem moderatè contemperando. Quartò, venosum genus & caput pleniter expurgando. Quintò, capitis humidam & calidam intemperiem remittendo: & tandem destillationem omni arte, à larynge & œsophago divertendo.

Et primò in fonte Chirurgico, si de sanguinis missione loquamur, aperienda brachii vena, non solum ad viscerum ventilationem, sed potius

potius ut sanguinem exploremus quam evacuemus. Cauteria nullomodo sunt omittenda: alterum quidem in brachio: alterum in nucha: quumque, si res urgeat, recedente febre, setaceum quoque abs re non erit. Quotidianæ interim frictiones convenientissimæ sunt, matutinae, à nucha ad dorsum: & pedum lotiones vespertinae, ante coenam. Caput totum servetur, pulvere quotidie asperso, ex majorana, radice iridis, cornu cer. rosæ damascen. sepius ipsis, & carie lignorum parato.

Ex pharmaceutico fonte reliqua sunt deprimenda. medica aut illa: & primo quidem pot. ex manna clarif. prima via expianda: cui super bibendum præbeatur jus, hordeo vel malvis alteratum, ad exsiccationem evitandam. Mox præparanda materia in primis viis hærens, julap. acet. ad unc. ii. cum drach. ii. crem. tart. luteum opportunè calor febrilis erit contemperandus: id autem præstare poterit succus cich. depur. in jure cichorac. alterato: simul quippe, & calorem contemperare, & quodammodo obstructions aperire valebit. Ita per aliquot dies progrediendum, clysteres interim iniiciendo, ex decoct. malv. viol. hord. mercurialis: addito syr. aut melle ros. solut. &c. Mox repetenda erit humorum præparatorum evacuatio, vel jam præscripta potione, vel bolis ex cass. lenit. & tartaro paratis, serum superbibendo, aut aquam hordeaceam.

Verum, quoniam obstructions nondum fuerunt ablatae, ideo aperiencia paulo validiora erunt administranda, quæ esse poterunt, præsentè adhuc febre, succus, cich. depur. ad unc. ii. cum succo agrim. ad unc. j. in jure cichorac. alterato: in quo dissolv. gr. vi. aut. vii. tart. vitriol. Quod si recesserit febris, succis jam dictis addatur syr de cich. cum rhab. ad unc. j. vel præbeantur aquæ agrim. & cich. an. unc. iv. in quibus drach. j. rhab. integra nocte infusa fuerit. Et ita aliquot diebus progrediendum: mox pil. de Tribus cum rhab. & cassia præbeantur, quibus superbibat Pateriens serum depur. vel aquam Nocer. ad libitum.

His peractis, ad capitis expurgationem deveniri poterit, dum uno eodemque tempore sanguis adhuc magis purificabitur, & ideo pil. præscribantur de tribus cum rhab. aggreg. & aureæ, summo mane, in aurora præbenda, vel ex Tral. circa noctis dimidium: quibus mane superbibat Pateriens aquam hordeac. vel Nocer. quæ, nisi quid obstat, bis aut ter repetenda: eodemque tempore caput errhino expurgandum, ex radice Iridis & majorana parato.

Superest ut capitis humida intemperies corrigatur, simulque pulmones exsiccantur: quod tentandum decocto aliquo exsiccante quidem, ac non valdè calefaciente: quod tamen sine sudore, aut parum, aut nihil profuturum credimus: iniquari namque humores, tum in venis, tum in capite exsistentes, per ambitum corporis sensibiliter evacuari debent, ne in partes affectas irruant. Decoctum itaque ita paretur.

℞. Radic. chinæ opt. unc. j. ligni rorismar. radic. ros. vulg. radic. cannæ montanæ, radic. enulæ an. unc. f. aquæ cich. pulmon. beton. an. lib. j. m. f. inf. per horas 24. deinde bull. ad consumpt. dimidii, & colat. servetur pro duabus vicibus summo manè exhibenda: cui ja

progreßu addi poterunt aq. sulph. gutt. iii. aut iv. ita enim, & facilius sudor proficitur, & pulmones promptius exsiccari poterunt: sudor tamen in hypochondrio tantum moveatur, & in lecto absolvatur. Decimo vero quoque die præbeatur Patienti potio ex manna clarif. nec victus adeo tenuis præscribitur, habita virium & gracilitatis ratione.

Toto vero jam præscripto tempore purgationis, aliqua intercipientia sublingualia non sunt omittenda: ut confectiones diacodii & diatragacanti frigidi cum bolo: expectorantia matutino tempore exhibendo, ut oxymel, aut julap. acet. creatum, ante usum syrupor. decoct. & omnium jam præscriptorum medicamentorum.

Tandem aliqua caput & pulmones corroborantia sunt in usum ducenda: ut conserva ex radice helenii, cum pulv. pumi. vulpis præp. & butyro sulph. additis pistulis & pomorum dulcium succo, cum saccharo q. l. ad ignem, S. A. elect. reformando. Ex usu quoque esse solet conserva è floribus botridis, butyro sulphuris addito. Pro capite, conserva è floribus beton. salvia, rorism. imo & rostrum, sub ingressum lecti assumenda. Vinum quoque pro mensa medicatum, paretur ex ligno rorismarini, & santalo rubro, ad unc. j. pro unaquaque situla.

Quibus omnibus congrua addatur victus ratio, quæ neque tenuis, nec nimis attenuans sit: licet Celsus jubeat quod dimidia pars cibi sit demenda, & sitis, quantum heris potest, sustinenda. Omnia autem prudentiæ Medici assistenti committenda. Et hæc satis. *Idem ibidem.*

Erratica Febris.

Vir 35. annum agens, temperamenti secundum totum, maxime secundum pecus, ad calidum & siccum vergentis, ventriculi vero frigidioris, pituitosis vomitibus assuetus, qui tamen sex abhinc mensibus cessarunt: præterito mense Septembri correptus fuit febre duplici tertiana continua notha, à qua die vigesima liber evasit. Verum, nonnullis in vivendi ratione erroribus commissis, post paucos dies rursus à cœna febrecitavit, cum horrore universali, calore non valde acris, sed tarde & cum difficultate foras se exerente, pulsu non adeo frequenti, urinis crudis & albicantibus, cum siti moderata: quæ febris spatio viginti quatuor horarum, cum universali madore cessavit: sed sequenti die, circa vespertimam, rursus invaluit, cum rigore toti corpori dolores inferente, & calore ab initio remisso: qui tamen in progressu paulatim succensus, intensior evasit, cum pulsu potius raro, & urina cruda. At nocte sequenti, hora decima febris: nova ejusdem accessio manifeste invaluit, cum horripilationibus & subsequenti calore, jam dictis non absimili: hæcque post trigessimam horam, longo lentoque madore omnino cessit, duobus integris diebus Patientem immuni relicto: quæ tamen iterum vespertinis horis quartæ diei eundem corripuit. Hæc autem febris inconstantia, à Medico & ipso Patientem observata, ansam dedit Medicis consulendi, ac de ejusdem causis, eventu, & de agendis, eorum sententiam in medium adducendi.

Inter febres periodicationes habentes, ea quæ Patientem nostrum infestat, periodorum nullum ordinem servat, sed inordinate movetur, ut us est ordo, nullum ordinem servare; hæcque Erratica dicitur, sive errabunda, quia semper errando procedit. Dicitur quoque Planetica; plane enim Gr. error Latinis, vel a Planeta Saturno, cum quo similitudinem habet; nam sicut Saturnus prælium melancholiz, ita erratica febris principium quartanæ statuitur; ut plurimum enim, & fere semper in quartanam degenerat, ut observavit cum Hippocr. Gal.

De hac loquutus definitionem Auctor dixit; errabundas febres esse, quæ non præfinito, neque certo ordine, sed incerto procedunt. Gal. verò dicebat, quod inordinatæ, seu erraticæ, febres, aliquando stant, aliquando moventur, nunquam vero ordinatè procedunt. Ita febris Pat. nostrum affligens; primò namque die, post cœnam febricitavit, spatio viginti quatuor horarum à febre liberatus; die sequenti, circa vespertinam, rursus eadem correptus fuit, & nocte sequenti; hora decima durationis hujus, nova febrilis accessio fuit observata, quæ post trigessimam horam omnino cessavit, & quidem duobus integris diebus; eadem tamen iterum quarto die, vespertinis horis, recurrente febre. Ex quibus patet, inconstantem & inordinatam, febrem intermittentem, propriè erraticam appellandam esse.

Neque decipimur in hujus febris cognitione, à plurium febrium, sive circuituum complicationibus, ut monebat Gal. nec minus ab aliarum febrium anticipationibus, prout Medici non exerciti, quos carpebat ipse Gal. primo, quia jam præcessit alia febris humores adurens, & cruditates inducens. Secundò, quia nulla proportio tertianaria, aut quartanaria stabilis observatur; & præterea, intervallum & quietem duorum, triumve dierum concedere solet hæc febris; & idè dicebat Gal. quod aliquando stant, aliquando moventur hæc febres erraticæ. Tertio, quia non desunt melancholici humoris putrescentis signa. Quarto, quia invadit hoc tempore autumnali, & supra inventum.

Pendet autem hæc febris à diversorum humorum permissione; quæ tamen non est adeò perfecta, ut in tertiana notha; sed uterque humor suam propriam servat naturam; & idè distinguitur hæc ab illis febribus, quæ sunt ab una simplici materia, in quibus observatur diversorum humorum eam componentium, natura. Humores verò in casu nostro, sunt melancholici & pituitosi, qui antea per vomitum excerni consueverant; hi verò simul misti, in uno tantum loco, circa viscera naturalia putrescunt, & ita à febrium complicatione distinguitur; dum enim humores iste, in uno eodemque loco invicem contendunt, modò unus, modò alter suam facit accessionem, ut observavit Gal. in Cleonactide; & idè utriusque humoris signa observantur, in pulsibus, urinis, calore, siti, & invasionis, modo; etenim rigor dolorem afferens, fere Ostocopos, ab humore melancholico & acido, sicut horror à pituitosa materia, cum aliqua acidate conjuncta, proveniunt; & ita ordinem variant humores, & fit erratica febris, donec, progressu temporis, exultio æqualiter ambobus humoribus in-

ducitur, & quartana ordinata evadit. Idè Avic dicebat, quod de proprietate harum febrium est ut stent in suo tunc secundum ordinem unum, hoc est, quod perducant ad febrem, servantem ordinem unum, nimirum ad ipsam quartanam.

Febris hæc, cum sit intermittens, periculo vacat, diuturna tamen semper esse solet, cum partim humores crudos & viscidos, partim verò exustos & melancholicos auctores habeat; unde raro fit quin in quartanam migret atque degeneret. sic Gal. dicebat, quod errabundis febribus quartana succedere solet. & Hipp. oportet, inquit, talem expectari abscessum per febrem continuam: in quartanam verò discessuram, quoties intermittat,prehendatque erabilem in modum, atq; ita agendo, autumno propinquet. Quod tamen præcognoscere durum erit nobis, si in urina nigra nubeculæ appareant; tunc enim quartana expectanda.

Curationem quod attinet, videtur Hipp. potius huic febre eandem denegasse quam proposuisse, dum ait, inconstantes febres, donec constent, sinere oportet, ubi autem constiterint, victu, & purgatione convenienti curabis. Gal. tamen in Com. obscurum hunc loquendi modum considerans, explicavit, dicens. Inconstantes febres sinere oportet; donec qualisnam febris sit cognoverimus. Quare, si statim erraticam febrem cognoscimus, ut præsentem, statim quoque curationem ejus aggrediemur. Primo quidem evacuantibus. Secundò, magis attenuantibus, incidentibus, detergentibus & aperientibus. Tertio, exultionem remonentibus. Quarto, viscera roborantibus.

Et in fonte Chirurgico, si sanguinis missionem consideremus, caute valde agendum; nam sicut, si ab initio invaderet, mediana brachii aperienda foret, ut sanguinis qualitas exploraretur, ita in hac, quæ aliis succedit, in quarum curatione jam sanguis extractus fuit, non adeò audaces in eodem iterum mittendo esse possumus. Salvatella itaque sinistra in casu nostro aperienda, & parçè sanguis mittendus, ad ulteriorem humorum exultionem inhibendam; sicut in aliis, quibus vires non adeò constarent, venæ hæmorrhoidales aperiri possent. Cauteria locum habent; nam morbi diuturni, non per crism sed per abscessum sanantur; Medicus autem debet esse naturæ imitator. Frictiones quotidianæ torri corpori convenientissimæ erunt: ut humores crassi attenuentur, & simul discutantur ac resolvantur.

A fonte Pharmaceutico sunt petenda evacuantia, præparantia, alterantia, aperientia, & viscera roborantia. Lenientia esse poterunt, syr. ros. solut. de polypodio: vel elect. lenit. cum tart. aut cum diacath. quia aliis febribus successit.

Et idè, præparantia efficaciora statim esse poterunt; ut oxymel, syr. byzant. cum aceto, de duabus radicibus; & tandem oxymel compositum, cum syr. de cich. cum rhab. addita semper decoct. cicchoraceorum, necnon agrimoniz, pentaphylli, petroselinii, scolopendrii.

Purgantia esse poterunt, decoctio epith. Mel. syr. ros. solut. temperata; cui superlibat Patientis seri capr. depur. lib. ii. Prærogativam solent habere pil. de tribus, & aggregat. an. drach. f.

cum

cum flore cass. ad unc. i. sero pariter superbibito.

Interim præparantium usui insistendum erit, & per epistram purgandum. Quod si obstructiones contumaces fuerint, ad decoctum falsæ Recentiores devenire solent, in jure galli, additis herbis & radicibus aperientibus, paratum. Nos vero ad syr. Terebinthinum, libenter & utiliter properamus; addito, non solum rhab. verum & modica radice nigra helleborina; qui alternis diebus propinari poterit; diebus vero intermedium, exhibitis succis depur. hoc modo.

2^æ. Succ. depur. cich. borrag. agrimoniz an. unc. i. decoct. borrag. endivæ, melilz, capil. ven. 3. v. m. pro syr. & sic pro aliis. si vero continuandum ad viginti & triginta dies, si opus fuerit, namque ex his omnibus consequemur deobstructionem, præparationem, caloris remissionem, & humorum, per epistram, paulatim evacuationem.

Tandem viscera cori oborant, contrax abstinthii, bugossi, borraginis, cum speciebus aromaticis rotati; succus abstinthii condensatus; vinum abstinthie.

Vixit ratio erit attenuans, at non tenuis, quæ morbis longis convenire non potest. Apparentibus signis coctionis, convenit vinum paucum, tenue & oligoporum; utpote quod possit humorum coctiones adjuvare, & evacuationes promovere. Quæ pro hac febre erratica curanda, satis. *Idem ibidem.*

Quartana Legitima.

Juvenis Mercator, 30. annum agens, temperamenti totius & jecoris, ad calidum & siccum vergentis, mediocris habitus, sed fuscæ coloris, hictus hypochondriis; negotiis quammaxime addictus, & cibis usus, de more, crassæ substantiæ, ut carne bubula, leporina, salitis carnibus atque piscinis, leguminibus, brassica, caeco veteri & acetariis, atque copiosis potibus: antehac quartana detentus, hoc autumnali tempore, dum febres grassantur quartanæ, equo longum iter, mercaturæ causa facurus, secundo itineris die circa vespere, febre correptus fuit, cum ex igno rigore, & carnisque totius corporis, usque ad ossa, profunda & dolorosa lassitudine: cum calore, statim ab initio, satis remisso, qui mox paulatim succensus, flammeus potius & siccus quam fumosus ab ipso Patientē fuit observatus. Perseveravit autem febris usque in sequentem diem; sicque die tertia, sine febre domum reversus, & ad consueta negotia, licet viribus non peritum refractis, noctem transegit inquietam; quarta verò die surrexit in lecto, cibum, ut sanus assumpsit; sed hora 21. eodem modo febricitavit ut antea, cum vomitu pituitoso; quorum causa Medicum accersivit, qui pulsus potius tardum ac rari observavit: urinam albicantem, aquosam ac decoloratam; & in reliquis, quæcunque in antecedenti paroxysmo observata fuere. Præscripsit autem leniens, ex elect. lenit. paratum, & tertiam accessionem die quartaattente expectavit, quæ ferè eadem hora comparuit: in cuius primo insultu pulsus observavit, non solum tardos & raros, sed etiam parvos ac debiles, & præterea rigorem consueto paulo ve-

hementiorem. Et licet febrem periculo vacare cognoverit & ipse Patient, anxius tamen de salutis celeritate, ut negotiis propriis omnino incumbere possit, a nobis consilium querit.

Non est qui ignoret febrem, egregium hunc Mercatorem di. exantem, esse quartanam; maxime vero cum in petum grassantium morborum & temporis conditionem unusquisque attendat, re soleat; sed præterea cum & ipse Patient, se quartanarium agnoscat; & quatenus per intermissionem; quia post viginti quartam accessionis horam, a febre minimis observatur. Rarissime autem continua evadit; etenim, non ab alimentali melancholia fit: quia est adeo pauca in venis, aliis humoribus alimentalibus mista, ut difficulter putredinem concipere possit; nec ab excrementitia: quia ut valde naturæ mimica in venis non detinetur, sed foras protrahitur, & ita febrem intermittentem producit.

Hæc autem, non spuria & notha, sed legitima est, utpote genita, non ab humore melancholico præter naturam, & exulto, sicut neri solent quartanæ per abscessum, post prægressas alias febres; sed ab humore melancholico naturali. Neque admittenda Tral. in Gal. criminatio, quod aliam quam legitimam quartanam, à naturali melancholia factam non cognoverit ipse, & ideo solius tantummodo legitimæ curationem assignaverit; etenim non observavit Gal. dicentem: Atram bilem, ex qua quartanæ ortum habent, geminam sortiri generationem; unam ex flava bile retorrida; alteram ex crasso sanguine. Quod idem alibi repetit; curationem tamen non proposuit, eo quod, cum biliosarum curatione coincadat.

Reliqua quoque signa omnia illegitimæ quartanæ præsentiam confirmant; Et primo quidem rigor ostocopos, hoc est frangens ossa & carnes; quia humor, utpote crassus ac terrestris, in profundo hærens, ossa veluti frangit & carnes contundit; & ob hanc causam ab initio rigor vehemens observari non solet, sicut in progressu; quia crudus, & non attenuatus, adeo facile concitatus moveri non potest.

Secundo calor, qui ab initio remissus & paulatim succensus, flammeus & igneus, non fumosus evadit, non secus ac in tella terreæ, a qua parum aut nihil fumosi elevari potest; secus vero in materia pituitosa, quæ ideo lignis viridibus comparari solet.

Tertio observavit Medicus, in secunda accessione, prægressa nocte gravi atque molesta, pulsus tardum & rari; quia cor, ob humoris frigiditatem, exigua indiget ventilatione; & præterea in principio tertie accessionis, eundem pulsus parvum ac debilem quoque notavit; arteria enim quasi alligata, & ad interiora retracta videtur, adeo ut liberum ascensum non habeat, ob humoris gravitatem.

Quarto, urinam albicantem, aquosam & decorem vidit, certum humoris melancholici naturalis indicium; talis enim non est in quartana spuria, ab exulto humore producta; & ideo aptissime dicebat Gal. quod in quartana urinæ variae sunt, sed crudæ omnes.

Quinto, longitudo accessionis & intervalli, accessio namque, ut observavit Serapio, pluri-

num ad 24 horam extenditur; intervallum verò adeo longum est, ut vix nuncupetur quartana continuam admittat Gal.

Causa hujus febris, cum melancholicus humor, excrescit ita quidem, ut naturalis, non exultans, aut præter naturam, in primis vis, circa viscera naturalia putrescens: ob prohibitam transpirationem, ab obstructionibus, ex humore melancholico, copia & crassitie peccante. Ad cuius non exultat melancholiz redundantiam, conspirant causæ remotæ omnes; ut ætas, totius & jecoris temperamentum, anni tempus, vita anteacta, ut studia; cibo, vin melancholicorum & acetu us; non aliter enim fit ex vino acetum, quam ex sanguine melancholia, & tandem copiosi potus, qui si aquosi, lientem inhiant; si meraciores, repleant & humores adurunt.

Harum autem causarum consensus & conspiratio, antehac eundem Patientem quartanarum reddiderunt, patet Aetii, qui hominem lemel tantum quartana corripi credidit, Hipp. auctoritate; Lib. de septenario: spurius quippe, non vero Hipp. genuinus est liber ille, cui innititur Aetii opusculo, cum potissimum experientia repugnet; etenim Villicus apud Beniveum m, prima vice quartana correptus, ab ingluvie & meri computationibus liber evasit: quia aegerant signa coctionis; secunda verò vice rursus quartana correptus, isdem crapulis dum seipsum liberandum sperabat: quia omnia crua erant, mortuus est. Et ita concidit opinio Aetii. Sicut nullo loco habenda lernei sententia, afferentis ab omnibus, in utero materno, contrahitur quartanæ causam, cum tamen multi, toto vitæ cursu, quartana nunquam correpti fuerint.

Cum autem quartana sit Medico, um opprobrium, eorumque operam atque medicamenta sapissime eludat; quoniam longissima temper est, & potissimum autumnalis; hinc accedit ut Empirici, Chymici, Paracelsici, Vangelmontici, Methodici, Vulgares & Dogmatici, omnes sibi propriam atque singularem proposuerint, in quartana curanda, diversam rationem. Et quoniam humor melancholicus ægre, & nonnulli diuturno tempore coctionem admittit, ideo Patientes impotentes sapissime evadunt; & licet prudentes ac divites, post dogmatica aliqua medicamenta experta, alius seculis pseudo-medici sese committunt; & quavis sapius cum vitæ propriæ discrimine, aliquando tamen evenit, ut sequentis coctionibus, beata vetula accedat die critica; vel, ut observavit Celsus ubi ratio non prodest, aliquando temeritas adjuvet.

Nos autem, relictis Empiricorum vanis & validis antimonialibus; Clymicorum & Paracelsicorum medicamentis mercurialibus, Vangelmontii febrifugo, quod nobis, & forsitan ipsi ignotum reliquit; Methodicorum, ventrem & vomitum moventibus Balneis; Ægyptiorum quinetiam clysteribus; Vulgarium improba vivendi ratione, prava & copiosa alimenta ingurgitantium, & meraciora vina bibentium, Dogmaticorum veram atque legitimam curationem delineabimus: etenim hæc nostra secta, vera ac legitima est, ut quæ ratione procedat: ex eadem & experientia composita.

Distinguiamus primò exquisitam Patientis

nostri quartanam, à notha, quoniam diversæ delumuntur ab unicuique causa indicationes, ut contra Gal. notavit Ital. & exquirat, cum eodem Gal. curationes proponamus, delumendo indicationem à febre, causa toris, & à Vitiis. Inter has autem, quæ à febre delumuntur parvi faciendæ; & ideo Gal. prohibet refrigerantia. Hippocr. vero præcipit quod omnis febris sit refrigeranda, præter quartanam. Sicut itaque medicamenta, ratione toris, in ætate temperata, & potius cruda in primo gradu in pavidis vero, humectantia. Ratione causæ, attenuantia, incidentia, aperientia, & ventriculorum roborantia. Ratione virium, nutrienda, & vires conservantia.

In fonte Chirurgico, omnium primò consideranda sanguinis visio, an conveniat, quo tempore, & ex quo loco. Convenire sanguinis missionem præcipit Galen. cui subscribit quoque Avic. dummodo tamen sanguis niger & melancholicus abundet in venis, ut facilius eile solet cum plerumque in quartanariis laboret lien, qui massam sanguineam depurare non valet, tuncque quoniam numeram quartanæ febris à toto venoso genere toveri potest, educitur sanguis ratione causæ toventis & antecedentis: non autem ratione causæ conjunctæ. Quod si in toto niger sanguis non reperiatur, tunc ita uti nitendus; & ideo Medici præsentiam præcipit ipse Galenus.

Tempus solet esse in principio, cum Galen. si sanguis in toto abundet, niger & crassius, in quibus lien male habet; si minus, non in principio, sed cocta & digesta melancholica materia, cum Avic. tunc enim a ramis venæ portæ ad cavam digeritur, hoc est distribuitur, quo tempore venæ crassiores quoque apparent, & ideo indicans, vitium nimirum in sanguine, reperitur quod ab initio non aderat. Sic itaque conciliantur; Gal. enim ab initio educit sanguinem, ratione causæ antecedentis, si adsit. Avic. vero in progressu, ratione causæ conjunctæ, ut depuretur sanguis ab humore melancholico, a minera febris ad venas distributio; caute tamen, & nonnulli parce educendus, sed potius melanagogis electivè, purgantibus, tunc temporis coctione apparente, massa sanguinea est purificanda.

Locus, est jecorialis, live mediana sinistra ex Gal. vel lateris magis affecti, ex Æt. Salvatella sinistra ut Galen. ex aliorum sententia, cui subscripserunt Paul. Nicolaus, Cardanus, Amatus, Velelius, & ipse Areteus. Communior autem, & magis utilitata sententia est Aetii, quod sanguis ex latere magis affecto educatur, neglecta interna aut media, omnes enim ab axillari procedunt; sed magis apparente & evidentiori tusa, ut crassior sanguis emanare possit. Sic in casu nostro, apperiat vena brachii dexteri; cum sanguinem melancholicum in toto abundare, ex ætate, temperamento, habitu corporis, hirsutie, & vita anteacta facile arguere possimus; non omissa tamen observatione, Medico præsentem expédenda circa sanguinis effluentis qualitatem, à Gal. nobis præscripta. Aperiantur quoque venæ sedales, si suppressa esset coniecta hæmorrhoidalis evacuatio; & in mulieribus, saphena, menstruis retentis aut diminutis.

diminutis. Caeterum in casu nostro, locum non habet, ut in diuturnis quartanis.

Ex Pharmaceutico fonte, si curationem à Gal. proponam attendamus, lenientia omnium primo sunt depromenda, mox preparantia et quoniam melancholici plerumque crudelitibus abundant; ideo, ante humorem melancholicum, pituiton est habenda ratio, qui a primis viis detrudendus, primo vomitu; secundo clythere; tertio lenienti medicamento. Vomitorium paretur, ex iure carniū, radice raphani alterato; addito iulapio acet. & oxymel. simpl. Clyther molis paretur ex decoct. malv. mercur. chamamel. betæ; additis mel. ros. solut. oleo chamamel. ovi vitello, & sale. Leniens sit elect. lenit. cum crem. tart. & modico mierz pieræ. Vel in potu mel. syr. ros. solut. cum lenit. & decoct. cord. q. s. pridie ante accessum animumendum.

Prima preparatio fiat syr. sine diluto, ut diutius ventriculo immorari possint.

U. 4. Syr. de cortic. citri, oxymel. simpl. aq. cinnam. an. unc. i. m. pro syr. & sic pro quinque. Inde reperatur aliquod ex prædictis lenientibus; cui superbibat mullam dilutam, ex aq. hordei paratam. Expiatis primis viis ab humore pituitoso, quibus vacuis a febre, in die quoque accessionis, aliqua erunt agenda, humorem melancholicum respicientia. Sic si ingruente paroxysmo vomitus sponte moveatur, erit adjuvandus; etenim, ex Avic. aut eradicat, aut alleviat: levioribus tamen id fiat, primis diebus, ut supra; validiori us autem in progressu, apparentibus signis coctionis.

In statu febrili, aliquod alterans erit offerendum, quod tamen non valde refrigeret, onus enim febris perfrigeranda, præter quartanam, ex Hipp. & ideo Arist. quoque dicebat, quod in quartanis, semper ignis sit iijiciendus. Sit itaque jus malva, althea, borrag. liquir. ponis apiis, & corticibus citri alteratum; cui addatur aqua cinnam. cochlear. Vel paretur tale iulap.

4. Succ. pom. dulc. unc. vi. aqua flor. citri unc. iii. mosc. ambræ an. gr. iii. sacchari fini lib. i. m. ad ignem paretur iulap.

In febris progressu, evacuantia & preparantia paulo validiora exhibenda, & tandem, apparente coctione, etiam valde purgantia. Ita clysteres validiores parari poterunt, ex decoct. malv. mercur. chamamel. utriusque cent. urez, fol. sennæ; additis elect. diaph. oleo chamamel. vitello ovi & sale. Vomitorium ita paretur.

4. Iuris carniū, raphano alterati unc. x. diasari fennelii unc. s. m. & nisi præstò sit diasarum, substituatur pulvis asari, à drachm. i. ad drachm. ii. Medicamentum verò esse poterit.

4. Elect. lenit. drach. xi. extract. sennæ polypod. an. drach. i. m. f. bol. vel potus.

4. Fol. epit. sennæ, an. m. i. cinnam. integri drach. i. aq. melissæ q. s. m. f. inf. per horas xii. deinde facia forti express. colat. adde syr. de polyp. unc. v. aq. flor. cit. aur. cinnam. unc. s. m. f. p. cui superbibat jus malva, aut hordeo alteratum.

Validiora preparantia erunt, decoctio buglossi, borrag. melissæ, card. sancti, gentianæ, petroselinii, api, cui addantur succi depur. borrag. & fumaria, potius quam saccharata & dulcia. Amara tamen & acida misceri pos-

sunt, ut syr. de cich. cum rhab. præsentibus obstructionibus; vel syr. byzantinus cum aceto. Et licet de usu aceti in preparando humore melancholico, dubitaverit Galen. cum Hipp. conceditur tamen, quando eus curationem, non autem quando præservatiōem intendimus; etenim, ad expurgationem non parum conducit fermentatio, quæ ab aceto excitatur.

Qua prægressa præparatione, & apparente humorum coctione, ad purgantia deveniri poterit; ut ad decoct. epit. Mel ad unc. vi. vel ad drach. s. extracti veratri nigri, cum cassia; quibus superbibendum præbeatur ser. c. prout alim. ad lib. ii. ob hellebori vim exurentem. Quæ purgantia, si ante coctionem præterentur, miseros ægros in damna irrepara ina præcipitarent, nam vel triplex quartana, vel diuturna, vel continua, vel alvi nuxus, nascies, ac tandem mors etiam ipsa consequeretur. Avic. autem intelligendus de humore antecedente, non conjuncto, ab initio purgando; sicut Ital. de quartana per bicecium facta, idest notha, in cujus principio faciliè aliqua coctionis signa observari possunt.

Apparentibus itaque signis coctionis, præbeatur purgans etiam die accessionis; quicquid dicans Gentilis, Savonarola, Mercatus, cum Gal. & Avic Hipp. enim primo tribus aut quatuor interpositis diebus, pharmacum iustum purgans exhibendum præcipit, in ipsa accessione; mox. intercurrentibus aliis diebus, pharmacum deorium purgans præbendum jubet. Pronunciavit autem indehite, aliis diebus, non tribus aut quatuor, ut innuit, humorum coctionem esse expectandam. Die autem accessionis facilius & uberior sequitur humorum expurgatio a pharmaco purgante, quinque aut sex horis ante accessionem, humor ipsa à natura movetur, exhibitio.

Humore autem iterum atque iterum expurgato, si aliqua in visceribus producta fuerit obstructio. syr. fennel. cum rhab. paratus, opportunissimus fuerit, pluries exhibitus, in vino albo tenui; ut qui egregie aperiendo, & humores crassos attenuando, uno eodemque tempore eosdem educat.

Mox Galen. diatrium pipereon, diaspoliticon, aquam cum pipere exhibet. Et tandem, manifestis apparentibus signis coctionis, Theriacam præbet; non autem ante, ne attenuati & commoti crudi humores, duplicem & triplicem quartanam excitent; ut contigit Eudemo Seni, Romæ, qui ab Archigene & Martino, primæ notæ Medicis, præmature Ther. exhibitæ, in triplicem quartanam incidit. Detur autem Theriaca antiqua, duabus horis ante accessionem; molestos etenim rigores mitigat, & humorem attenuatum per varias partes expellit.

Quod si contingat ut rigor diuturnus & vehemens evadat, sitque molestus, præbeatur spiritus vitrioli in aqua præssæ, ab initio, ut Gesnerus; vel gran. vi. piperis integra, cum paucio vino generoso, ut Amatus Luntanus; & spina prælinatus oleo de Scorpionibus Mathioli, vino malvatico dissoluto; vel theriaca aqua vitæ dissoluta.

A proprietate juvant interna & externa.

Interna, Gentiana plures dies assumpta optima cecidit. Die accessionis, in aurora, gutt. 2, quinta essentia torminalium, in exiguo vino cretico, tribus vicibus. Sic aqua theriacalis, aqua vite juniperina. Tristantulum autem cecidit oleum myrrha, in vino cretico sumptum, ad gutt. v. Inter externa, Macellus Medicus princeps, proponit lapillos albos & nigros in ventre mirandulum inventos. Cardanus, dentem serpentis appensum. Fernellus vicentem araneam, in testa juglandis clausam, collo appensam.

Victus rationem quod attinet. Aër sit calidus, ut con ulit Aul. Victus, primis duabus hebdomadis, sit tenuis, mox plenior, sed attenuans, sedula sit a salsa & sinapi enodita. Aëtius tamen aliquantisperat coctionem, ante salsamentorum usum. Ab omnibus glutinosis, flatulentis & refrigerantibus cibis abstinat, & potissimum a carne suilla. Pro potu, aqua, tanquam pelus fugienda; sit itaque vinum album, tenue, calefaciens. Somnus, sub accessione conceditur; impedit enim, vel saltem accessiones moderatur. Excrementum coctiones adjuvat, dum calore excitando, crassos humores movet & attenuat. Animi motus quartanam aliquando solvant ideo ex Gal. multi liberati sunt, ex solo gaudio, alii ex magno timore, ut narrat Rhasis. Sic Quintus Fabius fuit a quartana in pælio liberatus, ut refert Plinius.

Tandem, documentum circa vivendi rationem nobis trahit Celsus; dicens. In vetere quartana prodèst mutare subinde victus rationem, a vino ad aquam, ab aqua vinum; a lenibus cibis ad acres, ab acris ad lenes transire, comedere radicem deinde vomere; Jure puli gallinacei ventrem solvere; oleum ad trictiones adpice; e; calefacientia, ante accessionem; sorbere aceti cyathos, vel vini cretici, cum sinapi; per hæc enim, & similia corpus agitando, & de illo statu movendum. Monet præterea Celsus ipse, quod dum febris quiescit, diu meminisse ejus dici convenit, adeoque vitare frigus, calorem, crudelitatem, lassitudinem; facile enim revertitur. Hæcque, pro curatione hujus quartanæ legitimæ, dicta satis. *Idem ibidem.*

Quartana Spuria.

Juvenis Nob. annorum 18. temperamenti totius & jecoris, ad calidum & humidum vergentis, mediocri habitus, boni coloris; in vivendi ratione, potissimum æstate proximè præterita, in usu fructuum & potibus gelidis delinquens, ineunte autumno præsentis, in febrem tertianam incidit, extensam; pro cujus curatione, serum & stillatitias aquas præscripsit Medicus, verum genio nimium indulgens, medico iussu, easdem gelidas potavit largius, unde obstructions in visceribus, & potissimum liene, oboriri cœperunt. Cessavit nihilominus tertiana febris, licet postea valetudinarius, vixerit, inmodò paucis transactis diebus, rursus febricitaverit, febre quadam, quæ modo tertianæ, modo quartanæ, modo quotidianæ typum servabat, ideoque erratica a Medicis exstimata fuit; donec tandem in quartanam, modo sub finem autumnii, firmata est; quæ cum ve-

hementi rigore ostocopo invadit, cum dolore tamen in hypochondrio sinistro, ubi lien tumidus tactu percipitur. Pulsus sunt frequentiores, calor acrior, urina colorata, seu cruda, sitis molesta, appetitus dejectus, perpetuus motor, & frequens ad iram propensio, tumores quædam habet hæmorrhoidas. Constat autem de salute adipiscenda.

Non unicam esse quartanæ speciem asseruit Gal. dicens, quod Autumno quartanæ sunt, non quartanæ; quia ex atra bile ortum habent, quæ duplicem habet generationem; alteram quidem ex flava bile superflua, alteram vero ex sanguine crasso. Quod idem anobis repetit, dum ait, Quartanam ex trahiliario humore consistere; qui vel a sanguine crassiori, & responderet proportionem in venis, subsidenti in doctio vini sæculæ; tum etiam ex flava bile vehementer adlata, quæ atra bilis melenica est. Et sicut legitima ut a puriori atra bile, ex crasso sanguine orta, melancholia scilicet naturali, ita non legitima, & spuria, ab illa quæ ex flava bilis exustione oritur, quæ atra bilis præter naturam dicitur; & ideo hæc per abscesum fieri solet, nimirum post alias febres, & humorum exustionem; ratissime autem statim ab initio invadit; quantum quartanarum distinctionem si cognovit Hipp. cur eandem ignoravit Gal. ut falso capitur a Tra. Hujus generis autem est præfens, Juvenem Nob. affligens; qui post errores in vivendi ratione, & præsertim fructuum usu, & gelidis potibus commisos, in febrem tertianam incidit, atque in eandem perieversans, in erraticam, tandem obstructionibus in liene adactis, in firmatam quartanam lapsus est. Lien enim ab Hipp. fons aquæ dictus fuit, quia, tanquam sponsa, nimium potum trahit; unde imbecillis & tumidus factus, nec humorem melancholicum attrahere, aut, si cum potibus attrahat, eundem dimittere nequit, & ideo obstructions tumoresque excitantur; siue dicamus aquam appellasse melancholiam Hippoc. quia ubi adultio, ibi multa liquata & expressa humiditas reperitur. Erat autem in adultionem natura pronus Nob. ipse Patiens; sed præterea a prægresso febrili calore, etiam absque ulla naturali propensione, facilis in eam fuisse lapsus, quæ, accedentibus obstructionibus, & ab his libera transpiratione prohibita, in liene & ramis splenicis computrescens, febrem hanc quartanam illegitimam excitavit. Cujus cognitio neminem latere potest, non modo quia typus ejus ideam generatim nobis significare soleat; verum quia & pulsus frequentiores, & calor acrior statim, urina colorata; sitis molesta, & proclivitas ad iram adiunt, & omnium maxime, quia aliis febribus & erraticis successit hæc febris; quæ sicut flava bilis exustionem, ita quartanam illegitimam attestantur.

Hoc autem exustos humores, majori parte attenuatos & lutos esse ex eo patet, quod ad venas sedis irritata natura eos deposuerit; quod statim ab initio rigor vehemens & ostocopos factus fuerit, qui æquum non nisi in progressu fieri solet, attenuato nimirum, in decursu ipsius febris, melancholico humore. Nec exiguum hujusce exustionis signum præbere solet appetitus dejectio, ut contigit Onofriani cum humor melancholicus naturalis, ad

lis, ad appetitum excitandum destinatus, desit, nec ob vias obstruatas, a jecore ad lienem demandari possit; sic & mioror immodicus, exultionem jam factam, & ita præceps, hentem adhuc nobis designant.

Febris hæc, licet, ut quartana, securissima sit, ex Hippocrat. attamen, si ex liene procedat, & cum ejusdem tumore hat, periculosa evadit; imo ex hac nonnullos defunctos vidit Galen. etenim vel ad tabem juvenes, vel ad hydropem senes ducit. Ideo non adeo tuto præiens habenda; cumtumeat lien, & utpote spuria, ac per abscessum facta, difficultioris curationis semper evadet.

Ucunque tamen, longissima semper est, & hæc præteritum; primo, quia spuria, secundo, quia cum lienis tumore, tertio, quia autumnalis, & hyemem attingens. Nihilominus, si Patientis delictorum obitus, obtemperans omnino fuerit, si non proximo solitio, aquinotio saltem verno, liberandum speramus, cum appetentia defectionem ab initio, brevior. In febre prænunciare observaverit Brasavolus. Nec formidanda observationes duodecim annorum, enarrate ab Avic. neque vigintiduorum, a Masfaria, in quadam Matrona Venet, nec triginta, à Forello, sunt eni rarissimi casus, qui in exemplum modo non sunt adducendi.

Curatio autem hujus febris coincidit cum curatione tertianæ notæ; quam ideo Galen. non proposuit. Quare medica intentiones, pro hac tollenda, ab illis pro legitima curanda a Galen. propositis. Primo enim materia antecedens evacuanda, secundo refrigeranda & humectanda. Tertiò lienis obstruktionem aperienda. Quarto humores præparanda. Ultimo expurgandi.

Et a Chirurgico tunc primo desumenda sanguinis missio, quam n agis in hac illegitima convenire quam in legitima quartana puto; cum in prægressis febribus exultio in venis & calida jecoris intemperies fuerit contracta. Aperiatur itaque mediana sinistra; modicè tamen sanguine educto, licet adsit indicans & permittens, cum Patientis nollet. Si visibus valeat.

Et si ulterius probatur ipsa febris, cum lienis obstruktionibus, ex venis quoque sedalibus repetenda erit sanguinis missio. Et præterea cauterium sinistrae coxæ inurendum, ad scissitates melancholicas educendas.

Sunt qui Balneo non inepte utuntur, tredundantibus potissimum in hac febre exultis & melancholicis humoribus, parato ex aq. dulci malva, lauro & calamento alterata, etiam ante manifesta signa coctionis. Verum, hoc tempore frigido, Balneo substituenda universales frictiones, & inunctiones oleo amygd. cum quo vinum malvat. ebullierit.

A Pharmacia depromenda lenientia, præparantia, alterantia, aperiencia, purgantia, à proprietate juvantia & silentia. Lenientia autem erunt primò vomitoria. Secundo clysteres. Tertiò leniens. Vomitus, ratione causæ antecedentis, levioribus procurandus. Clyster parabitur ex decoct. malv. viol. pariet. mercurialis; additis syr. ros. solut. oleo comm. maturo, aut amygdal. vitello ovi & sale. Prout autem ab initio clysteres molliores, ita in progressu aciores conveniunt, ideo addi poterunt

syr. de polypod. elect. diacath. diaphoen. & nujstanodi ana. Lienens erit. syr. ros. solut. de polypod. cum momento; quæ flor. cic. i. Vel lenit. cum t. it. quibus superbibat jus, hordeo, vel malva alteratum.

Alterantia erunt exhibenda in accessonis vigore, ut decoct. cic. borrag. endivæ, malv. melitæ; additis succ. depur. bor. g. endivæ, pomorum dulc. concessio nonnunquam seio. Aëris quippe & lac animun præcipiebat; & Tral. frigidam; quam reprobat Avic. Laudavit autem Aërius, ad hemias quas; sed instanti accessione, ad rigorem inhibendum.

Præparantia erunt ab initio, jul. p. acet. ad unc. iii. cum draçen iii. crem tart & gutt. aquæ cinnam. quod, diebus immunitatis, mane, tertius aut quatuor horis ante cibum, quinque aut sex vicibus exhiberi poterit, à quo minorativum medicamentum comemet, ut syr. ros. solut. vel mel. ros. solut. cum manna clarif. aut lenit. cum diac. th. & t. it. solo, namque diacatholiceone qui rstanum liberavit Rhazis, quibus superbibat jus hordeo alteratum. Ad validiora præparantia & aperiencia mox deveniendum; qualia esse poterunt syr. de cic. cum rhab. syr. de pomis, vel de succo borrag. julap. acet indecoct. cic. borrag. endivæ, agnomæ, scolopendrii, solutis in hac eadem decoct. tart, vitriol. gr. x. quibus utendum septem aut octo vicibus. Sequitur polimodum præparatorum humorum expurgatio, decoct. epith. Mel. syr. ros. solut. n. ita. Vel elect. lenit & diacath. additis pil. de tribus cum thao. quibus superbibat serum depur.

His peractis, si non cedant lienis obstrukciones ad usum syr. Iernel. erit deveniendum, qui in qua agrim. parietum, r. dice veratra nigri infusioni addita, necnon rhab. globulo. eidem jam completo, infuso, qui ad unc. ii. in vino albo, per o. dies præbeat, diebus intermissionis.

Quod si neque his cesserint obstrukciones nec febris, ad validiora deobstruentia properandum, ad decoctum nempe ex salsa electa. ligno tamaricis & cortic. rad. capparum, in aq. stillat. agrim. cic. capil. ven. paratum, quotidie aumendum, cui præmitti poterit bol. ex ammoniaco, & troch. de capparibus compositus, cum aceto squillitico; vel in dicto decocto infillentur gutt. x. aut xii. spiritus tart. pluries rectificati in cujus usu diu insillendum.

Interim exterius pars obstruata illinenda oleo de capparibus, de cyclamine; cum adipe anseris & nitro reformato linimento. Mox formetur ceratum diachylon, cum ammoniaco, aceto squillit. dissolutum, aluta inductum, leni applicandum.

A proprietate juvantia in hac quærtanæ specie, interna esse poterunt, aqua destill. ex succo flor. chamæmeli, ad unc. ii. vel iii. quotidie decoctio climopodii in vino; in hoc verò Patientem, cor leporis præparatum, prout pulmo Vulpis & pulverizatum, atque pro tribus vicibus divisum hora paroxysmi, in vino malvaticeo propinatum.

Extrinsæcus verò, Scarabæus vivus, fulvo

luteo alligatus, & collo appensus. Sec viridis lacerta. Pariter, prima menstrua virginis, brachio dextero alligata.

Silentia tandem sunt consideranda, quæ vel rigorem sedare, vel totam accessionem sistere, ac firmare possunt. Ad rigores sedandos, A natus Luitanus expertus est cyathum aq. ros. in principio. Sic Aëtius frigidam ad duas heminas propinabat. Extrinsecus, illinatur spina oleo majoranæ, vel juniperino, vel oleo antimoni.

Silentia quoque dantur, cuilibet speciei quartanæ accommodata; sic & narcotica ante accessionem, apud Myrepsum Medicinæ principem in usu fuerunt. Hisce autem temporibus, in hunc finem passim exhibetur Chinæ Chinæ pulvis, ad drach. ii. in vini malvatici cyatho propinatus, in accessionis præludiis; qui tamen tuto exhiberi non potest, nisi præmissis copiosis & repetitis evacuationibus, in diuturno scil. febris labore. Secundo, visceribus ab obstructionibus ac tumoribus immunibus; ne aliquin alterutrum horum trium malorum accidat; aut enim paucis post diebus, copioso existente humore, revertitur febris, aut in venis humor retentus, febrem continuam & acutam parit; aut tertio, in via firmatus, visceribus scil. exitialem inflammationem inducit. Quod si China Chinæ deficiat, substitui poterit, ex compositis, Theriaca, Mithridaticum, Confectio ex succo Cyrenæico. Ex simplicibus vero, pulvis Gentianæ: vel clinopodii, pariter in vino malvatico.

Vicius rationem quod attinet, sit refrigerans & humectans, ut in tertiana notha, quidquid dicant nonnulli: ita enim sentiunt Tral. Paul. Aët. Orib. & Avic. Vinum sit album, ut jubet Galen. & Avic. cum illo. Caveat latiens ne impatiens reddatur, & quorundam exemplo, qui voracitatibus & comotationibus liberati fuerunt, liberam vivendi rationem præferat: etenim natura, licet in angustiis insurgat, & concocctos humores superet, atque expellat: iisdem tamen crudis existentibus succumbit, agerque moritur. Cujus rei exemplum habemus apud Benivenium, in villico bis quartanario, qui cum prima vice, concoctis humoribus, sub erroribus gravioribus in vicis ratione, convaluisse visus esset, postea, illis crudioribus, ob eosdem errores, interit. Hæcque satis, pro hac quartana illegitima curanda. *Idem ibidem.*

Febris Quintana.

Vir quadragenarius, temperamentis totius & jecoris, calidi & sicci, gracilioris habitus, gulæ & veneri indulgens, meracioribus vinis usus, ineunte corrente autumno, febre tertiana non exacte legitima correptus est, quæ decimaquarta transacta, in levem quartanam degeneravit, cujus peractis septem accessionibus, quinto quoque die manifestissime invadere cœpit, cum horripilatione, quam mox subsequitur calor manifestus, paulatim increfcens, qui in progressu febris, acris & igneus evadit. Pusillus ab initio, valde obscurus, rarus & tardus est. Urinx, ante accessionem, diebus intermediis, crudæ, tenebræ & albæ, in accessione coloratæ & paulo crassiores: sicut post accessionem, sequenti die,

coloratæ & crassæ. Terminatur vero ipsa accessio circa 24. horam, vel paulo supra, & reliquo tempore omnino infebricitans degit Patiens, cujus febris jam tres observatæ fuere periodi, quinto quoque die, eademmet hora. Quod Patiens ejusque domestici mirati, à nobis consilium petunt.

Nec raro occurrentia Professoribus admirationem injicere debent, prout quintana febris hæc, Patientem nostrum tandem invadens: quæ quidem rara temper fuit, licet rarissima septimana, nonana, atque plurium dierum; quarum raritas Gal. movit ad has omnino negandas. Et licet Hipp. admiserit quintanas, septimanas, & nonas: unde easdem, quibus judicentur circuitibus, considerandas monet. Galen. tamen has febres dari non solum negat, verum & ab Hipp. de his tradita, ejus non esse, sed ab alio infecta suspicari sustinuit: cum tamen te vera dentur, & observatæ fuerint ab Avic. Rhafi, Halyabbate, Aëtio, & Celso: quinimo decimanam in sexagenario observavit Zacutus: quindecim dierum, Gentilis: annuam, Benivonius & Amatus: quolibet septennio, Foetus. Et ipse Galen. tandem cognovit periodos, longe supra quartanam, ejus verba sunt hæc. Quartanus typus est, qui quarto quoque die unam & eandem facit accessionem, ac unam & eandem remissionem. Eadem de quintano & septimano intelligenda sunt. Subdit præterea. Et quintanæ inter se conjungantur, & cum sextanis, septimanis, decimanis, vigesimanis, trigesimanis, quadagesimanis, &c. Hæc Galen. Quæ antea non protulit, quia forsitan periodos hujusmodi nondum observaverat.

Harum omnium causam Avic. voluit esse melancholiam phlegmaticam, factam scilicet per pituitæ assationem, vel per melancholiæ cum pituita mixturem. Secundum alios, utroque modo fieri potest; alii namque humores, licet assati, non sunt ita tenaces ut adeo lente moveantur, & tardius putrescant; qui tamen crassi & lenti humores valde pauci sint oportet, & extra venas communes non solum, verum & ipsorum viscerum, nimirum circa mesenterium, ut adeo tarde putredinem concipiant. Sic febris hæc quintana, in nostro Patientem, ab humore atrabiliari, exustæ pituitæ permulto procedit, quasi paulo copiosior esset, citius accenderetur, & quartanam, non quintanam excitaret; prout & eandem, si exigua & sola esset atra bilis: quoniam diuturno tempore hanc perferre non potest ipsa natura, ut quintanam, septimanam, aut nonanam inducat. Ad hujusmodi humores pignendos, concurrunt in Patientem nostrum, res naturales, temperamentum nimirum jecoris calidum & siccum, ætas quoque consilens: non naturales quoque, pituitæ teraces, meracioris scilicet, vini consuetus potus, immodica Venus, alimenta copiosa: & tandem prægressæ febres non parum exultionem auxerunt, dum primo à bile, pituitæ mista, tertiana notha producta fuit, inde, exultione introducta, in quartanam degeneravit: & tandem, minorata materia, sicq; prorogata periodo, in quintanam firmata est: in qua, horror quidem, sed levis observatur: quia crassus humor, per partes sentientes non ad facile move-

movetur; calor paulatim succenditur, qui polleat acris & igneus percipitur, prout in testa ignita; pulsus rarus & rarus, ob frigiditatem, urinae variæ, sed crassæ omnes; non enim adeo facile huiusmodi humores concoctionem admittunt.

De hisce febribus loquutus Hipp. hæc protulit. Septimana longa est, verum non lethalis; Nonana hæc longior etiam, at non lethalis: subdit vero. Quinta pessima est omnium; etenim, & ante tabem, & tabidis superveniens, perimit. Contra quod prognosticum obmurmurans, ait Galen. in Com. quod Hipp. præfert oculis, hæc arbitrata concribere; quasi quod febres huiusmodi somniaverit, non autem viderit. Aliqui non inepte confirmant quintanam esse septimam, & nonana periculosiorem; eo quod hæc a sola atra bile, quam diutius natura perferre non potest, proveniat; reliquæ vero ab atra bile pituitæ mixta. Sed re vera quintana omnium pessima est; tum si præcedat tabem; tum si tabidis superveniat: non quidem ratione sui ipsius, sed ratione tabis; adeo ut si simpliciter consideretur quintana, magis periculosa esse non possit quartana ipsa, utpote quæ a minori quantitate atrabilaris humoris proveniat, & longius habeat intermissionis intervallum. At si quintana tabem habeat, aut proximam, aut conjunctam, tunc lethalis est, quod scilicet natura sustinere non possit & hecticam & atrabilem febrem. Tabes autem facilius quintana, quam septimana aut nonana accedit: quia humor magis atrabilaris in illa quam in his peccare solet.

Curatio hujus febris similis esse solet curationi quartanae; quam ideo utpote notissimam, consulto omitto, ne tardio, sine Patientis utilitate, afficiam; nonnulla tamen peculiariora addere non verebor, ne in necessariis deficiam.

Et primo, quod major in ea, intensior & longior requiritur attenuatio & incisio: minor vero & tardior humorum purgatio, quam in quartana; idque quoniam humor, sicut crassior, ita paucior exiit, unde majori præparatione, & minori expurgatione eger.

Secundo, quod vomitum commendat Avic. die paroxysmi, ex validioribus, dum ægre naturaliter ad vomitum fuerit pronus.

Tertio, clysteres proponit Rhasis, die paroxysmi.

Quarto, Avic. proponit sudoris provocationem in progressu, & balneum rosulativum: quibus tamen caute utendum monet Aesculapius, si quintana accedat ad hecticam propensio.

Tandem notandum, quod Zacutus sanavit puerum per integrum annum quintana laborantem, decoctione eupatorii quotidie exhibita.

Vicius rationem tennem laudat Avic. & somnum digerentem in principio; deinde in progressu, ad plenioris victum transit. Quæ de hac febre quintana, reliquisque plurium dierum, dicta satis. *Idem Ibidem.*

Febris Maligna tota Substantia.

Vir 35. annum agens, temperamentis totius &

jecoris, calidi & humidus, mediocris habitus, negotiis non parum implicatus, ventre gulaque indulgens, & pravi lucci alimentis continuatus, post itineris laborem, quo, utro citroque, pedibus ad antecessimum suburbium suum recessum, incunte ætate comineabat, ubi cum sodalibus comellationes atque conpotationes immodicas agitabat, domum reverfus, de totius lassitudine triduo continuo conquiescit; mox cum exiguo horrore decubuit, cui calor febrilis, exiguus potius successit, sine ulla symptomate pravo, live noxiæ, aut ingor autentem premebat, non vigilæ, non cibi satietas, solo alvi fluxu hæc secunda die, sed noxiæ tamen quantitate, apparente; qualitate vero, liquida materiam colliquatæ specie: in pulsu vix ulla unquam inæqualitas percepta, celeritate, tarditate, frequentia & raritate, sanorum pulsibus alioquin simili: languido licet quodammodo & humili; urina pariter sanorum urinæ parum dissimilis; & quod mirabile ac rarissimum, cum virum tanta statim libere atque pro ratione, ut vix è lecto surgere posset latuit; quod vomelicis, nos accersendi, ad vomitum, sub finem secunda diei, ausu præbuit.

Sicut in lignum hominem, leonem speciem simulantem, difficillime cognoscere licet, dum genus nolum, malamque voluntatem corde premens, bona tamen dat verba, & blanditus atque adulationibus sodales decipit, ac male agendo eosdem infectatur, atque tandem exterminat, ita de febre maligna adserendum, quæ quidem se placidam, atque mitem effingit, unde Galenus dicebat, quod Debiles & parvæ febres quandoque valde malignæ sunt; si ut contra calida & incendentes, stomacho angustiam, calorem & sitim intolerabilem adherentes, nihil tamen habent nonnunquam periculosum. Et ideo subdit; Licet ad manus sint nates, tamen Patientes perdunt. Hæc, Nobiliss. Pat. nostrum assurgentem, talem esse atque futurum suspicamus; cum duo in eadem observentur pathognomonica signa, malignis febribus essentialibus propria: quorum alterum est alvi duxus colliquativus, non superveniens, ut tradidit Galenus sed concomitans, ut melius observavit. dicens. quod, Colliquatio est perpetuum symptoma febris, quam pestilentialem privi vocitant, quæ mortales vel citra pestem corripit. Hoc est, maligna idealis, quæ vocari potest etiam pestilens, à febre pestilentiali distincta. Alterum vero signum, est celer atque cita virium imbecillitas, à venefica qualitate cor inficiente proveniens: unde statim pulsus humilis & imbecillis observatur. Nec obstat, quod Galenus in hac febre, pulsus esse similem sanorum pulsui asseruerit, hoc enim locum habet, quoad velocitatem ac tarditatem, frequentiam ac raritatem: cum venefica qualitas, potius quam insignis calor putridus cor ipsum corripit: quare in motu quodammodo naturaliter se habet: non tamen validus neque magnus, quidquid dicant Alimarus & alii, impossibile quippe ut a vincente veneno, corde affecto, vitalium virium non sequatur debilitas: quinimo & nonnunquam subitus casus. Et licet pulsus citra omnem ordinis perturbationem, æqualis servetur, hoc lignum est, non putre-

exhibenda, qualis aqua card. sancti, tot. citr. scorzon. de succo ruta capraræ, & omnium maxime cord. Exc. ax.

Quod si febris progressu natura ad cutem vergat, alexipharmacis diaphoreticis tunc erit locus, cum enim veneni quantitas exigua esse solet, solo sudore unius diei febres malignas non semel resolutas vidimus, tuncque spirit. vitr. Corn. cer. phil. Lapis Bezaar. uterq; in aqua scorzon. card. sanct. cord. Sax. copiose exhibita, primas tenent. Pariter lapis hystricis, intusus in aquis cord. mirabilis observatur ad sudores ciendos, & veneficos humores vincendos atque expellendos. Egregium quoque alexipharmacum diaphoreticum, est extractum contrayer. vz. Quæ tamen diaphoretica omnia, non adeo indistincte, neque in principio malignæ febris sunt præbenda, nisi diminutis humoribus, & nonnulli natura ad cutem movente.

Extrinsecus quoque, cordi linimenta & fomenta ad moveri debent. Fomentum quidem huiusmodi.

℞. Aq. melissæ, buglossi, card. sanct. an. lib. i. & floribus citri, ros. an. lib. saceti ros. unc. iii. succ. citri unc. ii. specier. cord. temper. drach. iii. m. pro epith. cordis, quo amoto hat illitus talis.

℞. Ol. de scorp. Matthioli drach. ii. Theriac. antiquæ drach. i. zibethi, benjumi an. drach. f. aceti ros. q. s. m. dissolvantur, & summo digito intincto cor illinatur.

Sympto matibus quarto loco occurrendum. Et quoniam omnia ad unam syntexin, sive colligationem rediguntur, ideo huic incumbendum, non quidem frigida potione, quam propinabant Aet. Paal. & Orib. adversus calorem colligantem, sed potius remediis cogenantibus, dentantibus, subtilipecta facultate præditis, qualis erit terra sigillata vera, ad scrup. i. sic & bolus armenus, pulvis item sinaragdi, ad gr. x. aut xii. omnia in aqua plantag. & meco cydon. exhibenda. Et urgente necessitate, ad opiata gradatim erit ascendendum, & primo quidem id syr. de papav. inde ad laudanum nepenthes, & tandem ad Theriacam recentem, cum margaritis reformatam.

Vires tandem omni iadultri atque arte conservandæ, observando, cum Gal. quod dum vires laborantis debiles sunt, cum insigni corruptione, parum & sæpe cibus sit offerendus, isque facilis coctionis ac distributionis, exiguique excrementi, ut ova recentia, instaurans pulli, cum sacculo cordialibus repleto paratum, condiantur cibi acido citri & lim. Vinum in principio interdicitur, ob humorum cruditatem, quod in progressu conceditur, est enim eximium cordiale, spiritus vivificans & refocillans, vires instaurans, & putredini resistens, interim pro potu consueti utatur aqua stillat. borrag. & aceti. cui addatur quoque portio scorzon. vel aqua secunda cord. Excell. Sax. Hæcque, pro curatione huius febris, dicta satis. *Idem ibidem.*

Maligna Febris Superante Humido.

Invenis Nobilis, 30. annum agens, temperamenti totius & jecoris, calidi & humidi, plethorici & pinguis habitus, ad obesitatem pen-
dentis, otiosam vitam in quodam suo secessu,

alicujus quidem emolumenti, sed paludoso degens: crapulis & compotationibus deditus, hoc incunte Autumno, cum extemporaneis flantibus ventis frigidis, totus ambiens frigidior consuetofactus esset, levioribus vero ipse attivis vestibus indueretur, vehementer refrigeratus, gravibus adeo doloribus totius corporis posttridie correptus est, ut neque stare neque decumbere posset, sequentique die, hellesterna scil. matutinis horis, intense febricitare cepit, ac propterea adventante nocte, accessit Medici. Patientem invenit febre, semper æqualiter affligente correptum, & conquerentem de totius corporis dolore gravativo, ac de absoluta impotentia ad motum, cum pulsus sitis magno sed languido & valde inæquali: urina semper rubra, crassa & confusa: cum foetidissimo halitu ac expiratione, & externum partium tepore. Modo in principio secundæ diei, nos de agendis consulit.

Synochos ne, an potius maligna febris hæc appellari debeat, dabitari posset cum Fernelio, qui malignitatem febribus, etiam sine putredine, accidere posse falso credidit, atque ex anthrace, sive punctura venenatorum animalium, febres, vel sine putredine excitari à solo veneno existimavit, non animadvertens forsitan putredinem sequi puncturam, illam vero, febrem. Ideo synochum putridam, verum malignam, hanc nominare satius fuerit. Synochum quidem: quia, sicut hæc neque in frigida ætate, neque frigido temperamento fieri solet, ita præseus, in juvene temperamenti calidi & humidi, habitusque plethorici se prodit, quæ semper æqualiter affligit, horisque mututinis invasit, cum præludio lassitudinis totius corporis phlegmonosæ, perseverans cum pulsu magno & valde inæquali, in ignis putredinis indicio, urinaque rubra atque crassa. Verum malignam, & quidem magis magisque futuram, etiam hujus principio deprehendimus, primo expulso, qui cum alioquin magnus & vehemens esse debuisset, languidus tamen observatur, mox ex urina, quæ modò valde confusa, turbidam omnino atque subjugalem minitur, præterea ex halitu foetido, quem expirat ipse Patient, excellentis putredinis indicio, ad quam jam pronus fuit, utpotè plethoricus, licet imperfecte, & ad obesitatem potius proclivis, quibus accedit externarum partium, si non in frigiditas, saltem tepiditas, inter maligna signa à Galen. cum Hippocrat. recensita.

Causa autem potissima & immediata hujus febris, fuit improbi sanguinis copia, ab alimentis copiosis, vel potius à consuetis crapulis, merique compotationibus congesta, accedente potissimum vita otiosa: sicut enim, non impleri cibis, & impigrum esse ad labores, tanquam sanitatis fundamenta ab Hipp. statuuntur; ita agitudinum, otium, & repletio, non parum quinetiam adminiculante in paludoso cælo habitatione, cum spiritus, animæ & omnium superationum instrumentum, ex aere & tenuissimi sanguinis portione periturum atque constet. Copiosa itaque impuri sanguinis sarcina in venis, tractu temporis, prava vivendi ratione concervata, nec ab exercitiis, aut ullo alio modo purificata aut diminuta, tandem ex obstru-
& im-

& impedita diaphoresi, excrementis insensibiliter digerendis, intra corpus harentibus: & cessante consueta atque necessaria totius corporis transpiratione, internus calor intensior & præter naturam redditus, putredinem in venis omnibus, vel communibus & maximis, ac plurimo calore abundantibus excitavit, à qua æqualis elevatur sanguinis putrescentis evaporation in cor & totum corpus, sicque febris synochus, eaque homotona accensa est. Verum quoniam humiditas excrementitia in venoso genere redundat, quæ à tepido, & languido naturali calore moderari numime potest, ideo, calore febrili atque præter naturali dominatione, sequitur ejusdem corruptio ac putrefactio, cujus finis est fætor, sive fœtida materia, in præsentis casu manifesta, sicut finis corruptionis nonnunquam est ipse cinis, dum ab excedenti calore ut exultio, & humiditatis consumptio, quarum corruptionem egregie meminit ipse quinetiam Arist.

Febris hæc periculi plena est, quia in hoc ejusdem principio, ab insigni putredine pendere, cum malignitate, ostendunt urinæ, quæ mutantur turbidæ, eademque permanent, vigentem in humoribus perturbationem significantes, præterea summa lassitudo phlegmonosa, copiam humorum naturam opprimientium ostendit, prout pariter pulsus languidus, valdeque inæqualis, insignem non modo, sed excedentem putredinem denotat, quam halitus fœtens confirmat, futuri in febribus, imo & propinqui obitus præsagium, ut observabat A. riatius. Et si in principio, quo omnia, cum Hipp. imbecilliora esse solent, eadem adeo prava conspiciuntur ac considerantur, quid in augmento & progressu ominandum erit atque expectandum?

Nulla itaque interposita mora, cura est aggredienda. Primo, humores, extra & intra venas redundantes diminuendo. Secundo, febrilem & præternaturalem calorem, quantum satis, contemperando. Tertio, ulteriorem putredinem inhibendo, & veneficam qualitatem oppugnando. Quarto, symptomatibus occurendo. Quinto, vires cordis & totius conservando.

Humorum minueratio, medicamento, & sanguinis missione obtineri potest, & quoniam, ubi medicamento, juxta & sanguinis missione egemus, sanguinis missio præferenda est, ideo primo consideranda venit: de cujus indicante dubitari non potest, cum corpus plethoricum sit, venæque copioso, necnon vitioso sanguine sint repletæ, unde lassitudo phlegmonosa & gravativa procedit. Negotium tamen facessere videtur permittens cum pulsus, licet magnus, vehemens tamen non sit, ut esse deberet, attamen, si consideremus quod sine sanguinis diminutione, dubio procul putredo semper intensior atque excellentior futura sit, cum malignitatis proinde majori semper gradus incremento, atque patientis certo exitio: sanguinis missionem omnino admitti debere determinamus. Quam dubitationem consideravit & ipse Gal. dum dicebat. Intemperantes, vinosos, ventrigulæque deditos, nec sanguinis missione, nec medicamentis magnopere adjuveris: etenim per vitæ intemperantiam, copiam vitiosorum

humorum ocysime colligunt, quibus nec magnum admoveere quidem erit tentandum. Quibus verbis nobis insinuat, quæ periculosa sit medicatio in magno & pravo humorum apparatu, cum tamen periculosissima evadat, & lethalis auxiliorum prætermissio.

Injectio itaque clystere, statim ex jecoraria dextra sanguis educatur, non tamen copiose, minusque utique ad animi deliquium, ut in hujusmodi febre, verum non magna, educere solebat Gal. in duobus illis juvenibus, sed moderate, Medico presente, & pulsus tangente: ita enim totam massam sanguineam ventriculo, ejusdem quoque ulterior putredo inhiberi poterit, & natura sublevata a tartaro, quæ premebatur, quod reliquum erit facilius, si non educere, saltem concoquere, & superare valebit.

In progressu autem ejusdem febris, at constantibus viribus, vel saltem si ultimum non deficientibus, repeti poterit ex venis sedalibus sanguinis diminutio, cum venæ externæ nanorhoidales, ut constat, à toto evacuent, quod admittit quoque Gal.

Nec ab hac sanguinis missione detertere valebunt maculæ, seu peticulæ, quæ facile in cute efflorescere poterunt, sanguinis corruptionem & liquationem significantes, quoniam motus ille, ut symptomaticus, ac proinde ut signum, non ut causa considerari debet, quia decementia in melius non statim apparent, ut nos monuit Hipp. Poterunt tamen tunc temporis applicari cucurbitulæ universo corpori, ac etiam dorso, cucurbitulæ enim, non ad profunda, sed à profundis semper ad extimas partes trahere solent, idque non peticularum, sive exanthematum ratione; sed ut sensibilior per sudorem proliciat & procuretur evacuatio.

Phlegmigi quoque, in hac insigni humorum putredine, cor occupante, locum habent, utpote qui a toto venoso genere vapores & humores putridos, necnon ab eodem corde divertere possunt, frictiones interim asperas non omitendo, manibus sudumigio ex decoctione malvæ & chamamelæ elevato, perfrictis, oleorum enim usus, utpote obstruens, non adeo nobis arridere potest.

Educto sanguine, excrementa primarum viarum, per alvum sunt excernenda, Syr. ros. solut. ad unc. vi. addita portione crem. tart. tenuissimæ pulveriz. vel unc. s. elect. lenit. Vel bolo ex cass. cum lenit. & tart. addito scrup. i. pulv. scordii, qui in progressu febris, erit semper cassiæ immiscendus, & tertio quoque die clysteres, cum melle ros. sol. in decoct. malvæ, mercurialis, hordei, betæ & parietariæ injiciendi.

Interim præparandi humores copioso Julapio acet. bis saltem per diem exhibendo, nimirum ad unc. iiii. vel unc. iv. cui nonnunquam addi poterit crem. tart. tenuissimæ pulveriz.

Neque caloris febrilis remissio negligenda, sed pro usu administranda, ne summe refrigerantibus adhibitis, in tanta humorum exuperantia calor natus obruatur, diminuat, sicque putredo adaugeatur. Eligantur autem in casu nostro, potius aquæ stillariæ quam serum, utpote, quæ magis putredini resistere valeant ut.

℥. Aquar. de succo acet. ℥b j. scorzon. ℥ iij. syrup. de acido citri, de succo lim. an. ℥ j. m. pro potu, & in vigore febris, qui etiam in synochus, certis horis observari solet, propinanda. Quod si natura ad cutem vergat, addantur quoque spiritus vitæ gutt. v. Tribus vero transactis noctibus, exhibeatur sorbitio hac.

℥. Decoctio cichor. borrag. endiviæ, acet. ruta caprariz, card. sancti, pentaphylli, calendulæ, dictamni cretici, ℥ vii. cui pramittatur juap. acet. ad ℥ iv. ut supra, quod secundæ vice præberi poterit matutino tempore, quibus, aut tribus horis ante prandium.

Uterior putredo inhibetur refrigerantibus & exsiccantibus substypticis. Hæc autem sunt tenuis substantiæ, ut acida, succus citri, lim. acetum, & hujusmodi alia, non autem crassioris, ut pontica & austera, sorba, corna, & alia hujusmodi. Ita quoque pulveres frigidi & siccæ, nunc sunt conditionis ut in farinam teri possint, & bene cum liquidis commisceri, cæteri namque obstructions parant, vel in intestinis remanent. Quod cum intellexerit egregius Vir Hieronymus Rizzetus, Pharmacopola Venetus, ad lignum S. Margaretæ, & peritissimus Chymicus, Conf. hyacinth. cæterasque, cum magis. perlarum, & fragmentorum pretiosorum compouere cepit, cujus exemplum ut omnes sequantur, in publicæ utilitatis gratiam, hortamur. Quare succi poterunt decoctioni jam dictæ immisceri, ut succus citri, lim. acetæ, cyani majoris & minoris. Pulvis vero statim ab initio parari poterit.

℥. Corn. cer. philos. margar. præp. boli Arm. Orient. ana drachm. j. m. dividatur pro tribus vicibus, & exhibeatur cum aquis ita paratis.

℥. Aqua roriz citr. sc orz. de succo rutæ caprariz ana ℥ ij. m. & cum pulvere exhibeatur ante cibum. At si natura ad cutem vergat, addatur quoque lapis bezoar. Orient. vel infusio in aquis cordialibus scorzonæ, & præclariss. Sax. lapidis hystrici, tuncque, non sub cibum, sed tribus vel quatuor horis ante, pulvis præbeatur. Quæ omnia non unico die, sed quotidie, pro oportunitate sunt repetenda, sicut composita quoque aliqua, & potissimum confectio Alchermes in usum duci poterunt, prout urgente putredine, & venefica qualitate. Theriaca quoque mediæ ætatis, à Medicis celeberrimis exhibetur: indicatur enim à maligna febre, quoniam attenuando aperit, & exsiccando superfluas humiditates, putredinem delet, & facultatem à proprietate roborando, veneno occurrat. Verum debet adesse permittens, & abesse prohibens. Permittens autem est virium robur, sicut prohibens, est puerilis & senilis ætas, cum enim Theriaca, & theriacalia omnia, ex Gal. mediam quandam habeant naturam inter corpus humanum & venenum, ideo proprietatem quoque habent humano corpus contrariam, quam superante non valent pueri, senes, & viribus imbecilles. Cautè itaque semper exhibenda Theriaca, nec adeo facile pueris & senibus, prout facili negotio ægris, etiam brevi morituris, à multis exhiberi solet, tunc enim vitalis facultas languida, ab activitate theriacæ extinguatur, eadem ratione qua exigua flamma à magna.

Extrinsicus quoque, fomenta & illius regionis cordis sunt administranda. Fomentum ita parari poterit.

℥. Aquarum melissæ ℥b ij. è floribus cit. vini albi odoriferi, aqua rosar. an. ℥b. succi cit. aut limon. ℥ iij. acet. ros. ℥ i. Troch. de gallia moschata ℥ j. specier. cord. temp. ℥b. m. pro epith. cordis. Illius autem luc erit.

℥. Theriacæ antiquæ drach. j. oi. de scorp. Matth. drach. i. zibethi, benjuai an. ℥ j. aug. ros. Mef. ℥ j. succi citri, acet. ros. an. q. l. m. res. lium.

Symptomatibus quoque, tum concomitantibus, tum supervenientibus occurrendum. Et quoniam hucusque alia non observantur symptomata, præter totius corporis lassitudinem & colliquationem, adeo & his succurrendum, non solum frictionibus jam dictis, verum etiam asperioribus, nec tantum linteis asperis, verum & manibus vino malvatico mactatis, in quo sal & niterum dissoluta fuerint, colliquationi vero cordialibus, addendo veram atque legitimam terram sigillatam, sicut & bol. armen. orient. Aliis autem quæ supervenire poterunt, diligenter erit attendendum.

De viribus cordis conservandis satis jam dictum fuit. Vires autem totius alimentis eruat sustinendæ, quæ celeriter, facile & optime nutriant, parumque excrementi contineant, erunt autem ptisana hordeacea diluta, panatella diluta, emulsione sem. mel. condita, pulli intectans. atque junioris contusum, ova recentia, succo citri, lim. vel etiam aceto diluta, in quibus parandis globulus, pulveribus cordialibus repletus, commisceri poterit. It. & in contuso pulli extrahendo, aspergatur aqua ros. flor. cit. cum succo citri aut lim. Parum autem & sape cibis est offerendus, cum vires debiles sint, & humores insignem putredinem, imò malignitatem concipiant. Ideo in hunc finem dicebat Hipp. Et quibus semel, aut bis. & quibus plurane, an pauciora offerre oporteat, considerandum esse, habita quoque consuetudinis ratione. Cum noster Pater assiduis crapulis & compositionibus debitus, Vinum, in duobus tantum casibus nostro Patienti concedi poterit, apparentibus scilicet signis coctionis, non autem in hac præsentis summa cruditate. Secundus casus erit, in extremo virium lapsu, vires enim inter omnes indicationes primum locum tenent. Et hæc satis pro casu patienti. *Idem ibidem.*

Febris Maligna Superante Sicco.

Nobilis Juvenis, 30. annum agens temperamenti totius & jecoris, calidi & siccæ, gracilis habitus, hirsutus, laboribus, & exercitiis quam maximè deditus, venationibus potissimum, pilæ ludo & remigationibus delectatus, in victus ratione præterea, meracioribus potibus, itemque aromatibus, pro conditura ciborum, usus, præteritis annis tertianis febrilibus frequenter correptus, tandem modo, hoc autumnali tempore, acuta febre detinetur, quæ eum inæqualibus horripilationibus nudius tertius, circa meridiem invasit, parum, aut nihil, hesternæ die remissa, ut Medicus domesticus observavit noctes omnino insomnes transegit, circa capu,

& pectus parum sudavit, hodie vero, horis maturinis rursus exacerbata est, ac sine ullo horrore aut frigore, cum vomitu porraceo, molestissimo capitis dolore, necnon præcordiorum, & potissimum circa ventriculum insigni æstu atque corporis iactatione. Pulsus sunt celeres atque frequentes, valdeque inæquales, nec adeo constantes, urinæ copiosæ, tenues, nec valde coloratæ, alvus hodie turbata est, & sponte reddidit excrementa cruda, & sincere biliosa, dum interim Patiens ipse, & domestici assistentes, leniens medicamentum, a Viro Excellent. præscriptum hesternæ die, recusarunt, clystere solo contenti. Modò accersiti, de agendis pro salute ita consulimus.

Acuta non solum, verum & aliquo modo maligna habenda febris hæc, ut mos ipsius invadendi nobis demonstrat, sævit enim intensè, & atrocior statim ab initio, in qua quidem, & qualitas, & substantia, & quantitas spirituum, humorum, atque continentium labefactantur, & quodammodo resolvuntur vires, ut ægre resistat Patiens, unde deleteriam aliquam, ac malignam qualitatem ad ægri perniciem atque labores concurrere censendum est, cum enim ex Hippoc. principia & fines omnia sint imbecilliora, nec nisi vi adacti morbi adaugeantur symptomata, si intra principii limites statim appareant sæviora, signum est præsentis causæ vehementissimæ, & aliquo pacto veneficæ. Unde recte quidem Hipp. dicebat, quod Simplicissimæ febres, ac signis firmatæ securissimis, quarto die, aut citius desinunt, deterrimæ vero, ut signis affligentes difficillimis, quarto die, aut citius intermunt. Per deterrimas autem, malignas intellexisse, subdit Gal. Præterea idemmet Hipp. scripsit, quod febres cum comate, labore, lucis turbulentia, vigiliis, & sudoribus, malignæ sunt, maligna namque symptomata, statim in principio apparentis, arguunt contractam antea malignitatem: vel ex malo & multipli humorum apparatu, vel ex prava humorum corruptione, vel ex maligna humorum combustione, quæ subitaneum effectum producant. Quod quidem suspicari possumus in Nob. Juvene, in quo humores quidem biliosi, ab ejusdem jecoris & totius temperamento producti fuerunt, unde præteritæ febres tertianæ, quæ facilius contingebant, cum corpora calida & sicca, ex Gal. ad febres valde disposita sint, licet ab ipso Avic. diversus sit. Verum hi tandem, tum ab ætate, tum a nimis exercitiis, tum & a meraci vini atque aromatum usu, exultionem contraxerunt, pravamque naturam induerunt, qui modo in venis majoribus putrescentes, præsentem hanc febrem biliosam, acutam atque essentiali continuam, pravis symptomatibus comitatum, ideoque malignam produxerunt. Quis enim unquam in bene morata febre, statim ab initio, vigilias, porraceos vomitus, dejectiones crudas sincere biliosas, capitis dolores præcordiorum æstum insignem corporis iactationem, & exiguos sudores in capite observavit? Etenim, primo cum vigiliis. Adolescentulus in mendacium foro decumbens, non dormivit, & septima obiit. Sic mulier apud Penimedem, non dormivit, deliravit, & obiit, Ita Silenus, nec prima, neque tertia, nec postea dormivit, & undecima obiit. Cum vomitu su-

cero, & bilioso, Mulier in mendacium foro decumbens, & parius in Thaso, postquam octava die, nedum in principio, bilioia, deinde nigra evomverunt, ambo perierunt. Ita Philites vomuit primo bilioia, inde flava & virulenta, & obiit. Cum capitis dolore, Sileno statim cepit dolere caput xi. obiit, ita & Philites caput diu dolebat, etiam ante morbum. Sic præcordiorum, & potissimum ventriculi æstus, non solum ingentem in venis majoribus calorem, verum & in venis ipsius ventriculi, navam bilem ebullitionem significat, quibus consequitur corporis iactatio, quæ contigit quoque Calvo in Larissa, quarta die defuncto. Sed sudores quoque, quantitate, & tempore peccantes, Deicientes enim semper mali: unde Hippocr. observabat in illa pestilenti constitutione, quod sudabant quidem, sed non toto corpore. Ita Sileno caput parum sudavit. Sic Lethion in Thaso, secunda die circa caput modicum sudavit, & ambo mortui sunt. Tempore vero: in principio enim, ante signa coctionis sunt, decernentia vero in melius non statim apparent.

Febris autem essentiali vehementiam, cum pravis symptomatibus concomitantibus, ab humoribus, non solum impensè biliosis, sed vehementer exustis atque ferinis provenisse certo credendum, humor enim exustus quandoque talem acquirit pravam & deleteriam naturam, statim veneficos effectus & indicia de se probat. Sic Galen. excrementa mera, maligna appellabat, qualia in vomitu porraceo, & dejectionibus crudis ac sincere biliosis, in nostro Patiente observata fuisse, unde Phreneticus ab Hipp. descriptus, primo quo decubuit dies virulenta vomuit, de quo Gal. ait, in hac Phrenitide, vitiosus humor in corpore concervatus fuit, veneno lethali assimilis, a quo lethale repetente apparuit symptoma, Quare, nec nobis mirari subit, si hujusmodi, aut similibus, in casu nostro præsentibus humoribus, febris vehementiæ, symptomata quoque jam dicta vehementia accedant, sicque ab ingenti calore, primo urinæ copiosæ, sed crudæ, ex quadam colliquatione appareant, pulsus celeres, frequentes, valdeque inæquales, nec adeo constantes, cum ab eodem calore spiritus & vires resolvantur.

Febris hæc, cum in malignis habeatur, spem tamen salutis omnino non adimit, mediam naturam inter salubrem & omnino lethalem servat, namque qui dicit malignam, non infecit necessario mortiferam, nihilominus humorum adustum apparatus, statim apparens, auctus proculdubio ab igneo calore febrili, eminens & imminens periculum minatur, ne ob exultionis excessum, humores ad concoctionem inepti reddantur, absolutam cruditatem acquirant, sicque in urinis, ac reliquis excrementis, signa coctioni contraria insurgant, & ægri salus omnino deplorata evadat. Interim jure merito de aliqua superveniente inflammatione dubitari potest, sanguine a calore fuso, & acrimonia naturæ molesto, ad aliquam internam imbecillitatem partem ab eadem detruso.

Agenda igitur statim a nobis expensa, recto ordine executioni mandanda. Primo, febrem respiciendo. Secundo, causam. Tertio, sympto-

mata

mata presentia, & emergentia. Quarto, pravam & malignam humorum qualitatem. Ultimo vires.

Primus scopus respicit febrem; nisi enim febrilis calor remittatur, humores & sanguinem ipsum torrefacit, bilem producit, vires laetificat, atque resolvit, & coctiones impedit.

Secundus causam petit, nimirum humores putridos, quorum antecedentes statim sunt minorandi, conjuncti præparandi, licque ad concoctionem disponendi.

Tertius oppugnat symptomata, tum concomitantia, tum emergentia. Concomitantia, vigiliæ scilicet, capitis dolores, ventriculi & præcordiorum angores, emergentia, deliria imminetia, & viscerum inflammationes.

Quartus spectat pravam, & veneficam humorum qualitatem, quæ quidem, ut nobis incognita, varia ac diversa alexipharmaca postulat, temperata tamen, utpote ab immoderato calore procedens.

Ultimus, viribus totius & cordis dicatus, cordialibus & alimentis, instaurandis.

Quibus intentionibus ut satisfiat, ordo executivus hic esse poterit, ut nocte proxime sequenti præbeat, cassia, cum crem. tart. cui hora transacta, superbibat Patiens ser. capr. aut asinin. depur. ad lb. Nec obstat turbata alvus, nec Gal. auctoritas, quod si febris fuerit cum profluio alvi, nulla sit opus evacuatione, eo quippe loco locutus est Gal. de alvi profluvio critico cum lignis coctionis, quod licet non fuerit pro multitudinis modo stante tamen coctione, spes esse potest, summa cum ratione, fore ut sit sufficiens, utpote ab ipsa natura sponte procedens, cum in casu nostro longe alia sit ratio, quod non à dominante, sed ab irritata natura alvus profluat.

Crastina vero die, vespertinis horis, nonnihil scilicet remissa febre, & secuta convenienti evacuatione, alvoque subsistente, aliqua, sed parca sanguinis missio locum habere poterit, ex brachio, ad venosi generis calorem ventilandum & remittendum, necnon ad imminuentem aliquam viscerum inflammationem præcavendam: quæ sanguiniseductio, nisi statim usurpetur, antequam vires deficiant, & humorum adustio atque putredo adaugeatur, tarde facta, juxta ac omissa, æquale vitæ periculum inducere posset, omittenda tamen, aut differenda, si succæ bilis vomitus perseveraret, supervenientibus quibusdam ventriculi moribus. Interim observandum, si vigilæ, capitisque dolores persistant, ut duo phœnigmi coxis, si fuerit opus, apponantur, & præterea oxorrhodinum futuræ coronali applicetur, ex ol. rosac. nenuph. succo lactucæ, & citri paratum. Inunctiones præterea refrigerantes toti abdomini, ex ung. ros. M. f. erunt adhibendæ.

Alteranti principem in hac febre locum habent, & nisi adeo crudi forent humores, corpus adeo gracile, tempus autumnale, de frigidæ portione cogitandum esset, quam libenter in hujusmodi febre, post quartam diem præparabat Celsus. Cum autem delint conditiones ejus usum permittentes, ideo eidem alia refrigerantia substituenda, quæ calorem febrilem quidem remittere, at nativum non obnuere, nec humo-

res peccantes crudiores reddere valeant. Erunt autem ser. capr. aut alin. depur. ad lb. ij, cum ꝑ. ij. julap. viol. aut rosac. Quod si diarrhœa, non critica quidam, sed nec symptomatice perseveraret, adeo ut neque cohereri, neque sollicitari postularet, eligi poterunt aq. still.

Ut ꝑ. Aq. de succo acet. lb. ij. aq. scorzon. ꝑ. ij. succi citri, lim. an. ꝑ. j. m. pro pot. in vigore feb. propinanda, sicut pro sorbitione tribus post horis ab assumpta portione, præbenda decoctio cicli. borrag. end. acet. sonci, scabiosa, melissæ, aut ruta capr. cum succo acet. depur. vel cum sale acet. quam sorbitionem cibis subsequi debet, aliis quatuor post horis. In progressu vero, remissio nonnihil calore, loco succi acer. julap. acet. decoctioni jam dictæ addi poterit, utpote quod bilem in pituitam, & pituitam in bilem vertat, cum Avic. præterquam quod exultos humores terment. re, atque attollere, licque ad evacuationem eosdem præparare valeat. Qui ordo procedendi nobis ab Hipp. præscribitur, cum Gal. Et ita excluditur abusus juris, tem. cit. alterati, qui in principio, aut febris augmento passim offerri solet, cujus usu anxietas, ab æstu, & caloris febrilis concentratio patienti minio prorogantur, sicut abusus quoque, & perversus ordo exhibendi sorbitionem ante portionem omnino rejiciendus.

Symptomata, quibus occurrendum in præsens, sunt vigilæ & dolor capitis, quæ nisi ab evacuantibus, alterantibus, revellentibus, atque topicis remissa fuerint, ad optata leviora erit progrediendum, idque tuto quia calidi peccant humores atque vapores. Trabeantur itaque, vel syr. de papav. ad ꝑ. j. ꝑ. vel laudan. nepenth. a gr. i. ad gr. ii. sumum, quo & quæ rosacea dissoluta nares & tempora illini poterunt. Imminetia vero, quæ præcaveri possunt, inflammationes internæ sunt, quibus alterantibus, divertentibus, ac revellentibus prospectum abunde fuerit.

Ideo consideranda alexipharmaca propria malignitatis, ab intenso calore productæ, quæ in humorum exultione consistit, quælibet enim qualitas, nedum sola caliditas, ubi ad plures gradus adaucta fuerit, sapit naturam veneni. Hæc autem, qualitatibus manifestis, vel frigida, vel saltem temperata esse debent, ne exultionem adaugeant. Prærogativam inter hæc solent habere margaritæ præparatæ: sic magist. perlarum: pulvis ossis de corde Cervi: pulvis cornu Rhinoc. sic & corn. cer. philosoph. uterque lapis Bezoar. opportunè exhibitus: Crystallus quoque præpar. & pulveriz. julap. perlatum M. D. omnia quidem in aq. tot. citri, scorzon. addita quoque portione cord. Excellens still. Saxon.

Extrinsecus cordi linimenta, atque epithemata. Epith. ita.

ꝑ. Aq. viol. lb. j. rosac. melissæ an. lb. ꝑ. & flor. citri ꝑ. ij. succi lim. ꝑ. ij. diamarg. frig. drach. j. camph. gr. v. m. pro epith. cord. Linim. vero.

ꝑ. Ung. ros. Mef. ꝑ. ij. specier. cord. temper. drach. ij. diamarg. frig. elixir vitæ an. drach. j. succi cit. & lim. an. q. f. m. pro illitu cord. post epith. adhibendo.

Vires tandem sunt diligenter custodiendæ, observando, quod sicut corpus caco-chymum à

multo cibo, ita ab exiguo valde leditur. Quare parum & sæpe Patiens ille erit nutriendus, parum quidem, quoniam multum non sustinebit virium imbecillitas: sæpius autem, quoniam multis indiget dispositio corruptiva, & huius corporis raritas: tunc facilis resolutio, defectus siquidem exigit adjectionem: corruptio vero temperamentum. Sint itaque, ptisana hordeacea, panatellæ, cum emuls. melouum, ova recentia, potissimum succo citri, aut aqua rosar. alterata, instaurans pullæ, ex margaritis paratum: condimenta ex acido citri, aut lim. Potus, aqua stillar. acet. end. cum acido citri, aut lim. & paucis sacch. aspersa. Vinum in progressu erit concedendum, tenue & oligophorum, apparentibus scilicet signis coctionis, vel viribus deficientibus. Hæcque satis pro casu presenti. *Idem ibidem.*

Maligna Febris Symptomatum ratione.

Generosus Juvenis Mercator, annum agens 25. temperamenti totius, & jecoris, calidi & sicci, mediocris habitus, vini potator egregius, cum hoc æstivo tempore, parum ante canem, iter diuturnum, concitatis & dispositis equis, sub radiis solaribus peregrisset, & vina meraciora uberrimè potavisset; tandem dolore capitis & febre correptus decubuit. Hæc autem cum insigni calore incessit, & exigua, die postera, declinatione: perseverante semper capitis universali dolore pungitivo, cum rubore faciei, & venarum oculorum turgentia. Mane sequenti accersitus Medicus invenit Juvenem acutè febricitantem, cum pulsu celeri, frequenti & duro, urina tenui & flava, siti inexhausta, capitisque dolore acutissimo. Quare statim, imposito clystere refrigerante, sanguinem mediana dextera misit, & hora transacta, cassiam cum pulpa tamarindorum præscripsit, atque altera transacta hora, serum capr. potandum ad ℥ij. ptisanam vero pro prandio. Post meridiem febris exacerbari visa est, juxta cum capitis dolore, ideo addidit Excellentiss. Aditans oxyrrhodinum, ex rosaceo, succo citri & succo lactuca, bregmati frigidum frequenter repetendum, serum pariter depuratum, pro primo alterante, cum julapio violaceo & rosaceo propinavit, sicut aquam hordeaceam, cum conserva de acido citri, pro secundo. Tertia die summo mane, cum alvus ab assumpta cassia bene respondisset, ex altero brachio sanguinis missione parcam idem medicus mandavit. At circa meridiem febris multum invaluit, cum intensiori calore & siti, adeo pro alterante præscripsit aquas stillatitias de succo cich. acetosæ & angurix additis julapiis jam dictis, sicut pro secundo succos depuratos acetosæ & sonci, in cinhoraceorum decoctione, & interim duo phœnigmos coxis apponendos præcepit. Noctem tamen æger prorsus infomnem duxit, manè vero universalis icteritia effloruit, dolore capitis parum per sedato, cum urina valde flava & crassa, pura linteola tingente. Quarta die, febris non adeo intense rediit, sed cum die secunda proportionem servavit, circa vespeream vero, parum de naribus nigri sanguinis stillavit, & rursus reperit nocte qua parum dormivit. Modo in fine quartæ die nos accersiti, ut de agendis

consultamus, invenimus jecur nonnihil elevatum ac durum, de quibus omnibus habita fuit hujusmodi consultatio.

Licet error non exiguus in vivendi ratione, à Patiente nostro fuerit commissus, motibus violentis, & diuturnis exercitiis sub radiis solaribus, hoc anni tempore ferme sub Canè peractis, accedente præterea vini meracioris uberrimo potu, à quibus equidem, tum jecur magis excalesceri, tum tota massa sanguinea biliosior reddi potuerit, nihilominus, biliosum apparatus in eodem antea extitisse proculdubio credendum, si Patiente ætatem, temperamentum totius & jecoris, vitamque antea actam consideremus, omnia enim ad bilis generationem conspirant. Quare mirum non est, si postrema accedente valida ac vehementi occasione, bilis adacta, & ab aliqua ejusdem crassiori portione, vel ab aliqua quintetiam cruditate occlusa, calorem putridum in venis supra jecur conceperit, & febrem excitaverit, quæ sicut in genere biliosa est: ita in specie tertiana duplex appellari potest, & quidem essentialiter continua, quamvis aliquam proportionem, tertio quoque die respondentem, observare videatur, etenim & febris ardens non sine tertianaria proportionem procedit, à qua quidem parum hac declinare videtur, cum intensissimum calorem, & molestissimam sitim secum ducat, quem invasionis modum, adeo vehementem in principio, quodammodo malignum appellare licet, cum qualitas, substantia & quantitas spirituum, & continentium labefactetur, resolvantur vires, & succumbat corpus, ex qua symptomatum intentione, innotescit deleteria aliqua & maligna qualitas, præter spirituum, humorum & solidorum vitium, cum alioquin ex regula, in morbis circa principia & fines omnes imbecilliora esse soleant, & nonnisi invalescente morbo adaugeantur symptomata, nunc vero, statim ab initio, sævus capitis dolor invaserit pungitivus, cum aliqua pullus duritie, rubore faciei & oculorum, qui proinde facile Patientem ipsum ad phrenitidem perduxisset, nisi Medicus, repetita sanguinis missione, oxyrrhodino repellente, phœnigmo revellente, aliis refrigerantibus præstito fuisset.

Verum malignitati jam dictæ, à febris vehementia & intentione procedenti accedit quoque malignitas symptomatum supervenientium ratione, icteritia videlicet ante septimam, necnon meri sanguinis stilla repetita, bilis enim portio quæ caput petebat, & in eodem dolores pungitivos continuos excitabat, dum a Medicis, ad ministratis remediis repellentibus, revellentibus à capite revocata fuit, in venoso genere redundans, vi ejusdem irritante non autem à natura dominante & critica expellente, ad cutem detrusa fuit, sicque intensè pestivè icteritia comparuit, quæ ante septimam, nimirum ante coctionem, nullo modo critica esse potest, expressus Gal. verbis. Nullum abscessum, nedum auriginosum, ante coctionem, criticum esse posse, quæ proinde mala ab Hippoc. fuit pronuntiata, nisi forsitan ante septimam cum rigore invaderet, tunc enim morbum solveret. Quare pravum & malignum symptoma censendum fuerit, potissimum cum hepar tensum atque durum, actu ipso percipiatur, incipientis inflammationis in hac

acuta

acuta febre indicio. Sic maligna quoque stilla meri sanguinis, quia significat quod natura quidem cupiat quod superfluum est excernere: sed ob propriam imbecillitatem id nequeat assequi, vel propter sanguinis crassitiam, vel propter facultatis imbecillitatem, vel propter partium densitatem, vel tandem, propter omnium concursum. Quare dicebat Hippoc. quod quibus rite & largiter sanguis per nares erumpebat, maximè servabantur, nec ullum vidit mortuum, Philiscus vero, epaminon & silenus, quibus quarto aut quinto die parum de naribus stillavit, mortem obierunt. Ideo nonnisi malignissimum symptoma superveniens hoc nuncupari potest, unde & febris, ratione symptomatum, maligna censenda.

Febris hæc, utpote magna, ratione propriæ essentiz magnificienda, vel ea in primis ratione quod statim ab initio prævis symptomatibus sit stipata, lævissimam quippe febrem, ejusque eventum exitialem non raro observavimus. Sicut enim simplicissimæ febres, signis firmata securissimi, tuto & cito solvuntur, ita deterrimæ, ac signis affligentes difficilissimæ, cito interimunt, ut docebat Hippoc. Augetur adhuc periculum à symptomatibus, non solum concomitantibus ut diximus, verum etiam mox apparentibus quorum ratione maligna hæc febris constituenda. Primo enim icteritis ante septimam omnino lethalis esse solet, nisi à jecoris fervore & copia bilis proveniat, ut observavit Gal. vel, nisi superveniat trium evacuationum aliqua, per hæmorrhagium scilicet per alvum, aut per urinam unde Hermogenes, sexta die auriginosus evadit, Heracles apud Aristoclidem, sexta auriginosus factus, vigesima judicatus est, quia omnes jam dictas habuit evacuationes, secus autem Phanagoreon servus, cui cum nulla ex jam dictis evacuationibus contigisset, perit. Sed his accedit, stilla sanguinis meri, quæ ferè semper mortem portendit. Attamen, quoniam Patiens juvenis est, viribusque satis robustis, salus deplo-randa non est, cum natura hucusque à Medico aptissime & tempestive aliqua & sublevata, dicturum evacuationum aliquam facillè Medici possit, in septima.

Ad quas nos interim eadem invitare & sollicitare debemus. Primo humores leviter ad alvum & urinam ducendo, eisdem ad concoctionem præparando. Tertio, calorem febrilem, utpote intensum, remittendo. Quarto jecoris vias refrigerantibus aperiendo. Quinto, vires cordis & totius conservando.

Quibus intentionibus hucusque satisfacere optimè tentavit Vir Excellentiss. Adstans, etenim in fonte Chirurgico, repetita sanguinis missione febrilem calorem intensissimum remittere tentavit, capitiq; dolori occurrit, sicque imminuentem phrenitidem interceptit, quam, cum dolore, pulsus quoque durus minabatur. Ita docet Hippoc. Ut capitis dolorem sedes, sanguinem de venis detrahito. In eundem finem, oxyrhodinum repellens frigidum apponendum præcepit, & phlogismos coxis applicandos. Quare ab hoc fonte alia non superflua deprecanda præsidia, præter clysteres refrigerantes & humectantes, ex lacte butyro & saccharo, vel ex decoct. malv. viol. hord. cum ol. viol. & rosac. & naribus fomenta ex aqua

tepida, vel ejusdem aquæ tepidæ malva alterata, attractio per nares, ad hæmorrhagiam promociendam.

Ex fonte Pharmaceutico sunt desumenda, alvum, & urinam leniter moventia, præparantia, refrigerantia, nonnihil aperientia.

Alvum & urinam simul leniter movere poterit ros. cass. ad drach. ij. bis per diem, sub prandium & cœnam oblatus. Urinam quoque movebit sal prunellæ, in aqua de succo cichor. & acet. ad lb. ij. dissolutus, sicuti utrumque, crem. tart. in pollinem tenuissimum reductus, exigua quantitate, ad drach. ij. scilicet exhibitus. Alvum quoque leniter ctere poterit julap. acet. ad ℥ ij, in lb. ij. feri capr. depur. quibus jam dictis propositis intentionibus latisheri poterit, præsertim si secundi alterantis loco, instituat decoct. cich. end acet. sonchi, hepaticæ, additis syrupis de acido citri, de succo lim.

Quibus opportune administratis, si aliqua succedat ex jam dictis evacuatio, quo natura verget, per loca conferentia & convenientia, eo ducere conveniet, sive per alvum, sive per urinam, sive nares, quæ si perfectè operabitur. Quæ judicantur, & judicata sunt integrè, neque movere quicquam, neque innovare oportet, sed sinere. Spes enim, quæ in angustis posita, in aliqua jam dictarum evacuationum omnino collocata est.

Tandem, vires cordis conservare aliquo temperato cardiaco licebit, ut margaritis præparatis, magist. earundem, cum aquis temperatis scorzon. totius cit. de succo acet.

Vires autem totius, alimentis refrigerantibus, & humectantibus, facilis coctionis & distributionis erunt conservandæ, quæ liquida potius, quam solida sint, cum facilius sit impleri potu quam cibo, inclinet autem victus ratio ad tenuem potius, moderatè tamen habita consuetudinis & anni temporis ratione. Potus sit aqua cich. vel acet. Quæ pro calu præcæti, dicta satis. *Idem ibidem.*

Febris Peticularis.

Mulier Nobiliss. 25. annum agens, temperamenti totius & jecoris, calidi & humidi sedentariam vitam degens, superioribus annis fecunda, modo abhinc tribus infœcunda, post austrinas aëris constitutiones, cum ruri, non longè à stagnantibus aquis diu morata fuisset, & alimentis indiscriminatis, crassi potius & mali succi nutrita, in urbem redux, non multos dies, hoc autumnali tempore, incidit in febrem acutam, cui, cum quadam horripilatione, ab initio calor successit intensus, cum lassitudine totius corporis, oculorum rubedine, & capitis gravitate, in ipsius febris progressu. Vocatus fuit Medicus domesticus, qui mane sequenti vix ullam declinationem ejusdem observare potuit licet ante meridiem exacerbari visa fuerit. Modò, horis vespertinis, ad consultationem accessit, invenimus Patientem acute febricitantem, facie rubra, cum oculorum rubedine, & maculis, pectore, & brachiis potissimum, necnon & dorso quoque efflorescentibus, quarum aliquæ superficiales tantum, plurimum rubri, aliquæ tamen etiam vio-

lacci calor, alix nonnihil quoque extuberantes, & ad tactum asperæ, colorisque flavi. Instant menstruz purgationes, quæ ipsi imminuta esse solent. Pulsus frequentes, valde inæquales & parvi. Urinz potius rubri quam flavi coloris, sed valde obscuræ; crassæ & ferè turbidæ. In quo casu loquuti sumus.

Licet hanc febrem synocham nobis patefiant unica accessio, hucusque observata, rubra facies, cum oculorum rubedine, totius lassitudo quodammodo phlegmonosa, capitis gravitas, pulsus frequentes, urinz rubræ, crassæ & ferè turbidæ, eandemque consistentiâ, totius & jecoris temperamentum calidum & humidum, necnon retenti sanguinis redundantia, nihilominus cum ad cutem statim, diversi coloris, & variz conditionis maculæ & efflorescentiæ apparuerint, peticularem, sive petechialem appellari posse credimus, à nonnullis etiam purpuratam, atque in Regno Chinaram, sericam nominatam à symptomate scilicet sicut singulosa à singultu, & syncopalis à syncopeden minari solet. Ab una tamen eademque causa, febris & peticulæ procedunt sanguine nimium in venis maximis putrefacto, cujus putredo insignis & excellens censenda est, adeo ut sanguis ipse propriam consistentiam, & naturalem unitatem amiserit, & liquatus ad cutem facillè ab irritata natura expelli potuerit, cui, quoniam aliqua portio ejusdem necnon bilioni humoris, non adeo corrupta associatur, ideo peticulæ quoque, non modo violacæ, verum etiam rubræ in cute apparere, necnon eminentiæ quædam, à biliolo humore produci, exanthemata dici, sicut, si humor crassior fuisset, totumque corpus magis densum, papulæ, eminentiæ scilicet majores, variis similes apparuissent, ut in Sileno. Peticulas autem antiquioribus notas fuisse habemus ex Hippoc. qui maculas observavit in pherecida, culicium moribus similes, licet ex medicinz principibus Græcis, solus æturius de iisdem loquutus fuerit. Rarum autem de his mentionem fecerunt antiqui, quidquid dicat Fracast. qui ab ann. tantum 1505. in Italia observatas fuisse valuit, quia parum aut nihil ad morbi curationem faciebant, non enim habent rationem indicantis aut prohibentis, quia non est per accidens, non potest indicare, nec prohibere id quod est per se. Quare si sub nostram considerationem veniant, ut signum considerandæ, copiosi scilicet fusi & corrupti sanguinis, cujus corruptionis in jor vel minor intensio arguitur ab illarum calore, rubræ enim à solo sanguine, etiam ebulliente provenire possunt, sicut flavæ, ab eodem in bilem converso, violacæ, à corrupto; & nigræ, ab intensiori adhuc putredine procedunt. Quam corruptionem nobis significare potest pulsus, si non modo parvus, verum & languidus fuerit, urinz item non modo obscuræ & crassæ, verum etiam turbidæ & omnino confusæ.

Insignem vero putredinem contraxit Nobil. Mulier in sanguinis massa, cum ob ejusdem copiam, superioribus annis fecunda, nunc vero sterilis, atque imminute singulo mense purgata, tum ab austriâ constitutione præterita, necnon, quia paludosa loca diutius habitavit, & prævis alimentis nutrita, sedentariam vitam du-

xit. A quibus omnibus causis, sanguis adaugeri, & putredini atque corruptioni aptus reddi potuit, & periculæ hujus febris auctor fieri.

Quamvis hæc febris à fuso & corrupto sanguine, absque venefica qualitate nonnunquam fiat, de hac tamen, in casu præsentis, dubitari potest, cum peticulæ violacæ plures observentur, color autem non parum faciat ad sanguinis corruptionem dignoscendam. Unde Critoni in pede secundo die postulæ nigræ sunt, eodemque die obiit. Sileno autem, quia papulæ octavo die rubentes apparuerunt, ad undecimam ejusdem fuit protractus interitus. Nobis itaque statuendum putredinem insignem adesse in casu nostro, quæ tamen adhuc veneficam qualitatem non contraxerit, quia pulsus, licet parvi & oppressi, non tamen languidissimi sunt, & præterea, quia non omnes maculæ violacæ, minus verò nigræ in cute apparent, quanquam febris principium adsit, quæ juxta cum ejusdem causa, aut extensive, aut intensive, aut utroque modo augmentum necessario susceptrura sit, unde periculi plena. Et quoniam inter omnino lethales & salutares reponenda est, ideo non desperata salute, ejusdem curatio intrepidè est aggredienda.

Quæ perficienda erit evacuantibus, alterantibus intensiorem putredinem inhibentibus, cardiacis alexipharmacis, & vires totius conservantibus.

Et in fonte Chirurgico, præ omnibus consideranda venit sanguinis missio, peccat enim sanguis, tum quantitate, tum substantia, quia multus & putridus est. Quare de indicante non est dubitandum, sicut neque de permittente, cum in principio pulsus parvi oppressionem, non virium resolutionem significare possint. De prohibente dubitari solet à Medicinz Protettoriis, sive, ut proprius loquar, à vulgaribus Medicis ob apparentes maculas, sive periculosum, motu veluti natura critico, cum tamen primo vix concedi possit, quocumque tempore, confertam peticularum eruptionem febrem judicare posse, minus vero, aut nullo modo, in principio, ante signa coctionis, cum decernentia in melius non statim appareant. Quare ut corrupti sanguinis signum, non ut causa à nobis sunt considerandæ & ideo sanguinis missionem prohibere minime valent, quinimo, si indicandi aut prohibendi vim obtinerent, sanguinis missionem potius indicarent, quam prohiberent. Educatur itaque sanguis, in casu præsentis, antequam vires deficient & sanguis majorem putredinem nanciscatur, injecto tamen prius clystere, ex saphena, cum menses immincant, & quidem moderata quantitate. Verum, sicut proculdubio sanguis mitti potest in principio, non tamen adeo tuto id licet in progressu, non quidem ratione peticularum prohibentium, sed ratione virium non permittentium dum enim insignis in sanguine evadit co ruptio deficient spiritus, concidunt vires, sicque deest permittens, unde mos invaluit, ut in hujusmodi febre, alii post quartum, alii post tertiam diem jure merito à venæ sectione abstineant. In hujusmodi namque casibus miratur quoque Galen. quod Hippocrat. ab initio venam non secuerit, quod tamen excusat

culat quod forsan accersitus fuerit, morbo jam progresso. Et licet Amatus Lulitanus sanguinem ex vena, etiam decima die eduxerit, facile macula illa rubra, non vero prave conditionis fuerant.

In progressu, si aliquis sudor appareat, adeo ut natura ipsa dominatrix, non irritata, ad cutem moveat, cucurbitula scarificata applicanda erunt, non spatulis, sed lumbis, & infra, ut a partibus nobilioribus quam longissime materia abducatur, & revellatur. Sic observabat Orribus ex Galen. quinimo & coxis ipsis, & suris, menstrua purgationes immutata prodierunt. Frictiones quoque fieri solent, inunctione Aetii manibus perfusis, & si aliqua pars princeps magnopere afficiatur, phlegmum quoque, coxis primo, mox etiam brachiis erunt admoveendi, necnon clysteres molliores opportune injiciendi.

Interim prima vix expianda syr. ros. & viol. sol. pore cali. cum crem. tart. superpræbendo ser. depur. aut aquam Nocet. ad sibi s. vel ij. quod si cassia repetenda fuerit, eidem modicum scordii addendum. Remittendus febris calor aquis tili. ex succo cich. & acet. cum syr. de acido citri. & de succo lim. Pro secundo alterante, paretur succus depur. acet. vel præbeatur syr. de succo acet. cum modico succi citri, in decoct. cich. borrag. pentaphylli, sive tormentillæ, & rutæ caprarum, addito in progressu julap. acetoso.

Ulteriorem putredinem, inhibere poterunt frigida, & sicca, tenuium partium, ut sunt succi acidi jam dicti, citri & lim. spir. vitæ. pulv. margarit. præpar. bolus armenia, tinctura corallor. & hujusmodi alia. Alexipharmaca, & cardiaca debent esse hujus conditionis, quæ febrilem calorem non augeant, ut emulsio sem. napi, decoctio acetosæ, card. sanct. rutæ capr. tormentillæ, pentaphylli, & potissimum in usum ducenda cardiaca diaphoretica, in quibus primum locum obtinebit lapis bezoar uterque, lapis hylicis contrayervæ, ol. sulphuris, ad gut. vii. & viii. benignius enim censendum ol. vitrioli. Inter composita vero præpollet aqua cord. præclariss. Sax. efficax quoque cord. fonsæ, ad 3 s. in aquis cord. exhibendum, nec spernendus quoque pulv. à Fracastor. ita descriptus.

℞. Terræ lemnis, boli armeni, tormentillæ, dii, cornu rhinocerotis, vel ossis de corde cervi ana drach. j. m. Dosis drach. j. in aquis cord. insignis quietiam efficaciz à nobis comperta fuit confectio alkermes, legitime parata.

Extrinsecus cor illinatur, vel aqua à fonsæ descripta, vel ol. de scorpiouibus Matthioli, succo citri dissoluto.

Vires quoque totius sunt congrua victus ratione conservandæ. Sic aer sit quidem frigidus, adeo ut Patiens inspiret frigidum, sed tangat calidum. Alimenta sint refrigerantia, ut ptisana hordacea, panatellæ, cum emuls. sem. melonum ova recentia, instantia pullæ, cibisque parum & sæpe offeratur, humorum enim malignitatem demulcere solet, & spiritus frequentius instaurare, qui insigni sanguinis corruptione deficere solent. Potus sit aqua hord. succ. citri alterata, nec vinum concedatur, nisi ob insignem

humorum corruptelam atque malignitatem vires deficiant, tunc enim corruptioni resistere, & vires reficere valet. Sic autem tenue, oligophorum. Quæ pro hac curanda febre, dicta satis. Idem ibidem.

Febris Colliquativa,

Nobilis Juvenis, 35. annum agens, temperamenti, secundum totum, calidi & humidi, calidioris tamen hepatis, mediocris habitus, fructibus copiosis assuetus. cibis condiendis aromaticis usus, & vana meraciora bibem hoc tempore ætivo febre acutissima correptus est, cum ardenti calore & siti incompossibili, quæ tertio quoque die obscuras quasdam exacerbationes habuisse visa est. Medicus accersitus, syr. ros. ventri solvendo exhibuit, cum sero copioso superhausto. inde sanguinem ex jecoraria detrahit, & portiones refrigerantes præbuit. Quarta autem die alvus sponte soluta est, cum evacuatione excrementi crudi, liquidi, sincere bilioli atque spumosi, quæ quinquies, & interdum sexies, usque ad septimam perseveravit, septima vero urinx multæ apparuerunt, potus, rationem atque mensuram excedentes, & undecima oleosa observata urina, cum supernatante nimirum pinguedine, ad instar telæ aranearum, perseverante tamen semper alvi excretionem, quotidie magis magisque graveolente, nonnunquam pingui, & strigimentorum speciem referente. Patientis interim totum corpus emaciatur apparet, plusquam ratio postulet: febris perseverat acuta, lingua aspera, sicca cum vigiliis, & nonnunquam mentis alienatione. Modo nos de agendis pro salute consulit.

Febrem, quæ ab initio Patientem Nob. corripuit, ardentem fuisse existimandum, quia ardentis duo pathognomonica signa, eandem concomitantia, statim ab quarta initio apparere, calor nimirum exurens & inexhausta sitis, cui, quoniam die superverunt crudæ, liquidæ, sincere, spumosæ atque biliosæ excretionem, non conferentes, nec ullum unquam judicium facientes, & in septima urinx copiosæ, cum supernatante pinguedine, colliquationis indicio, appuruerunt: colliquativam febrem eandem factam fuisse certo credimus, quam alvi excrementa confirmant, quæ primo sincere biliosa atque spumosa apparuerunt, ac tandem graveolentia, pinguis, atque strigimenti specie. Hæc autem colliquatio non à malignitate humorum, sed à vi caloris febrilis, seu à magnitudine febris provenire solet, ut consideravit Gal. cujus caloris causa, non solum fervido jecori imputandæ, verum & vitæ antea, nimirum frequenti omnigeno fructuum usui, qui facillime bilescere solent, multo vero magis ob aromata, nec non meri potum. Quæ omnia, tantum in jecore & toto venoso genere fervorem excitant ut non solum biliosissimus sanguis genitus fuerit, verum & ipsa flava bilis excrementitia copiosa, quæ in venis magnis, cum corde & faucibus confusum habentibus, putrescens, mediante prohibita transpiratione, ardentem febrem produxit. ut patet, non solum ex duobus jam dictis signis, verum ex lingua aspera, sicca, ut & mentis alienatione. Hæc autem viscerum, & venarum

effervescencia, quæ neque sanguinis missione, neque potionibus refrigerantibus cedere potuit, humores non solum, verum & adipem atque pinguedinem colliquandi vim obrinuit, quod excrementa & nimia totius corporis consumptio facile produnt, atque hinc colliquativa ipsa febris facta fuit.

Quibus duplici nomine periculosa est. Primo quia cito interficere potest, ut acuta, ubi enim biliosorum humorum dejectio, hypochondriorum fervorem non extinguit, maleficam eam febrem appellabet Galen. cuius acutæ quoque superata, tabis tamen adhuc periculum adest; ideo Parium in Thaso, acuta febre correptum, cui sexta die urina oleosa apparuit, & 120. die obiit, tabidum forsan atque consumptum obiisse crediderunt aliqui.

Omni arte itaque atque industria Patiens à febre acuta vindicandus, & interim ulterior colliquatio inhibenda, Quibus scopis satisfaciendum summè refrigerantibus & humectantibus, corruptos humores evacuantibus, in progressu humectantibus substantiis, incrassantibus, & quodammodo adstringentibus.

Pro quibus explendis intentionibus, frigida potio principem locum habere videtur, tum ratione febris ardentis, tum ratione ejusdem colliquativæ: sicut enim mulsæ potio adversissima, ita utilissima potio frigida frigidam quoque in casu nostro proponunt Aet. Pauli. & Orib. & ratio est, quoniam ardenti calore febrili, nimique colliquanti, remedio est. Unde Gal. omnes conditiones ad frigida potionem requisitas, ad tres redegit, ad vires scil. valentes, signa coctionis, & ardentissimam febrem, quæ postrema conditio se habet loco indicantis, vires permittentis; ut coctio, prohibentis, in hoc autem casu de indicante & permittente non est quod dubitemus. Et licet prohibens dubio vacare non videatur, quoniam tamen vehementissimo calore febrili non remisso, signa coctionis apparere posse, si non impossibile, difficillimum saltem videretur, ideo, non apparentibus etiam manifestis signis coctionis, frigida statim à nobis est: exemplo Averr. qui frigidam propinabat non expectata coctione, æger siquidem, dicebat ipse mori potest ante coctionem exsiccatus, nos autem dicamus, colliquans atque consumptus. Præbeatne itaque, sed non adeo copiosa ut possit calorem nativum obruere, ad ℥b. scil. v. vel vi. summum, sequentibus vero diebus, substituantur aq. stillat. ex succo cich. acet. end. & in progressu quoque, plantaginis, pro alterante primo, pro secundo vero præbeantur succi depur. end. & acet. in decoct. cich. end. viol. acet. hepaticæ.

Interim extrinsecus quoque visceribus epithemata refrigerantia apponantur cordi.

℥. Aq. viol. nymphaeæ, acet. rosar. an. ℥b. species. diamarg. frigid. drag. ij. camphoræ gr. vi. succi citri ʒ iij. acet. ros. ʒ i s. m. pro epith. cordis. Pro jecore.

℥. Succu cichor. depur. ℥b. s. sonci, lactucæ an. ℥b. species trium santal. drach. ij. succi citri acet. ros. an. ʒ ij. m. pro epith. jecoris. Totum vero abdomen illinatur ung. ros. Mel.

Quod si aliqua excrementorum major desideretur evacuatio, præberi poterit cast. cum pulp. tamarind. an. drach. iij. cui mox superbibat aquam Nocer. aut serum depur. sed faciliè sola aqua hordeacea, aut serum depur. utpote nitrosum, sufficere poterunt.

Colliquationis quoque progressus est inhibendus in quem hinc terra sigillata, vera atque legitima, insignem prærogativam habere solet, ad scrup. j. cum aqua plantag. aut portul. portione exhibenda, sic & bolus aruena pallida.

A proprietate vero agere dicuntur, pulvis smaragdi, ad gr. x. præparati, in aqua plantag. & succo cydon. exhibitus.

Quibus addenda victus ratio refrigerans & humectans, ac mediocris, non tenuis, non crassa ardente febre perseverante, qua cedente, minus refrigerans, & magis substantiicè humectans atque incrassans locum habebit, sic pauca tellæ convenient, cum en uls. amygdal. dulc. sem. me. on. & nucleorum pinorum, ova recentia somicocta, cum toto albumine sumpta, jura gallinarum, solus lactuce quandoque alterata, quibus aliquando addatur quoque pes aut portio capitis vitulini. Instaurans par erit cum corallis, margaritis. Et tandem remissa, aut omnino sublata febre, corpus totum jam emaciatum, ad usum lactis ducendum, & ex eodem edulia concedenda, observando interim, quod durante colliquatione alimenta omnia, non calida, sed tepida, imò etiam frigida exhibeantur. Potus sit aqua still. acet. stillatum pulli, quibus addi poterit aliquod cochlear succi cydon. vel granat. cui tandem aquæ immisceri poterit vinum austerum, tenue & oligophorum. Quæ satis pro præsentī febre. Idem ibidem.

Febri Hungarica.

Hungarus quidam Nob. nec minus cruditus quam dives, Patavium accedens cum aliis sodalibus, à nobis consilium petuit quoniam n. odo se totamque Nobilissimam familiam, à quadam febre, secundo quolibet aut tertio anno ferè totam Provinciam Hungaricam invadentes, tueri & liberari posset, multos enim occidere solet, licet plures quoque ab eadem evadant. Febris autem ab eodem ita fuit descripta. Hæc potissimum invadit post austrinas atque pluviosas anni constitutiones, atque fluminum inundationes, & multos eodem tempore eodemque modo affligere solet, invadit magna ex parte juvenes, plethorici habitus & sanguine repletos cum horripilationibus in principio, quibus succedit calor multus, nec adeo suavit, sed potius acris & intensior, magisque intus quam extra cum molestissima siti. Pulsus sunt frequentes, potius molles, ab initio quoque magni, qui tamen progressu dierum, à quarta scilicet, parvi à Medicis percipiuntur. Urinæ rubræ & turbatæ, rubedo adest oculorum, cum acutissimo capitis dolore, & delirio nonnunquam, cum totius lassitudine tensiva, ac oris ventriculi dolore. non sine aliqua durtie. Febricitantibus missio sanguinis, sicuti ante quartam plurimum prodesse solet, ita post eam, multos è vestigio de medio tollit. Terminatur autem, ut plurimum circa septi-

septimam, sive ad salutem, sive ad mortem. Qui servantur sudoribus diffluunt, & nonnunquam tumore quodam, vel pustulis corpore erumpentibus, aut post aures, quibus tamen tardius sanitati restituntur.

Vir Nobiliss. Tutelam ab hac febre, seu præservationem non adeo facile consequi poteris, cum sit morbus regionis, qui Endemius quoque sive Patrius, seu Vernaculus appellari solet, febris Hungarica, a Recentioribus dictus, plurimos enim uno eodemque tempore, eodemque modo, in hac tua regione invadere solet, qui quoniam a causa communi originem trahit, hæc difficulter ab incous evitari potest, aliqua tamen ad hujus præservationem recensere, abs re prius non fuerit.

Et primo, aer cubiculi suffitu alteretur, ex aqua rosacea, succalis citrini, ligno aloës, corticibus citri, cinnamom. & camphora parato. Totum corpus, vestitus ac linteamina, nitida omnia, & a sordibus immunia, serventur, aerque nubilus, & potissimum caliginosus, summo mane, & horis vespertinis arceus, præsertim verò si austrina fuerit constitutio, & prægressæ aut præsentis inundationes.

Secundò, inter condimenta ciborum, aromata non adeo ubertim usurpanda, nec meri secundi calices hauriendi.

Tertio, parce, & nonnisi nocturno tempore somno indulgendum.

Quarto, corpus quam maxime, ante cibum præsertim exercendum.

Quinto, si alvus sponte non bene respondeat, crem. tart. ex jure, corticibus citri, vel cinnam. alterato, dissoluto, sollicitanda, & plethorica corpora, Vere saltem, sanguinis missione evacuada.

Ultimo, animum exerceant, nè cum ingenio, torpeat quoque calor innatus.

Pro curatione autem hujus febris, consideranda veniunt ejusdem Idea & Causa, ut ab iis indicationes pro medela desumi possint. Febris igitur, synochos purgida biliosa erit statuenda quam abunde attingere possunt pulsus frequentes quidem sed quodammodo molles, & in principio magni: urinæ rubræ & turbatæ, sed præterea oculorum rubedo, necnon capitis dolor, ac tandem, quia corpora plethorica corripere solet, quæ sanguinis missione opportune administrata, levantur ac liberantur. Hæc tamen legitima synochos non est, sed quodammodo biliosa, & ideo pulsus non adeo pleni, magni & molles in progressu observantur, dolor capitis pungitivus potius adest quam gravativus: quinimo, & a biliosis tum vaporibus tum humoribus caput calefacientibus, deliria quoque excitantur, litis molestior quam in legitima synocha ægros molestat, & lassitudo, quæ in synocha phlegmonosa esse consuevit, in hac tenuia, mista nimirum ex phlegmonosa & ulcerosa se prodit, sicut a bilioso sanguine, per venas ad coronariam perveniente, ventriculi fit tensio dolorosa.

Verum quoniam peracuta est, septima namque die, ut plurimum interficit aut liberat Pat. Præterea, quoniam plures occidit, & cito vires prosterneat, pusillusque parvos ac languidos reddat, & nonnunquam per pustulas, papulas, alios-

que tumores, decubitus facit, ideo maligna non solum, sed quodammodo pestilentialis quoque, sine peste tamen censenda erit. Quare a sanguinis corruptione in venis maximis & cordi proximus provenire eam credimus, qui mihi-guem & excellentem putredinem adipiscitur, a multis cibis, utque pinguibus & pravi lucri, est enim piscivora gens illa, præterea melones, cucumeres uberrimè comedunt, vinaque meraciora divites aquam vero pauperes bibunt, ætate potius lutulentam, quia frigida est, quam Danubianam, quia calida. Ab his autem omnibus sanguinis quidem proventus, verum & ad putredinem idonei, eoque facilius accedente aromatum & vini meracioris frequenti & copioso usu, adæctas enim & præternaturalis redditus calor, in humidum non naturaliter agens, illud ipsum corrumpere, atque intense putrefacere potest, corruptio autem optimi pessima, quæ non solum intensive, sed extensive quoque ultro progressa, adeo massam sanguineam inficit, atque corrumpit, ut spirituum brevi temporis spatio instaurationem prohibeat, sicque post quartam vires concidant, & eductio sanguinis prohibeatur. Quod si vires alicui satis vegetæ fuerint, corrupti & venenati humores ab expultrice facultate ad ambitum corporis per sudorem expelluntur, eoque facilius si tenues fuerint, quibus crassio ihus, nec facultate adeo valida præditis, abscessus fiunt, pustulis, aut tumoribus alijs, per varias corporis partes erumpentibus.

Jam autem observatum fuit febricitantes illos evadere, quibus copiosi sudores, vel abscessus putridi superveniunt, quod Gal. quoque non præterit. Sicut servari quoque possunt per abscessus ad stranguriam qui non per decubitus sed per effluxionem fieri dicuntur, quibus urinæ copiosæ, crassæ, varicæ, rubentes, veluti & purulentæ, cum dolore fluunt.

Statim itaque tentanda curatio naturam gravatam sublevando, veneticæ qualitati occurrendo, ulteriorem putredinem inhibendo, spiritus & vires conservando, febrilem calorem remittendo, atque symptomatibus occurrendo.

Quibus intentionibus ut satisfaciamus, statim a fonte Chirurgico, injecto clystere sanguinis missio petenda est, movet enim Celsus in hac febre, etiam cum aliqua temeritate remedia esse adhibenda, statuitque optimum esse sanguinem mittere, si vires consent, adest enim plenitudo in venis, & natura a sarcina exonerata, facilius quod reliquum est ejicit & vincit, parcius tamen debet esse sanguinis evacuatio, ob veneni præsentiam, & habita virium futurarum ratione. Locus autem ut vena pedis, ut fiat a capite revulsio, Gal. exemplo, qui in febre pestilenti, per crurum scarificationes libram sanguinis sibi mitti iudic. Quod si vires non adeo consent, ob ætatis conditionem, aut febris progressum, venæ sedales aperiantur.

Quarta transacta die, frictiones asperæ convenire possunt, sicut & cucurbitula sicca, quinimo & scarificatæ, sanguine redundante, & constantibus viribus. Applicentur autem non solis infernis partibus, ut quibusdam consuevit, verum & dorso, cum non ad profunda, sed a profundis.

profundis attrahant, omittantur tamen si abscessus quispiam ad aliquam partem apparere inceperit. Phœnigmi quatuor coxis & brachiis apponendi, ratione revulsionis à capite & revulsionis atque derivationis à corde & à ventriculo. Oxyrrhodina capiti repellentia apponenda, ex rosac. & aceto ros. parata. Ventriculus præterea ung. ros. Mes. illinendus, & tandem, oleo amygdalino exiguo, rosac. immisto perfundendus.

A fonte pharmaceutico reliqua sunt desumenda remedia. Et si primo de evacuantibus loquamur, quidam misso sanguine, & apparente humorum turgentia, ad cor potissimum, purgans exhibent medicamentum, ut elect. de succo rosar. vel ros. Mes. cum flore cassiæ, sero copioso super epoto. Verum hoc magna indiget præmeditatione, ideo Celsus, in huiusmodi febre curanda, dicebat. Non facile sanguinem mittere: non facile ducere alvum: non cruciari vigilia, fame, aut nimia siti convenit. Quod si purgans præbendum videatur, id fiat die secundo, aut summum, tertio; primo quoniam ultra secundum diem humores non amplius turgere solent, & præterea, quoniam progrediente putredine, vires deficiunt, unde dicebat quidam, Cui vita cara est, transacto tertio die à purgatione, omnino à sanguinis missione abstinere. Leniens itaque juxta regulam offeratur, ex flor. cass. tart. & pulv. scordii, aut grani mercurii dulcificati, cui superbibat serum, vel aquam Nocerianam. Ulteriore putredinem prohibentia erunt frigida & sicca, ut succus citri, sum. in aliqua decoctione, nimir. cich. acet. tormentillæ, pimpinellæ, cardui sancti, melissæ, opportuno tempore præbenda. Statim pariter varia alexipharmaca, veneficam qualitatem oppugnantia, sunt in usum ducenda.

Ut \mathcal{L} . Semin. napi, citri an. drach. j. corn. Cer. off. de corde Cerv. zedoariæ an. drach. β . m. cujus dosis est drachma una, in aqua cord. Sax. & card. sancti. Robustioribus vero convenit decoct. scordii, card. sancti, in aqua acetosæ & rutæ capraræ, Quarta transacta die, alexipharmaca diaphoretica opportuna erunt, ut humores à centro ad circumferentiam facilius proliciantur, sudoribus enim frequenter levare solent ipsi Patiente. Ideo huiusmodi pulvis in exigua licet febris remissione observata, exhibendus.

Ut \mathcal{L} . Corn. Cer. scil. præpar. drach. j. lapid. bezoar. orient. \mathfrak{z} j. m. pro duabus vicibus, & in aqua card. sancti, & scorz. exhibeatur, cui addi quoque poterit aquæ sulphuris gut. j. Conferre item poterit extractum contrayervæ, ad drach. β . vel \mathfrak{z} ij. eidem additis bezoar. orient. gr. viii. cui superbibat Patientis cyathum aquæ scorz. & card. sancti.

Interim observanda erit naturæ propensio, ne obnitamur ejusdem proclivitati, licet enim plurimum, in hisce febribus, ad ambitum corporis vergat, quandoque tamen movet ad alvum vel urinam, & frequentius ad aliquam partem abscessus facit, tuncque quo vergit, eo ducere convenit.

Neque negligenda febrilis caloris remissio, & humorum calidiorum contemperatio. Ubi enim turget effervescencia febrilis, Celsus in

hisce febribus frigidam quoque potionem exhibebat; transacta tamen tertia die, & expectata aliqua humorum coctione. Nos vero libenter eandem omittimus, ob vitium imbecillitatem, ac caloris nativi libefactionem, ob veneni præsentiam, qui facile obrueretur; quæ præterea prohibetur à ventriculi dolore, non sine tumore. Quare tutiorem censemus usum aquar. stillatitiar. refrigerantium, de succo acer. end. cum syrup. de acido citri, vel de succo lim. aut julap. ros. & viol. sicut & succi depur. acet. endiv. in decoct. borrag. hepaticæ, melissæ & rutæ capraræ, pro secundo alterante præberi poterunt.

Tandem spiritus instaurare, & vires conservare oportet. Sic paretur in vase vitreoliquor odoratus, ex aqua ros. & flor. citri, addita perexigua aceti ros. portione: vel aqua rosac. infundantur cort. citr. recentis, & acetum rosatum. Paretur præterea liquor ex aqua scorz. & julep. gemmato vulgari aut M. D. Etruriæ, cujus haustus per intervalla à Patiente sumatur.

Vires tandem sunt omni industria conservandæ, ita ut æger parum & sæpe nutriatur, non vero gravetur; & ideo paretur instaurans pulvis, addito pulvere margarit. præpar. In usu sint ova recentia, in jure dissoluta, cui injiciatur quandoque cochlear aquæ rosacæ, vel succi citri, vel omnia simul. Pitina hordeacea diluta convenientissima erit. Et pro potu consueto, aquæ stillat. de succo acer. cum acido citri, aut lim. vel cum julap. item aqua secunda præclariss. Sax. vel tinctura rosar. cum aqua acetosæ parata, & succo lim. extracta. Hæcque, tum pro præservatione; tum pro curatione hujus febris dicta satis. *Idem ibidem.*

Febris Anglicæ.

Medicus quidam Juvenis, qui magnam partem orbis perlustrare decreverat, cum ad Belgas autumnali tempore pervenisset, in febricitantium magnum numerum incidit, & quidem febribus quæ omnino uniformes & sibi similes erant, plurimos unico die interficientes; quare perterritus, cum de itinere suo corripiendo, & brevi interposita mora perficiendo, ac de urbe lubenti animo quam primum deferenda cogitaret, obstitit Medicum esse, qui febres illas epidemicas, perniciosas, viam & communem causam habuisse arbitratus, eamque non exigui temporis, à qua proude non esset ipsi metuendum; ideo medicæ curiositati ut satisfaceret, aliquot dies in eadem urbe moratus est, quibus observavit febres illas acutissimas, vehementissimas, imò & contagiosas, maximè domesticis minus cæteris incolis, & omnium minime, advenis; quæ statim primis horis pulsus efficiebant languidos, inæquales, frequentes, & celeres, cum inquietudine, anxietate, imò & animi defectu. Urinæ quibusdam tenues & aquæ, aliis turbidæ & subjugales observatæ: sudor post paucas horas confertim erumpebat, toto corpore manans, quem ipsimet sibi procurabant; ex quo tamen nimis copioso resoluti peribant aliqui, & sine ipse superstes nullus observabatur; quinimo, si vel Patientis incuria, vel medicis remediis onissis sistebatur, citius interibant. Observavit præterea præ-

præcessisse humidissimam & austinam temporis constitutionem, pluvias frequentissimas & copiosas, aquarum item inundationes non modicas. Quibus observatis discessit, & itinere continuato, literis à nobis percontatus est cujus naturæ febris illa fuerit; cui petitioni satisfaciens, responsum ita scriptis mandavimus.

Febrem, à te nobis adeò accuratè delineatam, Vir Excellentissime, Putridam esse, omni procul dubio asserimus, quanquam non ephimeram, eo quod unco die plurimum terminetur, ut aliqui falso & perperam arbitrati fuerint; qui tamen concedunt infici quoque subtiliorem sanguinis partem. Etenim si solus spiritus putredinem conciperet, quod quidem fieri posse concedimus, cum ex aere & tenuissima sanguinis portione generetur & conslet, omnia verò putrescere possint præter ignem: pulsus primò inæqualitas non adeò evidens foret, quæ putrescentis humoris propriæ; à cujus minera putridæ evaporationes elevatæ inæqualiter, propter transpirationem ab obstructionibus impeditam, inæquales ideo reddunt pulsus. Sed præterea urina sub jugales, crudorum humorum in venis putrescentium agitationem demonstrant, à quorum copia, veluti per cribrum transfusa, cum nativi caloris imbecillitate, tenuis & aquæ quandoque reddantur. Et tandem, solis spiritibus putrescentibus, tanta non succederet sudoris copia; cum solus mador admitti possit. Est itaque putrida febris, eaque continens, & ex his quæ à plurima ac meracissima bile fiunt, quas de Natura Hominis, indigavit ipse Galen. Alia tamen conditio eidem annectitur, quod nimirum sit epidemica, perniciofa atque contagiosa. Epidemica quidem; quia plures uno & eodem modo invadit; perniciofa, quia plures exiguo tempore interficit; contagiosa tandem, quia contactu, per miasmata, communicatur corporibus dispositis, & ex communi causa, & quidem facilius sympathia & sanguine conjunctis atque domesticis. Sed maxime proprie coquendo, epidemicam jam dictam, in Endemia febre contineri asserendum; est enim regionalis apud Belgas & Hybernios, isdem vicinis regionibus, ab Anglia propagata, ubi primo incepit anno 1486. sub Henrico VII. inficiens Gallos, Belgas & Germanos, febrisque Anglica, sudor Britannicus dicta fuit: pestilentialis quoque, & per sudorem digerens appellari solita.

Est autem non solum intemperies calida cordis & totius, sed & morbus à tota substantia, venenatus, magnus, ratione partis affectæ, facultatis & symptomatum, tum præsentium, tum succedentium; in qua tanta est, tum magnitudo, tum putredinis, tum veneni vis, ut natura ultra diem eandem tolerare nequeat, sed copiosis sudoribus, aut plurimum succumbere cogatur, aut nonnunquam liberetur. Perirent aut facilius qui rari habitus facile resolvuntur, per sudores non solum diaphoreticos, sed syncopticos; servantur vero, habitu nec nimis densa, nec nimis raro præditi, à quo admittitur quidem sudor, at sine modum excedenti resolutione.

Febris hujus, sicut causa immediata atque conjuncta, est humor biliosus & valde serosus

excellenti putredine infectus; ita causa procacitærica & communis, est, cum in aere, tum in alimentis omnibus, redundans humiditas; ab aultima constitutione, aquarum inundatione orta, solo & aeri communicata, quæ insigni adeo putrefaciendi atque corrumpendi facultate donata est, ut serositas quoque biliosa, non adeo facile putredini obnoxia, intensè corruperit, & venenum ipsi cordi impertiverit. Unde summa cum ratione dicebat Galen. quod ubi recte anni tempora procedunt, & in se mutuo convertuntur, neque datur pestis, nec alius epidemicus morbus, sed solum dispersi.

Quod febris hæc perniciofa atque lethalis sit, experientia satis demonstrat; quæ terribilior evadit quo sudores unicuique ferè hisce febribus persugium, febricitantes dissolvendo, interimunt; obstitunt autem, ut diximus, facilius, densiorem totius habitum à natura sortiti; quia sudorem quidem, causam morbificam expellentem admittunt, absque tamen integra virium dissolutione; nisi dicamus, & melius, servari posse illos qui putredinem atque venenum in cordis sinibus continent, nullo vero modo, qui in cordis substantia, ut notavit ipse Gal.

Curatio itaque consistit in virium conservatione; humorum putrescentium atque venenatorum educatione; varia alexipharmacorum administratione, & caloris febrilis contemperatione.

Pro viribus tutandis, quinque vicibus, prima illa die, alimentum & alexipharmacum præbenda, ut totius & cordis reficiantur vires ipsæ. Alimentum sit pusilla valde diluta, cum pullæ junioris instaurante, quæ si non adeo præstito sint, prima vice substituatur emulsiō sem. mel. cum pullæ junioris confusis; & pro potu, aqua hordei cum julapio gemmato, aut tinctura rosarum, succo limonum extracta. Aqua quoque secunda præclariss. Sax. ad rem esse poterit. Alexipharmacum autem poterit esse pulvis ita parum.

℞. Bol. armænæ, terræ sigil. margarit. præpar. bezoar. occidentalis, ossis de corde Cervi, cornu Rhinocerotis an. ʒij. radie. contrayervæ ʒj. m. dividatur pro quinque vicibus, & præbeat cum aqua prima cord. præclar. Sax. & quidem una hora ante præscriptum alimentum. Aër cubiculi interim alterari poterit suffumigio ex aqu. rosar. in qua ebulliant cortices citri, myrabol, citrin. & modicum lingui aloës.

Pro evacuatione, sanguis nullo modo convenire potest; ejus namque missio non educit venenum, & vires resolvit. Et licet in peste Asiatica Galen. sibi metipsum, per scarificationes, librari sanguinis eduxerit, acutissima tamen non fuit affectio illa, prout febris hæc; ideo neque audiendus Avenzoar, qui phlebotomia juvenem illum à febre pestilenti liberavit. Vesicantia locum habere possent, tum cruribus, tum brachiis apposita, cum serositates venenatas à corde evocent & evacuent; nam & Aegyptii ulcera excitabant, & Recentioribus, raphanum pedibus, fuisse prius & aceto mandatis, malignitati, attrahendæ, apponere usus est.

Sunt qui medicamentis purgantibus statim

ab initio venenum expurgare feliciter etiam tentarunt. Sic Matthiolus narrat se plures liberante antimonio crytallino, in vino albo infuso; quod certe genus remedii tunc admitti posset, si humores venetici in corpore, non in ventriculis dignoscere possemus; verum quoniam incerta valde hæc conjectura, nec vires satis constant tanto remedio ferendo, ideo omitendum, considerantibus veneticos humores facilius per sudorem quam per alias vias evocat atque excerni posse, in hac præsertim febre, quæ sudorem potius expetere nobis significat; quæque exacerbatur, atque citius Patientes interiecit, si Medicus sudorem filtrare atque cohibere tentaverit.

Neque alterantia, & calorem febrilem temperantia sunt omittenda. Sed quoniam tempus oportunitum non adeo facile nobis conceditur, ideo, vel cum pulvere alexipharmaco in proposito, integra libra aquæ stillatitiæ de succo acetois erit propinanda; vel cum alimento potus erit augendus. Quæ de hac febre dicta satis. *Idem ibidem.*

Febris Hæctica Gallica.

Juvenis quidam dives 25. annum agens, temperamenti totius & jecoris, ad calidum & humidum vergentis, mediocris habitus, vigesimo lue ætatis ante gonorrhœam contraxit, ob quam ad medicum confugiens, ab eodem, aut imperito, aut doloso, sanguinis missione & medicamentis purgantibus fuit curatus; quorum ultio gonorrhœa quidem evanuit, verum capitis dolores, tumores crurum, & bubo in inguine dextro subortii sunt, & ab hoc suppurato, purulentæ & saniosæ materiæ copia tribus continuis mensibus emanavit. Interim capitis dolor cessavit, crurumque tumores delituerunt, sicque quatuor proximè præteritos annos absque ulla molestia transiegit. Verum anno elapso, rursus ab infecta muliere ulcus in glande, & bubonem iterum reportavit, qui pariter à lueri avido, & notario Chirurgo, perperam sanguinis missione & medicamentis tractatus, in deteriorem statum devenit; evanuit quippe bubo, ulcus consolidatum, & subinde papulæ in universo corpore, & in capite potissimum eruperunt, saniosa materia manantes. Dolores insuper, non solum in articulis, sed & internodiis, sæviores spirantibus Austris successerunt, & vires totius defecerunt, ægro in dies semper graciliori: qui tandem duobus abhinc mensibus febricitare quoque cepit, febricula circa vespere invadente, cum levibus horripilationibus doloribus universalibus atque vigiliis; quæ succrescebat cum exiguo calore, in cuius vigore mitescebant dolores; pulsus tardi & parvi, cum aliqua inæqualitate. Modo febris sæpe, sine ulla horrois annotatione iisdem horis exacerbatur, perexiguam habet declinationem, nullamque intermissione, & ab assumpto cibo quodammodo incalescit Patiens; gracilis autem adeo factus est, ut non solum ad atropinam verum & tabem devenisse videatur. Varias hoc tempore peregit purgationes, decocta in usus, vina medicata, aquas libitatas; atque omnino sine sudore, dum gallicum morbum occultare & proprium statum palam facere detre-

tauit. Modo, in hisce angustiis, congruo hoc anni verno tempore, de agendis ipse, cum domesticis, consilium eragitant.

Egregium Juvenem, quatuor abhinc annis lue gallica infectum, ab eadem nunquam vindictam fuisse suspicamus; licet enim per suppuratum bubonem corpus totum diutius expurgatum fuerit; attamen ab imperito medico gallica virulentia, quæ prius in valis seminariis tantum delitescibat, gonorrhœa, vi medicamentorum & missionis sanguinis avocata, quinimo sursum attracta, indeque per totam massam sanguineam diffusa fuit, & plures alias corporis partes; caput scilicet & crura inquinavit, non adhibitis potissimum propriis alexipharmacis. Et licet bene habere tres præteritos annos sibi visus fuerit, nulla tamen fiducia, cum enim lues hujusmodi, non solum cum spiritibus, verum & cum humoribus crassis, a quibus gummata, ad universum corpus & solidas partes intrasset; ideo diuturno tempore latere potest aut equam palam fiat, & proprias exeat vires; ut de viru canino exemplum tradidit nobis Galenus. Utcunque autem, illud certissimum est ex novo sædo concubitu, anno elapso, iterum novam luem Celticam contraxisse, quæ statim se prodidit ulcere glandis, ex attritione scilicet in concubitu: necnon bubone in inguine, hepatis emunctorio; unde in jecore primam sedem occupare plerique crediderunt; sicut alii in cerebro, quia humidus est affectus, caput vero Hippocrat. & Arist. testimonio, est pituitæ & seminalis substantiæ metropolis. Ex eodem autem, quo superius Chirurgi errore, atque præsidiorum medicorum abusu, materia infecta ab inguine revocata, & totum sanguinem inficiente pustulæ in capite apparuerunt; atque ab eodem inflammato papulæ quinetiam in universo corpore, saniosam materiam emittentes, illis non absimiles quæ in aultrina illa constitutione, ab Hippocrat. descripta, grassabantur; in qua describuntur, facer ignis, inflammationes, abscessus, suppurationes, cum materia puri non absimili, verum aliam quampiam præferente; præterea capitis glabrescentiæ, ossium denudationes; hæcque modo cum febre, modo sine febre. Subdit, quod quibusdam brachium, vel totus cubitus decidit; nonnullis totum semur, vel tibia, vel pes totus denudabantur quibusdam anteriora; aliis vero posteriora affliciebantur; & maxime peribant quibus abscessus non fiebant. Quæ quidem omnia luem veneream Hippocrat. quoque temporibus viguisse quibusdam persuaserunt; præsertim cum addat ipse Hippoc. quod omnia gravissima erant, dum pubem & pudenda urgerent. Quibus addunt isti, morbum gallicum in Italia primò innotuisse anno 1495. cum Neapolim oppugnabant Galli, Carolo VIII. regnante, juxta vulgi opinionem; cum tamen lues venerea, ex concubitu contracta, observata fuerit à Saliceto anno 1270. & à Taranta, anno 1418. Nos tamen cum communiori credimus, scilicet illa symptomata ab aultrina & humida prægressa constitutione provenisse, corpora ipsa quodammodo corruptente, & symptomata inducente gallicis similia; omnis enim corruptio ab excessu quantitatum procedit; sic & Gallicus ipse putridum quoddam & humidum in-

Inquinamentum partibus solidis inurit, quo partes ipse obsecra putredine laxantur, dehiscunt, imò & corpore excidunt; & ideo stantibus austeris omnia leviora fiunt, & circa vespere, nocteque, juxta cum febre, exacerbantur; præter dolores articulares & internodia instantes, qui cum à materia sub periostii contenta excitentur, sicut à noctis frigiditate ejusdem resolutionis prohibetur, & ita exacerbantur, ita vigente calore febrili, post noctis medium, eadem attenuata atque resoluta, mitescunt quinetiam dolores ipsi.

Febrem autem, quæ in præsens majus facessit negotium, à virulencia gallica ortam fuisse, non est, quod dubitemus; cum gallica symptomata sit subsequuta, atque horis vespertinis invadat, nocturnis succrescat, non multo tamen calore, pulsu tardo, pituitosi & melancholici humoris indicio, in quibus tanquam firmiori sede, fundari solet Gallicus ipse; licet non inficiandum, in quolibet quinetiam humore copiosiori atque peccante, firmari posse, ut potè à natura derelicto, sive minus custodito; unde dari posse tum biliosas, sive tertianas; tum pituitosas, sive quotidianas; tum erraticas, & quartanariam periodum servantes, sive melancholicas febres omnino sit asserendum; ut plurimum tamen quotidianæ gallicæ observantur, cum virus hoc statim calorem nativum viscerum naturalium inficiat, & coctiones ladens, crudam atque pituitosam materiam adaugeat, in qua putrefacta, febris plurimum in Gallici tantum progressu accenditur; & præterea, quoniam licet Gallica lues in humido putri fundetur, nihilominus in nobis existentem quandam occultam qualitatem in se obtinet, ut & in mercurio ignem experto observare licet; hinc adusta quoque & melancholica corpora reddit. Quare putridam ab initio fuisse pro certo habendum, ut pulsus inæqualitas, accessiones quotidianæ, cum horripilationibus, attestantur; quibus evanescentibus, accessiones insensiles factæ sint; cum tamen continuo febricitet ager, exigua licet declinatione, absumpto item cibo increscat, & gracilis valde sit redditus; quare dubitatur, num hæctica laboret, necne? Equidem, sicut hæcticum, non amplius scheticum esse Gallicum virus in hoc Patientem, censendum; ita hæcticam quoque posse esse febrem ipsam facile credendum, non quidem simpliciter, sed gallicam, in qua calor præter naturam in corde fixus habitualis non est, quod raro contingit; quia in humido putrifundatur lues ipsa; macies tamen hæctica cito accedit, & habitualis evadit Gallica febris, ob putridum Gallicum inquinamentum, visceribus & solidis omnibus corporis partibus inhaerens, ex quo febris, citra annotationem veram, hæctica simul. Non tamen negandum diuturnis febribus, tum gallicis putridis, tum non gallicis, hæcticæ quoque veras quandoque succedere; quod docuit & ipse Galen. quæ tamen diuturnitas non præcessit in hoc casu nostro, quam ideo veram hæcticam simpliciter non esse decernimus.

Cum itaque res ita habeat, curandum statim ut Celtica lues debelletur, quo febricula quoque, cum cæteris gallicis symptomatibus auferatur, antequam verè tabida evadat. Et

licet intentionibus implendis obstat totius atrophia; difficultatem tamen, at non impossibilitatem id infert. Quare salus desperanda non est; cum juvenis sit Patientem, necdum generosa ac propria fuerit expertus remedia.

Qualitas autem hujusmodi cum sit occulta, alexipharmaca requirit, ut extinguatur; quæ tamen sola non sufficiunt, sed exsiccantia præterea, in manifestis, sine oportet; sicut & in pestiferis affectibus, ab Hippoc. in illa austina constitutione observatis; Nec validis purgantibus tolli potest, ut falso quidam crediderunt, & longe minus laborantibus partibus solidis.

Quoniam verò totum, tum purgantibus medicamentis, tum sanguinis missione, satis superque evacuatum fuit; ideo in præsens, statim de alexipharmaco cogitandum; habita tamen insignis gracilitatis ratione; neque propterea vera ac legitima, procrastinanda curatio.

Quare ad guajaci medullam, tanquam ad sacrum & tutum alexipharmacum, est confugiendum; quod licet calidum & siccum gradu secundo, oleaginosum tamen & pingue, dummodo odorum, recens & nigrum sit; cui addenda quoque salsa, ut quæ parum aut nihil calefaciat, & humores non modo congelatos, verum & exsiccatos emolliendo, attenuet atque fundat. China quoque admittenda; cui tamen parum aut nihil fidimus, cum citissime eximias suas vires amittat. Nec ab horum usu nos deterreat totius insignis gracilitas; cum animos addant Cardanus, qui solo jure ex guajaco parato, febrem gallicam duplicem tertianam curavit. Sed magis Scholzius, qui tabidum Gallicum decocti guajaci & salsæ sanavit; prout hæcticum alium Solenander; quod tandem nostra non semel experientia confirmatum vidimus.

De modo autem cogitandum; cum sudorem quoque; ad materiam putridam solidis partibus infarctam, attenuandam, emolliendam atque educendam, necessarium existimemus. Decoctum itaque primo paretur, quod nutriendi facultatem obtineat, hoc modo.

℞. Salsæ electæ unc. j. medullæ guajaci, chinæ rec. an. unc. f. aq. still. acet. borrag. an. lib. j. f. m. f. inf. per hor. 24. deinde adde dimidium pullæ junioris; bull. lente, & cum operculo, ad consumptionem dimidii; facta verò colatura servetur pro duabus vicibus, hora una ante sudorem assumenda. Inde.

℞. Residuum, fol. rec. end. borrag. acet. an. manip. j. aq. opt. lib. xii. pullæ junioris dimidium m. bull. ad consumpt. quartæ, deinde B. M. destill. ut fiat stillatum pro potu consueto; cui pro lubitu Patientis, addi poterit cinam. frustulum, & sacchari fini quantum libet.

Transacta unica hora, b assumpto decocto, sedeat Patientem in labello aqua calida pleno, malva, meliloto, & mercuriali, sive parietaria, alterata, & linteis superpositis cooperto: ita proluciat sudor, ut minus gracilitati officiat, atque materia putrida galico infecta, solidis partibus inhaerens, crassefecta emolliatur atque liquetur; & ita mox facilius educatur in hypocausto; quod octo post diebus subire debet, exigua tamen in eo mora, prolesio potius in lesio

sudore: rursusque aliis octo diebus transactis, ad labellum descendat, & alternatim sic profequatur, ad 40. usque diem.

Sudandi modus iste respicit gracilitatem corporis, & duplici ratione materiam gallico infectam, educendam; quæ cum crassa sit reddita, humectatione eget ut dimoveatur: cumque & ipsa pituita crassifecta, sit quoque humectanda, ut facilius ad morum & evacuationem reddatur: prout notavit Tral. à Gal. edoctus, qui propterea anhelosis copiosum potum exhibebat. At quoniam putrida huiusmodi infectio omnino exsiccationem indicat: ideo in hypocausto ut alternatim sudet ipse Patiens necessarium duximus.

Sed nec vivendi ratio communis & consueta esse debet. Et primo quidem, cubiculum amplum, sed bene clausum sit, ad Orientem situm. Victus non tenuis, non pleuus, sed mediocris, nec attenuans: ideo panis non erit biscocctus, sed subactus cum aqua, china & salsa alterata. Carnes pullæ junioris, vel columbæ turricolæ in prandio quotidie sint in usu: quæ tamen bullisimul cum china, potius elixæ quam assæ. In cœna verò sit ipsi Saxoniarum ferculum consuetum: vel ptisana cum saccharo, & ova recentia, confectiones ex nucleis pineis, & passulæ: Quæ si viribus non sufficiant, vini quoque cyathus in prandio concedatur, albi, tenuis & subdulcis. Somno deficiente, à cœna comedat panis martis portionem. Quies potius quam exercitium conveniet. Alvus clysteribus erit sollicitanda ex lacte, butyro & saccharo paratis, & decimo quoque die cassia cum tart. præbenda. At si multum interdiu ex aqua secunda bibat, tunc potio ex manna clarif. exhiberi poterit, cui tamen superbibat feri depur. libras. Interim totum abdomen ung. ros. Mes. quotidie illinatur, & ut alacri animo degat, ab amicis invisentibus sollicitetur.

Exacto verò sudore, de lactis prius asinini, mox etiam caprini, necnon de Balnei aquæ dulcis usu erit cogitandum: aquæ enim Noceria-næ, à tanta corporis gracilitate, ab usu decocti, & à sequutis sudoribus venas exsiccantibus, effluxus intercipitur, ut praxi observavimus: præterquam quod humectatione substantifica magis egebit Patiens, quam refrigeratione. Totæ ætate verò, vinum ad mensam, china saltem medicatum erit parandum, totumque corpus ol. amygdal. quotidie illinendum. Hæcque pro gallica febris hæctica cognitione, atque curatione, satis *Idem ibidem*.

Hæctica primi Gradus

Iuvenis 30. annum agens, temperamenti totius & jecoris, calidi & sicci, gracilis & rari habitus, post longum iter hoc anni tempore æstivo, quo meraciore vina potavit, iisdem antea quoque delectatus, domum reversus post sudores diurnos nocturnosq: de totius corporis lassitudine & imbecillitate conquestus est, cum sit molestia atque inappetentia, ob quam exiguum cibum sumebat, multum tamen meri potabat, præteritis diebus febricitare cepit febricula quadam adinstar diariæ, citra ullam caloris molestiam, & cum acili tolerantia: quæ tamen transactio diariorum spatio, non modo non cessavit, sed quidem declinavit: imo transactis quinque

tribus diebus, sine ulla accessione semper ejusdem tenoris perseveravit: cuius calor licet mitis videretur, aridus tamen & mordax tactu percipiebatur, semperq: æqualis & sibi similis: cutis quodammodo aspera, corpus totum, non solum gracile sed squalens apparebat, molestis quoque vigiliis divexatum. Patiens tamen se febricitare non percipiebat; quinimo à febre nonnunquam immunis sibi videbatur, cum tamen solita munia obire non posset: pulsus solito frequentior à Medico domestico, parvus & debilis fuit observatus, semper tamen æqualis, urinæ fere sanorum similes. Modo, dubiis sic rebus, nos ad consultationem acciti sumus.

Cum Hippoc. ex solo calore tactu percepto, febrium differentias desumere consueverit, nobis quoque suspicari licebit ex acri & arido huius Patientis calore, febrem adesse; maxime verò si pulsus frequentiam consideremus, usum in corde adauctum à præternaturali calore significantem, & sensibilem operationum læsionem; cum Patiens ad consueta munera obeunda inertis jam redditus fuerit. Sed quoniam æqualis observatur ipse pulsus, urinæque fere sanorum similes, putredinem abesse omnino credendum, adeo ut febris hæc putrida haud censeri possit; sed neque diaria, cum diariorum tempus consuetum jam excesserit; & præterea, quoniam calor mitis & suavis non est, ut in diaria, sed oridus & acris; & quia in diaria Pat. seipsum febricitare cognoscit, cum alioqui calor febrilis, non semper æqualis & idem sit, sed incrementum & decrementum habeat. Quare a sufficienti febrium exclusione, in tertio genere, hæctica scilicet præsentem contineri necessario concludendum, quod facile vobis confirmant res naturales, nimirum temperamentum totius & jecoris, calidum & siccum, ætas juvenilis, habitus gracilis & facile resolvable; unde dicebat Galen. quod Nullus habitus humidus ab initio statim hæctica febre corripitur: sed qui natura sicciores sunt, calidæque temperaturæ, qui in vigiliis & laboribus degant. Quæ omnia adfunt in nostro Patientem, in quo non minus conspirant res non-naturales: præcesserunt enim iter longum, caniculari tempore susceptum; præterea meracioris & copiosioris vini potus, ciborum abstinentia, aut saltem parcitas, cum sudoribus redundantibus; à quibus jam dictis procatareicis causis febrem hanc excitatam fuisse minime dubitandum, licet hæserint Mercur. Vega, Actuarius & Avenzoar, à causa scil. protractica statim provenire posse; quem tamen scrupulum eximit omnino Gal. dum triplicem tradit hæctica originem. Primam quidem à causa procatareica. Secundam ab aliis præcedentibus febribus. Tertiam ab aliqua prævia interna inflammatione, ventriculi scil. jecoris, renum, pulmonis & intestini coli. Et licet Avic. quoque quodammodo à Galen. dissentire videatur, consentire tamen: quia rarè aut difficulter id fieri posse affirmavit. Quid si rarè, ergò aliquando; præterquam quod hæcticam ab initio fieri, licet omnino negari possit, à causa tamen procatareica admittendum, præsertim in corpore ad hæcticam ita disposito, in quo facilis fuit caloris introductio, non solum in spiritibus & humoribus, verum & in solidis cordis, & totius corporis partibus: quæ
calori

calor, ut factus & habitualis, ideoque semper æquans, febriculam jam dictam, citra caloris molestationem, cum facili tolerantia excitavit, quam hecticam, hoc est ægre solubilem, sive fixam & habitualement, quia totius corporis habitum infideat, vocavit Galenus. Hæc autem in primo gradu constituta est, qui roridam tantummodo substantiam, primis hisce diebus, calor ipse febrilis depascitur, nondum vero carnosam, minusque prurigeniam; & ideo nondum signa secundi, minus verò tertii gradus apparent.

Ad prognosticum accedentes, consideramus quod in morbis semper facilius est redundans minuere, quam dicens supplere. Verum quoniam in hoc hecticæ principio, exiguus valde est defectus, ideo non admodum difficilis fuerit ejusdem curatio; rationem reddit idem Galenus, dicens quod, Ubi adest intemperies & sola effervescencia in corde, sanare facile est, at ubi effervescencia sequitur consumptio, difficile; tunc enim virtus perpeffa est humiditatis inopiâ. Quare salutis spe concepta, curatio statim instituenda.

Quæ duplicem habet intentionem. Primam à febris essentia. Secundam à viribus desumptam, cum enim causam solventem non habeat, nec præservativam intentionem habere necesse est. Itaque, ratione febris refrigerandum & humectandum; ratione virium, substantiæ humectandum.

Quare pro hac curanda febre, nullam convenire evacuationem, nec per sanguinis missionem, nec per medicamenta, nulli non apertum est; sed alterationem atque nutritionem omnes in curatione partes implere.

Pro hac igitur curanda primi gradus, duo generosiora remedia proponit Galenus, à reliquis medicinarum Principibus recepta; frigida scilicet potum, & balneum. Diximus autem hujus hecticæ primi gradus remedia esse; quia in hecticæ principio, multò magis urget caliditas quam siccitas, cum non adhuc corpus exsiccatum fuerit, ac proinde refrigerantia potius, quam humectantia indicentur. In progressu verò, quoniam augetur & invalescit siccitas, & corpus absorbetur, ideo tunc vice versa, humectantia magis quam refrigerantia conveniunt; quinimo à refrigerantibus, eo statu, læduntur corpora graciliora, naturali calore destituta: unde in progressu lactis usum frigida potui substituemus, quod expressit Galenus, dicens, Primis diebus frigida convenit, dum vires validæ, & sanguis copiosus in corpore existit: non sic in progressu. Unde frigida potu Juvenem quendam præservavit, ne in hecticam incidere: imò & sanavit Mulierem, autumnii tempore hecticæ laborantem, moderata frigida portione. Sic Tral. ab initio frigida exhibendam docet.

Antequam tamen frigida nostro Patienti proponatur, primarum viarum expiatio procurari poterit, cass. cum tamarindis, & quidem tutius quam syr. ros. aut alia portione, quæ confertim evacuando spiritus resolvere, vires minuere & valde exsiccare solet; bolis autem superbibendum præbeatur serum depur. ad lib. ii. Aquæ qualiter sit dulcis, levis, ad vi. vel vii. libras. Neque observandæ omnes conditiones à Gal. pro-

positæ, frigida potum prohibentes, nimirum imbecillitas viscerum naturalium, gracilitas corporis, cruditates & obstructions, infuetudo, & anni tempus frigidum, quoniam alibi eadem restrinxit ad febris ideam, virium robur, & signa coctionis. Verum in casu nostro, frigida potui latet idea febris, vires eam permittunt, neque attenditur humorum coctio. Ergo propinqua: quanquam ea non admittit, aqua stillatitia, serum & hujusmodi alia refrigerantia substituentia forent.

Secundum generosum remedium, pro hujus hecticæ curatione, est balneum, quod quatuor habet partes; constat quippe ex aere calido, aqua calida, aqua frigida, & loco deteriorationis. Huic autem hecticæ principio, convenit frigidum, si audiamus Galen. dicentem, quod balneum hecticos nihil juvat, nisi in frigida dimissi fuerint, & licet periculum sit ne in anticum frigidum deducantur, remedium tamen consistendum non est; satius enim est cum aliqua fiducia, vel etiam periculo aliquid agere, quam ægrum certæ morti relinquere; item potentibus remediis pugnare quam nihil agere; præterquam quod possumus postea calefaciendo mederi. Hæc Galenus. Qui tamen tepidum proponit in hecticæ progressu, sicut tepidum, deinde verò frigidum, dum vires valde imbecilles, & corpus gracilius ac emaciatum fuerit, qui balnei postremus modus, utpote tutior, à nobis eligi & usurpari solet, namque humiditas aquæ tepore facilius infumatur & detinetur, si illico affatum superaffundatur frigida, in quem finem & Tral. præcipit inunctionem statim à balneo; sic & Aetius. Quare & nos, post levem linteis mollibus non deterfionem modo, sed corporis exsiccationem inungimus oleo amygdal. & viol. simul mistis, toto abdomine ung. ros. Mef. illito: præterquam quod à tepido balneo facilius quoque redditur alimentorum distributio. Efficacius autem redditur, alteratum foliis malv. viol. nymphet, lactucæ, salis, brancæ ursinæ.

Abalneo dormiendum non est, sed potius alimentum assumendum: ideo Gal. à balneo lac exhibet, præsertim imbecillioribus, Tral. autem ptisanum præbet.

Secunda intentio erit dirigenda ad virium conservationem.

Et ideo, primo aer inspirandus frigidus sit. Secundo notandum, quod hecticis copia ciborum noxia est: quare parum & sæpe nutriendum. Cibi autem in hoc primo gradu, sint æqualiter refrigerantes ac humectantes, nec adeo facile resolubiles: sic ptisana apta erit, pulvis item ex lacte, ovis, penidiis, & saccharo: quibus nonnunquam hordei quoque farina addi potest. Carnes decoquantur cum cancri & ranis, absceso capite. Potus sit destillatum pulli, cum sem. frigidis lact. viol. & end. Vinum damnat Tral. at saltem sit album, subdulce, oligophorum. Tertio somnus sit longior, corpora enim extenuata alimentis & longo somno sunt reficienda. Quarto, parum aut nihil exerceatur: cum balneum & reliqua sat sint pro exercitio. Quinto alvus lubrica servetur jure malvæ, cum sacch. prima mensa sumpto: vel clyst. ex lacte, butyro & sacch. paratis. Ultimo, animo hilari ab ira & molestia: etenim spiritus tristis exsiccatur ossa: juxta Poetam.

Attenuant vigiles corpus miserabile cura.
Idem ibidem.

Hæctica secundi Gradus.

Nob. Juvenis annum 30. agens temperamenti totius, & jecoris, calidi & sicci, gracilis habitus ad iram maxime pronus, post animi graves affectiones, & meri potum copiosum, caniculari tempore nuper præterito, ardenti febre correptus, & Medico domestico curatus, decima quarta judicatus est, prægresso sanguinis è naribus copioso profluvio. In cujus febris curatione Medicus ipse sitibundo Patienti potum denegavit, rigide adeo, ut præ calore & siccitate, uti: itque absumi sibi visum fuerit. Et licet decima quarta ab ardente fuerit judicatus, febricula tamen perseveravit; cujus quoniam nulla unquam accessio observari potuit, ideo Patientis sese a febre liberum atque immunem existimavit; licet Medicus febriculam, tanquam obstructionum sobolem, non abesse crediderit. Jam vero integer præterit mensis, cum necdum recedit febris ipsa, imo nec vires instaurare potest Patientis, quin potius in dies languidior atque gracilior evadit; tandemque à Medico familiari observatum fuit, quod duabus ac tribus horis ab assumpto cibo, totum corpus incalcescat, quo tempore pulsus sit magnus & frequens, semper tamen æqualis; urina sanorum fere similes, & in præsens continuo decumbere cogitur, cum nostrum poscit consilium. Accersiti itaque, observamus gracilitatem universi corporis evidentem, cum cutis quadam asperitate; pulsus debilem atque durum; caloremque totius aridum & acrem, in primis verò calidiora arteriarum loca; Quibus omnibus consideratis, ita sati fuimus.

Febricitantem Patientem hunc, non modo in præsens, verum & semper, ab ardente febre præterita febricitasse censuimus; atque hæcticam febrem istam subsecutam esse sancimus; tum quia symboleitas, ut cum philosophis loquamur, non exigua intercedebat, ætatis, temperamenti totius & jecoris, habitus corporis, anni temporis, & causarum procatarticarum præcedentium, ira nimirum, mororis & meri potus; tum maxime ob radentem febrem, quæ exurentem calorem cum insigni siccitate, & sitim inextinctam perpetuo comitem habuit; & potissimum, ob denegatum misero patienti aquæ frigidæ potum, quæ unica de causa hæcticæ febres: identibus succedunt. Hujus autem febris præsentiam agnoscimus, ex arido & acri calore, qui mitis tamen tactui ab initio, apparet; præterea, quia semper æqualis fuit, ut ideo infebriticantem antehac Patientis se ipsum existimaverit; quia calor factus æqualis nullam infert alterationem, citra quam verò non sit sensus; quæ vera est ac legitima ratio: non autem Mercati, quod scilicet calor paulatim, non subito & confertim agat in humidum. Hanc verò febrem primum gradum præterisse, & in secundo constitutam nobis significant, primo calor duabus aut tribus horis increvenscens à cibo, adeo ut incompressa adnotatio facta videatur: quod signum indubitatum ipsius hæcticæ appellabat Gal. quod sit propter humiditatem, mediante alimento, in sicco impressam: prout contingit

si aqua calidæ vivæ superaffundatur. Et licet hoc signum ab hæctica inleparabile sit, non tamen in primo gradu discerni potest; cum nondum vigeat siccitas morbosa, quæ ab assuso humido alimento evidenter accendi & alterari possit; quidquid dicat Joannes Bravus. Neque tamen tortè credendum, quamlibet si cicitatem esse omnino de febris hæcticæ essentia, ut falso existimarunt Mercurialis & Mercatus; quoniam ab initio siccitas erigua valde existit, adeo ut non possit sensibilibus operationes ledere; & ideo de essentia hæcticæ febris non est; sat enim quod aliquo tempore ab hæctica excludi possit. Quod expressit Gal. dicens: quod Proprium iis qui marasmi sunt affines, siccitas est, quoniam hæctica febris sæpenumero sine siccitate consistit. Sed præterea hanc hæcticam secundi gradus nobis designant, insignis totius corporis gracilitas, aridiuscula cutis, arteriarum loca calidiora, non intercepto de calidis vaporibus, à carne superstrata iudicio; pulsus item debilis atque durus, ob vires prostratas, & maximam arteriæ siccitatem; qui à cibo sit magnus & frequens, non quidem ratione usus adaucti sed quia virtus roboratur ab alimento, & arteriæ siccæ ex materia vaporosa molliores redduntur; non tamen sit magnus absolute; quia in hæctica nunquam talis esse potest. Urina autem in hæcticis, similes sanorum esse solent; quæ tamen si bonæ, parum conferunt ad salutem; si verò malæ & crudæ, periculum adaugent, ut considerabat Gal. cruditas enim & ipsa, facultatis concoquentis imbecillitatem significat. Quibus ita se habentibus, calor hæcticus & habitualis, non modo roridam, verum & cornosam & adiposam corporis partem, cum Gal. sive cambium, cum Avic. occupat ac depascitur; atque ita febrem ipsam in secundo gradu, non exigua tamen latitudinis constituit.

Sicut hæctica primi gradus facilis, tertii verò impossibilis sanationis est; ita hæc in secundo gradu posita, medio quoque modo se habet; adeo ut neque facilis, neque impossibilis, sed difficilis tamen sanationis evadat; cariosa enim atque adiposa substantia consumpta, difficilius quam rorida & longe facilius quam congenita ac radicalis reparari potest. Quare, cum difficultas impossibile non importet, aliqua spes salutis concipienda, atque curatio proponenda.

Pro qua, medicæ intentiones erunt, Curativa, à natura febris; & Vitales, à viribus desumenda. Præservativas omittimus; cum causam foveantem non habeamus, quæ præservativa indigeat indicatione; quinimò, quoniam hæctica hæc febris jam progressa est, secundum gradum jam assecuta; curativa intentio cum vitali coincidere videtur. Primo enim & principaliter humectandum. Secundo loco refrigerandum; ratione verò virium, pariter substantifice humectandum; atque ita coincidunt intentiones jam dictæ, quibus substantifice humectantibus satisfieri poterit, quibusdam refrigerantibus non omisissis.

Quibus consideratis, frigidæ potioni, quæ hæcticæ primi gradus statim convenit, lac erit substituendum; non neglecto secundo generoso remedio balneo scilicet aquæ dulcis. Antequam tamen ad lactis usum ducatur ipse Patientis, aliqua præ-

præcedat oportet primarum viarum expletio, cass. exhibendo, cum pauca pulpa tamarind. cui superbibat, et transfactis horis, iteri depur. lib. j. a. quo tribus post horis prandeat. Aliqua quoque præparatio instituenda esset, vel melle ros. vel iulapio acet. tamen sicut pituitosis amicissimum, ita biliosis inimicissimum, a Gal. habetur; ætiam autem exsiccare nulli non constat. Quare, iulapio acetoso addendus syr. de rib. co, vel syr. de pomis, superhaulto jure alterato cich. borrag. end. malva & violis; quinque vero transfactis horis, repetatur cassia supra dicto modo. Possumus & Hippocratico more alvum solvere, & primas vias abluere copiosa lactis asinini exhibitione, ad heminas, ad integram scil. phialam; ventrem enim solvit ita corporeose sumptum, vias abluat atque mundificat, nec ullam partibus siccitatem relinquit.

His peractis, ad lactis usum erit ducendus æger; sitque asinum, utpote quod facilius per corpus distri. uatur, & nonnihil refrigeret. Incipiat autem ab unc. iv. cum dimidio cochleari sacchari fini; mox procedendo ad unc. vi. vel ix. & ad integrum cochlear ipsius sacchari, ideo Gal. dicebat, assuesciendum esse ægrum ad lac ipsum. Asina autem ducatur in cubiculum; recens namque multum esse debet, alioquin, ut genitale semen, vires amittit.

Balneum, ut quod maxime corpus totum humectat, alimenti quoque distributionem valde juvat, si fiat cibo jam concocto sicut statim a cibo cruditates parit, & a longa inedia vires diminuit. Quare tribus horis ab assumpto lacte, in balneum duci poterit Pateriens, quod tepidum sit, ex Galen. præcepto, in progressu hæcticæ, frigidam in fine balneo affundendo, ut contractis porositatibus cutis, humiditas a tempore introducta contineatur.

A balneo, levissima statim deterfiones, molliissimo panno sunt instituendæ, corpusque totum oleo amygd. copioso inungendum. Cordi quoque aliquod epithema, calorem ejusdem habitualem contemperans, ac spiritus vivificans apponi poterit, ex aquis viol. ros. nymph. flor. cit. additis speciebus cord. succo citri, & limonum. Sic hepatis succus, cich. depur. addito aceto ros. utilis esse poterit.

Hisq. omnibus congrua victus ratio erit adjungenda, quantitate & qualitate. Quantitas sit, quæ ab imbecillo calore superari possit; & ideo in his casibus, parum & sæpè æger nutriendus. Unde Hippoc. rectè considerabat; Quibus semel, aut bis, quibus plurane, an pauciora offerre oporteat. Qualitas sit substantificè humectans, boni succi, facilis coctionis & distributionis, at non facilis consumptionis. Et quoniam lac hanc obtinet prærogativam, ideo lactaria quoque, & edulia ex lacte parata, non solum concedi, sed & in usum duci debent. Præstana secundum locum obtinet, cum ovo recenti, saccharo, & gutt. aliquot aq. flor. citri, aut ros. parata. Ova recentia nunquam omitenda. Contusa pulli, cum caudis cancerorum & ranis, dempto capite. Jura carniū addita testudinum pulpa. Neque fructus omnino interdiciendi, ut melonum pulpa, ficus aliquando, & uva pensilis, necnon pyra ac poma cocta. Vinum album, tenue, subdulce & oligophorum

concedi poterit. Pro potu autem consueto, præter aqua ex iucco pomor. dulcium & borragine, B. M. destillata, totum diu noctue modocriter pannis contegatur, ne a m. offri. ore calor ad centrum cogatur, sicquæ agis accendatur atque exsicceatur, neve ad aperta nimium diaphoreti, humiditates substantificæ simul cum viribus resolvantur. Somnus omnino non concietur. Quies omnino procuretur. Atus paulus, vel prunis damascenis, cum saccharo in jure coctis, aut clysteribus ex lacte, butyro & saccharo paratis lubrica ferentur: amittuntur passiones, & potissimum morores, a quibus sicut ex parte hac febris critica originem duxit, ita ab iisdem foveri & conservari posset, arceantur. Quæ pro hac curatione dicta sufficiant. *Idem ibidem.*

Hæctica tertii Gradus, sive Marasmodus.

Juvenis, 35. annum agens, temperamentum secundum totum & secur, calidi & sicci, gracilis habitus, hæmorrhoidali sanguinis profluvio obnoxius, post animi mœiores vehementes, propter uxoris & filii dilectissimi obitum, hypochondriacus redditus, tandem, ætate nuper elapsa, in febrem acutam incidit, quæ ita recessit; superstitie tamen febricula quadam, quæ vix ab ipso percipiebatur; quoniam medicus & ipse nonnunquam eundem omnino a febre immunem exultavit. Quoniam vero Pateriens parvissime comedit, tenuiori etiamnum diæta imaginatus se ab illa febricula liberandum; cum tamen quotidie calor acrior & aridior fieret, habitus multo gracilior, vires languidiores, & ab inedia, attenuato sanguine, ejusdem profluvium ex hæmorrhoidibus longe copiosius hoc tempore manaret: Propterea ad Medicum rursus confugere coactus est, qui cassiam cum tart. præscripsit, syruposque alterantes aperientes; ratus vero, quotidie, tribus horis ab assumpto cibo febrem exacerbari, cibandi tempus mutavit; nec tamen calor iisdem horis ab assumpto cibo invalescere unquam desinit, urinis supernatante pinguedine, telæ aranearum simili. Interim jam duo præteriere menses, quibus hac febricula detinetur; unde nos ad consultationem accersiti fuimus, qui invenimus Patientem febricitantem, cum pulsu frequenti, duro ac languido, necnon parvo; urinis a sanorum non valde alienis; crudioribus tamen, sed sine ulla supernatante pinguedine antea observata, cum calore valde arido, asperiori cute, ungibus aduncis, toto corpore squalido, prout & facie nonnulla Hippocraticæ signa præferente; etenim nares acutæ sunt, oculi concavi quidem, nondum tamen partes iisdem circumpositæ, omnino carne destitutæ, collapsa tempora, contractæ aures, cutis, circa frontem potissimum, dura & arida, totius faciei color pallidus atque livens, abdomen valde depressum atque exsiccatum, nec adeo evidenter, ut antea, totum corpus incalescit a cibo. Quibus omnibus consideratis, consultatio hujusmodi habita fuit.

Juvenem Nob. in melancholiam valde pronum, propter dilectissimæ uxoris & unici filii obitum, ad hæcticam dispositum fuisse, quid mirum? si præ tristitia quosdam tabefactos perisse asseruit Gal. qui & juvenem vidit, post cogn.

tationes, tristitiam atque labores, à Diatriariis ad Marasimum fere deductum; sicut patiter ex macore & vigiliis, Mulier quædam autumnii tempore, à Gal. quarto die hectica fuit deprehensa; adde quod in præsentî Patientē accessit febris acuta, quæ corporis humiditates absumere, & calorem acriorem reddere potuit: qui tandem, cessante quoque causa fonte, fixus & habitualis in corde productus est. Unde febris primo putrida in hecticam degeneravit; & ideo se febricitare non percepit Patiens. Hæc tamen augmentum suscepit, & invaluit ob tenuiorem victum, ab ipso Patientē servatum; necnon à largo sanguinis ex venis sedalibus profluvio; non parum adminiculante totius & jecoris temperamento calido & sicco, & habitu gracili, cum habitus humidus non adeo facile hectica febre corripitur, sed potius natura sicciore calidæ temperaturæ, præsertim anni tempore calido, ut docuit ipse Gal.

Sed quoniam in hectica contingit cor pati, prout in lucerna fomes; in primo namque ejus gradu consumitur velut oleum in lucerna circumfusus; in secundo, oleum ellychnio affusum; in tertio vero substantia ellychnii, quæ ideo rumpitur, & præ ariditate continuitatem amittit, cui etiam magnam olei copiam superfundas, uberior tamen flamma accendi non potest, sed semper rara ac tenuis, veluti palpitat & continuo fit minor, donec omnino extinguatur: ideo consumptis primis humiditatibus, roridis scilicet, cum Gal. & innominatis atque roridis, ex Avic. cum primus jam præterierit hecticæ gradus, qui antehac difficilis quidem cognitionis, facilis tamen curationis fuerat: cui secundus successerit, nimirum ex consumpta carnosa, atque adiposa cum Gal. & cambio ipso cum Avic. facilioris cognitionis, difficilioris tamen curationis: imo non cognitus, licet pinguedo, carnosa, & adiposa substantiæ colliquationis indicium, in urinis supernatans apparuerit: qui tamen neglectus, aut male curatus, in tertium tandem gradum, marasimum scilicet torridum, sive febrem marasmodem descendit: cujus præsentiam demonstrare in hoc misero Patientē haud difficile fuerit: siquidem pulsus sunt frequentiores & parvi, imo & languidi ac duri: urinx crudiores, nativi caloris imbecillitatem arguentes, in quibus supernatans pinguedo antea observata non apparet: quia jam adiposæ atque carnosæ substantiæ absoluta adest consumptio: cutis totius corporis aspera, & scabra tactui occurrit, & in summa, figura naturalis quodammodo corrupta atque mutata videtur: nares enim acutæ, oculi quodammodo concavi, collapsa tempora, aures contractæ, cutis, præsertim circa frontem, dura, ungues adunci, & abdominis depressio atque durities, insignis in toto siccitatis indicium præbent: quam nondum ad extremum redactam vix credi potest: quousque enim partes oculis circumpositæ nutriuntur, cor certissime nondum extrema tæbe confectum est.

Quare per gradus, quos omisit Hipp. & cum ipso Celsus, qui hecticam febrem sub nomine tabis, nobis proposuerunt, febris hæc à primo ad secundum, à secundo ad tertium, ad tabem scilicet progressa est, ut frequenter & sæpe sæpius fieri solet: licet aliquando marasimus tor-

ridus statim à principio, etiam sine præcedentibus duobus aliis gradibus heri possit, quidquid dicant Zacutus & Vega: quoniam tota humiditas, caro & pinguedo, ab aliqua alia causa colliquari & consumi possunt, quam consumptionem mox tabes ipsa, & torridus Marasimus subsequi potest.

Status hujus Patientis potius desertendus, quam curandus videtur. Tabem enim dicebat Gal. nec quidem curare tentaveris: nam et si calorem extinguere poteris tamen remanet, quæ senectutis ritu hominem interiecit. Nilominus tamen duplex respectus ad curationem tentandam nos invitat & excitat, juxta Gal. & Tral. Gal. enim Juvenem tabidum curandum suscepit, vivumque in annos servavit, marasimum torridum in frigidum marasimum commutans: n. elius enim, dicebat ipse, in habitu tenis vivere quam illico mori. Tral. vero scripsit, humanum est, atque benignum artis auxilium, cum morbis contendere, & non ceu deploratos ægros omnino relinquere: interdum enim, ubi quis naturam dextram nactus fuerit, & tabes incipiat, nondumque solidas partes torruerit, salutem consequi poterit. Addamus nos, si interitum evitare non possumus, cum humiditas solidarum partium irreparabilis sit, celeritatem tamen possumus coercere.

Quare, ut longiorem vitam ducat ipse Patientis, quammaxime heri potest, substantiæ totum corpus est humectandum. Secundo, ratione caloris febrilis, moderate refrigerandum; sed caute omnia, ne vel frigiditate nimia calor nativus omnino extinguatur, vel à nimio cibo obruatur. Ideo dicebat Gal. quod febris hæc nec levissimum quidem errorem tolerat.

Duo autem curationis erunt potissima remedia, internum unum; externum alterum; humectantia magis quam refrigerantia, ob siccitatem quæ jam præpollet. Quoniam verò in tabidis partes ad cibum alliciendum, propter siccitatem, infirmæ sunt; ideo alimentum sit facilis attractionis, tenuium scilicet partium, & moderate calidum; quod tamen, quia parum admodum nutrit, crassum namque, viscosum, firmum, quodque difficulter transpiret, ut assimiletur, exigeretur: in hac repugnantia non ita facile alimentorum copia suppetit: mediocriter tamen utrumque præstare poterit lac, præcipue si æger muliebrem mammam ore suxerit, ut Euriphon, Herodotus & Prodicus Gal. Præceptores præcipere solebant: vel saltem sit asininum, adhuc calidum, ut propterea asina ad cubiculum ducenda sit. Lac itaque, ut cæterorum omnium, tum alimentorum, tum medicamentorum præstantissimum, in usum ducendum: utpote mediæ temperaturæ inter sanguinem & pituitam, & quod magis accedat ad naturam sanguinis, ut Gal. visum fuit: ad frigidum tamen & humidum, ex eodem inclinât, parum autem à calore recedit; ideoque temperatum. Caprinum omittitur, licet magis nutriendum, eo quod difficilius permeet, & ad nutriendas omnes corporis partes non adeo facile pervadere possit: minus vero vaccinum, & minus adhuc ovillum, omnium crassissimum. Camelinum autem, & equinum nullo modo in usum veniunt. Sit autem ab initio ejusdem exigua quantitas, ad unc. iv. cum

cum melle, quia nimis calefaciens & exsic-
cans est; quæ paulatim augeatur. Sic si mulie-
brem mammas luxerit, unus mamma turgi-
da sufficiat quantitas, & paulatim ad duas al-
cendat, saccharo, cum ipso lacte, aut ante
ipsum degluto, idque summo mane. In pran-
dio præbeatur pusillana, cum emull. amygd. &
sem. melon. præmisso ovo recenti, in iure dis-
soluto; vel pulli junioris confuso, eodem mo-
do, cum sacch. in iure exhibitio, vel parentur
morielli, & præbeantur ad unc. ii.

℞. Pulvæ pullæ unc. v. nucleor. pineor. a-
mygd. dulc. pistac. an. unc. ii. troch. de gall.
molch. scrup. s. sacch. nni dissol. cum aq. ros. &
florum cit. q. s. m. f. morielli. Vespere in cœna
rursus mammas muliebres sugat, circa vero
noctis dimidium, lac arte paratum præbea-
tur, nempe ex amygd. nucleis pineis, & sem.
mel. in iure cum sacch. cui addi poterit con-
tusum ex caudis cancerorum, vel testudinum
carne. Quod si vinum appetat, sit pauciterum,
tenue & subdulce, cum offis panis præbendum
in prandio, & de nocte.

Verum quia difficillima evadit in hoc casu
alimentorum distributio, ideo frictions, ma-
nibus oleo amygd. unctis. quatuor horis ab
assumpto cibo ad ministrari solent, corporis
cutem mani us unctis contrectando atque
humectando. Ab aliquibus quoque picationes
institui solent; quas nos reprobamus, utpote
nimis resolventes.

Balneum verò antiquitus, potissimum in
hunc finem usurpatum est, ad alimentorum
nimirum distributionem adjuvandam, & totius
corporis habitum humectandum, atque quo-
dammodo refrigerandum. Quare vel mane,
quatuor horis ab assumpto lacte; aut vespere,
4. saltem, aut quinque horis ab assumpto
prandio, balneum aquæ dulcis adhiberi po-
terit, sol. malv. viol. lact. salicis alteratæ; sit-
que tepidum, ut considerabat Gal. dicens.
Quod gracilibus & imbecillis, frigida balneo
partes similes offenduntur, à quibus omnes
actiones obeuntur. Quare prius in balneo in-
calescere debent; tunc enim ipsis accidit
quod ferro dum intingitur, & in frigidam mer-
gitur; sic enim roboratur. Quare sicut non
calida, ne vires resolvantur; nec frigida, ne
partes similes offendantur, ex usu est aqua,
ita tepida conveniens erit, in fine tamen fri-
gida affusa. A Balneo tandem ad stratum de-
latus æger, moliter est detergendus, & oleis
amygd. & viol. totum corpus inungendum. Ab-
domen verò unguento rosato illinendum.

Et licet victus ratio jam præscripta fuerit,
aliqua tamen circa eandem considerari possunt.
Et primò, quod facilius sit impleri potum quam
cibo. Secundò, quod eorum quæ velociter
nutriunt, veloces quoque sunt excretiones.
Tertiò, quod & quibus semel, aut bis, & qui-
bus pluram aut pauciora offerre oporteat, sit
considerandum, ætati, anni tempori, regio-
ni & consuetudini aliquid condonando, ac
tandem, si non parum deterior cibus & potus,
suavior autem, si quandoque præferendus. Aer
interim inspirandus ad frigidum potius vergat.
Somnus & quies omnino procurentur. Alvus
lubrica servetur clysteribus mollioribus, ex

lacte, butyro & saccharo paratis. Animi pas-
siones arceantur, & erectio animo æger tem-
per degere jubetur. Quæ pro patienti casu
dixisse, satis idem ibidem.

De Febris Quartana Intermittente.

Vir xxx. annorum, temperamenti phlegma-
tico melancholico, cibis malisucci, velut car-
nibus fumo induratis & muria conditis, po-
tuitque nimis delectato nimium indulgens, ære
autumnali pulvis & nebuloso ex iunete satis
moesto domum rediens, sub vespere sentit
totius corporis lassitudinem, cum horrore, vo-
mendi conatu, succedente calore, in principio
paroxysmi debili, in progredi vero in intenso,
ad mediam noctem durante, quarto quoque
die cum simili inæqualitate, horrore & vomendi
desiderio repetit calor: tussicula quando-
que adest, capitisque dolor cum calore præci-
pue succrescens: urina extra paroxysmum ten-
nui; in paroxysmo magis turbida, conspicitur:
Pulsus itidem ante invasionem tardus est
& rarus; ingruente vero calore pulso celerior:
In sinistro hypochondrio nonnunquam dolor
percipitur gravativus, maxime ante invasio-
nis tempus: Paroxysmus tertiâ jam redit vice;
Tentata hæcenus lucere remedia quadam do-
mestica, sed frustra. Petitur consilium.

Resolutio.

Affectus quo æger noster laborat, est febris
Quartana Intermittens, Germanus *das vier-
täge Falt Fieber*.

Adesse hunc affectum testantur I. Signa Es-
sentialiter Inherentia, ut sunt: lassitudo cor-
poris totius; horror, huicque pedissequus calor,
& præter hæc aliis febribus intermittens
communia signa, typus, seu paroxysmus qua-
to quovis die rediens.

II. Signa Postessentialia, veluti dolor capi-
tis cum calore incrementa sumens, nec non
hypochondrii sinistri gravativus, vomendi de-
siderium, tussicula, pulsus tardus & rarus, idem-
que celer aucto calore evadens, urina tenuis,
hinc turbida magis post paroxysmum red-
dita.

III. Causæ Prægressæ, quarum censum po-
tissimum subeunt temperamentum phlegmati-
co-melancholicum, cibi mali succi, potus
crassior, ære autumnali, pulvis, & nebuloso
susceptum iter.

IV. Similitudo: qui enim dicto modo cor-
piuntur, Quartana laborare æstimandi sunt.
vid. Rolf. in O. & M. Med. Spec. Consult. Horst.
& Plater. in observ.

Subjectum Principale ut reliquarum febrium,
ita etiam Quartanæ intermittens cum B.
Rolf. O. & M. cogn. & cur. febr. gener. c. XXIV.
dicimus esse Cor. prout scilicet idem est officina
sanguinis, & luculæ perpetuò scintillantis
sedes, concretivè sumunt cum sanguine & va-
sis. Unde nec Febris adesse valet, priusquam
Cor afficiatur & caleat. vid. Galen. lib. i. de
diff. Febr. c. 3.

Minus Principale Subjectum est totum cor-
pus, quatenus singulæ ejusdem partes diverso

licet gradu inæqualitatem à febris quartanâ proveniente perlentiscunt, cum non nant, quæ alias sub archei auctu feri d. bebant.

Subjectum Causæ vix commodius concipi potest quam gl. melleæ stomachales, intestinales, & melaracæ, fermento intestinorum seroso, bilio. o. & ipsis intestinis, mesenterio, pancreate, & imprimis in nostro Ægroto lie. ne yelincantibus. quatenus scilicet fermentum febrile, acetosum, magisque lixum & penitus radicans in istis generatur, quod ad tempus ibidem delitescens, ob copiam & subtilitatem hinc in massam sanguineam eructatur, & febris quartanæ autor evadit. Quare nec pancreas solum, secundum Sylv. lib. i. prax. c. 30. & Regner. de Graef. de succ. pancreat. c. 1. nec lien solum juxta quosdam pro hospitio quartanæ habenda, sed & alia prunæ culinx viscera conjungenda.

Causa Immediata Proxima est circulatio sanguinis turbata in valis, radice & miscelâ. Hæc enim posita optimè confusus ille status humorum, præsertim in paroxysmo, ex varietate symptomatum, caloris & frigoris, concipi potest; majori vel minori læsione sanguinis & feri intentata.

Causa Mediata Proximior habetur fermentum peregrinum, inæquale, acidum, lixum & tartareum, circa locos ordinarios ut glandulas stomachicas intestinales, pancreatis & lienis antea dictas, penitus hærens, quod status temporibus resoluunt & in motus rarefactione promotâ adactum, per vias ordinarias, mediante vehiculo itidem ordinario, ad cor defertur; ubi delatum in actum erumpit, & in M. S. *archeo* excitat, adeoque archeum ipsum turbat, qui hostis hujus peregrini & heterogenei injurias & insultus ægrè ferens, eundem aggreditur, & omni modo subigere, & extrudere satagit.

Ut autem fermenti febrilis ratio pateat, dicimus per fermenta, ut alias in Chymicis, ita & hæc loci, nihil aliud quam particulas subtilissimas, salinas & volatiles insignem immutandi vim obtinentes, intelligi. Quemadmodum enim usu don estico & vulgari fermentum panificum, fæces vini aut cerevisiæ in exigua latius mole, ingentem mollis & liquidæ substantiæ copiam immutare valent (ut oris & ventriculi fermentum ipso assumptionis momento quævis palato immixta miro modo transmutantis, aliæque non latius memoremus) ita & cum fermentis morbois & in specie febrili, sive illatum illud sit, sive interius in viscerum conamerationibus conceptum, se res habet. Illud namque minime inertes possidet vires, sed maxime activas, & non raro vix subjugabiles, humoribus fermento tali febrili intus nuptis & penitus inquinatis.

Causas Medicas Remotiores præbent: Ætas, in nostro ægroto 30. annorum: quæ utut in se spectata non adeo facile autor quartanæ esse queat; accedentibus tamen aliis occasionalibus causis, cumque magis ad annos provectiores inclinet, potuit aliquid conferre ad generandum hoc malum; præsertim cum constet, majorem Februm hujusmodi proventum in tali ætate respectivè oboriri posse. Nam quod attinet quartanam, quæ, teste Hochstettero

in obs. Med. decad. 2. cas. 2. puella in ipsis matris puerperii septimanis laborare cepit, durante malo per integrum annum; hæc & similia rarissime obvenientia, ordinariam regulam non faciunt. Temperamentum cum sit pnegmatico melancholicum ob serum vitium, vappescens, & uliginotum, acidoque signatum caractere, maxime ad quartanam producendam dispositum est.

Ac quoque huc confert autumnalis, pluvius & nebulosus, cui expontus æger noxter ob transpirationem & respirationem suo modo prohibitam, *putrescentia* salina, biliosa, uliginosa varia congerere potuit. quæ alias retenta facile fermentifica evadunt, nuptaque principiis vitalibus eadem conspurcant, eorumque motum & qualitatem vitiant. Cibus præterea cum usus fuerit *dormitio*, tumatis præsertim & nariatis, mali incrementum istidem non parum promotum fuit, qualis enim cibus, talis chylus, qualis chylus, talis sanguis & consequens valetudo. Quomodo autem cibi se ad sanguinem habent, ita lotus præcipue ad lympham; qualis etenim potus, talis lymphæ: quam hinc in nostro calu a nimio potus crassioris usu, crassiorem quoque magisque tartaream generatam fuisse, sequitur. Accessit tandem motus in itinere, qui materiam vitiosam movere, inisque latentem visceribus ad sanguinis potuit protrudere undas.

His itaque productus nutritusque Ægri nostri affectus sequentia in præsentiarum examinanda præduxit symptomata.

Quantum enim redux ab itinere factus æger, illico sentit lassitudinem totius corporis. Quæ uti alias in sanis etiam, à motu cessis accidere solet, ita majori eminentiâ in nostro calu eadem se manifestat, spirituum motu debito à vitiosis humoribus eodem gravantibus inhibito.

Subsecutus est horror, quatenus fixans inæquale, acidum & immorigerum quid archeo & massæ sanguineæ communicatur. Hoc enim panniculo carnosum, membranisque partium illapsum, fibras earundem nerveas, acidis, salinis & inæqualibus suis spiculis vellicat, & partes sanguinis volatiles, balsamicas depriimit, ad cor propulso calore. Hærente sic ad superficiem corporis hospite peregrino, sanguine verò ab oppressione nonnihil liberato, spiritus vitales se recolligunt & emicare incipiunt, hinc brevi post facies caloris accenduntur, quo facto, inæquale quod est corpori, archeus sui jam juris factus aggreditur, quod subigere, vincere, diffare extrudere omni vi satigit. Ex quo etiam fundamento productior caloris ætus, deduci potest. vid. de his latius Willis tr. de Febr. b.

Vomendi desiderium petitur à vitiosa, cruda & acri in ventriculo, ejusque tunicarum plicis hærente materia Unde irritatione nervosæ substantiæ ventriculi factâ, idem ad vomitum invitatur.

Tussicula quandoque adest, à vellicatione partium asperæ arteriæ, à materia irritante, inæquali proveniente, deducendâ.

Capitis dolor itidem propter inæqualem & fortio rem acrioris feri in meninges cerebri in-

fluxum, earumdemque distensionem, sicque ortam, (in quo dolor omnis formaliter consistit) continui solutionem, productus est.

Et cum idem humor ad lienem quoque feratur, etiam huius dolorem parit gravativum, quod vel eo nomine præitare facile valet; quod constat, minus nervis instructum esse eundem.

Urina extra paroxysmum tenuis & pallida cruditate, turbida eadem paroxysmo exantillato, præcipationem & separationem partium feculentarum, verbo, coctionem à natura inchoatam denotat.

Pulsus tardus & rarus ante invasionem, facultatis vitalis debilitatem: ingruente calore paulo celerior, eandem robustiorem, indicio est.

Quod autem paroxysmus quarto demum die redeat, causa querenda est in humoris peccantis, adeoque fermenti fixitate. Quæ enim materia fluxuor, ea etiam sua natura citius massæ sanguineæ inferri apta nata est, exemplo tertianæ ad quartanam relata. fixior è contra ineptior est ad motum, hincque tardius afficit. Non excludendus tamen Archeus omnium in corpore rector & diribitor, omnisque mensura, numeri & temporis calcentissimus.

Prognosis Quoad Eventum Ipsum Salutis Vel Mortis quod attinet: affectus hic nullum lethality metum præ se fert cum secundum communem practicum sententiam quartana intermittens omnium febrium sit tutissima; nisi tamen exacta observetur diæta, & cura bene instituat, facile degenerare potest in duplicem, aut aliam mali moris febrem, ipsamque aliquando scorbutum, quem quartana, vulgo medicorum effato, vel invenit, vel relinquit, nec non melancholiam, aut hydropem. Non desperandum in nostro casu putamus, cum præsens anni tempus, ætas, & recens adhuc malum curationem ex voto futuram spondeant.

Quoad Longitudinem notum est, quartanam, licet minus periculi in se habeat, omnium nihilominus febrium longissimam esse. Hinc raro ante secundum aut tertium mensem, & si sextum attigerit ante annum terminatur. Ad plures annos 7. 12. 20. protractas quartanas leg. Gabelchover. cent. 6. obs. 47. Singula tamen hæc metienda juxta modulum activitatis fermenti: quod etiam ad statum in nostro agroto applicare convenit, quem proin bono esse animo luademus.

Modum Eventus dicimus coctionem humorum, coramque variis modis, naturæ vel medicamentorum ope, vel per sudorem, vel per urinam, vel per vomitum, ad quem proclivis alias est æger noster, futuram excretionem. De Prognosticis signis Febris Quartanæ pluribus legi potest Chesneau Obs. lib. 4. cap. 4. p. 466. & 467.

Perlustrata hæc theoria, Praxin aggredimur. Cumque duplex in hoc affectu observetur tempus, Intermittentiæ nimirum, & Exacerbationis, curatio juxta hæc ipsa varianda erit.

Tempore Intermittentiæ ad sequentes indicationes respectus habeatur, necesse est; (1) ductus obstructi in primis viis aperian-

tur. (2) amurca fermentica tartar. ea & acido-biliofa corrigatur, imminuatur & enervetur in qualitate & quantitate, ne in actum denuo erumpere, & *aggravari* concipere queat.

Primò scopo inservire possunt ex aperientibus martialibus tartareis, aromaticis, amaricantibus, aliisque aut hypochondriacis & antiscorbuticis, tum nostro agroto, tum alijs hoc affectu laborantibus sequentia: tinct. mart. aperit. cum succ. pomor cidon. parata solatis, Zvolfser. tartari sara egregia aperiendi vi pollent, cum aceto parata, liq. mart. vitr. mart. Ess. vitr. antiscorb. Ess. vitr. mart. Ludov. ab eodem descripta in Pharm. modern. sec. applic. diss. 1. p. 445. Arcan. tart. tinct. mart. cum arcan. tartari tinct. mart. temperat. D. D. Wedel. Eiusdemque mart. tinct. balsam. egregu plus, liquore mart. cum Ess. lign. aloës nullo constans. tinct. mart. volatilis. M. S. antiscorbut. Ess. absinth. compos. B. Rolinc. descripta in chim. in art. form. redact. Lib. 4. sect. 1. artic. 1. cap. 6. vel D. D. Wedelii extans in Amœnit. Eiusdem mat. medic. Lib. 1. sect. 3. cap. 6. pag. 148. Elixir. Prop. simpl. & martiale cum oleo caryophyll. remixtum, itemque album Helmont. Ess. Myrrh. balsam. Ess. sol. semm. Ess. rhabar. antim. cujus descript. tionem vid. in Amœn. mat. med. D. Wedelii Lib. 1. sect. 3. cap. 7. pag. 167. sp. sal. tart. Aperit. Penot. Elix. vitr. Mynsicht. Extract. absinth. card. ben. scord. acor. ver. & ex his cum sp. sal. arm. acuatis paratum Elix. Antiquate. D. Wedelii, magui usus in quartana & alijs febribus longioribus, pulveres Cachect. & similia huc spectantia,

Dantur hæc commodè cum Diluentibus præcipuè, pro extricanda penitiùs inhzente materia morbifica. quare Decoct. v. g. raporum, feri lact. caprin. & acidula obtundentia, ut Clyst. sulph. antim. tinct. rosar. viol. cum potu miscenda bene ordinantur.

Liquida enim hæc & penitiùs in poros admittuntur, & efficacius operantur. Hinc etiam Infusa, si paulò diutius duravit affectus noster, rectè commentari poterunt v. g. ex rad. acotos. cichor. gentian. plantag. sol. card. bened. summit. absinth. cent. min. fumar. chin. de chin. lig. colubr. cass. caryophyll. schonanth. cum limat. mart. & crystall. tartar. quæ tum diluendi, tum aperiendi sine in usum cedunt.

China de chin. (pluribus suo loco insequentibus commendandum medicamen.) ad ʒij. in vino infusum, pariter optimè in usum cedit, vel loco vehiculi, quod huius loci est, vel per se adhibendum.

Ad alterum scopum obtinendum Educentia medicamenta unice recommendanda sunt & quidem Vomitoria quod attinec, eadem in nostro affectu omnino abhiberi possunt & debent, cum constet ex vomitus desiderio in casu antea prolato, materiam moveri adhuc posse, nec nimis glandulis insidere. cedunt proinde hunc in finem tart. emetic. ad ʒ. ii. iij. cum cinnab. nativ. vel simili roborante, in pilulis vel cum saccharo datus, & convenienti vehiculo cum aq. cinamom. vel simili liquore propinatus. sal. vitr. tantoperè ab Angelo Sala ternat. emeticorum cap. 4. p. 499. commen-

datum, cum rad. asari & ol. destillat. cinam. vel alio, commode etiam adhibetur.

Laxativa & purgantia, insignem, in quartanis & mulibus febr. bus longioribus obtinentia virtutem, jam commendanda sunt; excellenti vero pro re nata & usu fortiori vel nutiori expetito inter eadem: pulv. laxat. vegetab. Dn. D. Wedel. Crem. & Crys. tart. simpl. & mart. l. tart. vitr. simpl. & lunar. pulv. Cornachini seu Cerberus triceps ex Crem. tart. antim. diaphor. & resin. scammonii, qui pulvis sæpe in quartanis commode usu esse solet. Porro pro pilulari formâ conveniunt extract. aloes, hellebor. nigr. panchymag. Croll. rhabarb. maist. pil. tartarearum resin. scammon. gualap. Infusa etiam purgantia antifebrilia vel eo nomine commendanda sunt, quod continuari longius possit eorundem usus, fermento tedium glandulis intestinalibus penitus impaeto commode inservientia. plura de purgantibus huc in quartanis febribus vid. passim apud autores practicos.

Purgantia hæc tempore intermittentiæ adhibentur ut plurimum: vel si placet die paroxysmi eadem propinare, maturius id exequendum, ut operatio ante paroxysmum absolvi possit; quam alias studiose durante conflictu disterre solet archeus.

Venalectio utut aliquando etiam in febribus intermittentibus horrore carentibus, vel plethora præsentente administretur; ut plurimum tamen ejus usus non exposcitur, cum facile ex mobili productior morbus reportari possit: quare nullis indicationibus præsentibus in nostro casu, ne noceamus, cum prodesse velimus ægroto, nostro, planè iuvicem esse dicimus venalectionem.

Tempore exacerbationis, seu hoc loco ante paroxysmum jam appropinquantem, eo respiciendum, ut miasmatis fermentifici, seu fermenti febrilis motus sufflaminetur & antevertatur, destruendo & annihilando eodem, quod sit præcipitantibus, incisoriis & disjicientibus, seu partium tenuium, seu fixarum cumprimis & alcaliarum, seu mixtis: quorum plurima licet etiam diebus intermissionis dentur, superius ex parte commendata, quale v. g. est Elixir Antiquartium, huc potissimum referendum; inprimis tamen hoc loco anteparoxysmum velut magis specifica, meritò laudanda sunt sequentia: sal. absinth. cent. min. card. ben. antim. diaphoret. lapid. cancr. conch. preparat. corall. arcan. duplic. Mynsicht. flor. sal. ammon. specif. febris. Croll. Lang. Strobilheg. Bezoard. min. mart. mater perlar.

Efficaciora verò & excellentiora hæc omnia reddi possunt additis viperinis, ut trochisc. de viper. cinnabarinis, oleis destillatis, & cumprimis oleo seu balsamo antifibrili Dn. D. Wedelii, composito ex oleo caryophyllorum, piperis & camphoræ. vid. Ejus Opiolog. lib. 2. sect. 1. cap. .

Commendanda etiam hoc loco in specie pecuniari nomine veniunt Bezoardica, illa scilicet, quæ exclusionem fermenti febrilis in sanguine respiciunt, talia verò sunt ex balsamis, sulphureis & salinis: olea. jam à nobis commendata, quibus addi merentur tinct. bezoard. Dn. D. Wedelii & aliorum ut B. D. D.

Rolinc. Michaël. Ludovic. Ess. theriac. balsam. sp. theriac. camphor. theriac. celest. ipsaque Andromach. sp. ebor. C. C. serpent. viperat. sal. volat. viperat. spectant huc quoque ipsa acida, ut acetum s. & bezoard. rutac. & sinuata.

Ex quibus hætenus recensitis, à medico petito, & materiæ medicæ guaro, pro variis circumstantiis, quæ in ægro nostro contingere possunt, variz, selectu probe instituto, concinnari queunt formulæ.

Singularem sui hoc loco meretur considerationem celeberris hodie, & decantata medicina Cortex Peruvianus, China Chinæ dictus, superius etiam cum aliis allatus. Egregium sane est hoc medicamentum, amaricante & fortiter penetrante virtute, cum asperitate leviter adstringente se commendans. Solet equidem 3j. per se, vel cum oleo destill. conveniunt in vino malvatico, vel alio propinari ante paroxysmum. danda vero opera circa exhibitionem hujus nobilis medicamenti est, ut nonnisi præmissis universalibus, & acuto febrili jam maximam partem correcto, in usum trahatur: alias major spirituum, materiæque morbinæ confusio ex intempestivo usu hujus laudati corticis provenire potest. Notandum præterea hunc est. infidum non raro post usum hujus corticis observari effectum. qui enim semel vel bis à propinato eodem remanet, sæpe post aliquod tempus redire visus est paroxysmus, majori aliquando, quam antea erat, cum vehementia. quare nec semper, nec nunquam hoc n. edicamine utamur oportet, quin semper genium morbi & circumstantias circa eundem, quidque ferant ægroti, quid minus, attendamus; non tam empiricorum sectantes temeritatem, quam firmis & veris dogmaticorum innixi regulis. Denique & hoc addendum, optimum hujus chinæ de chinâ cum specificis febrisfugis jam recensitis esse connubium. Plura curiosa hujus corticis exotici indagatori supeditabunt Willisius de Febr. cap. 6. Barthol. cent. V. hist. 56. Boyle tract. de utilit. Natural. Philos. part. 2. sect. 3.

Opiata præter jam dicta, quæ præstare possent ægroto nostro, aliisque quartariis auxilia, instar omnium & sufficientissime docet Dn. Wedelius in suâ Opiolog. loco suprâ cit. ubi simul methodum curandi genuinam febres intermittentes in genere, subministrat. Dari scilicet possunt Opiata non per se, & primariâ intentione, sed secundariâ cum pulveribus febrisfugis maritata: ac præmissis universalibus; hinc hanc in rem Horstius problemat. therapeut. decad. 1. quæst. 7. plurimas ait febres intermittentes, præsertim quartanas, post præparationes & purgationes debitas auxilio laudari opiatum sublatas fuisse, duabus vel tribus horis ante paroxysmum exhibiti.

Adhibito aliquo ex jam commendatis ante paroxysmum medicamento, æger leni calore tegatur, nec corpus ad sudorem conatu religioso cogat, rehciendus in ipso paroxysmo acidis, & aliis pro re nata suaviter refrigerantibus. eo tamen respiciendum, ne nimio resocillantium usu paroxysmus inhibeatur, & materia pœnitenda hæc opera intempestivè intro pellatur.

Quidam

Quidam ex hodiernis medicis methodo curandi febres quartanas hactenus propositâ non contenti, exantlato paroxysmo eadem repetunt, quæ paulò ante paroxysmum dederant medicamina, singulis 6. 8. horis eorundem continuando exhibitionem; immuinui nimirum hoc pacto & penitus inverti fermentum febrile rati, quem tamen curiosum conatum suo loco relinquimus, idque nonnisi in melius declinante morbo reutandum esse, rationibus in subsidium adhibitis, persuasi.

Topica poterunt adhiberi sequentia: stomacho, cum hic malè habeat, epithemata ex spir. vini, sapius repetenda, emplastrum de crusta panis, & bacc. laur. ol. caryoph. carv. roboratum pro lubitu applicentur. Lien, qui dolorem gravativum sentit, conveniunt. Unguenta & Emplastra emollientia & roborantia e.g. Empl. de cicut. degumum. ammon. ol. cappar. lil. albor. sp. formicar. pinguedines variz, & similia. Cordis & pulsum regioni inserviunt succuli ex spec. cordial. temperat. aq. is cordialibus frigid. irrorandi. Pro pediluvio commendatur lixivium: ne plura alia pro libitu adhibenda latius recenseamus.

Dietâ debite ab ægroto nostro in posterum observanda erit.

Cibus itaque sit boni succi & facili concoctionis. carnes sal. e nimio conditos, fumoque induratos, aliosque cibos crassos, glutinosos, ac multum terrestres succi in se continentes evitabit. flatulenta omnia fugiet. à contra melioris succi & magis correctis vescetur cibus.

Potus sit cerevisia probè defecata, vinumque tenue & maturum consilium quoque est, carduo benedicto, absinthio, aliisque infusus, quemvis exaltare potum.

Aere pluvio & nebuloso, quantum fieri potest, nullum posthac suscipiet iter: sed temperatum undique sibi eligit eundem.

Motus intempestivos mox à cibo non instituit, nec quiete nimia effeminabit corpus: cuncta ad mediocritatis leges compositurus. *Job. Michael. in Practi Clinica special.*

De Febri Maligna.

Juvenis viginti annorum, plethoricæ constitutionis, hæmorrhoidum fluxui assuetus, conqueritur de ingenti lassitudine totius corporis, sequitur horripilatio & inordinatus rigor, tandem calor continuus cum siti, scapitis dolore & vigiliis subsequitur. Pulsus erat languidus, nonnunquam naturali iterum similis: Sæpius animi deliquium patiebatur; aderat nausea & diarrhœa cum ingenti circa ventriculi religionem dolore; lingua erat arida: urina rubicunda & clara. Queritur quis morbus & quibus remediis curari possit.

Resolutio.

Affectum cognitio juxta Hippocratem est vera eorundem medicatio: Ante omnia itaque inquirendum erit in morbi hujus ideam, antequam curationem suscipiamus, cum in morborum cognitione maximam Fortunæ Medicæ partem sitam esse putemus. Dicimus ita-

que præsentem Ægrum laborare Febri Maligna, defunctis signis diagnosticis à symptomatibus morbi ideæ & aliis.

Desinimus hanc febrem quod sit: intemperies maligna acris & fervida, cum præternaturali totius massæ sanguineæ effervescencia.

Dicitur febris à ferveo, vel ut aliis placet à februo, de quo Willisius, Schokius Vossius & alii videri possunt. Nos parum curantes Etymologicas disceptationes, illas discutiendas aliis relinquimus. Nobis sufficit notasse, adesse intemperiem calidam & pulsus mutationem, vel ut alii loquuntur cordis irritationem: quibus positis, necessariò ponitur febris. Solebat alias vox febris solis febribus ardentibus tribui: hinc canit Virgilius.

Cum fuerit, atque artus depascitur arida febris.

Profuit incensos æstus avertere, & inter.

Ima ferire pedis salientem sanguine venam.

Ufus verò obtinuit, omnes illas intemperies, quæ aliqualem etiam conjunctum habent calorem, modò febrilis adsit cordis irritatio, vacare febres. Vide disputationes Medicas Sylvii.

Maligna dicitur, quoniam est mali moris, decipiens non raro ægrum, medicum & adstantes: symptomata habet graviora, quàm febres vulgò habere solent, plures afficit, multos interimit, & eludit vulgaria ante febrilia medicamenta, ita ut ejus natura longè distet ab aliarum febrium ideâ & genio. Dicuntur etiam tales febres malignæ, quia similes sunt malis hominibus, qui aliud vultu & verbis præ se ferunt, aliud corde occultant, & factis præstant. Dicuntur etiam venenatæ, quia immediate à venenatis particulis, sive intus genitis, sive extrinsecus admissis, oriuntur, ut dicitur capite de causa. Infestæ sunt ipsis medicis, hinc nonnullis vocatur febris antimedica, medicorum napellus & flagellum, quæ hodierno tempore in Germania multi celeberrimi viri objere, loquente experientia. vide tractatum Cl. Fehr. de Scorzonera.

Subiectum hujus morbi Universale dicimus esse totum corpus; conqueritur enim æger de ingenti lassitudine totius, adest horror & rigor; & omnes actiones lasas esse deprehendimus. Particulare verò est cor, quod musculum esse dicimus: Notandum verò ad evitandas falsas aliorum imputationes, nos hic non intelligere nudum illud parenchyma, ut vulgares Anamici illud in mactatis canibus vel aliis cadaveribus demonstrant; sed potius indigitari à nobis integram fabricam cum insito calore, & insidentibus spiritibus animalibus, sine quibus facultas illa pulsifica, quam nobis antiquorum sectantes errores velut superadditam quandam ab anima peculiarem virtutem obtrudunt, explicari nequit Entia præter manifestam necessitatem multiplicari velint.

Cor esse verum hujus morbi subiectum, patet ab insigni functionis ejusdem læsione, pulsus enim est mutatus, in quo consistit ratio formalis febrium juxta nonnullos, qui demonstrant dari etiam febres frigidas, & calorem esse saltem effectum motus sive febrilis fermentationis: de quo vide Franciscum Piens

medicum & Chirurgum expertum, ut & magnum nostrum Sylvium. Nunquam, dicentem, probabunt essentiam febris consistere in illo actu in corde, hinc & universo corpore. p. u. aucto, postquam dantur febres algidæ, frigore continuo & nullo calore aut ægris, aut medicis adstantibusve aliis notabili molestæ? quas, ne suis præjudiciis valedicere cogantur homines credere, quam scire magis apti, negant simpliciter & audacter? quoniam in auctoribus suis classicis, atque sua ex se mutuo exscribentibus, quos solos habent pro bonis, talia non legerunt in Museo suo somniis exco-gitandis & conscribendis, quam circa ægros symptomatibus eorum observandis magis dediti, pro quibus orandum est, ut sit mens sana in corpore sano, ni & hoc ex affectione quin & quandoque melancholia hypochondriaca sit minus sanum sicut ex vultu talium tetrico & moroso facile est medicis practicis hoc deducere. Sed quid dicent sussenii bonorum auctorum helluones, ac nil præterea ferè sapientes, de frigore tam sæpè per horas plures tam graviter circa intermittentium initia ægros vexante & lacerante, subsequente non rarò calore leni ac nullatenus molesto? Audebunt ne negare, durante frigore laborare suos ægros febre? Anpotius dicent toto illo tempore tam longo auctum esse & concentratum in corde calorem suum fictitium ac præternaturalem, quamvis nec sibi nec aliis, nec ægris ullo signo observabilem, præjudicio tamen suo necessarîo concludendum? sed pro his, pergit, quoque orandum, postquam mirè delirat ip-sorum mens. An quæso assentiemus hominibus omnem tum ægrorum tum aliorum, tum suum sensum suis præjudiciis postponentibus, & quidem cum quotidiano ægrorum suorum detrimento? Assit, ut hoc agat vir bonus ac Deum timens &c. Certum tamen est, calorem initum sive ignem naturæ ut alii vocant irritari, suppressi & tandem in manifestam erumpere flammam, accedentibus particulis ad expandendum nunc satis dispositis. Qualis vero sit ignis ille vitalis, multi non capiunt, seque illud nescire apertè profitentur, dicendo: Cœlestis esse naturæ. Putamus tamen non opus esse, ut ad extremos mundi angulos confugiamus, cum unus idemque hoc in universo sit color. Cœlestia enim, inquit Cartesius, Graydanus, Regius Tatinghoff, de la Forge, Brokhuisen, Ræi, alique Viti Clarissimi: & elementaria tantoperè non differunt. Non sunt duo calores, inquit Piens, neque concipi debent ut duo, sed unus.

Quoad Causam Negotium hoc est arduum & difficillimum, quod multorum Clarissimorum Virorum torlit ingenia. Morbi pestilentialis, inquit Clarissimus Willis, adeò in tenebris grassantur & ignotam ducunt originem, ut eorum causæ & essentia sine recurso ad occultas qualitates rarò explicentur. Conabimur tamen, quantum possibile, ægro nostro & adstantibus causam morbificam adeò clarè ac perspicuè proponere; ut nulli dubitemus, illam facillimè à quovis etiam, cui de meliori luto formavit præcordia Titan, perceptum iri. Causam itaque veram hujus morbi maligni dicimus esse particulas acres volatiles & val-

de incongruas, quæ compagem totius cruoris solvant, destruunt, & universam œconomiam labefactant, id quod partim a priori, partim a posteriori probari poterit. Novimus, non-nullo, alto supercilio hæc lecturos, qui istiusmodi morbos malignos à tota substantia, & qualitatibus occultis dependere acriter defendunt, imò in illos invehuntur, qui profundius in latentem causam inquirere conantur; quasi vero non sit laude dignum, veritatem profundo latente eruere, & omnia in foro medico ad manifestas qualitates referre velle. Omnes unanimiter prætentur & concedunt, causam febrium malignarum esse venenosam, ergo participabit de natura veneni: quod si ab epoto veneno eadem observemus produci symptomata, quæ per manifestas possint explicari causas, quid opus erit in explicatione symptomatum, febres malignas conitantium, confugere ad occultam aliquam & specificam energiam? dicam adhuc clarius: Si Mercurius sublimatus, napellus, arsenicum aliaque venena intus assumpta excitant nauseam, vomitum, ardorem, anxietates præcordiorum, tormina, rosiones, fluxus alvi cruentos, lypothimias, tremores, convulsiones, sopores, deliria, maculas cutis &c. per solam partium configurationem, quatenus dissoluta abeunt in subtilissimas volatiles ac summe acres particulas, per quam configurationem manifestè omnes illi effectus explicari possunt. Ergo etiam in febribus malignis & pestilentialibus ubi eadem observamus symptomata, per tales qualitates manifestas idem negotium explicari poterit. Prius nunquam negari potest, & hactenus sufficienter probatum, à nobis etiam in ipso conflictu ulterius demonstrabitur. Ergo consequens etiam erit firmissimum.

Recitè hoc ex fundamento præmittit Clarissimus Willis explicationem naturæ venenorum, antequam venenum pestilentialia in specie describat, quoniam illis probè cognitis, facillimè etiam naturam febrium malignarum scire poterimus. Siquidem ipsorum vis consistit in sola continui solutione, sive foris in corpus nostrum agant, sive intus virulentiam suam prodant, ita ut supervacanea sit divisio morborum in morbos intemperiei, compositionis & solutæ unitatis, cum omnes in continui solutione conveniant, & differant solum quod majus & minus, dum vel facilius vel difficilius in sensus incurrunt. A posteriori etiam sententiæ hujus veritas probatur, dum observamus medicamenta illa alexiteria non occultà sed manifestà agere qualitate, imò ne unicuique quidem nominari posse alexipharmacum, cujus effectus sive operationis non manifesta possit reddi ratio. Omnia enim alexipharmaca referri possunt ad attenuantia, incidentia, volatilisantia, calefacientia, quæ pro diversitate veneni exhibentur, quatenus illud consistit in frigore potenciali: glutine quodam volatili, coagulatorio & contagioso: vel in particulis acutis scindentibus & causticis, quibus necrosin liquori tam vitali quam animali inducit, (vel ut alii loquuntur, quibus animam vegetativam & sensitivam destruit) hinc oriuntur à venenis juxta Regium, magni ardores, mentis perturbationes, deliria: partium & totius

& totius corporis refrigerationes, intumescencia, livores, rosiones, excoriationes similiaque alia symptomata; quæ per contraria calefacientia, vel refrigerantia, item oleo-ginosa, pinguis & lenientia, sæpe curantur. vide ulterius medicinam Henrici Regii.

Particula illa incongruæ duplici agunt in corpus nostrum modo, vel fundendo, vel coagulando: fundendo, dum ita dissolvunt sanguinis compagem, ut in serosum abeat liquorem, & ad accendendum sit plane ineptus, inde cessat pneumatosis tam in corde quam in cerebro, non aliter ac affuso oleo tartari lac in liquorem tenuem abit, nec unquam ad fibrosam consistentiam reduci potest.

In Ephemeridibus Gallicis collectis à Jean Batistita Denys refertur, canem illico mori, si per Siphonem sanguini misceatur liquor N. ita enim fundi massam sanguineam, ut mutata ejus textura particula nunquam in ordinem pristinum cogi queant.

Coagulando, dum sanguis confestim figitur, & ad circulandum ineptus redditur; hinc oriuntur suffocationes, maculae nigrae, lividae, totum corpus non raro vel saltem alterutrum latus post mortem obsidentes: Non aliter ac si spiritus N. injicitur per arteriam, & sanguinem cum inopinato animalis interitu coagulat.

Accutabimur forsitan a nonnullis nimis curiositatis, quum illa parum profint futuro medico, semper enim eandem dicunt manere medendi methodum, eadem etiam semper applicari remedia, siye ad occultas confugiat quis qualitates, siye alius factus audacior per particulas (ad quas tanquam commune asylum dicunt nos confugere, & pro illis tanquam pro aris & focis dimicare, uno pro Diis haberi) negotium illud explicare tenter. Verum errant quam maxime boni illi veri. Quomodo enim Medicus debellabit morbum, cujus causam ignorat? ignorantiam verò suam nolens volens prodit, dum dicit: Febrem malignam esse morbum occultarum qualitatatum, idem est, ac si diceret, *die Flaischschwachheit Kommt her ich meiß nicht mehr*. Ipsa etiam alexipharmaca quam maxime inter se differunt, neque indifferenter applicari debent, & hujus rei ignorantia multos trucidat, ita ut forsitan errore medici plures pereant, quam virulentia ipsius morbi. Siquidem si venenum sit volatile valde & acre, summo cum vitæ periculo ægro exhibentur medicamenta alexiteria, salique volatilibus abundantia; potius contraria eligenda, vel præcipitantia, vel acrimoniam obtundentia, Lap. Bezoar. Bolus armena, diascordium & alia. Ex quibus patet, methodum nostram medendi non esse adeo periculosa & luorica, ut illorum, qui vera negligunt principia. Retulit mihi Dominus Waldschmidius, se aliquando tractasse Juvenem febris maligna graviter decumbentem, in quo nullum toto morbi tempore gravius observare poterat symptomata, quam summam respirandi difficultatem, per intervalla crebrius recurrentem, ut præ metu suffocationis æger erecto corpore noctu diuque sedere coactus fuerit. Ter lecta fuit vena, non lege methodi ordinaria, siquidem nec plethora aderat, nec calor febrilis

adeo urgebat, hinc secunda & tertia vena sectio ab aliis medicis prohibebatur, interim facies observabatur liquida a sanguine coagulato & circa nadas restagnante, pusillus erat sanguis a sanguine ad cor transeundum minus disposito, quibus omnibus probe consideratis, deserta via communis, venesectione bis adhuc felicissimo successu, aliis contradicentibus administrabatur, & æger a faucibus mortis eripiebatur, non neglectis aliis sanguinis coagulationem impediendis medicamentis. Et quomodo quæto occurrere poterimus symptomatice & coliquative urinae in febris his excretionibus sudoribus illis copiosis sed ægro functis? fluxui alvi coliquativo? de quibus optime Riverius de febris maligna? nisi vix illam fundendi probe cognitam habeamus, tunc enim exulare debent omnia attenuantia & volatilifantia, & illa adhiberi, quæ totum tum viscerum tum ipsius sanguinis conservent.

Brevibus itaque dicimus, particulas has acres & malignitatis & effervescentiae esse causas, ex sola configuratione, quemadmodum videmus in chymicis duos liquores confusos se invicem destruere, effervescere & strepitum edere, nullo alio accedente movente, præter solam illam texturam, quam à primo habent ortu, & quæ, quoties aliis figuræ particulis occurrunt, tales ebullitiones excitant.

Nunc eadem brevitate etiam Modum Generationis proponemus: generantur illæ particulae vel in corpore ipso, vel alibi generatae corpus intrant. In nostro ægro utrumque potest esse; Hodierno enim tempore malum hoc Epidemicum est, & hinc inde vagatur, ut quam facillime contagium aliunde suscipi possit. Adest præterea consueta evacuationis suppressio, ob quam sanguis restagnans aciescit, & ebullit, quo in motu particulae fiunt aciores & cordi communicata irritationem illam vitiosam, nec non una cum sanguine ad alias partes translatae, calorem totius corporis excitant, sicque malignitatem induunt, id quod cernere licet in aquis paludosis, aliisque liquoribus diu reservatis.

Symbolum suum conferunt Sex Res Non Naturales; Præ omnibus vero considerandus est Aer: quamvis enim & reliquæ quid conferre possint, tamen non tam generare febres malignas, quam illas graviore reddere putamus. Sine aere vitam nostram conservare nequimus, cum in eo sit occultus vitæ cibus, de quo vide phrasin Sophicum Domini Johannis Jakii. Aer itaque facillime sanguini suas imprimit qualitates, quod si alienis & peregrinis imbuatur particulis, inficit sanguinem & labem corpori nostro communicat, Eundem verò alterari & inquinari certo certius est. Sunt autem duo præcipui spiritus, quos in aere observamus, quorum unus est acidus, alter volatilis salis, uterque aptus, vel compagem sanguinis solvere, vel cruorum magis ligere. Negari sane nequit, continere in se aerem a stivum particulas salinas lixivias, sed volatiles, aliquid oleosi & aromatici habentes: Hinc, referente Illustri Digbæo, & ex hoc Clarissimo Sylvio, illi, qui exente vere aut vigente zitate aere sudo ac sereno per Galliam me-

rdionalem faciunt iter, percipiunt aromaticum plantarum etiam longissimè distitarum odorem & fragrantiam certissimo argumento, particulas subtiles emanare ex illis plantis, atque cum vento transportari per aërem ad regiones alias. Particulæ illæ agitatæ à calore solum magis acuntur, & attractæ per inspirationem augment particulas biliosas in sanguine, infringunt humorem acidum & austerum, quorum munus est sanguini iustam largiri consistentiam, & temperare bilis volatilitatem, unde sanguinis crasis valdè mutatur & ad corruptionem disponitur. Neque aër inspiratus pulmonibus solum communicatur, verum ipso in introitu etiam salivæ miscetur, & glandulas intrat, deglutitur etiam in ventriculum, ibidemq; auget bilem, hoc est, reddit illam acriorem & magis volatilem humores etiam pituitosos & viscosos ibidem attenuat, & fluxibiles reddit. Clarissimus Sylvius hæc de re ita dissentit: An inspiratus aër aliqua sui parte salivæ quoque aliisque humoribus, à cerebro subjectisque ipsi glandulis, glandulosis que tunicis ad os & fauces derivatis, commisceatur, & una cum illis deglutitus in ventriculo & intestinis tenuibus mutationem aliquam humoribus ibi repertis, aut confluentibus adfert? sicut arduum est probare, ita durum videtur negare. Mihi certè, qui veritatem ubique ac unicè sector, non censetur illud improbabile, quamvis putem, plures adhuc requiri observationes ad rem illam obscuram illustrandam, confirmandamque, & ita stabilendam, ut dissentientium cogatur assensus.

Referendi sunt huc venti, qui agitando, confundendo, & apportando aërem vitiant. Sic australis alis suis sale volatilem ad nos transportat, nec non spiritum volatilem, Boërealis plures acidas particulas secum vehit: suntque vel nitrosæ, vel de sale muriatico & arsenicali participantes. Denique impurius fit aër, & ad generandas febres aptior à nebulis, nubibus, pluvia, nive, grandine, à vaporibus & tetricis exhalationibus, è cavernis, locis paludosis, vel cadaveribus expiratis: de quibus prolixè agit Sylvius, qui videri potest.

Aër itaq; infectus interimit plantas, bruta & homines, ut videmus aquas corruptas & alienis incongruis & peregrinis corpusculis & atomis repletas necare pisces: Venenatæ enim particule sunt valdè agiles, & in momento tanquam radii luminæ per medium diaphanum transeunt.

Paulo aliis verbis, eodem tamen sensu, de hoc negotio loquitur Thomas Willis. siquidem is admittit innumeras atomos figuræ multiplicis & plurimum diversæ, ob quas varie cohererent, mutuo combinantur, & corpora nostra diversimodè afficiunt. Nam quamdiu in utrisque apta contemperatio intercedit, tam diu vita ac sanitate fruimur. Sin vero corpuscula aëri innatantia sint ejusmodi figuræ & potentie, ut spiritibus corporis nostri adversentur, tunc crasis ipsorum pervertitur, corpus putredinem concipit, & vita nonnunquam extinguatur. Hinc inter homines ac pecora lues sæpenumero grassatur, quæ simul rotos interficit greges.

Plura qui desiderat, adeat ipsum authorem libr. de fermentatione & febribus.

Cum verò brevitati studeam, ipsam applicationem Lectori relinquo, vel magis speciosa mihi ad cathedram refero, quilibet enim videt ex antedictis varam causam febrium malignarum facillime ita erui & in apicem duci posse, ut nihil possit esse clarius: Restat ut de signis agamus, antequam ipsam aggrediamur curationem.

Signa Diagnostica vel malignitatem indicant, vel dispositionem febrilem: utraque à symptomatibus desumuntur, quorum syndrome & congeries signum pathognomonicum exhibet. Itaque hic operæ precium erit, ordinere symptomata, & simul causam eorundem addere, quo signa fiant clariora. Hi morbi cogniti sunt difficiles, solent enim vel sine, vel cum tantillo frigoris invadere; adeo statim in principio ingens lassitudo membrorum, capitis gravitas, & ut plurimum solent ab initio illam indispositionem suscitare, quæ quis antea laboravit. Sic in hysterica muliere causabunt uterinos affectus; in calculosis dolorem renum excitabunt: qui colicis obnoxii sunt doloribus, in illis colicam mentiuntur, in aliis pleuritidem simulant. Sæpius cum hæmoptysi adoriuntur, sicq; deludent medicos, ut horum symptomatum, & non febris malignæ rationem habeant.

In præsentī casu Ager noster conqueritur de ingenti lassitudine totius, partim à copia humorum vitiosorum hinc inde in habitum corporis effusorum, partim etiam ob spirituum animalium vitium. Siquidem auræ vitæ particule illæ venenosæ afflant simul liquorem animale, propterea segnius insluit, & motum ac sensum cum molestia quadam edit. Accedit & hoc, quod, læsa sanguinis accensione in corde, illico cesset spirituum animalium genuina generatio, unde paulo post functiones animales non ritè peragi possunt.

Sequitur horror & rigor reciproci; partim ab halitibus acris & mordacibus partes sensibiles obsidentibus, partim etiam ab ipsa cordis irritatione, & flammulæ cordis agitatione. Siquidem observatu dignum, ligna recentia igni imposita ipsi ruina minari, & flammam valde minui, ut penitus extinguī videatur: tandem lucra transacta, & recuperatis de novo viribus, in apertam erumpit flammam. Eodem modo quoties humor incongruus una cum sanguine cor ingreditur, toties flammula cordis opprimitur, hinc rigor & horror ob illam cordis irritationem in universo corpore percipitur: Donec, discussis particulis aquosis, & ad accensionem minus dispositis, reliquæ particule fiant fervidiore; Hinc videmus in ægro nostro rigorem subsequi calorem, accenso enim sanguine, & aucta nunc flamma particule illæ agitatæ alias vicinas agitant, donec tandem calor in toto corpore deprehendatur. Quæ omnia accurate explicantur à Jaque Rohault de febribus. Cum his conciliari possunt Sylvii meditationes, qui rigorem deducit ab halitibus acidis & austeris succi pancreatici corrupti ob stagnationem, & bilis dominium superantis: quibus discussis, inquit, bilis sui juris facta calorem sive agitationem parti-

particularum minutarum in toto corpore insituit.

Sitis & capitis dolor ab iisdem dependent causis. Siquidem bilis tum per se acrior, tum ab effervescencia febrili adhuc acrior pejorque facta sitim inducit. In capite vero, rodendo, vellicando & distendendo acrimonia iūā salsā lixivā dolorem excitat : unde vigiliz contumaces sequuntur, quatenus tam ab acida acrimonia, quam etiam salsā. partes sensiles afficiuntur. Siquidem vigiliz tam diu durant, quam diu sensuum ex ternorum organa vehementer vellicantur. Pulsus est languidus, ob sanguinis corruptionem, ex obstructione hæmorrhoidum pronatum ; interdum naturali adhuc similis, quoties istiusmodi particule adhuc ingrediuntur, quæ momentaneam illam accensionem suscipiunt. Notandum tamen, talem pulsum non diu manere, & si accuratè forsan illum observare velimus, nunquam in omnibus erit naturali similis : Pulsus minor, inquit Clarissimus Sylvius, acceptus ferendus halitibus acidis ad cor delatis & sanguini admistis eundemque solito magis coagulantibus, adeò ut tunc densior factus segnius ac difficilior rareferi queat, Debiliior verò debetur iisdem halitibus acidis sanguinem non tantum, sicut dictum coagulantibus, verum eo ipso ipsum ad partium quarumvis secessum ac secretionem absolvendam ineptiorem facientibus ; unde in cerebro animales spiritus minori copia tunc à sanguinis massā secedentes animalem motum ubique languidiorem efficiunt : quapropter multi eò tempore pedibus suis stare non possunt, aut partes alias commovere.

Præcipuum signum diagnosticum inter alia à viribus desumitur. Videmus ægrum nostrum pati animi deliquium citra causam manifestam ; inde concludimus, latere anguem in herba, & summam malignitatem occultari, reliquis diebus magis magisque se prodituram. Sanguinis enim motum valde esse perturbatum, & ob æqualem ejus mixtionem à fermento venenato solvi inceptam cruorem in corde stagnare exinde facillime colligi potest.

Adest Nausca a bile volatili in ventriculo & intestino duodeno fluctuante, & ventriculi substantiam sensilem ad motus peristaltici inversionem irritante.

Alvi fluxus oritur à sanguinis fusione & colliquatione, nec non à bile acriori prædominante, & excrementa diluente. Dolorem circa ventriculi regionem alii à flatibus comprimentibus orificium ejus superius derivant. Nobis magis placent illa, quæ Helmontius habet, dicendo. Sedem suam has febres habere in convexo stomachi, ad quæ losa non nisi arcana provenire ; Endemicani enim inspirationem nihil aliud esse, quam edores imperceptibiles, qui per pulmones in thoracem penetrant, diaphragma perspirent, & stomachi superficiem feriant. Linguz ariditas vel sola hujus febris signum inseparabile est, qua persistente gliscit febris : vide Olsvaldum Gremis. Quæ signa collective sumpta, & febrem & malignitatem certo indicant,

cujus curationi nunc incumbendum esset, nisi ex re foret medici, sese prognostico aliquo præmunire, ne, si curatio pro voto non succedat, ejus fama incurrat naufragium.

Urina rubicunda debetur bili, vel particulis sulphureis una cum salinis mixtis & incocis : unde febrilem dispositionem & spirituum accensionem cognoscimus.

Signa Prognostica hoc in affectu sunt lubrica, facillime decipientia & medicum & ægrum, id quod jam dudum agnovit dictator dicens 9. 2. aph. orfism. 19. prædictiones in morbis acutis esse incertas. hinc. suadet Magnus Romncius ex Riverio : Satiuse esse, eloquia nostra suspendere, donec vel naturæ vel morbi victoriæ indicia certa se obtulerint. Siquidem observatum esse, quod quo majora in hac febre : pparuerint symptomata, quæ aliis in morbis pericula, imo etiam ipsam mortem minentur, eo meliorem salutis exitum respondisse ; Mitiorum verò symptomatum præsentia plurimos interiisse.

Fallaces ergo sunt his in morbis prædictiones, quia tempora morborum ita accurate distingui nequeunt, cum morbus hic æqualiter sua tempora percurrat, & refert Grems : quendam sextò die sudasse sudorem frigidum copiosum, & septimo se melius habuisse. Hinc exclamat : oquam fallaces regulæ dogmaticorum ! Idem observavit D. D. Geisfuius, in illustri persona, quod ex relatione Dn. D. Waldschmidii habeo.

Est hæc febris ex numero acutarum, hinc ratione temporis prædicimus ad undecimum & decimum quartum diem extendipossie. Est morbus periculosus, insidiosus, curatu difficilis ac multis lethalis. Metum augent graviora nonnulla symptomata ; animi deliquium, fluxus alvi, & summa virium prostratio. Reconvalescentiam repromittunt ætas juvenilis, mentis constantia, & convulsivi motus absentia.

Interim inter spem & metum versamur. Nul- lum dubium est, sanguinem ob prægressam hæmorrhoidum obstructionem valde esse corruptum. Magna spes sita est in earundem apertione, nam in febribus malignis juxta Fabricium ab Aqua pendente plus præstent hæmorrhoidum per hirudines apertiones, quam venæsectio, quoniam referatis arteriis sedalibus sanguis à corde revellitur.

Diligenter quotidie erunt inspicendi oculi, manus tangendæ, & lingua examinanda. Oculi, ut instans delirium prævideatur. Manus, quæ convulsionem instantem indicant : & lingua, quo sciamus, utrum morbus ungaticus, vulgo *Braune* coincidat.

Pulsus servans æqualitatem bonus. Malus è contra inordinatus & inæqualis.

Pulsus sanorum similes periculosi : significant enim naturam præ imbecillitate à coctione abstinere : juxta Riverium.

Motus convulsivi admodum periculosi sunt.

Motus tremuli manuum & linguz funesti esse solent, & plurimum ab Hippocra e damnantur.

Surditas in principio apparens malum portendit, in statu vero salutem pollicetur.

Narium stillicidium malum.

Singultus & cardialgie mortem minantur.

Maxima ciborum aversio periculosissima est.

Oculorum inflammatio certum appropinquantis mortis prænuncium, nisi hæmorrhagia narium sequatur.

Per somnium etiam nunquid ex oculis sub appareat, inspicendum. Nam si quid non exacte commissis palpebris ex albo sub appareat, modo non ex alvi profluvio, aut medicamenti potione, contingat, malum est signum & lethale valde L. 6. aph. 52.

Ex urinis in febribus malignis ferè nulla prognosis elicitur, aut admodum incerta: siquidem, quæ sanorum similis est, sæpius pessimum exhibet signum: Imò verò multi, coctionis signis manifestè, in urinâ apparentibus, è medio sublati sunt. Attamen urinz concoctæ, & laudabile enzorema habentes, idque multis diebus perseverans, & de die in diem magis sese uniens, ac in matulæ fundum sensum descendens, certam salutem perpetuo pollicetur. Vide Riverium.

Certius prognosticum, sed triste, sumitur ad hoc, quando ægri floccos carpunt, vel plucas supra lectum explicant, vel quodlibet obiectum inordinate arripiunt: quod qui faciunt, nunquam evadunt: quia significat delirium valde intensum, & non solum meningum, sed & oculi tunicarum inflammationem, & spirituum opticorum perturbationem incurabilem; propter quam oculis varia & falsa obiciuntur, quæ æger remove conatur. Vide Hæfer. p. m. 146. id aliquando tamen citra noxam & ægri interitum factum fuisse refert Horstius Tom. 2. p. 92. obser. suarum, quæ dignæ, ut noctu diuque à quovis practico legantur, relegantur, ac in succum & sanguinem convertantur.

Curatio nititur indicationibus: Sunt verò duo potissimum hoc in casu indicantia, imtemperies calida, & maligna, illa per alterantia, hæc per alexipharmaca expugnanda. Adhuc etiam urgentiora symptomata, quæ curationem ad se convertunt: vigiliæ, alvi fluxus, animi deliquium & linguæ siccitas.

Remedia desumuntur è triplici fonte: Chirurgico, pharmaceutico & dietetico. In primo sese offert venæsectio; queritur, utrum in ægro nostro celebrari possit?

¶ Nullum indicans venæsectionem reperimus hoc in casu, excepto calore febrili, & hæmorrhoidum fluxu suppresso. Malignitas enim per se nunquam venæsectionem indicat. Itaque contraindicantia, perhibentia & prohibentia quoque consideranda veniunt. Adest autem alvi fluxus, nausea & summa virium prostratio, quæ illam potius prohibent. Itaque ab illa abstinendum, & ejus loco curcubitula applicanda sunt, præsertim in partibus corporis inferioribus ad solvendam hæmorrhoidum obstructionem, in quo spes salutis ferè sita est. Conveniunt etiam hirudines venis sedalibus applicatæ: modum applicandi debuit

Zacutus Lusitanus, & ex hoc Hoffmannus.

Sanè venæsectio in morbis malignis mihi semper fuit suspecta, & nunquam approbatur, nisi in plethoricis; quia thesaurus ille vitæ humanæ, frenans acres & malignos humores per V.S. auferitur, & sic malignitas facilius prædominari potest. Hoc in nostro casu planè ob alvi fluxum exulare debet, qui est perpetuum prohibens. Et cum sit res maximi momenti, audiamus sententiam pronunciatam à Morzo, practico dexterrimo, ita dicente: Observandum diarrhæam magnum esse prohibens sanguinis missionis, ideoque in hac nostra maligna febre sanguinem non fuisse emissum, quia ipsa febrem, in qua tamen Hippocrates ita sanguinis missionem commendat, concomitatur. Fundamentum tamen etiam est in ratione, quia cum frequenti alvi dejectione, in qua diarrhææ essentia consistit, plurimum vires deiciantur, sanguis si emittatur, adhuc magis consequenter infirmus viribus destituetur, & sic tandem non supersunt, quibus possit morbum in vigore consistentem, perdurare, quod tamen semper Medicus mensurare debet, alioquin actum est de vita infirmi. Igitur omni morbi tempore, quo diarrhæa adest, à sanguinis missione abstinemus.

Solent alias Medici pro & contra disputare. Et miror Minadum Medicum Italum scripsisse de febre maligna, quod in hac febre auctor sit mittendus sanguis, si vero contingat, ut ægri moriantur, id factum esse, quod sanguis non sufficienter sit missus. Sed quid si ad animi deliquium usque emittatur sanguis, & æger moriatur, valebit ne adhuc exultatio illa, mortuum esse ægrum, quod non sufficienter sit missus sanguis? Interim procede cautè, venæsectio est remedium, quod medicum ad summum honoris & famæ fastigium evehit, & quod ipsum etiam facillimè è folio iterum deturbare potest. Si enim sanguis non est missus, contendunt, si missus fuisset sanguis; forsitan æger evasisset: Si vero mittitur, tunc inculcant venæsectionem, dicendo, febres malignas alexipharmacis expugnari, non vero vires deici debent, quibus amissa natura contra malignitatem morbi pugnare nequit; quicquid ergo feceris, vulgi censura impinges, si solus es in cura, tum omnis culpa tibi soli imputabitur, si in mutuum consilium alios Medicos vocaveris, hic venæsectionem, alter sudorifera, alter laxativum proponet, & cum quilibet in sua opinione cedere nolit, fit inanis rixatio, quæ omnia prolixius prosequitur Cremsius.

Vicem venæsectionis supplere poterunt curcubitula, de quibus supra. Rectè de illis Celsus, ut ex iis minus vehemens est auxilium, sic certè est magis tutum, nec unquam est periculosum, etiam si adhibentur, ideoque ubi sanguinem mittere opus est, periculumque à vena secta immineat, huc potius semper confugite.

Ex hoc fonte etiam vesicatoria petuntur, quæ auram venenosam tam è liquore vitali quam animali potenter revellunt, quæ ægro nostro in pedibus applicanda ordinamus, ne sanguinis motus ad vasa sedalia impediatur. Et quamvis illorum usus à nonnullis in dubium vocetur, plus tamen confidimus experientiæ tot viro-
lustrum

lustrum. vide Celeberr. Hortii & Riverii observationes. Experientiam hanc, inquit Hæferus in tractatu Hercules Medicus inscripto, in memet ipso confirmare ausim, qui, cum Anno 1631. eadem hæc Epidemica diebus canicularibus laborarem, & morbo in statu existente, per triduum totali usu rationis sine cibo, motu, loquela destitueret, non sine parentis mei & adstantium stupore, post cantharides nuchæ applicatas & vesicam ruptam pristinae sanitati, Deo opt. maximo medicamentis benedicente, restitutus fui. Cavendum autem, ne instante vel præsentente crisi adhibeantur, vel ne remedia uno eodemque tempore usurpentur, ne eveniat, quod heri solet in incendio domus, ubi populus adeo occupatur, ut unus alteri sit impedimento.

E fonte pharmaceutico purgantia prodeunt, quæ etiam nobis prohibentur, tum a malignitate, tum ab alvi fluxu: quo nomine non solum evacuantia proprie dicta, verum etiam lenitiva & clysteres castigantur, & citra temeritatem imo infanti in tali casu, ubi diarrhœa comitatur febrem malignam, exhiberi nequeunt; illi enim temerarii non intelligunt naturam venient, & nesciunt, quod particula illa acres levissimo etiam motu agitari, & a circumferentia ad centrum summo cum vitæ periculo, medici infamia, & perpetuo conscientie morfu, precipitari possint. Interim ignorantia nihil doctius, & nihil audacius.

Vidimus nunc, quid de venesectione, purgantibus lenitivis & clysteribus sit statuendum. Recte itaque primo statim intuitu aggredimur malignitatem, quæ Bezoardicis expugnanda: & quamvis Hippocrates sudores, sine coctione qui accidunt, nil lutares esse statuit, tamè cum materia maligna quæ talis coctionem non admittat, si coctionem expectare velimus, omnes humores interim corruptat, radices altiores agat, & vires magis magisque convellat; rectius ad ipsa statim sudorifera confugimus. Et cum superius dixerim, symptomatum urgentiorum semper habendam esse rationem, ut itaque una fidelia duos dealbare possimus parietes bezoardicis & intellectina corroborantibus etiam sic simul hunc curabimus affectum: detur itaque pulvis sequens.

℞. Pulv. Anglici ℥ss. S. *Englisches Gispulver auf einmal.*

℞. Aq. è typh. Cervor. s. vin. Tormentill. ana ℥i. S. *Wasser cum Pulver.*

℞. Diascord. Fracast. Div. Aq. Carduib. ℥ss. Spec. de hyacinth. ℥j. Liquor diaphor. myrs. ℥i. M. F. Pot. S. *Schweikrancklein auf einmal.*

Hæc & alia, quoties opus fuerit, exhiberi possunt, & sudores recto corpore expectari.

Curatio diarrhœæ feliciter peragitur sudoriferis, quoniam illa humores ad ambitum corporis a ventre revellendo non solummodo diarrhœæ, ubi cum maligna febre conjungitur, maxime profunt, verum & ipsa malignitate febrili hæc remedia etiam expostulante, ipsi malignæ febris sunt remedium. Observandum enim hic iterum ex Morzo, hæc diarrhœas nunquam esse naturæ salutares operationes, quod ex eo patet, quod patientem solummodo in pejorem statum cum virium dejectione deducant, neque

sint cum facili tollerantia, aut etiam sequatur contententia, qualiter sunt illæ, quas in continuis simpliciter putridis febribus cum virium robore morbi remissione non raro in praxi observamus. Neque refert, quod in principio morbi, alvo solummodo primæ regionis excrementa evacuante, non mutum videntur debilitare, quoniam notabilis sequatur debilitas, dum, diarrhœa continuante, serontates vasorum evacuantur. Interim & caloris & virium etiam habenda erit ratio. Cui intentioni satisficient sequentia.

℞. Aq. Theriacal. ℥i. rosar. regiz Viennens. ex Nitrum destill. è succ. rub. idæ. ana ℥ij. Spirit. refrigerant. gr. xv. Syrup. liberant. ℥i. M. S. *Ruhlend und starkend Wasser.*

Vel ℞. Aqu. ter. lact. destill. borrag. ana ℥i. Juleb. Gemat. C. ℥ss. M. S. Ut ante.

℞. Spec. de hyacinth. Diamarg. frigid. Pulv. Bekoard. Sen. ana. ℥i. Lap. Bezoar. Orient. ℥ss. Nitrum perlat. gr. xv. M. F. Pulv. S. *Starkend Herzt Pulver, ein halb Quintlein auf einmal.*

℞. Aq. p. Epithem. cord. rosar. ana ℥ss. Carbuncul. ℥ij. Acet. Bezoard. destill. ℥ij. S. *Hertz Pulsz und Anstreichwasser.* Virgilæ demulceri possunt sequenti Emulsionem.

℞. Sem. melon. excortic. cucum. excort. ana ℥ij. papav. alb. ℥ss. Contus. cum Aq. ter. lact. rosar. borrag. a ℥ii. emulg. l. a. add. Margarit. pp. ℥i. Man. Christ. perlat. ad grat. S. *Besänftigende Nachmittels für eitlenmal.*

Lingæ ariditatem corrigit Mucilago seminis Cydoniorum: Gelatina. C. C. vel quod erit mitior omnium, Aqua rubra ad fauces, vulgo *das rothe Gurgelwasser*, vel *das rothe Pommerische Wasser*. Cujus genuinam descriptionem multi inter arcana habent.

Unicum adhuc notandum de Diaphoreticis & Cardiacis, quæ liberaliori exhibita manu cordis motum intendunt, quin & sapissime ejus robur frangunt; quare vulgaris observatio est, quod cardiaca non raro mortem accelerant, eo quod cruorem usinis exagitando, vires citius alterant.

Caveant ergo sic sibi juniores medici, & discant rectè ex præcedentibus mederi, ne tam multos æterno in posterum commendent somno.

Simili prudentia & circumspicione etiam opus circa opiata, hæc enim, quoniam spiritus vitales extinguendo & figendo opus suum perficiunt, si in pulsu debili ac vacillante usurpentur, suffocando somnum perpetuum accerunt, id quod quotidiana experientia satis superque testatur. Quare in pulsu languido, inæquali ac formicante cane pejus & angue opiata vitanda erunt.

Dixtam quod attinet, consistit illa in legitimo sex rerum non naturalium usu, itaque in illis agro nostro erit servandus modus: Aer vitiosus corrigendus floribus fragrantibus hinc inde sparsis, aut suffitu ex rebus odoratis, miasmatis venenosis resistentibus. Præterquam enim quod ejusmodi thymiamata aerem infectum corrigunt, etiam spiritus vitales, pravitate venenosa aut infectos, à fœdis inquinamentis depurant, quemadmodum quævis odorata in abdita corporis se trajiciunt, spiritusque valde alterant, ac in lipothymis rerum fragrantium odore evanescentes spiritus revocantur, & in-

staurantur. Sic refertur Democritum insignem
saorum temporum Philosophum, morti jam
proximum, panis calentis odore integrum tri-
dium effluentem spiritum retinuisse. Hinc aliis
in plurimis morbis fuisse antiquis suere fami-
liares; ut videre est apud Hippocratem, Avi-
cennam & alios: Nec muliebri commentum
est, etsi illæ sine consilio re hac sæpissime utan-
tur, & quamplurimos patientes liberent: vide
Neueranz de Purpura.

Victu utatur tenui, cremore ptisanæ, avenæ,
panatella ex cerevisia & pane triticeo, ex julsu-
lis hordei, oryza, pullorum, caponum, aliis-
que facili concocctionis, cum succo citri, cy-
doniorum, rubi idæi & aliis paratis.

Potus sit decoctum. C. C. citri Mynsichti,
Emulsiones amygdalarum julepi refrigerantes &
confortantes. Tinctura rosarum. Et cum assue-
tus sit cerevisiæ, admittimus tenuem defecatam
& probe coctam, cui radix Scorzonæ, rasura
C. C., eboris & alia imponi possunt. Vinum ju-
hemus exulare, quia ob leptometiam spontè
sursum tendit, caput ferit, & vigilias contu-
maces & delirium excitat, ac febre suo, à
magno calore accenso, sanguinem inflammatis.
Et Neueranz in tr. de Purpura, ut & Hæferus
in Hercule medico, testantur, omnes fuisse mor-
tuos, quicumque vino abstinere noluerint.

Quin & vini, aqua cocta aliave refrigerante
diluti usus merito suspectus est: Clar. Riverius
in nonnullis subjectis vinum concedit, si scilicet
febris sit exigua, venenata verò qualitas pluri-
mum intensa, & corpus ægotantis pituitosum.
Zacutus Lusitanus, ut in omnibus, sic & in
hoc puncto mirabilis, indifferenter omnibus il-
lud concedit. Sic juxta Celsum sæpè quos ra-
tio non restituit, temeritas adjuvat. Usus aci-
dularum etiam interdictus, quod interiora ni-
mis refrigerent, & à circumferentia ad centrum
moveant. Præsertim cum in nostro ægro habea-
mus alvi fluxum symptomatice, qui ab usu aci-
dularum ingravesceret.

Quoad reliqua decumbat æger quantum pos-
sibile, quietè, quo per continuam diaphoresin
venenata spicula expirent. In somno & vigiliis
sit moderamen, quorum alterutrum, si extra
naturæ legem abeat, convenientibus medica-
mentis reduci potest. Animi affectus declinen-
tur, qua in re & adstantes suum faciant officium.
Confidat æger Deo, qui potenti suo verbo lan-
guores nostros non raro sanat, ubi omnis con-
siliū humani vis cespitat, ac cuncta desperatio-
ni proxima instantem interitum nuntiare vi-
dentur. *Idem Ibidem.*

Hemuritis Febris.

Vir 40. annorum, robustus, mala dixta diu
usus, incidit matutino quodam tempore in
horrorem totius corporis, quem insecutus est
calor magnus, pulsus crebrer, celer, perpetuo
durans. Sub vespere ipsum eodem die invasit
refrigeratio totius corporis, postquam seque-
batur pulsus julto celerior & crebrior. Sequen-
te die, calore illo perpetuo & pulsu celeri &
crebro durante, leviter perfrigeratus est, ca-
lorque deinde increvit & pulsus increbuit. Ter-
tio die rursus mane exhorruit & deinde incaluit
& vespere. Postquam refrigeratus esset, etiam,

increvit calor. Quarto verò die, leviter
denuo sub vespere refrigeratus, incaluit & pul-
sus increbuit. Adest ventriculi dolor, sitis, &
capitis gravitas.

Afficitur in hoc ægro totum corpus, ut ex
horrore, refrigeratione, & ejus incalescentia
cor, ut ex pulsu viâto: æsophagus, ut ex sitis
ventriculus, ut ex dolore: & caput, ut ex gra-
vitate est manifestum.

Morbus, qui ipsum affligit, est febris, quæ
ex tertiana continua, & quotidiana intermit-
tente, composita, Hæmitritæ, vulgo appel-
latur. Idque ex symptomatum hic descriptorum
ordine, & invadendi ratione & modo, clare
innotescit.

Causa procatactica hujus morbi est mala
diata, qua nosler æger diu est usus. Inde verò
nata cacoehymia pituitosa & biliosa, tum in
vasis, tum extra vasa existens, antecedentem
huic morbo præbuit causam. Pars verò ejus una
biliosa, mane alternis diebus horrorem, &
perpetuum calorem, pulsusque crebriorem ac
celerem; altera verò pituitosa, quotidie sub
vesperam, primò corporis refrigerationem &
deinde corporis totius incalescentiam, & pul-
sus celeritatem & crebritatem, item sitim, ven-
triculi dolorem, & gravitatem capitis indu-
cens, continens hujus morbi & symptomatum
ejus est causa.

Morbus hic, quia totum corpus affligit, &
ex cacoehymia contraria, biliosa sc. & pitui-
tosa, maligna & putrescente, originem ducit,
satis est periculosus. Curatio itaque diligentissi-
me est instituenda.

Eaque consistet in causæ procatacticæ, an-
tecedentis & continentis, ac intemperici, per
contraria, ablatione.

Primo itaque injiciatur clyster emolliens, quo
intestinis evacuatis, sanguis, ex brachio dex-
tro, tempore minoris afflictionis educatur
ad 3vj.

Et bibat de hoc julpio: ℞. Syr. acetosi
simplicis 3ij. Capill. veneris 3j. Aq. borrag.,
cardui bened. an. ʒss. Spirit. vitriol. q. s. pro
grato acore, Misce, F. Julep. Purgetur etiam
subinde, tempore minoris afflictionis, tali pur-
gante medicamento:

℞. Electuarii diacatholici 3ß Diaproni sol.
3iij. Cassiæ recent. extr. 3ij. Aq. car. bened. q.
s. Misce F. Haustus.

Et utatur hoc apozemate: ℞. Rad. petro-
sel., polypod. quere. an. 3j. cichor. 3ß. Fol.
agrimonæ, acetosæ, cichorii melissæ, an. m. j.
Flor. centaur. min., genistæ an. p. j. tamarin-
dor. 3j. Decoq. in aq. hord. 3xvj. addendo sub
finem decoctionis fol. fennæ 3jß. in Colatura
dissolve syr. de cichor. cum rhubarb. 3jß. Misce
pro Apozemate, de quo quotidie sumat 3iij.

Victus sit tenuis, temperatus. Tempus ci-
bandi sit circa horas minoris afflictionis. Potus
sit cerevisia tenuis, bene defacata, item julep.
ex aq. endiviæ, cichor., rosar., viol., borrag.
syr. de succo citri, ribium, & similibus. Per-
turbationes animi fugiendæ, & cum spe eventus
expectandus. *Hemuritis apud Theodor. Cra-
nen i Medication. lib. iij.*

Observationes

Juvenis quidam Nobilis bene habitus & sanguineus mense Majopila palmaria ludens, seque vehementer exercens, adhuc cum antagonista contendens; atque exandescens, postea domum reversus in febrem incidit Synocham, itaque Chirurgus accersito, vena brachii aperta, sanguisque ℥viij. detracta fuerunt, statimque ad sanguinis fervorem extinguendum julepum hunc propinavi.

℥. Aq. endiv. & acetos. an. ℥ij. succi li. non. ℥i. syr. de ribes & de agresta. an. ℥i. julep. viol. ℥i℥. capiat mediam partem statim a venæ sectione, alteram sub nocte, ut aquam fontis, quam summe expetebat, injecta tamen prius crusta, panis, assatim biberet concessi, quia nox inquieta fuit ob turbulenta insomnia & caput dolebat, oxyrrhodinum fronti & temporibus applicui.

℥. Aq. ros. ℥iiij. aq. plantag. viol. & lactuc. an. ℥ij. aceti rosac. ℥i. album ovor. numero j. ol. rosac. ℥i. agitentur ut fiat oxyrrhodinum.

Pulsus cum nihilo remissior esset, iterum crastino die missus est sanguis ex sinistro brachio bona quantitate. Sub vespere quia alvus non respondebat, & ut calor magis restingeretur clystma injectum fuit tale.

℥. Fol. malv. viol. acetos. lactuc. endiv. an. Mi. fl. viol. nymphææ an. pi. sem. cucurb. conquassat. ℥℥. sem. psyllii ℥ij. F. decoctio in colat. ℥℥. dissolv. sacch. rub. ℥j. cassia rec. extract. ℥℥. succi lactuc. ℥℥. ol. viol. ℥ij. salis parum. F. Clyster. hujus vbi bis ejecit, post mediam noctem facies & pectus madere cœperunt, indeque somnus subsequi, moxque inter dormiendum egregie sudare: & postea febris cum penitus dereliquit. Felix Platerus, obs. lib. 2. pag. 277.

Pro Febre ardente.

Pauper quidam quadraginta annorum correptus est ardente febre cum symptomatis solitis, illum paucis & nullius pretii remediis sequentibus sanum feci.

℥. Aq. card. bened. ℥vj. rad. asari pulver. ℥ij. M. pro haustu, hausto hoc calide in lecto, sudavit multum, vomuitque nonnulla biliosa, sequenti die basilicam cubiti dextri aperuit, & copiose sanguinem misit, pro cibo dabantur juscula, potus erat aqua decoctionis fragrariz, atque his sane mox subventum est misero. Martinus Rulandus. curat. 55. cent. 9.

Experientia longa observavimus in curandis febribus omnibus, & iis equidem quæ nullis pharmacis solvi & tolli potuerunt, illas mox & certo solutas & sublatas esse aqua benedicta. Martinus Rulandus. curat. 68. cent. 9.

Paupercula quædam febre ardente lethifera laborans, mox adjuvata est & liberata peremptu facilia & utilia ista cataportia.

℥. Pil. sine quibus, aurear. an. ℥ij. agar. troch. ℥℥. cum syr. ros. solut. F. pil. ix. quarum operatio fuit bona & salutaris, potus erat decoctum radicum cichor. Martinus Rulandus. curat. 69. cent. 9.

Vir quidam triginta annorum ardente febre extortescerebat, accesserat pertinax vigilia, lin-

gua arida, spiritus difficilis, cibi fastidium, vehementens litis, ab omnibus erat desperatus, urina fuit rufa, turpida & spumosa, hujus deplorati hominis curam suscepti talem. Cibus erat liquidus, sorbilis, humectans, potus aqua julepizata julepo violato, hoc purgatorium propinavi.

℥. Decoct. aperitiv. cum rhab. ℥ij. syr. rosat. solut. ℥ij. syr. de rhab. ℥i. M. pro haustu, quo alvus multa biliosa & varia egessit & febris sese mox inclinavit, urinaque cœpit naturalis fieri. Sequenti die post hanc evacuationem, basilicam venam me admonente pertudit, his ita peractis præter omnium hominum opinionem Dei misericordia iterum incolumis restituitur. Martinus Rulandus, curat. 45. cent. 10.

Juvenem quendam 19. annorum febre continua periculose laborantem mox annuente Deo, sanum feci per sequentem potionem & poculum.

℥. Aq. font. vini. an. ℥iiij. bulliant simul & semel. postea infundantur in calice nostro chymico per horæ quartam partem, deinde invocato nomine Domini, accepit calicem salutarem, bibitque intus, & post horam evomuit multa phlegmatica & biliosa, ac alvo quoque consimilia excrevit, & statim melius habuit, melior etiam urina, & quatuor dierum spatio sanatus fuit, victus ratio fuit humectans, potus decoctum hordei saccharatum. Martinus Rulandus. curat. 27. cent. 9.

Pro Febre continua putri.

Juvenis quidam biliosus 25. annorum, cum tempore verno a cibo, operi rustico valde intentus esset, in febrem continuam eamque putridam incidit. Secundo die a morbi initio ad eum accitus, cum alvum strictiorem haberet, minorativum medicamentum sequens propinavi.

℥. Ele&. lenitiv. & cathol. an. ℥iiij. syr. rosat. solut. ℥ij. aq. cichor. ℥iiij. quo & multa biliosa evomuit, simulque ter alvum excrevit, sequenti vero die, ℥viij. sanguinis ex vena brachii dextri extracta sunt, cum robullus esset, hora quarta pomeridiana hunc julepum ebibit.

℥. Aq. lactuc. cichor. endiv. an. ℥j. syr. de endiv. viol. oxyssacchar simpl. an. ℥℥. M. pro capitis dolore fronti oxyrrhodinum admovi, cumque male dormiret tempora inunxi oleo viol. & papav. simul mixtis, cum a sanguini distractione, aliquantulum sudasset, & bene egessisset, quarto die melius habere visus est, quinto autem cum signa coctionis in urina apparent, neque alvum deponeret, rhabari intus sequens dedi.

℥. Rhabarb. el. ℥j℥. pie ℥℥. infund. per noctem facta prius leni ebullitione in aq. endiv. ℥v. fortissimæ expressioni adde syr. rosat. solut. ℥ij. M. quo optime excrevit, ita ut febris sexto die minus illum affigeret, & urina crassior facta valde subsideret; septimo autem die per sudorem crisis subsecuta est, & sanitati restitutus fuit. Petrus Forestus, obs. 1. lib. 2. De febribus continuis.

Puella quædam septem annos nata, laborabat febre continua non admodum vehementi, sed quæ per intervalla, scilicet circa vespere

exacerbabatur, incepit febris cum vomitu pituitoso, quem deinde secutus est alvi fluxus etiam pituitosus, per novum tantum diem perseverans; lingua erat pallida & turbata, anhelitus acidus & graveolens. Prescribo potionem ex infuso ʒj. rhei cum syr. rosac. ʒj. quam paulo post assumptionem evomit, cum pituita crassa & valde putrida; deinde circa v. speram clysterem ex catholico duplici ʒss. iniiciendum curo: quo & reliquis medicamenti simul operantibus, quinque deiecit tota nocte materiam pituitosam, biliosam, & valde fetentem; mane febris per exigua, & meridie febris expers, ac sanitati restituta est.

Ex hac observatione colligere est, quantum aberrant illi Medici, qui in omni febre continua indiscriminatim a venæ sectione in hoc indam esse curationem existimant, cum sæpe in pueris dictæ febres a putridis humoribus, in prima regione stagnantibus oriantur; qui purgatione facili educuntur, in hac autem puella vomitus pituitosus & alvi fluxus talem humorum redundantiam indicabant. Lazarus Riverius. obs. 57. cent. 1.

Pro Febre summe maligna cum pulsu intermittente.

Nobilis quidam incidit in febrem summæ malignitatis, quam statim ab invasionis principio continebatur continuus vomitus materię biliosæ, vehemens linguę ariditas, sitis, inquietudo, intollerabilis æstus ventriculi, cum frequenti eructationum repetitione, quæ per intervalla vallagula communicabat angustias & coarctationem difficillimam; pulsatio arteriarum deprehendebatur valde inæqualis & inordinata usque ad septimum diem, quo percipi cœpit intermittens, sed hic nondum arripui desperationis ansam, licet haudquaquam me lateret Galeni de hoc signo iudicium prorsus formidabili.

Ad medelam huic affectioni præstandam accitus, neglecta sanguinis detractio, quam hoc anno in quibuscunque malignis & pestilentibus morbis crudeliter grassantibus periculosam compereram, illico exhiberi jubebam antidotum hoc cum aq. card. bened.

℞. Theriac. el. ʒij. rad. tormentill. bacc. junip. sem. card. bened. an ʒss. bol. arm. præp. ʒss. diamargar. frigid. ʒij. sem. acetos. citri. ras. eboris, an. ʒj. syr. acetos. citri, q. s. F. conditum, unde provocato abunde sudore meliuscule habuit, tertio die observata maxima humorum putredine, & apparentibus incendii aditionisque gravioris indiciiis, ordinavi decoctum ex hordeo, carduo bened. & scabiosa confectum, admixto saccharo & aceto in formam syr. acidi quo assidue utebatur, quandoque haustum ex stillaticia card. ben. & oxalidis aqua hibeat. Nutriebatur præparata subacida, avenæ in aqua cum pauxillo aceti præparato, ac tandem juscule pulli gallinæ simplicis in quo vitellus ovi erat dissolutus, assumpsit quoque succum mali punici. Quinto die confecto diligenter corpore, exhibitæque aqua hordeacea dulcorata, copiosissime profluxit sudor, qui mirè ægrotantem sublevabat anxietatis continuæ molestiis. Sexto per secessum prodibant

excrementa penitus biliosa cum fœtore magno, adeo ut natura materię peccantis diminutionem paulatim moliri jam videretur, sed impedita fuit ab insultu noctis subiequentis, qua symptomatum omnium concursus ingruerat tanta & vehementia & celeritate, ut æger condito ultimæ voluntatis testamento migrationis e vita momento intenderet. Septimo rediens manè in acerbo con sanguineorum attantiumque luctu citra ullam dilationem digitis carpo ad motus pulsum percipio intermittentem tertia quaque pulsatione, qui primo quidem contactu terrorem incussit, at examinatis interea cæterorum accidentium præsigniis, indeque certa convalescentiæ spe data, quidquid discriminis portendebat variata illa cordis & arteriarum motio, id totum retuli ad acerrimum naturæ cum vimorbi consertationem, neque profecto conjecturam meam eventus rei iecellit, quoniam reliquo diei decursu expultrix facultas occubatur planè in exonerando stomacho a noxia materię aductæ multitudine, animadversione habita primo ad virtutis corroborationem, odorati mala arantia aq. rosac. obtuli. Deinde ad juvandum naturæ conatum insciendo vomitu exhibui aquam tepidam cum ol. communi & arantiorum lucco mixtam, inde serosa quidem, excrementa nonnulla remanarunt. Sed quum minera maligna nondum attingeretur satis ab imbecilliori hoc medicamento, aut ejus tenacissima malignitas infringeretur, sequenti die (qui octavus numerabatur deliberato animo, & pulsus intermissione quamvis perseverante, ministravi potionem purgantem sequenti modo confectam.

℞. Rhei el. pulv. sen. laxativ. ʒij. infund. seorsim in aq. endiv. ʒijss. horis x. post tortem expressionem colat. adde. syr. ros. solut. ʒj. M. & quia mentio incidit pulveris senæ solutivi, cujus usum in hac inferiore Germania ego primus introduxi ejus descriptionem lubenti communicatione obiter subjungam, ut quibus visum fuerit in suis præparent pharmacopœis.

℞. Sol. sen. purgat. tartar. alb. an. ʒj. sem. anis. caryophyll. cinnam. galang. an. ʒj. diagrid. ʒij. comminuantur minutissime in pulverem. S. A. dosis est ʒij. in substantia & ʒss. in infusione. Ex superscripti pharmaci assuptione sexies æger per alvum excrevit flava, biliosa, adusta, fetida, cum sedatione omnium symptomatum: ut etiam testaretur sensibili perceptione sese liberari ab ingenti pondere glomeris per intestinorum longitudinem a ventriculo delabentis. Postea roboravi intrinsecus conf. exhibitione, foris verò illinitione olei ros. immaturi, convaleuit probè nobilis hic post universalem corporis evacuationem: saltem pulsus intermittens perdurabat adhuc in novum usque diem, quo commutabatur in parvum, rarum, & tardum, qui necessario debilitatem sequebatur ex mutua naturæ & ægritudinis collutatione natam. Proinde manifestè apparet hanc dicendi cautionem a Medicis esse observandam, ne animo penitus percussio & commoto de valetudinis recuperatione confestim diffidant, si quando ejusmodi pulsus sensus occurrat, cum causæ quidem morbi hæc magnitudinem & ancipitem oppugnantis naturæ luctum denotet, non tamen mortis propinquitatem, nui

nisi plurimum lethalem signorum tanquam ~~transiens~~ accessione confirmetur artificiosa conjectura. Ioanes Wierus lib. 1. obs. 4.

In febre maligna hodie frequentissimus est lapidis bezoardici usus; cuius (ut libere loquar) nunquam evidentem ullum fructum conspexi; veruntamen usurpationi facile concedo, quod ex iis sit, quæ si non juvent, nec etiam obsunt: quæque exerceri à Medico indulgebat Hippoc. Hier. Mercurialis. consult. 5. tom. 3.

Ut ingenuè dicam, dum Venetiis praxim exercerem, maximam lapidis bezoardici copiam consumpsi, nec egregiam operam sensi. Scio plurimos quibus exhibui, fuisse sanatos, sed non retuli in lapidem: Scriptores dicunt, quod eo sumpto sudor copiosus excitetur, post quem statim sublevantur. Ego tamen non vidi sudorem prorumpentem: vel si apparebat, erat sudor imperfectus, itaque quantum ad me, abjeci omnem spem huius lapidis in his febribus. Hercules Saxonia, lib. De Febribus. cap. 38.

Pro Febre maligna.

Vngula alcis summopere in epilepsia commendata mirabiliorem virtutem possidet, ut sæpius nos expertissimus, contra venena & febres malignas, eo modo sumpta quo lapide Bezoar utimur. Sudorem facillimè movet. Nos exhibuimus in minutissimas partes lima redactam cum conserv. de acedine citri ad septem granorum pondus, mirabileque effectus in morbi malignitate superanda ægrotis peperit. Dominicus Panarolus. observ. 33. pentecoste. 3.

Vir quidam incidit in febrem malignam quæ ipsum ad convulsiones & delirium perduxit, cum summa pulsus inæqualitate, unde brevi moriturus videbatur. Ex variis quæ illi exhibitæ fuerunt, maximè profuit aqua theriacalis nostra in febris pestilentis curatione descripta ad ℥iij. exhibita cum bezoardici jovialis, gr. xii. à quibus sudor copiosus excitatus est, & æger veluti miraculo liberatus. Lazarus Riverius. obs. 66. cent. 4.

Compositio aquæ theriacalis Riverianæ talis est.

℞. Limones recentes & succulentos, num. xij. cortices & semina exhimentur, succus exprimatur, eique adde cortices prædictos & semina: succi scordij, ℥iij. succi acetos. rutæ caprarie. scabios. & card. ben. an. ℥ij. ras. C.C. ℥iij. theriac. vet. ℥vj. cortices limonum in tenues laminas dividantur, semina contundantur, & herbæ quæ minus habent succi inter contundendum succo limonum irrorentur. Omniaque destillentur in B. M. huius aquæ detur. ℥j. per se vel cum aliis liquoribus permixta.

Matrona quædam Sexagenaria febre maligna laborabat, cum summa virium dejectione ex continuo alvi fluxu ad lienteriam tendente, & totius corporis refrigeratione singulis diebus recurrente, & per plures horas perseverante. Cum remedia ordinaria, quæ pro febre maligna alvi fluxu & corroboracione virium vulgo præscribi solent, sedulo ac continuo per biduum usurpara, nihil profuissent, & ægra in pejus rueret, ita ut die undecimo morti dro-

xima ac veluti in agone constituta videtur, ad bezoardicum joviale tanquam alexipharmacum eximium, & potens diaphoreticum confugiendum esse censui; illius gr. xij. exhibui ab eo tempore non amplius deiecit: perfrigerationes non redierunt, & intra biduum febris expersuit, ac postmodum brevi convaleuit. Lazarus Riverius. obs. 56. cent. 4.

Pro Febre maligna.

Post Monspellii obsidionem an. 1623. grassata est per plures menses febris admodum maligna, ex qua media ferè pars ægrotantium interibat, periculariter verò quibuscunque parotides superveniebant: (quod circa nonum vel undecimum morbi diem solebat contingere) omnes interibant, cum autem plures huiusmodi vidissem neque ullis alexipharmacis liberare potuissem, cogitare cœpi ideo cense-ri lethales parotides, quod pars illa non sit capax recipere totam materiam morbosicam, quæ intus manens, interimit; & supplendum esse naturæ opus: ac quanquam ægrotantes pulsum haberent parvum & frequentissimum ac pene formicantem, ut in agone mortis versari viderentur, quæ etiam brevi succedere solebat: attamen hanc C. Celsi sententiam animo revolvens, multa scilicet in præcipiti periculo rectè fieri, quæ alias essent omittenda, & satius esse anceps remedium in uno aut altero experiri, quam tot ægros certo exitio relinquere; sanguinis missionem præscripsi partitis vicibus, propter virium imbecillitatem bis aut ter eodem die, & sequenti die, purgationem: quæ via omne quia hæc remedia administrata sunt, feliciter evaserunt, neque ullus deinceps interit. Lazarus Riverius, obs. 43. cent. 1.

Vocatus ad quendam febre maligna laborantem, præter remedia ordinaria & julepos cordiacos cum sale prunellæ ter in die exhibendos hunc pulverem præscribo.

℞. Salis prunellæ. ℥ss. camphoræ 3℥. M.F. pulvis: qui dividatur in quatuor partes, quarum unam capiat tertia quaque hora: noctu hunc pulverem sumpsit, & manè multò melius habuit, jubeo iterari pulverem cum aliis remediis, & eodem die à præsentaneo vitæ periculo liberatus est, & paucis modum diebus omnino convaleuit Lazarus Riverius. obs. 18. cent. 2.

Aromatarius quidam viginti & quatuor annorum laboravit febre maligna, ex qua tandem circa undecimum morbi diem incidit in delirium, & paucis post modum diebus in motus tremulos & convulsivos nervorum, qui phrenitidi lethali supervenire solent per mentem ferè integrum delirium perseveravit, convulsiones verò per dies duodecim, tandem evasit post multorum remediorum usum: ea quæ magis profuere, sunt sectio venæ frontis, & julepi compositi ex aq. card. bened. ℥iij. aq. theriac. ℥iij. bezoar. mineral. ℥ij. camphoræ, gr. xij. qui quinquies fuere exhibiti. Lazarus Riverius. obs. 62. cent. 2.

Pro Febre maligna.

Ancilla quædam febre maligna laborare cœpit, quæ eam ad deliria convulsiones deduxit
quis

quia paupercula erat, & parcebat sumptibus, paucis remediis curata est in sequentem modum. Quater secta fuit vena, cucurbitulæ pluries admotæ humida & sicca: pro potu utebatur decocto radicis acetosæ, in quo dissolvebam bis in die salis prunellæ. ℞. spirit. sulphuris. gutt. xv. In iusculis sumebat frequenter bezoard. mineral. ℞. die undecimo morbi exhibui spiritus fuliginis. ℞. in aq. card. ben. & parum iudavit: die duodecimo exhibui ejusdem spiritus ℞. cum eadem aqua & copiosè sudavit. eodemque die febris remissa est, deliria & motus convulsivi desierunt: & intra paucos dies postmodum convaleuit. *Lazarus Riverius. obs. 36. cent. 3.*

Virgo quædam viginti annos nata, correpta est febre maligna, quæ eo usque processit non obstantibus remediis ordinariis, ut circa undecimum morbi diem in delirium & nervorum contractiones inciderit, quibus accedebant interdum Leptopsychiæ: in gravi illo periculo præter epithemata & pullos columbinos, aliaque roborantia interna & externa, sequentia remedia præscripsi: quæ in his affectibus maximè solent esse efficacis: nempe vesicatoria quinque cervicis, brachii, & femoribus admovenda; julepos ex aq. card. bened. ℞. in aq. theriac. Bauderon. ℞. in bezoard. ℞. in camphoræ, gr. vi. qui julepi per biduum usurpati fuere mane & sero: tum etiam prædictum bezoard. miner. exhibebatur in singulis iusculis ad ℞. hisce remediis intra paucos dies, à gravi illo morbo liberata est. *Lazarus Riverius. obs. 73. cent. 2.*

Mulier quædam triginta annorum sese mihi curandam obtulit: laborabat febre maligna à duobus diebus, cum dolore capitis, inquietudinibus fere continuis, sitique intensa, maculis quibusdam lividis circa pectus & dorsum apparentibus: ter intra biduum sanguinem eduxi ad ℞. singulis vicibus, cumque interna omnia remedia adversaretur. ad externa animum contuli, quinto itaque morbi die cataplasma ex cochleis cum suis testis contusis, stupisque superpositis utrique pedi circa plantas applicandum curavi: admotum est hoc remedium circa horam tertiam pomeridianam, inclinante autem die, cepit ægra sentire dolorem quandam molestem & gravem in utroque femore & tibia, qui ad mediam usque noctem duravit, ea sævitia, ut ægra de removendo cataplasmate perpetuò cogitaret. Media autem nocte sudor totum corpus invasit, tanto foetore, ut illum sustinere vix posset, mutato indusio, amota sunt e pedibus cataplasmata tetrum adeo odorem exhalantia, ut astantes ferè inficeret: mane agram alacrem invenio, febre, aliisque symptomatis valde imminutis, & brevi post onumino convaleuit. *le. Martinus. obs. 8.*

Pro Febre purpurata.

Vomitibus ad invicendum virum quendam febre continua laborantem ab octo diebus, in quorum spatio ter ipsi vena secta fuerat, & purgans medicamentum semel exhibitum, ex præscripto medici ordinarii; invenio pulsum valde frequentem & inæqualem unde suspicor febrem

esse malignam, simulque eum detegi jubeo, & totum corpus invenio exanthematis purpureis refertum: urinæ erant satis laudabiles concoctionis rudimenta quædam ostentantes. Præscripsimus cucurbitulas multas secundum spinæ longitudinem applicandas, tum siccas, tum humidas, epithemata, inunctiones ex oleo scorpion. Mathioli, confectionem de hyacinto in iusculis, & julepos refrigerantes, cum cardiacis, pro potu utebatur ptisana vulgari, in quam nodulus C. C. mergebatur: hæc remedia continuavit usque ad undecimum morbi diem, cum tamen omnia in pejus ruerent, ægerque delirio, & convulsionibus correptus fuerit: dicto die undecimo leviter sudavit sine fructu. Delirium cum stupore quoddam conjunctum erat: ideo vesicatorium cervicis admotum est. & cucurbitulæ continuatæ partibus inferioribus.

Julepi sequentes præscripti sunt.

℞. Hord. integri, p. j. rad. bugl. ℞. sol. borrag. pimpinell. scord. an. Mj. sem. citri, acetos. an. ℞. zamarind. ℞. ll. borrag. bugl. ros. rub. an. p. j. dictamn. cretic. p. ℞. decoctio in aq. ℞. ad tertie partis consumptionem: in colat. dissolv. sacch. alb. ℞. f. julep. de quo capiat ℞. mane & sero, addendo unicuique dosi salis prunellæ ℞. spirit. Martoli, ℞. Pro potu præscripta fuit tinctura ros. in iusculis, pulv. ex margarit. corall. ras. ebore. C. C. & lap. bezoard. at postremis diebus insuante decimo quarto die cum omnia in pejus ruerent, loco pulveris illius, substitui bezoardicum minerale purum, cujus ℞. sumebat in singulis iusculis. Cum vero circa vespertinam, febris, delirium, & convulsio plurimum intendi consuevisent; duabus horis ante exacerbationem hunc pulverem exhibuimus.

℞. Salis prunellæ. ℞. bezoard. miner. ℞. camphoræ, gr. vi. M. capiat cum aq. card. ben. & exinde melius halius decimo sexto die cum apparet concoctio in urinis, medicamentum catharticum exhibitum est ex senæ ℞. iheri. ℞. in decocto refrigerante iusculis. addendo colat. træ, & syr. rosac. an. ℞. quo blande purgatus est: eodem die pustulæ quam plurimæ animadvertæ sunt instar variolarum ad suppurationem tendentes magno quidem numero circa vesicatorium, tum sparsæ per dorsum, lumbos, & nates: die sequenti prædictæ pustulæ majori ex parte ruptæ apparuerunt, & ad exsiccationem tendentes: verum in parte anteriore circa hypochondria & pectus pustulæ perexiguæ, pelucidæ, & diaphanæ, humore seroso refertæ, infinito propemodum numero prodire: febris valde remissa, & delirium valde imminutum: decimo octavo somnus multus fuit, & ferè continuus diu nocte usque ad diem vigesimum: purgatus est iterum die vigesimo secundo, & postea febris omnino desit, ac paucis postmodum diebus perfecte convaleuit. *Lazarus Riverius. observ. 21. cent. 1.*

Raphanus quia magnam vim habet attrahendi malignitatem materiæ, utile est scobem ejus pedibus sale & aceto prius mundatis alligare: idem etiam occipitio apponi potest, si vehemens capitis dolor adsit. *Ioannes Crato. consil. 16. lib. 3.*

Pro Febre maligna.

Servus cujusdam Archiep. febre petechiali laborans eo devenerat, ut nulla spe superstitie, de vita esset conclamatum, ille vero mortis candidatus, qui mori se intelligebat, misso ad Episcopum nuncio, supplex vini haultum expe- tit ante fatalem horam quod illi ilico con- cessum fuit largiore quam experierat, mensura. Post haultum vini rhenani in sudorem, quievit. & judicata est cum salute febris. Similia exem- pla plura apud nos memoriz occurrunt. *Thomas Bartholinus. hist. 7. cent. 6.*

Ego certe testari possum, me, cum extremè febre pestilenti decumberem, animique deli- quia singulis momentis haberem quatuorque dies & noctes absque omni somno habuissem, omnesque astantes de mea salute desperarent, sex guttulis tincturæ coralli cum decoctione violarum ex cochlearia tincturæ sumpseram, enim ad duo cochlearia tincturæ sumpseram, cordis spiritus ita recreari, & naturæ gratissi- mum, quippiam accessisse, ac omnia præcor- dia subiisse senti. ut illico quasi luce depulsis te- nebris, morbi vim, medicaminis efficiacia, ma- nifeste abigi perciperem. Sudorem enim & cri- sim (cujus tamen nulla indicia præcesserant) movebat, maculasque quamplurimas purpureas ad cutem pellebat: quibus sudore continuo de- letis, brevis pristinam valetudinem recupera- bam. *Alfelmus Boetius. lib. 1. De Lapid. & Gem- mis. cap. 154.*

Pro Febre continua in puerulo ætate decim men- suum, cui à seculo Lingua frano Sanguis in ventriculum effluxit, à biq. putrescens, Febrem excitaverit cum saevissimis Symptomatis.

Quam primùm vomitus provocetur cum ℥ij. ol. amygd. d. ut putridus in ventriculo conten- tus sanguis evocari possit mox à vomitu, Cly- teriolus, quam primùm injiciatur ex jure pin- gui & saccharo, vel melle despumato, ut scæces, & ejusdem corrupti sanguinis reliquæ ab inte- stinis concreti purulentique notabilem copiam evomunt, adhuc unâ cum rejecto clystere san- guinis corruptis grumo grumos permultos ex- crevit: & sic statim remissa fuit febris: cessan- runtque omnia symptomata, neque in poste- rum quicquam mali persensit. Sanguis in ven- tricullum fluxit, quod ab opere chirurgico, non statim prorsum situaverunt infantem, ut ex ore potuerit protinus produere. *Io. Zecchius. cons. 46. & append.*

Pro Febre maligna cum vermibus in Muliere.

Ab umbilico inuncto sequenti linimento, & pilulis deinde devoratis, novem vermes ejecit, & sic præter omnium spem sana evasit.

℥. Ol. ovor. lilior. fellis bubul. succi cepæ as- satæ, butyri rec. an. ℥ij. M. F. linimentum.

℥. Aloes succotrinæ, ℥ij. spec. diatragac. frig. gr. v. cum syr. viol. F. pil. iij.

Sorbebat autem supra pilul. i. syr. de limon.

Petrus Forstius. obs. 4. lib. 6. De Febribus mali- guis.

Pro Febre publice grassante cum gutturis dolore molestissimo ex Catarrho pe- ne suffocante.

Plurimum profuit ad dolorem gutturis gar- garismus subiequens, quo in incipso ulus tum- tum in aliis, ita ut cum illo septies tantum gargarissem, dolor illic subito cessavit, simul & angustia pectoris miraculi intar.

℥. Aq. plantag. ℔j. aq. scabios. ℔ss. s. ros. rubr. p. j. sem. cydon. ℥j. bulliant leviter & co- lentur. adde diamor. dianuc. an. ℥j. terræ sigill. verz pulver. ℥j. M. quo cum usus essem viderat quasi liberatus ab hoc malo, ita ut nocte subse- quente optimè dormirem. *Petrus Forstius obs. 1. lib. 6.*

De Febre flata.

Architectus quidam singulis annis statò die, hoc est, quo natus fuerat, febre implicabatur, quæ ex putrescente bile genita suum circuitum servans decimum quartum non transgredieba- tur diem donec senio confectus, & eadem ex more complicitus febre natali suo die vi morbi prostratus, naturæ concessit. *Antonius Devenius. cap. 84. lib. De abditis morborum & sanationum causis.*

Pro Febre tertiana exquisita.

In principio mensis Junii, cum tempus valde calidum esset, ac impensè circa ægros curan- dos ipse laborassem, vigiliis, curis, & sollicitu- dine, plus æquo occupatus, in tertianam ve- ram & intermittentem lapsus sum: in paroxysmi principio & augmento à somno & potu absti- nebam, die verò sequenti intermissionis post primum paroxysmum ter in die ex julepo se- quenti sumpsi.

℥. Fol. acetos. endiv. viol. lactuc. scariol. an. Mj. prunor. damasc. numero xv. coq. in sero factis pro ℥ix. col. adde syr. viol. ex multiplici infusione ros. de endiv. an. ℥. M. F. julepus: co- alvus nonnihil solvebatur. Cibus erat panata vel pomum acidum coctum, potus cerevisia te- nuis tempore intermissionis, tempore febris prisana ex hordeo mundato & liquir. parata: post secundum paroxysmum die quietis hac le- niente medicina usus sum.

℥. Flor. nymphææ, viol. borrag. an. p. j. prun. damasc. num. xij. tamariud. ℥ss. coq. in sero factis in colat. ℥iv. dissolv. diapr. simp. cas- siæ rec. extract. syr. viol. an. ℥ss. M. inde habui sex sedes valde copiosas ac biliolas. Postea ter- tius rediit paroxysmus adeo violentus, ut in statu delirarem. Die verò subsequente, nempe quieto, cum urina aliquo modo tincta specta- retur, & crassior, ex basilica brachij dextri ℥iij. sanguinis extraxi: sed adeo inde debilita- bar, ut quasi syncopen futuram præsentirem, nisi Chirurgus imperassem, ut illico venam con- stringeret: at medico vino rhenano sumpto de- liquium animi interciperem, ut non fuerim syncopen passus. Alteratio tamen illa adeo pro-

profuit: ut postea non amplius paroxysmum habuerim. *Peirus Forestus*, obi. 2. lib. 3. De Febre intermittente.

Virum quendam febre tertiana laborantem Dei auxilio & sequenti medicina mox liberavi.

℞. Decoct. card. bened. ℥iij. extract. esul. ℥ii. M. pro haultu, quo multa biliosa phlegmate permixta egressit: per sequentes novem dies in aurora & longè ante paroxysmum accepit decocti sequentis ℥vj. calidè & in lecto stragulis bene contextus sudores graveolentes & acres emisit; ac eo penitus remisit febris, sanusque evasit decem dierum spatio. Est autem decoctum tale.

℞. Flor. centaur. min. M. iij. coq. in aq. q. sed dimittas. *Martinus Rolandus*. cur. 97. cent. 1.

Pro Febre Tertiana.

Ad Generosum quendam febre tertiana correptum vocatus, in hunc modum curationem instituto. Primo longè a remissione paroxysmi venam hepaticam petundo. Sequentibus sex horis ante paroxysmum jejunus assuñebat aquam hanc frigide.

℞. Aq. fontis, ℥vj. spirit. vitrioli, gutt. v. vel vj. M. ut f. potio aqua acetosa, quæ dentes non contrahat in stuporem, per hujus primi potus efficaciam & Dei potissimum misericordiam febris arcebat, atque ex toto quiescebat, nec unquam postea reverebatur: verum nihilominus per sequentes tres dies febricitans aqua ista dabatur ante ut dixi accessionem. *Martinus Rolandus*. curat. 100. cent. 1.

Alium febre tertiana laborantem curavi in sequentem modum.

℞. Aq. bened. aq. fontis, an. ℥j. commixtas fridè exhaustis, atque supra, & infra rectè multumque purgatus fuit, exhibui potionem hanc septem horis ante paroxysmum: sequenti die secari jussi dextri lateris basilicam, & sanguinem ad decem uncias fluere. Interea supra pulsus manuum per octo dies ligavi sequens. Epithema mane, quod per diem retinebat, noctu removebat. Est autem hoc.

℞. Ruta, salvia, bursæ pastoris, an. Mj. cum aceto rosac. conterebantur in formam pulvis, & adaptabantur ad pulsus: post quæ remedia, accessio febris ex toto recessit, nec in posterum rediit: cibus dabatur refrigerans & humectans, sed raro & parçè: potui dabam decoctum hoc ad satietatem quoties urgebat sitis.

℞. Cichor. Mij. rad. ℥iij. liquirit. ras. ℥ß. passul. corinthiac. ℥iij. coq. in aqua q. s. ad tertias: & sic omnino convalescit. *Martinus Rolandus*. curat. 94. cent. 1.

Pro Febre Tertiana.

Alternis diebus febrili paroxysmo corripiebatur. Puella Nobilis jam nubilis. Purgavi illam die quietis hoc pacto.

℞. Rad. cichor. dentis, leonis, an. ℥j. rad. rhapont. ℥ß. ablynth. chamædr. chamæpyt. an. ℥iij. fl. cordial. p. 1. fol. sen. ℥i sem. anis. ℥iij. infund. in aq. & vino: coque parum in duplici vase: colatz denuo infunde rhab. ℥ii. cinna-

mom. ℥i. exprimatur: bibat unam dosim, alteram tertio post die quo apyretos est. cum non remitteret, jussi in principio poroxylini aquam sequentem bibere.

℞. Aq. Cichor. cent. min. & gentian. an. ℥i. M. die febris tebris elapso repetatur hujus aquæ potus: pulvis applicari jussi in utroque carpo sequens.

℞. Cortic. intern. aucis arboris, maceretur in aceto torti, & ligetur supra pulsus: unde nigra macula, & postea cutis exoriatio secuta: paroxysmus post mitior fuit.

Jussi tertio aquam bibere, & pulvis sequens apponere.

℞. fol. thlaspi, bursæ pastoris, & plantag. an. q. s. contund. cum sale & aceto, & applicentur: vix bis hoc factò, febris cessavit, ipsaque sana facta est. *Felis Platerus*. observatione libro 2. pagina 288.

Nobilis adolescens mense Martio febre correptus, duobus diebus continuis paroxysmum habuit, postea alternis diebus paroxysmos aliquot, qui horis nunc tribus, nunc quatuor anticipabant: purgatus fuit, postea venæsecta, iterumque purgatus: ceterum cum non cessaret febris enimque misere affligeret, dedi illi ante paroxysmi adventum sequentem julepum.

℞. Aq. plantag. ℥iij. syr. de papav. ℥iij. bibat. Pulsibus applicet in carpo, & temporibus unguentum populeonis subaciuni cum telis aromaticum: superveniente paroxysmo statim sudor erupit, calorque longè mitior subsequitur. Postea denuo imminente paroxysmo, hæc duo remedia repeti, addendo ad julepum aquam Nicotianæ. Sudavit iterum mox ab initio, & vix frigus persensit: calor etiam modicus fuit: postea tandem febris illam deseruit. *Felis Platerus* obi. lib. 2. pag. 293.

Ob inordinatum thermarum usum, in febrem incidi tertianam intermittentem. sequenti die a secundo paroxysmo hausi ℥i. tartar. vitriol. cum gr. ij. diagridi in aliquot cochlear. vini absynthii calidi, cujus operatione bilis evacuatio egregia est subsequuta. Cum autem propter plenitudinem moderandam sollicitus essem, die paroxysmi tertio venæ sectionem institui, idque cum successu, signis concoctionis sese offerentibus: quam ob causam spem bonam de quarto paroxysmo non futuro suscipiebam. Quid sit? Natura ab onere ulteriore liberata sub noctem diarrhæam producit biliosam criticam, qua sanitati, Dei gratia, ab acuto morbo restituebar. *Gregorius Horstius*. obi. 10. lib. 1. De Febribus.

Pharmacopæus quidam quinquagenarius laborat febre tertiana intermittente: bis fuit purgatus, bis etiam phlebotomia celebrata: postea ante paroxysmum, sequens potiuncula ei exhibita est.

℞. Aq. cichor. ℥iij. salis absynthii, ℥ß. spirit. sulph. gr. xii. M. ab hac portione accessio non rediit, sed per urinas plurimum fuit evacuatus. *Lazarus Riverius*. cent. 1. obi. 10.

Studiosus medicinx post quinque accessiones febris tertianæ, secta vena bis, & semel purgato corpore. sumpsit initio paroxysmi, aq. bened. ℥i. accessio fuit cohibita, tum etiam operato medicamento per duas horas, postea vomuit quinque aut sexies sine molestia, accessio brevis

brevior solito fuit, & in fine illius purgatus est per alvum pluribus vicibus, & omnino curatus est. *Lazarus Riverius. cent. 2. obs. 57.*

Gratiapoli vocatus sum ad equitem quendam ordinis Divi Iohannis, febre tertiana laborantem; erat tunc temporis in tertia accessione: prius tamen quam tres illæ accessiones ordinem cepissent, per aliquot dies sine typo febricitaverat: præcipi ad diem sequentem, qui erat intermissionis dies, calomelanos Turqueti. ℞. diagrid. gr. v. in forma pilul. quibus valde purgatus est; redeunte circa vespertim ciborum appetentia, qua prius destitutus fuerat: die vero accessionis sumpsit ante paroxysmum julepum sequentem.

℞. Aq. cichor. ℥iij. sal. absynth. ʒß. spirit. sulph. ℥j. F. julepus: quem haurit duabus horis ante paroxysmum, & copore prope contecto sudavit copiosissime sicque à febre liber evaluit. *Lazarus Riverius. cent. 1. obs. 26.*

Pro Febre tertiana duplici.

Consiliarius quidam annum agens. 65. febre tertiana duplici laborabat à quinque septimanis, in quarum decursu multa remedia administrata fuerant ab alio medico; quater secta fuerat vena, pluries purgatus erat. & multi julepialiaque remedia exhibita: morbus tamen in pectus ruebat, & accessiones graviores evadebant, ita ut eo die quo ego vocatus sum, ipsum attonitum, & comatosum quodam stupore affectum invenerim, & adstantes de ipsius salute maxime dubitarent: tanta autem erat virium prostratio, ut nulli evacuationi locum esse censuerim. Primo igitur die quo ipsius curationi incumbere coepi, julepum sequentem exhibui hora una ante accessionem.

℞. Aq. cichor. ℥iij. sal. absynth. ʒß. spirit. sulph. ℥j. M. F. julepus. secundo die idem remedium iteratum est, hora etiam una ante accessionem. Tertio item die eadem hora sumpsit & accessio perexigua fuit. Quarto die manè sumpsit sequentem portionem.

℞. Sen. mund. ℥iij. sal. tartar. ʒß. spirit. sulph. ℥ß. Aq. cichor. ℥vi. infund. frigide per noctem, & colaturam capiat cum regimine: pluries purgatus est cum euphoria: & eo die accessio non apparuit, neque deinceps, & ita perfecte curatus est. *Lazarus Riverius. obs. 2. cent. 4.*

Servida quædam septimestris correpta est febre tertiana duplici, quæ per mensem eam afflixit; nulla apparente remissione, quod periculum non exiguum portendebat. Docet enim experientia quotidiana mulieres gravidas, huiusmodi febribus laborantes, difficillime curari, & non paucas abortu interveniente de medio tolli: ipsi secta fuerat vena, purgans medicamentum bis exhibitum, & multi julepi aperientes & refrigerantes propinati, tandem venæ sectione hora ante paroxysmum celebrata, & exhibitio immediate ante venæ sectionem, julepo ex decocto fl. chamam. & crem. tartari parato, febris omnino sublata est: accessio enim quæ post venæ sectionem expectabatur, non comparuit neque deinceps. *Lazarus Riverius observ. 7. cent. 4.*

Patronus quidam Sexagerius febre tertiana laborans, post usualia, remedia tandem curatus

est secta hora una ante paroxysmum vena præmisso decocto chamam. & cremor. tartar. & admotione carpis emplistri Sorobelbergeri, *Lazarus Riverius. obs. 12. cent. 4.*

Pro Febre tertiana.

Aspiritu sulphuris cum aqua exhibitio, copiose sudor provocatus, quod multis experimentis nobis innotescit, qui plures tertianas febres curatas vidimus eodem remedio in summo accessione æstu, & urgente siti exhibitio, unde copiosi sudores provocabantur, a quibus non solum paroxysmus, sed etiam totus morbus integrè solvebatur. Hac dosi exhibeo.

℞. Aq. frigid. ℔j. spirit. sulph. gr. xx. M. *Lazarus Riverius obs. 19. cent. 1.*

Retulit mihi D. Chomel, se omnes propemodum tertianas curare solitum, exhibendo per horam ante accessionem bonum haultum decocti chamam. & cremor. tartar. & statim ab assumpto remedio sanguinem detrahendo. Si non sit ad manus decoctum, aquæ frigida cyathum exhibet, & idem fere succedit effectus, putat aquam illam assumptam per phlebotomiam ad venas rapi, & materiam ebullitioni proximam diluere, unde accessio impeditur. *Franciscus Chomel. obs. 3.*

Vir quidam febre tertiana notha correptus est, quæ per mensem perseveraret, sumpsit meo consilio vomitorium ex ℥j. salis vitrioli in aqua dissoluti, a quo ter aut quater excitatus vomitus, nec febris amplius apparuit. *Simeon Iacobi observ. 14.*

Civis quidam Monspelienfis febre tertiana laborans, sumpsit aq. bened. ℥j. & à febre liberatus est, hujus etiam medicamenti operatione latum lumbricum excrevit septem pedum longitudinem æquantem *Samuel Formis obs. 12.*

Perfamiliare remedium febris inter vulgus nostrum ex pipere percrebuit: quo cum successu usum magnum olim Selandiæ Episcopus D. Io. Resenium seniore accepimus, in ipsa accessione piper cum spiritu vini exhibent, vel absinthium in aceto coctum cum paucis pipere tribus continuis propinant, quanquam malè multis cesserit, non paucis tamen profuit, sive quod vomitum provocaverit, sive quod horrorem febrialem discusserit. *Thomas Bartolini hist. 48. cent. 5.*

Ad febrem tertianam intermittentem epidemiam sudorifera maxime profuere paroxysmo instante cum alexipharmacis exhibitæ præmissis ex methodo præmittendis. Innuit in horum censu virtus unicornu nostri Groenlandici, quod non solum ʒß. pondere cum appropriatis ante paroxysmum exhibitum sudorem largum procuravit, sed febrem plerumque extinxit, expertus id remedii novi genus summa-guo successu in plurimis. *Tom. Bartolini. bis 56. cent. 2.*

Pro Febre tertiana.

Pro minorativo has pilulas dedi.

℞. Extract. pil. coch. ʒß. diagrid. præp. gr. iij. ol. anis. scenic. an. gr. ij. cum aq. cinnam. F. pil. vii. deglutivit involutas pulpa pomi sub cinerib. assi, & mediocriter inde depulvit. Sequenti die in ipsa accessione istud expulsum exhibui.

Aq. cinnam. card. bened. an. ʒx. C. C. usi præp.

℞. confect. alker. ʒss. lapid. bezoard. gr. vj. M. F. haustus hydroticus. sudavit, & visus paroxysmus brevior. Sequens paroxysmus multum anticipavit. in limine ejus dedi cochlear. 2. hujus pulveris ex cerevis. calente.

℞. Salis ab synth. gra. xvi. fol. centaur. min. ʒijss. sacchar. aib. ʒijss. M. F. pulvis.

Pro potu ordinario utatur hoc decocto.

℞. C. C. usti & præp. ʒii. coq. in lbvi. aq. fontis deinde impone in cantharo cinnam. el. & fracti, & sacch. albiss. an. q. s. superaffundatur decoctum effervescens, & sinatur sponte sua refrigerari. paroxysmus rursus anticipavit, sed mitior fuit, exhibui iterum dosin pulveris superscripti, & pulvis hoc sequens unguentum applicavi.

℞. Ung. popul. ʒij. tel. araneæ. ʒijss. opii thebaic. aceto solut. gr. iij. ol. fenic. gr. ij. M. fiat unguentum. paroxysmus non reverius est. Ad reliquias febris discutiendas, unica vice illum purgavi, ita.

℞. Elect. diacydon. lucid. lavat. ʒiss. exhibe. habuit aliquot sedes, bene tulit, & ad pristinam sanitatem rediit. *Petrus Lochitius obs. 1. cap. 5. lib. 1.*

Alteri, paroxysmi leve quodam præludium sentienti dedi ʒss. sequentis pulveris mei antifebricitici.

℞. Pulv. fl. & sol. cent. min. ʒii. C. C. usti præp. ʒii. sal. absinth. card. bened. cent. min. an. ʒi. manus Chr. perlat. ʒij. M. Fiat. pulvis ante sequentem paroxysmum ita accepit.

℞. Pulv. antifebricitici superscripti, ʒj. syr. de papav. ʒij. cum vino albo, q. s. F. haustus.

Abinde sudore copiose infecuto placide dormivit, & sese liberatum prædicavit. illo pulvere contra quascunque intermittentes febres feliciter hæcenus utor. *Iob. Petrus Lochitius obs. 2. cap. 6. lib. 4.*

Febris Quartana.

Empiricum Parisiensem plurimos quartanarios decocto radic. lappæ maj. ex vino albo, magno successu curare solitum, accepimus inter observationes Celeberrimi Viri Pauli Marquardi Siegelii, nimirum eadem quartanæ & luis venetæ quandoque remedia observantur. Sic illam cum tibiæ ulceribus hydrargyrosi curam narrat Ballonius. lib. 2. epid. & ephem. p. 131.

Hanc vero in Henrico tertio Galliarum Rege eodem decocto Bardanz à Petro Pena deletam testatur. *Samuel Fermius obs. 41. Georgius Hieronimus Velschius. obs. 4.*

Doctor Medicus certò affirmavit, vidisse se quendam quartanarium, cui in decursu febris ulcuscula apparuerunt maligna, consilio quorundam frictions ex hydrargyro usurpantur. Sanantur ulcera, imò & febris ipsa quartana. *Guil. Ballonius. lib. 2. Epid. & ephem. pag. 158.*

Hoc unum subicere libet, quod ab amico seu secretum quid accepi, & in multis casibus non inutile deprehendi.

Sumatur cor leporis, & eo modo quo pulmo vulpis solet, præparetur, postea in pulverem redactum, atque in tres æquales portiones divisum, tribus vicibus exhibeatur, hora una aut circiter ante invasionem, vino albo, aut alio convenienti liquore dissolutum. Vidi ego semel atque iterum post hujus amuleti assumptionem,

febrem deinceps non magis apparuisse, aut saltem paulatim evanuisse.

Verum hoc non statim ab initio morbi, sed ubi jam manifesta coctionis signa apparent, faciendum est. Petrus Monavius. ep. 62. lib. 5. consil. & epist. Cratonis & aliorum Medicor. à Scholtzio editorum.

Pro Febre quartana.

Quoniam in hoc levissimum & securissimum experimentum incidimus, quod quisque experiri poterit, literis id mandare placuit, quod ita se habet Cum frigore quartanarius torqueri coeperi, cyathum stillatitz aq. ros. ebibat, quo multa & biliosa evomet, & sanus evadet: ita enim multis evenisse observavimus: proximum est hic citare aliud contra quartanæ ingens frigus remedium, quod ex Galeno habetur, & sæpe à nobis in usu habitum, & pro vero compertum, grana v. vel vj. piperis integra de glutienda frigoris tempore ægotanti cum pauculo vino generoso dabis, quo auxilio repetito, æget bene habebit, ut nostro accedit ægotanti, cui quartana post tres deliit paroxysmos Amatus Lusitanus. cent. 2. cutat. 97.

Postquam multa & varia medicamenta quæ tum atram bilem, tum splenem respiciebant, daremus, tandem propinato pharmaco atram bilem respiciente die paroxysmi quatuor horis ante accessionem, multa & nigra excrevit, ac liber à quartana evasit.

Hujus evacuationis die paroxysmi ratio assignatur talis, quia commotione agitata materia facilius ad expulsionem redditur, quam divinus senex contemplatus, in quartana febre die paroxysmi pharmacum dare mandat. lib. De Affectionibus. non longè à principio (si vero quartana apprehenderit, siquidem impurgatus fuerit, primum caput purgato, & interpositis tribus aut quatuor diebus pharmacum sursum versus purgans dato in ipsa apprehensione, & interpositis diebus rursus aliud deorsum purgans dato in ipsa apprehensione) nos verò hodie hora paroxysmi vomitum proritamur, ac cum purgandi tempus instat die paroxysmi pharmacum damus, quibus multa & egregia consecuti sumus, adeo ut raro quartanam incuratam hoc incendendi ordine dimiserimus. Amatus Lusitanus. curat. 4. cent. 1.

℞. Aq. fl. cent. min. & rad. gentian. an. ʒj. julep. rosat. ʒij. M. bibat initio paroxysmi, & spinam dorsii oleo chamæm. & aneth. inungat: bis julepum exhibui quo fugata est febris.

Alteri in principio paroxysmi haustum aq. tabacci exhibui, & valde profuit. *Felix Platerus. obs. lib. 2. pag. 101. & 104.*

Aliqui pro singulari remedio singulis matutinis exhibent hanc aquam destillatam ad ʒij. vel ʒijj.

℞. Aceti fortiss. lbiii. panis albi calentis adhuc detracta crusta lbj. pulv. pyrii. ʒij. M. & destillantur in B. M. Similiter laudant quidam & hanc.

℞. Aq. Meliss. lbj. aq. vitæ lbj. medull. ebuli lbj. M. destillantur: dentur ʒii. per dies aliquot manè aut serò Felix Platerus. practic. com. 2. cap. 2. pag. 158.

Quidam ante triennium quartana laborabat

diu, dicebatque mihi se multis remediis usum esse. unum hoc profuisse, accepisse vinum sublimatum diligenter, quod aquam vitæ appellat, & madefecisse petiam lineam, ac adveniente quartana, imposuisse ventriculo: hoc modo se eam depulisse: videtur mihi satis tuta esse medicatio, præsertim in ventriculo frigido. Io. Crato. epist. ad Camerarium. lib. 3. conf. & pñt. Cratonis. &c.

Consiliarius quidam à febre quartana liberatus est casu rarissimo: cum secta illi fuisset vena, paulo post ocelum vulnus, & ligatum brachium, fluere cœperunt ex vulnere guttulae quædam aquæ limpidissimæ quæ fasciam penetrabant: & indusia sæpe mutare cogebant: perseveravit ille fluxus per multos dies, donec febris quartana cessaverit. Notandum est illum post multos annos ex hydropse interiisse. *Lazarus Riverius obs. 10. cent. 3.*

Aromatiarius quidam febre quartana satis diuturna laborans, quæ multis adhibitis remediis non cesserat, invenit cum ptisanæ potus ordinarii cyathis tribus mixtionem ex ambaro & mosco, quam pro conficiendis muscardinis paraverat saccharo addito, in qua erant utriusque gr. viii. & in calore accessionis ptisanam sumpsit in tres doses singulis vicibus agitando ne pulvis in fundo remaneret, unde copiosissimi sudores oborti sunt, qui moschum redolebant, & ille perfecte curatus est. *Lazarus Riverius, obs. 35. cent. 4.*

Pro Febre quartana.

Multos quartana detentos curavi vomitibus; abstinentia cibi diebus accessionis, purgatione; inunctione dorsi hora frigoris cum ol. lcorp. & pinguedine anseris & gentianæ succo.

Alios verò curavi succo rad. verbasci in potu dato. *Hieron. Cardanus curat. 24.*

Pro Febre quartana.

Anno 1571. multi quartanarii decubuerunt; qui sine remediis delicti sunt, omnes pene convalescerunt: quibus curiosè adhibita remedia, si fere interiere, præsertim si macilentis biliosisque forent, ut febres illæ potius à bile essent ulla quam à face sanguinis. Sic cum quartanis agendum mitissime, ne officiosa sedulitas plus oblit quam prosit. *Guil. Ballontus lib. 1. epid. & ephem.*

Pro Febre quotidiana.

Affinis quidam meus gratis innumeros febricitantes febre quotidiana & tertiana detentos pericarpio sequenti curavit; quosdam prima vice, alios secunda, pertinaces tertia. Remedium tale est. Novem Pentaphylli folia radicitus colligit, postea incipiente paroxysmo, arteriæ brachii dextri tria folia cum sale, superque his tria alia folia cum sale, rursumque desuper alia tria folia cum salis pugillo in medio foliorum imponit, & sic mille ad minus febre detentos curavit, multique etiam quartana detenti quatuor folia eodem pacto imponendo curati sunt. *Petrus Borellus, obs. 32. cent. 1.*

Malo non cedente ad Generosum aliquod auxillium confugiendum est hoc.

℞. Lign. guaiac 3ij. lign. visc. quern. 3j. lig. sassafr. ʒj. infund omnia horis duodecim in juris pulli gallin. ʒbi. deinde bulliant ad consumptionem tertiæ partis sub finem addendo cichor. beton. & menth. viridis an. folia duo colaturæ ʒvii. dentur horis quinque ante prandium per dies

aliquot continuos *Io. Zecchini. consil. 22.*

Ad digestionem humorum pituitosorum ordinatum hoc claretum.

℞. Aq. cichor. absynth. fœnic. an. ʒiij. de cichor. cum rheo ʒiʒ. syr. de quinque rad. ʒj. de granat. acid. ʒvj. crem tartar. ʒʒ. spirit. vitriol. gutt. vj. aromatizetur cum spec. diarthod. abbat. ʒj. cinnamom. el. ʒj. M. F. julepus instar clareti, pro tribus vel quatuor dosibus matutinis & vespertinis. paroxysmus anticipavit & fuit paulo brevior ex usu clareti quod continuabat. Sequenti die ex hac potiuncula purgante ter vomuit, & per inferiorem gutturem copiosè evacuvit.

℞. Gummi gutt. gr. viij. tartar. vitriol. gr. vj. spirit. vitriol. gr. ij. aq. cinnam. ʒj. M. F. haustulus. Postea sequens expulsiuum in accessione febris accepit.

℞. Aq. card. bened. cent. min. an. ʒi. an. cinnamom. ʒj. syr. de papav. ʒiij. sal. absynth. gr. viij. pulv. fol. cent. min. ʒʒ. spirit. vitriol. gr. iij. M. diligenter. F. haustulus. Paroxysmus vix tres horas duravit, horum usu continuato intra paucos dies a febre immunis evasit. *Io. Petrus Loichius. obs. 2. cap. 4. lib. 1.*

Duobus abhinc annis febre quotidiana violenta laborabam, à qua liberatus sum carpis applicando sequens.

℞. Salis marini, lupul. anglic. an. M. ii. passul. corinthiac. ʒiij. probe misceantur & contundantur. D. Robert. boile, lib. De utilitate Natural. Philosoph. cap. 10. sect. 5. part. 2.

Pro Febre Hellica cum initis tabis in muliere quadam.

Commendata victus ratione humectante & nutriente, sic præeunte divina benedictione, processum est.

℞. Sem. papav. alb. ʒʒ. gummi arabic. tragacanth. fatm. anyli, an. ʒi. sem. alth. malv. portul. bombac. an. ʒiij. sem. 4. frigid. maj. rec. & ex cortic. an. ʒiij. ciner. cancr. fluviatil. corall. alb. ust. succ. liquirit. spodii, ros. rub. an. ʒiij. spec. diatragac. frigid. digir. Solom. an. ʒiij. cinnam. ʒii. pulm. vulp. præp. ʒi. incisis & non contusis sem omnibusque loco calente exsiccatis M. F. pulvis dividendus in tres partes,

℞. Pulv. præscript. partem unam, sacch. ros. vet. ʒj. pinear. rec. amygd. d. rec. excorticat. an. ʒv. sacch. penid. ʒbi. aq. rʒssilag. veronic. ros. odor. an. q. s. ol. cinnam gr. vi. F. rotulæ, è quibus diglutia manè in lecto numero ii. vel iij. elapsaque hora sumat cochl. i. sequentis misturæ quæ.

℞. Aq. rʒssilag. ʒbiʒ. syr. jujub. ʒʒ. M. Nocturno vero in ingressu lecti de hocce capiat.

℞. Pulv. præscripti partem secundam, syr. de jujub. de papav. loch. de sarsara, an. ʒi. M. F. Elect. cum fol. auri.

℞. Pulv. præscripti partem tertiam, sacch. penid. ʒii. M. ad Scatulam. Familiarem sibi faciat usum istius pulveris interdium.

℞. Fl. ros. ʒiij. fl. viol. bugl. borrag. & nymphaeæ, æ. ʒiʒ. santal. rub. ʒiij. corall. ʒii. caryophyll. ʒiij. sem. citri. ocymi, an. ʒiʒ. camphoræ ʒi. conquassatis omnibus. F. Sacculus pyramidalis è syndone rubro isque interbastatus; irroretur sequenti mistura.

℞. Aq. ros. odor. ʒʒ. spirit. ros. ʒi. M. tepide ista irroratus sacculus admoveatur cordis regioni, hisce remediis disigenter cum insisteret,

re&ius habuit convuluitque, *Ioannes Petrus Lotichius. obs. 6. cap. 2. lib. 1.*

Pro Febre Hæctica.

Infanti cuidam trium annorum atrophica & hæctica laboranti, cui brachia & pedes flacciderant, venter vero tumidus erat, sequentia consului. Primò de hoc lacte cancerorum detur infanti mane & vesperi calide cochli. j. vel ii.

℞. Canceror. fluviatil. viv. numero v. bene lotis & mundatis affunde lactis caprini. q. s. contunde parumque coq. Postea per linteum succus expressus edulcoretur sacch. cand. q. s.

Si, tussicula adsit, succus raparum sub cineribus coctarum & expressarum sacch. cand. edulcoratus propinetur. Deinde fiat balneum ex aq. dulci fontana tepida in qua caput, & & pedes agni cocti sunt, in eo ponatur infans per horam dimidiam & amplius si ferre possit, ante ingressum assumat parum lactis caprini rec. & calidi vel lactis cancerini ut supra. Pro divitioribus parari potest balneum e solo lacte caprillo, vel vaccino, vel dimidiis partibus lactis & aq. dulcis. Tertio quoque die renoveatur balneum, & caput & pedes agni tam diu coquantur, donec caro ab ossibus separetur. Post egressum e balneo pectus cum ipina dorsi hoc linimento calide inungatur.

℞. Adip. capon. anser. an. 3j. ol. viol. 3ij. ol. amygd. d. rec. exp. 3ij. s. mucilag. sem. psyll. cum aq. viol. extr. 3ß. cum pauca cera. f. linimentum extra usum balnei etiam mane & vesperi fieri potest hæc inunctio *Io. Petrus Lotichius. obs. 3. cap. 2. lib. 1.*

Habui hæcticum in curatione diu, qui siccat & tabidus, nec balneo, nec lactis potu, aliisque innumeris humidis reicientibus auxiliis unquam potuit restitui, tandem morbi pervicacis pertæsus, ad ranarum usum accessi. Scillaticiam aquam ex illis extractam in balneo Mar. cum syr. violaceo permixtam pro potu quotidiano bibendam obtuli: eas elixas cum oleo, sale, saccharo, & salsamentis in coena & prandio degustabat, interdum illi erat pro frequenti usu jus album, factum ex illarum confusa carne, cum amygdalis, lacte, butyro, farina hordei, saccharo, vitellis ovorum: quæ omnia res, crassa cinnamomo, & rosacea irrorata, ad ignemque percocta, conditum faciunt suavissimum, quod optime nutrit, humectat, impinguat, coquitur facile, citò distribuitur: hoc modo gubernatus hic æger, trium mensium spatio pristinam recuperavit sanitatem Zacutus Lusitanus pbs. 36. lib. 3. prax. admirand.

Pro Febre verminosa cum alvi fluxu.

Puella quadam duodecim annorum febre continua laborabat cum alvi fluxu molestissimo, quo materias excernebat colore cineritio infectas quales apparere solent plerumque in verminosis affectibus: præscripti sunt clysteres detergentes ex rebus dulcibus parati, tum potus vulgares contra lumbricos, & rhabarrum pulveratum bis iteratum; ex omnibus tamen his nullum levamen obtinuit, imò febris & alvi fluxus in deterius vergebant, ut jam de salute puellæ dubitaretur: tandem sequentem julepum ipsi præscripsi.

℞. Rad. acetos. gram. & cichor. an. 3j. sol. endiv. cichor. acetos. portulac. & hyperic. an. Mj. scord. & absynth. pont. an. Mß. d. cordial. p. 4. coq. in aq. hord. ad quartaria v. in colat. distolv. syr. limon. 3ij. spir. vitrioli gr. aliquot ad levem aciditatem. F. julepus pro quatuor dosibus mane & serò sumendis: intra illud biduum quo julepo usa est, febris & alvi fluxus omnino quieverunt, & perfecte curata est. Si quis miretur tam levi remedio sublatum esse hunc affectum, sciat hypericum & scordium mirabili efficacia putredini resistere, & lumbricorum generationem prohibere, nedum genitos enecare: & vere testari possum me huiusmodi julepis in infinitis pene puerulis lumbricis laborantibus cum felicissimo successu usum esse. *Lazarus Riverina. obs. 16. cent. 1.*

Febris Ephemera &c.

Illustris & verè genosus Heros Sigfridus à Kolonitich, Liber Baro in Burgi. hlenitz, Haindorff & idenspoyen, &c. Sac. Cæs. Majest. & laudatiss. mor. Orum inferioris Austriae jam per plures annos Dux equitum ferentiarum gravis armaturæ, quam spartam ubi commissam, quanta fide, dexteritate & prudentia exornavit, quosvis alios potius, quam me, suæ Magnific. domesticum fere, teneam esse malo; cum flagrantissimo Sirio 30. Julii Anno 1596. in lenonem quendam cattrensem vehementius exandisset, haustumque vini meracioris gelida, & quidem glacie (cujus magnam vim ex subter. neis specubus facientium Turcarum Ungari protraxerant) refrigerata superbibisset, motuque violentiore incauisset; in febrem ephemeram, quæ dubio procul, si dextre tractata fuisset, diem unicum non transiisset, incidit. Ex quoquebatur tum æstu, si quo unquam, certe flagrantissimo: Sub cane, coque summe ferventissimo, erant us: sic, ut in ejusmodi, quæ tum quasi epidemice grassabantur, ne in continuas aut casuonicas febres transirent, magnopere inuigilandum esset. Ad primam statim accessionem vocati fuissimus: nisi Medicatui ejusdam procax *receptus* lux Magnificentie ad artem Medicam proclivissimè obstitisset. Erat Medicatui ille Equitatus Austriaco à sacris conjunctionibus: qui cum per transennam aliquando pharmacopolium quoddam inspexisset, miram hinc artis Medicæ peritiam sibi adjudicavit: Sic ut etiam in corpore hoc Heroico periculum sui profectus satis audacter facere præsumperat. Pillularum enim aggregatarum sesquidrachmam quam Chirurgus æque imperitus vel ipse Viennæ conglobavit, sui mo mane stupendi mysterii initar, suæ Magn. obtulit, oblatam in trusit. Vix assumerat, ecce boni nostri Præctici Parochus & Barbitonsor, anhelantes accurrunt: rogant ut Heroi, jam morituro, præsto simus: simulque, quid tentatum sit in illa consternatione coram cunctis proclamant. Tantas enim intempestivas bilis effervescentis commotio torsiones, & viscerum erosiones excitat: ac ad suam Magn. accedentes, vix non animi deliquium, aut graviora symptomata vereremur. Enormiter equidem turgens materia evacuabatur: Sed, cum natura suæ Magn. tenerrime tractanda fuisset; utpote quæ etiam

levissimis pharmacis irritata, cohibenda potius, quam exstimulanda sit, non injuria quamprimum ad abstergentia & lenientia motumque humorem cohibentia decurrebamus. Fiebat hoc per Enemata: quorum primum ex decoctione hordei, alterum ex puris oleis, tertium, propter doloris atrocitatem, ex anodynis collabatur: quibus etiam Christo, medicante, paucis horis dolor omnis ita consopiebatur: ut, cum sub serum crepusculum tria Laudani veri grana in emulsione quant: sem: frigid. major. exhibuissem, sua Magn. per totam noctem placidissime, usque ad septimam diei horam dormierit. Apparentibus autem signis concoctionis in urinis, nec evidente lassitudine remanente, cum tamen sitis clamorosa sua Magn. tam commotione bilis, quam fervore canticulari exagitaret, ad potum frigida non difficulter descendebamus: saluberrimi præsertim fontis viva scaturigine limpidissimas aquas suppeditante. Fons ille tertio a facia, ex cuspide l. tere Orientali castra metati fueramus, lapide, sub tecto, quo Turcæ, fontium admiratores, eundem convellerant, de concaemerata porticu promanans, venulas suas, ex vicinis montibus, qui Austro recta opppositi auro, coque purissimo, dubio procul turgent, nutuabatur. Tam blando enim afflatu non solum intestina, sed ipsum cor, irrorabatur, experientia penitus convictus, salubriores lymphas nunquam me gustasse, nec unquam gustaturum, putem. Cum autem, propter nimiam subtilitatem nullam ebullitionem admitteret, Saccharo candi & cinnamomo confuso, per manicam Hippocratis infusas aquas transcolabamus: quo quidem elareto non modo mirifice delectabatur: Sed etiam fuligines ardentes sic restinguebantur: ut post triduum ad excursionem, quæ Isthmum versus instituebatur, pancreaticæ valeretur. Et si autem in eodem incuriu, hostes provocando, & aliis equestribus commotionibus, Sirio ardente nimium excalfactus, ad decidivam devenire potuisset: tamen, cum assiduum clareti nostri usum continuaret, non modo ad conflictum Kereblinianum usque (circa quem sua Magn. catharro, vigiliis & aëre humidior concitato, paulum inquietabatur) integra sanitate fruebatur: sed medicastros castrenses serio destitutus, per totum quinquennium deinceps me in castris Heroica, fide & benevolentia complectens, contra Centaurorum Thraconumque fremitus & ronchos, Germana magnanimitate, defendebat.

Quanta perditorum hominum, de Medicastris castrensis loquor, per totum hoc decennium, non ad curandos, sed ad enecandos agros, in Ungariam colluvies confluerit, vel hinc æstimari potest: quod etiam ex Medicis sollemniter pronuntiatis, & tam Sac. Caf. Maj. quam Ordinum Imperiis mandato, sanitati castrensi præpositis, ad quadraginta fere fuerint extincti. Inescatrix enim illa Pannonia, voluptatum suarum illecebris, & spelucris, vel ex remotis regionibus, Medicos attraxerat ut de Agyrtis Judæis, Anabaptistis, Chirurgis, desperatis, tonsoribus, prædicatoribus denique castrensis altum sit silentium. Hi enim omnes, illotis manibus ad agros irrumpentes, Pli-

nianum illud, quo solos Medicastros impune in homines gradari alicui, sedulo adimplebant, si quidem, ut sancta fide confirmare ausim, plures hoc decennio per ejusmodi Harpyias, quam ab ipsis hostibus, trucidatos. Et Clerici: fortassis otium, quo, cum rara sit in castris devotio, abunde fruuntur, hic patrocinari possent: Reliqua Medicastrorum castrensis sentina, unde coram hortendo Christi tribunali patrociniunt tantorum scelerum maturata sit, non video. Confluit enim ad Pannonas hos militaris: qui non nisi egregie male tractatus, decerpendus videtur. Nec enim facile quis durissimum hoc vitæ genus subire gelit: nisi prius subductis rationibus se viresque suas, utrum tanto oneri suffecturæ sint, æqua lance perpendit. Felicem autem, & petelicem, dixerō: si in alieno & hostili solo irrobis obrutus Medicum fidum verumque adeptus fuerit: quam quidem felicitatem castris æternam velle, & voluisse, tam serenissimam Domum Austriacam, quam Ordines utriusque Austriæ, absit ut dubitem: cum hi copis suis in Ungariam fidelissime missis, Medicinæ Doctores adjungi curaverint: Illa publico salario, generali sanitati castrensi paterne prudenterque consuluerit. Quam providentiam paternam utinam reliqui Imperii Ordines imitandam potius, quam, vile forsan æris exigui momentum comparaturi, devitandam censuerint, de ipsis Thraciæ visceribus jamdudum triumpharemus. Magnum est, quod assero, majus subjungo: hac, ut molliter dicam, negligentia, plenum victoriæ cursum non modo interclusum, sed veteranis paulatim absumentis, Tyronibus neglectis, triariis vix non prorsus sublati, tanto majores hosti nervos additos esse, quantos nobis præcidimus: ut de suspiriis, quæ, inhonesta morte milite extincto, non possunt non nubes percurrere, nihil dicatur. Eo usque enim temeritas practicoorum castrensis progressa fuerat: ut Anno 1599. etiam vetulæ sagæque & incantatrices ad mactandum descenderent: quarum furias nisi ferro compedibusve coerceri curassemus, vix, ex oppositis ripis Turcis Tartarisque grassantibus legiones, per lemures ejusmodi ad raritatem deductas, eodem Autumno ostentare ausi fuisset. Plus igitur præstiterit: qui Medicum verum, rebusque necessariis instructum, ad Ungaros demiserit: quam si integra legione militum, non ab hoste, sed morbis & negligentia sanitatis publicæ enecanda, sumptibus vix tolerandis, suppetias tulerit. Merito n. & quidem ipsa experientia suffragante, vix quintum locum Turcæ hosti in Ungaria concessero? cum impietas erga Deum, negligentia sanitatis publicæ, privati commodi studium, livor & invidia Turcas multis post se parasangis relinquat. Impietatem erga Deum primo loco pono: quod contra stimulum nos calcitraturos verëor: Si, Damone quovis deteriore sæpe milite, Sathanam Turcicum oppugnare pertexerimus. Et huic quidem malo, pluris præsertim blasphemiarum, quibus castra, proli dolor, circumvallantur, obviam iturus Sereniss. Archidux Maximilianus, Anno 1597. Calend. Aug. sanctissimis edictis, quæ præcipientibus tubis passim in castris divulgabantur, non minus pie, quam fortiter. Christiani lux.

pratoris munia subibat, quæ tamen paulo post, effreni tam superiorum, quam inferiorum rabie antiquabantur. Negligentiam sanitatis publicæ in secundis pono: cum vel hac sola omnes, itiam rectissime dispositas molitiones disturbatas, non sine bile recordor. Absit n. ut his, quibus adhuc constringimur, compedibus in Ungaria nos detineri pateremur: si vel limis oculis ad hanc, in castris apprime desideratam sanitatem respectaremus. Illi n. qui metationibus castrorum præfecti sunt, cum plerumque res sinistre pensitent, persuaderi nunquam possunt, ut in designatione mansionum paulo plus milites, quam iumenta respectent: sic quidem, ut non raro commodis aquationis tantum inservituri, uliginosas & terrimam mephitim exhalantes convalles eligere soleant: quæ humi cubanti, misero gregi, ipso aeris attractu, venenum, pro sanitate, infundunt. Nil jam de subvectione commeatus, deque vini, modo rate, modo axe devehendi, turbidissimis sentinis, quibus miser miles vivere cogitur, dicam: hoc tamen unicuique pensitandum relinquo: quænam sanitas illi futura sit; qui pani, modo mucido, modo, modo fursuraceo, modo ex clibano ferventi, carnes adhuc tremantes supergerere, potum vero, quavis lacuna turbidiorem, superhaurire cogatur. Privati commodi studium tertius hostis erit: quod si uspiam, certe in castris, impunitate summa tyrannidem exercet. Quanta n. ut molliter dicam, imprudentia hæc est: quod nulli fere ex Ducibus, quorum fidei turmæ equestres, & peditum phalanges toto hoc decennio creditæ fuerunt, Medicis una deductis, tam sibi, quam suis, consuluerint: cum tamen honesto satis, non tamen nimis fructuoso quinquaginta florenor. stipendio, cuilibet legionis & cuius mille equitum turmæ, vel decreto Sac. Cæs. Maj. fuerit prospectum. Qui igitur his denariolis privatum commodum adaucturi, Medicis castrensibus subtrahitis, vel eorundem loco pessimis homicidis, uno & altero nummo conductis, Rempnbl. Christianam infanda clade affecerint, videbunt sane suo tempore, utinam brevi, quam se vix homines præstiterint. Livoris & invidiæ furias tanto magis Turcis præponendas scio: quo atrociorē noxam illarum, cum inter nostrates sæpe me spectante grassatæ sint, experiri coactus sum. Nec enim leviter teterrimo livore victoriæ nostræ contra Turcas basis hoc decennio fuit concussa: sic quidem, ut vel hoc solo, dum gravi simultatum & arrogantis veneno præcordia multorum infecta, omnem rei bene gerendæ occasionem sæpius extorserunt, quemvis Turcam superatum statum. Ponam tamen in quinto & ultimo locoremoratum nostræ victoriæ Turcam hostem, hominem (si tamen tale brutum pecus homo dicendum est) re vera nihil minus, quam strenuum militem. Quamvis enim concessero, ante decennium per Europæos Bassas, Temesvvariensem, Budensem & Bissinensem, in his ipsis nostris linitibus florum militum sustentatum fuisse: eundem tamen felicissimo mactatu per hæc duo lustra fortiter relictum scio. Scio & illud: fatali mille annorum periodo ad finem deducta, non prius hos Aquilæ Cæsareæ, Draconisq; Turcici conficiendos: quam

labes priores interneciva hostium clade fuerint absteritæ. In hoc maturando strenuissimum se his duobus lustris præstitit Dominus Kolonitschius, non modo impietatem erga Deum summo studio à commissis sibi turmis arcendo, sed etiam in metatione castrorum, quemvis etiam incursionibus hostilibus obnoxium locum seligendo: dummodo sanitatis castrensis ratio haberetur. Et hanc quidem, quam sedulo tutatus sit, locuples testis esse possum: cum me, vel per quinquennium non modo honestissimo stipendio in castris detinuerit: sed etiam sua manu sæpe ad infirmos, ex suo equitatu decumbentes, plus quam fraterne deduxerit, militis, ex grege vel minimi, sanitatem quovis auro redimendam censens. Paruit certe his omnibus non modo ad suam Magn. promptissimus aditus: sed etiam ex foco sæpe & conpneatu, qui propter tales semper intructissimus nulli occlusus, saluberrima, & in castris corvo candido ratiore pharmaca mutuabantur. Quibus quidem, non dicam artibus, sed debitis communi necessitati & Reip. Christiana officii, suffragante divina clementia, effectum est: ut a suæ Magn. ferentariis equitibus toto quinquennio, exceptis illis, qui pulcerrima morte pro aris & focis occubuerunt, fato morbisque vix sedecim fuerint extincti: cum contra sæpe dimidia pars illorum, qui a Ducibus, impietate, negligentia & sordibus nulli secundis, ad Ungaros deducebantur, turpissima morte, morbisq; inhonestis confecta sit desiderata. Quoties enim, re ad conflictum spectante, vix quingentos ex mille, quo numero conscripti & authorati fuerant, equitibus in aciem produci potuisse recordor: toties hanc illorum vafritiem & avaritiam toto corde detestor. Cum vero ad legiones & cohortes pedestras respecto, vix gehennæ tormenta, tantam improbitatem excoctura vereor: qua miseri milites, summe etiam data opera ab iis, qui parentum loco esse deberent, in castris confici solent. Sed hæc severissimo tantorum delictorum vindici commendans, ad secundam ex observationibus nostris transcendendo: cum non sine horrore recorder: quantos crabrones excitaverim: quoties, generali stipendio publicæ provinciæ Medicæ designatus, ad illorum Centaurorum, Thraconumque rabiem connivere nolui: Sed, conscientie meæ consulturus, pessimis illorum molitionibus, obviam eundo, quidvis molitus sum, gravibus nonnunquam, de publicandis tantis sceleribus, comminationibus interpositis. *Phobias Cœberus Observation. Ungaricor. Decad. 1.*

Febris Gallica, epidemia.

ANNO 1635, ætas erat admodum calida & sicca: quò tempore Regis Galliarum exercitus cum nostro conjunctus Lovaniam obsederat, ubi milites magnam rerum, præcipuè panis & aquæ, inopiam patiebantur, atque hinc spassim horarios fructus immaturos & crudos, carnes recenter mactatas & insulas sine pane, aliosque mali nutrimenti cibos comederunt, simulque ex stagnis quibusvis hiberunt: atque ita magnam crudorum & pravorum succorum copiam sibi ipsis in corpore accumulaverunt. At tandem fame sitique penè consumpti, obsidionem

relinquere, & ob Schenckianum munimentum per iudicium ab Hispano milite capum, in patriam nostram reverti coacti fuere. Huc cum venissent, præter nostros etiam Gallorum pedatus maxima pars Noviomagi (ubi tunc temporis habitare & praxin exercere coepi) aliquamdiu remansit, atque inter illos milites febris quædam maligna & pestilens paucis diebus ante eorum adventum grassari coeperat. Hic læti milites omnium rerum copia fruebantur, meliusque reficiebantur: sed prohi dolor! illa maligna febris intra paucos dies maxima sumpsit incrementa, & totum exercitum, præcipue Gallos, gravi clade multavit; nam præter nostros, intra duos tresve menses hæc diræ lues ad minimum tria millia funerum solis Gallis Noviomagi crudeliter extorsit, nec minori sevitia in castris ante Schenckianum munimentum, & aliis in locis inter nostros & Gallorum milites passim dominabatur: atque ab illis etiam ad cives & incolas Noviomageneses contagio delata, eorum ad minimum mille & plures paucis mensibus terræ devorandos objecit, nec minor etiam strages aliarum circumjacentium urbium civibus illata est, imo usque ad interiora patriæ nostræ penetralia malum hoc subiit. Quia autem febris hæc primo & gravissime Gallos, infecerat, deinde autem reliquos, vulgarter Febris Gallica, à multis etiam Morbus Gallicus appellabatur.

Non parvum huic morbo aderat contagium, quod maxime per contactum & attractionem putridorum ac foetidissimorum vaporum, sudoris, &c. aliis communicabatur; ac proinde qui ægris inserviebant vel diu aderant, eorumque foetores suscipiebant, plurimi eodem malo corripiebantur. Toti autem Noviomago brevi tempore contagium undique ingestum fuit hac imprimis de causa, quod ob tantum exercitum tota civitas militibus plena esset, ita ut ipsæ quoque plateæ & viæ publicæ undique militibus tam sanis, quam ægris ad latera platearum decumbentibus, repletæ forent, atque hinc sordes & excrementa tam ægrorum quam sanorum in vias publicas projecta ubique abundarent, nec quicquam, ob hominum sibi invicem occurrentium nimiam multitudinem, expurgari posset: ex hac enim foetidissima colluvie elevati maligni ac putidissimi vapores totum aërem, atque ita maximam totius civitatis partem contagiō morboque infecerunt.

Febris hujus causa non tam in spirituum, quam humorum maligna corruptione consistebat, atque propterea non admodum improprie pestis in humoribus appellari poterat. A peste autem in eo differebat, quod in peste imprimis spiritus vitales, in hac febre humores maligno modo corrumperebantur; præterea quod pestis contagium aëri imprimis inhæreat & magis ad distans inficiat. hujus verò febris contagium maxime per malignorum vaporum immediatum contactum & attractionem communicaretur: denique, quod pestis longè acutior & periculosior morbus sit, & cum quo plures moriuntur quam evadunt, cum in hac febre longe plures evadant quam moriantur.

Febris hæc nonnullos acriter, plurimos autem leniter in ipso principio invadebat, aliis

sine, aliis cum levi frigore & rigore. Magnus paulo post initium, in multis sublequebatur calor, cum siti vehementi, qui ardor, subinde brevibus intervallis leviter intermittens, ad septimum plerumque diem, vel diutius continuabat. In multis etiam calor intensus non percipiebatur, atque in his cor magis ab humorum malignitate, quam à calore affici videbatur, namque & his vitalis facultas magis læsa erat.

In principio morbi statim magna aderat debilitas seu ingens virium dejectio, nonnullis deliria, plurimis anxietates, multis capitis dolores, vigilæ, omnibus sitis cum maxima linguæ siccitate, multis quoque non diu post initium dysentericæ & diarrhæicæ malignæ, difficillimæ curationis, superveniebant pulsus plerumque valde creber, parvus & inæqualis sentiebatur.

Diebus criticis ægri se semper pejus habebant, paucissimæ tamen crises laudabiles habebant; videbatur natura velle moliri crises, sed propter humorum corruptorum copiam & malignitatem, viriumque summam dejectionem, perficere non posse. Crises per sudorem vel narium & menstruum hæmorrhagiam solæ morbum interdum, sed rarius, solvebant, nam plerumque imperfectæ erant: per alvi fluxum periculosa multisque læthales erant. Nonnullis parvæ maculæ rubræ (Italis lenticulæ, puncticulæ & petechiæ appellatæ) per totum corpus in cute erumpentes, morbum mutabant, interdum in pejus, sed sæpius in melius. Quibusdam qui diu agrotaverant, abscessus critici in aliqua parte salubri fiebant. Anthraces nusquam apparebant. Glandulas quoque in inguinibus, post aures, vel sub axillis nulli intumuisse, nihilque naturam per hæc emunctoria deposuisse vidi.

Ab hac febre curati, multibis terve recidivas satis periculosas ac sæpe læthales facili de causa incurrebant, imprimis si se ipsos vel nimis cito aëri exponerent, vel in diætâ leve aliquod vitium committerent.

In curatione hujus febris primum & maximum subsidium adferebatur sanguinis missione, terquaterve, imo in nonnullis sexies septiesve repetita: vidi etiam Gallos quibus à suis Medicis quatuor dierum spatium sanguis duodecies à brachiis satis magna quantitate detractus fuerat cum summo fructu: maximum enim levamen à venesectione sentiebant ægri, quod brevi tempore adeo notum evasit omnibus, ut plurimi ægri, etiam sine Medicorum consilio, sibi ipsis aliquoties venam secari curarent, atque ita multi à morbo liberarentur. Ita ut præcipuum hujus mali remedium venesectio revere fuerit. Sed quod mirum videri posset, cum à sanguinis missione alioqui debilitentur vires, in hoc tamen morbo natura post extractum majore copia sanguinem, à malignorum humorum gravamine manifeste levare & vires resumere videbatur, omnesque ægri, etiam illi quibus vires ad extremum dejectæ erant, venesectionem fortiter ferebant. Nulli remedio febres istæ magis cedebant quam sanguinis missione. Sanguis duabus vel tribus primis vicibus extractus admodum corruptus erat in omnibus, nec in tanta istius temporis ægrotorum multitudine ullum me vidisse memini, cui sanguis laudabilis extractus

fuit in principio; sed ut plurimum albicans, saepe ex livido virefcens apparebat, cui parum rubori sanguinis admixtum erat: mucilaginosus erat sicut decocti pedum vituli: in plurimis coagulabatur, in multis, etiam vix coagulabatur, ubi nempe putredine magna ex parte consumptis, & hi maxime periclitabantur. Tertia quartave lectione sanguis erat laudabilior.

Accedentes igitur ad ægros, primo statim vel clystere injecto, vel levi medicamine alvo parum citata, venæsectionem instituebamus quam citissime fieri poterat, eamque, si vires primitterent, postmodum repetebamus, extrahentes quaque vice a semi-libra usque ad libram sanguinis, idque deinde adhuc ter quaterve (pro virium robore & febris magnitudine) uno, duobus aut tribus interpolitis, reiterabamus. Interea tamen temporis modo exhibitis medicamentis purgantibus, modo clysteribus subinde alvus citabatur, & quia malignitas morbo aderat, sudorifera & antidota sæpius dabantur. Julebi & condita refrigerantia ac cardiaca, ut & apozemata refrigerantia & diuretica vinhabentia non parum quoque proderant, præcipue si admiscerentur talia, quæ simul etiam malignitati resisterent. In nimis vigiliis (quæ admodum frequentes erant) & deliriis, tantum lenè aliquod soporiferum temporibus illinebamus, narcotica enim per os nunquam tuto exhiberi poterant.

Febres malignæ & pestilentes quomodo sine vera pelle dari possint, & quid ab ea differant, latius docuimus in Tractatu nostro de Peste, lib. 1. cap. 12. annotat. 4. 5. Sunt autem hæc febres variæ, neque semper ab eadem causa procedunt, neque eodem modo invadunt, neque eandem curationem admittunt. Interdum solius aëris infectiones, interdum humorum ex prava dicta aliave causa pessime corruptiones, interdum rerum putridarum & corruptarum nocentissimæ exhalationes, interdum temperamentorum aëris & corporum pravæ dispositiones, vel singula hæc seorsim, vel aliqua ex his conjuncta, vel omnia simul hujusmodi epidemias febres generare valent, à quarum causarum varietate etiam earum, ut & curationes varietas maxime dependet: atque hinc est quod hujusmodi febres malignæ ac pestilentes vix unquam bis sibi plane similes visæ sint. Fracastorius lib. 1. & 3. de morbis contagiosis, describit febrem petechialem, quæ multum differebat ab hac nostra febre, nam ab aëris certa infectione originem sumpserat, & maxime spiritibus, non autem humoribus, bellum indixerat, atque imprimis curabatur antidotis, venæsectiones verò nocebant. Contra, hæc nostra humoribus magis inimica quam spiritibus, venæsectione præcipue sanabatur. Wierus lib. observat. medic. etiam mentionem facit febris malignæ & pestilentis, quæ circa Reheni tractum crudeliter grassabatur; sed illa quoque longe diversa fuit ab hac nostra, quod docuit curatio, nam scribit se comperisse in his venæsectionem admodum periculosam fuisse. Ab hac nostra febre etiam multum differunt illæ quas, Forestus lib. 6. observat. 4. 5. & 6. describit in quibus neque eadem aderant symptomata, neque curatio venæsectionem repetitam admittebat. Lazarus. Riverius, vir doctissimus,

centur. 1. observat. 17. unum adfert exemplum febris malignæ, quæ in multis, cum hac nostra conveniebat, & quinquies iterata venæsectione curata fuit; cui non multum ab similem etiam nos in Gallia quondam vidimus anno 1631. cujus antea mentionem fecimus observat. 3. Verum ut quomodo ægri hac jam dicta maligna febre laborantes optime tractati fuerint, melius innotescat, jam his proximis observationibus unum aut alterum exemplum ex millibus subijciam. *libraud. de Diemerbr. in observat. & Curation. Medicis.*

Febris Maligna.

Hermannus Thomas, pistor, prædicta febre maligna correptus fuit, Septembris, cum ingenti æstu & magna virum dejectione ab ipso morbi principio (nam febris hæc omnibus ægris statim vires potenter dejiciebat) pulsus erat, creber, nec parum inæqualis, sitis quoque maxima, cum linguæ magna ariditate. Totum corpus aequaliter affectum esse videbatur, ac proinde nullum usquam dolorem sentiebat, de sola maxima cordis anxietate querebundus. Prima morbi die circa vespere ipsum invisens, statim clysterem emollientem injici curavi, à quo alvum ter exoneravit. Ad sitim hunc julebum pro potu dedi:

℞. Aquæ cardui benedicti, borraginis, acetosæ, ana lib. 1. succi citri recentis & pomo expressi, syrupi de acetositate citri, violacei, rob. ribesiorum rubr. ana unc. i. olei sulphuris q. s. ad gratum acorem, misce, fiat juleb.

6. Septembris tempore matutino è vena mediana dextri brachii sanguinis libram venæsectione extraximus, cum summo levamine. Sanguis erat valde corruptus, cujus dimidia superior pars ex livido virefcebat & mucilaginosus erat, inferior nigricans vix coagulabatur, serum quoque virefcebat. Postmodum dolorem in gutture sentiebat, qui sine tumore erat, ad quem sedandum gargarisma conveniens præscripti. Etiam mane sumpsit medicamentum leniter purgans, à quo quinquies excrevit. Ad sitim utebatur interdum cervisia tenui, interdum julebo dicto. 8. Septembris, febre in eodem statu permanente, sanguinis unc. x. è sinistro brachio extraximus, qui corruptus erat ut prior. 9. Septembris manè hoc sudoriferum datum est:

℞. Dialcordii Fracastorii drach. i. confectio-nis de hyacintho, extracti cardui bened. salis rutæ, ana scrup. i. aquæ theriacalis, cardui, ana scrup. i. olei vitrioli gutt. ix. misce, fiat haustus. Hinc bene sudavit, sed tamen continua febris (quæ singulis diebus per aliquot horas tantum pauxillum remittebat) debilitas, dolor gutturis, sitis & oris siccitas in eodem statu permanferunt, quibus etiam vigilis ferè continuè aderant. Post prandium hujus apozematis duos haustus bibit, eoque etiam sequenti die usus fuit.

℞. Radic. cichorei, graminis, asparagi, ana unc. i. herlenii, eryngii, petroselinii ana unc. s. herbar. acetosæ, cardui ben. borraginis, centaurii minoris, scordii, scabiosæ, ana m. 1. pomum citri integrum, in taleolas dissectum, sem. 4. frig. major. ana drach. i. s. fruct. t. marindorum, tartari rhenani, ana drach. vi. passu-larum

larum corinth. unc. i. f. coquantur in aquæ communis q. f. ad lib. ii. adde colaturæ syrupi de limonibus unc. iii. misce, sit apozema. 11. Septembris, præmisso enemate emolliente, rursus sanguinis uncias septem è dextro brachio cum euphoria extraximus, à qua venæsectione febris multum minuebatur. 12. Septembris manè ab assumpto priore antidoto rursus copiosè sudavit. Post meridiem apozemate usus fuit. Sequenti die, cum alvus non satis responderet, hunc pulverem dedi, quem cum pauxillo sui julebi mixtum assumebat, atque inde ter alvum exonerabat:

℞. Rhabarbari optimi drach. i. cremoris tartari drach. f. fiat pulvis. Hic pulvis 16. Septembris reiteratus fuit. Intermediis autem diebus ut & sequentibus tribus, utebatur antedicto apozemate, & interdum particulam hujus conditi comedebat:

℞. Pulveris liberantis drach. i. f. diatrium santalorum scrup. ii. confectiois de hyacintho scrup. i. f. cortic. aurantiorum condit. rob. ribesiorum rubr. pulpæ tamarindorum, ana unc. f. Syrupi de limonibus q. f. misce, fiat conditum n. A 12. Septembris febris in dies magis magisque minuebatur, ita ut 19. Sept. æger jam expers febris videretur, neque angeretur, neque sitiret ampliùs, sed cibi appetentior esset. Tunc in victu forte leviori aliquo errore commisso, 21. Septembris recidivam passus est, febrisque magna cum vehementia rediit. Hinc rursus præmisso clystere, statim è sinistro brachio sanguinis semi-libram extraximus, cum tanto levamine, ut hac una venæsectione febris ferè in totum supprimeretur. Postridie manè sumpto antidoto copiosissimè sudavit, atque illò, & sequentibus tribus quatuorve diebus apozemate antedicto cum condito utens, à morbo in totum liberatus fuit. Durante hac curatione, dixta tenui nutrinus fuit, ex jusculis cum acetosa, horragine, pomis citri, hordeo mundato, uvis immaturis, & similibus paratis. Interdum cervisia tenui, interdum tenuissima (quam scherrehier appellant) interdum julebis pro potu utebatur, sæpe intolerabilem sitim fellebat cum pulpæ tamarindorum, vel masticando frustum poni citri saccharo immersum, vel linguz imponendo folium sempervivi majoris detracta exteriori pellicula in aqua maceratum. *Idem Ibidem.*

Febris Maligna.

Gertruda Coets juvenula circiter 24 annorum, eadem maligna febre correpta fuit. 8. Septembris vespere (qui erat morbi die quartus) ad illam vocatus, inveni ægram adeò debilem, ut vix loqui posset, singulis momentis animo linquebatur, ob malignos vapores corobruentes. Pulsus erat omnino parvus, creber, & inæqualis, calor tamen non admodum intensus, cum mate iam morbifica malignitate magis quàm calore infestaret. Statim hoc sudoriferum exhibui.

℞. Lapidis bezoar orient. scrup. f. diascordii Fracast. mithridatii Damoc. confect. de hyacintho, scrup. i. aquæ cardui ben. unc. i. misceantur pro haustu. Quamvis ob debilitatem non diu sudaret, tamen hunc valde levata

fuit. Ad sitim hunc julebum præscripsi.

℞. Aquæ cardui bened. melissæ, acetosæ, scabiosæ, ana lib. f. cinnamomi unc. i. succi citri recenter expressi unc. i. f. syrupi de limonibus, violacei, ana unc. i. f. olei sulphuris q. f. misce, fiat juleb. 6. Septembris manè alvus suppositorio citata est: post duas abinde horas cuncta mediana dextri brachii sanguinis lib. f. extraximus, qui valde corruptus, mucilaginosus, è pallido virefcens erat, cum sero viridi, parum boni sanguinis in fundo continens. Non obstantem magna virium debilitate, fortiter tulit venæsectionem, indeque magnum levamen sentiit. Hujus conditi subinde particulam comedit.

℞. Pulv. liberantis drach. i. salis prunellæ scrup. i. rob. ribesiorum rubr. pulpæ tamarindorum, conservæ rosarum, ana unc. f. confect. de hyacintho drach. i. f. syrupi de limonibus q. f. misce, fiat conditum. Postridie in iisdem continuatum est. Cervisiam tenuem olei vitrioli paucis guttis acore levi donatam pro potu ordinario bibit. 11. Septembris ultimum sudoriferum rursus sumpsit, indeque levamen aliquod sentiit. 12. Sept. febris, anxietas & debilitas rursus augeri videbantur, quapropter è brachio sinistro extraximus unc. vi. qui corruptus erat ut prior. Ab hac venæsectione magnum levamen successit. Libenter apozemata & alia quædam medicamenta præscripsim, sed quia per se delicatula erat, & jam à morbo valde nauseabunda, fere nihil assumere potuit. 13. Septembris rhabarbari pulverisati drach. i. cum cremoris tartari drach. f. cervisiam tenui immiscuimus, atqui ita non sine molestia exhibuimus, unde ter alvum exoneravit. Postridie paulo melius habuit, & antedicto condito usa est, febris valde exilis evasit. 18. Septembris in summam recidit debilitatem. Tunc hanc mixturam in cochleari exhibui, à qua aliquantum levare videbatur:

℞. Lapidis bezoar orient. scrup. f. confect. de hyacintho scrup. i. aquæ cinnamomi drach. i. cardui drach. ii. misceantur. 19. Septembris, iterum à brachio dextro sanguinis unc. v. extractæ sunt: qua venæsectione febris admodum mitigata fuit. Illa & sequenti die continuatum est in usu conditi & julebi. Hoc tempore etiam in consilium advocatus fuit D. Gisbertus Coets, vir doctissimus & Arnheimii Medicus primarius, qui inter cætera tanquam expertum & convenientissimum remedium commendavit suam aquam theriacalem, quam Carbunculi aquam nominabat, & instar magni secreti celabat. Hujus aquæ illius consilio bis terve de die offerebatur ægræ cochleare unum. 21. Septembris, febre rursus ingravescente, hoc antidotum dedi:

℞. Salis absinthii, confectiois de hyacintho, ana scrup. i. lapidis bezoar orient. xii. aquæ carbunculi, cardui, ana unc. f. misceantur. Idem illud 22. & 23. Septemb. manè & vespere reiteratum fuit. Septemb. immisso suppositorio vix semel alvum deiecit. Vespere hoc sumpsit:

℞. Lapidis bezoar orient. gr. xii. margaritarum præparat. scrup. i. aquæ carbunculi unc. f. misceantur, & dentur è cochleari. Sequenti die è massæ pilularum Ruffi gr. xii. duas pilulas deglutivit, à quibus circa vesperam bis deiecit: quæ pilulæ 18. Septembris reiteratæ sunt, ut & 2. Octobris. Intermedio autem tempore continuatum

diem tertium accessio majores vires attulit, atque hoc suo typo quatanam prodidit. Nam hac vice notabantur pleraque febres quatanæ non tam rigore quam calore infectæ. Præmissis ergo universalibus medicamentis, purgantibus & sudoriferis, cum in tertiam hebdomadem durasset, febris, viresque admodum debiles reddidisset, cœpi cogitare depulvere febrifugo ex cortice China China, cuius usus nondum hic admodum celebris erat. Cognoveram tamen olim valde eum conducere huic morbo, eo tempore cum Romæ olim innotescere ejus virtus cœperat, unde etiam aliquot doses mecum domum attuleram quæ tam consumptæ & amicis impensæ erant. Assumpsi igitur incipiente paroxysmo pulveris istius ʒi. infusi aliquot horis ante in vino albo Gallico, quo facto, paroxysmus solitas vires exercuit, licet nitius, sed sequens paroxysmus plane intermisit.

Quare cum non nescius essem præcipuam ejus pulveris noxam esse, in eo quod paroxysmum quidem tollat, sed quin per aliquot dies redeat prohibere non possit, & sæpe tum in duplicem quatanam transeat, in memoriam mihi revocavi antiquum axioma politicum posse quoque in Medicina locum habere, melius esse prævenire quam præveniri? sæpius pulveris hujus eandem dosin repetere volui meunte paroxysmo, ut si qua pulveris virtus esset in expellenda febre, eadem quoque in ea præcavenda valeret. Neque eventus fefellit. Nam cum multis vicibus iterasset hanc medelam, non rediit unquam febris, & Dei gratia liber evasi, neque graviora symptomata perpeffus sum, quam quibus sæpius antehac per intervalla eo anni tempore, meo temperamento maxime infecto, solitus eram, nempe flatibus hypochondriacis, capitis dolore & similibus, quæ solent Scorbutis attritiui: Meo exemplo multi edocti pulveris hujus usum tentarunt, omnes ferè prospero eventu, nisi vel ipsi nimia intemperantia fallerent spem medicamenti, vel non rite usi essent præscriptis. Domestico quoque meo præcepi eandem medicinam, sed quia robustiori corpori majorem suavi dosin, nam drachmarum duarum pondus fuit pulveris. Neque frustraneum erat consilium, nam desinit similiter paroxysmus, quamvis non ipsa febris, quæ quia neglexerat sæpius idem repetere medicamen, sicuti suaseram, rediit aliquo tempore interjecto, duplici paroxysmo infecta, sed ejusdem pulveris usu mox liberatus ab utraque est, & iterum iterum iterumque rediens eodem modo desinit. Adeo ut verissimum esse deprehenderim quicquid laudati autores de hoc pulvere bono publico divulgaverunt neque in hisce terris minorem esse ejus nobilitatem, quam in Meridionalibus. Est sententia Hippocratis, illa quæ reliquuntur in morbis recidivas parere; & recidivas deinde majoris mali periculum asferre, notum est. Non video tamen cur ab hoc pulvere abhorreant multi quia ejus usus semel probatus recidivas præcavere non possit, cum aliquoties iteratus facile id præstet. Id quod convenit omnibus ferè aliis remediis, quæ non nisi sæpius usurpata prosunt. Neque ideo proscribendum ejus usum existimaverim quod paroxysmum absque ulla evacuatione evidenti tollat: primo quia necesse est corpus rite esse

præparatum, deinde, quia oportet ægrum nihil omittere eorum quæ methodus medendi præscribit. Multa quoque medicamina essent rejicienda ex hoc fundamento, quod operentur sine evacuatione vel ratione sentibili. Quæ cum ita sint, amplectimur grata mente Divinum hoc beneficium, & efficacissimum hoc medicamentum, quod præsentaneo remedio tollit paroxysmum & morbum, cæteris partibus; quæ utilitas ratio ab aliis speratur; adeoque auxilium istius quo contra quatanas posset hic commemorari debuit, præsertim in tanta inopia præsentaneorum medicaminum. *Erasmi Bartolini.*

*De curatione Febris magica, seu per
Transplantationem.*

Honestæ matronæ Juvenclæ Anna Palivra, viri, dum viveret, integerrimi, Johannis Rechenbergeri, civis & Mercatoris Thorunensis conjux, Anno 1661. Menie Maio, febre Tertiaria simplici correpta, eaque (varius remediis à nobis s. a. frustra adhibitis) usque in Junium protracta moræ impatiens, suum cuiusdem mulierculæ infans nobis sequenti remedio, usa est: Subsecavit scilicet manuum pedumque ungues (ad modum terne a Johann. Schrodero, in Pharmacopœia Med. Chym. lib. 5. class. 1. cap. 13. propositum) colique in linteolo colligatos caudæ tinea præcis alligare iussit, posteaque halitum ori ipsius ter insufflavimus, atque sic pueri cum additione verborum quorundam a vetula illa Virgine nuncio urbem præterfluente immixtus est. Mirum sane dictu, quod à remedio hoc nullus amplius Paroxysmus febrilis ægram invaserit; sed illa volens vitare Charybden in Scyllam vere incidit misera, in locum enim febris dolor Colicus atrocissimus successit, qui tanto molestior fuit, quod sine intermissione duraverit, & vix selectissimis remediis post multos dies cesserit: ita ut ægra præ illo dolore prorsum in febrem aliquoties sibi optaverit. Cujus quidem curationis rationem hucusque nullam invenire potui. Sed talium ferè curationum, seu transplantationis morborum exempla, demonstrationes & rationes curiosus Lector invenies apud Robertum Flud, alias à Fluctibus, in Philosoph. Moysaica Sect. 2. lib. 3. membr. 1. cap. 3. 4. & 7. Similes etiam curationes reperiuntur in Opusculis Germanicis, Chymico Magico-Medicis Johannis Pharamundi Rhumelii: in Cura Magnética Herniar. cap. 3. Cura Podagrica Magica cap. 6. in Medic. melit. cap. 4. item cap. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 21. vide etiam Phil. Theophr. Paracels. Oper. Germ. Part. 4. p. 227. & alibi. Item Thom. Bartholin. Hist. Anat. & Med. rar. Cent. 3. Obs. 66. & Cent. 6. Hist. 53. Hic mihi in memoriam venit vidua Novo Opidana Thorunensis Benigna Reichia, quæ cum sæpissime, dum viveret, ab lætero deliraretur, ex diuturno usu Medicamentorum eorundem pertata, tandem urinam propriam ipso die, quo emissæ est, acervo superfundendam curavit, & hoc modo, morbum transplantando, ab eo liberata est: quod quidem remedium ei tantum dicis causa proposui, sed illa experientia propria veritatem ejus confirmare voluit

effluens suppuratur. Hinc puris sputum à sanguinis sputo. Junioribus periculosior est propter sanguinis fervorem & acrimoniam, vasorumque tederitudinem: Neque enim ob motum Pulmonis cito consolidantur vasa quocunque modo patentia, & consolidata cito recrudescunt tussi, motu thoracis perpetuo & acrimonia cruoris: Hæ causæ infamem sputationem illam reddunt, & remedia in tempore postulant, ne malum per longas moras invalecat. *Thomas Bartholini.*

Febris ardens spiritu vini curata.

Quædam Virgo Buxtehudanæ in Ducatu Bremenli, ardente febre laborans, petiit vinum adustum accepto eo, largum fecit haustum, inebriata hinc in somnum & copiosum sudorem lapsa, præter omnium spem, pristinae sanitati fuit restituta, *Joh. Ludov. Harnemanni.*

Febris continua lethalis cum variis excretionibus symptomaticis.

Puellus quinquennis Viri pl. Reverendi Johannis Gyzicki ad D. Mariæ Thorunii Concionatoris Polonici filiolus unicus ante sesquiannum febre continui correptus, primum diarrhœa continua, dein vomitibus vexabatur, quibus utrinque subsistentibus, maculae purpureæ hinc inde cum pruritu quodam erumpébant: sed mox iis evanescentibus, sudore copioso reolutivo molestabatur; quo etiam cessante; hæmorrhagiam parium per aliquot dies passus est: tum faucium & gingivarum putredine, cum fetore & ulcere augebatur, ista subsequēbatur ex aure sinistrali ichor quidam ad mortem usque fluens gravis fetoris: tandem urina sanguinolenta: quibus omnibus ultima rerum linea, mors, colophionem imposuit. Causam tam febris continuæ, quam concomitantium symptomatum magnam humorum putredinem non sine ratione accusavimus. *Simonis Schultzii.*

De Febre Pemphygode seu Bullosa.

Minimè recte eos sentire autumat Cous, de ratione victus in acutis, qui morbos in minoribus differentes, uno eodemque nomine nuncupare, nefas esse ducunt. Licetum itaque erit sequentem casum ad febres bullosas referre, quantumvis ampullæ non tantum fauces sed alias etiam corporis partes externas occuparint. Anno 1667. August. Fridericus Klimpel, quinquagenarius & in suburbio nostro degens, vicino suo in tegenda nova domo suppetias fert: in culmine aprem constitutus malignaque quadam aura percussus inopinato dolorem capitis gravissimum cum calore præternaturali conjunctum persentiscit. Sequentē mane accersitus, audio patientem de intensissimo calore capitisque dolore immanissimo, cum interiorum horripilatione quadam querelas agentem. Rebus ergo sic stantibus pro more mihi consueto ad nobiliora bezoartica & alexipharmaca cum præcipitantibus commixta statim confugebam, & pro calore præternaturali & fermento febrili compescendo, Antimonium ad modum Popii, debito modo calcinatum, nec non

cum ocul. cancr, præparatis commixtum, singulis quatuor horis in aqua ulmariz exhibebam; pro levando autem capitis dolore Oleum Sal armoniac. Sulphureum per instrumentum Glauberi destillatum, cumque aqua rosarum atque verberna combinatum, ut vertici guttatim attricareretur, curabam. Circa Solis occasum advolat Uxor ejusdem madidis oculis, faciemque maritimi mirum quantum intumuisse refert. Ego, cum virium naturalium præsentiam acquisivissem, eandem bono animo esse jubeo, & continuationem prædicti pulveris impero, addita insimul potione panchretæ sive Julapii sambuci myrrhato cum spiritus sal. armoniaci sulphureo nonnihil acuat. Augusti die 27. patientem rursus visito, faucesque ejusdem & faciem bullis adeo descadatam deprehendo, ut vix cognoscibilis esset; immo ipse etiam collum, manus, thoracem, tibiasque & alias corporis partes, quæ libero lovi fuerant expositæ, bullis majusculis instar globulorum, quibus pueri ludunt, contectas monstrabat, ut ne hilum genuinæ & naturalis cutis dignoscere possem, Calor vero p. n. nonnihil remiserat, reliquaque Symptomata non adeo urgentia erant, ideoque a prædictis duobus medicaminibus non destiti, & sic intra octiduum hisce solis patientem, Deo benedicente, pristino vigore restitui. *D. Christophori Seligeri.*

De Febre Singultuosa.

Febre singultuosa continua ante plures annos robustum virum, fere septuagenarium, Johannem Krieger, rusticum in Furichke, pago Thorunensi, *Schlesiſchen Ha. 12.* (quoniam e Silesia oriundus erat) appellatum, affectum recorder: cui levis purgatio bis instituta, & postea tam Elix. Propr. Parac. cum essentia absinthii, quam inunctiones externa circa ventriculi regionem cum oleo absinthii & mastichino multum profuerunt, tandem & vinum absinthites; qui postea per aliquot annos vixit, & peste interiit. Vide similes casus apud Hier. Cardanum in libello de Curat. & Prædiction. admirand. n. 21. & Læz. à Fonte Consil. 58. fol. 170. Item apud Greg. Horstium Observ. Medic. sing. lib. 4. prior. lib. 1. Observ. 21. p. m. 40. Præter hos inveniet benevolus lector apud Joh. Petr. Lotichium singularem casum lib. 1. Obs. Med. cap. 7. Obs. 1. de febre Lyria lethali maligna cum singultu. *D. Simonis Schultzii.*

Æstus Febrilis inusitata vi.

Fœmina quædam urbis Aureliensis gravis, febri acuta & inflammatione circa umbilicum subito correpta, opinione citius & citius liberata fuit æstus vero febrilem in fœtum transisse eventus docuit, mortuus enim ex utero extractus, ossa habuit in pulverem rubicundissimum redacta, tanta vis ignis febrilis fuit. *D. Matthie Jacobai.*

Helica in febrem ardentem salutariter terminata.

Studiosus quidam Juris, Dn. Ludovicus Hermannus Roder, Giella-Hallus, Francofurti degens, febri tertiana corripitur, qua, nescio quibus remediis, intempestive sublata, ut sæpe veri

solet, Hæctica succedit cum appetitus prostratione, calore post patium, sudoribus nocturnis & marcore insigni. Consulto est Medico ordinario, varia tunc ex officinis tum domesticis in unum vocantur, sed in varium omnia. Quare desperabundo tere animo Patriam suam Giesfani repetens, mihi altera statim die omne negotium exponebat. Periculosa hæctica mihi minere dico, idque ex febre tertiana male curata. Idem & Francosurti sibi à Medicis dictitatum esse regerebat, deque eo, se pessime habere, sed nulla ne sanitatis spes mihi reliqua? inquit. Omnino respondebam, ast cum periculum in mora, maturo consilio opus esse, cum adhortatione, ut morigerum se præberet, Deoque T. O. M. & medicinz ab ipso de terra creatæ consideret. Præmissis igitur obsequio, digestivi loco præmissi Sal. Armoniac. hoc in casu unanimi celebriorum Practicorum confessione commodissimum, alius quibuldam præcipitantibus junctum, idque ad imitationem Iulv. antichectic. Felicissimæ D. D. Conerdingii, quem à Celebratissimo Viro D. D. Scheffero obtinuit olim Beatissimus D. D. Thackius, Magnus quondam Hassiæ Machaon, ejus cujus M.D. eundem curioso Lectori libentissime imperio, cum omne bonum sit communicativum sui, est autem talis.

℞ Oul. caner. 3j. Salis Armoniaci. Nitri præpar. an. ʒi. Div. in 6. p. 2.

D. una dosi quotidie. Nictum autem studio omisi, cum ob nimiam digestionis primæ depravationem diarrhœa quoque subinde laboraret æger, cui sal facile vomitum addidisse poterat. Remedio hoc per aliquot dies continuato præter omnem expectationem supervenit febris ardens continua, cum intensissimo calore, siti, vigiliis ac delirio, quæ omni pulveri illi mehercè infontissimo ascribentes consanguinei, mihi que paulatim diffidentes Dn. Physi. cum hujus loci Ordinarii accersere jubent, qui præcedentium forte nondum certior redditus, triste prorsus prognosticum tulit, non tantum coram adstantibus, sed & in officina Pharmaceutica à pulsu sine dubio impulsus, qui prioribus morbis, jam nimium quantum debilitatus erat. Ego vero spem neutiquam abjiciendam esse duxi, sperabam enim fore, ut materia mortifica, facta e primis viis in vasa sanguifera metastasi, fermentatione ejusmodi febrili eo citius subijgeretur, atque æger a molesta illa Hæctica forte liberetur; nec decollavit spes primitus concepta: Debellata enim febre illa ardenti, omnia simul hæcticæ symptomata prorsus evanescere, convalescente sensim ægro, qui nunc æthetice vivit. Michael Bernardi Valentini.

Hæctica cura.

Anno 1634. Patavii sub tempore verno, hæctica febre laborans, præmissa tantum potantula laxativa, singulis diebus jejunus mane haustum bonum lactis caprilli recens emuleti, cum paucis saccharo sumi, nec non pro potu ordinario aquam simplicem coctam & succo puro citri expresso permixtam, itemque in alimentum jalecula coponum cum bucella panis similaginei, orizani, & hordeolum seu polentam, & præcipue ranas, limaces ac testudines. repudiata omni carne, in brevi sanitatem pristinam

adeptus sum, citra aliorum medicamentorum usum. Joh. Heurugii.

Hæctica in lactante.

Lanionis M, uxor, quadraginta duos annos nata, cholericæ, lactans, die 17. Octobris, anni 1681. apud me conquesta est, se tota ætate viribus detectis, inde vero à decem hebdomadibus tussim siccam pati, cum siti, citra cordis oppressionem, rursus jam à 14. diebus cibum terrene nullum appetere, passionibus hystericeis crebro affici, denique ab octiduo ardores, rigores, defluxiones, sudores copiosos, capitis dolorem, cordis palpitationem, & maciem extremam sentire: suam infantem ablactaret, utereturque vino medicato, & balsamo, antiphthificis, præterea biberet serum lactis cum conserva rosarum, & subinde acciperet Diaphoreticum Joviale. His vires instauratæ sunt, & ægra convaleuit.

Infantibus fortiter sugentibus, etiamsi & mamma & lac sanum fuerit, matri optimum nutrimentum decedit, & corpus exsiccum redditur, ita ut tandem marcore t. bescat, improprie si biliosa simul adest temperies. Vires ægra nostra paulatim defecere, qui optimum, dulcissimum, & pinguisimum sanguinis ad alendum infantem matri detractum est, juxta annexum d. Exercit. de Bile in Clav. Ded. pag. 105. item de spiritib. pag. 57.

Postmodum tussis sicca invaluit, ob siccitatem pulmonum, & partium vicinarum, arden-tes febres, & alias causas, videlicet optimi nutrimenti ablationem. Hæc tussis species curanda est medicamentis attemperatis, modice refrigerantibus & humectantibus. In primis conducit lac vaccinum & asinum, seu naturæ humanæ familiarissimum. Deinde valde prodest vinum nostrum aut serum lactis medicatum, cum balsamo antiphthifico.

Singularum ingredientia præcipua huic proponere, & examinare lubet.

Hedera terrestris vulneraria est, siccata, aperit, abstergit, & consolidat. asthmatis medetur, & phthisi, item Coryza, & calculo. Odorem habet terreum, gravem, saporem subamarum, acrem, qui multum salivæ provocat, & linguam abstergit.

Hepatica nobilis saporem habet herbidum, & prope fatinaceum, vix perceptibilem, odorem suavem, inftar storacis. Modice refrigerat, & adstringit, sanguinem emundat, hepatis & lienis obstructions refert, hernias curat, & phthisicis cum successu exhibetur.

Mucus pulmonarius saxatilis saporem habet aromaticum, odoriferum, gravem glutinosum, amaricantem, pisces redolet, summum phthysicos remedium est modice refrigerat, siccata, abstergit, hepatis valde prodest, & vesicæ obstructions, item febre hæctica, ictero, scabie, licheni- bus, gonorrhœa, febribus. Extrinsecus vuln-erum hæmorrhagias sanat.

Lingucula Gesneri saporem pinguem, butyrosam, excellentissimam est virum in phthim, & acris humoribus demulcendis, pingues reddit homines, pectus ampliat: è plantæ hujus floribus albis & ceruleis paratur oleum, per infusionem, quod balsamum nostrum antiphthificum constituit.

Tuſſilago ſaporem habet ſubamarum, baſſamicum, coſtinum, aqueum & aliquantum acrem, hinc modice refrigerat, pectori & inflammationibus prodeſt, tuſſim & phthiſin curat; flores ejus menſe Martio collecti & cum paſſulis decocti tuſſim leniunt, alvum laxant, denique fluxiones falſas deſtillantes ad pectus & aſperam arteriam emendunt, atque reſolvunt.

Viola ſuaviter olat Martio collecta, tenues & acres deſtillationes ad pectus perſuadet, in phthiſi ſanguini bonam conſiſtentiā largitur, & nervoſum genus à convulſivis motibus tuetur.

Rofæ rubræ adſtringunt, modice refrigerant, corroborant, hepaticæ ſunt, & ſtomachicæ, Præſervant à phthiſi.

Baſſanum anti-phthiſicum præter pingui- culæ & violarum roſarumque oleum recipit quoque pinguedinem caninam, & oleum hyperici.

Pinguedo hæc reliquis calidior eſt. Internè adhibetur vulneribus & exulcerationibus abſtergendis, ac conſolidandis, item in phthiſi, & ſi cruor à caſu diſſolvendus eſt: ſpinæ doſi inuncta ſpiritus animales ferocientes mirum in modum refrænat.

Oleum violatum uſurpatur fermè in Clyſteribus & inflammationibus. Cæterum ardoreſ internos lenit, ſi eo ipſa doſi ungatur, inordinatos motus ſpirituum animalium tollit, ſomnum conciliat, tabem infantum curat, ſi addatur ei pinguedo canis & caponis.

Oleum roſatum noſtræ compoſitionis, refrigerat, inflammationes tollit, tumores & œdemata penetrando ſolvit. Pænacea eſt aſſectuum externorum, luxationem, & afluxum humorum impedit, acrimoniā mitigat, in phthiſi curanda primas tenet.

Oleum Hyperici, vulnera curat, imprimis ligamentorum & nervorum, ad ambuſta prodeſt, articulis refrigeratis ſuccurrit, colicæ, dyſentericæ, & phthiſi inunctum ſolatio eſt.

At non tantum ſicca tuſſis ægram noſtram vexavit, ſed etiam ſitis humido exhausto à ſiccitate faucium, cui tamen ſero lactis & roſarum rubrarum conſerva ſubventum eſt.

Appetitus proſtratus erat ob bilem in ventriculo collectam, quæ ibi etiam ardorem excitavit, ad quem curandum uſi fuimus decocto herbarum refrigerantium & humectantium, item balneo aquæ dulciſ tepido, emulſionibus, conſerva violarum & roſarum.

Paſſiones hystericæ adſcribendæ ſunt uteri imbecillitati, conſenſui matricis cum mammis. Manifeſtè hic obſervatur à Partu, cum lac ad mammas conſluit, ſtatim atque ſugunt infantes: tormina exorta, quibus radice petroſelini, cum ſemine aniſi vel tœniculi decocta ſuccurritur. Oleum nucum vel horum cheiri in cochleari exhibitum ſimiliter decantatum eſt. Ventri etiam imponuntur ſacculi ex herbis uterinis. Aëgræ noſtræ multum profuit infantem lacte depulſiſſe & uſurpaſſe Diaphoreticum Joviale.

Primū enim ceſſavit uteri vellicatio à ſuſtione mammarum orta; deinde alimentum matri non amplius ſubtractum fuit: quare iſta ſeſe reſicere potuit: & recuperare vigorem priſtinum.

Diaphoreticum autem Joviale, ſeu pulvis an-

tiſepticus Poterii, ad demulcendam acritudinem humorum matricem & nervos irritantium mirum quantum valet. Idem uterum corroborat, ſæpè ex emaciatis quadratos & robuſtos homines efficit.

Calores & horrores ortum duxerunt ex intemperie calida ſanguinis febrem hecticam miſuante.

Deſluxiones ortæ ſunt à debilitato cerebri, acres eæ erant, ob ſaliſedinem & acrimoniā ſanguinis: hinc etiam capitis dolor ingraveſcebat, dum catarrhus tenuis & acris cerebri tunicas affixit; cordis palpitatio iridem humorum, anodini imputanda eſt. Macies in toto corpore adfuit, ob chyli & ſanguinis conſumptionem. *D. Job. De Muraltio.*

De Febre Tertianâ, in ſene in ipſa herba ſuppreſſa.

Cum Illuſtriſſimus & Reverendiſſimus Dn. Matthæus Biſtram, Episcopus Argivenſis, Suſfraganeus Culmenſis, & Parochus Thorunenſis atque p. i. Episcopatus Culmenſis Adminiſtrator, ſeptuagenario paulo minor, anno 1672, 28. Aprilis Thorunium veniſſet, & de dolorè ventriculi, poſt tempus quadrageſimæ, conqueretur, uſus eſt è conſilio meo die 30. Aprilis medicamento laxativo præmiſſa prius digeſſiva potione: à quo ille non ſolum per inferiora, verum etiam per ſuperiora blandè, ſed ſufficienter purgatus, die 1. Maii in febrem incidit, quæ tertia die reverſa eſt: cujus cauſa Reverendiſſimo ad ventriculum roborandum ſequens remedium præſcripſi.

℞. Elix. proprietatis Paracelſi 3 ij. eſſent. abſinth. 3 j. M. de qua mixtura ſingulis matutinis guttæ ii. 13. aut 15. cum juſculo ſumantur. Sed ne paroxyſmus febrilis tertia vice ipſum adoriretur, autor fui, ut hora una aut altera ante paroxyſmum hoc antiſebrili ſæpius experto uteretur.

℞. Tartari alb. ſubtil. pulv. 3 j. ſalis abſinth. lap. prunell. an. gr. 3. nuc. moſch. gr. i. M. F. Pulvis. Quo ſumpto paroxyſmus nunquam rediit. Verum ad obſtructionem alvinam tollendam ſequente enemate Illuſtriſſimus poſtea uſus eſt.

℞. Spec. decoct. emoll. carminat. an. M ij. caric. ping. num. 4. ſem. lini leviter contuſi 3 ij. decoqu. l. a. in qu. aqu. font. colaturæ 3 ix. adde elect. diacathol. 3 vi. ſacch. thom. 3 x. ol. chamæm. malvæ an. 3 vi. ſalis gemmæ 3 β. M. F. Enema. Tandem ad reliquias per ſudorem, (ad quem natura inclinabat) expellendas, pulverem hunc pro duabus vicibus ordinavi.

℞. Pulv. rub. Pann. alt. 3 ij. ſalis cardui ben. lap. prunell. an. gr. 6. M. Et ſic benedicente ſummo Archiatro, Illuſtriſſ. Dn. Episcopus in tam provecta ætate è febre liber factus, huc uſque ſanus atque vegetus vivit. *D. Simonis Scaulzji.*

De Febre tertiana in ſene poſt primam & ſecundam recidivam proſtigata, poſt tertiam vero lethali.

Prudenter ſanè Hollerius commentario ſuper Aphor. ii. Hippoc. ſect. 2. hæc verba amotavit: Poſt criſin, hoc eſt, excretionem criticam, relicta materia, tum diſpoſitio morboſa recidivas facere conſueverunt: niſi antevertanus purgatus

in ventriculo fermentatione & concoctione, sequetur, per venas lacteas a selli sanguini communicatur, & vel in ipsa sanguinis massa, vel etiam per circulationem ad alias partes detrusum, & sui juris factum, iterum se excipit, suaeque pro natura vermem iterum generat, qui varia vel in aliis partibus, quo pervenit, symptomata & affectus producere aptus natus est. An vero omnes febres à vermibus excitentur? Et an in nostro hoc casu febris à verme isto ad scapulas detruso originem duxerit? Sive an propter evacuationem copiosi sudoris illa cessaverit, & semen istius vermis ipse minimus adhuc, cum materia sudoris per accidens ad praedictum locum pervenerit, ibique hærens à copiosis humiditatibus separatus ob nutrimentum assumptum grandior factus, cutem eroderit? Iudicium meum suspendam aliisque eruditis judicandum relinquam. *Caspari Theophrasti Buerlini.*

Febris Tertiaria, cura neglecta, invexit symptomata.

Vir quadragenarius, habitus corporis strigiosioris, laboribus duris assuetus, autumno anni 1679. Febre tertiaria, hic tum endemia, qua diu fuerat infestatus, hoc medicamentis tamen liberatus, appetitum accusabat proflatum, obstructions alvi diuturnas, continuos ructus; nauseam, & propensionem ad vomitum, sudorem copiosissimum foetidissimum, præterea in abdomine per vices dolorem sensit rodentem & maxime mordacem, qui quoties repebat toties simul stuporem brachii sinistri induxit urinæ, cum emittebantur erant profunda rubebine tinctæ, mox turbidæ, crassæ, cum sedimento copioso, limoso; Coniciens ergo ex symptomatum relatione, materiam febrilem in corpore detentatam has dare turbas, & cruditates stomachi, hinc naturæ subvenire pulvere emetico purgante constitui. Nil hic per interiora evacuabat, solus vomitus ter secutus duos in lucem protulit vermes, alterum longitudine manus integræ, dimidiæ alterum. Propinatis hinc anthelminticis, infusioneque clysterum è lacte repetita, & purganti quodam alvo referata nihil amplius in putredinosa colluvie verminosum apparuit, æger autem perfecte convaleuit.

Fœmina rustica consistentis ætatis, prægnans, eodem tempore febre eadem epidemia corripiebatur, suæque aliorum, ne fœtus scilicet noceret, usum medicamentorum negligebat, omni naturæ, & proprii corporis robori committens, unde post in tumores pedum œdematosos incidit. Tribus ante partus legitimi terminum septimanis, cum maxime torqueretur circa præcordia, obstetricem quandam consulit urbanam, quæ ipsi pulverem polychrestum nostratæ ex præcipitantibus, bezoardicis, & diaphoreticis mixtum propinavit. Hinc post excitata per dimidiam horam symptomata velut asthmatica fœtum emittitur mortuum, cum profusione, loco lochiorum, aquositate copiosissimæ, non tamen omnis, abdomen enim ita tum exinde majori aliquo tumore aquoso intercute obfidebatur, qualis à combustionem oriri solet, minoribus hinc inde illum cingentibus tu-

moribus serolis, quasi insulis, quorum pars, ueri & pedes tumidi, sponte sua eron lympham effuderunt acrem. Sudore aliquoties ulu myrrhatorum cum sal. volat. mixtorum concitato hæc symptomata omnia evanuerunt. *Joh. burgi.*

De singulari tertiæ remedio.

Cum præterito Mense Martio anni hujus 1671. Tertiaria intellaret Patrem Cantorem familiæ S. Dominici, virum obelum, qui dictæ reges tempore illo quadragesimali non ita stricte observaret, curæ illius me præfecit Adm. Rev. Pater Prior. Accessi, atque ubi cum immo calore acitit conflictari deprehendi, pro illius levamine julepum convenientem præscripsi, atque ut post tridie pharmaco eacochymiam extulber suavi. Qua intentione cum postera die mane adesset, ille se medicamentum propter certissima quædam negotia assumere tum non posse retulit, atque ulum ejus post sequentem demum paroxysmum distulit. Interea vero dum istum instantem nocte futurum coram Monasterii mercenario quodam conqueretur, hic paroxysmum omnino non rediturum sancte assueverat, modo æger cubitum iturus singulis digitorum utriusque pedis interstitiis lardi muratici frustulum, digitorum longitudinem & latitudinem æquans, imposeret, & pedes linteo, ne lardum excidere possit, obvolveret, atque sic ad somnum se componeret. Monachus sanitatis avidus monita ista quam diligentissime persequitur & quidem non sine insigni emolumento. Morbus namque ita omnino est subatus, ut ab eo tempore nec ullos febriles insultus, nec horum reliquias vel minimas senserit, jamque dum ista scribo, salvus vivat ac incolumis. Quæstio hic oritur physica, qua ratione medicamentum hoc a febre liberaverit ægrum. Ego quidem, nisi id tribuatur nimis ægri confidentiæ, certum salutem ex applicatione hujus remedii sibi pollicentis, non tam lardo, quam sali, vi penetrandi putredinique potenter resistendi prædito, hunc effectum ad scriberem, sed ista jam oculatoribus expedienda committo.

Hætenus supra allegata, 26. April. præscripta Littera: At consequentia curam adeo præsentiam, ex alia ejusdem Excell. Medici Epistola die 28. Junii exarata, verbis mox subjiciendis B. Lectori huud invidendum est.

Pater Cantor Ordinis S. Dominici, visus quidem est ab eo tempore sanus esse atque ab omni morbo immunis, At die 10. Junii hujus anni 1672. circa meridiem, eum è civitate in Cenobium redeuntem de repente invasit Hemiplegia sinistri lateris. Et licet maximam adhibuerim curam, minime tamen prohibere potui, quo minus septimo post die, elusa omni opere, ad plures abierit. Utrum Empiricæ illi curæ adscribendus sit repentinus hic casus, non ausim absolute affirmare &c. *D. Georgii Vegeri.*

De singulari Tertiaria remedio supra memorato.

De cura illa Tertiariæ beneficio Lardi muratici aliud referam exemplum. Alitarii nostratis uxor, annum agens quadragesimum quintum, ex inordinata dicta corripitur sub finem mensis

Maii anni huius 1671. Febre tertiana. Varia post venesectionem adhibet medicamenta empirica, sed cuncta irrito successu. Accidit vero ut ille Pater Cantor Dominicani, cuius mentionem feceram in nuperi observatione (vid. obs. 200.) die 2 Junii autam empturus illius intraverit ades. Is e. ultu eam agrotare, coniciens, atque quod tertiana laboret percipiens, ut ad exemplum suum lardum muriaticum pedum digitis applicet, facile persuasit. Sed tantum abest, ut levis remiserit. ut potius majori violentia invaserit agram. Unde die quarto Junii maritus me accessit, atque ut uxori opem ferrem seculo rogavit, simul tamen quid antea actum sit retulit. Proposui pharmacum, à quo aliquoties atque cum *diaphorico* deiecit; unde optima spe fieti, valetudinem brevi pollicebamur. Sed ecce nil adversi nobis cogitantibus, quæ hactenus simplex erat, in duplicem, mox mutata tertiana adeo acerbè imposterum affligit agram, ut non obstante diligenti medicamento-rum usu omni in deterius ruerent, ipsamque mortem in propinquo esse indicarent. Mirabar hanc inopinatam mutationem, atque maritum me inter succum gammato vivo expressum in vino thenano uxori propinasse suspicabar. Hoc namque remedium sibi à Nobili commendatum fuisse, ante dictam mutationem retulerat ille, cuius tamen nuntium dissuavi. Maritus tandem in angustis versans, se non quidem succum illum uxori propinasse, lardum vero muriaticum pedibus ad Monachi persussionem applicasse fatetur. Ego his cognitis, relicta febre ad acrioris salis in agra redundantis ferociam coercendam me accinxi, nec sine successu, postquam enim salis C. C. volat. 3 8. cum salis Card. bened. gr. 6. & salis Absinth. gr. 5. prima vice, idque hora una ante paroxysmum exhibui, ille non tantum ad bihorium tardius sed & multo mitius invasit agram. Unde hinc medicamento insistentes, atque ubi illud propter ingratum suum saporem nauseam excitare cepit, cum paulillo medullæ panis in pilulas ad transformantes, agram benedicente Deo ab orci faucibus feliciter reduximus. *Ex eodem.*

De curatione Tertiana per lagenas.

Illustris apud nos scemina, ab annis aliquot phrenetica, & jam ante meum ex Italia reditum, à peritissimis Medicis, post varia incassum tentata, relicta prognostico, corripitur superiori anno tertiana exquisita, advocor, præscribo, quæ in rem videntur, rogo assumat. Illa pertinaciter reluctari; nihil pharmacorum admittere, oblatum etiam cum fremitu respuere cepit. Interea gratulatur malum, & octavo jam paroxysmo invalescit, singulis accessibus ferocius. Assisto paulum ante paroxysmum novum; & cum ore refutaret ingesta omnia, jubeo lagenas aqua calente ferventibus Agram hinc inde circumdari, ut vel invicta ad sudorem componatur. Illa contra emoveri lagenas jubet, & nisi tollerentur, ad conviciase præparare. Nil ego clamore, nil indignatione Agra commotus, jubeo ancillas peragere mandata, & vel invitam cogere ad sudandum, memor illius Hippocratis Epidem. 2. Curandum, ut in pallefcientibus Excandescencia oratur. Quod si (inquiebam mihi)

excandescencia sive *diaphoria* occurranda, ut sanguis diffundatur per habitum corporis, & pullorem exturbet; exturbabit etiam fortassis febrem, solvetque intestinas obstructions, mali præsentis fomenta. Nec fessellit augurium, cessavit febris & veltigio, & illa licet magnopere ferociente, quievit, nec unquam postea reversa est. *D. Olai Borichni.*

De Febre tertiana adniranda, aqua frigida, curatione.

Balthasar Helvich, Civis Posnaniensis, reliquorum civium ora cachinnus medentum Observationes admiratione replevit, & certè febris ludibrium in scenam produxit. Hic tertiana intermittente laborans, post frigus sensit calorem præternaturalem ad usque delirium. Omnium aditantium amica seponens monita, suis demandavit, ut se ad transluentem ibidem fluvium deferant, in quem usque ad collum se demisit, & eo usque in aqua ista se continuavit, donec omnis calor præternaturalis desierit. Sæpius iteravit & pristina sanitati restitutus est. Tota Civitas Posnaniensis moderni istius f. eti scientia abundat, sed non cuivis licet adire Corinthum. *D. Andrea Cassili.*

Cur Tertiana hoc anno frequentissime in Quartanas excant.

Vix integro seculo tot in his Provinciis numeratæ sunt quartanæ, quot unico hoc autumno pulularunt. Nec initio viæ sunt quartanæ, sed tertianæ vagæ, quæ sentim in duplices, immo triplices quartanas degeneraverunt, nisi manus Medici initio admoveretur. Nec difficulter parvere pharmacis, sed sibi relicta, vel negligentius habitæ ferociter insultarunt. Parcius tamen incubuere Urbi nostræ, quam agris, insulisque, ob dicta, ut opinor, vitæ cives: enim quod familiarem tum dysenteriam malignam formidarent, abstinere a fructibus horarii, leguminibus, aliis, quæ vicinis suis morbum invexisse audiebant. cæterum agrestes, & minorum oppidorum incolæ, nullo metu, oblati pascebantur. Hinc integræ familiæ toti propemodum pagi, immo quandoque tertiana pars oppidanorum, quasi fulmine icta lectis affixa est. Nec omnium tamen febres in quartanas abiire, sed eorum, qui neglexere curam omnem corporum, similes Virgiliano illi Georg. 111.

--- alitur vitium, vivitque regendo,

Dum medicas adhibere manus ad vulnera pastor Abnegat & meliora Deos sedet omnia poscens, vel eandem initio perversam instituerunt. Causam autem, cur ad tam frequenter ventum quartanas, hanc puto: extremum ætatis prætermorem modumque apud nos calorem, unde intestinus corporum calor ab externo evocatus est foras, quo facto reliqui humores tanquam in vappam subacidam desciverunt, promptam quartanæ genitricem. Explicatius loquar: videntur humores corporum id possi, quod cerevisia in cellis, tonante celo, aescit, paulo post, muret, corrumpitur; quod vividiores ejus partes fulmineum illud sulphur, omni

omnia pervadens secum in aera transtulerit, aut, si mavis, confuderit & in aliud schemaperverterit. *D. Olai Borrichii.*

De prole tertianaria pallidissima.

Cum alia de causa secundam Germ. nicarum Ephemeridum partem evolveremus, fortuito incidimus in illos Batavae puellae peste infecte amores: subitque cum memoriae similis fere, sed desponsata, nec infamæ fortis, tertianariæ superioribus annis curatio. Consummationem matrimonii, post annu pene sponsalia, sponsus æque ac illa, in omnem quoque eventum expectabant; & tradebatur tandem hæc, invitis tere ob morbum parentibus. Inter primos statim dies, & forte prima (utpote intercalari) nocte ingravida evanescere quasi sua sponte febris; peperitque puellam elegantis formæ, nunc (in breve vivere desierit,) viripotentem, adeo tamen per totam ætatem, etiam inter corporis antiquique motus pallentem, ut febris idem videri potuisset: sponso decetero sua impunctum peragente: cum tamen sæpius & hoc ipso anno observavi us tertianas, non doctus tantum, sed integros quoque pagos pervigantes. Præm. adorientium causa hic addimus, frequentissime notatum; quod scilicet in remittentium, aut per recidivas quotidianæ variationes protractiorum declinatione, cum remissus aut fere nullum frigus est, calore licet aliquandiu persistente, consuetius cum sit ab antifebrilibus, præsertim salis aut insipidis, (dum amaricantia aliud insuper eo tempore, macilentis tamen non æque semper in stomacho agere poterunt,) abstinuit, quam sub negotiosiori (pro peremptoria mortificatione) talium continuatione, miseria animam senem agens agitalle, vel ad novam conquendam alimoniam pepulisse. Ut hi quoque non inconvenienter quandoque dicatur: *Ignem ne gladio ne fudis.* *D. Danielis Ludovici.*

Quartana superventu pleuritidis curata.

Nobilis quidam aliquot mensium quartana, propter dixit viri officium, cum ipso die paroxysmi, sed horis aliquot ante ejusdem accessionem pertinacius saltasset, eoque, sudore manans, liberali cerevisiæ frigida hantlu abstersisset sitim, pleuritide corripitur adeo effreni, ut de vita ejus dubii amici me accerferent; qui expiato venæsectionibus atque expectorantibus humore impetuoso, notavi illa via ita profligatam quartanam, ut nullo amplius paroxysmo molesta fuerit, lætissimo agro, qui ex eo rarum quartanæ remedium invenisse se gloriabatur, ignotus quod uni fuit salutare, id alius sæpe notum deprehendi. *D. Olai Borrichii.*

De Quartana continuata.

Mulier supra annum quartana vexata nullo remedium genere tam molestæ febris curam tentaverat; sed illa nihil tot medicamentorum etiam vehementium, impetum morata pertinaciter hærebat. Placuit semel intentatum sequi consilium, & vomitorii experiri vires. Vo-

catus Medicus, qui durissime suos tractare consueverat, & ex eticis naceret: qui, cum gutturi gotte ad gr. 16. in confecta i. i. r. an præbere quotidie solebat, idem hoc in i. i. cula, sed tenera jam, multoque paroxysmis debilitata, explorandum ratus, dosim, qua antea robustissimum quendam ex vulgo iuvæne pulchrum ducebat, quatuor ante paroxysmum horis exhibuit. Quid hæc, ad vomitum & alvum sollicitata, adeo sæpe fellas petere, sæpe ore rejicere coacta est, ut jam ante illud paroxysmi tempus vicies alvum exonerasset, viribusque confecta nec manus, nec pedes movere, ad extremum nec vocem mittere posset. In illo tamen corporis humorumque, & medicaminis turbulento motu sua exacte hora subrexit cum frigore paroxysmus, laboranti suprema minas, cum pulsu exilissimo, & tantum non insensum. At neque sic cessabant vomitus & fellæ, verum, ut febris cedere vomitorio nolebat, ita nec vomitorium febrim servare fidem voluit, sed jam pari vehementia utraque pugnabant in unum, quod videbatur, la orantis interitum contendentia. Vici tandem natura, seque velut sequeltriam litigantibus, hinc febris, inde vomitorio, adjecit, donec post quadraginta fellas, multaque animi deliquia spirituosiss. emplastroque stomachali adjuncta, novum solarii ægra persentiret, pleniusque ex illo paroxysmo convalesceret: cum autem tam impetuosa, frequentique cacoehyæ purgatione actum de febre exstinguaret, inconsultum hospitium destinatis diebus recepit, tandem convalescens, dum sponte & sine medicaminum usu sola venis temperie post binos menses miseram jam plus s. tis desereret. Quo discant velim isti severioris Medicinæ advocati, etsi vehementium impetu teiciter sæpe febres abiguntur, in plurimis tamen etiam fraudi esse, molliculamque & lentam curationem duræ atque præcipiti anteponendam. *D. Joh. Nicolai Pechlin.*

De Quartana inversa.

Notum est illud Favorini apud Gallium, lib. 17. Noct. Att. c. 12. p. m. 428. Quartanæ elogium, quod bihuo medio intervallata febris fortunata & laudanda sit, in qua sit *sin paroxysm, duo paroxysmi*, una novæ, duæ matres, ut vero in reliquis febribus varæ inordinationes occurrunt, non tam vulgaræ illæ duplicationes, quam alia minus adhuc in scriptis obvia, uti tertianam sine rigore, & similia suo loco notabimus, ita quoque quoad paroxysmos quartanæ ipsos, seu typum, id videre contigit ita pridem. Viri Clarissimi novem annorum, præterito autumno in Hungariæ febriles insultus experta est tales, ut duobus ex ordine diebus paroxysmus redierit, tertio intermiserit, idque constanter hæcenus post meridiano tempore accidit, quo, præeunte frigore, calore hinc, aliisque consuetis febrium intermittentium symptomatis correpta fuit. Si itaque intermittentes febres à recursus tempore potius quam quietis denominantur, & hæc ad quartanam, sed inversam illam, referenda est. Profuit inter alia tinctura martialis ex arcano tartari liquido, mentis aquæ soluto & filtrato, cum paucis guttulis liquoris martialis ex cap. mort. flor. salis ammoniac. martiali in momento tincto, & pulvis ex antim. diaphoretici, arcan. duplic. & conch

mo, ceu generosiori abstineat, contentus dilu-
tiori illo, quod secundum vocant Artis filii, do-
nec aperta, fatigataque ex Mercurialibus hbra
corporis collegerint se in robur antiquum. Quo
facto, ex intervallo utatur pilulis de sagapeno,
aculeatis grano uno aut altero trochilorum
Alhandal; tribus autem proximis ante solli-
tium hybernium (quod jam imminet) paroxys-
mis componat se ad sudores, assumpto gentiana
extracto, vel sale aliquo volatili, vel denique
cortice gannanaperide: cuius usum etiam in
tertianis laudant hodie Britanni; nostri inter
initia febrium parcius usurpant, salibus lixivis
in hoc malo plerumque contenti, ut quæ longo
usu experti sunt salutaria, quamdiu malum
quondam septies admonuit. Non inviti ta-
men post septem paroxysmos ad gannanaperi-
dem descenderem, nisi a corticum traxini simi-
litudine fucus sæpe in Peruvianum hunc corti-
cem emanaret. Aiunt quidem fraudem depre-
hendi frangendo, gannanaperidem in fractura
nullas relinquere fibras, traxini corticem re-
linquere, verum si cortex fraxini vetustior est,
fortassis etiam fibras perdiderit. Optimum ha-
ctenus ab eventu indicium: dosis enim fraxinei
corticis non suspendit paroxysmum, Peruviani
suspendit, sed, nisi purgatissimo ægro, metuen-
da recidiva. Verum ad ægrum nostrum: cum de
eventu consilii nihil hactenus possit constare,
illud tantum hic monere libuit ex allato hoc
exemplo satis elucere; quam improbum, & præ-
ne invictum sit in veris quartanis acidum (nam
spuriæ nonnunquam facile percurruntur) ut
quod post annum insultum, exclusa tanta pi-
tuita morboz copia, Mercurio detrectavit pa-
rere. *D. Olai Borichii.*

Febris ex imaginatione.

In febribus quantum valeat imaginatio, vul-
gò notum. Exemplo nupero illustrabo. Mulier
quædam Hafuensis, cum diu febris quartana
ædio laborasset, consilium ingeniosum cepit,
transfere febrim in saxum quoddam, quod
medio inter Hafuiam & Congium itinere emi-
net. Igitur scriptis literis officiosis, incluso vin-
culo coccineo, favoris indicio, mittit homi-
nem, qui salute præmissa officiose rogaret, ut
febrim ad se reciperet. Servus mandata exse-
quitur, vinculoque elegantisaxum exornat, &
prælectis literis discedit. Hinc illa melius ha-
bere cepit, à febre immunis. Alia ancilla No-
bilis Matronæ febricitantis cum vel joco vel se-
rio officio offerret Domina dubbus solidis se re-
dempturam febrim, statim febricitate occæ-
pit, salva Domina.

Parili frequentique satis superstitione mulier-
culæ nostræ infantes suæ curæ commissos in-
struere solent, ut ab aliis variolis infectis pro
aliquot obolis variolas certo numero emant,
exillimantes illos, certa imaginatione illos,
qui emerunt hæc ingratas merces, & pro-
ventu pauciore infestari, & citius & tutius li-
berari.

Quantum imaginatio valeat ad curandos
morbos testatur historia Portæ, qui Neapoli
solicatus ut remedium parturienti præscribe-
ret, pulverem & quiskulias formulæ (in qua
Aq. capillor. Vener. scripserat) involvit, ne à

vento deportaretur, quas ubi ægra assumpsit
forti imaginatione & opinione feliciter filium
enixa est. *J. Jo. Haber in Not. ad Hist. Mexic. f.*
497. Observav. inquit Reiner. Solenander sect. 5.
conf. 15. p. 17. quosdam chartulas in quibus me-
dicamentorum formulæ (receptæ dictæ) conf-
criptæ erant, comedisse, & sanitati restitutos
esse, tantum potest apud plerosque concepta
in re aliqua opinio vel fiducia. Thom. Bartholini.

De triplici quartana & sextuplici.

Uxor cerevisiarii in foro veteri conquesta
mihi est anno præterito, singulis diebus, calore
se corripit sine frigore, semper jam à longo tem-
pore recurrente sine sudore. Hypochondriaca
vero est. Credidi eam triplici quartana labora-
re. Hinc variis ex methodo præmissis, tandem
chalybeato vino convalescere visa, mihi vale-
dixit. De triplici quartana quædam olim ad-
duximus *Centur. 1. histor. 95.* Hoc anno non
absimiles febres mihi hæstina grassari, obser-
vata.

Sextuplicis quartanae historiam & curatio-
nem olim à summi nominis Medico Patavino
Hieronymo Capivaccio conscriptam servo,
quam apud me diutius latitare nolo. Foran ex
usu erit: est verò hæc.

Cum Perillultris Comitæ affectiones diligen-
ter consideremus; in hanc tandem sententiam
ivimus, cum sex quartanis correptum. Quod
etsi dictu forsitan mirabile & inauditum videatur,
tamen qui volet singula sedula meditatione per-
sequi, ita rem sese habere conperiet. Affectu
enim melancholico, & præsertim hypochon-
driaco virum nobilissimum laborare certum est.
Vitium est status, namque percipit in hypo-
chondriis rugitus, tormina, & in ventris re-
gione frigiditatem, capitis etiam dolore præ-
nitur, quem ex vapore superiores partes pe-
tente provenire in confesso est, cum statibus
cessantibus eum etiam cessare fateatur. Sed
quod maiorem fidem facit, est totius partis si-
nistræ corporis frigus, quod in sinistro etiam pe-
de percipit. Accedit præterea eum ex curis &
vitz solitudine habitum contraxisse melan-
cholicum, ut ex his omnibus facile sit colligere
eum affectu melancholico esse correptum. Cum
vero febris bis in die invadat, mane & vespere,
nullo rigore aut sudore, quidnam aliud asseren-
dum, quam quartana ideam obtinere? Eam au-
tem sextuplicem esse; cum accessiones febriles
in die bis invadentes, quarta quaque die sibi
mutuo respondeant?

Hæc igitur febris ex melancholico humore
ortum ducit, cuius est multiplex vitium, co-
piosior enim est quam par sit, crassior, visci-
dior in liene impactus, quorum culpa factum
est, ut viscus hoc humore obstruatur, copiosus
enim à jecore generante transmittitur, nec
commode à liene expurgatur ob facultatis ex-
pultricis imbecillitatem. Hinc etiam fit, ut
cum totus à splene suscipi nequeat, in totius
partis sinistræ frigidioris quam par sit venas
transfundatur, & multiplices sibi an sex quarta-
narum exortum focos comparet. Somnus verò
ipsi facile conciliatur, quia rationi est consonum
melancholico humori pituitam esse permixtum
ut ex spuitionibus frequentibus intelligitur.

Absq.

erofioris, tertiana, prout sub initium putavi, simplici jam per octiduum laborantem inveni. Non in principio febris fortioribus deiectione agram, saltem dedi lapid. cancr. corall. p. p. nitr. antimon. cum tantillo opii, ut & potionem purgantem die intermissionis: nec venafectio, neque vomitus indicabantur. Cum autem peroxylmas tam v. gos animadvertentem, ut hodie hora prima pomeridiana, perendie hora septima vespertina redirent, nec tamen hoc temporis intervallo postponere continuarent, sed is, qui triduo post, iterum hora prima pomeridiana reverteret, cepi illos paulo exarctius examinare, invenique rigorem illius paroxysmi, qui hodie affligit circa meridiem, vix quadrantem horæ durare, caloris vero moram notavi diuturniorem, tanque vehementem, ut igni se injectam putaret agram; istius e contra, qui perendie circa vespertinam redit, schema inimici frigoris turbine, sed lumina caloris clementia stiparum vidit. Quoniam igitur quinto quoque die paroxysmorum facies & tempore & modo invadendi æqualis erat, quintana duplici agram meam laborare suspicabar. Obvia est sylvii non inepta de febribus intermittentibus, illarumque variis speciebus hypothesis, cui hæc, quæ hinc inde demum in observationum nota apprimere faceret. Verum ad nostram ægotam, cui ante sextum, qui contingebat vespere, paroxysmum propinavi domi de Panacea Dn. Crani, sed septimus circa meridiem insecutus nihil omnino remisit. Quatuordecim ita passa est paroxysmos, frustra semper propinatis febrifugis, aliisque medicamentis, hinc tenuit horum usum. Quid sit? Decimus septimus sua sponte emanit, quanquam decimum octavum non leviter iterum senierit, sed postea evanuit, quicquid artus servabat frigidus corpusque febrile. Horret adhuc medicamenta, quibus, nisi recrementa, passim latrantia evacuabit, recidivam metuo. *D. Henrici Christophori Ebelii.*

Febris erratica Magisterii Martii aperitivi Mynsichti usu curata.

Vir quidam primarius longo tempore febre erratica oppressus, multis tentatis, quæ humores crassos, & tartareos expurgant, viscera aperiunt, deobstruunt, nihil est levatus, & accedente œdemate pedum, hydropis rudimento, solum Magisterii Martii aperitivi Mynsichti usu, à febre & tumore ipsum liberavi. *D. Matthia Tilingii.*

De Febri octava die recurrente.

Abstrusa febrium natura ipsa paroxysmorum varietate mirabilis plurima hucusque exercuit ingenia; quæ tamen latentem ejus indolem plene detegere nondum potuerunt. In earundem quoque numerum præfens paroxysmorum distantia notabilis merito recensenda videtur. Spectabilis quidam Scabinus veteris civitatis A. B. quinquagenario major, ad hecticam valde proclivis, die quadam Saturni Anni 1671, ad finem tendentis, post cenam sumptam cubitum iturus percepit in lecto rigorem febrem cum maximis dorsi doloribus, subsequente mox calore totius corporis urente, sicut agenti, anxietate cordis, & continuo urina in magna

quantitate emittentis tumulo: quæ omnia circa matutinum tempus post copiosum sudorem solvuntur, sed appetitus, qui ea die promissus fuit, sequentibus redit, hinc etiam nimia domesticæ libere excedit, verum ob intemum aeris externi frigus adibus exire hanc potuit. Liber hinc erat per totos septem dies a paroxysmo, neque circa sex res non naturales aliquam diu advertit mutationem, præterquam quod urina non parum tincta fuerat. Sed elapsis septem diebus, die Saturni, eadem hora paroxysmus cum illis symptomatibus reversus est; eodemque modo, quo primus, solutus. Fuit iterum per septem dies a febre liber: at tertius paroxysmus solito tempore, die scilicet & hora ordinaria, redit, sic consequenter semper quartus & quintus, circumstantis omnibus in & extra paroxysmum in eodem statu permanentibus. Sextus autem paroxysmus die quarta tres horas anticipans venit, qui etiam ultimus fuit, & sic natura ipsa mediatrix vir ille feliciter à febre prædicta liberatus est; Nullo interea medicamento usus, præterquam ad sudorem promovendum pulveris pretiosi sive cordialis simpl. & Marchion. epilept. an. ʒj. pro dosi, is autem cum cerevisia calida. Verum natura ipsa partim per sudorem, partim per copiosam nationem febrem istam solvit. De similibus raris & insolitis febrium typis, scil. quintanis, sextanis, septimanis, octanis, nonanis &c. vide Hippoc. lib. 1. sect. 3. textu 2. de morb. vulg. item sect. 3. text. 7. ibid. & text. 9. ac 17. ibid. C. lenum in comment. ad eosd. text. Schenckii n. 6. obs. de febrib. Anat. Luitan. cent. 5. cur. 67. & cent. 7. cur. 73. Zacutus Luit. de l. p. Med. h. lib. 4. fol. 73. eund. de decimana de P. Med. h. lib. 1. obs. 24. fol. 37. Talsium obs. 1. 3. c. 5. Causas febrium istarum longioris intercedens indagare difficile esse videtur: Sed quid vetat secundum vulgatum humorum doctrinam istarum esse species simplicium typorum interpolata una accessione aut pluribus: ut sit quintana tertiana species, in qua tertius dies hinc accessione est, à paucis flava bile in naturam atræ bilis conversâ, ob paucitatem materiæ interpolatæ. Septimana quartana species, interpolata accessione diei quarti, ab humore melancholico non multum irritante ob pituitæ prætionem. Nonana, tertiana quædam intercepta, ab humore melancholico cum mixture pituitæ in parte biliosa, quæ ob frigiditatem minus stimulat, servatque typum tertianæ ob locum. Omnes autem diebus imparibus procedunt, in quibus autem est vis ad commotionem, ideo non interpolant duas accessiones, sed aut unam aut tres. Et sic de reliquis typis statuendum: liberum tamen vique iudicium in tam abstrusa doctrina libenter concedimus, præsertim Neotericis. Quorum sententias hic recensere non est nostri propositi, Plateri mentem de quintana & sexta febre lego *Prax. Med. tom. 2. cap. 1. de febr. genericis D. Simonis Schulzii.*

Febris Oscitans.

Honestissima Virgo febre vaga jam levius jam gravius affligebatur, nonnunquam & manibus aderant, cum incumberet gravius & sociam sibi jungeret nauseam, perpetua fatigabatur oscitatione

tatione, quæ non nisi absoluto paroxysmo solebat placari. Adhibita a me remedia varia, subcessu non satis optato, donec vesicatoriis occipiti adnotis, seroque acerrimo illa parte evacuato malum tandem defineret. Nihil tamen actum fuit vel vesicatoriis, vel salibus volatilibus, vel calloreatis vel sectionibus venarum in lethargo alterius primariæ virguis, quæ narcosi sex dierum, oppressa, cum omnia, quæ posset ars, Medici quæcunque exprompserint remedia, nunquam evigilavit. *D. Olai Borrichii.*

De Febris ex umbra sambuci orta.

Quidam apud Quedlinburgenses Balneator, Hermannus Worbs dictus, cacochymico corporis habitu gaudens ac serosis humoribus abundans, quoties sambuci frutici æstivali tempore approximat, ita, ut, umbra ejus tegatur, statim quandam in corpore alterationem, lassitudinem ac torporem, in primis vero glandulas inguinales ad ovi magnitudinem cum dolore intumescere sentit, una vel altera elapsa hora, rigore febrili non levi, ad horæ circiter spatium durante, hinc calore p. n. forti, dolore capitis &c. corripitur, uuo verbo: febricitat: Assumpto vero rob sambuci, vel alio quodam ex eodem frutice parato remedio sudorifero, intra 14. horarum spatium plenariè convalescit. & ab illa febre umbratili liberatur penitus: Hoc ipsum tali ritu sibi vel millies, quoties nimirum in umbra sambuci steterit, obvenisse jurato affirmat: Hanc p. n. ac febrilem sanguineæ massæ ac lymphæ fermentationem effluvia à sambuco exeuntia inspirare non facile quis negaverit. *D. Jacob. Schmied.*

Febres malignæ nuper Hafnia frequentes.

Hoc anno 1673. Febres malignæ, & ut plurimum petechiales, cum insigni capitis dolore, & nonnunquam cum pleuritide spuria, delirio, sæpe etiam phrenitide conjuncta, plurimos hic Hafniæ invaserunt, quæ prima invasione in multis ad modum mites erant, sed latebat anguis in herba, nisi enim ante quintum diem, qui semi criticus est, Medici auxilium, placato prius Numine, implorabant. Agri, plurimi, præsertim in quibus Cacochymia aliqua scorbutica sedem habebat, illuc unde negant redire quenquam, abierunt. Venæsectio, quantum ego experiri potui, nocuit plurimis, nisi in ipso morbi principio, & quidem corpore plethorico, celebrata esset, idque parè, & quo major malignitas, eo minus conferebat sanguinis missio, id quod multi suo malo experti sunt qui inconsulto Medico dogmatico venam petundi curarunt. Idem suo exemplo probatum fecit Civis quidam Zytopena in Vico Boreali, qui eadem febre maligna petechiali cum insigni capitis dolore, delirio & pleuritide spuria conjuncta correptus lethaliter decumbebat; ad hunc, cum nono die morbi, critico scilicet, vocatus essem (tum demum enim de salubri Dixta cogitat Philoxenus,

Cum Latius aut Renes morbo tentantur acuto,)

in ædibus illius agri hominem medicastrum juxta fenestram hypocaufti stantem reperio, qui manibus patellam cruore repletam hinc inde rotabat, & veluti ad Archimedis tabulam contenta examinabat, qui quam primum ad ægrum ingressus eram, male, sibi conscius clanculum sese subduxit. Ægro & morbo secundum artis leges examinato, quæro ex matris familias an Vena secta fuisset, respondit illa, imò heri qui octavus morbi dies erat, celebrata fuit Venæ sectio, idque ex consilio illius hominis quem in hypocausto vidisti: & hoc male, dixi ego, ut ipse in malam rem abeat pessimus consultor cum malo suo consilio, hoc ipsum est quod in exitum præcipitabit tuum maritum, major enim hic est malignitas quam febris, & apparent jam petechiæ in pectore, in brachiis, plumbæ & nigricantis coloris, pessimæ notæ, ubi & quidem octavo morbi die Venæsectio locum non habet, detracto enim sanguine, bilis freno, magis effervesceat malignitas; nisi adsit plenitudo, idque in principio. Si summa & sola Veneni perniciēs virium robur dissolvat inquit Joan. Morellus de febre purpurata C. 10. tunc doctus prudensque Medicus aut penitus à phlebotomia abstinere; aut si febris urgeat parca manu sanguinem detrahet: idque ante macularum eruptionem; & hoc in purpura scilicet, si febre purpurata propriè sic dicta; ubi nonnullis in Gallia & Italia Medicis non est religio etiam post quintum diem Venam secare; quod tamen ego in Dania non suaserim, ubi major malignitas in ejusmodi febribus, ratione scorbuti quam ibi locorum repetitur. Id quod etiam Magnus in Dania Medicus *Dr. Olai Wormius*, Vir non ni laude major, semper suavit, minusque esse peccati in malignis curandis, si phlebotomia omitatur. quam si incautè adhibeatur, Teste Excellentissimo Beati Viri Filio D. Wilhelm Wormio Professore & Bibliothecario Regio, Affine meo honoratissimo. Eandem opinionem de peste etiam sectantur ille Trium Imperatorum Medicus Crato, Sennertus, Heurnius & alii plures, dissipato scilicet Cordis, seu fontis Vitæ robore ab illa sanguinis eductione. Sed ut ad Ægrotum meum Zytopenam revertar, conquerebatur ille præter alia Symptomata etiam de insigni lateris dolore, quod procul dubio seduxit illum Medicastrum ad symptoma respicientem, non ad morbum, pleuritidem esse ratus; sed malè hoc, ut plurimum enim illud Venenum in multis febribus malignis petechialibus consistit in Vitriolica aliqua qualitate, idest, acri & mordicante sanguinis, quæ ad membranas delata illos vellicat, lancinat, & sæpe etiam ipsa pulmonum vasa arrodit, id quod mecum ante annum & quod excurrit expertus est Vir Doctissimus Dn. D. Olai Borrichius Professor Regius, in uxore Consulis, de qua Vir Laudatissimus mentionem fecit in Actis Medicis prioris anni sub Titulo sudor Ararentis quæ superata maligna febre petechiali, exulcerationem pulmonum passa est. fortè non aliam ob causam, quam à Vitriolica illa qualitate sanguinis quam febris illa maligna induxit: quæ Vitriolica sanguinis qualitas, quantum ego divinare possum, & in praxi expertus sum, nan tollitur sanguinis

missione, sed medicamentis vim habentibus Acidum illud præcipitandi, ut sunt oculi 69. crudi, margaritæ & tere præparata omnia huius fortis & farinæ: Videmus enim si oculis 69. crudis subtilissime pulverisatis superaffunditur succus Citri acidissimus, illum dulcescere, idem in corpore humano.

Hoc præterea in febribus istis malignis observavi, quod multa laudatissima medicamenta nobis alioquin in eiusmodi malignis inutilia, parum aut nihil auxilii nobis præstarent. Tinctura enim illa Bezoartica Liptienium, quæ multis aliis alio tempore profuit, nihil hic potuit, Diascordium Fracastorii, Elixir pestilentielle Tychonis parum efficacia dederunt: Sola Radix Contrayervæ subtilissime pulv. & cum rasura Unicornu Gronlandici subtilissime tri ta, itemque aliquot grana Lap. bezoar orient. simul mixta, & in certo vehiculo octava quavis hora exhibita, Deo benedicente, palmiam reliquis videbatur præripere: nec sine efficacia fuit Spiritus C. C. per intervalla in vehiculo convenienti datus; nec Syrupus ille ex Carduo benedicto compositus Cratonis, sive decocto ex radicibus Scorzonera, Bradanæ & rasura C. C. admiscebatur, pro potu ordinario, ejus autem hæc est descriptio.

℞. Succus Cardui Benedicti depurati, & ad mellis consistentiam cocti ℥iv. Succus millefolii eodem modo parati ℥ij. Salis absinthii ℥ij. Sacch. fin. ℥iv. vel q. s. f. l. a. Syrupus.

Millefolium enim nonnulli Practici etiam in ipsa peste commendunt, id quod nuper propria experientia mihi confirmavit Vir quidam Reverendus Pastor in Cymbria. Apud tenuioris fortis homines non sine laudabili efficacia operationem suam exercuit Theriaca de Tribus Kucufeli, cujus ingredientia desumpta sunt ex triplici illo regno, animali scilicet, vegetabili & minerali; quæ Theriaca forte illud est Theodoton Wolfgangi Gastoris, cujus Filius ipsius Flaminius Gasto meminit Tract. de peste §. 58. quod idem ex triplici illo regno compositum est. Sic etiam vesicatoria brachiis & femoribus applicata alio tempore in malignis saluberrima fuerunt, sed ut plurimum hic nihil effecerunt, quod cum observassem, loco Vesicatoriorum gallinam agiram vivam, per medium dissecandum & ipso momento plantis pedum ægroti, præsertim delirantis, imponendam, & cum scæteret maxime, removendum curavi. quod Deo aspirante maximum levamen sæpe attulit. Sic variantibus morbis etiam varianda sunt remedia: sæpe etiam Deus in illo suo Judicio suspendit Consilia Medicorum, ut verum sit illud,

Non est in Medico semper relevetur ut eger.

Interdum docta plus valet arte malum.

Hinc felicissimus ille Medico Chirurgus Febr. Hildanus obs. Chir. cent. 4. obs. 72: recte & pie disserit, dum inquit: Evenit ut sæpissime remedia quæ infinitis aliis profuerunt, in hoc vel illo ad votum non succedant, ut inde agnoscant ægri, simul & Medici, non proprie esse remedia quæ sanant Languores, sed solam misericordiam atque benedictionem Divinam. D. Caspari Kelichen.

Febris maligna ab haustu Aqua Putealis infecta oriunda.

Anni proxime elapsi hyberna constitutio, ut maximam partem clemens erat & aultrina, ita eandem excipiebat ejusdem tere moris ac tenoris ver, inultumque solatii afferebat omnibus terra nascentibus, adblandiente quoque ætatis Genio nativo, id est, calido & sicco, qui frugibus quidem & fructibus prosperam spondebat maturitatem, sed is multis simul funestus accidit: Statim enim ab solitio hoc urbem nostram ejusque incolas, præsertim plebeios, & qui virium robore præ cæteris pollere videbantur, Juvenes pariter & Juvenulas, invasit horrenda quædam lues, sive ea ex æris vitio (quod tamen ob contagii raritatem vix credibile,) sive infecta & corrupta aqua puteali profecta sit, nondum satis constat; constat autem inter omnes, quotquot ex illo putco primario quidem, sed de maleficio suspecto, aquas hauserant, primum omnium hoc malo laborasse; corripiebantur autem intensissimo capitis dolore cum siti inextinguibili, continuo æstu ac summa virium jactura, pectoris aderat angustia, dejectusque statim appetitus, quosdam enormis vomitus, nonnullos diuturna Diarrhœa, non paucos faucium affligegebat tumor & exulceratio, lingua quasi sumo indurata, acida & fusa, ita ut etiam liquida vix admitterent, hinc inedia & vigiliis quidam confecti ac enecti, mox in delirium abripiabantur, gesticulabantur, blaterabant, flocos legebant, quosdam profundus obruebat somnus, ut fere impransii plures dies noctesque transmitterent, excitati verò & nonnihil resocillati itidem delitabant, & quasi comatosi in consuetum soporem iterum mergebantur, quibusdam pustulæ aquosæ circapectus erumpiebant, quæ in squamulas desinebant, quibusdam petechiæ funestæ erant, & convulsiones Epilepticae omnibus, quos invadebant, mortem intentabant, à diuturna ventris constipatione & nocturnis horripilationibus crebro repetentibus malum semper gravius, levius autem à Diarrhœa larga, indore profuso, & hæmorrhagia natum; quidam parotidibus judicabantur, quibusdam sanies ex auribus, vermes ex faucibus, tumor colli, dolores & ulcera dorsi crurumque, pedum vacillatio & eundi impotentia, præsertim iis qui ex morbo jam quodammodo eluctati videbantur, & se cibo potuque largius invitaverant, id quod fere omnibus convalescentibus familiare erat, insatiabile scilicet cibi potusque capeffendi desiderium, ac denique capillorum defluvium.

Puerum tum notavi jam decennem, qui, postquam febri hac maligna, qua per aliquot Septimanas graviter laboraverat, fere defunctus esse videretur, singulari tentabatur Bulimia, ut omnem cibum potumque, & quicquid in buccam tubercinando quasi ingesserat, cum continuo ejulatu, canum instar duriora ossa rodentium, manderet & devoraret. ac lautitias istas suas cum lachrymis assumeret, quo malo nonnihil sedato aliud supervenit non minus rarum ac stupendum, quod idem puer, qui in eodem cubiculo cum sorore eodem morbo jam correpta, omnia delirantis sororis & adstantium verba ac sermones repetebat: Ego enim harum rerum

corte statulentæ, utinam non malignæ, autz indicio. Tertia imprimis matutina evigilans Sereniff. noster Rex læte factus est se jam de cordis anxietate vel dolore non amplius conqueri posse, sed subitam se virium refectionem & integram à morbo restitutionem sperare, si dolor, qui jam penitus discesserat, non amplius rediret, qui tamen post quartam secundo reversus est.

Hora sexta matutina jusculum oblatum, à quo Cervinam assam desideravit, quam tamen non obtinens iterum dormivit ad nonam usque diei horam.

Ab hoc somno omnia in deterius palam ruerè visa sunt cum extremorum refrigeratione, ingenti Cordis anxietate, Linguz ac faucium siccitate ac nigredine, difficiliore respiratione, & summa omnium virium ac facultatum prostratione ac exsolutione.

Frater enarrata Cardiaca, Pectoralis hac aqua, quæ & antea, jam quoque exhibita, item parum Aquæ Apoplecticæ.

R. Aq. Hyssopi ℥iij. Syr. Capillor. Vener. de Hyssopo an. ʒj. Oxyim. Squillit. ʒß. Misc.

Emolliens quoque Clyster injectus, sed huic nihil proficiens suppositorum additum, utrumque frustra. Tandem Oleum Diacolocynth. Quere. Umbilico admotum, secundusque Clyster inmissus, & tertius acrior, & Extremities calidis manibus Aqua Apoplectica & Carbunculi humidis diutius & pressius frictæ, sed omnium pro dolor opem elusit occultum morbi venenum, quod vix biduo cum dimidio elaso circa duodecimam diei horam Regiam Arcem & in vere Regium Corcum, summo omnium Honorum luctu ac mœrore subdole expugnavit ac penitus occupavit. *Thom. Baribolint.*

De Febri Maligna ex Mœrore.

Humorem melancholicum coacervatum in corpore & putrescentem horrenda sæpius inducere Symptomata, multorum confirmatur Observationibus, siquidem juxta Galenum non solum attrahilis sit venenum, sed quælibet species Melancholiæ, imo quivis humor diu retentus, præcipue in cacochymicis corporibus, id quod vidi in primario quodam aulæ ministro, is cum gratia Principis sui excidisset, elapsis aliquot mensibus, immensi corripiebatur & maligna febre, calor equidem non videbatur usque adeo vehemens sed anxietas cordis erat tanta, ut vix sese in lecto continere posset, quamvis ob summam virium prostrationem etiam primo statim die vacillantibus pedibus iuviti non valeret, urina erat tenuis & clara cum copioso tartaro valde acuto, quinto, sexto & septimo die delirabat sæpius cum siccitate & ariditate linguz, exhibebantur frequentissime alexipharmaca mixta cum deopiplativis & acrimoniam arenosi istius humoris Melancholici temperantibus, nono præter omnium expectationem judicabatur perfecte sudore copioso. Labet hic Cl. Riverij, Medici Regij, verba allegare, quæ casum huic valde illustrant, dum de febre pestilenti p. m. 514. sic scribit. Animi pathemata corpus vehementer exaggitare solent, humoresque conturbare, atque adeo ad hanc luem capessendam maxime disponunt, imprimis vero Timor & Tristitia-

adeo ut nonnulli existimaverint, in obsidione bus & caltris morbos pestilentes non tam ex prava victus ratione & cadaverum fœtore, quam terrore, metu, anxietate & mortis formidine provenire, quæ humores exagitet, eosque tumultuari ac itutuare faciat. Hactenus ille. Novi ego civem, quæ ante biennium febre maligna moriebatur, longo tempore summo affectu mœrore, quem postero die uxor eodem morbo extrinsecta sequebatur, in tantum tristitia dominatur Archeo, hunc Bravo Medicus Hispanus in Resol. Medicin. p. m. 726. repentinæ mortis causam Viri Excellentissimi eleganter deducit ex humoris Melancholici secundum Galenicis corruptione, quod Illustrissimæ cujusdam Personæ exemplo confirmare possem, nisi casum illum ad alia mihi reservatum. *D. Joh. Jac. Walschmidii.*

De Febri maligna singultuosa non lethali in femina quadam.

Typographi nostri Academici Uxor nuper in febrem malignam incidebat; cui statim ab initio aderant varia Symptomata, ut membrorum omnium lassitudo, virium imbecillitas, inappetentia, singultus, ingens oris amaritudo, sitis inexhausta & linguz scabrities. Singultus autem erat perpetuus, & tantus, ut abortum quoque concitaret. Horum pathematum causa erat humor malignus, acris & erodens, qui tunicis ventriculi impactus, singultum excitabat. Ego in auxilium vocatus, statim præscripti Julapium, malignum atque mordacem istum humorem infrangens. Eum ad patres ignobiles crurum vinculis, frictionibus, cucurbitulis distrahere, atque porro decocto Scorzoneræ, cum Syrupis de rib. acetosi citri, granator. papav. rh. præparato, contemperare tentavi: extra ventriculo etiam olea & emplastra corroborantia apposui. Ast hæc omnia opem nullam tulerunt. Ad narcotica etiam accedere coactus sum, quæque ac priora vehementem ejusmodi singultum tollere non valebant. Tandem malum hoc ferax solum emulsione, ex semine melonum cum aquis convenientibus & Margaritis præparatis confecta, est edomitum; hæc enim narcotici medicamenti instar acerrimum humorem & correxit & infravit. *D. Maubia Tiliigii.*

Urina nigra, à viro quodam Febri Maligna laborante emissæ, non lethali.

Juvenis quidam Steinbergæ in nostra vicinia habitans; alias melancholicus & hypochondriacus, incidebat, elapsis duobus annis, in febrem malignam, quæ tunc temporis admodum grassabatur. Ille febrili æstu, siti, inquietudine doloribus capitis, totius corporis lassitudine, nec non virium imbecillitate tentatus, per fratrem misit mihi urinam, maximopere contendens, ut ex ea morbi sui statum cognoscerem, & ipsi salutaria remedia præscriberem. Urinam videns perterritus sum, cum plane nigra & inst r atramenti scriptorij esset. Frater autem ejus dicebat, istam urinam esse vere nigram, fratremque suum hisce diebus semper talem urinam nigram reddisse. Ego, signum

hoc esse criticum considerans, auxilium meum ipsi non denegavi, & præscripsi statim sudorifera & alia convenientia remedia, quibus assumptis, etiam mox integram suam valetudinem recuperavit *D. Mathias Tilingii.*

De Urina oleagino in febribus malignis lethali signo.

Verissimum est axioma Excell. D. Wedelij, Introd. in Medicin. part. 3. sect. 2. theorem. 21. Urina oleaginosa quoad substantiam rara est, colligationem norat malignam. Ejusmodi u in m oleaginosam, simul tamen impenite rufam seu pessimum & funestum signum deprehendi in duobus fratribus, Coriarij Quedlinburgensis nris, quorum alter viginti, alter vero octodecim annorum, uterque febre summe maligna correptus, ille intra biduum, (erumpente simul circa pectus carbunculo pestilentiali livido ac funesto) hic vero intra sex horarum spatium ab invasionis tempore, (bezoarticis & expellentibus generosis & optimis frustra adhibitis) anno 1678. mense Martio, una eademque simul hebdomade exstinguebatur. *D. Jacob. Schmid.*

De Floccorum collectione in malignis non lethali.

Illustrissima quædam Baronissa febre maligna Hungarica cu u Petechiis laborans, cum a medicastro quodam solis refrigerantibus curaretur, incidit in Dysuriam, deinde in Convulsionem quas ultra quinquagesies passa fuit, eaque floccos moribundorum more colligebat, quam ad vocatus ego, Alexipharmacis & Cordialibus tum internis tum externis pristinæ sanitati, cum Divina Numinis ope restitui. Ex hoc videre est, quod desperatos floccos & Convulsionem, funeste secundum Hipp. febribus supervenientes, flocci quandoque facere, & non protinus desperare debeat Medicus. *D. pauli de Sorbais.*

Manuum tremor & Festucarum collectio in febribus acutis non semper lethalis.

In acutis febribus interdum affectus seu motus ex tremore & convulsione mixtus accidit, qui ~~non potest~~ appellari potest, ac lethale signum esse censetur, nam delirium & convulsio ipsam plurimum sequitur, unde ægri moriuntur; idque Hippocrates coac. prænot. aphor. 59. asserit: Et qui ad manum resiliunt, male habere judicantur. Verum curavi non ita pridem sartorem meum febre acuta laborantem, qui tertia die hoc affectu prehendebatur, & quod majus erat, festucas colligebat, delecto floccos evellebat, quod ex sententia Hippocratis i. progn. aphor. 13. lethale habetur, virium summa aderat prostratio, extrema frigeabant, & in principio morbi die septimo sibi mortem prædicebat, quam quoque certo instare omnes astantes putabant, at tunc sudore critico accedente æger præter omnium spem convalescit. Idem olim civi Wettinensi adhuc viventi, de cuius vita quoque desperabam, & ante paucas septimanas Nobilissimæ cuidam mulieri conti-

gisse, recordor. De nullius igitur salute, ex consilio Trincavellij. Consil. 62. p. 505. desperandum, quia, teste Averrhoë 7. colliget. c. 3. i. p. m. 166. sæpe accidunt in omni arte, quæ, modum in natura, & ut Celsus lib. 2. c. 6, air, interdum deserti a Medicis convalescunt, & plures sanantur, de quibus Medicus desperat, & contra moritur aliquis, de quo Medicus securus primo fuit: imo nonnonnullos cum signis coctionis mortuos esse, ex Schenckij Observationibus p. 840. patet. *D. Valentini Andrea Moellenbracci.*

Urinarum infusum in morbis malignis judicium.

Quo urinæ in febribus malignis primis diebus turbidiores, hoc melius de ægri rebus sperare soleo, quod videam magnam peccantis materiam partem ita commode evacuari, quæ retenta in corpore irritat sæpe in partes nobiles, & tragedias excitat. Non tamen perpetuum hoc esse experimenta loquuntur. Quandoque enim, licet rarius, urina in malignis sana, nihil mali portendit, quod peccans humor per metastasim alio declinet. Id ut in aliis, ita nuper in locuplete 82. annorum collylita mihi inspectum. Postquam enim decrepitis ille senex febre continua, malimoris correptus, celeberr. Archiatr. Simonis Pauli, meæque operam sollicitasset, urinam in medio æstu febrili jam laevissimæ similem deprehendimus, jam ab aqua fontana colore non distinguendam, evasit tamen Libitinam, translato in hæmorrhoidas exteriores humore noxio, qui per abscessum copiose exclusus ægrum a consuetudine mortis liberavit. *D. Olai Borrichii.*

Ex vena sanguis albus ductus in Febre maligna.

Fermentum subtile malignam miram habere vim destruendi succum nutritium totamque corrumpendi massam sanguineam: Vocatus Segentiladium ad Canonicum quendam febri maligna correptum, inveni sanguinem ternis venæ sectionibus ante meum adventum extractum à Chirurgo, in quo ne vestigium quidem sanguinis apparebat, dixisses potius albumen avi, feri gelatinam, vel ut Medice loquar, saniem: quod & in aliis observavi, quorum tamen nemo evasit, siquidem & hic Canonicus ea ipsa nocte ante meum abitum commissus Sacerdotibus placide obdormivit. *D. Joh. Jac. Wafschmid.*

De Rebus insolitis, post Febrem malignam, per nares & alvum excretis.

Civis apud nos uxor, cum febre maligna aliquandiu conflictata, tandem morbo ad declinationem vergente, e naribus tres capitis pediculos, eosque vivos, emunxit, & non longe post magnam æquorum pilorum compactorum congeriem per alvum excrevit, mox succedente integra valetudine. Et alia Civis filia innupta, itidem febre maligna ultra ordinarium alias tempus gra viter & dubia spe contenta, frequentissimis vomitionibus & ventris

torminibus ita excruciatum est, ut de recuperanda valetudine plane desperans, ne tantillum medicamenti assumere cogi potuerit, tota aqua per 14. pene dies contenta, appetitum plane prostrato, denique per interitum gutturem, cum Plauto loquor, ultra mille lapillos nucleis mespilorum, vel mali aurei non ab similes egressit, quæ tamen ante nil quicquam ejus fructus unquam comedit, & paulo post integre convaluit. *D. Georgii Abranami Merxlini.*

Rarus casus in Febre Maligna.

Juvenis quidam Arti pyrotechnicæ addiscendæ operam navans, in idit hyberno tempore, frigore intensissimo, in febrem malignam, ubi septimo nono die, critico scilicet, phreneticus e lecto nudus profiliuit, & absque illis qui curam ejus habere debebant, per scellas quasi furis agitatus decurrit in hypocaustum inferius, ubi Materfamilias ipsum comprehendere volens, ad januam enim deproperabat, ipsius furorem ex perta est, insit enim canis rabidi brachium ipsius mordebat, unde bona mulier perterrita liquit ipsum; quo facto, per fores, quas apertas vidit, in plateam nivibus & glacie undique tectam rapido pede procurrit usque ad forum Amagrisense, ubi in puteum satis profundum & aquis plenum sese precipitem dedit, mox tamen ab adstantibus aurigis, qui ante fores diversorii illius publici *Keckerbifcken* vulgo dicti, ex Urbe abiturientes præstolabantur, ex puteo illo extractus & in proximas ædes M. Nicolai Boye Chirurgi Regii, ex opposito sitas, deportatus, cura & bonitate domesticorum ad se rediit, debilis tamen & vix sui compos in hospitium cum reportatus esset, ego vocatus ad volo, inuenio hominem exanimem fere & Charontis aquis proximum: tentavi ergo in tam præcipiti casu omnia quæ sana ratio dictabat, imprimis sudore alexipharmacis largiter provocato, maculis rubris undique pictus melius spirare cepit, & sic porto adspirante divini Numinis gratia, medicamentis ex arte præscriptis & ab ægro, quamvis adhuc per aliquot dies deliraret, rite assumptis, convaluit.

*Sic cum fata voluit bina Venena juvant:
Secundum illud Ausonii. D. Caspari Kolichen.*

Mors horrida Febre maligna laborantibus rusticis

ANNO 1666. Mense Septembri grassabantur hinc inde in pagis Boëmæ Febre malignæ. Contigit ut in pago quodam Illustris. Dni. Comitæ de Millefino, quidam robustus vir eadem corripere, qua incrementum sumente tantum delirium successit, ut 7. personæ fortes haberent quod agerent cum ægro, ad eum continendum. Obiectum autem delirii ejus erat, Ventrem suum scatere vermibus seu lumbricis, unde se torqueri ab iisdem affirmabat. Post aliquot dies videbatur delirium remittere, unde ad quietem sese componente ægroto, adstantes quoque quiescere cœperunt. Interea patiens, omnes alto somno stertentes conspiciens, seque liberum ad motum persentiens, novo cœstro delirii percitus, ventrem aggredi, & utrobustus erat, umbilico excerpto, intestina con-

tinnato ordine extrahere cœpit, in tantumque extraxit, ut jam medietas illorum educta fuerit. Interea nescio an calu aut studio unus ex adstantibus quid agere patiens aspiciens, eundem crudeli labore implicitum advenit, conlocatis focis adque impediendum ægrum sese accingentibus obstitatus eisdem est æger, ut se sinant & non turbent in extrahendis e corpore suo lumbricis. Non diu perstitit sic æger, sed sensim immunitis viribus crudelis laboris perterritus, obiit. *D. Jac. Joh. Wencelai Dobransky de Nigroponte.*

Malignas febrium hyberno frigore non mitigatur.

Experti id sumus pluribus jam annis tum Hattinæ, tum Hellingoræ. Enimvero febres malignæ hoc plerumque evadunt pertinaciores, quo sævius urget gelu, immo & spargunt magis virus suum in domesticos, & nono plerumque die permunt. Sed quam primum circa veris initia remittit frigus, sensim remittit etiam violentia febrium, & regi se patitur malignitas, quæ ante ægerrime trinum admittit. An clausum visceribus malum, cum obstructis portis exitum non nisi difficulter inveniat, per antiperistaltin infestat severius. Quod si laxes meatus sudoriferis, & suos hic manes patiuntur ægri, antequam pleno sudore madeant, & sæpe, dictu factum, stragulis à manu tantillum remotis pori iterum clauduntur, intusque cohibitus hostis novas resumit vires, priusquam ægri persuaderi queant, ut ad iteratos se sudores accommodent. Quid enim facient Medentes, & ægris ipsis & ægrorum amicis sæpe non permittentibus repeti, quæ salutaria sunt, obtentu virium dejectarum? Quid quod aliquando nulla arte sudor exigi queat, antequam victor morbus, superum illum & lethiterum, licet diu satis calentem madorem protruserit. Quin & ejus quandoque ferocia est malignitas, ut ægri licet toto propemodum morbi decursu moderatis fluant sudoribus, nihilominus pereant. Et his si vesicatoria applices etiam plura, in rugas quidem contrahitur pellicula, sed parum initio effluit humoris, & postridie nihil, licet insistas sinapismis, quod perditissimum signum est. Salia volatilia, tantopere in malignis laudata Cl. Sorbaito, & merito laudanda, nisi tamen prudente regantur, pestiferam inducere solent hæmorrhagiam. Diascordium suis non caret laudibus, sed delicatiorum stomachi saporem illum plus odere, quam fullones ululam. Nec pulsui semper fides. Ad sum, um, ut tranquillo mari quilibet gubernator esse potest, fremente pauci; ita in his febribus, quando dira ingruunt symptomata, quandoque ars malum superat, quandoque ab eodem superatur. *D. Olai Borichii.*

De Purpura epidemia maligna infantum.

Cum anno 1664. hyemis mollis & pluviosa esset, grassabatur apud nos vere primo infescente purpura epidemia maligna, quæ per totam ætatem & autumnum usque in hyemem sæviebat, plurimosque infantes utriusque sexus, & 12. annum attingentes (nam ultra hanc ætatem vix ascendebat) perimebat. Merique secunda die morbi, nonnulli etiam prime moris

bantur; illi solummodò evadebant, qui nulla tunc inflammatione vel tumore œdematoso (variabant enim ista pro diversitate naturarum) intestabantur. Tum omnibus ab isto morbo liberatis, post copiosum sudorem (nonnullis etiam diarrhœa, sed tantum unus vel alterius diei critica profuit) squamæ decidebant, rubore cutis evanescente. Tandem, præsertim natu majoribus, tumor totius corporis, instar leucophlegmatiz, & intimi ventris sequebatur, qui per aliquot septimanas miseris molestinus erat, sudoreque etiam solvebatur, interdum etiam urina largius profluente. Evali tum etiam per divinam gratiam filiola mea unica, nondum annum supergressa, cum etiam privigna mea in curatione admiscebantur sudorificis bezoartica. Excell. Dn. D. Segerus, cum temporis Collega meus meus charissimus huic fidem dabit. D. Simonis Schultzei.

Febris Maligna cum Exanthematibus miliaribus.

Privigna Phamacopœi hic Posanii ad aureum Gryphum II. vel 12. annorum puella sub initium veris hujus anni, anni, mane, postquam consueto inquietius dormivisset, expergetacta bis vel tres vomuit, cui mater eriorum in victu commisitum rata, aliquid Theriacæ exhibuit, quo accepto paulam quievit & sudavit, post unam vel alteram horam decordis compressione & spinæ dorsi dolore conquesta, superveniente insigni calore, matrem in sententiam deduxit morbillos subesse, inprimis cum in colle & pone aures maculas observasset rubras. dedit itaque pulverem expellentem, & intra 24. horas bis reiteravit.

Tertio morbi die rubor quidam instar Erysipelatis per totum corpus diffusus apparuit cum cutis quadam asperitate, oris siccitate, ariditate linguæ quasi hili, pulu inæquali, delirio vehementi, &c. Accirus ego circa vespere ex signis morbum agnosco malignum, sed rubore per habitum corporis diffuso suspendo iudicium in crastinum, licet Rostaliū esse vix dubitarim, præscriptis præscribendis discessi. Altero die reversus, totum corpus non tantum ita intense rubrum, ac si panno rubro involutum esset, deprehendi, sed & a collo uique ad genua parvis exanthematibus granum nulli vix a quantibus, plenis ichore quodam albo pellucido, non tamen valde dolentibus, repletum. Patientis quidem supra modum debilis, sed symptomata aliquantulum remissiora bonam spem faciebant; quare iussi continuare. Alexipharmacis & expellentibus usque in nonum vel duodecimum diem, quo instar squamularum decedere, convalescente eximio matris cum gaudio ægrotæ Pro Febri habui maligna miliari, ut ovum ovo, simili illi febri, quam puerperis ante aliquot annos tam exitiosam descripsi. Excell. Dn. D. Gothofred. Welfehus P. P. Lips. in peculiari Dissertatione, & quidem illi speciei, quam *den miben Triefel* appellat, nisi quòd ratione subjecti eventus quidam fuerit disparitas, periculosiores quippe omnes morbi maligni giavidis & puerperis solent esse, quàm aliis. Nunquam antea a me visum fateor istud exanthematum genus, nec ab alio Practico hujus

loci observatum memini. Ancilla tamen, quæ ægrotæ semper aditabat, affirmavit, plane eodem morbo laborasse in juventute, & iusto sapius in die pulvere ex il. sulphur. & nitro præparato, quæ tenuioris conditionis erat, rexit. in fuisse. Nonnullæ autem aliæ supervenientes & visitantes ægrotam tamina atterebant se vidisse quidem tanta nonnumquam exanthematata plerumque ex alia, sed Germanice nominare mihi nesciebant. D. Caroli Kaggeri.

Febris petechialis per diabetem spurium soluta.

Anni hi hætenus ut bellorum, ita febrium malignarum fecundissimi, variè curam Medentium diltrinxere. Deliere pleraque per sudorem crises, nonnullæ per diarrhœas superveniente quiescere, una in juvene xxii. annorum, contumax, maculis subrubris comitata, & in deliquia subinde exiens, nec sudoribus paruit, nec assistimentis, donec tandem à velicatoris stimulatî humores viam sibi fecere per urinas, quas æger die xi. profudit adeo copiosas, ut verum diabetem formidarem. Et hæc ipsa profusio ipsi salutaria fuit. Non est tamen tam tarda alioquin crisis hæc quam illa altera per sudores: quippe notati mixti plures in febribus malignis, quibus, negatis sudoribus, illuxere emise urinz, sine optato eventu, quod pestilens illud in m lignis fermentum sæpe adhærescat tenacius sanguini ipsi, & lentis in eo humoribus, quam ut pariat se in vias lotii amandari. D. Olai Burichij.

De Patechiis summe malignis.

Mortalitatis memorem me fecit calamitas domesticæ, quam sexennio abhinc experiri me voluit supremus rerum humanarum Director, iustique octavo morbi die, diris & lethalibus petechis, quas pustulæ exiles variolas annulentes comitabantur, ac per faciem, brachia & manus copiose, rarus in tibis & reliquo corpore pectore excepto, quod tam ab his, quam ab illis immune plane erat, intermixtæ conspiciebantur, acerbissime conflctatam, ex hac infernari valle, in altum adhibitis alexiteriis exquisitissimis, in æternum gaudium transtulit. Morbi vehementiam & malignitatem præsumebam statim, magis cum cordolio. ex acerbissimo dorsi ac hypochondriorum dolore, cui ferendo teneri corpulcun vires non sufficiebant; accedebat insuper magnus præcordiorum æstus; nec non subsequenti die lethale alvi profluvium, ob carunculas facibus permixtas: Nam Hippocratis sententia excretionibus ejusmodi esse funestas (sect. 4. aph. 26. didici, præsertim ubi humor tam effertus & acris est, ut exiguo tali temporis intervallo intestina lancinando eorum pingue, epidermidum & tunicam internam, uti has partes describit Hollerius in Schol. Tertia die manifestus adhuc inevitabilis mortis signum me perterritaiebat, macula nempe nigra carbonis instar, medio cæpit magnitudine & rotunditate, apicem linguæ in sinistra parte occupans, qualem Sal-muth Obs. Medic. 31 Cent. 1. ratam, nec à moxquam in lingua observatam, nisi in quadam matrona,

matrona, Lipsiæ intra triduum extincta, notavit. Ingemisco, quod ego alteram conspicerem, & historię veritatem in propria mea morigeratissima filiola experiri habuerim necesse. Tum eruperunt etiā pustulæ in dictis supra partibus pusillæ, imitæ bullarum, quæ Hippoc. annotatione in Coac. Prænot. tex. 116. magis enucleato a Greg. Horst. in Progn. Febr. pag. 36. lethales cernendæ in febribus continuis, nisi purulentus abscessus fiat; nec subsequeretur hic ullus, quin potius facies crustis quasi artis undique obducta, se ad formidinem usque defœdata fuit, quæ antea nitida & delectabilis erat. Quanto morbi die urinam mingere coepit cruentam, continuando sic usque ad ultimum quam vitæ halitum, quod symptoma, in morbis acutis, mortis prænuntium dictavit, præter alios magnæ in Medicina autoritatis viros, Hochstetterius, Celeberrimus olim Patriæ Medicus, Observ. Med. rariorum Decad. 1. Cal. 7. 8. & 9. Nigris quandoque excerni innoxie Velschius supra merito iure laudatus, Syll. Curat. & Observ. Medic. Cent. 4. in Not. ad Observ. 10. ex Hipp. affirmat, aliquot insuper exemplis hoc ipsum illustrat Rhodius (quem Patavii olim singulariter mihi faventem colebam) Jobierv. 31. Cent. 3. Truculentis igitur istis insultibus cum resistere inbecilles puellæ vires nequirent morti victas dare manus, eheu fuit coacta acerbam relinquens mihi, matri, atque toti faminæ memoriam sui. Simile lectuosum fatum subit mei vicini filiolus quinqueannis, sed dispari sorte, beata enim mea filiola per octiduum misere conditabatur cum exitio illo morbo, hic vero decem solummodo horarum, maxima ex parte convulsionibus gravissimis transactarum intervallo defatigatus, vitalem spiritum emisit. Sanus quippe manē surrexerat, & sic diem transegerat ad horam sextam vespertinam usque, ast subito de ingentibus capitis & ventris cruciatibus conqueri incipiens, post trihorium atrocibus Epilepticis moribus, cum sensuum externorum abolitione, correptus, hora duodecima nocturna, & subsequente matutina secund. pari ferocia iisdem redeuntibus, ac vitale robur planè pessundantibus, tandem post bihorium, inter parentum suspiria naturæ debitum citò solvit. Dubio procul variolæ, cum Epidemicæ, fuissent etiam subsecutæ in hoc puerulo, quia ingens aderat præcordiorum ætus, pulsus velocissimus, ebulliens in valis majoribus sanguis, Epilepsia, exanthematum frequens prænuntia, ni atrox malum vehementiæ suæ naturam prius prostravisset, antequam noxiam malignitatem à Centro ad ambitum Corporis propellere conaretur. Cæturum funera, morbiq; malignitatem eam, quæ simulprehendebantur filius meus natu minimus, ut & ætibus meis propinqui istius filiola, natuq; superites unicus, superarunt; unde grates solvebamus Divinæ Misericordiæ immensas, quòd hanc nolus servavit togam, porro custodiendam!

Hippocr. summis Artis nostræ Dictatoris, Aph. 26. Sect. 4. Veritatem stabilivisse calamitosum domesticum meum exemplum, ante dixi. Ast feliciter expertæ fuerunt eventum ætatis consistentis dux Virgines, quas per aliquot dies, diverso tempore, Dysenteria exer-

cuerat dolorosa valde, propter exulcerata à bile flava, pituita & lassa permixta, intestina, materiæ primo abeunte copiosa, frequenti, liquida, varia, pinguedine polli odum quadam permixta, quam catui ul. seu portiones quædam veluti carneæ, mantelle in excretis conspicuæ insequerantur. Ambæ tamen literæ evaserunt, ope meo Medica adjuncta. Inter alia salutaris admodum fuit Balsamus Peruvianus liquidus, ad intestina exulcerata a facibus acerbis, putridisque vindicanda & consolidanda, Clysteribus permixtus. Singularem quoque nobilissimi exotici huius liquoris virtutem fui expertus, tum in immoderatis Diarrhois, tum defectionibus cruentis, quando reliqua parum proficerent. Et sanè admirandus fuit ejus effectus in adolescente quodam, qui atrocissimis ventris torminibus nimium sæviter torquebatur, prodeunte cum excrementis, valde fetentibus, saniosa materia, intestinorum ulcus certò indicante: Mitigari autem illa nullo pacto poterant, diversa licet sopiendis doloribus usurpata fuerint methodice remedia, usquedum Clysterem sequentem infundi, atque insuper istius Balsami, cum nucl. Pineis dissoluti ℥ss. additis Syr. c. Cort. Aurant. ℥ij. & Sacch. clarific. ℥ss. exhiberi ego, & mecum Medici alii duo primarii curavimus. Clyster erat talis.

℥. Rad. Tormentill. Symphyti. aa. ℥ss. Herb. plantagin. Bursæ pastor. Equiseti. Mentæ rubr. aa. mss. Flor. Rosar. rubr. Balsam. stor. Antos. aa. P. j. Sem. Sumach. ℥ij. Coqu. in aq. font. f. q. ad dimidias colatæ.

℥. ℥vii. In quibus dissolv. Sacch. Thom. ℥ss. Bals. Peruviani c. vitello Ovi solut. ℥j. Succ. Plantag. rec. expressi. ℥j. M. l. Clyster.

Cum patiens mox levaretur exinde sentiret post bihorium reiterari eundem jussimus, & sic Divina favente Gratia, ægrum jam conclamatum, pristinae sanitati restitimus. D. Lucl. Schrickij.

De Morbo Hungarico savissimis symptomatibus stipato.

Cum anno 1656. Serenissimus Sueciæ Rex Carolus Gustavus in Polonia funestam cladem pertulisset, milesque ejus dispersus, & morbo Hungarico (quem Clarissimus Sennertus recte Capitalis morbi, *Hauptpestilenz*, exprimit) infectus, Thorunium, quod tum numero lo & ræsidio Suecico septum erat, fuga petisset, Urbs quoque colluvie tanta hominum oppleta morbum istum epidemium hospitio excepit: quo plurimi Germani Comites, liberi Barones, Nobiles, strenui Milites, Cives & plebei misere perierunt, & qui mortem evaserunt, plerique recidivam diuturnam, nonnulli etiam bis, licet non lethalem perpessi sunt. Inter plurimos autem Casus, qui in ejusmodi morbis non rari sunt, sequens commoratione dignus nobis visus est. Henr. Doring. Uratisl. Silesius, sed Civis Dantiscanus è mercatore miles & Centurio factus, mense Mayo eodem morbo gravissime corripiebatur, quem pessimi satellites, utpote capitis & præcordiorum atrox dolor, anxietas cordis, intensissima febris, fitis immodi-

ca, ingens delirium, vomitus enormes, maculae purpureo-lividae, noctes insomnes, inquietudo & somnia virium prostrario affatim comutabantur, eisque tandem horrenda & septem dierum continua epilepsia seadjunxit, a qua ita debilitatus est aeger, ut per duas septimanas sine intellectu, sensu, motu & loquella jaceat; morti proximus esse videretur: nam neque de cibo, neque de potu aliquid assumere poterat, nisi quod ex Medicamentis corroborantibus & cordialibus, vinoque Rhenano penia inuncta labiis semiapertis instillabatur, quem altantes, & præcipue ipsius sæpe visitans plur. Reverendus M. Johannes *Bemmelbauer*. Eccles. Thorun. Senior. ad Div. Mariz Pastor, & Gymnasii Professor, sine commiseratione intrari vix poterant. Verum Divina Dei Omnipotentis ope, Excellentissimique beatæ memoriæ D. Meisneri & nostra diligentia, per selectissimorum Medicamentorum & analepticorum sedulam adhibitionem quasi ex orci faucibus ereptus, & præstinæ sanitati cum multorum admiratione, sed demum post plures septimanas, feliciter restitutus est. Hic nunc relicta militia mercimoniam exercet Warlaviz, & pancreatice valet: utpote quo cum ante aliquot septimanas Thorunii locuti sumus. Remediorum consignationem ob nimiam prolixitatem Observationi huic adnectere supervacaneum esse duximus, cum plurimi Auctores curationem istius luis descripserint: præsertim autem Martinus Rulandus Libro proprio de Morbo Ungarico, cui cum reliquis adjungi poterunt Crato in Consiliis Scholtzii, cons. 274. Sennertus lib. 4. de Febris. cap. 14. de Morbo Ungarico. Greg. Obsv. Medic. lib. 4. prior. lib. 1. Obsv. 29. Joh. Petr. Lorichius Obsv. Medic. Lib. 1. c. 7. Obs. 13. Baldass. Timæus Cas. Medic. Lib. 8. cas. 16. Johann. Hornungus in Cista Medica Epill. 110. Quibus adde, si lubet. Jani Curandi Rumelii Hiltiriam Morbi, qui ex castris ad ralla, a rallris ad rostra, &c. an. 1622. 1623. grassabatur. D. Sim. Schulz.

*De Morbo Hungarico die decretorio per
Temulentiam sublato.*

Lucas Fradel, Austriacus, Civis & Pandolcheus Thorunensis extra portam habitans An. 1656. mense Aprili Ungarica febre correptus graviter decumbebat, sed cum a Nobis Natura ejus fortis medicamentis idoneis adjuvaretur, quotidie majora concoctionis signa circa urinam, & in indicante; præsertim decima quarta morbi die, sudore paulatim erumpente, animadvertimus: tum ille hora vespertina à me petiit, ut ipsi concederem haustum unum vel alterum vini Rhenensis, cui cum, ut vini asueto, permiserim, ille non tantum haustibus, sed totis mensuris illud bibebat, & ita per tres dies aliquot stotfos nostrates (quæ mensura continet quatuor libras civiles) exhauriebat, inde quasi e crapula, dies & noctes dormiendo, copiosissime sudabat, & vix non sudore diffuebat, expergefactus interim vinum largiter sorbebat, iterumque somno se dabat, donec tandem die morbi decima septima, ad se rediit, mihi que pro licentia (quancquam ille mensuræ concessæ modum valde excessisset) gratias egit. Suffragatur nobis hac in parte Ex-

cellentissimus D. Sachsius à Levenhaimb (præpropera, cheu! morte non sine ingenti uterarii orbis detrimento e vivis nuper sublatus) qui *Amplex. sua* Sect. 6. membr. 2. c. 6. ita statuit: Non sempe aegris denegandum esse vinum, modo absque ulla noxa neri possit, si a vide expetatur, cum & in hoc gratia Medici consistat, censente Rod. à Castro in Medico Politico lib. 3. c. 8. Imò copiosius iustum in quibusdam morbis a malo liberat, secundum Primarionum lib. 3. de Vulg. Error. Medic. c. 18. Et paulo post: Proprietas hominis in omnibus morbis curandis magnam habet potestatem, & sunt nonnulli usque adeo comparati ad vinum, ut etiam in extremis morbis eo non possint abstinere; quod nos quoque in isto ægro considerantes, apparentibus signis concoctionis, & circa diem decretorium naturali appetitu accedente, non sine ratione fecisse existimamus, utpote qui ibi natus & educatus est ubi cerevitia nullum locum habet. Coniunge cum his Canonherum de admirandis vini virtutibus, qui lib. 1. cap. 3. §. 18. ita scribit: Vino in febribus & ut alio cuto uti possimus, & §. 5. vinum sudores provocat, eoque serosa materiam non parum per lotium elicitur. Item §. 16. vinum ex quocunque morbo reyaliscentibus prodest: ut ibidem plura prolixitate vitandæ causa reticeam. Porro cum his curiosus Lector conferre Colloquium in Tract. de Potu in Morbis Lib. 2. ut & Hippolyt. Obicium, atque Hippolyt. Antonellum in Apparatu Animadvers. in Eundem. D. Simonis Schulz.

*Vesicatoria quid possint in febribus
malignis.*

Quid præstent in declinandis curandisque malignis morbis, immo vero peste ipsa tonticuli, ulcera, vesicatoria, jam inde ab ævo Galeni cognitum fuit aliquatenus, dignum sane, quod exactius adhuc inquiratur. Sub climate nostro, ubi humores plerumque crassi & pituita segnes, aliquando præfens e vesicatorius solatium notamus, præsertim si ante septimum morbi diem applicentur internæ brachiorum, crurumque faciei, secundum procurum venarum ampliorum; est tamen; cum totis membris frustra admoventur, immo toto quandoque anno nullum ab his evidens auxilium. Ratio à diversitate *perenda* videtur: quoties particulæ illæ malignæ non admodum firmiter coherent, & tenacem non amplectuntur humorem corporis, excluduntur facilius vesicatorio & virus fugax cum sero prorumpente secedit: quando autem in viscida nidulantur materia, aut ipsa mutuo facierum lavore sibi arctius junguntur, eludunt fere vesicarum conatum. Sed qui internoscendum, in quales se malignitas armarit particulas? temperamenti ratio inspecta non sufficit, enimvero adverti visicatoria nonnunquam signissimè pituitosis oppido fuisse salutaria, contra, bile tumentibus nil attulisse levaminis. Ut proinde hoc unum rellet ex Ovidiano penu:

Semper tibi pendeat hamus.

Admovenda scilicet opportunè, præsertim ubi exemplis constiterit, aliis eodem modo, & prope tempore laborantibus fuisse utilia; quod si frustrentur expectationem, persistendum

dum in alexipharmacis quæ nihilo secius adhi-
oj. irbeant. D. Olai Rorichii.

Vesicatorii usus in Malignis Febris.

Nunquam me fessellit Vesicatoriorum usus in
morbis malignis. Nuper saviente febre maligna
in pago Blozenberg, applicare iusseram duo
vesicatoria carpi manuum viri 30. annorum
graviter decumbentis. Paulo post intumescere
manus cum inflammatione & livore, sed evi-
denti cum levamine & symptomatum febris ma-
ligna remissione, intra paucos dies cessavit
tumor, livor, inflammatio sponte, ægerque
convalescit. D. Joh. Jac. Waldsehidii.

*Curatio Febris Malignæ, Viperarum vivarum
deglutitione.*

Mirabilem viperarum esse naturam, & maxi-
mam adhuc partem nobis incongnitam, non ita
pridem Nobilissimus Franciscus Redi ex Obser-
vationibus singularibus Orbi erudito notum fe-
cit. Addam hæc morbi historiam non omnino
incongnitam, ab Illust. & Nobiliss. Dn. Haub. à
M. Seren. Saxon. Elect. à Consilio intimiori-
bus. miniante aliquot menses communicatum.
Apud Salmurienses in Gallæ Ducatu Andega-
vino Anno 1670. corripiebatur Nobiliss. Dn.
Craß B. a B. febre quadam maligna, quæ om-
nium fere Medicorum ibi celeberrimæ operæ illu-
sit, adeo ut ipse Patiens prognostico relinque-
retur. Alius Medicus ex vicinia fuit advocatus,
Empiricus vel Methodicus an fuerit, accurate
non scio, is quoque conclamatum, & de vita
Nobilis ægrotantis jam actum esse conspicie-
bat: nihilominus in morbo extremo ad extre-
mum remedium confugiendum esse ipsi veniebat
in mentem, propterea aditantibus ab eo su-
sum, ut, si vellent adhuc experiri medicamen-
tum aliquod, deberent procurare tres viperas
easque vivas, quas Dn. Patiens vivas quoque de-
glutiret; experientia namq; constare, vipe-
ras veneno resistere. Obstupescunt! sed ob-
temperant, atque summa cum molestia, ago-
nizanti fere, tres viperas vivas deglutendas
præbent, quæ intra trihorium integram affuxe-
runt veneni ve Malignitatis labem, adeo, ut
postea per secesum excreta præ insigni Tumore,
quasi rupi viderentur, quo facto sensim
convalescit Nobiliss. C. B. a B. & per Dei gratiam
peregrinationis metam profectus est. Si dubi-
tare quis vellet de historię veritate, ei autenti-
ca testimonia, si fuerit opus, delinc exhibe-
bo. D. Dauli Ammanni.

De medicamento Febrifugo ex lapide Scissili.

Civis quidam facetiosus, videns Medicum
vicinam suam sæpius visitare, quæsit ex fa-
mula causam, respondenti heram suam febricitare
alterius diebus, utro obtulit Medicinam,
sequenti die ante pa. oxysmum exhibendam:
Quid sit? Hæc infacio Medico assumpsit pulverem
ab ancilla allatum, & steim liberatur. Vnde
factum est, ut omnes fere febricitantes eb ino-
pinato hoc Medico efflagitarent auxilium, &
cum in promptu non haberet suum specificum,
ipsos sapius, ussit parumper commorari in ædi-

bus, interea quæsit in aula lapidem scissilem,
& cultello tantum abralit, quantum pro dosi
sufficere autumat, sicque solo hoc pulvere
multos curavit. Quis hic cum Ecclia non quæ-
ret: Quid mihi prodest, quod maiorem sapien-
tæ dedi operam? Cæterum cum hic de febris
incidat sermo, recordor pulveris antifebrilis
Clarissimi Kergeri, quo plurimos se curare asse-
verat, omisis longis illis veterum præparatio-
nibus & decoctis. Innotuit quoque toti Medi-
corum Orbi compendiosa februm Bartettana,
Salviana & aliorum Virorum curatio, imbiben-
do vel temperando acidum, seu juxta Excel-
lentissimum Willium & Kergerum, præcipi-
tando, vel secundum Helmontium, Philoso-
phum per ignem, saturando. Mihi in frequen-
ti usu est specificum febrile, cujus basis est an-
timonium nitratum, quo multos curavi, sub-
sequente leni vomitu & copioso sudore. Sic
memini, ante aliquot annos periculose agro-
tasse suavissimam conjugem Viri An. plim i &
Consultissimi Domini D. Schnudii, U. J. D. &
Consilarii Hanovienfis eminentissimi, & solo
hoc pulvere, incassum adhibitis aliis, per Dei
gratiam a febre liberatam fuisse, quod innume-
ris aliis Exemplis confirmare possem. D. Joh.
Jac. Waldsehidii.

Arsenicum Antipyretum.

Haut ita pridem fuit nomen, qui asserere
fuit ausus, cuilibet corpori naturali, quin, cuilibet
animali, atque adeo homini, inesse suum
venenum specificum, calidi innati & humidi
radicalis intergerminum amicissimumque hospitem,
naturæ quasibalsamum, huiusque con-
servativum: Hoc veneno, quovis modo ex-
centrico facto, aut ab indole sua declinante,
oriri morbos vari generis, hos autem indicare
veneni conservativi restitutionem in integrum,
& inde pendere sanitatis cardinem. Paradoxa
est sane hæc opinio, & naturæ veneni quam mi-
nime competens, imo contradictorium, esse
venenum, & esse naturæ conservativum. Qua
enim catachresi venenum vocatur, sanitatis
architectus, cum omnium effato venenum to-
ta sua essentia dicatur corpori, naturæ, vitæ
infectum? Siccine cadet ab omni sæculo irro-
borata inter alimenta, medicamenta & vene-
na, specifica differentia? Certe tale venenum
est *indiscretum*. Nil probat, animalia venenata
nutriri suo veneno; morsus hominis irati esse
venenosos, & quæ sunt alia: Nam uti illud est
in controversia; ita hoc non est perpetuum;
potest tamen ira effervescente degenerare in
venenum, qui ante non fuit humor; adjuvant
in morsibus continui solutio, ipsius venenati ira,
affluxus humorum, inflammatio! nec enim so o
contactu, ad instar torpedinis, vel habitu ira-
ti veneant: Est sane opus vulnere. Alium virum
celebrem memini olim statuisse, aut omnia esse
venena, aut nullum esse venenum, cum omnia
etiam saluberrima, vinum puta, excessu adhi-
bita possint esse veneni loco; jubet itaque ve-
nenorum dosin vestigare, & tunc futuca inno-
cua. Scilicet, arduum Vir eruditus cense statue-
re, quod quidquam Deus creavit, non mis-
propter quem omnia creata censentur (quon-
quam & hic aliqui controversiam faciant) to-
ta sua natura & essentia destructivum. Sed quis
exactam venenorum dosin mensurabitur? Quid-

si detur substantia, cujus sit talis à primordio elementorum textura, quæ intro sumta turbet, fermentet, congelet, convellat, enecet? nec enim inde sapientissimo Creatori dica scribitur! Namque, utut propter hominem esse omnia creata forte cenemus, non sunt tamen in eum omnia suæ creata, ut iis velcamur; sunt aliis destinata usibus (sic neque ligno, neque lapide, neque ferro ordinarie velcimur. Occasionem ista proferendi sequens historia suppeditavit: Cum nuper Goppingæ morarer, narravit Affinis meus Maskokyus Med. Lic. se miram oppido febrium intermittentium, at infallibilem in pluribus curam vidisse sequenti medicamine perfectam.

24. Arsenici albi crystallini gr. iij. vel vi. pro ratione subiecti, misce pulverisatum in vitrum parvum lati orificii (*Zuchergl.*) adfunde fluviæ frigidæ s. q. apertum vas colloca super prunas; agitando, dum cesset strepitus: hæc mixtura probe confusa febrienti, per 12. plus minus horas ante jejuno, una vice propinatur; Vbi per horæ quadrantem, aut paullo amplius hanc stomachus retinuit, capiatur aquæ calidæ simplicis præterpropter quartanæ, in hac solvatur butyri notabile pondus cum ovi luteo, duabusque vicibus calide sorbeat, imperata rursus aliquot horarum abstinencia. Insequitur anxietas magna largo sudore profluente; Tollit omnes intermittentes ipsamque adeo quartanam: Auctor perhibetur Monspelienis Medicus Anonymus, cujus filius R. ugravæ Palatinæ e pedibus in Wurtembergico Ducatu plures hoc medicamine perfunxit. Dicitur Dn. Maskokyus periculum se facturum pollicitus est, effectum ubi edoctus fuero, nil restabit quam ut ocyus transcribam.

Paradoxa mehercule cura, arsenicum tantum non crudum intra corpus, idue jejunum tumere! quis enim hanc præ rationem sufficientem facile credat? Quantum conjicio, partes arsenici deleteriz volatiliores, per effervescentiam cum aqua fluviæ, calcis vivæ æmulam, in auras avolant, reliquis fixioribus, eoque magis fatuis: Effervescentiam autem & solutionem calor promovet: Ipsum vero arsenicum potestate salina lactearum obstructions, quæ sunt perpetuæ fere intermittentium productrices (quod in mea Inaugurali de febr. tert. interm. epidem. latius probavi) haud dubie promptius atque alia quævis, expedire natum est. Mixtura pinguis butyracea videtur hac fini exhiberi, ut veneni spicula, si qua ab operatione forte supersunt in visceribus, obtundat; velut alias iis, qui venena sumere, pinguis imperare solemus. Haultus autem pinguis non statim propinatur, ne vomitu reddatur sine fructu, quod modo fuit absorptum. Ego alia methodo intermittentes feliciter abigere didici, tardiori licet, atqui tutiori: nolim imitari: ausim profecto adservare, quantumlibet hac febris tollatur, remanere tamen in corpore veneni characterem; nec ægros hac via curatos adeo prospera valet dinc per vitæ reliqua gavissuros. Alioqui novi Ambergæ Palatinatus superiore adolescentem lorarium a Magistro quotidie vapulantem, vitæ radio, araneum prægrandem contritum cum calcis vivæ notabili quantitate deglutisse citra noxam. An-

hæc duo salia, aranei puta & calcis vivæ semutuo destruxerunt, an araneus, quorum aliqui dantur, fuit *anadict* D. Kosini *Lentulus*.

Ex fagino fructu liberaliter comeso febris lipyria.

Virgo nobilis annorum sedecim, & corpore, animoque valens, dum mente septembris & Octobri in prædio paterno animi gratia rullacatur, & ut erat delicatula, gustus oblectamenta variè quærit, tandem intigentibus paganis quibuldam mulieribus, fagos etiam fructus maturos crudosque ore attingit; dumque in iis nescio quid luave, & linguæ blandiens offendit, largius se suillo hoc pabulo per aliquot dies invitat, applaudentibus consiliariis mulierculis, invenisse se tam gratum herili filiz nutrimentum, & non parcam manu delicias illas quotidie in cubiculum virginis matre in scia, inferentibus. Paulo post reversa cum matre in urbem, sentim fastidit cibos, & pallidior solito de gravitate capitis, angustis pectoris, & veneris inexplcabilibus doloribus conqueritur. Accedunt, corporis totius imbecillitas, pulsus vix sentum ulio observabilis, sitis, inquietudo, partium externarum frigus, illa interea non frigus, sed summum calorem in visceribus hærentem incusante. Advocatus initio joculari credebam virgunculam, ut quæ de ardore corporis quæta, tota rigeat exteris. Sed tentato carpo, notatisque symptomatis comitantibus ægre tandem causam mali ex sculpo, febrimque, lipyriam (qualis jam ante ab aliis, sed nuper crudite descripta est a Raymundo Forti, Medico Patavino l. de febribus) sed nimia glandium harum faginarum voracitate, promde malum aggressus diaphoreticis & alexipharmacis feliciter tandem, Deo fortunante, expugno, Vivit illa valetque sagum jam prudentior advertita. Maneat ergo grans tagium suum, scivorum, glirumque pabulum, humani palati fornicio, quod de copiose tuberculantibus intelligendum. Mereturque hic adjici illud Bauhini in Hist. Plant. l. vii. Nobis sane observatum, fagineam glandem, potissimum virentem, & nondum exliccatam, si paulo copiosius comedatur, solui instar caput turbare, ac ipsos etiam sues ejus elu turbulenteros reddi, & tandem obdormisere: id quod etiam Schvvenk scidius testatur: qui ait caput tentare, & inebriare eos, qui nimium comederint. Sed febrim lipyriam ejus elu excitam nemo fortassis antea observavit. D. Olay *Borichij*.

Tertiana halecis esu curata.

Sorror quædam mea ex esu halecam tempore æstivo febrim sibi causavit tertianam, sed cum per dies aliquot febrientis, aliquando me halecem elitantem viduaret, appetitu in igni instabatur, cui me adversantem simulane, sed clandestine famulis concessi, particulas quædam halecis, elui ei porrigere. Quo facto, febris omnino decussit, & sanitatem ægra pristinam recepit: Idem mihi contigit in alio febriçitante ex concessio potu aquæ frigidæ. D. Jac. *Dchemid*.

De Curatione Febris tertiana per terrorem.

Beatus Rolfincius scripsit Ordin. & Method. med. spec. comm. pag. 1024. Non raro medici vice fungitur terror, & quod illius superat captum, hujus sequitur raptum. Finem imposuiffe quartanæ refractariæ experientia docuit de improvise subortum. Febris Tertianæ immersione aquæ fluentis curata notatur Anno 3. Ephem. Germ. Obs. 211. Retulit mihi nuper quidam Magister Equitum, se tertianarium servum in paroxysmo perterritum, exploso in ipsum inopinatum sclopeto, pulvere pyrio & papyro reposito, à febre contumacissima liberavisse.

Scholium) Terrorem non solum in febribus curandis, sed aliis etiam in morbis magnam habere efficaciam, scimus. Sic tertianam ex bombardæ improvisa explosione Ephem. nostr. Dec. I. Ann. 11. obs. 150. ex immersione in aquam Anno 111. Obs. 211. quartanam ex cymbæ in aqua submersione cit. Obs. 150. ablatam recenset; quale per terrorem sanata quartanæ exemplum etiam in Ambros. Paræo libr. 1. cap. 23. Anno 2. Zod. med. Gail. mens. Jan. & decad. 4. observat. 1. Scharderia refertur. Paralytin veteratam & singultum gravissimum eodem remedio ablata describit Franc. Valleriola libr. 3. observ. 4. paralytin & contracturam Dam. Beckerus de cultiv. Boruss. quæst. 9. epilepsiam Dom. Cals. Theoph. Bierlingius advers. curios. 13. Dom. Thom. Bartholinus centur. 3. histor. anat. 41. arthriditem Phil. Salmuth. centur. 1. observat. 48. sanguis ex utero fluxum & oris inflammationem Guern. Rolfincius ord. & meth. med. spec. comm. lib. 14. sect. 3. scilicet cum spiritibus ab improvise aliquod casu magnus terror, incurritur, violenta eorundem commotio contingit, ut ita, qui antea sanguinem aliove humores, crassitie, quiete aut tempore peccantes sufficienter agitare atque attenuare haud valebant, nunc potentiori nisi subigendæ & alterandæ eidem pares evadant; quin & iidem viscosi præter naturam genitis particulis incarcerati quasi, sopiti, aut etiam ab aliis hostili acredine intestis lacerati, jam veluti relectis copiis ab eorum imperio sese evolvant, easque disiciant; aut regressi ad centrum suum, sanguinem in motu aberrantem, in ordinem sic redire cogant. Sed hæc sunt fortuita, nec facile à Medico imitanda, curam utpote satis incertam, & periculosam involventia; cum nec semper ea sic causæ morbificæ conditio, quæ illi extraordinario spirituum cedat insultui, aut eum patienter perferat, vel etiam spirituum non idem vigor, qui perturbationi illi sustinendæ sufficiat; quin potius hos dissipari, omnino suffocari, morbumque augeri, aut navum induci, contingere queat, unde non pauciora, sed facile plura exempla recensere liceret, quibus terror incessus varios morbos; aut ipsam etiam mortem inferendo, perniciosus exitioque essitit. D. Jac. Augustini Hunerunff.

*Anatomica inspectiones**Febres Hæctica & lenta.*

Felias Dom. Poupart Regii in camera com-

putorum Auditoris, cum bimestri Tertianæ laborasset, nec ad medicamentum adduci potuisset, cum cœlum incanduit paulum, datur medicamentum cui indormiendum imprudens Pharmacopæus censuit, medicamentum inane fuit, movit, nihil exclusit: Ab eo tempore vix febris experts: De Dolore capitis, de quo prius non conquerebatur: dum paroxysmus repetit, repente *apoplexia* fit, elatis in cerebrum vaporibus, imo & febre ipsa jam cerebrum occupante (unde calor acerrimi sensus apparebat) ac si febris esset Capitalis, ut sic loquar: per xxiv. horas *apoplexia* fuit & *apoplexia* eum prehenderat virtus erat debilis, nil natura præstitit quamvis irritata, Convulsus interit.

In cerebro nihil deprehensum, vena intumuerant parum: vi febris interit, obfesso cerebro quoque, ut interea non esset flabellatio cordis ob respirationem non liberam. Jac. Thevart Annot. 3. in cons. 58. Ballonij lib. 1.

§. 4. Audimus D. Cardinalis Lotareni, qui febre velut capitali interit, aperto capite repectas venas omnes adusto plenas sanguine, & meninges veluti tactas de cœlo & sideratas. Ballonius Epidem. & Ephemer. lib. 2. pag. 129.

Illustr. Baronissa de Coudrée, ætatis ann. 65. sterilis, post casum ex rheda in partem capitis lævam, deluxum persensit in maxillam diuturnum & dolorificum, unde Febris, sudores nocturni, melancholica phantasmata; Vario successu dimicatum est, tandem Febris invaluit, & mortalitatem exiit.

In aperto cadavere Pulmo repertus est inflammatus & lividus, cum maculis nigris: Ventriculus amplus, cor flaccidum; hepar extremo loco lieni adhærens, Uterus immense tumens & plane scirrhusus, Prostratæ ovi magnitudine refertæ pure: Cystis fellea referta lapillis & scirrhusa. Ex schedis Clar. Dom. D. Alexandri Diodati Medici Genev. & Dacani.

Duo sunt quæ inter accidentia symptomataque in febres, quæ hac tempestate grassantur, incidentia numerantur, quibus plurimum ægri torquebantur, Singultus ac Tussis: Nec ita quidem molesta esse cœperunt, vel quod totum febris tempus occuparent, vel quod brevissimo tempore divexarent: Vidimus enim incunte statim accessione ita suffocationis periculum oboriri & tussis molestias, ac si nulla vitæ spes relinqueretur, desinente accessione placide ac sedate habebant: Singultus autem in nonnullis ita molestus fuit qui febre nocturna, mox diuturna, cum destillatione in pulmones laborarent, ut omnia præter Singultum moleste ferrent, In his fuit Dominus de Bures, cui antequam cessaret singultus, totum corpus intumuit: Detumesciente corpore repetit singultus, afferens ei aliquid permolestius quam ante: nam & ulcusculum excitavit in partibus ad orificium ventriculi attrinentibus, nam cum quid deglutiebatur aut calidiusculum, aut manifesta qualitate præditum, percipiebatur in imo œsophagi dolor: Illi autem à Singultu, cum abdomen inflatum fuisset, alvus biliosa reddidit, post excretionem bilioforum sequuta sunt purulenta, quod mirum est, Nec credimus hæc à pulmonibus emanasse, quamvis hos laborare suspicaremur: cum enim à partibus superis tale

quæ-

*Febris Hæctica Phlegmonarum internarum
fere comes est.*

Vidi inflammationi laxioris Intestini diutius succedere Marcorem, ac stomachi, ac vesicæ, ac renum: Fuerunt autem nonnulli qui affecti erant difficultate intestinorum, Et ut in summa dicatur, quoties præ exsiccatum cordis ipsius corpus febrilem calorem susceperit, solutu difficilem. Hector Gibaltus comm. ad cap. xii. lib. 1. de differt. febrium Gal.

D. Sagittarii (Serenissimi ducis bavarie consiliarii) cor tabidum ex toto apparuit, ita quidem exsiccum & parvum, ut quod Thonerus de ejus cerebro ab aliis illusum recenseret, id nigredinem ex usu Tabacci frequentiter contraxisset, hoc ego de corde verissimè affirmare possim: Sanè aliquot septimanas antequam occumberet Vir clariss. consumptis magna ex parte spiritibus vitalibus & animalibus in utroque oculo visum perdidit: Mortuus tandem est anno hujus sæculi 47. non præcisè ex vomitu, ut Hæferus narrat. ex tæbe & febris Hæctica consumptus interiit: febris inquam Hæctica quartum magnitudinis gradum adeptæ. Franc. Ignatius Thiermair. conf. 5. lib. 1. p. 75.

Puerum novem annos natum xix. Martii 1669. secui: laboraverat is febre hæctica per quinque fere annos. cor autem nobis mortuus ostendit durum, longe infra sætatis magnitudinem, vasis tamen præditum tam amplis, ut viri perfectæ ætatis capacitatem æquarent. Pericardium laxè illi circumdatum, salso liquore repletum. Pulmones indurati costis adhæserant, omni sui parte purulenta materia expleti. Folliculus felle tunicæ virilis magnitudinis, nigricantem quandam substantiam imbiberat.

Probabiliter magis quam vere scribit Vesalius in Viris minus aquæ, in scæmolis plus inveniri: Seduxit etiam plures, ut Bauhinum, Jul. cæsserium, claudinum & alios, qui eodem tenui conjectura moti tradunt in hæcticorum, Phthisicorumque & marasmo laborantium Pericardiis nihil aut minus aquæ reperiri: Ego autem in iis semper plus humoris quam in aliis offendi: Rem eam pluribus experimentis veram hucusque cognovi, & mecum alii, Excell. Chr. Majus, & I. D. Hortius Anatom. Observ. 7.

Ego ubi hoc loco (pericardio) nonnonquam tres, quatuor, quinque aut sex uncias, aliquando libram illius humoris inveni, tandem eorum cerebro, opera administri inspicere non superfedi: profecto in ventriculis hanc aquam quoque multo cumulatorem sæpius deprehendi: In iis pedes aqua erant tumidi, in abdomine minus, plus aquæ in thoracis cavitate erat, ac in cerebri ventriculis aqua erat sane quam notabilis. Horum quidam ante mortem amiserat memoriam, quidam mente non satis constabat, Quidam, inquit Dn. D. Wepferus phthisi obiit, ac remoto cranio plurimum feri subpallii in omnibus ventriculis & spatio inter meningas reperti, C. V. Schneiderus l. 1. de Catarrh. c. 9.

Inter febres symptomaticas refertur quæ vulgo Lenta appellatur: qui hac laborant plus debito incalescunt præsertim à pastu, motu quovis aut exercitio: urina plerumque rubicunda est, spiritus sunt debiles & vires dejectæ, circa appetitum & somnum se modiciter habent, Iussi aut spuito copioso carent, verum in dies, (tabidorum instar) & sine causa manifesta marcescunt.

Quendam tali morbo defunctum aperui, in quo viscera coctioni dicata satis rectè se habuerunt, Pulmones vero erant excisici & aridi, necnon materia sabulosa instar cretæ per totum obfita: Non in hoc affectu mesenterium glandulis tali materia argillacea repletis oblidetur. Fernelius.

Filiolæ Dom. de la Vau mirum quid contigit, febris continua, dolor lateris sinistri, is fugax fuit nec perseveravit: inde dilata est phlebotomia, bene habere visa est, febris recruduit, difficultas spirandi, moræ.

Aperto corpore, Epiploon pure perspersum erat, à thorace fluxerat. nam totus sinistèr pulmo, & thoracis pars sinistra pure plena erat: Catarrhosa erat nec expectoraverat quicquam unquam. Gul. bathonius Epid. lib. 2. pag. 161.

Pulmonis vitium ex tenui, acri multaque distillatione è capite in hunc ipsum illapsa, cum Lenta febre notavit Jodocus Lommius Observat. med. lib. 2. Tale quid anno 1624. in Olao Slangeldorpio observare licuit Patavii, qui à febre continua in itinere Neapolitano contracta Romæ vix sanatus, extenuato corpore quum superatis Hetruriz montibus Patavium rediisset, intra paucos dies vitam cum morte commutavit: Viri eximii Guerneri Rolincii opera thorace aperto causa mali patuit. Job. Rhodius cent. 1. observat. 4.

I. Hæsius ex gravi percussione lateris dextri versus dorsum in tribus primis collis spuris, à qua flatulentus œdematosus tumor procreatus, per gangrenam & cariem 1638. extinctus est: in cadavere aperto pleraque sana, nisi quod in mediastini intercapedine vomica existeret crasso pure repleta: similisque sterno sub pleura incideret, eo loco ubi mediastinum connexum erat, vomica affectum, ita ut inter seledue hæ vomicæ communi aditu paterent: In abdomine magna puris copia innatabat, præcipue ad aqualiculum collecta, quæ ex pinguedine omenti & intestinis adnata, per Tabiticam febrem eliquata fuerat: Quam suspicionem O. Heurnio auxit residua omenti & intestinorum pinguedo, quæ diffuens similem idæam purulentæ materiæ representabat. Bartholinus cent. 2. Observ. 59.

Cadaver aperui cujusdam qui lateris apertionem admittere noluerat: in latere materia purulenta nidum habuerat, unde in thoracis cavitatem decidens, ibidemque in copia ingenti aggelata, & pulmones continue immerfos polluens, febrem lentam, & quasi Hæcticam, à qua æger valde senex interiit, excitabat. Willis Pharmac. rat. p. 2. sect. 1. cap. 9.

Multoties deprehendi integris pulmonibus, vel utramque pectoris cavitatem, vel alteram aqua plenam: Interim pulmones corrupto in aqua natantes vidi: unde cum Hipp

quæ ut eo citius desiderato fine potiretur, fortiora sibi expetebat, imo jam se portu sanitatis navigare firmiter persuasum habebat. Verum longè alia mihi mens erat, quam R. P. Confessionario ejus clarè satis exposui, prædixique hunc esse extremum naturæ conatum, quando quidem præter alia cadaverosus odor cubiculum satis amplum implens moneret, interiora corrupta omnia esse, Illulrenique Dominam non procul ab ultima rerum linea consistere: Itaque dum discedendum mihi esset, confortantium præcipue usum commendavi, reservatis reliquis ad reditum usque meum, quo tamen opus haud fuit: paulo enim post, cum nihil minus quam mortem cogitaret, subita lipothymia correpta obiit.

Cadavere me absente, quod valde doleo, aperto, oppidò apparuit quæ subitæ mortis, quæ tot aliorum sumpto natum, quibuscumque per tot annorum decursum confictata, causa fuerit: Mitto à Chirurgo observata, & lapidis in ventriculo reperti formam, &c. Cerebrum, quia plenissimum instabat, plenum erat & sanum: Pulmones velut arefacta spongia deformes, inter utramque alam purulenti, undique adnati: Cor valde parvum sed sanum. Ventriculus contractior siccitate, magnitudine ovi anserini, plenus materia cruda, quasi ovi putridi: Interius ventriculo accreverat lapis durus, griseus, quem abruptere coacti fuimus, crassus pollicem, longus articulum: Diaphragma arefactum, Abdomen plenum aqua, circiter quatuor cantharorum: Hepar magnum, durum, densum & colore præternaturali: Lien parvus valde & contractus, sicut & Renes, omnia informia, Mesentericæ Venæ obstructæ omnes: Intestina statu plena & aqua, Summa omnes muscoli tabe flaccidi, uterus & vesica tam parva, ut puerilia, sed inania: Slesvici 26. Julii 1659. Ioel Langelot Epistol. ad Thomam Bartholinum centur. 3. Epist. 49. & 50.

X. Martii 1676. in Puella octo annorum, quæ Febre Hæctica interjerat, observavimus ventrem infimum mediumque sero valde lento repletum: Pericardium quoque ejus notabilem continebat copiam: Pulmo sinister totus purulentus pleuræ firmiter agglutinatus: Glandulæ mesenterii omnes, similiter ac illæ quæ venæ Portæ trunco circa Hepar adsitæ sunt, insigniter tumefactæ glandulæ: Pancreas cum conglomeratis aliis, integre satis se habebat. Gerardus Blasius Observat. Medicæ xij.

Monachus Franciscanus ex Febre Lenta; dyspnœa post mense aliquot, cum delirio ad plures abiit.

In cadavere aperto visi sunt nobis pulmones lividi & exsucci: Lien cæculus & exilis, Intestina hinc inde inflammata, sicut & interior Vesicæ facies: Nihil tamen in urina viventis vitii comparuerat: Cætera sana videbantur, nisi quod totius corporis habitus fuerat extenuatus. Bartholinus cent. ij. histor. x.

Apertum est cadaver Cathar. Mathyloo Leodiensis, quæ nata erat annos xv. causam mortis in nullo viscere externam deprehendimus, nam animi anxietate ex ærumnois vitæ afflictionibus contracta in Tabificam Hæ-

citicam miseriam inciderat: quippe in prava diæta cum haberetur, & pessime tractaretur ab iis apud quos victum laborando conquiebat, nullo commodo nutrimento partes sustentatæ, & ad incrementum naturæ equitandum fultæ fuere: Unde enata Diarrhœa, ex humorum corruptela & intemperie, viscerum naturalium & vitalium omnes vires devolvaverat, cujus manifestæ spectabantur indicia in visceribus omnibus valde flaccidis, præcipue autem Corde & Pulmone: Venua etiam in dextro pulmonis lobo aderat: & supra pericardium, ubi membranz mediastini ei connectuntur: ad cordis apicem glandula nucis juglandis solida, valdeque densa exstiterat: Thyroides etiam glandula in jugulo eandem constitutionem obtinebat, sicuti etiam in Mesocolo eaque majores, & in mesenterio, sed minores, inter quas erant varix atheromatosis multam obtinentes: Plurima aqua pericardio inerat, cordi autem sanguis paucus: sed Pancreas à magnitudine & consistentia naturali non variabat, sicuti nec Lien: Renes flaccidi erant & laci, præcipue in parte ima, sed ureteris utriusque extra renem in exordio progrediens valde amplus: nihil tamen calculi aut sabulosi in renibus aut vesica deprehendebatur: Omentum omni pinguedine exspoliatum erat: Hepar flaccidius & colore fulco ad luridum vergente, cæterum naturaliter comparatum: Uterus minimus erat & durissimus: Testis uterque gracilis & longior naturali figura: Tuba non apparerat, sed vas deferens à teste ad uterum aliquatenus conspicuum erat: Vasa ad fundum & collum uteri protensa tenuia erant, quoniam nondum menstrualis fuerat: Totius corporis habitus gracilis & exsiccus erat. Ottho Heurnius Histor. xv.

Febre hæctica lætæ quidam cum periisset, in corpore nihil observatum, quam quod glandulæ, illæ duæ, quæ Pyloro à natura appositæ, (vel potius circulus qui est in pyloro) duritiem & scirrhum contraxerant, ratione cujus proculdubio alimentis non.

Glandulæ lumbares conspicuæ magnitudinis erant in corpore hæctico, quantum cum lymphaticis commercium manifeste videbatur: Hæctici hujus Mesenterium computruerat, Omento pentas absumpto, Ingentique aqua ad viridem vergentis quantitate in abdomine collecta. Thomas Bartholinus Epist. 70. cent. 2.

Cadaver D. Miron Regii consiliarii, febre lenta mortui, & adeo exsucci ut nec carnem nec pinguedinem habuerit, sed loco musculorum fibræ rubentes remanserint, & ossa cute sicca & arida fuerint vestita, Paulus 18. Junii 1639. apertum fuit plurimis presentibus, imprimis Gualdone Patino, visu digna hæc notabat vir doctissimus, 1. Omentum corruptum, gangrenatum & totum fere consumptum. 2. Ren dexter gangrena correptus, putridus & nigro colore tinctus, cui impactus calculus in medio, crassus & longus minimi digiti magnitudine, cujus apex ureteres ingrediebatur, quos rano bilurco obstruxerat, hic ren adeo corruptus fuit, ut nisi aliunde mors obvenisset, mortis potuerit solæ esse causa. 3. suppressione urina brevi sine dubio sequutura.

Alter Ren neque putridus erat, neque ulcerosus, sed lividus totus propter lymphaticam cum dextro, qui præter hauram nihil reni habebat simile. 3. Hepar grande sed durum multis in locis, plenum putridis tuberculis de foris, & parvis abscessibus interius, ex quibus prodiit materia alba & crassa linegnatis intar: sed magis putrida inferior pars quæ reuic tangit, superior collis aduata, color lividus, sanguis contentus crassus, lividus & putridus: 4. Lien non valde vitiosus, solo colore livebat, quod forsitan vitium ab hepate illuc amplitudine sua protenso contraxit: 5. Intestina decolorata, imprimis jejunum nigriculum, & nonnihil siccum durumque. 6. Mesenterium consumptum nihil spectatoribus reliquerat præter glandulas nonnullas virides & pure foetido tectas: substantia ipsa mesenterii videbatur in pus resoluta, quod tribus ultimis morbi mentibus per ventris fluxum evacuauerat: distincta tamen erant vasa, venæ & arteriæ, ob copiam sanguinis stagnantis. 7. Pancreas durum, scirrhosum & exue. 8. Ventriculo naturalis erat constitutio, & vesica lotio plena. 9. Pulmones duo plane purulenti, pleni tuberculis nigris & cæruleis, quibus appertis eluxit pus album & spumolum cum sanguine livido & nigricante, præter partem inferiorem sinistri, quæ tota rubebat, dura & sicca, cum aqua rubræ clara: tinta unica in cavitate. 10. Cor exile & aridum, quale illorum esse solet qui febre lenta moriuntur. *Thomas Bartholinus cent. ij. observ. xix.*

Nob. mulier adolescens nupta viro Illust. propectæ jam ætatis filium illi peperit: Marito è vivis sublato, vidua in manumilla sinistra tumor prodiit durus, &c. mox postquam sanata fuit in gravissimos dolores incidit circa osium nudam, præcipueque articulorum regionem, cum capitis intolerabilibus cruciatibus erumpentes. Medici suspicati à lue venerea eos procedere, curationem eo dirigebant, atque suffitibus ex cinabari medebantur: Accersitus ego, eam sub strato decumbentem suffumigii que ob lectum carbonibus accensis calefactum, calentem sudantemque deprehendi, & de doloribus circa osia atque calvariam conquerentem, febreque simul laborantem, quæ suas habebat certo tempore exacerbationes, easque præsertim post cibum sumptum. Cum & Medici & Chirugi eam lue infectam mihi narrarent, Ego singulis exacte perpensis, ostendi arthritidem esse hunc affectum, neque dolorem illum, circa osia se offerentem, quæ quartam luis speciem constituit, multis rationibus probavi, Quare à suffitibus illis, quibus jam diu usa fuerat, & qui febrem Hæticam in ea pepererant, abstinere iussimus, & pro doloribus arthriticis remedia convenientia adhibuimus, verum cum præter hunc affectum, circa coxas, humeros caputque eum affligentem, febremque Hæticam eam consumentem, febris Putrida simul accessisset, unde cardialgiæ, vomitio post cibum sumptum fere continua, ac nenses aliquot supervixit, tamen sensim tot morbis labefacta, tandem è vivis excessit.

Corpus demortuæ à medicis sectione diuisum, atque undique diligenter inspectum hoc pacto constructum deprehensum fuit: Capitis cranium crassum atque integrum sine lucturis, Ventriculi in cerebro aqua limpida pleni: Manima sinistra, quæ dum viveret scirrho laboraret, circa radicem scirrhosa, ut & circa papillæ radicem scirrhus erat candidus, glandulam representans. In collis vena lora nigricans. latebat: Hepar sanum nec vitiatum: Vesicula felis exterius nigra, intrinsecus ulcerata, & bile atra, quæ picis instar splendebat, repleta: Lien totus putris sanguine nigerrimo oblitus: Venæ melataicæ tumentes & sanguine atro turgentes, eoque crasso & veluti concreto, qui è majoribus venis, coralli instar nigri, invicem coharens extrahebatur, venæque ex illis ventriculum implicantes latæ & varicosæ erant: In rene dextro calculus triangularis, albus, mucosus obvolutus inventus fuit, in sinistro tantum arenulæ: In reliquo corpore sanguis, in vena cava paucus, uti & cor, quod parvum erat, exangue cernebatur: Ex quibus præcipue his vitis satis conicere potuimus in venis causas & putridæ & hæticæ febris, atrophiciæ, aliorumque partium naturalium symptomatum fuisse, quæ mortem illi potius quam arthritidis, quippe quæ curari potuisset perierunt. *Platerus Observat. lib. 2. p. 504.*

Anno 1595. puellam annorum xii. aperui incantata quæ credebatur, adeo mitis symptomatibus per octennium correpta fuerat: Huic cor intra pericardium aquæ virulentæ innatabat, cui color viridis ac si marinam vidisset aquam: Causa mortis Pancreas erat, quod mirum in modum intumuerat, Jecoris cavæ parti ætissime adnatum, ita scirrhosum ut lapidem tangere te existimares. Dissectum candido plane intus conspiciebatur colore, h. ud aliter ac si albam pituitam admodum induratum tractasses. Extenuata omnino erat, extincta febre Hætica. *P. Parvum Observat. 14.*

Famula quædam cum longo tempore non sine febre decubisset, per me tandem utcumque restituta fuit sanitati, ita ut aliquot mensibus foras prodiret, Verum postea facta recidiva, rursus aliquot mensibus decubuit, neque tunc ulla medicamenta adhibuit, nisi cum jam macie exhausta jaceret, cum Febre Lenta, sitique continua & fluxu coliquante: Atque cum tunc ad illam accitus essem, tumor circa stomachum apparuit rotundus, ita ut tunc apostema esse videretur, atque instante jam quasi morte, & remediis aptis adhibitis nihil juvantibus, & cum ex tactu pus sentiretur, constabat intus latere abscessum jam maturum, Chirurgus accitus incisionem in moribunda tantare non fuit ausus, nam die uno vel altero sequente obiit.

Facta post mortem incisione, inventus est lobus hepatis supra stomachum ascendisse, totius hepatis membrana illesa quæ hepar continebat: sed ea incisa tota hepatis substantia corrupta & purulenta, vomica instar undique effluxit in capicitatem ventris cum putore intolerabili. *Forestus lib. 12. Observat. 20.*

Vid

Vidi cui Hepatis parenchyma, illaesa sola superne, in pus verum fuerat sub languida febre ac frequenti leipothymia. Heurnius aph. 41. 6.

Vir Nobil. Jacobus Myro, Senator Parisiensis, cum esset raris texturæ & inermis valentissimus, circa initium Februarii 1640. incidit in febrem continuam, quæ ex prægrandi abicenu rupto in Mesenterio, cum pravis aliorum synptonarum, præsertim vero diarrhoea biliosa & icterica, jugibus vigiliis, hæmorrhoidibus, & universi corporis coliquatione, versa est in lentam symptomaticam, qualem graphice describit Scholæ nostræ lumen Fernellius 4. path. cap. 16. Ex hoc affectu postquam decubuit Nob. Senator, per quinque fere menses, quibus in dies pugnatum est arte medendi, tandem exitum superavit opem quæ victa jacebat, fatisque cessit morte lenissima, sine ulla vi, ullaque tortione, quaque placidiorem nullam potuisset unquam sperare aut optare Augustus ipse, sine ullo cruciatu & tormento, quam *visitationis* nomine indigitare solebat. Transactis ab excessu horis xii. dissecavit cadaver.

Inter cetera observatu dignissima quæ consulto annotavi & hoc unum fuit, Ren dexter, ex cujus vicio supra annos x. (zvisissimis doloribus nephriticis multoties fuerat devexus) totus putris & in tabum redactus deprehensus: In cujus media substantia & cavitare oblongum & obliquum calculum comperi, angulosum, & ut ita dicam, cornicularem. Jam multum temporis erat ex quo haud dubie Ren ille non solum putris & sanior, verum etiam totus gangrenosi affectus & corruptissimus, sui muneris nihil quicquam edebat, & propria secernendi sanguinis & feri excernendi facultate destitutus erat. Qui enim potuisset obstructo meatu à glandiore calculo, & corrupta ad eum putredinis gradum propria substantia, ut ipsius renis nihil aliud quicquam haberet præter figuram & tunicam, quæ pro renis substantia merum tabum, idque nigerrimum continebat. Et tamen nulla unquam laboravit per totum morbum urinae suppressione: Quod sane sæpius quoque à xv. annis in hac populosissima urbe, callosissimam feracissima, observavi. Ergo non est semper verum uno Rene obstructio alterum statim cessare ab officio, cum ægrotum plurimi urinam profundant alterius Renis beneficio ad ultimum usque vitæ momentum: Ex Observationibus Excell. Guidonis Patini Doct. Med. Parisiensis & Facult. Decani.

Laborabat vir Nobiliss. D. Gul. Poole, ultra sexagesimum aliquot annos progressus, habitu pleno, febre quodam lenta, ut plerumque solent senes, cum apeplia, virium languore, aliisque symptomatibus, qui tandem jugulatus mortalitatem exiit.

Aperto post mortem corpore, inventus in vesica urinaria calculus, durissimus pyriformis, in medio secundum longitudinem peritus: urina ex eo tanquam canali quodam sine omni impedimento profluente, xiv. unciam pondere constans: In hoc Nob. Viro

nulla apparebant calculi signa, quæ quidem fuerint observata: nullus ponderis sensus, nulla unquam calculi in vesica coagulati suspicio: ut miretur quis non ime causa, quomodo neri potuerit, ut tantæ molis & ponderis lapis ab ægro non discerneretur. *Federici Lepii observ. 55. lib. 3.*

Hac nostra memoria à corruptione uteri observatum est primates mulieres inter, febre latente & blande agras tractante, quod expectationem sperique Medicorum non infamit nota & ignorantis impiectione deest: pat. Ballonius Histor. 1. lib. 2. consil.

Febres Intermittentes.

Aliquoties publice quibusvis præsentibus, in Notocomio Academico ægrotum præter alios graves affectus, intermittentibus quoque febribus, & quidem non raro manifestis diutine laborantium, & tandem mortuorum cadavera dissecantes, per syringam hunc rei aptam, intudimus faciem volatiliem liquidum, & tinctura cœrulea retentum in ductum Pancreaticum ubi in tenue meatu insertum, qui sal quoniam nunc in putres, nunc in pauciores glandulas non penetrabat, dum in ceteras tum viciniores tum remotiores, & quidem non coloratas, tam interiores quam exteriores admitteretur, ipsaque colore suo ingereret, obitaculum atque hunc inde latitante, propter quod ne per laterales Pancreatis ductus omnes in connexas ipsi glandulas mearet, Liquor intus impeditur, spectatorum nemo non videbat, & procul omni dubitatione agnoscebat. Fr. Sylvius Præleos l. 1. c. 30.

Obstructionem in Pancreatis ductibus observavimus in femina febrem intermittentem passa: In cujus dissectione per syringam intudimus liquorem volatilem ac cœruleum in ductum Pancreatis majorem, ex quo in pleurosque ductus laterales penetrabat, dum in perpaucis propter obstructionem sistebatur, unde dicto colore inficiebatur ipsa Pancreatis substantia in uno loco & non in alio. Regnerus de Graaf Tractatu de succo Pancreatico cap. 2. thesi 175.

Recordor egregiam & Nob. Domicellam Annam de Gatinois, uxorem N. xx. ante annos Tertiana autumnali laborasse, quæ in continuam & modicam tamen mutata, totam hyemem viguit, sed insignita zvisissimis stomachi doloribus, duas trespas horas statim ab assumpto cibo juvenulam graviter exercens, Verosimile sane fuit focum Febris causamque doloris adeo æperbi in Pancreate latuisse. Nam hujusmodi dolores deinceps observavi à Scirrhuso Pancreate, graviter premente ventriculum, cibo distentum excitari, aut potius recrudescere & exacerbari à compressu ventriculi cibo pleni: Et nominatim in Reverendo Canonico Qui quatuor ante mortem annis de his doloribus fuit apud me semper conquestus, id enim contulit satis ex dissectione corporis: Car. Piso Sect. 6. de morbis ab Illuvie serosa pag. 194.

Vir quidam Nobilis Campanus Sanguineo

& melancholico temperamento, incidit in Febrim cum quodam dolore ad Dorsum Lumbos, & totius corporis tremore insolito, qui post paucos dies feliciter deliit fluxu hamorrhoidalī, lento quidem & paucō, sed dolorifico, post aliquot dies utroque symptomate adancto. Is auxilium Medici reculat, nullam a Medicorum præceptis opem sperans, incurabili quodam, ut aiebat affectu laborans: Morbum enim magicum esse; Ingravescente affectu & Febre incandescente, accitus D. Guido Patinus Medicinam illi fecit, venæ sectione iterata & purgatione blanda ex cassiæ medulla, foliis lennæ & syropo diarrhodon ægri statum perduxit ut in convalescentiæ spem lubens deveniret: Tandem quum vino multo, eoque meraciore usus esset inscio Medico, invaluit Febris, prostratæ vires, fœtor corporis nulli ferendus: tandem cum *diuresi* & lugaci delirio extinctus est.

In dissecto cadavere apparuerunt omnia viscera nutritia supra modum pallida, a veteri intemperie biliosa, quæ toto vitæ decursu dominatum obtinuerat, sed absque ullo eorum substantiæ vitio: Ex utroque Pulmone leviter compresso serum putre & fœtidum defluebat; Substantiæ cerebri serum multum intar feri lactis subvirescens innatabat, cujus portio in spinam dorsī decidua, Tremorem illum initio morbi concitaverat. Mortis autem causa fuit ingens abscessus in toto Pancreate latitans, cum multo pure & fœtore intolerabili; pure inquam valde putrido & subviridi, cujus acrimonia glandulosum corpus pene universum excederat atque discerpserat. Thomas Bartholinus cent. ij. histor. xxxix. & Epist. 23. cent. ij.

Febris Tertiāna in sene lethalis ob vitium peritonæ, mesenterii & pancreatis.

Cum anno C. 1668. Illustr. & Rever. Dn. Ioh. Rozycki Episcopus Chelmenſis &c. septuagenario major Thorunī ut Commissarius Regis Poloniæ degens, ii. Aug. in Febrim Tertianam exquisitam incidisset, ab eaque adhuc in isto mense per medicamenta opportune eidem à Nobis exhibita, fortunante Deo, scil. purgationem levem, venæ sectionem, & pulverem nostrum antifebrilem ab eadem liberatus esset: accidit ut ex pravo victu, nempe fructuum horariorum atque vini ceralitis nimio usu, die 2. Septembr. recidivam passus sit: qua iterum benedicente summo Archiatro, beneficio pilularum nostrarum antifebrilium feliciter profligata, hinc sanus utique ad Abbatium Mogilnensem novem miliaribus Thorunio distantem profectus sit, ibidemque usque ad annū 1669. ultimos dies mensis April. satis vegetus, in ista præsertim ætate permenſis: ubi tum ex nimio esu lactis coagulati & cremoris ejusdem, secunda vice in Febrim Tertianam recidit, ad quem ego 2. Maii veniens, post secundum paroxysmum lene evacuant porrexi: subsequitū autem 4. paroxysmo venam dextri brachii medianam incidere jussi, tum ventriculo corroborantibus prospiciens febrem denuo. Deo propitio, abegi: Sed cum ille ex lactiniis, qui-

bus admodum delectabatur, accedente ita, tertia vice in huc Junii recidivam incurrisset, tertia Julii viribus prostratis vitam cum morte commutavit; ad quem 4. Julii ejusdem mensis vocatus accedens, cadaver cum permissione domesticorum aperire jussi.

In quo omnia secundum naturam, inventa fuere, præter peritonæum & mesenterium atque pancreas, quæ singula nonnihil corrupta & saniosa deprehendebantur: Hepar etiam durius secundum naturam esse consuevit erat.

Apparet inde quam vera fuerit in hoc casu Clar. Hollerii annotatio, comm. in aph. 12. s. 1. Post crisin tum relicta materia, tum dispositio morboſa recidivas facere conſueverunt, nisi antevertamus purgatione vel alteratione: Accidit tamen aliquando citra hæc ut hæc recidiva ob intemperantem victum ægri, si plura sumptis quam conticere possit; Recidit etiam in morbum sæpe convalescens propter externas injurias, id quod præſens casus confirmat: Huc refer aphor. citatum. Simon Scultzius in miscell. cur. anno 1674. 75. & 76. pag. 216.

Mensim Febrim Tertianam, quæ tenuit Ampl. Præsidem ante quinque annos locum habitum in Hepate cujus indicium Tumor inflammatorius visceris ei supertiles, qui in suppuratum abiit, ut contitit ex sero purulento, commixto sanguinis massæ, vena secta conspicuo, & lingua semper albescente, vapore scil. purulento tincta, quique accessu febris quartanæ exacto tandem anno mortem intulit.

Ejus in cadavere Hepar insigniter tumefactum & quasi retortidum, sed adhuc aspersum pure fuit repertum: Lien totus ambustus & carnis instar niger. Car. Vailo de morbis a deſeſa colluvie, sect. 6.

Recordor etiam Nob. adolescentem, Ioh. de Bouilly, Tertianam laborasse gravi admodum & producta, cujus paroxysmū circa meridiem à mediocri Rigore cum inciperent, sudore largo sequenti solvebantur, febre autem ingravescente, derepente & in continuum mutata, subito me absente suffocatus interit.

Dilecto cadavere Hepar immani tumore, & jam scirrhuso distentum inventum, & vomica pure prægnas in pulmone, nam biduo ante peripneumonia oppressus fuerat. *Idem ibidem.*

Non ita pridem excessit e vivis Rever. N. à Tertianā febre comitata magno admodum tumore Hepatis, eoque duro, nec non abdominis dextri, & eo etiam infra umbilicum porrecto confectus.

In hujus cadavere, præter Hepar scirrhusum & oppido grande, observatæ glandulæ omnes dextri lateris, una cum pancreata, tumore supra admirationem magno & duro distentæ retortidæque, ut vere lapideas diceret: Hic autem, ut accepi, ante Tertianam Lenta febre hybernaque detentus extabuerat. *Idem ibidem.*

Affligebat Nob. Scutum, & quidem juvenem Tertianā duplex, jamque xxij. diem perſequebatur, comitante usque & usque diarrhæa biliosa: Utrique malo obviam ibat Medicus peregrinus

venæ sectione decies repetita, Prifana, confectio diachyma, alius: Quibus minime respondentibus expectationi, ager allatum Londino spiritum Tartari, nescio quo popularium suadente, per intervalla ad guttas plures hauriebat, unde viribus quidem sibi auctor videbatur febre tamen nequaquam immutata. Succellere tandem faeces alvi nigricantes, quas post aliquot dies mors sequuta.

Aperto cadavere hæc patuere, 1. Pulmo exterius atris sparsus maculis, interius pure hinc inde restagnans. 2. Pars Hepatis gibba, sanz similitudo, sed coloris obsoleti & in album tendentis: Sima, quæ felleæ vesicæ propior, cærulea plane: neque lambebat duntaxat superficiem in vius ille color, sed in ipsam jecoris substantiam alte penetraverat: Ut conjicere hinc licet bilem initio morbi hujus fuisse valde æruginosam, adeoque vicina omnia fædo colore tinxisse: qua per continuum diarthram tandem deiciente, non ideo a morte vacua fuit vesicula fellea, sed alia sane bile, & quidem subtili, eaque dilutissima jam distendebatur, quæ perpetuo in intestina, ut erat texturæ nimis fluidæ excurrens, non poterat non alvum identidem ad excretionem frequentes sollicitare: Sed cur æruginosa ante bilis? laboraverat ante animum quartana in qua cum præcipue triumphet succus acidus, credibile aliquid ejus in vesiculam quoque fellea sese intinuisse, & colorem naturæ suam convertisse sensim in viridiusculum. 3. Lien triplo major naturali, & intus nigra quadam amurca hinc inde squales. 4. Renes magni sed flaccidi. 5. In dextro cordis ventriculo dimidium cochleare sanguinis, sed lenti & puitosi: In sinistro ne gutta quidem sanguinis reperta, adeo frequentes v. s. omnia exhausserant: Quod si in simili posthac casu sanguis mittatur parcius, Et usurpentur liberalius, non ea quibus attenuetur bilis, sed quibus nonnihil crassescat, rectius haud dubie ægro consulatur. Olaus Borrichius Observ. 91. In actis Th Bartholini ann. 1671, & 1672.

Vir ætate flore, epulans liberaliter, quotidianè vomitioni biliosa jamdudum fuerat obnoxius, hac repente suppressa, ventriculi vehemens dolor prehendit, cum nausea & tussis inani: Huic mox cæpit corpus citra febrem ullam vehementi rigore tanquam invadente exquisita Tertiana. ex intervallis quotidie supra vicies concuti: Exactis diebus circiter xv. putrescente jam bile, Tertiana febre corripitur, qua multis post diebus soluta, resolutio insequitur omnium corporis partium quæ sunt sub capite, nec multo Corpore dissecto, tam multorum affectuum causam deprehendimus bilem sinceram, eamque pristinam, circum jecoris cava libræ pondo membranæ coercitam, & ejus jam portio in spinæ nervos obrepserat. Fernellius Pathol. lib. 4. de febr. cap. 10.

Anno 1580. obiit Sereniss. Princeps, Magnus Dux Etruriæ, inexpectato casu, ex febre Tertiana, quam Medici ipsi simplicem fatebantur: Quæ causa erat deinde vulgi & eruditorum judicia hinc inde audirentur, præsertim cum primo pharmaco assumpto statim melius habere incipiens, ex voto, quod fecerat, 12. supplicium meritis è carcere liberari jussit: Erant qui fungorum elui repentinam mortem adscri-

berent, quo cibo ipsi maxime delectatum certum est, cum sanus viveret; Alii medicamenta non recte exhibita inculabant, quæ sane omnia nive & glacie refrigerata gelidissime assumpserat.

In cadavere ejus Jecur durum & exsangue repertum, ut cui 3xx. sanguinis paucis interpositis diebus extractæ erant, subsequente ita intolerabili: ventricum anteriorem tunicam marcor quidam sanior attingerat, reliquis visceribus bene constitutis & integris omnino. 1. Valsægii Rumlæus observ. 94.

§. 7. Bilem ejusque acrimoniam incensandam, ex anatome famuli Helvetici, duplici Tertiana & simplici, Patavii deluncti vidor mihi divinare: Vesica enim fellea, quia ubique obstructa observabatur, imprimis obstructis meatibus, qui per substantiam jecoris dispersi bilem ad vesicam deducunt, bilem calidum succum in corpore resistentem, & febris & rigoris causam fuisse vero sit simile: videatur Spigelius lib. 1. de Semitertiana cap. 15. qui venas portæ pro fomite hic agnoscit. Th. Bartholinus cent. 4. Epist. 47.

Febres tertiana naturam referente à serositate biliosa in carnibus putrente orta.

Anno 1648. mense Augusto in Nob. urbe Lucenæ, ipsiusque agro, morbi grassantes inter Epidemios sunt reponendi, non ratione essentia, cum plures afficiant sub diversâ forma, synochi scil. hemitritæ, ardentes, tertianæ, ephemeræ: sed ratione causæ, utpote qui à causa communi ortum duxerunt, acere scil. valde humido & in activis inæquali, modo calido modo frigido: Et quia hic affectus magis viguit in planitie quàm in montibus, ubi magis ventilatur aer, hinc factum est quod in montibus degentes non ægrotaverunt, ægritudinesque variz extiterunt pro diversâ patientum temperatura & varia victus ratione: Sicut enim excedens aeris humiditas corpora afficiens, ea disposuit ad putredinem, cum humiditas sit putredinis subjectum, putredoque hæc sese insinuat in humores in corporibus prædominantes, eosque vel sanguineos, hinc synochi putridæ: vel biliosos, hinc ardentes & tritæphies: vel cum puitosis putrescens, hinc heymitritæ: Nec solum variz fuerunt febres pro diversitate humorum, sed etiam pro diversitate loci in quo putrescunt: Hanc ob causam bile prædominante, modo fuit ardens, dum putruit in venis: modo Tertianæ naturam referens, dum putruit in parte determinata: Vel in carnibus ipsis, circa quas serositas biliosa inventa fuit in copia dum facta fuit cadaverum dissectio. Ben. Silvaticus cons. 15. cent. 1.

In Tertianæ Febris principio morbifica causa cor petens, circa Cor & Pulmones, quando immoratur, anhelosos, suspiriosos & ignavos facit, quia principium aggravatur vitale, & sanguis in Pulmones impingitur, incrassatur, non transit: Hoc ego ex dissectione illorum qui in principio accessionis mortui sunt, expertus loquor, Harvey de motu cordis c. 16.

Lienis viscus, est focus frequentissimus plerumque febrium sive continuarum sive intermittentium, quæ ex inflammatione maxime fervidi, tenuis & atrabilis succenduntur: quæ

que febres adustionem sanguinis, partim linguæ nigrore, partim urinæ fulgorum quandam emicantem præ se ferente demonstrant, ut ex dissectione cadaverum eorum, qui ab ejusmodi febrium violentia perierunt, nec non ex excrementis, atque etiam ex solutione ejusmodi febrium deprehendere est: In dissectis namque cadaveribus, aut Lien totus sanguine atrorem fulgentem præ adustione retinente carbonis instar turgere conspicitur (ut sæpe alias & nuper à me animadvertum in Ampì. Præsidi Michaelè Bouveto extincto à quartana continua) Aut vero ejusdem Lienis parenchyma in succum quandam piccum ac fulgentem dissolutum cernitur: cujus particulæ quandoque per alvum rejici solent, picem fusam substantia sua & nigrore fulgente referentes, ut animadverti quoque in mulieribus præsertim melancholicis à natura, post diuturnas febres: C. Piso de morbis à sero sectione Theorem. 3. p. m. 40.

Joh. Fornageus dum juvenis esset valde famelicus erat & ciborum appetens: vix famem satiebat: Observarunt primarii Medici eos, quibus aut imbecillis est Lien, utpote non satis officiose expurgans Hepar, aut putris, voraces esse, ac velut vulvino quodam generaliter dicto occupari: Ac revera hic de quo nunc agimus, Splenicus erat, corpore & habitu melancholicus per adustionem, sed tamen moribus & animo satis festivus & hilaris: Sed literæ illæ interiores, quibus vitiosissima etiam natura potest emendari (exemplo Socratis) illum ad istam æquitatem & hilaritatem traducere poterant: At febre Quartana longa, qua detentus fuerat, & dolor fixus ad hypochondrium sinistrum, & apertio cadaveris satis testantur quale vitium in Liene fuerit: Et cum cibum ingereret conquiescebat dolor. Præter autem naturale & initium ipsi Lieni vitium, quod corpusculum istud in tantam corruptionem adducere non poterat, sed juvere tantum, causa erat ~~condensatio~~, quæ noxam magnam intulerat ipsi Lien: Nam cum forte in equum conscendisset, artis equestris parum peritus, tante vi ab equo depressus ac decussus est in solum, ut mirum fuerit cur repente oppressus non fuerit: incididerat in latus sinistrum, & Pulmo & Lien vitium ceperant: Ad medium mensis Martii dolore cepit pedem dextrum, revera arthritidis erat, eaque residua ex febre illa quartana de qua dictum, nam narrabat se diuturnitatis tandem affectum omnia remedia undique quævisse quibus posset cito febre ista defungi: Consultum est ut hauriret cyathum aceti destillati aqua diluti: Revera febris visa est extingui: Sed vice illius totum corpus scabie est infectum, nec non ab eo tempore in magnis temporum mutationibus articularibus doloribus est impeditus: Cum ergo duos integros dies magno pedis articulo laborasset, & ad anodyna more solito confugisset, dum cessat dolore ille, paulo post doloribus hypochondriorum, & præsertim sinistri conqueritur, in neutrum decumbere poterat; Erecta cervice spirare cogebatur: Murmur erat magnum & flatuum ilias, dolores istos à flatibus esse putabamus: alii vero ab illius refluxu materiæ, & orgasmo materiæ antecedentis, quæ ejusdem erat naturæ cum ea quæ dolores articulares committebat; Mors,

quæ repente ingruit non fuit (ut putabamus) recurus illius materiæ quæ in pede dolore excitaverat, aut suppressæ materiæ virulentæ & antecedentis, commotio, sed rupta velut vomica inte. ut, Etenim in hypochondrio sinistro adeo potens erat pulsatio ut quæcunque ei hypochondrio superessent ea subiulerent, & pulsatio talis percipiebatur qualis in abscessibus ad suppuratum tendentibus: Nunquam memoria nostra tam alte palpitans pulsansque hypochondrium contigeramus, ut mirum non fuerit si ei post hæc doluerit sen. per, & si ita repentinæ cladis interitusque causam intus to. erit: Ac initio quidem tanti momenti reme. esse non putabamus: ac nos fateri oportet mali essentiam ignorasse deceptosque similitudine tantum: Nec illud evenisset, magna artis nostræ, quæ multis est auxilio, calumnia, quod contigit, Nam tribus à venæ sectione horis, de repente arteria vasisque aliis, ut credibile est, in Lienis regione ruptis interiit: Sed mirum quod contigit, natura conabatur per vas venosum in capacitatem rejectare eum sanguinem, qui sua copia & quantitate molestus erat, unde intumuit induruitque ventriculus, ut saxeus lapideusque esse videretur: Sed credo libera non erat via qua id præstaretur.

Aperto autem cadavere, putris & semilacer inventus lien, & immagnam molem excreverat, sed corruptione propriæ substantiæ in partes veluti minimas concisus & semerosius videbatur, Lobi pulmonis sinistri adhaeserant costis, & in Liene sanguis concretus erat, quæ propriis vasis effusus, tandem ruptis tunicis quibus concludebatur, inopinatam mortem intulit. Ballonius cons. 107. lib. 1.

Michael Tedler ann. 25. anno 1640. cum per 16. circiter menses Quartana laborasset, non obstante eo quod diversis accommodatis remediis usus esset, ad superandam quam ex victu pravo contraxerat cacochymiam, tandem morbo medelam superante noctu inter 23. & 24. Martii decessit: fuitque hic ejus vitæ exitus: aliquot diebus ante mortem a corrupto viscerum tono pedes & crura tumescere ceperunt, Viresque & appetitus paulatim desiniebantur, manebat tamen idem febris circuitus, cujus paroxysmus etiam nocte, quæ ipsi præultima fuerat, passus est, sed & die subsequente ante vesperam, novo eoque vehementiori paroxysmo correptus fuit, qui ipsum mane ante tertiam abstulit.

Aperto in defuncto abdomine, hæc præcipue p. n. deprehensa fuerunt: Lien præter solitum, triplo major erat, flaccidus tamen & sanguine nigro ultra quam decet insuccatus: circa autem ejus arterias, earumque ramos, ad ventriculum & ad Portæ venam tendentes, glandulæ erant multæ, quæ comprimendo ductus angustabant, & visceris hujus (ut facile colligere est) obstructionem faciebant, simulque febri hujc dum viveret occasionem præbebant, & omnium medicaminum vires eludebant: sed & hujusmodi aliquot glandulæ erant circa vesicæ felleæ ductum ad intestina tendentem, eumque ita comprimabant, ut vix aliquo conatu instrumentis tenuissimis esset transitus: Et harum glandularum omnium maxima firmiter etiam Portæ truncus ad finem Pancreatis nece. batur

batur: adeo ut mirum non fuerit nutritionem ipsi defecisse, & lœteritiæ paulo ante mortem signa se in mutato corporis habitu obtulisse, & alvum (de qua tandem etiam querulus fuerat.) segniorem redditam: In Thoracis dextra parte etiam modica aquæ quantitas colligi cœperat, pulmo ramen mediocriter habitus & liber: similiter autem pulmo passim partibus continetibus erat adnatus, non corruptus quidem, sed flaccidior tamen & aquea spuma impletus: Reliqua a naturali constitutione non multum aliena erant. *O. Heurnium observ. 22.*

Helidæus secuit aliquando in Hospitali Bononiensi virum quendam, qui febre quartana, qua diu detentus fuerat, tandem mortuus est: Posteaquam autem cadaver istud aperuit, repetit in corde, venis, & quasi omnibus membris, frustra magna, longa, alba, pituitosa: Hoc est proculdubio id quod in venis cruditatem appellere solent: *Ex observationibus Laurentii Scholtzii.*

Juvenem, cui perperam fuerat exsectus testis, febris quartana prehendit, ac in eas redegit angustias, ut nequiverit unquam in cubili quiescere; nedum urgente etiam vel maxima dormiendi necessitate, sive nocte sive die, somnum capere, nisi vel pronus consideret in sedili, vel caput in lecto haberet sublime, interdita ipsi quasi omni decumbendi copia: corpore enim vel minimum, sive retrosum, sive in alterutrum latus inclinato. dici vix potest quam acerbos illico perferensceret dolores cum in lumbis tum in ventre, quorum cruciatibus, qualibet febris accessione tam miserandum in modum excarnificatus fuit, ut oppressus miseris, non iuvitus e vita discesserit.

Invenit autem Anatome Jecur inflammatum, Intestina vitellina, ventriculum vero atra bile peritum, eandemque in turgidis omenti. ac multijugis lienis venis (quarum congeniem perperam vas breve vocant) adeo copiosam ut coram omnibus digito inde exprimeretur: In varicosis vasorum spermaticorum anfractibus, veliculisque sub vesica positis, ob exectum alterutrum tellem, plurimum stabulabatur seminis, Sed admirationem movit pancreas, supra infraque ut turgidum & extuberans, sic intus sordido pure, ac viscide pituita impendio nimis infarctum: cujus pondere depressis oculisvisque venæ cava, ac arteriæ magnæ tunica, visceri huic suppositis, ut juvenile hoc corpus emarcuit, genio suo defraudatum, sic excitavit contumax ipsius obstructio summas illas præcordiorum angustias, quæ comitabantur quascunque febris accessiones: incalescente proculdubio putrida hujus visceris proluvie, sive ab incendio febrili, sive à pulvinorum calore: cujus vapores deinde in ventrem spinalem, medullam cerebrumque delatos, æquis non videt excitasse dira illa symptomata quibus corpus hoc quotidie fuit exagitatum, *Tulpius observat. med. lib. 4. cap. 32.*

Quinquagenarius, aut circiter, è febre tertiana æstiva autumnio in quartanam simplicem, hinc in triplicem degeneravit, atque Novembrem in hydropem; Desperatus est à Medicis quia Practici confirmatum hydropem dicunt post secundum mensem: Relata causa ad hepatis refrigeratum, partim morbo, partim in

aqua destillatarum, acetosæ & cichorii, quibus plurimum usus fuerat.

Mortuo Febr. initio inventa sunt syderata intestina, similia aquatilibus colubris: Omentum corruptum: Hepar multis occupatum scirrhis. *Hollerius observ. 20.*

Dom. Magnus ait in vulgari Quartanarum fœtura, observasse se plerosque toto autumnio & hyeme quartanarios decubuisse, ac tandem interisse, in quorum mortuorum cylli lapidis loco fellis coucreverat: His Quartanis *Jecur* author fuit. *Ballonius Parad. 135.*

Febris Semitertiana.

Quidam ex gravi dysenteria in Semitertianam spuriam incidit, quæ postea febris intermittens facta fuit. Aegro 40. die mortuo, & corpore aperto, inventa est interna ventriculi tunica levi erysipellate inflammatorio affecta: Venæ mesaraicæ, & quæ ad ventriculum tendebant, atque omentum, crasso nigroque sanguine refertæ erant, imo omentum semiputrefactum ab inflammatione erysipelatode, quæ in omnibus venarum portarum ramis minoribus inerat, *Adrianus Spigelius lib. 1. de Semitertiana cap. 15.*

Ego plures qui febre quotidie sese exacerbante, præcipue circa vespæram, aut statim post meridiem, in modum duplicis tertianæ continuæ, vel semitertianæ, perierunt, secuti, & in his putredinem non in vena cava, sed inflammato alicujus prunæ regimis viscere, vel alia aliqua recondita parte, inflammationem paulò minorem quam ut dolore ab ægro, vel tactu hypochondriorum à Medico & ægroto cognosceretur, deprehendi: *Idem ibidem. cap. 16.*

In dissectis Semitertiana mortuorum cadaveribus, reperi inflammationes ex sanguina biliolo & pituitoso factas circa jecoris cavam partem, in ventriculo, intestinis tam crassis quam tenuibus mesenterio, omeato, liene, & sæpius in una partium commemoratarum, aut pluribus; aliquando etiam in omnibus, quæ celeris mortis causa erant, superveniente gangræna vel sphacelo: Præterea in plurimis dolores in ventre immanes vel continuos, qui certis horis plerumque exacerbabantur, vel intermittentes eos affligebant, orti fuerunt, ex tacto abscessu, sanie ac pure, aut bile saniosa & concocta per secessum vel vomitum redditis. *Idem cap. 14.*

Rarissime Semitertiana laborant, qui firmis sunt visceribus, sed ii qui destillationibus, laborant, jecur habent obstructum, aut lienem, aut mesenterium, pulmones male affectos, per longa intervalla colicis doloribus infestantur: Nullius eorum, qui à semitertiana perierant, cadaver inspexi, in quo pulmones & jecur non male haberent: vel una cum his caput, lien, renes, mesenterium, intestina magna ex parte inflammata, & in aliqua parte gangræna correpta erant, præsertim quo loco ileon colo jungitur. *Idem lib. 2. c. 11.* In quodam juvene Belga, qui post dysenteriam in semitertianam incidit, & die 20. mortuus est, reperi intestina tenuia inflammata; Ileum, qua parte colo & cæco adharebat, sphacelatum. *Idem ibid. c. 16.* Adolescens quidam Gallus semitertiana correptus 27. die mortuus est: in cujus cadavere dissecto

secto tenuia intestina inflammata fuerunt deprehensa, & ilei portio magna versus colon sphacelata: jecoris etiam cavæ partis portio inflammata fuit, *Idem ibidem*.

Novi mulierem (eo morbo detentam) cui cum urina Ruebant primo surfurea quadam, inde & pelliculæ magux, & postremo pus manifestum villis, festucis & tunicis variis intertextum: Profecto ea membranarum defluxio, pro quantitate sui, certum morituris prænuntium milit, nam ex hepatis, aut pulmonis, aut cordis lisionatione contigerant, ut etiam per anatonem deprehensum est: Plerisque dissecto corpore universa hæc viscera, aut major illorum portio, nunc nigra ut carbo quispiam visa est, nunc suppuratis pustulis plena: ut enim facillime ut per consensum tunicarum pituita concretescens jugiter adarescat, eademque salior aut virulentior, subjectam œsophagi linguæque substantiam depascatur. Follem per urinos recensere, ut mulierem Æthiopis symbolo, & sub insigni Hierosol &c. Corn. Gemma de febre pestilenti Hemitritzo.

In III. Domino à Calmontio febris erat assidua, alias interdum, alias noctu exacerbationes habens: una dies levior, altera acerbior, in moris *mutabilis*, aut *mutabilis*: di forte remissio aliqua erat, minima occasione prehendebat Horror; cum perfrictione quadam, ita ut ad hemitritzon accedere videretur: Anxietas erat summa, quæ a calore acri omnia confundente & os superius ventriculi molestante contingebat: Implacabiles erant dolores renum, urinx fere crudæ: conjiciebamus circum ventriculum collectam esse humorum copiam, unde defectiones animi excitato vapore sequerentur: Sed mirum quod apparuit, nam cum habitum corporis haberet tumidiusculum, pituitosum, minime dissilabilem, corpus internum æstuabat, omnia quæ excernebantur erant biliosa, tota massa sanguinis erat corrupta, Et quod mirum, pulvis erat vibrans, qualis in ingentibus inflammationibus apparere solet: Cumque esset annosa, mirabantur Medici, quomodo in febris assiduitate ista Pulsus vibratio, elatio, magnitudoque tamdiu persistisset: at animosa erat mulier nullis aut corporis aut animi laboribus defatigari solita, nulli pene celeritate cedens, irasci celeris, ad omnes actiones expedita: cor compactum habebat, & facultatem vitalem omnium validissimam (nec enim tamdiu, tam violentæ diræque febris molestias tulisset) Itaque pulsus erat validus cum facultas vitalis esset valida, auctus erat usus, instrumentum cedebat, ut mirum non fuerit, si talis pulsus extirerit: Sed quod magis mirum fuit, est quod uno die quinquies aut sexies rigeret, ac si nova accessio foret: Statim ab isto horrore, calor adurens surgebat, manum tangentis feriens, adeoque vola manus & planta pedum incaluerat ut nullus fere cum calorem ferret, obiit die 27. totius morbi.

Aperto cadavere: sinistrapars Pulmonis erat purulenta, Et cum ita esset præcipitis, in cysti cholidocho novem lapilli, ciceribus rubris duplo majore inventi sunt: Hepar incendio incanduerat, totus sanguis putris erat & lacteus Balionius lib. 1. consil. 77.

Febris acuta ab intestinorum inflammatione subsequente vicinarum partium putredine &c.

Febre acuta correptus Fridericus filius Celsi. Principis Norvegiæ &c. 1657. sexto die Parisiis extinguitur: Aperto defuncti corpore, visa est cerebri partium integritas summa, cor ipsum quale in sanis: Pulmones per febrile incendium à constitutione naturali aliquantum degeneres: Hepar parte sui cavæ & majore lobo, à calore febrili ex succum & subnigricans: Lienis color immutatus, vergens in coeruleum, Omentum exaruerat: Renum parenchyma parte sui interiore subangulum & subdurum: Mesenterium magna sui parte putrilagine & sanie velut quadam conspersum: Intestina subtumida & subnigrificantia, Intestinum Ileum duobus in locis exesum & perforatum: In vesicæ cavò glandulosa quadam substantia ad nucis avellanæ magnitudinem non adhærescens sed mobilis: Denique per totas alvinas regiones prorupta & effusa tam ingens vitiosorum & ferolorum humorum saburra ut æquare videretur pondus librarum duarum & trium. Thom. Bartholin. Cent. 5. Hist. 4.

Febris ardens

Patavii puer quidam frequenti sicum cibo scirrhum contraxit jecoris, nec longe post in Febrem incidens Ardentissimam, die petuit critico.

Eius dissecandi cadaveris facta copia, aperto abdomine, extra in foetida natæ aqua, siccus thorax, pericardium expers aquæ, maximo & continuo cordis æstu depaillæ, corrugatum conspiciebatur. Observatio lesseni à Lessen.

Juvenis quidam intra triduum Febre Ardentissima, maximisque symptomatibus correptus mortuus est: Secto corpore Cor torrefactum pyri tolli imaginem representans, absque ulla pericardii aqua inventum fuit. Dominicus Panarolus Pentec. 1. observat. 31.

Ardente Sirio juvenis in Causum incurrit, cum lingua nigra, Siti clamosa, viscerum ardore & nimio vicerum caumate pressus, applicitis remediis convaleuit: Post duos menses debilis factus iterum incidit in Ignem; curatio non potuit fieri quin macie tabefactus & vita migraret.

In ejus lectione inventum est cordis involucri rugosum, & cordis ipsa substantia marcida: Nec mirum, quum omnis fere humor qui in pericardio natura sua continetur, ab assanta colore fuerit exhaustus. Zacharius Pr. Adm lib. 1. Observat. 142.

Sanguinem grumofum in sinistro & dextro ventriculo cordis interne affixum semel tantum observavimus, in tot quos secavimus, In quodam juvene febre ardentissima mortuo, non concretum, nigricantem & stagnantem, ut in aliis, sed maxime rubrum, aliquantam flavescantem, in cordis ventriculis maxime adhærentem, ut secari non possit citra lacerationem. Panarolus Pentec. 2. observat. 19.

Lictori cuidam Febre Acuta prehensio statim vivere cepit supercilium sinistrum, & antequam

viginti dux elapsæ essent horæ, totum corpus spaciato sunt tentatum, ipseque expiravit.

Ego gravem lubeile aliquam cordis affectionem suspicatus, curavi ut dissecaretur cadaver: Quo facto cor invenimus duplo majus quam in sanis esse solet, cum venis tumulentibus & inflatis ad digitum crassitiem. *Hercules Saxonia Præclim. Practic. Præte 1. cap. 1. §. 5.*

Quadragesarius febre ardentissima correptus doluit etiam a latere: detractus mediocriter sanguis ad vascula duo: perseverant omnia neque cedit dolor remediis: Sexto die detractus iterum sanguis ad duo vascula putris & corruptus: Sudor 7. levis, tenuis & tantum in capite & thorace: nihilo melius habet: deliria nocturna, ætus & inquietudo magna, vrinx turbida: sudavit: 9. & 11. nihilo levata febre, 10. levius habere visus, nocte eadem patitur: 11. vrinx subsident, sed divulso & nigro sedimento, sudat ut prius: pulsus perpetuo frequens & magnus cum pauca inæqualitate: iam tendines manuum sine manifesto membri motu revelli sentiuntur: vrinx bene coloratæ & corporatæ cum sedimento nigro: 13. floccos colligit, manibus revelluntur digiti, delirium fere perpetuum: 14. media nocte mortuus est. Pulmonibus corruptis nigricantibus inventus est. *Hollerius libello observat. §. 93.*

Intinus Sac. Cæl. Majestatis consiliarius, à parente podagrico ortus, circa annum. 35. doloribus arthriticis infestari cepit, a quibus ut liberaretur emplastris, quibusdam à Chirurgo oblatis est abusus: Sed incidit in scyllam volens vitare charybden, nam post unum vel alterum annum correptus Ardente febre, cum erysipelate Pulmonum suffocatus interiit.

Cum autem mors semper fere imputaretur Medicis, quasi terminum accidentalem potius essent devincere ideo hanc ut calumniam fugerent, ad corporis dissectionem confugiunt, in qua Pulmo, post remotum sternum, niger adeoque tumidus sese obtulit, ut naturali suo reddi non potuerit hospitio: Epat magnum plurimo nigroque sanguine conspersum, cum cysti fellea omni bile destituta examinanda se obtulerunt, Cum autem sufficiens mortis causa in Pulmone inventa fuisset, dubii fuimus an aliæ investigandæ forent particulæ: Ultro ergo progressi, in utroque rene duo magni calculi inventi fuerunt ponderis 3vj. nullo signo præcedente, sive pedum torpore, sive lumborum gravitatem sive urinx indigentiam consideres: Nam copiosiores justo fundebat urinas, sed aquæ si nullimas, sitimque adeo intolerabilem patiebatur, ut nullo potu ea sedari potuerit. *Antonius de Pozzis Observ. 32. Miscell. curios. annuæ.*

Gener. Viri D. Thomæ Trenchard, Equitis auratis, famulus à pedibus, annos circiter xxv. numerans, procere staturæ, temperamento bilioso, cum ex officio multum incaluisse, hausto cerevisiæ, forsan frigidioris poculo, incidit in tussim cum pectoris angustia & spirandi summa difficultate, accedente febre Acuta, cum intensa siti, & malarum rubore, pulmonibus laborantibus & inflammatis familiari: Hic ut erat robustus initio hunc affectum parum curans de vocando Medico parum erat sollicitus: Quo vero in dies ingravescente, Herus, serva amantissimus, me accersiri curavit, Ad quem ingressus, pul-

sum inveni tangendo magnum, undosum quodammodo & languidum: consideratque symptomatis, hominem peripneumonia laborare affirmavi, dato simul Hippocr. oraculo, Quod pauci eam evadant: Ego tamen sine cunctatione, cum tertius esset a prima invasione dies, basilicæ dextræ incisionem institui, & detraxi circiter septem sanguinis uncias, cum virium imbecillitas largiorem profusionem non admitteret, etsi sanguinis plenitudo adesse videretur: Sequenti die ad materiam impetum à pectore avertendum, & humores vitiosos evacuandos, exhibui mannam, de cocto pectorali dilutam, adjecto syr. ros. sol. cum agarico: Leniter inde purgatus fuit, sed symptomata omnia ingravescabant, ut de salute ejus omnino desperarem, maxime cum sputum non procederet, & febris exanthesceret: His ut subvenirem, præscripsi Eclegma.

24. Conserv. viol. & borrag. mucil. sem. psyll. & cydon. cum aqua de oca. malv. violar. & lactuca extr. ana ʒj. tab. dialth. ʒiij. emull. iv. frig. semin. & papav. alb. ʒij. syr. violar. & jumb. ana. q. s. m. f. Eclegma. Pectus unguento pectorali & resumptivo mixtis injungi curavi, &c. Cum vero in lipothymiam creberrime pronus esset, & resciri necesse haberet usus sum, ex imitatione Valleriolæ, succo ex vervecum cordibus expresso, addito tantillo confectionis Alkeræes: Sed sicuti exitiale signum est, ubi nunquam ullis auxillis, ratione recta administratis recreatur natura, ita & in hoc ægro contigit frustra adhibitis præsidis, 7. tandem die, morbi magnitudine superatus, natura cessit.

Hujus corpore Nobil. Heri iussu à me dissecto, omnes in infimo ventre contentæ partes apparebant bene constitutæ: Pulmones vero membranæ costas succingenti in utroque latere per plures fibras erant connexæ, unde difficultas spirandi ex parte proculdubio processit, forsitan etiam inflammationi ansam præbuit, substantia eorum erat nigricans & sphacelo correpta, Et hic fuit morbi exitus, ut verum sit quod Celsus ait, Peripneumoniam scil. esse vehemens & acutum malum, quod plus periculi quam doloris habeat, paucique ea correpti evadant. *Friederici Loffine obser. iv. libr. 2.*

Febris Epidemia.

Illustr. cujusdam Comitis Filiolus trimus, vixit supra ætatem solidi 1. Dec. anno 1633. tumorem pone aurem sinistram, ad juncturam maxillæ inferioris radicum, sed tamen usque in collum protensum, cum dolore ardente monstrabat: qui indolem suam provido medico mox sequenti die cum febre acuta epidemica, gravi anhelitu & tussi sicca, constanter in mortem usque tenentibus huic pulsionem loquebatur: d. 5. huius virulentæ epidemici sobole, successit alvi profluvium atro carbone nigrius & estusissimum cum dysphoria fortius quam allevatione patiens perstante tussi illa sicca & præcordiorum quasi præocata spirandi difficultate, nuncio huius veneni in spir. vitali & liquorib. naturalibus jam habituati & tyrannidem suam exercentis: cimmeris plusquam ignorantia tenebris occæcati duorum medentium oculi, hanc catastropham à summa virulenteria non advertentes, catarrhi figmento, quo totus orbis eluditur, afflictis parentib. & adstantib. singulis imposuerunt: Post 4. septimanam per alui recrementa rejectio vermiculo, totus in eorum expul-

pulsionem incubuit Medicus; etiam mercurium vomituum exhibere paratus: Interea cum indies magis arjeteret pro suo mercurio, Tumor oedematofus albus, nitens, circa Puelli hujus medicamenti inundati malle olos, in utroque pede exortus, supra furas, subito perreptat abdomen, & prima vice manum & faciem dextram occupat, ultima, & infortis, sinistram quoque, cum summa palpitatione illius lateris dextri: Die xi. lavarii exhibitus mercurius dulcis ad tria grana in pulve: Ex hoc deiecit hic æger octo sedes fœtidas mucosæ (vermem vero nullum) liquidas, colore ferè glyceo, cum allevatione respirii & tussis illius continuæ, remissione etiam palpitacione dextri lateris, adeo ut cum hactenus ne manum quidem ferre posset, hic dextro lateri (quod pluribus septimanis non factum) incumbere, & indormire satis placide, Die xii. insequente propinata quinque guttæ tincturæ martis in cerevitiâ: hora octava insequente ægrum sat bene comedentem & avidè, & solito pauciores urinas vidimus: Die io. alternata vice usurpatur Martis seposito, surrogatus est mercurius dulcis, dozi trium granorum, verminum & incipientis hydropis causa: quæ tota die nisi duas ante mediam noctem dejectiones coctas, natureles, compactas habuit, & melius illa nocte quievit: mirabantur nobiscum altantes effectum & notabilem meliorationem, sed tamen peritidam ex hujus medicamenti usu bis repetito, Nam continua tussis & pleuram dextram circumfiliens palpitatio, remissior in tantum observata, ut pluribus, ac nunquam hactenus, horis æger huic lateri incubuerit, hodie de nullo querulus: Secundo tumor, tempore vespertino, in pedibus & suris prominentior semper, solita mensura circa suram utramque, ad duos transversos digitos monstratus, spem illius parentibus faciebat in euorem, quam tamen minus tutam satis semper prædixi: Die xiv. eadem euphoria perseveranti ægro, post somnum præterita nocte satis commodum, denovo mane expegetacto exhibitæ sunt guttæ 4. vel 5. de tinctura Martis: satis tota die comode valuit; Die xv. spes hæc meliorationis, prout prædixeram, concepta frustrari cœpit penitus, etsi domestici lætius sperarent: mihi unico nomine suspectus fieri cœpit, quod cum febris æstu immanius recidivante, præteritam noctem duxerit totam insomnem, mox omnem cibum tam subito respuebat, vix respirium ducens & quasi suffocandus: Die xvi. ubi ex enemate ægri euphoria sperabantur, præcedens nox insomnis & inquieta hujus injectioni successit: manus faciesque sinistra, itemque latus ad oculum intumescere: Abdomen mensuram solitam, quæ in dies tumor explorabatur vel diminutus, in sex transversorum digitorum incrementum per horas notabile elongavit: pedum itidem tumor albus, oedematofus, nitens, circa suram ad duos transversos digitos adauctus, & ad genua extensus cum respirio anxio & agonisante: Ideo seposito usu tincturæ Martis, de spiritibus alii cerevisiæ usuali commixto, propinatum est ægro, ut urinx, quæ deficere sensim cœpere, libenter succederent: Die xvij. incrementum summente tumore & dyspnœa, æger sumpsit medullæ seminis ebuli curiose excorticati grana

vii. cum gr. iij. Mercurii dulcis in pulvè con-
tusis amygdalis facta: interdum bis deiecit
quamvis mucosa recrementis alui commixta. Cir-
ca vespem satis vegetus: Ex quo post mediam
noctem præfocationis sibi imminenti quasi
præfugio excitus puerulus, hora secunda ante-
lucana cum morbo vitæ quasi prælocatus &
anxius finivit.

Die sequente apertum & exenteratum est cor-
pusculum puelli: Antequam Chirurgus novacu-
lam admoveret, invitavi Medicum Corradè &
D. Davissonium, curationis comites, velint dis-
picere an putatitum & toties inculatū vermes tan-
torum facinorum & mortis reatus pollulandi
fuerint, An potius, quod heri amant in febrium
harum Epidemiarum, maxime castrensiū pro-
craftinata curatione, viscus aliquod naturale,
etiam Hepar ipsum eschara vel lethali charac-
terisatum: vel hospite malignitate habuit ex-
solutum occasionalis causa fuerit illius hydro-
pis, ad prædictas mensuras, duabus ante mor-
tem, hebdomadibus subito tuæfacientis, sub
cujus adauctu prælocatus videbatur hic pue-
rulus: Aperto tamen abdomine, vermis nul-
lus inventus: Sed ecce post hanc exenteratio-
nem, quod prognosi Medica nullus nostratum
augurari potuit, in sinistra parte obviabat ma-
gna diaphragmatis propendens inlar sacci,
purulentia ex albo virecente, e totali suppu-
ratione sinistri lobi Pulmonis, salvis corde & pe-
ricardio, adeo infarcta ut liquamen illud pu-
rulentum, postquam scalpellum à Chirurgo per
musclos intercostales in cavum thoracis peni-
tius intruderetur, instat fontanæ profliret, & è
cavo thoracis, postmodum aperti, supra men-
suram dimidiæ ollæ effunderetur, de parenchy-
mate vero pulmonis ne vestigium quidem co-
pareret reliquum: In abdominis cavo vero aqua
inventæ nullæ. *Andreas Cæselius in methodo med.
feb. Epidemias.*

Filius Dom. N. novem annorum, bonæ com-
plexionis ægrotavit diebus xxxij. febre Arden-
tissima, quæ spatio paucorum dierum consum-
psit puerum. Mortui inveniebatur Hepar im-
mensæ magnitudinis prorsus sanum, nisi quod
in extremis partibus esset totum, nigrum & du-
rum. *Bartholinus cent. 3. hist. 34.*

Aurifaber habebat minitrum macilentum &
longæ staturæ, qui incidit in febrem satis
acutam: Monitus a sodalibus, accepit vinum
malvaticum cum zinzibere & aliis aromatibus
ad provocandum sudorem: sed cum ex hoc le-
vi sudore parum juvaretur, monitus accepit ab
eisdem Theriacum & intravit balneum, ut ma-
gis postea provocaret sudorem, quod & secun-
du fecit, sed res semper cessit in deterius: Vo-
catus, ad ubi refrigerantia & omnia quæ pos-
sunt moderate illum æstum sed frustra, & intra
paucos dies exhalavit animam.

Secui corpus, Hepar ex nimia illa caliditate
combustum fere inventum, ita ut haberet qua-
tuorrimas in gibbo. Ex observation. *D. Joh. Hefsi
med. Norici.*

Scotus febre præhenditur Assidua, &c. Aper-
to mortui abdomine primo se obtulit Hepatis
lobus orificio ventriculi posteriori affixus dia-
phragmati nothisque costis, ut nonnulli frustra-
tim avelli potuerit, Portio hæc illius nigricans
ex inflammatione quæ præcesserat, reliquum
hepatis recte se habebat. *Placetus observ. p. 471.*

Anno 1670. Auriga ex febre continua ardente quali furibundus, in via Regia demortuus, iussu Serenissimi Electoris Saxonie secabatur: In exenterato cadavere inter cætera observavi viscera omnia bene constituta, excepto quod in ventriculo neque cibus neque chymus sese offerret: Erat autem repletus materia viscosa fluidiore, ex viridi nigricante, gelatinæ spissiori, adhuc tamen fluidæ similis, quod mensuram cantcharum minicum ferme excedente: E cystide fellea adhuc integra & illæsa, ovo columbino majore, exsudasse vidi tenuiorem bilis portionem, duorum vel trium digitorum transversorum spatium, circum circa superas inferasque & adjacentes partes undique croceo colore tingentem, irrigantem, itaque corrodentem ut partes ea illinitas & attactas putredinem acquisivisse manifeste non solum apparuerit, verum & præter hepatis subitantiæ magnam partem hypochondrii dextri tingendo rodendoque putridam reddiderit, illæsa plane vesicula biliaria: Unde facile colligendum erodentem vim bilis simul genus nervosum tetigisse & ægrotum furiosum reddidisse: Venulæ insuper & arteriæ in cerebro turgebant sanguine nigricante, eque corde dissecto sanguis nigerrimus, picis ad instar liquidæ dimanabat. *Melchior Fribs in miscell. curiosis anni 1673. observ. 100.*

V. Veinmanni filius, cum Patavii diu misere affigeretur, tandem in febrem incidit vehementissimam, cum urinae suppressione, cui postea stitilicidium advenit, cum tæcum retentione & maxima hypochondriorum tensione, ita ut summe imbecillis evaderet vermes quidam subelle suspicabantur, cum nares semper vellicaret, atque ideo miserum clysteribus perpetuo sollicitabant: Ego inflammationem & scæcum retentionem solam causam divinabam, quare adhibito fomento ex absinthio, agrim. cuscuta & carduo melius habere cepit, expulso etiam sudore, urina reddita & scæcibus excretis: cum vero naturæ debilitas nullis medicamentis tolli posset, obiit.

Secto cadavere, vesicam invenimus maximè molli musculis adnatam, urina aliisque excrementis plenam una cum ureteribus: Renes in puero tantæ magnitudinis quanta vix esse poterant in adulto: Splenis quoque & dextri hepatis lobi inflammatio aderat, vermes nulli. *J. Wadstr. Rønnerus observ. 40.*

Observavi Lienem rubentem & acidum in quodam Duce militum: hic quamvis esset hepate bene se habente, nihilo tamen minus & siti immoderata angebatur, & ardente febre cruciabatur, fuitque hoc visum anno 1593. *Hippol. Bosius de Facultate Anai. Lest. 2. p. 14.*

Febris ardens, cum lumborum dolore ab inflammatione renis sinistri in corruptionem abeuntis.

Sereniss. & Potentissimus quidam Princeps, annos 51. natus, natura plethoricus & corpulentus, cum quodam tempore æstuante Sole inter venatorum turmas summo mane campos ingressus esset, non prius venari desit quam sol ad occasum inclinans eundem abstinere cogeret: ibi vehemens ac violenta corporis, sub pondere gravis, & nedum optime post tot morbos compoliti, agitatio, occasionem & causam fatalis

morbi certo provocabat: ibatur enim venatico curru per iuvia tanto animi æstu, ut cum auriga non satis audaciter pro reverentia Majestatis, Regem saxis, fulcis stipitibusque supercheret, Dux ipse, excussio à curru homine, habenas raperet, & animo alacriter indulgens, curruque nulla lege temperans, nec curru parceret nec ipse sibi: altera post mediam noctem hora tristitem effectum exercere cepit violenter voluptas, ac primum quidem nephriticis conceptus cruciatibus præter morem doluit: repetitum ea die bis terve balneum, neque calculum neque dolorem loco movit: altera tamen dies benignior visa est, Janique cum venatoribus nova expeditio designabatur, quamvis interim sitis faucium molesta & quædam inappetentiæ fastidia non desisterent: quarta morbi die vehementius exarsit renum viscerumque vicinorum dolor, quem excepit ingens ventriculi & præcordiorum, atque totius corporis concussio, cum vehementissimo ad vomitum conatu, & omnium, ut videbatur, vitalium inanimati contictatione: apparebat ex illa naturæ violentia omnes quicunque in tanta corporis mole delitescerant humores ad tumultum excitos turbare, & omnia misere, præcipuamque rebellionis sedem jam tunc in stomacho refugere, febris certe manifestis seie prodidit argumentis, dolore capitis, ænu, siti, tridii & aliis ejus generis: quare quæcunque; contranephriticis dolores sunt adhibita remedia, ita temperabantur, ut simul calorem expugnarent: Quinta morbi die cum malum cresceret, aperta vena emissus copiose est sanguis, usque adeo floridus ut nunquam hæcenus ab annis plurimis observare licuerit meliorem, nam etsi primo vasculo non nihil putridioris admixtum inuaret, tribus tamen aliis adeo purus exceptus fuit, ut vel inde perquam facile fuerit Medicis concludere febrem illam non ipsa in sanguinis massa exarsisse intra venas, sed extra vasa ab æstuante alicubi pravo quoppiam, aut etiam maligno humore, & præcipue ab illa intra ventriculum stabulante flamma concepisse: Firmabatur hæc opinio ab incrementis deteriorum symptomatum: nam quamvis sanguinis illa missio in corpore plethorico opportuna fuerit & laudabilis, post illam tamen non immunita sunt mala, sed advenia aliunde, inter quæ primas vendicare visus est gravis, & in omni febre periculosus singultus: hic cum in horas cresceret, nihil quod ad eundem compescendum conducibile videbatur, intermissum est, continuo enim biduo aptissima & præstantissima medicamenta propinata sunt, nihilominus febris restincta non est: singultus autem vehementia augebatur in momenta; hinc demum Medici cum ex aliis signis, tum præsertim ex illis atrocibus singultuum incrementis, præsentissimum & plane extremum periculum adesse prælagiebant, credebantque fieri vix posse ut Rex, quantum quoque viribus polleat, diu unam aut alteram inter singultus illos supervivat: quare in eam partem omnes converterunt curas, ut stomachum ab illa labe, seu æstuante bile, fundo ventriculi innatante partimque ejus lateribus impacta liberum facerent: evidenter enim inde apparuit ab illa sola assurgere habitum venenatum, qui superius orificium ventriculi suffumigans, acrimonia sua singultus illos

excitaret totumque corpus concuteret; quia vero pravius purgatum culis nihil fuit effectum, concinnum est communi consilio, vomitorium porrigendum esse: adhibitus in eam crocus metallorum, sed beneficio naturæ factum ut medicamentum aliam aperiret viam, omnis enim illæ pravi bilis apparatus, qui sane magnus fuit, non vomitu, sed faciliore per alvum deiectione coepit, ad admirationem usque, & quandam formidinem turbatus est, nec sine manifesto emolumento, mox enim post unam aut alteram horam omnis illa singultuum tempestas ad malaciam composita est, & tandem desit, cunctosque in spem erexit integre ac perfectæ sanitatis: sed quamvis tanta adultæ bilis copia intra paucas horas educta sit, & major deinceps continuatis purgationibus copiosius educeretur, cessantibus tamen singultibus adhuc ardor febrilis ab incendio stomachi prorumpens, cor ipsum vehementer affligere patientem ad extremas adigere angustias non desit: demum integro post sacram synaxin triduo, alternis eventibus cum morbo & doloribus luctabatur, victor interdum, & quasi periculum prætergressus morbo superior, interdum usque ad desperationem adstantium morbo succumbens, postquam ex diuturno more lucta insignis tum corporis, tum animi mutatio, vix aliquid boni promitteret: alter, habens tamen spes & metus, donec ex multa conflictatione vires collapsæ penitusque resolutæ nihil in medicis in natura vel artis subdiis bonæ spei relinquerent: tandem peracta extrema unctione, circa horam undecimam nocturnam manifesta deficientis vitæ signa se prodiderunt, ita ut ante secundam, post mediam noctem horam, istis verbis prolatis, Domine Jesu in manus tuas commendo spirituum meum, expiravit suavissime.

Post meridiem sectione corporis facta, videri sicut manifest. in morbi mortisque causam, partim in rene sinistro, qui quantus fuit, fæde compuerat, nihilque aliud tunc quam merissimus mucus & purilago, partim in ventriculo, cujus fundo & superiori orificio innatabat pars non minima bilis adultæ: cætera quoque viscera haud leviter inflammata conspiciebantur. Cujus morbi historiam tibi B. L. candidè exhibeo ceu eandem oculatus & verissimus quidam testis, propria manu conscripsit; eamque mihi fideliter communicavit: sed D. Andreas Cnoselus Achiater olim Regius, in exercit. epid. febr. contra D. Augustinum, Corrade exerc. 4. tragici hujus casus causam in crocum metallorum, quem unus medicus, insciis reliquis a balneatore quodam nutiatum, temere ad 15. grana in substantia propinavit, loco citato plane rejicit. De abscessu renum vide Hallonium *conf. 4. lib. 1. Simon Schultze in Miscellan. cur. anni 4. observ. 114.*

Nob. Venetus ardentissima febre correptus fuit ex pituita falsa, cum maxima albedine & lentore linguæ, cum siti inextinguibili, vigiliis & extenuatione corporis: obiit tabectus.

Dissecto cadavere, invenimus in rene sinistro abscessum jam suppuratum, jecur, vesicam, intestina, erysipel. te detenta. ex qua inflammatione erysipelacea obiit. *Bened. Silvaticus episc. ad beverovicium, in hujus exercit. de calculo.*

Vidi qui in acuta febre, utroque contento hypochondrio plurima per alvum dejiceret, ni-

gra porracea, cruenta, flava, graveolentia: & brevis interdum cataphora levis surditas: temporarium delirium, à quibus parotides expectabantur ad 97. dolor sub auribus, unde magis illæ sperabantur: verum præ inbecillitate naturæ recurrente materia, orta gravi dyspnœa, mortuus est 30.

In altero quoque eadem omnia & graviora quoque, singultus, animi deliquium, frequens mutitas, pulsus deficiens, sub 30. levi parotidum significatione edita & orta dyspnœa, alteri similiter obiit.

Utroque dissecto omnia viscera marcore confecta & abscessu putrida inventa sunt. *Hollerius commis. aphor. 17. sect. 2. Coasar, Hipocr.*

In vesica fellea eorum quas febris ardens ante diuturnam rapuit, sæpe lapides deprehensi.

Arenulæ febricitantibus non paucis (maxime morbo jam defunctis) copiose cum urina minguntur, nulla vel præsentè vel præterita etiam nephritide, fero à venis omnibus aut certe majoribus (ubi exultio humorum viguit) sabulum hoc rapiente: quod ininus mirum videbitur usque, qui bilem totam intra propriam vesiculam in lapides, alias numero paucos, alias numerosissimos induratum aliquando viderint, apertis eorum corporibus, quos febris ardens aut etiam diuturna rapuerat, *E. V. Schneidens 1. de catarrhis specieliss. cap. de Arthritide.*

Febris acuta ab inflammatione juxta musculos lumbares internis, in abscessum desinente.

Dom. N. famulum habebat, qui ex confusione lumborum in egrundem internam inflammationem vehementem, febrem acutam excitantem inciderat: quo vita defuncto, cum venter aperiretur, ac intestina removerentur, animadverti in internis musculis abscessum à renum regione ad fundum vesicæ exprorectum delitescere, ex quo aperto magna puris copia exiit. *Observ. Jac. Oethai Prasalis Dyschreusis Medici.*

Gravida acuta febrilis infantem enititur cujus ossa vi æstus febrilis friabilia reddita sunt.

Gravida febre acuta & inflammatione circa umbilicum subito correpta, opinione citius & citius liberata fuit, æstus vero, febrilem in foetum transiisse eventus docuit, nam mortuus ex utero extractus ossa habuit in pulverem rubicundissimum redacta, tanta vis ignis febrilis fuit. *Matthias Jacobus observat. 116, in Actis Bartholini.*

Illustr. virum temperamento cal. & humidum annum supra 63. agentem, circa solstitium hybernæ anni 1106. Borea de repente fervente, de mane horripilatio cum ingenti lassitudine invadit, unaque sitis vehementi & oculorum caligine; facies insolito robore saturato ac livori propiore suffunditur: urina copiosa, rennes & aquæ, instar pellucidæ: hisce symptomatibus totum diem urgentibus appetente nocte somnolentia gravilque corporis ac stupor & in motu atonia: taciturnitas denique, oblivio & delipientia quedam obrepunt: atque cum non sine stupore omnium insolentem animi stuporem ac delipientiam in heros mirantium, quid rerum ageret prorsus inscius & insultum ab illo hectore mutatus transgressisset duas horas, ecce

derepente evigilat atque ad se redit, sed attentus & immemor eorum quæ sibi evenissent: tum vero primum è pulu majore ac velociore, nec non crebro & inæquali, simulque igneo in toto habitu calore febris emicat eaque acriter comitate siti, & quæ plurimam noctis partem inquietam traducere cogeret: Sequenti die assidua quidem & vehemens sternutatio, una cum tussi & raucedine exercuit, indeque febris deservit paulatim, sed ea sequenti luce denovo ingravescere cepit: Atque hunc cursum tenuit febris in xv. usque diem, nisi quod à secundo paroxysmo in dies lentescens magis magisque tandem prorsus elanguit: Secundus morbi recursus à priori nihil omnino discrepavit, nisi quod nulla sternutatio excretiove subsequuta, sed alterius brachii, in quod caput rependum inclinabat, torpor & tanta imbecillitas ut illud attollere per aliquo menses ei non fuerit integrum. Tertio febris repetiit sub novilunio in Februarii incidente, stante desubito Borea, sed & 4. 5. 6. & 7. imo quoties constitutio aeris mutaretur usque ad annum 1698, recurrit inquam febris sed longe levioribus symptomatis: Circa deliquium Lunæ quintæ anni 1608. prægressis per unum & alterum diem coryza multaque spūione, & insigni colli gravitate febris recruduit terrificis, magis quam unquam comitata symptomatis, 2. scilicet deliquii die Borea faviente, cum ab hac causa serosa colluvie intorsum vi frigoris compulsæ, plurima mictione urgente & sopore jam sensim premente sese æger comminisset, ecce subito horrore insolitaque rigescit gravitate & pandiculatione, oscitationeque & sopore opprimitur atque mentis quadam hallucinatione: Ea porro gravitas brevi adeo concrevit, ut sponte conciderit genibus labantibus; reducto autem in lectum sopor sensim, unaque oblivio ac veluti desipientia obrepunt, quorum ille quidem circa primam noctis vigiliam solutus est, hæc contra evidentius auxere, ita ut quantum ad interrogata non absurde responderet, tamen garrirer & iugaretur præter consuetudinem: Ab eo tempore vrens calor per universum corpus paulatim se prodere, sitisque urgere totam noctem una cum sequenti luce, urinis tenuibus alioqui ut ante, & instar aquæ perspicuis, copiose fluentibus: eam diem excepit nox sopore inturbido & inquieto traducta: à quo evigilantem gravitas statim opprimat pariter cum oblivione & desipientia, ut vel lectum commingeret, moxque sopor horroreque, & tanta in motu atonia, ut statim vel catalepticum in lecto diceret: sub vesperam tamen primum evigilare, nugari, ziliare, sistere; reliquam noctem sopor sed turbidus interruptusque tenuit, febris ardor inde remissior: Quinto morbi die, ecce paroxysmus hora consueta, sed longe gravissimus repetit, cum ingenti extremorum refrigeratione, oblivione, desipientia, commictione lecti, comate vigili, aponia, sensu sepulto, motuque abolito, & tanta corporis gravitate ut plumbeum crederetur: neque vero quicquam deglutire, vel ad oblata generosa quæ somnum excuterent sensus alicujus superstitis signum ullum dare, respiratio crebra difficilisque admodum & parva; pulsus è magno & renitente,

parvus, creber & nire inæqualis, vultus magis quam ante flammans, sed oculi lacrymas pręgnantes: à meridie ad nonam largus ludor sese adjunxit, tandem circam x. noctis æger sensim somnum excutere, ad se redire, sed inde æstus vehementior, qui tamen lentescere cepit declinante die: Hoc die de mane de natium dolore querelæ, nam cum corpus illi à natura vultioris molis à sopore illo gravissimum redditum, durante per 15. horas veterano, totum in nates procumberet & nigræna incescit, cujus cacoethia adjuncta vehementiæ paroxysmi quarti anticipantis, si ve rigori, qui ex Hippocr. in continua febre, corpore jam debili lethalis est, oppressus naturæ cessit.

Aperto cadavere, Aqueam in capite impuritatem confirmavit reperta aqua plurima in toto capite stagnans, & adhuc in cadavere reles, nec ab ardore febrili resiccata: Lebreum autem in sanguine inflammato hatille argumentum est, quod sanguinis massa ardore febris pene exsiccata exhaustaque est, ut dissectio docuit, cum in vasis vix libra sanguinis restisset in demortuo. *C. Piso de morbis a ferro sect. 2. p. 1. cap. 4.*

Huic febrī comatosæ similem & germanam omnino vidimus in Nob. matrona 63. annorum, habitus eufarci: Similis inquam fuit in omnibus, si ve idæam febris, si ve syndromen symptomatum spectes: in his tamen duobus discrepans, quod & epilemasias tempus ac initium exacerbationum non adeo pertinax, cum horas duntaxat novem desipientiaque premeret, & calor citius emicaret, Et vero non fuit producta, aut recurribus distincta; sed in quinti paroxysmi initio fatalis exitit.

Vasa similiter sanguine exhausta in cadavere reperta, & caput plurima scatens, aqua: sed speciatim vesica cholidochos distenta prægnansque pluribus calculis fabæ molem excedentibus, iisque viridantibus. *Ida n. ibidem*

Mulier Tinea tentata, crebris lotionibus sanata, in capitis dolorem ac febrem continuam lethalem incidit: Media pars totius cerebri, cum membranis (erat dextra) putrida inventa est, ichore citrino referta. *Saxonia Prælect. Præf. p. 1. cap. 1.*

Ventriculo nimis incalescente Pulmonis inflammatio perniciofa, decreto Hippocr. de morbis lib. 1. Quali Ovenus Lunge lux familiar poltrems, Cimbricæ nobilitatis decus Patavii anno 1617. abripitur; qui juvenis sanguineus vehementi in gymnasticis exercitio febrem continuam sibi attraxit, inflammatis Pulmonibus; quos corpori exemptos, ita deprehendimus affectos, antequam ad suos in patriam transportaretur *Ioh. Rhodius cent. ii. Observat. 1*

1601. in Ducatu Urbini, totaque Piceni regione hyems frigidior, æstas humidior fuit; autumnus frigidus & humidus; hyems denovo borealis, deinde placidior circa solstitia atque vernalis, etenim Austri Favonii, boreales alternatim viguere, bis terve tantum pluvias quare Martio & Aprili, tota in regione Pisauri, atque Urbini, grassabantur tumores circa fauces, frequentes pleuritides, tussis, difficultates anhelitus, Thoracis dolores, frequentes lethales Peripneumoniarum excruciant,

alia primo Insultu fatigabant, plurimæ ab angina & pleuritide ortum ducebant, & in septima sæpe, raro xi. interneciebant, neque hominum maiorem partem occupabant, sed senes destillationi obnoxios, in moderationi victus deditos atque exercitiis violentis: plures rursus incolas quam urbanos, eoque calidos atque crassos: febre prima die cum rigore, deinde continua corripiebantur, cum sit magna & lingua excrementosa humida, modo aspero & rubra, gravitate thoracis premebantur, levi dolore ad claviculam, costas, spinam, humeros vagante; densa & calida respiratione, tussitum sicca tum humida, cum sputo viscido, spumoso, crasso, rorato, subflavo, subcruento, subnigro, rarissime purulento; ægro sputa deiciebantur, aut nihil; nec eos aut paleas a parietibus carpentes, 4. & 5. delirii peribant: Hanc febrem non admodum magnus calor, nec tamen insigniter mordax concomitabatur: urina crassa & confusa inter mitia apparebant, quæ si statim attenuarentur, moriebantur, si vero paulatim clarescebant, sanabantur: eorum color est subrufus, pulsus magnus & mollis, aliquando intercurrentis erat, in salvandis validus in morituris languidus, frequentissimus: Efflorescebat malarum rubor & oculorum: facilius supini & in latum decumbebant, alii recta cervice spirare cogebantur.

Quamvis auxilia necessaria adhibita fuerint, maxima ex parte tamen plurima pars ægrorum interibat: Sectis cadaveribus, reperti sunt pulmonum abscessus, ex quibus multa materia foetens prodibat. *Latus a Fonte consult. iiii.*

Melchior de Ireshoy annos 4, natus febre corripitur continua, sed quæ exasperationes haberet: catarrhus erat, tussis sicca, nec prætenella ætate quicquam excernere poterat: tamen inanis semper erat tussis & tenuis humor eieciat spiritum: Vomitiones frequentes, alvus albicans deiecit, deinde substitit: urinae tenues crudæ, decolores pro febris vehementia: medicamentulo alvus sollicitata reddidit multa biliosa: tussis perseverabat: dolores ad sinistram hypochondrium sed vagi nec eodem modo perseverantes, deinde sinistram lateris partem occupabant: alvus soluta est, viridia excreta, chylola, sitis quæ expleri non poterat: magnum in pulmonibus conceptum incendium conjectum est: hinc dolores ad sternum & latus sinistram, sed qui ad latus sinistram non perseverabant: Medici putabant vomitiones ad inbecillitate ventriculi oriri: Quod in eam suspicionem eos adduxit, est frequens dejectio, multa que rerum variarum, putridarum, virulentarum: aliquando animus periculum deliniebat: & nos animi defectiones & frequentes vomitiones in alio observavimus, cui inflammatio pulmonis a pleuritide aut fugaci dolore lateris oborta fuerat. Febris non erat admodum vehemens, destillatio erat magna, elud. bat spiritum: sensim conticiebatur; & incantis nobis cum cibum appeteret, biberet avidissime, 20. die, item cum de purgando eo cogitaret Medici, sublatus est: debuerat mitti sanguis.

Aperto cadavere nihil p. n. in pulmone contentum inventum est: una pars pulmonis veluti st. pula ardente delagraverat, lobus unius pulmonis livebat, Hepar quoque veluti delagrat-

verat *Ballonius consult. lib. 1. cons. 27.*

Multi incantati eripiuntur ob inflammationem Pulmonis, quorum in Pulmonibus nihil reperitur aperto cadavere, nisi quod venustum aliquod flammæ apparet, Et hoc ignota non animadvertunt, Quod accidere verisimile est cum erysipelas Pulmones oblidit. *Ballonius Epid. & Epnem. lib. 1. p. 25.*

Vir Rever. biliosus & melancholicus, post multos animi corporis & labores multam sanguinis rubicundi cum tussi copiam reiecit, qui auxiliorum ope visus est melius se habere, quamvis febris Assidua reliqua fuerit, quæ bis septem diebus transactis aucta est, post cibum & nocturnis horis magis increfcens: conquesius per biduum de sinistri lateris dolore, eoq; non admodum intenso, cui per hoc tempus aliqua tussis, sonans breves, difficilis spiratio coniunguntur, nihilominus desistente dolore febris in dies magis augescit, & præter somni brevitatem, in hoc tempore adeit siccitas & ariditas linguæ sine siti, dolor universi corporis, dorsi præsertim, mingendi difficultas, lotia clara & faeces duriores: Ego supposito sanguinis profusionem præcedentem a Pulmone tulisse, & cum non præcesserit dolor, potius per anastomosis factam esse quam per diæresin, existimo in substantia Pulmonis laxiori relicta, illius partis inflammationem concitavisse, deinde corruptionem & gangrenam; & ob id non esse mirum si in primis diebus adfuerit tussis & dolor, deinde parte affecta caneroia reddita, omnia delituerint, febris assidua a cibo & horis nocturnis ingravescent ex affectione proposita prohectur: An vero etiam solutis fixa coniungatur, in dubio reliquo. Mingendi actio sere ablata, & siccitas linguæ sine siti, proveniunt ex facultatis harum partium de se sentibus; cum non repellantur alia & usæ in quas possint referri quæ ratione siccitatis cum non percipiatur sitis ob delirium, sequitur ex defectu facultatis siferæ symptomata procedat; Idem die de mictione sere ablata.

Alii Medici putabant morbum futurum diuturnum, cum symptomatibus augescentibus spatium duorum dierum suffocatus obierit. Antequam secaretur cadaver, sciscitatus quæ mea esset opinio? respondi corruptionem in pulmone in parte sinistra versus dorsum vergente, quemadmodum in consultatione dixeram, Et secto cadavere ita inventum est. *Latus a Fonte consult. xlix.*

Rev. Pater post multos labores & in aëre perniciosa moram, ut & sub radiis solaribus, febre Assidua cum destillatione ad partes spirituales, tertianæ duplicis formam referente fuit constitutus, a qua transacta x. 1. die visus est evasisse: Demceps dum in novis erroribus versatur, in febre Assiduam delapsus est, quæ a longo rigore exordium sumens, cum dolore sinistri lateris, cuiusdam gravitatis thoraci incumbens, cum tussi initio sicca, deinde progressionem huiusmodi, in qua pituitosa flavitie & cruore perflusa apparenti spirandi difficultate vehementi, cum pulibus mollioribus, languidis & inæqualibus, malis rubentibus. Hic 14. die recidivæ suffocatus obiit.

Visum est secare cadaver, cum omnino ego prælagirem in pulmonibus offensionem esse: secto cadavere, inventa est altera pulmonum pars aucta in magnitudine, ut quæ duplo maior esset quam altera, & durior: quæ secta multa aqua ter-

tida sunt expurgata, & caro inventa densa, dura & rubra, quemadmodum esse solet hepatis caro, & ab eodem latere etiam in usculi intercostales non sine læsione inventi sunt. *Zelus à Fonte consulti. 300.*

Nob. N. annor. 40. constitutionis sanguineæ, pleniorisque habitus, circa 4. Febr. 1617. cum febrilibus accidentibus incidit in pectoris angustiam, respirationis difficultatem, subsequens puto cruento & concurrente urina suppressione: prout autem erat vir magnanimus, ita parum vel nihil hunc affectum curans, Heidelbergam proficiscitur, ibique deterius habens, venæ sectionem instituit, & post biduum Darmstadtium repetens, omnia symptomata magis ingravescere sentit, unde Francofurtum sequenti die sese confert, ibique medicorum opem frustra impiorat viribus naturæ, ob gravia symptomata incumbens. Adhuc autem præter signa peripneumoniam comitantia, difficultas urina, qua mirum in modum affligebatur, cui fortassis ansam præbuit denegata feri copiosioris dissipatio per habitum corporis, ob aeris hyberni frigidioris inclementiam. in quo prædictum iter initio morbi suscipiebatur, imprimis cum alias etiam nephriticis obstructionibus æger interdum laboraret. Desit ea difficultas urina remedium usum, sed adhuc sputum cruentum, dyspnœa, nullus dolor in pectore. calor p. n. summaque virium imbecillitas aderat, ex quibus signis facillime pulmonum inflammatio lethalis colligebatur. Ingravescente ergo virium imbecillitate 25. Feb. tumor pedum succedit symptomaticus. Ac 26. viribus pedetentim oppressis, & uno atque altero pedum digito livescente atque emoriente, circa vespertinam, præcedentibus diebus præeuntibus levibus deliriis, sæpius cum sopore quodam obortis, animam reddidit.

Aperto cadavere, in pectoris cavitate serum sanguinolentum copiosum aderat, pulmones, quorum substantia alias spongiosa undique sanguine crassiore, qualis venosus est, scatebant, extremis eorundem partibus induratis & nigricantibus: cor flaccidum & intuspenitus exanguis, conspiciebatur, à interna sanguine putrido statibus permixto replebantur, unde paulo ante mortem copiosus sanguis odoris deterriimi, ob imbecillitatem retentricis summam, etiam exercebatur. *Horslius observ. 9. lib. 3.*

Circa novilunium mensis Nov. anni 1607. cum Virum Illustre, jam quindecim dies febris, arthritidis, sopor aliaque symptomata crudeliter exercebant, ecce de repente insolita accessit respirandi difficultas. ad sublimem accedens & recti spiræ, eaque dolore universi thoracis superioris comitata, atque gravi illo quidem magis quam puregente, & una tussicula, sed rara. Eo dolore quarto die evanescente, supervenere sopor generumque rubor, febre interea spirandi quoque difficultate in crebescens. Quem morbi progressum tamen ipse non viderim, sed ex relatu tantum ægri & domesticorum, atque triduo duntaxat ante obitum vocatus fuerim, illico peripneumoniam urgere & jam ad suppuratum & brevi ad mortem tendere significavi, cum tamen pro febre simplici catarrho coniuncta duntaxat ab omnibus haberetur: nam & pathognomonica signa cum affectum evidenter arguebant, & præter sputa toto morbi tempore alba, viscida,

spumosa prorsus, rotundaque æstus, suffocatio & velut leipothymia, nec non epindrosis superiorum partium ceteraque accidentia confirmarunt satis, quibus non multo post difficultas inspirandi gravis, sudor toto corpore diaphoreticus successit, à quo sensum labefactari functiones omnes licetor subsequi cepit. Tum præter dejectiones alias, semper abominabiles, tunc factoris expertes, hoc quoque in eo orabile fuit, quod in illo ipso ægrotante, antequam exspiraret, è naribus per 4. horas destillavit humor albidus, tenaxque & foetidus omnino, ac vere purulentus, sed excrucians, qui in pulmonibus ebulliens sua sponte in nares despumaverat: cuius etiam reliqui & repertum in dissecto pulmone denuntiavi, & revera observavi quamquam longe major portio ante mortem destillasset.

Postremo cum viscera & hypochondria, intestinaque cum ventriculo & mesenterio, integra ac inculcata omnino fuissent reperta, præter renes calculis prægnantes & ceteroqui, sanos: solus pulmo insigniter tumidus & quodammodo exelus repertus, in hisque unus humor albus & tenax ac purulentus delitescens. *Car. Piss. de morbis à sero sect. 5. cap. 1.*

Vir Illustris sanguineæ & biliosæ temperationis, in primo senio constitutus, qui multis ab hinc annis ruborem non naturalem in genis ferre cum pustulis extuberantibus consuevit, cum Venetias appelleret, ex nimis laboribus, & vigiliis in febrem assiduam delapsus est, cuius cum diuturno rigore cepit initium, cum tussi, dolore pungente & respirandi difficultate ac pulsu duro, aspero instar ferræ, quæ auxiliis adhibitis septima die visa est mitior reddita, ut sputa non amplius cruenta, sed alba conspicerentur. Transacta septima die, rursus febris cum rigore invadit, cum tussi & maxima respirandi difficultate, dolore non ita intenso, ad mediam thoracis partem potius vergente, cum pulsu magno, undoso, & spuitione cruenta nigricante uberrima, ut mirum videretur unde tam copiosa exspuitio proficisceretur, ut aliqui ex medicis ex capite proficisci opinarentur: lotia sanorum similis conspiciebantur, fæces vero biliosæ apparere incipiebant; adest ingens faciei rubor.

Plurimis auxiliis, adhibitis, non cessantibus vigiliis & respirandi difficultate, decima die accessit pseudo delirium, & pulsus redditi sunt parviores, tandem 14. die vitam cum morte commutavit: secto cadavere, pars dextra pulmonum fuit inventa corrupta, nigricans, tanquam sanguis concretus, & ejusdem lateris etiam pleura male affecta: hæc omnia prædicente, cum alterius Medici opinionem non amplecterer, quod materia noxia à capite prolaberetur.

Mea sententia fuit Virum Illustr. in primis diebus proculdubio ex morbo laterali laborasse; adfuerunt enim 4. signa pleuritidis proposita ab Hipp. & quintum à Gal. febris scilicet acuta, dolor lateris assiduus, difficultas spirandi, tussis, pulsus durus, celer, inæqualis febris hunc affectum comitatur ob inflammationem & situm partis laborantis, quæ cordi proxima est: dolor pungens sequitur, quia membrana, pars nervosa, inflammatione tentatur, & continuum solvitur. Difficultas respirationis accidit, quam Gal. 1. de loc. 3. debere esse frequentem & assiduam affirmat, quoniam pars respirationis instrumenti la-

borat & dolet: prohibet enim dolor quoniam infumenta respirationis plurimum attollantur, inde respiratio fiat parva & crebra necesse est. Tussis vero succedit, quia ex pleura laborante inflammatione, siue pars est tenuis & rara, ob id necessario aliquid humiditatis refudat, quæ pulmonem communicatur: pulsus vero ob febrem necessario est celer: propter vero nervosam partem male affectam insigniter durus, sed minor quam febre conveniat: postmodum vero ex pulmonis inflammatione conflictari, pleuritide in peripneumoniam commutata, imo spuitiones copiosæ & nigricantes ipsorum pulmonum caloris naturalis corruptionem confertim factam, non mediocriter indicium præ se tulerunt: Cujus affectionis causa proxima est sanguinis biliosi ad pulmones defluxio, prava qualitate affecti: remotiores vero jecoris intemperatio fervidior, mala dispositio pulmonum & errores exteriores. *L. à Fonte Consultatione 91.*

Adolescens 18. ann. optimæ cæteroquin constitutionis ex victu inordinato incidit in continuum cum respirationis difficultate: cumque aliquandiu, nihil proficientibus remediis laboraret, diarrhœa superveniente obiit.

Secundo cadavere præter pulmones etiam hepar erat inflammatum, *Jo. Udalr. Rumlertus obs. 21.*

Illustr. & Rever. Matthæus Zante Patriarcha Venetiarum, sanguineæ & biliosæ temperationis, qui aliquibus abhinc annis difficultate excretionis sæcum laborabat, quæ duriores & ictericorum similes deiciebantur, vigiliis obnoxius, mense Julii, post multos animi corporisq; labores, præcipue ad iram concitationem, in febrem assiduam delapsus est, quæ in principio accessionalis videbatur, cum longo rigore invadens: secunda autem major accessio primæ correspondens per decem horas anticipavit, in cujus remissione sudor copiosus insequutus est; deinde febris continua fuit animadversa, aliquot horis nocturnis augmentum capiens. Lotia erat sanorum similia & fæces, aderat maxima spirandi difficultas cum tussi, & alba pituitæ exspuitio interdum etiam putrida: rubor maximus in genis, non poterat in sinistram latam nisi cum difficultate decumbere: aderant vigilæ & somni breves, cum sudatiunculis citæ pectus & collum; siccitas linguæ & labiorum albedo: pulsus magni, interdum molles, qui in sexta die in quarta pulsatione facti sunt intercepti, quo tempore etiam biliosa dejectio successit. Adhibitis remediis res tamen semper in peius delapsa est, ex quo factum est ut alter ex medicis pronuntiaret febrem esse redditam malignam. de inflammatione pulmonis ne verbum quidem, 14. die vitam cum morte commutavit.

Secundo cadavere, fuit inventus tumor in parte sinistra pulmonis, ex cujus sectione materia fœtida fuit educta: quæ mea duntaxat fuit sententia, atque lupis in vesica fellea ingens, totam vesicam replens. *L. à Fonte Consultat. 32.*

Illustr. & Rever. Offredus de Offredis, sanguineæ & biliosæ temperaturæ in ætatis initio. post usum glaciæ luculentum, ac labores corporis vehementes, in febrem assiduam est delapsus, quæ cum ventriculi offensione & alvo liquidior, in principio per circuitus succendi visa est, cum immanis respirandi difficultate, ut decumbere non posset & suffocari videretur, cum tu-

bore genarum ac linguæ & labiorum siccitate & albedine cum tussi & pectoris gravitate quadam, cui in fine tertie diei sudor copiosus successit: in toto tempore vigilæ, circa frontem & collum sudatiuncula, lotia alba crassiora, fæces vero sanitatis similes: pulsus magni, molles urinae quales sexta die (dum per tres horas somnum capit) præter sudorem universalem deiciunt, biliosa, lotia turbulenta prodeunt, maculae magnæ, cineritæ per cutim erumpunt, pulsus magni, molles, sed in quinta pulsatione intercurrentes percipiuntur: in fine sextæ diei succrevit delirium, pulsus redditi sunt in horas languidiores, in fine septimæ ad meliorem vitam fuit perductus.

Secundo cadavere, pulmones fuerunt inventi tumentes & pravi coloris, sed non fuerunt secti, cum operatio fuerit facta ab ignaro barbitonfore. *L. à Fonte consult. 122.*

Febris lethargica à pulmonibus putredine affectis.

Vidua Dom. Garnier ann. 45. nata in morbum incidit: habitu erat satis luculento, alba, genis rubentibus: ægritudine aliqua animi detinebatur quæ sese eximere non poterat facile: circa æquinoctium autumnale, cum præcessisset temporis constitutio inæqualis (qualem pauci admodum animadverterant) putredinis parens, in morbum incidit. Primum totum corpus maculis rubris, ac si morbillis laboraret, aut si ingens æstus foret, erat defædaturum, nonnullis corporis torpor, appetentia dejecta, ignavia, rerum omnium contemptus, cum alioqui prudenter rerum omnium satageret & ad omnia munera obcunda esset alacris, quod magnam morum dissimilitudinem significabat, & ad judicandum de dubio anticipitque exitu occasionem porrigebat, febris continua fuit, de nocte maxime exacerbabatur, nec exacerbationis ullum erat lignum quod anteiret, sed confusa erant omnia: magna non ita febris apparebat ut ea nos moveret. febres eo tempore grassabantur mali ingenii, urinae fallaces erant, nam nec incendii indices erant magni, & sedimentum laudabile factis, & enzorenia continebant: comatosa erat, nec nisi interrogata respondabat, alieni tamen judicii nullum erat signum: capiebat satis belle cibum oblatum: diebus judicibus nihil natura movit, nihilque excrevit nisi arte sollicitata: dejectiones variae, putres admodum, sanguis bis missus plane putris: vires plurimum dejectæ apparebant, præsertim animales, quarum etsi non magna necessitas est in morbis tamen ad judicandum nobis magnam præbent occasionem: primis decem diebus exactis omnia satis moderata pacatæque fuerunt, sed ab 11. aut 12. die magnum apparuit incendium; ex intervallis graveolentissimæ dejectiones, levia deliria, oculorum lacrymarum involuntariarum, genarum, ac præsertim sinistrarum, rubor satur admodum. Tandem cum urinam redderet involuntariam, aut retineret ac si suppressa esset involuntarie quoque; alvus descenderet, 14. morbi die ab illa exacerbatione mantella, 10. autem totius historiarum morbi, cum sudore magno (nullus autem toto tempore febris apparuerat) deliria, risus, taciturnitas magna, tremores & quasi subsultationes manuum aderant: potus omnes sine discrimine admittebat, non sitiebat graviter febriens; potus veluti in profundum descendere videbatur: cum coluere

luere os aqua juberetur, non poterat ore rejicere, bene ratiocinabatur, interit.

Aperto cadavere reperti sunt pulmones veluti putres, collis adherentes, intestina plena fugaci tetroque flatu, cum serosi humoribus in spatiis & inanibus foraminibus abdominis, qui meteorisimum inferebant. *ballonius cap. 4, lib. 1.*

Quatuor annorum puella febre continua extincta erat: hæc curiositati nostræ anatomicæ immolata post mortem, pulmones exhibuit collis & sterni firmissime adherentes, multis locis duros, multo pure fluentes, & utraque parte, quod rarius occurrit, pure repletos: pericardium, panni lanei crassitie nigricantem cordis circumdabat substantiam: interim neque dyspnœa, neque tussicula ulla, neque phthiseos specie laboraverat: reliquo enim corporis habitu bene constituta, carne solida & pingui erat. Addo verò plurimos me in hacce nostra Hollandia secuisse, qui pulmones altera parte habebant exulceratos: raros qui utraque, qui tussu aut dyspnœa laborabant non adeo multos. *Theod. Kerkringius Observ. Anat. 7.*

Anna Burgunda, 33. annum nata, sanguinea, portatrix meri nuli secunda, ingluvie dedita febrem incurrerat stipatam siti, cibi fastidio, vigiliis, orthopnœa, corporis jactatione, aliisque symptomatis: inter quæ non obscurum locum habebat pulsatio vehemens supra ventriculum: quem pulsum ergo arteriæ celiacæ multis animo meo versatis, conjeceram, quibus elevandis malis nulla præsidia profuere: verum indies augescente pulsatione, diutinos labores & extrema virium detrimenta jam passam mors occupavit.

Cadaver dissecando, compertum est mesenterii membranam, quæ à peritonæo deducitur, multo circum cruore suffusam atque intentam, nihil interim mali mesenterii vasibus expertis: quoniam autem nobis opinio fuerat male patientis arteriæ celiacæ, ad hanc nos perlustrandam nostrum studium appulimus, eandem ab omni proximo corporum objectu expedientes. Exortum igitur ab inferioribus, postquam ad arterias emulgentes pervenimus, superata jam parte quæ magnæ arteriæ primos divaricatus sentit, corpusculum offendimus tria ex pituita concreta (hujus est uber modus arteriæ longeque amplior quam venæ) vi caloris opinor sibi met incumbentia, quæ obturabili cujusdam modo arteriæ ductui sic offarcta transversim erant, ut spiritui se transfundenti præcluderent viam: continuo autem ad superiora facto transgressu, tandem celiacæ sese obtulit, ita dilatata ut compressum pusillum admitteret, quæ naturæ suæ modo vix annularis digiti crassitudinem æquat, in quo sinu sanguis abunde stagnabat ater, grumofus, in putredinem abeuntis imaginem præ se ferens: à quo uno arteriæ sic depravato statu profectam interitus causam nemo est qui dubitet. *Ex obser. Nicolæ Larchei Medici Rom. apud Severinum lib. de Abscessibus p. m. 280.*

Cum Myrtilleti studio Medico vacarem, & in pinato quidam è Seren. Elect. Satrapis octiduo spatio à febre quasdam symptomatica jugularetur, exenteratio demandata est Archiatro, & sequentia notatu digna memoriæ infixi.

Abdomine secto, omnia salva & justo loco posita invenimus: ubi vero sternum à costis separatum, & pleura dissecta, statim animadvertere li-

cuit utrumque lobum Pulmonum valde flaccidum dorso cum pleura firmiter adnatum. Lobis in superiore parte dissectis & manibus compressis, nihil erat conspicuum nisi ipsum: sed circa medium alia unctione per transversum administrata, iterum lobis compressis, subito multa parva vomica, instar apicum digitorum eruperunt, quibus uterque lobus ad innamamque partem, quæ diaphragma appropinquat, refertissimus erat. Corde aperto, in sinistro ejus ventriculo, invenimus massam quandam fibrosam, pinguedinem reterentem, nulla parte adnatam, sed liberam ovi columbini magnitudine.

Hujus materiæ facit mentionem Cl. D. D. Wepferus Dissert. de apoplexia. p. 124. sed nullus dubito quin eandem materiam in arteriis invenissemus si modo inquisitio debita facta fuisset: interim hoc miratu dignum, Nobilissimum nunquam de ulla pectoris angustia conquestum, siue tussu, sed exercitio equestri & chorearum quotidie vacabat, cum tamen pulmonum minima saltem pars in superiore parte sana esset. *D. Gothof. Christianus Wincklerus in Miscell. cur. anni 1671. obs. 133.*

Vidi ego in dextro cordis ventriculo mulieris, quam peripneumonia sustulerat, radicem enatam, carnosam, albidam, flaccidam, quæ prodians ex corde & cavam venam subiens, propagabatur usque ad caput & os sacrum: eadem carne substantia ex sinistro ventriculo prodibat: quod in quatuor cadaveribus peripneumoniacis subinde observavimus. *Obs. Noretii Nervii Med. Florent.*

Anno 1596. Virum quinquagenarium dissecui hic inflammatione Jecoris laborabat, quod visui torrido ac adulto, conspiciebatur colore: peritula autem ejus membranula, parenchyma universum in putrilaginem abierat, maximamque puris copiam effundebat, potissimum ea sui parte gibba quæ diaphragmati adheret: adfuerat continua febris, quæ cordis succulentiam nativam ita consumpserat pyri in modum uti contactum conspiceretur, flaccidum plane, haud aliter ac si pulmonem tetigisses: huic pulmo variis locis collis adnatus conspiciebatur. *Pet. Pavus obs. 19.*

Expendenti mihi aphoristicam, div. Hipp. sentent quod sc. ex bubone febres omnes malæ præter diarias, cum inviserem præcl. Vir. Adrianum Spigelium, Geleber. Anatomic. è vivis sublatum, cum bubone sub axilla sinistra ann. 1625. ann. 47. non levis mihi scrupulus occurrit, nunquid ex bubonibus fiant solæ ephemeræ, vel putridæ etiam ex Hipp. enim sententia in aph. proposita: expressa luce clarius statui videtur, ex bubone febres putridas quin etiam fieri posse: non enim dixisset, ex bubone febres omnes malæ præter ephemeræ, si ex bubone fierent solæ febres ephemeræ: cui subscribentes omnes fere medicinarum scriptores asserunt, fieri posse ex bubonibus, non solum febres ephemeræ, sed etiam putridas. Atque de putridis id palam fit ex Præsenti Spigelii morbo, à quo extinctus est, quem ferè continuè observavi 63. dierum spatio quibus decubuit. Hic etenim Vir Præclar. ex indicis digiti punctura, dolorem & tumorem insignem in sinistro brachio passus est, cui successit abscessus seu bubo sub axilla, cum dolore adeo gravi, ut non solum brachium, sed & totum corpus immobile factum sit, cum febre acuta sine annotationibus manifestis, inappetentia, vigiliis & gravi virium angore: vigesima sponte erupit abscessus &

guæ, post cibi potiusque immoderationem, duobus affectibus potissimum detinetur: scilicet diluutione a capite in subditas partes, alter est febris assidua sine certo ordine tenens, post cibum & horis vespertinis more duarum tertiarum increfcens: in quibus ita se habet ut se vix morbum perferre asseveret, cum dormiat plus consueto, nulla caloris mordacitas perferatur, urinae tamen copiosæ produnt albo sedimento refertæ, hæque multo uberiores quam ingellis respondeant optime: optime se habet ad ea quæ offeruntur: horis vespertinis facies rubicundior inspicitur, præsertim circa genas, nares & aures, quam alius temporibus: adest tussis sicca, assidua; pulsus humiliores & frequentiores percipiuntur: ea quæ excernuntur sunt similia sanorum: In regione renum non mediocrem seivorem experitur, neque sine admanulo incedere potest: 10. die facta minoratione ex flore cassiæ, præter excrementa fecalia multus sanguis corruptus fortens fuit excretus, tandem die 40. interit.

Secundo cadavere inventa est corruptio & abscessus in sinistro renis exteriori carne, me ita prædicente antequam cadaver secaretur. *Lalium a Fonte Consult. 68.*

In quodam à febre duplici tertiana continua extincto verminum in ventriculo & intestinis quantitas ingens deprehensa.

Febre duplici in tertiana continua correptum mortuum secui, in quo quanta esset verminum copia dictum incredibile est: ipsi enim in ventriculo & intestinis conglomerati atque coacti per oesophagum ad os usque ascenderant, absque eo quod alexiteriis remediis copiose ægro administratis enecati fuissent, vermes porro ex materia heterogenea genitos, aliquos albos, aliquos rubros & alios nigricantes aspeximus. *Dom. P. Anagnost. Pentec. 1. Observat. 41.*

Febbris continua. 1. A mesenterio pure referto. 2. Ab eisdem abscessu.

Virgo in dolores colicis similes incidit: contra quos cum nullum remedii genus valeret, missella febre quotidie cum rigore insigni repente, doloribus jam dictis associata post paucos menses marasmo consumpta est.

Dillecto ventre, ingens copia puris, quo tum mesenterium refertum, ac quasi turgidum erat erupit. *Ex observatione Th. Merisani Archiatræ Bavarici.*

Illustr. N. Febre valida correptus cum vomitu, 14. transacta, in alvi cruentam dejectionem devenit, ita ut sanguinem nigerrimum, corruptum, pessime olentem ad 15. lb pondus excreverit, unde animi deliquio correptus, omnes cum proxime moriturum credidimus: nihilominus cibus per intervalla optimus refectus, vires resumpsit, ita ut, etsi febris continua, licet non ita intensa & uniformi continuo vexaretur, nihilominus salutis spem præberet: sed tamen cum quotidie faeces copiosas sanguinolenta sanioque materia excerneret, in diebusque magis, ac magis emaciaretur, infinitis prope remediis adhibitis, 63. à decubitus

die occubuit, cum tan en postremis diebus ingens urinae profluvium supervenisset, ita ut quinque horas & amplius quotidie per plures dies emitteret.

Cadaver dillectum fuit, atque in mesenterio ea in parte superiori, qua intestino recto annectum, ulcus sordidum, ad spithama longitudinem adinventum: unde ea in parte collectum abscessum coniecimus, illoque disrupto, putridum sanguinem ea in copia profluxisse non dubitavimus: Sed quod mirum est, nunquam per totum ægritudinis tractum, præterquam extrema die, qua illi venter intumuit, de illius partis dolore conquestus est. *Marc. Donatus hist. mir. lib. 4. cap. 7.*

Franciscus primus Galliarum Rex Febribus Intermittentibus postea Continua occubuit, referente Thuano tomo xv. historiar. lib. 3. calendis Aprilis anno 1546. Manu facta est dillectio corporis secto abdomine, omentum ruptum ad pubem & ad ventriculum seie exhibuit, sic ut intestina, suo veluti velamine ablato nuda spectarentur: Sed qua parte duodeno & pyloro incumbibat nigredinis speciem & corruptelam referebat, Duodenum putre, purulentum: Ventriculus inferiore tunica ruborem cum nigrore mixtum repræsentans, humorem atrum, majorem etiam quam pro ratione assumptorum copia, continebat: Cu a ulcerata saniem subrullam eructans: Iutris pulmo, dextra parte colitis ad spinam sic pertinaciter hærebat, ut inde sine dilaceratione divelli non potuerit: qua parte sectione facta vitosa sanies effluxit: Cor & lecur, Ren sinister plane illæsa, Lien non admodum insigniter affectus: Ren dexter ultima parte scatens, à quo exortum vas seminarium exemptum, colluviem partes adjacentes effuderat, sic ut in illis omnibus insignes corruptelæ apparerent: In collo vesicæ, ulcus latum pure multo refertum: Sub pube dextra omnia purulenta, & ipsa substantia gangranosa scrotum, parastata & partes omnes testes ambientes simile vitium contrexerant: Animæ rationalis sedes integerrima: Tam variorum affectuum, tam diversos focos obsidentium certæ cum sint causæ, nullum tamen ad generationes primordia referendum esse, aut in posteros transire posse affirmare non dubitamus. *I. Cosma Holizachii. Observatio.*

Mercatoris filia, antea sæpe frequenter, hæmorrhagiæ obnoxia, ac proinde cachexia tere consumpta, in febrem biliosam continuam incidit: Ordinatam vinum laxatum (cum ab aliis omnibus abhorreret) inde pejor habet: Enema præscribo, leniendi ventris gratia simul non neglectis alterantibus & corroborantibus: Succedit autem pervigilia, dolor capitis, intumescencia ventris, cardialgia frequens, sit pulsus intermissus, convulsionemprehendunt, tandem totalis adest, fluxu alvi symptomatico succedente: Prognostico tacto, roborantibus tantum naturæ suppetias ferre conati sumus, imprimis tunc temporis ubi exacerbatio vehementissima affligebat, quam admodum leniebat roborans istud cuius usum mihi commendaveras in palpitatione cordis dolorifica, chrysolitus videlicet præparatus cum lapide bezoar, margar, magisterio, &c. Hoc sapius adhibito, non tantum ad miraculum vehementis cordis

cordis dolor remisit, sed rediit etiam appetitus cum somno moderato: vires vicissim colliguntur quadantenus: pulvis, qui per octiduum fere nullus, jam verniculans, post intermissus redditur: Sed plenaria restitutione gravius erat malum, ob incipientem hydropem: qua de causa virium recolectio diuturnior esse non potuit, ideoque paulo post naturæ debitum soluit.

Post mortem aperitur: abdomen ichore fetido plenum, Omentum putrefactum, Lien atque Hepar scirrho laborabant: Pulmones pleuræ adnati, cum capsula cordis, in qua humor putridus: cor duplo majus, bubulum referens, inveniuntur: quodque notatu dignum, circa valvulas dextri ventriculi calculus ex Tartaro concretus, instar minoris castaneæ, nucis compressioris, membranosa valvularum substantiæ adnatus conspicitur, vehementioris *καρδιαλγίας* proculdubio causa proxima *Greg. Horstius observat. lib. 4. obs. 47.*

Curae meæ commissus est Dominus Contant, febre Continua laborans, cujus primis diebus comites fuere vigilæ, capitis dolor: præsertim occipitis, durities & contentio utriusque hypochondrii sine dolore, cum mœlitiâ summa, quam pariebat metus ne simili morbo, qui fratrem extinxerat, detineretur: Robur nimis minus aderat vitium, *ἰσχυρότερον* erat, per cubiculum, imo aream deambulans, appetitu non carens, maxime vini, quanquam solis iysculis ex Medicorum præscripto uteretur & prisana officinali: Ter illi missus fuit sanguis ante diem septimam, bis in brachio, semel in pede, quæ venæ sectio cum immunem omnino reddidit è capitis dolore: enematis alvus quotidie sublucebatur, exhibebantur Iulepi hepatici, fortius hypochondriorum adhibebantur a quorum usu remittebat eorum durities manifeste: tandem symptomatis omnibus remittentibus aut mitescensibus, cum evidentibus coctionis in urinis notis, octava die lenis pugatio & epirastica exhibita est, cui non defuit optatus successus: Toto eo tempore, quanquam non remitteret febris, sublevatum se testabatur, solitis deambulationibus insistens: Res eo in statu ad xi. usque qua se lecto tradere coactus fuit: xii. incanduit febris, defectiones aliquot biliozæ superveniunt, sitisque intenditur quæ parva hætenus fuerat: Buyatius Medicus vacuationes symptomaticas aliquando daripronuntiavit quæ periculum denuntiant, hanc vero ejusmodi esse non credere, qua de causa venæ malleoli sectionem ad diem sequentem præscripsit, dummodo levis illa diarrhoea consisteret: At vero cum die xiii. auctior foret, sanguinis missio facta non est: quamobrem injecto, juxta dicta Medici præscriptum, clystere, xiv. fluor ille ventris multo liberalior fuit, viresque ægri deiciebat, qui tamen circa vesperam substitit pane, sed succedentibus atrocibus hypochondrii dextri doloribus & totius ventris: Accercitus D. D. Mouton, dolorem illum adscripsit humorum metastasi factæ à parte ignobili ad nobiliorem, periculumque denuntiavit Dom. D. Moulinerius xvj. die morbi superveniens, rite explorato morbi & ægri statu, in hepar factam esse humorum depositionem asseruit, nec procul abfuturam mortem, quæ die sequenti adfuit circa noctem & morbi 17. Septembris. 27.

Postridie cadaveris dissecandi gratia cum o. cum dictum adiutem, rem peractam repertis: avidus ramen cognoscendi hypochondriorum & intestinorum statum, ob summos dolores quos ea in regione perpeffus erat æger, qui paulo ante obitum toxico se infectum fuisse credere mihi dixerat, laxatis futuris coram Dom. Garnier, deprehendi ventriculum sanum & integrum, at hepar & lienem omnino putrefacta, præsertim hepar quod lividum erat & lactis coagulati instar friabile: Intestinorum tunicam exteriorem corrolam & laceram diversis in locis, cum ulcere, cujus oræ callosæ erant, e quo materia purulenta prodibat, tantæ amplitudinis ut apicem auricularis digiti posset admittere, ac substantiam intestini cuiuspiam omnino pervalerat, quod quale fuerit designare non potuit, quia in abdomen confusa conjecta essent: cujus capacitate serositas biliosa exundabat, abominando & horribili fœtore prædita, cujus libræ circiter sex eductæ fuerant ab eo qui dissectionem susceperat: Neque cor neque pulmones vidi, graveolentiam veritus, quæ referente Dom. Garnier, in statu erant naturali, si Pulmones aridiores non fuissent. Dabam Villetæ Antoniz anno 1662. Octobris 2. Julien.

Nos infra signati, examinatis interioribus partibus cadaveris Dom. A Contant: intestinis pluribus in locis exulceratis, e quibus uani perforatum: Hepate & Liene corruptis intra bidui spatium, per quod doluerunt, Aquis & serositatibus intra abdominis capacitatem, extraordinarie fœtidis collectum, alique; symptomatis funestis, concludimus dictum Dominum morte violenta occubuisse, inducta a causa maligna & veneno lente actionem exerente, quod substantia se non prodidit, sed tantum effectibus: Quod asserimus 2. Octobris 1662. Mouton D. M. Garnier, Julien.

Dominus Corbet, Procurator Regius Vienne Delphinatus, relationem præcedentem, quia res est momenti, communicatam mihi voluit: Ea præsertim de causa quia rumor erat defunctum a veneno exhibitum interuisse, quamobrem sententiam meam quoque; ut proferrem voluit.

Ego D. Medicus Facultatis Monspeliensis, Lugdunensi Aggregatus, infra signatus, certum facio me legisse, & ad amissum examinasse relationes facta a Dom. Mouton Doctore Medico, ac magistris Garnier & Julien Chirurgis Delphinatibus, morbi & eorum quæ adnotate sunt in cadavere adaperito Domini A Contant: Qua de causa censeo morbi & mortis causam adscribendam esse insigni cacoehymia & corruptelæ humorum, cujus malignitas proles est & alumna: nec non vermium copiz febris comitum quandoquidem æger morbi initio famelicus fuit: Intestinorum unum percusum fuit, e quo materia exiens, uni versum abdomen implens, putrida, abominando fœtore donata fuit (proculdubio ob lumbricorum ingentem copiam mortuorum & in intestinis corruptorum; quos proculdubio videre licuisset iis apertis) & intestinorum exteriorem tunicam exulceravit: mesenterium & epiploon corruptis, nec non hepar & lienem, intemperie affecta & impuritatibus infarcta: quandoquidem ab initio morbi observata fuerat insignis in utroque hypochondrio tensio, iis familiaris qui prava utuntur dia-

Neque enim locus est constituenda legitimæ exhibitioni veneni, cuius nullum signum univocum extat, cum ventriculus (qui primam veneni impressionem, ore dati, semper excipit) integer & sine labe repertus sit: Adde his memorata symptomata febribus a venenis inducitis fere familiaria esse quod hoc tempore præsertim innotescit, quæ Delphinatum huiusmodi regiones peragrarunt, (Gratianopolim præsertim anno 1650) plurimum funesta: Atque hæc est mea sententia quam propria manu firmavi: Lugduni x. Octobris 1662. Gras.

Febres continua lethales, exussis visceribus ob denegatum potum.

Sunt quidam qui eandem fere legem in omnibus febricitantibus servant, nimirum ut caveant maximopere à frigido potu: quam ob causam anno 1649. innotuit propemodum ægrotum numerus e vivis sublatus est, cum tamen febres essent continuæ, cum mixtione diversorum humorum & præcipue bilis, non tamen solæ, qui cum citi maxima torquerentur exulsi obibant.

Sectis cadaveribus ventriculus, cor, pulmones & reliqua viscera tanquam exulta apparebant. *Domin. Panarolus Pentec. iv. Observ. 8.*

Febrie continua extincti vasa omnia sanguine depleta reperta sunt

Anno 1641. Novemb. v. dissectum fuit corpus Principis Ferdinandi, Hispaniarum Regis fratris, qui lxxxix diebus Febri continua, ætatis 32. ann. Sublatis, corde, hepate, pulmonibus, adeoque dissectis venis & arteriis, vix cochlear cruoris in cavum thoracis confluit. Plane nimirum ostendit hepar exangue, cor vero instar crumenæ flaccidum: Biduum ante mortem plus edisset si ipsi concessum fuisset: Fuit nempe per venæ sectiones, purgationes, hirudines ita exhaustus, non desinebat tamen Tertianæ typum servare. *Helmonius Tract. Febris cap. 4. §. 16.*

In cadavere febre extincti in vasis vix libra sanguinis superstes fuit. *Car. Piso lib. de morbis a ferro secta. 2. p. 2. cap. 4.*

Anno 1663. obiit in Gallia Serenissimus Princeps H. ab A.D.L. annos 63, natus, pusillæ staturæ sed vividæ & robustæ constitutionis: Huic febre continuâ prehensio tam stricta dicta imperatur, quanquam largiori alimento, si concessum fuisset, libenter indulgisset tamque frequentibus venarum sectionibus ex depleatur, ut aperto post obitum corpore. vasa omnino exhausta reperta sint. viscera autem omnia integra, nullatenus, ut in sene, flaccida & marcida. Adeo ut facile constiterit magis illi funestam fuisse medicorum industriam & sedulitatem, quam ipsam vim morbi.

Febres ardentes alimentarios humores corporisque substantiam calore suo absumunt, scribit Hippocr. 1. de morbis, Qui ex febre ardente moriuntur, omnes ex sitestate moriuntur, Et referunt auctores quidam sanguinem totum fuisse absumptum, ut scribit Argenterius ad cap. 2, lib. 2. ad Glanconem de Mutio Medices, Arcis Pisanæ Præfecto, in cuius cadavere percutta quidem sanguinis reperta est, *Primrosius de vulgi erroribus lib. 2. cap. 6.*

Illustriss. Marchesia Rangona tribus ab hinc diebus sollicitatur febre continua, è genere ardentium, imò etiam Leipyria pulsus enim 1.

magnus est, celerrimus, frequentissimus, atque etiam durus, non nihil, languidus tamen, qui Galen. teste, biliosas febres non omnes consequitur, sed letales tantum.

Sitis licet non sit inguis, ob humorem à cerebro in os assidue labentem, insignem tamen calorem febriem intus urentem indicat, alias enim ægra non sitiret, nec aquæ potum usque adeo ex peteret. 1. Vigiliæ quoque immodicæ febri huius naturam patefaciunt, quippe quæ vaporum à bile putrescente in caput elatorum acrimoniam consequuntur: Cæterum quoniam cerebrum distillationis principium multis subfrigidis abundat excrementis, fere continue in somnum propensa est, dormire tamen vix potest brevè etiam temporis spatio, unde colligitur Coma vigil. 4. Temporum insignes pulsationes dictæ febri pariter sunt indicia, humores enim biliosi facile sursum tendentes temporum arterias subeunt, eoque congressu membranas, tum internas tum externas invadunt feruntque, ideoque 5. capitis dolorem suscitant, tant, ita ut 6. quidam Deliris præludia detegantur: quandoquidem morbum perquam gravem & acutum minime (ut deberet) sentire videtur: interrogata enim quomodo se habeat ut plurimum bene respondet: Quod mentem laborare indicat iuxta aphor. 6. sect. 2. 7. adeo spiratio frequens, laboriosa, & cum stertore quodam, à virium languore, usu aperto, ob viscerum, præsertim spiritalium, ingentem æstum atque viarum spiritus angustiam, capitis fluxionem in asperam arteriam consequentem, unde stertor: 8. longitur huic febri dolor dextri lateris, non pectoris & acutus, sed admodum mitis non continuus, sed longo temporis intervallo interjecto leniter suscitatus, qui parte laborante exterius pressa excitatur, minime certo loco circumscriptus, sed modo hanc, modo illam dextri lateris partem invadens. 9. Excrementa, ut feces & lotia, multa bilie repleta sunt: nec obstat quod pituitosa etiam admixta biliosis excrementa conspiciantur, nam ex præcedentibus sunt collecta: quæ cum spumosa sint, magnam viscerum & venarum ebullitionem indicant: tæces non solum biliosæ spumosaque conspiciuntur, sed læves etiam ac nonnihil pingues, quæ nativum viscerum calorem ab ingenti calore putredinati & febrili violatum denotant, ut humores prius liquentur, deinde carnes & pinguedines: Lotium autem primis morbi diebus rulum fuit & saturatum, tenuè tamen, utrumque caloris nativis obsoles, cuiusque morbi indicium, deinde confusum apparere coepit ob sanguinis & humorum, qui venis sunt majoribus confusionem, corruptionem & putredinem, cum putredo omnia perfrat, permisceat & confundat: 10. sudores circa caput, collum & pectus, una cum copiosiore urina erumpere coeperunt, qui mali, quia nullo in cæteris excrementis apparente coctionis signo, exigui, subfrigidi, febre non deficiente & in die pari promoti sunt: 11. Insignis calor percipitur circa thoracis & ventris regionem, licet exteriores corporis partes interdum frigida, nonnunquam moderate calida contingantur interiores tamen semper affirmat ægra hinc linguæ nigredo, tamen non multum arida cernatur, ob materiam à cerebro in os assidue distillantem: Ex quibus colligi-

mus febrem hanc putridam & continuam, non solum biliosam & ardentem esse, verum etiam Leipyria naturam amulati, cujus locus est in venis quæ ad partes spirituales ad jecur & hypochondria spectant, quod patet ex illarum partium ætu, dolore, atque hypochondriorum, præsertim dextri, elevatione potius quam renitente tumore, febris autem binas exacerbationes quotidie habet: mane nimirum & vespere, levestamen, ac tertio quoque die, sed per dies pares manifesta exandescencia apparuit, cum vero maxima esset inter nos opinionum ambiguitas, statim discessi non amplius rediturus, verum hora quinta circiter sequentis noctis, (die morbi quinta) summis precibus accersitus, illi ægram inveniri valde siticulosam, anxiam & inquiete, se jactantem, cujus extrema frigida non amplius recalescebant, difficulter & cum interiore respirantem, prompte tamen loquentem, quibus omnibus exacerbatis symptomatibus præceps destillatio ita impetuose accessit, ut præclusa spiritus via temporis brevissimo momento prælocata perierit.

Dissecto cadavere reperti sunt pulmones penè tabefacti & exsiccati, præsertim quoad partem finitimam, etenim, sicut secundum propriam substantiam, in suam maciem siccitatemque dextri quoque pulmones ob eandem causam inciderant, ita tamen excrementitia humiditate suffusi ob inflammationem a sanguine prurioso ea in parte inceptam, molles & haccidi apparebant, imò corruptio quædam in membrana pulmones succingente ejusdem lateris dextri manifeste concipiebatur: Partes igitur internæ, ut prædicebam, non autem externæ, afficiebantur, nisi alio quodam leviori & peculiari affectu: *Zecchijs consultatione.*

Tantum in Leipyria febre renitentiam alexipharmacis omnibus observavimus, ut mortuis ægrotantibus, secto pectore, maculæ nigerrimæ inventæ fuerint, per totam pulmonum substantiam dispersæ & alte penetrantes: pulmones hoc modo variegati pardi pellem amulabantur. *Don. Panayolus Pentec. 2. Observ. 14.*

Famulus cerevisiarii Delphensis misere ultra annum decubuerat, annos natus 36. Per integrum annum dolore hypochondrii dextri conficiebatur, atque in autumno febrem habuit non observantem typum, lentam tamen, qualis in corruptela subitantiæ jecoris fieri solet: duravit deinde hæc febris, typum non retinens aut observans, per totam hyemem sequentem, quæ neque hominem in vere reliquit, & perduravit deinde ad ætatem usque &c. Cum autem per annum quasi tabe consumptus foret, maximos dolores perpassus, ac tunc faciem ictericis similem haberet, qualis contingere fere solet omnibus jecinorosis, tandem C. Ericium accersivit, quo statim repudiato cum opem non sentiret, variorum empiricorum opera usus est, ita ut tandem ad extremam atrophiam deveniret: Ego quoque accitus, hominemque inspecto, admirari cæpi, cum in vita virum magis consumptum nihilentemque nunquam vidissem, cui tantum pellis rugosa una cum ossibus restabat, jecore enim ita contrahente totum corpus tabe absumptum conspiciebatur: Deinde huic non solum facies erat citrina, sed universum corpus flavum evaserat, etiam albedine oculorum

in citrinum colorem plane conversa, quod & jecinorosis & ictericis evenire solet: Aderat & huic tussis sicca, admodum molesta, hominem omnino conciens: hypochondrium nempe dextrum apparebat durum & valde subitundum, & omnibus conspicuum, multumque abdominis plane consumptis & extenuatis: urina vero tenuis erat, sed supra modum tincta & ignea, ut vinum rubrum ac diaphanum videretur: sed & oris siccitas eum molestabat, præsentem febrem hecticam, ac pulsu vix apparente, & magis sub noctem interia: cæterum modo alvus adstricta erat, modo admodum liquida & plurima biliosa liquationis instar egerat: postea iterum fuit arida & sicca: Præterea aderat & cibi satidum sitisque inexhausta, ita ut in aquam frigidam ac gelidam magna in copia hauserit, ad hunc postquam ultra annum laborasset, ingressus, cum ab initio huic sanguinis detractio esset præternaturalis, idque male in epatis inflammatione & apostemate, nunc id nullo modo siccit, in homine jam tunc & hecticæ febre consumpto, ipsoque humido radicali etiam absumpto: Ego vero apostema in hepate confirmatum atque incurabile pronuntiavi, & non diu post hæc opinionem confirmavit cadaveris sectio: nam tumor admodum durus paucis diebus e regione hepatis ita in immensum excrevit, ut omnibus appareret, non sine dolore: quod ligatum erat abscissus futuri, nam si simplex scirrhus fuisset nimis doluisset: quare prædicto prognostico cum pro deplorato habuimus, cum apostema hepatis confirmatum non curetur, ac postea cum idem tumor laxior fieri inciperet, febrem agis invalescente, suppurationem expectavimus: hinc cum apostema maturum appareret, & materia satis esset deducta ad saniem, renitebantur quidam prædicta accidentia, gravitas tamen major remanebat, cum materia in uno loco magis congregata videretur, & tactu lenitas & mollities sentiretur, duritie, quæ prius sentiebatur, in totum ablata: statim autem cognovimus ex dolore redeunte, ruptionem appropinquante, punctione & febre rursus increscente & gravitate majore: cum tamen perse non rumperetur abscissus, ut Chirurgus ruptionem juvaret imperavimus: verum cum ejusmodi ingens apostema non rumperetur, Chirurgum incitavimus ut ad incisionem procederet, sed in corpore debili & exhausto id tentare noluit, vel non audebat: existimabat enim quod tandem per medicamenta apposita rumperetur: verum cum illud non succederet & escharam quasi induxisset, denuo me in consilium adhibuit: ego autem cum ex signis præsentibus animadverterem quod pus totam ventris cavitatem occuparet, potissimum e regione hepatis, ubi tumor ingens laxior apparebat (nam motio puris & fluctuatio quadam exaudiebatur) ulcus jam factum in hepate malignum, putridum & corrosivum judicabam, quod hominem subito è vita tolleretur, nisi ulla (ut veteres Medici facere solebant) vel incisio aut apertio statim fieret scalpello vel phlebotomo aliquo, quæ licet etiam in homine deplorato & viribus exhausto periculosa haberetur, tamen tentandū fore, ne æger statim ex putredine puris intus collecti exspiraret, ideo & secundus Chirurgus advocatur qui incisionem statim agenda censuit, præhabito tamen prognostico quod cura coacta periculosa foret, ta-

men tentanda ne ulcus in pectus procederet: interim si fieret, atque æger animo dilinqueret, sicque vitam finiret, id in manu nostra non esse, cum vires exhaustæ essent, interea potius anceps quam nullum remedium adhibendum: Cæterum ægro ipso, tum amicis altantibus consentientibus, Chirurgus dextre suo officio functus est; prima vice post adhibitam incisionem sanie virulenta & sanguinolenta absque pure exeunte, ac cum vulnere impositum esset linamentum, quod secunda visitatione amovebatur, materia viscosa, purulenta, foetida, copiosa emanavit, cum tanto foetore ut totam domum eo implerit, ita ut vix quisquam nostrum in cubiculo apud ægrum persistere posset: Cum vero materia foret vitiosa, ut eo minus exire posset, denuo coactus est incisionem ampliorem facere, quod etiam dexterrime peregit neque interiora laluit: exivit tunc materia admodum foetida & purulenta amuræ similis: unde coniecimus omnia interiora corrupta, & hepar similiter, & ægrum non evasurum amicis prædiximus, juxta aphor. xlvij. 7. Tertio autem die ab incisione caro exterius facta est livida ac in gangrænam mortificata: nec tantum caro externa, sed & interior, quod cognovimus ex ingenti putredine & foetore qui ex loco inciso exhalabat dum vulnus resciceretur, non aliter quam ex homine cadaveroso & demortuo: præterea dum Chirurgus paulatim pus propelleret, & ad exteriora labia vulneris deduceret, tanta cavitas apparebat ut & interna tandem etiam corrupta spectarentur: Paucis, septimo die ab incisione peracta mortuus fuit.

Eo demortuo cadaver incisum, Et in tota ventris capacitate copia puris valde foetentis, ut præsentis in cubiculo perdurare vix potuerint. Occupabat autem pus tam partem sinistram quam dextram sub toto abdomine, usque ad unum ventrem, & repertum est ommentum à pure virulento consumptum, peritonæum quoque disruptum & putridum conspiciebatur, similiter & intestina nigredine & plumbeo colore infecta spectabantur: Hepar autem durum videbatur, ingentis magnitudinis albicans autem circa stomachum, sed in gibba sui parte, prope nothas costas, nigrum, exustum ac plumbeum, in esthiomenon transmutatum: erat enim hepar circa illam partem potius esthiomenatum, ut ita dicam, quam ulceratum: & in parte gibbosa, paululum deficiente à costis, gangræna infectum: Et vix pus in hepate conspiciebatur, potius vero in concavitate ventris, quod ab hepate disrupta membrana eo defluerat: præcipua autem Hepatis corruptio erat in parte dextra, versus costas spuria, & circa musculos: intercostales quinetiam similiter nigredinem contraxerant: Costæ quoque spuria tanquam igne combustæ ex esthiomeno, nigritiem & exiccationem contraxerant, ita ut carbonis instar nigre adustæ frangerentur: Viceratio vero ad musculos abdominis processerat, magis in parte dextra, qui muscoli similiter tandem nigredine & gangræna affecti erant. In parte vero hepatis esthiomenata potius vitus & sanies spectabantur quam verum pus: mirum fuit quod hic tamdiu vixit: Antequam autem in illam tabidam & siccam dispositionem

Domina de Bobigni, cum per annos aliquot sensim atque paulatim emacruisset, omne alimentorum genus fastidivisset, & ut loquitur Hippocr. *ἀπὸ τῆς ἐξουσίας τοῦ σπλάχνου*, tandem repente ac inopin. to est extincta, ac cum cibum nec caperet nec appeteret (apud Hipp. autem *ἀπὸ τῆς ἐξουσίας* significat cum aliqua appetentia accipere) quotidie vivendo moriebatur & moriendo vivebat, prehensa est paroxysmo febris tertianæ typum referentis: tertio post die idem paroxysmus, à quo revaluit & fuit *ἐπὶ τῇ τρίτῃ* & habebat more solito, locum & deambulationem cogitans: At accessit rigor *ἐπὶ τῇ τρίτῃ* tertiani & tertii paroxysmi: fuit rigor ingens & tantus ut ab eo non potuerit, ut loquitur Hip. *ὡς ἐπὶ τῇ τρίτῃ*. Totum erat sane *ἀπὸ τῆς ἐξουσίας* interna conflagrant incendio: sequenti die rato concessit & conquebatur maxime de dolore ad hypogastrium.

Invenitur aperto cadavere pulmo aliqua ex parte inflammatus, epar exsuccum & mali coloris: Sed uterus erat corruptus & quasi gangræna affectus, plenus tabo & sanie, quæ erat *ἐπὶ τῇ τρίτῃ* Maritus per tres annos fere abstinerat a congressu: forte si ager fundusque cultus fuisset melius cum ea actum foret: laborarat olim *ἐπὶ τῇ τρίτῃ*, qui erat tetri odoris, aliqua ex parte & fere omnino suppressus erat: interit tere à venena interno & genitivo: Hæc cum alias fecunda esset, (quod mirum) cum foemellam conceperat, fluebat ista materia, etiam copiosa cum marem, aut minor erat aut stillebatur. *Jac. Thevart nota 2. in conf. 96. lib. 1. Conf. Basilien.*

Filiolus septennis Ill. Baronis de Hinton. ob varios in victu errores, doloribus intestinorum jampridem obnoxius, Novembri elapso vomitionibus porraceis, alvi fluxu putrido, æruginoso interdum & variegato tentabatur; febre insuper exacerbationibus sub noctem cum anxietate, morsu ventris, nausea, stridore dentium, frigore extremorum, & siti inexplebili stipata: Per totum morbi cursum intractabilis pessime se habuit ad oblata, medicamenta pariter & alimenta, solis gelatinis ex C. C. & rasura eboris in cerevicia tenui solutis refocillatus, quas etiam sæpissime, præmissis roctibus aliquot acidioribus, anxius exstomachavit: Fauces interim aphthiis & albicante mucilagine usque ad linguæ radicem conspurcabantur. D. D. Meara memorata symptomata & una cum materia membranosa rejecta de phlegmone & sphacelo ventriculi hænitantem tenuerunt, eam tamen non esse ex nobilitate partis affectæ, morbum tam lethalem in tot dies productum ferendo imparis, ex partium necessario consentientium incolumitate, ex euphoria denique ad ejectionem consequente, passus est sibi persuaderi: Ob similitudinem potius substantiæ, materiam jam prope lumbricorum fornæ dispositam, vel forsas particulas esse lumbricorum putredine fractas coniecimus. Circa 8. morbi diem accersitus sum, consentiente autem D. D. Meara ad expurgandam morbi mineram in primis viis malignitate vermiformi putrescentem, infusum rhei mane exhibetu, coctione quad. in in urinis apparente: o. quo septies ferebatur alvus, excretionibus sumum incendium redolentibus, sub nocte tamen ingravescebat febris consuetis stipata symptomatis. 10. Summo in me substantiam quandam nigricantem, viscidam &

quali cutiformem summa cum inquietudine evomit, ex quo levatior aliquantulum ad somnum se composuit: nox eadem: 11. delirus in lecto contineri noluit, laudano vero opiato sub nocte confopitus sibi restitutus est: 12. conimilis materia semel ac iterum cum priori molestia portio eiciebatur. 13. 14. Nausea, vomitus & diarrhoea aliquantulum sedabantur, ita ut appetitu quodam ad iuscula incitari videbatur: Exacerbationes nocturnæ omnino cessabant, nunc quod pro stridore dentium varium pruritus continuo scalpenti impetu urgebat. 15. Sedatis igitur symptomatis, discessimus, Pharmacopæo interim junctis consiliis insulam rhei repetendum cardiaca, aquam deinde caponis cum scolebotricis destillandam ad fercula ordinaria curavimus: 20. alvus decies dato pharmaco ferebatur, nocteque sequenti refocillatus muliercularum cura & Pharmacopæo tradebatur: At, at, quod per diem unam vel alteram deliruit venenum jam tandem majori cum ferocia excanduit, ita ut perseverante fluxu, rebelli & colliquativo, enaciatus ad marasimum ducebatur: 28. denuo vocatus, in tam stupenda macie, qua potui diligentia viribus incumbendo, ceterum de felici eventu omnino despondens, in morbo pariter ac ægro intractabili, modis tamen quibus licuit omnibus contendimus: cataplasmatibus præsertim, anodynis & roborantibus *mi æ τῶν ὑποκρίνων* munimus: analepticis exanguem retinimus, præcipue laudano opiato tanquam sacra anchora hæremus, sine quo continuo egerendi conatu fatigato, vel minimas parare inducias impossibile duximus: Hisce tentatis, alvus supra quam sperari potuit denuo sistitur, regio abdominis mollior & plenior assurgit, excrementa, quæ bis tantum vel ter in die deiecit, coqui parumper & ad mediocritatem quandam reduci videbantur, perseverante tamen in ulera & rerum omnium fastidio, seseque per intervalla prodit pestis cum fluxu bilioso, sincero, pingui, spumoso foetido conspicua & ipsissimis viceribus radicatus impacta: 36. materiam jam quarto vernisformem reiecit, unde continuo in pestum adhuc superesse remedium speraverint, propono 38. Clar. D. Dikes accersitus, vix dum audita historia conceptæ opinioni de morbi causa calculum suum adjecit, de prognosi autem paulo confidentior, fluxum illum perniciosum nec fruari posse nec debere pronuntiavit, nec exanguem sceleton renutriti nisi veneno in ipsa culina & organis nutritui inservientibus hærente per cathartica profligato: Vicit viri sententia, feliciori forsitan omne obeunda in principio morbi & constantibus viribus, ubi nec macies, nec facultatis lapsus ceteris omnibus intentionibus ingentibus præpolluere: Eadem nocte Marc. dulcis cum resina gyalap. in syrupo garyophyll. propinabatur: frequenter deiecit lætida & pingua sine evidenti virium ruina, de vermibus autem sollicitus, eosque medicamento parere nullus dubitans, repetitionem hortatur pulveris & infusionem hydrag. vice julapii: 41. Summo mane sub priori regimine administratur purgans ut ante, sed in minori, ut par fuit, quantitate & minori molestia: sub nocte levi deliquio, tremore minui & motus impotentia affigebatur: hinc vino albo valleriol. concessio, & laud.

mop. gr. 1. ad ulteriorem spirituum dissipationem præcavendam, somno se committit: xiv. sub mane, sudor diaphoreticus tempora & frontem occupavit, qui post horam unam vel alteram laxatis spiraculis per totum corpus calidiusculus erupit, sub vespere, recreato parum & ad motum habiliori, carnes vitulinæ (poscenti sane) offerebantur, quas tandem succo spoliatas exipuit, noctemque sentit insperato prægressis auspiciorem, cessante forsitan natura & indomitæ pesti succumbente: xv. Hæc interim tanquam læta auguria D. Dikes una cum Illust. Patre in ulteriora erigunt tentamina: sub nocte repetitur pulvis compari regimine, minori tamen evacuatione, ita ut natura penitus deiciente nihil ultra periclitari placuerit, præsertim Doctore se subducente: xlix. Mane sanguis tenuis & ichorosis, tanquam ex liquamine Pulmonis, reciprocatione spiritus per asperam arteriam in os ferebatur, linteis intromissis enulgendus: hora 5. pomeridiana frigidum & exanguie simulacrum tanquam exuvias deposuit Nobilis infans.

In aperto cadavere, rudi & inexercitata manu aperto, quæ observari potuerunt hæc sunt 1. Ecchymomata circa musculos transversos 2. Peritonæum nigricans & putridum 3. Omentum sicut & mesenterium extenuatum & omni pinguedine spoliatum, 4. Ventriculus laxus & inanis. 5. Intestina flutibus distenta, pellucida, excrementis vacua, internis quin etiam tunicis & librarum omni genere exuta. 6. Ileum colore flavo variegatum. 7. Epar in parte concava lividum: Vesicula fellea quintuplo quam per est tumidior. 8. Pulmones exulti, aridi & mucagine alba obductis, 9. Cordis ventriculus sinistè sanguine gumoso repletus. 10. Venæ majores vice sanguinis sero repletæ D. Bidgood in *hijlor. rarioribus* Edmundi de Meera, p. 161.

In sede febrium facio cum Sylvio esse intestina tenuia: id sensus docet, exempla obvia sunt, unum con muncabo ex schedis paternis, Mulier germane Patavii, robusta & corpulenta, nonnihil pinguis, sexagenaria, nihil excrevit per alvum spatio novem dierum, nec clysterem admittere voluit: Incidit in febrem Malignam cum vomitu bilioso, moritur post biduum.

Aperto cadavere pulmones fere putridi, Hepar parum scirrhosum & inflammatum, Ventriculi tunica interior inflammata, Intestinum Ileum in medio gangrenosum & putridum (ut ruptum sit inopinato ex contactu) tota pars, supra gangrenam ilei, inflammata intus in tunica interiore, ut supra modum venæ mesaraicæ magnæ & turgidæ fuerint: Pars Ilei inferior tota coaluit, ut nihil pertransire potuerit: Aquo succo ista inflammatio sit, sensu dijudicare non possumus, nisi faciem experientia sua præferat Magnus Sylvius Thomas Bartholinus centur. iij. Epist. 86.

Credo Helmontio sedem malignarum febrium esse in ventriculo: Id testatur Anatome illorum qui eo morbo extincti fuerunt, Observatus enim est ventriculus cum Intestinis inflammatus. Unde ingens illa sitis, vomitus, faucium ardor & alia apparentia oriuntur: Ex hujusmodi profecto sectionibus & oculari demonstratione certius de sede affecta indicamus quam rationibus & conjecturis: Firmat historia mox citata &c. Non ab similia vidit in dissectis febri-

citantibus. Spigelius lib. 1. de semitertiana cap. 16. Roma innumeri ægroti anno 1649. febre contigua occubuerunt, in quorum sectis cadaveribus ventriculus & reliqua viscera tanquam exsulta apparebant, teste Panarolo Pentecoste 4. obs. 8. quare refrigerio & humectatione postea multos sanatos scribit. *Th. Bartholinus cent. 3. Ep. 4.*

Nob. adolescens relicta Germania, Brixia ad diem 27. Junii anni 1571. in itinere alvus ei primum fluere cepit, idque durans per dies forte xv. debilem valde reddidit: Quo fluxu tandem cessante, iterum convaluit, nisi quod faciei color usque cineritius remansit. Porro circa Januarii. medium alvus ei strictior reddita, remansitque deinceps semper ita, ut nisi suppositorum adhiberetur rarius sedes haberet forte tertio vel 5. nonnunquam etiam sexto die laxari prunorum atque passularum, uvarum coctarum non potuit: nihilominus tamen comedit multum & hilariter nullos sentiens dolores, aut capitis gravedinem ullam, victus ipsi cum cæteris nobis communis; Eivinum sine aqua, & extra prandium vel cenam nunquam bibenti, nec excessum ullum facienti, se noster gratissimum: Ingreunte æstate ei in facie pustulæ obortæ sunt rubicundæ; atque ad diem Aprilis 29. Febri tertiana duplici laborare cepit, à quo Doctorum auxilio mox liberatus nunquam satis feliciter valuit: Cœnas nihilominus ac prandens more solito, usus subinde lactis fero usque ad decimum septimum Junij, quo denuo per integros decem dies incepit vi febris putridæ & hæcticæ decumbere, ac Medicorum præscriptionibus parere, quoad 26. præscripti mensis, statim post solis occasum vitæ diem ultimum clausit.

Hujus igitur cadaver cum post horas x. vehementer intumesceret, nigerque sanguis a naribus erumperet, diversa suspicatus ut aperiretur omnino volui: Quocirca in aperto corpore primum Pulmones pustulis affecti, omnino putridi sunt reperti: Lien nigrior & grandior, Jecur ponderosum adeo & plane exsiccatum; Stomachus cum reliquis partibus purus & integer, continens adhuc aliquantulum brodii hordeacei, 4. horis ante mortem sumpti, apertum corpus foetidissimum edidit odorem.

Cum igitur prædictus Nobilis ad minus mensibus novem semper maxime sobrie, imo sine maximo etiam excessu quam temperatissime vixerit, ab excell. Medicis causas scire desidero. r. Unde alvus adeo stricta permanferit; Diende unde Jecur, unde Lien usque adeo affecta, atque pulmones tam valde putridi redditi sint, & unde mors ipsa provenerit, cum tam in ægritudine quam extra nullum commiserit errorem: ejusque optima habita sit ratio. victum quoque semper habuerit optimum: Num aer hic Italicus morbi hujus causa extirerit, & an diutius forsan in Germania vivere potuisset: Postremo quoque unde cadaver post mortis horam x. prius inceperit intumescere, & tantum cum maximo fœtore nigri sanguinis copiam per nares ejecerit; &c.

DE affectibus quos passus est Nob. Juvenis, de illius morte, necnon de iis quæ post mortem sunt subsequuta, ut ex arte loquamur, hoc unum inprimis statuendum est tanquam manifestum & confessum, juvenem hunc à primor-

dio generationis suæ Jecur calidissimum habuisse, caput vero humidius, & pulmones satis imbecilles, matrem non usque adeo laevam: quo factum est ut Jecoris caliditate humor melancholicus in dies magis magisque augetetur, inde obstructions, & propterea etiam caloris incrementum, ex quo Jecinoris incendio omnia mala tandem sunt subsequuta, etenim Gal. 6. de diebus crit. 3. & 1. de loc. c. 7. dicebat Affectio jecinoris sensim animal, moraque temporis lationem in alimento percipere & calorem contrahere: quare mirum non est si ex generatione humoris melancholici, & propterea frigidi alimenti, color ille lividus & cineritius exortus est: Sique ex multis obstructionibus Jecur exarsit & Lien tumidior factus est. Etenim cum plurimum sanguinis melancholici generaretur, atque ad lienem transmitteretur, neque vitus liens tanta esset ut humorem illum distribuere, aut absorbere posset, hinc lienis tumor subsequutus est: Et hanc esse causam putamus cur Jecur siccius, ac veluti aridum in cadaveris sectione observatum sit, & lien tumidior apparuerit, quod 1. loco quærebatur: Hinc etiam apparet causa cur post alvi profluvium alvus adstricta permanferit: Etenim sicuti alvus sit humidior quando cibus in chylum convertitur parcius distribuitur in Epar, sic rursus siccior & adstrictior redditur cum omnis humor in ea contentus ad Epar fertur: & sicuti parcius distribuitur, vel quia pius assumitur quam Epar indiget: vel quia citius trajicitur quam Epar attrahit, idque vel ob multitudinem bilis, expultricem debiliorem: sic omnis humor ad Hepar fertur, vel quia minus sumitur quam Epar indiget: vel quia Epar sui caliditate citius attrahit quam par sit, & omnem chyli humiditatem absorbit, imo propter obstructions venarum Epatis ad intestina bilis transmittitur, cujus causa facultas expultrix proritur, atque propter caliditatem & siccitatem Jecoris, intestina quoque sunt calidiora & sicciora, & ob id ad retinendum robustiora, ut mirum non sit si in hoc Nob. Adolescente, præcedente alvi profluvio, subsequuta sit alvi adstrictio, non quod cibus plus justo fuerit subtractus, sed propter jecinoris caliditatem & siccitatem, quæ omnem fere humiditatem absumpsit, adauctam fortasse propter obstructions, quarum causa bilis quoque transitus ad intestina fuerit impeditus, & vis retentiva intestinorum facta fuerit robustior & feces sicciores, & hæc uti arbitramur, est causa illius quod primo quærebatur: Quod vero & humorum exussio, cum quadam pravitate in corpore conjuncta, fuerit in causa ut pulmones putrescerent, ex hoc facile conjectari licet, quoniam fieri potuit, ut vapores & pravi succi in caput delati, cum in optimum nutrimentum commutari non potuerint, qui ad pulmones transmissi pustulas in pulmonis excitarent, aut cum pulmones suapte natura imbecilliores extiterint, ob pravam alimentum pustulæ illæ fuerint excitatæ, aut utroque modo perpelli fuerint: quibus pustulis excitatis, uti patet, febris maligna & fixa fuerit excitata, uti voluit Gal. 1. in Epid. 1. Hoc autem persuadere quoque videtur raucedo & catharrus insignis qui apparuit, ut mirum non sit si ob pustulas illas veneficas & malignas, quæ virus & materiam veneficam ge-

rarunt, calor natus pulmonum fuerit extinctus, unde putredo illa pulmonum insignis, & tandem mors per suffocationem est sequuta, quod 3. & 4. loco quærebatur: Quod cum ita sit, cur mirari debemus si post mortem intumuit, cum hoc sit opus materię venenę, in his præsertim qui per suffocationem pereunt? Quoniam humores & spiritus a proprio principio in materiam deleteriam revocati, liberi & soluti, quum imo ab eadem refugientes, quodammodo ad partes optimas delabuntur, & sic universum corpus attollunt, & ora venarum aperiuntur, unde sanguis effluere solet, quemadmodum in hoc præfenti cadavere contigit, e ejus naris sanguis niger & melancholicus, & ob insignem putredinem valde foetidus effluxit. Et hoc est quod postremo loco in dubium revocabatur: Ut concludendum sit materiam hanc, quæ febrem excitavit, & tandem mortem induxit, venenam quidem fuisse, sed in corpore gentem, quod aliquando in corporibus male affectis contingere potest: Quare non aëri Italico, non prævi victus rationi, non ineptis importunis medicamentis non alicui causæ externæ sed prævi illius corporis constitutioni malum hoc est adscribendum. *Consiliorum Scoticarum cxcix.*

Parentes Illustrissimi. Ernesti Naslovici Comitissæ filia, annum vix egressa 23. Junij 1655. per litteras conquerebatur, quod filia eufara, florida & bene habens enormi diarrhoea correpta fuerit, altero die aliqua ex parte sopita, sequenti vero cum vomitibus recurrente largius: Advectus 24. Junij deprehendi duritiem in dextro hypochondrio, calorem totius p. n. sitim, pervigilias, capitis dolores, alvi excrementa alba, virium prostrationem, quibus 26. Junij superveniens epilepsia hanc vitam imposuit. Post obitum tota dorsi regio fuit nigra a umbra ad finem spinæ dorsi, ventriculus vero in sinistra parte nigricans & quasi putrefactus, viridi humore repletus. Hepar scirrhosum decem unciarum, vesicula bilis grandior & nigra bile inflata: Intestinum rectum quoque nigricans: Renes unciarum quatuor, bene dispositi & sani, ut & lien, vesica, ipseque Cor uncia unius & dimidia: Cerebrum vero librarum quinque copiosa aqua circumfutum erat, aderant ipsi pultula aqua plenæ: *Thomas Bartholinus, ex communi J. Van. Horstii, Gent. 3. Observ. 80.*

Virgo 31. annorum integro biennio ante mortem laboravit copiosissima varium hæmorrhagia qua non nisi venæ sectione sisti potuit: paulo post incidit in cachexiam & hydropis initium tumefactis pedibus & ventre interiore, remanente cachexia: Menses fuere in ordinati, aliquando non fluebant penitus, aliquando nimis erant copiosi: perduravit tamen hæmorrhagia, quæ alternis diebus crescebat, xiv. v. xv. die ante interitum corripiebatur tumidissima & sicca, nonnunquam quid foetidi expuebat: sentit punctiones & dolores in regione hepatis, evomebat bilem corruptam, præstinam ac cum ea vermem oblongum alioque simul vermiculos: Ego ad eam vocatus deprehendi febrem malignam, quam conatabantur subsequenteria symptomata, delirium, vigilia, inquietudo, sitis inextinguibilis, vomitus materię corruptæ, dextræ partis faciei resolutio

levis, hypochondrii sinistri ac lateris pectoris sinistri maximus dolor ac altus: Nul lateri incumbere potuit, color faciei flavus ac subniger: urinae erant subnigrae, ex dextra nare frequenter per intervalla aliquot sanguinis guttulae promanabant: Post multos perperos cruciatus morte occubuit.

Mortuum secui, atque primo occurrit vena umbilicalis (quæ in omnibus adultis novus ligamenti obtinet) sanguinis copia turgida atque extensa; in quibusdam locis, ubi hæc vena contorquebatur, instat varicum tuberosa: Hepar justam habuit magnitudinem, sed erat album, tuberosum, inæquale, durum & exanguine, ut vix sanguinis guttula ex dilecto hepate exierit, ex gibbo nihil, extrema parte parum, Thoracis capacitas dextra erat aqua subnigra & putrida plena, continebatque ejusdem aquæ cantharum & dimidium: Pulmonis dextra pars in ea cavitate collocata cum pleure corrupta ac nigra fuit: Ventriculus mirum in modum copia tumescens tum statum inflatus ac tumidus reperiebatur: Juveni & duas vesicas urinarias, alteram naturalem & in sua sede collocatam, alteram ex matricis collo dextro latere prognatam, naturali vesica duplo quasi majorem, lortio plenissimam & duabus tunicis, ut naturalis vesica præditam: Hic nullus meatus aquam vel immittens vel emittens conspiciebatur: Uteri corpus erat scirrhosumque: reliquæ partes satis integræ apparuerunt. Caput non aperui *Voischerus Cont. l. bello observat. Anat. & Chirurgia.*

D. de Malortie, Vir magni in militia nominis, ætatis annorum circiter 42. continuis vomitibus per aliquot retro menses vexatus, qui nec bolis ventriculum detergentibus & aliis catharticis. nec corroborantibus internis aut externis silli poterant, cum siti intensa, bilis copiam maximam in ventriculum confluentem indicantibus, sub finem Maii incidit in febrem quæ duplicis tertianæ, vel quotidianæ continuæ typum præferebat, à multa biliosorum & pituitosorum humorum simul copulorum putredine: ex duplici tertiana post octo dies t. cta est continua simplex: vomitus non desinebat; capitis dolor comitabatur & ardorem in lumbis percipiebat: Post injecta enemata emollientia & refrigerantia spatium trium dierum his n. istus est sanguis ex cubito, qui pituitosus & crassus erat: postea hirudines venis sedalibus appositæ sunt, quæ capitis dolorem & renum æstum placarent, sed inflabatur ventriculus dolorificè & hypochondrium dextrum, unde compatiens Hepate, & ad inflammationem tendente, sexta die auriginosus evasit, sed & men absque febris remissione, quod juxta Hipoc. Aph. 61. Sect. 4. perominosum est. Die 8. (cum septima sine evacuatione ulla critica effluxisset) purgatus est leni infusione rhei & agarici in aqua endivie, cum addita Elect. Catho. 3ss. & Syrup. ros. laxat 3vj. & conf. hyacinth. 3i. ad vires respiciendo, quia pulsus erat contractus, propter oppressam naturam a vaporibus malignis, unde sese expedire non poterat nec explicare: Vires deinde cadentes fulcire studium aquis & pulveribus cardiacis, & præcipuè lapide Bezoartico orientali, varie & extra partem, & in ipsis tercibus administrato. Non dabat magnam virium prostratio insignibus sanguine

guinis evacuationibus locum, pugnāvimus tamen cucurbitulis, venæsectionis vicariis, ad partes intimas cum leni scarificatione, & citra illam, ad revulsionem vaporum malignorum à corde: Enemata frequentia in eundem finem, vel quotidie, vel altero quoque die injiciebantur.

Die nona obiit, Introspectum cadaver exhibuit nobis epiploon corruptum cum fibris non coherentibus: Mesarum scirrhum in lya origine & corruptum, putrem lienen, Cavam epatis partem scirrham & inflammatam. Pulmonem, quæ costas attingit, inflammatione tentatum, Pancreas putrefactum, ventriculum pure repletum & in fundo pituita crassa ac villosa, unde vomitus illi pertinaces, infarctum: internam ejus tunicam aliquantulum exulceratam. Nihil in reibus & ductibus urinaris, omnia inibi alias integra, sed absque sero ullo: Intestinorum internam tunicam itidem, ut ventriculi, nonnihil ulterius justo abrasam & ad exulcerationem pronam. Sic in misero illo corpore adhuc fere repertum, *Riverius.*

Dux Canadensis obiit Lugduni xxvij Januarij anni 1658. circa sextam vespertinam, extinctus à febre continua maligna: Poltridie eadem dissectus est à Magistris Regnaut & Chirurgo, Chirurgis, coram DD. Rhodio, Grassio, Guillemino, Garnerio & Falconeto Medicis Urbis Aggregatis, atque hæc in cadavere adnotata. 1. Totius dorli epidermis inflammata & ex dimidio divulsa, ad partem lumborum internam gangræa duobus in locis, unaquæque latitudinis semicronati argentei quam plurimæ minores circumcirca ambiebant. 2. Aperto capite, non solum cerebri meningis phlegmone tentatæ fuerant, & vasa plurimum distenta ac repleta sanguine adulto nigroque, sed & tota cerebri substantia, præsertim cerebelli, reliquis partibus magis inflammata cum siderationis initio. 3. Pectore explorato, in utroque phlegmone occupati & exsiccati comperti sunt, sunt, mediastinum, pleuram, septum transversum inflammatio quoque invaserat necnon universos pulmonum lobos, parte poltica sideratione omnino correptos: pericardium paucissimam aquam continebat: cor inflammatum, admodum flaccidum, quod immixtum vini spiritui, in quo plurima aromata infusa fuerant, cardica & putredini reluctancia, condituræ gratia, inde summe foetens exemptum est: 6. In imo ventre Epiploon corruptum apparuit, cum maxime intestinorum partis mesenterij & pancreatici inflammatione, 7. ventriculi interiorum tunicam phlegmone etiam non invaserat, in qua aliubi conspicuæ maculæ lividæ, præsertim quæ lecur spectat, 8. cuius tota substantia iustam matione correpta erat & sphacelo tacta, præter in tota parte cava: 9. Splen incendium conceperat, in colore immutatus. 10. Renes quoque ætus notas præ se ferebant, & maridi erant, venæ omnes, cavæ & azygos sanguine destitutæ, 11. Exempta viscera & pelvis cupressi imposita, horæque spatium tantum in ea detenta, ea non decolorum & nigram reliquerunt.

Ego subsignatus certum facio me Romaniojam venisse 26 Septembris anno. 1662. accersitum à D. Antonio Galian. morbo detento, febre continua molestis symptomatibus stipata, nempe dolore continuo totius ventris, accer-

biori tamen ad hypochondrium dextrum: tum inextinguibili, sudore frigido capitis & pectoris, vigiliis perpetuis, & caloris naturalis extinctione. A quorum symptomatum violentia poltridie circa vespertinam extinctus est.

Die sequenti urgente Nob. Matrona Maria Chol, uxore defuncti Dom. Claudii Galiani, Romanolæ Domini, cadaver à Magistro Claudio Garnier Chirurgo, Cremii incolæ sectum, in quo partium nobilium insignes læsiones à nobis deprehensæ sunt & viscerum in ventris, scilicet hepatis, lienis, intestinorum, mesenterij & omenti: Hepatis enim & Lienis substantiam putredo invaserat, extraordinario foetore se prodens: Exulceratio aderat in intestinis, præsertim tenuibus, quorum unum exiguo foramine profundo perforatum erat, exitum materiam purulentam, pulvis simili, bihi commixta, admodum foetida concedente: Omentum & mesenterium ad os postea & pene putrefacta: E quibus enumeratis partibus compressione facta exsudarant biliosus humor, à quo abdominis capacitas replebatur necnon à statu odoris terribilissimi: Insignis illa dictarum partium intemperis, atque maligna corruptio, suspicionem suam exerente, cujus natura ab affectis denum intelligi potest, alienis omnino à morbis vulgaribus: Supra dicta vera esse assero, in quorum fidem nomen meum apposui, *Montoy D. M. Osebris 2. 1662.*

III. Comes annuus agens 32. corripitur febre lenta assidua, horis vespertinis magis ex-candescente, ante 7. exhibetur leniens à Medico: loco venæ sectionis, admoventur sanguifugæ venis quæ in extremo ano sunt posite, quæ interdum purgare consueverant, sistitur sanguis à Barbitonsore caligine pulverisata acetopermixta, febris adaugetur, superveniunt maculæ in toto corpore laeviores, violacei coloris, sensum & motum utriusque cruris amittit, lotium supprimitur 14. die obiit.

Dissecto cadavere intelligo renem sinistram compertum esse nigrum, & ab eodem lacere etiam spinalem medullam affectam. *L. à Fonte consulti. 19.*

Grassabantur febres malignæ petechiales in obsidione Hafniensi 1659. intra & extra muro: Multi qui de dolore ventriculi conquerebantur, concitato vomitu, vermes spithamam longos revomerunt, & febres extinctæ ad sanorum consortium redierunt; quod sæpe quoque in Noosdochiis sibi commissis observavi. Exercitatus Medicus & Chymicus D. Ahasverus Paynk. De verme admirando & de extra nare Nob. viri Cassennatis post febrem acutam rejecto, legendæ dissertationes tres apud V. Alf. à Cruce cent. 3. de quæ per Epist. Bartholinus cent. 6. hist. 29.

Medici tum præclarissimi tum fide digni nihil significarunt non unum vermem, sed aliquot. in hominis leniculis extincti vel oppressi cerebro in ventos, qui tum in cerebri substantia, tum in duriæ materis sinibus latuerint, non solum scio: *Cojsey in appendice obs. v. Anat. & Chirurgic.*

Ex corporibus eorum qui febre Hungarica Theriade mortui sunt, vermes nonnunquam confectim prorepisse animadverti sunt: Id quod experimento dedici cum nemo subesse suspic-

cellariam pro exigentia morbi, & temperamenti sanguinei, percipit, & exequitur: in oratione delicatæ complexionis blandi. Infortiore præferbit solutivam pilulam, ne activiori medicamento quateretur nimis: Indominuota moles: quo peracto per quinque continuos dies visibili febre immunis statuitur, unde præparatam materiam quinque syrupis expurgandam pharmacum constituunt, propinant, & hoc mixtas in humoribus evacuavit vires, moxque leve sequitur subdelirium, brevique quasi positus in Apoplexia obiit, cedens tamen naturæ, quam toties vicerat picinis, Inexpectata morti. Attoniti Domestici cada-veris imperant dissectionem, cui præsens quasi sitis ego, lividi primò corporis intense rubentes observo genas, mox pectus secari satago, in quo sani cordis incredibilem vidi magnitudinem. Talem pulmonis corruptelam, ut illæ substantia dissoluta simplici tantum membrana, tanquam in sacculo contineretur, quo rectio, copiosa effluxit, nigerrimi & foetidissimi sanguinis, ac corrupti Pulmonis quantitas: Simulunam pulmonis vidimus Lienis itatum, cujus integra tantum membrana fluidam pariter, ac corruptam illius substantiam, præter nonnullas Malpighii glandulas continebat: Uterius, metastasim in capite conjiciebant aliqui, quorum gratia cerebri tentavimus dissectionem, ideoque secato cranio crassissimo, futurisque adeo compactis ut decisse viderentur; Ablata dura meninge, tenuis occurrit admodum crassa, ut attoniti suspicarentur an tenuior aliqua inferius lateret, triplicique cerebri illud involueretur menige, quod non successit, sed hoc unum observabile, Piam matrem crassitie & densitate duram æquare: Ablatis itaque duris hisce meningibus, corticales cerebri anfractus ita pulchre distinctos detegimus. hoc est, inter se adeo separabiles, ut notabilia vacua remanerent, cum in aliis capitibus arcta contiguitate anfractuose copulenter: Anfractuum ergo hæc conformatio vere industria: dum æque bene ac intestinorum gyri semetipsis distinguerentur, & ideo si pia mater per corticales cerebri ambages undequaque se insinuat, cum illa crassa adeo extiterit, per consequens illa ablata notabile remaneret spatium inter anfractus, tanto magis considerabile quanto copiosiores gyri: Substantia vero cerebri universa naturalis omnino & sana, præter solitam serositatem in minima quantitate, & corporis colorem nonnihil flavescens.

Symptomata corius morbi progressu inobservata non scrutor, incredibile nullatenus nullam extitisse diagnosim tanti morbi, ut assistens fatetur Medicus: equidem febris latuit maligna, de qua loquitur Fernesius lib. de febr. cap. 17. foris mitis ut interius vero conturbans: ex oculis autem emerit excitata pharmaco, dum duplex inflammatio purgantium non resistit viribus, febrileque fermentum mutans à pharmacovires, effrenatas concitat sanguinis effervescencias, inflammatoque parti inflammas adauget; quamobrem non immerito cum antiquis recentiorum consensus, nunquam satis purgantium reprobat damna in inflammationibus, cum autem præcipuus in febricitanti sit scopus statum noscendi sanguinis,

utrum nempe in conpage sua nimis sit stricta, quapropter excrementa intricata sanguini adeo compliceantur, ut secerari ab ipso nequeant, quod sanguinis coagulationem nonnulli vocant, an diverso modo subvertatur cruor, quando scilicet ab heterogeneis partibus fermentativis secedit in partes, adeoque dissolvitur, ut corruptius ulque ad fibras communiter nuncupatas, & tunc per parenchymatum poros se inimpans alicubi stagnat, putret, partesque ipsas corrumpit, ac universo sanguini maligna communicans vitia, unde spiritus non elaborat sanguis, quinimo veneni assumens naturam hos inficit, vitamque maligne perimit: ita affectus sanguis in hoc casu in partes spongiosas irruens intus filtratur, inde corruptivam inducens fermentationem, illas adeo alterat, ut nec propriam retineant substantiam, sed in foetidissimos degenerent chores propria parenchymatis membrana simpliciter inclusos.

Quid utem sentiendum de rara piz matris crassitie & diducta anfractuum cerebri contiguitate? Vere suspicor nullum contulisse suæ perfectioni in pingendo, cum in hac arte excellens fuerit si quis alter, Equidem hoc unum est quod cogitatio sit ab anima, non ab organis, ideoque cum bruta non cogitent, illa probabiliter carere statuunt Cartesiani; cogitationis autem scrutari vires, animæ ut essentiam indagare, idque exigere videatur aliquid supra animam, quia in tantum materialia, & omnia mortalia, cognoscit anima, quæ ut aliquid supra illa, cum sit immaterialis & immortalis, nullatenus in operando dependet anima ab organis, ita in tacuis, in quibus principes animæ facultates non exercentur uti debent, aliquid in cerebro insoliti apparet, ergo scrutari animæ operationes à corpore dependentes, nil aliud est quam organorum vires contemplari, quod scilicet, & quomodo concurrant in operationibus, & ad id non requiritur aliquid supra animam, cum hæc sit supra sui corporis organa posita ergo tantæ cognitionis possibilitate, querendum esset utrum à particulari cerebri conformatione dependeat ingeniorum diversitas: profecto cerebri anatomie suam detegit in omnibus structuram fere consimilem, quamvis probabiliter conjecturari possemus an cerebri fibre Willisianæ in omnibus ejusdem sint modificationis, quod non ita facile oculis observabile: Interea ingenii vires in particulari conformatione cerebri conformatione dependere firmiter credo, verum non tantum in hoc, sed à diversa sanguinis constitutione, ex qua major vel minor spirituum perfectio & copia constituitur: ita accidit maniacis, in quibus non perversitur cerebri structura, sed spiritus animalis ab indole muti & benigna in accerrimam degenerant ita hypochondriacis, in quibus sanguis ater, spiritus gignuntur nebulosi, ex quibus tot phantasmata.

Cum ergo ingenii vires consistant in particulari sanguinis, & animali cerebri conformatione, possumus industriam erueret tam pectoris: & primo cordis insolita adeo magnitudo arguit copiam notabilem rarefacti sanguinis, qualibet systole expulsi in, quæ dum in anfractus cerebri perveniebat, capacior

Lucatenii Regis Danie Medici in Actis medicis Bartholini anni 1672. p. 25.

Febris Epidemica Nervosgeneri & Thoracis partibus infesta Febris Epidemica ab inflammatione Pulmonum Epidemica vermiculosa.

Circa æquinoctium vernale anni 1661. puella novem circiter annorum agrotare cepit, imprimis absque calore & siti intentis, appetitus dejectio & virium languor accesserant: insuper vertigo fere continua molestabat, cum crebro leipothymia metu, ut sæpius animi deliquium instate putaverit; cuius agritudo quoniam tussis crebra & humida stipata fuerat, primo tantum frigus susceptio putabatur, verum intra paucos dies ista tussis plane convulsiva: adeo ut inter tussendum, p. phragmate sursum elato, & cum sputo sursum repetita, ita aliquandiu retento stridor ingens & velut suffocativus edebatur: dem apertius Febricitans, ac de siti & calore conquesta, noctes insonnes cum insigni corporis agitatione ducebat, atque prope diem delirare loquuta de veste sua in aquas delapsa querebatur: cumque omnia in pejus ruerent, motibus convulsivis primo in artubus, mox in facie & subinde toto corpore tentari cepit, paroxysmi crebra vice, nempe bis aut ter intra horam repente, gravissime urgebant, adeo ut misella hæc intra nycthemeri spatium, aquo affectiones ipsamodice graviores exortæ fuerint, spirituum animalium tenore libefactato penitus fatum obierit: Dum paroxysmi convulsivi urgent, pulsus erat plurimum inordinatus, ac sæpe intermittens, etiam vomitione crebra afficiebatur.

Cadavere dissecto, symptomatum in hac febre præcipue urgentium rationes & vestigia clarius patebant; Nam calvaria olla amota, ita ut vasa meninges perreptantia, sanguine plurimum turgescere conspiciebantur, quasi fere tota cruoris massa in capite aggereretur: Venis enim circa viscera ian ac medijs ventris sectis aut disruptis parum sanguinis effluxit: Porro membrana ista, ubi cerebellum investit, atque altius nitrata ipsum a cerebro deriunt, sanguine pluribus in locis extravasato suffusa, colore atro purpureo insigniebantur, ut minime dubitandum esset, quin phlogosis sive inflammatione, illic circum circa excitata, convulsivum adeo atrociter instantium causa fuerit: Integumentis hæc ablatis, cerebri substantia profus madida, & humore aquoso supra modum irrigata videbatur: quoniam ejus cortice exempto venticuli omnes aqua limpida erant impleti, cuiusmodi pellucidi liquoris plusquam libræ semissem eximere licuit, ventre inferiore aperto, viscera omnia in eo contenta sanis sarta & sana tecta invenit: venticulus, licet inani vomitione crebro laceratus, nihil præter liquorem nuper ore ingestum continebat: etenim neque in ipso, nec in appendice ipsius lumbrici, aut acres humores (qui sæpe ejusmodi convulsionum causa perhiberi solent) repeniebantur: Intestina tenuia pluribus in locis mutuo involvebantur, a viscerum istorum motibus convulsivis; Thorace aperto, pulmonum cava valde rubicunda, &

velut intusa, imo in quibusdam locis quasi livida & fere nigra apparebat, ex eadem ubivis discilla icior tenuis & spumosa exudabat. *Tb. Willis patol. Cerebri cap. 8.*

Temporibus inconstantibus morbi equidem sunt inconstantes, dummodo istorum perduravit inconstantia: sed quando ipsorum inæqualitas uniformis aliquandiu persistit, pro ut factum est per duos annos fere continuos, ut plurimum fuerunt austrini, ventrosi, frigidi, pluvii, & cum maxima aquarum illuvie, morbi supervenientes constantes apparent & fere uniformes: Cujusmodi sunt febres hoc tempore grassantes, non Bergomitanum, sed Bononiæ, Venetiis, in Foro Julienti, agro Patavii, Vicentiæ & fere ubique locorum; In his enim omnibus locis populariter sævierunt febres, non quidem vere pestilentes, quia licet multos interfecerent, ut plurimum tamen fuerunt salutares, nec alicui co. unicatum fuit contagium, sed sunt Ardentes spurie, ad continentium naturam accedentes invadentes, cum dolore capitis, colli, lumborum & totius corporis perseverantes, cum siti, vigili, paraphreniade, & aliquando cum phreniade, veribus & cum peticulis erumpitibus, plerumque ruris, aliquando violaceis, nigris diversis temporibus, ut plurimum circa septimanam, & in puerulis cum morbillis cum & variolis, & urinis tenuibus, aliquando crassis & turbidis, & aliis accidentibus malum noxam harum ferunt committantibus: hæcque febres viros magis quam mulieres affligunt, eosque ut plurimum intra secundum senium constitutos, si præsertim plethorici, biliosi, aut melancholici fuerint, si locorum humidorum fuerint incolæ, si incomposite vixerint, immodice incaluerint, veneri indulserint, vitiosisve succis redundaverint, raro Claustrales, tanquam minus incomposite viventes.

Originem autem habuerunt hæc febres ut plurimum a putredine circa viscera naturalia, ideoque & vermes fuerunt excreti, diarrhææ non raro subsequuta, cum criticæ tum symptomatice: Fere tamen semper sese insinavit putredo in totum venosum genus, non sine aliqua Pulmonum inflammatione, ut apparuit ex dissectione Cadaverum: Hincque factum fuit ut fere in omnibus apparuerint peticuli; pluribus supervenerint iudices aliquando diaphoretici, non raro salutaris, & fere omnes judicati sint per urinas copiosas. *Ban. Silvatici consil. xlv. cent. 1.*

Sæpe decipiuntur Medici, Peripneumoniam speciem pro febre mali moris & maligna iudicantes, ac pro tali curantes: Et dum febres huiusmodi epidemiales vagantur, si corpora eorum qui perierunt secta sint, maxima ex parte inveni labem, vel in extremis lobis, vel in parte postica pulmonum, quæ ad gangrenam perexiguam tendebat: Id ipsum etiam accepi a Doctore celeberrimo, qui se eadem experimenta multoties observasse testatus fuit: Ideo caute in his procedendum est ut cognoscatur pars affecta.

Scholia.

In Pulmonum affectibus non plerumque respira-

respiratio lœditur, quod provenit, partim ex natura affectuum, partim ex situ, Nam Tabes, vel ulcus Pulmonum, ex se respirationem non lœdit nisi per accidens, cum scilicet pus vel pituita in arteriis eorum recipitur: Similiter pituita, quæ in pulmonum substantia recipitur, respirationem parum aut nihil lœdit, nisi cum vala obstruit, & aeris ad cor ingressum vel egressum cohibet: aut pulmones magnificando, inauitatem pectoris, quæ ad libere respirandum requiritur, repleri facit: Imo neque ex inflammatione particulari pulmonis, quæ scilicet extrema loborum ejus, vel partem aliquam externâ, & maxime pollicem obsideat, nisi maxima sit: ex illa enim cor potius præfoculationem patitur quam magnam æstuationem; neque ob id arteriæ occuluduntur, vel comprimuntur, Et ideo non sequitur neque ratione organi, neque ratione aucti caloris necessitas magna respirationis, neque impedimentum illius, nisi leve: Inde sæpe decipiuntur Medici, qui hæc est peripneumonia species, &c. Ideo caute in his procedendum est, ut cognoscatur pars affecta: Quæ ex levi, sed angustiosa respiratione, & subdificili in aliquo latere decubitu, sicuti ex pulsuum mollitie, ex sudore circa pectus & cervicem, cum adsunt malignitatis notæ, colligi debet: Et maxime cum alvus bene ab excrementis abstergitur, & videntur hujusmodi ex sanguinis evacuatione sublevari, licet parum habita ratione languoris virium & febriculæ convenire videatur: Cognoscitur etiam ex pulsuum inæqualitate, nam ex parte affecta celeriores & majores, vel crebriores & oppressiores erunt. *Sebastianus Nasus meth. med. Parte 2. p. 298. Vide Lal. à Fonte.*

Initio hyemis 1697, districtu domini Veneti universo, morbus quidam malignus & epidemius grassabatur, quo plusquam lx. millia hominum, ut ferebatur, cum horrore & febre corripiebantur: Horum nonnulli cito interibant, cæteri brevi evadebant.

Sectione cadaverum instituta, mira & vix credibilis vermiculorum minorum copia apparuit, causamque, quæ vel experientissimis nondum in mentem venerat, manifestavit. N. S. Gemmarius, ex illis locis redux, quamprimum ad nos appulit male habere coepit, sibi quæ propterea metuens ne simili morbo decumbere cogeretur, consilium nostrum expetiit: purgandum censuimus spec. diaturbith. cum Rhabarb. ʒj, pulv. sem. fantonic. Jalap. ana ʒß. m. duas dozes sumpsit, juravitque se copiose purgatum plusquam bis mille vermiculos vivos excrevisse. *G. H. V. c. Joh. observ. Medico Physic. hecatostea 2. §. 39.*

In capitibus eorum qui Febre Hungarica mortui sunt, cum scissimis capitis doloribus, deprehensos vermes testatur Curadinus cap. 10. de Febre Hungarica. Vide lib. 1. scæ. 1.

FEBRIS. ALBA.

Vid.

CHLOROSIS.

FICUS.

Vid.

VERRUCA.

FISTULA.

Curationes.

I. **A**B Ulcere sinuoso saltem differunt *Fistula*, quod præterea callosa & dura sunt. Namque Celeriter si non curetur sinus, pus cumiculos porro agit, pars ulcerata callum contrahit, duriorque efficitur, sic ut agglutinari nequeat quod malum tunc *Fistula* nuncupatur. Enim vero est *Fistula Sinus* Angustus & Oblongus, seu Ulcus Sinuosum, Angustum, simulque Callosum, ac proinde Curam non facile suscipiens. Id quod ut, quoniam orificio existente angusto, fundo autem lato & calloso, copiosa simul & virulenta sanies ibidem colligitur, indequæ continuo emanat.

II. Sunt autem plures *Fistularum* Differentiæ, quæ desumuntur a magnitudine, numero, figura, situ. Aliæ enim breves sunt, aliæ longæ & altius penetrantes. Aliæ unum duntaxat orificium, unamque tantum cavitatem; aliæ vero plures sinus, diversasque cavitates habent. Aliæ sub cute extensæ, aliæ altius penetrant, aliæ in carnem desinunt, aliæ ad ossa, vel ad nervos, vel ad venas aut arterias pertingunt.

III. Cauter *Fistularum* haud immerito censentur omnes illæ, quæ sinum efficere possunt. Quandoqui sem enim *Fistula* a Sinu tantum differt callositate & duritie, facile datur intelligere, in *fistulam* sinum degenerare, quum mala huius curatione callus circa ipsum obducatur, ac tandem durus evadat.

IV. Cognoscuntur verò *Fistula*, in primis stylo in sinum immisso; quò & quo tendat, & quam altè pertingat observamus. Quod si obliqua fuerit *fistula*, ut stylus recta adigi nequeat, specillum plumbeum, aut potius cerea candela, quæ flecti potest, immittatur. Insuper caro, quæ *fistulam* circumdat, alba apparet, sicca, dura, sine aut cum parvo dolore, nisi sit juxta nervum, partemve nervosam. Sed an unus, an plures sint sinus, specillo vel candela cerea explorandum est; idquæ Pus etiam, quod effunditur, non raro testatur. Enimverò si plus puris, quam probabile sit unico in sinu contineri & generari, effluat; aut si, ubi Ager situm mutaverit, pus, quod prius subliterat, demò fluere incipiat, plures sinus adesse, altiusque *fistulam* penetrare indicio est. At plura si sint *fistula* orincia, per stylum non ita facile explorari potest; sed potius per syringam uni orificio liquor injiciatur, siquæ per omnia orificia is effluat, una est *fistula*: sin per omnia non reddatur, plures *fistula* adsunt.

V. Cæterum omnes *fistula* difficulter sanantur. Recentes tamen, simplices, quæquæ in partibus solum carnosæ sunt, non profundæ, in corpore juvenili & boni habitus, facilius curantur: difficiliter verò, in quibus plures partes sunt erosæ, quæquæ antiquæ sunt, sensu non præditæ, profundæ, flexuosæ, & varios sinus habentes, membris nobilibus vicinæ, in corpore senili, emaciato, cacochymico. Imo quædam *fistula* ne quidem curari debent, quoniam antiquæ sunt, & à partibus nobilibus remotæ, per quas

quas superflui ac vitiosi humores expurgari jam diu consueverunt.

Sicut & ex difficul. curantur, ac ferè insanabiles sunt, quæ ad musculorum principia, venas, arterias, nervos, ossa, articulos, dorſi vertebras pertingunt, quæ ad thoracis vel abdominis cavitatem, aut ad contenta intus viscera penetrant. Tales enim fistulæ vel medicamenta non ferunt, vel ad eas medicamenta pervenire non possunt. Hinc Celsus lib. 5. cap. 28. inquit: expedita curatio est in fistula simplici, recenti, intra carnem; adjuvatquè ipsum corpus, si juvenile, si senium est. Inimica contraria his sunt. Itemque si fistula os, vel cartilaginem, vel nervum, vel musculos læsit, si articulum occupavit, si vel ad vesicam, vel ad pulmonem, vel ad vulvam, vel ad grandes venas, arterias, vel ad inania, ut guttur, stomachum, thoracem penetravit. Ad intestina quoque eam tendere semper periculosum, sæpè pestiferum est. Quibus multum mali accedit, si corpus vel ægrum, vel senile, vel mali habitus est. Et Paulus Ægineta lib. 4. cap. 49. ait: si fistula ad os usque decumbat, curari hanc absque manus opera impossibile est, nisi temporis spatium sua sponte squamma, vel os abscedat.

VI. Quoad Curandi Methodum: duplex occurrit fistularum Curatio; una vera & perfectas altera palliativa seu imperfecta, qua nimirum fistula exsiccat intus, & foras consolidatur, manente nihilominus sinu. Hanc Curam innuit Galenus lib. de tumoribus prat. nat. cap. 4. ubi hæc habet: coercetur tamen sinus siccatus à medicamentis, ut habere sanitatem irreprehensibilem pars videatur: siquidem perpetuo quis accurato victu utens, salubre ferè, & superfluitatibus vacans corpus habet, cohibitus manet sinus. Superfluitate vero aliqua collecta rursus repletur, iterumquè fit qui ab initio fuit abscessus: rursus vero, ut convenit, medicamentis evacuat, siccatur quæ & coercetur, & semper longe faciliora ei hæc omnia sunt, quam is, quæ primò abscedunt. Neque enim quæ divelluntur dolent partes: etenim jam distant, celerimèque replentur, facile fluorem suscipiente sinu. Atque istam Curationem non omnino spernendam esse existimat Aquapendens, & interdum bene sibi successisse scribit, etsi non semper. Perficitur autem hæc cura legitimo Rerum Nonnaturalium usu, nec non purgato per intervalla Corpore; dehinc fistulæ simul immixtis valide siccantibus. Hoc enim modo coalescit orificium, ut sana videatur fistula: quæ quidem interdum planè coalescit; ut plurimum tamen tamdiu clausa solummodo manet, quamdiu superflui in corpore non colliguntur humores. At postquam aliquid humoris denuò in sinu colligitur fistula quoque iterum aperitur.

VII. Altera autem fistularum curatio vera est, atque hoc modo perficitur. Primum, conveniente institutâ Dietâ, vitiosi in corpore redundantes humores emendandi ac expurgandi, usurpatis tum vulnerariis dictis, tum humoribus istis evacuandis aptis Decoctis, præced. cap. 2. nec non lib. 1. cap. 7. abunde traditis.

Deinceps danda opera, ut callus removeatur. Sed cum Medicamenta callum absumptia ritè applicari nequeant propter fistulæ orificii angustiam, illud dilatare necesse erit.

Id verò fieri potest vel per sectionem, vel commodius & absque dolore per immixtas turundas ex Radice Gentianæ, aut Spongia præparata. Hæ enim fistulæ sinui immixta humiditates imbibunt, & crassiores redduntur, atque ita pedetentim absque dolore orificium dilatant: quæ interdum quoque, cum cum callus dilationem impedit, imbuuntur & illinuntur medicamentis, quæ callum auferre apta nata sunt.

VIII. Sed dilatato quantum satis est fistulæ orificio, callus removendus. Fit autem hoc vel medicamentis, vel ferro, vel igne. Medicamentis auferitur callus in iis præcipue, qui neque incisionem, neque ustionem ferre volunt, ubi recens est fistula, & callus non admodum durus: huiusmodi autem medicamenta acia & erodentia esse debent, & eo acriora vel minus acia, quò callus crassior vel tenuior fuerit.

Ad removendum fistulæ callum Scultetus post Armament. Chir. Obs. 75. hoc laudat Unguentum:

℞. Aluminis Uli, Mercurii Præcipitati, viridis Æris, Salis Nitri an. p. æq. Album. Ovorum q. s. f. s. a. Unguentum. Barbette illud commendat:

℞. Pulv. Rad. Bryoniæ, ʒj. Thuris, Myrrhæ an. ʒij. Æruginis ʒss. Salis Armoniaci ʒ. Olei Olivarum, Axungia Porci an. q. s. Miscantur pro unguento. vel, quod magis efficax:

℞. Vitrioli Albi ʒiij. Aluminis, Æruginis an. ʒss. Aceti fortis ʒvj. Calcinentur, & hac exinde Pulvis, qui nascatur cum unguento Ægyptiaco pro Litu, eoque inungatur turunda fistulæ inferenda. Eum in tuem quoque conducit unguentum Fuscum felicis Wurtzii. Vel hac acris Injectio, quæ fistulæ callum erodat. v. gr.

℞. Aquæ Aluminosæ seu Mercurialis ʒiij. Plantaginis ʒiij. Rosarum ʒj. unguenti Ægyptiaci ʒss. Miscantur pro injectione. fistula verò post injectionem bombace, cera, vel en-plâtre ocludatur, ut quod injectum sit intus maneat: et atque talis injectio quotidie semel fiat, aut bis pro re nata.

IX. Sed cum semper callositas fistulæ medicamentis non cedat, atque interdum hac in re plus auxilii & commodi adferat manuum opera, nonnunquam meriam ad Ferrum & ignem accedendum. Aperiendus nimirum totus sinus est, dehinc Actuale Cauterium adhibendum.

X. Ablatâ tandem omni callositate, sinus detergendus est, ac purus reddendus, ut caro regenerari, hinc & sinus conglutinari possit. Hoc verò fit adhibito unguento Aureo, Balsilicone, aut Digestivo cui Aloë, Myrrha, similiave Sarcotica sint addita. Vel huic intentioni ut satisfiat, usurpetur injectio, ex Absinthio, Agrimonia, Centaureo, Radice Aristolochiæ Rotundæ, in Aqua Pura decoctis, addito Spiritu Vini cum Pulvere Myrrhæ & Aloës; quæ & sinus apertus probe abluatur.

Fistulæ autem perfectè curatæ cognoscuntur: si humor emanans sit pacus, crassus, coctus; item si locus affectus sine tumore, dolore, & omnino siccus sit. Joh. Munnix in in Chirurgia ad hodiernam Praxim adomata.

De Fistulis in specie ac primò De Fistula Lachrymali, eſſi de ea jam ſupra capite de Ægylope.

I. Cæterum in interno oculi cantho inter duo puncta lachrymalia Caruncula locatur, lachrymalis dicta, quæ continuum lachrymarum per genas deſluxum impedit; ſed eas imbibendo ordinate per vicina puncta lachrymalia in nares dirigit. Hæc caruncula ab acium humorum affluxu turgere nonnunquam, intumeſcit, & abſcedit, ulceraturque, ulcere non raro in Fiſtulam abeunte, ut adeo tandem ſubjectum os carie corrumpatur: qui affectus lachrymalis fiſtula nuncupatur.

II. Eſt itaque Fiſtula Lachrymalis Tuberculum inter majorem oculi angulum & naſi radicem ortum, plerumque cum inflammatione, nonnunquam & ſine inflammatione. Atque hic tumor aliquando quidem in ſuperficie ſe oſtendit, aliquando magis profundum obſidet, & non niſi tacta ac compreſſione percipitur. Tumor hic ruptus & male curatus in ulcus abit, quod vel ſimplex remanet, à quo pus coctum plerumque exudat: vel terpens & malignum evadit, à quo pus crudum eſſluit: id quod non raro ſub inferiore palpebra viam ſibi facit, & per tuberculum ibi elevatum, exulceraturque aquoſam & ichoroſam materiam eſſundit: aut ſi abſceſſus tardius rumpatur, in ſinuolum ulcus, ſeu titulum oculi, lachrymale dictam degenerat.

III. Cauſa humor eſt tenuis, acris, ſaluſ, quæ eo ſtillans primò inflammationem, dein erosionem, exulcerationem, ac tandem fiſtuloſum & ſinuolum ulcus, nonnunquam cum ſubjecti oſſis carie, producit.

Tuberculum autem ipſum alias majus, alias minus eſt, in ſuperficie eminens & viſui expoſitum, aut in profundo latens, & cum ſoluta unitate in Ægiloſe, citrà hanc in Anhilope. Rumpitur autem tuberculum hoc, aut intus verſus oculum, aut extra per cutem, aut utrimque. Interdum & os naſis proximum perforat; nonnunquam cartilaginem palpebræ, ac ipſam palpebram corrumpit.

IV. Igitur dignoſcitur malum hoc, quod tumeat locus affectus, rubore in ambitu perfundatur, lancinante dolore affligatur, in primis inflammatio ſi adſit. Ubi vero cute exulcerata rumpitur tuberculum, ſit abſceſſus cum ulcere, quod ſi legitime non curetur, pus diutius coëreſcitum cuniculos porro agit, ſinumque facit, per quem collecta intus ſanies aut ſpontè eſſluit, aut preſſo ungulo extruditur, tumorque nonnihil ſubſidet, uſque dum nova colligatur materies. Nonnunquam ad os uſque ſubjectum ſinus penetrat, illudque erodit, viamque in naſem proximam aperit, è qua graveolens quid continuo excidit.

V. At vero affectus hic aggrè ſenatur, niſi mature ei occurratur. Atque difficilius redditur hoc vitium, ſi ſit conjuncta ſoluta unitas, ſique tu nor profundas occupet partes.

Si ruptio ſit interiora verſus, periculoſior quia metuenda eſt ſubjectorum oſſium corruptio.

Fiſtula recens, & quæ oriſicium habet extiuſecus manifeſtum, facilius curam ſuſcipit.

In genere tamen Fiſtula Lachrymalis chro-

nicum malum eſt, cum propter perpetuum materiz affluxum, & motum oculi continuum, tum quia conveniens ligatura ea in parte fieri nequit, tum denique quia medicamenta debilia parum agunt, fortia vero oculum lædunt.

VI. Quoad Curandæ Methodum: Quandoquidem eodem modo non ſemper ſe habet Fiſtula Lachrymalis, non ſemper eadem erit hujus affectus Cura. Curatur namque vel ut incipiens; vel ut abſceſſus jam ruptus, cujus tamen latera minime ſunt calloſa vel ut Fiſtula perfectæ, oſſe tamen ſubjecto ſano, minimeque corrupto; vel denique ut Fiſtula perfectæ, oſſe ſubjecto carioſo: atque tum aut Medicamentis, aut Chyrurgia.

VII. In genere ut Ægilops vel incipiens vel perfectus Curetur, primum inſtituenda eſt optima victus ratio. Dein redundantes in toto acres tenuesque humores ſunt corrigendi, & tum per alvum, tum per urinas, tum per auctam tranſpirationem evacuandi. Quem in finem conducit Decoctum, ex Ligno Guajaco, Saſſaparillæ, Radicibus Saſſaparillæ, China, additis Beto-nice, Majoranæ, aliſque Cephalicis; nec non (ſi Purgans id deſideramus) ſulpha Colocynthidis, Glycyrrhyza, & Inſuper Setaceum nuchæ adhibere quantum conducat in Curandæ Fiſtula Lachrymalis, Praxis docet, affirmat Hildanus Cent. 4. Obſ. 19.

VIII. Generalibus hiſce præmiſſis, ſi Ægilops incipiens ſit, atque nondum apertus, ſecetur ferro ac aperiatur, idque fiat mature. Si enim apertio differatur, per vicinas partes erodit, & Fiſtulam ſæpe inemendabilem gignit.

Aperto autem abſceſſu, ſeu natura, ſeu arte, imponantur, Deſiccantia, Detergentia, Conſolidantia: quem in finem conducit Unguentum de Tutia, vel ſimile ex Aloë, Myrrha, Plumbo Uſto, Tutia, Spodio Preparato, &c.

Chalmetæus Enchir. Chir. lib. 3. cap. 20. ſe nihil præſtantius ſequenti eſſe expertum teſtatur;

℞. Vini optimi, ſeu potius Spiritus Vini. Mellis Roſacei an. ʒj. Pulv. Myrrhæ optimæ ʒij. M. F. Linimentum, quo mane & vèſperi locus illinatur. Inſuper ipſi ulceri poſtquam Exſiccans aliquod impoſitum ſit Unguentum, pars affecta comprimat inſtrumento ab Aqua pendente, & à Sculteto Armam. Chir. Tab. 8. Fig. 1. depicto, aliove ſimili, ut ulcuſculum ita conſolidetur, & cicatrice ocludatur.

IX. Si vero perfectæ ſit Fiſtula, lateribus adeo calloſis, incidatur ferro, ac dilatetur ſed ſi Patiens ferrum admittere nolit, dilatetur Turundis ex Radicibus Gentianæ, aut Spongiis Preparatis. Quod ſi hoc fieri nequeat, tantillum ex Cauſtico quodam prudenter applicetur. Diligenter interim oculus claudatur, ne forſan liquefactum Cauſticum in oculum fluat.

Aperta & ſufficienter dilatata Fiſtula, Mercurius Præcipitatus Ruber ulceri imponendus, aut filamentis inponendus eſt, ac ſuperponendum Emplaſtrum ex Gummi Elemni.

Atque hoc modo callus conſumendus, quo attrito, pars affecta nunc citato Aqua pendente inſtrumento, vel ſimili comprimat. ipſique ulceri Baſamum Peruvianum, vel Tolutanum, aliudve Unguentum Exſiccans, Detergens, Cicatrizans imponatur, ſicque conſolidetur ac cicatrice ocludatur.

X. At

At vero subiectum os si cariosum observetur, (quod deprehenditur, si immisso specillo asperitas quidam inesse appareat; aut sonus quidam percipiatur oste pulso, consumpto scilicet periosteo) quantum heri potest detegendum est, dein ferro abradendum: quo sublato, ossi superstiti filamenta arida applicanda, quousque caro laudabilis ab ipso excreverit; impositum quoque vulneris labiis Unguentum de luttia, sarcorici loco, propter continuum ichoris ad angulum oculi fluxum; tandem cicatrix inducenda Gummi elemi, aut Emplastro Diapalmo, similivè exsiccante. Si autem os cariosum & probe detectum commode abradi nequeat, Euphorbium in subtilissimum pulverem redactum inipurgatur. Enim vero nimis præstantius esse Euphorbio in ossibus carionis, & in fistula lachrymali ostendit Praxis, subscribitur Hildanus cent. 5. obs. 12. & cent. 2. obs. 91. Quippe quod adjacentem carnem non adurit, ut perperam nonnulli metuant. Sunt qui cariem ossis oleo vitrioli, sulphuris, aut aqua forti corrigere tentant, sed male; ad circumjacentes enim partes fluunt, & os ulterius corrumpunt.

Alii ossis fistulæ lachrymali subiecti cariem cauterio actuali corrigunt, male; quæ enim iterum aut ignis non sanat, insanabilia esse Hippocrates pronuntiavit. Scribit tamen fabricius Hildanus, non curationem fistulæ lachrymalis cum euphorbio semper tam feliciter successisse, ut cauterio actuali nunquam fuerit usus, Interim vero illud non rejicit, atque ideo fistulæ plane occalescente, luvionibus utendum, si Agri adiuvant, utpote quæ callum non modo atterunt, partemque ipsam corroborant, sed etiam citius separant os corruptum.

Quandoquidem igitur & callus fistulæ, & ossis corruptio consolidationem impediunt, hinc callositate ossisque carie absumptis, nec non deterio satis ac mundificato ulcere, Balsamum Peruvianum, vel Jolutanum, vel Unguentum de rutia, aut simile filamentis applicetur, ut plana ac pulchra fiat cicatrix.

Per totum autem curationis tempus, collyrium exsicicans ac anodinum oculo frequenter immulsetur, & linteam republicatum, eodemque collyrio madefactum applicetur, sintque omnia fasciæ diligenter ligata, ut oculi motus quoad heri possit impediatur, exempli loco cito id, quod sequitur.

℞. Aq. rosarum, plantaginis, euphrasie an. ℥iij. sem. cydoniorum ℥iij. mancant in infusione per horas dein colaturæ admisceantur, troch. alb. rhasis subit. pulv. tutie præparatæ an. ℥iij. fiat collyrium, calide oculo identidem adhibendum.

In genere tamen de fistula lachrymali inveterata cum magna subiecti ossis corruptione notandum, quod difficulter ea curetur; & si curata fuerit, adhuc tamen ex oculo lachrymæ effluant, ob carunculam lachrymalem absumptam.

Sed genuinam fistulas lachrymales curandi methodum videre licet apud Hildanum cent. 6. obs. 3. & Petrum de Marchettis obs. chirurg. 22. Idem ibidem.

De Fistula Ani.

Ani fistula est Ulcus angustum, longum, callosum, sedem habens in substantia intestini re-

cti. vel musculi ejus sphincteris. Exulceratur vero sedes hæc nitida variis modis. Interdum namque circa anum oriuntur fistulæ rectum intantum. ad quaquam perforantes, sed circa anum continentes, & in carne terminum habentes. Aliæ exedunt intestinum rectum, simulque perforant communia integumenta, ut sanies exterius per cutem egrediatur. Nonnullæ ad intestini recti tunicam tantum exteriorem perfringunt, & serpunt supra intestinum, quod tamen non perforant. Aliquæ inter tunicas intestini recti luctum tendunt, modo ad medium sphincterem, modo ulterius. Quædam ad vesicam deflectunt. Adhuc aliæ uno tantum sinu, aliæ pluribus perreptant; quædam rectæ, quædam tortuosæ, ut non possit earum ductus investigari: quandoque vero sunt multæ simul & contortæ, atque conjunctæ, habentes tamen unum principium, sunt etiam aliæ perfringentes ad articulum coxæ. Harum fistularum principium excurrit nonnunquam ad lumbos, si ve thoracis vertebrae. Imo interdum a ipsas scapulas, inquit ampl. Iulpius obs. Med. lib. 3. cap. 5. Cujus oras licet tortice diducas, & amphes, (quod tamen ad cutaneas fistulas sanare utile) opera non nihilominus ludes: nec pervenies unquam ad remotissimum sinuosum fluxuum principium.

Causæ vero fistularum ani aliæ externæ sunt, scilicet Internæ. Inter externas causas frequentissima est tuberculum exterius circa anum eructum & suppuratum, cuius sanies si exitum non habet, sinum efficit profundum. Evacitur autem utrimodum tuberculum ex contusione partium ani, ut sæpe equitancibus, & aliquando renigantibus contingit: item ex ictu, vel casu in partibus circa anum tactis, cum exinde partes ani proximæ atterantur, & corruptis vas sanguinis ad nates, & circa anum cogatur, qui extravasatus putrescit, & putrescendo acrimoniâ acquirit, & molles illas partes exedit, sumat, fistulamque efficit. Insuper vulnera hujus partis non raro in ulcera degenerant, atque hæc in fistulas. Inter Internas namque fistularum ani causas primo numeratur pleus intestini recti non rite curatum: dein apostema in partibus luse obortum, & serius apertum; viz. expectata ejus maturatione, cum tunc temporis sanies illa intus contenta corrodat, & sinum, tandemque fistulam efficiat; atque ideo in hac parte apostemata, antequam ad maturacionem perveniunt, sunt incidenda.

Cæterum ab humoribus vitiosis ad intestinum confluentibus, & musculum sphincterem erodentibus hujusmodi fistulæ oriuntur; dum a mæteri salsa, mordaci, vel virulenta, ex hoc potissimum venerea, exulceratur rectum intestinum, hinc sensum evacuato algere ab eadem in eo congesta, & diutius herente, paulatim percolitur; atque materia inter partes musculosas collecta, tandem oritur tumor in partibus ani externis, qui disruptus in fistulam abire, tum rectum intestinum, tum musculum ejus sphincterem perfringentem. Denique hæmorrhoides summe & male curatæ, atque exulcerantes, in sinus nonnunquam, tandemque in fistulas abeunt.

Cognoscuntur autem ani fistulæ, quod officium ulceris sit angustum, sinus vero intus latens, & labia ejus collofa sunt. Excernitur etiam inde sanies (modo orificium eius non claudatur. Tum enim nihil excernitur, & vicinæ partes tumide sunt) aliquando aquosa, aliquando virulenta.

An verò unus, vel plures sinus sint; item an penetrent, vel non penetrent; vel intus rectæ aut incurvæ hæc intus, stylo immisso exploratur. Si namque fistula sit in partibus externis prope anum, quæ nec musculum sphincterem non perforaverit, in intestinum rectum tamen penetraverit, id specillo patebit; intruso siquidem digito orio inuncto in anum, specillum nudum illi occurret. Si vero intus sit tortuosa, ut stylus in anum facile penetrare non possit, ex excrementis id deprehenditur; cum aliquando per fistulam feces alvi reddantur, & liquor in fistulam injectus per anum exeat, seu in anum intus per fistulam egrediatur. Porro fistula inter intestini recti tunicas dignoscuntur immisso specillo, si digito id non fuerit obvium, sed membrana ipsius intestini tectum. An verò fistula perforat intestinum rectum in musculo sphinctere, vel supra eundem, hoc prodit signum: siquidem si digiti in anum intrusi apex ab eodem non contrahi, sed loco veluti vacuo hæere sentiatur; quo stylus quin etiam in fistulam demissus perveniat ad extremum usque digitum, in illud scilicet cavum, fistulam perforare intestinum supra sphincterem indicio erit. Vtrum vero fistula fuerit in musculo huius principio, medio, vel hinc, quoque digito & specillo patet. Si ad velicam perveniat, urina per eam redditur. Interdum ad rectum intestinum & velicam simul penetrat, ac tum inter mingendum crepitus ex pudendo, perinde atque podice emittitur.

Quod prælagia de Ani fistulis faciendæ: Ani non penetrantes fistulæ penetrantibus minus periculose sunt. Nihilominus tamen omnes tere Ani fistulæ sanabiles sunt. Et gloriatur Petrus de Marchettis, se ultra sexcentas ani fistulas perfectè curasse, alias difficilissimas, alias facillimas.

Ægre admodum sanantur ani fistulæ, quæ supra musculum sphincterem intestinum perforant ut & quæ a lue gallica procedunt. Facilius verò & brevi tempore, quæ in orificio ani; minus facillè, quæ in medio musculo intestinum perforant.

Atqui fistulas hæc Curandi Indicationes vel totum corpus, vel partem respiciunt affectam. Totum corpus quæ respiciunt, permittunt (si viscera Patientis bene fuerint constituta, ut patet ex inculcata ejus valetudine) fistularum curationem mox aggredi, non expurgato corpore, absque ullo futuri morbi periculo. Alioquin præmittatur corporis iugatio, preparantibus, & purgantibus lenioribus; nec non Vena Secetur. At verò Patiens fuerit mali habitus, & cacoehymicus, propinetur insuper Decoctum ex Ligno Guajaco, Salsaparilla, chin, &c. Ut tum per sudores, tum per Auctam Transpirationem, & copiosorem excretam Urinam, ab humoribus vitiosis liberetur: præsertim siquidem cacoehymicus, raro admodum ex toto sanantur fistulæ ani. Fonticuli item cruribus excitati non raro multum conducunt, cum per hosce materia detrivetur, & evacuetur: si in senibus ex antiqua fluxione si sint fistulæ, ea tutò nunquam curantur, nisi ante consolidationem excitetur Fonticulus in crure, pro evacuatione materię quotidie collectæ.

Partis autem Affectæ curatio multiplex est, pro varietate & differentis fistularum. Atque hinc in ipsius fistulæ curatione explorandum

prius, num hæc sit unica vel multiplex, hoc est, num unum habeat orificium & ductum; an vero plura orificia, pluresve ductus: deinde num in intestinum penetrent fistulæ, nec ne; & sic porro fistulæ quippe prope Anum, quæ non pertingunt ac ipsius orificium, facillime sanantur, non tamen absque sectione: & quidem si rectæ sint sectione unica; si autem sinuosæ, pluribus curari solent sectionibus.

Primo igitur foramen fistulæ dilatandum immisis Turundis ex Radice Gentianæ, vel spongia Compressa; ac quotidie easdem crassiores immittendæ, donec foramen fistulæ dilatatum admittat scalpellum ad Sectionem: satis verò dilatato foramine, immittendus Caltellus rectus, atque faciendæ unica Sectio, ad fundum usque ipsius fistulæ; postmodum ad prohibendam inflammationem imponendum linteam discerptum Ovi Albumine imbutum, superinjectis stupis in eodem madefactis; quibus postero die remotis, diligenter stylo inquirendi alii sinus: qui dilatandi, atque secandi modo nunc dicto: supra fistulam sectam adhibendum Digestivum ex Melle Communi, Theriacinâ, & Ovi vitello. Quod si fistulæ callum consumere nequeat, imponatur illud sculteti.

℞. Mercur. Præcipit Rubr. 3ß. Mellis Rosacei. 3ß. Misceantur. Unguentum hoc linteo discerpto excipiat, & fistulæ apertæ callo ponatur.

Consumpto callo, deterioque vulnere, caro generanda, non quidem sarcoticis Unguentis admotis, utpote humidoribus; sed in cicatricibus, Unguento de Tutia scilicet, de Plumbo, similibusve, atque linteo discerpto his imbuta vulnus omnino implendum, ut caro eundo succrescat, ac superponendum Emplastrum diapalma, vel simile.

Producta autem æqualiter carne, inducenda cicatrix non fulveritur, nec insanentis Aridis, quibus labia vulneris callosa evadunt, & cicatrix non ita facile obducitur: at impositis istis Exsiccantibus Unguentis quibus dura ac solida evadit cicatrix, quæ difficiliter dehiscit.

Sed fistulæ, quæ ad orificium ani pertingunt, & serpunt exterius supra Intestinum Rectum, non tamen ipsum perforant, non ita facile sanantur, ob copiosas humiditates, quæ ab intestinis continuo deducunt. Iste sunt quoque dilatandæ, & sequendæ, nullo quippe alio præsidio sanantur.

Igitur si occurrat fistula ani non penetrans rectum intestinum, sumendum specillum, quod in una sui extremitate capitulum rotundum, & pro hili serici traiectione foramine donatum habeat, in altera, pro incisione fundi fistulæ, inilar acus triculpidis acuminatum sit, cujus apici asigatur pula cerea, quæ instrumenti acumen liberiores transitum habeat ad sinus fundum, neque tui or sit, ut in latera ejus impingat, operationem impediat, & dolorem excitet.

Preparato ita specillo incerto, fistulæ fundus inquirendus, eoque invento, specillum fortiter tradendo cutis perforanda. totumque illud per fistulam ducendum, propendente ex utroque foramine filo serico. de in educto specillo, hili extremitas colligenda, ac tulinè stringenda, sicque universi sinus incilio filo peragenda. Atque hic modus fistulam non penetrantem incidendi proponitur à c. cello lib. 7. c. 4. hæc verbis, in fistula de-

“missio specillo ad ultimum ejus caput, incidi
 “cutis debet; diem novo foramine specillum
 “educi lino sequente, quod in aliam ejus par-
 “tem ob id ipsam perforatam conjectum sit.
 “At vero quia fistula totius per filum incisio &
 curatio in his tarde procedit, illamque assiduus
 comitatur dolor, merito rejicit eam Febr. ab
 Aquapendente, nec locum habere ait, nisi in his,
 qui meticolose ferrum expavescunt. Unde &
 nos potius duimus, fistula specillo perforata,
 & foraminibus pro usu syringotomi, quod al-
 tero extremo capitulum crassius habet, suffi-
 cienter dilatatis, nlin sericum remove, at-
 que fistulam ipsam incidere. Et hæc fistularum
 per filum & aciem scalpelli curatio Celsi & re-
 centiorum Practicorum voris satisfacit, atque
 simplici per filum iucisione melior est, & tolera-
 bilior, in primis quando orificia propter sinus
 longitudinem nimium distant, si tamen & hæc
 operatio æquo tardior videbitur, omnibus bon-
 æ operationis conditionibus sati faciet. Chi-
 rurgus, si statim fistulam inciderit syringoto-
 mo autam aciem habente, globulo tamen ce-
 reo munitam, quo syringotomi acu non tran-
 situm habeat liberiores ad fundum fistulæ, ne-
 que metus sit, ut in latera impingat, opera-
 tionem impediatur, doloremque excitet.

Verum enim vero licet hoc modo, per sectio-
 nem partium externarum, Fistulæ Ani non Pe-
 netrantes ut plurimum curari soleant; facilius
 tamen eadem curam suscipiunt, si ipsum inte-
 stinum intus secetur. Neque omnino metuenda
 est musculi sphincteris & intestini recti sectio;
 hæc equidem cautela, ne musculus totus sece-
 tur, sicque fæces involuntarie effluent. Scribit
 Hipp. lib. de Hamorrh. sphincterem tuto posse
 incidi, quovis modo, sine læsione sui officii,
 si saltem octava ejus pars relinquatur intacta,
 alias sequeretur involuntaria læcum excretio, &
 tandem ipsa mors.

Tertio occurrunt Fistulæ, quæ Intestinum Re-
 ctum perforant, sive in inferiore Musculi Spincte-
 ris, sive media, sive suprema ejusdem parte; quæ
 tamen loci diversitas non mutat curationem, sed
 solummodum ejusdem tempus; extremi quippe
 musculi fistulæ citius sanantur mediis vero, vel
 supremi tardius, propter profundas sectiones,
 quibus ad perfectam earundem sanationem
 opus est.

Hujusmodi fistulæ aliquando ab Hippocrate
 sine incisione curantur. Nam primum Turundam
 fistulæ immittit Succo Lithymali madidam, pro
 callo consumendo; deinde Florem Aeris ad-
 pergit: in anum ad inflammationem prohiben-
 dam Glandem immittit Corneam, exterius Cre-
 ta Detergente illitam, usque in quintum diem:
 ablato callo, Glandem Alumine implet, anoque
 imponit, ad glutinandum, ad inflammationem
 arcendam, ad locum affectum exsiccandum. Sed
 vix unquam hæc curatio succedit, præferenda au-
 tem quæ primum hæc fistulas dilatat Turundis
 accommodatis, deinde eas secatur, vel Syringo-
 tomo, vel Filo Serico. Utendum Filo, Patienti-
 bus ferrum reformidantibus; licet hæc sectio
 longa sit, & dolore molesta: frequentius vero
 Syringotomo quia citius & minore dolore ope-
 ratio perficitur: & quidem hunc in modum. Spe-
 cillum sumendum argenteum, præ utraque extre-
 mitate rotundis capitibus præditum, illudque

pro necessitate incurvandum. Hujus extremo, &
 Syringotomi globulo filum ex lino duplicato al-
 ligandum. Quibus peractis, fistulæ orificio len-
 te intrudendum specillum, illudque ut & nlin
 duplicatum, & globosum scalpelli caput, per ani
 orificium trahendum. Deinceps manu sinistra ar-
 ripienda syringomi superior pars, atque sic in-
 strumentum trahendo & impellendo fistula uno
 ictu, ne diu Agri doloribus torqueantur, inte-
 gre incidend, Quæ incisa, sanguis sistendus, in-
 flammatio prohibenda, callus (modo nunc di-
 cto) absuendus, vulnus recenti carne implen-
 dum, & cicatrix inducenda.

Ad Fistulas autem, quæ Intestinum perforant
 ultra Musculum Spincterem, parte superiore,
 quod attinet: Istæ a multis habentur insanabi-
 les, nisi præfecto toto sphinctere, ex quo in-
 voluntaria ne scilicet alvini excretio. Hæc ta-
 men se sæpius feliciter sanasse scribit Petrus de
 Marchettis, citra illud incommodum; facta viz.
 congrua dilatatione, ut in omnibus aliis ani fi-
 stulis curandis fieri solet; musculus sphincter
 eoque secandus, ut aliqua ipsius pars integra
 superit, ac intacta, quæ suo fungatur officio.
 Facta sectione, superstes fistula Actuali Caustico
 erit inurenda, ut callus tollatur, cujus crusta bu-
 tyro vel digestivo sublata, implenda cavitas lin-
 teo discerpto imbuta Unguento de Tutia; hæc
 ratio, ut imminuatur quotidie, donec proba-
 caro aequaliter generetur, & cavitas oppleatur.

At nonnunquam observantur Fistulæ, quæ ser-
 punt inter Intestini Recti tunicas, & superius
 tendunt, modo ultra latitudinem Sphincteris,
 modo infra. Ex tamen raro sunt callosæ, propter
 humiditatem in intestinum, ejusque membranæ
 continuo allabentem; quæ proinde statim sunt
 dilatandæ Turundis ex panno lineo confectis,
 vitatis illis ex Radice Gentianæ, vel Spongia
 Compressa, quæ plus satis dilatando, lacerant
 membranas intestini) dehinc secandum longi-
 tudinem, abque ullo metu læsionis musculi spincte-
 ris: ad externa vero faciendæ est sectio.

Sed Fistulæ hæc secantur, immittenda in-
 tra Anum cannula rotunda, altero extremo clau-
 sa; at a latere fissura patefacta, in cujus medio
 lana mollis vel gailypium lateat, ne acies scal-
 pelli hebetetur: illius cannulæ usus est, ut secta
 fistula, excipiat gladiolum, illæis proinde inte-
 stini partibus oppositis.

Curantur autem facili hæc fistulæ sectæ, obdu-
 cta cicatrice Injectionibus exsiccantibus bis
 quotidie infusis, nec non immisis Turundis im-
 butis Unguento de Tutia, atque Pulveribus rei-
 dem Exsiccantibus Facta namq; Sectione, non
 immittenda Turunda longa, ad fundum usque se-
 ctionis pertingens, illita Ovi Albumine cum Bo-
 lo Armeno conquassato: ad deteritionem vero in-
 jicenda Aqua Hordei cum Melle Rosaceo, & su-
 pra turundam inspergendi Pulveres ex Bolo Ar-
 meno, Terra Sigiliata, similibusque, tum ad ex-
 siccandum, tum ad adstringendum. Notandum
 vero, quod hujusmodi fistulis nunquam adhibea-
 tur Digestivum, ne tenues intestini membrana
 nimium flaccescant & resolvantur. Post quatuor
 aut quinque dies, pirandæ Injectiones ex Aquis
 Thermalibus; vel, hisce deficientibus, Artificia-
 libus ex Vitriolo, Nitro, Sale, Alumine, cum aq.
 communi, immissa semper Turunda imbuta Un-
 guento de Tutia, ac Pulveribus dictis Exsiccan-

tibus; quibus remediis obducenda cicatrix, quæ duri licet, & callida, nequaquam tamen impedit contractionem musculi ipminteris; quinimo mollior foret, brevi resolveretur denuo ab humiditate continuo partem illam alluente.

Tandem ad Vescicam serpentes Fistulae succedunt; quarum quædam perveniunt ad ejus colum, & quidem aut juxta ejus exortum, vel medium, vel finem, ipsum tamen non perforant: alie ipsum pertundunt in ejusdem exortu, aut medio, aut circa finem, ubi cervix vesicæ triti vulgo perhibetur. De hisce vix est dicendum, cum omnino sint insanabiles, & solo Prognostico relinquendæ, ne infametur artis præsidia. Quoad illas tamen, quæ pervadunt ad cervicem vesicæ, ipsam tamen non perforant: in iis curandis majore dilatazione opus est, quam in præcedentibus; in quam rem, ex usu sunt Turundæ ex Compressa Spongia, vel Radice Gentianæ, atque fistula dilatata, faciendæ Sectio gladio admodum recurvo, dorso laevi, ne lædatur collum vesicæ, acuta acie, quod partes illud invellente sint membranosa, quæ diffiçulter secantur. Si sint plures sinus, in pluribus sectionibus sunt patefaciendi, illas temper vesicæ collo; turpe quippè, & fœdum foret, urinam per aliam partem effluere, quæ naturalis facta sectione, callus remouendus, tum absolvenda curatio ut in aliis fistulis.

In genere vero de Fistularum Ani Curatione Medico observandum, ut statim ad eam se accingat, nisi remuente Agrosiupressa siquidem, ut sæpe fit, purulenta materia variis modis excavantur, unde tandem fistula in plures diffunditur, quæ supra materia oriuntur abscessus, non sine magno dolore, gravi febre, & aliquando morte ipsius Patientis.

Perperam itaque exillimant multi Pseudo-Medici, & Barbitonfores, se sanare posse fistulas ani & intestini recti Balsamis, Unguentis, Injectionibus, aliisque hujusmodi præidiis; sed frustra laborant, cum hæ non nisi sectione sanabiles sint *Idem ibidem*.

De Fistulis Pectoris, Abdominis aliarumque partium vide Caput de Uteribus ubi huc pertinebunt. Hic rursus de *Fistulis* jam in specie mentio ratis ex Clar. Petro de Marchettis ac Theodor. De Mayerne, ut & de Fistulis vetera ex eodem Petro de Marchettis pauca.

De Fistularum Ani Differentiis.

Licet non me lateat, ab omnibus uctoribus curationem fistularum ani proponi, cum tamen divertit sint a modo, & ordine eas explicandi, ac curandi, ideo decrevi cum in medium afferre, quo sæpe felicissimo successu has sanavi, & differentis ipsarum exortus.

Alie itaque fistulae sunt propè anum, non tamen pervenientes ad ejus orificium; nonnullæ ad ipsum pertingunt, & serpunt exterius supra intestinum, quod tamen non perforant: quædam vero ipsum pertundunt; & quidem alie in externo musculo sphinctere; alie ad partem usque ejus mediam; quædam prope eundem externum superius, vel etiam ultra, superiori tamen parte: aliqua inter utramque tunicam intestini recti tursum tendunt, modo ad medium sphincterem, modo ulterius: earum item quædam aliquando ad vesicam delectunt, quæ sunt species fistularum ani, & intestini recti à me

observatæ. Præterquam quod alie uno tantum sinu, alie pluribus perreptant; quædam tortuosæ, quæ differentia accuratè recensendæ fuerunt, utpote ad earum curationem apprime necessariæ.

De Causis Fistularum Ani, & Intestini Recti.

Causæ harum fistularum alie sunt externæ, alie internæ. Externæ, vulnèra, in ulcera degenerantia, atque hæc in fistulas: contusiones ex equitatione, ex lapsu, vel aliqua hujusmodi causa anum contundente, cujus ratione oriuntur abscessus; quæ contusiones, prope anum potissimum, ex pure in iis conclusæ perforant absque dubio intestinum, quæ si longius ab ano recedant, illud non lætactant, sed tantummodo carnem, supra quam exterius serpunt.

Causa verò internæ fistularum ani, & intestini recti sunt humores, hæmorrhoides, exulceratio.

Hæmorrhoides siquidem, ratione doloris sanguinem attrahunt, subito postmodum tumore, qui in sinum, tandem in fistulam desciscit. Ab excoriatione vero intestini recti suboritur, dum ab aliqua materia biliola, mordaci, vel virulenta, ex Lue potissimum Venerea exulceratur, atque lentim excavato ulcere ab eadem in eo congeita, & diutius hærente, paulatim perfoditur; atque materia inter partes musculosas collecta, progressu temporis suboritur tumor in partibus externis ani, qui cum raptus in fistulam facessit, quæ tum partes ejusdem musculosas externas pertundit.

Ab humoribus quinetiam heterogeneis aliquando ad intestinum confluentibus, & musculum sphincterem perforantibus, abscessus, & fistula suboritur, ratione superius aliata.

Atque hæc sunt causæ, & modus generationis fistularum ani, & intestini recti. Ad signa modo progredimur.

Signa Fistularum Ani, & Intestini Recti.

Si fuerit fistula in partibus externis prope anum, quæ tamen musculum sphincterem non perforaverit, id specillo patibit, prout si penetraverit in intestinum, intruso siquidem digito oleo inuncto in anum, specillum nudum illi occurret.

Dignoscuntur fistulae inter utramque tunicam intestini, in nullo specillo, si digito non fuerit obvium, sed membrana ipsius intestini tectum. Observandum vero, quod specillo immisso, totam longitudinem fistulae deprehendimus, quo non pertingit digito in anum immisus. An vero eadem fistula periorat intestinum rectum in musculo sphinctere, vel supra eundem, hoc prodit signum, siquidem si digito in anum intrusi apex ab eodem non contringitur, sed in loco veluti vacuo hære sentiatur; quo stylus quineti in fistulam denarius pervadat ad extremum usque digitum, in illud scilicet cavum, fistulam perforare intestinum supra musculum indicio fuerit, cujus intestini perforati signo ab omnibus proposito, accedunt hæc, male olentes scilicet ex fistula erumpentes, aut faeces.

Utrum verò fistula fuerit in principio musculi sphincteris, medio, vel fine perbelle patet digito, & specillo, ut supra observatum. Quando verò ad vesicam tendunt fistulae, situs id nobis demonstrat, oculis siquidem ipsis id patet

specillo in locum vesicæ demisso: si verò vesicam pertulerint, copiosa effluet urina, atque aut per totum vitæ curriculum laborant, aut misere paucis post diebus ægri moriuntur, si fistula valde dilatetur. Et hæc quoad signa, in quibus Medico-Chirurgus multum accuratus desideratur, in iis potissimum, quæ musculum, & intestinum perforatum produunt.

De Fistularum Ani Prognosi.

Omnes fistulæ superius descriptæ à perito Medico sunt sanabiles; prout, omni ambitione procul, felicissimo successu earum quamplures, imo sexcentas perfectè sanavi, methodo inferius proponenda: quanquam in his quædam facilius, quædam difficilius, & quidem ægre admodum sanantur, quæ scilicet supra sphincterem musculum intestinum perforant; ut quæ à Luc Gallica suboritur. Facilius vero, & brevi tempore, quæ in orificio ani; minus facile, quæ in medio musculo, ut & quæ intestinum perforant supra musculum; quippe difficillime istæ, nec nisi longo tempore admittunt sanationem.

M. jori autem difficultate, si symptoma aliud quod grave eisdem accesserit, utpote inflammate hæmorrhoides, atque proximus illis subortus abscessus, dolor gravis partis affectæ, ut & calius annosus, ac durus admodum; quæ symptomata licet diutius protrahant earum sanationem, non vero eam prohibent omnino; quin potius his sublati, facilius eadem contingit.

Dubium verò apud auctores, utrum ani fistulæ occludi debeant, quibusdam id omnino negantibus, utpote quæ insanabiles, ipsorum sententia, qui hanc curandi viam ignorant; quibus refragatus, censeo omnes debere, ac posse sanari, his exceptis; quo casu observandum, an fistulæ post cachexiam sine obortu, an vero fistulas cachexia exceperit: si enim fistulæ cachexiæ succedant, tunc non sunt sanandæ, nisi prius sublata viscerum omnium intemperie, & ad laudabilem redacta; quæ verò cachexiam præcedunt, omnino obducendæ.

Quod vero ex fistulis induci possit cachecticus habitus, facile est probare; sanguis siquidem, dum circulatione partem à fistulis corruptam, ac prout inquinatam alluit, pravam nescio quam suscipit qualitatem, quam visceribus postmodum impertit, ac cachecticam infert dispositionem, vel saltem, non concessa circulatione, sanguinis tetri vapores, elevati à parte fistulosa pure obsita sanguinem contaminant, unde viciata nutritione oritur cachexia.

Quod verò aliqui objectant, quo scilicet purulenta illa materia, quæ continuo ex fistula effluebat, erumpat, eadem sanata; hanc certè, inquiunt, tetram, & corruptam necesse est recurrere, atque alias partes labefactare; ne propterea pessimo consilio fistularum anni sanatio tentanda sit. Respondemus, nullum ex earundem sanatione sequi detrimentum; siquidem prout natura singulis corporis partibus proprium alimentum largitur, ita parti fistula laboranti; cui tamen nutritiæ cum sanguis laudabilis licet, accedit, corrumpitur, & in pus

convertitur, qui propterea est expurgandus, unde sanata fistula, alimentum illius partis non corrumpetur amplius; quinimo alimentalis substantia particeps in eam faciescit, ut non sit opus materiam illam retinere ad partes sanas, atque ipsarum temperiem corrumpere; ut propterea fistulæ ani, & intestini recti possint nullo ægrotorum periculo sanari, ut sæpissime observavi; præmissa tamen totius corporis cura, expurgantibus materiam morbiicam, & vilcerum nativam temperiem redintegrantibus; atque quo omnis prorsus timor absit materiæ refluxus, fonticulus temori dextro inurendus, expurgandis quotidie excrementis.

Curandæ vero fistulæ ani, periculo gravioris mali, ex puris effluxu, ut sæpissime fit, cohibito, quod acrius, & candidius in varios sinus se diffundit, pertuso intestino, & amplius ulceribus productis, ex quibus quamplures moriuntur; prout exacto biennio accidit illustissimo, & excellentissimo Malipetro, D. Marci Procuratori, non admittita sectione fistulæ ani, quod & in sexcentis aliis observavi; ad quam propterea curationem me accingo.

De Fistularum Ani, & Intestini Recti Curatione.

Curatio fistularum duplex est; alia universalis, causæ, alia particularis ipsi morbo dicta. Universalem quod spectat, si viscera patientis fuerint bene constituta, ut patet ex inculpata valetudine totius corporis, abunde erit corpus expurgare lenientibus, præparantibus, & purgantibus, levioribus tamen, nullo sanguine, si opus fuerit, ex brachio, vel pede, quanquam aliqui abhorreant à medicamentis; quibus quidem non refragatur, præsentem optima corporis constitutione, qua præditos multos curavi, non expurgato corpore, felici successu, & absque ullo futuri morbi periculo. Quod si patiens fuerit mali habitus, & cacochymicus, purgandus primò semel, & iterum fluxioni arcendæ, ac tollendæ; tum propinandum decoctum ex ligno Guajaco, salsa parilla, aliisque medicamentis, pro ægri temperamento; præsentem siquidem cachexia, raro admodum ex toto sanantur fistulæ, nisi sublata viscerum intemperie, iisdemque corroboratis. Quoad curationem topicam, multiplex ea est, præ varietate, & differentiis fistularum: Fistulæ quippe prope anum, quæ non pertingunt ad ipsius orificium, facillime sanatur, non tamen absque sectione, & quidem si rectæ, non sæpius repetita, si sinuosa, pluribus.

Primò igitur foramen fistulæ dilatandum turundis, imbutis aliquo proprio medicamento unguento scilicet ex betonica, matriilyva, & hujusmodi; ac quotidie eadem crassiores immittendæ, donec foramen fistulæ satis ampliatum admittat scalpellum ad sectionem; quod si aliquando non sufficiant, alix adhibendæ ex radice gentianæ, aut medulla sorgi, vel spongi filo constricta: satis verò dilatato foramine, demittendus cultellus rectus, ab Aquapendente delineatus in instrumentis Chirurgicis, atque faciendæ unica sectio ad fundum usque ipsius fistulæ; postmodum imponendi globuli imbuti ovi albumine, ad prohibendum immissionem

tionem, superinfectis stupis in eodem madefactis; quibus postero die remotis, diligenter stylo inquirendi alii sinus, qui dilatandi, atque secandi modo jam dicto; tum retrigerantia applicanda, atque supra fistulam primo lectam adhibendum digestivum. Quia vero expissime a sectione callus subortus impedit sanationem, illi tollendo, ex usu erit viride zris, vel præcipitatum inspersum; cavendo tamen ne hæc corrosiva contingant labia vulneris, metu doloris gravioris. Quibus frustra adhibitis, deveniendum ad ignem actualem; quanquam observaverim aliquando callum sublatum solo digestivo; quod licet alicui forsan novum, & præter rem videri possit, sæpius tamen experientia nuni est compertum, potissimum vero in muliere quadam laborante antiqua fistula, perforante ambas nates, per ossis coxendicis foramina, quæ clauduntur a musculis obturatoribus externo, quæ collo obduruerat admodum duro, ad crassitie mediæ digiti, quam curavi amplis utrinque sectionibus, ad ossa ossa usque; postmodum applicato digestivo, concoctionis causa, quibus callus mollior factus, levi negotio abscellit, instar corticis arboris. Spatio quinque mensium, perfecte adeo muliere sanata, atque multis post annis incolumi.

Consumpto verò callo, deterfoque vulnere, caro generanda, non quidem unguentis sarcoticis, utpote humidioribus, sed siccis, de tuthia vel lliidis; atque ita globulis his imbutis vulnus implendum, ut caro e fundo suerescat, priusquàm illi imminuantur; necnon supra eosdem applicandum ceratum de chalcitide, vel de cerula, aut de gratia Dei; vel, hyemali potissimum tempore, Barbarum.

Producta æqualiter carne, inducenda cicatrix non pulveribus, nec filamentis aridis, quibus labia vulneris callosa evadunt, & cicatrix non ita facile obducitur, sed eorum loco, medicamentis potenti. siccis, actu verò humidis, prout supra dicta unguenta, lliidis, de tuthia, de plumbo, & similia, quibus dura, ac solida evadet cicatrix, quæ difficiliter dehiscat.

Quia vero quandoque succrescit caro, quæ remoratur cicatricem, atterenda hæc lumine ullo, præcipitato, & similibus. Atque hæc de curatione primæ differentie fistulorum.

Aliæ verò fistulæ quæ ad orificium ani pertinent, & serpunt exterius supra intestinum rectum, non tamen ipsum perforant, non ita facile sanantur, ob copiosas humiditates, quæ ab intestinis continuo deluunt. Istæ tamen, prout in aliis diximus, sunt dilatandæ, & secandæ; nullo quippe alio præsidio sanantur.

Hic oritur dubium, an sectio sit facienda in interna, an externa parte; si enim externa longior videtur futura, ac nimis profunda, non levi sane periculo sit, ratione magnæ sectionis; si interna, vulnerantur sanæ partes. Id tamen solvitur, quod scilicet sectio internæ partis sit præferenda; quia fistulæ, quæ serpunt secundum intestinum rectum, quavis ipsum non perforant, nunquam possunt consolidari nisi ipso quinetiam sectio; nec absque ratione, cum heterogeneæ substantiæ sint, intestinum, & caro circumposita, quæ proinde non potest agglutinari, nisi carnæ substantiæ opem, quod per sectionem curandum.

Quod verò caro intestino coalescere non possit, causa est humiditas ichorosa, quæ ab ejus membranis effluens, humectat carnem ipsam, im-

peditque quonivinus possit agglutinari; ut propterea non sit omnino metuenda musculi sphincteris, & intestini recti sectio; hæc tamen cautio, ne ut musculus non totus secetur, ne tæces in voluntarie excernat.

Facta sectione, omnia præstanda superius præscripta; hoc solum excepto, ut digestivi loco, utamur unguento ex Betonica, vel de matrisylvia aliquot dies; adhibitis deinde exsiccantibus paulò validioribus, coercendæ superfluxæ humiditati, atque solidiori carni in fundo fistulæ producendæ; oppleta verò fistula carne firma laudabili, obducenda cicatrix modo supra dicto; quæ tamen mollior sit, non dura, quo musculus perfecte constringi possit; hæc liquidem aliquando dura adeo evadit, ut ille satis non possit coarctari, non sine involuntaria sæcum excretionem, cujus causa imperiti sectionem musculi a Medico, factam calumiantur.

Quod si contingat callum durum produci, emolliendus erit aqua forti, vel spiritu vitrioli, præter infusus in aquis nostris thermalibus, apprimè utiles, quarum vis non solum callos emolliendi, sed etiam simul & semel mirifice corroborandi partes læsas; in quam rem propterea vitanda olea, Unguenta, & cerata, quippe quæ laxando, reddunt partes fluxioni obnoxias; & callo non nisi tardius producendo opportunas.

Succedit modo curatio fistularum, quæ intestinum perforant, sive in externa musculi sphincteris, sive media, sive suprema ejusdem parte; quæ tamen loci diversitas non mutat curationem, sed solummodo ejusdem tempus; extremi quippe musculi fistulæ citius sanantur, mediæ verò, vel supremæ tardius, propter profundas sectiones, quibus ad perfectam earundem sanationem opus est; quæ, prout aliæ omnes, primùm dilatandæ curandis accommodatis, mox secandæ; idque duplici ratione, vel syringotomo, vel filo sorico, aut ferra equina. Utimur filo, patientibus ferrum reformidantibus; licet hæc sectio longa sit, & dolore molata; frequentius verò syringotomo, quia citius, & minori dolore operatio perficitur.

Patet facta fistula, alterutro modo supra dicto procedendum, cavitasque ex sectione opplenda, globulis imbutis ovali albumine. Notandum tamen, quod hæc fistulæ plures postulant globulos, ut sectio patens sit, ne coalescente de novo intestino, quod facile fit, partibus circumpositis, fistula eodem statu, quo antea vigeat. Facta coctione, potius unguento ex Betonica, cum digestivo, atque optimo pure apparente, producenda caro; non quidem ut aliorum vulnorum, ratione superioris allata, Unguentis de Betonica, vel de matrisylvia, quibus, ob actuale humiditatem laxa sit, & mollis, in parte potissimum humidiori, sed adhibitis filamentis siccis, pulveribus tuthiæ præparatæ, terræ sigillatæ, cornu cervi usti, plumbi, & hujusmodi medicamentis actu, & potentia siccis inspersis, quibus cicatrix quinetiam firma obducitur.

Quod si musculi sphincteris multum sit abscissum contraria instituenda curatio, unguentis nempe actu humidis, vero siccis ne cicatrix, ut jam docui, durior & solidior evadat, quæ prohibeat contractionem ipsius musculi, cum sæcum involuntario exitu.

Modum verò quod attinet curandi fistulas, quæ intestinum perforant ultra ipsum musculum sphincterem, superiori parte, quanquam insanabile

les à multis habent urnis toto musculo sphinctere præfecto, ex quo in voluntaria sæcum excretio, eas tamen sæpius sanavi summa felicitate, citra illud incommodum, facta congrua dilatatione, prout in aliis omnibus præscriptum; musculus si quidem sphincter eousque secandus, ut aliqua ipsius pars, verbi gratia, ad latitudinem annuli, integra supersit, ac intacta, quæ suo fungatur officio.

Facta sectione, superstes fistula erit murenda, ut callus tollatur, cujus sublata crusta butyro, vel digestivo, implenda cavitas globulis, imbutis unguento de tuthia; hac observatione, ut immineantur illi, donec proba caro æqualiter generetur, & cavitas oppleatur.

Quia vero plurimum accidit, ut propter redundantem humiditatem partis, generetur caro fungosa, & mollis huic absumenda, valet Unguentum Illidis, cum unguento de tuthia æqualiter mixtum, usque dum caro utilis producta fuerit, cicatrice postmodum obducta.

Succedunt modo fistulæ, quæ serpunt inter utramque tunicam intestini recti, & superius tendunt, modo ultra latitudinem sphincteris, modo infra; quæ tamen caro callosa sunt, ut ego observavi, propter affluentem humiditatem intestinum, & membranas continuo alluentem, quæ proinde statim sunt dilatandæ turundis ex panio lineo confectis, vitatis illis ex medulla forgi, radice gentianæ, & spongia præparata, quæ plus satis dilatando, lacerant membranas intestinorum; quib. abunde dilatis, secandæ illæ sunt secundum longitudinem, absque ullo metu lationis muscoli sphincteris; ad interna vero faciendæ est sectio.

Dum vero secantur, immittenda intra anum cannula rotunda, altero extremo clausa, altero vero latere fissura patefacta, in cujus medio lana mollis, vel gossypium lateat, ne acies scalpelli hebetetur; cujus cannulæ usus est, ut facta fistula, excipiat gladiolum, illælis proinde intestini partibus oppositis.

Curantur facile istæ fistulæ sectæ obductæ cicatrice, injectionibus exsiccantibus bis quotidie infusis, nec non immixtis turundis imbutis unguento ex tuthia, atque pulveribus itidem exsiccantibus.

Facta sectione, statim indenda turunda longa ad fundum usque sectionis partingens, illata ovi albumine, cum bolo armena orientali conquassato, postero die ad deterfionem, iniicienda aqua hordei, cum melle rosaceo, & supra turundum, inspergendi pulveres ex bolo armena, terra sigillata, cornu cervi ustis; tum ad exsiccandum, tum ad adstringendum. Notandum vero, quod his fistulis nunquam digestivum adhibendum, ne tennes membranz intestini corrumpantur. Transactis quatuor, aut quinque diebus, parandæ injectiones ex aquis thermalibus montis ægrotorum; vel harum inopia, artificialibus ex vitriolo, nitro, sale, alumine, cum aqua communi, immixta semper turunda imbuta prius unguento ex tuthia; deinde pulveribus exsiccantibus jam dictis; quibus remediis obducenda cicatrix, quæ durius licet, & callosa, nequaquam tamen impedit constrictionem muscoli sphincteris; quinimo si mollior foret, brevi resolveretur de novo ab humiditate continuo partem illam alluente.

Superest curatio fistularum ad vesicam serpentium, quæ differunt: quædam enim perveniunt ad ejus collum; & quidem aut juxta ejus exortum, vel medium, vel finem, nec ipsum perforant; aliæ

ipsum pertundunt in ejusdem exortu, aut medio, aut enca finem, quæ vesica annectitur suæ cervicæ.

De prioribus actum in tractatu de fistulis urethræ, de aliis non est differendum, cum omnino sint insanabiles, & solo prognostico relinquendæ, ne infamentur prætidia, quæ multis fuisse salutis, ex Celso, ut proinde earum sola curatio docenda supersit, quæ pervadunt ad cervicem vesicæ, ipsum tamen non perforant, in quibus majori dilatatione opus est, quam in superius propolitis, in quam rem, ex usu sunt turundæ ex spongia contorta, & compressa, radice gentianæ, medulla forgi, vel sambuci; atque dilatata fistula, faciendæ sectio, non quidem scalpello, sed gladiolo in hunc ulum parato, admodum recurvo, dorso lævi, ne lædatur collum vesicæ, acuta acie, quod partes illud investientes sint membranosa, quæ difficulter secantur. Si sint plures sinus, prout plurimum fit pluribus quinetiam sectionibus patefaciendi, illata semper cervicæ, ne Medico infamia iuratur; turpe quippe, ac scædum foret, urinam per aliam partem effluere, quam naturalem. Facta sectione, callus removendus, tum ab solvenda curatio modo jam proposito in aliis fistulis; à quibus istæ non differunt, nisi ratione situs. Observandum tamen Medico, ut statim ad fistularum anicurationem se accingat, nisi renuente ægro; suppressa siquidem, ut sæpe fit, purulenta materia, variis sinus excavantur, unde progressu temporis fistula in plures diffunditur, ex qua materia suppressa suboriuntur aliquando abscessus, non sine magno dolore & febre satis gravi.

Quod si fistulæ fuerint amplæ, deducunt totum corpus in cachexiam; sanguis quippe, dum circulari motu movetur, & partem affectam permeat, suscipit, nescio quam malam qualitatem, & inquinatur, atque à parte fistula excavata elewantur vapores putridi, qui labef. ctant viscera naturalia & vitalia.

Fistulæ vero, quæ perforant intestinum, ideo statim sunt curandæ, quia ægri plurimum laborant tenesmo, & frequenti deiectionis cupiditate, cum doloribus in excretionem sæcum, & quod gravius, cum pars affecta pure semper redundet, accidit sæpius, ut in ulcera phagedæna facessant; quod frequentissime observavi.

De Symptomatibus supervenientibus curationi Fistularum anæ, & Intestini Recti.

Præcipua symptomata, quæ in fistulis anæ ad se trahunt curationem, sunt, languinis fluxus, inflammatio, vehemens dolor, & hæmorrhoides. Dolor sedandus anodynis, ut oleo amygdalarum dulcium, violarum, chamæmelino, lacte, butyroloto aqua rosacea, & hujusmodi.

Aliquando insignis suboritur inflammatio, præsertim ex sectione, si fuerit magna, ratione scilicet doloris attractis humoribus; tunc vero applicanda repellentia, ut ovi albumen, succus plantaginis, portulacæ, palygoni, myrtillorum; atque si dolor, & ardor urgeant, educendus sanguis è venis superioribus, revulsionis causa, ad partes longinquas.

Tument vero sæpiissime hæmorrhoides, sectione potissimum, & applicatione medicamentorum acrium irritatæ; hinc acuti dolores, qui curationem trahunt, quibus ex usu est linteum in lacte tepido expressum, & applicitum, necnon ossa panis lacte vaccino imbuta, & appositæ, prout optimum unguentum rosaceum; quo casu conveniunt quinetiam stupefacientia, le-

viola tamen, ut unguentum populeum, vel santalinum, cum poriuncula opii. Nulium vero præstantius remedium sectione venæ brachii, & ratione revulsionis; postmodum ex pede, derivandi causa, ratione morbi, & virium.

Ultimum symptoma est sanguinis profluvium; secantur quippe aliquando rami venarum hæmorrhoidaliū, qui statim sanguinem magno impetu effundunt; qui proinde omni ope sistendus, cum in eo vita consistat; applicandum propterea gossypium ustum, cum pulveribus adstringentibus; necnon stupæ imbutæ ovi albumine, parte manu opprime compressa per aliquod tempus, donec coerceatur; quo apparatu utendum duos, aut tres dies, quosque sponte a pure a fonte defluit. Quibus vero instituta est aliqua sectio, vel hæmorrhoides fluunt, infectis ex aquis thermalibus non sunt administrandi, utpote qui facultate quadam fluxum sanguinis denuo excitant, quorundam chirurgorum gravissimo errore, qui illis utuntur.

De Observandis in curatione Fistularum Ani & Intestini Recti.

Perperam existimant multi Pseudo Medici, se sanare posse fistulas ani, & intestini recti balsamis, unguentis, injectionibus, aliisque huiusmodi præditiis; verum frustra laborant, cum hæc nonnulli sectione, & ustione sanabiles sint. Siquidem ego spatio quinquaginta annorum, nullam vidi fistulam ani sanatam perfecte; licet observaverim aliquas à barbitonforibus, imperitisque Chirurgis ad cicatricem deductas, quibusdam arcanis remediis, sed speciem solum, & superficiem tenuis; in quarum quippe fundo materia purulenta dehtesceret, paucos post dies in novas majores fistulas, & graviores diffusa.

Quare si ex toto fistulæ sint sanandæ, ferro sunt omnino secandæ; quod licet multi reformident, Anatomes ignari, ejusdem tamen periti nullo periculo, & metu hoc præsidio utuntur, quod tamen cautè administrandum in huiusmodi fistulis, ne lacerentur venæ sedales, hæmorrhoides dictæ, cum sanguinis erumpentis magno impetu, qui non adeo facile sistitur. Si itaque hæmorrhoides non tumeant, faciendæ sectiones inter unam & alteram ani rugam; si vero appareant, eadem inter ipsas administranda.

Fistulæ profundæ opus habent pluribus, & reperitis sectionibus, metu inflammationis, unica enim, & ampla, ob vulneris magnitudinem, dolorem, & inflammationem excitat; quod observandum etiam in sinibus profundis; ut propterea gravissimo errore quidam imperiti chirurgi, latrones potius, statim post sectiones ani, & intestini recti, ferramento candente urant partes recent cultro læsas, unde dolor insignis, & curatio longius protrahitur.

Sæpiissime vero accidit, ut flaccida caro sub crescat, quæ corrosivis absorbenda, alumine scilicet ulso, præcipitato, viride æris, trochiscis de minio, & huiusmodi: in quorum tamen usu observandum, applicanda mane potius, quam vespere, ne ratione doloris, patientibus somnus intercipiatur, magno eorum detrimento; multos siquidem vidi, qui ob vigilias, & dolores à medicamento vespere adhibito, inciderunt in

febres; quod non accidit, si interdiu eadem medicamenta ulerpentur; quia vis lentiva occupatur, & avocatur a variis objectis ex ternis, præterquam quod possumus eadem removere, & illorum loco, sedantibus dolorem uti, sine ullo incommodo patientis, & somni, quod nunc tu commode præstare non possumus.

Quod si pars ægra dolore afficiatur, adsitque febris, vel inflammata hæmorrhoides, tunc a sectione abstinendum, donec propriis remediis cedant; contingit vero aliquando dolor à materia purulenta, suppressa in aliquo loco ipsius fistulæ, & potissimum in aliarum partium fistulis, & sinibus flexuosis, in quibus acrimonia corrodit partes subjectas, & dolores inter continuos, quos quibus sanandis statim facienda sectio, ut eadem effluit.

Observandum etiam summa diligentia, ut antequam ægri huiusmodi dimittantur, sectiones omnino sint carne oppletæ, & cicatrice obductæ; si enim vel minimum quid earum superstes fuerit, non occlusum, progressu temporis puris guttæ genitæ erodunt partes, atque uiculus, & fistula tuboruntur; cujus erroris crimine laborant Medicorum nonnulli.

Observationes

De Fistulis Ani. Quatuor fistulæ perforantes rectum intestinum, in infantulo unius mensis, perfecte sanata.

Curavi infantem unius mensis, Nobilem Patavinum, laborantem quatuor fistulis ani, perforantibus rectum intestinum, parte inferiori.

A principio exiguis turundis duas tantum ipsarum dilatavi, imposito filo serico, cui alligavi parvum syringotomum, arte paratum; quas postmodum sanavi modo superius proposito, tractatu de fistulis; alias vero duas eadem methode secui, & ad cicatricem deduxi, ægro firma etiamnum valetudine degente. Quod observalle & re fuit, ut rarum, ratione ætatis.

De Ulceribus Ani.

Quia verò nostro ævo frequentissime suboriuntur ulcera in intestino recto, ægrè admodum sanabilia, ut quotidiana patet experientia, modum propterea hæc sanandi proponere decrevi, hoc præmisso, quod pleraque horum ulcerum ortum ducunt à Lue Venerea, & potissimum præpostera, rara verò ab alia causa; licet quidam oriantur à dysenteria, in parte nempe superiori ipsius intestini recti, & colli alia verò ex hæmorrhoidibus, partis scilicet inferioris ejusdem recti, & circa orificium ani; rhagades vero, vel scissuræ quæ à falso, & acri humore ortæ, facile tamen sanabiles, dummodo mala aliqua qualitate careant. Ulcera autem ex dysenteria facta, deterfione aqua hordei, & melle rosaceo iterum, & tertio per siphonem infusis; postmodum nostri aquis thermalibus, brevi spatio temporis sanantur; prout rhagades unguento ex cerusa camphorato, ducto in plumbeo mortario. Ulcera verò Venerea, quæ plurimum supra musculum sphincterem,

rem,

rem, non adeò facile; ex concubitu quippe semel corruptum, & virulentum in ipso superstes, ulcera ampla excitat, quæ progressu temporis serpunt, aut superius, vel interius; cum observaverim in cadavere supra triginta ulcera, distincta magnitudine unguis supra ipsum musculum sphincterem, per totum rectum intestinum serpentina, ad coli quinetiam partem aliquam; ex quibus ulceribus duæ, tresve libræ puris per diem evacuabam. Hic autem pateriens erat valde emaciatus, cum febre lenta ex ulceribus à me curatus tredecim, aut quatuordecim dies, tandem obiit. Præter ulcera vero supra musculum sphincterem, adfuit sinus quidam, ab ulceribus superioribus serpens, usque ad ani orificium; quorum ulcerum causa fuit Medicorum incuria, qui duos ante annos ipsum non sanatum dimiserunt, ejusdem salutis prætextu, quod materia à toto corpore maligna expurgaretur; ut propterea miserrimus pateriens sine remediis diem obire coactus sit; quo morbum modum docere decrevi, quo in curatione horum ulcerum uti soleo.

Primo itaque totum corpus ab humoribus expiandum medicamentis propriis, humores redundantibus purgantibus, deinde aluendum decoctum ex ligno Guajaco, & salsa, per quadraginta dies, cum sudore, prout in Lue Venerea; atque dum hæc sunt, adhibenda remedia topica, in primis injectiones à principio, ex aqua hordei, mista, cum Unguento Ægyptiaco, ad abstergenda ulcera, semper sordida, aliquedum dolorem inferunt, atque cum ex ipsis aliqua portio sanguinis effluit; tunc vero abstinendum ab Ægyptiaco, cujus loco erit decoctum Guajaci, scorderi, virgæ aureæ, & hujusmodi; postmodum utendum aquis nostris Theriacibus monti Ægypto. um: atque ab injectionibus immittenda semper turunda longa, & crassa, imbuta unguento rubro, l'acentali, dicto, aut unguento ex tutia, multo cum unguento l'idis equali dosi, & aliqua semper portione præcipitati, ut Lue Venerea dicatur. Quomodo multa ulcera Venerea sanari, & quotidie sano; quoniam in ulcera quandoque adeo maligna occurrunt, quæ remediis dictis non cedunt, in quibus deveniendum ad ignem, quo inurenda non solum semel, sed iterum, & tertio, ac quarto atque ne partes sanæ ledantur, locus primo ulceris inveniendus; in quam rem utantur quidam instrumento speculo ani vocato, quo lacerant partes, cum dolore, & inflammatione, neque tamen locus ulceris patet; ut propterea usum speculi non probem, cum facilius quod optamus consequi possimus. Quo itaque ipsum duntaxat ulcus inuratur sine laceratione aliarum partium, hac methodo utor; immitto turundam longam, crassam, aliquo unguento ex prædictis imbutam, quatuor aut sex horum spatia, quæ educta, observo, quæ pars ejusdem unguento careat, cujus loco aliqua materia purulenta superstes ipsi turundæ inherens patefaciat locum, & magnitudinem ulceris; tum mihi parvo cannulam ejusdem longitudinis, quæ possit pervenire ad ulcus, cujus extremum, sit obcuratum, & perforatum tantum illa parte, quæ ulceri respondet; deinde nuncio cannulam luteo colore imbuta osi albumine cum aqua rosarum, ipsamque in anum

intrudo, & ferramento eandem immisso, repetitis vicibus inuro ulcus; hac tamen cautione, frequentius id fiat, & citius, remoto ferramento candente, potius quam eodem diutius intra cannulam contento, ne scilicet intestinum rectum altius inuratur, & perforetur. Facta inustione, duos aut tres dies utendum turunda imbuta butyro; postmodum deveniendum ad injectiones superius dictas ex aquis thermalibus, vel decoctionibus exsiccantibus, imposita semper turunda imbuta dictis unguentis. qua methodo multa ulcera Venerea intestini recti sanavi, quam propterea latere nolui.

Observatio Singularis.

Gravia symptomata ex vi in anum immissa cauda porcina, ejusdem setis ad medium usque scetis brevi omnino sedata, cum salute agra.

Memini Meretricem quandam in vitæ periculum deductam, cui à quibusdam studiosis cauda porcina, quæ acri hyemis frigore obriquerat, intra anum immissa fuit hac ratione; lectis scetis et primò setis ejusdem, ad medium usque, valde asperis, postea inuncta eadem oleo, atque in anum ipsius mulieris vi inserta; cum vero aliqua portio ipsius caudæ, tres digitos, extra emineret, atque eandem Medici tentarent educere, pili inverli dehebantur in intestinum rectum, ut dolorem agra ferre non posset, cum vero medicamenta postmodum per os exhibuissent, speculumque immittunt, ut anum dilatarent, & educerent caudam, frustra fuerunt, adeo ut sex dies alvus illi suppressa fuerit, accedente vomitu, cum febre, & dolore omnium intestinorum; accitus vero, cum omnia prædicta intellexissem, arundinem longam duas, ut tres spithamas perforavi, in extremo lavigatam; deinde filo crasso extremum ipsius caudæ, extra anum prominens arte alligavi, atque immisso filo in cavitatem ejusdem arundinis, in podicem immisi, per quam filo attracto caudam eduxi, illa omni in intestino recto, ex quo statim maxima copia fecum effluxit, cum patientis levamine; postmodum injecto duos, aut tres dies lacte caprino, bis, terve per diem, atque sedato dolore, gravissimo certe, intudi vi vinum nigrum austerum ad corroborationem partis; quibus ex toto convaluit agra. Petrus De Marchetti in Sylloge observationum Chirurgical.

De Fistula in Ano.

Morbus per se patet, præcipue si instrumentis exploretur ulcus.

Indicationes sunt hæc: sanguinis fluxus si adsistendus, ulcus sordidum detergendum, carne replendum, per siccantia consolidandum, & cicatrix firma est procuranda: humorum acrimonia obtundenda, & corpus est renutriendum.

Quoad Viandum, comedat parvè, vescatur unico cibo, prunis, passulis; bibat cerevitiæ medicatam. Conveniunt quoque Emulsionis amygdalata, hordeata, Pasta regia, panis marcius, gelatinæ, lacticiæ, sed præcipue lac-

almy-

animum ad humorum acrimoniam temperandam.

Purgetur ter diebus alternis hoc modo.

℞. Calomelan. opt. præparat. gran. xv. vel. xx. diaprun. solutiv. ℥ij. gum. Arab. ℥j. fol. aut. numero 4. M. f. Bolus mane sumendus, superbibendo tantillum vin. alb. aut. cerevis. medicat., & postea jusculum. Sine ullo dolore operatur aut sanguinis nuxu.

Injiciantur Clysteres ex vulnerariis & lenientibus, ut sanguinis fluxus sistatur, ut in Capite Diarrhœa Dysenteria & Tenesmo describuntur.

Injectiones fiant primo anodynæ, dein detergentes, & denique attringentes & exsiccantes. Anodynæ supra in Cap. 3. de Tenesmo, &c. describuntur. Detergens sit talis.

℞. Rasur. guajac. ℥ij. rad. caryophyllat. ℥iij. aristol. rot. ℥j. fol. fani. ul. cul. prunel. vinc. pervinc. veronic. herb. Robert. pilosell. ana m. j. Coq. in aq. fabror. ferrar. ad ℥ij. adde sp. vin. ℥iij. mucilag. sem. psyll. & cydon. in aq. ros. & plantag. extract. ℥ij. tereb. Venet. ℥j. vitell. ovor. numero 2. M. f. Injectio. Addi quoque potest n. el. ros. aut Taplimel.

Taplimel, de quo hoc sermo est, nihil aliud est quam mel decoctis vulnerariis additum & despumatum, ubi basis est tapfus barbatus.

Injectio attringens sit talis.

℞. Sterc. asin. rec. m. ij. aq. ros. plantag. ana ℥iij. Infunde & decoq. interim. adde succ. plantag. ℥iij. syr. de papav. ℥ij. gum. Arab. in aq. spermat. ranar. solut. ℥ss. f. Injectio bis in die uturpand.

Aliquando addo phlegmat. alum. uncias aliquot, ol. myrrh. per deliqui ℥j. trochisc. alb. Rhaf. ℥ss. sacch. Saturn. ℥j. vitriol. Martis ℥ss. Aliquando facio ex calce viva ℥j. in aq. tabror. ferrar. ℥iij. vase æneo per hor. xij. mace. rat. unde sumo ℥ij. & mucilagine, ovi vitellos, &c. addo.

Aliquando compono ex aq. calcis & mercurio sublimat. simul committ & sacch. satur. edulcorat.

Conveniunt intus Diaphoretica viz. Hartmanni aut commune, cum pulveribus testaceis & terreis commilla, viz. ocul. can. magist. perlar. bezaor. orient. corali. &c.

Persistat in usu Decocti sudoriferi sequentis ad 10. 30. 40. dies plus minus pro ratione operationis & virium.

℞. Rasur. lign. sanct. rec. & resinof. sarlap. medullof. buxi ana ℥ij. rasur. quar. rec. rad. caryophyllat. ana ℥iij. rad. tapf. barbat. filipend. scrofular. maj. ana ℥j. rad. symphyt. maj. cortic. rad. ononid. ana ℥ss. rasur. corn. cerv. rec. dent. equimarin. ana ℥ss. persicar. maculat. m. ij. prunell. bugul. fani. ul. veron. utriusque, scabios. ana p. iij. flor. prunul. ver. p. viij. rosis. p. ij. Matracio indantur, & superaffunde aq. sequentis ad supereminet. iij. digitor. Digere in fimo equino per biduum. Cola pro iij. dos. matutin. provocetur sudor superpositis stragulis sine calore externo.

Aqua sudorifica talis est.

℞. Rad. perasit. rec. ℥iij. rad. bardan. ℥ij. ulmar. card. bened. calend. bened. ana m. viij. scord. m. vj. summit. anth. beton. ana m. iij. cort. citr. ℥vj. Incis. & contus. affund. cerevis.

fort. gallon. iij. macera in fimo per quatrduum, & vale duplici distilla ad usum.

Post quartum quemque sudorem repetatur bolus purgans cum mercurio.

Diebus sudorum, nisi fluat alvus, subducatur Enemate.

Postea) præcipue si tabis sit metus) deveniat ad ulum balnei ex aqua & lacte cum multo tapfo barbat. ad 4. 6. aut 8. dies semel in die.

Cerevisia medicata sit hujusmodi.

℞. Rasur. lign. sanct. ℥ii. sarlap. ℥vi. rad. symph. mai. ℥v. cort. rad. dulcamar. rad. caryophyll. hlic. foemin. scrofular. mai. filipend. tormentill. ana ℥iij. rasur. dentis equi marin. ebor. ana ℥iij. fol. rec. siccar. bugul. prunell. scabios. agrimon. pilosell. veronic. utriusque, fani. ul. ana m. ii. nuc. moschr. per frustra dissect. numero viij. cerevis. lupulat. fort. cong. xii. bulliant in parte cerevis. mox ubi retrixerint, reliquum addatur cum succ. cochlear. ℥iij. nasturt. becabung. ana ℥iij. pomor. redolent. rec. express. ℥vi. fermentatione peratâ lagenis lapideis indatur pro potu ordinario.

Ad fontem impurum occidendum utilissimum est Electuarium seq. in ejus usus diu persistat.

℞. Conserv. flor. papav. rhœad. ℥j. conserv. ros. rub. ℥ii. pulv. rad. symph. mai. ℥ss. rad. scrofular. filipend. rasur. dent. equi marin. ana ℥ii. magister. perlar. corall. lap. hæmat. præparat. ana ℥iij. sang. dragon. ℥ii. spod. ℥j. gum. Arab. ℥iij. syr. corall. q. s. f. Electuarium.

℞. Hujus ℥ii. terebinth. coctur. indurat. croc. martis corallin. ana ℥i. M. f. bolus mane sumendus, superbibendo haustum lactis asinini, & vesperi horis tribus à cœna. Addo aliquando battituram ferri vin. Hispanie. extinct. & in porphyrite lavigat. ad ℥iij. aut ℥ss. aut amplius pro re nata.

Eidem intentioni inservit Julapium hoc, quod post dosin Electuarii (vel aliâs) sumi potest.

℞. Flor. veton. rub. p. iij. papav. errat. p. ii. malv. rosez. p. iij. ros. rub. p. iij. aq. cichor. fumar. pomor. redolent. ana ℥ss. * aquæ e cordibus animalium ℥vi. sp. vitrioli q. s. ad gratiam; extrahet tincturam. Cola, & in ℥iv. colaturæ dissolve syr. de symph. ℥j. de pomis redolent. corall. ana ℥ss. M. f. Julapium bis in die sumend. Singul. dos. adde gum. Arabic. in aq. plantag. solut. ℥ss.

Juscula Medicata fieri possunt à rad. chin. rasur. ebor. dent. equi marin. corn. cerv. rad. scrofular. symph. filipend. sem. melon. passul. & herbis vulnerariis & attringent. ventre galli veteris inclul. & incoct. cum frusto carnis vitulinæ.

Hydromel quoque ex vulnerariis & ingredientibus cerevisiæ medicatæ parari potest.

Si adsit callositas, conveniunt pulveres cathartici, ut pulv. Vigonis, æruginis; immo stercus humanum siccatum, calcinatum, & pulverizat.

Si adsit caro fungosa, absunatur ad fundum alum. ust. Præcipitato per se aut cum alum. mist. pedetentim alterutrum pulverem augendo. ol. nrimon. unguent. Egyptiac. &c.

Balsumum ad ulcus detergendum tale sit, præcipue si adsit caro fungosa.

℥. Virid. æris depurat. & subtiliss. pulv. ℥i. vitriol. Hæliac. ℥ii. ol. abjet. lin. ana ℥iiii. tereb. Venet. gum. elem. ana ℥ii. liquefiant gum. mata cum ol. & adde virid. æ & vitriol. & digere super ciner. tepide per noctem, addendo not. antimon. mercur. alb. præcipit. ana ℥i. sal. Saturn. ℥ii. Mf. & limpidum a crasso separatur, Huic banamo addi potest balsam. sulphuris.

Ad omnia Ulcera putrida Pulvis lequens est præstantissimus.

℥. Mercuri præcipit. ℥i. vitriol. alb. alum. ult. ana ℥ß. eichnam facit profundam Aut ol. antimon. cum ol. papav. aut ros. com. nist. donec. itanno illitum id nigrescere non facit. exedit carnem putridam nullo vel saltem exiguo dolore.

Intestinum rectum pondere suo deorsum tendens cum dolore, sustentetur spongia molli cum idoneo iubilgaculo.

Post injectiones ne coacervetur purulenta materia, canulam interdiu gesserit, cui apprimatur spongia, ne aer subeat.

Sufficiens quoque exsiccans huiusmodi fieri potest post ulceris deterfionem.

℥. Mercur. ℥i. lap. pyrit. ℥vi. mastich. thur. sandarac. ana ℥iii. ladan. ℥iib. styrac. calamit. benzoin. ana ℥ii. gum. guajac. ℥ß. f. Alcohol & cum terebinth. Venet. q. s. f. Trochisci pond. ℥ii. Recipiat funum in sella perforata, dein per embolum in anum semel in die; pro euphoria continuetur. Addi potest gum. animæ, benzoin. &c.

Proiunt Aquæ Spadanæ: Aut si haberi non possunt, substituantur Vinum Chalybeatum vulnerarium lequens.

℥. Radu. lign. sanct. ℥iii cortic. ejusd. ℥iii. sarlap. ℥viii. rad. sic. symph. maj. scrotular. utriusque, nupend. capl. narbat. sanguinar. caryophyll. ana ℥iiii. fol. sic. prunel. bugul. verone. maris, virg. aur. hyperic. ana m. ii. androsen. equiset. pimpinell. agrimon. ana m. i. rasur. dent. equimarin. ℥ii. spod. corn. cerv. ad albed. ult. ana ℥iß. croc. Mart. aperient. ℥xv.

Imbibantur vin. albo generoso ad macerationem, dein ejusd. vini adde lbxxx. F. Vinum medicatum.

Si a vino nimis incalescat æger, diluatur doctis (viz ℥iiii.) cum aq. spadent. ℥ii.

Si fluxus non satis sit apertus, aperiatur turundis ex medulla sambuci, vel ex spongia carâ, glutine taurin. aut ichthyocolla imouta.

Si exulceretur ipsum intestinum rectum, & nullis cedat remediis, tandem ad excisionem deveniendum. Nam secundum Hippocratem, Rectum in testinum & secans & resecans, & confuens sive ligans, & urens, & putrefaciens, etiam hæc gravissima esse videantur, nihil læsas, *Tocodorus De Mayerne in Praxi Medica.*

De Ulceribus, & Fistulis Urethrae.

Oriuntur ulcera ex gonorrhœa Gallica, plurimum in extremo collo vesicæ, atque urethra; aliquando etiam ab humoribus calidis, acerbis, & corrodentibus, licet raro. Uicium autem colli vesicæ in perineo situm; eorum vero, quæ paulo intra ipsum, scroto: quandoque vero inter glandem, & penem delitescunt, in foveola scilicet illa, ubi glandis ortus. Hæc autem non ita facile sanantur, nisi ex toto gonorrhœa sublata: quæ enim ab aliis humoribus

oriuntur, emulsione seminum melonum decem, aut duodecim dies, sponte sunt sanabilia. Si itaque ex gonorrhœa ortum ducant, curanda hæc medicamentis accommodatis, ab omnibus propositis, luem spectantibus, decocto scilicet Guajaci, cum sudore, & huiusmodi. sanata gonorrhœa, ulceri incumbendum primo, nisi enim sanetur, caro ex ipso luxuriat, unde affectio, quæ sarcoma Græcis, vulgo carnositas, quam hancotomi corrolivis medicamentis atterunt. Hæc itaque ne succrescat, ulcera curo candelis quibuldam, compositis ex pulveribus plumbi uni, ceruiz, tuthiz præparatz, misti cum cera, in urethram immittendis, & detinendis diu noctuque, quæ, mergendi pruritu iocitante, educuntur; quibus solis hæc ulcera sano. Observandum tamen, non esse imponendas, fluente gonorrhœa, ne ab istidem suppressa, exulceret colum vesicæ, & alias partes proximas; atque, si malignitatis aliqua suspicio subit, eadem candela imbueni unguento ex cerula camphorato, nullo cum præcipitato pulverizato, abique ullo metu, ne hoc exulceret partes sanas; tum quia ex hoc unguento ex cerula, tum propria experientia duce, hoc scilicet non excoriare partes sanas sed tantum modo extinguere m. iam qualitatem ulcerum, quæ sublata, candelis supra dictis postmodum sanantur facillime: in quam rem uxor etiam aqua Aponitana, assumpta per os, ad decem libras, cum spiritu terebinthinæ, aut vitrioli decem, aut duodecim dies, quatuor horts ante prandium, quæ, urinæ me. tum perlabente, ejusdem vi exsiccante ulcera urethrae facillime consolidantur, quæ methodo quamplurima huiusmodi sanavi.

Et quia solent perforare urethram cum integumentis, aliquando in perineo, quandoque in scroto, ab illis, progressu temporis, fistulæ suboriuntur; quæ si in perineo, abiente gonorrhœa, pars callosa circa urethram, & partes adjacentes, inorenda fermento candente, quo caro illi accrescat; & ad cicatricem deducatur nitulr hac tamen lege, ne illa inuratur, atque fistula amplior fiat, nec urethra, pars spermatica amplius intauratur, & resarciatur, ut propterea sat futurum sit, eidem parti circum circa carnem inducere, quæ vice sit urethrae, ut cicatrice obduci possit medicamentis sarcoticis, & epuloticis jam dictis.

Observandum tamen, quod si pars interna urethrae non solidescit, oritur carunculam superius jam dictam; ac proinde in curatione harum fistularum, patienti caudalam ceream in eadem tempore gestandam, ne in callum omnia adhibeantur.

Si vero pars urethrae scroto opposita fistula laboraverit, urina ex ipsa effluens scrotum corrodit pluribus foraminibus; quæ curatio ardua admodum, & difficilis, licet felici successu eandem sæpius hac methodo tentaverim. Expiato prius corpore, & exhibito decocto Guajaci, cum sudore, fluxioni sistendæ, itatim accedo ad partem ipsam læsam, quæ si multiplex fuerit, omnes n. u. las seco; & per candelam propositam omnem operam in sananda urethra adhibeo; cum alia ratione fistulæ scroci non omnino sint sanabiles, nisi cura palliativa, quæ de novo recrudescunt. quod si non possit sanari urethra candela, scrotum secandum, usque ad illius fistulam, ipsaque inurenda, modo jam dicto, & carne sectæ partes opplendæ: ac tandem cicatrix inducenda medi-

camentis propositis. Contingit verò aliquando, quod in quibusdam obiervavi, ut scilicet pertusa urethra ex gonorrhœa, amplo foramine, urina profluat, & scrotum repleat, ad magnitudinem quandoque capitis pueri, dilatatis nempe partibus ejusdem, unde dolor, inflammatio insignis, ex qua tandem gangræna, & sphacelus; quorum causa, terramentis candentibus, & incidentibus pars ipsa, alienata, & emortua amputanda; quod aliquando obiervavi, scroto sphacelo corrupto, & extirpato, nudatos testes, foramine amplo in urethram patefacto; quod sanavi modo superius propolito, per candelam scilicet, & uisfarcoticorum; ac tandem epuloticis neque alia ratione vidi hujusmodi patientes sanatos. quæ licet ab aliis Medicis forte obiervata, propria tamen experientia confirmata, addere præter rem non existimavi. *Petrus De Marchensis in Sylloge observationum Chirurgicarum.*

Consultationes.

Pro illustri & nobili equite Simone merlino Forolintense Ulcere intestini recti fistuloso, & sinuoso partem externam natis sinistra vicinam apprehendente detento.

Sicuti perennis delidendi cupiditas in illustri, & nobili patiente affectus intestini recti ad finem est iudicium, ita & excretio portunculae ramenti intestinalis idem intestinum paulo supra laborare, præcipue vero secundum partem huiusmodi tuam noxa circa natem ejusdem lateris, tumor inquam, ac inflammatio quidam prægressa, tum immixta tenta, & in partem ea recepta demonstrant. Verum affectum præter naturam nullum alium esse, nisi ulcus, quod intestinum rectum ac partem externam natis sinistra, vicinam apprehendit, præter fidem oculatam, ichor sanior ad haviem inclinans, qui continuo effluit, satis superque suadet, quod & canum tunc ex tenta immixta, & affectu natis, item & fistulolum ex dururnitate illius, inique ichoris tenuioris emanatione. (nam a multis annis talem effluxionem cum pruritu intra, extraque anum passus est quæ indurata e regione ipsi ano semper infect) confirmari posse mihi videor videre; Atqui ulcus prædictum per totam intestini substantiam peruasit, orificiumque ulceris in eodem reperi intestino, ex vicina parte affecta facile suaderi potest.

Sed quid causæ sit quod dum mingit illustris patiens, ut plurimum egerat, ac antea intermingendum difficultatem persenserit, & cessare semper liquidas excreverit, non erit abs re cognovisse. Arbitro ego postremum ex humore acriori, & copiosiori tunc temporis ad intestina defluente, eorumque exultricem facultatem sollicitante, accidisse; difficultatem vero lotii in aliqualem compressionem ob tumesceniam partium affectarum velicæ proximarum factam, referendam esse censeo, atque tandem dejectionem tempore mictionis aliquando fieri puto, quia intestinum rectum secundum proprium musculum sphincterem male habens, facile in redditu urinae afficitur, ac velit, nolit, egressum fecum admittere cogitur.

Principia autem generationis ulceris propositi sunt proxima & remora, proxima in unius

materiæ acrioris copiosum affluxum referre non dubito materia namque acre acronem, copia vero linum, & cavitatem efficiere valet, & ubi diutius collues saniosa detinetur, callo, ac proinde fistula datur occasio.

Principia remota pertinent ad causas generantes materiam prædictam, & genitam non venientes, in serie illarum tum intemperiem jecoris teruidam, uti calor flammæ exentis jecoris toboies docet, tum errata in vita antea repono, in harum verò numero n. t. v. m. imbecillitatem partium ani, ob eandem laxitatem, & humiditatem, robur autem expultricis partium totius, præcipue vero jecoris pono.

Ut ex his unicuique facili sit intelligere, ad Medicum pro curatione instituend. attinere, ut ulcus illud fistulolum amoris impedimentis agglutinetur; ceterum cum impedimenta & propria, & communia existant, ratione illorum oportebit officium ampliare, detergere, & siccare, callum eximere, & quod est deperditum sarcoticis reparare, ratione horum, communum scilicet, humorum affluxum inhibere erit necesse.

Quæ opera ad felicem exitum perducere posse non dubito, tamen meo iudicio cum inguini difficultate, quia medicamenta opportuna promittuntur, aut saltem difficulter adnascuntur, & partem affectam undequaque non possunt attingere, parsque demum male habens sua natura imbecilla existit.

Sed an hæc facienda curatio meritis dubitari potest, nam ex una parte ætas patientis ultimæ (enim illustri eques septuagenarius) distantia loci affecti à partibus præcipuis, tandemque præservatio forsitan à gravioribus malis, quam homines mediis hisce ulceribus fistulosis ut plurimum sibi nanciscuntur, facili quævis persuadere possent, remedia pro peccata, & vera sanatione non esse tentanda; Ex altera verò parte, quoniam nobilis patiens viri us est valens, bene habitus, ac in ceteris sanus, & pius, quæ hujusmodi fistula multiplicatur, & concitata fluxione humorum inflammationem, dolorem, cruciatumque sibi insignes adiungunt, tuberculaque dura in intestinis occasione illarum laborantur, meritis quorum exitus tunc cum intercluditur, curatio absoluta videtur ex usu opportuna, & necessaria.

At ego in ea sum sententia, ut si veræ curationi sese dare voluerit vir illustris, quod possit utique curari, sin minus, Medicus in id incumbat oportet, ut præservetur, quæ amputatis vel saltem resectis capitis remotis, ulcereque continuo deterfo, exiccatoque malum non augeatur, sed potius reprimatur, quem curandi modum, tametsi fictum, & palliatum, gravissimum nihilominus viri insequuntur.

Deveniens ergo ad præsidiorum materias, & primum chirurgicas, statuo curationem ab aliqua sanguinis n. u. sione per sectam venam auspiciandam esse, vena ideo in cubito, vel in manu secunda seligatur, sanguis enim in toto redundat, robur virium adest, & corporis habitus ad crassum inclinatur, deinde cauteria in brachio sinistro aut femore dextro, secundum partem domesticam inusta, sicuti & perennes frictiones, deligationes, ventosationesque partium superiorum mihi summo pure probantur, apertioem vero loci ab experto chirurgo, medicamentis non conferentibus, non improbo.

Post

Postmodum ad pharmacia, primum comuni, dein priuata deuenio, quæ de communibus sit semper, pro lenienda aut syrupum rolatum solutiuum, ac de polipodio, pro humoribus concoquendis, decoctum cicoreaceorum, boraginis, betonicæ, ac psilliatum cum suis syrupis; pro purgatione in finem Rhi barbari, Agarici, & senæ, cum manna etiam, atque etiam laudo: Quinquo & cataplasma de tribus cum Rhabbarbo, tempore vero calidiori decoctum, insuamque in robolanoium curmorum, chebulorum, & indorum ex sero lactis paratum, interuallis quousque assumpta prolutura propono; Vomitu quoque, si patiens ad eum a natura pronus fuerit, semel in mense habitum a cibo non vitupero. Verum & de medicamentis insensibiliter euacuantibus, primum purgatione est cogitandum, decoctum idcirco guaraci, & sulfæ cum china, & sandalis erit in usus, & si sudor, modeste tamen, & placide promouebitur, tanto efficacius redietur medicamentum; Vrinæ quoque medicamenta, non vera (nam vera eorum nungis accendunt) huc referenda, quæ inter alia nihil tum terrena frigida, tum serum lacis distillatum, adiectione lactis seminum uel elonum copiose bitum tempore opportuno mihi maxime attrident, verum & ab oxymelle dilutione ex decocto radicis apij recentis, capillorum veneris, scopolendrii, & eritroidis non abhorreo.

Denum de particularibus pharmaciis cogitandum, quæ si referantur ad se oris interperiem, præter aliqua ex urinalibus dictis, iucum quoque cicoreaceorum non solum assumptum, sed in irrigationis hypochondrio dextro uel cum aceto, & puluere sandalorum adhibitur, sicuti & confectio rosarum cum speciebus confectiois ex tribus sandalis uinum continuum non improbo; Quod si medicamenta hæc ad ulcus attineant non solum a qualitate manifesta, sed & a proprietate quedam agere solent, quæ a proprietate, quo uult, primum est pulvis radicis gentianæ, vel aristoiocliæ ex uino epotus, alterum est pulvis ranarum adhibitus. verum & quibuidam radix hellebori nigri in fistula tribus diebus diuisa, item & elaterium cerebintia ex ceptum radique cucurbitis alijni summis laudibus extolluntur. Sed quæ a qualitate nota operantur, sunt detergentia, siccantia, callum absumptia, & agglutinantia; Atqui oriticium dilatandum turunda vel ex gentiana, vel sponte confecta, deinde ad medicamenta prioris ordinis deueniendum, sunt autem thermæ sulfuginosæ, inter quas, velut omnium regina est aqua Tettueci vocata, quæ non solum in potu per tres vel quattuor dies ante decoctum guaraci assumpta, sed & iniecta ac per modum semicupij usurpata plurimum valet; succus quoque apij cum uino Mulso decoctionis hordei, myrrhæ & aloes iniectus, est accommodatus, ac pro callo eximendo nil præstantius unquam succo herbæ Reginz cum Ammoniacæ aceto dilutis, & iniectis, sed quod omnibus præferendum, est nugentum Aegyptiacum fixum dilutum, à quo uero usu, si pars nimium irritetur, iniiciatur sesum lactis, vel ipsum lac asinum, & si ex voto callus auferetur, ad sarcoticorum usum accedendum, quæ erunt unguentum isidis, vel decurtia uino Mulso diluta; item & succus pumellæ, virgæ aureæ, & Gencaurii minoris, om-

nia iniecta. Proagglutinatione fiat iniectio ex uino nigro aulero decoctionis plantaginis, rubi, malicorii, hypochoeridis, & acaciæ, huc referendum oxellum Galeni, & uerum arabicum.

Victus his omnibus undequaque commodens inungatur, qui erit nobilis patiens uiscatur bonis cibis, & abstineat a salis, aguilibus, aronitis, & tucenis, edus farinæ, subactis, piscibus palationis; atque his quibus aer toris, & cessis oris natura, bibat uinum subrubrum subactum, guaiato, ac sandalis uel edicatum, tempore autem decocti instituat victus leniartemans, & uinum interdicitur, reliqua his ipsis respondeant, Deusque O M. laxit, ut cedant in salutem illultris, & nobilis Equitis. *Julius Delar. Chaudinus in Consultationibus Medis.*

De Ulcere fistuloso Ani. Pro Nobili

Patiente

Quod morbi vel diligentissime curati, aut non sanantur, aut agre sileant, modo ob ipsorum contingit pertinaciam, modo ob ægrorum, aut medicorum frequentes errores, modo utriusque ob causam præterit præteriti contigisse obseruo. Suorum enim nobili huius patientis tribus ab anno annis ulcus fistulosum in ano, cuius ratione frequentem penus est, & patitur deiciendi uoluntatem, doloremque, & gravitatem circa podicem; Neque hactenus ab affectu proposito liberari potuit, uariis nec remediis præsidis administratis, & duplicem ob causam, primo quidem ob incuriam cum ipsiusmet ægri incompolite uiuentis, & affectum ipsum aliquandiu iperuentis, tum medicorum, vel potius circumtorancorum quorundam, qui generosis cathartici humorum colluuiem a toto ad partem, & attraxerunt; tum & ob ipsiusmet affectus pertinaciam. Sicuti enim facillime suboritur ulcera fistulosa circa anum, ob innatam illarum partium molliem, laxitatem, & humiditatem: ita genita ægre admodum sanantur, ob continuam ad ipsas fluxionem, & difficilem localium parti affectu adhesionem, cum præsertim ulcera hæc veterauerint, & dolorifica, putrida, depascentia, intemperata, & tabe Gallica inquinata fuerint, cuius naturæ esse ulcus hoc ualde suspicor. Hoc etenim sicuti originem duxit à fluxu, salaque pituita, genita ob incompositam uiuendi normam, & ad prædictas partes, tanquam imbecilliores a tribus annis decumbente: ita fouetur a continua fluxione a cerebro humido, uentriculo imbecilliori, & jecore præcalido, ratione intemperie ipsius. Quod cotinuat quinetiam factum est, ob uolentiam Gallicam, & alias prauas qualitates propositas: cum præsertim decoctas egerit radices, ut non immerito suspicari liceat propagatum esse in uarios sinus, atque in intestinum ipsum penetrasse. Quæ de re certiores erimus, si digito in podicem immisso stylum in ulcus demersum perciperimus; vel si fistiles per aluum, & materia faculenta, & foetida per ulcus effluere obseruabitur; atque hinc febricula illa lenta, quæ hebdomadas, & menses conficitur, originem ducere potuit, uaporibus scilicet putridis iugiter ad cor eleuatis ab ulcere hoc putrido; quæ inualefcit, dum egeruntur faeces duræ, cum rigore, iisdem præterlabenti-

bus partem exulceratam exquisito sensu prædictam, atque calore, accensis spiritibus, ratione doloris, hincque tandem carnis excrefcentiæ, ex sanguine illo vitioso genitæ; ut propterea ulcus propositum omnium malorum, sit tons. & origo, quo non obducto, nec alii affectus cedent.

Hoc autem consequi difficillimum censeo, ne dicam impossibile, si præsertim pertingat ad intestinum ipsum. Non ob id tamen medicis præfidiis supersedendum censeo, quib. saltem ipsius incrementum coercetur, metu aliquin febris fixæ, quæ ad tabem, & mortem nobilem nostrum patientem tandem deducat: cui nunc satis vires constant, generosis remediis pares. Neque hæc fistulas enim ex illarum censu est, de quibus verba fecit Hippoc. 3. in 6. Epid. 39. dum prodidit, tales fistulas aliquando humores superuenos purgando præseruare à graui ribumalis, propterea non curandas. I hæc enim sunt fistulæ callosæ, sine dolore non depauescentes; hæc vero est dolorifica, ideo non callosa, depauescens & dyssepulota, cacoethes, & maligna.

Ipsi autem curatio absoluetur exsiccatione ulceris. Quod neri non potest, nisi sublatis impedimentis, quæ in casu præsentis sunt quatuor. Primo fluxio perennis, quæ est auertenda, & alexipharmacis extinguendum inquinamentum. Secundo intemperies calida & humida refrigerantibus, & exsiccantibus remouenda. Tertio sinus, qui aperiendus, si fieri potest, vel saltem laxandus. Atque demum detergendum, & exsiccandum est excrementum crassum, & tenue in parte exulcerata.

Ut prædictis indicationibus satisfiat, præmittenda est diligens totius corporis euacuatio, cum educatione sanguinis, tum ex jecoraria dextra, tum ex saphena sinistra, accedente simplici, ac repetita humorum vitiosorum præparatione, & purgatione, atque inuisione facia duorum fonticulorum dextro femori, & sinistro brachio, exhibita triduum Aqua Tetturina, cum syr. ros. Placet quintam repetitus usus blandi decocti ex ligno Inaico, sarsaparilla, & santalis, cum cephalicis, & aliis quæ hypochondriorum rugitus, & tensiones spectent: à cuius usu 40. dierum spatio, cum blando sudore, commendatur usus Lactis caprili, tanquam detergentis, refrigerantis, & agglutinantis, 20. dies circiter cum octo, aut decem guttulis olei ex ligni Indico; ac tertio ex usu erit aqua B. Virginis, refrigerans, detergens, & exsiccans: vel ipsius loco aqua Villensis in agro Lucensi. Atque hæc de internis. Externa topica varia sint, pro sinuum varia conditione, in magnitudine, & profunditate. Si enim admodum alte descendant, cultro falcato angusto sunt aperiendi; profundiorem vero turunda laxandi, blandisque erodentibus atterendus levis quidam callus in superficie, non enim censeo totum sinum occalluisse, alioquin non esset dolorificus. His peractis, exsiccandum est ulcus, non omissa ipsius deterfione. In quem usum maxime polleat aqua nostræ Thermæ, in primis Montis agrotorum. Per alexipharmaca deinde ipsi ulceri occurrendum. Tandem ad maiorem exsiccationem, & roborationem partis, balsamum occidentale opportunissimum censeo, præter alia leuiora cuiuslibet in arteuersato notissima, breuitatis propterea

gratia prætermittenda. Atque hæc potissima pro præsentis affectus curatione proponenda duxi. *Benedictus Silvaticus Consiliter. & Respons. Medic. Centur. 3.*

*De Flcere Ani. Pro Nobili Matrona
Cremonensi.*

Vigesimus nunc agitur mensis, cum Nobilissima Matrona annorum 17. ulcus patitur in tota interna parte intestini recti, subortum forsitan ex acri materia biliosa in secore feruido genita, & à toto corpore ad intestina, tanquam ad sentinam, tunc temporis transmissa, quando diarrhæa biliosa laborauit, non sine confluxu pituitæ falsæ, absque vili suspitione alterius corruptionis viuentis. Ulcus hoc nunc callosum factum est, propter materiam crassam porositatibus partis affectæ insitum est sordidum, ob defectum caloris natiui, atque dyssepuloton, ac difficilis sanationis, ob ingentem affluxum materiæ pituitosæ, biliosæ, & atrabilis à ventriculo, iccore, & toto corpore ad partem affectam; cacoethes quæntiam, propter intemperiem humidam partis affectæ, cuius indicium euident caro circa eandem inæqualiter excrefens. Est dolorificum aliquando, cum propter decubitus prædictæ materiæ, tum propter violentam fecum excretionem, fistulosum fortasse, cum supràdictæ partes facile sinuosis ulceribus sint opportuna, propter continuam earum humiditatem.

Difficillima propterea curationis, ut mirum videri non debeat, si usu tot medicorum præfidiarum ex methodi lege propositorum non cesserit. Non ob id tamen in iis supersedendum est, quorum beneficio speramus fore, ut aliquo saltem temporis Nobilissima patiens pristinae sanitati restitatur.

Quoad ut fiat, præmissa uniuersali totius curæ, reuellentibus deriuantibus, & euacuantibus sistenda est fluxio, & materia fluxa euacuanda, ulcus detergendum, valide exsiccandum, & cicatrice obducendum, administratis interim iecur refrigerantibus, & calidum innatum partis affectæ fouentibus. Quæ præstebuntur remediis Chirurgicis, Pharmaceuticis, & Dieteticis.

Pro totius itaque euacuatione, præscribatur leniens paratum ex mell. & syr. ros. sol. cum manna electa; vel ex electuario lentiuo, & manno, cum pulpa tamarindorum. Sanguis interim educatur ex vena interna utriusque brachii, longe à menstruis purgationibus: mox sub illorum tempus, ex saphena. Præparentur humores syr. de succo borraginis, & oxymel. simplici, cum decoctione cichoris, sonchi, hepaticæ, borraginis, agrimonie, & seminum citri; ac deinde purgentur rhab. senna, & agarico infusis in decoct. cord. adhibito syr. de polyp. compos. ros. solut. & manna Repetatur deinde prædictorum humorum præparatio syr. de sumaria compos. de cichorio cum rhabar. & oxymel. compos. additis aquis beten. sumaria, lupulorum, & cichoris: alteriusque diebus prædictarum aquarum loco, addatur unc. ris decoct. epithymi Mes. & facta humorum præparatione, reperatur purgatio medicamento jam præscripto, vel huius generis. Vandiore namque traherent humores ad partem affectam. Interim inu-

tur fonticulus brachio sinistro, ad maiore revulsionem, & detersionem cum materia fluentis tum fluxu, & in parte ulcerata contenta. Exhibetur aqua Tetrutiana quatuor aut quinque dies quolibet mane, ad libras quatuor, cum unc. iij. mel. ros. sol. A quibus ex usu erit decoctum radicis chinæ, salsa parilla, & lantatorum citrinorum, additis hordeo, & cichoraceis, 40. dierum spatio, excitato sudore cum doliosis lixivis feruido plenis semel in die: victu modice tenui præscripto, vino oligophori potui concessio. His internis accedant externa localia, & quæ clysterum, & suppositoriorum ope partem affectam attingunt: atque adeo apprimè convenient clysteres ex aqua Tetrutiana, cum melle ros. vel etiam ex muria, ad maiorem detersionem, tum ex vino rubro, cum pulvere tutillæ, sabarum, hordei, & thuris. Turunda parentur ex terebinthin, Cypria, & melle, cum ciner. quercus, chalcitide, olivæ ipsis, & aristolochia rotunda. Omnium tamen maxime usui erunt aquæ Thermales montis ægrotorum, utpote quarum vis præfens ad ulcera antiqua, admittatur per clysteres, vel infusus forma: in istis tertia tamen quaque die oblini poterit pars affecta sevo hircino, atque ex ipso turunda parata commendanda in ano, ad emolliendum callum, qui deinde atteretur detersoriis validioribus. Quæ si frustra fuerint, deueniendum erit ad ignem, parata cannula undique ferrea pertusa, in podicem inferenda, in quam deinde immittatur ferrum candens, idque ter, & quater in die: nullum enim præstantius, & tutius remedium in ulceribus antiquis putridis intestini recti expertus unquam fui. Aquis Thermalibus propositis, injiciendis addentur aloë, thus, & larcacollu, ad maiorem exsiccationem: tandemque applicentur sarcotica, ut betonica, matricaria, plantago, & ossicremata, cum vino. Ad compescendum autem lecoris feruorem absque ventriculi noxa, conferet aquarum Thermalium frigidarum internus usus, decem aut 2. dies, cum diureticis, quo ad urina vias perducantur.

Quibus addatur congrua victus ratio prædictis proportionem respondens. Ita namque spero fore, ut pristinam sanitatem consequatur Nobilis Matrona. *Idem ibidem.*

De Fistula antiqua, & Condylomatibus, cum febre. Pro Nob. Florentino.

Tot, & adeo refractarii sunt affectus Nobil. patientem diuexantes, ut nec ipsius Apollinis manu debellari possint; ex fide Virorum Præclarissimorum, qui ad nos scripserunt, ut propterea medica exposcant præsidia, non prohuius salute, sed pro vita saltem prorogatione. Fistula namque antiqua in podice sunt semper curatissimi illis, ob laxitatem & humiditatem insignem partis affectæ, continuamque excrementorum colluviem; magis vero profunda; sordida, verminosa, & tabo Gallico infecta; deteriores autem, & magis rebelles, quando perforant intestinum, ita ut feces transmittat per ulcus: licet tamen vita in longum protrahatur. Auenzoaris testimonio inter Arabes, & Mathen de Gradi inter Latinos, historiam referentis Medici Ticinensis de Filibertis, qui feces per ulcus excreuit annos viginti continuos. Quod si ulceri

a aliquo, fistuloso, profundo, cacoethi, venenoso, & Gallico accedant condylomata, siue carnis excrecentia, longis incurabili, produunt affectum, ob confluxum sanguinis vitiosi, & melicholici; quem sane in Nobili iuvene prædiximus, conuincere facile est ex descripto eius temperamento. Quando vero decennio tere integro variis medicis præsidis rite, & ex lege præscriptis cum assumptis, tum applicatis, non solum non cessat affectus, sed in dies magis invadit, vesica collum erigens, ita ut facies, & ventris sciepitus cum lotio excernatur: quo prius modo id a Ferneto prædictum est 6. de Partium morbis & sympt. Cap. ii. vel saltem urina crassa, fetida, & saniosa sunt conspicua, cum ipsius ossis sacri aliqua labe, atque os mani circumponatur partium, qui locus quæso fuerit ullis medicis prædixis? Accedente vero his omnibus febre hectica, tabida, marasmodi, cum grandi corporis macie, ut ossa sola cute tecta videantur, virilique adeo prostratis, ut semper decumbere cogatur, quæ spes eluceat de vita proroganda? Quinimo præfens impendit metus, ne adventante ætate, deteriora nant omnia, viribusque collapsis, succumbat tandem patienti; ut propterea vix in promptu mihi sit, quæ vita quidquam eius prorogeretur, quod a Viris doctis, & in arte veratissimis hactenus non fuerit præscriptum.

Quare si curam operi laudo quoad partem affectam, frequentem ulcerum detersionem, modo aqua Tetrutiana, & melle, modo vino in quo ebullierint scordium, matricaria, lupini, & sabæ; omittis causticis, vndioribusque detersoriis; ita non inconsultum cenleo eam roborare ferro candente per cannulam ferream longiorem à latere undique pertusam, intra podicem semel ac iterum aliquis diebus applicato. Hoc enim unico remedio vidi humilas Gallicas, putridas, & altas nuntios, nuntios, absque ulla noxa durasse, nondum tamen ad has calamitates perductas. Ratione autem febris, si vires ferent, ex re erit consilio marasmodum torridum in senilem mutare, per refrigerationem corporis balneo aquæ dulcis, adimittendo ex Gal. præcepto in Methodo medendi. Et quanquam alias non admodum protulerit decoctum radicis chinæ, atque hac non fuerit adeo familiare naturæ ipsius: utrumque nihilominus iterum præscribendum existimarem. Omnia enim secundum rationem facienti, licet non succedant rationem, non est ad alia transgredendum, stante eo quod à principio visum est, ex Hippoc. decreto. Quod licet locum habeat in curativis intentionibus, non autem in materiis remedium: attamen in casu præfenti etiam istis præsidis medicis utramque alteratis insisterem, atque aliquot dies decoctum radicis chinæ repererem, cum carne porcelli, ramis, & caudis cancrorum paratum: ita tamen ut in ipso deinde fiat contusum pulpæ caponis nutriti carne viperina. Sic namque medicamentum alimentosum. Quod si in ipso dissolvatur scrupulus magisterii perlarum, vires quinetiam magis instaurabitur: exhibito deinde cibo modica quantitate, facili coctionis, & laudabilis substantiæ; cuiusmodi erunt ova tremula expressum vel contusum perdicum, testes gallorum juniorum, gela ex carne caponis, cum succo citri; & morcelli

ex pistaciis, nucleis pineis, amygdalis dulcibus, pulpa perdiciis, & nucis Indicæ, cum saccharo. & aquæ ex d. citri. cum quibus animumet aliqua idò unum vel alterum cochlear aquæ vitæ ad mitaurandas vires iam collapsas, a Quercetino descriptæ in sua Pharmacopœa Restituta. Post usum autem prædicti decocti aliquot dies, lac præscribetur, primo arte paratum ex nucleis pineis pistaciis, amygdalis, & seminibus melonum, in iure pinguis caponis, cum saccharo: tandem vero & naturale, idque asininum, si muliebris non fuerit copia, ex mammillis exsuctum, aut cum modico saccharo, & buccella panis, ubi primum emulsum fuerit, dummodo venter flatibus non obmurmuret. Quod si redundant, cum aliqua imbecillitate ventriculi, præmitti potest stillicidium supra eius fundum ex oleo absinthie, amygd. amararum, chamamelino, & mastich. cum vino albo generoso ad penetrationem; multo deinde tote abdomine summitate purpuræ prædictis oleis inbutæ; ac deinde lac vel humanum ex ubere, vel asininum, cum quarta parte mellis Hispani, loco sacchari, ex Gal. decreto 7. Meth. medendi præscribetur ad uncias quatuor, vel quinque ad summum singulis matutinis horis in aurora, præmissa parca cœni, quo ventriculus vacuus sit; atque ita quatuor vel quinque dies periculum fiet eius tolerantia. Quod si nullam noxam inde capiet, & facile feret, continuandus erit usus ipsius aliquot hebdomadas; non omiſſa interim totius corporisunctione oleo amygdal. dulcium, facta blanda frictione ad reuocandum sanguinem, & retardandam corporis exsiccationem. Et hæc adnotanda duxi Virorum præclarissimum mandatis obsecundans potius, quam ut magni fore usus sperem. *Idem ibidem.*

De Ulcere antiquo Intestini recti. Pro Illustriss. Equite Massæo Ferrariensi.

Rogatus ab Illustrissimo Marchione Pio sententiam de Chirurgica operatione, pro salute Illustrissimi Equitis Massæi inueterato recti intestini ulcere laborantis, proposita, intestini nempe eiusdem extractione, atque unctione, inspicari sane non possum, a Chirurgis celeberrimis solertia, & usu, nonnunquam præstari quædam miraculis perquam similia: que nadinolum & legi ab ipsis ex dorso è regione renis tentatam ipsius cum extractione calculi, patientisque salute, sectionem, rem profecto longe difficillimam. Quare & operationem propositam quod attinet, illam eorum peritæ lubens committo: quam tamen & periculi plenam esse, & male cessuram existimo. Tamen enim non ignorem, intestinum rectum partem esse, quæ loco dimoueri, & foras prolabi possit: quod pueris non raro accidit, ob laxatos humiditate musculos, nonnunquam & nimis maiore parturitibus, atque idcirco lubens fatear validioribus emollientibus, aptisque instrumentis intestinum id à Chirurgo extrahi, detergeri ulcus, urique posse: cum tamen semel dumtaxat, & admodum igne subsequi haudquaquam possit, utque adeo curatu difficilis, inueterati scilicet, sordidi, profundique sanatio, Chirurgia hæc quid allatura sit emolumenti non video. Fortis certe relictum intestinum longe maximum subibit gangræne periculum. Eodem vero mox

ab unctione intro reducto, quid aliud sperandum, quam elichara recedente, it. tu ulceris pristino simillimis? Neque enim de sectione hic cogitandum. Etto tamen (quod impossibile ego quidem iudico) sicari ulcus hoc, sanarique modo prædicto possit, non poterunt certe non superesse continue ab intestini proidentia molestiæ. Neque enim quamvis exticcato, ac cicatrice obducto ulcere, tanta unquam esse poterit laxatarum partium corroboratio, ut continuum intestini prolapsum prohibere possit, ni id ipsum continue globulo idoneo, fasciæque competente coerceatur. Hæc mea super ea re sententia. *Idem ibidem.*

De Ulcere fistuloso in podice: Pro Illustriss. D. Georgio Nani.

Affectum Illustrissimi D. Georgii, etsi minus mihi, quam Viris illis Excellentissimis, qui ad ipsum Venetiis diutius continue inuaserunt, cognoscere licuit, Excellentia tamen tua Illustrissimæ geram morem, quæque mea sit de mali huius natura; eiusque futuro successu sententia paucis aperiā. Malum ego hoc ex ulcerum esse genere indubitanter pronuncio; quod & a paucis, in mensibus eram suspicatus: argumento fuerat exeuntis materiæ qualitas. Neque enim id quod effluere solet, simplex pituita est, sed materia quædam cum modica plerumque sanguinis portione permixta. Sed neque ex venis hæmorrhoidalibus, ut censent, manat hic sanguis. Eset enim & copiosus, & floridus, & a qualibet materia seiunctus, fluereque vel ad mediocrem conatum semper, & à paribus ano circumpositis emanaret. His autem omnibus nonditionibus sanguinem, de quo nobis sermo, videmus destitutum. Etenim neque multus is unquam est, neque expers putredinis, neque a reliqua materia separatus: sed & lotis aqua thermalis illis partibus, eius sistitur fluxio; atque ab altiore loco eundem profluere ipsi nos cum speculi beneficio explorauimus, tum stylo argenteo gossypio inuolutò altius immisso, neque sine sanie extracto. Accedit, quod, quæ speculo adhibito videri potuere partes, viderimus nec absque carne superflua exulceratas. Verum non unico ulcere constat malum hoc. Videre enim mox ulcus est in ani extremo sub ipsis hæmorrhoidibus; in ipso dein progressu ex coriatio multa speculi beneficio detegitur, non sine metu ne aliud intus delitescat, quod aut speculo, aut etiam stylo deprehendi non possit. Materie enim exeuntis & copia est maior, & terminus à quo, quod partem altior, quam ut uniuersam ab his, quæ videri possunt, ulceribus pronanare statuamus. Quare cum neque alicuius morbi ad sit dolor, internum quandam adesse fistulam non leui suspitione adducor, tamen hac de re Excellentiam tuam Illustrissimam certam reddere non possum.

Ut sit, non leue sane est hoc malum, cum quod partim sit hæreditarium, quod imbecilli, humidoque natura sit loco, atque inueteratum; tum etiam quod continue ab prauorum iniurioso corpore humorum affluxu foueatur. Quapropter & quid boni augurari possim non video. Neque enim facile crediderim eam fore Illustrissimi Domini Georgii patientiam, quam diuturni adeo,

adeo, atque pertinacis mali curatio exposcat: quinimo pronuntiare ausim, nunc eius affectum eodem, quo Illustrissimi Domini Antonii eius parentis, successu huiendum. Quod tamen prognosticon haud dimiteor ulque adeo ratum esse, quin sperare liceat tunc, ut Illustrissimus patiens diuturno usu praediorum, victusque praescripta ratione, sanitati tandem aliquando restituatur, quam eidem à propotente Deo toto animo exopto precor. *Idem ibid. m.*

De Fistula Ani. Pro Nobilibi Polono

Ea est affectum pertinacia, qui à decennio Nobilissimum patientem exercent, ut de ipsis sanandis nulla amulgeat spes; adstipulantibus etiam Viris doctissimis, qui ad nos scripserunt, adeo ut medica solummodo admittant praesidia, quorum ope vita saltem longius protrahi possit. Fistula liquidem antiqua, ansemper sunt difficiles, ob fluxionem, imbecillitatemque partis affectu difficilius sanantur, quando sunt fordidæ, profundæ, & venenolæ, virulentæ Gallicæ participes: potissimum vero, quum perforant intestinum, ita ut feces ex uere efflaunt; cum quo tamen affectu vitam longius prorogari posse, prodidit Auenzoar. & Mathæus de Gradis qui refert historiam medici cuiusdam de Fanoertis Papiensis, qui intestino perforato, & facibus per ulcus erumpentibus vitam traxit viginti, & plures annos. Quinimo, intestinis perforatis, & ventre ipso, adeo ut feces illac transmittantur vivere ægros, prodidit Auic. Prim. 4. Fen. 6. tract. 1. cap. 1. Neque lethalis omnino esse solet fistula, licet velicam exulceret us, ut succedat intus sacum, & puris, eripitque per pudendum, testimonio Fernelii Lib. 6. de Peritum morbis, & symptomatibus Cap. 11. Quod si ulceri antiquo, putrido, sinuoso, Gallico, intestini perforanti accedant carnes excrecentiæ, seu condylomata, longe magis inutabilem exhibent affectum, ob contumacem sanguinis vitiosis, & melancholici quem sine in nobili patiente præpollere conicere est ex eiusdem temperamento. Verum quum toto fere decennio variis medicis prædicis præsiidiis, cum internis, tum externis non solum cessarent affectus prædicti, quin potius in dies magis conualuerat, quibus accessit febris hæctica, tabilis, & varia modes, cum corporis macie adeo gravi, ut vasa pelle obducta superfuerint, viresque adeo prostræ ut continuo sit ipsi decumbendus, non modo valetudinis adipiscendæ, sed neque longioris vitæ alicui spei locus est quin potius statuendum ne sub ætatem in deterius omnia labantur, viresque iam collapsæ tandem fatiscant: ut propterea vix mihi super sit quod iis addam, quæ a Viris doctissimis fuerunt hæctenus viua parata ad vitam longius saltem producendam.

Quare sicuti laudo summo opere frequentem ulcerum detersionem, modo aqua Tetutiana, modo vino a bo in quo ebullierunt matrisylva, lupini, ad luto modico melle; omnis omnibus causticis, & validioribus detergentibus: ita non inconsultum censeo exsiccare validius, & corroborare partem illam affectam ferro candente, per cannulam ferream pertusam ad latera intra podicem iterum ac tertium in die inserto,

nec diutius detento. Ratione vero febris marasmodis, si ferant vires, consultum esset ex Galeni consilio curare ut marasmus torridus in senilem facessat, refrigerato, & humectato corpore balneo aquæ dulcis, ex Galeni præscripto administrato in lib. methodi medendi. Et quamquam alias non magno fuerit usui decoctum radicis chinæ; atque lac natura auersatus fuerit: utrumque nihilominus iterum tentandum existimarem, exhibito decocto radicis chinæ quindecim dies circiter, parato cum carne suillarenti, ranis, & cancrorum candis; in quo deinde fiat contusum carnis caponis, nutriti carne viperina. ita namque fiet medicamentosum. Quod bis in die exhiberi poterit, interposito paucio cibo mediocris quantitatis, & facilis concoctionis, puta ouis sorbilibus, pullis Indicis, vel testiculis gallorum, aut gelu ex carne caponis, cum succo citri: moriellis etiam ex pistaciis, nucleis pineis, amygdalis dulcibus, carne caponis, & pulpa nucis Indicæ; à quo lac ipsum erit accommodatissimum, primo quidem arte partum, aliquot dies, ex emulsione seminum frigidorum majorum, nucleis pineis, pistaciis, & amygdalis dulcibus, in quo dissoluatur scrup. sem. magistris perlarum; deinde & naturale asininum, cum modico saccharo, & mica panis, ad uncias quatuor circiter: nisi antea ex usu visum fuerit Viris præclarissimis pelliculum facere lactis muliebris ex ubere exlucti. In quorum usu cura parcissima sit, quo usus lactis tempore ventriculus sit ieiunus *Idem ibidem.*

De Fistula lachrymali quamvis supra capite de Aeglope fuisse satis egerimus, per placet tamen hic rursus adducere ejusdem historiam satis raram, ac primò responsionem, quam dedi informationi parum accurata mihi super hac re transmissa, cui subnectam morbi integra historia qualem scilicet habui postquam Nobilissimam Aegram, Lanjannam hac de causâ profectus, advi.

Ex iis omnibus quæ per epistolam ad me transmissam significata sunt satis agnosco Fistula Lachrymali affligi Nobilissimam Matronam, at non itidem constat, an iminentiæ omnis jam facta sit experts, sicque fistulam quam Chyrurgi Galli *Fistule plaire* vocant constituat, & an omni prorsus carie os subiectum careat, nam etiam si specillò exploratoriò adnotata non sit, non inde tamen concludendum nullam adesse, siquidem specillum commodè ac pro arbitrio non movetur ac volvitur hisce in partibus delicatioribus, nec caries ita incisionibus peractis semper subiacet quin multi sinus arctiores ac variè contorti sæpius ad eam difficili deducunt via. Suppono interim Medicos ac Chirurgos in hanc explorationem adhibitos nihil quod exquisitioris accuratationis sit omisisse, & ea propter tantum novam meditari aptationem, quod per viam sibi primò loco paratam ad morbi penitiores penetrare radices non detur: Verùm liceat mihi opponere, 1. quod si fistula de qua agitur omnis prorsus eminentiæ sit experts vix concedatur distinguere quò demum incidenda veniat locò, pro cura perficienda; quodque

etiam si fistula pus multum eructaret, elevationemque satis sensibilem præberet, unde innotesceret subjecta cavitas, attendendum foret an ne cum Domina Aëgra junior sit fistula eo loco ponatur, in quo, carie absente, commodum fuerit deligationem compressivam adhibere, sicque curam, quam non semel expertus sum, peragere. 2. Videndum si fistula ejus fuerit conditionis quæ incisionem necessario exquirat quæ in ipsius deveniatur fundum, fungositatque ossi adnatæ illius cariem obregentes remediis absumantur, videndum inquam, quis locus operationi esse debent, quo scilicet fructuosior, quam prius celebrata, evadat, quod non levis est difficultatis, dum interim errores in hoc commissi, incisiones sæpius multiplicare cogunt & vultum omnino deformant, sic aliquando vidi a Chirurgo, quamvis petito, totam prope oculi, circumferentiam ferro violatam, quia dum caries in ipso oculi angulo partibusque vicinis exquirebatur, inde ad ossis Lygomatis partem remotiorem, ubi posita erat, deveniendum fuit. 3. Quamvis mihi non satis perspectæ sint omnes Medicorum assentionum rationes quibus ad apertionem cauterio potentiali ubi parandam inducuntur, non possum quin regeram ejusmodi applicationem non parum secum vehere periculi, dum scilicet non ita penes nos est illius actionem exhibere quin sæpius ad ipsum oculi cantli majoris ligamentum pervadat, quo erosô, vel nimium debilitato enascitur morbus qui Rhyas dicitur, qui que præter alia incommoda non parvam deformationem inducit. Adde quod etiam si tale quid non contingat, semper, futurum sit ut turpitudine non mediocris de cicatrice restitente enascatur: quodque tam prompte quandoque molliorem pervadat cutem medicamentum ut ad os nasi spongiosum levique tantum pellicula indurum liberius perveniat, illudque suâ acrimoniâ carie afficiat, ac inflammationem in vicinam accersat per exagitationem ac fermentationem salum, sero fluxionem facienti innidulantium quam procurat. Unde patet ad hoc præsidii genus non esse descendendum donec alia omnia inutilia prorsus videantur; super his autem non est quod determinatè pronunciemus priusquam ægritudinis examen diligentius perfecimus Medicosque ac Chirurgos ordinarios audierimus.

In sequentibus cum Lausannam ivissemus proprio nostro examine novimus de morbo ea qua jam suscipit paulo enarrabimus.

Nobilissima Matrona D. B. annos circiter 28. nata fistulam lachrymalem juxta dextri oculi angulum majorem gerit, qua coacervatur pus copiosum, illudque crassius aut tenuius pro ratione temporis quò in parte afflicta commoratur. Per se autem non evacuatur pus aggestum, sed tantum expressione factâ per immisionem digiti indicis inter oculi globum ejusque orbitam, illo spatio quod canthum inter majorem ac minorem medium interjacet; digito verò tum aliqua vi adactò per punctum lachrymale inferius non minori elabitur vehementia humor, quam per syphonem truderetur. Imò si materia, contenta intactò largiis favò copiosius aggesta sit, quod serosius est ac lymphidius sub lachrymarum forma effluit quidem, sed par-

cè admodum. Præteritis temporibus compressa parte affecta per canalem lachrymalem pus trans mittebatur ad nares, verum cum à septem jam mensibus glutinosiores ipsius particule hæc sibi viam clauserint ad superiora necessario illud refluat, unde non mirum si canalis herniosus factus sit, in quo ea quam pallus est dilatatione continere valeat humorem ad cochlearis mediocris quantitatem, si modo per octo horas non comprimatur. Originem hujusce fistulæ repetant ab ictu ex ipsa infantia oculo inflicto, unde subito enata, est magna inflammatio, quæ eam in glandula lachrymali reliquit alterationem unde suffectus sit continuò humor, qui per canalem lachrymalem inferiorem, unum de suis excretoriis vasis, expurgatus lymphidus primò visus est, donec alteratione sensim aucta purulentus evaserit, nec hodie totus ab ipsa glandula derivetur, sed etiam à carnibus ac membranis glandulosis superiori prædicti canalis parti assidentibus, in quas proculdubio liquor de supra elapsus acrimonia sua eam irritationem ac debilitatem fecit, quæ in causa ut eas succi nutritii in eas corrivati, lymphæque excernendæ portio in pus abeat, & à multiplici hac scaturigine tam copiosum permanet. Si per orificium canalis lachrymalis quod vulgo punctum lachrymale dicitur, quodque hic non parum dilatatum reperitur, nobis licitum foret filum argenteum tenuis inuicere, facile de carie, an scilicet et interiori orbita adit, contritusset: Verum quandoquidem præ metu irritationis ac inflan matioris molestie sic procurandæ, ab eo arcebamur tentamine, conjecturaliter tantum hac in re pronunciamus; scilicet, tum ex qualitate humoris proluentis, qui nec odore, nec colore cariem arguit, tum ex carnibus superstratis quæ nec lixent, nec colescent, quantumvis quotidie vehementius pro educendo pure comprimantur; tum ex oculi globo ejusdemque mulculis, ubi nec rubor, nec ad alterutrum latus alia retractio appareat; tum ex ipsius glandulæ lachrymalis colore qui satis naturalis est, nec aliqua sedatur ulceratione aut erosione. Exinde enim probabiliter admodum deducitur materiam elcretam malignioris non esse sortis, aut intensioris acrimoniæ, sicque hæcenus vasis suis quantumvis dilatatis coerceri potuisse, ut ea ulterius, minime per ruperit, & ad nudum os non pervenerit. Quod etiam facilius deducere: est ex eo quod humor totus compresso suo sacco per punctum lachrymale effluat; si enim perruptus foret canalis humorque in orbitæ cavum effusus liberius vagaretur, quidni sibi alias pro exitu recluderet vias? Verum quod hæcenus magno Aëgræ bono, infectum est, non sic impotenter semper persistabit, ni totis viribus & derivetur & mitigetur humor, oculusque cum adjacentibus partibus corroboretur. Caries autem hac in parte eo periculolior fieret quod vix ac ne vix quidem medicamenta aut operationes necessarias pro sui cura demitteret. Pro humore evacuando proponebatur nasi perforatio juxta oculi majorem canthum, at hæc operatio minùs fructuosa foret, quia etiam si prima mali origo in glandula lachrymali fuerit, illino ad vicinas & inferiores sibi partes corrivata est, at eamque constitutionem ita vitavit, ut copia materia-

materiarum quæ jam excernuntur præcipue faciunt. Jam autem quis non videt perforationem præpositam sublimiori perficiendam loco, quam quò ascendere valeat humor interius aggestus, ut sic commodè exhauritur? Itaque donec tumor aliquis exterius enascatur quò inciso ad cavitatis fundum pergere detur, (quod vix possibile credimus) cogemur curæ insilire palliativæ, cujus fructus aliquando lætior multo evadit, quàm nobis primo polliciti fuimus. Hæc de causâ ut emissarium aliquod aperiemur humori setaceo omnino conducibile foret, sed delicatior Nobil. Aegræ constitutio illiusque pro tam generoso præsidio summa æveratio, nos in cauterio in nuchâ continuò inurendo jam continebit. 2. Semel singulis septimanis corpus expurgabit Agra & quandoquidem ventriculus purgantia ordinaria tolerare non valet, hoc commode ut per intusum rhei & sennæ cum paucis tale prunella, quo vice aquæ communis parabitur potus coctæ saccharo edulcorandus & aquâ naphæ aromatizandus. 3. Serum in genere absuget. & ejusdem acrimoniam non parum obtundet si in potu ordinario utatur, loco aquæ communis cum vino, decoctio tenuiradicis chinæ, salisparillæ, vici quercini & ligni lentiscini. 4. Singulis noctibus cubitum itura oculò affecto, nareque ejusdem lateris excipiet fumum qui de pugillo uno aut altero pulveris in carbonibus immixti elevabitur, qui pulveris ex mastiche, olibano, myrrha, succino & sanguine draconis cum p. uicissima antimonii cinnabari paratus est. continuoque post singulationem apparet oculo luteola concupiscata liquore balsamico, è myrrhâ, balsamo vero & Tolutano, extracto. 5. Imponet capiti sacculos cephalicos è succino, mastiche, gummi elemi, benzoin. flor. lilior. convall. alvia, anth. betonicæ, confectos, addito balsamò vero. 6. Subinde de die attr. her. in nares pulverem nasalem catarrhis educendis non parum aptum &c. His O. M. benedicat. Datum Lausannæ die 6. Martii anni. 1093.

Observationes.

Loes Auf dem Sande Hildenz, consanguineus meus, vehementissimo dolore cujusdam dentis molaris vexabatur. Adit barbitonforem, qui fracta dentis eminentia radicem in alveolo reliquit, inde continuato dolore exortus est abscessus circa dentis radicem, quò rupto exterius, paulatim remisit dolor, ulcus verò (quod nullo modò consolidare potuit barbitonfor) in fistulam degeneravit. Diversorum Chirurgorum consilia imploravit: sed frustra, donec ego quintò post annò ad paternos lares reversus, curationem Dei beneficio infra scriptis remediis feliciter absolvi. Instituta optimâ victus ratione sequentem exhibui potiunculam.

℞. Pulver. Passaphanti 3j. detur cum decoctio betonicæ, salviæ rosmarini & majoranæ. Postridie venam in cubito incidi. Deinde materiam in capite sequenti decoctio præparavi, & leniter purgavi.

℞. Herbar. & flor. betonic. scab. veron. cuscute, agrimon. an. m. j. summit. rosmar. major. flor. salviæ & primul. veris an. m. β sem. anis. fœnic. an. 3ij. liquirit. 3j. Coquant. in aq. ad

consumtion. tertiæ partis. Hujus colaturæ per triduum in aurora calidè ad 3 iv. melle despumato dulcoratæ, exhibui.

Postea. ℞. Ejusdem decocti colaturæ 1b j. sol. sen. mundat. 3ij. agar. recent. trochiscat. & rhabarb. elect. an. o ij. Maneant in infusione horas 12. deinde iterum leniter calefacta, fortiter exprimantur. Expressioni adnuce syr. de betonica & rosat. solut. compos. cum rhabarb. agar. & sena an. 3j. M. f. potio pro 4. matutinis. Tandem sumit sequentes pilulas.

℞. Mass. pilul. auræar. & aggregativ. ana 3i β. trochisc. alhand. & diagr. an. gr 4. Cum syr. de stoe had. formentur pilul. 5. quæ diuculo sumantur. Præparatò satis corpore radices dentis elodi, callositatem vero nuchæ unguento de succo apii mundineavi, tandemque cicatricem emplastro diacalcith. & pulv. aloni. ultî induxi, sicque curationem spacio 30. dierum feliciter absolvi *Fabr. Hildan. Obsr. Chir. Cent. 3.*

Juvenis quidam Colonienfis non ex obscurâ familiâ oriundus, cum simili morbo laboraret, in manus barbitonforis incidit, qui variis & per menses aliquot frustra adhibitis remediis, tandem me consuluit, & quidam amplius agendum esset a me inquisivit, cui præscriptum methodum fideliter communicavi, quæ & brevi sanatus fuit æger. *Idem ibidem* ubi rursus duo alia adducuntur exempla quibus ulterius confirmatur quid valeat methodus descripta: sed ehen rursus ex Clatiff. Hild. no aliud exemplum.

Inveterata ac deplorata inferioris maxilla fistula quomodo curata.

Nobilis matrona Basileæ, ex morbo acuto sanitati reitutata, defluxione ad dentes inferioris maxilla melli lateris, cum per multos menses vexata esset, nec dentem, ad quem catarrhus decumbebat, sibi extrahendum curasset, tandem radicem ipsius exorta inflammatione & dolore maximo generatus elucoscessus. Quò exterius rupto remisit dolor. nisi quòd inter mallicandum & loquendum, molesto in doloreque aliquem semper sentiret, ulcus in istulam degeneratum per annos quatuordecim apertum remansit. Interim etsi variorum Chirurgorum consilia auxiliaque imploraret, multa tamen frustra tentavit. Nullus enim de extractione dentis cogitaverat, imò potius extractionem omnes dissuaseraut. Ego cum ann. 1610. Sereniss. Princ. *Janitio Radzevils* Lithuaniz Duci, in difficili ac longò morbo operam meam impertirem, ad matronam quoque hanc (quæ jam sexagesimum annum ætatis prætergressa est) accersitus fui. Tum superiorem partem dentis, ac cujus radicem fistula erat, ad alveolum ferè usque erosum inveni. Semel atque iterum expurgato corpore radicem dentis extraxi. Postea turundam unguento nostro ad callositatem absumendam imposui, erosâ callositate pulverem præcipitatum quotidie inspersi, & emplastr. palmem applicui, nec medicamenta hæc mutavi usquedum ulcus perfectè sanatum esset, quod intra mensem contigit. Radix autem dentis erosa, inæqualis, & materia quadam lapidosa per laminas disposita, obducta erat.

*Pro Fistula in dorso à Scapula ad lumbos
perurgentie.*

Purgato corpore potionem hanc vulnera-
riam præscripsi.

℞. Rad. consol. maj. ʒij. rad. bistort. aristol.
rot. dictamn. alb. ʒi. n. b. pyrola ʒij. con-
solid. saracen. ʒii. l. alchimil. agr. mon. equi-
set. beton. fl. hyperic. rot. an. ʒi. lein. hyperic.
portionat. an. ʒii. ocul. cancr. ʒi. F. omnium
pulvis: cujus sumatur tertia pars, & coq. in
menturis quatuor vini albi, & mensura una aq.
plantag. coletur & fervetur ad viam, addendo
sacchari quarrar. j. aq. cuiam ʒi. bibat de eo
mane jejunus cyathum unum, & sub vespertam
horis duobus ante coenam unumquemque; ita con-
tinuando donec reliquæ pulveris partes con-
sumptæ fuerint. Intere, dum hoc decocto uti-
tur, injectionem sequentem per Syringam in
ulcus in lumbis infundat.

℞. Succ. apii officin. succ. plant. g. & agri-
mon. an. ʒii. succ. tabacc. ʒi. mell. ros. ʒii.
vini rub. ʒi. dissolv. chalcantin. alb. aluminis
tartari, an. ʒii. vel plus dum torandum adhuc
est ulcus, ærug. æris, auripigmenti, an. ʒß.
F. injectio. Cum supra & infra pateret ulcus,
ut siccaretur, funis per canalem infundibuli
in humidus ulcus fuit intronatus, tam diu do-
nec per superius ulcus toran. en prodiret, sic-
que interiores omnes cavitates pervasisset.

℞. Maltich. turris an. ʒß. myrrh. ʒi. ben-
join. storac. an. ʒiii. sarcocoll. pic. resin. pini
gummi elemi, an. ʒi. F. Pulvis carbonibus in-
spersendus pro fumo. Postquam curam hanc per
injectionem & suffumigationem aliquot septi-
manis continuasset, integrè sanatus fuit. *Ælix
Platerus. obs. lib. 1. pag. 500.*

Studiosus quidam octodecem annorum in
pectore diu habebat fistulam, ex qua efflue-
bat multum aquosum pus. Hæc à me curata sic
fuit, mane & vespere postquam exivit omne pus,
injeci per Syringam oleum heraclinum, ac po-
stea foraminum multarum turundam maiorem in po-
sui, ut maneret aperta, atque tali processu
quotidie penitus consumuit *Martinus Rulandus.
curat. 39. c. 1. 4.*

Domina quædam iuencula fistulosis ulceri-
bus pluribus locis prorumpentibus: ultum de-
bilitata, post expertissimorum Chirurgorum
irritos planè conatus, & cum ab omnibus pro-
deplorata haberetur, tandem brevi temporis
spatio sequentis remedii usu integrè curata est.

℞. Aloysi. & menth. an. M. millepedum
bene contulor. (demptis prius capitibus) ʒoo.
Sacculo omnia includantur, qui suspendatur
in cerevis. tenuis pintis viii. peracta fermenta-
tione, capiat haustum de ea bis terve in die
plurimum præstant millepedes in fistulis &
mamillis exulceratis modo non sint cancro-
sæ. *D. Rob. Boyle. lib. De Virili. Natur. Philosoph.
part. 2. sect. 3. cap. 3.*

*Caleri oblongi dimidium lumbis infixum, biem-
nio post extractum est reliquæ inde
Fistula sanata.*

Anno 1591. adiut me juvenis robustissimus

optimique habitus laborans perangusta qui-
dem, sed profunda & perpetuo doiorumca fistu-
la, ad dextram ipsius cornu partem, circa quar-
tam vertebra lumborum. Is non abbat, libran-
te biennio cum toto ulatum vulnus, in quodam
tumore, quod à nemine h. ænus curari po-
tuisset. Dilatata fistula trochanis de minio &
spongiis præparatis, item radice gentianæ, in-
veni in ima parte oblongi cultui dimidium, cu-
jus micro defixus fuit inter tertiam & quartam
vertebram, reliquum callo ol. ductum. Inciso
callo extraxi cultum. Eximundificato ulce-
re, cum pulvere præcipit. to, & unguento quod
Apostolorum vocant, juvenis brevi tempore
convaleuit. Id autem hic insigne est, quod à vul-
nere accepto, ad ext. eman. curationem, vix
unquam febricitavit, nedum p. ilus sit inflam-
mationem, spasmus, dolorem acutissimum, &
reliqua symptomata quæ solent fructu dorso ac-
cidere gravissima Anno 1612. Cum Hildinam
profecus essem, prædictum virum in arce Nes-
selrod prope Dusseldorpium, apud benerosum
Virum Dom. Wilhelmum Ketlerum &c. cujus
tum tenporis, quamvis senex, erat domesti-
cus, vidi: qui & coram generoso vobis, omnia
quæ acciderant exposuit; seque ab eo ten po-
re, quod à me curatus fuit, quam optime na-
tuisse constanter affirmavit *Wilhelm. Fabric.
Hildan. obs. Chirurg. cent. 1.*

Fistula ex parotide orta.

Studiosus quidam circa annum 12. statis ab-
scessu sub ante dextra (parotis vocatus Medi-
cis) correptus fuit, qui quum paulatim in fi-
stulam abisset per tres in egros annos frustra
è barbitonsoribus excruciatum fuit. Tandem ad
Jul. Ann. 1620. cum Bernam venisset, & in ibi
adductus fuisset, fistulam coniunctam, inveni;
exteriori in cute duo saltem erant foramina
angustissima, quorum unum sursum versus cra-
nium tendebat, & in duos sinus dividebatur,
alterum deorsum versus jugulares venas des-
cendebat. Sed omnia intus erant callola, Opti-
mè præscriptâ victus ratione, semel quinetiam
atque iterum expurgato corpore, causticò in eò
cute, quæ hiulis adiacebat, erosi, & diges-
tivum, nec non unguentum basilic. ad casum
escharz applicui. Deinde eodem causticò, nec
non pulvere angelicò, diligenter retinctò,
callositates omnes paulatim absumsi, ita ut in-
tra septimanas septem plenissimè convaleverit.
Porro in ejusmodi curationibus diligenter at-
tendendum, ne quicquam de cute à musculosa
carne separata, & venis capillaribus destituta,
remaneat. Consolidationem enim impedit. Et
quia illa in primâ applicatione in notis ægrò
propter callo sitatem insignem erosa non fue-
rat, applicationem confici aliquoties iteravi;
ubi diligenter prospiciendum est, ut quantitas
caustici, cum cute, quæ erodenda est, ius-
tam, & ut dicimus, ad pondus habeat pro-
portionem, Et ita quidem ut partes integræ
& sanæ conserventur, malè effectum verò de-
struantur. Id autem rectè ut fiat, necesse est
ut Chirurgus optionem habeat notitiam facul-
tatis sui caustici Deinde etiam ut naturam sub-
jecti cognoscat, hoc est, an molle, rarum,
humidumque, an verò solidum densum & sic-
cum

com existat? 2. Quam periculosum enim sit in applicatione causticorum medicamentorum errare lutor ex aliquot observationibus meis observare poterit. *Idem Centur.*

Fistula Urachi.

Valentinus Vogel calculum è seroto extraxerat, vicelima martij proximè præteriti iterum me invisit, retulitque se ab eo tempore quo a nobis discessit, iterum me invisit, quam optimè habuisse, & in ditione Tigurina in pago quodam ludimagistrum egisse, jam verò propter instans ver, atque astatem (quo tempore Ludimagistros suos ablegant Helvetiæ rustici) ut alibi nutrire possit, prospiciendum esse. Ante aliquot autem menses ulcus haud proculsub ipsò umbilico exortum est. Ex quo plerumque pars aliqua urina, ut pote subtilior, non tantum guttatim existit, sed nonnunquam veluti cum impetu erumpit. Ulcus hoc sine dolore fere, molestia, & febre, ex tuberculo ad instar furunculi, factum esse, sanctè nobis asseruit. Ego stylum explorarium per illud ipsum ulcus, quod valde angustum & callosum, ad vesicam ipsam immisi. Ex quibus videre est Urachum in virò istò pervium factum esse, tam sagax ac provida est natura, in conservatione sui individui. Cum enim ductus urinaris callonis ulceribus impeditus esset, aliam sibi pro evacuatione urinae fabricavit viam. Clarissim. Wierus in ea fuit sententia Urachum in omnibus pervium esse, & proinde diutius maximò cum fructu umbilico applicari posse &c. *Idem Centur. vj.*

Fistula lacrymalis in puella, sanata sectione, caustica, aliisque præsidij, ex artis lege. Accedit, contra multorum sententiam, vera & certa fistulas lacrymales curandi methodus.

Quamvis omnes Medicinæ, & Chirurgiæ Scriptores, variam præscribant curationem fistularum lacrymalium, ego tamen quadam à me observata proponam, licet ab aliorum methodo non aliena sanavi itaque puellam septem annorum. Curti mercatoris filiam, ab incubulis fistula lacrymali laborantem, cujus à multis frustra tentata erat curatio, hac ratione; secui fistulam ipsam, & quia puella non ferebat diutius hanc operationem, osque erat corruptum, quod simplici propterea sectione abradi non poterat, coactus fui illi adhibere causticum, mixtum cum unguento ex betonica, & paulatim fistulam dilatare, quo totum os corruptum eradi posset, quo sublato, applicui supra os superites filamenta arida, quousque cæco laudabilis ab ipso excrevit; præmissa tamen digestionis medicamentis propriis; postmodum supra labia vulneris unguentum ex cutia, sarcotici loco, propter continuum ichorist fluxum ad angulum oculi; tandem induxi cicatricem cerato ex Diachalcitide, filamentis tenuissimis aridis, qua methodo multos curavi; quanquam occalescente sinu, libentius institutionibus ferramento candente utar, si agri admittant, utpote quæ callum non modo atterant, partemque ipsam corroborarent, sed etiam citius separent os corruptum, quicquid sentiant aliqui, perforandum scilicet os, quo

materia illa purulenta per nares effluat, & cicatrix exterius obducatur; qui tamen frustra sunt, quia os perforatum inurendum, ex illorum sententia, quo foramen melius pateat, præbeaturque exitus puri; at quando os est corruptum, omnino removendum, cum alioquin fistula non possit sanari, neque ad cicatricem deduci exterius, atque ita hæc curatio futura sit palliativa, & iutura; præterquam quod hujus perforationis non alius sit ulus, quam ut os perforatum, & inultum citius abscedat, cujus loco natura carnem prius aliam generat, quæ progressu temporis evadit callosa, & dura instar ossis, quæ curationis finis; quia cutis cum carne subiecta, quæ ab ipso osse excrevit, cum ipsa coalescit, atque ita fistula sanatur; non verò foramine superstitite, ex quo continuo emanat materia purulenta, cui antea patebat exitus ex angulo oculorum perforamina, puncta lacrymalia dicta; progressu siquidem viginti, aut triginta dierum circiter, os inultum, & perforatum abscedit, unde foramen obstruitur à carne, ut dictum est, ex ipso pullulante. Graviter proinde errant, qui existimant, perforationem hoc commodum præstare, ut materia per nares effluat, licet huius ope os perforatum citius abscedat; observandum tamen, non esse perforandum os, nisi præsentem maximam ipsius corruptionem, quæ perveniat usque ad cavitatem internam ipsius nasi; sola siquidem ejus superficie corrupta, aut alterata, sat fuerit partem læsam scalpro abrasorio abradere, dum pars cutis coalescat ossi; quod tamen, fieri non potest, nisi sanum fuerit, & incolume, ejusdem autem corrupti, & scalpro excisi hoc vobis fuerit indicium, cum spatio, decem aut summum, duodecim horarum, caro illi accreverit, quod nonnisi facta abrasione contingit, coalescente fistula. Quod si post abrasionem nulla caro subreverit, os corruptum adhuc subesse pronuntiandum, quod proinde denuò abradendum, quousque hæc signa omnino non appareant. Quæ ratione feliciter semper, & tutò sanavi fistulas lacrymales, non solum puerorum, sed etiam adultorum, qui cum plures sint, eorum nomina referre superledo, quæ in memoriam revocare difficile est.

Quia verò non omnes fistulas lacrymales sunt cum corruptione ossis, ideo ista duobus modis possunt curari; vel incisione sola, & attritione calli, cum generatione carnis; vel secundo, absente callo, per compressionem ipsius partis, instrumento ab Aquapendente descripto, aut aliquo alio simili: quæ, quia à plerisque pertractantur, supervacaneum censeo repetere, cum mihi sit animus, proprias tantummodo in medium adducere observationes, iis prætermisissis, quæ passim ab omnibus proponuntur. *Petrus de Marchettis in observation. Medico Chirurgic. Sylloge.*

Fistula colli anterioris infra laryngem, ex tumore a barbitonsore intempestive sanato. Observanda in curatione vulnerum colli, ne vena jugulares, & carotides arteria ledantur.

Multas sanavi fistulas colli potissimum verò quæ laboravit adolescens quatuordecim annorum

rum, in parte ejusdem anteri, infra laryngem, oborto primum ex contusione tumore, cui a Barbicoufore sanato. superstes fuit titula inter utrumque anulum asperæ arteriæ, cum latione utriusque cartilaginis, ex qua spiritus effluabatur. Habita itaque prius totius corporis ratione, medicamentis humores peccantes purgantibus, deveni ad topica; & primo quidem quatuor integumenta dilatavi, turunda ex spongia, deinde scalpro abrasorio partes ipsas cartilagineas utrinque, ætate abrasitum filamenta arida supra eadem applicui; postmodum unguento liliis, quod occalescere ceperat in parte carnosâ, attrivi. Tandem globulis ex filamentis, imbutis unguento ex tuthia, cum unguento Indis, cavatam opplevi; atque senim & sensim annuntis globulis, cerato ex Diachalcitide, cum filamentis aridis cicatrice fistulam obdixi.

Hic autem observandum, quod si vulnera colli punctim iniecta fuerint, nec statim mortem inferant, pro signo hoc habendum sit, venas jugulares, & arterias carotides illas esse, ac propterea maxima cautione curanda; quia licet non pervadant totum collum, turunda tamen non est immittenda longa, & crassa, sed brevissima, quæ integumenta non excedat, quæ principio imbuenda ovi albumine, superinjecto postmodum linteolo duplicato per totum collum, eodem ovi albo intincto, cum bolo armenia, & sanguine draconis: educto deinde sanguine, pro virium tolerantia, atque exhibitio medicamento leniente pottero die; a quibus per duos dies non immutanda remedia partis vulneratæ adhibita, cum solum linteolum ex usu sit sæpissime, quotidie prædictis pulveribus cum ovi albumine inductum. Victus sit solum præsana hordeacea bis per diem exhibita; potius vero aqua hordei pauca copia, quod si deinceps inflammationis metus ingruat ex altero brachio sanguis ducendus, iusta quantitate; atque urgente dolore, viribusque permittentibus, adigenda quinetiam cucurbitula, scarificatæ. omni quippe ingenio, & arte prohibenda generatio puris, utpote quod venas & arterias corrodat, cum mortis præsentis periculo, prout observavi in quibusdam ab imperitis male curatis, dum intruderent turundas longas admodum, a quibus puris copia congesta, venas, & arterias consumpsit, mortisque causa fuit; ut propterea duobus aut tribus post diebus, removeam turundam illam brevem, applicato deinde linteolo inducto cerato ex cerusa; repetito alio perinde duplicato eodem modo, pulveribus prædictis, cum ovi albumine inducto, quibus spatio octo, aut summum decem dierum hæc vulnera sanare consuevi; servata tamen semper dicta tenuissima, ne humores ad partem vulneratam confluant, atque in purulentam materiam converti vasa erodant.

Quod si vulnus trajiciat collum, hac methodo utor; imposita scilicet brevissima turunda utriusque eodem modo, quo superius proposui. Animadvertendum præterea, hæc vulnera nunquam esse tentanda ipseillo, ne, quod facile contingere potest, disrumpantur vena, aut arteria cum vitæ proximo periculo. Quamethodo multos sanavi, multoque quinetiam mor-

tuos vidi, diversa ab hæc curatos. *Idem ibidem:*

Dua Fistula sub axilla, variis remediis frustra tentata, igne actuali feliciter sanata.

Quidam laborans duabus Fistulis profundis sub axilla me accessit, variis frustra tentatis remediis; quippe, quæ cum ad subjectas usque costas penetrarent, incisiones proinde non admittebant sine vasorum latione, ac præsentis vitæ discrimine. Cum autem Medici, in eam primo corrosivis; postmodum vero conpressionibus, ligaturis, & hujusmodi præfidiis, in casum tamen, ego corpore jam expurgato, statim ad operationem me accingens, utramque fistulam ad fundum usque inuissi, ferramento candente, absque cannula, repetitis vicibus, donec omnino, & æqualiter toto fistulatum sinu callus ætereretur; cicatræ vero detergenda, turundis primò longis, & crassis butyro illitis, postmodum digestivo usus; Pure vero apparente laudabili, alias inuissi, inductas unguento ex Betonica, quas quotidie breviores paravi, quibus omnino remotis, pulvino ex linteolis sub alis, compressa parte ligatura satis arcta, spatio vincti dierum agrum sanata omnino restitui. *Id. ibidem.*

Qua ratione curanda fistula thoracis, cum labe ipsius ossis sterni, quod abrasione solum nunquam vero inuisione tentandum.

Fistulas sæpissime præ manibus habui, ex abscessu, aut vulneribus superstes, quæ aut corrumperent, aut aliqua talem labe afficerant os ipsius sterni, ex abscessu potissimum, ratione redundantis puris; quo casu, amplianda titula, aut turunda ex spongia; tota postmodum pars ossis corrupti abradenda, dum caro laudabilis, paucis post horis illi accrescat; tunc vero imponenda globuli ex filamentis imbutis unguento ex Betonica, aut Matri ylvæ, atque carne inducta, cicatrix, medicamentis efficantibus alias propositis, obducenda; quod si caro parvo temporis spatio non succreverit, indicio fuerit, totum corruptum os non esse abradendum, ac proinde operationem repetendam, donec caro optima adnascantur, quo illis postmodum remediis detur locus. Nunquam vero desensum ad inuisionem ipsius ossis sterni, quia non abscedit, aliorum more, quæ licet ex toto corrupta non sint, sed aliqua tantum parte, si inuagantur, sola illa labe affecta abscedit, superstite alia laudabili; quod non contingit ossi sterni, quod lentum latis, non potest ita facile in squamulas dividi; quin potius inuisione ad internam usque ipsius partem pervadente, totam partem corruptam abscedere necesse est, non quidem spatio triginta, aut quadraginta dierum, prout alia ossa, sed trium aliquando annorum unde consilio, ut nunquam os sterni inuratis; observavi siquidem in multis non abscessisse, nisi duobus vel tribus annis exactis, ut propterea tutior, & facilius sit curatio per ablationem, quam per inuisionem; quæ methodus curandi fistulam à vulnere; vulneris autem, quod non penetrat in cavatatem, principio

cipio statim ad mutuum contactum labia adducenda, & quidem si amplum fuerit, per suturam, si vero angustum, per compressionem, prohibita puris generatione, ne os ipsum corumpat, aut saltem afficiat. qua ratione in his vulneribus non penetrantibus, sed lacerantibus tantum os ipsum sterni, progressu octo vel decem dierum illa ad cicatricem perduxit, sola appposito cerato ex cerusa, vel ex Diachalcitide *Idem ibidem.*

Fistula umbilici ad intestina usque serpens, diu frustra curata, parvo temporis spatio feliciter sanata.

Patrem quendam Theatinum vidi, laborantem fistula umbilici, ad intestina usque penetrante, de quorum dolore erant querelæ, ex demisso statim in eandem specillò: quem hac methodo curavi. Facta scilicet totius corporis expurgatione, missi totum orificium fistulæ jam colosum, & induratum immissa in illud parva turunda, quo omnis crusta simul callo attereretur, & quidem imbuta à principio butyro, postmodum digestivo, quam facta concoctione eluxi appositis filamentis, illitis unguento, ex betonica, & superdato & diachalcitide; atque octo post diebus circiter obstinui à filamentis, solo contentus cerato, quò cicatricem in luchi, agro spaciò viginti dierum sanato, qui à Medicis Mutrinensibus multos menses in callum fuerat curatus. *Idem ibidem.*

Quinque fistula femoris ex vulnere sclopeti cum tumore, & osse carioso, male curata, subactò callò, & accommodatis remediis sanata quidem, ob extremum tamen os fractum supra aliud diuinus coalescens, aliorum Medicorum incuria, claudicante agro. Quòd antiqua fractura ex vulneribus sclopetorum sint incurabiles.

Memini me curasse Illustrissimum Vincentium brici, sclopeto vulneratum in femore, novem menses venetis frustra curatum. Laborabat autem quinque fistulis femoris, & insigni ejusdem tumore, cum osse carioso. Illustrissimò agro aucto enaciato, ut ossa sola cute tecta appàrent, accedente febre fixa ex fistulis orta; quem cum interrogarem de remediis, & methodo curationis antea adhibitis, respondit, sine turundis processisse, applicito quidam cerato & cataplasmate ex farina lupinorum, theriaca & vino malvatico; præscripta à Medicis viduus ratione ex pane fufuraceo, & carnis loco, ut pote quæ vulneribus sclopetorum noxia, oleribus, vel saltem aliquando solius vervecinæ concessio usus quod valde mirari subit, cum fistulæ, omnium consensu, non sanentur nisi sublato collo, qui non solum his accereverat, sed & ossis quinque corruptio accedebat: Tumor autem à cataplasmate calidiori, & nimis exsiccante, induratus ad id fuit, ut resolvi omnino non posset. Ego vero hac modo curationem sum aggressus, præscripta primo vultu ratione, ex pane scilicet triticeo purissimo, pullis junioribus, glandulis ac cerebris vitulorum, ovis sorbilibus tremulis, ptisana hordeacea, vino oligophoro & hujusmodi, exhibui quandoque ex pharmacis semi-

unciam floris cassiæ noviter extractæ, præsertim aliquando clystere, aut glande ad alvum ciendâ; à quibus quinque fistulas prius dilatavi turundis ex medulla assii indicis, seu sorbi, aliquando etiam ex spongia, & quia tumor, curationem impediebat, illi applicui aliquot dies cataplasma balnei 2. libi ad blauccon. ex farina, triticea, aqua & oleo communi, quibus brevi temporis spacio ex spacio toto discussus est; ex purgata quinque etiam sensim materia prout in omnibus fistulis, in eo congesta, atque in pus conversa eorum dilatatione. His peractis deveni ad abrasionem ossis cariosi, atque eadem opera ad calli atteritionem; cum vero ex titule à parte externa ad internam femoris petierent, & quædam mutuis oculis in se invicem illarent heu immisi sectaceum ex lenico imbutum unguento issidis, cujus præsidio callus ex toto fuit sublatus; tum ferramentis totum os fistulis subjectum erasi; postmodum sectaceis, dimissis, sensim turundas intro minui, adhibitis medicamentis sar. oticis, n. itis cum aliqua portiuncula issidis, ne caro laxa, aut callus denuò succresceret, curationi impedimento futura; applicui quinque etiam spongis supra femur, madefactas nostris aquis theriacalibus montis nempe ægrotorum, atque modice illas fascia contrinxi cum spongiis, ita tamen ut in quolibet fistularum orificia breves cannulas plumbeas immitterem, ne materia aut purulenta, aut serosa, alicubi hærens aliud sibi pararet foramen. Tandem sublatis cannulis, & arctius alligatis spongiis, orificiis fistularum adhibitis filamenta arida, cum cerato ex diachalcitide, cicatriei inducendæ; cumque Medicorum veterum incuria extremum ossis femoris fracti fracti supra aliud coaluisset non potui antiquam hanc fracturam, novem nempe mensium, componere, cum ratione debilitatis virium Illustrissimi ægri à principio curationis; tum quod fracturæ ex vulneribus sclopetorum, iis quinque integris, cum initio non bene conmittuntur, difficillime sanantur; quod nec quidem tentandum, ossibus frustulatim fractis, nisi præsentis vitæ descremine; ut propterea nobilis claudicare coactus fuerit. *Idem ibidem.*

Ex Gonorrhæa venerea antica variis fistulis perforatum collum vesicæ, prope urethram, cum effluxu urina, non solum ex scroto pluribus locis, verum etiam ex inguinibus, præter spem sanitati restituito agro.

Cæsar Quojetus Rhodiginus, morbo detentus, meæ curæ se commisit, multorum frustra expertus, qui primò laboraverat gonorrhæa venerea, quæ longo temporis spacio sua acrimonia & mala qualitate, collum vesicæ prope urethram utrinque petuderat, ut non solum ex scroto pluribus locis urina, verum etiam ex inguinibus efflueret, variis proinde fistulis subortis; quas insanabiles prædixi, superstitite adhuc gonorrhæa; quarum tamen curationem aggressus, & primo quidem corpore quam accuratissime expurgato, illi exhibui decoctum ex ligno, & salsa, cum sudore; turundis interim usus imbutis solo unguento ex betonica, mino-

hærentis incurvari, tandemque per anum exire queat

Fili utriusque extremum conjunctum alligamus ligno cuidam tereti, sicque ad eum modum, quo cum fistula sua processit ab Aquapendente, contorhone continua, fortique constrictione quicquid filo comprehenditur dividimus.

Operatio secunda Syringotomo perficienda certior est, minusque dolorifica, uno breviori absolvitur tempore, ab ea tamen abhorreere magis solent agrotantes. Instrumentum hoc invenit Galenus, delineavit Andr. à Cruce, emendavit H. F. ab Aquapendente, approbavit Schultetus; figura ejus quæ operi quam maxime accommodata est, in qua globulus est, qualis etiam in instrumento exploratorio plumbeo supra indicato requiritur, ne, dum per fistulam, hinc intestinum ipsum, protrahitur, nocuum ei adferat; hinc per fistulam & intestinum ducitur, sic ut per anum exeat usque ad tertiam suæ longitudinis partem ubi acuties incipit instrumenti, cujus dorsum obtusum, similiter ac illud quod est cultri domestici, quo panem scindimus. Et autem totum instrumentum ad instar falcis incurvat.

Instrumentum hoc per fistulam immisum, digito in intestino apprehensum celeri manu extrorsum ducitur, & hac ratione quæcunque attingit impetu uno discindit.

Sincere ut hic agamus, necessarium non modo qualiter instrumentum dictum tractare debeamus cognoscere, sed & quomodo ulcus tale fistulosum incipiat, procedatque, imo quænam de eo prædici queant. Ad hæc casum sequentem exhibere utile erit.

Franciscus Volkertsen vir aliquomodo melancholicæ complexionis, ex anni ad os usque caudæ, hinc ad natium concursu ubi intestinum rectum ossi dicto accumbit. Brevi tumor hic exortus, qui pinguedinem, marginem musculi glutei, imo, quod admirandum, intestinum rectum, perforavit.

Accedens agrotantem, præter febrem, doloremque gravissimum, tumoris durtiem, rubedinem, extensionem, consideravi. Quod, symptomata alia tumori adscribi debere, certum, Cataplasma hoc eidem applicari necessarium duximus, quo eo maturatio promoveretur.

℞. Rad. Altheæ. Brion. Lillor. alb. an. ʒj. β. Fol. Malv. Bismalv. Violar. an M. j. Flor. Chamomill. M. β. Sem. lini. ʒβ. Coquantur & contundantur, addendo Farinæ fœnugr. Semin. lini. an. ʒii. Axung. porci q. s. Butyr. recent. ʒj. Vitell. ovin. j. M. F. Cataplasma.

Calide hoc applicamus tumori, secundo die eum aperire consultum duximus, & effluxit materię foetidæ purulentæ insignis satis quantitas.

Post hæc excrementa alvina, quibus status permixti, sonitu se manifestantes, tumorem accedere notabamus, unde perforatum jam esse intestinum clare constabat. Multa equidem adhibebamus, quorum opera consolidare, carnemque regenerare nos posse credebamus, ast frustraneus omnis labor; ad incisionem adeoque, modo in prægressis indicato perficiendam, devenire coacti, qua & intestini reliquas partes sanas, & eusem musculosamque intestini por-

tionem adhuc integram dissecare necessarium; directione peracta, quod sanguinis illuxus gravis ex Venarum hæmorrhoidalium apertione adesset, medicamentum adstringens ordinarium vulnerato loco applicavimus.

Die sequenti puris minus solito in vulnere repperire licuit, imo omnia sanitatem veram promittere videbantur, quæ etiam brevi tempore, auxilio divino, introducta.

Per anam hæc incisionem excedentem in parte dicta humoralem collectionem exoriri posse, non est quod nunc alicui videatur, etiam in aliis subjectis similia iis quæ in hoc observare licuit, notabimus; At vero vitii principalissima causa hæmorrhoides exulceratæ, ex sanguine acriori ortum ducentes, unde vicinarum partium corruptio. Exemplis variis quæ proposuimus illustrare liceret, nisi agrotantium plerique impedirent.

Sunt inquit ab Aquapendente, qui ferrum pertimescant & universi sinus incisionem à filoheri expetant, quod non laudo, quia nimis molesta & tarda est incisio, & dolor assiduus, & longa curatio.

Partem hanc, in qua ulcera hæc fistulosa occurrunt, sensilem omnino esse, variis exemplis verum esse comperimus; testatur idem memorabilis historia quam Reverendus Pater Augustinus lib. de civit. Dei 22. cap. 2. de Innocentio summe dolores fugiente proponit; hanc rerum Chirurgicarum cultoribus coronidis loco communicare placet, cum voto curationis, similis omnino illi quam sanctus Episcopus adducit.

Quis inquit novit, præter admodum paucissimos, salutem quæ facta est Innocentio Advocato Vicariæ præfecturæ ubi nos interfumus & oculis aspeximus nostris; venientes enim de transmarinis, me & fratrem meum Alippium, nondum quidem clericos, sed jam Deo servientes; ut erat cum tota domo sua, religiosissimus ipse susceperat, & apud eum tunc habitabamus: curabatur à medicis, propter fistulas quas innumeras atque perplexas habuit in posteriore atque ima corporis parte. Jam secuerant eum, & artis suæ cetera medicamentis agebant. Passus autem fuerat in sectione illa & diuturnos & acerbos dolores, sed unus inter multos sinus fefellerat medicos, atque ita latuerat, ut eum non tangerent, quem ferro aperire deberent, Denique sanatis omnibus, quæ aperta curabant, iste remanserat solus, cui frustra impendebatur labor. Quas moras ille suspectas habens, multumque formidans ne iterum secaretur, quod ei prædixerat alius medicus domesticus ejus, quem non admiserant illi ut saltem videret cum primum sectus est quomodo id facerent iratusque illum domo abiecerat, vixque receperat, erupit, atque ait: iterum me secturi estis? ad illius, quem noluit esse præsentem, verba venturus sum. Irridere illi medicum imperitum coeperunt, metumque hominis verbis promissionibusque lenire, præterierunt & alii dies plurimi, nihilque proficiebat omne quod fiebat, Medici in suâ pollicitatione persistebant, non illum sinum ferro, sed medicamentis esse clausuros, adhibuerunt & alium grandævum jam medicum satisque in illa arte laudatum, adhuc enim vivebat, Ammonium dico, qui loco inspecto, idem quod illi, eorum diligentia peritæque promissit. Cujus a-

le factus autoritate securus, domesticus suo medico, quod futuram prædixerat aliam sectionem, faceta hilaritate veluti jam salvis illis. Quid plura? postea tot dies inaniter contumpti transierunt, ut fessi atque confusi laterentur eum nisi ferro, nullo modo posse sanari. Expavit, expalluit nimio terrore turbatus, atque ubi se collegit, farique potuit, abire illos iussit, & ad se amplius non accedere imperavit: nec aliud occurrit fatigato lachrymis, & illa jam necessitate contracto, nisi, ut adhiberet Alexandrinum quendam, qui tunc Chirurgus mirabilis habebatur, ut ipse faceret quod ab illis heri nolebat iratus. Sed posteaquam venit ille, laboremque illorum in cicatricibus, sicut artifex, vidit, boni viri functus officio, persuasit homini, ut illi potius, qui in eo tantum laboraverant, quantum ipse inspiciens mirabatur, curationis suæ sine fruerentur: adjiciens quod revera, nisi sectus esset, salvis esse non posset. Sed valde abhorrere à suis moribus ut hominibus quorum artificiosissimam operam, industriam, diligentiam, admirans in cicatricibus ejus videret, propter exiguum quod remansit; palmam tanti laboris auferret. Redditi sunt animo ejus, & placuit ut eodem Alexandrino assistente, ipsi suum illum ferro, qui jam consensu omnium aliter insanabilis putabatur, aperirent. Quæ res dilata est in sequentem diem. Sed cum abiissent illi, ex nimio moerore Domini, tantus est in domo illa exortus dolor, ut tanquam funeris planctus, vix comprimeretur à nobis visitabant eum quotidie Sancti Viri, Episcopus tunc Usuleus, beatæ memoriæ Saturninus, & Præbiter Gelosus, ac Diaconi Carthaginensis Ecclesiæ. In quibus erat, & ex quibus solus est nunc in rebus humanis jam Episcopus cum honore à nobis debito nominandus, Aurelius, cum quoque recordantes mirabilia opera Dei hac de resæpe colloqui sumus cumque valde meminisse, quod commemoramus, invenimus, Qui cum eum, sicut solebant, vespere visitarent, rogavit eos miserabilibus lachrymis ut mane dignarentur esse præsentibus suo funeri potius quam dolori. Tantus enim cum metus ex prioribus invalerat prius, ut se inter medicorum manus non dubitaret esse moriturum. Consolati sunt eum illi, & hortati ut in Deo fideret, ejusque voluntatem viriliter ferret. Inde ad orationem ingressi sumus. Ubi nobis ex more genæ figentibus, atque incumbentibus terræ, ille se ita projecit, tanquam si fuisset aliquo impellente graviter prostratus, & cepit orare. Quibus modis quo affectu, quo motu animi, quo fluxu lachrymarum, quib. gemitibus atq; singultibus concutientibus omnia membra ejus, & pene intercludentibus spiritum, quis ullis explicet verbis? Utrum orent alij, nec in hæc eorum averteretur intentio, nesciebam. Ego tum prorsus orare nil poteram, hoc tantummodo breviter in corde meo dixi, Deus quas tuorum preces exaudis, si hæc non exaudis? nihil enim mihi videbatur addi jam posse, nisi ut expirare orando. Surreximus, & accepta ab Episcopo Benedictione dicissimus, rogante illo ut mane adessent, illisque, ut æquo animo esset, hortantibus. Illuxit dies, quem metuebant, aderant servi Dei, sicut se affuturos esse promiserant. Ingressi sunt medici, parantur omnia

quæ illa poscebat, tremenda ferramenta. proferuntur, attonis, suspensisque omnibus. Eis autem quorum erat major autoritas, defectum animi ejus consolando erigentibus, ad manus secturi, membra in lectulo componuntur, solvuntur nodi ligamentorum, undatur locus, inspicit medicus & secundum illum si num armatus atque intentus inquit; scrutatur oculis, digitisque contrectat, tentat denique modis omnibus, invenit firmissimam cicatricem. *Job. à Meekren. Observat. Chirurg.*

De Ulcere intestini recti Brasilianis familiari.

Anno 1624. cum ego (Jacobus Lachmund) qui totius classis Bataviæ chirurgus constitutus eram, cum illa in regionem Americæ Meridionalis, Brasilian, profectus essem, militibus nostris in illa regione ulcus nascebatur in intestino recto, eo modo, quo in nostris oris homines in digitis panaritio corripuntur, quod ipsis maximos dolores afferebant, ita ut fere insanerent propter urentem materiam, antequam maturelceret & aperiretur. Brasiliani hunc affectum, seu morbum, quo sæpe intestantur, vocabant Byctos. Remedium autem hoc erat: sumebant citrum ponum, quod in sex vel octo partes longas dissecabant, ex his particulam quandam, intar suppositorium in intestinum inferebant, & hoc sæpe iterabant recentibus pomis citris; hoc modo statim magni illi dolores sedabantur. Ego, cum Brasilianos hanc medicinam facere viderem, pari modo medicas manus adhibui & dolori & morbo nostrorum militum, qui hoc pacto pariter convalescerunt. *Friderici Lachmund.*

Dolor intestini Recti.

Vir Religiosus & Doctissimus habitu obeso, curru hyeme vectus viis in pedibus luto & lapidibus, dolorem sensit in intestino recto, sedenti præsertim & cubanti molestus. Arbitrati sumus coccygis esse luxationem ad interiora quæ intestinum rectum velliceret. Talem enim iussim coccygis dislocationem observavimus, præsertim in parturientibus. Facto per chirurgum expertum periculo, nihil digitis ano immisis observatum quod coccygis luxationem indicaret. Unde nervosi generis esse affectum, qui Virum optimum fatigat, suspicio remansit, laeso nervo, sinistro præsertim, (ubi dolor,) qui ex osse sacro ad crura descendit. Hinc igitur per nervinum emplastrum, decoctum nervinum & suppositorium ex nervosis herbis, quod proximè affectam partem tangit, consilia & operam commodante Excellentissimo Dn. Borrichio, consultum fuit, ut minus jam molestiæ exhibeatur. *Th. Bartholini.*

De Calculis ex Ani fistula extractis.

Civis quidam Uratislaviensis, ob enormem corporis crassitiem, obesitatemque prorsus stupendam tota Urbe famosissimus, nescio ex qua causa fistulam Ani contraxerat, sineque insigni molestia aliquot annis toleraverat. Tandem ægrius eam ferre incipit, doloreque in-

dies

dies magis magisque exacerbatum, tumorem inflammationis nullum omnium, a parte sinistra sphincteris ani situm, attollentem sentit, qui ipsum neque sedere, neque ambulare, egerque cubare permittit. Acceritur Chirurgus, D. Gottfried Schultz, Vir ob insignem industriam non vulgari peritiam iunctam merito laudandus, qui lanceola tumorem, re sic ferente aperit:

Ex vulnere primo puris copia, mox quoque calculus prorumpit. Evacuata sic doloris & inflammationis causa, vulnus à Chirurgo debite tractatur, ac tandem consolidatur, fistula, monitu Albuealis, intacta relicta, utpote quam patiens non admodum moleste ferret. Elapso autem ab hac circiter biennio, de novo inter deambulandum vexari, atque de die in diem dolores acerbiores sentire incipit, donec tandem nimis ingravescentes iterum Chirurgi manum in auxilium vocare eum cogunt. Hic, denuo parata sectione, inter sordes varias ex vulnere emanantes, jam non unicum calculum, sed geninum, & utrumque priori illo majorem invenit, ac deinceps vulnus ut antea cogit. Calculos istos, à Patiente magis habitos, Chirurgus mihi videndo, examinandosque obtulit; quorum primus redditus asper est & superficiei inæqualis, lupini instar compressus, cinerei coloris, itrus splendentibus varie intermixtus, sat elegantis texturæ, gr. viij. pendens. Secundus eorum icilicet, qui secunda vice excisi sunt, major, avellanam mediocrem mole æquat, formaque fere refert, lævis est, pallidus, venulis rubentibus hinc inde pictus; fereque silecem mentitur, cui tamen & substantiæ firmitate multum cedit, & pondere, quo gr. xxvi. non excedit, interior est. Tertius denique postremo inventorum scilicet minor albidior est, colore & substantia tartarum; qui dentibus accrescit, exactè refer, lævis maximam partem, nisi ubi sulcis quibusdam, sanguineum quid ostendentibus, quasi incisus est. Uterque horum ea parte, qua mutuo se tetigerant, detritus est: atque ille in plano ab attritu factò lineolis ellipticis aliquot quasi in totidem laminas sive tunicas, successivè accretas, dispescitur: hic verò in medio detritæ partis punctum quendam globulum ostendebat, qui distracto calculo nucleus crassius, circa quem tartarea ista massa concreverat, esse deprehendebatur. Integer adhuc pendebat gr. xiv. diffractus verò & nucleo callus, vix gr. viij. attolebat. *Gottfriedi Schultzii.*

Fistula sub mamma dextra.

Fistularum pertinaciæ causa unde repetenda ostendunt allata exempla: Pertinacissimæ & tandem tabem inferentis, exhausto totius crure, exemplum mihi occurrit anno 1632. cum eo tempore incumbere cura Medica pauperum Gallorum advenarum, vel urbis incolarum, inter illos commissum habui quendam nomine Bourgeois, Prætoris Urbani Apparitorem, Virum raræ texturæ, anno circiter xxx. natum; Mula illi, bene se habenti, leviter rubebant; vino modice utebatur, in victu temperans; Morbo prehensus utitur calceolari agyrtæ opera, qui antimonio exhibito ipsi ad hyper-

cathartin deducit, unde vir natura debilis ad Orci fauces compellitur: Vix recreatum, pravoque victu deinceps sustentatum, pleuroperipneumonia vehemens adoritur; & qua mæa ope emerit, sed supellite in pectore, sub mamme dextra, fistula, quam præcessit abscessus mihi excitatus, quanquam universam materiam pectore contentam exhaustis videretur libera & liberalis purulenta anacatharsis: Adeo copiosam eructabat fistula sanien, ut illius occludendæ omne concideret consilium: Indito tenui stylo & longo, origo ejus superior esse deprehendebatur & inter musculos pectoris deerrare; qua de causa inito cum aliis consilio, discissa est forfice (quantum alte progredi licuit) secundum longitudinem fistulæ; sed cum ad claviculas usque factus esset progressus, nec exortus pateret; ingressus præterea, ob tortuositatem non pateret amplius stylo, res naturæ committenda fuit, & ului decocti traumatici pectoralis, hyemelitidis forma præscripti, à cujus usu vitam per triennium produxit, Apparitoris officio ad ultimos usque dies functus æger. *Theoph. Bonetis in Sepulchreto.*

Anatomica Inspectio

Fistula insanabilis ex inspectione anatomica.

Filia Pictoris, Nicolai Aliz infecta aliquandiu acerbo lumborum dolore, mox tandem in molestanti lumbis tumore, quæ perenni suo cursu usque eo contumplit tenent corpulculi vires, ut brevi excederet e vita.

Cujus mortis causam inquisitione Anatome, invenit evidentem cariem in costa spuria emittentem continenter in subjectas partes tantum acrioris ichoris, ut illis etosis prodierit inde fistula, ut longa & anfractuosa, sic eludens quancunque opem Medicam.

Quam artis impotentiam non raro quoque videre est fistulis prope anum exortis; Quarum principium excurrit nonnunquam altissime sive ad Lumbos, sive Thoracis vertebra, imo interdum ad ipsas scapulas, quas scopula operta vocat Corn. Celsus; Quibus in locis equidem non semel ostendi fontem remotissimarum & immedicabilium fistularum.

Earum inaccessa caries, quo minus exploretur specillo impedit tortuosius ipsarum flexus; qui etiam remoratur clysteres eluendo ulceri dicatos: Excluditque manum exempturam os intus vitiatum: quo tamen minus mature sublato, tollitur immatura morte homo, & obnix ne à Medico sanetur Fistula à remotiore carie originem trahens: Cuius oras licet forfice diducas & amplies (quod tamen ad cutaneas fistulas summe utile) opera nihilominus ludes, nec pervenies unquam ad remotissimum sinuosorum flexuum principium, à quo descendunt tot ramuli, & tam frequentes rivuli per profundiores musculos ac tendines, ut licet specillum vel dexteræ ne immittatur in tortuosam ejusmodi fistulam, neutiquam tamen attingat, nedum immutet, vel tollat cariem genitam perrennis ulceris causam. *N. Tulpius lib. 3. observ. 18.*

Ex vulnere Thoracis fistula suborta, spatio aliquot mensium pervadens ad capsulam Cordis hujus substantiam ad fibras usque cavitatis absumpsit.

Ex vulnere sterni ad quartam costam sinistra parte suborta fistula in quodam veronensi, cum per aliquot menses eadem laboraret, ad ejus curationem me vocavit; cujus corpore primo expurgato, nulla licet spe salutis, ratione maciei, qua confectus erat, nec non febris & virium imbecillitatis, immixta turunda copiosum pus eduxi, à quo aliquot post diebus syncope correptus æger vitam cum morte commutavit.

Dilecto cadavere, inveni capsulam, & fere totam cordis substantiam ad fibras usque ab ulcere excisam. Videant igitur an contare possit sententia Aristotelis lib. 3. de part. animal. cap. 4. quod cor nullum vitium grave diu patiatur, siquidem hic patiens diu vixit, quamdiu scilicet, ulcus & fistula penetravit ad cavitatem aut ventriculum sinistram ipsius cordis. *Petrus de Marchetti. in observat. Medico-Chirurg. Sylloge.*

FLATUS.

DE iis forsam jam satis in morbis quibus familiarius adjunguntur ac præcipue in *Affectione Hypochondriaca* ab iis *Flatulenta* denominata verum hic rursus pauca.

Hatus, qui intra ventriculum, & intestinorum cavitates plusquam in alia totius corporis parte quavis ageri solent, ad hunc modum produci videntur: dum alimenta in visceribus subacta, & digesta, a fermentis & calore ipsorum dissolvuntur effluvia quamplurima decedunt; quæ si spatium liberum & apertum obtinerent, in auras migratura evanescerent; verum ea membrana conclusa, & simul aggregata vaporum congeriem quasi ventum constituunt; qui intestina læpe inflat, ac distendit, & quæ data via ruens, secum excretionem promovet; conclusus vero tormina, & non raro ventris, inflationem creat. Hatus in visceribus ab alimentorum dissolutione emergentes, simili ritu gignuntur, ac cum Margaritæ, Corallia, aut alia concreta matratio imposita à menstruis suis dissolvuntur: à solutionibus enim factis vapores quamplurimi dimanant, qui si strictius coercerentur, vas continens distendi, aut dissilire cogunt: pariter ab alimenti intra primas vias, sive dissolutione, sive coctione, aut fermentatione, effluvia copiosa decedunt, quæ simul aggregata, ac intra membranas conclusa flatum efficiunt; cujus insuper proventui uberiori causæ quædam aliæ contribunt. Hoc etenim insigniter præstat, succorum non ritè miscibilium collectatio, & effervescencia. Quippe dum humores adventitii: aut ingesta heterogenea ac impriis medicamenta cum aliis intestinorum contentis fermentescunt, à mutua particularum refractione, corpuscula quamplurima decedentia in vaporem aggeruntur. Porro ab ipso sanguine ebulliente cum halitus copiosi ubique decedunt, eorum pars quædam ex arteriis in viscerum cavitates erumpens, flatum aggre-

riem ibi productam auget. Cæterum ad uberiore flatuum proventus amplius adhuc faciunt, viscerum extensiones, & intumescencia convulsivæ. Quippe dum membrana, ob majores spirituum explosiones, & excursus inordinatos plurimum distenduntur, cavitas interna sicut vesica inflata multum ampliatur, proinde ut humoris inclusi portio, intra vacuum illud spatium, velut cucurbitam post flammam extinctam, in flatum rarefiat; qui postea, quando membrana tetanus submitit; cum impetu erumpit, aut proximos subinde intestinorum anfractus tumultuose pervadit. Propter hanc rationem, quando intestini pars aliqua ex phlogosi, aut humorum acrimia decubitu, extensionibus convulsivis fuerit obnoxia, etiam flatus continuo producti molesti admodum evadunt. Cum plurimum à Coli inflammatione defunctorum cadavera aperui, reperi id omnibus cuncta intestina ad summum distenta, & quasi à vento inflata quod proculdubio accidit, non quia flatus primo genitus viscera ista distenderat, sed cum membrana à spiritibus valde irritatis, ac intra fibras ipsorum ex plosis plurimum distenderentur; idcirco ad vacuum implendum flatus illi secundo, & per consequens progignebantur. Propter hanc causam, Tympaniti oriri supra innuimus, & alibi forsitan aliquando fusius declarabimus. Quod itaque in Nephritide, passionibus Colica, Hypochondriaca, & Hysterica flatuum proventus uberrimus esse solet, hi non, uti vulgo fertur, morborum istorum causæ, sed tantum effectus sunt: nempe dum istorum paroxysmis membranarum affectiones superveniunt, atque viscera cava à spiritibus violenter ex plosis intumescunt, hinc spatium inane occupetur, humiditas quadam inclusa in vapores, à quibus fetus emergunt, resolvitur. Quamobrem cum partis affectæ distensio relaxatur, flatus ita ex tempore productus à membranis concidentibus alio propellitur. *Tam. Willis Pharmac. ration. part. 3. sect. 3.*

Flatuum mirifici lapsus.

Nullus fere est morbus, quem non faciat au-
augeat concursu suo flatus; imo, ut semper
in humoribus vitium sit, rarissimum tamen est
ubi non & statim aliquæ sint partes, sed tam
obscure & ita, ut nescias an ipsis humoribus
imputanda sit tantorum tumultuum causa. Ma-
nifestius autem in pruna regione, velut pro-
prio diversorio, imperium suum exercent; est
enim ibi ille intestinorum angulus, in quem
Bilis succusque Pancreaticus & quidquid delu-
per ex poris Oesophagi & Ventriculi destillat,
perpetuo confluunt. Hic statim, ubi male con-
venit humoribus, & læsa hinc inde qualitatum
temperies acrius invicem effervescent, parata
flatuum materia. Nempe alcalina Bilis unde
novis acrimoniæ stimulis & fluore animata,
illam intestinorum hospitam, Pituitam, in bul-
las extollit, quæ ipsæ ut superficiem orbemque
nascæ sunt viscosiorem, hoc magis ab intesti-
na illa vi elastica ampliantur, difficilisque ob-
resistentiam vicendi majorem, discutiuntur. Jam
vero etiam succedens alia post aliam Bilis isdem
armata spiculis fluoreque volatili oleoso, no-
væ usque flatuum moli crescentibusque indicio
symptomati-

symptomatis scenam instruit, doloribus jam fixis, jam vagis, jam acutis, jam crassis & obtusis & serè indeprelensis; tumori jam anodyno, jam sonoro muniureque se & borborygmis prodeunti. nunc etiam subito, nunc lento & paulatim eunti, omnia pro ingenio bilis & pituitæ. Quæ tamen ipsa tam dubiis sæpè indicibus se ostendunt, ut aliud pro alio existimes, & de flatu non temere nisi ex flatu constare possit. Sunt lumborum Chronici dolores duntaxat à flatibus, ea parte, quæ intestinales in duodenum confluunt succi & vehementius mutuo insurgunt, hinc enim spumæ bullæque viscidiores coortæ intestinum magis expandunt fibræque lacerant sensorias. Alligata est hæc in *superis* validis firmissimisque membranis, quæ & ipsæ, ut sunt expansum planum nervæum, & hinc mirificus invicem cum spiritibus consensus, vicinos nervorum plexus facile sollicitant sensumque sui impediunt. Atque ex hoc fonte illi tam sævi ad febrilium insultum initia & grassantis ad ileum organi lumborum cruciatus; hinc etiam dubii illi ancipitesque in colica nephritica dolores, tam immanes sæpè, ut veru se transfodi ægri existiment. Jam verò etiam fixus magisque immobilis efficitur dolor, si in tunicarum intestinalium spatiis unde unde illapsus hæserit flatu, quod in colica Picaviensium accidere aliqui voluerunt, & cujus ego instar in viro quadragenario ex contumaci tandem & immediabili octo mensium osphyalgia mortuo vidisse me plane sum persuasus. Similiter hypochondrii dolores etiam flatu non tam à lienis solido, quam flatuum in angulum istum intestini conjectorum obstinatio mora originem trahere videntur. Nempe obliquius asturgens tenuium illa pars lienem versus acutiusque inde reflexa vel situs ingenuo efficit, ut diutius ibi hæreat, quidquid julto viscosius allabatur, sive pituita sit, seu lymphæ pancreatica, seu bilis, seu denique Flatus. Periclitatur autem quàm maximè hic locus infemini, ut quæ asotia hororumque fructuum ingluvie cruditatibus fermentationibusque flatulentis copiosam ministrent materiam, in illa imprimis corporum per balenatios imo & ferreos thoraces strictura. Equidem, cum succi importunius effervescentes spatium requirant solito majus, in quo liberè se expandere possint, accidit, ut compresso illo hypochondriorum angulo, quem dilatari oportebat, & succi & flatu ibi hæreant & fixa sede novis corruptelis fermentationibusque viam aperiant. Quod si tamen inde dilabantur, in solito se murmure & borborygmis per ventris angustias propulsant. Sanè quotidiano didici exemplo Virgines, quæ corporis integritate Viris se commendare debebant, gulari intemperie & corporis nimia curatura hoc effecisse, ut, negato in illa ventris compressi angustia comæatu, continuo horrendoque murmure & velut arietantium in se spirituum rugitibus, etiam variato subinde per gradus musicos sono vicinorum aures offendisse, non sine suspitione depravatæ validudinis. Jam qui in reliquis inde intestinis ipsoque colo oriuntur dolores à flatibus, vehementes sæpè sunt & funesti. Ubi id quoque notavi. omnes promiscuè abdominis dolores, si acuti sunt cumque tensione conjuncti, pro colicis vulgo haberi, qui

tamen iliaci non raro sunt, & nunc in hypogastrio, nunc sub umbilico, dirissime ægrum excruciant; deinde vix quenquam ex ejusmodi dolore decubuisse. cui non simul inflammatio Intestini, stagnante nimirum ob tensionem in capillaribus sanguine, contigerit. Adeo putandum non est, ita uni Colo inhærescere flatu, ut non in cætera quoque Intestina expatiatur; imo vero, cum effervescenti occasio duntaxat in tenuibus sit, necesse est ex illis lente in coli spatia prorepant, & ob valvulosos cellulososque tunicarum processus, tum etiam seguiorem motum peristalticum, diutius ibi hæreant, tandem quoque ab acescente cum tempore lymphæ fermento ad novam & tumultuariam flatulentiam disponantur, id quod in exquisita colica evenire auguror. puri coli dolores quotidiani sunt & causariis quibusque, tum maxime *emphic* laborantibus, familiares. Quin etiam hypochondriorum illi dolores, quæ colum participant, eo pertinere videntur, ut quos a peculiari illius intestini fermento excitari maximam partem credibile est. Monstrata mihi est virgo annosa variisque exercita morborum radiis, huic duabus plerumque horis post cibos intestina crassa, tam lateralia quàm illa hypochondriis subjecta, à flatulento spiritu adeo tumescere solent, ut imposita manus illam intestini à cæteris partem convexasque & interstitiis ligamentosis divisas cellulas luculenter distinguere possit, subsidente rursus post trium horarum intervallum illo tumore, & complanato ventre. Alius autem erat & planè mirabilis Nobilis Matronæ casus, cui semel iterumque de die, sive jejuna seu saturæ, in tantam subito molem efflati venter solebat, idque serè sine dolore, ut veluti adflata ex æolio antro vaticinari velle videretur; hæc indicibus monita in sellam se recipiebat paroxysmumque unius seræ horæ generosè sustinebat. At nunc quoque qui ventriculi orificio incumbunt flatu, ob nervei ibi plexus subtiliorem sensum, cardiacam sæpè excitant non ante destitutam, quam in ructum eruperint; adeo etiam, quod in suffocatione hypochondriaca conjunctum est animi deliquium, non ante securitatem præstat, quàm exorti identidem flatu ore rejecti fuerint. Nonnunquam verò etiam in ipso ventriculo focus & locus esse flatuum solet, effervescente ibi acri materia, atque tum augeri ventriculum in majus & extra propelli necesse est; emphysema vocant hunc affectum præctici nonnulli, cujus tantam vehementiam in puella quadrienni vidi, ut cartilaginem scutiformem articulo suo, cui tum adhuc dum mollior heret, excusam in alterum latus inclinasset. Ut verò hic quotidie flatu sese exserant, non tamen ita his carceribus contineri possunt, ut non etiam in sanguinem se proripiant, nam & in ipso sanguine concipi eos posse facile inducor ut credam. Vidi ante annos viginti quinque teste & arbitro Celeb. Sylvio, cadaver apertum hominis à multis ventris doloribus pectorisque angustis tandem oppressi, quem etsi iam ante ex flatibus laborasse conjiceremus, sectio t. men rem omnem, manifestè docuit. Primum ergo, ut abdomen aperiebatur, erumpentes ingenti copia flatu cameram scædo atque impudico odore replevere. Intestina deinde omnia hinc inde, ut

fieri solet, turgidula deprehensa, ventriculus quin etiam foras inflatum utrem referebat, adeo ille erat extensus. Et vero perambulasse jam ventrorum regionem videbatur, cum ad novum spectaculum magnitudo cordis vel duabus partibus naturali major curiosos avocaret; itaque, qui polypum hic aut copiosos sanguinis grumos adituros credebantur, ventriculum utrumque omni cruore vacuum, sed a copioso flatu immensum adactum, deprehendimus, imprimis verò dextrum illum, utpote cuius cavitas molliorque partes viscosi flatus luvium facilius admittent; ejusdem ventriculi auricula & ipsa multo flatu tumefacta sociam venam continuata flatuum serie insolitaque tensione luculente prodibat, quid quod toto corpore venæ, etiam coronaria illa, passim flatibus distinctæ nunciam succi purpurei fluidique acri alternationem oculis ostenderent. Virginem etiam vidi, quæ, postquam in frigore tertianæ cum ventris doloribus, illæque a flatu, collectata erat, in valescente deinde calore, universi habitus tumore laborare cepit: & vero repentinum inchoatumque symptomata plurimis veneni suspicionem iniecerat, cum subsidens identidem cum calore tumor a flatu id fuisse luculente indicaret; nam & post quinque cum paroxysmo idem recurrit tumor totiusque remittit; inde etiam quæ primæ regionis vitium corrigerent flatulque discernerent, morbum penitus delevit. De causis verò flatuum toto corpore bacchantium, ut plurimæ ex sint ac diversæ practiceque sitis ventilatæ, mirum est sæpe eas quoque tam leves esse Novi & ostendi jam ante, quibus animi passiones secundam præberent flatuum materiam & in universum corpus diffunderent. Verum id quidem rarum, quod solus decubitus in unum alterumve latus in litio tantam generaverit flatuum & borborum copiam, concomitantibus gravissimis symptomati, cardialgia frequentia Pulsus, & sudore frigido, ut nisi erectio in angulum corpore, & mutato viscerum situ a præsentis periculo liberari non posse videretur; & verò tum & missi ructus crepitusque in speciem cholerae ventriculum & intestina omnino exoneraverit. Jam a voluntate etiam nostra flatul & excitari & regere prodigiosum est; vidi tamen, qui quoties vellent, in os alvumque protrudere flatum poterint. Utrum consuetudo in libidinem versa, an olusinator voluntas, specie animi affectus, bilem illam, flatuum dominam, provocaverit, alii exponant. Mihi satis est exploratum habere, nullos esse tam peregrinos mirificosque morbos, qui non & ipsi flatibus huc vel totos se aut partem sui debeant. *Job. Nicol. Peckhaus in Observ. Physico-Medic.*

De Flatu Furioso.

Temina quædam annorum 50. temperamenti pulegmatico-melancholici, mensum inexpecta, & mater octo liberorum, heri circa vespeream conquerebatur anxietate, palpitatione cordis, vertigine, eamque paulò post excipiente inflatione, vim aliqualem dolore in tibia dextra per dimidiam horam oberrante, hodie mane inflatio illa cum dolore ad sensum proropebat inter serpentis per dorsum ad brachium sinistrum & hora post ad brachium dextrum, mox

ad pedem sinistrum, & ita hinc inde è loco ad locum instar mercurii discurrens totam tandem corporis peripheriam vexat, adeit litis, appetitus depravatus, alvus tarda, urina est quodammodo turbida, pulsus inæqualis, somnus perturbatus, vires absumentur; pejora metuens quaerit consilium.

Omniis in casu proposito enarratis signis probe consideratis, subjectum hoc affectu Arabibus Nakir dicto laborare patet; Latini appellatur flatulentus ambulo, Flatus Furiosus, ambulo furiosus & vareni, nominibus scilicet ab inseparabili affectus proprietate delinatis. Germanis *die Natten, die Faren, die gute Kinder, die gute Helden*. Cum verò definitionis nominum magna sit utilitas, quod ea mediante quaestio nis itatum distinctè intelligamus, ne frustra disputetur de vocibus, affectum nostrum definimus, quod sit inflatio cum dolore varie periodica, a vaporibus subtilissimis vehementissime in variis corporis partibus oberrantibus orta: pro genere proximo igitur ponimus inflationem cum dolore, & eatenus pertinet ad morbos solutæ unitatis. Ratione solius inflationis, ad orbis magnitudinis auctæ, discreta specifice reliquis definitionis verbis comprehensa, subiecti & causæ proximæ denominatione conficitur.

Subjectum affectus nostri duplex facimus, alterum inflationis, alterum generationis: subjectum inflationis dum in definitione varias totius corporis partes constituimus, non tam viscera, quam musculos & vasa intelligimus; generationis subjectum in hoc casu primum est ventriculus cum intestinis & vasa sanguinea. Ventriculum dico, propter vitiosam eius fermentationem, quod vitiosam efficit fermentationem seu concoctionem, cum concoctio proprie nihil aliud sit, quam per fermentationem minimarum scilicet particularum, ex quibus alim. nota constant, solutio. Intestina, imprimis duodenum, propter ductum biliarium & pancreaticum humores suos in id exonerantes, quibus commixtæ cruditates in ventriculo generatæ, idem peregrinam pariunt fermentationem & chyri vitiosum. Secundò vasa sanguinea, quia in istis demum vaporum subtilissimorum elaboratio perficitur.

His nullis, ad Causas accedimus, à quarum cognitione cum teste Divino nostro Coolib. 1. de morb. mul. tota curationis pendeat felicitas, eaque sola sit, quæ verè Medicos à medicamentis distinguat, in eas paulò accuratius inquiramus. Dividuntur autem in immediatam seu proximam, & mediatas, hæcque rursus in propinquiores & remotiores. Quoad immediatam, de ea Doctiss. Sennerti qu. 6. de arthrit. p. m. 81. ita sentiti nostri homines plerumque ad incantationem referunt, & nescio quid nati a incubis dolores illos parere putant, cum tamen dolores tales vagæ causæ naturales habere possint & a flatu quodam acri seu sero acri ex humore ferè scorbutico genito per patres membranosos & musculos vagante, ortum habeant. Ex qua sententia eam eligimus, qua serum ad motum talem celerrimum excitandum nimis sit pigrum, adeoque pro causa immediata vapores subtilissimos & acres statuimus: hi quomodo generentur, partim capite præcedente audivimus, partim inferius, ubi de symptomatibus agemus.

egenus, uberius explicabimus. Causa mediata propinquiores sunt, quæcunque propinquas ad vaporum concurrunt generationem, uti sunt obstructions variaz, inprimis hypochondriorum, particula heterogeneæ cum Chylo sanguini immixta, quæ in eo vitiose fermentescentes ejusmodi vapores producant qui per arterias ad quas vis partes deferuntur.

Causæ mediata re-notioros ex rerum naturalium, non naturalium, præternaturalium, ac supernaturalium classe deumuntur. In naturalium serie primo ex casu observendus venit Sexus, ratio est in promptu, quia uterque sexus peculiaris habet affectus, & ita alter præ altero magis in hunc vel illum morbum inclinat. Siliatur autem sexus femininus; qui ut plurimum vitæ sedentariæ deditus, quæ mater est variorum humorum vitiosorum, dum sanguis non debite ventilatur, concoctio minus rite perhicitur, unde variaz cruditates, hinc flatus, vapores, fuligines. Secundo Ætas, de qua Divinus noster Caus, & multum facit ad facilitatem difficilioremve curationem nosse ætatem, an juvenis vel senex, an juvenula vetula, ut scilicet sciamus, an sit morbo conveniens, qui plerumque non tantum in recessu habet periculi & non tam graviter affligit, ac extra eam contingens, & ut vires inde, cæteris paribus, colligamus. Est verò ægra nostra 30. annorum, quæ ætate sanguis jam incepit vigorem pristinum deponere, variis particulis heterogeneis inquinari, spiritibusque minui, hinc variaz oriuntur peregrinæ fermentationes, unde exhalationes huic affectui generando aptæ. Tercio Temperamentum phlegmatico melancholicum, quod cum humores viscosi & bilis adflascensaburra bilis constituat, cooperantibus reliquis ad hunc morbum producendum maxime est idoneum. Ex Nonnaturalium classe primo examinari meretur Aer, qui variis hoc tempore miasmatis obputredinem matrem nisi omnium, tamen plerorumque morborum auctummalium, viciatus; dum per inspirationem sanguini in pulmonibus ventilando communicatur, variis cæteris concurrentibus peregrinas excitat effervescentias, hinc exhalationes & noster affectus. Hic obiter notandum magnus ille error circa influxum astralem, vel aspectus, uti vocant, quibusdam nimis superstitiose creditos, quippe quæ, astraputo, quicquid etiam virtutis in affectibus flatulentis generandis argentum vivum tanquam ventorum & flatuum patri, Lunæ, ortui Herculis & reliquis ejusdem farinæ signis Astronomi quandoque nimis creduli attribuant, excepto unico sole, nobiscum neque prospera neque adversa valetudine fruentibus plane nullum habent commercium. 2. Cibus & Potus, qui huc quoque non parum forsitan contulerunt, uti sunt varia fructuum genera & novum vinum, ventriculum propter difficilem eorum concoctionem debilitantes cruditatesque ac obstructions augentes. 3. Quies, cui dum ægra nostra obtemperamentum & consuetudinem nimium indulgit, malum fovit. 4. Animi Passiones, tristitia, curæ, moeror, quæ cum figant quasi ac suppriment spiritus animales, coctionis viscera munia sua perperam obeunt. 5. Excreta & Retenta, quæ alias vel peccant in

excessu vel defectu, hic in defectu peccasse videntur, dum in casu narratur ægram nunquam mentes fuisse expertam, & nihilominus esse matrem ocio liberorum, hoc vero naturaliter fieri posse & quotidie fieri, plurima probant exempla; rationem addimus, quod in his sanguis non abundet, sed tantum ejus sit, quantum in aliis post purgationem relinquitur, creditus igitur sanguinem menstruum neque ad conceptionem, multo minus ad formationem vel conservationem esse necessarium, adeoque parum huic nostro affectui contribuisset, vel adhuc contribuere. 6. Somnus Et Vigilia, quæ cum Motu & Quiete convenire censemus, somnus sc. peccans cum quiete peccante, & vigilia peccantes cum motu peccante quoad afflictiendi modum conspirant. Causæ præternaturales sunt obstructions variaz, peregrinæ fermentationes & intemperies massæ sanguinæ. Quoad causas Supernaturales, & diabolium rerum naturalium consultissimum hoc uti & alia omnis generis mala, permittente tamen Numine Divino in corporibus humanis excitare posse, varia apud varios testantur exempla, & quotidianæ, prohi dolor! satis evincunt experientia.

Differentiæ sunt variaz: Alius est hereditarius, alius adacitius; alius sympatheticus seu per consensum, ex. gr. ex obstructione mensium, suffocatione hypochondriaci &c. oriundus, alius idiopatheticus seu per essentiam, ex fermentatione peregrina massæ sanguinæ proveniens; alius mitior seu benignior, alius gravior & quandoque malignus, pro humorum videlicet in corpore peccantium vitio. Hic monendum Clarissimum Blancardum in Lexico suo medico cætera doctissimo arthritidem vagam confundere cum nostro affectu, hos autem affectus valde inter sedifferre probo primo, quia in illa, teste Nobiliss. Willis tom. I tract. de scieb. c. 5. p. m. 56. plures salis fixi quæ congeris e massâ sanguinea huc illuc circa membra aut articulos velut totidem nidos deponuntur & catenus est morbus articularis. 2. quia arthritidis vaga motu est pigrior, quam Nakir, qui vapores pro causa habet subtilissimos & vehementissimos. 3. symptomatibus, de quibus cap. seq. Denique probo autoritate viri Doctiss. Sennerti, qui quæst. 6. de arthrit. p. m. 82. his verbis distinguit: verum morbus hic arthritidis non est, neque enim est saltem circa articulos, sed oritur à flatu seu spiritu furioso & vasis effuso, & per ambitum corporis discurrente. Varenos vero & Nakir esse unum eundemque affectum cum Arabe Albucas. cap. 95. l. 2. Sennerto l. all. aliisque firmiter statuimus. Hæc de differentia.

Sequuntur Signa, quæ vel sunt diagnostica, vel prognostica. Diagnostica ex casu desumpta sunt sequentia: 1. Anxietas, à sanguine ad ascensionem minus apto, qualis phlegmatico-melancholicorum est, ideoque nimiam motam in corde trahente, vel à fermento peregrino subtili & acri cum sanguine ad cor delato, ipsiusque fibras & nervos sexti paris leviter afficiente. 2. Palpitatio cordis, à sanguine viscido & terrestri ope fermenti ante dicti taresfacto, adeoque majus spatium occupante, unde cordis ventriculi valde dilatantur, & spiritus co-

nondum bene respondere videatur & appetitus adhuc sit deprivatus, ad depravatam ventriculi fermentationem & humores vitiosos tanquam causas, placet educendos ac corrigendos mane sequentes calibeantur pilula:

℞. Magist. jalap. Extract. helleb. n. à gr. v. M. tart. schrod. de amron. Q. 4 gr. vii. M. P. Pil. num. xv. deaur. D. S. *Carier. Billen. pro vehiculo.*

℞. Aq. petros. Card. B. scorzon. à ʒi. D. S. *Raffer ut den Billen.* Tum ad confortandi. progrediendum, quorum formula sit talis:

℞. Aquam cium. ʒi. sp. lumbr. terr. ʒi. Tinct. bezoard. oii. pareg. Excell. Dom. Præf. ʒi. sirub. cium. ʒi. confect. elkerin. incomp. ʒi. M. D. S. *Præf. tunc. d. von ein Löffel voll, ut nehmen.*

Tandem externa quoque spirituosæ, discutientia parti affectæ applicari possunt; uti sunt sp. lumbric. terrestr. sp. fornic. pinguedo castor. oleum still. anethi, carv. camm. tznic. &c. quæ vel sola, vel varie composita pro ratione status adhiberi possunt, hic formula sequentem præscribere lubet.

℞. Bals. perum sp. lumbric. fornic. essent. p. ʒi. olei circulari ʒi. still. anethi, carv. an. ʒi. M.

Harthmannus in Praxi commendat in ignem umbilico impositum ad flatus expellendos, sed Excellentissimo Praxidi experienti eventus non respondit, alii unum vel alterum granum Zuberli cum bombace umbilico imponunt, sed hic cautela opus est.

Cum vero teste Galeno de Theriaca ad Pamphilianum, nullum tam validum in Medicina sit remedium, quod ex se ortum auxilium inducere possit, si resistatur ab iis, quæ circa dictam sunt, aut ab his non adjuvetur, non immerito eius ratio habenda, in quo puncto prudens Medicus facile noverit, quæ sursum erunt partium. *Ioh. Michael. in Praxi Clynica speciali.*

FLVOR ALBVS

Proter sanguinem quem naturaliter genitalia muliebria plorant, etiam interdum excerni solet liquor serosus ac pituitosus in affectu scilicet qui vocatur *Fluor Albus*. A quibusdam appellatur gonorrhæa muliebris. ab aliis vero hæc duo tanquam distinctissima à se invicem separantur.

Est scilicet Excretio colluviei variz per genitalia. dum nunc humor pituitosus, crassus & mucosus, omne aquosus & serosus effluit, isque interdum paucior, interdum copiosior, interdum acris est, salinus & mordax, interdum vero benignus, mitis & blandus. Albus quidem ut plurimum, interdum etiam flavescit, interdum viridescit, interdum alio vitioso tinctus est colore.

Inodorus est ut plurimum, rarius solet esse graveolens & fetidus, nec solet esse fere calis nisi simul exulceratio quædam conjuncta

sit ex qua purulentia fetida tunc simul excernatur.

Occupat hic fluxus omnis ætatis & omnis status famellas, tam virgines, quam maritatas: Virgines, inquam, illibatas adhuc & innocentes.

Alium namque est quod quidam putant, hunc fluxum iis non convenire, nisi quæ jam virum passæ fuerint. Testantur namque observationes etiam puellas octennes ac novennes, quæ nunquam menstruum fluxum, nec virum passæ fuerunt, huic ipsi fluori albo fuisse obnoxias.

Vnde etiam hic Fluor albus longe aliud vitium est à mensium decoloratione, cum æque menstruatæ & non menstruatæ affligat, tam quæ nunquam adhuc menstrua viderunt, quam etiam quibus jam lege naturæ menstrua non amplius fluunt: Et quidem has posteriores quibus menstrua cessant familiarissime affligit hic fluxus: Rarius verò virgines aut puellas innocente, polluit; quin & gravidæ afflixisse observatum fuit.

Typum, aut periodum certam hic fluxus observat nullum: sed nunc continuus, nunc interruptis; sed variis vicibus recurrit. Circa menstruationis legitimum tempus tamen copiosius & uberius icaturit.

De hoc affectus ejusque materiæ & causis; libere quæ sentiam proponam: nam à nemine adhuc ejus natura legitime producta fuit & explicata.

Dico ergo hunc fluxum album nihil esse aliud, quam gonorrhæam muliebrem, nunc veram nunc notham, analogam scilicet gonorrhææ virili, dico analogam non verò eandem.

Hoc negotium per se pateret si ex veterum hypothese, mulieris intestibus semen elaborare, illudque in uterum & tandem in vaginam effundere, statuere vellem; sic enim qualis esset gonorrhæa per se pateret.

Sed quoniam huic sententiæ minorem fidem tribus; (scilicet seminis generationi in testibus muliebribus) Quin potius testes muliebres ovarium muliebrem dicam: ob id hic Fluor albus, seu gonorrhæa alio modo explicanda venit.

Hoc ut pateat certum est feminas in coitu sensibiliter; idque cum insigni voluptate aliquam materiam excernere; Hanc hac vice materiam seminalem vocabimus. Testantur autem hanc excreationem ipsæ mulieres quamplurimæ, si scilicet viri voluptuosos gaudeant amplexu. Vnde autem excernatur, & qualis sit, hic quaestio est?

Respondet Hornius, Batavus iste anatomicus jam defunctus, in prodromō epistolico de partibus mulierum generationi intervientibus ad Kolsinekium misso, quod mulieres quamquam talem materiam voluptuosè in congressu excernant, hæc ipsa tamen non ex testibus effluit, sed quod ex glandulosâ osculi uteri interni substantiâ per multos minutosque meatus, exprimitur ac eliciatur, idque beneficio spirituum per arteriolas & nervos effluentium. Hanc Hornii assertionem, ut ut anatome nondum omnibus oculariter demonstratam, admodum tamen probabilem arbitror.

Nam maxima voluptas muliebris venerea, partim in earum clytoride ex dulci ejus à membro virili fricatorio motu, partim circa istud

riticiū uterī internū ab liquoris modo dicti expressione percipitur. Vnde glandulosam istam orificiū uterī internam substantiam proflatis glandulosis & spergiolis virorum in radice penis quodammodo analogam ætimo. Præter hanc materiam, seu lympham veneream (ut sic dicam) cum ex glandulis excernatur, circa orificiū uterī internū, aliud est adhuc salivale humor, ut apposite cum Rhodius in mentis. observ. anatomi. observ. 53. qui in congressu maris pubem irrigat, & per binas lacunas juxta muliebris pudendi labia itas exiit quæ lacunæ observabiles sunt imprimis in vivis mox post congressum: in defunctis vero cum arte conveant, vix observabiles.

His præmissis dico, liquor iste qui in fluore albo emanat, excernitur tum per orificiū uterī internū glandulosum, & est vel ista feminilis materia turgescens quam mulieres in coitu excernunt, vel est alius quicumque humor, qui per loca ista transudans, aut transcolatus ex universa massa sanguinea ejiciatur. Prius si fiat, est gonorrhæa muliebris vera; posterius vero si contingat, gonorrhæa muliebris notua, sed benigna.

Observanda enim est differentia in hoc fluore muliebri, dum alius est levior in quo lymphæ pauca, id quæ non adeo frequenter, aticans & nonnihil glutinosa, excernitur, sine eo ut corporis gravius vitium, aut labe ejus insignior sit adjuncta: Est quæ gonorrhæa vera in qua solummodo istud orificiū uterī interni est affectum.

Alias fluxus est copiosus, continuus, ubi multa varia, serosa varie colorata & similia ubertiori rivo excernuntur, concurrunt quæ tunc simul cachexia, seu levio phlegmatia totius corporis: interdum accedit tumor pudum, torpor actionum, flaviditas membrorum, & quæ sunt hujusmodi alia concurrentia symptomata: Et hic posterior fluxus est gonorrhæa notua, vitio massæ sanguineæ totius cachectico pronata, orta imprimis remotè ex vitio stomachi aberrante circa chylicationem. Accuratè præcæris differentiam noniorum fluorum harum observat Hærnius, dum priorem fluorem vocat fluorem uterinum, tanquam qui solummodo ex uterī orificiū vitio accidat; posteriorem verò vocat profluvium muliebre, seu tale quod ex tota muliere effluat.

Plura quæ ad cognitionem huius affectus faciant qui cupit, is videat Høstetter. decad. 4. obs. 1. in schol. Post Høstetter. videat Schneiderum lib. 3. de catarrh. ubi inse & prolixè historiam huius affectus, cum primis ex aliis autoribus declarat in integro cap. 8.

Causam ergo quod attinet fluoris primi, seu gonorrhææ veræ, est materiæ istius feminilis copia & ubertis, aut ejus spirituosior turgescencia, conjuncta cum aliquâ laxitate orifici istius uterī interni: unde hoc dilabi ex se faciliè permittit, accedente imprimis coitus consueti ad tempus intermissione, aut ingenti coeundi, tam in maritatis, quam virginibus desiderio, imprimis ubi adest simul laudabilis victus ratio, vita sedentaria, curis ac meditationibus vacua, & quæ minùs gravibus turbata est animi affectibus.

Posterioris verò fluoris, seu gonorrhææ no-

thæ, causa proxima est laxatio istius orificiū glandulorū ejusque flacciditas, seu tonus utrumque glandularum ita æsus & laxatus, ut per eas nunquam per emunctorium quoddam universale excernatur mucus seu chylus erudus copioso sero acri dilutus, idque eruditatibus, ut dico, massæ sanguineæ vitio stomachi pronatis: tunc enim transcolata in juvā odii liquandina, per illud orificiū nimis laxatum & glandulas resolutas, quasi continuo in odore plorant istæ nymphæ, quæ alias potius aridis gaudent.

Unde in talibus est habitus perfecte cachecticus, ac potius perfecta quædam levio phlegmatia. Hinc tumores pedum, appetitus venereus dejectus, & similia concurrentia symptomata, manifestè se exhibent in talibus famellis.

Quod autem in specie per hunc locum effluat tale sanguinis liquamen, in causa est laxatio & quasi resolutio istius orificiū interni. Unde præter alias causas remotas, etiam partus difficilis, aut abortus, in causa interdum est ut oriatur talis fluxus, ex nimia distensione aut laceratione, aut aliâ læsione istius orificiū uterī interni glandulosi.

Hæc quoad theoriam huius affectus. Quod attinet signa. Fluor albus ab ista famella ægra sponte manifestatur: Et quidem imprimis distinguendus est fluor, qualis scilicet sit, gonorrhæa an vera, an vero notua? Nam ubi fluor est gonorrhæa vera, tunc fluunt pauca moderate, citra ullum acrimoniæ sensum, & talis gonorrhæa vera, seu fluor citra insigne incommodum petdurare potest, sin vero copiosa, aut acra, aut decolorata etiam, aut similia effluant cum cachexia corporis, vitium prostratione, omnium actionum torporis &c. gonorrhæa notua talis, fluor albus esse solet, qui & ubi acrior simul concurrat lymphæ, tum febris nocturna, seu vespertina, quasi catarrhalis tales foeminas affligere solet, scilicet febricula quædam lenta, imprimis vespertino tempore acerbans, simul solet concurrere.

Prognosis quod attinet; præter alia mala infæcundas & steriles solet reddere foeminas hic fluxus. Denique præter cachexiam, quam auget, hydropem, item uterinum prolapsum, vaginæ uterī exulcerationem & tandem mortem inferre solet.

Rarum interim est quod refert Ballonius lib. 1. consil. 59. de fluore muliebri continuo suppresso, qui exinde mutatus fuit in diabete lethalem.

In juvenculis facilius curationem admittit hic fluxus: in vetulis vero via est ad mortem: ut ut in genere difficilius curari soleat, & imprimis sedula medicamentorum continuatione opus habeat.

Ubi ergo fluxus hic est de natura gonorrhææ veræ, tunc quoad curam, assumenda est materia seminalis, & adstringendæ sunt partes uterinæ nonnihil laxiores.

Una ex optimis curis est copula cum viro: quæ in viduis & virginibus deficiente, sequentia sunt usurpanda; alias in gonorrhæa virili ex turgescencia, aut acrimonia nimia seminis, sunt in usu v. g. succi citri ʒij. singulo mane usurpanda; sicuti etiam mala citria & limonia crebrius usurpata conducunt, imprimis ubi cum ipso fluxu titillatio quædam, aut pruritus ad venerem fuerit

fuerit conjunctus; sed continuanda sunt hæc.

Folia & flores, seu cimæ salicis, decocta in vino & potata crebrius etiam hic conducunt; mentha & urtica mortua flore albo injicienda cerevisiæ, & ita potus hauriendus. Nam hæc urtica mortua, seu galeopsis flore albo præ aliis in gonorrhæa muliebri tam verâ quam nothâ convenit.

Terebinthina in ovô sorbili, vel in aquâ flor. salicis omnis mane assumpta conducit. Tanquam efficax & expertum commendatur sequens decoctum.

℞. Rafum. rad. glycyrrh. ʒvj. sem. myrtillor. coriandr. præparati plantag. viticis s. agnicastiana ʒj. papaver. alb. ʒij. hyosciam. ʒss. hord. mund. M. j. acaciz, sumach ana ʒj. Contusa coquant. in aq. chalyb. pro fʒ. iʒ. addendo postmodum trochiscor. de Alkekeugi ʒj.

Præter dicta, pulvis mandibularum lucii piscis à ʒʒ. ad ʒj. usurpatus & continuatus ibidem conducere solet: Trochisci etiam de terra sigillata item de succino: ipsum succinum præparatum & similia etiam sunt usus laudati. Externe balnea ac somenta adstringentia pubis regioni sunt admovenda, quæ inter imprimis est balneum, seu somentum factum ex cortice radicem prunorum sylvestrium, cortic. lign. guaiac cum alumine in aqua chalybeata, adjecto paucō aceto, cocta.

Quod verò attinet gonorrhæam notham, seu fluorem album posteriorem & deteriozem; in hac curanda 1. stomachi chylinatio emendanda per vomitoria administrando tunc experta stomachica. 2. sanguinis cruditas & cachexia corrigenda per salina vol. oleosa & aromatica. 3. Ipsi fluori specificis resistendum, partibusque læsis adstringentibus & nervinis est succurrendum.

Vomitoria imprimis sunt egregia, repetenda etiam ubi necessitas postulat. Purgantia circumspicte sunt usurpanda, ne angeant potius fluxum, quam vomitem subtrahendo eundem imminuant. Autore enim Platero observatum fuit, quod purgantibus fluxus talis interdum fuit excitatus, in his quæ alias eundem nunquam passæ fuerunt. Caute ergo usurpanda hic purgantia per inferiora, aut omnino omittenda. Ubi vero necessitas postulat eadem, maritanda sunt imprimis rhabarbaro, ut hujus adstrictione relicta, emendetur inducta à purgantenoxa. Unde species diarturbith cum rhabarbaro insigniter commendantur ab Helidzo Paduano. Juxta pulverem jalappæ, etiam ejus resina, quatenus cachexiam sanguinis emendat, conducit. Sic ex helleboro nigro ejusque extracto cum mercurio dulci conveniunt laxativa.

Item bryonia adpropriatum, ubi necessitas postulat est purgans, quæ omnia laxativa colocynthide sunt acuenda, extracto trochisc. alhand. Potiora sunt sudorifera quæ tuto usurpantur non minus quam diuretica in specie terebinthina. Sic namque Fonseca lib. 1. conf. 21. pro derivatione ad urinas commendat & laudat hoc.

℞. Terebinth. ʒʒ. pulver. corall. rubr. bol. armen. ana ʒʒ. M. sumat jejunè bis in septimana in convenienti ventriculo. Unde etiam Kiverius tanquam utile commendat pilulas ex terebinth. cum rhabarbaro efformatas.

In specie verò ad corrigendam cachexiam simulque inde oriundum fluorem album, si quid aliud expertum specificum est rosmarinus ejusque decoctum sane expertum est ad sanandum fluorem album. Hoc namque decocto rosmarini solo semper felicissime se fluxum muliebrem album restituisse retert Lindanus in suis practicis: & credo quòd verum sit, est namque elegantissima plantula utrumque rosmarinus. Sunt qui adjungunt folia melissæ & menthæ: ex quo ternario medicamenta quæcunque continuato usu administrandamoneo.

Conveniunt etiam alia ad cachexiam appropriata, ut sunt v. g. radix galangæ, cyperi, caryophyll. item major menthæ; etiam vulneraria, ut alchynilla, agrimonia, veronica, bacca lauri, quibus adiungenda adstringentia & similia, in specie viscus quercinus est commendatus pro hoc usu. Hinc Panarollus in Pentec. 2. obs. 48. laudat decoctum muis pineæ jam ligno visci quercini, quò decoctio sæpius hausto, tanquam mirabili & experto remedio in hoc morbo curando se visum fuisse asserit.

Hinc rad. filipendul. tormentill. Sigill. Salom. angelic. & similes conducunt. Sclarea, quam vulgo hominum odoratum, item gallitrichon vocant, est singulare specificum in fluore albo quacunque ratione usu patâ, in specie si infundatur vino, & crebrius hauriatur. Sic etiam Corbejus de morb. mulier. item Stockerus in sua praxi, recensent quandam mulierem, aliasque albo fluore affectas per hoc unguentum curasse.

℞. sclaream, contundatur & aliquantisper putrefiat, in butyro postmodum coquatur aliquantulum, coletur & servetur pro usu: quò unguento mulier ab umbilico ad interiora usque sedulo perungatur, & tiam ipsum unguentum per pelloſos vulvæ applicetur; qui pelli commendantur etiam de hac ipsa herba ut facilius succedat experimentum. Commendatur etiam ad compescendos omnes post partum dolores. Post sclaream optimum est lamium album s. galeopsis flore albo, species urticæ mortuæ; cujus aqua conserva decoctum in vino usurpatum, mire conferunt.

Vidi certe aliquando cum essem adhuc sub informatione D.D. Michael. quòd genorosa femina diu & contumaciter hoc albo laboravit fluxu. ita ut aliis quam plurimis in cassum adhibitis remediis, tandem accessit ad decoctum hujus galeopsis curata fuerit.

Post hanc etiam melilotus albus, item plantago cimæ rubi idæi, equisetum, hyssopus & majorana laudantur.

Horum simplicium flores, specialiter nymphi alb. item bellis flor. alb. ejusque conserva, diutius continuata certo fluxum album sistere prædicantur.

Lignum lentiscinum, guaiacinum, in specie saslatras commode, ubi placet simul sudores movere, usurpatur. Modus utendi est satis cognitus. De aromatis nihil dico, quoniam oratione cachexiæ per se commendantur, quæ inter in specie est galanga, item anthophylli. Porro vinum in quo extinctum est aurum tanquam experimentum laudatur tam à Foresto, quam à Corbeio. Lac chalybeatum cum bold Armena mistum crebrius usurpatum in lascivioribus

ribus in usu esse solet. Essent. lign. tinct. coral. salisfras & similia per se sunt nota. Hisce porro etiam adiungenda sunt maxillæ lucii piscis calcinat. cranium, seu caput caponis exsiccatum & pulverisatum. Item tuber ustum ad 3i. fuit experimentum Helidæi Paduani. Præ cæteris succinum album, ossa sapiæ præp. trochisc. de carab. chrystall. præp. ostiocolle, alum. plumosum, item lapis amianthus, putamina ovorum calcinata post exclusos pullos; item ebur sine igne præpar. sunt commendati usus. Timæ; namque experimentum ad fluorem album componitur ex magisterio ostiocolle ad 3ß. misto cum carneolo præp. ad 3ß. quæ à 3i. ad 3ß. in aq. rori. mar. vel conserv. rorismar. propinanda sunt Aliam paululum descriptionem his ipsis tamen primario ingrediendientibus, habet idem Timæus in casib. p. 214. Quid autem per magister. ostiocolle. intelligat, ut verum fatear. nescio, nisi ostiocolle præp. intellectum velit. Est enim ostiocolle substantia adeo singulariter dura, ut neque in igne calcinari, neque per quodamque menstruum corrosivum dissolvi, & in magisterium redigi possit. Erit ergo intelligentia ostiocolle præp. Ex qua etiam Tachenius venetiis, ut obiter moneam, præparat. remedium singulare contra casum ab alto, item contra febres quascunque. Lapidis amianthi, seu aluminis plumosi pulverem Boëtius miscet cum aqua vitæ & saccharo, & ita patienti propinat eundem tract. de gemmis. Alia per se cognita libens omitto. vitellum ovi in aq. rosar. dilutum propinatum & iteratum superius ex Amato Lusitano commendavi in fluxu rubro, seu menstruis nimium fluentibus. Idem ad fluxorem album commendat albumen ovi aqua rosarum concussatum & ita repetitis vicibus usurpatum: hoc ipso enim se & fluorem album & etiam gonorrhæam curasse asserit. Efficacius erit si aliquot mastichis grana huic albumini ovi adsumendo adjungantur. Externa remedia quod attinet, conducunt imprimis thermæ artificiales ex sulphure & alumine cum adstringentibus & uterinis parandæ, v. g. cum plantag. salv. matric. artem & similibus cinis nucleorum jugland. cum vino mistus in uterum injectum mirifice fluxum hunc filtrere asseritur. Alias suffitus ex thure & mastiche, item ex gumm. juniper nunc mochas. succino & bdell. est egregius. Suffitus salve infundibulum exceptus est secretum Corbeii. Fortus ventris inferioris & pubis cum decocto vineæ pervincæ adstringente cui additum sit alumen, laudatur à Foresto.

Præter has gonorrhæas, seu uteri fluores est adhuc muliebris gonorrhæa notha, maligna seu virulenta. Hoc est fluor muliebris gallicus à contagio maligno veneris oriundus, & ex ulcerationem cujusdam partis internæ, aut in vaginâ, aut in orificio uteri, quin etiam exulcerationem ipsorum testium muliebrium insequens. Panarolus observavit namque vomitum seu ulcus clausum in unoquoque teste muliebri in muliere quæ ex gonorrhæa gallica cum gravibus doloribus mortua fuerat. Hæc ipsa tamen gonorrhæa maligna minus confundenda est cum nostra gonorrhæa seu fluore albo, de quibus modo loquuti sumus. *Michael Eithmulerus in Colleg. Pract. special. de moro. viror. mulier. &c.*

Vix à solo utero procedit tantæ colluvici serosæ effluxus, sed liquidum illud excretum secedit à toto venoso genere. Ideo siccand. absorbendi & divertendi ichoris, maxima & continua est habenda ratio.

Hoc symptoma, quemadmodum gonorrhæam, præsertim virulentam, potius detergendo, quam adstringendo, averruncare soleo; & sane tutior est via, ne præsidio inclusus hostis deinceps ferociat & ulcus faciat in renibus, vesica, utero, in quo sæpe cancer hæc de causa generatur.

Ad peccantis materiæ evacuationem & diversionem facit, (1) vomitus sæpius provocatus; aliquando, raro tamen, per validiora Emetica, ut sunt Antimonialia. Vitriolum album astringente roborat, & villos ventriculi firmat, neque impetuose movet per inferiora, ut sæpius Antimonio contingit, (2) Sudoris provocatio per diaphoretica potens est revulsivum. (3) Per via urinæ evacuatio electiva peccantis materiæ maxime est ad derivationem momenti. (4) Cauteria etsi laudentur à plurimis, tamen non sunt adeo insignis effectus, nisi manifestæ fiat à capite deluxio: tunc applicentur collo, humeris, brachiis. Vel ruentis in Uterum ichoris quærat divericulum & declive emissarium: Et tunc internis coxis quatuor digitis supra genua inurantur, (5) Purgatio etiam hic locum habet, per quam ducatur satis potenter tenuis humor, idque sæpius repetitis vicibus.

Quod ad medicamentorum stadium decurrendum attinet, convenientissimus erit ordo sequens.

Quemadmodum morborum fere omnium longissimorum primus est focus in ventriculo, sic primum illud est in eorum curatione, ut universo corpori prospiciens culina primo everratur, & superfluitatum collectio quotidiana pene inevitabilis diligentissime præcaveatur facile vomitum sors felix est, quippe per istam evacuationem antecedentium causarum incrementum antevertitur, earumque in conjunctas impeditur transitus.

Sequatur Vomitus purgatio, quæ absolute necessaria est (etiam sæpius repetita) antequam ad detergentia & sudorifica fiat transitus, quæ immediate Catharticis debent succedere.

Purgantium formulæ.

℞. Terebinth. Venet. aq. rosar. ad albed. lot. 3ii. pulv. rad. petrosel. glycyrrhiz. & rhabarb. ana. 3i. camphor. gr. iii. m. f. bolus sumend. è cochl. cum syr. violar. hor. 4. ante prandium quatuor matutinis consequentibus.

℞. Mass. pilul. coch. min. 3i. pulver. calomel. gr. xv. ol. anisi gutt. ii. M. f. dosis sumend. post bolos dict. Pilul. hæc sæpius repetantur prout vires ferant.

Hydragoga fluori huic convenient: viz Mechoacan. Jalap. ejusque resina, Scammonii resina; Elaterium aliis catharticis, ut pilul. aggregativis, permixtum ad granum unum & alterum; Iris Florent. ad 3i. cum resin. Jalap. vii. ad x. aut resinæ scammon. gr. v. Semen Ebuli. Gambogia, &c. Observando semper ut die purgationis circa horam somni cardiacum aliquod ex confectioe alkerm. lap. bezoar, magister. perl. & corall. exhibeatur.

Notatu dignum est in hoc affectu tantam haberi debere feri rationem (quippe cuius copia in venoso genere fluctuans; morbum fovet) ut ei evacuando strenue sit incumbendum.

Corpore probe per sedem purgato, utilissimæ sunt ad everrendum & roborandum aquæ Minerales ferri & vitrioli virtutibus turgentes, quales sunt Tunbrigenfes; quæ si desint, licebit ejusmodi arte parare. In corpore pituitoso, ubi magis siccandum; aquæ Thermæles sulphureæ bibantur.

Diureticorum hic locus est, quæ sint huiusmodi.

℞. Raphan. per taleolas sect. ℥ij. sacchar. cand. ℥iv. crystal. mineral. ℥ij. Misceantur in paropide argentea, & excipiat liquor ad usum.

N. B. Hic liquor valdè foetet, præsertim cum nitro, ne nauleam moveat.

℞. Rad. apii recent. ℥iiij. rad. petrosel. taraxac. asari ana ℥ii. alkekeng. cerat. ℥j. Infund. loco tepido per hor. 24. in ℥vii feri lictis recent. clarif. deinde f. ebullitio ad ℥v. consumption. Colatura f. per manicam, in qua dissolve liquoris prædicti ex raphano ℥iiij. Mf. pro 4. dos. sumend. bis in die, superambulando, per octiduum. Vel satius forte fuerit mane tantum istud diureticum exhibere in majori quantitate, ne si paulo post vel inter passus detur, coctionem præcipitet, & cruditatibus venas oppleat. Tunc ℥vi. ut pro duabus doibus, & addantur tantum ℥ij. liquoris ex raphano.

Dum diuretica exhibentur, injiciatur Clyster mihi fluat alvus per se, quod vix fiet, alio diverso sero.

Nota, cum hoc malo sæpius complicari Gonorrhæam vel simplicem, vel virulentam; utraque tractanda erit juxta proprias indicationes detergendo strenue & indefinenter, sed gradatim quoad gradum virtutis remedium, & tandem sistendo & astringendo sive assumptis sive injectis.

Detergentibus succedant sudorifica, quibus utatur agro pro *dispositio* modo, per septem vel plures dies.

℞. Antimon. diaphoret. Hart. man gr. xij. lap. bezoar. gr. viij. conf. flor. veronic. ℥j. dialcordi. ℥j. Mf. si bolus sum. mane superhaulto seq. liquoze.

℞. Aq. stillatit. card. bened. & Mariz scabios. ulmar. ana syr. veronic. ℥j. syr. veronici. ℥vj. Mf. f. dosis cum guttis sex sp. Vitriol. Provocetur in lecto sudor superpositis stragulis atque (ni alias satis manaverit) ad pedes appositis lagenis aqua calida plenis.

Interim victus sit parcior, & nisi rite fluat alvus, provocetur clystere.

Cerevisia medicata diaphoretica talis sit.

℞. Sarsæ ℥ij. rad. chin. ℥iij. rasguaiaci ℥i. sassafr. ℥vi. vidorum abietis resinof. ℥x. rad. pimpinell. & tormentill. ana ℥iiij. sem. bardan. ℥iiij. sem. coriand. præp. ℥v. veronic. mar. & sanic. sicc. ana m. j. Omnia contusa & concisa crassiuscule, dividantur singulis lagenis lapideis ℥viij. capacibus, affudendo cerevis & bene obturando vasa. Post infusionem sufficientem bibatur cerevis. pro potu ordinari. in pastibus & extra passus.

Vel. ℞. Sarsæ ℥xvi. rad. chiu. ℥viiij. rad. si-

lic. foem. ℥xii. rad. asperag. fenicul. rusci ana ℥iv. santal. alb. & rubr. ana ℥iij. rad. symphyt. maj. ℥vi. ratur. ebor. C. C. dentis equi marin. ana ℥iiij. summit. Archangel. alb. cum flor. soi phiz, hermariz, lysimach. purpur. ana m. iij. pilosel. auricul. mur. ana m. iij. agrimon. ceterach, cuscutz meliss. ana m. iij. nuoc. moschat. ℥ij. squamz terri quater in vino Hispan. extinct. & in prophyriz. levigat. ℥xv. Sicca omnia, concisa & contusa includantur sacco e tela rara, qui pendeat in Alæ generos. galon. decem, sinatur heri fermentatio ad perfectam usque depurationem. Liquor limpidus includatur lagenis lapideis, quæ apprimè clausæ servantur loco subterraneo.

Vel loco dictæ decoctiones vulnerariæ & siccantes mane sumantur.

℞. Rad. chin. ℥ij. fol. veronic. maris, alchymill. bugla, prunellæ, pilosell. millefol. agrimon. ana m. j. ros. rubr. p. ij. santal. citrin. ℥ij. lign. Rhod. ℥vi. f. decoctio in f. q. aq. font. chalybeat. Colaturam clarificatam levi coctura redige ad ℥viij. pro 4. dos. matutin. Dulcoretur paucis saccharo. Continuatur hujus usus per 20. dies.

Quoad victum. Cibi sint boni succi & cocti faciles; carnes assatæ potius quam elixæ; panis bene coctus, bene fermentatus, sale modice conditus, additis seminibus paucis anisi & coriandri, postridie coctionis saltem comedendus. Vitentur lacticia, sorbitiones multæ; potus largus, fructuum abusus præcipue *apianus*. Vitentur etiam pingua, mellita, saccharata, pisces mucilaginei & molles; si quos appetat, sumantur durioris carnis, sive marini sive saxatiles. Abstineat etiam ab acetariis, salis, piperatis.

Violenta ne sint exercitia, quæ lumbos præsertim fatigent. Pessima animi pathemata, ita & moeror, cane pejus & angue fugiantur.

Quoad sistentia, videndum ut tempore idoneo exhibeantur, id est ultimo; metus enim est ne à refluxu materiæ in viscera, gravitis incommodum suboriat. Hoc que incommodi habent astringentia, quod obstructions augent, vel generant, & alvum astringunt.

In Sistentium censu primas tenent succinam, radix symphyti maj. tormentillæ, flor. lysimach. purpur. santalum album, camphora tenuitate valde penetrans, & aëreâ atque ignea vi insigniter siccans, & agens in partes generationi dicatas, in quibus odore solo semen consumere perhibetur.

℞. Conf. ros. rubr. ℥iiij. conf. flor. Nenuphar. utriusque, Lysimach. purpur. bugloss. ana ℥j. myrobal. condit. cortic. citr. condit. ana ℥vj. magister. perl. & coral. ana ℥ij. rasur. C. C. ℥v. succin. alb. præp. ℥iiij. off. de corde Cervi ℥vj. spodii Ca. ad albed. usq. ana ℥ij. croci Martis aperient. ℥ij. Mf. & cum syr. cort. citr. f. Elect. de quo capiat æger instar jugland. mane & vesperti longe a passu.

Vel. ℞. Conf. ros. rubr. flor. lysimach. purpur. archangel. alb. veronic. rubr. salv. ana ℥j. crystal. Martis ℥ii. Mf. & cum syr. moror. rub. Idæi & sapâ cydon f. Electuar. de quo capiat a ℥i. ad ℥ii. quotidie mane. superhaulto vini albi momento per plures hebdomadas.

Crystal. Martis. ℞. limat. ferr. puriss. q. v. cui

instilla paulatim & successive oleum sulphuris, donec nulla huc ebullitio. Affundatur aqua pluvia distillata, f. dissolutio; hanc filtra per chartam emporeticam, eique sp. vin. permisceto: Crystalli intra paucas horas decident ad fundum, quos in charta siccatos reponito ad usum.

Quæ aborbendo sistunt, siccitate pollent & terrea sunt substantiæ, viz. bolus, terra sigillata, Lemnia, creta, interior pars alba & mollis concharum ostrearum, mater perlarum, testæ & chelæ cancrorum, oculi caneri, ovorum testæ coral. alb. (præsertim in fluore albo, ut rubeus in rubro) perle. C. C. calcinatum, ossa omnia, præsertim humana, calcinata ad summam albedinem.

Crocus Martis corallinus, qui sit ex vitriolo Martis ad summam albedinem calcinato, ad summum astringens in omni fluxu.

Sistuntur etiam tenuium humorum effluvia eorundem in crassatione live congelatione, quæ procuratur ichthyocolla, gum. tragac. spermate ranarum (non bufonum) idoneo tempore collecto & diligenter exsiccato citra adustionem, ita ut possit in pulverem redigi; albumine ovorum itidem deliccato; mucilaginibus sem. psyll. cydon. præsertim autem nenupharis, ubi gluten est copiosum, Fit gelatina ex lacte & ichthyocolla, additis pulveribus subtilissimis, sandali albi, C. C. calcinati, spodii; additur parum sacchari & concinnatur ferculum non ingratum: potest addi aliquid cinamomi. Est in fluore albo efficax, si bis in die ad uncias duas ad nunc de ore etur longe ab alimento.

Pilulæ hæ specificæ sunt. ℞. Succin. alb. præpar. sandal. alb. ana ʒss. C. C. calcin. ocul. cancr. præpar. corall. alb. præp. nuc. moschat. ana ʒi. glycyrrhiz. Hispan. sicciss. ʒi. gum. Anim. camphor. ana ʒiij. f. omnium pulvis subtiliss. excipiens f. q. terebinth. Venet. f. massa pilular. Sum. ad pondus ʒi. mane hor. 4. ante prandium, & in ingressu lecti horis tribus a levi cæna, superhausto vini rubri sive clareti ulii cum sacchar. & cinam. momento.

Vel. ℞. Gum. guajaci, animæ ladan. colophoniz ana ʒi. mastic. thuris, sandarac. ana ʒiij. succin. utriusque flavi & albi præpar. ana ʒiijss. rad. torment. ʒi. bistort. symphyt. maj. sili. pendul. rna ʒss. inter ossis sepiz, mandibul. Lucii magister. perl. & coral. cum ol. sulph. præcipitat. ana ʒijss. C. C. ad albedinem ulii ʒvj. croci Mart. astringent. ʒx. camphoræ ʒij. ambr. gris. ʒijss. f. omnium pulvis qui excip. f. q. terebinth. Venet. f. massa pilular. Dosis ut supra.

Haud minus sistunt tabellæ sequentes. ℞. Croci Martis optimi ʒss. coral. rubr. præp. marg. præp. vel potius salis eorundem ana ʒij lap. hamatit. Præp. ʒijss. bol. Armen. terr. sigillat. ana ʒj. sacchari albi. duplum pondus omnium Mf. & cum mucag. gum. tragac. in aqua Rosar. extract. f. tabell. ponderis ʒij. Capiat unam mane & vespere.

Ista nisi profecerint, & ad Narcotica sit deveniendum, concinnentur tales pilulæ.

℞. Gum. guaiac. ʒiij. colophon. ʒss. mastic. ʒij. laudan. dysenteric. nostri ʒss. cum sap. cydoniorum f. massa Capiat ʒj. quotidie mane superhausto vini albi tantillo per 10. vel 19. dies.

N. B. Vinum exhibendum ad correctionem

opii, ne videl. caput feriat & somnum conciliat.

Laudanum autem Dysentericum hoc est.

℞. Extract. opij. ʒss. extracti eroci ʒi. tinctur coral. ʒi. magister. perlar. eroci mart. adstring. an. ʒiij. ambræ gris. benzoin. an. ʒi. moschi ʒss. M. F. Massa. Dos. gr. iij. vel iv.

Quoad externa, caluit cauteria, infusus, suffusus metrenchyta, & emplastra lumbis &c. applicata.

De cauteriis supra dictum est.

Infusus ex hystericis, paucis adstringentibus & vulnerariis plurimis parandus est.

Suffusus siccus. ℞. mastic. sandar. an. ʒij. styrac. calamit. benzoin. an. ʒi. lign. Rhodii, sandal. citrini ana ʒiij. ladan. puriss. ʒij. carbon. salic. ʒv. M. & cum mucagine gum. tragacanth. extrahit. in aq. Angelica aviculæ Cypriæ instar digiti crassæ & oblongæ, incidenda f. a.

Suffusus humidus, ex odoratis in sella perforata exceptus etiam proderit ut ex decocto ligni Rhodii, rasur. juniper. styrac. benzoin. in vino albo, addit catyophyll. nuc. mosch. &c.

Metrenchytum. ℞. cortic. medii querc. junior. ʒij. radic. torment & bistort. an. ʒi sand. citrini & rubri an. ʒvi fol. querc. tenell. potentillæ, plantag. centinod. an. M. j. archangel. albæ M. ii. sal. rubr. M. f. rosar. rubr. p. iij. Bull. omnia in aq. fabror. ʒss. vi. fiat injectio bis in die tepide, ter quater ve quavis vice. Postea utatur idon. o subligaculo.

Emplastrum applicandum lumbis & ossi sacro.

℞. Ladani puriss. ʒij. radic. bistort. ʒi. gum. Arab. lapid. hamatit. battitur terri in a. eto præpar. an. ʒss. langu. drac. mastic sandar. an. ʒvi. myrryll. ros. rubr. an. ʒiij. olei glandium, ceræ, an. q. s. ut f. Empl. Theodor. de Mayerne Praxeos Medic. lib. 3.

In Fluore Mulierum. ℞. Extracti senn. ʒi. resin. turbit. gr. viij. res guajaci gr. vi. syr. rosar. q. s. M. F. Bolus.

In fluxu seroso. ℞. Rob. samb. ʒij. resin. jalapp. gr. x. mercur. dulc. gr. xv. M. F. Bolus.

Vel. ℞. Extract. rhei ʒi. syr. rosar. ʒi. sal. hamatit. gr. iij. M.

Humores crudi circa ventriculum cumulati, evacuentur per vomitoria, uti.

℞. Eximel. ʒss. sap. vomitor. gut. v. M. F. vomitorium.

Post sufficientes purgationes, ad discutendas humorum superfluatorum reliquias, sudorifera adhibeantur uti.

℞. Rob. sambuci ʒij. antim. diaphor. terræ solar. an. ʒi. tinctur. antim. ʒss. decoct. lign. guajaci ʒij. est f. sudoriferum.

Vel. ℞. Bezoartici C. C. ʒi. decocti rad. chin. ʒij M. F. sudoriferum.

Tel. ℞. Conserv. ros. rad. symph. cand. an. ʒijss. coral. rubr. C. C. usti & præpar. an. ʒi. matris perlas. præpar. ʒss. sang. drac. croci mart. ana ʒij. bol. armen ʒi. cum syr. corall. & de ros. sicc. f. bolus. Dos. mane & vespere a ʒi. ad ʒij. Hermann. Nicol. Grimm. Compendii Medico chimici lib. 4.

Consultationes.

Pro Perilluari, ac Nobilissima Fœmina Ausculana meri fluore Albô quoquo pacto flavescente affecta.

Affectus, quo nobilissima mulier detinetur ita dese patet, ut à quoque vel medicæ facultatis ignaro cognoscatur, is etenim uteri fluxus albus existit aliqua ratione flavescent, qui sicuti omnibus quoad sensutam cognitionem, sic tantum Medicis quoad curationem meritò debetur, eorum nam que est proprias causas, propriamque generationem attingere.

Circa quæ illud meo iudicio interim statuentum, hujus videlicet affectus causam unicum caloris nativi languorum exillere, quod an ita se habeat, luis venererz infectio, ejusdem occasione inunctio ex hydrargirio ad usum deducta, aliæ fere innumeri in vivendi ratione errores perpetrati attestantur; quæ omnia an possint calorem nativum labefactare, proindeque diversos parere præter naturam affectus, vel ex hoc cognoscere licet, quod viscerum principalem temperamenta, ac proportionem potissimum solent evertere, id quod per illustri nostræ patienti contingit dubio procul, hinc non mirum, si in ea sanguificatio male habeat, non tantum ob læsam hepatis facultatem, ac proportionem, verum & ob ventriculi intemperiem frigidam, ac humidam, ex qua multa pituitæ copia ibidem generatur, quæ postmodum in jecore non potenti non emendata, per venas diffusa, ad uterum demum tanquam ad omnium excrementorum in feminis partem expurgatricem deveniens, prædictum profluvium excitat.

Cæterum, an hoc in facultatis retentricis vitium, vel in expultricem si referendum, non erit abs re, si distinxero; ac ut id paucis expediam, puto ego in facultatem expultricem esse referendum, quod ex eo potissimum conicere licet, quod ea omnia adsunt hoc in casu, quæ solent facultatem expellentem ad operandum suscitare, excrementa inquam tum copia, tum qualitate peccantia, quantitas in pituitam, qualitas in alicujus ichoris biliosi portiunculam (hinc exeuntis color quoquo pacto flavescent) referri debet.

Quæ omnia cum ita se habeant, pro hujus affectus, Symptomatumque concomitantium, palloris nimirum, appetitus dejectionis totiusque lassitudinis, & aliorum si quæ alia patitur mulier nobilissima) remotione, Medici curantis partes erunt, in unicam excrementorum ablationem non solum incumbere, verum etiam in id totum studium dirigere, ne scilicet de novo eorundem generatio fiat, ac propterea viscerum discrasias emendare, luis veneream propriis Alexipharmacis corrigere, calorem nativum roborare, atque uterum, qui præsertim patitur, firmare tenebitur.

Quæ ne consequatur, non parum suspicor, multa si quidem pertinescenda deterrent. calor primum nativus rei medicæ fundamentum adeo labefactatus; causa secundo illa maximæ activitatis lues gallica quam (ubi radices altiores jecit) est impossibile dimovere. Tertiò præ-

sentis affectus difficilis tolerantia, quam L. illud totius luce clarius insignem ostendit; Quæ tamen si obtent curationi, non propterea medicus a medicamentorum usu desistat oportet, ætas enim e contra patientis perilluariis tere consilientia, ejusdem animus prudens, ac præceptis Medicis obsequens Medicæ curantis diligentia Medicamenta, & auxilia medica si non absolutam sanitatem, maximum saltem fructum, ac utilitatem allatura pollicentur.

Quæ bona spe concepta, ad materias præfidiorum devenio, & quod ad chirurgicam spectat, non habeo quod proponam, nisi cauterium tum in femore dextro secundum partem domesticam, tum in brachio sinistro surciturum, item frictiones primum molles, mox asperiores, hinc ex melle probe cocto, & actu frigido, ea tamen frigiditate, quam aquæ fontis attivo tenore sustinent, factas; Galenum præceptorem insequutus non possum non summiopore probare.

Quod attinet ad pharmaca, totius habeatur providentia, primum per lenientia mel ros. & syrupum ros. solutiva, deinde per præparantia, decoctum inquam cicoraceorum, betonicæ, boraginis, agrimonii, senecii, capill. ven. semine melonum cum cortice, tandem per purgantia ex infuso Rhab. & Agarici, adjecta manna, sed mitiora aliqua evacuantia perilluari patienti in usu sint oportet, eaque sæpe sæpius reiteranda, inter quæ ego omnibus præfero pulverem radices mechocani ex infuso myrobalanorum citrinorum in vino nigro austero factis.

Post hæc pro evacuatione sensibili per urinas ea Diuretica probo, quæ pariter Galenus hoc in casu probavit, decoctum videlicet asari, & apii, verum cum lacte semine melonum; pro evacuatione vero insensibili per habitum nil præstantius decocto guajaci, & salsa, adjectis sandalis rubris, cicoraceis, betonica una cum diureticis frigidis, aut saltem temperatis; A quibus ad uteri roborationem duo propono unum est aquæ infusum ex thymis aliquibus aluminosis. Alterum est pulvis qui.

℞. Carabæ drag ii. storum spicæ odoratæ tunicarum internarum ventriculorum Gallinæ an. drag. i. M. & fiat pulvis subtilis, cujus drag. i. exhibeatur ex decocto extremitatum vituli, in aqua calybeata parato.

Pro ventriculo autem, & hepate roborando, necnon proportionem eorundem servanda, primum ratione hujus, si exterius succus cicorii ex aceto, ac speciebus cerati sandalini super propriam regionem administraretur, non in probarem. sed quod mirum in modum probo, est serum caprinum depuratum, estque calybeatum cum succo acetosæ interius ad plures dies exhibitum. Ratione vero ventriculi intus à confectione aromaticum rosatum dicta, sine Musco tamen, & ambra non recederem, extra ceratum Masticeum cum aromatibus applicitum, & his non conferentibus embrocæ ex oleis stomaticis juberem administrandam, quibus omnibus confido calorem nativum inigne juvamentum percepturum, & eo magis, si proba vivendi ratio conjungatur.

De qua nil habeo dicendum, nisi quod patiens nobilissima carnes comedat vitulinas, hædinas, pullorum, & ænium in montibus degentium, iis-

que potius assis, quam elixis utatur, ova, ac pisces succilli in u. u. qui in aquis claris vitam degunt, circa quæ omnia illud præcipue notandum quod si edulia in aqua calybeata coquerentur, plurimum esset fructus, vinum oribat nigrum, & austerum, quod non oportebit aqua dilueretur. Verum eo tempore, quo guaiaci decoctum assumeret, eam vivendi rationem servabit quæ utinam esse solet, qui etiam hic adnotarem nisi certo seipem excellentissimum curantem eam posse optime præscribere, sicuti & omnia alia, quæ ad salutem nobilissimæ patientis attinebunt, quam utinam his à me propositis præstidius. Deus O. M. de morbo ad sanum statum traducat. *Julius Cesar. Claudinus in Consulatu Medicin.*

Muliebri Profluvium.

Mulier annum agens vigesimum tertium, temperamenti piruitosi, duobus abhinc annis viro nupta, post aliquot menses ab initio Matrimonio in muliebri profluvium incidit, primo satis mite, temporis autem progressu magis molestum. Materia peccatum qualitate, ut plurimum ad glaucum, sive croceum colorem, & quandoque albicantem vergens, tum etiam quantitate, quia fluxio est continua; suis tamen temporibus consueti Menies apparent. Hinc virore & tristitia afficitur, cum filios, ut maxime optat, procreare non valeat. Multa quidem fuere tentata remedia, sed ea leviora omnia. Quare cum generosiora nondum experta nobis adhuc salutis spem faciant, sapientissimum consilium tuum & auxilium quaerimus.

Quoniam muliebri Profluvium Senioribus familiare esse solet, quo quinquagenariæ ut plurimum corripuntur, unde mirabatur Mercurialis cum Aëtio, Adolescentes: & ante ipsum Lernelius, Puellas huiusmodi affectu corripit: ideo cum huic Nob. Adolescenti contigerit, magnus inde recessus à naturali statu est inferendus: cum enim per huiusmodi affectum totum corpus, scatens excrementis, per Uterum expurgetur, tanta excrementorum sarcina non adeo facile in juvenili, minusque adolescenti ætate congeri debet, in quibus uiget calor natus. Quare in hac Nob. Adolescente non exiguum adesse partium principalium, & forsitan principaliter intervientium intemperiem, facile credendum; at quænam sint, ambigere cogimur: siquidem totius ejusdem intemperies pituitosa in relatione describitur, materia vero ex utero fluens, crocea ut plurimum, & quandoque albicans observatur, caliditatis indicium: unde cogimur quoque statuere, frigidam quidem atque humidam in toto, sed in jecore calidam reperiri intemperiem; quibus facile addita quoque fuerit aliqua ventriculi imbecillitas, si non positiva, saltem privativa: & forsitan cum Hipp. à capite defluens humiditas, de quibus Schedæ nulla mentio: sicut nulla de modo vivendi, qui forsitan & cruditates in ventriculo, & biliosus humores in jecore, indeque in toto congerere potest: Pro certo enim habendum quod ad muliebri profluvium gignendum semper concurrat

sanguinis impunitas, aut cum Expultricis robore, ut in Juvenibus, aut cum Retentricis venarum imbecillitates, ut in Senibus, sicque varia excrementorum copia, pro diversitate partis laborantis, & excrementum producentis. Et licet sæpe à rationatibus procedat, nihilominus Auctor Definitionum dicebat, quod in profluvio muliebri colores plures contingunt, albus, rufus, ruber, niger: quod confirmabat Galenus dicens, in profluvio muliebri expurgari, quod in corpore redundat, vel rubram sanguinis saniem, vel excrementum album, ut pituita; vel pallidam, vel biliosam; unde mille coloris species observari assuebat Aretæus.

Quoniam vero Uteros humidus habentes non concipiunt, extinguuntur enim in eis genitura, vel præterlibitur, ideo Nob. Adolescens non concipit, quia continuo uterum humida materia irrigatum habet, & forsitan a diuturno excrementorum transitu aliqua intemperie & imbecillitate affectum: atque ita symptoma hoc in excretis immodice fluentibus, copia & qualitate peccantibus, causa sterilitatis evadit.

Cujus Curatio impossibilis censenda non est, licet valde difficilis: atas enim & quodammodo naturales radices habet partium nimirum intemperies continua excrementa regenerantes, quas corrigere non adeo facile fuerit.

In tribus autem consistit ejusdem Curatio, in evacuatione materiæ peccantis, tum per Dejectoria, tum per Diuretica; in correctione intemperierum partium mandantium; & in aliqua Uteri exiccatione atque roboratione.

Quibus intentionibus ut satisfaciamus, iterata, sed parca, opus erit sanguinis nutritione ex utroque brachio. Et quævis differat casus iste ab illo in Uxore Boethii, à Galeno descripto; nihilominus frictions quoque asperæ, ut in illo, toti corpori proferre poterunt.

Reliqua ex Pharmaceutico fonte sunt desumenda remedia; & primo, pro primarum viarum expiatione, conveniet potio ex manna clarif. cum tartaro. Pro primo præparante sine diluto oxymel simpl. cum aqua menthæ paratum, & cinnam. atque cortic. citri aromatizatum, ad ℥. iij. Quinque vero transactis diebus, repetatur potio eadem, ut supra, addito tamen agarico infusioni consuetæ.

Qua prima perfecta expurgatione, aqua Tetticianæ, utpote præstantissimum remedium, quatuor aut quinque diebus cum vehiculo dejectorio propinanda erit. Mox pro secunda præparatione paretur malsa diluta, cui addantur succi depurati & per arenam trajecti, cich. horag. & agrimoniz; in quorum usu quindecim diebus insillat: sed quinto quoque die assumat electuarii diaph. & de succo rosar. an. ℥. ij. cum flore calthæ; vel infusionem agar. rhab. & senz, addito syr. ros. solutivo, quibus superbibat aqua horde. co vel feri depur. lb. ij.

His transactis diebus, ad urinæ vitas erit materia fluens Diureticis divertenda, cum Diaphoretica

retica & Sudorifica ab anni tempore calido non permittantur: Sic Galenus uxori boëthi præbebat apii & alari decoctum: ego vero jus alteratum, ita parandum censeo.

℞. Chinæ opt. inc. liqui lentisc. è chio an. ʒ. β. ligni sassafras. inc. ʒ. ii. radic. fenic. apii an. ʒ. i. aquæ com. lb. iii. m. f. inf. per hor. xxv. deinde adde quartam partem galli junioris, & bull. ad consumpt. dimidii, colatura vero servetur pro duabus vicibus, summo mane exhibenda; cui præmittatur bolus.

℞. Terebinth. cypriæ lotz in aqua capill. ven. ʒ. β. salis tart. volatiliz. gr. vii. m. reform. bolus. In cujus decocti usu insillat integro mense; sed singula hebdomada assumat.

℞. Elect. lenit. ʒ. β. diaph. de succo rosar. an. ʒ. i. Magisterii jalappæ gr. vii. m. reform. boli, & exhibeantur quatuor horis ante cibum, quibus tamen superbibat aquam hordeaceam.

Terminato decocto jam dicto diuretico, jecoris & renum calida intemperies per easdem vias urinarias corrigi poterit aquis acidulis, imo vitriolatis in valle solis scaturientibus, & prærogativam in hoc affectu obtinentibus: ad quas se conferat Nob. Mulier, ut postea eadem domum reversa, utero exiccatio aliqua atque roboratio procuretur; in quem finem utilissimæ essent infusiones in aquis sulphureis; quæ quoniam forsan præsto non erunt, ideo iisdem substituantur aqua pro infusione cum tubulo, in qua ebulliant folia rosarum, myrti, balauitæ, cort. granat. gallæ, pulegium, & calament. & membrana illa, quæ sub crassiori cortice quercus reperitur, portionem quoque alumi. crudi in eadem dissolvendo.

Et dum jam dicta omnia peraguntur, sicut & postea, congrua erit servanda victus ratio, quæ sit moderata in primis qualitatibus, ad siccumque vergit in secundis, à viro excellentissimo adstanti peculiariter præscribenda. Sed interim vinum pro mensa pareatur medicatum lentisco & santalo, adeo ut pro singula situla dictorum uncia duz ingrediantur. Ita à cibo devoret duo aut tria integra grana malliches, vel pilulam ex ʒ. i. succi ablynthii condensati.

Quibus si non cedat affectus, à capite magnopere soveri facile erit credendum; & ideo ad decoctum sudorificum oporiori tempore erit deyenendum, cum pulvere viperino exhibendum: hoc enim suppresso, fecundam quoque futuram Mulierem Nobil. sperandum. *Raym. Iohan. Forst. Consult. & Resp. Medic. T. 2. cent. 4.*

Muliebri Profluvium.

Illustrissima March. temperamenti totius ad calidum & siccum vergentis, hepatis calidioris; post felicem foeminae partum felixque puerperium mense Augusto præterito securum, incidit in menstruum primo diminutionem, cui venæ sectione opus fuit; inde quatuor post mensibus, ob varias corporis animique agitationes, in eorundem depravationem, cum statuto tempore aliquot solum guttulis sanguinis succederet fluxus albæ materiæ, viridi ac flavæ mistæ foetida semper, atque acris, quæ non solum partes per quas exibat, summo ardore affi-

ciebat, sed magnis quoque doloribus dorsum & ulcerosa lassitudine totum corpus vexabat, præsertim aut omnino suppressis, aut parcius effluentibus jam dictis materiis, quibus rursus exeuntibus patiens Illustriss. levabatur. Interim febriculis quoque subinde laboravit, urinis turbidis plerumque apparentibus. Tandem circa dimidium februarii mensis, ignara etiam se utero gerere, variis insolitis prægressis motibus, post egressum abunde sanguinem, abortivit, succedente etiam sufficiente lochiorum expurgatione, cum addita parca ex laphana sanguinis emissionem, patiens melius se habere visa est. Duravit tamen, & durat adhuc dolor fere continuus in dorso cum fluxu, licet pariori eorundem materierum absque ullo levamine. His accessit frequens alui fluxus materiæ crudæ ac ferossæ, calidæ & acris, cum calore, ac doloribus capitis, ita, totius corporis lassitudine ulcerosa, urinis, jumentorum similibus sæpe, sed semper crudis; stomachi imbecillitate ac ulcerum naturalium fervore. Quibus malis opportuna remedia à summa tua Virtute exposcimus, hoc solum addentes, quod in præsens menses floridi sanguinis fluunt, licet suo more, hoc est, summa patientis lassitudine, & etiam post debitum tempus apparuerint.

Muliebri profluvio matronam Illustriss. jam divexatam fuisse, & adhuc nunc molestrari non est qui in arte peritus dubitare possit: siquidem continuum ab utero effluvium materiæ copiosæ à sanguine alienæ id attestatur: sicuti ab urina jumentorum simili, confirmatur, ut de Nat. muliebri ʒ. asserbat Hippocrates. hoc autem profluvium biliosum sese ostendit, cum observatur humor exiens serosus, & sæpe flavus, præterea acris & mordax, & non in utero congestus: exiguus enim esset, & fluorem uterinum potius, quam muliebri profluvium constituere: sed à toto venoso genere emanat, sicut prius à jecore servidiori producitur, qui una cum mensuris purgationibus singulo mense à Natura excerni debuerat, verum partim ob aliquod in utero & vitium, & labem ex abortu contractam, partim ob humoris ejusdem & copiam, & acriorem qualitatem, usque ad prænitum tempus Menstruum detineri, nec à Natura tolerari potest, sed facultatem expultricem irritando, eandem ad sui expulsionem frequenter cogit, & muliebri profluvium parit. Vitium autem in utero, obstructionem esse credendum, eamque à crasso, exulto & melancholico sanguine factam; & ideo accedentibus mensuris, quia vasa & ligamenta implentur & extenduntur, dolores succedunt, ab utero ad dorsum usque etiam sese extendentes. Ad hujusmodi autem sanguinis productionem prona valde est patiens Illustrissima: virilem enim naturam ab ortu sortita fuit, servidius temperamentum tum jecoris, tum cordis, & ætas in vigore caloris temperamenti constituta est; quæ omnia (additis quoque animi mororibus, non ad solius biliosi humoris, sed atrabilis quoque generationem conspirant, qui à natura ad uterum detrusus, nec venulas illas permeare valens, in iisdem manens obstructions

facit: & reliquis humoribus excrementitiis transitum impediens, Menstruorum imminutionem induxit; sicque concurrat fecunda calidi humoris generatio, & parca, menstrualis tempore, eorundem expurgatio, quam supplet Natura continua jam dictæ serolis atque biliosis aeris materis extra tempus transmissione.

Profluvium hoc curari quidem, at non adeo facile supprimi debet, dum e multis malis minus hoc elegit Natura: sicut enim modo malum est, ut signum, ita si importune supprimeretur, malum evaderet etiam ut causa, dum multiplices excitare posset p. n. affectus. Neque ut causa modo conceptioni insensu esse potest, cum a venis non in Uteri cavitate, sed ejusdem cervicis profluat humor. Curandum tamen esse dixi, tum quia concubitus molestum reddit, tum maxime quia ab iisdem causis permanentibus aliqua quoque pejora mala procedere possent: & ideo causis multo magis, quam effectui esse incumbendum nos monent omnes Medicinæ Principes.

Quare expiatis primis viis, secundo venosum genus ab huius pravis humoribus depurandum. Tercio Uteri obstructions sunt aperiendæ, ut Menstrua bene procedant. Quarto Jecoris & sanguinis fervor contemperandus; atque tandem uteri vasa nonnihil corroboranda.

Quibus intentionibus in fine veris, aut inunte Estate satisfaciendum erit; & primo a fonte Chirurgico iterata erit deprendenda sanguinis missio, & primo ex Jecoraria dextera, tempore intermedio a præterita & futura menstrua expurgatione æque dilenti; secundo ex saphæna dextera in fine menstrua purgationis imminute procedentis. At si primus sanguis extractus forsitan niger valde atque crassus apparuerit, unico intermisso die, ex altero brachio repetatur educio, ut facilius tota purificetur massa sanguinea, & ne ad Vterum a Natura transmissus; impedimenta adaugeat, magisque imminutas reddat menstruas purgationes, non omitta postea tertia ex saphæna educatione.

Ex pharmaceutico reliqua sunt depromenda medica auxilia. Et primo primæ viæ erunt expiandæ porione ex man. clarificata; aut syrupo ros. solutivo; aut cassia cum leistivo. Deinde quinque diebus præparantibus utendum è Julapio acet. corticibus citri aromatizato. Quod si abhorrereat Illustriss. Patiens, substitui poterit cremor tartari ad semunc. quotidie præbendus, in jure corticibus citri alterato dissolutus. Mox leniens supradictum erit repetendum. Et inde ad ultiora præparantia deveniendum, quæ erunt potius succi depurati, quam syrupi saccharati, illique ex cich. borag. & pohns ad ʒiij. in decoct. cichoraceorum, additis foliis malvæ & viol. in quorum succorum usu ad xx. dies saltem pergendum erit; sed quinto quoque die biliosi humores, & tandem etiam exusti erunt electivè educendi, primâ & secunda vice exhibendo electuarium de succo rosarum ad ʒ. iij. flor. cassiæ mistum, cui post horam superbibat, aut seri caprini, aut aquæ Nocet. lb. ii. tribus vero horis ab assumpto potu prandeat. Vice vero tertia & quarta, addatur quoque

Extractum senæ ad ʒ. i. aut potypodii. & pariter superbibat serum, aut aquam jam citam: nec quicquam de ventriculo dubitetur.

Jam dicta peracta purgatione, utilissimas, into necessarias existimo fore aquas acidulas, & præsertim Villenses, ut quæ valeant non solum viscerum & sanguinis calorem contemperare, verum quodammodo & aperire: quarum tamen usus tutior fuerit, si iisdem præmittantur aliqua alia præsidia Uteri venas tolerantis, quæ esse poterunt interna & externa. Et tertia, erit cyathus aq. stillat. capiti. Ven. & artem. additis gr. x. salis ejusdem artem. vel addita uncia aq. sabinae, vel gutt. tribus aut quatuor ol. sabinae; in cujus aquæ potu insistat matrona illustrissima x. aut xii. diebus; & interim uteri regio foveatur spongia magna appositâ, imbuta prius decoct. malv. puleg. orig. calanien. mercurial. radic. lil. alborum, quæ removeatur, ut altera calens admoveatur, & sic per vices ad integram horam; inungendo postea uteri regionem oleo lil. alborum.

Inde ad usum jam dictarum aquarum deveniat; & primis diebus vehiculis dejectorio, reliquis vero diuretico, ut moris est, sunt propinandæ; & tunc lactis usum per plures hebdomadas utilissimum fore censeo; quo eodem tempore infusiones quoque in aliqua aqua uterum corroborante prodesse possent, qualis apud nos est aqua Montis Agrotorum, vulgo de Monte Grotto dicta; & ista, esse poterit aqua jam dicta Villensis, ut venæ cervicis uteri quodammodo laxata aliquam corroboracionem acquirerent, qua forsitan non indulgebit uterus nuper affectus.

Jam dictis omnibus congrua victus ratio est addenda, adeo ut a salitis, acris, calidis aperiensibus alimentis abstinere: sicut ab usu atomatum & vini generosi; a nimio exercitio, & ab ira, & meroribus: ad has enim animi passiones est valde propensa. Alacriter igitur vivat, ut optatam sanitatem consequi & conservare possit, quam ego eidem Matronæ Illustrissimæ a Deo enixe precor. Idem ibidem.

Muliebre Profluvium.

Nobilissima Matrona annorum viginti novem, stature mediocris, temperamenti totius ad calidum & siccum vergentis, jecoris calidioris, ut ex colore florido atque interno calore cum alio stypticis se colligi potest, capitis immodici, quia capillos gestat & multos; & oblongos, & præterea destillationibus est obnoxia, unde ventriculum quoque vix credibile est, sicut læditur etiam a libera victus ratione; sex abhinc annis, post partum felicem & naturalem, sibi observare cepit madida pudenda cum aliqua acrimonia & urinis ardore, quæ humiditas hucusque major semper Estate, quam Hyeme apparuit, eaque coloris citrini ut plurimum, & quandoque aquosi; ab illo vero tempore sterilis reddita est, & incessit vix percipibilis quædam totius corporis gracilitas. Varia a Medicis Excellentissimis fuere administrata remedia, nimirum aquæ thermales, boli ex cerebello, serum destillatum & chinæ decoctum necessariis præmissis purgationibus, quibus ta-

men quicquam non cessit effluxio, licet nonnihil a China Decocto juvari sibi visa fuerit Nob. Matrona, quoad concoctiones & nutritionem, non autem quoad fluxionem ab Utero. Dubitatum fuit, num Gonorrhœa, sive seminis effusio sit, cum addatur ignavia quædam ad Venerem & a coitu aversatio; an potius imbecillitas aliqua, sive laxitas vasorum renalium, sive tandem totius corporis excrementorum ad Uterum depositio. Pro hoc affectu sedando, si non auferendo, ad usum juris Chinæ ducta fuit triginta abhinc diebus Nob. Matrona, cum aliquod juvamen sibi asserre videatur. Proximo vero Autumno ad majora devenire cogitant isti Excellentissimi Medici, nimirum n. post expurgationem universalem, ad Decoctum salis, ligni quercini, radicum prœniz cum correctivis hordii, cinnam. & coriandri, tertio quoque die idem Decoctum alterando pulpa tamarindorum, & dissoluta cassia cum crem: tartari. De quibus omnibus à me consilium petit Nobiliss. Matrona.

Molesta ab Utero fluxio materiæ serosæ, & ut plurimum citrini coloris, quæ sex abhinc annis divexatur Matrona Nob. & quæ primis temporibus cum urinz ardore & acrimonia effluebat, progressu postea remissis, inter depravatos motus à Galeno recensetur. Symptoma in excretis immodice fluentibus, qualitate, quantitate, modo & tempore peccantibus, quæ si modica esset atque fuisset, Uteri Rheuma, sive fluxus uterinus dici posset: verum quoniam non adeo exigua effluit materiæ, eaque ut plurimum flavo ac citrino colore tincta, acrique qualitate ab initio prædita, idcirco non in Utero primum ortum habere, nec ab Uteri imbecillitate, sive intemperie scaturire credendum, adeo ut fluor uterinus tantum constituatur; sed ab alia superiori loco priginem ducere; Uterum vero ut a quæductum eidem inservire credo; nisi forsitan adeo diuturno tempore à continuo humiditatis ad Uterum affluxu & Uterum ipsum aliquam labem contraxisse suspicemur; fluxionem tamen principaliter à partibus superioribus desfluere, & muliebri profluvium appellandam statuo; quod tamen legitimum non esse, sed spurium ostendit signorum absentia, quæ non solum à Galeno in Vxorē Boethi ad Positum, verum & ab Aetio, & Paulo adducuntur. nimirum cibi fastidium, difficilis respiratio, tumor pedum, abdominis, faciei, oculorum, & tandem totius, cum virium insigni imbecillitate, quibus addi Hipp. urinam jumentorum similem. Neque confundenda est hæc affectio cum Gonorrhœa, sive seminis effusione, quoniam non adeo diuturno tempore sine insigni virium iactura & totius emaciatione perseverasset, ut in Hipp. de Grypalope legimus: neque cum imbecillitate, cui necessario non associatur materierum effluxio; præterquam quod exiguo temporis progressu urina cruenta, quinimo & propter imbecillitatem laxatis venarum orificiis sanguis ipse excretus visus fuisset. Quare constanter asserendum idem huius affectus esse muliebri profluvium, quod nil aliud est, quam totius corporis redundantium excrementorum per Uterum expurgatio. Horum autem partes mandantes ex ipsorum qualitate, & totius, atque partium superiorum intemperie fa-

cile dignoscuntur, & ideo in casu nostro, cum Matronam Nob. in juvenili ætate constitutam potius, & jecoris temperamenti calidj & sicci, capitis vero humidioris, nec adeo tenui ventriculi esse considerem, hisque excrementorum ab utero prodeuntium color ut plurimum citrinus & flavus, nimirum biliosus, necnon quandoque albus & aquosus addatur, plures quoque atque diversas esse partes generantes ac mandantes certo decerno; à jecore namque citrini coloris materia, sicut à capite aquosa & pituitosa producitur, cui in ventriculum delabenti, & eundem quodammodo laxanti cruditates quoque ab eodem genitæ commiscuntur, indeque mista materia hujusmodi ad jecur & genus venosum distribuitur; utraque vero hujusmodi materia & biliosa, & pituitosa Naturæ molesta, pro minori malo & individui tutela ad uterum transmittitur, magisque ætate, quam hyeme, quoniam tunc temporis tenuiores generantur humores, & per ipsam expurgantur magis, non sufficientibus contactis mentis evacuationibus. Ab hac vero fluxione quoniam impeditur conceptio, & sterilis redditæ est nob. Matrona, ideo non per vasa ceruicis, sed per interna corporis ipsius uteri effluere omnino credendum: dum enim ab hac irrigatur & humidatur uterus ipse, Genitura non retinetur, sed foras elabitur; Quæcumque enim humidos Uteros habent, non concipiunt dicebat Hipp. à qua eadem humiditate excitationem quoque ad coitum obtundi, & corruptionem impedi credibile est. Gricilitatem vero vix perceptibilem à causa potius hujusmodi profluvii, nempe ab intemperie partium concoquentium, quam ab ipso profluvio & excrementorum ipsorum excretionem provenire censeo; non enim utilis succus, ut esset sanguis, excernitur.

Affectus iste, præterquam quod Mulieribus molestissimus esse solet, sterilitatem etiam inducit, & præterea temporis diuturnitate individuo quoque plura mala asserre potest; adaugeta namque intemperie, partium mandantium imbecillitate, suscipientium, & viarum lubricitate, adaugetur quoque excrementorum profluvium, quod tandem bonorum succorum, imo & ipsius sanguinis portionem secum rapere & extraducere solet, unde corpus vel ad Atrophiam, vel ad Cachexiam ducitur; & idcirco omnia agenda, ut prorsus auferatur quod tamen assequi non adeo facile erit, cum non ad versus solam humiditatem pugnandum sit, sed adversus quoque biliosos, & calidos humores, sicque contra indicationes habeamus.

Nec illud in Curatione præcipuum à nobis est subticendum, quod nimirum de astringente, vel de hujusmodi fluxionis suppressione solliciti esse non debeamus, nisi prius excrementorum reproductionem prohibeamus, intemperies partium mandantium corrigendo, alioquin retenta excrementa, multa pejora mala Nob. Mulieri inducerent.

Quare aliqua hoc anni tempore sunt agenda, ne augeatur affectus; sed vera, legitima & generosa curatio in Veri futurum erit differenda: in contumacibus enim affectibus quos purgare oportet, Vere purgandos esse dicebat Hippocr.

us tart. vitriol. gr. x. quibus pariter superbi-
bat jus alteratum; ita enim si quæ adessent
in illo elentio obstructions, una cum humo-
rum preparatione referari poterunt, alternat-
im perseverando in dictorum succorum & cas-
sia usque ad octavum usque diem: quo tempo-
re assumat bolos ex flor. cassi. ad 3. vi. &
pil. de tribus cum rhab. ad 3. j. addendo
Magist. mechac. gr. x. quibus post horam
superbibat aquam nocer. ad libra. ii. & tribus
horis ab assumptæ aquæ prandeat. Mox resu-
mat succorum depur. unum, nempe cich. borag.
& agrimoniz, in iure pullæ cichorac. agrum.
câpill. Ven. & betonica alterato, in quo disso-
luantur gr. xii. salis tartari fixi; in quo cum usu
pergat ad octavum usque diem, sed interim hoc
tempore de sanguinis missione cogitandum erit,
ex Jecoria dextera sanguinem educendo ad
3. vii. observando tamen tempus medium & æ-
que distans à ventris purgatione tum præteri-
ta, tum futura; in quem finem potest differri, &
anticipari sanguinis eadem missio. Transactis
jam dictis postremis octo diebus, preparato-
rum humorum expurgatio erit ineunda, vel
jam dicto medicamento ex cassia. vel electua-
rio sent. cum pil. de tribus, & Magist. mechac.
parato; vel infusione rhabarb. ad 3. ii. agar.
ad 3. i. sennæ ad 3. ii. cinnam. integ. ad 3. j. in aqua
cich. addendo syrupi ros. sol. vel pot. ex man-
na clarif. 3. v. quibus pariter superbibat, ut su-
pra, aquam nocer. ad lb. ii. vel iii. & interim
diebus intermediis alvus clysteribus sollicitari
poterit.

Expedita secunda intentione, tertia erit quo-
que absolvenda, caput nimirum expurgando pi-
lulis aureis, coctis, simulque aggregat. an. 3.
ss. summo mane assumendis; quibus, trans-
actis duabus horis, superbibat aqua. Nocer.
libra. ii. aut ii. & tribus horis ab epota aqua
prandeat. Hæ pilulæ quarto aut quinto trans-
acto die sunt repetendæ; & diebus interme-
diis cyathis aqua capitalis erit præbendus,
nimirum stillat. cich. beton. & major. ad 3.
vi. vel ix. in eadem dissolvendo sal betonicæ
ad gr. x. vel xij. & addendo, ita annuente
nob. Muliere. confervam de acido citri, aut li-
mon. ad libitum. iisdem diebus intermediis ex-
purgetur quoque caput ipsum Errhino, pul-
vere ex rad. iridis florent. major. & nigellæ
parato.

Quarto pro roboratione ventriculi aquæ
Tertuciana à me proposita fuisset superius,
nisi crudorum excrementorum à ventriculo
proventum multo magis à jugibus impropor-
tionatis objectis, quam ab ejusdem ventricu-
li imbecillitate derivari conlicerem. Quare
cum paulo infra humidæ capitis intemperiei
prospiciam, uno eodemque tempore atque
isdem remediis ventriculi quoque rationem ha-
bebo.

Et ideo quinto pro capitis exiccatione, si-
mulque excrementorum ab utero diversione ad
sedorificum decoctum erit deveniendam, quod
jussu datur.

℞. Salsæ pril. elect. ligni visci querc. veri
a. 3. j. Chinæ opr. sarr. alb. lentisci & chin-
ni 3. ss. aqua stillat. ci. h. lb. iij. stillat. beton.
lb. j. m. f. infusio per horas 24. deinde bull. ad
consumpt. tertiz, & facta colatura servetur ad

usum pro tribus vicibus, matutino tempore,
hora una ante ingressum h. potum assuenda,
cui præmittatur pulvis viperin. ad. xij. Proporu
vero consueto.

℞. Residuum, aqua. com. electæ lb. vi.
m. bull. ad consumpt. tertiz, & sub finem
ebullit. adde cinnam. integ. 3. ij. bull. pa-
rum, & f. colat. cui adhuc ferventi adde sac-
chari albi 3. iv. vel ad libitum nob. Matronæ,
sicut præter frustula citri recentis, ut agitando
fiat potio lavis, vulgo aqua Cedrata dicta, pro
potu in mensa consueto: Vinum enim prius
& omnino abdicandum. Sudor autem semel
tantum in die provocandus, & primis tribus au-
quatuor diebus in hypocausto excitetur, perfici-
atur in lecto: inde paulatim in eodem hypo-
causto diutius detineatur, adeo ut octo aut de-
cem dierum spatium ad horæ dimidium perveniat,
sicque perseveret, neque id tempus excedat us-
que ad quadragesimum diem, sudorem tamen
in lecto per alterum horæ dimidium perficien-
do. Decimo quoque die potionem sumat ex
manna clarif. ad aquam epotam infra duce-
dam: & diebus intermediis, si alvus pigra
fuerit, clysteribus sollicitanda, ex lacte &
syr. ros. sol. parandis. Victus debet esse atre-
nuans. licet non adeo tenuis, habita tempe-
ramenti, habitus corporis & consuetudinis
ratione. Quare de more comedat panem buti-
ctum, aniso, aut fœniculo & (si placet) etiam
saccharo conditum: addantur nuciei pini, amy-
gdalæ quæque, & præterea passulæ ad libitum.
Tertio quoque die concedi poterit palumbæ
curricola assata, aut avicularum mont. n. quinimo
& perdix una: & quandoque, vel urgente siti,
vel exuberante calore, prisana hordeacea con-
cedenda, semel tamen, non bis in die. Absolu-
to sudore, calida Jecoris & renum intemperies
corrigenda esset, hocque eximie præstare pos-
sent aquæ acidulæ vitriol. ut quæ non solum
refrigerare, verum & renes, & vasa robora-
re, imo & fluxum ab utero ad urinam affa-
timdi vertere valeant. Verum quoniam tempus
pro hujusmodi aquis epotandis omnino im-
portunum erit, ideo in futuram ætatem dif-
ferendus, non autem omittendus erit aquarum
dictarum potus, & substituenda est potio aquæ
stillat. de succo cich. & plantag. ad 3. x. cum
gutt. tincturæ coral. chymicæ, summo mane
haurienda, eidem præmittendo Confervam
rosar. ad 3. j. sicque decem diebus, sicut mox
aquæ de succo cich. addi poterit aqua stillat. ex
tenuissimis quercus foliis, omiſsa illa planta-
ginis.

His iisdem diebus quibus secur aquis præ-
scriptis quodammodo refrigeratur, postre-
mæ quoque intentioni aliquo pacto satis fa-
cere erit tentandum, & infusionibus in
aquis sulphureis & aluminosis cum tubulo,
quæ ob temporis inopportunitatem admi-
nistrari nequibunt, substituendæ erunt in-
jectiones clysteribus uterinis, primis die-
bus aqua Tertuciana simpliciter parandis, quæ
diebus sequentibus alteretur sol. rosar. myr-
ci, salviæ, ros. mar. orig. puleg. calam.
montani, & facta colatura, addatur alumen
crudum, atque tandem tantillum troch. de gal-
li. moschata, nimirum ad 3. ss. libris ejusdem
aquæ commisceatur, cum pro utero exiccando,
tum

tum pro ejusdem tono conservando; hæc autem injectiones repeti poterunt & mane, & vespere, aquam induric in utero diu detinendo. Quo eodem tempore regio quoque renum sub ingreditum lecti illuminanda erit balsamo saturni, quo facile parabitur, oleum saturni cum oleo myrtino commiscendo, idque tum ad eorundem renum refrigerationem, tum ad laxitatis vasorum roborationem comparandam. Jam dictis omnibus addi potest aliquod medicamentum à proprietate juvans, à me non semel in hujusmodi casibus expertum, estque pulvis turturæ ita parandus. Turtur deplumatus & exenteratus, vino ablutus, grana malliches electi impletur, confuitur, & in furno reponitur ad exiccationem usque, deinde contunditur, in pulverem redigitur, & a 3. i. usque ad ii. quotidie post exactas purgationes, vel in jure carminum plantag. alterato, vel aqua stillatitia ex foliis quercus per mensem exhibetur, quem Nob. Matrona quoque assumere poterit, præsertim quia tempus erit hyemale. Nec pigeat tamdiu in remedium uti perillire, ita enim morbi conditio expostulas, jam confirmati, & altas radices in corporis partibus principalibus fixas habentis.

Qui idcirco congruam quoque vivendi rationem pro fundamento exigit, quo deficiente corruet quoque fabrica medica: unde dicebat Aetius, quod præcipua fiducia in recta victus ratione posita est, quæ in hoc casu mediocritas tum in attenuatione, tum in tenuitate esse debet. Et primo caput ab æris inclementis erit custodiendum, & præsertim ab extemporaneis aquilonalibus ventis, sicut à diuturna mora prope ignem, corpusque totum toto hyemali tempore vestibus caute custodiendum. Secundo ex alimentis inter carnes vitentur concoctu difficiles & excrementosæ, quales sunt suillæ, bubulæ quoque frequens usus, aguinæ, volucrum aquatiliū. Inter pisces, dan nantur palustres & nimis glutinosi, non ut tales, sed ut crudiatum auctores; pariter ostreacea omnia & conchyliæ, vulgo apud nos pesci armati vocata. Inter edulia ex pasta parata damnatur tantum frequens usus. Inter lacticia, prohibetur lactis usus, sicut usus quoque casei veteris: reliqua conceduntur. Inter legumina, permittuntur hordeum, oriza & lenticula, damnantur cætera. Inter fructus, conceduntur castaneæ, nonnunquam persica, & pyra decocta, & uva pensilis. Inter bellaria, amygdalæ, nuclei pinei, raro pistacia. Inter olera, in acetariis concedi possunt lactuca, endivia, cichorium. Inter condimenta, prohibentur aromata, exiguo cinnam. vel pipere ruditer contuso exceptis; damnantur quoque condimenta ex allio, capis, & renuente ventriculo, etiam valde acida, ut frequens usus succi citri, limon. arantiorum. Quandoque ad concoctionem in ventriculo juvandam duo integra grana mastich. devoret. Prandio pleno potius, & parva cæna sit contenta. Superinjectiones, tanquam pestis, fugiendæ, nil enim pejus, dicitur Avic. quam comestio supra comestionem: sicuti comporationes quoque tum vini, tum aquarum vitandæ. Potus autem confusus si vini non generosi, non albi, non dulcis, sed rubri subtypici potius, lentisco & santalo rubro medicati. Terrio somnus con-

coquit, & ideo potius diurnus & nocturnus, non autem diurnus proderit. Quarto probatur exercitium, sed in hoc affectu non moderatum, ita ut lumbi & renes non defatigentur, aut in rheda laxentur. Quinto alvus lubrica servanda cibis potius, quam medicamentis, passulis scil. aut prunis Damascenis in jure decoctis, saccharo conditis, prima mensa assumendis, & iidem jus carniū superbibendo; clysterium namque usu alvus torpescit, & non nisi auxilio aliquo excrementa reddat; quare potius cassia condita prima mensa uti poterit. Et tandem animi alterationes sunt arcendæ, & præsertim ira ac tristitia. Hæcque omnia in salutem Nobil. Matronæ scripta sunt. *Idem ibidem.*

Muliebri Profluvium cum Sterilitate, in Hypochondriaca.

Nob. Mulier, triginta annos nata, temperamenti calidi & humid. plethorici h. bitus; octo jam annis quadragenerario Viro nupta, marem post annum feliciter enixa, coepit postea Muliebri profluvio lutei coloris vexari, cum ab ineunte ætate insigni dolore cum tumore in parte dextera uteri laboraverit, quod per totum hoc temporis spatium nullis tantum remediis perduravit, imo etiam maligna febris jam quatuor annis accessit, medicis auxiliis sanata: & si quandoque sitia quæ potibus nobil. Pat. indulgebat, ingentes cruciatus ad dorsum ulque sese extendentes uterum invadebant. Sic se habentem unici filii obitus duobus abhinc annis tanto anxio dolore, ut in mororem ac timorem, aliaque melancholica symptomata inciderit, quæ etiam in præsens una cum ipso muliebri profluvio infestant, licet menstrua suis legibus per quinque dies satis prodeant. Tacta abdomine, dolorem magnum in pyloro atque liene perferit, vomitusque insipia materæ illi facilis, imo familiaris, prout alvus facillime assumptis pharmacis solvitur; & interim infecunda reddita est.

Inter affectus atque symptomata quibus divexatur Illustrissima juvenis, aliqua mihi propono hoc tempore consideranda atque curanda: aliqua tantummodo consideranda. Consideranda atque curanda, sive saltem minuenda, est hypochondriaca affectio: præterea muliebri profluvium; atque tandem sterilitas. Tumoris autem antiqui in uteri regione existentis modo curationem non aggrediar: altas enim & antiquas sibi jecit radices, quæ ut evellantur, opportuniori tempore & ulteriori medicatione indigebunt.

Sterilem ad tempus, non absolute, esse juvenem Illustrissimam jam patet, cum anno primo nuptiarum marem conceperit felici partu, qui usque ad annum sextum sanus vixit, & ideo sterilitatis causam mox successisse censendum, quam adhuc in Muliere Illustr. reperiri, non autem ex parte viri, credendum est; hancque fuisse humorum excrementitiorum copiam, facile conjicio, tum quia olim tumorem in uteri regione contraxit, tum quia quatuor jam annis malignam febrem fuit passa, quæ a libertate, & forsau mutatione aliqua in vivendi ratione ortum duxit: habitus enim ejus crassior redditus

est; quare suspicandum menstruum sanguinem conditionem mutasse, & præterea muliebri profluuium (excrementorum iudicium) non solum per venas cervicis, verum & per vasa uteri interna prodire, sicque uterum ipsum irrigando, conceptionem i. pedire. Hanc vero excrementorum generationem multo magis adauxit tristitia atque mæro, ob unici filii. exitum, dum turbatis in ventriculo alimentorum coctionibus à vehementi, diuturna & tristi meditatione, quotidianæ cruditates & in pyloro, & in mesenterio stabulantes, & obstructions producentes. à jecoris & circumstantium viscerum calore fervetactæ, imò adulta redditæ, hypochondriacam affectionem excitarunt, cui facile melancholica accessio passio, ab iisdem obstructionibus sanguinis impedito motu, qui stagnans, idcirco crassior & magis exustus redditus, ipiritus inficiendo, mærorem & timorem inducit, melancholici affectus symptomata propria. Sic Galenus huiusmodi affectum describendo, dicebat credendum esse in hoc affectu plus caloris, quam deceat, adesse in illis venis quæ cibum e ventriculo excipiunt, & in iisdem sanguinem crassiorem esse redditum. Quoniam vero hypochondriaca affectione præsentē, multiplicatur excrementorum proventus, dum à mæra melancholica ventriculus infestatur, & coctiones labef. cantur; ideo à cruda materia in eodem quotidie genita, vomitus quoque materia aquosæ excitatur: & ab eadem ad jecur, indeque ad venas decursa, muliebri profluuium fovetur atque conservatur; quod flavescens coloris ut plurimum observatur, quia à jecore fervidiori reddito, à proximis obstructionibus & à meraciori vini potu biliosa materia subministratur, quæ cruda & pituitosa materia transeunti associatur. Notum tamen interim quod decipiamur in imbecillitate ventriculi consideranda atque curanda, quæ à frigida privativa, non positiva procedit: privatur enim calore ventriculus ab exuberante calore jecoris atque hypochondriorum, eo modo quo minor flamma à majori allicitur atque extinguitur, unde & siccitas in pyloro, imò & in ventriculo ipso introducit, quæ tactu percipitur adeo, ut compressionem vel levem tolerare minime possit; quod ante oculos nobis esse debet, ut vulgarem errorem in curatione evitemus.

Aliqua igitur sunt hoc tempore agenda, ut affectiones jam dictæ imminuantur, & vere venturo facilius curari & superari possint, antequam ad incurabilem statum perveniant.

Et primo ventriculus & prima viæ ab excrementis mundandæ. Secundo obstructions referandæ. Tertio venosum genus ab excrementis, quantum fieri potest, depurandum. Quarto jecoris calida intemperies moderanda. Quinto uterus exiccandus, atque tandem aliqua à proprietate pro conceptione in usum ducenda.

Pro quibus explendis intentionibus, omnium primo potio ex manna clarif. præscribi poterit, ad ℥. iv. vel ad summum ℥. v. cum alvus Illustrissima juvenis facillimè solvatur. Mox per quinque dies summo mane assumat.

℥. Julap. acet. ℥. ii. aq. florum citri ℥. i. aq. cinnam. ℥. ii. m. pro una vice, & sic pro aliis. Quinque autem transactis diebus, repetatur potio jam dicta, addito cochleari aquæ cinnam. Pro ulteriori humorum præparatione.

℥. Succi depur. cich. borag. endiviv. an. ℥. i. per arenam tranciantur, deinde adde tart. vitriol. gr. xii. juris alterati borragine, malva, agrim. ℥. iii. m. pro una vice, & sic pro aliis septem. Hæc autem, aut sequentibus diebus, sanguis ex jecoria dextra est omnino educendus ad ad ℥. vii. vel ℥. viii. tempore nimirum intermedio & æque distanti à præterita & futura menstruum expurgatione. Sed interim septem jam dictis transactis diebus, aliquod leve purgans erit exhibendum, quale esse poterit potio jam dicta ad unc. iv. addita drachma rhabarb. & agar. infusioni consueta, & evacuatione incepta, superbibat libram aquæ hord. vel juris hordeacei. Inde ad ulteriora præparantia, aperiencia, at non valde exiccantia erit deveniendum, ut

℥. Succi depur. malv. agrim. an. unc. i. per arenam, aut manicam colentur, deinde adde salis tart. nxi gr. x. juris carnium alterati malva borag. agrimonia unc. iv. m. pro syr. & sic pro aliis. Sequenti vero die summo mane bibat.

℥. Aquæ stillat. de succo cich. de succo agrimon. an. unc. iv. syr. de succo hyon. unc. i. m. pro una vice, & sic pro aliis, cui præmittatur bolus ex ℥. i. Extracti de rhab.

Sic sequenti die reassumat sal. tart. huiusmodi alternatim procedendo usque ad dies viginti quatuor.

Interim postremis diebus se recipiat ad Balneum montis falconis, & fiant infusiones cum tubulo in aquis illis sulphureis & salgeminis duodecim aut quindici diebus, quotidie mane & vespere per semihoram, ascendendo etiam usque ad horam integram.

Post hæc Profluuium muliebri prospiciendum erit; in quem finem paratur pulvis turturis eodem modo quo pro altera Illustrissima adolescente scriptum fuit.

Ita pro fecunditate recuperanda aliqua erunt in usum ducenda, & esse poterunt eadem, pro altera Illustr. præscripta; quibus addi potest pulvis stellarum in vino exhibendus, vel decoctio radicis imperatoris, quandoque etiam pastinaca sylvestris.

Et victus ratio quæ fuit jam pro altera præscripta, erit observanda, cruditates arcendo, nec humiditates multiplicando, moderatis & opportunis cibis & potibus; corpus exercendo, præsertim jejuno ventriculo: & virum ejusdem Illustriss. monendo, ut decem dies ante menstruas purgationes à concubitu abstinere, & statim secutis iisdem mensuris, cum uxore coeat, & penis glandem balsamo factitio peruviano ante coitum illinat.

Reliqua pro jecoris fervore contemperando, & alia incumbe futura æstate erunt adimplenda, nisi jam dicta, à me in præsens propolita suffecerint. Idem ibidem.

Muliere Profluuium cum uteri prolapsu.

Illustrissima & Excellentissima comes cujus, ætatis

ætatis & habitus sit, ignotum est, temperamenti totius pariter non enarratis, hepatis tamen calidioris, capitis candioris & humidioris, & ventriculi frigidi, de cujus menstribus purgationibus mihi relatum est, cum superioribus annis laboriosos tulerit partus, tribus abhinc annis, præcipuis tribus symptomatibus conflictari cœpit, nimirum vehementi lumborum dolore, muliebri profluvio, & uteri procidentia, ita referente Excellentissima. Viro astanti: quo tamen ordine innaferint, scire hætenus non licuit. His accedunt quoque quandoque dentium dolores, & occasione motus, tum corporis, tum animæ, dorsi dolor cum reliquis omnibus adeo exacerbatur, ut totum corpus alteretur, & arteriarum omnium pulsatio vehemens exciteretur. Effluit autem ab utero materia heterogenea, tum cruda, tum assata, & facile quoque serosa, adeo acris & mordax, diversique coloris, ut mordicando, excoriationem in uteri vagina excitare videatur: cum tamen nulla sanies, minusque pus apparverit unquam, & ideo ab omni exulceratione prorsus immunis censeatur. Varia fuit experta medicamenta purgantia, Decocta radicis cannz sylvestris & salis; aquas sancti Maritii, verum omnia citra levamen, quinimo ex Purgantibus hystericos & colicos dolores non semel passa fuit. Modo de agendis pro salute consultit.

Quod matrona Excellentissima quam ego in consentienti ætate suppono, itemque mediocris habitus, & secundum totum temperamenti (ut conicere licet) ad calidum & siccum vergentis, vehementi lumborum dolore crucietur, fluxione variaz materie diversique coloris ab utero detineatur, & uteri procidentiam patiatur, Excellentissima Medico relatori credendum. Verum num uterino fluore, an muliebri profluvio laboret, mihi decernendum est; & præterea ad quem gradum ex tribus uteri procidentia pervenerit statuendum. Quæ ut distinguantur, plura in relatione desiderantur, quæ nititas nimirum materie quæ per uterum manu, aut digito tangentis, num scilicet fundus os uteri tantum tangat, & primum; an ad vaginæ dimidium perveniat, & ita secundum: an vero extra pudendum tangatur & prospiciatur, sicque tertium gradum constituat. Facilius autem nobis erit muliebri profluvium ab uterino fluore distinguere, si materia profluens diversii coloris, cruda & assata consideretur, quæ à sola uteri intemperie & nativi caloris imbecillitate provenire haud credi potest, eoque minus, si copiosa fuerit: præterquamquod & jecoris fervor, & capitis intemperies calida & humida, & ventriculi frigiditas, licet privativa, multorum excrementorum heterogeneæ naturæ proventum necessario arguere nobis videntur: à capite namque calida & humida intemperie affecto, & per consequens destillationibus obnoxio: catarrhalem materiam, eamque copiosam, non in dentes solum, unde dolores, sed multo magis in ventriculum continuo debuisse credendum, cujus portio crassior facile in vasis mesaraicis detenta, obstructions etiam reliquit, quæ arteriam aortam comprimentes, facient à parva occasione ejusdem, & reliquarum omnium arteriarum

pulsationem adaugent: & inde exortis hypochondriacis flatibus, dolores quoque, hypochondriaci proprius, quam colici, quandoque excitantur; portio vero tenuior ad jecur & venas delata, & à calore ejusdem liquata, una cum sanguine exulto, acido & acris, à facultate expultrice ad uteri venas detruditus, & muliebri profluvium excitat, quo, ut dicebat. Galenus a totum corpus per uterum expurgatur: hocque fieri, nullo modo utero affecto. Verum progressu temporis hujusmodi profluvio perseverante, vel uterus ipse intemperie aliqua, vel aliquo morbo in soluta unitate, quinimo & in situ mutato tandem affici solet; quod in casu nostro evenisse censendum; dum a perenni & diuturna humorum in uterum fluxione laxatis superioribus ligamentis, latis nimirum, quæ desinunt in uteri fundum, laxatus quoque à suis appendicibus est uterus iose, unde ejusdem procidentia secuta sunt, quæ adhuc major evadit, quotiescunque partus difficultates, aut abortus accedant, adeo ut aliquando uteri funis invertatur, & non solum primum, verum secundum & tertium procidentia gradum constituat. Nec mirum lumborum dolores his casibus excitari, cum jam dicta ligamenta lata, sicut desinunt in uteri fundum prope cornua, ita musculus lumborum proxima sint; Muliebri vero profluvium copiosius evadere solet, dum menstrua, aut immunda procedant, aut prorsus suppressa fuerint.

Affectus isti sunt omnes magni faciendi: Vteri namque prolapsus præterquam quod sterilitatem importat, præterea mulieribus turpis & molestissimus esse solet; muliere vero profluvium quandoque cachexias, nonnunquam Tabes accerlit, vel utero aliquod grave malum imprimat, sterilitatem & illud frequentissime inducens. Difficilis autem curationis erunt in hac Excell. Matrona, quoniam plurimum annorum, & altas sibi radices confirmavit. Nihilominus ego floridam ætatem supponens, bonumque corporis habitum, nondum graciliorem redditum, viresque robustas, salutem non despero: eoque minus, cum propria hucusque non fuerint administrata remedia malorum horum omnium radices extirpantia. Utinam pascere proxime petactio hæc scribere mihi datum fuisset.

Pro salutē igitur comparanda, medicæ intentiones erunt, primas vias mundare. Secundo obstructions humectantibus & Aperientibus referare. Tertio venosum genus totum depurare. Quarto caput expurgare, & ut mali fontem, exiccare. Quinto uterum reponere, si fuerit opus, ejusque ligamenta robore. Sexto reliquias materie in venoso genere existentes ab utero divertere, atque tandem calidam jecoris & venarum intemperiem corrigere.

Quibus intentionibus ut satisfiat, à chirurgico fonte, quamvis Gal. in curatione uxoris Boethii nullam de sanguine mittendo mentionem fecerit, eadem tamen in casu nostro opus esse judico, utpote ab illo dissimili: scatebat enim illa aquositatibus multis, quæ retentæ, & in utero collectæ, uteri hydropem excitave-

rat, quare brachii vena magis apparens, præfente Medico, erit aperienda, & sanguis q. s. mittendus; cætera genera revulsionum non adeo apta statim videntur ante totius repetitionem minorationem: conveniunt enim profluvio mentium multo magis, quam muliebri, & ideo nec derivatio locum habebit, nisi fortasse menstrua imminuta; aut suppressa fuerint. Caute-rium sinistro brachio affixum, opportunum foret, ad materiam catarrhalis à capite delabentis diversionem & evacuationem, quamvis capitis exacta exiccatione secuta, evitari possit. Uterina vero præsidia topica, quoniam nonnisi toto & capite expurgatis administrari debent, cum Hipp. in uteri prolapsu curando dixerit: ventrem autem nesciveris; ideo ordine executivo proponuntur.

Et interim reliqua remedia ex fonte pharmaceutico depromuntur. Pro prima explenda intentione potio magist. ex manna clarif. & post sex dies repetita, idoneum erit leniens, & intermedis, quinque diebus julap. acet. ad 3 ij. addita oxymel. & aq. flor. citri unica uncia, aptum erit præparans.

Pro secunda intentione tutum erit adhibere succos depuratos & per arenam trajectos cich. borag. & agrim. ad 3 ij. additis gr. x. salis tart. fixi, in jure pullæ cichorac. alterato. Præparati vero humores, octo aut decem dierum spatio, erunt expurgandi pilula de tribus ad 3 j. flori calicis commixta, superbibendum præbeatur serum, aut aqua hordeacea.

Inde ad tertiam intentionem explendam succi pariter depur. exhiberi poterunt ex cich. agrim. & fumar. in jure pullæ cichor. melissa, lupulo & asparago alterato. guttulas addendo spirit. tart. ter rectificati, qui sal quoque volatile continet in semetipso: humores enim præparando, ad urinæ vias quoque ducere poterit: cui syrupo, si placeat Viro Excell. Adstanti, præmitti poterit oxymel dilutum, aqua ag. im. paratum; in horum autem usu duodecim aut quindecim diebus erit insilendum; sed quinto quoque die elective purgans erit exhibendum, indicationem desumendo ab extracto sanguinis: namque electuarium de succo rosarum, diapheui. & confectio hamech. cum jsture cassia; erunt purgantia eligenda, quibus semper aliquod hydragogum, exemplo G. leni, ut mechi. extractum addi poterit: quibus semper superbibendum serum, aut aqua noceriana sive hordeacea.

His peractis, pilula capitales pro quarta adimplenda intentione, bis aut ter quarto quoque die erunt exhibendæ, nimirum cochiz, aut, & aggregat. ad 3 β. simul mixtæ, diebus intermedis succos depuratos præbendo cich. agrim. & beton in jure cichorac. & capitalibus alterato, caputque Erthini expurgando, ex pulv. radice ireos, major. & nigella, aut tabaci paratis. Inde ad capitis intemperiem humidam auferendam erit deveniendum; in quem finem de decocto sudorifico præbendo omnino cogitandum, alioquin & jam à me præscripta, & præscribenda, inutilia, sicut reliqua omnia antehac administrata, proflus evadent: hoc enim remedium genere non solum caput, pars mandans, exiccabitur, uterus nempe, & cum utero universum corpus. Parabitur autem ex visco quere.

modica salsa, lentisco, & china quoque, si macies aliqua inceperit, in aquis stillat. de succo cich. & beton. præmittendo pulverem viper. ad gr. xv. aut xx. Decimo quoque die potionem ex manna clarif. aut syrupum ros. solut. exhibendo, & quadraginta diebus in hujus usu insilendo. Quo tempore non adeo tenuis, licet attenuans esse debebit victus ratio; & pro potu consueto parabitur ex residuis aqua secunda, addendo in fine ebullitionis frustula cinnam. frustula citri & saccharum ad licitum, ut fiat aqua suavis vulgo cedrata.

Quinta intentio erat, uteri in situ naturali repositio, & ligamentorum roboratio; quare repositione si egeat, ut docet Aët. & Paul. Matrona illustr. supina collocata, coxis altioribus, reflexis popliteis & cruribus disparatis, pessario ex lana altringentibus imbuto, uterus sursum repellendus; deinde aut eodem pessario, aut pessario ex subere in loco conservandus, imo circulus uterinus ex eodem subere in eundem finem parandus, Matrona ipsa cum Hipp. octo aut novem dies decum hente. Interim umbilico cucurbitula appolita prodest, necnon sub mammis; odorata naribus, foetida utero commendat Aët. cum Hipp. Lumbis vero ceratum aliquod corroborans erit apponendum, quod ex mastiche, pulv. constricti & cerato de pelle arietina poterit reformari. Post hæc vero mirabiles experimur quotidie infusiones, primò in aquis aponitanis humiditates exiccandi & resolvendi facultatem habentibus: mox in aquis montis grotti, sive agrotorum, facultatem exiccandi & efficaciter roborandi obtinentibus.

Sexta erit intentio reliquias humorum ab utero divertere, more Galen. qui uxorem Boethi hydragogis, diureticis, frictionibus asperis & cibo euchymo curavit atque sanavit, nunquam altringentibus usus, ut perperam reliqui Romæ Medici fecerant. Nos igitur diversionem quidem cum eodem tentabimur, at non diureticis, quoniam serosus & aquosus humor fere simplex in illa Boethi uxore peccabat, crassiores vero humores in casu nostro, qui ideo per alvum potius erunt ducendi electuario lenit. cum pil. de tribus aliquando, non nunquam cum magist. mechoac. bis aut semel in mense.

Postrema tandem intentioni satisfacere posse videntur aquæ thermæ acidulæ, & præsertim vitriolatæ, quæ alias non profuerunt, quoniam mali fons non in hypochondriis & hepate solum, sed multo magis in capite reperiebatur. Verum quoniam impetuosè & violentè ad vias urinarias & uteri tendunt, ideo suspectas habeo, & potius aliquot diebus cyathani aq. stillat. cich. anguriz & cucurb. cum jul. pio ros. & viol. totius substitui posse credo, ut tandem ad usum lactis asinini, ut quod quæ n. celerè me distribuatur, nec caput feriat, ad quadraginta saltem dies. Matrona Excell. ducatur, eo tunc, ut viscera naturalia contemperentur, sanguinis qualitas demulceatur & edulcoretur, totumque corpus, forsitan substantiis humectatione indigum, renutrietur.

Hæc sunt, quæ pro vera, legitima & absoluta dictorum affectuum curatione mihi necessaria videntur: quorum administratio quoniam

apriori tempore eget; ideo aut ea tantum ex præscriptis eligenda, quæ ab anni tempore calidiori permitti poterunt aut prius tota curatio in tempus magis opportunum differenda: addita congrua victus ratione, propositis indicationibus proportionata. Etli ventriculo robur aliquod addere Viro Excell. Adstanti videatur, sal abstinenti statim à cibo quandoque deglutendum præcipiat, ceteraque opportune præscribat. *Idem ibidem.*

Muliebri profluvium & infœcunditas in hypochondriaca melancholica.

Illustriss. Mulier annum trigessimum agens, Viro nupta, temperamenti totius & jecoris ad calidum & siccum vergentis, capitis humidioris; jam duodecim annis concepit, & octavo mense abortivit; dum vero in utero habebat, materia modo alba & viscida, modo flavida & crassa ex utero huebat; post abortum lotia copiosa nimis & abundantia eruperunt, adeo ut ad medica auxilia silentia & altringentia confugere coacti fuerint assilientes, a quorum administratione menstrua purgationes, quæ antea convenientes & abundantes prodibant, imminuta reddi coeperunt, & ab illo tempore paulatim semper magis defecerunt, ita ut in præsens duos tantum dies anticipantes parcissime effluent. Interim de ventriculi imbecillitate conqueri coepit, quæ in dies semper uivaluit, cum pyralismo rugitibus in abdomine, copiosis flatuostitatibus & frequentibus vomitibus materis crudæ, ut plurimum acidæ, adiglar succi limonum: accedentibus suffocationis sensu, cordis oppressione, capitis gravedine & perturbatione, timore & frequentibus mœroribus, etiam sine causa manifesta, cum imminentis delirii suspitione & vitæ desperatione; & multis diebus, antequam menstrua erumpant omnia sæviora redduntur, cum dolore humborum. perseverante adhuc jam dictæ materis, quandoque alba & viscida, ut plurimum flavida & crassa per uterum effluxu. Accersitus fuit Medicus pro curatione, & aquam tertucianam exhibuit, indeque alia medicamenta, ut conjectare possumus, calida, decocti nimirum & pulveres, indorem provocando, à quibus tantum abest ut levamen reportaverit, quin potius abscessus sub ala sinistra confertim extuberavit, & quâ citissime suppuraverit qui à Chi-urgo adaptus, copiose expurgatus fuit. Cum autem vitam inspicere ducat, & infœcunda sit reddita, ad me pervenit, ope medica indigens in quem finem hypochondria manibus tractavi, & obstructions non leves, valde exiccatas, sub pyloro in mesenterio & utero manifestas percepi, nec ab istis jecoris gibbam partem immunitatem inveni. Quare hoc veris tempore congruo medelam infra scriptam consulo, non quidem ut ex toto ab hisce affectionibus omnibus hæc sola vice vindicetur, sed ut ad multo meliorem statum redigatur.

Mensium imminutione & muliebri profluvio detinetur Illustrissima Mulier, atque ab affectu melancholico hypochondriaco committitur: neque credendum à facultatis imbecillitate neque ab Uteri densitate, sive duritie, neque à naturali angustia vasorum primum provenire

posse symptoma: siquidem ante conceptionem satis abunde itatus temporibus per Uterum expurgabatur; sed ejusdem duplici assignari potest causa, nempe sanguis crassus, qui occasione profluvii locum abortum secuti, præcipitavit in Uterum, & in eodem ramansit, tenuiori parte affluente, ibidemque deinde confirmatus ab altringentium medicamentorum usu, à Medico incaute præscripto, adeo ut ab illo tempore vasorum allectio, & sanguis crassior quotidie semper redditus, imminutionis mensium semper etiam magis adauctæ, pro causa concurrant. Anticipationis causa est natura irritata a prava qualitate & copia ipsius menstrui sanguinis evacuationem exigentis, qui dum paulatim acervatur in Utero vasa replens atque distendens, cruciatus affert pluribus diebus, antequam menstrua erumpant: improbi namque sanguinis testimonium fuit muliebri profluvium, primis annis etiam ante conceptionem apparens. Et quoniam si menstrua plura hant, accidunt morbi, & si non hant, ex utero morbi contingunt, hinc factum fuit quod excrementorum copia, tum a fervido jecore, tum ab imbecillo ventriculo quotidie genita, nec per Uterum expurgata, in venolo genere detenta, à natura partim ad cervicis Uteri venas transmissa, muliebri profluvium conservaverit: partim ad venas internas, obstructions in Utero adauxerit, sicque mensium imminutio successerit, & infœcunditas: in vasis vero hypochondriacis retenta, in istis stagnans atque stabulans, motu & circulatione privata, affectum hypochondriacum melancholicum procreavit, fortan etiam sine prægresso hypochondriaco affectu, qui tamen necessario successit, tum ob ventriculi naturalem quamdam imbecillitatem, tum quia in melancholicis hypochondriacis necessario compatitur, unde creditur, quibus & in lacteis & in mesentericis venis obstructions succedunt, & in casu nostro ad jecur quoque pervenerunt, & gibbam partem nonnihil obstruxerunt; ab his autem crasse factis & terreis redditis, exhalationes, flatuositates nempe crassæ jugiter elevatæ, & tandem adducta omnia in relatione symptomata in naturali regione procedunt: hoc est rugitus ac murmuræ huc & illuc per ventrem vagantia, & ventriculi perturbationes, ciborum imminutiones & nonnunquam ad acidum corruptiones, & diaphragmatis compressiones, unde suffocationis sensus emanant: sicut à mixta sanguinis melancholica, & in Utero, & in mesentericis stabulante, tetri & crassi vapores ad cor & in caput efferuntur, qui spiritus obtenebrantes, timores insolitos, & sine causa mœrores inducunt, imo Patientem Illustrissimam ad futuri delirii suspitionem, & ad propriæ vitæ desperationem deducunt; de quibus & Hipp. dicebat, quod Sanguis in Utero retentus, præ multitudine resilit in cor & septum unde cor fatum sit: à fatiuitate vero sequitur torpedio, & à torpedine delirium apprehendit: & ideo mortem, ut bonum, vel saltem ut minus malum, amant. Ad quæ omnia mala inducendæ negari non potest, olim adhibita medicamenta, jecoris, hypochondriorum & sanguis fervorem, & æstum adaugentia, non parum conspirasse; Vtero itaque male affecto existente, totius sanguinis im-

puritate

puritate addita, quid mirum, si mox à conceptione destiterit, & Mulier ipsa Illustissima in-
tercunda reddita fuerit, dum sanguis menstruus,
ut tertium generationis principium, ad concep-
tionem concurrat, & nisi satis profuant men-
strua, Uterus gentale semen arripere non po-
test.

Sicut status huiusce Illustissimæ Patientis
Medicis eget auxiliis, ita ab iisdem non adeo
cito optatum levamen reportaturum esse cre-
do: antiquæ enim & confirmatæ in ea sunt om-
nes jam diutæ affectiones, & quod prius est, me-
lancholicæ, & quæ magna indolentia atque dili-
gentia ex parte Medici egent, sicut ex parte
Patientis non minori obedientia, quam præ-
stare eidem operæ pretium est, cum sit juve-
nis, & ideo de longa vita feliciter traducenda
agatur.

Curationem itaque alacri animo aggredia-
tur, primo primas vias expiando atque muni-
dando. Secundo obstructions in mesenterio
stabulantes removendo, aut saltem hac pri-
ma vice imminuendo. Tertiò massam sangui-
neam depurando. Quartò Uteri vias, quoad
fieri poterit, aperiendo; atque tandem jecoris
atque hypochondrii calorem contempe-
rando.

Propositis autem intentionibus satisfaciend-
um remediis Chirurgicis, Pharmaceuticis &
Dieteticis.

Et inter Chirurgica, omnium maxime con-
venit sanguinis missio, quia substantia, qualita-
te & motu peccat ipse sanguis, nec proluheri
potest à gracilitate, quæ in hac Illustiss. non
adeo evidens & insignis est: Multi enim graci-
les, dicebat Gal. sanguine abundant, alii crassi
parum habent: & subdebat, ob id ego mulier-
cula, cui jam octo menses menstruæ defece-
rant, licet extenuatissima foret, primo die san-
guinis sesquilibrium detraxi, secundo libram,
tertio semilibram; at nos minori quantitate
contenti erimus. Educatur itaque decem à pur-
gatione saltem diebus, ex vena jecoraria bra-
chii dexteri, usque ad 3 vi. cujus color si in me-
liorem mutetur, exire permittatur usque ad
3 vi. cujus color si in meliorem mutetur, exire
permittatur usque ad 3 viii. si vero niger usque
ad 3 vi. totus appareat, supprimatur, & tertia
die repetatur venæ sectio brachii sinistri, sangui-
nem pariter ad 3 vi. educendo. Et quamvis ex
pede quoque, ratione motus, sanguinis missio
conferre possit, erit tamen in finem curationis
differenda, & facienda statim à secuta men-
struali purgatione, adhuc hiantibus orificiis
vasorum Uteri, ad 3 v. aut ad 3 vi. ad summum:
sicut parum antequam erumpant menses con-
ferre potest cucurbitula sicca, & pubi, & in-
guinibus affixa; eodemque tempore somenta,
spongia magna uterinis partibus admota & re-
petita, prius imbuta, & expressa decoctione
malv. mercur. dictami cretici, sabinæ, calam.
montani, radic. althææ, & lil. alborum, mane
& vesperi per horam; qua remota, fiat inunctio
oleo lil. alb. cum aromatis. Interim toto cu-
rationis tempore abdomen illiniatur unguento
malvano, oleo amygdal. reformato.

Ex Pharmaceuticis desumenda sunt primò
Lenientia.

Syr. ros. solut. clarif. 3 iv. pot. ex man. cla-

ris. 3 iij. aq. florum citri parum, m. f. potio,
cui, tribus transactis horis, superbibat jus hor-
deo vel malva alteratum, & hora una ab assump-
to jure prandeat. Sex sequentibus diebus assu-
mat summo mane tale præparans.

24. Julap. acet. 3 ij. aq. ros. citri 3 j. aq. cin-
nam. 3 ss. m. pro syr. & sic pro aliis, à quibus
subsequatur expurgatio.

Ita 25. syr. ros. solut. de polypod. an. 3 iij.
aq. florum citri parum, m. f. potio, & tribus ho-
ris ab assumpta portione superbibat feri capr.
depur. aut aquæ nocer. 3 j. ss. duabus vero ho-
ris ab assumpta aqua prandeat. Sequenti vero
die assumat tale præparans.

26. Succo depur. & per arenam trajecti, ci-
chi. borag. intybi an. 3. j. decoct. in jure pullæ
paratæ malvæ viol. melissæ, sonchi. 3. v. pro
syrupo. Sequenti mane assumat bolos ita pa-
randos.

27. Floris cass. rec. extracta 3. ij. Tart. vi-
trioli. gr. x. m. f. boli, & post horam superbi-
bat jus alteratum solis cichi, borag. endiv. mal-
væ, viol. agrim. & tribus horis ab assumpto jure
prandeat. Tertiò vero die repetat succos in jure
alterato, ut supra; & quarto repetat bolos, ut
supra, ita perseverando ad xv. dies; quibus
terminatis, talis præbeat potio.

28. Rhabar. opt. 3. j. fol. senæ rec. mund.
polypod. an. 3. ij. cinnamomi integri 3. j. aqua
f. m. f. inf. per hor. xij. deinde f. expressio, &
adde expressioni syrupi ros. solut. 3. v. m. f. po-
tio, & tribus horis ab assumpta portione præbea-
tur ferum capr. depur. ad 3. ij. duabus. vero
ab assumpto sero prandeat. Inde ad ulte-
riora deobstruentia erit deveniendum sic.

29. Succo depur. & per arenam trajecti cichi.
agrim. pom. dulci an. 3. j. decoct. in jure para-
tæ borag. malvæ, agrim. capill. Ven. culcutræ
3. v. spirit. tart. ter rectif. gutt. vi. m. pro syr-
upo. Sequenti vero die assumat bolos ita paran-
dos.

30. Flor. cass. rec. extr. 3. ii. rhabarb. opt.
3. ss. m. f. boli, & post horam superbibat

31. Seri capr. destill. 3. j. syr. de succo. li-
mon. unc. j. tribus vero horis ab assumpto sero
prandeat. Tertia die repetat succos, ut supra;
quarta bolos, & ita alternatim perseveret ad xv.
dies, quibus absolutis, assumat potionem hu-
jusmodi.

32. Pot. ex man. clarif. unc. vi. addendq in-
fusioni consuetæ rhabarb. opt. 3. item, tri-
bus transactis horis, superbibat ferum depur. ad
3. ii. & duabus horis ab assumpto sero pran-
deat.

Ita referatis quoquo pacto & mesenterii, &
jecoris obstructionibus, & massa sanguinea
quodammodo purificata, ad uteri venas ape-
riendas deveniri poterit; in quem finem pare-
tur Julapium hystericum tali pacto. Miceren-
tur folia sabinæ, dictami cretici, artemisiæ,
calamenthi in aceto & aqua capill. ven. per
hor. 12. deinde facta expressione, addatur ad
ignem sacchari q. s. ut fiat julapium d. lutum &
longum, deinde.

33. Hujus jul. pii 3 ij. aq. malv. capill. ven.
arte. i. iij. an. 3 ij. salis artemisiæ gran. i. m. pro
potu maturino, decem aut duodecim diebus
exhibendo; quo eodem tempore apponatur ute-
ro spongia decoctione supraproposita imbu-

ta, & expressa, modo quo supra inunctionem subuendo, amota spongia, ut scriptum fuit.

His peractis, absoluta quoque erit curatio, siue totius & partium expurgatio, quibus duo sunt addenda alia remedia præstantissima, nullo modo omittenda, ad obstructionum reliquias delendas, & jecoris, hypochondriorum & totius sanguinis calorem contemperandum, ac ad totum corpus substantiæ humectandum & connutriendum, quorum alterum internum erit, alterum externum; primum erit lac asinum per quadraginta vel quinquaginta dies, mane de more quinque horis ante prandium assumendum, incipiendo ab \mathfrak{z} v. cum semiochleari albi, & ascendendo usque ad \mathfrak{z} x. cum integro ejusdem sacchari cochleari; sed assumatur nuperrime multum cum suo naturali calore, neque eidem superdormiendum. Alterum externum est balneum aquæ dulcis, tepidum & ad frigidum potius inclinans; alteretur autem aqua foliis malv. viol. mercur. fouchi, in quo moretur ad semihoram, vel paulo plus, horis vespertinis circa 22. horam & in hujus usu perseveret ad 30. dies. Interim non omittendo lactis usum summo mane, & in eodem, etiam terminato balneo, perseverando.

Dum lac assumit, decimo saltem quoque die sumat casiam ita parandam.

\mathfrak{z} l. Floris cass. rec. extr. \mathfrak{z} v. crem. tart. \mathfrak{z} ij. m. l. boli, cujus in fine augeatur parumper dosi usque ad \mathfrak{z} j. Et quoniam, repurgato corpore massa sanguinea purificata, & quod magis est, referatis uteri obstructionibus, & in integrum redacti menstrua purgatione, muliebri quoque profluvium cessurum esse jure redendum sit, ideo a suppressantibus & astringentibus hac vice abstinere utile fore puto, ne rursus obstructions & in visceribus, & in utero adaugeantur.

Quare jam dictis omnibus sit sit, congruum vivendi rationem addere. Et primò incolat ærem, qui non sit crassus, paludosus, vitet crepuscula & quaecumque æris inclementiam. Secundò victus sit potius refrigerans & humectans. Inter carnes virentur suillæ, bubulæ, aves lacustres. Inter pisces, virentur palustres, cœnoli, ut tinca, anguilla, & hujusmodi, testaces & ostreæ, & in sartagine frigi. Edulia ex pasta parata prohibentur, exceptis vermiculis apulienibus. Inter lactaria, damnatur caseus, præsertim antiquus. Inter legumina, permittuntur tantum oriza & hordeum. Inter fructus, prohibentur acidi, & nimis dulces, ut pruna omnis generis, cerasa acida & ficus, reliqui conceduntur: uva tamen sit pensilis & alba. Inter olera damnatur brassica. Condimenta prohibentur ex aromatibus, cinnamomo & pipere ruditer confuso exceptis; pariter prohibentur ex alio & cepis; acida item omnia. Vinum sit quidem album, sed non dulce, non austerum, mediocriter generosum; & interdicitur potare inter prandium & cœnam. Somnus sit diurnus, sed nocturnus; & si consuetus diurnus, sit brevis. Exercitium confert, sed ante cibum, nempe mane & postremis horis vespertinis. Alvus lubrica servetur passulis, vel prunis decoctis, jusculis quoque carum superbibitis; qui-

bus non sufficientibus, exigua sufficiat portio floris cassiæ ad \mathfrak{z} ij. vel iij. sub cibo sumenda. Animi passiones arceantur, consocietates procurentur, & solitudines evitentur, alacrique & confidenti animo sustineatur, & credat se iteratis purgationibus, non tamen adeo diuturnis & operosis, optatam sanitatem consecuturam. *Idem ibidem.*

Muliebri profluvium cum sterilitate in hypochondriaca.

Nobilissima Juvenis vigesimum quartum annum agens, temperamentum calidi & siccum, mediocris habitus, & muliebri profluvio multis abhinc annis divexata, elapso proxime anno adolescenti Viro nupta, sex abhinc mensibus timore ac morore sine causa cum alvi stypcitate affligi cœpit, ipsaque menstrua quæ statim temporibus per octo dies, licet cum aliquo dolore fluebant, in minui & quinque diebus absolvi. Mesenterium in parte dextera obstructionibus implicatum est, prout uterus in sinistra. Coitu parum delectatur, & tarde admodum semen emittit. Modo & inveterati profluvii, & aliorum malorum auxilium efflagitat, ut conceptioni quoque idonea reddatur.

Ex tribus affectibus de quibus conqueritur Illustrissima Adolescens, duo proprium individuum, tertius speciem & propagationem respicit. Individuum, melancholia hypochondriaca & muliebri profluvium: speciem sterilitas ipsa. Et quoniam postremum à primis duobus pendere censeo, ideo primi duo considerandi & curandi, demum tertius.

Postquam igitur Nobiliss. Nupta Viro juncta est, relictis propriis parentibus & familiaribus, ob hujusmodi status mutationem, aliquam animi apprehensionem pati cœpit, cui addita quoque victus mutatione & ciborum superingestionibus, ventriculi coctiones deteriores reddi cœperunt, unde cruditates genitæ & in mesenterio firmatæ, in eodemque a calore circumstantium viscerum, & jecoris potissimum exiccatæ, terreæque redditæ, melancholicam naturam contraxerunt, & circulant sanguini viam interceperunt, qui diutius inibi stabulans, & ipse crassitiem a calore adeptus, hypochondriacæ & flatuosæ affectioni melancholicæ quoque addidit: eoque facilius, cum sanguinis a toto pars crassior ad uterum transmissa, & in ejusdem venis retenta, reliquo sanguini transitum impediat, & menstrua consueta diminuta reddat: unde affectio melancholica non à solo mesenterio & epigastrica parte, verum & ab utero atque hypogastrica originem ducat. Verum quoniam antehac liberæ vivendi rationi indulgit, vicerum quoque, ventriculi nimirum & jecoris aliqua semper læsio emerit, atque ideo excrementorum quoque proventus necessario Nobilissimam Pat. nolestavit, & potissimum cruditates in ventriculo, privative potius, quam positive affecto genitæ, quæ a jecoris calore fuscæ atque liquidæ, ad venas transmissæ, in se per arterias ad uterum delatæ, per eundem ut plurimum aquosæ & pituitosæ, quandoque etiam sed raro, bili mixtæ excernuntur, & muliebri profluvium

sistunt, quod uterum humiditate irrigando, seminis retentionem impediendo, seminum exquisitum ipsius uteri obtundendo, facile sterilitatis quoque causa evadit, cum Vir ejus sanitate fruatur; nec in toto Nobilem & pulchram Adolescentem, ætate, atque colore florentem, adeo pravam dispositionem habere conjiciam, quæ sterilitatem inducere possit.

Quare ut eidem medicam opem præstemus, expiatis primis viis, obstructions primum menses, tandem & ipsius uteri referandæ. Secundo Milla sanguinea ab excrementis depuranda. Tertio ventriculo robur addendum, & jecoris intemperies corrigenda, ut tandem uterus ab humiditatibus liberetur, & nonnullis quoque à proprietate juvantibus conceptio procuretur.

Quæ jam dicta omnia hoc anni tempore absolute exequi non poterunt, & ideo nec nostrum finem assequi; aliqua tamen sunt agenda, ut ipsius affectus diminuantur, & Vere venturo facilius evadat eorundem eradicatione.

Interim repetita sanguinis missio ex Chirurgia depromenda, primo ex venis superioribus, tempore æque distant ab utraque menstrua purgatione: secunda vice ab inferioribus, desinentibus usdem menstruis, hoc est, hiantibus adhuc uteri valis.

Ex Pharmacia vero pro prima intentione.

℞. Pot. manna clarif. ʒvi. aq. florum citri parum, m. pro potu. Iude per quinque dies assumat summo mane.

℞. Crem. tart. ʒβ. dissolvatur in jure corticibus citri alterato, sicque quotidie. Inde repetatur potio jam dicta. Mox ineunda præparatio ita.

℞. Tart. vitriol. grau. xii. & dissolvantur in jure alterato cichorio, boragine, endivia, malva & agrimonia, & ita per septem dies. Quibus transactis.

℞. Pot. ex man. clarif. ʒv. addendo infusioni consuetæ rhabarb. opt. ʒi s. rad. mechoac. ʒj. ciinam. integri ʒβ. aq. florum citri parum, m. f. potio, & incepta evacuatione superbibat feri capr. depur. aut aq. nocer. ℥ij. & duabus horis ab assumpto sero prandeat. Post hæc ultiores obstructions aperiendæ ita.

Ita ℞. Aquæ stillat. capil. ven. malvarum an. ʒiv. spirit. tart. rectif. ʒj. m. pro una vice, & sic pro aliis; quod præparans alternis diebus est exhibendum: diebus vero intermediis.

℞. Flor. cass. rec. extr. ʒi β. rhabarb. ʒj. m. f. boli, quos assumat summo mane, & hora transacta superbibat jus malva & endivia alteratum: sicque alternatim, viginti quatuor dierum spatio sanat & spiritum tartari, & rhabarbarum modo jam dicto. Quibus transactis, sumat potionem.

℞. Pot. ex manna clarif. ʒv. addendo infusioni consuetæ rhabarb. opt. ʒij. spicæ gr. xi. florum citri parum, m. f. potio, cui pariter, ut supra, superbibat aut serum, aut aquam nocerianam.

Interim quindecim hisce postremis diebus se conferat ad balnea Montis Falconis, sedeat in semicupio, & per tubulum recipiat aquas sul-

phureas illas & salgemmosas, quæ idem his in die, saltem ad semihoram.

Tandem aliqua ad profluvium muliebri conferentia erunt in usum ducenda; simulque nonnulla à proprietate conceptionem juvantia. Pro profluvio coeundo, paretur pulvis ex turturæ & masticæ, hoc pacto. Turturæ plumes denudentur, exenterentur; vino nigro ablutur, grans mastich. in pleatur, & acut confutur, in furno reponatur, & ita assetur & in pulverem redigatur: cujus pulveris dosis erit ad ʒj. singulo mane per mensem in cyatho aq. stillat. & tenerimis quercus foliis.

Pro conceptione obtinenda, paretur pulvis ex matrice leporis, vino prius abluta, & pariter in furno exiccata: cujus pulveris assumatur semidrach. in vino albo, parum ante cenam. Pariter conduci pulvis seminum erucæ ad ʒj. eodem modo & tempore. Item sat satyrionis à ʒβ. usque ad ʒj. in vino albo generoso.

Familiaris sit inunctio partium ad uterum attinentium, ex oleo lil. alb. cum aromat. in quo dissolvatur exigua portio coaguli leporini.

Quibus omnibus congrua vivendi ratio erit addenda, potissimum in cibo & potu: cruditates enim & serositates sunt arcendæ: & ideo prandio & cœna Nobiliss. Adolescens sit contenta, nec de more extra templis bibat, vinumque sit tenuis substantiæ, nec generosum, nec dulce, nec austerum. Corpus exerceat in negotiis domesticis agentis: Scythæ namque Domina propter otium steriles erant: sicut ancillæ, propter exercitium fecundæ. Ab Illustrissimo Viro observandum, quod abstinere à coitu octo aut decem dies ante menstrua; in quorum fine coire opportunissimum erit: facilius enim semen ab utero modice menstruato retinetur: sicut ab iisdem abundantibus extingueretur. Animi passiones sunt arcendæ, & potissimum moror & ira: quarum omnis occasio est removenda à Nobiliss. Viro suo & ab omnibus Domesticis ejus. Quæ scripta sat sunt usque in venturum Ver, quo tempore ad alia transeundum; si opus fuerit. Idem ibidem.

Muliebri profluvium, & infœcunditas in hypochondriaca.

Illustrissima muller annorum viginti septem; temperamenti calidi & humidi, mediocri habitus; quatuor abhinc annis fluxu muliebri; materis modo albæ, modo flavæ, modo alterius coloris torquetur; cui symptomati multis abhinc mensibus additur melancholiâ insueta; cum rugitibus & flatuositatibus; murmurationibus in hypochondriis; necnon cordis aliqua oppressione. His tamen non obstantibus duos peperit filios, masculum unum, & foemellam alterum. Sexdecim tamen abhinc mensibus infœcunda reddita est, mensibus purgationibus bene fluentibus. Quare de agendis consulit.

Duplici affectu, melancholiâ scilicet & muliebri profluvio detineri mulierem Illustrissimam ab exacta & erudita relatione intelligo, quibus tertius; nimirum infœcunditas, superadditur.

Pro quibus expugnandis incum exigitur consilium. Et si melancholiam consideremus, hanc hypochondriacam invenimus, ex rugitibus, copiosis flatuositatibus, septum comprimentibus, ut propterea flatuolus affectus à Galeno dictus fuerit; qui licet solus sine melancholia dari possit, facile tamen & ut plurimum in melancholiam migrat, dum à clausuris in lacteis & mesentericis venis existentibus, caloris illarum partium ventilatione impedita, phlogosis introducitur, crassificato nimirum & arefacto ab eodem adaucto calore sanguine ipso, qui stagnans in illis venis, nec amplius circulus, vaporibus atris ab eodem elevatis spiritus inficit, qui tum in corde, tum in cerebro tenebrosiores redditi, timores atque moerores sine causa manifesta ingutunt, melancholiz characteres proprii, neque à toto venoso genere melancholiam consensum habere puto, cum temperamentum calidum & humidum, & habitus totius corporis mulieris Illustrissimæ carnosus & floridi facie coloris observetur. A toto tamen muliebri profluvium provenire minime dubito, quod etiam urina junientorum similis, ab Hippocrate asinina vocata, confirmare solet, ad differentiam uterini fluoris, qui non adeo copiosus esse solet, & præterea quoniam mulier Illustriss. jam concepit, utero gestavit, feliciter, peperit, signa evidentia, quod vitium in toto, non in utero reperiatur: profluvium enim muliebri est illud, in quo per uterum totum corpus expurgatur: hocque mulieribus frequens & familiare esse solet, & ideo muliebri profluvium dicitur: rarissimus autem fluor uterinus, quem ideo dari posse negarunt & Massaria, & Altimarus. A toto itaque effluunt humores diversi coloris & albi, & flavi, modo consistentis substantiæ, modo fluxibilioris, quæ diversitas plures quoque, ac diversas esse partes affectas, tales humores jugiter reproducentes, nobis significat, & istæ sunt concoctionibus delinæ: à ventriculo namque Bradypeptiz & imminutæ primæ coctiones, indeque cruditates procedunt: sicuti à jecore fervidiori reddito flava & biliosa materia; quandoque ab eodem calore nimis crassificta, quandoque fusa atque liquata nimis, progignitur, qui humores utpote in massa sanguinea redundantes, copia & qualitate peccantes, & naturæ molesti à facultate expultrice irritati ad uterum extruduntur, & non per magna vasa in uteri corpore existentia; non enim concepisset, neque in utero gestasset: quæcunque enim uteros humidos habent, non concipiunt; sed per vasa cervicis, ubi quoque molestum percipit Illustrissima Mulier pruritum. Et quamvis modo infœcunda reddita sit, non in uterum, sed in improbum redditum sanguinem culpam referendam esse censeo: purus enim debet esse sanguis menstruus pro conceptione, cum tanquam tertium generationem ipsam concurrat.

Medica providentia eget status Illustrissimæ mulieris, non solum quia melancholico affectu præsentem infelicem vitam ducit, verum etiam quia, si muliebri profluvium augmentum suspiciendo ulterius progrediatur, color totius vitatur, & cachexia, aut atrophia postea succedunt. Verum tamen est, quod non adeo facile erit utrumque debellare affectum; & licet uno

eodemque tempore, iisdemque remediis utrique providebimus, melancholiz tamen incumbere est nostra potissima intentio, cum in ordine affectus melancholicus prior sit curandus, ut sine quo non alter affectus, nimirum muliebri profluvium tolli possit, quibus sublatis infœcunditas quoque recederet. Quare primæ viæ expiandæ. Secundò obstructions mesenterii aperiendæ. Tertiò eadem reliquorum viscerum reserandæ. Quarto massa sanguinea ab humoribus excrementitiis vindicanda. Quinto fervor jecoris & renium contemperandus, non neglecta aliqua Ventriculi & uteri tutela.

Et ex Chirurgico fonte sanguinis missio non unica tantum est deprecanda ex utroque brachio, & potius pareior: quamvis enim de hac Galeus in hoc affectu curando nullam mentionem fecerit, unde & Boëthi citra ullam sanguinis missionem curaverit, eandem tamen omisit, quoniam muliebri profluvium omnino serosum fuit, sicut frequenter esse solet: in nostro vero casu biliosum ut plurimum, & à pituita forsitan etiam salsa, unde pruritus, quorum ratione & jecoris fervor, & humoris calor, & acrimonia missione sanguinis eget, quam & ætas, temperamentum totius, habitus corporis, & anni tempus permittunt.

Ex Pharmaceutico fonte pro primarum viarum expiatione aptissime & optime administrata fuere lenientia ex manna clarif. & syr. ros. sol. vel ex cass. lenit. & tartaro. Pariter præparati fuerunt humores julapio acet. addito poline crem. tart. aq. flor. citri dissoluto, repetitumque fuit alterutrum ex lenientibus propositis, ut inde ad primi gradus deobstructionis deveniri posset; quæ exsiccatis obstructionibus, humectantia esse debent, & ideo succi depur. & per arenam trajecti conveniunt cich. borag. sonchi ad ʒ iij. in decoct. jure pullæ parata cichorac. addita malva & violis, in qua dissolvantur gr. x. tart. vitriolati. Septem autem aut octo transactis diebus, præparati humoris purgandi portione ex manna clarif. addendo infus. consuetæ rhab. opt. ʒ ij. tribus vero horis ab assumpta portione superbibendum serum depur. ad lb ij. & duabus horis ab assumpto sero prandeat. Inde ad ulteriora aperiencia progrediendum, quæ tamen in activis qualitatibus sint moderata, & humectantia in passivis; præbeantur itaque succi, ut supra, & depur. cichor. malv. ad ʒ iij. addendo ʒ ss. salis tartari fixi, in decoct. malv. viol. agrim. lupul. asparag. jure pullæ parata. Sequenti vero die parentur boli ita.

℞. Flor. cass. rec. extr. ʒ ij. rhab. opt. ʒ j. m. s. boli, quibus post horam superbibat seri capr. destillati libram, vel saltem ʒ x. tribus vero horis ab assumpto sero prandeat. Tertia vero die rursus assumat succos, ut supra, & quarta bolos cum sero: sicque alternatim perseveret ad xx. usque diem; quo tempore assumat.

℞. Decoct. epith. Mes. syr. ros. solut. an. ʒ. iij. aq. flor. citri parum, m. t. portio, tribus horis ab assumpta portione superbibat ser. capr. depur. lb. ij. & duabus horis ab assumpto sero prandeat. Quod si sanguis jam extractus apparuerit valde impurus, repetenda erit duabus aliis vicibus eadem portio, eodemque modo, alioquin omittenda. Et pro reliquis intentionibus explendis alia vix

alicujus aquæ chalybeatæ usum erit instituendus, cujusmodi esse poterunt Villenses, vel si præsto non fuerint, saltem nostræ Apōnitæ B V. tribus primis diebus cum vehiculo dejectorio præbendæ, reliquis vero quindécim cum diuretico, diligentissime facta observatione, ut ex toto transeant; in quem finem vehiculum diureticum tale esse poterit.

℞. Aq. stillat. asparag. capill. Ven. malv. an. ℥ss spiritus turt. ter requis. ʒss. m. & summo mane præbeatur hæc potio, statim superbibendo cyathum aquæ mineralis; transacta vero hora, reliquam aquam potare incipiat usque ad ℥b. vij. circiter, in cuius primis duobus cyathis exprimatur unius lim. succus; dosis vero ipsius aquæ paulatim adaugeatur, usque ad x. vel xij. libras, retrocedendo usque ad vi. sed semper præmittendo vehiculum diureticum.

Terminato aquæ usu, lac asinum nullo modo omittendum, Melancholicis enim est singulare remedium, tum quia obstructions sicciores & contumaciores superare valet, dum topus quoque emollire Gal. asserat, tum quia hypochondriorum & jecoris fervorem contemperaet, sanguinis acrimoniam & salsedinem demulcere, sicque ejusdem vitium corrigere valet præbeatur autem, ut moris est, suo naturali tepore, nuper mulctum, incipiendo ab ʒ. v. cum semicochleari sacch. albi, & ascendendo usque ad ʒ. x. cum integro cochleari, cui tamen non superdormiat, & perseveret usque ad quadragesimum vel quinquagesimum diem.

Interim si ventriculo aliquod robur addere sit necesse, à cibo statim deglutiat gr. ij. maitich. integræ aut ʒ. j. salis absynth. aut pilul. ex succo absynth. densato. ita pro Uteri excitatione & roboratione infusiones à Viro Excellentissimo propositas laudo in aqua Montis Falconis quæ ut salgemmosa & sulphurea nostræ intentioni satisfacere poterit; caute tamen infusiones administrandæ, nimirum infra renes & reliqua viscera naturalia, in aqua sedendo cum tubulo, ne renum & hypochondriorum calor reaccendatur: imo ante Balnei ingressum jam dictæ partes sunt muniendæ, in frig. Gal. ung. ros. & santalino renes; rosato vero simpl. totum abdomen illiniendo.

Neque de majori astrictione solliciti esse debemus; profluvium enim hujusmodi ex seipso suppressi solet, deficientibus in venoso genere excrementitiis humoribus, qui deficiunt, intemperiebus partium remissis atque correctis; quod tamen omnino hac sola Purgatione nos consecuturos vix credere possum.

Restat igitur solum, ut jam dictis omnibus conveniens addatur vivendi ratio, quæ erit ab Excellentissimo Viro adstanti exacte atque diligenter præscribenda, ut fundamentum nostratum omnium operationum, cui reliqua quoque omnia & executioni mandanda, & si opus fuerit, etiam alteranda atque mutanda libenter committo. *Idem ibidem.*

Observationes.

Pro Fluore albo.

Purgatio decenter corpore, mane & vespere ante pastum per decem dies utatur hoc balneo.

℞. Fol. Lauri, organ. calamenth. puleg. menthastr. Sabin an. M. iij. attemini. meliss. nepet. beton. majoran. an. M. iij. rad. rub. tinct. cypers. an. ʒij. rad. rusci, asparag. an. ʒij. splic. nard. (exsiccat enim humiditatem) junici odori an. ʒj. sem. rutæ, dauci, anis fœnic. fœsel. an. ʒss rad. valerian. ʒij coquantur in aq. pro balneo. Si valde fluant humiditates albæ, ne concitior fiat fluxus, styptica magis addantur. Si adhuc fluor non vincatur, semel in hebdomada accipiat has pilulas.

℞. Pil. mahich agar. troch. an. ʒij. cortic. myroball. cheb ʒij. excipiantur melle ros ex ʒj. l. pil. vi. dentur iv. pro vice. Succini farina cum ovo sorbili detur. Hæc sunt quæ ad album fluorem profunt, & præcipue hic pulvis, quo multæ matronæ Nobiles post universalia remedia lanatæ sunt.

℞. Falcium Lucil piscis, capitis caponis in furno exsiccati; an. ʒss. ossum dactylorum ʒij coriandr. præpar. sem. anis. torrefact. an. ʒj. rad. nymph ʒss. sacch. ros. ʒij. datur ʒj. cum vino rubro. Petrus Forestus. obs. 13. lib. 26. De morbis Mulierum.

Ad evocenda ab utero ad alias partes recrementa, tria valde profutura præsidia occurrunt, diureticorum usus, repetita ex rhabbaro purgatio, & ligni guaiac. decoctum, quod ita fit.

℞. Ligni guaiac. ʒj. rad. sassaparill. ʒij. santal. om. omnium ʒj. infund. in aq. chalybeat. ℥lii. horis 12. deinde bulliant ad consumptionem tertiæ partis: sub finem ebullitionis adde. fol. plantag. menth. j. n. atricar. artemis. fœnicul. capill. ven. an. p. j. sumac. rad. petrosel. an. ʒj. colati ʒ vij. vel viij. exhibe in auro-ra, & sudor molluscule provocetur, idque viginti saltem diebus continuus præstandum: quo tempore cauterium cruris dextri parti interiori affixum, non possum non summopere laudare. *Jo. Zecchi* consult. 35.

Hujus mali maxima habenda est ratio, cum mulieres quas exercet, steriles ut plurimum reddere soleat, vel etiam gravidis abortum parere remediis usitatis peractis, si vitium adhuc pertinaciter persistat, Electuario mihi hoc in casu sæpe felici cum successu usurpato utatur.

℞. Gummi arabic. tragacanth. corall. utriusque; an. ʒij. ciner. putamin. ovor. C. C. sem. Pro revulsione laudo vomitum cum diasaro Fernelii ad ʒss. detur ex aqua mulsa, vel.

℞. Rad. asari ʒss. detur cum oxymel.

Pro derivatione materiæ per alvum conveniens est medicamentum jalapæ, in hunc modum.

℞. Jalap. pulv. ʒj. cinnamom. pulv. ʒss. m. & cum jure pulli. F. potio. Deinde pro præparandis humoribus sumat singulis quoque mane tria cochlear. oxymel. simpl. per v. aut vi. dies: deinde sumat. ʒss. hydragog. min. Fernel. vel in bolo cum sacch. vel cum paucio vino: his ad exsiccandum corpus & roborandum ventriculum, decoctum sassaparill. cum paucio ligno guaiac.

confectum sumat per 15. aut 20. dies, & procurat: sudorem semel in die, ut materia revellatur ad cutem; id quod Galen. procurabat facere in uxore Boethi lib. de Præcognitione, fricando corpus melle cocto, & etiam linteis primò lenibus, postea asperioribus: derivetur quoque materia ad urinam, quod fecit Galen. ex decocto rad. asari & apii: venter quoque si tumet & maderet, arena calida exsiccare debet: id quod Gal. in uxore Boethi fecit victus, denique sit exsiccans, & quam minimum bibat. Rodericus à Fonseca. tom. 1. consult. 4.

Nonnunquam evenit mulieribus pituitosum profluvium, cum pituita per alias partes denegetur exitus, hæc per dorsum ad uterum defluit. Siccabimus in his caput & siccabimus illam pituitam decocto guajaci & syrupo Montagnanz. Nam lotu & suffumigiis curationem recipitur, inquit Hippoc. de morbis mulierum. Jo. Hearnius ad aphor. 16. sect. 5.

℞. Fimi asinini m. iv. macerentur aq. rosac. magna rejiciatur, & cum sacch. f. syr. cujus in hoc affectu admirabilis vis est. Paretur etiam Syrup. ex succo urticæ mollis. Pro suffitu plurimum valet rasura ebor. carbonibus injecta commendatur hoc facile paratu. Accipitur ebur tenuissime in lapide porphyrio pulverisatum, & propinatur ex aqua chalybeata Guil. Bullonius, comment. ad hist. 2. lib. 2. consul.

Nos sæpius hoc remedio hunc morbum sanavimus, nempe nucis pineæ decocto cum ligni visci quercini portione in potu administrato: mirabile remedium est huic morbo, sicuti nos pluries observavimus. Dominic. Panarolus, obs. 48. pentecost. 2.

Fluore albo mulier quædam mediæ ætatis laborans ultimum & copioso sic curata est.

℞. Pilul. assajaret & fortid. an. ʒj. cum succo artemis. f. pil. v.

℞. Pulv. aromat. rosac. ʒj. ras. ebor. & C. C. an. ʒj. cortic. citri. sic. diamargar. calid. an. ʒss. galang. cyper. an. ʒj. ciner. spong. combust. & lota aq. pecul. rosac. ʒss. sacch. ʒj. f. pulvis. Capiat cochl. j. mane ante ingressum balnei. Balneum tale ordinavi.

℞. Rad. bistort. lapath. an. lb j. gallat. malicori an. m. ij. fl. chamæm. melil. ros. rub. sol. absynth. an. m. j. aluminis ʒj. sal. ʒj. tartar. p. j. f. decoctio pro iniectione in balneo Utatur in dies hora una in hypocausto calido & sic fuit pulchre sanata. Felix Platerus obs. lib. 3. pag. 781.

His pessis sæpe usus sum in fluore uterino ad expurgationem illaviei.

℞. Fell. vacæ ʒj. rad. asar. agar. cinnam. an. ʒj. succ. mercurial. ʒj. coq. cum melle paucis reliquisque permixtis f. instar. unguenti ad sacculos implendos. Felix Plat. obs. lib. 3. pag. 781.

Menses albi præmissis universalibus quibusdam appropriatis emendantur, qualia sunt apud obstetricem gallicam, pag. 83. sem. citrulli, si singulis diebus numero xij. deglutiantur superbito haustu lactis vel.

℞. Camphor. ʒss. scobis ebor. ʒij. aq. ros. nymphæ. an. ʒss. m. & repetatur sæpius pro dosi. Wolfgangus Hoeserius cap. 1. lib. 7. Hærenl. med.

Mulier quæ integro biennio fluxu albo laboraverat, accepit nucem moscatum, ejusq; assata & divisa partem ʒ. manè. alteram ʒ. vespere adsumpsit; sicque continuando sanata est. Hoc ip-

so remedio utebatur quoque Tho. Erasmus in flendis mensibus nimis & fluore albo. Ceu singulari experimento. Hieron. Keesnerus obs. 101.

Quædam jam aliquot annis fluxu albo confictata hac ratione convalescit, accipiebat cineres samentorum vitium, & aqua inficiens pedes fomentabat vespere immediate antequam cubitum iret, primoque die deglutiebat grana juniperi tria, altero v. tertio vii. semenque pizterea urticæ adsumebat. Idem obs. 103.

Mulier quædam quadragenaria diuturno fluore albo laborans, post multa remedia frustra tentata, ptisana laxante per mensem integrum singulis diebus usurpata, protinus liberata est.

Ptisana conpositio talis fuit.

℞. Sem. mundat. ʒj. sem. coriandr. præp. liquirit. ras. an. ʒss. aq. fortis in qua tamarind. ʒij. ligni lentiscini, ʒj. bullient cyathum unum infundantur frigide per noctem, & colaturam capiat manè duabus horis ante pastum. Lazarus Riverius, obs. 81. cent. 3.

Mulier quædam à septem mensibus fluxu muliebri seroso laborabat, quam curavi intra quinque septimanas exhibendo singulis octo diebus gr. viii. resin. jalapæ: educta scilicet serosa illuvie, à qua pendeat affectus. Deinde recidive occasio sublata est usu sequentis opiæ.

℞. Conf. ros. antiq. ʒij. conf. absynth. ʒj. pulv. elect. triant. & aroniæ. rosac. an. ʒj. coral. rub. præp. ʒss. theriac. vet. ʒij. cum syr. de rosis siccis fiat opiæ: de qua sumebat ad magnitudinem avellanz singulis diebus hora somni per longum tempus. Simon Jacoz. obs. 8.

Hic Syrupus bonus est & utilis in hoc affectu.

℞. Fl. artemis. matricar. melil. beton. salv. origan. eupator. asari, an. m. ij. cumini anis. ammeos. sem. rutæ, carvi, an. m. j. enulæ sicæ m. iv. cal. aromiat. galang. zedoar. cindam. an. m. ss. bistort. gall. mosch. doronic. viol. citrinat. an. ʒij. liquir. ʒss. bulliant omnia in lb xii. aquisque ad medietatis consumptionem. Deinde cum forti expressione colentur, colatura addatur aceti lb ss. sacch. lb xv. coquantur ad debitam consistentiam ut f. Syrupus: cujus dentur manè ʒij. cum aq. absynth. bet. & meliss. an. ʒj. & tardetur cibus post ipsam horis 4. Baribal. Montagnana conf. 214.

Puella quædam octodecim annorum fluore albo diu laborans post multa & varia remedia quibus per annum integrum usa est hoc uno sanata est. Sorbebat jejuno stomacho ovi vitellum recentem aq. rosacea exceptum, & intra quindecim dies sana evasit: cæterum album ovi prædicta aq. rosac. concussim, & jejuno stomacho ebibitum non solum ad album fluorem facere, sed gonorrhœam sanare satis sumus experti. Amatus Lusitanus curat. 12. cent. 4.

De Puella octenni fevora albo laborante.

Puella nobilis octennis, habitus corporis gracilioris, corripiebatur per tres menses fluore muliebri, s. albo mensium fluxu; (qui, referente Hoechstettero, Augustanis puellis, etiam parvulis virginibus familiaris esse solet, jex nimio atq; continuo sacchari usu, quo à pueritia assuecra, & somno, cui indulget hæcenus contractio, cum pallore faciei & labiorum, cephalalgia gravi, respiratione anhelosa, palpitatione cordis, lassitudine gravativa, appetitu penitus prostrato, ac metu ne malum hoc in cachexiâ aut atrophiam degeneret

neret, idque ob depravationem nutrimenti sanguinis. Parentes de salute filiolæ non parum solliciti, consilium implorabant meum. Ordinavi varia, quæ alias cum felici successu in hoc affectu adhiberi sciebam, imprimis ad ad humores crudos præparandos, obstructions referandas, ac intemperiem corrigendam optima tandem observata dicta, præscripsi vinum medicatum, ac postea tincturam corallorum cum spiritu lignorum præparatam aliquoties exhibui, & ægram præter parentum opinionem divina benedictione optimæ sanitati restitui, quæ adhuc superstes atque incolumis vivit. *D. Joh. Matth. Neri.*

De fluore albo in puella sex annorum.

Filia Civis cujusdam honesti sex annos nata, corpore erat cachectico, inquirenti in causam hujus cachexiæ, narratum mihi fuit emanare ex pudendis hujus filię materiam albicantem, quæ fluori muliebri simillima erat; ulcus enim adesse nulla signa denotabant: purgavi ergo illam per epierasin infuso rhabarbari, & deinde tincturam corallorum in liquore aliquo convenienti per aliquot dies exhibui, & sic Deo benedicente, feliciter fuit restituta. *D. Casp. Kolichen.*

De fluore muliebri croceo.

Nota mihi est Matrona Nobilis, quæ singulis mensibus ordinario non sanguine; sed materia serosa crocea purgatur, hæc materia lintheamina si tangit, nulla lotura deletibilis existit: cæterum bene valet, nec ullum incommodum sentit, nisi quod sterilis existat; lochia alias flava esse rarum non est, præsertim si puerperæ crebrius in cibis & condimentis croco utantur; exinde enim lochia semper flavescere observavi. *Dom. Alardi Hermannus Cumanus.*

De fluore albo curato.

Scorbuticæ matronæ, fluore mensium albo fatigatæ, cum variis ex arte præscriptis remediis non satis ex voto procederet sanitas, consilio amici electuarium præparari jussit quod ex Abbate Italo acceperat, non huic tantum malo sed stomacho roborando, ruborique faciei profuturum, me tamen prius consulto. Dissuadere usum non potui, cum, præmissis quæ ex methodo præcedere debebant, electuarium hoc ex aperientibus ventriculumque roborantibus compositum viderem. Nonnihil tamen à me immutatum fuit, cum à manu medicarum rerum non adeo perita scriptum esset.

℞. Limaturæ chalyb. pep. & nutritæ in aceto commun. per novem dies 3 ij. myrobalan. chebulor. indor. belliric. emblic. nucis moschatæ an. 3 v. sem. nasturt. ind. ameos herb. origani piperis oliban. zinziber. pulp. tamarind. pic. nard. squinanth. rad. ciper. an. 3 iij.

Contunde contundenda, tere terenda, imprimis myrobalana, contundantur cum ol. amygd. dulc. quod deinde prorsus abstrahatur ut sicca sint, exinde in pulverem terantur. M. f. l. a. electuarium.

In mulio, vel vino, alternis diebus exhi-

bendum quantitate nucis. Multorum experientia probatum, non malè cessit Matronæ honestissimæ, usitatis antea medicamentis præparatæ.

Alias non unam fluore albo afflictam restitui vino medicato ex aperientibus & uterinis, denique decocto rad. chinæ. Inter rara experimenta, & sapienter ero feliciter probat adversus albas mulierem fluxiones, hoc accepi in Italia; cremorem nempe seminis lactuæ prius macerati in aqua extinctionis chalybis, addito pulvere eboris in tenuissimum pollinem reduct.

D. Thom. Bartholini.

Smegma uterinum.

Catherina Frevode, post sterile conjugium, ab obitu mariti ad secundas transiens nuptias prægnans tandem redditur circa annum ætatis prope quadragesimum, infelici eventu. Postquam enim prius gestationis mensibus caussæ afflictæ penissime in rationes Libitinæ venisset, ultimo sane mente de doloribus uteri, febre vaga, torminibus horrendis conquesta Celeb. Vir, D. D. Simonem Pauli mecum (ut quorum ante truciore usa fuisset consiliis) advocavit; qui excretorum novitate, & gravitate symptomatum impediti serius acceritos nos ostendebamus, nec jam immedicabili malo posse occurrere. Duravere parturientis dolores per plures omnino dies, oncem movente lapidem obstetricæ Regiæ, ut infans, quem extinctum certis signis docebat, protraheretur in lucem. Sed conatus parientis succubuerat, Prodebat autem ex utero interea plurimum liquoris crassi, denique, colore ita albo, ut nivem provocaret, odore nullo. Dixisses vel Smegma Venereum albidissimum modico humore lubactum, vel delicatissimi generis pomatum, quod vocant. Admovimus candelæ musitatum hoc spissamentum, quod tantum abest ut arderet, ut strepitu etiam candelam exstingeret. Tandem mors peregit mandata, & nos de crassamenti hujus natalibus ambiguos reliquit. *D. Olaf Borrichius Professi. Rogli Hassniens.*

Lympha uterina acris salsa & subinde caustica.

Dici vix potest, quàm variis sæpe humor per interna & naturalia seminarum destillet, si ve colorem seu acrimoniam spectes. De colore mensium variegato res feminis quàm Medicis notior, non enim omnia effutunt, & ne hoc faciant putant sterilitate prohiberi. Acrimonia verò adeo sæpe invalescit, ut instar cauterii lente proserpentis vicina depascatur fibrarumque carnearum, quibus ipsis magis est inimica quàm solidioribus partibus, solvat contextum, atque hoc a levibus & vix cognoscendis principiis. Primum enim, quæ sanguinem fundit colliquatque acrimoniam muristica salsa, nisi nature reprimatur, cunctis deinde gradibus lixivam causticamque induit naturam, & post hæmorrhagias fluoresque versicolores texturam corripit solidi, inque tabum liquidum subinde resolvit; imprimis quando à fermento venereo naturalis acrimonia

nia contagium accepit. Hic autem velim observent naturæ custodes, quàm huic plerunque loco acrimonia sit vernacula & velut intermentum seu pignus generationis concessa. Distillat nimirum ab interna uteri superficie vaginæque rugis tubulatis ros quidam nitrosus, generationis seminarium, qui junctis tandem particulis in humorem se coagulat falsum muriaticum, tam copiose aliquando fluentem, ut menstrua mentiantur alba. De hoc vidi conquereutes feminas, tamen Virgines, quod ordinarium sæpe mensium fluxum copia exsuperet totoque inde tempore duret, non mutato propterea sanguinis menstrui ordine, prodire autem non fluoris tantum sed & grumorum gelatinosorum specie. Narravit mihi femina huius probatissima sibi, cum virgo esset, menstruis cum Lunâ euntibus fluorem plerunque successisse album, frutulus crassioribus & instar albuminis ovi cocti comitatum, neque ante demisse hoc vitium (si ita vocandum est, quod sine ulla valetudinis labe corpus succulentum occupabat) quam cum Viro consuesceret, tum cum suppressio illo fluxu menstrua sola ordine prouideret. Illa tamen ipsa, cum aliquando rei novitatem stuperet, ex grumulis, qui naturam atque inter femineum inquinare solebant, unum manibus oculisque exploravit, repetitque materiam albo ovi cocto plane similem, cumque curiositate ducta digitum ori admovisset, tam perditæ aciem, ut quovis lixivio certare posset, insectumque os frigida diluere necesse haberet. Ego quoque, cum juvenis Anatomica sequeretur experimenta, lympham ejusmodi viscosam crassitudine urticæ marinæ æmulam in vacuorum uteris, præsertim circa osculum internum & vaginam deprehendi; excussa uteri vaginæque superficie interna tubuli oculis obvi erant, qui ad cultelli stricturam humorem sudarent viscosum, non aliter ac raxæ cutis post pressionem solet. Atque illum humorem esse arbitror, qui degeneri & serina acrimonia contextum tandem destruat solidorum viscerumque crasin immutet, *Joh. Nicol. Pechlinus in observ. Physico-Medic.*

Anatomica I Inspectiones.

Elizabethæ Anglæ quinquagesimum jam ægenti ætatis annum menstrua octennio ante finire cessarunt, nunc inde ab anno redeuntia, sed inordinate: per tres menses eodem fluore corripitur albo, copioso, summaque cum virium debilitate: sensim aucto, adeo ut stanti ambulantiq; semper invitat quid destillet: acrimonia humoris abditæ naturæ loci multum erodebantur, urinaque juxta suppressæ: inde grani sanguinis prodierunt, ingenti cum dolore præsertim in hypochondriis: alvus per quinque continuos adstricta erat: adhibita autem incassum fuerunt a Medicis excellentiss. pharmaca tandem supervenientibus intolerabilibus circa pubem & anum cruciatibus, & vomita materiz biliosæ mortua est.

Dissecto post mortem cadavere sequentia notavimus, 1. Omentum tenue, sine pinguedine. 2. Ventriculum magnum ac valde capacem,

biliosi humoris plenum, internè rubentem, & multis quoque glandulis, conspicuum. 3. Intestina tenuia in inguine sinistro contracta penitus, & crassa tum flatibus tum duris excrementis distenta, præterea variis in locis veluti occlusa. 4. Pancreas cinerei coloris, durum tactu. 5. Lienem coloris nigricantis & 6. Hepar pallidum, ad flavedinem biliosam vergens, nec sanguineo rubore tinctum: 7. Hujus vesiculæ copiosa bilis inerat: 8. Glandulæ in regione lumborum plures, conglobatæ, atque aliz prope uterum, valde duræ erant, humorem crassum, sebaceum, flavescens & puri analogum ex se fundentes quo & vasa lymphatica distenta turgabant. 9. Venarum sanguis tenuissimus fuit, sero multo dilutus, 10. Cordi polypus erat. 11. Pulmones sani; 12. Ren sinister duplici cavitate, pelvim efformante, præditus. 13. Vesica urinaria lotio adhuc turgibat. 14. Uterus arcte undique partibus vicinis adhæsit, fundo ejus cum recto intestino, vesicæque urinaria unito. Circa testiculos, utroque in latere, hydatides sat magnæ conspiciebantur, lymphæ turgentis insipida: ipsi testiculi purulenti & ulcerati fuerunt, nec tubarum processus rite apparuit: liquor in arteriam spermaticam injectus, omnia uteri & vaginæ vasa implevit, indeque levi compressione, cum ex utero tum & vagina manavit: uterus magnus erat, intrinsecus rubeus, exulceratus, excoriatus, pure farctus, inque sinistram magis latus inclinans: ulcus extra uteri portæ, in vicinam quoque vaginam serpsit, nam ista, quasi gangrena tacta, prius nigricare visa est: vasa uteri omnia cruore turgabant, *Ex literis à Clar. Joh. de Muratio, Tiguri Medico & Chirurgo die 27. Augusti 1677. ad Nobil. D. J. Conradum Pejer, Medicum Schafnusi.*

In Angliâ muliere quæ Leucorrhœa per plures annos decubuit, & tandem cortolisvis matris ulceribus misere obit, uno cum Clariss. Sylvio 14. Maii 1668. Lugduni Batavorum, glandulas totius corporis omnes lymphaticas, seu conglobatas, duriores flavasque exticisse, & humorem crassum, sebaceum, luteum, puri analogum continuisse: vasa vero lymphatica valde repleta & distenta fuisse deprehendimus: super ad testes, in tubarum extremitate hydatides utrinque magnæ aderant. *Joan. de Muratio Exercit. de Lympha & Saliva, in Annæis 5. 11.*

Mulier 40. ann. ex partu laborioso fluore albo se laborare conquerebatur: dolorificus valde hic fluxus, nec uniformis hic semper, cum tenui modo, modo viscidæ magis magis exiret materia, diverti coloris odorisve: injectioes hic adstringentes variz a Chirurgis variis adhibitz, at sine ullo successu: postquam enim per 14. septimanas misere sic vitam egit, abiit tandem, exhibuitque corpus dissecanti uterum omnimodo purulentum, non uno loco materiam etiam ex fundo ipso, abdominis cavo communicantem: dissectio hæc instituta 22. Febr. 1677. *G. Blasius p. 50. observ. med. 3.*

Dec. 2. 1675. apertæ cadaver mulieris 30. annorum fluxu hæc laboraverat albo jam per 7. menses, qui ultimis temporibus gravis admodum & dolorificus, materiz foetidissimæ. Urinam parce admodum excernebat, nec unquam sine dolore: dissecus venter

vesicam

vesicam urinariam offerebat mirum in modum distentam, urinæ insigni quantitate repletam, capitis humani magnitudini fere accedebat. ad umbilicalem regionem se extendens: osti um pubis margini firmiter undique adnata, incumberebat hæc uteri non solum vagina, sed & fundo, imo pondere suo partem utramque graviter adeo comprimebat, ut non rotunda, aut saltem leviter protuberans, sed complanata, in o potius sinuosa observata fuerit: fundus ipse substantiæ licet debita, vix à statu naturali recedens, parte antica atque pollice digiti transversali laterali utraque duplicis digiti crassitiem habebat: hinc ampla valde quamvis ipsi incumbens vesica, extensio ejus tanta ut utriusque manus digitis vix tegi valeret: vagina ab extremo pudendi usque ad orificium internum ulcere sordido affecta notabatur, scatebat hæc materia purulenta, summe fetida, cujus etiam aliqua portio ipso in ventris cavo loco eo ubi vagina dicta intestino recto cohærebat, reperiabatur, eo quod consueta substantiæ uteri particula materiæ illi concessus fuerit exitus, omnibus locis gravis æque hujus vaginæ exulceratio; levior quæ vicina magis orificio externo, gravis quæ interna: nec tamen ab ulcere quamvis liberæ magis pars antica vaginæ dictæ, alienæ constitutionis omnino expers reperiabatur, duritiem enim insignem hic reperiabamus, in o & crassitiem, utraque tanta ut substantia vix minimi digiti crassitiem habens naturaliter constituta, duorum pollicum crassitiem superaret, cartilaginose fere constitutionis: atque huic substantiæ hujus, cum crassitie, conjunctæ duritiæ excedenti, urinæ suppressionem, aut saltem, parciolem excretionem, hinc vesicæ urinariæ extensionem summam, unice adscribendam ducebamus, angustato scilicet ab uteri substantia dicta meatu urinario eidem continuo. In latere dextro tuba uterina, circa extremitatem eam quæ ab utero est remotior & amplior, inflammata valde, toto reliquo corpore purulenta omnino, omni cavitare destituta, purulentus idem testiculus: In sinistro utraque pars à statu legitimo notabiliter haud recedebat: in utroque testibus vicino, cornubus uteri adhærebat vesica, quarum dextra ovi gallinæci magnitudinem habebat: liquore gelatinoso, pellucido, subflavo, repleta; sinistra vix juglandis, aquosa magis: ren uterque sero mire extendebatur, forsitan quod urinæ excretio aliquandiu parciore fuerit: æreteres amp i itidem, vesica felle insignis quoque magnitudinis, bile turgida, hepatis bonæ notæ, pancreas quoque lienis mira structura, numerum sive species sive figuram: ille duos exhibebat lienes intime connexos, sic ut nonnisi singulari adhibita circumspiciione separari potuerint: hæc locis variis incisam substantiam, adeoque quasi in lobos quosdam parte ea quæ ventris anteriora respiciebat, divisam: imo in liene hoc, duplici ex eo pore dicto modo composito, appendicula singularis etiam observabatur, quam lobum ejus vere nominare licebat; circa renem sinistram nucis moschatæ magnitudinem habens globosa occurrebat substantia, vasis mire irrita, dissecta hæc lienis substantiæ similis observabatur. Cordis ventriculum dextrum insignis admodum occupabat polypus, tenax valde, al-

bus, fibrosus, extendebat se ad plurimum digitorum longitudinem in arteriæ pulmonalis interiora: mediastino circa pericardium utroque latere, vena varix datu turgida aditabant: in inguine sinistro glandulæ quæ aderant, naturali in statu inveniebantur, quæ in dextro duplicis juglandis similitudinem referebant externam faciem spectantibus, licet valde essent inæquales: dissectæ plurimis ex particulis, albidissimis, facile digitis resolubilibus, singulari tunica involtitis compositæ videbantur: cor, renes, partesque aliæ varix maculas habebant. in tunicis se manifestantes, subnigras, lineæ albicante circumscriptas.

Ulcus dictum uteri, hinc fluor purulentus vesicæ circa vasa pampiniformia, glandularum in inguine inruessentia, quæque alia huc facientia adduximus, quam causam habuerint meum non est determinare, eo quod nonnisi viribus diuturnitate afflictionis omnino destructis, adeo ut etiam vix verbum proferre valeret, in Nosocomium delata fuerit desuncta ista, lymphæ singulari vitio, simili omnino illi quale luis venereæ, præcipuum, si non unicam causam, variis rationibus moti habemus, plurimum hic tribuamus: ultra ex dictis succedent: Hæc an correptæ fuerint à functa dicere non possumus, hoc hic monuisse satis sit, vel sanguinem luis a causis corruptum, (etiam non raro à malignis, quas inter seminum palmam ducit) lymphæ dispositioni prave, ac speciatim magis coagulationi singulari, hinc circa glandulas, aliaque loca, ubi ductuum ejus motui destinationum copia colectioni, aliisque inde productis vitis occasionem prabuisse, licet nec ipse partibus aliis humoribusque pepercerit, sic ut non solum vitia alia in muliere hac observata, verum & uteri ulcus ipsum ex sanguinis lymphæ constitutione præternat. originem duxerint, vel ex impuro congressu, seminisve pravi in utero detenti corrosiva vi ulcus uteri primo, hinc ex hoc sanguinis lymphæ vitia, quæque ab iis produci posse diximus, dependere. *Gerardus Blasius part. 5. Observation. medic. 9.*

Sæpius vidimus in dissectionibus puellarum seu virginum, & liarum mulierum profusio uteri albo, dum viverent, laborantium, quæ ob alium aliquem morbum gravem extinctæ fuerant, in utero enim earum humorem limpidissimum invenimus, qui è cavitare ejusdem guttatim stillabat per verum collium in sinum pudoris, in quo candorem tantum acquirerebat, ut cretam aut calcem dissolutam in aqua dixisses, & ejusdem mixtionis crassitiem quoque, in aliis majorem: an verò id fiat, id est, ista albedo & inspissatio humoris antea tenuis & limpidissimi, acquiratur coctione aliqua, vel aeris externi appulsu, frigidi potius ut videtur, aliis judicandum proponimus *Severinus Pinæus de Notis virginis lib. 1. problem. 11.*

FLUXUS HEATICUS.

DE Fluxu Hepati. ô jam quidem supra capite de Diarthea aliquid attulimus, ve à materia non exhaustimus, de eâ itaque rursus in præsentiarum quedam restant adducenda, ad

primò Considerationem Medicorum super Hèpatico Fluxu à Martino Carcè, Cumanò-Hungaro Lugduni Batavorum iuventam An. 1672. ac viritate, eruditione, experientia, Nobilissimo, Excellentissimo, Clarissimoque Viro D. D. Carolo Drelincurtio Philof. & Medic. Doctori, antehac in Gallia Consiliario & Medico Regio ordinario, nunc Lugduni Batavor. Profefiori Prælico & Anatomico, Præceptor publico & privato, de suggestu, & i. Theatro Anatomico, sanare & secare monstranti, cum Sueda & Apolline dicenti & docenti, subtiliter curiofo, & solide Docto, Promotori Magno, de studiis suis benemerito, & idcirco plus ex præcepto Dei, quam juramento Hippocratis suspiciendo. Oblatam, Dictatam, Consecratam.

Ad neglectus est, quòd ad cognitionem & curam Fluxus Hepaticus, ut clanculum Medicorum auxilia lubret, culcitrasque ægotantium sordibus fœdet, & tamen quasi larvatus foret non cognoscatur. Ita sicut ille Medicus, de quo Galenus v. de locis affectis cap. ultimo mentionem habet, cum ignoto tibi hoc hoste pugnabat; nec enim prius agnovit, quam à Galeno larvâ ei detractâ. Idque hac occasione: Gauco Philosophus, Vir insignis, compellat Galenum hunc in modum. Quoniam heri & Gorgias & Apelas mihi nuntiavunt, notiones, prælagique edidisse te, quæ ad Divinationem potius, quam ad medicinam pertinere videbantur, cupio equidem periculum facere, non adeò, ut tuam experiar doctrinam, quam ut sciam, nunc tanta sit in Arte Medica, tum cognoscendi, tum prædicendi facultas? &c. Sicque ad clinicum Medicum deducit. Fatum felix! Contigit Galeno primò ingressu, videre illuvientat. insaniosam, unde animo erectior factus spondam accedit. decumbentis arteriam ad carpum tangit, morbum detegit. Et dum forte fortuna lumina ad fenestras converteret, hyssopum ex aqua nulsâ decoctum considerat, ac de erronea opinione circa morbum pronunciat. O boni! quantum se medicum probat? Medici & Philosopho admirabilem, Arti Medice gloriosum.

Utinam sagacitas Galeni bonis medicis imitanda animis omnium inhaeret! Utinam sicut ille medicus solus, hostem hunc larvatum non cognovisset! Non doleremus infectum juniorum quatuor medicorum variis commorantium e quibus com mensalis unus suum morbum nec cognovit, nec in principio magnificet; superpremi nihilominus statim diem cum oculis, (ob fluxum hepaticum clausi.) socii interim ejus, ferius um phrygib. sapientes, & in mortis causas inquirentes, ab oraculo Galeni, quod consultum est, certiores de morbi natura redditi sunt. Nulli quidem cecitas aliena viam restituit; aliena tamen pericula quosdam cautos reddunt, ex quorum numero ut sim, nec vitia excretorum contenti plani medico iddignum putem, ac officiorum aphæ. Secr. 1. præscriptorum nemorem me præstem, monitoria hæc si hedi-sustarunt.

Fluxus hepaticus est dejectio indolens, humoris cruenti, ichorosi, hostilium recens matet, rum ablutioni similis, & fœtidi, ab hepatis corruptione ortum ducens. Quâ confictati, appetitu sunt prostrato, carnes oderunt, vino delectantur, febriculam aut febrem quandoque patiuntur, uti nonnunquam urgentur, sangui-

nolenta aliquando per os, nares, uterum, hæmorrhoides, aut poros emittunt, cachexiâ, pruritu, hydropè abdominis aut tumore pedum ferofos, infestantur.

Fluxus) à fluidorum in corpore nostro motu, denominationes variaz medicâ civitate donantur. Hinc *ῥέως*, fluxio, id est, ipsi fluendi actio: *ῥέμα*, fluxus: *ῥέματος* fluxio fluxus, *ῥέματος* aciluxus, destillatio: *ῥέματος* deiluxus, deiluvium, humor effluens: *ῥέματος* influxio, influxus. *ῥέματος*, fluxus, fluentum, alvi fluor, profuvium. Sanguis ipse effluxu suo variis nominibus occasionem dedit: *ῥέματος* sanguinis profuvium, *ῥέματος* sanguinis eruptio e naribus, *ῥέματος* ex anivalis *ῥέματος* cruenta alvi dejectio cum dolore & ventris torminibus. Cum vero fluxus hepaticus indolens sit, *ῥέματος* dici nequit.

Hepaticum dicitur hoc fluentum, à parte affecta, seu scaturigine unde manat. Hepatici enim dicuntur in genere, quicunque morbo aliquo hepar obfidente laborant: in specie veteribus, quibuscum loquitur Fernelius, qui hepaticum, hoc est, jecoris inflammatione tentantur; neotericis verò hepatici, jecmorosi, & jecornici eluent, quorum hepar vitium, & imbecille evasit. citra alium morbum, unde affectus nofter, *ῥέματος* hepatis imbecillitas apud multos auct. At hepar male affectum esse ex sanguinis effluentis, qualem notavimus colore, notat Galenus, v. de locis affectis. Affirmat Boerhaave, non tantum cruenta & aquosa; sed ipsam quasi hepatis substantiam decessisse eosque ex hoc affectu morerentur lib. 1. Obs. 22. in scholis. Id conprobat experientia, conjecturis & ratiociniis potentior, cui refagari nulli, nisi qui peponem loco cerebri habuerit, licet, Contigit enim Viro Excellentissimo, Anatomico curiosissimo, Practico etiam ad minima attendenti, Præceptor in Anatomicis & Praxi fido, in sui admirationem quoties loquitur me rapienti D. Carolo Drelincurtio, (quem dulciter de hac materia, publicè anno 1671. dieb. 20. 22. 23. Octobris, & privatim circa initium Martii anni currentis audivi) fluxu hepatico demptos aliquot aperuisse quorum jecur ad instar pomi putris corruptum, contrectantibus digitorum apertibus, cessit & ad contactum levem omiluxit. Haud me fugit, nequaquam me assensum eorum cogere posse. (quod etiam non contendo) qui nomen hepatici fluxus ex præjudicio notum dictitant, & hepate nequaquam morbofo similem fluxum aliunde ortum habere posse judicant. Ast longum otium disputandi de possibilibus, relinquo his, qui in utr. milibet partem disputare parati sunt; bombos tamen verborum experientia scabello discuti, veritatis aurâ difflati spectatorem me exhibeo. Notat Platerus tract. 3. lib. 2. de vitis excretorum cap. 11. Fluxum cruentum, dilutum, copiosum Dyfententem aliquando supervenientem, sed idem in causis tinctura à fluxu hepatico eundem distinguit.

Corruptio hepatis.) Hepar male affici dicitur, sed modorum doctrinâ accessu difficilis, hic quoque acclivis habet, præcipue quòd formæ substantialis vires compleat. Corruptiorem nominavi, quam Philosophi mutationem ab esse, ad non esse dicunt. At non ad non esse impli-

simpliciter, materia enim in materiam mutatur, unde ab annihilatione delinguitur, verum ab ene hepatis, ad non ene hepatis, quod fit tota modorum variatione. Tollitur quies partium & particularum juxta partes, partiumque particulas, hoc est, textum arteriarum, venarum, cavæ, portarum, lymphaticorum vasorum, pororum biliariorum, nervulorum. Retexitur majori defraudatione partium, quam procorum penelopes, tela hujus divini textoris ope contexta, flamen & subtegmen. Mutatur locus glandulosorum acinorum, & fit *ρυσ* seu *ρυσ*, id est, defluxum acinorum *εργη* vera, id est, incontinentia. Figura variationem subit. Motus ei congruens ligamentorum ope, ut hbrarum in vasis existentium, per hepatis substantiam sparsorum eluditur, unde vera *ατομία* & *αδυναμία*. Magnitudo si non increseit, quid mirum? Ponium enim putre raro (nisi *ζύμωσις* accedat,) incorrupto tumidius sit. Decrescere autem si purgat, rationi consentaneum; quia profuit aliquid ejus substantiæ, præcipue ubi mali labes diutius serpsit. Pori vitiantur, evertuntur, unde naturalis sanguinis *διρρη* impeditur, *διχολία* depravatur, & *αχθία* accenit. Quid dicam de humore vegetativo, & calore vitali a quibus vitæ *πνεύμα* adest, & *σφαιλική* partem habet hoc eni mortificatio & morticinium partis est, non ergo his magis opus, quam mortuo dapibus optimis.

Causæ corrumpentes internæ quatenus in ipsum hepar agunt) sed, quia nihil à se corrumpitur, nec tamen quicquam extra sphaeram activitatis suæ agit, causæ proximæ in ipso hepate perquirendæ. Alluit verò hepar sanguis arterialis, qui arteriæ cœliacæ ramum dextrum affluit; aliunde vero, uti venæ portarum sorduli concava jecoris irrigent, ita venæ lare radices ejus concava perreptant. Accedunt spiritus animales, quos si succum nervosum vocas non litigo per nervulos a plexu costalium singulares, sanguis hic filtratur & transcolatur ad truncum cavæ ascendentem. Bilis derivatur per poros bilarios ductus hepatis, & confluit in intestinum. Lymphæ receptaculum commune pellitur. Fluxus vero hic, quoniam per gyros intestinorum fit, viarum ad intestina perviarum ductum sequitur. Sanguis serotior solito laxat poros vasorum, aut etiam capillaribus paululum dilatatis exit in substantiam, ubi imbibitur, & infiltratur, seu spongia liquores imbibit; seu spiritus ammoniaci, seu alcohol vini parti affusus per eam serpit. Postea sero sanguinis tenuiore copiosius allabente, sanguis paulo crassior filtratur quidem, tenuius vero serum in loca uliginosa effusum cum aliqua sanguinis portione, dum poros, sanguini transcolando alias pervios, impervios offendit. Bilis motum ad poros bilarios sequitur, sicque fluxum hepaticum constituit. At quoniam pars infiltrata non exprimitur (vel compressione partium vicinarum puta diaphragmatis motu superne deorsum, vel contentatum in abdomine inferne sursum; vel constrictione illa, quæ fit partim per nervulos, partim per fibras textum hepatis constituentes, partim etiam per membranam hepatis non tantum ejus extima sed & intima pervadentem, ac vasa comitantem) uligine vitata diluit acinulos, & cohesionem illorum

disnectit, sicque à communi vita separat. Ubi videmus carnes etiam recentes, in quam putillimam & nulla ratione vitiatam manus sensim corrupti, & quidem ætate citius, quam quam hyeme. Ita motu partium naturali sublato, acinuli decidunt *κατὰ* rumæ seu calus sit; quam partis morticinium consequitur, seu jecoris *ἀσφραγία*.

Qui magis inclinant ad hunc affectum) raro hunc affectum etiam oculatissimi medici observant, unde qui sint ad hunc affectum procliviores quod ab experientia dependet, non facile determinatur; tamen rationi consentaneum videtur, tales, in quibus copiosum serum, pori bilarii patentiores, pori in vasis adducentibus laxiores, in abducentibus exilliores angusti huic affectui magis obnoxios.

Res hunc affectum inducere valentes) ær frigidus quia interiora calefacit, & sanguinem fluidiorem reddit ut Hippocrates dicit ventres hyeme calidissimi aph. 14. lect. 1. Exteriora vero frigore contrahit, affluenti sanguini copiosiorem occasionem dat, transituro eidem ac percolando obicem ponit. Vasorum advehentium, poros laxando, advehentium arcuando fluxum producit, & reliqua parte acinorum corpusculis infiltrata corruptionem ingenerat. Transpiratio enim impedita recte inter causas putredinis recensetur. Calidus, sanguinem liquat & fundit, calorem ejus vitalem turbat, non tamen prorsus incendit: spiritus contumita quibus robur hepatis. Hæc est ratio, cur homines ardente syrio ad laborem segniores deprehendantur. Humidus aer, poros corporis penetrat, silem liquat, qui liquefactus defluxiones adjuvat. Alimenta admodum refrigerantia, ut sunt olera frigida, potus glacialis importune haustus, ventriculo immixta, suam circa portas vim exerunt, frigore penetrante. Quod, minus mirabitur, quicumque expenderit, ad auram frigidam, totum corpus calore exstians subito rehci; ad medicamentorum testiculis aut plantis pedum admotorum vim, astuantem febrium fervorem, restringui: ad halituum & vaporum motum horrores, rigores, excitari. Frigore etiam afficitur mesenterium, in quo venæ portarum viræ propagines, quæ sanguinem a frigore male alteratum in jecur intundunt. Et quicquid chyli per venas lacteas, aut lymphæ per vasa lymphatica in receptaculum commune convehitur, ab indole nativa degenerat. Mutatur etiam chylus & lymphæ, in in ipso ductu thoracico unde ratio patet, cur æstuant potum frigidum hauriendo, in ipso potandi actu rehciantur; alterationem quippe subit sanguis ipse descendens. Sic varias mutationes, a quibus abhorret natura, dum patitur sanguis, illius filtratio vitio se peragitur. Opjatorum & relaxantium abusus motum tollit, citra quem nulla actio. Motus corporis nimius, motum humorum versus intestina festinat. Evacuatio sanguinis in congerendo sero, plurimum valet, seminis vero crebreque exaurit. Decubitus in plumeis cultris sanguinem calefaciens, proclivorem reddit, ut in intestina corrivetur. Ira Humores movet. Moror meatus obstruit. Et sic plurima, quæ alias innoxia, in hujus visceris perniciem conjurant.

Morbi qui hunc producant) succedit hoc mor-

Im aliquando febribus colliquantibus, in quibus non tantum pinguedo, a bile sanguinem ad nutritionem ineptum reddente, liquefcit; sed corrupto prius nutrimento, ipsa pars, succi nutritii indolem sequitur. Quod facilius in hepate, quam aliis partibus contingere potest, eo quod filtrum & colatorium sit bilis. Idem contingit nonnunquam in febribus malignis, pestilentialibus, & peste ipsa, in quibus salacris malignum, & volatile, malignitatis suæ stigma profunde inurit, & virus per ductum communem in intestina evomit. Idem in morbillis & variolis, ubi sunt adeo vehementes, ut non tantum saviant in exteriora; sed etiam viscera occupent & corrumpant. Ita perfecte Vener. Præc. Meus plurimas variolas vidit, quæ suppurrantes intus & extra fluxum epaticum invexerunt, illumque perpetuo intra paucos dies lethalem.

Indolens.) Contrecta, ure, seca manum illam, quæ hinc ab anno tormenti bellici volante globo abrepta est, atque curiositatis gratia apud chirurgum asservatur nec molestiam ullam manco facies, nec tristem ullam sensationem eidem excitabis. Quid enim cadaveri cum viro? cadaver esse corruptum Hepar, h. e. vitæ sensuque destitutum supra dictum: neminem itaque mirari subeat si tale hepar nullo afficiatur dolore. Non enim putandum est hepar comminutâ toti conjunctum sensu destitui, id quippe luculenter refutat experientia eorum, qui hepatidem h. e. inflammationem hepatis perpetiuntur. Negari tamen nequit eos qui hoc fluxu corripuntur aliquando torminibus vexari; vel propter lumbricos in intestinis catullientes vel ob medicamenta aut acriora aut etiam adstringentia, sed præpostere exhibita, ab his enim humor in cavernis hepatis moram facit, & acrimoniam acquirit, dumque per intestina devolvitur dolorem invehit.

Cruenti, & hostiarum recens mactatarum ablutio (similis) sic e. g. videmus, & in artificiosa parenchymatis hepatici separatione: & in spongiæ sanguine infectæ acaquis immersæ secundâ aut tertiâ compressione, sanguinem aquosum exprimi: atque demum in ipso sanguinis venæ sectione emissi feri, quod ubi vel leviuscule cremorem, & caseum ejusdem moveris, illico plus minusve rubescit. Ichorosi,) *ichor*, græcis dicitur sanies serosa & tenuis, qualis prodit vel ab ulceribus capitis manantibus, vel à capitis fursuribus violentius abrosis, vel demum ex cadaveribus diutius quam per est inhumatis dum solaris æstus in illa agit. Aristoteli *ichor* ille sanguis est crudus, qui vel nondum coctus vel in serum versus est. Alludit procul dubio vir magnus ad sanguificationem in hepate, quam medicina prisca docuit: sanguinem vero in serum converti, si benigne exponimus, profitebimur à sanguine lympham separari, quam si quis saniem nuncupat forte vapulabit: saniem quoque græci vocant *rosin*. & *rosin* quod albicat: unde sanguineus ichor commodius quam sanies dicitur. Fit nonnunquam ut sedimentum crassum, vel faeces vini rubri, vel amurcam representans dejiciatur, quod à substantiæ colliquatione fieri solet, ubi subtiliore liquore effluente crassius sedimentum in jecoris cavernulis cen lacunis stagnat.

Tale quid in collegio Anatomici clariss. D. Drel. videre mihi contigit, in liene tabido ex lienoso extracto, qui juxta caput permagnam cavitatem lutulenta cœnosa & limosa materia refertam; parte vero reliqua scirrhosam durtiem habebat. Lien autem substantiæ similitudine ab hepate non multum abhorret. Idem igitur in jecore concipio ac hisce oculis in illo liene deprehendit:

Fœtidi) fœtorem adesse in omni carni corruptione ubi aliquid partium volatilium effluvia emittentium adest, ipsa docet experientia, cujus subjectum aliquid sulphurei esse, probat solutio sulphuris lixivio calcis vivæ facta, & aceto non fœtido præcipitata, fœtorem abominandum excitans. Ita sulphur accensum, & candelæ recenter extinctæ fumus pinguis & sulphureus fœtet. Ita omnia suffibus & suffumigiis materiam præbentia, quantum quidem novi, ignem concipiunt, aut concipere apta sunt, sicque gratum odorem quem fragrantiam nominant, aut ingratum & tetrum, quem fœtorem vocant, ex se nuttunt. At oleum sanguini inest qui copiosus per hepar à partibus internis remeat, & dum corrumpitur fœtidissimus evadit; uti etiam destillatione oleum summe fœtens ex sanguine prolicitur.

Appetitus prosternitur) halitus teter, & execranda mephitis janitoris ostia transit & penuraturæ, ventriculum scilicet subit: ubi *simon* corrumpit. Hac autem corruptâ stimulus ad alituram animalium datus appetitus nempe hebescit idque partim quia spiritu acido non imprægnatur lymphâ salivalis, quæ fermento originem lupeditat; partim vero quia deglutita non potest manere incorrupta, verum succo peregrino imbutur atque dilutus.

Carnes oderunt.) suppetit ergo ratio cur hic carnem vehementissime odetint & avertentur. Ascendit enim ad ventriculum continuus ex hoc lacu vapor, qui condensatus in superiori ventriculi orificio ad nervos stomachicos fami præfectos penetrat, & averfationem carniū producit. Hujusmodi exempla passim prostant. Sic dantur, qui supplicia spectant dum latro securi subdere collum cogitur & aciem adeps sequitur, spectaculi dant pœnas pinguium averfatione. Sic ex improvviso offendentes cadaver vermibus luxurians, exinde caseos veteres vermiculis scattentes abominantur. At hic abominationis causa continue adest perpetuo enim renovatur, ut effa vulturis infernalis immortale scilicet Titii jecur.

Vino delectantur) est quantum hi à carne abhorrent; tantum vino delectantur deliciæ enim quas vinum habet in sui amorem hæcicos imo & icteros pelliciunt. Documentum dedit hujus rei mercator anglus prædives per biennium ictericus, qui toto morbi decursu vini summo desiderio tenebatur. Is valetudinis recuperandæ causa ad excellentissimum doctorem D. Carolum Drelincurtium, in hanc urbem transfretaverat; sed post aliquot dies, itineris tedium, & salutis spem, cum morte commutavit, cujus jecur scirrhosum anatome docuit. Sapit vinum, quatenus glandulæ *salivæ*, sporades, basilares, hypoglottides, proglossides, uvulares, palatinæ, caco chymo sanguine irriguæ, subtili ejus spiritu resoluuntur. Ventriculus

culus ipse, ab ingrata illuvie, quæ illum subit liberetur; venæ lacteæ irrorantur, & spiritibus animalibus in cerebro lecernendis materiâ subministratur. Sed ohe malum! illecebris hisce blanditur hostis infentissimus, & suamantissimis clam jugulum petit inquit Iernel Path. lib. vi. cap. vi. de substantiâ hepatis corruptela. Fundit eam languentem, calefaciendo intestina & mesenterium, in quibus radices portarum, uti rami in ipso hepate calore vitalem æstu peregrino insicit, sanguini motum concitatio-rem conciliat: fluxum & corruptionem ipsam aug. r.

Febris aliquando adest.) Quod si fluente sanguineo rivu oritur, venæ Portarum & cavæ, inquinamentum tenuius & parcius paludis coenosa hepaticæ, ad mare microcosmi abripiatur, febris hic occulta, qualem forestus lib. cit. obs. 23. in dysenteria hepatica, ex intemperie frigida notat. Si copiosius, tunc se magis patefaciet, accedente præcipue notabili dicta vitio. Quod si frustum teter corruptela adducatur frequenter, non tam continuo, insequetur animi languor & defectio, ac tandem cum sudore frigido mortis prænunciâ syncope.

Sicis urget) calori febrili comes ut plurimum solet esse sitis, quia fauces ab halitibus ascendenti- bus arescunt. Accedit altara causa, feri sanguinis effluvium, unde sanguinis circulatio tardior, e usdemque ad glandulas oris, salivam eructantes allapsus parcior. Sic sanguis vitæ thesaurus vehiculo ex parte destitutus linguam, & os universum rore suo defraudat.

Sanguinolenta excretio per nates, os, uterum hæmorrhoidas, corporis poros) naturam providam quæ à nemine docta, conservationi totius intenta noxia fugit, secum hoc compellere non sinit. Sanguis ergo cordis contra uone in partes pellitur, & multatu naturaliter perit poros ad mensuram suæ magnitudinis accommodatos, qui præter naturam constriunguntur aut dilatantur. Imo his illæsis, si sanguis tenuior existat, subtiliores etiam meatus, quam naturaliter habet, pererrat, ostiola horum cutaneæ, propter recursus naturalem impeditum, & continue influentis sanguinis impetum, effringit ut.

Vnde impellitur unda,

Urgeturque eadem Venies, urgetque priorem.

Quid enim, si.

Gutta cavat lapidem non vi; sed sæpe cadendo.

Sanguis copia suo tenuem cuticulam distendens, & noviter pulsus, novis ictibus arctans, eandem petru per.

Imprudenter cohibito cachexia, pruritibus hydrops, p. dum tumor suo succedit) naturam bene agentem spectare, adjuvare, & imitari decet medicum. At scire, quando? quæ n? &c. bene agat? hoc opus, hic labor est. Et non abs re fluxuum cura, Cos ingenii medici & iudicii ac prudentiæ, prædictæ lydius lapis audit. Ruenti cum impetu aquæ ostia oppono, murmur habebit, & frustra prohibente obice exundabit. Ita dum imperitorum error, molimen naturæ eludit, & quod prodire sinendum erat, sistit, operam perdit. Tunc enim immutato cursu, in varias partes ruit. Suffundantur hoc ichore acris glandularum subcutanearum myriades, aderit pruritus, perfundatur intersticia subcutanea & cuticula à cut. plurimis in locis sejungatur fiet scabies. Rumpantur vasa

lymphathica & serum sudet in abdomen, exorietur hydrops; in rede tumor serotus. Si verò hoc serum per corporis poros eat atque redeat, variam pro sui varietate introducit cachexiam.

Prognosis i. Exitus.) Salus, non illico desperandum hepatico fluxu confictatis, si in principio peritum medicum nacti sint: non etiam ubi malum aliquandiu duravit sentim procedens, & lento gressu, nisi præveniat ad exitum deducens, potest eam docta manus hoc malum debellare. Mortis At ubi partus est febrium malignorum, pelvis, variolarum morbiliorum & sanguis atque fluens tuicus est & splendidus cum fæto intolerabili, istud doctus plus valet arte malum. 2. Durationis. Nec naltum durare novit, ubi periculis & acutis affectibus successit, aut eosdem commixtus est: diu tamen aliquando traudenter hospitatur. Idque vitio patientum, qui parum de hoc malo conqueruntur, eo quod indolenter degant, sicque malum ceu i. tentem anguem subnerbare relinquunt: aut etiam vitio delicatiorum medicorum, quibus hoc unicum natum, *finis mibi adest*, sufficit, & vitium excretorum examinare dedignantur. 3. Modi eventus & n. utationis ubi vero æger in exactam rationem habere cupit, & medicus diligentem & arti congruam adhibet medelam sanat sæpe, atque ulatim. Interdum vero morti ægrum eripere non potest, sed mors patientem ab amicis subito aut lente divellit.

Origine) suo hic munere recte fungetur medicus ubi 1. sanguinis serum copiosum diminuendo, iustam sanguini consistentiam conciliarit. 2. Hepar nondum corruptum roboraverit. 3. Idem a corruptione præservaverit, & cadaver hepaticum condierit. 4. Naturam in regeneratione corrupti reverit. 5. Patientem convenienter cibaverit.

Purgantia) indicationi primæ satisfaciunt i. ha-barbarum, myrobalani citrinæ, aloem non quasi hæc hydragoga forent, sed quia cholagoga, & per poros bilarios evacuant, qui sanguini seroso ad intestina fluenti, canaliculi existunt: & quia parti eidem, teste experientia opitulari deprehenduntur: tum etiam quia duo priora, vim adstringendi, huic affectui convenientem habent; tertium vero, inter ea quæ corruptionem arcent, optime audit. Exhiberi vero hoc modo possunt.

Accipe Rhabbarbari tolli. Drach. β. Nucis Moschath tolli. Maltiches ana Drup. j. Sacchari clarificati Drach. j. Pulvis. aut Accipe. Myrobalanorum Citrinæ ana conditatum. Drach. ii. vel accipe. Aloes, succo absint hui & Centaurii nutritæ. Scrup. ii. olei Myrrhæ per deliquium. Drach. β. conserve absinthii. Drach. iβ. M. F. bolus. hæc Serum educunt, sanguinem magis consistentem reddent, hepar roborabunt, & Poros aperient.

Tincturæ) Altera indicatio complebitur extractis. Absinthii, Cardui bened. Aristolochiæ rotundæ, centaurii minoris. conservis. Rosarum rubrarum, acetosæ, trifolii acetosi. conditis. Enulæ campanæ, cydoniorum, nucis juglandis.

Condientibus.) Ballanica virtus requiritur ad tertiam indicationem, quam, quia celebrat bernardus penotus a portu, in ballano præclaro ad cadavera inungenda. & a corruptione præservanda, quo Veteres in senio sublevando usos dicunt: habet.

Ex descriptione petri aponensis conciliatoris.

℞, Myrrhæ, aloes hepaticæ, spicæ nardi sanguinis draconis, thuris, Mumiz, opopanax, bdellii, carpobalsami, ammoniaci, sarcocollæ, croci, Mallicis, gummi arabici, stracci liquidæ ana ℥ij. labdani electi, succi castorei ana ℥iij. Mucæ ℥ß. Terebinthinæ ad pondus omnium, pulverizanda pulverizentur & cum terebinthina probe misceantur: pone totum in alembicum & ingeniose destilla, liquorem destillatum accipe, & in vas vitreum reconde. Dosis guttæ iii. extrinsece vero hoc ipso, at aqua rosarum temporato, regio hepatis mungatur. Felicem successum ex hujus balsami usu sperare licet.

Hepar regenerantibus) forte hoc absurdum videbitur posse hepar regenerari; quod concessero ubi totum corruptum est; ubi vero, pars eius duntaxat. nequaquam. Rarum in hanc rem exemplum & oculis charius habeo excellentissimi promotoris D. caroli drelincurtii observationibus & curationibus vero heroicis & regio medico dignum. Historiam Anglus quidem lutetia parisiarum conquerensidus narrabo. batur de gravitate hypochondrii, Decubitu molesto, respiratione difficili, pars affecta mollis deprehendebatur, Maturantia juverunt, Signa puris apparuerunt, apostemate aperto pus eruentum copiose per dies octo prodit, pronunciante D. drelincurtio: pus a partibus internis manare; chirurgus risit; at digiti immisi in ipsum recur penetrabant, quod in ambitu vulneris costis adhaererat, ita ut nihil in abdomen delaberetur. Sed enunciati veritatem non tantum chirurgo verum aliis cum thoma incredulis digiti immisi firmiter probaverunt. Adhibitis vulnerariis Dei & artis ope restitutus est. Ergo idem contingere posse in fluxu hepatico, imo sæpe contingere, concludere quid vetat? Vulneraria ergo hic convenient, uti sunt radices symphyti, angelicæ, aristolochiæ rotundæ, Imperatoris, bistortæ, caryophyllatæ. Herkæ & folia equiseti, centaurei minoris, Plantaginis, millefolii, pentaphylli, hyperici, verbenæ. Cortices & lanugo florum salicis, &c. Sanguis draconis, sarcocolla, & hæmatites. Hæc s. a. administrata, ita sanguinem depurant, ut ex eo, quod perditum est reponi possit; hæc tenuem ichora carnis generationi nocentem remonent, & naturæ subsidium ferunt. Observandum etiam, corruptis & defluentibus acinis glandulosis, non illico vasa corrumpi; nam separatione glandularum facta, vasorum divaricationes integræ servantur.

Ultima indicatio. Diata duabus vocibus enunciari solita, Cave, cape, absolvi potest. Abstinentum ergo ab iis quæ, supra notavimus huic morbo occasionem præbere. Usurpanda vero ea, quæ juvant. Ut sunt alimenta morbo decrementum, ægro virium augmentum adferentia. Amygdalata & hordeata consulentia spissioris quam Emulsionibus. Pasta regi analeptica ex carne Testudinum nemoralium, canerorum fuvatilium, caponis, perdicis, cochlearum, ex hepate Luporum, Perdicum, Gallinarum, Anserum. Thyrsuli asparagorum tæciores decocti, capita cardui altilis, acetosa rite preparata, aceto & butyro condita. Olus

ex Seride seu intybo multos restituere dicitur. Passulæ magnis laudibus extolluntur. Cerasa, pyra, melspila decocta magis quam cruda, sorba bene matura. Observandum tamen: Nec simpliciter aperientibus, nec etiam solis adstringentibus utendum esse; ne illis sanguinem copiosius proluciamus; his sero copioso viam præcludamus. Intervals ergo circumstantiæ docebunt. Potio fiat, ex decoctis & destillatis herbarum hepato roborantium. Chalybeata sua laude non carent.

Non libet ad causas eas, quas ex affectuum numero citavimus, ut: febres malignas, pestem, variolas, & morbillos excurrere: uti etiam symptomata omnia, hæmorrhagias, cachexiam, scabiem, &c. pertractare. Sublatâ enim corruptione effectus tolluntur, & causis venturis præcautione nullum commodius remedium. Atque sic considerationibus nostris de hepatico fluxu, cum fucis, cum apibus, & cum araneis concinnatis, non sine numine, quod venerandum in secula, finem imponimus.

Hactenus præmemoratam considerationem Medicinæ attulimus. Jam ad alia transimus.

Serosum fluxum & hepaticum dictum, qui viderint, pauci sunt: Curandum autem, sibi persuadent per antidiysenterica admista cum hepaticis; quæ scilicet robovent, & calefaciant. Hepati lupi plerique magnam vim in hoc affectu tribuunt, illudque varie præparatum exhibent. Sunt qui aquam ex illo cum aliis simplicibus commisto per alembicum eliciant: alii electarium, alii pulverem. At aromata quacunque modo exhibeantur, optima erunt: cinnamomum, galanga, piper, zinziber, caryophylli, cubebæ, horumque essentia, spiritus, aqua. Vinum ablinthites, aliudve, e ligno gavaiaçò, cinnamomo, & pipere conditum: conditura & electaria e bacis lauri, uvis passis, nucis odorata, cæterisque etiam proficiunt. Hydrotica moderate sumpta a nonnullis commendantur ad superabundantis seri evacuationem. Tutiora vero videntur diuretica, & sudorifica, quæque alkalia plurimo continent. Vitanda autem sunt humectantia, cathartica valentiora, acida, pingua, oleosa. Narcotica, si moderata fuerint, & cum roborantibus mista, pro ratâ suâ quoque proderunt. *Lucas Tozzi Medicin. Pract. lib. 2.*

Consultationes.

Fluxus hepaticus legitimus.

Juvenis præstantissimi senatoris æconomus, 30. annos natus, temperamenti iccoris & cordis, calidi & ficci, habitus gracilioris, vims meracioribus semper delectatus, & nive refrigeratis, moribus corporis & animi continuo agitat, & diarrhœis biliosis frequenter obnoxius, tandem declinante ætate diarrhœa biliosa correptus, eam neglexit consueta vivendi ratione semper usus, ea opinione quod præteritarum more hæc duobus vel tribus diebus cum levamine suppressenda foret. Spes tamen illum frustrata est, plures enim dies perduravit, cum siti vehementi, & tandem ciborum fastidio, excrementis, quæ primis diebus biliosa erant, in rubida, & quandoque tenui sanie cruenta mista mutatis. Nihil tamen abrasionis medicus dome-

domesticus observavit, sed pinguem potius & oleosam substantiam innatautem, postremo vero bilem crassam, graveolentem, valde coloratam, & quandoque veluti vini faciem. Hujusmodi autem evacuationes duobus aliquando, vel tribus diebus intermittunt, adeo ut p̄t. melius habere videatur, sed mox deterioris conditionis recrudescunt. Accedit quoque scibricula, vespertinis horis invalescens. Quoniam autem senatori excell. juvenis hujus sanitas admodum cordi est, ideo illius jussu, ad te, tanquam ad artis medicæ fontem confugimus, ut quamprimum scriptis agenda committas, exactissime à nobis administranda.

Quoniam diarrhoeis, vel crudis vel biliosis totum venosum genus nonnunquam expurgatur, ideo homines à quamplurimis malis præservare solent, unde observabat Gal. quod accidunt aliquando certis temporum intervallis, dum omnis corporum redundantia per ipsas educitur, prout commodum inveniisti contigit superioribus annis, quibus à copioso & consueto vini meracioris potu, nec non ab animi corporisque vehementibus motibus, calida cordis & jecoris naturali intemperie magis magisque adaucta, copiosa bilis coacervata est, à valida tamen venarum expultrice ad intestina detrusa, & per alvum evacuata trium aut quatuor dierum spatio, non sine patientis levamine. Verum, quoniam tum ratione ætatis, tum copiosioris meri potus, necnon invalescentibus corporis motibus, atque animi curis, ob domestica negotia jecoris potissimum intemperies eo provecta est, ut bilis à vehementi calore crassefacta copiosius proventus, non amplius ab expultrice derurbari potuerit, hæc proinde in jecoris venis subsistens tantum altum in hoc viscere accendit, ut (accedente quinetiam consueto gelido potu) ejusdem tono laesæ, sanguificatrix facultas debilitari cœperit, unde ab initio sitis vehemens cum ciborum fastidio, intemperiei calida indicio, inde crassæ bilis graveolentis & valde coloratæ excretionis observatæ, necnon postremo innatantes pinguedines, colliquationis soboles quæ omnia fervidissima jecoris intemperiem produunt (propt̄ frigidam demonstrant assidue excretiones, nec multæ, nec graveolentes, sed veluti limus & niger sanguis) hepaticum fluxum imminuentem prænuñtiantes, qui postea luculentius se exeruit, rubida proluvie apparente, quam, ingravescente malo, tenuis sanguinis sanies secuta est, & nonnunquam veluti vini sæx, semper tamen sine erosione, quorum evacuatio duos aut tres dies aliquando intermittit, mox deterius recrudescit. Quoniam autem sanguis in ipso viscere corrumpi cœpit, febris quoque accessit, quandoque medicis imperitis ignota. Omnia equidem symptomata fluxum hepaticum legitimum, ex sanguificatricis facultatis scil. læsione atque imbecillitate, à calida intemperie proventientem manifestissime significantia, ait enim Galen, quod à qualibet octo intemperierum sanguificatrix facultas noxam pati potest, unde hepatico appellavit illos, quibus citra manifestum in hepate vitium, in propriis actionibus illud debilitatur.

Ut igitur huic patienti opem feramus, biliosi atque corrupti humores sunt evacuandi. Secun-

do calida jecoris intemperies corrigenda. Tertio tonus ejusdem pristino statui restituendus. Et tandem jecur ipsum propriis adstringentibus roborandum.

Et licet non adeo facile sit sanitatem consequi, cum affectus firmis innitatur radicibus, calidæ nimirum jecoris & cordis naturali intemperiei, erroribus in vivendi ratione magnopere adauxit, cujus ratione jecoris robur exolvi perniciosissimum est, nihilominus, quoniam juvenis præceptis medicis obtemperans, & ab initio propria à viro excellentissi. opportune administrata fuere remedia, ideo spem salutis concipimus, remediis à tribus fontibus desumendis & administrandis.

Et primo quidem in chirurgico, peropportune fuit ab initio sanguis ex jecoraria vena detractus, post immutatam & medicamentis evacuatam bilis copiam, ad contemperendum jecoris & sanguinis fervorem, quod remedium genus in progressu non adeo facile admitti potest, ob ejusdem visceris imbecillitatem, bilionique humoris redundantiam. Hepatis regioni refrigerantia & subadstringentia apposita fuisse suppono, epithemata scil. ex succo cich. Spec. Triou. sant. & aceto, parata, sicut & illius ex ung. Ros. mes. cui, sub finem morbi, santaluum quoque addendum fuerit.

Ex pharmaceutico promo desumenda bilem imminuentia atque excernentia: quæ quoniam jam à viro excellentissi. prudentia iterum atque iterum præscripta & administrata fuere, ideo repetita cassia, cum rhab. Seroque alinino depur. superhausto, ad secundam explendam intentionem deveniri poterit, in quem finem, succus cich. depur. sicut & intybi, sonci commendari solent. Verum nobis experientia comperit aquas thermales & Villeses potissimum egregie huic morbo mederi: facultate enim pollent, ratione ferri & aluminis, quibus constat, & jecur refrigerandi & subadstrictione roborandi præterquamquod, in diuturno hujusmodi fluxu, diureticorum usus magnopere conferre solet. Præbeantur itaque primis diebus dejectoriz, reliquis autem diureticæ, primo scil. præmisso. syr. ros. sol. cum decoct. pulpæ tamariind. postea succo lim. vel. spiritu vitrioli, qui præter diureticam vim, substantiam jecoris densare & cogere, necnon sanguinem quodammodo filtrare poterit: in quorum usu ad 15. imo 20. dies pergendum fuerit.

His peractis eadem intentio continuanda, siquidem ex Gal. habemus, quod, scopus curationis præcipuus est intemperiei contrarietas. Hinc Actius & Trall. uno ore prodiderunt, quod, primus curationis scopus, est, ut inremperiem ad contrariam deducamus, & non, ut vulgares medici, qui nihil solliciti de intemperie, statim ad adstringentia & hepatica deveniunt. Quare eadem intentione adhiberi poterit, vel succus cich. & sonci in decoct. End. acet. Plantag. Portul. & hepaticæ, vel bibatur quotidie, summo mane, cyathus ex aqua stillatitia de succo cich. End. & plantag. addito lim. succo.

Interim tertia quoque intentio expleri poterit, exhibita hora una ante prandium & cenam, tinct. Corall. chymica, ad gutt. v. aut vi. in semicyathis aqua Plantag. vel auro potabili, in aqua destill. ex teneris Quercu foliis.

Tandem à proprietate juvare, & prærogativam obtinere hepar. Lupinum gal. auferuit, cujus donis apud ipsum fuit ad 3 i. quod ab ipso Actius quoque desumpsit. Reformeretur igitur pulvis ejusdem Lupini hepatis, cum conf. Rosarum, & summo mane exhibeatur, cui succedat hauritus ejusdem aquæ plantag. aut quercus. vel præbeatur cum gal. Eupatorio mistum, hoc enim inigni jecoris roborandi facultate præditum est. Hoc etiam tempore, una cum carnibus in aqua, de more bulliat lignum cydoni, à schenchio magnopere commendatum.

His addimus, quod si cruentus alvi fluxus contumax fuerit, ut præstantissimum remedium à Galen. proponitur phil. Roman. iterum, vel etiam tertio per intervalla exhibendum, licet ipse eodem semel tantum exhibito hepaticam ante operiem se sanasse profiteatur.

Victus ratio jam à viro excell. præscripta diligenter servanda, cui addimus, quod materia alimenterum sit hepatis substantiæ similis, quale proinde erit jecur omnium animalium, potius vero sit aqua noceræ, utpote refrigerans & quodammodo adstringens, cum terram saniam ejus alveus contineat. Quando vero vino uti licuerit, sit album tenue & subausterum. Quæ omnia confirmant ea, quæ à viro doctissimo, tum administrata, tum administranda, pro pat. salute proposita fuere. *Raym. Joh. Fortif. Fonsust. et Resp. Medic. T. j. cent. 3.*

Fluxus hepaticus spurius.

Excell. Marchio. 30. annorum, temperamenti calidi & humidum, habitus ad obesum vergentis, vitam otiosam ducens, & cibis, potibus atque veneris magnopere indulgens, frequentibus diarrhoeis superioribus annis obnoxius, anno tamen abhinc suppressis, ventris doloribus correptus est, simulque ephemeris febribus, à quibus evacuatione à medico sollicita sæpe liberatus est, licet de quodam ponderis sensu in abdomine conquestus fuerit semper, tamen neglecto. Tandem 40. abhinc diebus, alvus præter consuetudinem, iterum, ac tertio, quolibet die cruda & liquida, potius quam solida egerere coepit, non sine aliqua macie, & totius corporis lassitudine ac virium lapsu. Quibus deterritus pat. Excell. me domesticum medicum accivit, qui præter hæc omnia mihi relata, evacuationes non semel inspexit, easque liquidas ut plurimum, quandoque etiam compactas, sed & chylosas potius observavi. Decolor insuper patiens redditus est, atque consueti gracilior, & Mesenterium obstructionibus, prout tactu deprehendi, occlusum habet. Ideo curatione illi maxime est opus, quam quoniam lenienti medicamento inchoare decreveram, juvenis excell. illud renuens, respondit, se nolle currenti addere calcar equo simulque iussit statim sui status historiam tibi præstantissimo viro transmitti, ut de hujus affectus natura certiores nos facias, & pro Marchionis excell. salute agenda proponas.

Quod alvi fluxu 40. abhinc diebus marchionem excell. excrucians, maciem totius inducat, viresque atterat quid mirum? cum chylosas observetur, ac proinde quotidianum corporis ali-

mentum, vel omnino, vel saltem magna parte subducatur. Consideratione autem dignum, & cognitum necessarium, quænam sit pars in hoc fluxu principaliter læsa, & num ventriculus, an potius mesenterium, vel jecur ipsum, vel intestina sint incusanda, ut scilicet & affectus idea, & illius causa innotescant. Et primo quidem ventriculus excludendus nobis videtur, quod ejusdem male affecti nulla querela præcesserit, & licet frequentes cruditates superioribus annis in eodem genitæ fuerint, unde frequentes pariter diarrhoeæ, & ab iisdem suppressis, ephemeræ quoque febres, quæ earundem excretionum solvebantur, id tamen non ventriculi vitio, sed potius improprietatis objectis, quantitate & qualitate peccantibus imputandum fuit, quo etiam obstructions mesenterii referendas censemus. ventriculo autem secluso, ipsa lienteria proinde ableganda, & quidem potissimum cum delit celer ciborum non mutatorum transitus. Neque intestina hic locum habere credimus, quoniam licet chylosa observetur excretio, non tamen qualitas ciborum impermutata discernitur, præterquam quod tempore ab assumpto cibo valde distanti alvus movetur, & chylosa materia excernitur, cujus effluxus, lætis intestinis, non adeo cunctatur, quare de cæliaca passione non est cogitandum. Superest igitur, ut mesenterium, vel jecur, vel utrumque afficiantur. Atque sicut de mesenterio dubitari non potest, cum sit obstructionis insarctum, tactu à viro excell. & ab excell. Pat. gravitatis sensu perceptis, ita de iccore dubium esse potest, licet nobis pars affirmativa præferenda videatur, siquidem à promiscua assumptionum qualitate jecur ipsum imbecillitatem contraxisse suspicandum, accedente præsertim immoderato veneris usu, necnon vita otiosa, internissio enim corporis motu, alimenta diutius in visceribus hærent, & tardius distribuuntur, unde calor natus agendo reparitur, & à diuturna mora gravatur, atque in suis operationibus debilitatur. Quoniam vero calidum & humidum ipsius jecoris temperamentum non adeo facile altaratricis, sive sanguificatricis facultatis læsionem admittere potuit ideo attracticem lædi non adeo difficile fuit, cujus noxa facilius intemperiem humidam sequitur, prout sanguificatricis calidam. Quamobrem ob mesenterium obstructum, chyli transfluxu intercepto ad hepar, ob ejusdem vero attracticis imbecillitatem, eodem non attracto, duplici nomine in mesenterio tandiu moratur, donec corrumpatur, corruptusque, varia specie coloris & consistentiæ, per alvum excernatur, unde hepaticus fluxus illegitimus constituitur, quam perperam Fernel. pro cæliaca passione usurpavit.

Ut autem auferatur ventriculus primo expiandus. Secundo obstructions in mesenterio, & forsitan in cava jecoris aperiendæ. Tertio jecur adstringentibus & à proprietate juvantibus roborandum.

Hoc autem assequi non adeo facile existimamus, cum obstructions auferre arduum sit. Nichilominus si pat. Excell. Medico obtemperaverit, cum obstructions exsiccatæ non sint, operata salutis, tuto & cito consequendæ illi spem facimus, & multo namque facilius est attra-

attracticem jecoris facultatem, quam sanguificatricem lalam corrigere.

Ex Chirurgico itaque fonte primo consideratur sanguinis missio, quam quidem affectus ipse non exigit, cum quia nullum jecori robur addere potest, cum quia venæ sectio non expurgat obstructions, sed id faciunt incisiones & detersiones, ideo vel o mittenda, vel in aliud tempus differenda, dum conjiciamus ab aliquo jecoris calore coindicari. Quare remedia sunt à fonte pharmaceutio petenda.

Et primo quidem ventriculi expiatio cass. cum tart. vel syr. ros. sol. perficienda, ut inde ad mesenterii obstructions aperiendas statim deveniamus, levioribus primo, mox validioribus. Paretur igitur oxymel. ex quatuor radicibus aperientibus, in aq. agrim. & aceto maceratis, ut addito melle hispanico, & trufculo integri cinnam. fiat oxymel. suave, sed dilutum, cujus quolibet mane tres unciz præbeantur, epoto ab iis jure tenui cich. borrah. melissa, pentaph. & agrum alterato. Sex vero præteritis diebus assumat. flor. cass. & lenit. an. ℥i. Deinde repetantur decoctiones validiores, additis præscripto juri alterato tart. vitriol. gr. xii. & exhibitio alternis diebus rhab. non torrefacto, ex Avic. & Hipp. in ventris fluxionibus, quoniam in præsens non agitur de retentitricis imbecillitate. Præbeatur itaque ad semidrachmam, ruditer pulveriz. & cum flore cass. refor. ut fiant bol. ii. aut.

℞. Extr. rhab. ℥i. tart. vitriol. ℥i. m. refor. b. & aut. His autem superbibat Excell. Pat. decoctionem præscriptam, & ita alternatim procedat assumendo oxymel cum decoct. & tart. vitriol. altera vero dierhab. jam præscriptum, cum eadem decoctione. Quod si 15. dierum spatium obstructions magna parte non oblituerint, ad validiora pergendum, crocum scil. Martis aperitivum, cum acido sulphuris paratum ut.

℞. Croci martis aperit. gr. iii. Succ. Eupat. condens. ℥i. m. f. b. & aur. à quo bibat aq. agrim. ℥vi. plures dies, sed quarto quoque sumat. ℥i. pil. de trib. cum ℥i. Elect. lenit.

Ablatis, aut magna parte obstructionibus imminutis, aquæ tetrucianæ locum habebunt quatuor aut quinque diebus assumendæ, cum mell. ros. & syr. ros. sol. ad perficiendam primarum viarum ablutionem ac detersionem.

Deinde tertiz explendæ intentioni, mirificè conducet absint. ut quod & jecur roborare, & ejusdem meatus expedire possit, nitrosa enim & amara, cum subadstrictione, id præstant. Nonnulla quoque addenda à proprietate juvantia, in quibus troch. ex aniso, amygd. amar. & oymel. proponit Galenus ut & alios hujusmodi.

℞. Amygd. amar. ℥i. anis. ℥ii. absinth. sem. apii ℥ii. cumini ℥ii. vini albi generosi. q. s. m. f. pastilli, quorum unus cum exiguo vino absinth. assumatur. Nos autem libenter aliis compositionibus utimur, ut.

℞. Pulv. hep. succi absinth. condens. Succ. agrim. condens. succi cich. condens. an. ℥i. m. & cum vino albo aromatico refor. b. vi. quorum unus præbeatur, superhausto cyatho aq. agrim. & cich. chalybeatz. Vel paretur tale elect.

℞. Passul. mund. vino lotat. & per setac

transmull. ℥b. i. rhab. elect. ℥iii. sacch. opt. ℥iii. m. ad ignem, sub finem adde pulv. caryoph. ℥i. f. m. refor. elect. cujus dolis erit ad ℥i. epoto ab hoc haultu vini absinth. Tandem jecori & visceribus omnibus robur conciliare poterit theriaca antiqua, sequentibus tamen mensibus hyemalibus usurpanda.

His addatur congrua victus ratio. Parcius, sed optimis alimentis vescatur, & moderate bibat. Corpus exerceat. Venerem hoc tempore ablegat, & alacriter vivat. Quibus ut D. O. M. aspiret, emix obiecto. *Idem ibidem.*

Dysenteria Hepatica.

Vir Juvenis 22. annorum, Joh. Dan. Struppius ad belmhausen, Ann. superiori 1620. sub initium Martii, consiliu causa me visitat, de cruentis dejectionibus quotidianis, carnis loturam ut plurimum repræsentantibus, absque dolore, conqueritur: adest etiam ita frequenter urgens, urina subaurea tenuis, appetitus dejectus, & nausea a carne.

Quamvis Dysenteria vocabulum propriè tantum illas alvi dejectiones cruentas includat, quæ cum intestinorum exulceratione dolorifica sunt abusive tamen, juxta Hippocr. & galen. interdum etiam pro aliis dejectionibus cruentis sumitur, quæ ratione dysenteria quædam hepatica dicitur, ubi intestinis illæis, propter jecoris imbecillitatem cruenta sit dejectio. Talis affectus etiam in hoc ægro proponitur, ubi cruentæ sunt dejectiones, non dolorificæ cum pure permixtæ, quales hactenus in dysenteria propriè dicta descriptimus, nec etiam puri sanguinis, quod vena quadam rupta vel aperta fieri solet; quotidiana, per intervalla scilicet, non tanta crebritate, sicut in dysenteria propriè dicta fieri solet accidentes, carnis loturam, ut plurimum repræsentantes, quatenus jecur imbecillius sanguinem, nondum perfectè elaboratum, sibi non retinet, sed per meseraicas ad alvum transmittit, unde dejectiones ejusmodi similes aqua redduntur in qua nuper maceratæ carnes animalium abluuntur; absque dolore, tali scilicet, qui dysentericis alias accidere solet, ob intestina p. n. affecta. Non enim negandum, quin hic etiam gravativus dolor, ob jecoris imbecillitatem, levide causa sæpius observari solet. Adest sitis frequentes urgens, tam propter absorptionem humida substantia, respectu fluxionis præter naturam, quam quod etiam hepar ad intemperiem calidam inclinet, quod urina suborea, tenuis, cum appetitu dejecto nauseaque carnis magis confirmabant.

Est vero propterea, quod primis mensibus non admodum affligat hoc malum, ægrotantes interdum non admodum solliciti sint, nihilominus affectus hic periculo non caret, cum pars affecta princeps sit, totique singulis horis prospicere debeat, unde negligentia patientis facillime cachexiam, hydropem, totius consumptionem, &c. producere potest.

Quocirca, cum affectus in hoc ægrotante adhuc in principio esse videretur, ante omnia i. Jecoris intemperiam calidam, obstructioni minimarum venarum occasionem præbentem, corrigendam. 1. Ejus robur dissolutum conve-

nientibus adstringentibus reducendum. 3. Primam coctionem corroborandam esse statueram.

Quoad primam indicationem optimè conveniebat conservæ radic. cichor. modicè refrigerans & aperiens, respectu jecoris, cui juxta secundam indicationem aliquid adstringentium admiscuimus, ut sunt conserv. rosar. antiq. cum appropriata jecori carne, vel pulpâ passularum cornuâtiacarum, & aliis hoc modo.

24. Conf. rad. cichor. ʒi. rosar. antiq. ʒʒ. pulp. passul. corinth. ʒvi. linat. chalyb. ppt. ʒi. coral. rubr. ppt. C. C. ult. ppt. ana ʒiʒ. syr. de endivia l. q. l. F. Electuar. moile; cui adde sp. vitr. ex marte ppt. ʒʒ. M. Hujus electuarii usus ʒʒ. frequens sit vacuo stomacho, quotidie bis, tribus horis ante cibum cujus loco, variationis gratia, sumantur etiam interdum rotula, quæ.

25. Specier. diarrhoe. abbat. ʒiʒ. diatrion. santal. ʒi. conf. rap. cichor. ʒʒ. semina. melan. ʒi. sacch. in aq. ros. & endiv. solut. ʒvi. F. confectio in ritulis.

Porro majoris corroborationis gratia, juxta secundum canonem, interdum etiam usum rhabarbari parumper, totis concessimus, quantitate ʒiʒ. cum pulpa passularum minor. permixtum, haulti vini medicati superaddito, quod

26. Rad. cichor. ʒii. herbar. agrimon. mar. rub. alb. ana. mʒ. absint. m. ʒ. sem. fœnic. ʒʒ. macis, nucis mosch. ana ʒi. incisa & contusa infund. in fʒ. viii. vini Rheum. tenuioris de quo tempore prandii quoque corroborationis ergo primus haustus bibatur.

Exterius inunctionem ordinavimus mane vespereque.

27. Olei absint. cydon. amygdal. amar. ana ʒiʒ. flor. chamæmel. summ. absint. agrimon. ana p. i. multich. nucis mosch. caryophyll. ana. ʒi. aq. absint. aceti sambuc. ana q. l. l. Decoctio & coletur pro linimento.

Præter dicta, quod tertium seppum att. net, victum facilis coctionis, modicè refrigerantem & adstringentem ordinavimus, imprimisque crepalam angue prius fugiendam esse diximus, quibus monitis, ad verum usque tempus servatis, pristina sanitati patiens vicissim restitutus fuit, ita ut æstivis mensibus nutritæ causa ad Bohemos abiret. *Gregor. Hoffm. observ. & Histol. Medic. n. lib. 4.*

A diarrhæa contumaci in lientericum, cortiacum & Dysentericum fluxum non infrequens transitus, & ab Hippocrate pluries notatus, sed in Hepaticum fluxum insolens plane aut saltem rarissima metastasis. Rarius etiam quod scribi hepaticæ colliquationi sociam adesse febrem consuevit. Utrumque tamen in nobiliss. Domino Vuillet morbi genus agnosceis & proprio charactere suisque coloribus ita graphice depingis, ut nullus superesse, videatur dubitationi locus; sed ut clarius causarum quæ tantæ calamitatis parentes sunt æquivocatio detegatur & innotescat, nonne propius vasorum mesentericorum atoniam & imbecillitatem à nimio & diuturno fluxu oriundam quam ipsum hepatis tonum laxatum accusare liceat? An fortassis præcessit occultus licet phlegmonodes mesenterii dolorum incapax, abscessus

quo incalcescente febris & diarrhæa fuerint sufficitæ, eodem rupto & expurante febris remissio & dejectiones suberuentæ contigerint? In hepatico fluxu sincera solent esse alvi rejectanæ & loturis carniū sanguine adhuc madentium simillima; at in hoc fluxu non sunt impmixtæ dejectiones sed ex hepaticis, stomachicis intestinalibus, imo ex toto corporis habitu deciduæ & consociatæ, ut tu ipsemet observasti sed ulterius quæso attendi? an quid purulenti vel puriformis admixtum habeant, quod si desit nec vix præcesserint de mesenterio querelæ, tunc vel hepatis vel saltem venarum atonia, succorumque helleborina & deleteria malignitate imprægnatorum cacochemia multiplex incusanda venient; Ex quibus tanti mali dubium, imò funestum eventum ominari licebit, eo præsertim nomine quod nullis cedat præsidis, licet technicè & ex methodo præscriptis. Ego verò quid addam vix video, cum attringentia & roborantia incassum jam & pluries usurpatæ fuerint, ut & narcotica quibus suppressa per aliquot horas estuvis copia, mox postmodum fluxus ubertate compensatur. Attamen ut aliquid etiam è mea suppellectile conferam illud imprimis assero omni fluxui hepatico & visceris vasorumque atoniæ ac præsertim illi diarrhœæ *καταρρακτική* abiectioni vel corruptela oriundæ nihil esse conducibilius lacte bubulo ustulato vel sufficienter evaporato (etiam ramentis fibre) cum julepo alexandrino dulcorato; illud pro ratione opportunitatis & ægri idiosyncrasia ac Euphoria propinari poterit, bis terve in die aut si bene fiat pro omni potu offerendum julepo alexandrino interdum admisceri poterit semina syrapi papaverini ut diutius morari & vim suam cydere valeat; si tamen peculiaris quædam cacochemia adhuc luxuriare ad fermentari videatur, eliminandæ erit confectio universalis quadruplici atque abeo, vel pillulis ex mecoacanthæ adeo & confectio hyacinthina, vel ex tinctura rhei & rosarum rubrarum vitriolatæ ac saccharata; hic etiam locum habent elysmi nutrientes stringentes, & roborantes. Gelatina è solo cornu. cervi mircobalæxi conditi trigra granorum astis Quercelam pulvis & spongis cynobati intestinorum laxitati maxime conducibilis; & si ulcus subesse conicias alkool saturni crudi ad ʒi. alimenta omnia cichoreo atterentur, ac tandem si horum præsidiorum vim eludat *δυσήρ* affectus dysenterica & hydrotica in subsidium vocentur puta cornu cervi, terra sigillata tormientilla, bislortæ pentaphyll. filipendul. & bezoard. Nec deesse debet suis diureticis locus, ut serum superfluum ab intestinis ad vasa urinaria derivetur, & siccescant alvini ductus; saliva cynorrhodi & succum ejus decoctum pro potu offeratur, ac tandem ad lac humanum velut ad sacram anchoram, cæteris pene deuidis, confugiendum; vulgata attringentia & corroborantia hic non transcuribo ne actum agere videat. Non negligenda topica interim moneo, tum focus tum cataplasmatis tum emplastri forma ea præsertim quos ex sentalio, menta, & cichoreis massicæ terra sigillata cydoniis parzi consueverunt. Longe plura conscriberem si magis proficua arbitrarer.

è thomis. Aquentibus 4. Kal. Septemb. 1666.
Ex literis Manuscriptis Domini de Villefranche D.
M. ad D. nrm. Serpoulier Medicum camberiacen-
sem.

Observationes.

Cnidam Fluxu Hepatico laboranti.

Omnium primo dedimus infusum rhei, my-
robalan. citrin. & chebul. Postea hoc decoctum
propinavimus.

℞. Marthub. absietli. rom. fl. ros. rub. menth.
sicc. & rubr. an. Mi. sem. sanguinar. plantag.
coriandr. præp. an. ʒi. myrobal. citrin. ʒ β.
rhab. el. ʒiβ. schenanth. ʒβ. rad. cichor. apii.
petrosel. an. ʒβ. cal. aromat. incis. santa. rubr.
an. ʒi. coq. in aq. chalyb. ab ʒbi in colat. adde
syr. de menth. de cichor. cum rheo an. ʒβ. M.
pro quatuor dosibus.

Deinde dedi semel ʒβ. rhei pulv. in modum
pilul. cum syr. de ros. siccis: postmodum im-
peravit, ut bis in die ex hoc condito sumeret
ad magnitudinem castanæ.

℞. Conf. ros. antiq. ʒiij. spec. aromat. rosat.
sive moscho. ʒiβ. myrobal. citrin. parum aslat.
& palv. mastich. an. ʒi. cum syr. myrtino. F.
conditum. Cum fluxus nondum cessaret, &
jam ultra quatuor menses durasset, & valde
æger debilitaretur, sequens apozema præscri-
ptum est.

℞. Marrub. absinth. rom. menth. sic. fl. ros.
rub. an. Mi. sem. myrtill. plantag. an. ʒiβ. cin-
nam. el. santal. rubr. cal. arom. an. ʒi. coq. in
vino rubro styptito, aq. equiset. & meliss. ad
ʒbi. colat. adde syr. de menth. myrtill. coto-
neor. an. ʒii. M. sumebat bis in die: quia circa
stomachum dolebat, ceratum stomachicum
apposui, & hepatis regionem inunxi unguen-
to santalino & ol. absinth. Postea cum neque
his adhuc fluxus remitteretur, omni manè per
tres dies hunc pulverem dedimus cum ovo sor-
bili, qui multum juvabat.

℞. Sem. plantag. nucis mosch. mastich. pulv.
C.C. un. an. ʒβ. cinnam. el. gr. v. F. pulvis sub-
tilissimus sed cum fluxus intotum non cessaret
myrobal. cheb. parum toltos, cum rheo tosto
ad ʒiij. cum aq. plantag. & syr. de ros. rub.
sicc. propinavi. & omni manè capiebat ad ma-
gnitudinem castanæ ex elect. sequenti.

℞. Conf. ros. antiq. diacidon. sine specie-
bus, an. ʒβ. nuc. mosch. mastich. an. ʒi. troch.
de Carabe, de spodio, an. ʒβ. C.C. usti. pulv.
fl. ros. rub. cortic. granat. balault. an. ʒβ. co-
rall. rubr. gr. iii. seric. combust. gr. ii. cum syr.
myrtill. menth. an. q. s. F. elect. moderatè. li-
quidum, cujus usu fluxus cœpit cessare. Petrus
Forestus obs. 21. lib. 22. De Profluvio alvi.

Vir quidem consistentis ætatis, temperamen-
ti sanguineo cholericæ, capillis rufis, crispis-
que præditus gracilis, siticulosus & negotio-
sus, ad iram promptus, nuptiarum & convi-
viorum creber asseda, biliosis defectionibus,
& ventris osionibus plurimum afflictus, ante
hos decem annos inflammatione hepatis cor-
ruptus est cum febrili horrore & calore circa
vesperam indies invalescente, cum tussicul. sic-
ca, colore lurido vel citrino, respiratione dif-

ficili & quasi intercepta vel singultuosa, cum
dolore & nonnulla intumescencia lateris dex-
tri, nausea viriumque summa debilitate; sed
tum ab hoc periculo morbi genere conve-
nientibus medicamentis menstruo, & quod ex-
currit, spatio, per dei gratiam fuit liberatus.
Paulo vero post in eisdem dixit errores dela-
plus, iterum ejusmodi rosiones ventris, & de-
jectiones biliolas experitur, præsertim a sum-
mo & prandio cum nonnulla cardialgia, urinæ
acrimonia, siti, appetituque fere nullo, quin
& fluxus hic quandoque triduum ipsum intor-
quiescit, sed postea largius fertur, cum flatu-
bus, rugitibus & tencino. Excrementa modo
crassiora sunt & grumosa, sæpius autem liquida
dilute rubea instar loturæ carnis, modo cine-
rea sine febris, sine dolore, cum lassitudine spon-
tanea; omnium rerum adest tedium & somno-
lencia plurima. Cum autem malum hoc sæpius
inducias daret, a crassius quoque Medicis, va-
riisque medicamentis adstringentibus pariter,
& corroborantibus & tonicis, e. g. hepate lu-
pi, mastiche, theriac. tinct. corall. rhabarb.
diu multumque per aliquot annos fatigatus pa-
rum levamen inde sentiret, tandem tamen
præter omnium spem crebro agrimonix vulga-
ris dioscoridis usu, cum prædictis aliisque ex-
hibitis plenariè restitutus est, sumo in pulver.
conserv. mixtura, decoctione, infusis & hinc
rotulis.

℞. Pulveris agrimon. per setaceum trans-
missi ʒiij. rhab. hepat. lupi ppt. an. ʒi. cass. lign.
veræ ʒii. confectio. alkerin. compl. ʒi cum
sacch. in aq. agrim. sol. q. s. f. rotulæ inspergen-
tæ oleo cinnam.

Cujus simplicis virtutes in ulceribus vesicæ
consolidandis Forest. lib. 7. obs. Chirurg. 3. ac
in involuntaria urinæ emissionē hortius l. 1. p.
2. de morb. mulier. obs. 1. præ cæteris felici cum
effectu comprobant. D. Joh. Michaelis Febr.
Academ. natur. Curios. Præsidis.

Anatomicas Inspecciones.

Vide supræ Capite de Dysenteria.

FOETVS

DE eo ut & de Partionis termino aliisque
multis vide capite de partu. Hic tantum
verbum de dentibus fatibus jam inexistenti-
bus contra vulgarem opinionem, ex peramica
communicatione D. Gujot D. M. ac rursus pro-
pter materiæ affinitatem de serotinis dentiholo
aliisque circa dentes ex eadem communica-
tione. Sic itaque ille.

Dentes per aliquot menses in infantibus la-
titant secus ac in animalibus brutis sit, nam
statim ac vitali aura fruuntur dentibus instru-
ctas esse in vulgus quoque notissimum est. Dum
autem in pueris per tempus adhuc in mandibu-
lis ita conclusi manent, non id circo tum de-
mum, quando jam natus est infans, rudimenta
illorum poni credendum est, hoc enim qui si-
bi persuadent magnum cum Anatomes impe-
rito vulgo errant errorem; nam utero conten-
tis fatibus illos ad esse auctoria docet. Vidi ipse
sæpius antehac & haud ita pridem plurimos
curio.

cuculo servatos embrionum dentes apud clariss. D. Car. Declincurtium ubi simul etiam notabam parvula isthæc oscula in superna potissimum parte sua non carere duritie, & in primis colore suaviter albicante jam tum posse distingui a radiculis suis quæ instar extenuatum in unguibus nostris, visui se offerebant. Numerantur autem ut plurimum septem menses antequam hiant conspicui, prout jam olim Hippocrates, Aristoteles, Plinius, Galenus, aliique annotarunt. Inter rarissima enim merito numeramus, quod Plinius Laurentius & cum illis etiam alii testantur, se nonnullos haud infimæ sortis mox ab ipso ortu dentibus instructos vidisse.

Serotinos dentes in sexagenario latuisse, viro autem quadragenario erupisse.

Dentes circa septimum ætatis annum si non omnes plerique tamen in conspectum veniunt. Ultimo loco tandem genuini protruduntur, qui vulgo dentes sapientie, serotini, Græcum *οδοντες*, ite *ιδιωμα* & *εργον* dicuntur. Hos anno vigesimo viris pariter atque feminis prodire Aristoteles scribit. Sed apud eundem, ut & Plinium legere est alius octuagesimo demum anno erupisse. Nonnulli decimo octavo, vigesimo sexto, vigesimo octavo, trigesimo demum anno provenire statuunt. Et sic nec Autores ipsi hac de re inter se conveniunt, nec unus solus experientiam habet sibi suffragantem. Uti enim reliqui dentes, ita & hi huic citius illi serius obtingunt. Reperit eisdem adhuc intra gingivas latitantes in sexagenarii cadavere, quod publice cum admiratione omnium dissecuit Excellentissimus D. Promotor meus; Qui ipse aliquando medicinam faciens cauldico parisiensi, (quadragenario majore quem *ιδιωμα* demencia) observavit omnibus in casum adhibitis remediis tandem sapientie dentem dextrum superiorem prodire.

Idem 1675. De dentium ordine multiplici.

Mirum est, (quod plinius c. 37. lib. 11. narrat) timarchum Nicæis filium paphii duos habuisse maxillarium dentium ordines, quod etiam de Mithridatis filia idem affirmat; imo Herculem triplici Dentium serie, ut & Pœbum, Realdi columbi filium, nec non Ludovicum XII. Galliarum Regem, annotante Bartholino, eadem ornatos dicam an deformatos fuisse legimus. Sic nuper, Clariss. Promotor meus, infantis cadaver publicis oculis subjecit, è cujus maxillis integram dentium seriem, scapelli cuspidem, revulsit, altera adhuc dum intra maxillas latitante: sed illam gingivis nudatam & expositam omnium oculis pari metodo sigillatim decussit.

Idem 1675. In odontalgia rabida arteriolam antragi urandam esse.

In atroci dolore solent etiam aliquando arteriotomiam instituere inque illis locis ubi usus obtinet feliciter sæpe administratur constat mihi per sæpius laudatum Dn. Promotorem meum defureculo carotidis exterioris perreptante au-

ris antitragum, quem sæpius (dum apud Principem de Iurena g. m. Caltrensiu Medicorum comes esset) a principis sui Chirurgovidit cautico actuali (adeos usus crescentis lura in modum affabre fallo) felicissimo cum successu deuri.

FOETOR.

De Foetore narium vid. in narium Affectibus
De Foetore oris in oris Affectibus de Foetore pedum in pedum Affectibus &c.

FRACTUR.

Ac primò De Fracturis in genere.

I. Sed quum de affectibus, qui carnosos mollesque partibus accidere solent, quique pro curatione manuum opera indigent, abunde nunc dictum sit: modo restat, ut de iis vitiis quoque agamus, quæ ossa invadere possunt. Eum vero quod in parte molli est vulnus, id id dura & ossea est fractura; propriè Græcis *αγμα* & *καταγμα*, quæ est ossis divisio seu ruptura à causa externa violenter irruente. In fractura definitione omnes fere auctores sunt concordantes, quod sit continui solutio in osse facta: in hoc vero differunt, quod Galenus, Paulus Aegineta, & alii Græci, perfracturam intelligant quamcunque unitatis live continuitatis solutionem in osse, à re extrinseca violenta factam, tam ab instrumento incidente, quam contundente, vel rumpente. At vero cum de fracturis tantum simus dicturi, quæ à re contundente vel rumpente sunt; ideo cum guidone de cauliaco fracturam definimus: quod sit, ossis continui solutio; absque incisione, violenter extrinsecus à re rumpendi, vel contundendi vim habens facta: vel potius dicamus, fracturam esse continuatis ossium solutionem, à violentia quadam extrinsecus irruente acci dentem.

II. Sunt autem varix fracturam differentiarum, quas tradit Galenus lib. 6. Meth. Med. cap. 5. franguntur namque ossa vel simpliciter, vel cum adjuncto vulnere, extremitatibus acuminatis fracti ossis musculos, cutemque perforantibus Idem contingit, cum à glande plumbea vulneratur caro, & subiectum os frangitur. Simplex fractura tribus modis contingit: vel enim franguntur ossa transversim, quæ in primis & propriè fractura dicitur. Et quidem si ita franguntur, ut nullo pacto extrema cohæreant, atque e directio non jaceant; in specie hujusmodi fractura *καταγμα* a fracti canlis similitudine appellatur. Dicitur etiam *αγμα*, & similitudine fractæ radicis & cucumeris. Vel franguntur ossa secundum longitudinem instar aliojus asseris; atque hoc fracturæ genus fissura vulgo, Galeno *αγμα* nuncupatur. Vel franguntur cum continuatione in plures partes, & talis fractura *αγμα*, comminutio appellatur quæ & *αγμα* nuncupatur à quibusdam dicitur, quod sit facta in modum contusarum nucis testatum.

Dein à parte affecta varix petuntur fracturarum Differentiæ. Alia enim est crurii fractura, alia

alia humeri, alia brachii, alia femoris, alia alius partis. Insuper alia fractura magna est, alia parva, alia simplex, alia multiplex, alia iola, alia cum carnis cum luxatione, inflammatione, gangraena, &c.

III. Cuius autem fracturam internæ nullæ sunt; Externæ vero ea omnia, quæ contundendi, vel ossa rumpendi, ac dividendi vi habent: sive sit catus, sive ictus quidam violentus, qui sua vi & violentia os frangit & comminuit, ac continuitatis solutionem, quam fracturam appellamus, efficit. Facit tamen ad faciliorem ossium fracturam eorundem constitutio fragilis, ut etiam leviozem impetum sustinere non possit; sive ea sit naturalis, sive à carie (imprimis luem veneream, ac inunctiones mercuriales subsequentes) acquiratur. Enim vero ex lue venerea, arthritide, aut inveterato scorbo cariosum os, levissima accedente causa externa, fractum fuisse aliquoties notatum est. Memorandæ & raræ fragilitatis historiarum exstant apud Marcellum donatum de hist. Med. Mirabil. lib. 4. cap. 5. Schenkium lib. 5. obs. 8. Hildanum cent. 2. obs. 66. 68. Qualem & nos observavimus in muliere scorbuto graviter afflictâ: cujus historiam adferre haud gravabor. Mulier septuagesimum septimum agens, annum scorbutica, postquam cum brachiorum tum crurum doloribus lancinantibus ac rodentibus diu fuisset afflictâ, vasculum quoddam è pavimento attollens, mox vehementissimum in crure sinistro sentiit dolorem, ob quem deponere vasculum, & proximo in loco sedere tuit coacta. Dolor hic indies augebatur, variaque ei sedando per quinque hebdomadas imposita fuerunt remedia: quæ cum nullum adferrent levamen, ecce 2. Junii 1688. per gradus descendens eadem in parte ossium crepitum persentiebat, ab eoque momento omnis incedendi potentia cessabat. 14. Junii vocatus cum gerardo Dompelaar, medicinz doctore, & Chirurgo N. Schut, crus omnino diffractum observavimus. Fracturam composuimus, & diligavimus, linteaminibus madefactis epithemate ex æqualibus partibus aquæ puræ, aceti Rosacei, & spiritus vini, addito tantillo salis communis. Sed penitus emaciata quum esset ægra, nulla succrescentis calli indicia unquam apparuerunt: quin potius, labescentibus indies viribus, tandem ad plures abierit.

IV. Ad dignoscendas fracturas jubet Hippocrates, partem sanam cum ægra conferre, ut discrimen, si quod sit, facilius intelligatur. Nam si partis affectæ figura fuerit inæqualis, utpote in loco percusso cava, & in opposito tumida, fracturam suspicari licet. Insuper transversim vel oblique facta fractura facile cognoscitur, quia ossis fracti extremitates separatæ tactu deprehenduntur: si membrum fractum contrectetur ac varie dimoveatur, crepitus ac fragor in affecto loco, ob ossium mutuam collisionem, ac affriccionem, auditur; dolor vehemens adest, ob divulsionem ac distorsionem partium nervosarum, aut ob puncturam eminentis ossis in periosteo. Adhæc fractura femoris, tibiæ, aut pedis, omnem incessum tollit, quem aliqualem, admodum licet dolorificum, luxatio concedit: Et hoc certum signum distinguens fra-

cturam & luxationem. Adest quoque interdum membri tortuositas, & brevitæ, dum inferiorem ossis partem musculi convulsi sursum trahunt: sed non semper.

Si vero fracturæ vulnus sit conjunctum, non solum dictis signis ea cognoscitur, sed etiam tactu; digito vel specillo intra vulnus immisso, quibus fractura vel ossis asperitas persentitur.

Fracturæ autem secundum longitudinem factæ difficilius cognoscuntur; deprehenduntur tamen ex membri præternaturali crassitie, inæqualitate, dolore. At comminutio tactu explorari facile potest: variis enim in locis os digitis cedit, exasperatum valde.

V. Cæterum ossa fracta nunquam vere reu-niuntur, & sicut caro non coalescunt secundum intimas partes; sed, ob ossium siccitatem ac duritiam, duntaxat secundum exteriorem superficiem mediante callo, circa oras ipsorum oborto, consolidantur. Facilius autem curatur fractura ossis transversim facta, quam quæ oblique contingit, quæve inæqualitatibus prædita est, quia neque facile committuntur & nullo retulo innituntur, carnemque, interdum & nervum quoque, & tendinem vulnérant: sunt namque illæ fracturæ, in quibus capita fractorum ossium sunt retusa, minus periculose.

Difficilius item curatur fractura, ubi os in multa fragmenta divisum est, quoque plura sunt fragmenta. Etiam quo fractura major, & ossa fracta majora, eo difficilius & tardius consolidatur.

In illis partibus, ubi bina sunt ossa, ut in brachio & crure, si alterum tantum frangatur, facilius fractura curatur, quam si ambo sint fracta, cum minus muscoli contrahuntur, sed ab altero osse integro tensi servantur, atque integrum os fracto sit veluti sustentaculum. Facilius item consolidantur fracta ossa, quæ suis sedibus mota non sunt.

„Ossa autem minus periculose in medio franguntur, „ & facilius curantur, & quo propior fractura capiti, vel „ superiori vel inferiori ossis est, eo peior est. Celsus lib. 8. cap. 30. Enimvero & majores adfert dolores ob nervosarum, tendinosarumque partium læsionem, & difficilius curatur. Quæ vero fracturæ articulis spatio trium vel quatuor digitorum proximæ sunt, non solum periculose, sed & curatu difficiles, cum commode ligari nequeant ac ut plurimum tale difficilem juncturæ motum relinquunt; viz. ob callosam inter tendines, articularumque ligamenta concrecentem substantiam.

In genere recens fractura ad consolidationem aptissima est. Si vero tempus protrahatur, curatio difficilior redditur. Arabum princeps Avicenna inquit: „quanto serius fracturæ restaurantur, tanto peiores „ sunt; cum spatium illud aliena substantia repleatur, & „ in restoratione majore extensione egeant, magnæque „ extensioni sæpe spasmus seu convulsio accidat.

Quæ potro fracturæ cum vulnere sunt conjunctæ, periculose sunt, & eo periculosiores, quo majora fuerint vulnera, ac sensibiliores partes tetigerint; cum in hujusmodi fracturis dolores, inflammationes, ac gangrænæ supervenire soleant, & ferulis, aliisque sustentaculis uti vix queamus.

Demum de tempore consolidationis fracturæ nihil certi prædici potest, cum id variet secundum ætatem, habitum corporis, ænitempus, alias circumstantias. Ut plurimum veronavi, maxilla, juguli, pectoris, scapularum ossa, collæ, ossa ipsæ, tali, calcis; manus, & plantæ pedis, intra vigesimum, vel vigesimum quartum diem consolidantur. At crurum & brachiorum intra trigessimum quantum & quadragessimum diem, &c.

Circa tempus vero, quo ossa fracta confirmari, ac firmo soleant obduci callo, observavit Fabricius Hildanus cent. 6. obs. 68. tibiae gravidarum fractas, quamdiu uterum gerunt, mediante callo coalescere non posse. „Tota enim „natura, inquit, cum circa formationem foetus occupata sit, materiam pro calli generatione destinata ad uterum mittit, & ossa fracta negligit. Cujus rei memorabile exemplum refert cent. 5. obs. 87. de matrona gravida, quæ tibiam fregerat; ubi tantas circa generatione nalli habuerunt difficultates & labores, adeo etiam, ut tertia & vigesima hebdomada, post contractam fracturam, movendo & circumagendo pedem, ossa contracta adhuc vacillarent. Tandem tamen, scilicet a tertia & vigesima ad trigessimam septimanam, fractura fuit confirmata. Causam autem tardioris generationis calli in foetu querendam esse judicat. Quamdiu enim in utero fuit foetus, alimentum pro calli generatione destinatum, ad sui nutritionem per vasa umbilicalia attraxisse putat.

De Generali Fracturarum Curatione.

I. At fracturarum curatio tum in ruptis, fractisque ossis adunatione ac reductione; tum in illius consolidatione & conglutinatione consistit. Ossis vero adunatio Chirurghi opera & dexteritate efficitur: consolidatio autem & agglutinatio virtute ac viribus naturæ, cumque Balsamo suo naturali; glutinoso nempe humore, ad coadunanda & consolidanda ossa accommodatissimo, efficacissimo. Eumverò cum fractura sit ossis continui solutio, pro ejus curatione finis ac prima intentio erit unio. Hanc tamen unionem medicus facere nequit, sed solius naturæ opus est; quæ in junioribus nunquam per intrinsecam & omnimodam partium disjunctarum unionem; in adultis vero, interveniente *calli* seu callo, tanquam glutine, conjungere fractas extremitates solet. Est autem callus idoneum ac proprium facti ossis alimentum, quod ibidem effervescit dum concoquitur, & in tumorem attollit substantiam ossis haud secus ac in coleolis arborum per infusionem adaptatis contingere solet. Acque hic porus seu callus licet non sit os, ita tamen dorus est, ut si idem membrum denuo frangi contingat, potius alia in parte frangatur, quam ubi callus genitus est.

II. Verum enimvero Unio illa etsi naturæ opus sit; tamen ut Ea scopum suum assequatur, plura adhuc necessaria sunt. Nimirum cum ossa fracta plerumque suo loco dimoveantur, si id accideret, ea restituenda, & ad amissam coaptanda. Deinde hoc modo conjuncta servanda. Quæ si dextrè Chirurgus fiant, unio postea

ossium seu calli generatio opus naturæ est. Medicus tamen & hic natura operi terre debet: quod sit, si partis naturalis temperiem conservet, & Inflammationem, ac omnia symptomata, quæ naturam in opere suo turbare possent, avertat.

III. Primo itaque, ut corn. celsus lib. 8. cap. 7. docet, animadvertendum & considerandum est, utrum ossa fracta proprio loco exciderint, nec ne, cum non temper, ubi transversim franguntur ossa, sua naturali sede excident. Cognoscitur autem ossa, suo loco dimota non esse, si in fracturæ loco nulla cavitas percipitur, nec punctationis sensus adeit, nec membrum brevius apparet. In hac ergo fracturæ specie non opus est, ut membrum extendatur, & de ossium repositione ac coaptatione laqueoretur.

At vero ossa fracta si loco suo exciderint, ita ut unum supra alterum efferatur, prima cura esse debet, ut restituantur. Fit autem hoc duabus operationibus, quarum altera extensio, altera conformatio seu ossium in suum locum repositio appellatur.

IV. Igitur in fracturæ ossium restitutione opus est membri extensione: cum enim musculorum fibræ, ossis robore destituta sequantur naturalem suam determinationem, & in se contrahuntur, necessum est per vim eos, simul cum osse fracto, tantum elongare, quantum a naturali statu recesserint. Alioquin, si non recta fiat extensio in fracturis, ex attritione rumperentur ossium eminentiæ, quæ dein suas in cavitates reponi non possent, sed vel exterius ad ossium latera harerent, vel inter ossa fracta remanerent, ossisque fracti coaptationem impedirent.

Ut autem iusta fiat Extensio, danda opera ut fiat minime cum dolore. Fiet vero hoc, si membrum extendendum ea figura colloccetur, in qua muscoli non agant, sed otiosi, & omnes laxati sint, hoc est, membri talis sit situs, qui omnium familiarissimus, quæ nullam ipsi adferat lassitudinem: quo modo & minore extensione opus est, & minore cum dolore opus perficitur. Extensio interim fiat neque validior neque debilior, quam requiritur, sed moderata: quoniam ex validiore extensione malignis oritur dolor, ex quo postea febres, convulsionem sequuntur: in debiliore vero ossium capita committi nequeunt; sed eorum eminentiæ simul confriquantur, vel franguntur, vel in proprias cavitates recondi ac reponi non possunt.

Cæterum sit extensio hæc aut solis manibus, idque unius vel plurium; vel habenis, sive lintheis, fasciisve circumpositis; vel per Trochleam trajecto fune, quale exemplum habet Fabric. Hildanus cent. 5. obs. 86. & ex eodem Scultetus Armam. Chir. Tab. 22. Fig. 1. Extensio namque major vel minor requiritur pro diversitate temporis, ætatis, magnitudinis ossis. Fractura recens, æger debilior, os exile, leviolem exigent extensionem; vehementiorem vero fractura inueterata, æger robustus, os magnum. Sic minimam postulat extensionem radius; majorem ossa, quæ in summa manu & summo pede sunt; adhuc majorem ossa cubiti; validiorem humerus & tibia; validissimam femur.

In genere autem cognita fractura mox instituat extensio; si namque id non fiat, magnus

ob dolorem vehementem fit humorum affluxus, & musculi versus sua principia trahuntur, hinc extensio difficilis evadit, & si instituatur, ossa fracta adjacentes partes carnosas pungunt, ac sequuntur inflammationes, convulsiones, aliaque mala accidentia. „Quicquid suo loco motum est, ante inflammationem reponendum. „Si vero convulsio oriatur, ossibus in suam sedem restitutis, rursus ea (si commodè fieri possit) suis locis propulsabimus. Chalmet. in Enchir. Chirurg. lib. 4. cap. 2. Quod idem docet Hippocrates lib. de fracturis §. 36.

Si cum fractura Luxatio incidit, primum luxatio, modo fieri possit, dein fractura erit curanda, quod maiorem vim in restaurando postulet luxatio, quam fractura. Tagaultius lib. 5. cap. 4. Anton. Chalmet. in Enchir. Chirurg. lib. 4. cap. 2. Oribasius lib. de Machinamentis, Vido Vido Interpret. pag. 498.

V. Extensioni succedere debet Conformatio, quæ est ossis fracti in suum locum repositio, & extremitatum recta coaptatio; quam musculorum legitima figuratio optime determinat, sic ut nulla in illis contorsio notetur. Ea sit, si postquam membrum eatenus extensum est, ut in reponendo ossa se tangere nequeant, Chirurgus membrum, utraque manu comprehensum, studeat ad pristinam figuram reducere, impellendo hinc, inde, ante, retro, ad latera, donec extantes particule in suas cavitates & pristinas sedes fuerint reductæ. Non sunt autem eminentiæ ossium cum impulsu vehementi in suas cavitates intrudendæ, ne rumpantur, sed potius sponte sua, extensione laxata, manibus Chirurgi leniter directæ in suas sedes recedant. Repositionem vero probe factam esse, ex doloris cessatione, ossis fracti in superficie æqualitate, & comparisone cum sano membro facta, elucescit: sique membrum reductum post fracturam longius appareat, id violentæ extensioni tribuendum est.

VI. Ossa sic probe coaptata exacte conjuncta sunt tenenda, quod præstabit Deligatio, quæ ita fieri debet, ut & partes commissas servet, & inflammationem arceat. Sed priusquam Fascia membro fracto injiciatur, ad humorum affluxum & inflammationem prohibendam, atque partem affectam roborandam, linteum reduplicatum, Oxycrato aut Vino Rubro Adstringente madidum (omissis Oleis, Emplastris, & similibus, utpote inutilibus, ac non raro admodum noxiis) imponantur; dein Deligatio instituitur, quæ nec nimis laxa sit, ne ossa suo loco iterum dimoveri possint; nec nimis arcta, ne alimenti affluxum prohibeat, & dolorem excitet. Perficiatur vero duabus Fasciis, paratis ex linteis vetustis, aliisque ulibus ex parte attritis, ut sint tractabiliores, validis tamen, ne extentæ lacerentur; nullas confusiones, aut extantias habentibus, ut æqualiter, ac sine dolore constringant. Prior Fascia supra fracturam injicienda, & circa eam modice comprimendo ter involvenda, dein sursum versus ducenda, usque dum ad sanam membri partem, quatuor, quinque, vel pluribus circumvolutionibus perveniat, paulatim imminuta compressione. Ubi autem satis de sana parte fuerit comprehensum, ibi deligationem terminare oportet. Dein altera Fascia, priore duplo longior contrario modo involvenda: si enim prior versus dextram, hæc versus sinistram obvolva-

tur; ut si forsitan musculus aliquis per primam fasciam a nimum ad alteram partem sit attractus, restitatur in partem contrariam per secundam fasciam, quæ primum fracturæ injicienda, & una vel altera circumvolutione facta ab ea incipiens deorsum aliquoties circumvolvenda, similiter paulatim compressionem minuendo, iterumque supra fracturam ducenda, ita ut ultra primam fasciam in parte sana terminetur.

Maxima igitur diligentia opus est in fasciis arctandis, cumque eæ injiciuntur, patientem interrogare oportet, qualem circumjectam fasciam sentiat, & si premi se dixerit, laxari debet; sin vero fasciam ita laxam affirmet, ut minime fractum membrum sustineat, adstringere est opus. Moderate ergo fasciæ adstringi debent, magisque in parte tracta stringi ac coarctari, quam alibi, ut ab humorum defluxu ea defédatur.

VII. Quoniam vero hæc duæ fasciæ, jam circumvolutæ, ad fracturam continendam debiliores sunt, adhibenda insuper Splenia, seu panni linei sæpius complicati, oblongi, crassi, splenis brutorum intar. (Compressæ barbaro vocabulo, latino Pulvilli vocantur.) Hæc circa fracturam, & totum membrum, per ejus longitudinem adhibenda, ut unum alteri non superponatur, sed inter ea digiti transversi spatium circiter intercedat: quæ nrmuntur appositis Ferulis, ex ligno tenni lævigato, aut potius chartæ crassiore paratis. Etenim cum fasciæ & Splenia indurabilia non sint, fracturam firmam & directam servare nequeunt; sed facile fieri potest, ut tum vigilantibus, tum dormientibus membrum moveatur. Ut igitur in motibus membrum firmum teneatur, opus est iis, quæ rigida sunt, & non flectuntur, & tamen minus ponderosa. Quem in finem Hipp. elegit Ferulas, quæ & rigidæ sunt, ac inflexiles, sed leves. Quod si ob membri inæqualitatem ferulæ aptari non possint, partes cavæ splenis implendæ sunt, ac membrum æquale reddendum, ut ferulæ commode applicari queant. Desuper Vincula alliganda admodum laxa, sic ut appositæ ferulæ cum splenis contineantur, nec quicquam paræ adstringant, ac comprimant sed ut tutum, immobile, ac in debita figura membrum servant. At vero in ferularum appositione cavenda sunt ossa prominentia & excarnia; illis namque appositæ dolorem, nec non alia inferrent graviora symptomata.

VIII. Signum autem congruæ deligationis potissimum ipse Ager indicare solet, ubi, num prematur, rogaveris, atque is respondeat, se premi quidem, sed leviter, idque præsertim, quæ fractura est. Sin vero patiens fasciis nimis prematur, eæ celerrime solvendæ & aptius deligandæ, ne ex arctiori vinculo prava eveniant symptomata. Sin fasciarum circuitus iusto laxiores, & nihil se premi respondeat patiens, arctius vinciendæ, cum laxa vincula non prohibeant membrum, quo minus, quæ fractura est, depravetur.

IX. Congruæ deligationi succedit bona membri Repositio, quæ sit, mollis, æqualis, sursum vergens, sic ut nec protuberantia, nec sinus in loco fracto notetur, neque dolorem & inflammationem excitet. Præterea in repositione oportet congruam membri figurationem considerare; quæ scilicet dolore vacat, & musculos ex utraque parte integros servat: hæc autem est figura media, in qua dum otiamur singula mem-

bra continere consuevimus, ut in cubito figura angularis, in carpo recta, &c. Ea nimirum, quæ inter extremos cuiusque membri motus intermedia est. Hæc figura nisi observetur, exiguo post tempore membrum dolere solet.

Pars igitur deligata in Capsula Lignea, qualem depingit Hildanus lib. de Ichore & Melicer. cap. 29. & Scultetus Armam. Chir. tab. 36. fig. 1. 2. 3. Stupa linteo involuta repleta, siue in pulvinari molliuicula deponatur, atque ita intertium usque diem relinquatur, si Patiens eo, quo deligatus est die, & sequenti nocte sentiat se valentius stringi; postero vero die minus, nec non in parte extrema tumor laxus, mollis, & parvus appareat: si vero aut sit nullus tumor, aut magnus & durus postmodum in manu vel pede, prava est deligatura; quia illa non continet; hæc nimis arcta est, & inflammationem movet, atque gangrenam non raro minatur; unde nulla interposita mora Ager solvendus, ac denuo, sed moderate, diligendus est.

X. Igitur si probæ deligationis signa adsint, nullusque dolor insignis, nullave inflammatio suspecta sit, reliquum opus, quod est callum, per quem fracta ossa conjunguntur, gignere, naturæ committendum, & deligatio ante tertium diem non solvenda. Tertio autem, post primam deligationem, die quum laxiores videntur fasciæ, solvantur; cumque fuliginibus ac vaporibus ob deligationem exhalare prohibitis, & per moram ac stagnationem acrioribus redditis, ita intolerabilis non raro exciteretur pruritus, ut in dolorosam excoriationem, ac inflammationem terminetur; hinc pruriens pars Aqua Tepida aliquoties perfundatur, ut apertis poris detentæ subcute fuligines evaporari queant: dein membrum ligatura, quæ moderata paulo arctior sit, contringatur, ac porro ut prius deligetur, inque capsula seu molliuicula pulvinari deponatur in septimum usque diem; nisi pruritus, vel inflammatio, vel dolor, vel quid aliud infestet. Septimo die fasciæ iterum solvenda, membrum Aqua Tepida perfundendum, & deligandum, arctius adductis fasciis; ita tamen, ne sanguinis circulatio, spirituumque vitalium ac animalium radiatio prohibeatur.

Membrum ita deligatum detineatur immotum ad duodecimum circiter diem, quo fasciæ denuo solvendæ, & membrum deligandum. Si namque tardius solvatur deligatio, magna sæpè incommoda (qualia sunt, partis exulceratio, putredo, gangrena, &c.) inde oriuntur; quorum exempla notavit Fabricius Hildanus cent. 2. obs. 91. qui propterea monet, ut secundo aut saltem tertio die semper deligatio solvatur: & quamquam post septimum non sit adeo necessarium toties fracturam solvere, se tamen de quarto in quartum fascias solvere, partemque affectam inspicere solere, scribit. Atque hæc Deligatio continuanda, (paulo laxius tamen fasciis & ferulis indies adstrictis, ut nutrimentum ad ossa fracta magis confluere, & callus gigni, firmusque reddi possit) donec callus genitus, & fractura sanata sit; quod triginta aut quadraginta intra dies plus minus fieri solet.

XI. Interim ad Calli Generationem alii exhibent Juscula, in quibus bullierunt Folia Agrimoniae, & Radices Consolidæ Majoris. Nonnulli rusciores Cibus præbent. Alii Lapidem Oxycolam pulverisatum & cum Jusculo exhi-

bent, & cum Cerato extrinsecus applicant. Sed cum calli Generatio, adeoque fractorum ossium mediante callo unio, solus Naturæ opus sit, hæc omnia, ut inutilia ac plane inepta, merito rejicimus. Nihilominus tamen, ut omnia quæ Naturam in opere suo turbare possent removeantur, bona Dieta Agrotanti præscribenda, venz sectio aliquando instituenda & sanguis nonnunquam depurandus: In partium inferiorum fracturis Purgantia rarius, fere sola Suppulatoria usurpentur. In superiorum autem partium fracturis Purgantia atque Ene-matum usus necessarius admodum est.

XII. Quod si Fractura per longitudinem ossis facta sit, fasciæ arctius stringendæ, quam in reliquis, ut ossa fracta, quæ secundum latitudinem à se invicem recesserunt, ad mutuum contactum ducantur, & removeri nequeant. Cæterum ea omnia agenda, quæ in transversæ fracturæ curatione dicta sunt.

De Affectionibus præter naturam, quæ Fracturis accidunt.

I. Quoniam vero Fracturis non raro quædam accidere solent, quæ curationem remorantur, aut post curatam fracturam remanent; ut sunt dolor, inflammatio, pruritus, excoriatio, membri debilitas & gracilitas, figura depravata, &c. quæ idcirco Medici operam requirunt, de iis etiam paucis dicendum.

Dolor igitur si adsit, ne in causa sit, ut humores in partem affectam confluant, & inflammationem vel quid aliud excitent, omnino leniendus ac tollendus. Ut vero tollatur, considerandum, à qua causa proveniat; quæ statim tollenda. Perpendendum ergo, an ab osse aliquo pungente Dolor sit, an à fasciis nimium adstrictis, an ex pravo membri situ, an ex humorum affluxu.

Si ex osse pungente Dolor sit, (id quod ex levi partis contrectatione, & pungente dolore cognoscitur) fasciæ solvendæ, & os pungens vel in locum suum reponendum, vel, si fieri possit, eximendum, aut præcidendum. Sin ex fasciarum nimia adstrictione Dolor oriatur, deprehenditur id ex tumore, qui in membri extremitate apparet, Agerque se vehementer premi conquiretur: tunc quamprimum fasciæ solvendæ, & laxior deligatio instituenda. Sed ob malam membri situationem si Dolor fiat, id Ager facile indicat, & situs mutationem postulat, quæ ita instituenda, ut jam sine dolore se esse fateatur.

II. Verum ex humorum defluxu quum pars doleat, Tumor, & Inflammationis signa apparere incipiunt. In hoc casu si membrum devinctum sit, quamprimum solvendum, & cum linteo duplicato vel quadruplicato calidè imponendum Oxycratum, vel Vinum Rubrum Adstringens: vel applicetur fomentum anodynum, Resolvens, leviterque repellens, ex Malva, Althæa, Violaria, Scordio, Floribus Sambuci, Camomilla, Rosarum Rubrarum, &c. in Lacte Dulci, vel Cerevisia tenui decoctis. At priusquam sedata fuerit inflammatio, pars affecta non deliganda, saltem arcte non stringenda.

III. Pruritus cum partem infestet, & Agrotantem torqueat, cessabit si Aqua Tepida pars inter diligandum foveatur, ut apertis poris materia pruritus efficiens dissaripossit. Quod si locus affectus Aquæ Tepidæ affusionem com-

mode

modo non admittat, ejus vaporis satis utiliter apponitur. prohibenda interim Aëris scalptura, eo quod pessima, & præter exoriationem dolores exciter graves. Si tamen ex imprudenti scalptura, vel ex fasciarum resolutione diutius quàm par est protrahatur, dolorosa oritur ex coruptio. Sanatur aliuione Aquæ Tepidæ, uti proutus; & Litu ex Unguento de Cerusa, Alo Camphorato, Nutrito, vel simili.

IV. Non raro quoque Fracturis, ex attritu, vel ex rectoribus vinculis, qualibet alia de causa Gangæna accidit. Quæ qua ratione tractanda sit, lib. I. cap. 17. abunde dictum fuit.

V. Sed & nonnunquam post Fracturam membrum gracile & debile manet: quod fit ob alimentum penuriam, dum a nimia fasciarum strictura partis affectæ vasa & porositates admodum contrahuntur, adeo ut sufficiens alimentum affluere nequeat. Id quando fit, pars Aqua moderatè Calida fovenda, donec rubescat, eaque laxius demceps vincienda. Insuper commendatur à nonnullis Picatio, quæ fit Nigra Pice supra linteam ducta, parti multoties applicata, & violentè, velociterque ablata, ut ratione adhaerentia, pilorumque evulsionis ac doloris, alimentum alliciat, cavendo postmodum strictam fasciarum circumductionem, quæ affluens alimentum iterum repelleret.

VI. Etiam contingit, ut postquam Ossa Fracta iterum coalescent, pristinam & convenientem figuram non recipiant, sed Distorta sint, unde membri motus impeditur, & claudicatio in pede oritur, vel in brachio apprehensio laeditur. Fit autem hoc, vel ob Chirurgi ossa componentis & fracturam deligantis imperitiam aut negligentiam; vel ob Agrotantis vitium, quando membrum fractum ante calli confirmationem movet, aut ipsi innititur: vel ob ipsius Fracturæ culpam, quum ossis frustulum inter ossa fracta continetur, quod mutuum eorum contactum impedit.

Emendatur autem hoc vitium, si quidem læsisio membri sit magna, continuoque punctiones, ob acuitatem capitum ossium non recte compositorum, perierint, Patiens sit juvenis & robustus, callus recens, & non diu concretus, os fractum non adeo magnum; si callus iterum frangatur & ossa rectè coaptentur & componantur. Verum ut tutius fiat hæc calli fractio, is emolliatur multis diebus fomentis, Balneis & Limentis. Callo satis emolliato, Chirurgus membrum fractum genu suo imponat, & os utrinque utraque manu deprimat, ac denuo frangat; deinde ossis fracti partes manuum palmis coaptet, & fracturæ novæ convenientem curam instituat. At vero si Patiens sit senex vel debilis, callus vetustus & induratus, os magnum, quale est femoris vel humeri: optimum est illi manum non admove, ob periculosa, quæ hanc curationem subsequi solent symptomata: satius enim est vel deformem vel claudum multos adhuc annos vivere quam crudeli cura lætissimam provocare symptomata. Etiam si læsisio membri in suis functionibus non sit admodum magna. Ager forte sua sit contentus.

Atqui si ossis frustulum membrum eorum distorqueat, Incisio fiat ad os fractum usque, & Valsella ossis portio glutinationem impediens extrahatur, dein Fractura per extensionem

coaptetur, deligetur, & deponatur, eodem modo quo recens Fractura.

De Fracturis cum Vulnere.

I. Sed Fracturis non raro conjungitur vulnus, quando ossium fractorum eminentiæ acuta incumbens carnem perforant. Atque in hisce interdum os fractum nudatum est, interdum non est nudatum; Quumque denudatum est, nunc extra vulnus non eminet nunc vero eminet: deinde interdum os, seu tagmentum aliquod abscissum esse metuemus, interdum nihil abscissum speramus. Quæ omnes Differentiæ cum variæ sint, variam sanè expostulant Curationem.

II. Fractura cum Vulnere Simplici, hoc est, in qua nec os a suis tegumentis denudatum est, nec aliqua ossis portio abscissura, duas habet pro sui curatione Indicationes. Prima est, ut Ossa fracta loco suo restituantur, & conjungantur. Altera, ut Vulneris Labia simul reuniantur. Quod si os frangatur, & una cum ossis fractura etiam musculi & corpora adjacentia vulnerata sint, tunc curationis intentio oritur duplex, quarum altera quidem circa ossa fracta, altera vero circa corpora adjacentia vulnerata versatur. Galenus lib. de Arte Medica cap. 91.

Primum ergo, cruore sordibusque deterfis, membrum congrue extendendum, & ossium fractorum capita debite coaptanda, haud lecus ac in fractura sine vulnere. Hic tamen notandum, ne Extensio sit adeo valida, quod partes carnosæ ac membranosæ admodum lacerentur, contusæ, & attritæ plerumque sint; alioquin dolores ingentes, nec non convulsiones excitarentur, non raro cum vitæ discrimine. Et quidem Extensio hæc, Ossiumque Repositio statim, & primo aut ad summum secundo die fiat, priusquam parti gravis superveniat inflammatio.

Extensione peractâ, Ossisque Reposito, Vulneris Labia ad mutuum contactum adducenda, adductaque servanda per Linteola Emplastica cruciatim imposita, & Fasciam. Dein Vulneris ea applicentur, quæ conglutinandi ac vulnera consolidandi vim habere suo loco docuimus.

Post hæc fractura Deliganda est, perinde ac si ossa citra vulnus essent fracta. Fascia tamen hic sint molliores & latiores, ut oras vulneris utrinque comprehendant, & sic labia ejus constringant, non comprimant: angustiores namque si essent fasciæ, tunc vulnus cinctum tenerent, & dolorem inferrent. Cæterum minus etiam stringendæ sunt, quam si vulnus non adesset, ne compresso vulnere dolor & inflammatio oriatur: unde Hipp. & Celsus plures faciunt circumvolutiones, cum melius sit sapius circumvolvere, quam adstringere. Nonnulli autem hujusmodi fracturæ deligationem instituunt per Ascialem Fasciationem. (de qua Scultetus Armament. Chirurg. tab. 17. fig. 1. & tab. 18. fig. 8. 10.) ut crebrius fieri possit partis affectæ inspectio.

Tertio, nonnunquam secundo, à prima deligatione die pars solvatur, iterumque deligetur; ita tamen, ut deligatio paulo magis comprimat, quamdiu durat timor inflammationis, nisi dolor prohibeat. In secunda vero, & tertia solutione laxior semper fiat deligatio, ut libera omnino sit sanguinis, pro futuri calli materia, circula-

tio. Reliqua curatio eadem erit, ac fracturæ sine vulnere; nisi quod ferulæ non sint ad vulnus apponendæ, ne id comprimant: si vero apponendæ, adhibeantur ad vulneris latera & partem oppositam, donec sanatum sit vulnus. Raro autem contingit, simplex vulnus, si fracturæ coniungitur, secundo vel tertio apparatu cicatrice non obduci, vel saltem carne non repleri. Sanato vulnere si nondum confirmatum sit os, eadem agantur, quæ in fractura simplici.

III. Interdum tamen accidit in fractura cum vulnere, ut os nudatum non sit; ossis tamen frustulum abscessurum metuamus. Id quod fit, cum ob fracturæ impetum aliquod ossis fragmentum ita à reliquo osse separatum sit, ut cum eo de novo coniungi nequeat. Tum enim natura id quod sibi molestum est, aliisque ossibus uniri non potest, foras protrudere conatur, neque finem facit, donec expulsum sit; id quod longior demum tempore non raro perficere solet.

At vero abscessurum os indicat sanies, quæ copiosior, quam pro magnitudine & constitutione vulneris, effluit. Deinde labia vulneris non coeunt, & si coeuerint, iterum dehiscunt, & ad excrescentiam stimulari videntur, & laxa quasi ac spongiosa evadunt; nec non tacita quædam motio in parte vulnerata percipitur. Neque enim natura vulnus integre sanat, ubi aliquid intus hæret, quod reliquis agglutinari non potest. Adhuc ossa abscessura indicantur, si in plures particulas os comminutum sit: neque enim tunc omnes facile conglutinantur.

Cito autem futuram abscessionem suspicatur, si caro laudabilis in parietibus ossis sani generetur. Enimvero non alio modo os recedit, quam dum natura carnem in labiis ossis sani creat, quæ os superpositum attollit, atque propellit. „ maturum ossis exitum, præter probabiles „ quædam conjecturas, inde cognoscere licet; si „ os semel, iterum, atque tertio quis pulset: percussum enim si clangorem, & vacui resonantem „ reddit, appetitum de maturitate testimonium „ dabit. M. A. Severinus efficac. Chir. part. 2. de „ iis quæ ad ossa spectant, cap. II.

Tempus vero, quo ossa recedere soleant, varium est. Enimvero ætate tenera, tempore æstivo siquæ os non adeo magnum sit, viginti, triginta, aut quadraginta dierum spatio abscedit, si vero sit magnum, ætate adulta, tempore hyemali, vix sexagesimo die, aut etiam tardius, os separatur. In magnis ossium contritionibus, etiam post multos annos fragmenta ossium prorumpere, exemplo demonstrat Hildanus cent. 4. obs. 97. Quod & in Praxi frequenter observari solet.

Si igitur os abscessurum suo loco motum sit, & in vulnere consistat, statim vossella extrahendum. Similiter si ossis frustulum per rimam undique à reliquo osse sit separatum, in suo tamen adhuc loco detineatur, nihilominus quoniam nunquam cum reliquo osse glutinari potest, apprehendendum & extrahendum; siquidem sine dolore & violentia extrahi possit: atqui absque magno vi si id fieri nequeat, non debet extrahi, quia facile excitantur dolor, inflammatio, ulcusque fistulosum redditur, cum extracto osse cavitas illa sanie repletur, quæ corrodendo carnis generationem impedit. Hinc potius natura negotium tunc committendum, quæ sensim id, quod agglutinari nequit, separat. Interim tunc opus natu-

rz à Medico juvandum, & propterea deligatio laxior instituenda, sæpiusque (de tertio scilicet in tertium) solvenda, ne pus detineatur, sed facile effluat. Ferulæ etiam eo loco, quo os abscessurum, non imponendæ, ne dolorem comprimendo pariant. Insuper Medicamenta vulnere admovent, quæ ossa & omne alienum e vulnere expellant. Quem in finem Barbette Chir. part. 1. cap., sequentia proponit,

℞. Cineri Lumbrior. Terrstr. ʒiij. mellis virginici ʒij. M. F. Unguentum.

Vel; ℞. Aloës, Myrrhæ an. ʒß. P. Rad. consolid. Mai. Aristoloch. rot. an. ʒiij. euphorbii ʒij. Therebinthinæ, & ceræ q. s. ol. lilorum albor. parum. M. F. Unguentum.

Ossicula tandem omnino separata, ac citra violentiam extracto, ferulæ adhibeantur ad latera vulneris, donec id consolidetur. Si autem, vulnere ad cicatricem perducto, fractura nondum fuerit confirmata, ferulæ undique erunt apponendæ, ut in fractura simplici.

Verum enimvero si ossium fragmenta, quamquam a suo toto separata, periosseo tamen adhæreant & affixa sint, nullo modo sunt educenda, sed potius in suum locum, situmque naturalem apte reducenda, cum coalescere & conglutinari queant.

Attamen insignis ossis portio si sit abscessura, ideo, quod ossis fracti partes non potuerint cum aliis componi; tales partes vulnerata omnino leniter tractandæ sunt. Enimvero propter motum & compressionem dolores accidunt vehementes, pungentibus ossis distracti particulis non rite compositis partes vicinas.

Si vero non statim, sed demum postea, os abscessurum appareat, Deligatio hæc (ut membrum quotidie deligari & solvi cum odore queat, absque eo quod fractura moveatur) nunc utetur in Asciam fasciationem, donec os abscederit. Osse autem abscesso, ac in conspectum detruso, vulnus consolidandum. Quo ad cicatricem perducto, membrum in quiete conservandum, donec fractura confirmetur, appositis undique ferulis.

IV. Cæterum in fractura cum Vulnere si os periosseo suo denudatum appareat, videndum, utrum extra vulnus emineat, nec ne. Extra vulnus si non emineat, Curatur moderata membri Extensione, convenienti Coaptatione, Labiorum Vulneris ad naturam contactum Adductione, apta Deligatione, & congrua Depositione. In Deligatione tamen denudatum os cute, musculisque quamprimum coeperiendum, sicque ab aere externo, quantum fieri possit, defendendum, ne alteretur, & postea abscedere necesse sit: hinc considerandum, an aliqua ossis portio sit recessura, vel nulla? nulla abscedet, si os nudatum statim cutis operculo fuerit resectum: aliqua recedet, si os diutius aëri fuerit expositum; quamquam & hæc regula non ita universalis, quin sæpius observatum sit, ossa propter causas tum externas tum internas denudata, non fuisse alterata, nec squamam abiecit, uti variis exemplis ostendit Fabricius Hildanus cent. 4. obs. 9, & 96.

Si igitur nullum aut parvum os abscessurum sit, Deligatio peragenda, velut in fractura cum vulnere simplici, & in qua parvi ossis expectatur separatio: si magnum sit abscessurum, Ascia-

Asiali Deligatione pars vincienda, uti infra-
sura cum osse magno abscessuro.

At vero os fractum, nudatumque si extra vul-
nus emineat, perpendendum, an in propriam ca-
vitatem, beneficio debite extensionis, citra vio-
lentiam & convulsionis periculum, restitui pos-
sit, nec ne: si possit, restituitur; sin minus, non
restituatur. Periculosam restitutionem indicant,
prominentia magna, inflammatio, & pars ob
musculorum contractionem dura: faciem vero,
os eminens parvum, absentia inflammationis, &
partis molities.

Cum igitur os eminens citra violentiam &
periculum convulsionis reponi possit, primo
membrum moderate exteendatur, deinde fra-
ctura componatur. Quod si ossa extensione dif-
ficulter coaptari queant, ob timorem magni do-
loris, & periculose convulsionis, validior ne fiat
extensio, sed vecte seu scalpro quodam incisore
inter ossa fracta immisso (vid. scultet. tab. 27. fig.
9.) extensio juvetur, donec ossa e directo collo-
cata videantur: deinde paulatim extensio rela-
xetur, & vectis extrahatur. Verum enim vero si
os, cui innititur vectis in superiore parte, multa
fragmenta, vel aliquod acutum habeat ossicu-
lum, ut vecti non detur commodus locus, illa
scalpro rasorio. uterenda, hoc autem forfice præ-
cedendum, ut vecti tuta comparetur sedes. Os-
seposito, considerandum, an fragmentum ali-
quod abscessurum sit, nec ne? si nihil sit recessu-
rum, pars affecta (vulnere apposito conveniente
digestivo) deligetur, ut fractura cum vulnere
simplici; sin vero aliquid recessurum, deligatio
inutuetur, ut in fractura cum magni ossis sepa-
ratione.

V. Quod si eminentia denudati ossis ita foras
protuberet, ut sine violentia in locum suum re-
reponi nequeat, tunc è duobus malis minus eli-
gendum, osque eminens & nudum forfice præci-
piendum, vel potius subtili serra amputandum,
& postea fractura per modicam extensionem
coaptanda: hoc enim melius est quam huiusmo-
di ossa non coaptata relinquere, vel extensione
violenta ægrum in periculosam præcipitare
convulsionem, & ad mortem deducere. Fractura
coaptata, membrum deligetur, ut in fractura
cum vulnere simplici, ita tamen, ut vulnus quo-
tidie sine cruris commotione inspicere possit: at-
que hinc suadet Scultetus, ut fasciis & emplastris
foramen supra vulnus incidatur, ad medicamen-
ta vulnere magno quotidie applicanda. Ratio-
nem porro fasciarum perforationis addit: „
„ quia vulnus magnum, & ideo per secundam
„ intensionem curandum, copiosam generat sa-
„ niem, indeque crebram requirit inspectionem
„ os autem comminutum, ob metum novæ mus-
„ culorum contractionis, frequentationem mem-
„ bri elevationem, fasciarumque resolutionem
„ prohibet, unde media via, ut vulnere & frac-
„ tura satisfiat, incedendum.

Verum tamen cum eminens os resecatur, ita ut
os brevius fiat, multi ægro prædicendum volunt
partes fractas futuras esse breviores: quæ prædi-
ctio ex Hippocrate & Galeno vera est, quando
femur vel humerus fractus particulam assis ami-
serit; sed cum tibia vel cubito portio quædam
abscindatur, brevitatis membri semper timenda
non est: os enim sanum conservat membrum
sistentum, donec natura defectum abscissa

portionis callo compensaverit. Cujus rei me-
morabile in nobili viro vidimus exemplum. Is
e curru, equis in tutorem incitatus penitus dis-
fracto decidens, tibiam cum fibula circiter in
medio disrexit, tanta cum violentia, ut supe-
rior tibia pars, cutem ad duorum digitorum la-
titudinem perforaret, atque omni periosseo pri-
varetur: vocatus cum Cornelio van Beest Medi-
cinæ Doctore, & Chirurgis Herbetto à Rave-
s-vay, N. du Pré, suavisimè unanimiter eminentis
istius ossis, periosseo penitus denudato, ablatio-
nem: dictum factum, & altero die os illud sub-
tili serra amputavimus, crus ad pristinam lon-
gitudinem extendimus, & in molli pulvinari æ-
qualiter deposuimus, vulnus quotidie inspicien-
do; atque sic ex utroque ossis nunc paulatim suc-
crescens callus tandem coivit, sensimque in os-
seam duritiem firmatus est, ita ut crus pristinam
longitudinem retinuerit, & ubi ablatum sit,
nunc videri vix possit. Haud absimilem histo-
riam recenset Cl. Diemerbroekius Anatom. lib. 9.
cap. 1. nec non Scultetus Arment. Chirurg. tab.
28. ex quibus insuper patet, ægrum e duplici
fractura cum vulnere & deperditione ossis, re-
stitutum nonnquam non claudicare. Imo
femur licet, vel humerus fractus particulam os-
sis admiserit, non tamen semper sequitur, par-
tem illam futuram fore breviorē: ita videtur
observasse Doctissimus Lindanus, qui Physiologi-
cap. 16. artic. 21. hæc habet: „ memoria dignum
„ est, quod meus pater vidit Enchusæ. Puero
„ comminutum est os femoris: frangens arte
& natura sequestratis, medio osse ex os spatium
„ erat quatuor pollicum. Id visum est ex reliquis
„ partibus ossis sensim adactis & tandem co-
„ untibus ita impleri, ut dicere non licet, ubi
„ abfuisset, aut quod incommodum haberet ex
fractura.

De Fracturis in specie.

I. Igitur de fracturis in genere cum satis nunc
dictum sit, cumque ossa quæ franguntur varia
sint, & secundum ossium fracturam varietatem
curatio nonnihil variet, haud abs re erit, de iis
in specie quædam superaddere; saltem propo-
nendo differentias, quæ à subjecto, & ossium
fracturam diversitate sumuntur. Et quia frequen-
tissime franguntur humerus, brachium, manus,
femur, crus, patella, ossa pedis, de iis primo
dicemus; postea & reliquorum ossium fra-
cturas subjungemus.

II. Enimvero Humerus, cum externis Inju-
riis expositus sit, sæpius frangi solet. Appella-
tur autem humeri os id, quod inter cubitum &
summum humerum interjacet, & superiore ejus
capite cum scapula committitur, inferiore ve-
ro ulnæ & radio articulatur.

Cognoscitur ossis hujus fractura non solum
ex partis dolore & actione læsa, cum cubitus
amplius sustineri & elevari nequeat, sed etiam
tactu, cum, si pars hæc præmatur, osium frago
ac strepitus audiatur, & inequalitas persentia-
tur.

Humeri os, ut Hippocrates lib. de fracturis,
§. 9. Paulus Aegineta lib. 6. cap. 100. & Celsus lib.
8. cap. 7. inquiunt, quadraginta diebus coalescit.
Cum autem sit glandius, longiore tempore ad
callum generandum opus habet.

Fractum vero os humeri ut restituatur, bra-

chium incurvetur, sic ut incumbat pectori, mox humerus circa articulationem inferiorem comprehendens deorsum ducatur: facta hac extensione, ossa convenienter manuum opera componantur; quod haud ita difficile fieri potest. Sedulo tamen hic curandum, ut semper in hoc uti servetur, ne iterum, quod levis mutatio efficere valet, eo excidat. Chirurgus interim, post secundam præter propter deligationem, quavis vice brachium in rectum prudenter extendat, ne tendines ab humero ad cubitum excurrentes diuturna ea quiete contrahantur, sicque rigiditas accidat brachio. Si vero hæc tendinum contractura relinquatur, haud difficile est eam curare, si quotidie ingens pondus gettet æger, Chirurgus autem rigidum membrum frequenter illuat Unguento Emolliente relaxante.

Hippocrates lib. de fracturis §. 8. alium proponit modum, quo humeri os fractum extendi & componi debeat, de quo inspicitur Sculteri armamentarium Chirurgicum tab. 23. hg. 1. Vult enim sapientissimus senex, ut rotundum lignum cubiti longitudinis, vel paulo brevius ab utroque capite habenulis aligetur, quæ trahi, vel alicui sublimi adhæreant, sicque æqualiter ac firmiter lignum suspendatur, ne sursum vel deorsum ferri possit: Deinde æger brachium super dictum lignum imponat, id est, ut transversum lignum alæ subiciatur; tum petiens sedeat ita sublimis, ut parum ablit, quin suspendatur: interitum aliquod aliud paratur, cui brachium inhæreat, pulvinari uno vel pluribus brachio, suppositis, ita ut ad eam altitudinem perveniat, ut cubitus ad rectum angulum collocetur, vel à ministerio ita detineatur. Deinde cubito valida, mollis, & lata habena circumdetur, cui magnum pondus appendatur, quod extendere convenienter possit; aut robustus aliquis partem inferiorem, cubito cum humero ad rectum angulum figurato, cogat, ac trahat. His factis, Chirurgus itans, altero pede super re quapiam sublimiori collocato, prominentioribus palmarum partibus fractum os componere debet. Alii autem scalarum gradu suspensi ligni vice utuntur.

At vero manibus non raro fieri potest hæc extensio, præsertim in pueris: resupinato enim ægro ante, ne molestia aliqua afficiatur, & alligata ac suspensa ipsius manu ex cervice, ita ut angulosa figura sevetur, alter ex ministris ambabus manibus humeri superius caput apprehendo, alter inferius in diversa extendendo. Quod si manuum opera expediri non possit in adultioribus, ob musculorum crassitiem & robur, laqueis extensio fiat, quorum alterum supra, alterum infra fracturam brachio circumligare debemus, itaque duobus ministris (quorum alter ad caput, alter ad pedes ægrotantis consistat) ut in diversa æqualiter & simul extendant, præbeantur.

Facta quovis modo extensione, ossibusque convenienter compositis, fasciæ injiciendæ, incipiendo à fractura, attendendumque ut semper in ea figura ligetur membrum, in qua manere debet, id est, ut cubitus cum humero rectum angulum constituat. Cætera porro agantur, ut in generali fracturarum curatione superius diximus.

III. Brachium propriè dicitur illa pars, quæ est à cubito ad carpum. Constat duobus ossibus, quorum alterum radius, alterum ulna

dicitur. Atque frangitur nunc utrumque, nunc alterutrum tantum.

Fractura brachii, ubi unum saltem os fractum est, facilius curatur; at utrumque si fractum sit, pessima est, & difficilior curatur: majore namque extensione tunc opus est, cum ossa fracta nullum tulerum & sustentaculum habeant atque adeo musculorum fibræ, ossis robore penitus delituit, naturalem suam determinationem omnino sequantur, & in se contrahantur. Ut plurimum tamen brachii ossa intra triginta præter propter dies coalescunt, quam ætas ab ætate, natura à natura differat. Veruntamen si alterum saltem brachii os fractum sit, facilius est curatio, cum subjectum habeat alterum, in quo plus opis est, quam in fasciis, ferulisque. Et si radius tantum frangatur, faciliorem admittit curationem; si ulna, difficilior curatur.

In Curanda brachii fractura haud secus procedendum, ac in aliarum partium fracturis curandis. Ad extensionem vero nanote vi opus est, ubi radius fractus fuerit; majore, ubi cubitus seu ulna; maxima, ubi utrumque os. Et quidem si ambo ossa sint fracta, æquas extensio faciendæ: si alterutrum solummodo fractum sit, ea in parte, ubi fractura est, fortior extensio intuitenda. Atque hæc actio ex sententia Pauli Æginetæ lib. 6. cap. 101. fieri debet inflexa manu ad angulum rectum, sic ut pollex omnium digitorum altissimus, contra minimus digitus omnium infimus habeatur. Fieri autem potest extensio manibus, à duobus ministris in diversa extendentibus; & si vehementiore extensione opus est, utrisque præsertim ostibus fractis, & in valde carnoso, Habenæ faciendæ, alligando unam supra fracturam, alteram infra. Extensione facta, ad motis prominentibus palmarum partibus os fractum dirigendum & componendum, atque in pristinam sedem restituendæ si quæ ossium adsint eminentiæ. Osse fracto reposito, fractura fasciis circumdanda, & alia, quæ in genere de fracturæ curatione dicta sunt, peragenda; tandemque brachium recte collocandum ac situandum: quod fit, si incurvatum imponatur pectori, sic ut manus paulo altiore occupet locum, quam brachium ipsum, nec non mitella comit odissime excipiat e cervice suspensum in ea figura, hoc est, quæ rectum angulum referat in cubiti curvatura, ut conjuncta ossa nullo modo dimoveantur. Post hæc singulo biduo aut triduo leniter brachium extendatur, quo affluentes humores non nimis diu in articulis detineantur, adeoque non efficiant harum partium coalitum & hinc membri rigiditatem. Similiter si superius ulnæ tuberculum, olecranon dictum in ipsa cubiti flexura fractum sit, qualibet vice, inter deligendum, leniter brachium extendatur, & iterum cubitus incurvetur, ne in ipso articulo, viz inter ejus tendines & ligamenta, callosa conerescens substantia juncturæ difficilem motum vel omnimodam rigiditatem relinquat.

IV. Manus ossa sunt octo carpi, quatuor metacarpi seu palmæ manus, & quindecim digitorum. Hæc ossa, Digitorum viz. & præsertim metacarpi, fracturam nonnunquam patiuntur; at vero carpi ossa conduntur magis, quam franguntur.

Cognoscitur autem fractura in hisce ossibus facile, visu & tactu; cum hæc ossa fracta vel ad exteriora, vel ad interiora ut plurimum declinent. Non difficile tamen, & quidem intra viginti præter propter dies, perfecte coalescunt, & sanantur.

Quando ergo quoddam manus os frangitur, patiens lafam manum super æqualem & lævem tabulam deponat. Deinde minister ossa fracta extendat: Chirurgus vero manu in suam sedem ea restituat; hinc conveniente fascia partem obvolvatur. Et quidem si digiti fracti sint, excepto pollice, vicinis sanis alligandi, ut ab iis in suo loco, quasi à ferula apposita, contineantur. Tandem glomo ex linteo convoluto manus vola complenda, ut hoc modo ossa composita facilius contineantur, & digiti in media figura conserventur. Manus quoque cum brachio à collo idonea fascia suspendatur, ac in quiete detineatur, quousque fracta ossa consolidentur; deintertio vel quarto quoque die vincula solvenda, & pars multa aqua calida fovenda ac perfundenda, cum dixerit Hippocrates lib. de fracturis, „ In omnibus autem, qui juxta articulos sunt, affectibus, liberaliter calida aqua perfundenda est, deinde medicamenta applicanda, & rursus pars deligenda. Et sane multum hoc modo præcavebitur, ne digitis vel extensis vel contractis callus tam facile generetur, adeoque ne manus officium in comprehendendo lædatur. Hipp. lib. 6. Epidem. nautæ cujusdam historiam refert, cui ob fracturam medi digiti, exortæ inflammationi gangræna successit, tandemque ipsa episthotono corruptus interiit.

V. Femoris os, licet cæterorum ossium, quæ in corpore humano sunt, maximum, crassissimum, & longissimum si, nonnunquam tamen frangitur, vel in medio, vel in extremis, locisque vicinis.

De femoris fractura Hippocrates lib. de fracturis, ex edit. Lindanis, §. 13. ita scribit: „ at vero si femoris os fractum fuerit, extensio, nem præ omnibus facere oportet, ita ut ne defectuosius fiat. Amplior enim facta nihil læserit. Neque enim si quis distantia ex vehementia extensionis ossa deligaverit, fieri poterit, ut deligatio ipsa teneat, ut ita distent: sed coeunt inter se ossa quam citissime, ubi intendentes ipsa remiserunt. Crassissima enim ac fortissime quum sint hac parte carnes, deligationem superabunt, non ab ipsa superabuntur. Hoc confirmare videtur C. Celsus, dum lib. 8. c. 10. id scriptum relinquit, si femur fractum est, fieri brevius oportet; quia nunquam in antiquam sedem revertitur, summisque digitis postea ejus cruris insistit. Sed multa tamen femori debilitas est, ubi fortunæ negligentia quoque accessit. Et Avicenna lib. 4. Gen. §. tradit raram admodum esse femoris fracti integram curationem. Quibus verbis nos monent, ut integram femoris fracti curationem nunquam pronuntiamus, sed omnem potius diligentiam adhiberi claudicationem dubiam prædicamus, ne ex fracturæ natura, aut ex Agrorum impatiencia superveniens, nostro adscribi errori, & præmii loco famam minuire possit. Scribit quoque Fabricius Hildanus cent. 5. obs. 86. se neminem unquam vidisse, qui ex hujusmodi fractura sine claudicatione evaserit, præter unicam puellam, cui novam & peculiarem curandi ra-

tionem adhibuit, quæ ibidem videri potest. Id autem præcipue accidit, si femur in loco superiore juxta coxam frangatur. Sui vero generis, aut in medio femoris os frangatur, & diligens cura adhibeatur, non adeo diducitur, & sine claudicatione fractura sanari potest.

Ubi igitur femoris os fractum est, valenter omnino extendi debet, & recto transire, ita ut in neutram partem convertatur: violenta extensio convenit, quoniam maximi sunt musculi, qui femur circumdant, & magnam verius suum principium contractionem faciunt.

Resupinato ergo Agrotante, & extensis cruribus, valida Extensio fieri debet, vel manibus, vel habenis, ut videre est apud Scultetum Arnam. Chirurg. tab. 26. fig. 1. vel Instrum. entis sive machinamentis, gloriocono puta, vel trochlea trajecto fune, qualem depingit Fabricius Hildanus cent. 5. obs. 86. nec non scultetus tab. 21. fig. 1. Extensione sufficiente facta, musculi, utpote validissimi, facile fracti ossis partem anteriorem ad superiora adducunt. Id tamen ut rite & decenter fiat, prominentibus palmarum partibus, ut in aliis fracturis, os dirigatur & comprimatur, adeoque ossis fracti caput eo prentur. Interim meminerit Chirurgus, si quando operi se accingat, tenet ut anteriore & posteriore parte gibbum esse, anteriore & posteriore curvum, ut ad eam figuram femur educat, ne imperveniat, claudicatio. Hipp. de fract. §. 24.

Reductum femur apta & conveniente ligatura deligetur, qualis est fascia asciahs, quæ simul & in orbem circa coxam & alia, ut inguina etiam, & quod inter anum & genitale est, involvatur; cum ob alias causas, tum ne exterius ferula nudam partem offendant.

Insuper fractum femur conveniente fascia obligatum longo canali, qui poplitem excedit, imponatur. Nam si canalis femori adaptetur, qui poplitem non excedit, is noxam potius, quam opem adiit: prohiberi enim non poterit, quin corpore aut crure moto fumus quoque moveatur. Popliti etiam molestus erit, & genu curvavi permittet: si vero quis genu quodammodo flectat, femoris quoque vincula moveri necesse est, & musculos alio modo figurari. adeoque & ossa fracta dimoveri. Ideoque utilissimum videatur, femur in canalem conjici, qui à coxa ad pedem usque pertingat; & præcipue, si ad poplitem cum canali fascia laxa circumficiatur, velut infantes in cunis fasciari solent. Enimvero ubi femur in partem anteriorem, aut ad latus distorquebitur, ita cum canali melius continebitur. Canalis igitur à summo ad mium usque, aut nullus adhibendus.

Cæterum inno calci magna habenda cura, ut tum in femoris, tum in tibiæ fracturis apte collocetur: etenim si pes dependeat, tibia reliqua obfirmata, ossa in anteriore cruris parte gibba apparere necesse est, idque eo magis, si hominis calx suapte natura grandior fuerit. Hipp. lib. de Fracturis §. 16.

Sed distortio femoris præcavebitur, si membrum in ante, & post deligationem instructum Gloflocomo (vide Scultetum Arnam. Chir. tab. 21. fig. 4.) conservetur ex tentum, usque ad perticam fracturæ confirmationem. Ne autem instrumentum hoc partem sua duritie atterendo lædat, adeo aliquid molle subjiciendum, uti est lana capta, mollis stupa, vel simile.

VI. Patella etiam interdum frangitur, & quidem nunc secundum longitudinem, respectu totius femoris, nunc in transversum, nunc in obliquum; & nunc in duas, nunc in plures partes comminuitur; insuper nunc cum vulnere, nunc sine vulnere.

Hujus autem ossis fractura facile innotescit ex tactu, cum partes divisæ perſentiantur, cavitas appareat, & crepitus in contrectatione audiatur, nec non omnimoda adsit incedendi impotentia.

Patella equidem, ut alia ossa rara, facile coalescit, modo recte jungatur, & conjuncta servetur. Et si secundum longitudinem facta sit fractura, sine manuum opera, sola musculorum tibiæ extendentium contractione, ossa conjunguntur, & conjuncta pulvis, splenis, fasciisque non difficulter in suo loco retinentur, ac ununtur viginti circiter dierum spatio; atque ita nulla calli extuberantia, & hanc subsequens claudicatio, facile metuenda. Ambrosius Parvus tamen Chirug. lib. 14. cap. 22. neminem sibi visum fuisse scribit, cui os hoc fractum esset, qui non per vitæ reliquum claudicaverit: idque ideo, quod facta calli concretionem consolidatio liberam genu flexionem impediatur. Verum etsi hæc de transversa fractura facile concedi possint: tamen recte statuit Fabricius Hildanus Cent. 5. & observ. 88. non semper, præcipue in fractura patellæ secundum longitudinem facta, id esse necessarium; cum non semper callus ita protuberans nascatur, ut motus impedimentum in genu, & claudicationem afferat videamurque in aliorum ossium fracturis; naturam tam eleganter callum generare, ut sæpe vix fracturæ appareat vestigium; quod in primis accedit, ubi peritonæum integrum est, quod materiam calli retinet, ne nimis excreſcere, & protuberare queat.

Si verò fractura transversim vel oblique facta sit, difficulter admodum curari potest, ut incedendi impotentia, vel item claudicatio non relinquatur. Enimvero cum musculus tibiæ extendentes sursum versus, & pedem moventes deorsum trahant patellam, ossa fractæ patellæ ita disjunguntur, ut haud facile congiungi, aut conjuncta retineri queant, unde callus extuberat, qui cavitatem inter femur & tibiæ os adeo adimplet, ut articuli illius motus impeditur. Nihilominus symptoma hoc prudens Chirurgus non raro prohibere solet, si quolibet vice, inter deligandum, fractam patellam digitis (ne fragmenta composita denuo dimoveantur) firmiter apprehendat, & undique loco prudenter moveat.

Itaque in hujus ossis restauratione, crus primo extendendum est; dein à Chirurgo Patella seu in duas, seu in plures partes fracta conjungenda, & secundum naturalem figuram æquanda nec non conveniente ligatura continenda. Torulis verò impositis stramineis, ut in fractura cruris fieri solet, membrum immobile tenendum, & omnino cavendum, ne crus flectatur. Hoc enim si heret, fragmenta composita suo loco iterum dimoverentur; quem in finem popliteæ cavitatis rotundis splenis ex æte implenda, ut genui curvatura impediatur. Religiosè interim observet Chirurgus, ut inter deligandum fractam patellam prudenter ultrò citroque mo-

veat, ne inter tendines & ligamenta, quibus continetur patella, callus concreſcat; hinc & articuli illius motus difficilis, vel omnimodo rigiditas, atque adeo incedendi fere impotentia, aut saltem claudicatio relinquatur.

VII. Crus illa pars appellatur, quæ à Genu ad pedem extenditur. Contat duobus ossibus. quorum quod crassius est, & internam cruris regionem occupat Tibia; quod tenuius & exterius, Fibula nominatur. Franguntur hæc ossa interdum ambo simul, interdum unum tantum; & fractura accidit vel in medio, vel in superiore, aut inferiore parte.

Si utrumque os fractum sit, facillimè id cognoscitur; cum totum crus infecti possit. Nec difficulter cognoscitur Tibiæ fractura, si ea tota fracta sit; quoniam totum hoc os in conspectum, utpote in loco excarni, facile venit. Si vero Fibula sola frangatur, id non ita facile cognoscitur; quoniam multa carne regitur: fracta tamen pars ad interiora inclinare solet.

Si ex ossibus hæc alterum fuerit fractum, facilius curatio est: præsertim si Fibula tantum sit fracta, curatur facilius, & Ager citius pedi insilire potest; cum facilius crus extenditur, & tibiæ maximam oneris corporis partem sustinet. Tibia vero si fracta sit, curatur difficilior, quia crassior, & vice fundamenti totum corpus insilient; hinc & majore extinctione opus est, & homo tardius incedere audet. At utraque ossa si fracta sint, difficilis admodum est curatio, tum quia validior requiritur extensio, tum quia omni ulcro destituta est pars affecta.

Sive ergo utrumque, sive unum os frangatur, crus, quantum opus est, extendendum, ut sine læsione ossa suo loco restitui & congiungi queant. Quod plerumque duo viri robusti (si alter in partem inferiorem, alter in superiorem crus trahat) manibus præstare possunt. Quod si id exsequi nequeant, Habenis vel Machinamenti utendum. Et ubi satis extensum crus fuerit, ossa fracta reponenda. Deinde Fasciis crus involvendum; quæ & latiores & longiores esse debent, quam in brachio. & omnino ita situandum ac componendum, ne in ullam partem perverti possit, neque ossa fracta depravari queant. Tandem crus rectum & extensum super pulvinari, aut re molli & plana collocandum, & Ferulæ, ac Canales adhibendi, ut cap. 2. de generali fracturarum curatione diximus. Quæ in re observandum, ne super eminentes ossium extremitates applicentur, vel super magnum musculorum Gastrocnemii ac Solei tendinem, qui calcaneo inseritur. Hæ namque partes, cum sensum habeant exquisitum, compressionem non ferunt, sed compressæ dolent, ac inflammantur. De situ autem tibiæ fractæ hæc habet Fabricius Hildanus cent. 1. observ. 93. „ In fracturis tibiæ curandis, nonnulli Chirurgi non levem committunt errorem, quum „ volunt tibiæ erectam insistere talo, ex qua „ situatione hæc sequuntur incommoda. Primum „ quidem sit, ut Ager temporis progressu majorem „ dolorem patiat in talo, quam in ipsa „ fractura, idque propter tendines magnos & „ nervos, qui talo inseruntur. Dolor autem „ ille multos ad se trahit humores, qui in ipsa „ junctura, & spatiis inter ossa pedis fracta, atque „ ligamenta retinentur. Et quia ex hac si-

tuatione

„ tuatione venæ & arteriæ comprimuntur, &
 „ proinde pars affecta suo calore quodammo-
 „ do destituitur, necessario condensantur &
 „ refrigerantur hi humores in ipsa junctura, &
 „ spatiis inter ossa pedis. Inde curatâ fracturâ,
 „ pes novam adfert molestiam: ægre enim &
 „ difficulter movetur junctura, sequuntur &
 „ nonnunquam alia quam pessima symptomata.
 „ Id quod idem hildanus memorabili exemplo
 „ contrahat, quando subjungit: „ prospiciant
 „ igitur chirurgi, ne nimis curiose situationem
 „ hanc in fracturis tibiæ observent. Involuta
 „ autem tibiâ fasciis, spleniis, & stupis, & in
 „ capsula idonea collocatâ; ea eligenda est
 „ situatio, quæ minime sit dolorosa. Itaque
 „ modo in hanc, modo in alteram partem col-
 „ locanda est tibiâ, ut æger nunc in hoc, nunc
 „ in illud latus decumbere possit: sic enim mul-
 „ ta accidentia evitabuntur. Hæc ille.

VII. Hominis Pes, sicuti manus, ex mul-
 tis minutisque, nec non duris constat ossibus,
 magnitudine & figurâ diversis. Sunt autem ea,
 septem tarsi ossa, quinque metatarsi, quatuor-
 decim digitorum. Ossia vero pedis & manus non
 frangi scribit Hippocrates lib. de fracturis. §. 10.
 nisi acutâ vel gravi quapiam re carnosæ partes
 vulnerentur. Sunt enim duriora: & quæ acuta
 sunt, & graviora, si ossa hæc frangant, cutem
 incumbentem salvam non relinquunt. Et Pau-
 lus Aegineta lib. 6. cap. 106. scribit, salum nullo
 modo frangi, non tantum ob duritiem, sed
 quia undequaque ab ossibus eminentibus est mu-
 nitus. Similiter Albucasis lib. 3. cap. 18. inquit;
 ossi calcis nullo modo accidere fracturam, aliis
 vero pedis ossibus fracturam accidere posse, ac
 etiam ossibus digitorum; sed raro hoc evenit,
 potiusque hæc ossa atteruntur, quam fran-
 guntur.

Si autem pedis ossa frangantur, visu & tactu
 idprehenditur; cum hæ partes excarnes sint.

Horum ossium fractura per se periculosa non
 est; sed quia non nisi à valida admodum & vio-
 lenta causâ franguntur, partes incumbentes,
 & vicinæ carnosæ ac tendinosæ simul contun-
 duntur & vulnerantur, unde dolores gravissimi,
 inflammationes, aliaque superveniunt acciden-
 tia. Diebus tamen præter viginti conservent &
 coalescunt; nisi quæ cruri vicina sunt. Ea
 enim cum sint majora, longius tempus re-
 quirunt.

Curatio fere eadem est, quæ ossium manus
 fractorum. Commoda nimirum facienda exten-
 sio, & ossa, sive in superiorem sive inferiorem
 partem emineant, in naturalem sedem compen-
 denda: quod commodius sit, si æger pede fra-
 cto tabulæ planæ panno obductæ insistat. Dein-
 de fasciis pes involvendus. Et cum pedi feru-
 le ob loci inæqualitatem commode adnoveri
 non possint, splenia oxycrato, vel vino rubro
 adstringente madida loco affecto imponenda,
 fasciisque locus vincendus, ut ossa composita
 in sua sede contineantur. Situatio tamen & col-
 locatio aliter hic instituenda, quam in manu.
 Enimvero cum manus data sint ad apprehensio-
 nem, curva figura digiti collocandi sunt. Ides
 vero cum ad ambulandum & standum dati,
 recta figura situandi, non curva, ne eorum actio
 depravetur.

IX. Imper & alia nonnunquam franguntur

ossa, inter quæ nasi primo loco occurrunt. Con-
 stat autem nasus ex ossibus & cartilaginibus:
 ossa ejus proprie franguntur; cartilagine con-
 tunduntur, deprimuntur, distorquentur.

Fracta vero hæc ossa ex signis manifestis in-
 notescunt, quoniam si adversa fracta sint, nares
 desidunt, & sinus nasus apparet, difficulterque
 spiritus trahitur: si à latere os sit fractum, is lo-
 cus carus apparet: Sin cartilagine contusa
 sint, earum distorsio, & in alteram partem in-
 clinatio adest.

Commodissime ex sententia Hippocratis lib.
 de articulis, ex edit. Lindan. §. 3. restituitur
 nasus fractus eodem die, vel certe paulo post,
 nec differenda curatio, quia in naribus callus
 cito generatur, intra decem dies, nisi corrumpatur.
 Subjungit tandem sapientissimus Senex:
 „ Nasus ex omnibus corporis partibus facilli-
 „ me componitur, & nisi protinus dirigatur,
 „ dirigi postea non potest, sed pervertitur.

Itaque si nasus fractus in inferiorem partem
 æqualiter dimittatur, simulque reddatur, quam-
 primum quicquid in cartilaginem incidit, leni-
 ter excitandum ac sublevandum, ut sublatum
 postea decenter coalescat; viz. in nares aliquid
 intromittatur, quod dirigat, ut specillum ad
 digiti formam febricatum, ex buxo, vel ebore,
 vel ferro: aut quod fractum est, eleveur digito
 in nares immisso, atque in naturalem sedem
 restituatur. Extrinsecus etiam ab utraque parte
 nasus apprehendatur, ac sursum ducatur. Ubi
 autem probe conformatus fuerit nasus, ut natu-
 ralem figuram conservet, longa linamenta con-
 torta in nares immittenda sunt, quæ narium ca-
 vitatem implent, vel perforata cannula, aut
 penna introducatur, superimposito externis
 Emplastro defensivo, vel simili.

Si vero in uno tantum latere nasus fractus sit,
 dirigere etiam convenienter ab ea parte, quæ
 declinat, & in naturalem sedem restituere oportet,
 cum Digitum vel instrumentum commodum
 in nasum, qua parte læsus est, immitten-
 do, tum extrinsecus dirigendo. Et ne quod com-
 positum est, iterum depravetur, in singulas
 nares (ut crassius in nares læsam) Linamen-
 tum, vel penna anserina grandior molli pellicu-
 la obducta, vel fistula aut cannula e plumbo
 vel argento, itidem pellicula obducta, immittatur,
 ac tam diu intus relinquantur, donec os
 aut cartilago satis roboretur. Neque multum
 refert, quid immittatur, modo præter, ne fra-
 ctum nasi os subsideat, & molle sit, odorif-
 que gravis expers. Monet tamen Hippocrates,
 nullo pacto spongiam esse immittendam, quo-
 niam humorem imbibit, atque sic turgendo,
 partem distendit, cunctaque dissolvit. Etiam
 deligationem improbat, quam C. Celsus pro-
 ponit, quia magis nocet quam confert, cum
 similitatem, & majorem amplioremque distorsio-
 nem adferat. At de necessitate ligaturæ in na-
 rium fractura curanda disputat Galenus de caulia-
 co in sua chirurgia, qui videri potest.

Si juxta cartilaginem nasus tractus sit, & in
 obliquum distortus, post congruam conforma-
 tionem, habenula digiti lata, glutine aliquo
 illita, naso ex parte, in quam inclinat, agglu-
 tinanda; postea intendenda, quantum expe-
 dit, ut nasus recte dirigatur. Longa autem sit hæc
 habenula, ut circa aurem obducta circum caput
 obdu-

obducatur. Hæc iuste dirigit nasum, & remitti ac mendi potest. Et si ista nates impositæ tandem dolorem excitent, tollendæ, & tandem nates habena ductæ servandæ. Post quartum de numerum dieni habena denendæ, & empositæ, quod Catagmaticum imponendum.

Si fractura ossis maxillæ fuerint contracta, quantum necesse, singula in suam sedem reponenda, vel forceis instrumentis compellenda, neque facile, & ni in nullo modo agglutinari possit os, aliquod eximendum, cum semper deformitate pariat. Postea ceratum vel emplastrum ad ossa conservanda imponenda sunt. Plura de narum fractura videntur, apud Hippocratem lib. de Articulis, articuli. 32. 33. 34.

X. Interdum & interior maxilla frangitur, vel transversim, vel in plurima fragmenta, ossibus semper inter se aliquo ex parte contentis, raro penitus disjunctis, & dissolutis, ut in aliis.

Interea autem fracta maxilla cognoscitur, quoniam in tam extrinsecus ossa fracta sunt, & tunc apparet, & in interiore os parte aliqua gibbentis digito percipitur. Si vero transversim fracta fuerit, introitum manifesta cavitas sit, & in anteriore oris parte fere dens super proximam dentem, excedit.

Maxillæ ossa, in primis diebus inflammatio non accedit, intra viginti præter propter dies consolidantur, & dentes integri remanent. Si vero curatio minus protrahatur, dentes vitiantur, & molares redduntur, auctore Hippocrate lib. de articulis articuli. 29.

Si igitur maxilla ita per transversum fracta sit, ut ossa inter se aliqua ex parte equidem cohererent, digitis utrinque, tam ori inniatis, quam extra applicatis, os comprimere & in suam sedem compellere oportet: interius namque tuberculum foras propellendum, & altera manu ossa inæqualia complananda. Maxillam vero in suam sedem esse restitutam, ex ejusdem, nec non dentium æqualitate apparet.

Si vero maxilla toti transversim fracta sit, quod ita non raro accidit, sic ut os super os emineat, & dens super proximum dentem excedat, digitis ori inniatis, & extra manu adhibitis, ossa fracta componenda: & nisi simplici compressione id fieri possit, primum extensio, ministro retro continente & chirurgus ante extendente, fieri debet, hinc & ossa inter se componenda. Deinde dentes qui sunt ad fracturam, non tantum bini, verum & plures inter se colligandi, donec ossa ferruminata sint. Hipp. filio augetur: ubi defectu vel filum feritum, vel seta equina in impari poterit. Si maxilla in medio fracta fuerit, qua parte ambo colligantur ossa, ambabus manibus inter se coaptari & dirigi debet.

Ubi autem fracta ossa fuerint reposita, quod ex æqualitate dentium cognoscitur, ut suo loco conserventur, extrinsecus ferula, ex corio seu alia conveniente materia, maxillæ longitudini correspondens, apponenda, hinc convenientis Deligatur instituta; quæ fiat fascia duabus extremitatibus fissa, duos digitos lata, media quoque sui parte in longitudinem infissa, ut utrinque mentum complectatur. Cum ergo fasciæ in extremitatibus fissæ quatuor sint capita, duo inferiora ad summum caput deducantur,

ibi demque deligentur, vel pileolo nocturno assuantur; duo superiora transversim tractata ad inum occiput deligentur, vel eisdem pileolo assuantur.

Si talis fracturæ vulnus sit conjunctum, specillo explorandum, an minutum, & in plures partes distracta sint ossa; & si ossis fragmenta separata inveniuntur, illique contrahantur, nequeant, idoneo introitu, cito eximenda; neque vumeris orincium angustum sit, ampliandum: deinde vulneris labia ad mutuum contrarium adducenda, & appositis lineis empiasticis adducta conservanda, atque dicatum cruentis vulneribus Medicamentum superponendum, donec consolidentur. Interim ne decumbat æger in partem maxillæ tractam, sed in sanam; ac non hinc, sed capiti innixus, ne ossa composita iterum ditorqueantur. Maxilla quoque immobilis servetur; ideoque æger non multum loquatur, nec duriores cibos masticet, sed molniori us & liquidis nutriatur, donec callus obduret. Et si aliquid demum suo loco motum fuisse observetur, tertio præter propter die deligatio solvenda, & si quid exciderit in suum locum reponendum.

XI. Clavicula acromio & sterno articulata movetur; qua parte autem jungitur sterno manifestius agitur, obscurius & fere insensibiliter cum acromio, quia capulæ motum sequitur. Idcirco fracturæ claviculæ pars acromio juncta situm mutat, in anteriorem, vel posteriorem, vel inferiorem locum conversa, altera ejusdem parte semper immota.

Frangitur vero clavicula vel transversim, vel oblique, vel per longitudinem. Si per transversum id accidit, vel prope humeri articulum, vel magis versus articulationem cum sterno distringitur.

Cognoscitur ossis hujus fractura tacta potius, quam visu; ut & ex dolore.

Si per transversum frangatur clavicula, facilius curatur; difficilius autem, si per longitudinem. Nam quod transversim fractum est, facile extensione, & digitorum compressione in naturalem sedem revertitur: reliqua fractura semper quid eminentiæ habet, quod ægre coaptari potest. Perficitur tamen claviculæ fracturæ curatio quatuor & viginti circiter diebus.

igitur ut hæc Fractura curetur, ministri duo ad extensionem requiruntur, quorum unus utraque manu humerum, qui claviculæ fracturæ adjacet, ad posteriora, alter caput in latus oppositum ducat; interea chirurgus digitis id quod prominere propellendo, imo foras attrahendo, & quæ deorsum tendunt, sursum, & quæ sursum sunt, deorsum compellendo, fracturam componat. Aliqui autem, ut facilius fiat restitutio, Glomum Lineum alæ subijciunt, hinc brachium ad costas comprimunt, atque ita os suæ sedi restitunt. Si vero ossis fracti extremitates ita depressæ sint, ut sursum reduci hoc modo nequeant, æger resupinandus est in pulvinari duriori, spinæ inter scapulas subjecto; humeri interim manibus sic deprimentis, ut ossis fracti extrema depressa eleventur eoque, ut in naturalem sedem restitui possint.

Compositis fracturæ Claviculæ ossibus, Plagula tres convenientis crassitiei & longitudinis, ut cavitate, quæ supra & infra claviculam est, recipiant, parandæ, quarum duæ lateribus, tertia cras-

sior

prominenti fracturæ imponenda. Ita enim & os fractum eminens deprimeretur, & nec sursum, nec deorsum, nec ad latera è suis sedibus ossa fracta composita dimoveri poterunt. Hinc Deligatio instituenda; quæ fiat fascia palmum lata, delvita, longitudinis, duplex caput habente, decussatim injecta, quæ sæpius circumducenda, & obvolvenda, ut brachium ad posteriora deducat: Interim cavitas sub axilla lintaminibus convolutis replenda; sic namque facilius deligationem sustinet Patiens.

XII. Scapula etiam qualibet sui parte frangi potest, rarius tamen in processu illo, qui Acromium dicitur; sæpius juxta spinam, & in aliis extremitatibus. At si acromium frangatur, visu & tactu percipitur, præsertim si pars ægra cum sana comparetur: sin vero latior ejus pars, & in extremitatibus frangatur, tactu cavitas quædam deprehenditur, & punctior dolor in parte percipitur.

Fractura quæ in Summo Humero seu Acromio est, difficilius curatur, quam in aliis scapulæ partibus. At in cervice scapulæ, aut circa articulationem ejus cum humero, quæ est fractura, fere incurabilis est.

Si ergo os fractum Scapulæ adhuc cohzreat, manu Chirurgi in suum locum restituendum. Quod si non facile fiat, & majore vi opus sit, pila ex linteo sub axilla ponatur, & minister deorsum humerum trahat, cubitum ad costas adducendo, Chirurgus vero manu Fracturam comprimat & componat. Sin os fractum Scapulæ non cohzreat, modo ligamentis & periosteo quodammodo adhæreat, & pungendo admodum molestum non sit, etiam suo loco restituendum. At si penitus & ab osse, & à periosteo ac ligamentis separata sint fragmenta, sic ut carnes pungant, cute incisa, eximenda. Sin vere non pungant, relinquenda: natura namque, quod reliquis non cohzret, tandem sponte expellit, etsi interdum post longum tempus id fiat; sic refert Ambrosius Paræus lib. 14. cap. 9. cuidam Marchioni è scapula vulnerata ossium quædam fragmenta post annos septem, cicatrice referata, erupisse.

Ossibus rite compositis, Deligatio conveniens instituenda, sique summum Humeri fractum sit, Pila sub ala vincienda, & deligatio non frequenter solvenda: Æger interim in opposito latere cubet, & partem in quiete detineat.

XIII. Interdum costæ ex causis violentis quoque franguntur; casu viz. aut contusione. Et quidem fractæ Costæ interdum intro declinant; interdum extra eminent; interdum, etsi totæ franguntur, proprio loco non dimoventur; nonnunquam & caro circa costas colliditur.

Si costa & tota fracta, & extremitates loco motæ, quædam inæqualitas & cavitas tum visu, tum tactu deprehenditur, & strepitus auditur. Quibus accedunt & alia symptomata; adest viz. dolor gravis, pleuriticum dolorem æmulans, respiratio difficilis, tussis molesta, & non raro quoque sanguinis sputum, dum ex vasis ruptis effluentem sanguinem pulmo imbibit, nec non febris. Si tamen Costa quidem fracta sit, at fractæ extremitates neque intro cesserint, neque in exteriorem partem compellantur, pauci febriçant, aut sanguinem spuunt.

Costarum Fractura si simplex sit, absque par-

tium vicinarum gravi contusione, aut inflammatione, periculo vacat, & intra viginti quatuor dies non raro curatur. Sin vero caro circa costas atteratur, periculum malum est, & non raro lethale, teste Hippocrate lib. de Articulis. Etiam periculosa est fractura, si Costa intro compellatur, & pleuram pungat vel vulneret, tuncque eadem fere symptomata, quæ pleuriticis infestare solent, superveniunt, ac longius protrahitur curatio.

Si ergo Costa fracta sit, proprio tamen loco non dimota, nec incumbentium, vicinarumque partium contusio adlit, per se facile consolidatur. Sin extra promineat, manu comprimenda, & in propriam sedem reducenda, ac æquanda. Si intro vergat, Æger tussit, ac spiritus, ore clauso, retentione eam exterius compellat; Chirurgus vero Ægrotanti manibus, quantum fieri potest, succurrat. Quod si non succedat, nonnulli Emplastrum cuti valide adhærens censent imponendum, idque aliquoties cum impetu auferendum, donec in locum suum Costa sit restructa. At quando Costæ fragmentum membranam pungat, atque acerbissimi inde dolores, aliaque prava symptomata oriuntur, cutis incidenda, ac pungentia fragmenta vel eximenda, vel præcidenda. Plura de Costarum Fractura videantur apud Hippocratem lib. de Articulis. §. 51. 52. 53. 54. Insuper defelicissima curatione fracturæ costarum, in qua nonnulla notatu digna occurrunt, videatur Fabritius Hildanus cent. 5. Ocul. 85.

XIV. Dorsi spina est Vertebrarum omnium contextus, & sicut quædam corporis carina, quæ constat septem Cervicis Vertebris, duo decim Dorsi, & quinque Lumborum, nec non osse Sacro, & Coccygis. Vertebrarum Corpora raro admodum Fracturam patiuntur; eandem tamen Processus à causis externis & violentis nonnunquam franguntur. Id autem tactu facile deprehenditur, cum huc atque illuc moveri persentiantur distractæ Apophyses.

Vertebrarum processuum simplex Fractura simplici lenique manuum opera restituitur, ac consolidatur viginti circiter dierum spatio: sunt namque Processus hi ossa spongiosa & rara. Sin vero per vim admodum violentam totæ Vertebra frangantur, adeo ut medulla spinalis simul patiatur, dehinc Paralyti afficiantur brachia, pedesve ægrotantur, ac urina fecesque alvi retineri nequeant, mors in propinquo est. Interim tamen ne æger sine auxilio deferatur, nil faciendorum negligendum, & factò prognostico cutis incidenda, ac libera fragmenta eximenda, hinc vulnus curandum.

Ad Fracturas spinæ pertinet ossis Sacri & Coccygis fractura; quæ si ita sit, ut & spinalis Medulla lædatur, lethalis est. Sin ea non lædatur, adeoque salutis spes sit, immisso in anum digito usque ad locum affectum, os fractum expellendum; extrinsecus vero altera manu ossa æquanda, & in suum locum reponenda. Et si aliquod ossis frustulum abruptum persentiat, facta apertione, id eximendum, ac porro vulnus ex arte curandum.

XV. Os ignominatum, quod ossibus tribus, Illo, Coxendicis, & Pubis, simul unitis constat, frangitur ut scapula, vel in extremitatibus, vel secundum longitudinem, vel in medio.

Cognos-

Cognoscitur fractura hæc ex dolore, qui ta-
tu, & compressione imprimis exasperatur; nec
non cavitate, inæqualitate, punctura, &
nonnunquam stupore in crure ejusdem lateris.

Exigit autem fractura hæc celerem restitutio-
nem, periclitaturque consolidatio quatuor & vi-
ginti præter propter diebus. Interim si sit in
ossis innominati extremitatibus, digitis vel ma-
nu ossa fracta componenda ac æquanda.

Si vero frangatur os per longitudinem, vel
ad interiora declinet, ita situetur patiens, ut
super ventrem decumbat, Chirurgusque mani-
bus, uti potest, fracta ossa componat.

Si os fractum comminutum sit, apertio fa-
cienda, sicque & fragmenta libera auferenda,
& alia reponenda. Verum cum vix sub cute so-
lum, sed sub ipsis musculis talia fragmenta ple-
rumque lateant, sine periculo hic sectio non
instituitur: hinc omnino cavendum ne in faci-
enda hac apertione, tendines, vel vasa tur-
piam majora lædantur, sicque graviora exci-
tentur symptomata. *Job. Adunnicks in Chirurgia
ad hodiernam praxim adornata.*

De fractura ossium, nulla accedente coalitione.

Contingere non raro observamus, ossium ex-
trema in fracturis haud reuniri, quæcunque
etiam externa æque ac interna adhibeantur
medicamenta.

Exemplum huc faciens considerabile, non ni-
si semel (quod in Chirurgo adeo exercitato ad-
miramur) visum proponit Fab. Hildanus obl. 91.
cent. 3. his verbis: Ante duos menses ex Ger-
mania redux, Basileæ fracturam observatione
dignam in quadraginario vidi. Hujus viri bra-
chium sinistrum cum ante annos decem rota
molendina apprehenderet inter cubitum & car-
pum ossa in transversum adeo confregit ut om-
nino inter se disjungerentur, cutis quinetiam
& musculi mirum in modum dilacerarentur.
Dolor supervenit maximus inflammatio & intum-
escens totius brachii, non solum ob magni-
tudinem morbi, verum etiam quod ossa in suum
locum reposita non fuerant, carnemque conti-
nuo compungerent. Multum puris per menses
aliquot effluxit, multaque ossicula à Chirurgo
extracta fuere; tandem remiserunt symptoma-
ta, & consolidata fuerunt vulnera, sed ossa dis-
juncta remanserunt, & ita quidem ut eo in lo-
co veluti alterum articulum constituerent. Ma-
num enim dextram si adhibet, sinistrum brachi-
um antorsum & retrorsum ducit, non secus ac
si naturalis priore in loco articulus esset, idque
sine ullo dolore. Ossa se invicem non attingunt,
sunt enim extremitates ipsorum callo obducta
brachium aliquo modo extenuatum est. Cubi-
tum quidem movet, sed difficulter, quapropter
brachium fere inutile est. Cæterum quid cau-
sa sit cur ossa in hoc viro per callum connexa
non fuerint, profecto me latet; nisi forsitan im-
propriū nutrimentum ossis, ex quo, teste Ga-
leno callus procreatur, in pus conversum una
cum pure effluxerit, aut caro & membrana ali-
qua inter utramque extremitatem ossis interce-
derit. Adeoque natura adeo est diligens atque
provida, ut extremitates ossium confectorum
licet levissime se contingant statim conglutinet,
atque conjungat.

Exulcerationes fracturis supervenientes qua-
cunque à causa, primitiva sive fuerit, sive autem

cedens, sive etiam conjuncta, impedimento
esse posse, quo minus ossum detur coalitus,
maxime cum alimentum ossum sustocatione
consumptioni, corruptioni, aut cumque ex-
tinctione ansam præbent, haud in possibile no-
bis videtur; atquis rationem dabit unde eve-
niat quod ossa fracta haud reuniantur, ubi ex-
ulceratio nulla adest, imo nulla vel in cute vel
in musculo continui observatur solutio? Notare
etenim nobis locuit, non solum in ulna & ra-
dio, ossibus adjutoris, tibia & fibula, sed &
(in duobus licet subjectis) ossibus femoris, per
infortunium fractis, quæcunque etiam inurpa-
rentur media, interna æque, inter quæ con-
siderabilis Ichthyocola, ac externa, emplastra,
splenia, ligamenta, nullam secutam extreni-
tatum unionem, etiam omni exulceratione
absente.

Causa hujus rei quæ sit cum prædicto Hilda-
no, me ignorare fateor, nisi dicamus, deli-
gationem in fracturis usualem, non urgente do-
lore, tumore, inflammatione, aut gangraena,
frequentius fuisse solutum, vel etiam hu-
mores ad calli concretionem promovendam ne-
cessarios plus debito attenuatos, splenia bre-
via nimis aut molliora applicata, imo tractam
partem, ad arcendam incalescentiam quando-
que supervenientem, nimium humectant. Et
harum ultimam calli generationem impedire
satis constat. Spleniorum nimis brevium, mol-
liorumque applicationem, hunc deligationem
minus arctam efficere posse, quo minus extre-
mitates ossium fractorum coeant, in aucta
quodam, cui ex itinere reducti os humeri dex-
trum diffractum, in quo quod splenia molliora
nimis usurpata, nec manus extrema cum ulna
ex debito sursum flexa, nulla extremorum coa-
litione secuta.

Externis impedimentis sic consideratis, Chi-
rurgo in arte exercitato interna adhuc varia
occurrunt, quæ ad id ut extrema ossium fracto-
rum callo nullo obducantur plurimum facere
possunt. Tales humores nutritii os accedentes
minus pingues, aquosiores, corrupti, imo
etiam nonnunquam omnino maligni, habita-
tamen ubi vis consideratione structurae corpo-
ris & ossum.

Observare nobis licuit in aliquo, morbo gal-
lico quasi tabefacto, ossa adeo fuisse exsiccata
imo arefacta, ut ad quemvis attractum strange-
rentur, sic enim claviculam in partes varias
confractam in eo vidimus dum thorace pectus
vestire conabatur.

In tali casu ubi ossum extrema uniri recusant,
nil convenientius, quam, instrumento quo-
dam apto, ex ferro confecto, utrinque mem-
brum comprehendere, extremaque conjunge-
re, ne in motu, vel incessu incommodum ali-
quod ægrotanti adveniat. *Job. à Maken in obser-
vatis. Medico Chirurgiis.*

Observationes

Pro Fractura Brachii in Senes decrepito.

Curationem hoc modo institui, clementer
expurgato corpore, illam victus rationem, quæ
multum nutrit (omissis tamen cibus viscosis,
qui mihi in fracturis mirum in modum suspecti)
lingui-

sanguinemque optimumque procureat, calidum & humidum radicale instillet, præcrispit. Singulis quoque diebus jejuno stomacho, ad ʒij. sequentis pulveris ex jussulo carnis recentis exhibui.

℞. Lapidis, osteocoll. diligenter præpar. ʒj. clonam. cl. ʒij. sacch. ʒij. M. F. pulvis tenuissimus. Brachium usque ad scapulam sequenti linimento quotidie bis inuaxi.

℞. Ol. lumbric. ʒij. ol. gran. Junip. ʒij. succilumbric. ʒj. M. F. linimentum. Sed ante omnia prius ossa in locum suum, ea qua fieri potuit diligentia reposui. Post inunctionem sequens applicui emplastrum.

℞. Empl. Vigonis ad fractur. ʒij. empl. oxycroc. ʒij. lapid. osteocoll. præpar. ʒij. lumbric. præpar. & in subtilissimum pulverem redactor. ʒj. cum q. s. ol. lumbric. f. emplastr. fracturam de tertio in tertium, aut de quarto in quartum diem solvi, & medicamenta renovavi, reliquum vero brachium quotidie semel aut bis, ut dictum est, ad scapulam & nucham usque inuaxi: hicce adhibitis remediis, callus intra paucos dies, usque adeo procreatus fuit, ut collisio ossium non amplius perciperetur, & brachium intra quatuor septimanis restitutum fuerit: & sic natura in hoc decrepito veluti allopatia experget, & calor natus fere extinctus in ista parte iterum beneficio prædictorum medicamentorum accensus fuerit: quantum valeat in fracturis ossium osteocolle seu lapis ossifragus non raro expertus sunt: reperitur in campo quodam arenoso prope Damitadium. Eligitur qui sub terra absconditus, extra terram prominens est invalidus nullusque momenti *Guil. Fabric. Hildanus. Obs. 90. Cent. 3.*

Lapis osteocolle, qui & Sabulosus dicitur, singulari quadam virtute & proprietate occulta generandi callum præditus est: idque ego cum in aliis tum præcipue in quadragenario quodam observavi, is quum utraque fossilia ad malleolum sibi transversim confregisset, me advocandum iussit. Ossa in situm naturalem reposita, singulis matutinis horis jejuno stomacho ʒj. hujus lapidis in marmore cum aq. rad. symplut præpar. exhibui, primis diebus cum ptisana, aut jussulo carnis recentis, postmodum vero cum vino: his quæ fracturæ applicui eundem lapidem pulverisatum & præparatum admiscui: inde factum est, ut spacio triginta dierum plenissime restituta sit tibia, ut sine adminiculo incedere potuerit. *Guil. Fabric. Hildanus. Obs. 90. Cent. 1.*

Lapis hic cautè & in senibus tantum, aut extenuatis, & quibus languet calidum nativum adhibendus est, ne aliàs callus superfluus generetur multo labore diminuendus. *Guil. Fabric. Hildanus. Obs. 91. Cent. 1.*

Ego jam à multis annis magno cum successu sequenti ptor emplastro in fracturis.

℞. Emplastri blotani ʒij. ceræ nov. ʒij. coloph. gummi elemi pinguisissimi an. ʒj. dissolv. in ro. igne. Postea insperge sequentes pulveres, rad. consol. f. m. j. balaut. nuc. cupreil. rosan. ʒj. mastic. thuris, an. ʒij. ad. addendo ol. rosac. q. s. ut iterum in adultis & extenuatis ad ʒj. hujus emplastri, tantumdem osteocollæ præpar. admiscro. Singulis quoque diebus mane triflu. ante partum horis, de eodem lapide cum

jussulo carnis vel vino albo exhibeo: multum enim curationem lapis ille accelerat. In juvenibus verò, & qui optima corporis sanitate sunt, lapis ille sive per os datus, sive externè adhibitus minime convenit: non autem statim ab initio, neque primis diebus applicandum est prædictum emplastr. multo prius oxycroceum, ne effluxus humorum ad partem latham sequatur: ab initio itaque postquam os fractum in situm suum repositum est, sequens applico cataplasma,

℞. Rad. consolid. maj. tormentill. bistort. an. ʒij. holi alb. ʒj. balaut. ʒj. nuc. cupreil. gallarum. ros. rubr. an. ʒij. f. omnium pulvis tenuiss. cui admiscee farinæ hordei ʒvj. hujus pulveris accipe quantum opus est pro membri fracti magnitudine, ex quo cum postea formetur cataplasma in mortario vel alio vase sine calore ignis, addendo vitellum ovi cum albumine, parumque olei rosac. applicetur membro fracto & renovetur ab initio tertio vel ad summum quarto quoque die, donec symptomata non amplius sint metuenda. Vunc emplastr. Vigonis, vel meum applicari poterit, & de sexto vel decimo in decimum diem reiterari. *Guil. Fabric. Hildanus. Cista milit. classe 15.*

Emplastri palmei sive blotani qui prius ejus author fuit, hæc est descriptio.

℞. Adipis porcin. rec. & fragrantis, minii, an. ʒxii. chalcidia, vit. sed non ad rubedinem, aluminis vsti, an. ʒij. adipis cervini ʒiv. mastic. thuris in tenuiss. pulver. redacti, an. ʒij. fiat emplastr. S. A. agitapelo bacillis salicis & succulentis. *Guil. Fabric. Hildanus, in consilio de conserv. valetudine, in epistola ad Croquerum.*

Curationes illas ossium confractorum per lapidem, quem Erasistratus sabulosum vocat, quis non penè fabulas esse indicet? Multo etiam magis unguentum illud, quo telorum inunctione, vulnerati sanantur, ridiculum videatur: & tamen fide digni amici nostri utrumque lancie affirmant. Sunt alia sexcenta, quæ idem omnem superant, non tamen ideo falsa sunt quæ vehementer in iis præstare, & curatio repugnat, experientia, cum admiratione subscribo Andreas Dudithius, epist. 25, lib. 6, consil. & epist. Cratonis & aliorum à Scholtzio editorum.

Pro fractura humeri.

Osse per Chirurgum reposito, emplastrum hoc adhibendum est.

℞. F. m. fabar. farin. ciceris, hordei, frin. volatil. molendini, an. ʒij. spathul. r. gacanth, gummi arab. myrrid. bol. armen. myrrid. pulveris. an. ʒij. album. ovi. v. conquat. ta in vino styptico nigro: lucci plantag. aut vmi styptici q. s. ad incorporandum, & en plastrum. Hoc contrahit, repercutit, roborat, & firmat. Deinde stupas longas, laticas, aqua prius beneatas & expressas toti brachio circumvolvebat, & fascia latitudine quatuor digitorum, aptè in doque quibus præparatis diligenter dicta adjectis tenuis quatuor aut sex, inter se facta, restitulatione, et in pannus linteus ʒij. solus in pl. ros. prius apponatur. Deinde aliqui jam dicta, ut en plastr. stupæ & ferula n. j. cras fasciis ut mors est: non solvebatur ad quinque dies. Interim brachium

memini) tempore hiemali, terra congelata in proximum pagum ad agrum quendam invensum & consolandum ipsi abeundum, domumque redeundo ex aggere quodam tres circiter pedes alto, deliliendum esset, dextrum pedem adeo libitorit ac fregit, ut integrum os tali aut altragali, non solum ex suo loco dimoveretur, verum etiam abruptis & abstractis ligamentis, quorum beneficio, reliquis ossibus alligatur, sub interno malleolo per cutem ipsam erumperet, & foris propenderet. Ad ades suas deportatus, Chirurgus accersitur, is videns os omnino separatum, & nbris nonnullis tantummodo adhaerens, ipsum absceidit, & ea quæ sanguinis fluxum impediunt, applicuit.

Alterâ die Clarissimi Viri, Domin. Galenus Wierus, Illustriss. Clivia censum Juliæcens. Montanium &c. Principis Medicus ordinarius atque primario, & D. Comasslotanus piz memoriz ejusdem Principis Chirurgus, præstantissimus, Præceptor meus plurimum honorandus, in consilium vocati fuere. Qui victum tenuem præscripserunt, corpus a pravis humoribus evacuerunt, venam inciderunt, vulnere anodyna & pus moventia applicuerunt. Repellentibus item seu detensivis, ut vocant, affluxum humorum prohibuerunt. Curatio difficilis fuit, dolorosa atque longa. Interim tamen amici & quidam viri docti ipsi non desuerunt. Etsi enim proprium suum Chirurgum Dusbургensem, nunc & in arte non mediocriter versatum haberet, attamen nunc Johan. Wierus, nunc Galenus Wierus, nunc Reinerus Solenander, omnes prædicti Principis Doctores Medici longè celeberrimi, ipsum inviterunt, omniaque quæ necessaria videbantur præscripserunt. Ego quoque non raro una cum præstantissimo Dom. Coimò slotanò Dusseldorpio, ad ipsum profectus fui. Sic divino solo numine tandem ita convaleuit, ut & sine Scipione in cedere posset, uti ego cum in edentem anno 1599. cum Colonia Dusburgum ad pium & honestum virum D. Simonem Engelgraff, a cane graviter morsum, vocatus essem, ipsemet vidi. *Idem ibidem.*

Quidam ex domesticis D. Samuelis Moratelli, civis Paterniacensis, vir robustus & optimo corporis habitu præditus, ætatis tempore brachium sibi ad cubitum fregit. Et quia tum temporis Basileam profectus eram, rusticum quendam, (qui in hoc tractu præ aliis etiam exercitatus Chirurgis in fracturis ac dislocationibus reponendis extollitur) ex pago proximo accersiverunt. Conjux quoque mea, quia, non raro, me absente fracturas ac dislocationes reponerat, & sanitati restituerat, simul vocata fuit, ad meum quoque finem, ut domestici mei vulnus, quod fracturam comitabatur (cujus curam rusticus ille Empiricus aggredi volebat) curarent. In locum suum fractura reposita, emplastrum ex pice flavâ applicuit, fasciisque, & splenis omnia deligavit, (relicto tamen foramine pro vulneris mundificatione & ne ante decimum tertium diem solverentur fasciæ, splenia, & emplastrum amoveretur, jussit, domumque se contulit. Quid sit? Alterâ die post denovo dolor supervenit qui paulatim auctus erat. Interim domestici mei, qui vulnus quotidie curabant, agrum & adstantes, ut emplastrum amoveretur, admonuerunt, sed frustra: Malue-

runt enim impostorum quam in arte versatorum consilium sequi, dolore tamen magis magisque aucto, tandem parere coacti fuerunt. Præsentibus itaque D. Moratello, aliisque inde dignis hominibus, fractura a domesticis meis soluta emplastroque ablato, brachium non solum tribus in locis exulceratum offenderunt, verum etiam tærens, ut hinc inde vermes, quales in carne putrida generari solent, conspicerentur. Imposito itaque unguento nostro Ægyptiaco, & cataplasmate aliquo, putredini resistente, applicato, curationem feliciter absoluerunt, brachiumque pristinæ sanitati domestici mei restituerunt. *Idem ibidem.*

Sabaudus quidam, Vir Senex ac decrepitus, Genevæ in ponte Rhodani ex equo delapsus, tibi sibi paulo supra malleolum fregit. D. Joh. Griffonio mecum advocato, fracturam feliciter reposuimus, omnisque dolor protinus sedatus fuit. Tertio die post, cum fracturam solvere vellemus, æger recusabat: aiebat enim, sibi à quodam amico, & in arte versato (erat autem is empiricus) significatum, fracturam ante septimam diem non esse solvendam. Quinto tamen de morbi, dolore exorto & propter seras admonitiones D. Griffonii, in præsentia D. Jani Antonii Sarazeni Medici Regii, soluta fractura, pustula multæ ac lividæ, quæ gangrenam proximam significabant, conspectæ fuerunt. Scarificata tamen tibia, & medicamentis gangrenæ adversantibus applicatis, tandem convaleuit.

Rusticus ex pago quodam in agro Paterniacensi, sub plautro lignis onusto, pedem adeo sibi fregit, ut à junctura separatus, & mirum in modum contractus esset. Advocatus ego, antequam manum adhiberem, utque opprobrium onere præcaverem, adstantibus sequentia significare visum fuit. Primo etiam si summa adhiberetur diligentia, curationem nihilominus, propter magnitudinem morbi, ante menses sex vix absolvi posse: Secundo quia fractura ingens, claudicationem impediri non posse. Tertio, quia ego tum temporis cum aliis quoque agris occupatus, necesse esse, ut agrum ad me adducerent; Ad hæc cum parentes & adstantes consentissent, fracturam reposui, & demum redii, expectavi que donec agrum adducerent, sed frustra. Tanta enim fuit apud eos negligentia; ut agrum apud se retinerent, neque quemquam alium qui fascias medicamenta que mutasset, advocarent. Post itaque dies aliquot, rursus dolore acerbissimo, inflammatione item ac fœtore subortis, miser ille extinctus est.

Ego quoque quum in solutione fracturæ cujusdam Nobilis Belgæ non satis diligens essem, ac à decimo quarto usque ad vigesimum primum diem, medicamenta minimè mutassem, callus adeo magnus procreatus est, ut inde maxima deformitas tibie sequuta fuisset, nisi protinus callum pressissem. Quæ verò methodo id factum sit, lector ex Observat. 91. Cent. 1. colligere poterit.

Ut itaque cautè ac securè agamus, secundo aut ad minimum tertio quoque die, Hippocrate & Galeno docente, fractura solvenda est, idque in eum finem, ne in membro, præter solitum cooperto, dolor aut pruritus uboriat, neque ejus humoris qui jam parti

berentur. Occurrebant tunc ea, quæ tui Exc. l. de ossibus parte 4. cap. 4. ex Amb. Paræo referret, qui l. 15. cap. 22. testatur, se neminem cui patella fracta fuisset, vidisse, qui non claudicaret. Tu cum Domino Baræo existimas, causam claudicationis ad callum, cuius beneficio patella fracta connectitur, referendam esse; cum videlicet capacitatem articuli subter patellam implet, motumque articuli impedit. Etsi verò opinionem hanc rationi contentaneam esse, in dubium revocare minime conabor; unus tamen restat scrupulus, videlicet, an fracta patella, extuberantia colli talis esse possit, ut cavitatem hanc (quæ inter femur & os tibia magna est) adeò adimpleat; ut motum actionemque genu impedire possit? videmus enim ut plurimum in reliquis ossium fracturis; [nisi contusio ossis & periostii fuerit maxima] naturam tam decenter & eleganter connectere ossa, ut raro relinquatur verugium fracturæ. Periostium enim, quandiu integrum est, materiam calli retinet, quo minus, & extuberantiam accrescere possit, nisi ea adiuvetur, quæ ex proprietate quadam specifica generationem calli promovent, uti ego adhuc juvenis in Belgio feci, & quidem paucis cum successu; quemadmodum videre poteris centur. primæ Observat. 91. Deinde in hoc nostro ægro, callum non fuisse causam claudicationis ex sequentibus apparebit; quapropter distinctione hic opus est. De quibus plura vide apud *Hildannu Observat. Chirurgic. Cent. 5. p. m. 43j.*

Mira ossium fragilitas.

Sæpissime cum admiratione legi, Vir Ampliss. ea quæ de mira & ferè incredibili fragilitate ossium, cum apud Marcellum Donatum mihi lib. 5. cap. 1. scribuntur, tum etiam à temetipso, & à Dom. Joh. de Burgo observata, mihiq; communicata, necnon Cent. 2. Observationum mearum inserta fuere. Cum enim ossa partes sint corporis omnium solidissimæ, ex substantia quin etiam crassa & terrestri ita compactæ, ut etiam per multos annos illæ in ipsa terra remaneant, impossibile mihi videbatur, tam facillè ea disrumpi ac frangi posse: sed experientia aliter edoctus, adscribam exemplum unum aut alterum.

Superiore anno 1620. Matrona quadam honesta & robusta, quæ nondum 30. annum ætatis attigerat, Dom. Philippi Thomæ, hujus urbis Senatoris filia, cum quodam die circa rem familiarem occupata esset, & in ipso hypocausto fortè fortuna in pavementum cecidisset, tibiam dextram circa poplite sibi fregit. Vocantur Barbitonfores duo, qui quidem fracturam se rectè reposuisse asseruerunt, interim tamen insecutus est dolor adeò magnus, aliæque symptomata adeò sæva, ut quum ego septima mente post acceptam fracturam, in consilium adhibitus essem, ipsam veluti in agone reperirem. Quapropter manum adhibere recusavi, corroborantia tamen quædam præscripsi, & astantibus significavi, ipsam brevi finem vitæ facturam. Post paucos dies paulatim, & veluti lumen cui deficit fomes, extinguita fuit adeò consumpta atque extenuata; ut ossa vix cute obregerentur. Nec mirum: prop-

ter gravissimos enim, continuos ac longos dolores & cruciatus, quos ex inepta deligatione & situatione tibiæ perpetua fuerat; propter diuturnum item decubitus, quam de universilibus toto illo tempore morbi, ne semel quidem heret mentio; calor natus labefactus, & humidum radicale absumptum, obstructiones quædam quam gravissimæ hepatis, lienis, & venarum mesaraicarum sequuta fuerunt.

Ante annum sexagenarius quidam Solodurensis, ex Senatorio ordine, Un. Ursus Kouctini nomine, ab aliquot annis catarrhis adeò obnoxius fuerat, ut maxima inde virium, totiusque corporis labefactio, etiam externarum partium, sequuta sit. Die quodam lectum egrediens, cum per cubiculum deambularet, vestesque indueret, nec non inopinato pedem dextrum non satis apte deduceret, propterea in pavementum decidit, non sine maximo dolore, atque signis, quæ os fractum esse arguebant. Advocato Empirico quodam, cujus consilio & remediis in fracturis ossium plerique illo in loco utuntur, femur seu femoris os, ad quatuor circiter digitos, in latitudinem positos supra genu in transversum fractum esse, repertum fuit. Reposuit quidem fracturam, si Empiricis jactantius credendum: dolor enim verissimum signum, os non satis rectè fuisse repositum, non remisit, sed potius auctus fuit, donec tandem, quum universalia plane neglecta fuissent, exorta esset phlegmone, & ex inde ulcus circa fracturam, quapropter ad menses aliquot decumbere coactus fuit. Tandem cum utcumque restitutus videretur, & innixus sustuleris per cubiculum deambulare posset, paralyti aliisque gravissimis symptomatibus (de quibus post hac data occasione ad te scribam) correptus fuisset, naturæ debitum solvit. Os autem verissimè fractum fuisse, testis sum ocularis. In postremis enim morbo suo, non diu ante obitum ulcus ipsum adhuc ad os usque apertum, inspexi, osque fractum fuisse, manifeste cognovi. De causis hujus fragilitatis ossium inter se non conveniunt Medici: ego libentius tuam intelligam mentem, quam quicquam hæc de re impræsentiarum proferam. Vale Vir Amplissime & cum tuis omnibus æternumque felicissimè vive. Raptim Bernæ Helveticorum, 28. februar. 1621. *Idem ibidem.*

Mira femoris fractura.

Petrus Kerler Ulmensis, artificii Murarii, mense Novembris, anno 1624. Argentina per lapsum femur sinistrum dupliciter transversum fregit, ut postea patebit. Adhibitis adhibendis, per semestrem ferè penes Chirurgum decumbit, donec fractura consolidata, nec femore breviori reddito respectu alterius, huc Ulmam pedes sese conferret; ac de abscessu circa locum affectum, nec non ulcere fistuloso conquereretur: adveniens itaque medicam implorat opem, ubi particulam aliquam ossis fracti diuturnioris istius abscessus causam statuimus. Hinc igitur ulcus fistulosum ampliandum, & naturæ, quod citius ab aliena materia liberetur, succurrendum esse putavimus. His itaque continuatis tandem

renovavi, atque ita patiens intra sex septimanas iterum incescit.

Non dicam hoc in loco, quod fractura per transversum facta facilius possit retineri, quam obliqua, nec etiam, quod pro signo bonæ restitutionis in fracto tibiæ osse plerumque habeatur, si pollex pedis directe respiciat genu, quandoquidem hæc nimis nota sunt; nec magis causam reddere conabor, cur dolor post os repositum mitigetur, quoniam liquidum est, hoc fieri, quia prima doloris causa, de qua modo locutus sum, aufertur cum temporis, sed antequam finiam explicare decrevi, quo pacto callus producat, qui ossa fracta conglutinat.

Quando sanguinis & humorum circulatio restituitur iterum tam in osse fracto, quam alibi, tunc particulae quædam ex poris arteriarum egredia transiunt per tubulos ossis, &, cum perveniunt ad extremitatem ossis diffracti, amplius pergere nequeunt per lineam rectam ob tubulos a fractura interruptos, ideoque deflectunt ad latera, ubi ossi & sibi invicem adherentes constituunt tandem callum, qui ossa iterum coniungit.

Callus hic in senibus & debilibus tardius generatur ob sanguinem viscosum & crassum, qui per angustos ossium tubulos transire non potest, atque ideo in tali casu crassiores sanguinis particulae debent attenuari per lapidem osteocolam dragmæ pondere quotidie sumtum, imo nocere non posset, si lapidis ejusdem pulvis commisceretur etiam cum emplastro, quod externe imponitur.

Sed in ægrotis nostro res longe aliter se habuit nam callus indecoram molem exercebat, quamobrem imposui emplastrum de ranis cum mercurio & strictam ligaturam, ut scilicet emplastrum hoc particulas quasdam calli ita attenuaret, ut avolarent, & ligatura callum ita comprimeret, ut nova apponi non possent.

Atque ita finem imponam huic observationi, postquam dixero, quod crus ægroti semper extensum jacere iussi, & curam gessi, ut calx pedis inniteretur pulvinari parvulo, in cujus medio foramen erat, nam alias contingere posset, sicut experientia testatur, ut gangræna invaderet calcem, quia vasa & tubuli partium a longo decubitu vehementer comprimuntur.

Reperiuntur nonnulli, qui in fractura tibiæ commendant viscosa, quæ ego, ut noxia, rejicio, quandoquidem in corpore se non exercente obstructions non parum augent, quæ e contra potius diminuendæ forent. *Johann. May. in prax. Chirurg. rationali.*

De Fractura tibiæ cum vulnere.

Virgo 20. annor. idu scilicet parvis globulis plumbeis onerati & cominus inopinato a nescio quo infortunio explosi in interiore cruris parte paulo infra genu vulnus accepit, quod longè lateque egregie patebat, imo in tantum ut palmæ spatium superaret; aderatque ingens ossis tibiæ in valde parva fragmenta diffracti contritio & comminutio, quæ se per totam vulneris longitudinem atque ossis tibiæ crassitiem extendebat; hinc dolor atrocissimus affligebat ægrotam quæ ideo multas noctes in-

sonnes transigebat, aut si per exiguum temporis intervallum aliquando dormiret, nox evigilabat non in summo terrore, ac quasi cum convulsione cruris vunerati, unde ossa diffracta non raro dinorquebantur.

Ossa contracta, atque magna extensione reponerantur, & fragmenta quæ ab aliis partibus prorsus erant separata, soluta & libera, e velligio blande eximebantur, reliquis adhuc aliquatenus adherentibus relictis, donec progressu temporis separentur.

Tunc digestivum confectum ex therebinthina vitello ovi, pulvere radices iridis aristolochiæ, myrrhæ, aliisque imponebatur cum emplastro ac lavamento acidum temperante; deinde adhibeatur communis ligatura, tandemque crus affectum capsula lignea inclusum concinne collocabatur in lecto, supra quem funis suspendebatur, quo ægra corpus aliquatenus, ubi necessitas exigebat, posset exigere; ac ad pedes ægrotæ in lecto ponebatur erectus semicirculus ligneus, ne scilicet itragulorum gravitas cruri affecto aliquam crearet molestiam.

Ventresectio, quam plures commendare solent in tali casu, omnino omissa fuit, quandoquidem nihil utilitatis inde promanare potest, nec magis secundum methodum vulgarem hic in usum revocata sunt purgantia, quia hoc in malo quiete nihil optabilius, atque nihil perniciosius quam motus, sed ubi ægra nonnunquam alvum exonerare tenebatur, linteum quadruplex supponebatur naribus, quod alvi excrementa excipiebat.

Patiens interea temporis comedeat cibum concotum haud difficilem, bibebat cerevisiam recentem ac primis singulis vespertis assumebat blandum aliquod anodinum ad mitigandum dolorem ac tollendum illum terrorem, de quo dixi.

Ossa reponerantur, quotiescunque post terrorem nocturnum reperiebantur distorta.

Vulnus ob magnam puris copiam quotidie bis religabatur, atque ita progressu temporis complura fragmenta separata sunt, tuncque calli generationem ac accretionem quotidie conspeximus propullulantem non ex medulla, sed ex ossis tubulis valde angustis, per duos humores nutrientes ex arteriis egressi deferuntur.

Vulnus hoc, periculosum adeo, intra semestris spatium coaluit, ac patiens sere iterum tam bellice incescit ac obambulavit, quam fecerat, priusquam hoc vulnus intelligeretur.

Simili cum successu aliam sceminam eodem malo decumbentem a patre meo sanatam esse recordor; sed hæc duo exempla aliquem adeo securum reddere non oportet, ut fracturam cum vulnere parvis faciat, nam illam plurimis necem intulisse compertum habeo; sic ubi in nosocomio Rotterodamensi aderam cum aliis quotidie per totos ferme dies curandis plurimis vulneratis, qui ex obsidione urbis de Graaf appulerant, omnes, qui fractura tibiæ cum vulnere laborabant, e vita abreptos esse novi, & inter alios unus affligebatur fractura tibiæ cum vulnere, in quo plurimos vermes latos, crassos & albicantes non sine admiratione conspexi, sed unde hi vermes suam traxerant originem scilicet ab ovis ex aëre in vulnus delapsis, ex quibus exclusi sunt vermes, ubi quædam in humori-

bus stagnantibus exorta fuit fermentatio. Sic ova non pauca ex aëre decidunt in lac, ex quo postea conficitur caseus, & quando hic recens est, ova non excluduntur, sed ubi caseus putrescit, hoc est, ubi fermentatio quadam progressu temporis producit in caseo tum demum vermes prorepunt ex ovis.

Sic in valde magna ossis contusione fracturam cum vulnere eo comitante crus paulo infra genu extirpatum esse memini.

In fractura tibiae cum vulnere quidam adhibere consueverunt ligaturam octodecim capitum, quæ Belgicè nominatur *een boxtuuse ligatuur*, sed nos feliciter uti sumus communem, quam bis quotidie mutavimus ob ingentem puris profluentis multitudinem.

Novi chirurgum, qui loco capsulae lignæ, de qua dixi, in usum revocat instrumentum quoddam ferreum, cui crus affectum imponitur, & conservatur ita extensum & immobile, sed illud instrumentum hic, verbis exprimere non possum.

In simplici fractura tibiae apponuntur plerumque ferulae ex charta crassa confectæ; illæ verò in nostra ægrotâ prorsus omittebantur, quia in vulnere tam vasto minime videbantur convenire.

Digestivo nostro, quod vulnere imponebatur, nulla admiscebatur pinguedo ob ossa denudata, nam quod pinguedo noceat ossibus experientia abunde testatur, ejusque rationem reddidimus antea.

Parvus de praxi chirurgica bene meritus est, multumque habuit experientia, attamen perperam in fractura cum vulnere commendat astringentia, quæ quare & quantum noceant, sæpius diximus. Non puto autem aliquem in malam partem interpretaturum, quod tantum virum audeam reprehendere, nam quò clarior est aliquis, eò periculosiores sunt ejusdem errores, quia plurimi sola auctoritate tanti viri permoti cæco quodam impetu eundem sequuntur, euntes qua itum est, non qua eundum.

Notandum est callum difficillime prodici in fracturis gravidarum & lactantium, quia materia idonea à fœtu aut infante callo subducitur. Sic Fabricius Hildanus refert in Cent. 5. Observat. 87. quod hac de causa in fractura tibiae cum vulnere vigesima tertia septimana ossa adhuc vacillarent.

In fractura tam simplici quam composita, ubi callus ossa confracta iterum conjunxit, ægri plerumque molestiam quandam periculisunt in motu, quod contingit, quia callus recenter generatus occupat locum musculorum hanc aut illam partem moventium.

Antequam huic observationi finem imponam, duo problemata valde intricata extricanda superesse mihi videntur; primum est, quare ossa, dum hiems est serena, facilius ac citius diffinguntur, quam alio quovis tempore; alterum verò, unde proveniat terror post somnum brevem ægros tam simplici quam composita fractura laborantes plerumque invadens.

Ad primum aliqui fortasse responderent, glabritiem glaciei efficere, ut homines sæpius prolabantur in terram atque hoc pacto facile venire, ut ossa disrumpantur; verum enim vero hoc nodum non solvit, hoc difficultatem nondum tol-

lit, nam ossa non tantum, sed & fœtum, lignum aliaque dura corpora brumali quam aliò quovis tempore facilius disrumpuntur. Unde igitur hoc contingit? dicam, ausculta paulisper; Quo partes corporum durorum pertinacius & firmitus conjunguntur inter se, eo difficilior diffinguntur; hoc certum est: sed quodnam est illud, quod in partibus durorum corporum efficit coherentiam? non quies, ut quidam opinantur, quoniam illa non est aliquid positivum in corpore, sed tantum privatio motus, ideoque hoc effectum non producit quies, sed aer comprimendo partes durorum corporum conjungit ac coherere facit, ut patet ex experimento in observatione septima tertiae decadis citato; aer autem, dum æstas est, magis premitur quam media hieme, partim quia tum temporis à calore solis validius agitur, partim quia tunc gravior existit ob admissos plurimos vapores ab ardente sole sursum propulsi; atque hic jam manifestum evadit, quare ossa aliaque dura corpora hiemali tempore facilius franguntur quam ætate; hinc etiam facile colligi potest, quare ligna in loco multo citius comburantur, cum rigida premuntur hieme, quam dum æstas fruimur ætate; nimirum aer brumalis debiliore sua pressione non valde pertinaciter particulas ligni conjungere potest, unde hæc particulae à ligni corpore facile separantur, dum vim patiuntur à particulis quibusdam terrestribus solæ materiam mundi subtilissimam imitantibus, ideoque rapidissime agitantur. Huc accedat, quod aer hiemalis, utpote minus premitur & pauciores continens, flammam liberius divagari permittat.

Veniamus jam ad alterum problema, quo quaeritur, unde oriatur terror in somno, non autem in vigilia ægros ossis fracturam patientes invadens, ac ossa disrupta non raro iterum distortuens.

Parvus magna experientia in arte chirurgica locupletatus, qui ipse aliquando fracturam tibiae ac fibulae cum vulnere passus est, ac in proprio corpore hunc terrorem vivide satis persentit, ut ait, hujus phaenomeni rationem reddere conatur in capite vigesimo textu libri agentis de fracturis, sed misere philosophatur ibidem, non nisi nugæ ac chimæras in medium proferens.

Videamus igitur, num nos rationem magis vero-similem asserere valeamus; tentabimus. Iam. Ubi vigilant ægroti, vident, audiunt, edunt, bibunt, agitant brachia atque hoc modo multum succi nervi consumunt, sic ut ille haud adeo magna copia profuat in partes irritatas ex cerebro, sed cum somno sua membra demulcent ægri, longe aliter se res habet. Aures non audiunt tum temporis, oculi occlusi sunt, nares consueti negotio non vacante, lingua silet, brachia quiescunt; ubi igitur illo tempore humores circa fracturam tibiae stagnantes ac acescentes distensione sua fibrillis afferunt molestiam, ac easdem scissione sua irritant, tunc inquam, succus nervus, qui jam ad negotia in vigilia peragenda non impenditur, magnâ copia prolabitur in musculos irritatos, qui hoc pacto inflati crus vehementer movent, ac unam ossis disfracti extremitatem in hanc, alteram in illam partem misere distortunt, unde dolor tatis

atrox exoritur, & sic patiens post brevem somnum non sine terrore expergiscitur. Ut autem huius phaenomeni rationi, quam reddidi, facilius fidem adhibeas, consultum judico, ut ad paucula verba sequentia attendas. Dum viges & vigilas, dum vesiculæ tuæ seminariæ multum fecundi seminis continent, imaginare, quam vividè poteris, pulcherrimam quandam puellam, hoc pacto tamen te semen ejaculaturum non opinor, nisi alia moliaris; verum si tibi somno placido fienti ante imaginationem obversetur haud inelegantis formæ puella, & si interea temporis vesiculæ tuæ semine satis distenta sint, semen non rarò summa cum voluptate hoc pacto prolabetur, quia scilicet vesiculæ seminariæ valde contrahuntur à succo nerveo, qui magnâ copia, dum dormis, à cerebro in vesiculas seminarias à semine distentas & valde irritatas deferretur, quia jam non impenditur ad alia permulta negotia, dum vigilas, peragenda.

Sic novi duos Epilepticos, qui nunquam, dum vigilant, sed semper, ubi somno sepulti jacent, paroxismo corripiuntur, quod sententiam meam non parum confirmat. *Idem ibidem.*

Fractura tibiae & fistula cum vulnere.

Filius Domini N. N. quatuordecim annorum, cum sociis ludens, tibiam & fibulam dextram contiegit, ita ut prostantia hæc ossa muscolum Catuocemum & suralem cum venis quibusdam pertuderint: pes extensus per ministros fortes & in æquilibrio detentus erat, aliquedum utraque manu Chirurgus membrum comprehensum ad pristinam figuram reduxit, & impellendo hinc inde, ante, retro, ad latera extantes partes, in suas concavitates, & pristinas sedes reduxit; quo dolor magna ex parte cessavit, osque fractum in superficie æqualitate adeptum, & sano membro simile redditum est: vulneri tum imposuit Cerotum Galeni, & desuper emplastrum adstringens, deligavit pedem fascia tres ferme ulnas nostrates longa, ter fracturæ circumvolvendo, & versus genua teniendo aliam dein fasciam affecto pedi his circumduxit, versus malleolum finiendo; Hisce fasciis imposuit compressas per transversum & juxta membri longitudinem, ut inæqualitas omnis caveatur, & deligatio super fracturam firmetur: propterea compressas has epidesmo retinuit, & Syndesmo theca chartacea muniavit; tandem pedem directum, ut calcaneus ab omni compressione liber fuerit, capsulæ lignæ imposuit. Modus hic deligationis per duas hebdomadas continuatus fuit; post instituta fascialis fasciatio octodecim capitum dicta, ob copiam puris, & crebram partis inspectionem: post tertiam hebdomadam in melius profectus est æger, calloque fractura conglutinata, & perfunata.

In fracturis ritè sanandis Chirurgus officio suo neutiquam satisfecisse dicendus est, si ossa ab invicem disjuncta rite iterum coaptaverit, cum & eadem debite ligando ac reponendo, ut concrefcere denuo queant, apta reddere teneatur, non solum coalescentiam alias impeditu-

rus sed pluribus etiam aliis incommoda aptum expositurus; quæ inter sphacelus crudelissimus eundem e vita tollere valet, cujus exemplum, præter Ephemeridum nostr. curios. dec. 1. ann. 1. obs. 248. Phil. Hochstetterus dec. 5. observ. med. cal. 7. exhibuit, ubi cruris fracti ab imprudenter tacta arctiori ligatura sphacelum describit; qualem etiam in alio calc. neus non rite collocatus concitaverat, quem fuit Joh. Helly vigiliis observ. med. 154. Prout vicissim a laxissima ligatura coalescentiam ossium impediri, Joh. Mekeanus cap. 68. observ. chirurg. non immerito admonet. Scilicet fasciæ membri partes diffractas iterumque in naturalem situm locatas, conservare in eodem debent, quo ita particulæ glutinosæ exsudantes, ossium alimento alias intervituræ, se invicem contingere atque coagulari, callum constituere queant, unde laxiori ligatura extremitates ossium fractorum è loco suo moveri facile cum possint, unio sperata impeditur: & è contra si strictiori ligatura, aut inconcinnâ repositione spiritibus animalibus ac sanguini aditus redditusque; compressis scilicet nervis & arteriis, denegetur, partem tandem aiori necesse est, Glutten vero illud nutritum e sanguine deponi, particulæ illæ viscosæ, in ejus sero abundantes probabile reddunt, ut ita à nervis illud sperare, cum aliis, haud opus habe. mus. *D. Joh. de Muratio.*

Fractura costæ & cruris in gravida.

Anno Christi 1681. die 29. Decembr. honesta matrona, *Dn. Nauratho*, t. t. Præfeci in *Dirmstein* trans Rhenum. Uxor, in glacie cecidit adeo periculose, ut in dextro latere frangeret costam, in sinistro utrumque focile cruris paullo supra malleolum; nihilominus (ut jam a semestri esset gravida) rite curabatur utraque fractura intra tres menses, donec tandem feliciter enixa esset foetum, qui adhuc tum ultra triennium superstes est. *D. Georgii Franci.*

De miro effectu tabaci in fractura femoris cum vulnere.

Chirurgus mihi notissimus, & à mea directione dependens, curationem suscepit cujusdam juvenis Rultici, cui in terram lapso femur dextrum à rota currus onusli ita contusum & contritum fuit, ut caro musculosa denudata ab ossibus quasi divulsa cerneretur. Diu actum fuit mundificantibus, siccantibus, sarcoticis, epuloticis, sed continuus humorum affluxus omnem operam & vim medicamentorum elusit. Pulverem tabaci, utpote heriz vulnerariæ aspersit parti læsæ, sed vix hoc facto, patiens ad enormem vomitum fuit concitatus. Retulit mihi inopinatam hoc symptoma prædictus Chirurgus, quod ex naturali causa forsitan ortum suspicatus, jussit ut insersionem hujus pulveris repeteret; Dictum factum, semper insersionem immediate sequebatur vomitus. An vellicando nervosum genus, & stomachum in consensum trahendo, vel communicando vapores, hæc anacatharsis excitat? utrumque videtur

tur probabile; totum enim corpus, ex doctrina Hippocratis, & ab experientia unguentorum Mercurialium, est conspirabile & confusile.

Fateor equidem & mihi Stomachum moveri, si odorem fum tabaci naribus etiam à longè excipiam. Eliminare sanè & prosciberem ex foro medico hanc herbam; si in mea potestate foret, propter tot nocumenta, quæ à Simone Pauli Commentar, de abusu tabaci allata sunt; sed nolo offendere Clarissimos Viros, Thomam Bartholinum & Diemerbroeckium, quos esse tabacophilos testatur, illius Consilium de anat. pract. fol. 18. hujus vero tract. de peste Cuique placeat fumus odorque suus. D. Adami à Lobinwald.

Herba Ossifraga

Fertur in Norvvegia nostra plantæ cuiusdam ossifragæ vis singularis emolliendi ossa Jumentorum, quæ illa vescuntur. Et quod mirum ex eadem incolæ unguentum conficiunt pro ossibus glutinandis. Sulpicatur D. Simon Pauli noster, mercuri vel plumbi subesse mineram, deditque id negotii peritis loci Sereniss. Rex noster, ut de veritate rei inquirant, & quid terra illa, ubi planta nascitur, sinu suo occulti condat. Quicquid rescivero posthac scribam. Vidi plantam siccam apud Clar. Botrichium Collegam, quæ propius ad juncum accedere mihi visa est D. Barthol. in litter. ad D. Sachsum missis.

Herbam hanc à nemine Botanicorum descriptam vocat Gramen Norvveg. *Wasspiss*, ossifragum. Ex D. Simon. Pauli Prof. Regius. Hafnens. in quadripart. novæ edit. clas. 4. pag. 529. Norvvegis dicitur *Beemras*. Herbam istam secum anno 1641. e Norvvegia primum adduxit D. Jacob. Fabricius Med. R. Christiani IV. narravitque eidem Generos. D. Janus Bielke Regn. Norvveg. Cancellarius compertum esse ejusdem herbæ efficaciam, ut si boves eo vescerentur, ipsos usque ad ambulandum fieri ineptos, ut elumbes videantur nec vestigium facere possint. Imo ut *Georg. Arichzeum* Generalis Major Philobot. meus, retulit in litteris ad D. Simon. Pauli, adeo ossa mollescunt, & conteruntur, ut baculo possit quasi circumvolvi animal, non tamen moritur, sed curari potest si ipsi ossa exhibeantur alterius animalis, hujus herbæ esu perempti. Conjecturam facit D. Simon Pauli pag. 532. delitescere forte ibi, ubi crescit herba hæc, in intimis terræ visceribus mineram saturni vel mercur. currentis, quia secundum Kircher. art. mag. l. 3. p. 5. c. 1. omnes plantæ alimentum vere magneticè ex terra trahant & naturam metalli supra quod creverunt assumant. Contra meminit Jacob Bontius J. V. med. Indor. cap. 33. f. 86. herbæ, quæ semen fert instar hordei, sed nigrius & hirsutius in Malacca & Continentis quibusdam Indiæ locis crescentis, quæ ossa adeo firmat & roborat, ut si ejus succo solummodo dentes imbuantur, silicem in pollinem redigere possint. Thom. Bartholini.

De gramine ossifrago.

Graminis hujus originem Norvvegiæ debemus, quod ea virtute vel malignitate præditum dicitur, ut jumenta, quæ vescuntur, evertet, ad

motum inepta reddat, ut velut exossata videantur. Hinc conjectura ingeniosa suspicatur Celeberrimus noster D. Simon Pauli, magnum illud Horæ & anatomies decus, subesse illis locis, ubi germinat herba, fodinas vel plumbi vel argenti vivi, unde vitium hoc ossifraga herba trahat. De quo argumento eruditam epistolam ad me publice laudatus magno suo merito Senex exaravit, ex qua excerpam quæ ad hoc negotium spectant, ut Lectoribus curiosis satisfiat: Ita vero ille:

Porro, Celebratissime Bartholine, vitio minime mihi vides si insuper gnaviter ac obtinate, te exorare contendam, consilio, studio, operatuis, mihi non desis, sed ut defesso Atlanti, impiger successit Hercules: ita tu mihi in statione mea successor, patriz in honorem & commodum suppetias foras; & pluribus te rogarem hæc omnia, niq. scires, Ciceronem à Platone, præclare scriptum putare in officiis: quod non nobis solum nati sumus, sed ortus nostri partem patriæ tibi vendicet, hinc eundem quoque statuere, quod omneis omnium caritates patriæ una complectatur, pro qua quis bonus dubitaret mortem oppetere, si ei sit profuturus? Quæ cum ita se habeant, egoque complurculis ab hinc annis in eam deveniunt sententiam, & adhuc in ea permaneam, certo quodam in tractu Norvvegiæ, novo & inaudito exemplo, delitescere fodinas vel plumbi vel argenti vivi: æque ac pridem Dei gratia on ni populo innotuit, argentum aliæque metalla in ea reperiri ac effodisque omnia Celeberrimus Joh. Laurenbergius, popularis meus, quæ Poeta ad Maronis, quæ Mathematicus ad Euclidis samam pergens, suo Heroico, meo honori dicato, cum horam meam Danico idiomate 1648. publici juris facerem, universo orbi asseverare studuit. Atque interim non immerito, meæ conjecturæ, de invenendis plumbi ac argento vivo, in Norvvegia & occasionem & rationem prudenter exigis? Nisi ergo grave, molestumque tibi, perdocte Bartholine fuerit, quartam partem quadripartiti mei botanici posterioris editionis, & quidem in ea historiam graminis evolvere (heluo alias librorum qui es, si tam honesta in re, hoc loquendi modo cum Cicerone utinam liceat) utique nullus dubito, quin istic loci exacto & perpolitio judicio tuo abunde satisfaciam, præsertim cum Nobilissimæ Europæ Nationes (quas inter Gallicam & Britannicam recenseo) studium hoc meum sive collaudent sive tacite approbent; Sed in fidem priorum omnium Nobilissimi ac maxime strenui Domini Georgii Reichvein, natione Catti, chiliarchæ literas, Germanico Idiomate ad me datas, ex meo quadripartito huc accersam: quem meritissimo, cum adhuc superesset, redicivum appellasses Dioscoridem, adeo subactus erat, non solum in militari disciplina, sed quoque Botanico studio, ita ut si nonnullis Medicinæ Candidatis, negotium facessere ipsi placuisset, herbam illi ultro ei porrexissent, & quidem pressio pollice. Sed linquam hæc illius vero ad me datarum literarum verba ita habent (Latine versa in gratiam externorum.)

Honoratissime Dom. D. Simon Pauli. Quamdoquidem editum herbarium tuum pervolvimus, intellexique Te D. Doctorem, Herbarum apprimere esse partium, & ex Te ipso audiivi plura meditari

hæc illius vero ad me datarum literarum verba de eis in publicam lucem proferendis: reticere non possum multas in hoc regno elegantes & mirandas species inveniri, quarum quædam quidem cum aliis conveniunt, sed singulari figura & colore, aliquæ vero prorsus raræ, & me conscio (qui tamen in juventute mea istius studii maximus cultor fui, plurimisque cum Medicis præclaris familiaritatem contraxi, meque ex parte in us exercui, & adhuc data occasione & temporis opportunitate summopere oblector & recreo) a nullo descriptæ unquam. Inter alias, duas species tibi enarrabo, & quoad fieri potest describam, & futuro anno, si Deus vitam protogaverit, & valetudinem indulerit, ad vivum depictas & compactas, vel etiam, si possibile, recentes & vivas me misurum pronitto, quia hoc tempore haberi non possunt, cum disitis abhinc locis crescant, sexaginta circiter leucis, meque alia negotia impendant, quoniam illas afferri ad me jubeam nec enim libenter unicuique revelarem.

Prima species similis est apio risus, sed radices habet crassas & nodosas, iustar radicum seu raparum rothseldianarum. Si bestia, ut equus, vacca, bos, ovis, vel porcus illam devoret, (cujus tamen appetunt esum, unde rustici ubi hæc herba crescit, ista loca circum sepunt in quibus copiose luxuriat) statim moritur, & disrumpitur, venenum ejus quoque tam vehemens, ut avis si cadaver involet, pariter concidat confectum, & si inde repellatur, statim ex aëre decidat moriaturque hinc plantam incolæ hujus regionis appellant, *Syltenvebber*.

Alterius speciei hæc est historia gramen est, longis acutisque foliis instar iridis. Si eo pecudes vescantur, sicut de priori dictum, contringit & conterit illis statim omnia ossa, ita ut ossa fracta intra pellem circa bacillum circumvolvi possint, non statim tamen expirant, sed curari possunt. Si illis exhibeamus ossa contusa alterius alicujus bestie ex usu hujus herbe mortuæ. Hinc etiam incolæ sedulo provident, ut semper in promptu habeant hanc medicinam. Sape hanc plantam beatus Dn. Cancellarius Jan. Bieleke & ego habuimus, qui nomen ossifragi illi dedit & imposuit. Quando ad manus tuas pervenerit ipsa planta, de ea ulterius inquires, ejusque decemtem anatonem ipse suscipies. Christianæ 24. Augusti anno 1661.

Posthabita ergo ranunculi venenata species, contra illa graminis maxime meretur ejus ut hic loci habeatur ratio, quam Perillustri ac Generoso Heroi ac Dn. D. Jano Bieleke, Norvagiæ Regni quondam Cancellario dignissimo, eleganti mecastor, ingenioso & effectui illius convenienti vocabulo, Gramen ossifragum appellare alluivit: ceu qui peritissimus non literarum solum, sed insuper quoque res herbariæ ac medicæ erat: quin & ille, in utrisque his septem trionibus subjectis regnis, suam senectutem in seculo studii hoc seculo æque oblectavit, ac multis retro actis seculis Orientales sive Reges sive Reginas se oblectasse accepi: ushinc ego sequutus in comparabilis rerum naturalium indagatoris Athanasii Kircheri, & societate Jesu Concionatoris, aliorumque eruditorum vestigia, aut potius illecebrationes & observationes, scilicet, in terræ visceribus profundis in Norvagia delitescere vel

plumbum vel argentum vivum, ceu quorum minerales exhalationes, cum utraq; intellus nervis sint, jumenta veluti enervant, dum patcuntur hoc gramine ossifrago eo in tractu, ubi alma mater terra, veluti ex gremio suo, hoc genus graminis, in jugis uti hariolor, profert, ne ergo te, eruditissime Polyhistor, te compello Bartholine, amicorum intime, æque ac me ipsum pro re nata male habet, quod Nob. D. Georgius Reichvveim, verbulo non meminerit tractus istius Norvagiæ, ubi hoc graminis genus pubescit aut pullulat, sed solum ad me scribat loca illa circiter 60. miliaribus Christiana distare Dolendum sanè ob publica commoda, hunc prisca virtute & fide Virum, ocyus vitæ paulam fecisse suæ, quam in rem ea conferre posset, quæ in suis ad me datis literis mihi pollicitus est; adeo verum illud nostri Hippoc. occasionem præcipitem, ac pindari quoque illud; homines cotidie ceu arborum folia cadere. Quæ cum ita se habeant, jam nostrum est, ut pro re nata Christophorum Columbum imitemur. Qui sic inquires? ut enim ille ratione & sagaci conjectura, æterna sui laude Americam sive primus invenit, sive detexit, ita adderet graminis ossifragi subsidio, nondum detectas, sive plumbi, sive argenti vivi fodinas, in musæis nostris lucubrant, conjectura, ratione non cassa, indagare ac assequi, nox calamis nostris, Deo fortunante, dicta metalla veluti effodere. Etenim nullus dubito, cum aliquot exëplaria typis expressa hujus meæ epist. nomini ac honori tuo dicatæ, Christianiam, Bergas, Stavangriam, Nidrosiam aut Dronthemium, data in rem oportunitate, mittere meditari in Norvagia & præsertim celeberrimis his emporiis, distrahantur & divulgentur; Quin Reverendi Dn. Episcopi, Pastores, Verbi Divini Ministri, ac alii honesti Viri, passim in Nob. Septentrionali hoc Regno habitantes, ubi intellexerint, quam pervicaci studio ac opera contendam, alteri huic patriæ, in qua quidem educatus tuus & Celeberrime Bartholine, natus es, prodesse, nobiscum sagaciter loca illa indagare, aut requirere in istos tractus occipiant, ubi gramen ossifragum germinet; tibi vero amicissime Bartholine, Domine Collega, Affinis ac Compater honoratissime, cum plures eorum præ me, vel noti vel affinitate juncti sint, proin quæso te, publico hoc in negotio, tradamus operas mutuas, ego publicis his ad te datis literis, tu ad eos privatim dandis. Ego interim hic loci, prisicum aut more majorum, acclamo feliciter! &c.

Plura senis disertis & eruditis D. Simoni Pauli verba, in epistola parænetica publica legi possunt, quo Lectorem amando, ut ad ipsam rem veniam quam nos curare per amicitiam intimam pro publico bono publici amantissimi sategit.

Ne votis tanti Viri deessem, cum ille ad Episcopos Christianiensem & Nidrosiensem literas cum sua parænetica epistola mitteret, ego ad Episcopos Stavagriensem & Bergensem commissum negotium cum officiosis literis detuli, ut & per singulas Regni Norvagiæ dioceses exquiri sedulo posset, an in locis, ubi gramen ossifragum provenit, minera aliqua plumbi vel argenti vivi eruatur. Rei veritatē tempus aperiet, quo suspicio Magni Viri roboretur. Certe probabilitate non levi se tuetur, cum plerumque herbarum locorum suorum vim redoleant, & qualem ex terra succum trahunt

trahunt, talem vefcentibus præbeant, fibique allocient, apud Achillem latum elegans locus occurrit lib. 4. de Clitoph. & Leucip. Amor. de Eleph. ante bene olente quia vefcitur nigra rofa. Auctoris verba hæc funt latio donata: Indorum flos eft, quem nigram rofam vocant. Hæc elephantes vefcuntur, quemadmodum, gramine apud nos boves. Igitur a primo fere ortu pabulo ejufmodi nutrita belua cibo fimilem odorem reddit, halitusque odoratiflimum ab imo. ubi ei fpiritus, fons eft, efflat ~~et~~ hic defignari Dalmatius in notis docet per rofam nigram, quæ in India ex Græco nomine, folia funt, in Græcia flores nigri. Quale igitur alimentum, talis corporis habitus. Añio vefcentes Orientales, hircum olent. Venenatis herbis pallia puella, Alexandrum inti ere potuit. Purgantibus ufa nutritrix, lac purgativum exhibet. Romarino, thynno, aliisque odoratis herbis pallia oves in Provincia Narbonenfi fapidiffimas carnes nobis exhibuerunt. Infinita in eam rem exempla fuppetunt. Herbas denique ex terra visceribus imprægnatam notum, quam olim Martis lucus. Hinc uxor Aurelianenfes ex fuphureo fofo infames cum luco fuo ex menfa Regia exfulant. Vinum quoque affaticum glebæ luxgavitæ noxium calculofos efficit. Ne plura exempla afferam, fufficit, quia de mineralibus fermo eft, Pechlini, nuperi de purgantibus fcriptoris facundi, obfervatio, qui ex relatione Nicolai du Pont Medici Colonienfis, fcribit oftentatam fuiffe Lugduni Batavorum arboris particulam vivo oblitam mercurio: poffe quoque pellilentem affari auram a metallicis partibus ex eo conftare, quod in Polonia in graminum radices irrepere vivum, mercurium teftetur Beguinus, & in Dalmatia arborum truncis infillatam mobile metallum oculorum fe judicio agnoviffe teftentur Chymici. Simile quid in Norvvegia metallis fecunda pari poteft gramen Offiliagum, ut non tam offa pecudum, quam nervi, quibus mercurius vivus inimicus eft, afficiuntur, tendinesque contrahantur. Sunt, fafteor, etiam ex vegetabilium claffe, quæ offa emolliunt, folia nempe cicuta vefcentibus capropter exitiofa, hinc pro callo offis emolliendo tale remedium proponit Chalmereus l. 4. Enchirid. Chirurg. c.

℞. Fol. cicut. m. iv. f. decoct. pro fotu. Folia terantur cum axungia fuilla vel gallinacea, f. cataplasma poft fotum applicandum. An vero offa pecudum ab efu graminis offifragi ita emolliantur ut fragilia fint, ficut narrat Rejebvveimus, vel potius nervi debilitentur, quod vero fit mihi fimilius, & fufpicatur quoque experientiffimus nofter D. Simon Paulli, accuratiorum relationes, quas ex Norvvegia expectamus edocebunt. De his aliisque ad offifragum gramen fpectantibus dum follicitè cogitavimus, ecce veniorem graminis hiftoriam Bergis Norvvegorum ad Ampliffimum Virum D. Rothum, in Collegio Commercio affefforem bene peritum, Hafniam tranfmiffit Excellentiffimus Medicus D. Joh. Frid. Treublerus, amicus nofter, cujus Viri in Re Medica verfatiffimi, adeoque fide pleni relationem hic fubjungam, ut ab omnibus intelligatur, latina confuetudine donatam.

Mitto una caulem graminis defiderati in fru-

fta quod diffectum, ut anguftia epiftolæ caperetur, quod ruffici noftri (quorum non paucos hac de re examinavi) *Starrgras*, flores, aves jam amiſit, plenum ſeminibus a fine tantum immaturis. Locis paludolis & humidis creſcit inter alia dumeta prope omnes villas coloniarum. Primum gramen eft, quod vere prodit, unde avida funt pecora ad decerpendum, quam primum vero alia gramina copioſius prodierint, hoc gramen avitantur, totum propter cau. in duruſculum. Ex efu hujus pecora male habent; macie confecta, ſpina dormi extra protrudente, (unde ruffici dicunt), quod dormi ut factum,) pedibus offibusque debilitatis, ut a gravi me incedere queant. Quod autem proſus non olis nant offa, vix fieri poteſt, alioquin omnia animalia perirent, & nunt polternerentur. Pro antidoto ruffici ſemper habent exſiccata offa in promptu, quæ quotannis conſervant adhuc uſum, quando carne prius abraſa uſi ſunt, eadem quoque offa in plateis & adibus colligunt. quæ exſiccata in parva fructa contringunt, & mox ab animalibus magno appetitu in minima dentibus comminuta deorantur, unde quaſi ſiſtatio ſubſequitur, nuntumque æque ex ore proſiſt, ut ſtatim melius habeant pecora, & proſus convaleſcant. Aliqui pro remedio in pharmacopoliſ emunt radicem tormentillæ; plerique tamen & pene omnes offibus acquieſcunt. Videtur (quia ruffici rationem nullam dante ſciunt) quod pecora plerumque primo vere terra adhuc humoribus nimis ſæta, ex hoc gramine præcoei tantam in ſe humiditatem ſuperfluam ſorbeant & devorent, quæ deinde per offa exſiccari debet. Uniusque tamen ſuum relinquo judicium. Ad ſatiſfaciendum curioſorum animo, gramen hoc in particula terræ, in qua creſcit, ſervavi, & in vaſe collocari juſſi, idque juveni cuidam Paſtori Jano Danielis tradidi, cujus navicula in portu medio milliari hinc diſſito hæret Hafniam cogitans, adjunxique particulam geminis iplius in charta conſignatam, ut petitioni ſatiſfacere.

Tandem de gramine ad amicum laudatum perſcripſit Dn. Treublerus, magna cum ſama medicam Artem Bergis exercens, ut plenam ex illo graminis offifragi hiftoriam jam habemus, cui nihil addi poteſt, niſi uberior ſubterraneorum inveſtigatio, ut de mercurio vel plumbo forſan latente, certiores ſimus. Ex ſalvatione ſubſequente ſuſpicionem ſuam de mercurio conſirmari credit Dn. Simon Paulli. Quam tamen nimis graminis devorati humiditati aſcribit D. Treublerus, per offa exſiccata. Sola quidem humiditas horbz illa ſymptomata inducere non videtur, quæ patiuntur pecora, niſi alia maligna qualitas adjungatur ex quoquoque principio derivanda, quod dies docebit. Liguſam graminis integram, confeſci ex fruſtis à Treublero miſiſtis, & ex alijs non ita pridem mihi a Cl. D. Borrichio communicatis, accuratorem daturus cum ex condicio l. Treublerus vas miſerit integra herba terre ſup immerſa conſpicuum.

Idem D. Treublerus 14. Octobr. 1777, hæc poſito ad amicum laudatum ſcripſit: de gramine hoc tantum eſt ut dijeam, copioſum in omnibus villis reperiri, mihi quoque uſuiſſe duos & hurgos cum plantam hanc in menſa mea re-

ſiſſem

fuisse, qui existimabant esse Centaurium minus, affirmabantque diu pro ista herba se in usum suum traxisse nec exinde quidquam mali profuxisse. Unde non video ex gramine vel herba provenire damnum, sed ex humiditate, sicut antea dictum. *Idem ibidem.*

De Gramine Ossifrago.

Quæcunque de Gramine Ossifrago dici poterant in Actorum nostrorum Volum. II. absolvimus. Pauca hic residua commemorabimus. Comperimus exinde non in Norvegia tantum istam plantam provenire, sed in Cimbria quoque nostra luxuriare in locis paludosis, & sine ullo damno à jumentis consumi, ut credere fas sit plantæ hujus naturam, sicut aliarum, variare pro locorum diversitate & climatum conditione. Ingentem copiam exsiccatæ plantæ ad nos ex Cimbria nuper attulit Pharmacopæus Urbis peritissimus Christophorus Herford Senior, ut omnibus curiosis satisfaceret. Forma florum elegantissimorum eadem est, quam figura expressimus ad Observ. 43. Volum. II. nisi quod in acumen magis desinant, & densiores sint. Centaurium non male referunt colore saturato Experimentum decantatæ virtutis emolliendorum ossium frustra in brutis nostris tentativimus. Forſan in exsiccatæ plantæ, qualis ad nos delata fuit, cum sale volatili, vis exspiravit, quemadmodum in nonnullis aliis, ut ruta similibusque exsiccatis evenit.

Meminerunt Curiosi Parisienses in Diario Eruditorum, quod *Journal des Sçavans* vocant, Anni 1675. hujus plantæ ex nostris Actis, sed non satis mentem nostram videntur allecuri, digni tamen omni laude, quod tanto judicio seligant ex variorum scriptis quæ & prodesse possint & delectare curiosum Lectorem.

Ira vero illi pag. 192. §. 3. de nostra herba ex nostris Actis scribunt.

Ce qu'il dit (asc. Bartholin) d'une autre espece d'herbe qui vient aussi de la Norvegue, & qu'il appelle ossifragum est encore particulier. Car il assure que quand les chæns en ont mangé les os de leurs jambes semblent sortir de leur peau & ils ne peuvent marcher en cet état. Pour les guerir on leur donne des os secs & broyez; ce qui leur excite une grande salivation qui les guerit enfin. Est il croit qu'après cette guerison une vapeur mercurielle ou quelque autre vapeur maligne passe dans cette herbe.

H. e. Id quod narrat (Bartholinus) de alia specie herbæ ex Norvegia advectæ quam Ossifragam appellat, singulare quoque est. Nam ille affirmat si feles eam comedant, ossa pedis videri extrapellem prodire, ut nequeant tali statu incedere. Pro curatione illis exhiberi ossa siccata contrita, quibus salivatio succedit ingens qua tandem curentur. Creditque peracta hac curatione vaporem quendam mercurialem vel alium vaporem malignum transire in herbam hanc.

[Feles] De felibus quæ herbis non vescuntur, nihil dixi, sed aliis pecoribus animalibusque in pascuis herbas decerpere suetis.

[Ossa extra pellem] Ossa tantum debilitari usu herbæ scripti, ut ad incesum inhabiliora reddantur.

[Vaporem mercurialem] suspicio ingeniosa est D. Simonis Pauli. Vitiisum, ex hirones minerales seu plumbi seu argenti vivi in terræ visceribus profundis Norvegiæ forte delitescens, jumenta enervare. Quam salivatio conſtare videtur. Ante curationem hæc finit, neutiquam peracta curatione. An vero talis minera lateat in Norvegia ubi hæc herba crescit, necdum experientia constat. In Cimbria, ubi quoque uberius est ejus proventus, nulla minera observata, nec expropter illis symptomatibus infestantur pecora innoxie isto gramine vescuntur.

In cæteris Eruditi Parisienses rem acu tetigerunt.

De Gramine Ossifrago Appendix Ex Epistola Illustris & Magnifici Cancellarii Norvegiæ Job. Friderici Marschalch, Bergis scripta ad D. Simonem Pauli Medicum Regium.

Quindoquidem intellexi Te adhuc sollicitum esse de herba vel gramine, quod ex relatione beati Generalis Majoris Reichvini, ossa confringit animalium quæ eo vescuntur; inquisivi diligenter in illam rem, & tandem inveni gramen illud, quod in his regionibus appellatur Stur, cujus specimen mitto, forſan minus, quam pro naturali magnitudine, quod hujus anatrigori imputandum. Quando ætas calore suo graminis hujus flores protrulerit, vivis coloribus delineari curabo, captaboque occasionem commodam perfectiorem plantam Dn Doctori transmittendi. Alias intellexi feminas quæ pecus custodiunt & curant narrare bestias ossium dolores experiri quando eo gramine vescuntur, sanarique exhibitis ossibus contritis aliorum animalium, non enim audiui exhiberi illis ossa animalium eodem gramine occumbentium, sicut Reichvinus beatus scribit. Vale. *Idem ibidem.*

Anatomica inspectiones.

Vincentius Balduinus, Vir infractæ ætatis, vixit aliquandiu miserandum in modum, ob humeros intra annos quindecim quater extractum, quod paulatim increſcens, sive ex viscido contusi ossis succo, sive sanguine eo uberius affluente, in eam tandem devenit molem, ut nec pectus nec scapula immodicum ipsius pondus fuerit amplius ferendo, excitatis non solum maximis nervorum doloribus, verum etiam summa spiritus difficultate, ob luxurians pondus thoracis motum continenter impediens, cum indefatigabili vigilia. Quibus et febbris quo evaderet, ulus fuit consilio variorum Chirurgorum, quorum alii tumorem emolliere atque in pus convertere: alii contra luxuriam ipsius ardore fascia coercere: ac nonnulli viciatum os serrula præcidere adnixi fuere, sed omnes successu infelici: Venæ enim ac arteriæ huius tumoris latiores erant quam ut pollice humano potuissent obturari, ac promde magis impedimento quam auxilio facere facie: mortemque adeo non distulisset, quam maturasset amputatio improvide instituta.

Facto autem vivendi fine, docuit anatomie

omnia sub cute visci crassitiem ac steatomatis induit naturam, parumque discrepasse à materia veri canceri, cuius nomen fortassis propterea huic ossis vitio laud male inpositum ab indultrio Celso. Ipsa vero ossa erant non modo à se invicem sejungata, verum quasi malleo minutim contracta, ac præ irriguo madore adeo tenera, flaccida ac molliora, ut instar ceræ scalpello facillime conciderentur. *Tulpius observat. lib. 4. cap. 12.*

Strenuo militiæ duci globulus plumbeus à bombardâ hostili emissus utrumque os brachii sinistri prope carpum perfregit, & vulnere penetrante lauciavit brachium: Antequam pugna excederet, statim intolerabiles sentit dolores, qui frigore hyberno exaucti sunt, cum quatuor horas equitando in via impenderet, antequam in proximam civitatem delatus Chirurgi manus subiiceretur. Sedula opera in huiusmodi casu difficili adhiberi solita, non impedit gangrænam parti læsæ imminentem, quæ in externa manu & brachio se non prodit sanotum simulis. Sed cum intolerabili cruciatu interno interiora pervagabatur, & dolores sensim ad totum brachium & scapulam sinistram diffundebat, cum tumore, sed itrius quibusdam lividis sanguinis secundum brachii longitudinem ascendentibus: Ampliato demum vulnere, innissaque manu Chirurgus observavit interiora frigida & sphacelatam manum assistentes vidimus: cumque nihil in medicamentis spei amplius superesset, de manuum operatione cogitatum mature fuit, ipso etiam viro generoso urgente, ne serperet ulterius malum, quod interne latius protensum videbatur: Quamquam vero parum profuturam membri læsi amputationem iudicaremus, anceps tamen remedium cum prognostico dubio experiri statuimus.

Brachium medium ferrâ resectum prognosticon omnino confirmavit: Primo quippe copiosus ichor flavus effluxit ex musculorum in cistitis, cui tandem sanguis successit ex vasis suis, qui facile aqua styptica coarctat: Septimo hæc die peragebantur, & eodem circa vespere exspiravit æger.

In amputato brachio vulneris conditionem interiori rimati, vidimus ulnam fractam, & læsum quoque radii, fragmenta ossium tendinibus musculorum manus incumbentia & velliantia, amplum hiatum fœtentem, sphacelata omnia.

Dolorum magnitudo ex tendinum punctura ab osse fracto & aculeatis ejus frustulis, nec non p. lis in vulnere latentibus, à tunica pellicea sine dubio abrasis, repetenda est: Sphacelus vero à venenati globuli ictu ortus, siue veneficam qualitatem naturæ suæ debeat globulus à nitrato pulvere protrusus, sicut plurimis persuasum: siue globulus iste fatalis veneno per artem fuerit imbutus. Hisce sane vulneribus, præsertim in nervosis partibus, malignitas fere semper conjungitur, quod ex partium affectarum decoloratione, mortificatione, leipothymus, & celeri fato colligimus: imo febris in nostro ægro vel nulla vel exigua, mente sibi semper ad extremum spiritum constante: Ex observatione *Plazzoni* de Vulner. sclop. cap. 30. Vunus à sclopeto una cum ossis fractura illatum, si minutum sit, certissimum genus

fracturæ existit: Nam carnosæ & nervosæ substantiæ non solum à qualitate venefica, ultione, contusione & attritione læditur, sed etiam propter ossis fracturam partes magnopere alterantur, hinc & vehementes inflammationes, dolores, convulsiones & gangræna oriuntur, quæ omnia ut plurimum mortem ipsam inducunt: à convulsione tamen noster æger immunis fuit. Cæterum de globulo veneno imbuto magna nobis oborta suspicio, quia statim ab ictu accepto de immodico dolore conquestus fuerat, strenuus Dux & miles, & cito ad cor penetravit mali vis: Variis tingi solet, etiam succo allii, ne vulnera admittant curationem. Globulus nobis visus, infortunii causa, aliquod monitri videbatur alere: Incisuris enim multis distinguebatur, arte factis, quo fine nescio, certe non bono: uni incisuræ adhærebat frustulum ossis, ab ulna fracta fragmentum. Ichor vero ille flavus copiose ex brachii amputati trunco stillans infectarum partium argumentum erat & putredini vicinarum: digito compescere voluit Chirurgus, sed eo remoto fontis instar prorupit serum; Et tale quoque ex vulnere sclopeti, puris loco, stillabat; Quicquid sit, ex levi, ut videbatur vulnere, sed lethali, magna tragœdia excitata: Lethalissima verò hæc vulnera globulorum pronuntiant artis periti, quod non solum nervosæ partes solvantur sed & lacerentur, & affectio non tantum cerebro communicetur, ratione vulneris, sed quod magis est, ratione nervorum venefica qualitas immediate cerebro communicari potest & ægri subito interficere: Non vero per nervos solos cerebrum inficitur, sed per vasa sanguinea, hic quoque affecta, cor ipsum infestatur. Hinc in nostro ægro leipothymix anxietatesque frequentes, & ad ultimam halitum recurrentes observatæ, nec cerebrum læsum ex actionibus apparuit. Forsan nisi satum præcipitasset cor affectum, etiam ad cerebrum serpendo penetrasset venenatus vapor. *J. Barbo. linus in Actis Medicis annor. 1674-75-76.*

Anno 1629. sub finem Martii, visitavimus mortuum ex vulnere femoris cum omnimoda ossis fractura. Invenimus os etsi pessime repositum, ex parte tamen coaluisse: Maxima & acutissima ossium fragmina in vulnere relicta, ad minimum corporis motum dolores læso summos concitabant, novamque movebant hæmorrhagiam, unde post longam atrophiam, gangræna totum crus occupante, septimo à vulnere mense mortuus est. *H. ab Heers observ. Medec. xxii.*

Lites sequuntur ingentes, Chirurgi enim ex vulnere mortuum testabantur: Negabant Medici dicentes à perito artis curari potuisse, nec ullum vitæ, sed claudicationis periculum adire potuisse: Ego arbiter à Dom. Scabinis adhibitus, misi ex tempore qui Hippocr. meum afferret, statimque exhibui textum qui est l. i. de morb. sect. 5. Hæc autem cum sunt ex necessitate contingunt, in vulneribus quidem si crassi nervi, & musculorum capita in femoribus præsertim vulnus acceperint, necessaria est claudicatio: Moritur etiam si quis vulneratum habet cerebrum, aut spinalem medullam, aut jecur, aut septum transversum, aut vesicam, aut Venam multum sanguinem effundentem,

aut

sut Cor, Ex vulneribus autem minime mori contingit, si his partibus vulnus acceptum non fuerit. Hæc verba omni luce clariora quoniam Legulei literarum aucupes torturi sunt, tempus nos docebit. *Idem ibidem.*

Obiit puer annorum 12. in Xenodochio Basiliensi 20. Augusti 1673. qui saltando fregerat femur, in quo fissura, facta, Per biduum magno tamen dolore, scalas descendit & ascendit: Non observata fractura, à quodam Mago male curatus: Tandem Chirurgus accersito, omnia semper in pejus ivere, ut pure collecto febris accesserit lenta; hinc cacochymia, defluxiones ad partem debilem, os ilchii & caput femoris, non sine magno dolore; Tandem luxato osse femoris ex acetabulo, & facto ulcere paulo infra trochanterem majorem, dolor mitigatus est: febre non cessante, & materia purulenta in femore multiplicata, tandem obiit.

Secus fuit à D. D. Glafero, qui ulcus sordidum deprehendit, & secundum ductum vasorum & interstitia musculorum cavitatem magnam, ut & musculos ab osse femoris omnino separatos; In hac cavitate ingens puris copia visa est, quæ à genu, ubi primo tumorem fecit, premendo, ad ulcus ascendit, nec substitit prope genu, sed protraxit se secundum ductum nervorum, & musculorum interstitia ad talum usque, ubi etiam humor & pus observabatur: separatis à femoris osse cute & musculis, fissuram ossis deprehendimus, secundum longitudinem simul & transversum, ut in margine patet: muscoli omnes laxi ex humoribus madefacti erant, imprimis nates constituentes: in acetabulo erat mucosa substantia indurefcens: prope genu sub patella similis mucus erat: In mo ventre nullum ingens malum inventum est, nisi quod à cacochymia viscera essent debilitata & pallidiora, alias in statu naturali plane consistebant. *Ex communicatione D. D. Io. Georgii Adami goldi Basiliensis, in D. Boneti Sepulchreio.*

Hinc ratio datur totius morbi, hic puer hinc inde petulenter saltans fregit os unde de repente ingens dolor oboriebatur; domum redux intolerabilem dolorem sentit, reticens saltem, per biduum tamen adhuc (quoniam erat fissura, & dimidia pars ossis consistebat) per scalas ascendit & descendit, sed tantum extremis digitis pedis (qui dexter fuit) innixus; Modo decumbebat modo non, dolore interim continuante, tertioque die adeo intensus est, ut fere amplius consistere non posset, propter solutam unitatem periostii & tendinum puncturam ab osse fracto: Ob istum motum autem fissura se magis dilatavit, & musculos pressit punxitque, unde motus læsiõ & genu incurvatio, quod muscoli genui flectentes affecti essent ab osse fractio. Quoniam autem fractura non esset nota, & parentes putassent puero à sagâ mali quid accidisse, accusarunt sagum, qui talia sanare profitebatur, sed hic nil profecit cum malum ignoret: adhibuit sue sortis remedia & malum auxit, si quidem in genu genu & totum femur usque ad caput femoris, nec dolor mitigatus est. Tandem frustra accersito. Chirurgus perito, nomine Schwartz, pure jam preloante, dolore aliquatenus mitigato, (nam pure factio omnia iustiora sunt) & præsentē febre lenta,

à materia purulenta excitata, ulcus factum est à natura paulo infra trochanterem majorem, unde puris copia quotidie evacuabatur hinc tumor prope genu, & dolor plane incepit evanescere, sed diuturnitate temporis, & imbecillitate corporis secundum muculos & vasa, pes infra genu ad talum huc intumescere cepit; propter copiam puris ulcus toto reliquo tempore apertum servabatur; à pure musculi ab osse separabantur & semiputridi erant, quod femur esset fractum, ideo externus tangendo apparuit duplex os esse, aut instat ossis quædam materia juxta tendines musculorumque ortas: Interim cacochymia orta fluxiones ad partem debilem fiebant, hinc musculi laxi, & tandem luxatum est caput femoris ex acetabulo; Interim febre omnino consumptus & emaciatus tandem obiit. *Idem ibidem.*

Dominus Marchandus, Jurisconsultus Parisiensis, passus est defluxionem in genu articulum toto octimestri ipsi molestant, quæ de causa usus est opera plurimorum tum Medicorum tum Chirurgorum, at sine fractu, quod malum ab osse duceret originem: Dum quadam die in lecto de latere in latus se convolveret effræctum illi est os tibiae juxta genu, morte paulo post subsequuta.

Apertum fuit Femur, repertaque fuit fractura & separatio apophysis ossis illius, quod carie & putredine infectum erat, quanquam lue nunquam laborasset. Ideoque recte ab antiquis traditum ossa triplici morborum genere affici posse, Intemperiei, compositionis & solutæ unitatis.

Notent Tyrones ossium apophyses sæpe divelli, quod luxationis quoddam genus est vix sanabilis, teste Columbo Anat. cap. 2. quod ejusmodi ossium conjunctio & coaptatio non hæc ossis nudo capite acetabulum subeunte, sed pluribus tuberculis totidem sinus subintrantibus, ejusmodi reductio difficilissima est, à causa interna vel externa: externa, quandoque Chirurgi errore; interna humoribus quibusdam illaplis in quempiam articulum, inibique retentis; quod in lue Venerea & Variolis sæpenumero accidere videmus, vel ob alium aliquem humorem lue non inquinatum, quod accidit prædicto Jurisconsulto, *Parvus Operum lib. 15. cap. 21.*

In Fracturis ut aliorum ossium, ita & femoris curandis sæpe vitia advertuntur, primo in figura, deinde in callo: In figura, dum non rite extenditur, conformatur, deligatur, deponitur. In Callo, dum ille sit nodosus; ubi conjungitur, & monitroso callo, qui insigni eminentia nodis in arborum ramis subinde comparentibus respondet; similis est. Talis monitrosus callus apparebat in utroque femore Pilæ magistri aulici lusoriz.

Eo forte suffocato, & post anatomen cocto ad sceleti structuram, uterque ab invicem abscedebat callus. *Rosinus Dissertat. Anat. lib. 2. cap. 49.*

Scriba rusticus cum Norrvagiam, sylvis asperimis collibus & montibus horridam, e quo circumiret, procul Bergis lapsu graviore Fracturam tibiae sinistrae passus dolores sentit gravissimos: Vicini rustici hominem miserum hospitio exceperunt, & pedem fractum sine ex-

tenione instrumento ligneo excavato firmiter incluserunt, summaque cum diligentia oleo ex cineribus inunxerunt; Hunc in modum lecto affixus inter rusticos annum complevit, & tandem magna cum difficultate ex Septentrione Bergas delatus fuit, Ad consilium vocatus Medicus, deprehendit os tibiæ cum fibula esse fractum, quinque digitorum latitudine supra malleolum, ita ut pars tibiæ inferior fracta, cum parte superiori callo ad latus firmissime connexa fuerit, latitudine trium digitorum, fibula autem fracta inferior nusquam firmata in musculis oberraret, ut moto pede exacte sentiri posset: ob callum firmiorem extensionem nullam fieri prædixi, at rogatu amicorum instrumentum efformavit, quo utrumque os in diversa trahebatur, sed frustra conatu, cum cutis sola eo usque extenderetur, ut jam dirumpi videretur, illa præsertim in parte, cui extuberantia ossis superioris fracti adnectebatur, Ideoque & hoc in loco, & alibi, vulnus metuendum esse adstantibus monstravit, iussitque ut Chirurgi instrumentum remitterent, quia nec æger amplius perferre posset: Inflammatio statim oborta, cui sedandæ externa applicabantur, & ad doloris mitigationem interna propinabantur: Igitur abscissionem pedis suavit Medici, ut ad officium e lecto rediret; sed æger acerbius credens mutilari quam extinguui, maluit, persuasus quorundam agyrtarum blanditiis, ut instar ossis fracti, jamque in suum locum repositi, pars deligaretur tortioribus adstringentibus, atque emplastro catagmatico, quod absque ulla ratione, aut consensu Medici, approbarunt Chirurgi, unde dolores fere intolerabiles cum tumore novo surrexere: Quibus nihil proficientibus, sero æger à doloris acerbitate & longo decubitu fere insanus, tibiæ magis amissionem optabat quam cruciatus diuturniores: Die itaque 5. Martii 1655, operatio commissa est Chirurgo peritissimo, qui, carne prius ad os incisa, nudatum os feliciter abscidit.

Peractis deinde peragendis, Dissecti membri cutem cum musculis aperuit Medicus, calli formam lustraturus: Ossa tibiæ fracta tanta firmitudine connexa erant, ut parvo cultello dissolvere nequiverit: Ossiculum autem acutissimum cuticula adhærebat tenuissima ossi inferiori: Fibulæ ossa fracta nullo modo conjungebantur, id quod ex commotione persentiebatur antequam essent rescissa; Inferior pars ossis tibiæ, ubi quædam cavitas conspiciebatur, nigricabat & sphacelum minitabatur: Optime inde convaluit æger & artificioso pede amissi damnum compensat. *Th. Bartholinus cent. 3. Histor. 85.*

Nob. quidam Pomeranus annos 44. natus, circa solstitium hybernium anni 1594. gravissimis in dextro humero, nullo vel tumore vel qualitate p. n. affecto, doloribus, nocturno potissimum tempore torquebatur: Quorum leniendorum causa primum Tonsoris cujusdam opera usus est, qui neglecta morbi causa, parti affectæ multis septimanis medicamenta calida attrahentia & exulcerantia applicavit: Sed magis subinde auditis doloribus, & succedente insuper femoris dextri dolore, à me consilium

petiit: U. inquit tum erant aquosæ & crudæ, appetitus mediocris, mens integra, vires tantæ ut interdiu cum doloribus remitterent, in arca domus obambulare posset, Et si vero ipsi convenientia quædam remedia adhibebam, tamen parum aut nihil profeci. Cum post me aliorum quoque Medicorum auxilium frustra expertus esset, omnem deinceps recuperandæ valetudinis spem abiecit: Porro Dominica Exaudi anni 1594. matutino tempore e lecto in sellam sublatus, maximo tremore & concussione totius corporis oppressus, eoque simulæ lectum repeteret iterum relevatus est: Eadem die circa vespertam doloribus femoris ingravescens, contenta voce exclamare cepit halt! halt! halt! Uxor itaque ipsius ad eum in lecto decubentem accurrens, femur affectum utraque manu comprehendit; idque media parte introrsum, versus sinistram pedem subito inflecti atque incurvari sensit, sic ut genu dextri pedis inguen sinistram respiceret: Visa tum est ægro arbor in pedem decidere, ejusque casu, in quo se manifestum fragorem percipisse aiebat, confringi. Cumque uxor & alii eadem cum ægro opinione essent, ac femur plane contractum esse arbitrantur, sequenti die Chirurgum pro curatione accersiverunt, qui affectum locum diligentissime inspiciens atque contrectans, præter inflexionem, quæ postmodum in dies magis magisque aucta est, nullum vel fracturæ vel tumoris p. n. indicium in eo deprehendere potuit. Hanc femoris inflexionem octo diebus antecesserunt, & toridem etiam consequutæ sunt urinx cruentæ, quæ tamen postea ad naturalem statum redierunt: Ratio quoque circa illud tempus ut plurimum turbata fuit, vires prostratæ, dejectio appertius: Facta inflexione, æger cruciatus in femore sensit intolerabiles ut se loco dimoveri non pateretur, sed quinque septimanis continuis in loco immotus jaceret, donec tandem ipsa solstitii æstivi die vitam cum morte commutaret.

Mortuo ægro femur incurvatum nullo negotio extendi atque in pristinum statum reduci potuit, ac tum demum fractura, media ipsius regione, se conspiciendam exhibuit, commissura partium fracti ossis adeo æquali ac si setra esset incisum: Similis fractura mortuo jam ægro, in medio quoque ossis humeri dextri deprehensa est, cujus tamen nullum ipso adhuc vivente vestigium animadverti potuit, & semihora ante obitum amici adstantes utrumque brachium citra omnem difficultatem ab ægro elevari atque extendi videbant. *Jacobus Seidelius observat. Medec. vi.*

Ossis femoris caries ac fractura.

Jurisconsultus de tumore dextri genu querebatur cum dolore ingenti: hocce morbo octa mensibus affligitur. Ad se interim doctissimos Medicos ac Chirurgos vocat, sed nihil auxilii attulerunt. Postea cum lecto decumbebat, ac de latere in latus se vertebat, os femoris in duas partes prope genu diffractum est, & brevi post obiit.

Post mortem femur aperiebatur, ejusque os in duas partes, circa genuum apophyses disruptum cum carie inventum fuit.

Pruden-

Prudentissimus vir circa genu ex obstru-
ne vasculorum quorundam tumorem habuit; li-
quor obstruens acidus factus periosteum corro-
dit, unde gravissimus dolor; corrodemdo tan-
dem ipsum os invasit, idemque totum carie us-
que ad intima consumpsit; cum jam consultissi-
mus vir se de latere in latusolvebat, non dif-
ficile fuit concipere, id præ corporis onere,
quod sæpe femori innititur, in partes duas ru-
puit. *Stephanus Blancard. in Anatom. Præf.*

Fractura brachii à globulo scelopetari.

Nobilis quidam per os brachii scelopetari glo-
bulo ictus. Vulnere accommodato, sine dolo-
re tumore aut inflammatione se primis viginti
diebus bene habuit. Postea febre vehementissi-
ma correptus: trigesimo die obiit.

Exenterato cadavere pulmones putridi, &
schirrolitibus duris pleni. Ren dexter ulcera-
tus cujus purulenta in velicam deposita.

Liquet in hoc nobili morbi causam lincæis
oculis latitare; non enim vulnere obiit, sed à
malo interno. Multa sacro involuero tecta ja-
cent, neque ullis mortalibus omnia scire fas est.
Inest namque sæpe in incredibili verum, & in
versissimi mendacium. *Idem ibidem.*

TRENVM PENIS BREVIUS

Vid.

PENIS MORBI.

FVLGINE ICTI.

Vid.

COMBUSTIO.

FUNGUS.

Fungus est mollis excrecentia, sensim in-
crementum capiens ex dilatatione aut la-
ceratione membranarum, & circa has colle-
ctis & evasatis succis, imprimis nutritio, & ut
plurimum circa articulos oborta.

Ut plurimum circa articulos apparent fungi,
& membranis radicatus inhaerere solent. In ge-
nu sæpissime apparent ejusmodi tumores, & dum
hæc scribo infans trium annorum & juvenis 10.
annorum iisdem affecti mihi curandi ostereban-
tur.

Per se patet hujusce morbi diagnosi, nam
excrecentia fungosa facile in visum nostrum in-
currunt, & ex tractu ab aliis haud difficulter
diagnosci possunt, cum substantiam habeant
spongiosam; mollem atque albicantem & im-
presso digito nulla remaneat fovea, nec ægri
magnum inde percipiunt dolorem. Ut pluri-
mum verò incrementum capiunt, & circa arti-
culos observantur, imprimis circa genu, &
molam seu patellam, hinc genu loco suo sæpe
adeo dimovetur, ut extensioni seu deambula-
tioni obstat pedemque ad ambulandum faciat
ineptum. Cum tamen & alie partes carnosiores
non sint ab iis immunes, sed membranis quibus-
cunque inhaerere queant, & a vulneratione mem-
branæ cranii fungum enatum non ita pridem in
milite observavimus. Fungosi hi tumores limi-

les sunt strumis glandularum.

Fungi ut plurimum circa articulos oborti
sunt ex violenta distensione, dilatatione ac
laceratione membranarum, vel ex luxatione
violenta hbrarum tendinosarum, hincque effluit
succus nutritius & quidem in maxima copia,
ex quo caro mollis, rara & luxurians squamosa
generatur, quæ dicitur fungus, qui ut plurimum
post vulnera membranarum emergere solet;
quod si accedat aciescentia & corollio, fungi
exoriuntur cancroli.

Prognosis quod concernit, fungi sæpe etiam
per plures annos afficiunt homines, sed præter
incommodum & dolorem: nisi si contingant in
articulis, motum ac sensum, premendo ner-
uos, aliquo modo tollunt. Ob stagnationem
vero diuturnam succus acrior redditur, qui fa-
cile tumorem cancrorum producere potest.
Corpus quoque ad tabem disponunt omni succo
nutritio in fungo deperdito. Aliquando malum
hoc lethale est.

Quod dixam refert, ista eo dirigenda, ut
succis rite constituti absque ruptione tubulorum
circulentur, in quem finem aer eligatur calidus
ac temperatus. Frigidus vero admodum nocet,
quoniam incrassat succos nostros, transpiratio-
nemque impedit. Alimenta sint facili digestio-
nis, exulent acida, acria, salina, muriatica,
corrosiva, exinde enim succus nutritius pesti-
mus partibus affertur, & sic ruptione tubulorum,
& evasatio succi nutritii facile produci potest.
Potus sit calidus, imprimis potus theæ, vel
coffæ, vel succolad. vel vinum Gallic. Hispan.
aliudque non acidum. Vinum enim Rhenanum,
Franconicum, imo ipsum sæpe Mosellarum, qua-
tenus acido & tartaro abundant, coagulando
succos maxime nocent; eligatur potius cerevi-
sia tenuis rite defæcata, & herbis volatilibus
ac aromaticis maritata. Vigiliæ & somnus, item
motus & quies sint moderata, & modum solen-
nem haud excedant, motus enim nimius, si
mox à pastu sit, chylum crudum & cum impu-
ritatibus per alvum expellendis, permistum, in
sanguinem pellitur, quies vero immodica, ut
est vita sedentaria, quam experiuntur factores,
nocet, quibus propterea verrucæ fungosique
tumores familiares sunt. Animus sit hilaris nul-
lis passionibus obnoxius. Animi enim passionibus
vehementiores, ad affectus hos excitandos an-
sam dare possunt, quæ fulminum instar sangui-
nem percutiunt, & inter ea potissimum quæ spi-
ritus figunt, debitam eorum ex cerebro in
partes subjectas emanationem sanguinis ac suc-
corum circulationem impediunt, & per conse-
quens succis crassatis ac acidis, imprimis nutri-
tio, corrigendis anam præbent; cujusmodi
sunt tristitia, maror, curæ immodicæ, odium,
terror &c.

Fungi curatio difficilis est, eo autem strenue
incumbendum, ut obstructions referentur &
evasatio succi nutritii ante omnia impediatur;
quod obtinere possumus, si particulae acres,
seindentes, ac corrosdentes, e succo nutritio
elimincentur, in quem finem conducant interna
sudorifera, & pro re nata interna laxantia
mercurialia. v. g.

℞. Rad. scabios. enulz camp. ana ꝑ. s. far-
sæpar. ꝑ. iij. herb. scord. fumar. nummular. ve-
ron. scolopendr. ceterach ana M. s. flor. sambu-

buci p. ij. hyperic. p. i. rasur. santal. citr. 3vi. saffair. 3b. guaiac 3ij. cortic. ejusdem 3iij. vitr. mart. 3j. f. l. tart. 3ij. sem. dauci 3ß. M. pro mensura 1ß. vini. Dem exhibeantur Tinct. antimon. tartaris. essent. viperar. essent. lignorum, aliaque. Chalybeata hic præcipue egregia sunt, nodulo propterea includenda, & potui ordinario indenda.

Cura autem præsertim externis præagitur topicis. Theriaz præ aliis conducunt, in quem suum artificiales facile parari possunt. Sæpe etiam id ferrum est accedendum & exscindendum est fungus in casu ubi inclinatur ad cancerum, & cum hoc sit periculosum, pro partis affectu ratione, pulveribus acidum temperantibus incrementum ejus quantum possibile impediendum, in quem scopum conducunt omnes pulveres ex sale saturni, camphor. calce viva, tuthia, lapide calaminari, myrrh. succin. thure. C. C. ulso parati. Spongiosis his tumoribus item inspergi possunt, vitriol. alum. instum, vel pulvis ex aristoloch. rotund. calam. aromat. caryoph. concinnatus. Applicetur etiam spir. matricialis, oliban. cum calce viva, imò instituantur varia suffumigia ex succino, sabin. oliban. mastiche &c. Vel ex herbis sale volatili gaudentibus parentur fotus, cataplasmata, & calide fungosis imponantur tumoribus. Nec negligenda sunt emplastra optime resolventia, ut sunt emplastrum de thea, divin. de labdan. de ran. cum mercur. & vitriol. albò parat. vel cataplasma egregium ex cucumere alinino, limac. rubr. coctis in vin. gallic. addendo pulver. rad. jalapp. & bryon. f. q. Emplastr. de cicuta & de cunino itidem conducunt. Frequenter tumores hi non deligandi, nec, quod Chirurgis notandum, aperiendi sunt, hinc etiam à cauteriis abstinendum est, quare ex hujusmodi tumore improvide aperito mors sequuta est. *Iob. Dolani in Encyclopædia Chirurgic. rationali.*

Quemadmodum in stirpibus arborum humores semiputridi per corticem extuberantes in fungos coalescunt: Sic fracta exemptaque portione aliqua cranii. ac dura matre lassa, statim humores cerebri circa plagam affluunt, qui sive ossis (ut Alexander Aphrodisæus voluit) sive aeris frigidityte condensati instar fungi concrevunt, atque interdum adeò intumescunt, ut extra cranium per foramen terebra factum emineant. Affectus autem ille Galen. lib. 1. de loc. affect. & 3. epidem. fungus ex similitudine nuncupatur: est enim caro mollis, levis, pallida & spongiosa, quæ quidem cito excrescit, lento vero pede retrocedit. Potest & ex flatu procreari. Si enim calor cerebri imbecillus factus in materiam quæ circa vulnus collecta est, aliquid agere intendit, flatum procreat, qui cum per tenuem meningem expirare nequeat, eam in altum elevat. Observavi enim hæcenus in his qui fungis affecti mihi occurrerunt, tenuem meningem, ut plurimum integram, crassam autem disruptam fuisse. Crassa enim disrupta, factaque digestionem vulneris, natura statim incipit carnem supra tenuem meningem generare, quæ loco tegumenti incumbit, ne ex aeris injuria nocumtum contrahat. Si namque humores copiosi, aut flatu circa plagam colliguntur tenuem membranam simul cum adnata carne facile, instar fungi, in altum eleventur.

quia caro est mollis, & radix subnixa, fungi itar, superne latior, inferne tenuior. Augetur vero & decrescit pro materia affluentis copia, & chirurgiarum incrementum intercipientis. Fæcet valde hæc caro: vulgo sicum sancti Hiacini nuncupant, qui Galeni sententia partium quibus adnascitur naturam & conditionem redolet; quanquam in genere; sic de natura verrucarum malignarum.

Ad ejusmodi fungorum profligationem admoventur remedia quibus specificæ facultas insit absumenda carnis superflua, qualia sunt quæ validius exsiccant, & blandius atterunt & exedunt, quale est quod sequitur.

℞. Sabin. 3ij. ochræ 3j. pulveriscentur simul & aspergatur caro exercecens.

Vel, ℞. hermodact. combust. 3ß. fiat pulvis in eundem usum.

Vel, ℞. Fol. & flor. beton. & chamæm. melil. rosar. summit. major. rosar. an. Mj. cm. anis. & fenugr. ana 3j. incidantur & contundantur pro fotu. Harum herbarum q. s. indatur sacculo ejus magnitudinis, ut mediam tere partem capitis cooperiat, qui hlo intertextus coquatur in vini & aq. comm. partibus æqualibus, & applicetur calidè. Post fotum abstergendum est caput linteis calidis, deinde sequentem pulverem insperge fungo, atque toti vulnere.

℞. Rad. caryoph. angel. calam. arom. ana 3ß. rad. aristol. rot. ireos Flor. lign. guajaci an. 3ij. flor. saly. summit. major & ros. mar. ana p. i. f. omnium pulvis subtilissimus.

℞. Emplastr. de beton. 3iij. gum. elemn. dissol. in aceto rosar. 3j. pulver. ros. rubr. myrtill. ana 3j. mastic. calam. aromat. ana 3ß. olei rosar. q. s. f. emplastrum. Quod si ejusmodi caro fungosa, eo ut sæpe fit incrementi veniat, ut ovi magnitudinem æquet, quam proximè radicem serico filo ligabis & contringes arctius, cumque vi contractionis decidit, commemoratis pulvisculis asperges. Sic etiam certius quàm acrioribus catharteticis profligatur. *Iob. Vigierius in Chirurgia sua magna.*

Observationes.

Ex fungo cranii mors.

Cosmus Slotanus, Chirurgus præstantissimus Juvenem nobili familia natum, cui cranium fractum, portioque ejus quædam exempta fuit, unde fungus exortus, curandum habuit. Ille ab omni propemodum periculo levato ægro, & sedatis symptomatibus a curatione continuanda desistere coactus fuit, quod auam Principis sui sequeretur. Barbitomor cui erat demandata, contempto consilio & medicamentis Slotani, nullaq; habita ratione loci affecti pulverem aluminis & vitrioli utri insperxit fungo. Inde exortis statim dolore vehementissimo, febre accurissima, delirio & inflammatione, paucis post diebus mors subsequuta est. *Hildanus in Observ. Chirurgicis.*

Legitima fungicatio.

Anno 1601. 9. februarii Dom. Francisci Crose- rani Lustriacensis Petri et æt. tribuni natus, Petrus nomine, 14. annos natus, vulnus ex casu lapidis, ex alto diruti (cujus pondo librarum duodecim cum uncis decem) in dextro bregmate cum insigni cranio fractura accepit. Ego ad curationem vocatus, puerum invenio tunc loque-

loquela, visu, auditu, & ut breviter, dicam, semianimum. Vomitus aderat vehemens & continuus, & sanguinem eiciebat, tum per os, & nares, tum etiam per aures. Abrasis crinibus, dilatatoque vulnere, impressum cranium altius in substantiam cerebri & duram matrem disruptam, conspiciebamus. Exemptis eadem nocte crani fragmentis, curationem aggredior, prout necessitas urgebat. Et quamvis gravissima essent symptomata, ita ut de recuperanda sanitate parum superesset spei, tandem nihilominus paulatim & ante vigesimum diem, morbi ex toto fere remiserunt. Pars quoque dura matris ab impresso cranio disrupta, sensim naturæ & medicamentorum beneficio frustratim excidit, ita ut sperabamus jam procul abesse a periculo. Sed elapso vigesimo die morbi, ecce novum malum, exortus enim est e vulnere fungus insignis qui intra viginti quatuor horas ita excrevit ut magnitudine oui gallinacei extra cranium emineret, quem divino favore infra scriptis medicamentis feliciter persanavi.

In principio, deinde alternis, ac tandem tertio quoque die, sequens enema injeci.

℞. Radicum & foliorum altheæ, malvarum, Parietariæ, mercurialis, florum Chamomill. Meliloti, florum & foliorum betonicæ ana m. f. sem. fenigræci, lini, anisi ana ʒi.

Coquantur in aqua ad consumptionem tertie partis, in lb. j. colaturæ dissolue benedictæ laxat. & hiez picæ compositæ an ʒij. Vitellum oui, salis p. Ol. chamomillæ ʒij. misce fiat enema. Bis vero in die fomentationem sequentem vulneri applicui.

℞. Foliorum & florum betonicæ, salviæ, chamomill. meliloti, rosarum, summitatum majoranæ, rosmarini ana m. j. sem. anisi & fenigræci ana ʒi. Incidantur & contundantur pro foru. Harum herbarum q. s. indatur sacco ejus magnitudinis ut mediam fere partem capitis cooperiat, qui filo intertextus, coquatur in vini & aquæ communis partibus æqualibus, & applicetur calide, post totum diligenter abstergendum est caput linteis calidis, deinde sequentem pulverem inspersi fungo atque toti vulneri.

℞. Radicum gariophyllat, Angelicæ, calami aromatici ana ʒs. Rad. arist. rotund. Iridis florent. ligni guajaci ana ʒij. florum salviæ, summitatum majoran. rosmarini ana p. i. fiat omnium pulvis tenuissimus; deinde sequens emplastrum applicui.

℞. Emplastri de betonica ʒiij. Gummi elemi dissolut. in oleo rosaceo ʒi. pulver. rosarum, myrtillorum ana ʒj. masticis, calami aromatici ana ʒi. cum ʒ. q. ol. rosacei fiat emplastrum.

Hic fungus paulatim & intra quatuordecim dies subsidit. Ossicula quoque quæ cum aliis prima nocte extrahi non potuerant exierunt ita ut intra hebdomadas decem plenissime convalesceret. *Fabric. Hildanus observ. Chirurgi.*

Facis in observationibus tuis Chirurgicis mentionem fungorum, & læsis men. branis cerebri, ex humoribus ad locum affectum affluentibus eos nasci doces. Quæ & aliorum Chirurgorum est sententia, ubi in mentem mihi hoc incidit dubium: An solum membranæ cerebri affectis generentur fungi? Faciunt quidem, ut vides, Medici solum fungorum in vulneribus ca-

pitris mentionem: sed in aliis quoque partibus fungos nasci posse, hæc duæ persuadere videntur historię, quæ superioribus annis, dum hic Wittebergæ Medicinæ operam darem, acciderunt. Prior hæc est. Puer quidam annos natus circiter decem, ex læsâ pedem sinistram ad terram vehementius allisit, atque in planta e regione minimi digiti, læsit. Hinc tumor primo supra malleolum externum conspectus fuit, qui à Rustico quodam imperito (forsan luxationis alicujus reponendæ gratia, adhibito) postea deorsum pulsus fuit. Hinc tumor paulatim incrementum sumpsit, ita ut totum pedem prenderet eumque insigniter distenderet, & pedes digitorum magno intervallo ob tumorem interjectum distarent. Cutis tamen colore sanæ parti plane fuit similis. Tentata, ut fieri solet, a variis varia, sed omnia frustra. Tandem ad Chirurgum perventum: qui cum suppurationem ob insignem loci molliem tactam esse crederet, & dolores increverunt, aperuit locum. Parum sanguinis, puris vero nihil effluxit: mox vero prosiluit quasi pinguedo quadam quæ vulnus claudebat. Sequentibus diebus spongiæ, nigro seroso sanguine plenæ copiosius erumpere ceperunt: & in planta pedis versus digitum minorem una nocte quasi *super* incidit tanta, quæ dimidium thalerum æquaret. Aperta illa nihil tamen putridi decidit, & nihil mortuæ carnis separari potuit, sed fuit caro quasi spongia adusta, cruenta, sanguine turgens & stillans. Ceperunt & alii in locis, ad latera, & supra talos fungi se efferre fædo & horrendo aspectu, ut pars illa pedis magnitudinem capitis superaret. Tandem ad sectionem ventum, & præcisum est pedum usque ad os naviculare & calcis: quod abscissum est, caro fuit tota fungosa, partim putrida & corrupta, partim coagulata, densa & viscida pinguedini porosa similis, pondere fere lb. iij. Verum sequentibus diebus spongiosa caro, iterum magna vi prorupit, & quantum interdum auferebatur, tantum noctu iterum succrevit. Denique tumor magnus ad sinistram inguen loco, quo glandulæ sunt, in femore exortus est, specie plane similis ei, qui in pedio ab initio conspiciebatur, qui & ipse postea, sua sponte ruptus est, ex quo magna spongiosæ carnis copia excrevit. Non ita multo post puer in vivis esse desuit.

Altera historia hæc est: Puer duodecim annorum, dentium dolore graviter vexatus est. Ventum tamen ad extractionem: extractus est unus ex dentibus superioribus. Oritur postea tuberculum in palato prope illum dentem, magnitudine nuclei pruni. Istinc cum esset molle, nec sponte aperiretur, pus subesse creditur: aperitur, sed nihil effluit, nisi aliquot sanguinis guttæ. Postea vero caro spongiosa, nigricans prorumpit; quæ usque adeo increvit, ut non solum per os prominere, sed & per nares ex cresceret, puerq; tandem mortem affret. Parentes primam mali causam suspicantur hanc fuisse. Puer ictus fuit pilâ nivea cui lapillus inclusus fuerat, ad interiorem oculi angulum. Eo loci post menses tres ortum fuit tuberculum, quod postea præsentem illam carnem spongiosam in hstrulam quasi degeneraret. Hæc eo fine ad te vir Clariss. scribo, ut ex te audiam, quid tibi de generatione fungorum videatur. Laciunt

quidem antiqui Chirurghi, Guido, Theodoricus, & alii mentionem excrecentiarum, naptarum, seu naptarum, ut appellant, quæ apostemata magna, carnosæ & molliæ sunt, esse dicunt: fungorum tamen, quantum quidem memini, mentionem faciunt tantum in vulneribus capitis. Itaque ad me perscribas velim, an hi, quos in suis duabus historiis descripsi, veri fungi fuerint, si non pro fungis habes, ad quod genus tumoris pertineant. Si vero pro fungis agnoscis: quid, quod authores, saltem in capitis vulneribus de his mentionem faciant? Verum itaque fungorum subjectum scire velim. Quid si illud sit membrana in genere aut quodcumque corpus membranosum? Sed nihil definire volo: verum tuum ea de re, & aliquid etiam de vera fungorum curatione (si quid præter illa, quæ in observationibus sunt, habes) expecto. *Idem ibidem.*

Fungus ex capitis vulnere pulveribus ex spica, Et schœnantho inspersis sanatus.

In consilium vocatus, vidi patientem vulneratum in syncope, cuius vulnus ad cranium usque & duram meningem pertingebat; cum vero ægrum aliquot post dies à vulnere inflicto reviserem, observavi fungum avellanæ magnitudine. Consului ut inspergerent pulveres ex spica, & schœnantho, quorum usu, sequenti die attritus est, & brevi etiam propriis remediis vulnus sanatum. Quo remedio sæpius fungos sanavi, ac proinde tanquam arcanum vobis propono. *Domin. de Machettis observ. Medico Chirurgic. Sylloge.*

Fungus Palati cum carie, scalpello & cauteriis feliciter extirpatus.

Multi magni morbi sæpius à nobis curarentur, si magis viderent Medico, minusque meticolon forent aucti. Nobilit. Dominus Collin, Jurisconsultus, dum viveret apud Amstelodamenses meritisissimus (cujus nomen propter raritatem & inauditam animosiratem in admittendis & sufferendis remediis, licet durissimis, præter morem appono) ante aliquot annos me convenit, dicens sese aliquid incommodi in pollicæ & laterali parte palati sentire; quo viso & bene explorato, hæc usus sum verbis; Noli Spectatiss. Domine hoc malum flocci facere, & multo minus unicuique revelare; verebar enim ne in manus incideret eorum, qui omnis generis remedia nil profutura illi præscriberent, imò periculum, quod erat præ foribus, interim augerent. Hisce auditis, rogavit me Dn. Pater, qualis esset affectus, quomodo & quibus remediis morbo occurrere vellem? Respondi malum consistere in carie pollicæ & lateralis partis ossis palati cum carnea excrecentia fungosa eandemque excrecentiam esse extirpandam, & ossis cariem inurendam. Pater generosissimus hanc curam diu non distulit, ast vero quamprimum vocari iussit Allardum Cyprianum, Petrumque Adriani filium, Chirurgos dexterrimos; qui eandem a nobis propositam commendarunt curationem. Itaque confectis cauteriis loco

affecto appropriatis, universalibus piamentis ut & dentibus aliquot molaribus qui nobis in ipsa operatione obtulerent, evulsis, aggrediebamur curam ut sequitur. Omnibus prospectis & rite præparatis, monuimus patientem, ut digitum elevaret simul ac multo succinationis periculum afferret, & diutius non esset terendo, ipseque respirare vellet; nam experientia eramus edocti tantum fumum oriturum, quævis in renovandis soleis equinis excitatur. Hisce monitis frustrum ligneum digiti crassitie inter utramque maxillam immisimus, ne in operatione os clauderet; posthac scalpello acuto, recurvato, & secundum palatum accommodato, abstulit alter Chirurg. totum tumorem, alter interim buccarum partem anteriorem spatula admodum lata muniebat ne a cauteriis nimis læderentur, in quem finem etiam splenis è linteo carpto confectis & aqua frigida madetactis buccis propiciebat. Ablato tumore cauteria candentia successive fortiter unum post alterum adacta sunt, donec videretur sufficere: cum interim patiens digitum attolleret, eduximus dicta cauteria candentia. Hisce peractis composuimus ægrum in lectum, non sine facietis verbis, quibus subsidens nos alloquebatur. Interim præscripsimus hordeatum ad ardorem compescendum, ut & oris collutionem dolorem leniendi causa. Sequenti die invenimus afflictum nemini magis esse dissimilem, quam sibi ipsi, ita intumuerat ejus caput, propter inflammationem inhumanam, unde etiam à febre haud manserat immunis. Hæc onusta remediis inflammationi resistentibus oppugnantes, brevi inde cessaverunt & inflammatio & febris. Interim ad escharæ casum promovendum, decoctum malvæ, ricuum &c. usurpavimus, addendo sufficientem quantitatem mellis rosacei, quod pro re nata mutavimus. Post escharæ separationem omnibus rubicundis apparentibus, videbantur in portu navigare. Paulo vero post exigua particula carnis fungosæ in conspectum sese dedit, quod nobis ansam dedit cogitandi malum non esse in totum eradicatum; itaque novam institutionem commendavimus, quam æger neutiquam renuebat, dicens: facite quod artis est. Proximo die institimus novas institutiones cum simili fere eventu, caput enim rursus vehementer intumuit, comite febricula, quæ ipsdem profligavimus remediis, brevique post in totum convaluit patiens, qui postea per plures annos incolumis vixit. *Ruyssch. observ. Anatomico Chirurgic. Centuria.*

Similis casus, dissimilis vero eventus ob Medicamentorum inscitiam.

Eodem fere tempore quidam contra fungosum palati sui sarcoma, junctamque ei cariem, remedia quæsit apud Pharmacopæos, & audaces medicos, quorum cæca & stolta temeritate malum eo durebatur, ut propemodum esset inexpugnabile. Tandem scolorum istorum nugatoris remediosis fatigatus me aliosque accessit; Audito vero, sine ulla ratione nil boni esse sperandum, recusavit nobis obedire, eo magis quod non desissent, qui enim spe recuperandæ valetudinis inescabatur, solis scilicet

cer medicamentis loco affecto applicandis, quæ tamquam secreta nec ulli revelanda servabant. Post aliquod tempus me de novo consulere confanguinei, dicentes ægrum inultionem admitturum: quid sit? Chirurgus, qui curationi præerat, inurere partem affectam volens, cum in finem cauteriolum, quo dentes cariosos inurere solent, attulerat: Rogatus quid facere vellet, respondit, palati cariem inurere. Quum vero audivisset qualibus cauteriis indigeret ad opus illud perficiendum, animus fere illi defecit; & sic patiens defectu requisitorum remedium miserrimè per aliquot hebdomadas adhuc vixit, donec vitam cum morte commutaret. *Idem ibidem.*

Fungus ex vulva excisus.

Fungum primum indolentem vident Medici; Sed mox non sine alicujus doloris sensu. Qui eò plerumque sit gravior: quo plus zitu & à præallata bile; Cujus uberior affluxus, excitat in ipso non modo dolorem, pruritus, ac inflammationem, sed interdum utique livorem, & post illum, veram carcinomatis naturam. Uti evidenter demonstrant mamma, lingua, labia, guttur, vulva; aliæque partes, vel rarsæ ac teretes; vel glandulis ita refertæ; ut facile degenerent in fungos: proximum carcinomatis subjectum.

Ex cancroso oris fungo, sequitur præter ardoris, ac doloris sensum, frequens ac molestum illud sputum: quod Hippocrates in coacis prænotionibus, cap. 16. aph. 36. *πυλινδρὸν* vocat, cujus naturam asserit in eo consistere: quod præcedat pus, ex thorace eruptum. Sed in uliginosa nostra Hollandia, terminat plerumque, seu fidissima crisis, febres etiam vehementissimas. Utiq; variolas internas, & interdum contumacissimos, obstructi lienis, affectus. In quibus nonnumquam ejusmodi ptyelismus excurrit, ultra mentis curriculum.

Quod si verò fungus aliquis valvæ occupet: irritat illam continenter, & effundit menstrua ipsius non minus copiose, ac si instaret verus partus: à quo tamen fixus hic tumor minimè quum expellatur; necesse est tandem confugere ad scalpellum & ejus ope radicitus evelle: quod nequit exstirpare irritus ejuscemodi partus.

Sed artis est talem sectionem vel audere, ritè perficere, in tam obscuris tenebris. In quibus tamen illam bis vidi, non minus secure justificatam: & fungum ejus loci à Bernardo Ollulario, Chirurgus dexterrimo: sine ullius partis offensa, non secus ex vulva excisum ac si subdio & in loco maxime obvio scalpellum suum direxisset.

Matrona pia ac verecunda, læssita aliquandiu ab immodico menstruum profluvio, incidit tamen in urgentem urinx difficultatem: & ex illa, quasi in veri partus conamina, à quibus licet nihil expelleretur solidi; dilatabatur tamen inde usque eo angustum vulvæ os: ut obstetrix in auxilium vocata, potuerit illic sentire fungum vulvæ tam firmiter basi suæ, adnatum; ut nulla vi inde dimoveretur.

Qua propterea desperata, itum fuit ad Chirur- gum, jam nominatum qui (explorata con-

venienter tumoris natura) scalpellum suum nec timide dimisit in sinum pudoris; nec infelicitè excidit fungum hunc uteri, æquantem magnitudine sua ovum gallinaceum. Mirabantur amici præsentès, hinc induciam ægræ, alias maxime verecundæ; illinc vero, non minus audaciam secantis, aggredientis tanta animi præsentia, tam inauditum, ac insolens opus.

Cujus ope ubi exemisset fungosam hanc excrescentiam, cessabant illico dolores, menstrua inordinata, sed præcipue indefatigabiles illi conatus, quibus continenter stimulabatur uterus ad expellendum onus, plus æquo sibi molestum; quod tamen post anni curriculum sensit iterum illic increlescere. Sed mutabatur brevi in pus; quo cum trullularum ibi excideret, liberavit ipsam a repetenda sectione, sed nequaquam à continuo fœtore, vehementibus angustis, & frequentibus animi deliquiis. Quorum symptomatum ergo, necesse habuit deinceps integrum decennium, immundam hancce valvæ illuviem, aliquoties ablucere per insequentem clysterem.

℥. Herbarum, plantaginis, boni Henrici, singularum manipulum. Solani, pyrolæ, veronicæ singularum manipulum medium. Seminum lactucæ, tidoniorum, singulorum dragmas duas. Decoquantur ex aqua hordei, admiscendo novem ipsius uncus, succi semper vivi majoris unciam unam, mellis rosæ, uncias duas myrrhæ dragmam mediam, misce, fiat clyster uterinus. *Nicolaus Tulpus observ. Medico Chir.*

Fungus canerosus in interiori matricis colli parte.

Honestæ quædam Vidua hic Hagæ habitans quadraginta circiter annos habens, temperamentique calidi, ac sicci, nec non atra (quam jam olim dixere) infestabile de tumore quodam extra corpus propendente mihi quæstæ est, quem non parum incommodi sibi adferre, quoque velut stimulis assidue se pungi dixit; fœtore insuper ingenti illum abundare, ac instantibus catameniiis, extendi, multoque ampliorem fieri, asservit.

Quamobrem non parum sollicita meam imploravit opem. Ipse autem suasi, uti, præparato, prout deceret, corpore, quicquid hoc esset tumoris (malignum namque perspexeram) Manuali Chirurgi opera tolli juberet. Cum itaque (nec enim alium mali finem videbat) consentiret, rem cum fratre *Joh. Stalpartio vander Wiel*, nec non cum tunc quidem Chirurgus, nunc autem & Medico *Cornelio Seltingio* communicavi.

Tumorem itaque hunc exactè perspectum fungum sive colli matricis excrescentiam cancerolam esse comperimus, anteriori quidem parte latiore, posteriori vero angustiore. Statuimus idcirco basin hujus-excrecentiæ, si contingere daretur, valido cingere filo, ac quotidie paulo arctius vincire, ut siquidem fieri posset, tumor à sana parte separaretur. Rem itaque aggressi duplici fili circuitu anteriorem, crassioremque excrescentiæ cinximus partem; Chirurgus autem, quod utramque manum eodem tempore vagina non admitteret, digitis sensim eo usque promovit filum, ut basin attigisse crederet: tum vero ob viæ angustias præ-

pediebatur vinculum contrahendi facultas. Id tamen ut perficeretur, nihil consultius duximus, quam si utramque huius extremitatem crassiori firmiori que alligarem specillo, ut hoc contorsor, illud contraheretur, coarctaretque excrecentiam; hoc autem ita successit, ut illa intra quatuor, vel quinque dies alimento destituta protinus decideret. *Stalpartius Vantor Wiel inobserv. Medico Chirurgic.*

Casum huic nostro admodum similem refert *G. Segerns miscell. med. phys. Germ. dec. 1. an. 2. obs. 21. fol. 200.* de honesta, & pia vidua, atque temperamento melancholico prædita, annorum circiter 47. cui excrecentia fungosa, foetens, & sphacelo postmodo correpta, uterique prolapsum mentiens propendebat e vagina, post cuius extirpationem ægra e vita discessit, cuius cadavere aperto sphacelosam illam substantiam nihil aliud fuisse compertum est, quam excrecentiam fungosam ex uteri collo majori prope vesicæ orificium enatam, ac à mensium & corruptorum humorum affluxu procul dubio ampliata, atque dilatata. Ejusmodi fere excrecentiæ mentionem faciunt dictæ *Ephemerides German. dec. 2. an. 2. obs. 186. fol. 413. &c.*

De maligno fungo scribit *N. Tulpinus in obs. Med.* qui e vagina excisus gallinaceum æquaret magnitudine ovum; ex hoc autem proxime sequenti anno eodem apparente loco temporis tractu malignum, foetidumque ulcus natum, cui purgando, abluendoque mulieri assidue syphone aqua repleto opus fuerit, addit, cap. 34. agens de maxima uteri excrecentia, quæ excisa pugno magnitudine par esset; hanc autem crassa, firmaque exterius cinctam membrana, ac interius albescens, ac glandulosam fuisse scribit, ac postea non rediisse.

Theod. Kerckringius obs. anat. 53. de muliere quædam memorat Coloniz Agrippinæ habitante, cui in interno uteri ore carnosam fuerit excrecentiam, quæ per totam sese diffundens vaginam, atque extra corpus propendens multis uteri procidencia credita sit.

Plura ejusmodi habent *Victor Trincavellus lib. 9. cap. 15. Arctavi acut. lib. 2. cap. 11. Hieron. Fabr. ab Aquapendente oper. Chirurgici cap. 85. &c.* Idem in Scholio observationis mox allatæ.

De Fungis Microscopicis.

Juvenis xvii. annorum in sinistro hypochondrio primum, post circa genu illius lateris levius quosdam ultra mensem incurrit dolores, quos, cum negligeret, à tumore circa genu oborto claudicare incepit, donec dolor & tumor totum femur occuparet, & omnimodum pedis illius usum auferret. Ad parentes suos Chemmicium delatus, & acerbissimis doloribus affectus, chirurgi nostri Theophili Voigtii opem implorabat, qui, ut dolori occurreret urgenti, varia cataplasmata, vesicatoria tandem, & potentiale cauterium femori applicuit. His nil juvantibus, ubi & ego vocor, ægrum a continuis doloribus tantum non exanimatum invenio. E sinistro hypochondrio materiam calidam & acrem ad genu defluere querebatur: tactu locum affectum exploranti humor supra genu quætuans occurrit.

Præmissis igitur præmittendis, sequenti die, ut aperiatur tumor, jubeo. Effluit cum impetu ad tres fere uncias materia serosa crocei coloris, quæ evacuata, & turunda molli vulnusculo occluso, ultra horam quiescebat æger. Redit doloris acerbitas, materia tamen ita evacuata remittit, & exhibitis anodynis patiens placidam transigit noctem. Dolori sequenti die crudelente turundam iterum remove jubeo, & serum loturam carnis referens, circa vesperam autem portiuncula fungosa sero illi junctæ evacuantur, ex quo causam illius doloris singularem, & vix curabilem affectum, cum à fungis intra cavitates musculorum latitantibus dependere videatur, enuncio. Nec fecellit prognosticum; non tantum enim singulis diebus notabiles fungos extrahebat Chirurgus, sed & cum post obitum femur illud & genu ipsi Cal. Maii 1673. dissecarem, musculos omnes emaciatis, & fere tendinosos invenimus, intra eorundem autem cavitates varios fungos, tumoris & doloris autores: Consumtum præterea in osse femoris conspiciebamus periosteum, nec ossis superficiem pepercerat humoris acrimonia, absque tamen nigredinis aut putredinis alicujus notis: ubi caput seu pars femoris inferior cum tibia per *ἄρθρον* articulatur, cartilago luxurians tumoris in genu causa deprehendebatur, quæ molam sive patellam genu loco moverat, & extensioni & ambulationi pedem fecerat ineptum. Infinitum ventrem aperire erat animus, sed parentes id piaculum reputabant, quocirca mali fontem rimari non licuit.

Occurrunt hic quædam, quæ considerationem utique merentur. Materia, e qua fungi generantur, aliquando e loco, in quo propullulant, aliquando e locis remotioribus scaturit, illaque haud raro acris existit & corrosiva, quod non solum dolor evincit, verum etiam osium, solidissimarum corporis nostri partium, absumit. Favet huic pronuntiatio etiam subsequens historiarum biga.

Fœmina quædam fungum in pollice pedis dextri gestabat, qui à linimentis & emplastris à balneatore quodam illitis & applicatis irritatus, & sensibilia sumebat incrementa, & dolores inferebat intolerabiles. Hic unciam pendens, una cum pollicis anteriore articulo, amputatus, non solum unguem, sed & ipsum os in sui substantiam converterat, immo in osse radices egisse, aut ex osse in mucorem resolutum, aut tabescente, haur secus ac ex C. C. rali sanie (vid. Verulam. Sylv. Sylvar. cent. vi. n. 546. p. 864.) prognatus videbatur, eo, quod radix illius cartilaginosa præ se ferebat duritiem.

Idem mihi videre ante triennium fere contigit in quodam hujus loci paupere, quem etiam fungus in pollice pedis dextri mirum affligebat in modum, qui una cum pollicis articulo dextre ablatus, eandem totius ossis propalabat consumptionem, ut adeo mirum non sit, si ipsi fungorum substantiæ aliquando ossicula impacta compareant. Infeliciores erant pannifex illa fœmina, quod facta articuli diminutione non tantum non minuebantur dolores, sed & e vulnere alii nascebantur fungi: illius vero vulnus post duarum septimanarum decursum perfecte consolidabatur. Causa fuit non alia, quam quod

quod materia fungorum in femina in loco affecto delitescerat; in viro in inguinis dextri glandulis, quas duras tumidasque instar bubonum ostendebat; perinde ac juvenis istius in parte abdominis interna. Referebat Chirurgus se in alio, cui in digito sinistri pedis excreverat fungus, inguinis glandulas similiter tumidas observasse, quo uua cum fungo pedis digito ablato vulnus quidem ad cicatricem perducebatur, è suppuratis autem postmodum glandulis erupisse fungulos, mortis lentæ, acerbissimæ tamen, præcursores autoreſque. Agyrtarum præterea, barbitonorum & balneatorum gloriatio est, se curasse, aut curare posse, si fomenta non juvent aut emplastra è cauteriis, immo ipsa sectione illos, quos vocant *die Glid-Schvammre*, genuum tumores. Ego vero in his tumoribus semper cartilagineam excreſcentiam adverti, qua & patellam loco movet, & pedum usum sufflammat, & proinde illis, qui curari nequeunt, annumeravi. Quadriennium est, cum in vicinia nasutulus quidam mulieri cauterio potentiali circa genu applicatio consulere conaretur; sed non multum aberat, quin inflammatione, tumore & doloribus excitatis gangrena superveniente in vitæ discrimen conjecisset alias miserrimam, Interim tumores genuum à flatibus & humoribus ortos curationem admittere neutiquam nego. *à Christophor. Fridr. Germanni.*

FURFURES

Vid.

PILORVM VITIÆ.

FUROR UTERINUS.

Plato duas maniz species celebrat, unam *ἡ νόσος τῶν ἀνθρώπων* ab humanis morbis alteram *ἡ νόσος τῶν θεῶν* à divina alienatione; hujus iterum quatuor constituit partes, quibus totidem Deos præponit; ac *μαντικὴν ἐπιτομήν* tribuit Apollini, *τυλιανὴν* Dionysio, *μουσικὴν* Musis *ἐρωτικὴν* Veneri & Amori, hancque omnium optimam esse docet.

De furore Venereo seu Amatorio non Platonice, sed Medice hic differimus, quatenus morbi fœtura est. Eiusmodi furor à membro principaliter affecto, scilicet vtero, vterinus, Græcis *μετρομάνια* dicitur. Sunt qui *μετρομάνια* vocitent; sed improprie, quod cutacea illa pudendi muliebris epiphysis quam *νύμφη* & *τὸ μύρον* appellant, verum non sit huius passionis subiectum: at tamen Nymphomaniz vocabulum admitti potest, eo sensu quo veteres Anatomi ci clitoridem Nymphæ nomine donabant. clitoris enim, veneris aculeus, in hoc affectu man felle tumet atque incalescit.

Definitur Delirium ferinum sine febre effraznem ac inextinctam veneris appetentiam inducens. Cum mania comenit conturbat mentis fœritie, & *ἀνοησία*; sed ab illâ seiungitur quod non ab atrâ bile, sed à feminis feruentioris plethorâ ducat originem; quodque desipientia pro halituum è semine euectorum ac imaginationem pulsantium conditione, circa rem veneriam peculiariter versetur, ita ut petulcæ agro-

tantes nihil aliud vel loquantur, vel cogitent.

Causa proxima non est putridum semen ut in hylterico pathemate, sed genitura incorrupta quidem, at uberioris & actioris, in vasis uterinis orgasinus; hinc enim uterus, partesque ipsi annexæ cum internæ tum externæ, & præcipue clitoris *φλόγω* concipiunt, ac cerebro per medios vapores in *σπινθηριώδη* tracto, femina dementatur, & furiosatum libidinum zitu percellitur.

Cur sola mulier hocce furore crucietur, virque ab illo immunis vivat, quanquam semine præditus multo activiore, duplex est ratio: prior ex parte *ἡ ἰσχυρία*, id est causæ suscipientis, quod vir sui potentior sit; femina vero, iudice Hippocrate, sit *ἀσθενέστερη* & *ἐλαφύτερη*, pusilli demissique animi: posterior ac præcipua ex parte *ἡ ὁρμή*, hoc est efficientis causæ, quod virile semen in vesiculis seminariis ac prostaticis glandulosis ad utriculi urinarii ceruicem sitis, tanquam in penu ac promptuario asservatum, inde ad caput non commode vaporet, nec illis particulis res sit cum cerebro: Mulieres autem eiusmodi vesiculis ac prostaticis destituantur, quarum quippe vascula ejaculatoria non ad vesicæ collum tendant, ut in maribus, sed ad vulvam cuius præligne est consortium cum cerebro. Quemadmodum sonus secundum trabis ductum procul & rectâ excurrit, ac fumus iuxta pali erecti longitudinem alte effertur, sic per continuitatem spinalis medullæ, cui uterus robustis connectitur ligaminibus, expedita est fuliginum ex arvis muliebribus ad cerebrum *ἀναστροφή*.

Hippocrates, si vulgo credatur, hunc morbum oriri ait à sanguine menstruo, qui in virginibus viro maturis effluvio carens, ad cor & diaphragma præ multitudine regurgitat: vnde cor primum infatuatur, indeque corpor, & ex torpore dementia inuadit. Satiùs tamen videtur textum istum de matricis strangulatu vel de melancholico delirio, vel de vtriusque affectus *συνεπλοκή* interpretari, quam de infamia uterina; ut reuera Hippocrates timoris à caligine nati eo loci meminit, qui melancholiam non furorem testatur.

Arbitrantur nonnulli in mania hysterica, Veneris thyrsio mentem percuti, ob errorem externum, à nimia videlicet obiecti vehementiâ, ut sit in ira, amore, cæterisque animi passionibus; quo pacto etiam animantes quibus toto anni cursu in Veneris conflictum prorumpere negatum est, accedente statâ iugandi tempestate, maxima seminis ebullientis plenitudine turgent quæ ipsas furire solet: proindeque nullas anathymias e feminis minerâ ad *μυροειδὴς* importari autumant; sed appetitum veneris naturalem qui in utero positus est, ubi à spermatis copiosi atque præferuidi stimulo ultra modum pungitur, appetitum animalem in cerebro tantopere commouere, ut hic immoderatio factus, excussio rationis à qua compesci deberet, dominio, eam secum abripiat.

Feritur equis auriga, nec audit curtus habenas

Indeque in pudicis fœminis luctam fieri observant appetitus sensitivi & rationalis qui illius procellas pacare nititur, ac mulieres nimium coeundi desiderium præ pudore aliquan-

diu occultare, donec tandem ratione subuersa, propudiosa euadant.

Aliquis etiam opinari posset, ipsummet animalem veneris appetitum non cerebro inhi-
bitare, sed utero, quem ideo Plato *ζῷον ἡσυχματικόν*
vocavit, haud secus ac animalis cibi potus-
que appetentia in superiore ventriculi orificio
collocata est; adeo ut metromania respondeat
bulimix, vel sit inmoderate a quibus delira-
tionem longe abesse constat.

Veruntamen in hoc affectu *τὸ φασματικόν* & *τὸ
δρακονικόν*, perturbari ex cogitationum, dictorum
facto unque aburditate liquido colligitur;
Nec ideo confuro uterinus, sed simplex lascivia
famæ canum meretur comparari. Certum est
etiam illas facultates tenentis desipientiæ proprie
sic nuncupata, potius quam ob errorem exter-
num solummodo deprauari; secus vix vilius
unquam dabitur deliramentum, ipsaque mania
nihil aliud erit quam prægnans incandescen-
tia rationem inuadens. Igitur in furore uterino
agrotatio imagineticis ac ratiocinatricis po-
tentix causa est effrenati appetitus animalis,
non e contra; aliterque se res habet, quam
in effulis animi pathematis; hæc enim licet men-
tem extra quadrum, ut loquuntur, promoue-
ant; per se tamen & proxime non inlunt *τὴν ἁ-
ρμίαν*, sed *τὴν ἀλγίαν* animæ, neque ideo cadunt in
Virum sapientem quem Philosophia moralis ap-
petitus sensitiui violentiam refricare docuit;
cum morboſa deliria ne fortissimis quidem, Stoi-
cisque hominibus parcant, quoniam a cerebri
valetudine dependent, quæ rationis imperio
non subiecitur; hæc neque ob causam in animi
passionibus sentiunt homines se vitiose agere,
nec in foro ciuili, ac multo minus in foro con-
scientiæ excusatione digni sunt: delirantes vero,
ac speciatim feminae ex utero insanientes se
transuersas raptari ignorant, insontesque me-
rito habentur.

Domicilium appetitus veneris quod attinet,
an illud in cerebro, an in membris procrea-
tioni dicatis assignari debeat, controversia est
Physiologica non Pathologica, nec proinde
huius arenz.

Causa interna caloris & acrimoniæ in semine
gemina est, partium seminis fabricationi desti-
natarum, testium nempe & vasorum spermati-
corum exuperans caliditas; ac sanguinis e quo
semen conficitur, feruor immodicus vel per se,
vel propter mordacium, salforumque humorum
mixturam. Menstrua quoque non ex voto ir-
rumpentia ad hanc insaniam conferunt; ab
his enim præsertim si calidiora fuerint, uterus
una cum suis vasis ac semine in ipsis contento
effruescit: quamobrem appetente fluore men-
struali, mulieres magis subant ob voluptuosum
pruritus ex plenore sanguinis ac spirituum ad-
uentu.

Causæ procatartice furoris hysterici multi-
plices sunt *ἀπὸ τοῦ ἀσχηματισμοῦ* sive sex rebus non
naturalibus mutuandæ. Primo cælum æstuosum
atque squalidum, ut *καλοκαίριον* tempore, cum
ingenti Sirius æstu terras adurit: Nam sicuti,
autore Philosopho, viri æstate minus quam
hyeme ruunt in venerem, quod intensus eorum
calor dissolvatur a caliditate ambientis: ita ex
aduerso mulieres per æstem magis quam per
hymen ad clinopaleu intelligantur, quia frigi-

dus ac ignauius illarum semen ab æstiuo calore
redditur actuosum, ac per compensationem con-
trariæ qualitatis resouetur; ideoque Ægyptia-
cas feminas, veneris in tantum famelicas esse
narrat Herodotus, ut cum hircis rem habeant:
produunt quoque historiarum Indicarum Scri-
ptores Americum Vesputium ad quamdam noui
Orbis oram appulisse, ubi mulieres libidini
adeo erant deuinctæ, ut Bacchantum more in-
pautas furerent.

Sed potissimum victus ratio est *ἀσχηματισμὸς*
uniuersim quidem dapes saliores & opiparæ,
daphiles ac Sybariticæ mensæ, ferula gaudata
iuxta Archelstrati opiodædali, vel Apicii, quem
Plinius nepotum omnium altissimum gurgitem
appellat, artem culinariam parata: mirumque
philtera tam graviter interdici, dum interim co-
quis permittitur, inquit Iularchus, alimen-
ta *μαρμαρίων* & *φάρμακων*. Priuatim vero inter ir-
ritamenta veneris languentis & acres diuitis ur-
ticas numerantur, aromata omnia; embain-
mata, pulpamenta, tortilla iura quibus suc-
culentæ ac polytrophæ carnes iniriantur; gal-
lorum crura atque testiculi; qua recentia ac
tremula; præterea panes azymi (si Didymo
credendum) *ἀσχηματιστοὶ οἱ οὐκ οὐκ ἀσχηματισ-
τικαὶσσι* sunt veneris incitabula; item alpa-
ragorum turiones; echinata scolymorum pi-
næ, eorumque thyruhi; nuclei pistaciorum;
pinei strobili, boleti; tubera, ac pleraque le-
gumina, ut pisæ, fabæ, cicera admissariis
equis exhiberi olim consueta in genere quod-
cunque cupediarum genus, omnisque ventris
saturitas, leminarium est veneris anoris: Ni-
hil sic inflummat corpora ac titillat genitalia
membra, sicut indigestus cibus, ructusque con-
vulsus, inquit B. Hieronymus. Venter etiam me-
taco præsertimque dentato ac *καυστικῷ* existans
cito despumat in libidines: Non *ἄσπετος* ignes,
ait idem Hieronymus, non Vulcania tellus, non
Ve euus & Olympus tantis ardoribus æstuant,
ut iuueniles medullæ vino plenæ & dapibus in-
flammatæ: nec immerito lasciuie iumentum
frans inedia subiugandum esse alibi suadet.
Quædam mulieres in *καλοκαίριον* uterinam illapsæ sunt
propter usum vini Hippocratici, cui aliquid
boracis fuerat dissolutum.

An inter veneris illectamenta sal veniat re-
censendus ambigitur. Non pauci contendunt,
ut a rutâ atque menthâ, sic a sale ope caloris
atque siccitatis genitalem succum consumi.

Præterea salsa visum, semenque minorant.

Ita Abimelech Sichemorum urbem expugna-
tam soloque adæquatam consperfit sale, in per-
petuam infecunditatis notam: ad cuius forsitan
exemplum hodierni Magistratus reorum læsæ
Majestatis ædes demolitas sale aspergunt. Aliis
placet quemadmodum sal adest sanguine per
se emaciat; sed per accidens pinguelacit, ali-
mentum ad partes deuchendo (nam Apolloni-
us; Herophili discipulus macros ægros ac inu-
beres cibariis salitis re corporabat, ac Hippatri
equos impinguant, paucis sale esse admixto)
sic moderatam salis usuram esse prolificam, qua-
tenus sanguinem ad seminis officinam deducit.
Nonnulli denique a sale semen quidem incendi;
sed eius copiam detrahi existimant.

Nos plurimis documentis nixi, veneris ardo-
rem sale proritari, virtutemque fecundam ei
ineffe

inesse iudicamus, ita ut Grammatici vocem *salax* à sale non inepte derivasse videantur. Nam lymphæ minerales sale imprægnatæ à sterofi vindicant: aqua Nilotica quæ nitrosa est, multarum foeminarum viscera longiore præclusa sterilitate, ad conceptum relaxavit: vena spermatica sinistra ab emulgente exoritur, ut seminis materia, saluginis seri redderetur particeps, ac illi salaciores sunt, quibus utraque spermatica ab emulgentibus emergit: naues sale onustæ sunt murium feraces; imo non desunt Physiographi, qui mures absque masculi opera solo salis linctu impleri affirmant: dato sale, canes ad generationem inertes caviliunt: oves aquam salinam bibentes maturius coeunt ex Aristotele: ac Sacerdotes Memphitici libidinem fugaturi à sale abstinabant, autore Plutarcho: populosissima est piscium salum incoletium Respublica: nec sine ratione Marui apud Ethnicos Dii omnium petulantissimi iungebantur, & Venus dicebatur *αἰγίη* saligena: stirpibus quoque propagandis sal conducit, hinc *αἰγίη* in opud Græcos dici solitum de summa fertilitate, ac plantæ maritimæ præ cæteris luxuriant: aquæ quoque *αἰγίη* & *αἰγίη*, quia nitro imbutæ, irrigandis plantis sunt magis accommodatæ, docente Plutarcho: & Hippocrates *αἰγίη* commendat: notum est in Liouia succensarum sylvarum cineres solere tritico conseri, lætasque meti messes: nitro terris benefacit: agri stercoreati fecunditas sali quo finis scateret, accepta fertur: Elizæ fontem jericonis sale fecundavit: & Virgilius;

*Semina vidi equidem multos medicare ferentes
Et nitro prius & nigra perfundere terrâ.*

Denique totis corporibus nihil est utilius, inquit Plinius, sole & sale: quasi ad humanam procreationem, simul cum sole & homine, sal tanquam tertius collega deberet admitti. Sed nimium à littore recessimus, reducantur vela.

præter aerem & alimenta, veneris illicium præbent somnus longior: supinus decubitus in culcitra plumea renes calefaciens, quod etiam præstaut arctiora lumborum cingula: otium corporis & animi: *συγγαμία*: familiaritas cum adolescentibus: unde B. Hieronymus: Cincinnatos pueros & calamistratos, & peregrini muris olentes pelliculas vocat pestes ac venena pudicitiz: Obscena etiam spectacula ac Fescennini versus, sunt Veneris poppysmata, sopitamque amoris flammam ventilant: uno verbo vita mollicula, deses ac luxuriosa: venus tandem præcox & immatura quæ nondum confirmato iudicio cupiditati habenas laxavit; quæ de causa ut ex Aristotele colligitur, puellæ temporius viro copulatæ vitam degunt incontinentiorem: quædam etiam hoc malo tactæ fuerunt ex concubitu cum viris qui maiorem illaturi voluptatem; oleis calidioribus ac suaveolentibus veretrum inunxerant.

His omnibus addi debet foeminarum *αἰγίη* ac primo quidem temperies non sanguinea quæ semen copiosum, sed qualitatibus moderatum coaceruat; multo minus pituitosa, sed vel melancholica, vel biliosa: Mulieres namque melancholicæ & serosæ sunt & flatuosæ, unde seminalis humor à falsedine seri acuitur, & à flatibus turgescit: biliosis autem etsi ratione siccitatis, illiberalior iustis seminis abundantia, bilis ta-

men flammescens geniales igniculos accendit; unde Poëtæ Marti Venerem coniunxerunt ob irascendi & concupiscendi germanas vires, & quod Martiales viri plerumque simul Venerei sint. Moderatam autem caliditatem siccitatemque intelligimus: secus si qualitates istæ plurimum exuperent, urinam genitalem, ut cum Plinio loquar, depopulantur. Ita leo quia calidissimus atque siccissimus, minime libidinosus est; cumque seminis & medullæ assimilis sit materia; ille quoque tenuem & exiguum habet, & quidem in paucis ossibus medullam, ac pleraque eius ossa non solum corneola sunt, verum etiam adeo dura, ut ex iis collisus quasi è silice ignis elidatur, autore Aristotele.

Secundo habitus considerandus est: nam ut carnosæ pinguibus, sic graciles carnosissimis magis uruntur.

Tertio statura; in proceris siquidem minus quam in parvis bulliunt libidinum incendia, quoniam in his & calor unitus vegetior est, & propter parciorum nutritum plus restitit sanguinis in semen abitari: ita claudæ libidini magis indulgent, quod ad membrorum debiliorem ac decurtatorum nutritionem paucus sanguis sufficiat; warrantque Amazonas solitas fuisse infantes masculos exarticulare, non modo ut claudinequirent insidiari; sed etiam ut in venere magis valerent. Idem dicendum de gibberosus quæ camelis idcirco comparantur coitum toto die exercentibus, referente Aristotele.

Quarto colorem cutis, & pilorum maxime in partibus pudendas cruribusque luxuriem oportet attendere: In illis enim quæ ex albo flavescunt, aut propter sanguinis adustionem nigricant, ac pilosiores sunt, scintillant magis ignes cupidinei quam in lacteis atque depilibus.

Tandem aphrodisia lymphatione sæpius tentantur puellæ viripotentes *αἰγίη*, ut ait Hippocrates, *αἰγίη* quibus instat nubendi tempus, cum mammae sororari, pedes iulis siue tenera lanugine vestiri, mensæque primum erumpere incipiunt; quapropter Aristoteles adolecentulas eo tempore diligenter custodiendas esse monet: attamen iuuenibus, utut plenis annis nubiiles sint, hac insania frequentius vexantur maritæ *αἰγίη*, dummodo nihil aliud adiunctum sit, quod veneris proclivitati aduersetur: item mulieres coniugatæ quarum exardescens libido ab igna viore marito haud satis restinguitur, ac postremo iuvenes viduæ durissima sustinentes castimoniz prælia; nam oblectamenti antea facti memoria, calcar est amoris, reique notæ ac expertæ appetitione premuntur magis; quocirca virgines instar brutorum, molestiæ vitandæ causâ, Veneris contubernium optant; mulieres insuper *αἰγίη* illecebris pellectæ, eius flagrant desiderio; quantumque in negotio veneris polleat retroactæ voluptatis recordatio, patet ex equo Dariano qui ad eundem locum ductus, ubi pridie equam inierat, memor nuptissimi gaudii hinnitum statim edidit. Huc accessit assuetudo; nam crebro coeundi exercitio, præsertim in illis quæ ætatem consistentium nondum attingere, amplificantur seminalia vasa, eorumque simul ac testium vis attractrix usu roboratur: quare, cæteris paribus, foeminas viri consuetudine quondam potitas, nec in Amoris

palæstra amplius velitantes semine magis surgere necesse est, quam puellas *ἀνδρῶν* quæ sub Veneris vexillis nondum militauere: recteque Tertullianus minus arduam esse virginitatis quam castitatis conseruationem probauit, & B. Hieronymus: Virginitas, inquit, in eo facilior est, quia carnis incentiua non nouit, & viduitas in eo sollicitior, quia præteritis animo recolit voluptates. Quanquam fortassis contingere queat ut quædam virgo venereos amplexus impendio magis iucundos concipiens quam reuera sint, illorum mulcedine acerbius angatur; Vnde idem Hieronymus alibi dicebat: Ferreas mentes libido domat, quæ maiorem in virginibus patitur famem, dum dulcius putant omne quod nesciunt.

Differt furor uterinus à simplici verendarum partium prurigne, quod ille iuniores, hæc annosas potissimum intellet, in illo contrectata genitalia sine dolore demulceantur, in hac scalpitu magis inflammantur, & cum aliquo delectamento doleant: deinde quod pruritus aut coitus prolubia non conciat, si neque illam pudendi particulam quæ ueneris appetitus primaria sedes est, non occupet; autominus uenis patereculis libidinosiores reddat, sed sine delirio & furore; quæ gallinacea ac indomita salacitate famosa olim fuerunt, Semiramis Assyriorum Regina; Iulia Augusti filia; Messalina Claudii vxor quæ Venere lassabatur sed non satiabatur; Agrippina Neronis mater; & Faustina Marci Aurelii coniux.

Distinguitur à suffocatione hysterica, quia in hac mulieres manent attonitæ citra loquelam, respirationem & motum: In furore vero linguam habent infrenam ac prodigam, anhelant, & instar Furiarum agitantur.

Ut periti est Botanici, ait G. lenus herbas internoscere, recenter *φασγάνους*. proindeque inestigiatas adhuc ac informes; sic nascens affectio, necdum numeris omnibus absoluta, nonnisi à Medico perspicacissimo detegitur, ac idiota quorum hebetiorem obtutum fugit morbus neophytus, huius diagnosi habent pro prognosi.

In prima igitur huius manie, ut ita dicam, *ἐνδοχῶς*. inuictæ perennant vigilæ, femina ieiunio deditæ sunt, taciturnæ.

Voluntque curarum crises in pectore fluctus.

Lactantur corporis inquit; frequenti sed claustra locorum muliebrium prurientium, ardentium, atque intumescantium consfricatione lætantur; oculos inlittores exactoresque libidinis hinc inde lasciuia evibrant; veneris vel audito nomine, eius cupiditate ardescences erubescunt; pulsus concitator est quo Erastriatus Antiochi in nouercam Stratoniceam, & Galenus Romanæ mulieris in Pyladem histriionem, amorem deprehenderunt.

Adolescente iam uirbo, ac ratione penitus prostrata, emotæ mentis seditio seruet in oculis, facies saturato perfunditur rubore. Nam quemadmodum quæ in ciuitate peraguntur, solent apud emporium promulgari; sic interiores hominis tumultus in vultu platea perspicue relucet; ægræ incessu furiali ambulant: iracundia *ὀργῆς* capiuntur: rerum inhonestarum narratione gaudent, ac blando sermone, gratis

geltibus, mellitis oculis, oreque beneuolo, virorum gratiam indecenter aucupantur; donec sœuiente furoris impetu, frontem conuulsculent, & sequeltrata feminea verecunda quasi cæstro percitæ, non modo prætextata loquacitate proteruiant; sed audacissima quoque licentia viros propalam infectentur. Historia refertur nobilis cuiusdam matronæ cæteroquin honestissimæ, quæ & homines & canes ipsos ad congressum rabiose prouocabat.

Pax sequeltræ est placati huiusce morbi, qui postquam valedixit, quasi postliminio reuertitur. Verum quia dimissionis intercapedine, ac per amica pyroxyfmi silentia, datur locus præfidus quæ *καὶ κατὰ τὴν φύσιν, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀνάγκην* agrotans alias respuebat, affectio uirani potius censenda est quam exitio: a, nisi conubium semen deleteriam corruptelam contrahat. Res enim præstantiores huiusmodi solum celeriore, verum deteriore quoque putredine dilabunt, ac tanto magis infestæ ac hostiles fiunt, quanto magis utiles affinesque fuerant, sicuti capitale est ac Vatinianum inter consanguineos odium. Lapides ac metalla non modo propter siccitatem atque densitatem; sed etiam quia simpliciora sunt, nec tot pugnantibus elementis constata, diutissime imputria feruantur, ac dum computrescant, minime sœda est eorum corruptio. At mixta ex plurium contrariorum *συμμεσῶν* perfectius elaborata, ut lac, sanguis, semen, citius putrent, non modo ratione humidatatis quæ mixtio promptè dissoluitur; sed potissimum quia plurimis particulis heterogeneis constant calore veluti terrumine colligatis, quæ vi simul irretitæ, amore libertatis sese extricare assidue conantur, quo modo scriplic Hippocrates aquam pluuialem, omnium præstantissimum citissime putrere, quod ex plurimis congregata sit ac permixta. Nec tantum facilius, sed sordidior præterea ac putidior est eorumdem corporum ruina, ubi tam diuersæ quibus componuntur partes, rescisso communi quo tenebantur vinculo scilicet calore, velut solutis compedibus dissoluantur, & quæ prius sese inuicem contemperabant, per *ἀποσπασθῆναι* sui iuris factæ, intensas recuperant qualitates. Cum igitur maior mixtio, maioris putredinis occasio sit, semen ut est perfectissimæ naturæ, ita putrefactum ac *ἐφ' ἑαυτῷ*, veneni malignitatem induit, mephitimque pestiferam ad cor, cerebrum, & cæteras partes exhalat, unde interitus, perinde ac epoto malefico pharmaco, inopinatus, dirisque & insolitis symptomatis stipatus consequitur; atque unde vita, hinc etiam summa excitatur pernicies.

Quod si semen à venenata eiusmodi putrilagine sese tueatur; furor tamen perseverans ex sympathico idiopathicus, ac ex hospite ciuis sit, lenta tabitudine miseris depascens. In eo ni diligens insaniendum habeatur cura, tragœdia ad catastrophem brevius traducitur; Nonnullæ enim laqueo vitam sibi eripiunt, ut virgines illæ Milesiæ, quas sine ulla evidenti causa sese catervatim suspendisse refert Plutarchus: cuius eventus causæ querenda est ab Hipp. *ὁμοῖον*, inquit, *καὶ κατὰ τὴν φύσιν, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀνάγκην* ab oppressione quæ circa cor est, sese strangulant: corde namque multitudine vaporum compresso, istius compressionis idea, i maginationi morbida iugiter oblata, hanc ad fauces resse constringenda

obiata, hanc ad fauces recte contrahendas latenter impellit: quidam vero in stupidos putresque desilire visæ sunt aquæ perfrigerium exoptantes; sic non ita pridem Lugdunenses mulieres tam atrox, tamque absurda incessit animi perturbatio, ut in flumina gregatim sese pronas deiecerint: quomodo olim in decantatissima illa peste Attica, ægri.

*Influvio partium gestidos ardentia morbo
Membra dabant, nudum iacentes corpus in undas:*

*Multi precipites lymphis putealibus alta
Inciderunt, ipso venientes ore patente.*

Aliæ tot ærumnarum mole oppressæ, quasque tandem tædet cœli convexa tueri, diuerso spontaneæ necis genere pereunt. Ac profecto hunc affectum valde horrendum esse necesse est, quandoquidem Melampus, referente Herodoto, ob relictum Argiuarum mulierum furorem, patia prius cum Argiis inerecde, maiorem regni eorum portionem, sibi & fratri suo Bianti obtinuerit. *Antanius Menotius Dissertation. Patholog. part. 1.*

Curationes.

Phlebotomia sæpius, prout vires ferre possunt, celebranda est, ut tota humorum massa, & ipse uterus refrigerentur, & sanguis fervidus ab uteri venis revellatur. Postmodum purgatio instituenda est benignioribus composita, bilem aut melancholiam educentibus, prout alteruter humor redundaverit. Purgationi succedent julepi præparantes humorem peccantem, refrigerantes scilicet & leviter aperientes, per tri dum usurpandi. Mox purgans validius exhibendum erit ad humores illos penitus infixos evellendos, cui usui conferre poterunt illa medicamenta purgantia, quæ in manæ curatione fuere descripta, quæ per intervalla erunt repetenda.

Iterata purgatione ad uterum, & univrsum corpus refrigerandum, humorisque fervorem temperandum, sequens balneum erit utilissimum, idque pluries in morbi decursu erit repetendum.

℞ Fol. lactuc. salic. nymphæ, vitis, portulac, umbilic. ven. an. falcj. fl. viol. nymphæ & ros. an. M. j. coq. omnia pro balneo, quod ingrediatur tepide, sine sudore, bis in die longe à pultu.

Ad ulteriorem corporis refrigerationem serum lactis per multos dies exhibeatur. Proprietate specifica semen extinguunt sequentia.

℞. Fol. nymph. salic. viticis, an. M. vi. fol. lactuc. portulac. umbil. vener. an. M. j. sem. quatuor frig. mai. lactuc. & papav. alb. an. ℥ss. anch. ʒij. fl. nymph. & viol. an. M. j. contunde omnia recentia, & irrorentur succo limon. & destillentur in B. M. ac singulis atque libris adde camphoræ ʒj. Capiat ʒj. frequenter. Vel ex prædictis simplicibus fiat decoctio & saccharo dulcoretur ad plures doses addendo camphoræ parum, vel fiat emulsio ex sem. frig. maj. lactuc. & papav. alb. extracta cum aqua nymph. lactuc. & salicis. cum syrupo violaceo. Opiata in hunc modum præscribi poterit.

℞. Conserv. fl. nymph. viol. & viticis, an. ℥ss. conserv. ros. ℥ss. caulium lactuc. condit. ʒj. corall. & sinaragd. præp. an. ʒj. cum syr.

viol. & nymph. f. Opiata.

In summa delirii vehementia somnium concipiantia utilissima sunt tam interna quam externa. In toto morbi decursu clysteres refrigerantes & blande purgantes usurpandi sunt, cavendo ab acrioribus & vehementer purgantibus.

Injectiones etiam neri possunt in uterum ex decoctis herbarum pro balneo aliisque remediis præscriptarum, quibus utiliter Sal. Saturni addi poterit. Clysteres frequentes ex oxycrato ad hoc quoque conferre poterunt. Exterius linimenta refrigerantia, lumbis, pubi & perineo admoventia sunt. ex ol. nymph. unguento rosac vel albo refrigerante cum succis solani, hyoscyami nymphæ dissolutis, addendo parum camphoræ; cum lamina plumbea perforata supra renes continuo gestanda. Ratione causæ hujusmodi virgines viro juveni ac valido jungantur. *Lazarus Ruerius. præf. medic. lib. 15. cap. 5.*

Curatio furoris uterini absoluitur primo venæ sectione, si sanguis abundet secundo purgatione, si humores adulti calidi perarideantur; ubi imprimis profunt alterantia, quæ vim habent serum simul educendi.

℞. Mass. pilul. de fumar. ʒi. scammon. sulphur. gr. sacch. saturni gr. iiii. M. f. pilulæ pro una doli.

℞. Aq. nymph. ℥iij. syr. de nymph. ʒiij. pulv. cathol. purg. ʒi. M. pro una doli.

℞. Syr. cichor. cum rhubarb ʒi. aq. nymph. ℥ss. scammon. sulphur. ros. gr. viii. M. pro una doli. Tertio alterantia refrigerantia, ut sunt lactuca, portulaca & occulta qualitate agentia, v. g. ruta vitex, cannabis, camphora, cicuta, quæ in monialibus potius usurpanda.

℞. Aq. castitæ. ʒiij. syr. de nymph. ʒiij. sacch. saturn. chrystall. ʒi. M. Dosis 1. vel 3. cochlearia.

℞. Sem. cannab. ʒii. lactuc. portulac. ana. ʒii. cum s. q. aq. nymph. f. e. a. emulsio. adulcoretur cum syr. de nymph.

℞. E. leat. castitæ. ʒii. utatur ad guttur.

℞. Olei nymph. ʒi. rutæ ʒiij. sacch. saturn. ʒi. M. f. licur. quo iungantur renes & partes genitales.

℞. Emplastr. cicuta q. s. malaxetur renes cum oleo de nymph. inducatur super alutam, & obducatur symdone rubra in forma ulitæ emplastri uterini *loh. Michael. Præf. Clin. general. part. 1.*

Observationes.

Illustris Comitissa Sterilis, certis temporibus per mensem unam atque alterum incidit in delirium sine febris, cum audacia & risu: sermo multus & frequens uni obiecto diutius in hærens frequentissime de rebus veneris adest; oculos habet vagabundos huc illuc nutantes; dolor nullus, nisi quod remittente furore totum ventris intumescantur: sæpius ligamentis quibus continetur seipsam strangulare conatur. Tandem mentis vicissim compos reddita, sæpius anno spacio, plus minus, à miserrabili hoc affectu libera vivit, cujus tamen retidivam expectare cogitur.

Casum hunc sub finem ann. 1613. Vir reverend. & clariss. Joh. Weberus, Sacrosanctæ Theologiæ Doctor, & Ecclesiastes illustris Aula Gleichen-

sis, ad mandatum Illustris sui, per literas proponebat meumque consilium expetebat, nimirum ut primo determinem, quid de morbo sentiam, dein qua ratione curari, vel saltem mitigari queat.

Ad utrumque temporis ratione breviter hoc modo respondi.

Morbum quod attinet, cum propriè melancholiam vocari non posse, siue primaria, siue hypochondriaca intelligatur; idque propterea quod omnis melancholia sit mentis desipientia sine febris cum metu, tristitia & odio hominum ita ut agrotantes non admodum furiosi sint, & potius solitudinem quam hominum conversationem expetant. Hunc Hippocr. 6. Aph. 13. Si timor & tristitia diu perseverant, ex eo attritus significatur. Ergo potius iis subscribendum esse iudico qui statuunt affectionem Illustris Comitissæ speciem quandam esse furoris cum ut inania sine febris, cum quadam audacia, timore & malitia minime præsentibus.

Furorem hunc non per *periphrasim* cerebro accidere, sed potius per contentum, inde colligo, quod suas intermissiones habeat, nec etiam tempore paroxysmi semper eodem modo delirium intentum sit. Quæ autem pars læsa ad ejusmodi furorem facere possit inquirendum.

Potissimum ad uterum respiciendum esse iudico, cum certior factus sum, conjugium Illustris Comitissæ esse sterile, quam ob causam corruptionem seminalis materiæ fortassis adesse suspicor, una cum intemperie uteri calida & siiva plurimum excedente & exurente, quam præcedere solent procatacti. & tales, ad iram seu promptam inclinationem, terror ac facilis consternatio, amoris affectus vehementior, menstruum inordinata effervescencia, tempus anni calidius, &c. Vocatur autem ejusmodi morbus *furor uterinus*, & cognoscitur non solum ex iis quæ sunt de essentia morbi, sicut nimirum ex delirio sine febris absque timore, cum quadam audacia, sed præterea ex subsequentibus etiam, sermo videlicet multus adeit; inprimis de rebus Veneris, quas vehementius appetunt hujusmodi patientes: Oculi vagabundi, huc illuc nutantes conspiciuntur, quod aliis etiam iis convenit, qui Veneris habenas remissius tractant, & affectu amoris diutius cruciantur. Hinc manus quoque non raro naturalibus applicare solent, præsertim dum cogitatio venerea diutius protenditur. De dolore tempore fervoris nullo conqueruntur: qui enim dolent & dolorem non sentiunt; iis juxta Hipp. mens laborare dicitur: in remissione tamen, potissimum ante furoris exacerbati initium, non raro ad infimi ventris dolore & gravitate conquiescunt. Accidit quod familiare quoque hic sit agrotantibus, ut intentionem sese strangulandi frequenter habeant, quemadmodum experientia notum est, forte quod uteri strangulatus faciliè incidere possit, quam ob causam suffocationis species frequentius phantasie perturbatæ sese offert: sic enim quod Hipp. de morb. Virg. innuit, circa cor & diaphragma propter compressionem strangulationes oriuntur, ut laqueo mortem, veluti bonum quoddam expetant.

Sit hoc modo determinata morbi species,

cum suis causis atque signis: ad curationem progredimur, hoc primum prognostici loco notato; morbum hunc eo curatu difficiliorem esse, quo magis est inveteratus.

In curatione tam ad causas antecedentes, quam conjunctas respiciendum est, ideoque juxta subsequentes indicationes operationes Medica dirigendæ veniunt.

I. Uteri intemperies calida & sicca satis excedens, refrigerantia & humectantia requirit. II. Seminalis materia ut & sanguis adultus, circa regionem uteri collectus ablationem sui indicat. III. sanguis venosus in toto calidior & siccior effervescencia sua paroxysmum facillime producit, propterea quod una cum eodem malignitas citius ad caput evaporet, ante mensium commotionem alterandus ac temperandus est. IV. Halitus corrupti cerebrum petentes discutiendi, & alio, ad partes ignobiliores ducendi sunt ubi potissimum cauteria non omittenda. V. Inflammatio seu fervor spirituum in cerebro refrigerandum & humectandum esse indicat. VI. Vehementia delirii sæpius topicorum usum requiritur, ubi, ab inordinatio curationis processu quiescere cogimur.

Pro excipiendis his indicationibus triplex auxiliorum materia consideranda venit, nimirum Chirurgia, Pharmaceutica, & Dietetica. Quoad Chirurgiam venæ sectio primum locum habet qua sola sæpius Empirici maniacos & furore percitos curare conantur, ut videre licet apud Plater. lib. 1. observationum; quæ pro alteratione totius in brachio adhibetur, mediana vel cephalica incisa, sed hac cautione, ne circa tempus menstruum hoc accadat, quia convenientius est paulo antequam fluxus mensiuus expectatur, ut saphæna pedis incidatur, quo promptius sanguis deorsum moveatur. Scarificationes quoque in consuetis non improbandæ modo hoc ipsum hæc instantibus mensibus, ac tantum in cruribus, non in superiore corpore, ne magis ad caput materia derivetur. Cauteriorum usus etiam hic pertinet, nimirum ut primo cauteria fiant in cruribus, quo corrupta materia, potissimumque malignæ evaporationes caput afficientes deorsum vergant. post affluente materia revulsa ad partem oppositam, optime vero attrahentibus pedum fomiculis commode quoque cervici letaceum applicaretur, remedium omni ex parte tutissimum, & in gravissimis capitis affectibus præsentissimum, de cujus vero usu legatur. *Gul. Fabricius Cent. 1. observ. Chir.*

Quoad Pharmaceutica juvantia citius in hoc casu medicamenta præscribuntur quam adhibentur, propter quod agrotantes discretionem destituantur. Eligenda tamen alterantia, & corroborantia.

Quod alterantia, conveniunt interius Syrupus Acetosus citri, de succo granatorum, additis his, quæ uterum peculiariter respiciunt, ut sunt Syrupus de Artemisia, aqua melissæ, castoreum & similia quæ ratione indicantium commisceantur, & mane vespereque tribus cochlearibus exhibentur.

℞. Syrup. de f. acetosæ. Endiviæ, ana ʒiβ. Granat. duc. ʒii. Artemis. ʒβ. aquam Melissæ ʒi. m.

Huc etiam pertinent condita quæ ex confer-

va tosar. violar. Borriginis; pauxillo pulveris castorei addito, cum syrupo pomorum dulc. conficiuntur: his enim, uti prioribus quoque vis modice refrigerandi, humectandique meriti tribuitur. Exteriusque inunctionem pubis & infimi ventris commodè fieri posse, statuiamus, cum unguento santalino, Infrigidante Galeni, admulto s. q. olei violarum, Nenupharis & similibus. Imo & balnea aquæ dulcis (minerales & sulphureæ thermæ minus hic conveniunt) post evacuationem conceduntur, infestius vide licet in decocto herbarum refrigerantium ut sunt violaria, fol. salicis, lactucæ, endiviæ & similes, quibus commodè flores chamæmeli mediocri quacitate miscantur,

Quoad evacuabilia, frequenter lenientia exhibentur, imprimis hic serum caprinum infusionis folior. Senæ commendari posset. Lenientibus præmissis peccans materia digeratur per syrupum de prunis dulcibus, de Artemisia, cremone tartari, ipiritu salis & similibus, subsequente mox evacuatione magis appropriata, sive forma potionis vel aliter hoc fiat, ubi plurimum per Magisterium Tartari (quod ex spiritu vitrioli & oleo tartari conficitur) Medicum præstare posse, non dubito.

Nec tantum universalia purgantia sufficiunt, sed opus est ut ad appropriata quoque pergamus, respectu particularium evacuationum, ubi deliberandum de injectionibus seu clysteribus, ac pessis uterinis. Varand. de morb. Mulier. l. i. cap. 5. huiusmodi laborantibus extra conjugium constitutis mature prospiciendum esse iubet, ut viro eoq. valido jungantur, quia satiato sic utero & vacuata materia & effusa, quæ in vasis illis continetur, aliquando eas sanari contingat. Imo & illa quæ per habitum corporis evacuant, ut sunt sudorifera medicamenta, suum locum habere possunt, si præmissis universalibus adhibeantur; cum non tantum vim habeant attenuandi resolvendique respectu latitantis corruptæ materiæ, sed simul quoque malignas evaporationes ad cerebrum ascendentes dislipent ut per poros cutis evaporent.

Quoad corroborantia, potissimum caput respiciendum, aliæque membra principalia cum utero, quam ob causam tuto præscribuntur rotulæ capitales ex margaritis præparat. Smaragdo præp. cum ol. nucis moschata, saccharo in aq. Lavendulæ soluto, quantum sufficit, addito. Item citri conditum, Confectio Diarrhod. Abbatis, sine saccharo Rosar. novellæ, Dimarg. pigid. Electuar. latificantis Almanforis, ex quibus cum conservis appropriatis Electuaria corroborantia, vel cum saccharo in aq. melissæ & Rosar. dissoluto, morsuli confici possunt.

Tandem in summa delirii vehementia, pro leniendo symptomate totis viribus eo allaborandum ut est, ægrotanti quietem somnum procuremus: Hinc potus loco decoctum hordei & cap. papaveris vel aqua lactuc. cum syrupo papav. permixta præscribitur, & externè capiti Epithemata somnifera ex aqua Rosar. Lactucæ solani, Nymphææ, verbenæ, & similibus applicantur, facta simul inunctione per unguentum populeonis, cum parte quadam olei Nymphææ ac Rosar. pauxillo opii atque croci commixtum, imò ad laudani opiatum usum in-

terdum quoque, sed cum cautione accedendum.

Quoad dietam, aer ambiens frigidiusculus sit, vel arte, vel mutatione soli: Victus nec nimis sit tenuis nec plenus, sed mediocris ideoque iuscula hant hordacea cum amygdalis dulcibus & sem. papav. permixta: Caro sit hardi-na, vitulina, avium montanarum, perdicum, pisces saxatiles, perca, luci, auctæ, &c. Ova quoque sorbilia non improbantur: exoleribus Alparagi, Endivi. Spinachia, lactuca, beta &c. commendantur.

Exercitationes corporis sint moderatæ, conjugali congressu frequentiori non excluso cum ad corruptæ materiæ seminalis evacuationem servire queat. Hæc sunt, quæ abiens ad casum hunc propositum respondere potui, cætera præsentibus Medicis relinquens. *Gregorius Horstius Oper. Medicor. l. ii.*

Virgo nobilis 30. annum agens, boni habitus carnosa sanguinea, rosei coloris, formæ elegantis, alioquin verecundissima, & potius Mulicis quam Venereis oblectationibus dedita, deliciisque cibi & potus meracioris indulgens, singulo mense bene expurgata, duobus abhinc mensibus taciturna primo & tritris fieri capit, librisque veneris oblectari, mox viriles potius quam femineos congressus appetere, & de re aliqua venerea facta mentione, rubore faciei statim suffundi, suspiria edere, dein lascivam, inconstantem, modo garrulam, modo iracundam se ipsam exhibere. modo in fletum, modo in risum solvi, tandem tumultuosa reddita, exuto pudore, de rebus venereis in virorum potissimum consortio, cum gaudio & voluptate verba facit, & quod peius eisdem sollicitat, atque invitat, quibus & se ipsam huc usque prostituisset nisi afflicti parentes eam custodissent, etenim ab accersito Medico juvene clam manum optavit, ut illam ad propria pudenda admoveret. Quærit autem Medicus, cum parentibus, quid opus sit facto.

Nobiliss. Virgo, spontaneæ castitati cum se ipsam dicasset, res venereas semper abhorruit & animum impollutum conservavit, quousque ætatis progressu acriori, fervidiori ac copiosiori sanguine productio, semen quoque copiosius & acre progenit, quod tandem veluti turgens & naturam ad sui expulsionem stimulans, Veneris appetitum, primo naturalem excitavit, qui per medullam spinalem cerebro communicatus animale quoque cor umpeus, turbans atque immoderatus, imaginationem circa illud objectum immo & rationem ipsam depravatam reddidit, unde à turgentia, concitata incontinentia, depravata imaginatio omnia venerea licere sibi persuadet ac pudendi contrectationes & cucurbitum ipsum honestam Virginem expetere, citra pudorem cogit, quod non adeo facile contigisset absque uteri calida intemperie nec solius quidem clitoridis, in quo veneris oestrum, sed reliquarum etiam partium in quibus semen generatur, testium scilicet ac vasorum spermaticorum, quam intemperiem uteri sanguinis ac seminis, facile in corpore plethorico inducerunt cibi calidiores, vina meraciora, vita antehac otiosa, delicias ac voluptatibus dedita, auxerunt vero lectio de rebus venereis & cum viris quærita conver-

facio. Hunc autem excessum præmonstravit ab initio taciturnitas atque mæsticia illa, cum præ pudore insolens illa veneris deliderium prodere non ausa est, misera patiens, quæ tandem omnia patefacere coacta est subuersa ratione, victoque pudore, & morbofo veneris appetitu percita, qui dehinc ab Actio, quod sit uteri calida intemperies, cerebrum in consensum trahens, ad quam rabiosum delirium consequitur. Sed forsan melior fuerit ejusdem descriptio, quod scilicet sit veneris immoderatus appetitus, feminas in insaniam sine febre ducens à seminis copia & acrimonia non sine uteri calida intemperie ortum habens. Differt autem à salacitate, in qua intra limites honestatis sese continent mulieres. Pariter à fervore uteri, in quo dolor aliquis ac displicentia in utero percipitur, cum aliqua horripilatione. Ab uteri quoque pruritu, quia ille datur etiam sine libidine, ut contingit Semiramidi & Messalinæ, quæ uteri pruritus & libidinem, satyriam in viris similem, patiebantur, sine delirio tamen ac furore.

Turpis ille affectus qui totam familiam macula & labe aspergere potest, durissima namque prælia castitatis, & ubi quotidiana pugna rarissima victoria, ut ait, D. Augustinus. In principio tamen non adeo difficulter tollitur, ut si negligatur, in Moniam degenerare poterit. Itaque curatio aggredienda. Et primo quidem sanguis calidus contemperandus. Secundo uterius refrigerandus. Tercio humores acres evacuandi. Quarto semen aut eduendum, aut extinguendum. Quinto tandem caput præservandum.

In Chirurgico fonte, nullum præstantius prodest remedium, repetita sanguinis missione, ut ejusdem copia minuatur & acrimonia contemperetur. Secundum locum tenet balneum aqua dulcis, alteratum foliis lactuæ, salicis, viridis, nymphæ, viol. portul. rosar. cum aliis externis, de quibus infra.

Ex Pharmaceutico & dietetico fonte reliqua desumenda auxilia. Sic primo præbeatur leniens, potu.

℞. Syr. ros. sol. unc. iv. decoct. pulpæ tamarind. q. i. m. f. p. vel bolo.

℞. Floris cal. rec. extr. unc. i. extracti. mechoacan. gr. x. m. f. bol. quibus superbibat ierum alin. aut c. prin. depur. ad lib. ii. Quod si ob mentis oberrationem medicamenta respuat, præbeatur extractum mechoac. ad scrup. i. & ref. pil. Præparatio ita fiat.

℞. Quatuor sem. frig. an. unc. f. papaver. drach. i. ali. nymphæ, lib. i. m. fiat emuls. & præbeatur. Hanc si aversetur, offeratur seri aliniri destill. lib. i. tincturæ chorall. chymicæ gutt. vi. m. pro syr. & sic pro aliis, matutino tempore exhibendis. Purgentur deinde humores hoc modo.

℞. Elect. desucco rosar. drach. ii. diagrydii extracti mechoac. an. gr. v. m. f. bol. quibus transacta hora superbibat seri alinini aut capr. depur. lib. ii.

His peractis facile melius habuerit ipsa virgo tunc vero utatur xv. aut xx. diebus tali portione.

℞. Succu endiviæ depur. unc. iii. decoct. lactuæ portulacæ, nymphæ, agni casti. unc. v.

m. pro una, & sic pro aliis. Et interim dum hæc præbentur descendat in balneum herbis præscriptis alteratum.

Capiti pariter prospiciatur oyrrhod. ex succo lactuæ, al. ros. & viol. ac succo citri parato, & futuræ coronæ applicito.

Seminis interim in hoc casu, non emissio. Sed extinctio procuranda decoct. rutæ, anethi, coriandri, viticis mentham commendat Plinius, sed camphora præ aliis potentissime venereos ardores extinguit, hæc enim ter potu sumpta quendam luxuriam tentatum penitus liberavit, ut narat Avic. cujus dosim præponit Rhasis ad scrup. iv. sed detur à scrup. i. ad drach. f. Extrinsecus quoque renes illinantur intrigid. Gal. cum camphora reformato.

Amuleta quoque à quibusdam proponuntur & peculiariter smaragdus gelatus venerum actum impedire, in eo & in coitu frangi dicunt, corallia quoque collaudant, tamquam eximium remedium.

Proponuntur item folia cicentæ ruditer confusa, & utero accominodata, hæc enim tellibus applicata utebatur B. Basilii, ad venereum arcendum.

Vicius rationem quod attinet, sobria sit, nec nimis nutriens. Vitet aromata, talia, flatulenta, acris, vina meraciora. Azitrus optimus. Acetaria in cœna, ex foliis lactuæ, portulacæ, menthæ. Aquæ frigida potus communis venerem extinguit, prout à proprietate vinum, potu consueto, in quo nullus piscis extinctus fuerit. Vitet otium, namque.

Otia si tollas periere arcus amoris.

Somnus sit parcius, nisi adsint vigilæ, & delirium imminuat. Meditationes opportuna erunt. Sic Religiosa colloquia. Virorum vero conversatio vitanda. Sed jam dictis omnibus non contentis, marito juveni atque robusto ejus cura committatur. *Raymundus lobannus Foris, libro de morbis Mulierum.*

Virgo Gallica, nobilis jamque nubilis, vitam otiosam ducens, calida diæta utens, postquam amorem clandestinum cum ignobili quodam contraxerat, cui tamen annuere recitabant Parentes, insomniis fatigatur; jam aliquot dies incipit vociferari, locum qui nos ab altero sexu distinguit ostendere, lasciva cantare, torum tueri, & Bacchæ bacchanti si velit quis adversarier, ex insana insaniorem reddit. Immo nisi à robustissimis vinculis & duobus imo tribus viris in lecto retinetur, totis artibus ignem concipit, nuda proflit, & si quis masculus ipsi obviam factus, in illum ferociter ruit, utque veneri sacra faciat, lasciva petit; perpetuo tene me vigilat.

Semillam oculi, mala mens, gratia blanda;

Facies in totum ignescit & tumet: humor mucosus, acris, viscidus, lintea fere corrodens, per sinum pudoris, per inordinata temporis intervalla effluit:

Et teter sese halitus atris

Faucibus effundens nares contingit odore.

Pulsus præterea vehemens, Lingua exsucca, Macies in corpore toto. Medicus vocatus virginem hanc in carnificinam Gallico-Medicam inducit, ubi post iteratam trigessimam, intra sex-

sexto diem, Venæsectionem cum sanguine simul insanam Mentem, velanum amorem, chearam vitam, caramque simul & terè divinam virginis pulchritudinem exhaustit, cadaver vero Anatomicis subjectum manibus quam stupenda exhibuerit, Coronis nostræ Disputationis interet.

Morbus, qui ægram affligit, est intemperies acris calida, Cerebri, uteri, ac partium generationi dicatarum, cum delirio. audacia & immoderato Veneris appetitu, ortus à sanguinis & spirituum animalium propter vehementiorem animi impressionem orgasmo, atque ferocia quasi ignea, acrimoniam irritativam conjunctam habente. Vocatur vulgo Nymphomania, item Furor uterinus, uteri deliramentum, ex anili famula uterum cum Platone tanquam Animal furibundum concipiente, à Gallis vocatur le Fureur de la matrice. Belgis Mader-Raleiny. Gerin. *Mutter-Wahnsucht*. Etque is morbus, quo Virgines affectæ leguntur Melseiæ, de quibus Plutarchus, quæ se suspendiderunt, quod improbz Veneri non offerre possent sacra; & Lugdunenses fœminæ ex alto sese præcipitarunt in fluvios, ex nimio coeundi desiderio. Datur quoque Lacus in Bœotia Furialis, quo si quis biberit, ardore libidinis exardescit & in Furorem agitur.

Differt vero hic morbus ab aliis delirii generibus, quia Nymphomania tota in venere versatur, & nihil aliud affectæ imaginantur aut loquuntur, quam de *venere*, corporeisque deliciis Asuffocatione uteri, quod morbo tentatæ sint garrulæ, iracundæ & inquietæ; in suffocatione vero uteri mulieres manent attonitæ sine motu & loquela ac cum exigua respiratione.

Pars Affecta est cerebrum, cum quo per consensum afficiuntur partes generationi vacantes. Cerebrum vero affici patet ex functionum principum læsione; uterum, ex humore acris sine pudoris affluente. Afficitur quoque totum corpus, quod ex macie aliisque phænomenis patet.

Causa Procatarchica morbi est calida dieta, qua ægra uia est, i.e. Cibis multo sale volatili & Sulphure scatentibus, qui tantam effervescentiam in corpore effecerunt, ut particulas quasdam crassiusculas & nonnihil viscosas pori arteriarum transmiserint, quæ alias non fuissent egressæ. Possunt enim pori arteriarum peccare, (1) cum nimis patuli sunt, ita ut crassiores quam solebant particule extravasentur, quæ in partibus hærendo producant obstructions, polleat dolores, denique. Inflammationes. (2) Cum pori contorsione aliam figuram acquirunt, ita ut partes acres à se dimittant, quæ sua acredine dolores excitant. (3) Etiam pori peccare possunt nimia angustia, ita ut non transmittant particulas, quas admittere debebant. hinc si sistantur particule illæ acres, lancinando quaquaversum dolores insignes pariunt. Videmus jam nostro in casu poros Cerebri & uteri peccasse, primo & secundo modo. Primo dum crassiores viscosæ in cerebro particule extravasatæ fuerunt, quæ obstructionem, postea inflammationem produxerunt, & antecedentem huius morbi causam præbuerunt. Secundo dum pori aliam figuram nacti particulas acres salinas à se dimiserunt, quæ in partibus venereis actionionibus dicatis hærendo, suæque acredine vellicando

pruritus, titillationem, denique dolorem peperunt.

Causa antecedens est dispositio inde enata sanguinis & spirituum animalium fervida, seu ignea sulphureosissima acris, quæ ad Cerebrum dehinc ad uterum delata, atque utrinque in orgasmum acta, proxima ac immediata Affectus nostri causa facta est. Hic vero ad concipiendum clarius modum, quo Cerebrum & uterus in dicto casu afficitur, de Cerebro & utero nonnulla inferenda erunt.

Cerebrum itaque concipio, tanquam contextum innumerabilium fibrillarum tenuissimarum, sibi mutuo intertextarum, plus minve rotundarum, non quidem Mathematicæ, cum natura tanta æquei operamina non exsequatur, sed utcumque teretium & multis in locis figurarum irregularium. Quapropter ob figuram hanc non tam arcte sibi incumbere possunt, quin aliquos ducius relinquant intermedios, non secus ac inter aliquot cylindros sibi mutuo impositos, remanere videmus per totum decursum spatium aliquod triangulare. Et hæc spatia fere referunt figuram talem, qualis ex contactu trium pluriumve circularum oritur, sed inordinatius figuratam, adeo ut in quibusdam locis vix ullum tale intermedium spatium relinquantur. Istos autem canales exiguos secundum fibrarum longitudinem extensos cuicumque figuræ vocabimus tubulos.

Uterus contextus est innumerabilium vasculorum tam Venolorum quam arteriosorum, imo Lymphaticorum quoque & nerveorum, id quod videre licet in uteri vasculis cera repletis, qualem phylatrorum oculis publice Lugd. Batav. exhibuit Dn. Nuckius Anatomicus Arausoniensis Principis, in quo minima etiam vascula quæ alias visum fugiunt, & non nisi armatis oculis cerni possunt, ad instar minimorum ramusculorum arborum, cera rubra, viridi, & Mercurio suo præparato subtilissimo repleta, in conspectum venire. Textura autem illa remota non potuit non tam arcte sibi incumbere, ut non relinqueret spaciola, quæ pororum intro foras & foris intro nomine veniunt.

Nunc in viam redeamus, cum extra oleas hic migraverimus, statuimus, particulas crassas viscidas, in jam dictos Cerebri tubulos adactas, vel totaliter illos obstruxisse, vel partialiter. Totaliter, quando corpus obstruens ejusdem figuræ fuit cum obstructis poris, e gr. si porus fuerit triangularis & particula obstruens etiam triangularis. Partialiter vero, quando corpus obstruens non fuit ejusdem figuræ cum obstructis poris, adeoque necessario reliquæ quædam pororum remanserunt. Ut cum pori rotundi obstruuntur à corporibus triangularibus aliisque angulosis, qui itaque non totaliter opulentur, sed reliquæ quædam pororum remanent per quos non nisi Materia Primi Elementi Cartesi sive subtilissimus (qui æther primus ille motor nostri corporis, ut & aliarum omnium rerum in macrocosmo existentium est teste Cartes. Tom. I. Eq. 45. 48.) fluere potest, ob parvitatem indefinitam, (cum vacuum in rerum natura non detur) multum istius igneæ materiæ indefinenter illac fluere cogitur, quæ materia ex sua natura celerrimo motu per hæc angustias, cum determinatione quadam magis

versus hanc quam illam partem Cerebri, torrentis, imo fulminis instar ruat, prout nempe illi porri aliter atque aliter sunt dispositi, atque æquilibrium spirituum animalium in Cerebro tollunt. Nam cum spiritus in statu naturali in æquilibrio positi sint, minima vis superaccedens hoc æquilibrium tollere valet; quare non mirum est quod Materia Primi Elementi ab una parte magis quam ab alia mota, hoc æquilibrium tollat; æquilibrium jam sublato non placide & æquis viribus ut ante per Nervos in corpus distribuatur, sed inordinatis motibus huc atque illuc discurrentes per Cerebrum, & ejus vestigia, Delirium producant.

Nunc ordo jubet, ut ex causis prædictis inflammationem nempe, & ignea terocia, tum ærimoniam sanguinis & spirituum propter calidam dictam contracta Phenomena in casu nostro proposita deducam. Et quidem lasciva est memorata Virgo, ut locum scilicet ostenderet, qui nos ab altero sexu distinguit, lasciva cantaret, nuda profleret, in viros obviam factos rueret, linguam micantem intra labia aliorum vesana vibraret; non aliunde vero hæc oriebantur, quam quod per vitam otiosam & contractam cum ignobili Juvene amorem, sanguinis & spirituum, tum in Cerebro, tum in partibus generationi destinatis, excitatus fuerit orgasmus, hincque nulla alia Cerebro impressa fuerint vestigia, quam de inundo conjugio, celebrandaque lascivis illis gestibus Venere. Nam quotiescunque talia vestigia repræsentantur menti, oritur etiam cogitatio de eisdem objectis, spiritus enim animales dum motu feruntur immodico neque Anima amplius in eos obtinet imperium, Phærontis ad instar solares equos flectere impotentis, in illa vestigia irruunt, quæ cum nihil nisi lascivi contineant, nihil nisi lasciva quoque menti repræsentant, adeo ut Mens, quatenus in cogitatione consistat, minime deliret, (æque namque sana est in stultissimis quam in sapientissimis) sed in eo tantum vitium sit, quod non distinguat bene objecta simul sibi oblata, quæ cum in ægra nostra nulla alia sint, quam lasciva, oriuntur miræ illæ compositiones & sermones huic ægræ nostræ familiares. In hoc igitur erat mens, dum putat ideas excitari in se à causa externa præsentanti cum excitentur revera tantum à vestigiis Cerebro impressis. Sic etiam præter rationem moribundi dicuntur ratione destitui, eo quod nesciant cogitationes suas proferre, ad interrogata apposite respondere, unde non est, quod mulierculæ tantopere clamitent, eorumque misereantur, quasi omnem rationem perdidissent, cum tamen illis in casibus, Mens tanquam suo ergastulo soluta, multò feliciter agat & longe diviniora speculetur. Interea otiosam vitam, quæ prægressa est in nostra ægra, implevisse talibus vestigiis quoque Cerebrum, Ovidius Amoris ille Proto-Notarius jam olim testatus est:

Otia si tollas periire Cupidinis arcus,
Contemptæque jacent, & sine Luce faeces
Quam Plato nus rivo gaudet quam popu-

Tam Venus otia amat, finem qui

quod dicitur AMORI.

Cedit amor rebus, res age tutus eris.

Accedit, quod Virgo fuerit, nam
Fœmineo magis est usu Venus cetera sexu.
Mitior illa Viris.

Imo nubilus, juxta Ovidium enim
Prima cupidineis ætas manet apta triumphis.
Non gaudet veteri sanguine mollis Amor.
Porro etiam natale solum ad hunc Affectum
quicquam contulisse dici posset, est enim Virgo
Gallica,

Proumque genus regionibus illis.
In Venerem est, ilagr. & vitio gentisque
suoque.

Imo quod lasciva nimis fuerit ante hunc affectum, ex gestibus facile colligere erat, præprimis ab avominando, dum micantem linguam intra labia aliorum vibraverit, qui mos Gallis, talis, Hispanisque frequentissimus, attamen periculosissimus. (Galli vocant baiser à la Florentine, eo quod maxime sint consueti hæc oscula Florentinis fœminis.) Dn. D. Job. Mauritius Hoffmannus quondam nati retulit, sibi Patavii notum fuisse Baronem Suecicum, quæ ex osculis à teenina Lue Venerea infecta, labiis impressis, & saliva per linguam communicata, uvellam suam amiserit. Idem quoque Amico meo contingit, qui cum Galinas magis quam Gallos Lutetia quævisset, ex osculo tali Lue Venerea correptus, misere animulam suam exspiravit. Tales jam lascivæ impressiones in Cerebro factæ cum spirituum ope Animæ repræsententur, lege conjunctionis Mentis cum corpore, (quæ consistit in eo solo, quod Mentis cogitationes certas sequantur certi motus in corpore, & quod certos motus in corpore, sequantur certæ perceptiones & cogitationes in Mente;) sic mox quoque in dicta ægra indecoros corporis motus introduxerunt, atque effecerunt, hinc ut vociferaretur lasciva, cantaret.

Non peccare putans quod sapius oscula
jungat.

Quemadmodum vice versa quando partes genitales pruriant, ab acerbis sanguinis particulis, ita ut particula nervæ vellicentur, & periculum incurrant ruptionis, tunc in Anima oritur idea titillationis Venereæ & influxus hic spirituum; jam vero cum spiritus inordinatis motibus hinc illinc discurrant & julto copiosiores influant, facile patet, cur ægra nostra interdum a tribus viris, & fortissimis vinculis in Lecto retineri nequiverit.

Vigilia perpetua in ægra dein notabatur, excitata propter spirituum animalium motum nimium, ex imaginatione impressisque phantasiæ vestigiis subsecutum.

Facies in totum ignescit & tumet, quia Materia Primi Elementi seu æther subtilissimus copiosius per humores & sanguinem prope partem inflammata cum transfluat, hinc omnes humores cum sanguine movet & rarefacit, unde tumor oritur & inflatio faciei ejusque rubor, unde etiam dependet Pulvis vehemens.

Lingua exsucca est, ob duplicem rationem, aut (1) quia dum serum & partes aquæ sanguinis habitum corporis, vel per alias vias magna copia extra corpus protruduntur, Lympha vix aliqua pro necessaria humectatione ducit ad os, linguam & gulam, quod alias tunc sensum ariditatis in nobis, & tunc sitim efficit, quæ
fitia

fitis potu sedari potest, cum tantum proveniat à defectu humidi; aut (3) glandulæ salivales sunt obstructæ, ut nihil vel parum salivæ secretæ ad os mittatur, & hinc à dicta causa si cæteroque fiat fitis, potu, licet immodico, non tollitur, sed ventriculi coctio & appetitus destruitur; quare potius opera danda erit, ut gargarismatis & internis Medicamentis obstructio referetur.

Adhæc Spiritus acres magno impetu in ægra dicta dum ad arvum feminale quippe salacitatis partem propulsi, acrimonia sua trillant & convellunt quam vaginam Uterinam, glandulis undique & undique repletam, ad modum mali Citri compressi liquorem exhibentis, vel spongiæ aqua repletæ, manuque fortiter compressæ, inde pariter Liquorem profluere faciunt, adeo acrem, ut lintea corrodat, pruritum pudendorum inducat, teterrimum quoque de se spargat odorem. Eadem demum acrimonia spirituum horumque celeritimus motus, in causa est, quod macies sit in corpore toto. Cum enim pinguedo nihil aliud sit, quam racem minimi lubidantæ oleosæ minimis vesiculis contentæ, à quibus ductus peculiare primum prodire Malignius observavit, qui similem succum oleolum venis advehunt, (uti id graphice demonstravit in Cursu Anatomico Dn. du Verney. Anatomicus Regius Parisius) ut acrimoniam sanguine temperet, quia particulæ vero illæ pingues, ob sanguinis acrimoniam hic nimium sunt abraasæ, nihil aliud sequi potest, quam ut sanguis indies deficientibus hisce oleis particulis, acrior reddatur, particulæ nutriente abrasantur, & macies sic inducatur.

En Phænomenorum hoc in Casu occurrentium origines, nunc ad Prognosin accedamus. Muerabilis igitur hic Affectus turpissimus, & macula honestioribus familiis, uti lente tantum & sensim curari, ita denique in Maniam consummatam degenerare potest.

Curationem quod attinet, ante omnia illa inchoanda est à regimine rerum non naturalium, adeoque aer est eligendus temperatus, quod si enim frigidus corpus nostrum intrat aut ambit, poros contrahit Curaneos, contrahendo claudit, obstructionibus que ansam præbet. Calidus vero nimiam in corpore effervescentiam auget, particulasque crassas extrudendo inflammationi materiam præbet. Alimenta usurpanda sunt tenuia, aquosa, insipida, cavendum à salis, calidioribus multo sale volatili & sulphure constantibus, cum ad Venerem stimulaudum maxime sal conducatur, ut hinc non adeo insana & vana sit Poëtarum fabula, Venerem ex Saturni testibus in mare projectis & ipsius spuma salina ortam, fixitans, hinc Ausonius cecinit.

Oria solo, suscepta solo, pare edita caelo.

Æneadum genitrix--Venus. Vinum si concedi debeat, sit oligophorum, Cerevisia tenuia aquosa, præsertim hordeacea, particulis suis molibus particulas pungentes acres vaginalium instar recondentibus, Somnus procurandus, quiesque imperanda, imo hypnoticis concilianda, à nimia tamen dosi cavendum; nam ubi ægri à nimis vigilis sunt defatigati, si semel dormiant, vix iterum expergeunt, id quod ante aliquot septimanas observare licuit Furthi in Patria mea, in obstetrice, quæ ex

parva tincturæ opii dosi, vigiliis antea defatigata, satis cessit Excretiones quantum possibile promoveantur; Ocium vitetur, (mouente Ovidio.

Hæc monitis fugias otia prima meis,

Hæc ut ames faciunt,)

& laboribus continuis exerceatur. Exhortetur semper talis ægra ad honestatem, & opprobrium ei proponatur ut resipiscat, sic Milesias virgines curatas legimus lege promulgata, ut quæcunque sese, hoc affectu percitæ, necarent, per forum nudæ traherentur. Venererent cui thura sunt, nam & in maritatis interdum hic Affectus, præsertim illis, quarum mariti ferendis talibus oneribus impares obvenit,

In non maritatis his nihil proficientibus, triplici indicatione curatio instituitur. (1) Sanguinis nimius motus immutatur; (2) Obstructiones referuntur; (3) Acrimonia sanguinis corrigatur. Incipimus itaque juxta primam indicationem a Venæsectione tanquam sacra anchora quæ bis vel ter eodem die erit, modice reteranda, ut vasis sanguineis notabiliter depletis, & non ita distentis, pori illorum magis coarctentur & subsidant, unde tanta copia spirituum in Cerebro deponi non potest, & omnia in corpore sunt tranquilliora. Locum quod attinet Rodericus à Castro Saphænam constituit; nobis sufficit quævis patentior Vena, cum propter sanguinis circulationem in Medicam artem nostram introductam, omnes illæ veterum controversiæ de Venis eligendis, corruant. Unam tamen admittimus distinctionem, nempe si sanguis subtilis uti in hoc casu peccet, Venæsectio in brachio, si crassius terrestris in pede est instituenda; & quidem in Affectibus, illis ubi sanguinis magnus impetus est, & vires adhuc constantes, melius est affatim illum extrahere, ad levissimum Animi deliquium; in reliquis Casibus ut in morbis frigidis; non tunc nos tam liberales esse possumus, quam Veteres fuerunt in illa administranda, eo quod homo facilius in Lypothomiam deturbari quam inde revocari queat.

Rodericus à Castro Cucurbitulas commendat, sed quid quæso illæ præstare possunt? nonne sana rationi, & circulo sanguinis repugnat hoc dolorificum remedi genus? Videamus quomodo illæ apponentur, & quem usum præbeant. Candelam ceream primum isdem supponunt, unde aer intra eas rarefit, hoc facto eas cuti apponunt & aer rarefactus iterum condensatur, ac minoris locum replet, unde fit ut cutis attollatur intra cucurbitulas, ad locum ab aëre relictum replendum. Has uno atque altero momento temporis ita applicatas, & in quiete relictas, remonent à cute, illamque ab aëre illo sublatam & attractam (uti loquuntur) incidunt lancetta, sic iterum candelam accensam illis supponunt, & tenuiorem ex laxis vasis capillaribus sanguinem extrahunt, obstructionesque in vicinia aliquo modo tollunt, sed successus non semper eorum votis respondet: quia sæpe accidit, ut humiores ita sint indurati, ut quamvis tubuli majores sint facti, isti propter viscositatem non possint egredi. Immo subtiliori sanguine per cucurbitulas extracto, crassæ remanent, & terrestres particulæ, in corpore, tanquam instrumenta novas obstruccio

nes producentia, (quæ jam in nostro Affectu sunt,) an igitur hoc in calu conducant cucurbitulæ, considerandum illis relinquo, quibus.

De meliori into nuxit præcordia Titan.

Veteres Autores curationem absolvere student frigidis, sed nunquam innuunt, quid sint frigida. Et quidem frigida sunt, quæ particulis crassis & immobilibus constant, nec obstructions in corpore tacere apta nata sunt, jam vero nonne in nostro calu acculavimus obstructions sane redderent pertinaciores. Profunt tamen ex frigidis nitrata, quæ ex salinum sunt natura, quibus deobstruunt potius, quam obstruunt, nullum sal volatile in corpus ingerunt, imo denique parum Materiz subtilissimæ secum vehunt, accidit enim idem cum nitro quod cum marmore aut glacie, quibus si manus imponatur, friget: nimirum cum calor alias in nostro corpore sentitur, quod certa ætheris copia fluat per ejus poros unde Tremor inducatur in texturam ejus fibrarum, jam si extrinsecus ponatur impedimentum, quo minus solita illa ætheris copia affluere possit, statim ille Tremoris gradus, qui erat in fibrillis minuitur, atque inde sentitur frigus. Sic e. g. Glacies, marmore, poros habet, per quos parum materiz P.E. fluit, jam si manus imponatur, impeditur æther, quo minus solita copia in illam partem irruere queat atque hinc coloris oritur imminutio seu frigus. Fiat itaque pulvis refrigerans talis.

℞. Lap. Prunell. gr. xv. l. ℞i. Camph. Sacch. Saturn. an. gr. iiii. iv. Laud. op. gr. i. M. F. Pulvis. Camphoræ enim & Laud. op. leniter increassando faciunt, ut sua spicula salina acria non adeo exferre possit Massa sanguinea.

Confert potissimum serum lactis, præcipue si chalybs in eo sit extinctus, nam volatile in sanguine aliquatenus remoratur, ob metallicam gravitatem. Nitrum in aqua dissolutum (vel ejus loco Sal prunell.) propinatum, summe quoque prodest in omnibus morbis, ubi sanguinis nimis peccat ætus, & is nimis volatilis est, ut & sp. nitri qui aperit, & coagulando motum sanguinis retinet, & denique diutiuscule in sanguine hæret.

Profunt quoque omnia, quæ sanguinis motum conpefcunt, ut oc. cancr. Corall. Terra sigill. omnia martiata Sol. auri. & lunæ, sed hæc omnia subtilissime debent teri, ne ubi alias aperiuunt, nunc potius obstructionem pariant.

Inter externa sequens Oxyrrhodinum (ut levis somnus excitetur) conducit.

℞. Ol. Rosar. ℞iij. Succ. portulac. Lactuc. Sola. an. ℞i aq. papav. Rosar. an. ℞iij. Aceti rosacei ℞i. M. F. Oxyrrhodinum.

Cum luteis duplicibus capiti tepide applicandum. Possent vero etiam insuper ad ætun sanguinis coercendum maxime mihi commendata emundtoriorum inunctiones nitrosæ, & sinapismi umbilicales hic insignis usus esse.

Accedimus ad secundam & tertiam indicationem, quæ consistit, in obstructionum refectione & acrimonia sanguinis temperanda; ad quas obstructions in cerebro & meningibus referandas conducit potens sudoriferum si vires conlitterint, particulæ enim sudoriferæ, particulas acres secum attoilunt, easque volatiles reddendo, extra corpus protrudunt.

℞. Sal. Carduib. gr. xviii. Bezoard. miner. gr. vii. Camph. gr. ii. Laud. op. gr. i. sp. vitriol. gr. vi.

aq. Carduib. ℞ii. Syr. papav. ℞iii. M. F. Potio.

Viva animalia dulcetra & capiti applicata porro profunt, quia calor & vapor blandus, qui ex his exhalat, maxime amicus est nostris poris, & conveniens aliquo modo ad obstructions referandas in us.

Pedes quoque contineantur in balneo tepido, in quo cocti fuerunt Capita papav. & Fl. Chamouill. & reliquæ herbæ emolientes, ut vapores placide ad caput ascendant, quæ minorem motum sanguini conciliant, & particulis suis molibus instar lanæ hastas aculeque pungentes, i. e. particulas acres involuunt, & sic quiete inducunt.

Confert quoque ob particulas molles, acres, temperantes, sequens Emulsiio.

℞. Amygd. dulc. ex cortic. at. ℞i. contunde in mortario, unde aq. decoct. hord. ℞viii. Sem. iv. frigid. maj. an. ℞ii. papav. ℞ii. Sacch. alb. ℞iij. Syrup. de papav. ℞ij. M. F. Emulsiio.

Omnia præterea lenientia profunt, ut Gelatina C. C. hordeata, amyllum, & omnia gummata, quia particulæ eorum moles, & ductiles, acrimoniam sanguinis involuunt, & sanguinis motum nimium inhibent.

His omnibus nihil conducentibus, natrium omnium, si possibile est, fiat, idque cum Juvene, aut viro robusto, & qui strenuum in hoc ludo athletam agere possit.

Nunc promissis meis memor, quam infelicissimè res gesta sit cum hac nostra ægra, paululum annexere lubet. Accersitus quippe Medicus, vix explorato morbo, institutis intra vi dies triginta per V. S. reulsionibus & derivationibus, injecto quidem primo Clystere acri, cum tamen sanguis acrimonia peccaret, posteaque exhibita purgatione, ad putrefactum semen evacuandum. (juxta methodum Gallicam, quam ad oculum delineavit Medicorum gallicorum Momus Dn. Moliere, in ludo scenico inscripto: *Le malade imaginaire*: scilicet clysterium donare, postea seignare ensuita purgare) in ultima instituta phlebotomia, quæ erat trigesima, ita curavit scil. ægram, ut cum sanguine in purum simul spiritum efflaverit, incalto illi amatori nuptu, quem immundissimum vocare solent spiritum, dum ultimus adhuc de rebus venereis halitus inferebuisse, nam casta Venus cygnis vehitur. Venus improba Corvis.

Postquam vero jussi parentum in viscera defun- & inquirere licuerat, præter clitoridem mira magnitudine prominentem, ulterius postquam curiosas manus admovimus, ovarium sive testes muliebresprehendimus, maximæ magnitudinis, ovulaque inspersa pisum, si non superantia, certe adæquantia; obstupimus horum aspectu, cum vix credam tale quid annotatum fuisse in libris Practicorum, excepto Cl. *Blancardo in Hol- landischen Tyden Lehr-Register Ann. 35.* qui simile exemplum recensuit; sed quænam Phænomeni hujus admirandi causa? ex superioribus jam constat insignem adfuisse sanguinis & spirituum organum, quid mirum, igitur si ille in humore ovulorum factum, ipsa in tantam magnitudinem distendisse?

Observationes.

Furor uterinus in puella.

Puella. 15. annos nata, quæ cum menstrua nondum passa esset, illa vero instabant, ob motum ejus fluxus sequiori sexvi familiaris, impeditum

peditem furore uterino & convulsionibus per intervalla misere torquebatur; Saphenam ergo dextri pedis incidendam curavi, ex qua cum sanguis liberaliter fluxisset, paulò remissiora fuerunt symptomata. Præscriptis insuper pilulis menagogis & cæteris non neglectis quæ sana ratio & experientia ad profiganda symptomata suadebant, promotus fuit sanguinis ille fluxus & cum eo Deo benedicente, fuit restituta. *D. Caspari Collichen.*

Ex Pleuritide notha Furor uterinus.

Virgo nobilis ex pleuritide spuria decumbat; quæritur à venæsectione & carminantibus aliisque remedium. Et bene se habebant omnia cum intervenit ju. eais parentem virguncula invisens; in quem illa fixos conciliens oculos ita è vestigio immutata est, ut mali pleuritici oblita, in cantiones & gestus à maternos affectum suum profunderet. Desit itaque malum primum, sed recruduit ita violenter secundum, ut in delirium acta de nulla re vel cogitaret vel loqueretur, nisi de nuptiis & fescenninis, certa in gremium juvenis irruere quories rediret, non sine insigni pudore honestissimæ, unde orta erat familiar. Neque aliter obviam iri potuit in majorem quotidie flammam erumpenti desiderio, quam removendo ex oculis ejus objectum illud amoris. Tandem allato in hanc rem ficto nuncio, mortem juvenis denunciante, illa post deploratam satis diu orbitatem suam, helleboro per vices expurgata ad sanam mentem rediit. *D. Olai Borrichii.*

Convulsiones & Furor uterinus in Nobili Muliere ex mariti anaphrodisia.

Furoris uterini subjectum non tantum reperire est in virginibus sanguine vegetiori præditis ac bene habitis, vel in viduis junioribus ac ætate florentibus; sed etiam in nuptis inque modestioribus quarum mariti impotentia ad venem afficiuntur. Sic non ita pridem consulebar pro muliere nobili ac formosa, 30. ad summum annos nata, quæ cum jam a sex annis conjugis sui amplexibus minime frueretur, propterea quod ignavior in hac palæstra, seu potius inutilis athleta, factus esset, manibusque interea sapius ab ipso una cum illa cubante in vulva pruriente atrectaretur, in furorem deducebatur cum motibus convulsivis, ac frequentibus animi deliquis tumultum quid in dies minitabantibus. Cui autor fui ut præter specificæ, turgescientiam seminis compescencia, abstinentiam à mariti lecto in sui medelam adhiberet, seorsimque ab ipso cubaret; unde sane bene habet.

Quia scilicet cum nondum morbus ad summum sue exaltationis gradum evectus esset, ratioque ac minus pudor ab eo pessundati, vires suas ultra partem aliquam generis nervosi non exerebat, idque tantum occasione data, scilicet dum maritus imprudens, propriæ debilitatis oblitus atrectationibus in motus efferos ciebat spiritus quos ratio ac pudor alias compescere noverat. Quæritur à quibusdam cur sola mulier hocce crucietur furore, vir que ab illo

immunis vivat? Cui quæstioni responsurus celeberrimus Meniotius, duplicem rationem adfert. Primo quidem quod vir sui potentior sit; secundo quod non tam facile sit virilis seminis ac muliebris cum cerebro commercium. Verum ne in ejusmodi rationum futilitate retegenda immoret; quis nescit priapismum seu satyriasmum quo affliguntur viri, sui generis furorem esse, quo ratio sæpe ita proculcatur, ut non tantum in obvias incurrant feminas, sed etiam in sui sexus homines, ipsaque etiam animalia bruta, ut scilicet revera brutam suam expleant aviditatem. Imo ad cujusvis mulieris aspectum, membrum nobisum aut saltem in quod præcipuum impetum facit humorum ac spirituum orgasmus, evolvant, illudque sub omnium adpectu tractando semen centies de die effundant. Talem prorsus hic habemus virum, qui non sic tamen minus ad octogesimum tertium, & quod excurrit, ætatis annum devenit, quique etiamnum hodie in hac provectioni ætate, tot pollutionibus ac amplexibus minimi fractus, plena fruitur sanitate. Ita non contigit mulieri viduæ quæ cum novissime in furorem hunc incidisset, affecta que etiam durius imaginatione se diabolo nuptam crederet, nihil obscenum omittebat, sed inde brevi enecta est. Utinam corpus aperire datum fuisset.

De Furore uterino unicam Inspectionem Anatomicam breviusculum ex Clar. Steph. Blancard. Anaton. Præflic. adducendam habemus quæ hæc est.

Virgo furore uterino tacta, tanta mania fuit correpta, ut catenis vinciri deberet, Interim ex improvviso obiit.

Aperto cadavere, ovarium dextrum pugni magnitudinem æquabat, succique plenum erat.

FURUNCULUS.

Furunculus Latinis, *ἄσθλη* Græcis, Nostratibus *Een floet-hin*, est Tuberculum in acumen protuberans, cum inflammatione, duritie, rubore, ac summo dolore, ovum columbinum magnitudine non excedens. Similiter C. Celsus lib. 5. cap. 18. Furunculum definit, quod sit, tuberculum acutum cum inflammatione, & dolore, maximeque ubi jam in pus vertitur.

II. Species autem Furunculi plures sunt: Alius enim benignus est, ac mitis: Alius malignus, ac vehementius dolens. Idem observavit Paulus Ægineta lib. 4. cap. 13. sic inquit: „Furunculorum alius est clemens, alius maleficus: Clemens quidem cum in sola cute coeunt; Maleficus autem, curatuque difficilis, cum altius radicibus actis in cutem erumpat.

III. Fit vero Furunculus è crasso, impuro, acido-acri, aliisve modis depravato sanguine, quem natura à reliquo puriore secernens, tanquam insensum & inutilem in corporis habitum critice expellit.

IV. Signa quibus cognoscitur hic affectus sunt exigua inflammatio cum pustula, & vesicula sensim increfcens, cum dolore, duritie, & rubore cum Scatam attigerit, qui paucos intra dies absolvitur. Porro tuberculum in acutum tendit, & columbini ovi magnitudinem non excedit. C. Celsus aliud signum adjungit, dicens: „ Qui ubi adaperitus est, & exit, super apparet „ pars carnis in pus versa, pars corrupta subalbida, subrubra, quem ventriculum quidam „ furunculi nominant.

V. Idem Celsus loco citato docet, in furunculo nullum esse periculum, etiam si nulla Curatio adhibeatur. Maturescere enim per se, atque erumpere. Sed dolorem efficere, ut potior Medicina sit, quæ maturius libeet.

Dicendum ergo furunculum periculo vacare, nisi morbo grassante maligno in Anthracem degeneret. Sed quoniam Cacochymiz soboles est furunculus, hinc raro fit, quod solitarius erumpat, sed fere multis corpus scateat, atque inquinetur.

VI. In curatione furunculi, quum humor hujusmodi tumorem efficiens crassus sit, impurus, acido-acris, & aliquando malignus, nunquam Repellentibus utendum est, sed ex sententia Galeni, & Pauli Aeginetæ, furunculus coquendus appposito Pane masticato, & in Cataplasmatismis formam redacto; vel Diachylo cum gallinaceo adipe; vel ex C. Celsi præscripto, Gummi Galbano.

VII. Igitur applicandum mox emplastrum

diachylum cum gummi; vel quid simile facile concipi potest, ut Puris generatio promoveatur & acceleretur. v. gr.

℞. Picis navalis, liquidæ an. ℥ij. Gummi Sagapœni ℥i℥. emplatri diachyli cum gummi ℥℥. M. F. S. A. emplastrum.

Vel ℞. Rad. lilior. alb. rec. ℥ij. caprarum sub cineribus assiatæ. ℥i℥. sol. alexæ, flor. camomillæ, meliloti an. Mj. Coctis in aqua pura, vel cerevisia tenui ad molliem, & in mortario contusis adde Farinæ Secaliginis mellis virginæ an. ℥ij. unguenti Basiliconis ℥i℥. vitellos duorum ovorum M. F. S. A. Cataplasma. Furunculo aperto, & expressio omni Pure, vix ulla ultra Curatio necessaria est. Equidem Puris educio ut facilius fiat, imponendum porro emplastrum diachylum cum gummi, cum unguento basilicone, aut alio quodam mundificativo: postea emplastrum diachylum simplex, vel diapalma.

VIII. Sed malignus si sit furunculus, & ex venenata materia excitatus, malignitas illi, priusquam applicentur remedia, foras trahatur admoda cucurbitula cum multa flamma.

IX. Cæterum ut præcaveatur ne sæpius ejusmodi tubercula infestent, præcipiunt multi ut nux moschata mas vestibus insuatur. Sed quæ vi & proprietate amuletum hoc ab istis satellitibus immune corpus reddere queat, sagacioribus expendendum relinquo. *Joh. Munnike in Praxi Chirurgica.*

Finis Libri Sexti.





BIBLIOTHECÆ
MEDICO-PRACTICÆ
LIBER SEPTIMUS.

De Affectibus à Litera G incipientibus.

GALLICA LVES

Vid.

LVES VENEREA.

nitus evanescente, terribili periculo perfungebatur.

GANGRÆNA.

GANGLIUM.



De eo videatur caput de Atheromate. Hic tantum observationem adducimus de Ganglio Nemausi mense Novembri anni. 1682. mortui viperæ curato quam benigne nobis communicavit Clarissimus D. Rivalier, qui illic per plures annos Medicam Artem cum magna celebritate exercuit, nunc verò Patria sua Religionis ergo exul, Lausannæ pro tempore commoratur.

Ganglium in sinistro carpo gerens Pharmacopola Nemausensis, Farie nomine, nullius non generis remedia, ad fastidium usque, per sex aut septem annos, importuno tumori adhibuerat. Fermenta, purgationes, thermas, emplastra, gummi, hydrargirum, omnia frustra. Mandandas aliquando viperas incautè tractans, in pollice sinistrae manus commorsus est: sed ita leviter ut nullo affectus dolore, oculatorum testium fidem vix sequutus, ictum se fuisse crediderit. Sed cum inceptum opus intentioni animo prosequeretur, nocentissimum, tamen pollicis & brachii, innotescens venenum, sero satis sibi consulendum esse docuit. Jam interiora pervadens, humoribus pestifero fermento coinquinaris, vitales partes adoriebatur, spiritibusque, præ animi terrore, aut ob humorum depravationem, in confusionem actis, apertum mortis periculum impendebat. Per multis igitur Medicis certatim Pharmacopolæ salutis studentibus, nullaque promiscuè antidota propinantibus, ipse unam aut alteram viperam super craticula tostam devorabat, inciso sæpius vulnerato pollice, haustisque cardiacis, inprimis verò sale viperarum volatili; ganglio pe-

Angræna & Sphacelus nec tumores sunt, nec ulcera: imo nec morbus Sphacelus est, sed partis affectus *iniquus* & mortificatio: gangræna verò ad mortificationem tendens, quæ nonnunquam sine tumore invadit: quia tamen frequentissimè tumores subsequitur, inflammationes præsertim graviore, plerique inter tumores de affectibus hisce agere consueverunt: quorum ductum nos sequentes de iis hoc loco etiam sumus dicturi.

II. Gangræna igitur, quam vulgò *het hette Duer*, *ofte den Heijjen-brand*, & ignem S. Antonii vel Marcelli nominant, incipiens est partis mortificatio aut corruptio, ad *iniquum* seu mortificationem tendens, cui nisi celerrimè succuratur, membrum plane emoritur, omnemque sensum & vitam amittit, nihilque seu secetur seu uratur percipit: quæ *iniquus* ita perfecta Latinis Sideratio, Græcis *σφαια*, nostratibus *het zonde-Duer* nuncupatur, adeo ut duo hi affectus non nisi gradu differant. In Sphacelo namque pars omni sensu & vita destituta est, planeque emortua in gangræna verò perfecta partis corruptio nondum adest. Ex cum in gangræna nondum sit tanta corruptio, neque perfecta mortificatio, molliores partes solummodo invadit: Sphacelus vero, utpote qui est perfecta ac integra partis corruptio non solum partes molliores, cutem puta, carnem, venas, arterias, nervos invadit, sed & ipsa ossa intacta non relinquit.

III. Hinc multi gangrænam definiunt, quod sit incipiens mortificatio partium corporis mollium, serè inflammationem gravem, aut male curatam insequens. Galenus lib. de tum. v. bus præternaturam videtur definire, quod sit initium mortificationis in partis agæ, quæ paulatim sic invadit & occupat partes vicinas & adiacentes, ut nisi adferatur remedium, perfecta subsequatur mortificatio. Et alibi inquit, gan-

grænam esse dispositionem mediam inter summam inflammationem & sphacelum, eamque inflammationibus esse tanto deteriore, quo major est gangræna sphacelo. Alii aliam dant gangrænae definitionem. Sed omnes omnium definitiones aut descriptiones adferre infinitum foret: sufficit si dicamus, gangrænam esse incipientem & imperfectam partium mollium, cutis scilicet musculorum, venarum, articularum, nervorumque mortificationem sphacelum vero plenam, perfectam, & absolutam mortificationem, non solum supradictarum partium, sed & ossium quoque, aliarumque plus minus solidarum. Vel gangrænam esse partis hientem mortificationem; sphacelum vero jam factam & deploratam.

IV. Cum itaque uterque affectus, gangræna nempe & sphacelus, sit mortificatio, hic quidem perfecta, illa autem imperfecta, adeoque nec differant nisi gradu, ideo utriusque eadem erunt causa.

V. Gangræna & sphaceli causa est, quum pars spiritibus, quibus foveri & vivificari solebat, destituitur. Spiritibus pars destituitur, vel quia in ista parte suffocantur, vel quia in eam transferri non possunt. Suffocantur & opprimuntur spiritus aut nimia inflammatione; aut frigore externo; aut aquoso humore in partibus collecto, aut nutrimenti defectu; aut animalis venenati punctione seu morfu; aut nimio aestu externo ex ambulatione; aut magna partis contusione; aut scorbuto. In partem perferri nequeunt spiritus, quum nimia vasorum & pororum obstrukcione via interclusa & obturata est.

VI. Namque Gangræna huiusmodi raro oritur, quando naturalis vivificans calor ex impedita transpiratione suffocatur, uti evenit in magna inflammationibus, præsertim ubi temere his adhibentur frigida, adstringentia, & emplastica medicamenta, bolus viz. Armenus cum ovi albumine, similave, quibus spiritus influentes, ipsumque nutrimentum arceantur, & repelluntur quasi a parte affecta: ipsique adeo vasculis capillaribus, porisque cutaneis eorundem medicamentorum ulu constrictis, empyreumatica per insensibilem transpirationem evacuari solita parti impinguntur valde, ac veluti inculcantur; atque ita obruitur, suffocaturque quantumcunque inest calidi innati, hoc est, spiritus radiantis ac partem vivificantis.

VII. Insuper ab ingenti frigore externo sæpe oritur gangræna, atque non raro observatur hyeme per nives & glaciem iter facientibus extrema pedum, manuum, aures, nasum emori ob externi frigoris vehementiam. Sed priusquam extremæ hæ partes planè emoriantur, primo acutus & pungens oritur dolor, quo cessante gangræna, hinc & sphacelus adest. Enimvero quum tardius in extremitatibus sanguis circulatur, facile, vasculis capillaribus porositatibusque externis vehementi frigore constrictis, ibidem stagnat & condensatur; interim affluens cruor ultra moveri nequiescit itidem subsistit, concrevitque: qui, postquam spirituosæ & salinæ volatiles particule evanescere, per suorem salinarum particularum acrior factus nervolas, tendinosas, aliasve membranosas si-

brillas vehementius rodit & lacinat, adeoque acutum pungentemque dolorem excitat. At, qui corrupto magis sanguine, vasculisque capillaribus exesis, cessat dolor, cessat spiritus vivificantis radiatio, suffocatur natus calor, hinc incipiens primo, dein perfecta accedit partis mortificatio; cuius color rubicundus in lividum ac nigricantem protinus mutatur.

VIII. Etiam gangræna causa quandoque est humor aquosus in partibus inferioribus, cruribus puta, pedibus, ac scroto collectus; quo partes hæ nimis distenduntur, porositates obstruuntur, insensibilis impeditur transpiratio, hinc (recrementis per eam exhalate consuetis in partibus retentis) vivificantium spirituum radians motus immittitur, tandemque aboletur, atque adeo innatus calor extinguatur, oriturque gangræna.

IX. Cæterum alimenti, sanguinis scilicet, spiritusque influentis defectu nonnunquam oritur gangræna. Cum enim radians vivificansque spiritus perpetuo nutrimento, seu flamma oleo, indigeat; si id denegetur, suffocatur & extinguatur, ut flamma in lampade deficiente oleo. Et hoc modo extremis corporis partibus accedit interdum gangræna in atrophia, Tabæ, similibusve affectibus Chronicis; præsertim in sedibus, in quibus, quæ siccitate plus debito oclusis corporis poris, motus humorum retardatur nimis, tandemque sistitur, ut adeo natus calor suffocetur, partisque hæc vel illa emoriatur. Eadem de causa, si luxatus articulus non bene reponatur, luxatum os vicinæ comprimit vasa, sanguisque ac spirituum transitum impedit, unde partis extenuatio, ac nonnunquam mortificatio accedit. Simili plane modo et gangræna, si pars quæpiam nimis arctè & diu vinculis constringatur: atque gangrænam paralyticorum ex interceptione spirituum animalium ita oriri nonnulli volunt.

X. Adhæc est mala februm, præsertim malignarum, crisi aliquando gangræna & sphacelus; viz. cum humores acri-salini ad partem quampiam debilem, per quam evacuari nequeunt, ruunt, atque ibidem aggesti sanguinis spiritusque motum intercipiunt, nec non vitalem radiationem, id est, innatum calidum suffocant, extinguunt. Sic refert Hildanus de Puella peste afflicta, cui, cum sanata videretur, & liberata ab omnibus symptomatibus, subito tantus exortus est dolor in utriusque pedis digitis, ut siderati illico fuerint, adeo, ut ad ultimam usque articulationem amputandi: quo facto, & adhibitis remediis tandem convalescit. Memini quoque, me simile quid vidisse ante octodecim annos, cum in hoc Athenæo sub auspiciis Cl. Diemerbroeckii Iudicis Medicis operam darem, in virgine triginta præter propter annorum, decumbente in Xenodochio nostro, atque mensium suppressione laborante; cui nasi, auricularum, vulvæ digitorum extremitates emoriebantur, quibus omnibus separatim pristina illa recuperavit sanitatem. Alterum succurrit exemplum, quod nobis videre contigit ante sexdecim circiter annos in quodam Medicinæ Doctore, cui, cum curatus

status omnino videretur à febre tunc temporis in hac urbe epidemica, ecce inopinato mane exigilanti crus sinistrum jacebat plane immotum ac torpidum, doloribus tamen acutis & pungentibus per intervalla genu infra supraque affligentibus; id quod paucos eis dies plane corruptum & emortuum observavimus. Et quoniam indies deficiebat magis natura, partiumque corruptio & mortificatio longius proserpebat, etiam variis in locis magnæ separatæ fuerint portiones, ixit unde redire negant quinquam.

XI. Porro ex ictu aut morfu animalis venenati ut aliquando gangræna, quatenus acrisalivum valde, ex saliva illiusmodi animalis, venenum læsæ vel per moriū contusæ parti communicatur, in qua humores & spiritus condensando ac corrumpendo, illorumque motum & radiationem inhibendo, innatum calidum extinguit. Idem præstant medicamenta septica, quæ carnem exedendi & corrumpendi vim habent, non satis prudenter adhibita in locis præsertim calidis & humidis, ut in emunctoriis, pudendis, similibusve.

XII. Enormes ustiones interdum excipit gangræna, vel etiam sphacelus; quoniam ustione vasa corrugantur & constringuntur, sic ut tum sanguis affluens, tum spiritus influentes liberè permeare, ac per partem affectam radiare, eamque vivificare nequeant; hanc suffocato, extinctoque nativo calore pars emortuit, corrumptur. Præterea tum empyreuma, tum cutis corrugatio summum accendit dolorem, ac proinde humorum excitat adfluxum, quibus in parte agra incallescuntibus & inflammationem concipientibus, extinguitur spiritus vitalis radiatio, ipsumque adeo innatum partis calidum suffocatur.

XIII. Denique ex partis alicujus magna contusione nonnunquam oritur gangræna, quandoquidem læsis apertisque per contusionem vasculis humores effluunt; qui extravasati, condensati, & in parte contusa aggesti porositates obstruunt, insensibilemque impediunt transpirationem, ac proinde incalcentes inflammationemque concipientes, suffocant tandem, extinguuntque vivificantium spirituum radiationem.

XIV. Scorbutus quoque non raro gangræna causa est, & partes quasdam enori facit, crura præsertim, nec non gingivas, aliæve oris internas; ex eo scilicet, quod sanguis acrisalivus, lixivis, ac austervis particulis abundans tardius per vasa moveatur, atque alicubi aggestus & stagnans, nec non insensibilem transpirationem prohibens, exulcerationes primum excitet, ac dein vivificantium spirituum radiationem motum perimat, extinguat.

XV. Cognoscitur vero gangræna ex eo, quod pars affecta livescere ac pallere, & color illius vere naturalis imminui incipiat, tanquam si proximum sui interitum persentisceret; hori di namque coloris extinctio denotat, alteratum esse spirituum sanguinisque in partem affluxum, estque floridi coloris causa radicans per partes sanguis. Dein agra pars mollescit, flaccescit, marcescit, ac cuticula non raro separatur. Tandem magis magisque sedatur dolor, pulsus cessat, febrisque accedit continua, maligna.

XVI. Variant tamen gangræna signa pro causarum varietate. Quæ namque ingentes sequitur inflammationes inde dignoscitur, si color ille floridus, qui solet adesse in morbi actionibus, in pallidum & lividum mutatur; color pulsans, qui prius infestabat, cessat; partis affectæ sensus hebetatur; pustulæ oriuntur grandiores, ichore carnis loturæ simili plenæ.

Eadem hæc signa plerumque apparent, ubi ab enormi constitutione ortum habet gangræna.

XVII. In gangræna, quæ à frigore externo ortum ducit, subito acutus & pungens oritur dolor, rubor in parte affecta apparet, qui paulò post in lividum & nigrum mutatur colorem, calor partis extinguitur, ac frigus & stupor cum horrore percipitur.

XVIII. Sin ictum, ut morsum venenati animalis excipiat gangræna, dolores & febres continuo affligunt, syncopes adiunt frequentes, quandoque delirium; pustula hic oritur, sub qua nigra est macula, quæ dein partem dispergitur. Talis namque gangræna in partibus sese manifestat extremis, ut manus pedisve digito, atque in totum brachium, totamve tibiam subito sæpe derivatur.

XIX. Ob defectum vero alimenti si partem gangræna corripiat, nullus adest dolor, nullus tumor, nulla inflammatio; sed macies potius, corpusque statim refrigeratur, & accedit plerumque in extremitatibus, ubi pustulæ tandem oriuntur, ac naturalis color in lividum mutatur.

XX. Si autem ex constrictione ac ligatura eveniat gangræna, pars agra tumet & distenditur, exoriunturque pustulæ majores, ichore carnis loturæ simili plenæ. Præterea pars ingravescit, fitque immobilis atque inpressi digiti vestigium in ipsa remanet, & cutis & partibus subjectis deduci videtur.

XI. Ex scorbutico si oriatur gangræna ferè à pollice pedis initium sumit, maculæ ac lineæ subnigris exterius sese manifestat, quæ ut crustam siccam degenerant, quam sequitur partis affectæ stupor, & tandem ipsa mortificationis, sine ullo fatore. Dolor quandoque nullus adest, aliquando intensissimus. Causas equidem evidentes ab ægris facillè explicari possumus, ex hisque intelligere, è quoniam præcedente affectu eveniat gangræna.

XXII. Ad sphacelum vero quod attinet signa ejus intensiora sunt signis gangræna; cum enim uterque affectus sit mortificatio, neque differant nisi gradu, ideo utriusque eadem sunt causæ, & eadem signa. Partis siderata color niger est, eaque si pungatur aut secetur, non sentit. Membrum insuper cadaverinum spirat fetorem, fitque molle & putridum, atque inpressi digiti vestigium in eo remanet. Cutis si attollatur, facile a carne subjecta separatur, quia adest spirituum per partem radiatio. Sed hoc potissimum signo affectus hic distingui possunt; si pars agra secetur, pungatur, vel aduratur, nihilque prorsus sentiat, dicitur sphacelus; quia sphacelus seu sideratio est omnimoda sanguinis circulantis, spirituumque radiantium extinctio, tum partis corruptior sin vero sentiat aliquis adest, gangræna nuncupatur.

XXIII. Probè cognitis gangræna & sphacelo, priusquam curam suscipiat Cheirurgus, prospicere debet quis morbi futurus sit eventus, utrumne sanabilis sit, nec nesci gangrænam namque periculosum esse affectum, cuius facile patet. Enimvero nisi citissime adferatur auxilium, in sphacelum brevi degenerat, parsque affecta planè emoritur. Qua de causa nullus hic cunctationi locus, sed statim suppetiæ ferendæ; quod non ita difficulter fiet in Vegeto adhuc & juvenili corpore, ubi spiritus sunt robustiores, eorumque radiatio nondum magnopere laesa est.

XXIV. Sed gangræna quæ fit ex humorum affluxu, multo difficilius curatur, quam quæ fit sine eo. Difficulter quoque hic affectus curatur in ore, palato, pudendis, aliisque partibus humidis; uti & in hydropicis. Perniciosa quoque est gangræna partium nervolarum & tendinosarum.

Gangræna à pede aut tibia orta, indeque genu transcens, in sphacelum sæpius mutatur, & lethalis est.

Ex defectu nutrimenti quæ oritur gangræna, ut plurimum lethalis.

Sed gangræna ex prohibitis ac interceptis spiritibus, ac potissimum quæ à luxationibus male restructis provenit, ut & quæ à valis transversim dissectis proficiscitur, difficillimè sanatur; in sphacelum vero degenerans lethalis.

Ex scorbuto quæ est gangræna ad multos menses protrahi potest, & raro perfecta curatur.

At vero sphacelus longè periculosius malum est. Nec enim pars sphacelo correpta restitui potest; sed mox excidenda, & à viva separanda est.

XXV. Atqui gangræna ut curatur, prudenter prognosticatione facta, nec purgatio, nec venæsectio locum habet. Sudoriter alexipharmaca apprimè conducunt, ut æquabilis sanguinis motus, spirituumque per partes radiatio, quantum quidem possibile, servari possint. Itaque.

℞. Rad. scorzonæ rec. ʒij. contraiervæ ʒij. fol. scordii m. β. rasuræ cornu cervini ʒss. coq. S. A. in aqua pura ad ʒxxiv.

Ex hoc decocto bibat Patiens ter quaterve de die haustum: & interim quotidie bis sumat pulverem ex ʒss. oculorum cancrorum. Horum loco etiam cochlearum exhiberi potest mixtura ex. gr.

℞. Aq. carduibened. ʒij. melissæ ʒi β. theriacalis simpl. ʒvi. confect. hyacinthor. ʒj. pulv. oculor. cancror. ʒij. syrup. limonum ʒvi. misceantur.

Utile quoque est vespere sub hora somni exhibere ʒj. theriaces aut mithridatii, cum haustu vini. Etenim febris, si adsit, ut maligna curari debet.

XXVI. Igitur generalibus hisce non neglectis, ipsius membri affecti cura aggredienda, quæ consistit in spirituum, qui ei desunt, restoratione: nec non stagnantis ac putrescentis in parte ægra humoris correctione, ejusdemque motus imminuti aut pene aboliti restitutione.

XXVII. Hæc spirituum ad partem revocatio, atque stagnantis & putrescentis in ea hu-

moris correctio, ejusque motus propomodum aboliti restitutio, absolvitur per topica Medicamenta Calefacientia, Incitantia, Detergentia, & putredinem tollentia; quæ tamen varianda sunt pro causarum, e quibus oritur Gangræna, diversitate.

XXVIII. Et ad specialem Gangrænae Curationem ut accedamus, primo qua ratione Gangræna, quæ magnas Inflammationes subsequitur, curari debeat indagabimus. Quo in casu Affecta Pars Scarificanda multis incisuris, usque satis profundis, ut stagnantes & in parte ægra corrupti humores evacuari queant, hinc & applicita medicamenta penitus penetrare. Sed in magnitudine & profunditate Scarificationum respiciendum ad ipsius affectus magnitudinem; viz. intusne Gangræna, & in membri fundo inceperit, an vero tantum foris sit, & in exteriori ejus parte. Enimvero partem externam si duntaxat comprehenderit, levibus ac superficialibus Scarificationibus cutis incidenda. Sin autem profundas atque internas membri partes occupet, indeque sensus aut amissus plane, aut multum saltem fuerit imminutus, pars profundioribus incisuris Scarificanda, usque dum sanguis effluat, & vitæ sensusque indicia sese prodant.

XXIX. Facta Scarificatione pars abluitur Spiritu vini in quo theriaca dissoluta est, vel aqua contra gangrænam cum theriaca.

Thomas Bartholinus in miscellaneis curiosis Medico-physicis, seu Ephemerid. Germanor. Anni secundi observat. 1. admodum extollit aquam marinam, cui absinthium incōctum est.

Alii scarificatam partem abluant spiritu vini in quo dissolutus lapis alchymiz, vel spiritu vini cum unguento ægyptiaco: eique ægyptiacum cum unguento Apostolorum & Basilicone postmodum imponunt. Cui tamen methodo non subscribimus, quoniam aultera & vehementer exsiccantia (quæ sunt lapis alchymiz & unguentum ægyptiacum) poros nimium contrahendo suppurationem, hinc & separationem prohibent.

XXX. Facta ablutione parti circumjiciatur fermentum calefaciens & aperiens, quod lapis renovetur.

℞. Herb. mælex, scordii, absinthii, rutæ, artemisiz an. m. β. fol. dictamni cretici, flor. camomillæ, sambuci an. m. j. coq. in s. q. cerevisiæ tenuis ad ʒbii. pro fomento.

Vel ℞. Herb. scordii, absinthii, rutæ, artemisiz, fol. dictamni cretici an. m. j. vini albi Gallici ʒbii. coq. S. A. in diplomate, dein coletur, & colaturæ addendo theriaces ʒij. misceantur pro fomento.

Jobus Meckeranus observ. chirurg. cap. 61. Fomenti loco hoc in ponit cataplasma.

℞. Micæ panis albi inveterati ʒij. fol. scordii, rutæ an. ʒi β. summ. absinthii ʒj. fiat omnium pulvis, qui misceatur cum vino albo gallico, & post levi ebullitionem sit cataplasma, quod calde applicetur.

Barbette Chirurgiæ part. 1. lib. 1. cap. 14. id, quod sequitur, commendat,

℞. Summ. absinthii, flor. camomillæ, sambuci an. m. β. herb. scordii m. β. rutæ m. β. micæ panis similaginei ʒvi. fimi caballini ʒii. coq. in aqua muriatica, & sub fuem addendo,

acramentum

Attramenti ℥ij. Spiritus Vini ℥iij. F. S. A. Cataplasma. Etiam laudibus suis meretur sanosum illud.

℥. Cicutariz Aquaticæ, hoc est, Phellandrii Mu. Absynthii, Scordii, Salviz an. Mi. Micæ Panis Albi. q. s. Fiat omnium pulvis, qui coq. s. a. in s. q. Vini Albi, & addendo Spiritus Vini quantum admisceri potest, f. S. A. Cataplasma.

Alii Cataplasmatibus aut Fomenti loco applicant Flores Cerevisæ, Nostratibus *Gyl.*

Haud inutile quoque erit medicamentis Gangrææ applicandis, siue Cataplasmatibus, siue Fomenti, admiscere Lincturam Castorei, aut Aiz Fætidæ, aut Camphoræ, aliave Balsamica, & Sale Volatili Oleo Abundantia; quibus porositates aperiantur, stagnantes putrescentique humores corriganentur, hinc & spiritum per partem radiatio immixta valde, & propemodum abolita restituitur.

XXXI. Sed priusquam circumspiciatur Fomentum, aut applicetur Cataplasma, parti scarificata cum petris imponatur Unguentum Basilicon, vel Basilicon cum Theriaca & Unguento Apostolorum, vel Digestivum ungare cum Basilicone, vel id quod sequitur.

℥r Mellis Cummi. ℥iv. Therebint Venet. ℥ij. Farinæ Hordei ℥x. Pulv. Aloes, Myrrhæ an. ℥iij. Croci ℥j. Vitellos duorum Ovorum, spiritus Vini ℥ij. Mel & Therebintina simul coquantur continuo agitando, addendoque in fine Farinam Hordei, & post levi ebullitionem remove ab igne, ac add. Aloem & Myrrham, cunctaque aliquantulum refrigerit Ovorum Vitellos, tandem Crocum Spiritui Vini permixtum, & F. S. A. Digestivum. Jobus Meckerranus in Observationibus Chirurgicis, loco citato, hoc commendat Separatorium.

℥. Digestivi comm. ℥iij. Unguenti Basiliconis ℥iij. Pulv. Myrrhæ ℥ij. Mercurii præcipitati ℥iij. Spiritus Absynthii gutt. xxii. M. S. A. Chirurgus vero quoties ad Aegrum accedit, remediis hisce factæ Escaræ summam partem tollere conetur, aut scalpelli acie incidat ad partem usque sanam, ut inposita penetrare queant medicamenta ad corrigendum quicquid corruptum est; nec alia procedat methodo, donec videat morbum superatum.

XXXII. Insuper ad serpente. Gangranam sistendam summopere conducit Butyrum Antimonii in circumferentiæ circulo inter partem sanam & ægram illitum, ut de Carbunculo distulsiuit.

XXXIII. Factam esse Separationem partis ægræ à sana ex eo cognoscitur, quod latius Malum non serpat, atque appareat circulus exacte rubens, exquisitique sensus, in quo spissa & alba reperitur materia.

Inducta vero quovis modo Crusta collatur iisdem medicamentis, quæ de Anthrace cum in finem proposuimus.

XXXIV. Atqui à Nimio Frigore Externo aut Congelatione si fiat Gangrana, accuratè perpendendum, incipiatne affectus, an jam aliquantisper aduerit; id quod ab Aegro, & Adstantibus, nec non ex indicis hisce promptum erit intelligere. Namque Morbus duntaxat incipiens est, si eximio rubore affecta pars scin-

tillet, dolor sit vehementissimus, punctorius, exuens. Sin vero in ceteratus sit, pars livida erit, & frigida.

XXV. Igitur si incipiens sit Morbus, non statim Pars affecta igni admoveenda, aut Calida quolibet ei apponenda; quin potius Aqua Frigidissima membrum irrigandum, aut Ni e perfricandum, ut scilicet inc. les. ere, & primum calorem recuperare solet. Hoc ipsum quilibet tacite hyeme experitur, si manus frigore propemodum congelatas tricer Nive aut aqua gelida: ne enim subito incalescunt; at igni admotæ magnum ceptunt dolorem, cumque pungitum. Eumvero cum præ nimio frigore tardius in extremis corporis partibus sanguis circuletur, & ferme subsistat; si Patiens propius igni admoveatur, partium & ignea poros vehementer intrantes rapidissimo suo motu stagnantes, condensatoque humores dissolvere interius, hinc & corrumpere, partiumque interitum & mortificationem causare facile possunt. Sed Nivei Membra ex nimio frigore Congelata fricentur, aut Frigidissima aqua irrigentur, subtilis materia leniter se placide amovendum per poros intrans congelatos humores, nec non suffocatos fere vitales spiritus excitat blande, eorundemque radiationem, adeoque & nativum calorem plerumque restituit. Et hæc ratio est, quod Regionum septentrionalium incolæ homines valde refrigeratos, rigidos, & pene emortuos aqua frigida primo soleant immergere, & manus, pedes, & sum, aliæque refrigerare membra, priusquam hospitium ingrediantur, nive fricare, & Gelida aqua ablucere. Cujus rei memorabile exemplum refert Labritius Hildanus, libr. de Gangrana & Aphacelo cap. 13. quod ita habet;

„ Vir Generosus & Pius narravit, se cum „ Regiones Septentrionales peragraret, incidisse in Viatorem frigore rigidum, ac pe- „ ne emortuum; quem paulatim suo impositum, „ cum deduxisset in diversorium, Hospes illi „ demerit in Frigidam: quo facto undique „ erupit gelu, ut ipsius corpus glacie conte- „ ctum conspiceretur. Tum quonque propina- „ tum illi, acibat, cyathum amphorem hy- „ dromelitis, addito pulvere cinamomi, car- „ yophyllorum, & macis, unde sudor in loco „ provocatus est; atque ita agrum ad se rediisse, & convalescere, anissis duntaxat manuum, pedumque extremis articulis.

XXXVI. Conspiciens autem Chirurgus ex sedato pungente dolore, ipsam quoque Congelationem magna ex parte mitigatam & correctam, missam faciat aquam Frigidam, aut Nivem; ac lenes adhibeat Frictiones: dein fectus ex Lacte Dulci, ovi Baccæ Lauri, Folia Rosmarini, Salviz, Flores Lavendulæ, & similia Calida incocta fuerint, applicetur. Raparum decoctio, aut Rapa cocta, & cum recentia Butyro, Oleo Rosaceo, & ovi vitello in mortario contusa, plurimum juvant. teste Johanne de Vigo chirurg. libr. 4. cap. 3.

Vel pars affecta (non neglecta interim, si necesse sit, scarificatione) fricetur hoc vel simili.

℥. Spiritus juniperini ℥j. Induræ Castorei ℥ij. Olii Therebintinae ℥j. Camphoræ ℥ij. Miscantur S. A.

in calide applicetur Fomentum, quod identidem renovetur,

℞. Herb. Rutæ, Salviz, Rosmarini, Absynthii an. Mj. Fol. nicotianæ ʒiʒ. sem. Sinapi. Cumini, rad. Bryoniæ an. ʒj. coq. in Vini Gallici, & & urinz hominis adulti an. p. æq. ad ʒxxx. pro Fomento; cui & spiritus vini addi potest. Barbette in Curatione Gangrænz ex nimio frigore, sequens præscribit,

℞. Herbar. Scordii Miʒ. Vincetoxici Mj. rutæ Mj. Sem. Nasturtii, urticæ Rom. an. ʒiij. coq. in f. q. vini Gallici ad lbij. colat. addendo. spir. vini ʒij. M. pro Fotu. Insuper conducunt, tum Fomenta, tum Cataplasmata, tum alia medicamenta superius præscripta.

XXXVII. Hisce peractis componatur Ager in lecto, probeque tegatur, eique exhibeatur cum vino calido Theriaca, Mithridatum, vel simile Sudoriferum & Alexipharmacum; quo Diaphoresis promoveatur, atque adeo æquabilis humorum motus, ac spirituum corpus vivificantium ordinata radiatio servetur.

XXXVIII. Sin ex Humore seroso in partibus extremis, cruribus puta & seroto, collecto eveniat Gangræna, Universalibus hand neglectis, pars affecta scarificanda, sive altius, sive superficialitèr, prout Malum magis minusve altas radices egerit: dein sequenti Fotu abluenda & fovenda,

℞. Rad. Bryoniæ siccæ ʒij. Herb. scordii, Rutæ, absynthii an. Mj. Pulpæ Colocynthidis, Salis Tartari an. ʒij. Muris Limonium ʒxv. aquæ Rutæ ʒxxxvi. Coquantur S. A. & Colaturæ addendo spiritus vini, in quo ʒiʒ. Camphoræ sit soluta, ʒiij. Pulv. Aloes, Myrrhæ an. ʒij. Misceantur pro Lavamento & Fomento, quod fervide parti applicetur. Potest quoque parti affectæ imponi Cataplasma. v. gr.

℞. Rad. Vincetoxici, Angelicæ an. ʒiʒ. Herb. Phellandri Mij. absynthii, Rutæ, scordii an. Mj. baccar. juniperi ʒij. Sem. sinapi ʒj. Coq. in vino albo & urina hominis adulti ad mollitiem, dein in mortario contund. & addendo Farinæ fabarum ʒiij. Salis Armoniaci ʒiij. M. F. S. A. Cataplasma.

Pars sic curata in lecto est continenda, nec non arena probe calefacta sacculisque inclusa ei circumponenda, ut in perpetuo calore membrum serveretur.

XXXIX. Chirurgus interim dum removet Fomentum vel Cataplasma, conetur acie scalpelli Escaram separare; dein abluat denuo partem affectam præscripto Fotu, admoveatque idem vel Fomentum, vel Cataplasma: nec aliter se gerat, donec sisti Malum animadvertat. Tandem separare nitatur Escaram Pharmacis ante commemoratis: imponendumque interea vel Fomentum, vel Cataplasma, quod putrefactioni resistit.

XL. In Gangræna, quæ ex Alimenti defectu, & atrophia evenire solet, atque ut plurimum in partibus excitari extremis, quavis ratione corpus humectandum & reficiendum, tum commodo victu, tum quibuscvis, quæ pro Præsenti Causa convenire videntur, rite usurpatis.

XLI. Quoad partem Affectam; indagandum prius, num atrophia velut Causa Futura Gangræna solummodo adsit; an vero Gangrænz ipsa jam invaserit? Si nihil præter metum Gangrænz ex Atrophia adsit, quavis ratione humectanda ac reficienda pars affecta, pori aperiendi, sanguinis spirituumque in ea motus restituendus, hinc & alimentum allicendum. Quem in finem pars fovenda jure tepido Intestinatorum, Capitis, & pedum Vervecis; cui nonnunquam Lumbrici incoqui solent Postquam vero aliquamdiu fota fuit Agra Pars, Ventosæ applicentur cucurbitulæ, usque dum rubescere incipiat; tunc autem den eundæ, & sequenti Linimento pars ungenda, diuque fricanda,

℞. Olei Laurini ʒj. guajaci ʒiij. Aluminis Plumosi ʒj. Misceantur exacte pro Litu Alii laudant Partem Affectam inungere Succo Lumbricorum Terrestrium, qui potenter calescit, humectat, nec non pororum ac vasculorum obstructions aperit, ut spiritus, alique humores liberius permeare queant; atque ex præscripto Johannis Wieri, in tractatu de Scorbuto, ita præparatur.

„ Sumit ille Lumbricos cæmeterii pinguiſſi-
„ mos, quos aqua primum, deinde Vino
„ exacte lotos minutim incidit, & phialæ
„ immittit pasta obvolvitur; hanc turno inserit
„ cum alio pane, hocque cocto phialam pa-
„ sta obvolvutam quoque eximit, ac ubi re-
„ frigerit mergit in aqua, hinc, pasta mol-
„ lescente ac phialam deferente, Lumbrici in
„ liquorem resoluti sese offerunt, percolatus
„ liquor serveretur usui; sed alterno quoque die
„ renovandus, cito namque corrumpitur, tem-
„ pore præsertim æstivo.

XLII. At vero si jam invaserit Gangræna, Scarificatio hic non facienda, nisi urgente necessitate. Sed Pars Affecta foveatur tali Fotu;

℞. Rad. Bryoniæ Siccæ ʒij. herb. phellandrii, Nasturtii aquat. an. Mij. rutæ, Scordii, Salviz an. Mj. baccar. Lauri ʒiʒ. Sem. sinapi ʒj. Stercoris Columbini ʒiij. coq. S. A. in Vini albo & urina hominis adulti, ad lbij. pro Fomento.

Postquam aliquamdiu pars ita fota est, ad luculentum ignem moderate fricetur, & fricando inungatur sequens; quo profitates aperiantur, & sanguinis spirituumque radians motus restituatur,

℞. Spiritus Cochleariz ʒiʒ. juniperini ʒj. Tinct. Castorei ʒiij. Camphor. ʒij. Misceantur.

Post Frictionem & inunctionem imponendum denuo Fomentum, vel ejus loco Cataplasma pag. 93. præscriptum; vel.

℞. Herb. salviz, Rutæ, Sabinæ an. Miʒ. Sem. sinapi, bacc. Lauri an. ʒiʒ. coq. S. A. in vino albo & urina hominis adulti ad mollitiem, dein in mortario contendantur, & addendo Stercoris bubuli rec. ʒiij. Camphoræ in ʒiij. spiritus vini solutæ ʒiʒ. F. S. A. Cataplasma.

Sedata Gangræna, mundificandum & incarnandum est ulcus, hinc cicatrice obducendum. atqui ubi nulla spes apparet, membrum conservari posse, amputandum id est. Sed antequam

quam hic amputetur pars emortua, necesse est, ut Cheirurgus ventura pericula prædicat, eaque palam commemoret apud Ægri amicos & adstantes. Nam etsi amputetur altius pars affecta, in ipsa quoque carne viva, malum equidem ut plurimum truncum iterum invadit, atque occupat, estque omnis Gangræna ex Alimenti Defectu plerumque lethalis.

XLIII. Ad hanc Gangræna speciem curandam proxime & illa accedit Gangræna, quæ ex Mala februm, præsertim Malignarum, Crisi ortum ducit. Et quoniam illa magnam cum Anthrace habet similitudinem, eodem fere modo ac Carbunculus curari debet.

XLIV. Cum vero Gangræna oriatur ex ictu aut Morsu Animalis Venenati, periculum in mora est, atque ideo affecta pars Caustico actuali niox inurenda, & abluendum subito, quicquid ejus malignitatis particeps est. aut ejus loco pars alte scarificetur & abluatur spir. vini vel simplici, vel aromatico, vel aqua contra Gangrænam in qua dissoluta Camphora & Theriaca. Dein hoc vel simile imponatur Cataplasma,

℞. Herb. Rutæ, Salviz, Rosmarini an. Mj. Sem. cumini ʒj. nucis moschata ʒij. coq. in f. q. vini Gallici ad molliorem, dein in mortario minutim contund. & addendo farinæ lupinorum ʒij. theriaci ʒvi. pulv. croci ʒij. spir. vini in quo ʒj. caput sit soluta ʒiʒ. f. S. A. Cataplasma, fervide imponendum. Vigierius Chir. lib. 1. cap. 11. hoc proponit emplastrum ex Hildano,

℞. Fermenti acris, farinæ lupinorum aliorum sub primis coctor. an. ʒij. sol. rutæ, scordii, dictamni cretici an. M ʒ. pulv. rad. angelicæ, Vincetoxicæ an. ʒʒ. Theriacis, mithridati an. ʒj. M. cum f. q. Decocti scordii, & f. S. A. emplastrum vel cataplasma,

XLV. Interea exhibeatur Theriaca cum vino calido, vel cochlearum utatur Patiens sequenti mixtura diaphoretica & alexipharmaca.

℞. Aq. carduibened. melissæ an. ʒiʒ. theriacal. simpl. ʒvi. theriacis ʒj. salis absinthii ʒij. camphoræ gran. 4. syrupi limonum ʒʒ. misceantur.

Sedata gangræna mundificetur, incarnetur, & cicatrizetur ulcus, ut in carbunculo.

Gangræna, quæ e medicamento septico corpori admoto evenit, eodem fere modo curatur.

XLVI. Non prætereunda hic gangræna, quæ a scorbuto originem ducit, & plerumque partes extremas, crura præsertim, afficit, nec non partes oris internas, gingivas puta, palatum, genas, linguam, aut fauces non raro occupat, imprimis in infantibus. In huiusmodi gangræna curanda remedia interna omnia, quæ in scorbuti curatione conducunt, minime sunt omittenda: quæ tamen non enumerabimus, quoniam alterius sunt loci.

Equidem Patiens continuo utatur tali mixtura.

℞. Aq. melissæ, antiscorbuticæ ana ʒij, spir. cochlearum per se destillat. ʒij. salis vola-

tilis cornu cervi gran. ʒj. Syrupi limonum ʒvi. misceantur.

Interim crui affectum, præmissis scarificatione & ablutione cum spiritu vini, &c. foveatur hoc vel simili fomento.

℞. Radix ligni guajaci, sassaparilla an. ʒj. rad. angelicæ, cenchodii maj. an. ʒvi. fol. cochlearum, q. s. in aqua. an. m ʒ. Seminis feniculi ʒvi. mæra & contusa digerantur per noctem eandem in vase clauso in spir. vini ʒxxviii, mane fiat colatura, quæ sit pro tota. Vel loco fomenti applicetur cataplasma.

℞. Herb. phellodendri m ʒ. rutæ, salviz, absinthii an. Mj. bacchar. lauri, juniperi an. ʒj. ser. ininis feniculi ʒx. coq. in vino Gallico ad molliorem, dein minutim contund. & add. farinæ fabarum ʒij. pulv. aloës, myrrhæ an. ʒij. spiritus cochlearum cum spir. vini destill. ʒij. f. S. A. Cataplasma calidè applicandum, & identidem renovandum.

Ceterum ulterius procedendum, ut de gangræna, quæ magnas sequitur inflammationes, curatione dictum fuit.

XLVII. Sed huiusmodi gangræna si in partibus oris internis, gingivis viz Palato, Genu, Lingua, Fauces, fiat: atque affectæ partes corruptæ, nigricantes, ac omnino putridæ sint, pessimumque emittant fœtorem, generalibus hæud neglectis, conducit mixtura, quæ partes hæc labæ scorbuticæ infectæ, hunc & corruptæ, frequenter laventur & fricentur, v. gr.

℞. Muriæ limonum, aquæ antiscorbuticæ an. ʒvi. spir. vini ʒiʒ. theriacis ʒj. salis absinthii ʒij. pulv. myrrhæ ʒʒ. aluminis crudi ʒiv. mellis rosacei ʒiʒ. uisceantur pro oris collutione.

Interim tamen si durities quædam in Gena appareat, foris applicetur cataplasma ad tumorem emolliendum, & citiorem promovendam separationem.

℞. Herb. Salviz m ʒ. rutæ, absinthii an. m ʒ. nucis moschata ʒij. aloës, myrrhæ an. ʒij. farinæ fabarum coctar. ʒij. pulver. & cum f. q. Spiritus vini leviter ebulliant in formam pulvis, eique addendo gum. ammoniaci in aceto soluti ʒʒ. f. S. A. Cataplasma calidè applicandum, & sæpius permutandum.

Cum vero curari incipiat affectus, oris collutio mitigetur, donec perfecta sequatur sanatio, ubi gratia.

℞. Aq. antiscorbuticæ, plantaginis, salviz an. ʒiʒ. vini albi Gallici ʒij. elixir, propriæ, tatis sine acido ʒij. salis absinthii ʒj. aluminis crudi ʒiv. mellis rosacei ʒj. misceantur.

XLVIII. Succedit nunc quæ ex Combustione oritur Gangræna, ad ejus curationem tradendam hæud abs re foret, prolixam de Combustionis Cura materiam hic exponere: sed quoniam de ea lib. 3. fusius sumus dicturi, sufficit hoc loco tantum monere, quod si magna Combustio Curam rite non suscipiat, quin potius in Gangrænam vergere incipiat, conducere sequens Medicamentum, quod Parti affectæ, prius scarificatæ, cum linteo carpto calidè applicetur, ac identidem renovetur.

℞. Spir. vini ʒij. Tinct. Castorei ʒij. Camphoræ ʒij. M. S. A. Dein superponatur Cataplasma,

℞. Herb. Phellandrii Mij. Rutæ, Scordii, Salix an. Mj. Cœparum crudar. ℥ij. Baccar. juniperi ℥i℥. coq. in vino Alto ad mollitiem, dein minutim contund. & addendo Farinæ Fabarum ℥ij. pulv. nucis moschatæ ℥ij. aloes, Myrrhæ in spiritu vini solut. an. ℥ij. unguenti Basiliconis ℥ii. F. S. A. Cataplasma, tervide applicandum, & sæpius renovandum. Hinc ulterius procedendum p. re nata, ut superius exposuimus.

XLIX. A. spirituum in Partem interceptione si eveniat Gangræna, pro morbi ratione & Agrotantis viribus, diligenter indaganda causa, ob quam spiritus arcentur a parte affecta, eaque si fieri possit statim tollenda. Hinc si arctior sit ligatura, laxanda. est. Dien admovenda Pharmaca calefacientia, aperientia, Resolventia Eum in hanc Hildanus proponit hoc Cataplasma,

℞. Farinæ Lupinorum, Fabarum, Lentium an. ℥ij. pulv. scordii, absinthii, Horum Camomillæ an. ℥℥. cum oxyn. etc. aut Syrup. de acetosa, F. S. A. Cataplasma.

Si inualecat nihilominus Malum, Locus affectus scarificandus, & ablucendus spiritu vini simplici, vel cum Theriaca, ac porro in Curatione procedendum, uti in Gangræna ex nimia Inflammatione.

L. Verumenimvero quoniam Gangræna, remediis nunc satis propositis licet commode adhibitis, ulterius proserpat, magisque ac magis inualecat, non amplius Gangræna est, sed Sideratio, hoc est, spirituum Radiantium Omnimoda Extinctio, totaque partis corruptio & Mortificatio, hinc & curari non potest, cum pars plane emortua ad vitam revocari nequeat. Sed unicuique tunc, ut Patiens servetur, restat remedium; viz. Membrum corruptum rescindere & extirpare, quoquavis dubio, gravi, & violento utendum tamen, moxque sicuturum Membrum amputandum; ne pars sincera trahatur, Crudelem siquidem Medicum necessitas facit; nam crudele malum crudele remedio expugnandum, atque nihil interest, an satis tutum sit præsidium, quod est unicuique: satius est anceps auxilium experire, quam nullum: melior est dubia spes, quam desperata salus: satius est motum alicujus partis perire, quam totum hominem. Nam, ut ait Hippocrates, extremis morbis extrema conducunt remedia: item, quod non sanat medicamentum, sanat ignis; quod non sanat ignis, sanat ferrum; nec illa dura videtur curatio, cujus est salutatis effectus.

LI. Cum igitur Sphacelus sit Perfecta Partis Mortificatio, ideo cura ejus non consistit in Medicamentorum facultatibus; sed in unico, coque ultimo & extremo remedio, quod est Partis Sphacelo affectæ, Infectæ, & Corruptæ Extirpatio; nam quod a naturæ regimine non amplius pendet, excindendum & amputandum est. Atque ita omnibus diligenter consideratis, ubi Chæirurgo de Agrotantis voluntate, deque ejus viribus plane constitit, tum ad munus suum rite præstandum sese accingat, omnibusque ante operationem, in operatione, & post operationem necessariis instructus Patientem in oppostro, commodoque si-

tu collocet, extirpationemque aggrediatur, sed cum partis corruptæ extirpatio variis modis a variis Auctoribus tradi solet, haud gravabor quorundam de ea proferre sententias.

LII. Nonnulli Scarificationi profundiori, inter partem sanam & mortuam, inspergunt pulverem ex Arsenico, vel imponunt Unguentum Ægyptiacum, cui admixtum Arsenicum.

Alter modus extirpandi quod corruptum est, sit actuali Caustico, dum uritur qui quid infectum & emortuum, ac remouetur e cara.

Tertius modus est, Novacula simul rescicare quicquid corruptum & emortuum; deinde actuali Caustico vulnus invadere, tum ut sanguinis fluxus sistatur, tum ut reliquæ corruptæ carnis porro absumantur, sed ope arti nec hæc quaquam exerceri possint, cum phœlus sit in corporis parte, quam non tunc esse aut possibile totam extirpare, clu si usputa, inutilisive. Si tamen membrum sit corruptum, adeoque amputandum, neque Caustico actuali, neque Potentiali, neque Novacula id expediri potest, sed integ. i membri, manus sc. pedisve amputatione opus est. Verum qua ratione, & quo in loco Operatio hæc tutius & commodius institui possit, novum est Auctorum sententia.

LIII. Multi ex Recentioribus statuunt satis commodum locum esse in ipso articulo, quamvis in praxi contrarium vulgo observetur, tum ob difficultatem, quæ in ipsa sectione occurrit, quod non tam prompte inveniri possit locus conjunctionis duorum ossium, tum quod cito traxtarde admodum, & difficulter inducatur.

LIV. Sed cum non semper Malum sit prope Articulum, at sæpe circa Medium aut finem Membri, nunc porro queritur, si nec facienda Membri amputatio in parte emortua, an in parte sana? Qui in parte corrupta atque emortua sectionem instituendam autumant, his narrantur rationibus; tum quia sic minus rem dolorem sentiet Patiens; tum qui, in magnum non incidet hæmorrhagiam, ob quam nunquam summi defectio oritur, & in ipsa operatione Agri moriuntur, atque hujus sententiz videtur fuisse Galenus lib. 2. de curandi ratione ad Glauconem cap. 9. ubi sic scribit, Membrum emortuum statim rescindere oportet, quo sanam partem vitalem attingit. Et paulo post: Satius est ob majorem securitatem, quando abscindis & circumcidis id, quod jam putruit, eam, quæ velut radix est, sanæ parti adjunctam, adurere. Hanc quoque sententiam defendit Johannes de Vigo lib. 4. chir. cap. 7. sic inquit: Incidendum est membrum prope sanum, ita ut aliquid remaneat corrupti. Et hoc de tribus causis. 1. ut incisio sine dolore fiat. 2. Ut sanguinis fluxus evitetur. 3. Ut post remotionem ossis fiat cauterisatio cum paulo dolore. Inter recentiores idem sentit Fallopius tr. de tumor. pr. nat. cap. 16. ubi docet, aliquid relinquendum esse potius de parte corrupta, quam ut sanam incidamus, ob easdem rationes, quas de Vigo habet rationes Hier. Fabricius ab Aquapendente Chir. lib. 1. c. 19. & de oper. Chæirurg. titulo de Sphaceli Chirurgia, tantam corruptæ carnis partem relinqui vult, quanta est, et assuetus unius aut sesqui digiti, id quod,

si in vivente parte instituaturs sectio, duo inevitabilia sequantur symptomata: viz. sanguinis profusio ex præcissione magnorum vasorum: & dolor intolerabilis, cui nonnunquam convulsio accedit. Quæ incommoda evitari posse putat, in parte emortua si instituaturs sectio. Ne autem seditatio ulterius extendatur, abscisso osse, ferramentis candentibus relictam partem putridam undique inurit, donec vim ignis persentiat ægrotans, & aliquem patiatur dolorem. Ita enim partem emortuam in crustam degenerare, quæ vasis est operculum, & partem vivam ita per unctionem corroborari testatur, ut spatium tridui aut quatruidi appareat separatio mortui à vivo, & ita sistatur mortificatio sine dolore, & sine sanguinis profusione. Sed consilium hoc periculose plenum alex nobis videtur, quia certi non sumus, malum illud, quod relinquitur, non sese multiplicaturum, & quod sibi fidem nobis faciet, os ipsum, quod carni subest, non esse altiori in loco corruptum.

L. V. Contrarium igitur merito sentiunt alii, quos inter est C. Celsus, qui lib. 7. cap. 3. inter sanam vitiatamque partem carnem scalpello incidere usque ad os jubet, sic ut potius ex parte sana aliquid excidatur, quam ex ægra relinquatur. Haud secus Guido de Cauliacio jubet membrum incidere supra corruptum aliquantulum in loco, in quo cum nilo immisso invenitur dolor & firmitudo. Hos alii sequuntur, inter quos Ambrosius Paræus Chir. lib. 11. cap. 18. qui Celsi consilio minimum ejus quod sanam est amputare jubet: sic tamen ut ex parte sana potius aliquid excidatur Fabricius Hildanus lib. de Gangræna & sphacelo cap. 17. ubi plures adducit Chæirurgos, plane idem sentientes. Quapropter concludimus tandem, in parte sana faciendam esse sectionem, proxime tamen ad ægram. spatium unius circiter digiti transversi. Et quidem hæc regula exceptionem patitur in tibia: in qua si sphacelus sit supra malleolos, prope genu extirpatio est facienda: quod enim relinquitur, nullum præstat usum. imo magnum incommodum ægro adfert, cum ligneo crure ipsi utendum sit, parsque otiosa in posteriora vergat: adde quod in tendinosa musculorum, & excarni tibia parte instituta sectio consolidationem faciat longe difficilem. In brachio vero tantum conservetur, quantum commode alligandæ & aptandæ manui ferreæ sufficiat.

L. VI. Cæterum amputationis locum in manuum pedumve digitis quod spectat; rectissime in ipso articulo sit sectio. Nam in digiti articulo minore cum periculo sit amputatio, ac minore cum dolore; nervi enim & tendines incisi sursum contrahuntur, carne conteguntur, & vix ullum accedit incommodum.

L. VII. Explorato & designato amputationis loco, ad membri corrupti extirpationem veniendum est. Sed ut operatio hæc rite instituaturs, quæ ad eam necessaria sunt instrumenta in promptu sunt, eaque ita collocandæ, & ordine disponendæ, ut in operatione unum alteri minime sit impedimento, uti accidit Chæirurgo, cujus meminit Hildanus; qui cum crus emortuum abscinderet, & in medio esset operæ, serra fasciæ (quia cutem & carnem sur-

sum reducerat) ita involuta fuit, ut ab operæ aliquamdiu desistere cogereetur, dum sciantur fasciæ iterum excitaret.

L. VIII. Sunt vero instrumenta ad hanc Operationem necessaria, Culter propemodum applicatus, Serra, interdum sed raro Scalper Excisoria torfex, cauteria actualia, pulvis ad sistendum sanguinem, Tenacula ad liganda vasa, defensiva, fasciæ oxycrato madefactæ, Pulvilli, Stuppa ovi albumine intincta & pulvere ad sanguinem sistendum adpersa, vesicæ bovina, & si quæ alia.

L. IX. Igitur corpore, omnibusque necessariis ad operationem preparatis, & ordine dispositis, id quod agendum inchoetur. Atque si tibia verbi gratia, amputanda sit, inplorato prius supremi numinis auxilio. oportet ægrotantem haustum largiorem vini, aut cardiæ, aut aliquod assumere, ne inter operandum deficiat. Nonnulli opiatæ alicujus confectionis, vel laudani opiatæ aliquid exhibent ad sensum sopiendum. Quos tamen merito reprehendit Fallopius, atque levia soporifera nihilo prodelle existimat, valida autem periculosa, quoniam spiritus inde profligantur, hinc vires prosteruntur in gis.

L. X. Patiens verò pro natura, situ, & varietate partis affectæ convenienter & commode colloceatur, atque ne pars in operatione vacillet, aut æger eam movere possit, firmissime vinculis & ministris comprehendatur, detinea-turque. Deinde à viro robusto cutis & caro sana (quantum fieri potest) sursum attrahenda, ut eadem postmodum relaxata denudato ossi melius obduci queat. Tum supra sectionis locum valida fiat ligatura vinculo non ita lato, sed forti, idque ut æger minus dolorem percipiat; tum ut, ob vasorum constrictionem, sanguinis fluxus melius compesci possit. Guido vult, vinculum alterum adhiberi parti emortuæ, ut inter duo illa vincula fiat incisio; nec male fortassis. Cum enim adstantes ter-reantur sanguinis eruptione, hujusmodi ligatura coarctetur sanguis intra venas partis emortuæ, ne effundatur.

L. XI. Hæc peractis, ubi locus conveniens fuerit electus, Chæirurgus cultro propemodum falcato totam circumquaque carnem musculosam quam potest festinanter resecet. Hinc serram acutissimam adhibeat prius ad fibulam, deinde ad tibiæ, sicque os præc-dat.

L. XII. Si geminum sit os, ut in crure aut cubito, nonnulli cultellum ancipitem inter duo ossa à ministrante Chæirurgo inferi volunt, tum ut auferatur periostium, tum ut vasa majora ibidem delatrescentia discindantur: sed perperam, quoniam in vivis hæc duo locilia, tum in crure, tum in cubito, tam prope sibi conjuncta cernuntur, ut impossibile sit, vel minima cultellum inter illa inferere. Insuper mora illa sanguis copiose nimis profueret, unde & ægrotanti facile animus deficeret.

L. XIII. Facta amputatione, si magna & immodica sanguinis adfuerit profusio (nam ut medicocriter sanguis fluat sinendum) sistenda est: raro tamen id fit, modo fortis instituaturs ligatura: adeo ut nonnunquam ad aliquot cochleatiz non profundatur cruor, aut ad tres qua-

tuorve uncias ad summum. Igitur ad sanguinis immoderatum profluvium sistendum, aliqui cauterio utuntur actuali ad vasa inurenda & crustam carni inducendam: quod remedium genus à multis tutissimum judicatur, cum ignis non solum fluentem sanguinem sistat, at etiam reliquias putredinis, & mali radicem, si qua supersit, absumat; & quo citius ossis fragmenta excident, etiam ipsum os inurendum precipiunt. Sed metuendum est, inquit Cl. van Horne in Microtechnie, ne eadem illa, quæ ab inusione actualis cauterii inducitur, crusta decedente novus fiat sanguinis fluxus, & antequam ad eum sistendum advocetur Chirurgus, jam æger ad plures abiit. Addit Paræus Chirurg. lib. 12. c. 35. crudele id esse, cum summum dolorem adferat, si in viva carne, uti debet, sectio facta fuerit; unde partibus nervosis prava sæpè superveniunt accidentia. Quapropter idem cap. 31. 32. 33. suadet, ut tenacula vel voliella vasa apprehendantur, & acutransfigantur, atque adducto filo deligentur.

Constrictis autem vasis, seu ligatura, seu actuali cauterio, vincula solvenda, & membro stupæ albumini ovi imbutæ, & pulvere sanguinem sistente conspergæ, imponendæ.

Pulvis sanguinem sistens, qui valde laudatur ab Hildano lib. de Gangrena & sphacelo cap. 17.

℞. Farina volatilis ʒvi. thuris, sanguinis draconis an ʒj. boli armeni, terræ sigillatæ an ʒss. gypsi ʒiʒ. musci crani hum. ʒi. ranarum aquatilis. præp. ʒij. pilorum leporis minutissime incisor. ʒij. pulv. albumi ovorum oleo exsiccat. spumæ maris, spongiæ correfactæ an. ʒj. M. f. pulvis subtilissimus. Plerumque etiam sine cauterio actuali & ligatura sanguinis profusio cohiberi potest, si fungum quem crepitum lupi, vulgo *houff* appellant, in usum ducamus; viz. ut in spatio inter duo ossa medio, portiunculas ejusdem, pulvere sanguinem sistente plenas, & ovorum albumine madefactas, applicemus: aut si ex eodem fungo excavato veluti cutellam conficiamus, pulvere thegnotico repletam, cui tunc membri extremitas imittatur.

Alii liquorem stipticum ex calcantho & similibus præparatum cum luteo dilcerpto, aut stuppa cannabina imponunt, sicque sanguinis fluxum protinus supprimunt, ex. gr.

℞. Vitrioli Ungarici, aluminis crudi an. ʒvi. phlegmatis vitrioli lb. iv. coq. tamdiu donec omnia fuerint dissoluta: liquorem refrigeratum fibra, & a crystallis subinde concretis separata, ac addendo singulis libris, olei vitrioli ʒj. M. & servetur usui.

Hoc liquore lintea quintuplicia humectata vulneri, vel orificio arteriæ, vel trunco membri extirpati superimponantur, adhibita conveniente ligatura, & observatur sanguinem protinus esse coagulatum. Plura de stiptico hoc liquore addit Jo. Corn. Weber, in Anchora Sauciatorum pag. 124. 125. Aliam porro methodum, quæ hæmorrhagia post amputatas manus subito fuerit sedata, proponit Felix Platerus lib. 3. observ. pag. mihi 772.

LXIV. Coercito autem nimio sanguinis fluxu, & cæteris ita constitutis, membri extremitas, ejusque apparatus ita in situ detineatur benedictio emplastrum defensivi & glutinantis, quibus omnibus vesica bubula superinducatur, donec hæmorrhagiæ metus transiverit; tandem cruciata fasciatio instituitur.

LXV. Atque hic primus apparatus est, seu prima deligatio, quæ ante secundum aut tertium diem ætate, hyeme ante quartum non est solvenda, nisi quid valde urgeat; interim membrum figura media collocandum in pulvinari. Soluta vero ligatura, & ablato primo apparatu, aliquot pulv. os ex lupis aut gossypio paratos nec non albumine ovi madefactos, & pulvere thegnotico adpersos, in promptu habeat Chirurgus; quoniam prudenter amoveat: pulv. tan. c. c., qui in primo apparatu vasis impositi fuerit, si aliquo modo, quantumvis levissime adhaeserint, propter hæmorrhagiæ metum, in proximam usque deligationem relinquendi sunt. Sin vero facile, & velut per se deciderint, recentes vasis imponere convenit; at reliquo vulneri applicetur digestivum commune, vel mundificativum de apio, vel

R. Therebinthina Venetæ vino lota ʒiij. mellis rosacei ʒi. pulv. rad. aristol. rot. iridis florent. farinæ hordei an. ʒi. b. spir. vin. ʒss. M. f. S. A. mundificativum.

LXVI. Inter ea tamen postquam ligatura soluta, detractaque fuerit, cutis jam leviter reducenda est ad vulnus tegendum, quatenus potest fieri id poterit: quem in quem Paræus & alii cutis extremitates quatuor in locis a. u. & filo traducto ad se invicem adducunt, & indatum os obtegere satagunt, ne ab ære ledatur, sed quorum opus est æg. um non profuturis carnificibus exercuciare: cum enim truncus post operationem intumescat, futura hæc nimium in modum dolores auget; filium quoque intumescente carne, cutem abruptit. unde futura relaxatur, & plane inutilis evadit. Hinc commodior videtur ea, quam siccam vocant, quæque per emplastrum conglutinantia satis apte peragitur.

LXVII. Tandem dum curatur hoc modo vulnus, procurandus est casus extremorum ossium, quæ aeris & ferræ contactu alterata fuerint. Eum in hunc Chirurgi pulveres catagmaticos mispergere perperam solent; quoniam his os conservatur, hinc nec squamæ reparatio promovetur: sed pinguis potius, & oleaginosa ossium extremis imponantur, quæ ossa corrumpere, adeoque illorum separationem, si finire solent. Accelerat quoque casum ossis, si peracta amputatione cauterium actuale leniter leviterque ossi applicatum fuerit.

LXVIII. Sed ipso in trunco luxurians spongiosaque caro sæpius excrescit, quæ cæcanda est insperso pulvere radices iridis Florentinæ, aut aluminis ulsi, aut sequente, quem Hildanus proponit.

℞. Aluminis ulsi ʒij. vitr. calcin. ʒss. cerussæ, lapid. calaminaris, plumbi ulsi an. ʒj. m. f. pulvis. hinc inducenda cicatrix emplastro diapalma, de cerussa, unguento desiccativo rubro, diapompholigos, similibusve.

Post curationem vero quomodo tibia lignea aut integrum ex ligno factum crus sit adaptandum, exponit Ambrosius Paræus Chirurg. lib. 13. Joh. Munnick. in Chirurgia ad. hodiernam Praxin adornata.

Consultationes.

Gangrena pollicis sinistra manus lethalis.

Filia Joh. Hessi Ecclesiæ Megagestinensis Pæto-

Palloris ex inflammatione pollicis manus sinistra gangrenam contraxerat, quam quum negligentius haberet in sphacelum degeneravit; accersitus Chirurgus quidam Callrentis Paulus Polt digitum uno vehementique ictu paulo infra articulum amputavit, usque sanguinis profuvium sisteretur, ferro candenti adussit: hinc dolores acutissimi, vigilia perpetua, animi deliquia, convulsiones, aliaque suborta symptomata, quæ etiam adhibitis idoneis remediis quandoque mitigarentur, subinde tamen recruduerunt, donec tandem e vita decederet agra.

Inflammationes partium insolentes, quandoque in gangrenam abire & sphacelum, vulgo uolum est, quatenus a copia sanguinis & humorum calor natus partis affectu suffocatur: qua via autem quibique remediis præcaveri, possit ne in gangrenam degeneret inflammatio, apud authores passim obvium est.

Curationem vero quantum attinet & in specie quidem sphaceli, nullâ aliâ ratione perfici ea potest quam amputatione, siquidem quod plane jam corruptum est vitam amplius recuperare non potest ac propterea. *Ense referendum est ne pars sicca trahatur.*

Quibus autem modis & instrumentis hoc fieri debeat, alii aliter sentiunt: quidam carnem mortuam prope sanam multis sectionibus rectis & obliquis scarificans, idque satis profunde usque ad os, postea vulneribus pulverem ex arsenico & sublimato inspergunt, ut pars mortua a sana separetur. Alii cauterio quod corruptum est, adurunt usque dum dolor percipitur in parte: alii sectione amputant corrupta, idque vel novacula, vel ferra, aut modio vel securi.

Verum quam noxia sit arsenici sublimatique vulneribus scarificatis inspergio, docet Paræus; quam perniciose cauterisatio demonstrat Fallopius; quam periculosa per modiolum aut securi amputatio, exemplis evincit Fabricius, quibus merito accensetur hoc nostrum, in quo triplex error commissus videtur.

Primus quidem in eo quod pollicem infra articulum resecuit Chirurgus, cum rectius & cum minori periculo & dolore in ipso articulo hæc amputatio: nervi enim & tendines incisi sursum contrahuntur, carne contegnantur, neque ullâ sequitur convulsio.

Alter vero, quod ictu adeo vehementi & per modiolum pollicem amputavit, id quod novacula melius expediri poterat. Iieri enim non potest quin percussione violentia nervi & tendines contendantur, rumpantur, ossaque conterantur & immanissimi cruciatus, inflammationes, tumores, convulsiones, aliaque prava symptomata excitentur, ut in tractatu suo de gangrena & sphacelo cap. 17. annotavit Guilielmus Fabricius.

Tertius denique in sistendo per ferrum candens sanguine, siquidem ut Paræus movet, unctiones non tantum summum dolorem inferunt, sed & partibus nervosis prava accidentia inducunt, multumque sanæ carnis absumunt, unde ossa denudantur, & caro ac cicatrix summa cum difficultate vel plane non obducitur.

Quæ cum observare ex usu sit in gratiam Tyrorum hoc loco inserenda duxi, ut cautius de

corio humano ludere discant, & sic ubi ferro aut igni agendum est, diligenti cum præmeditatione, & circumspexerit hoc faciant. Arduæ enim & difficiles sunt hæ operationes, & quandoque etiam peritorum evadunt conatus, adeoque temere non tentanda, nisi ubi nullum aliud est præsidium, tunc enim satis tutum est, ut Celsus loquitur, quod unum est, nullo exquilitate sit comparatum. *Balthassar Timæus in c. libris Medicinalibus.*

Gangrena brachii & sphacelus ex ulcere pedis intempestive ocluso.

Vir quidam Consularis ulcere Rheumatico pedis sinistri per multos annos affectus, tandem consolidato ulcere, in vehementissimos capitis dolores incidit, quibus cum per integram hyemem conflictatus, circa æquinotium vernum anni 1632. subito vehementique dolore brachii ejusdem lateris prehenus est, cum insigni dolore & inflammatione, quæ cum a Chirurgo ejus loci natio negligentius haberetur, in gangrenam & paulo post in sphacelum delit, amputato brachio, æger quadriennio post apoplexia fortiter extinctus est.

Quam periculosa sit ulcerum fluentium maxime inveteratorum oclusio, supra lib. 2. casu 26. & lib. 6. casu 24. dictum est, ubi enim natura longo tempore assuevit humores noxios ad partes ignobiliores detrudere & per ulcus apertum subinde evacuare, fieri non potest, quin præclusa via in partes principales regurgitent, ægroque certissimam perniciem, aliquando interitum adferant, nisi tempellive sufficienterque evacuentur & exsiccentur, quod cum in præsentis casu neglectum sit, mirum non est quod a multis annis per ulcus pedis effluens humor exitu denegato, ad cerebrum delatus, capitis dolores, postmodum cum impetu in brachium decumbens, gangrenam & sphacelum excitaverit. Humores enim pravorum a natura in membrum aliquod detrusos subito id mortificare posse multiplex experientia constat & supra lib. 5. casu 8. demonstratum est. Accessit & culpa Chirurgi, qui initio malum hoc plane neglexit, nihilque applicandum sed pannis calidis solummodo fricandum, tegendumque suavit, unde proculdubio attractis per friciones & calorem humoribus exasperatum est, quanquam & in eo peccatum, quod postmodum suavit Balneatoris vehementer repellentia, refrigerantia & adstringentia, ut succus sempervivi, acetum vini & id genus alia imposita, quibus pori constipati calorque natus suffocatus est, ut in responsis nostris prolixius docuimus. *Idem ibidem.*

Gangrena scroti.

Nobiliss. D. Petrus Von Sövenhausen cognatus meus ex dysenteria in hydropem ascitem incidit, cui cum scrotum supra modum intumesceret, apertionem urisit. Ego dubii eventus auxilium, quod paucis, bene multis male cesserat animo volvens, tandem ex arbitrio Celsi, melius esse anceps quam nullum remedium, ratus, minitrante lithotomo, scrotum uno vulnere, eoque satis amplo apertui & primo quidem die scroti humoris libras circiter duas per cannam argenti-

Observationes

De Gangrena ex contusione, qua totum crus, scrotum & inguen, spatio 29. horarum mira cum celeritate invasit, atque agrum è medio sustulit.

Die 21. superioris mensis Julii, Stephanus Stoppinus, civis Passacientis, Oppidi hic in vicinia ad lacum Neocon entem liti, quinquagenarius robustus, & optimo corporis habitu præditus, cum in maximis messis occupationibus, ipsimet plaustrum vacuum ducere tentasset, ac currendo in terram procidisset, rotæ internam partem sui sinistri cruris dilaceravit, cum tibiæ ossis, à periostio suo ad longitudinem spithamæ, denudatione; neutrum tamen os fractum aut fissum fuerat, ita ut pedes domum, à qua iter dimidix horæ abierat, se conferret.

Ego eodem die vocatus, illico totum crus coxamque oleo rosar. ʒiʒ. inunxi. Vulneri prius vino rubello & aqua tepida, à sordibus & arcu abluto, digestivum sequens imposui.

ʒi. Terebint. lotz ʒi. ceræ ʒʒ. gummi elemi ʒij. ol. de vitell. ovor. ʒj. dissolue lentissimo igne, postea admisce croci ʒʒ. vitell. ovor. n.ii.

Ut autem affluxum humorum impedirem, fasciâ intincta poscâ, totum crus involui, vitæque optimum ac tenuen præscripsi, & pro potu ordinario decoctum agrimoniz & veronicæ ordinavi. Hinc dolor plurimum remisit, noctem tamen eam, utrumque inquietam transiit. Circa scapulam quoque & humerum sinistrum (licet nullum manifestum contusionis indicium apparuerit) quia tamen eo loci de dolore conquerabatur, eodem oleo rosar. inibi bis illum in die inunxi, ade ut dolor scapulæ intra biduum cessaverit. Die 22. Julii sequens medicamentum ei exhibui.

ʒi. Syr. ros. solut. compos. cum rhabarbaro, Agarico, & senna ʒʒ. pulver. sennæ præpar. ʒij.

Cum decocto agrimoniz & veronicæ hat potiuncula, qua corpus leniter purgatum fuit. Papulo post deligatione soluta, optima futuræ digestionis signa apparuerunt. Denuo itaque præscriptum digestivum imposui, totumque crus oleo rosar. inunxi, & fasciâ poscâ imbuta, omnia colligavi. Circa vespertinam eadem reiteravi, qua nocte optime quievit.

Die 23. Julii iam mane basilicam dextram (sinistra enim propter cicatrices ad cubitum nullo modo in conspectum sese dabat) incidi, sanguinisque ad ʒvi. extraxi. soluta deligatione vulnere partem illam suræ dilaceratæ & à subiecta carne disjunctæ, quia livescbat, ac ad gangrenam tendebat, abscindere visum fuit. Qua parte in præsentia reverendi D. Joh. n. du Moulin ejus loci præbiteri, abscisa, eaque aceto & sale abluta, Ægyptiacum nostrum ad radicem putredinis, reliquæ vero parti vulneris digestivum imposui. Postea sequens cataplasma, quod putredini resistit, applicui.

ʒi. Farinæ fabar. ʒiij. salis marini ʒj. pulver. summitat. absynth. vulg. scordii utriusque suræ ana ʒi.

Cocquantur in oxymelite simplici, fiatque cataplasma addendo sub finem myrtiæ, aloes,

an. ʒʒ. fiat cataplasma.

Circa vespertinam rursus eadem methodo processit, sed quia nox subsequens ei non admodum quæta futura videbatur, grana aliquot laudani ei exhibui. Quæ nocte nullos dolores persequitur, sed quiete & secure dormivit.

Die 24. Julii mane soluta deligatione, putredinem inhibitam, neque gangrenam amplius proserpere, certis signis conspiciere licuit. Ad maiorem tamen securitatem, unguentum Ægyptiacum, ut antea filamentis complicatis, & ad radicem putredinis, totamque partem læsam, supradicto cataplasmate cooperui. Intemperies nulla neque inflatio aut dolor aderat. Domum itaque me confero; circa tertiam pomeridianam illico & quidem me absente, in altera tibiæ, nimirum externa parte suræ dolore acutissimo corripitur.

Ergo circa nonam noctis horam ad ipsum veniens, maximis quidem doloribus ipsum vexari facile conicere potui, blaque ulla tamen intemperie manifesta, aut inflatione conspicua. Unde Hippocratis sententiam, litro de vulneribus capitis animo voluens, videlicet, carnem contusam necesse esse putcheri, & in pus converti, ab incæptis deistare nolui, sed denuo digestivum imposui. tibiæ oleo rosar. inunxi, ac rursus tempore somni nonnihil laudani ei exhibui. Verum tantum aluit, ut somnum capessere potuerit, qui potius circa tertiam horam noctis me accersivisset, si forte aliquo modo dolorem lenire possem. Deligatione ita rursus soluta, externam partem suræ, & quidem ipsum locum dolentem ex parte lividum deprehendi. At quia dolor magnus, nihilque aliud in promptu erat, illico cataplasma ex unicapanis in lacte cocta, additis vitell. ovorum, parumque butyri recentis, calide applicui. Hinc dolor aliquo modo sedatus fuit, parumque æger quievit.

Die 25. circa septimam horam matutinam solutis fasciis, partem externam suræ palmæ latitudine nigram & sphacelatam offendi. Subito ergo Paterniacum me recepi, ut ea, quæ pro morbi magnitudine necessaria, videbamur, præpararem. Circa meridiem instructus on nibus necessariis ad ægrum rediens, statim sic exclamavit: o utinam attulissem terram, tibiâ enim hæc est amputanda, quo dolore & cruciatu possum allevari.

Solutis ergo denuo fasciis, totam externam partem suræ, & ipsum pedem sphacelatam, veticis etiam nigris & maximis, nec non aqua loturæ carnis similis, repletis, animadverti. Interim tamen nonnullis in locis, dolores & maximi & continui aderant. Effragitantibus itaque tum amicis, tum imprimis ægroto ipso, ut tibiâ amputarem denuo me domum comuli, & instrumenta cum omnibus ad hanc rem necessariis mecum attuli, atque circa horam secundam pomeridianam ad ægrotum redi, tumque totam tibiâ, præter illam partem vulneris cui præcedentibus diebus Ægyptiacum applicueram, syderatam & in loco sano non amplius abscindi posse comperi. Supra genu item ad externam partem in quodam loco, crines novacula abradens, sonum quasi vacuum aliquod subfuisse, percipere potui. Inde malum mihi subesse conjiciens, adit. uribus æ-

que amicis, significare capi, amputationem plane infructuosam & inutilem fore, & ut alios Medicos atque Chirurgos in consilium advocarent, suasi. Post duas horas iterum soluta deligatione, locus ille, in quo antea sonum audieramus, prorsus sphacelatus deprehensus est. Circa decimam horam noctis in inguine ad scrotum, vesica ovi magnitudine nigra, & aqua loturæ carnis & sphacelata conspiciebatur. Intra horas duas scrotum in magnitudinem capitis intumuit & syderatum est. Tum æger sudoribus primo calidia, postea frigidis correptus, circa tertiam post mediam noctem horam, quæ quarta dies sui morbi cum undecim horis erat, ab incæpta vero gangræna, hora vigesima quarta, placide, & inter loquendum fere expiravit.

Post mortem totum latus & caput paulatim ita intumuerunt, ut sequenti die, cum cadaver inhumare vellent, capulam ampliari necesse esset. Sub hypocondrio sinistro vesica, quæ magnitudinem capitis adæquabat, nigra & aqua languinolenta plena, exorta est. Ex ore quoque & naribus aqua ista sanguinolenta tam copiose emanavit, ut per cubiculum iutar rivuli deflueret. Ex cadavere item talis fætor expiravit, ut adstantes in fugam converteret. Ab initio morbi usque ad finem vitæ, vix ulla febris in illo cognosci potuit, nullumque symptoma febrile, veluti dolor capitis & renum, sitis, siccitas & ariditas linguæ, aut pulsus a naturali statu recessus, apparuerunt. Urinæ tamen statim ab initio morbi ad finem usque vitæ sanguinolentæ erant.

In ista autem recitata historia, nonnullæ occurrunt difficultates quarum aliquæ, quamvis ex Doctissimo tuo Tractatu facile dicui possunt, cupio tamen hac de re Excell. T. iudicium atque sententiam si quando sibi per oculum li-cuerit ulterius intelligere.

Primo quidem, an gangræna hæc tam furiosa, tamque dira & immanis, ut vix unquam similis conspecta, ex contusione sola, vel ex causa aliqua interna & occulta, orta sit necne?

Ego ex sola illa contusione tibiz, tam horrendum malum oriri non potuisse, plane sentio.

Primo enim contusio in tibia etiam magna pro magnitudine tamen gangrænz non respondebat: erat enim cutis tantummodo cum carne a membrana à subjecto musculo separata: ita quidem, ut ne ramus ille insignis qui per musculum, suræ partem internam constituentem (qui crus moventium in ordine primus) & integer conspiciebatur. Hanc quoque ob causam pars illa cutis dilacerata & a subjectis partibus separata, nutrimento suo destituta, necessario gangræna & sphacelo correpta fuerat. Hac vero parte abscissa, gangræna protinus inhibita fuit, quemadmodum antea dixi, neque postea ullum indicium gangrænz apparuit, usque dum totum crus invaserat. Secundo, si gangræna ex interna parte suræ ad externam serpendo penetrasset, vulnus prius labe ista infectum fuisse, quam vicinas partes invadere potuisse, luce meridiana clarius existit: at penetratio illa, quomodo sine dolore, inflammatione & inflatione maxima fieri poterat, nondum video. Post primam autem noctem usque ad 14. mensis diem, quæ fuit ter-

tia morbi dies, nullum (pro magnitudine vulneris) dolorem, nullamque præterea inflammationem adfuisse, sed optima signa digestionis apparuisse, testabuntur & fidem facient adstantes, quorum ex numero erant Rever. Ioh. D. du Moulin, ejus loci Prebiter, uti & D. Emanuel Viltitius Philosoph. mag. & Medicinæ Candidatus, convictor meus suavissimus. Adde quod extrema suræ parte nullum unquam indicium contusionis apparuerit. Tercio non potuit gangræna hæc ab externa parte ad coxam nisi serpendo, ac in transitu partes, unam post alteram inficiendo, pervenire. Ac in hoc casu gangrænam cum tibiâ, tum etiam femur, inguen & scrotum, quasi uno eodem momento (interim tamen nunc inde partes nonnullas illasas relictas) invasisse, ex præcedenti historia elicere licet. Potuit itaque contusio hæc in crure, meo quidem iudicio, esse causa adjuvans, præcipuum autem materiam aliquam venenatam ex corpore eo propulsam fuisse plane sentio. Quamvis enim antea morbis non adeo obnoxius homo ille, quia tamen rota, totum latus transgressa fuerat (id quod dolor circa scapulam indicat) potuit facillime sanguis, aliquo in loco concretus ac putrefactus, in pestiferum hocce venenum conversus, postea vero à natura expulsus hocce crudele malum generare. Gravissima enim quandoque ex sanguine coagulato, Fernelio de abditis rerum causis lib. 2. cap. 15. teste, symptomata oriuntur. Idem testatur Fernelius aliquando se partem sphacelari vidisse sine causa externa, sine tumore aut rubore conspicuo, oborto primum dolore immanissimo, tandemque ægrum extinctum fuisse, sine febre, sine symptomatis admodum gravibus, adque in hoc ægro belle observare licuit.

Ex modo dictis autem oritur secundum dubium, nempe, quomodo natura hancce pestiferam materiam absque symptomatis conspicuis, puta febri, syncope, celis, & similibus, tam diu retinere, multo magis ad extremas partes corporis propellere potuerit? Tercio quomodo factum fuerit, quod caput & totum cadaver, excepta tibia dextra, post obitum in monstruosam hancce magnitudinem intumuerit: Cum animæ facultates, animale extincto, omnes abolitæ sint ac cessent.

Irolixe & ordine hancce historiam recensere placuit, propter varias & ineptas, quæ hac de re apud vulgus habentur opiniones *Guilelmus Fabricius Hildanus in Observ. Chirurg.*

De gangræna gravissima ex morfu equi progenita.

Casum de gangræna, ex morfu equi cujus in via Mildunum versus, mentionem fecimus nunc T. Excell. penitus adumbrare statui, dum tamen de uenenositate vulnerum à feris infistorum prius verbum unum aut alterum præfatus fuero. Percrebuit apud vulgus Chirurgorum opinio morsus equorum, canum, urforum, leonum, ac similibus belluarum, maxi-

mum ac exitiosum in se continere venenum. Hujus opinionis in causa sunt symptomata gravissima, quæ hujus vulnera sequuntur, & præcipue quod sæpissime in gangrenam terminantur. Chirurgum non mediocriter in operibus artis chirurgicæ versatum, familiariter novi, qui hac imbutus opinione, omnes morsus animalium, etiam non venenatorum, aut ferro cendenti, aut oleo ferventi, protinus inurebat, atque hac occasione plerumque sibi nomen crudelis parabat. Ego etsi hujusmodi vulnera nonnihil malignitatis in se continere prohtear, quemadmodum postea dicam, attamen quomodo eorum opinio qui ipsa absolute venenosa esse sentiunt, suaderi possit, nondum video. Si enim morsus horum animalium, per se & absolute venenosi essent, tunc profecto parvum quandoque vulnus, ab ipsis inflictum, non minus ac magnum, malignæ qualitatis particeps esset, quemadmodum videmus in morsu canis rabidi, ubi minimum quidem vulnus, si neglectum fuerit, mortem inferre, potius est. Contrarium in prædictorum animalium, (nisi rabie infecta fuerint) moribus observatur. Ingentia enim ac magna ab ipsis inflicta vulnera impunis ubi ossa simul sunt fracta periculosa exitiosaque esse, necnon aliquando in gangrenam terminari experientia tamen facit: præcipue si fracturæ acute nimis ligatæ aut error aliquis in curatione commissus fuerit. Unde igitur, inquires, pessima ista symptomata? Profecto ego plane sentio, ipsa magis ex contusione quam ex venenosa aliqua qualitate horum animalium accidere. Cum enim sint robustissima, vi sua contundunt, & conterunt musculos, venas, arterias, imo & ossa ipsa. Hinc dolor, hinc inflammatio, humorum affluxus, tandemque spirituum suffocatio & gangrena. Cujus rei exemplum memorabile mihi videre contigit, quod tibi viro doctissimo & chirurgicarum operationum avidissimo, prout promiseram, communicare non gravabor.

Anno 1579. quum Novit. Cheirurgiæ operam darem, civis quidam in oppido Zoons ad Rhenum, ab equo in brachio graviter morsu vulneratus fuit, cum carnis dilaceratione & ossis fractione. Advocatus Barbitonsor, ossa fracta in sedem naturalem reposuit: vulneri digestivum, fracturæ vero medicamentum ex bolo armeno, farina & albuminibus ovorum confectum, applicuit. Fascias item ferulasque apposuit, & fenestellam, quo vulnus quotidie absque fasciarum solutione curari posset, reliquit. Sed quia fascias ferulasque nimis arcte contrinxerat, auctus est dolor, auctus est & affluxus humorum. Et quia corpus neque à pravis humoribus, neque ab abundantia sanguinis exoneratum fuerat, sequuta est inflammatio, tandemque gangrena. Magister Joh. Dungen, apud Novisenses Cheirurgus exercitatus, præceptor meus plurimum honorandus, in consilium adhibitus, brachium scarificavit, unguentum ægyptiacum, reliquaque medicamenta, quæ ad curationem gangrenæ requiruntur, applicuit: ita ut gangrena remiserit, tandemque brachium sanitati restitutum fuerit: sed curatio fuit & longa & laboriosa, non quod qualitas aliqua

admodum maligna animadverteretur, sed quia os fractum fuerat, & gangrena supervenerat.

Ante paucos annos mulier quædam Bernæ cum urtis, qui continuo ibi in propriis fossis asservantur, escam obtulisset, ac urtus ipsius manum, ni fallor dextram, per cancellos arripisset, adeo manum & brachium momordit, ut illud abscindere necesse esset. Non quod medici venotiam aliquam quæritatem in morsu isto agnoscerent: sed quia caro simul & ossa penitus confusa, contritaque fuerant.

Cæterum etsi in morsu animalium prædictorum & per se non venenatorum, illam quam vulgus Cheirurgorum ipsis adscribit venenositatem, ut antea quoque dixi non inveniam, non negarem tamen, ab ipsis inflicta vulnera ab aliis, ense & cultro incisis, non nihil differre, imo etiam nonnihil in se continere posse malignitatis, atque proinde peculiarem curandi methodum requirere. Itaque ut omnia recte, & ut artis est administrantur, morsus beliarum live equorum, live urforum, canum, leonum, aprorum (ut & de hominis morsu observ. 84. cent. 1. scripsimus) sic distinguo. Aut enim animal rabiosum est, aut solummodo commotum, & simpliciter iratum, cum morsu violat: (donec enim mansuetum, & minime ira percitum, neminem mordebit, ut quidam morium canis distinguit.) Unde affectus quilibet, peculiarem requirit curandi methodum. Si enim animal rabiosum fuerit, vulnus sive murere expedit, reliquaque media, quæ observatione 87. cent. 1. & observ. 98. hujus centuriæ recensentur, applicanda erunt. In morsu vero ab animali non rabioso facto, inustione opus non est, ea tamen remedia quæ ab alto ad superficiem trahunt, usurpanda sunt idque in eum finem, ut si quid maligni subesset, paulatim educeretur. Primo itaque vulnus aceto, in quo theriaca dissoluta est, ablavo: postea si vulnus parvum fuerit, spiritum vini cum theriaca, filamentis impono, & emplastrum Basiliconis applico.

Aut ℞ Pulveris radic. Angelicæ aristoloch. rotundæ, vincetoxici, caryophyllatæ an. ʒi. folior. scordii, rutæ an. ʒij. theriacæ, extract. card. benedicti an. ʒij.

Cum ℥ q. mellis rosacei fiat mixtura in forma unguentum hoc in omnibus vulneribus ac ulceribus malignis & venenosis, anthrace & similibus præstantissimum est. Sin vulnus magnum & contusio ingens fuerit, ut quamprimum digeratur, affluxus humorum evitetur, necesse est, alioquin inflammatio, dolor ingens, atque pessima symptomata ferenda erunt. Statim itaque victus tenuis instituendus, corpus à pravis humoribus evacuandum, & vena, si nihil est quod obstat, tundenda erit. Membrum vero male affectum oleo myrtino & rosaceo inungere convenit. Defensivum quoque ut affluxus humorum impediatur, applicandum. Vulneri vero sequens digestivum imponendum.

℞. Cere novæ, colophonis, gummi elemi an. ʒss. terebinth. lotæ in aqua cardui ben. ʒj. olei rosacei, Amygdalar. dulcium, de vitellis ovorum an. ʒj. liquefiant lento igne & percolentur, deinde admisce croci ʒj. theriacæ, extract. cardui bened. an. ʒij. vitellos ovorum

ii. misce fiat unguentum.

Vulnere hoc modo satis digesto, imponatur antea descriptum unguentum ex pulvere radicis Angelicæ, Aristolochiæ rotundæ tandemque emplastro diapalmeo, aut de cerusa, vel simili aliquo medicamento inducatur cicatrix. Si dolor supervenerit nimis; applicetur cataplasma aliquod annodinum, ex statu nostro de gangræna, vel de combustionibus, excerptum. Si fractura adfuerit dementer & absque violentia reponantur ossa, diligenterque in sede naturali retineantur, absque terularum tamen nimis arcta ligatione, ne hat humorum attractio, calorisque & spirituum suffocatio, quemadmodum in viro illo, cujus antea memini, accidit. Pura astringentia, uti etiam emplastica hic, propter insignem contusionem non conveniunt: sed quæ simul digerunt. Inuncto itaque toto membro oleo rosaceo & myrtino, sequens applicetur cataplasma.

℞. Farinæ hordei ℥ij. pulv. rosar. rubear. myrtillor. fanigræci an. ℥ss. pulv. scordii folior. rutæ an. ℥ij. coquantur cum vino rubro, ad formam cataplasmatiss: tum admisce. Croci pulverisati ℥j. ol. rosacei myrtillor. an. ℥j. de vitellis ovorum ℥ss. vitellos ovor. n. n. applicetur tepide singulis diebus semel, præcipue si contusio magna fuerit, idque usque ad decimum quartum diem, donec vulnus optime digestum sit, & graviora symptomata non amplius sint tinenda. Tum in facis & tinctaminis quæ fracturæ circumponuntur, fenestella, ut vocant per quam vulnus singulis diebus mundeatur, relinquatur, fractura vero quarto aut etiam sexto quovis die tantummodo deliganda erit. *Idem ibidem.*

De gangræna ex frigore, ac congelatione.

Anno 1600. peregrinus Britannus Roma rediens, & in monte S. Bernardi a via recta deflectens, ac inter nives pernoctans, tantum frigus passus fuit, ut extremitates omnium digitorum dextræ manus, extincto in ipsis calore nativo, gangræna correptæ sint. Exorto statim dolore vehementissimo viriumque prostratione, maxima nonnisi cum difficultate secundum Valleiorum pervenit, ejusque loci Chirurgum quendam diligenter satis in consilium adhibuit. Is videns gangrenam jam in sphacelum degeneratam, apicesque digitorum plane emortuos esse, carnem digitorum circum circa ossa, prope carpum incidit, nec non ad proximum articulum usque separavit: digitos quin etiam in ipsis articulis novacula abscidit. Idque tali artificio & dexteritate perfecit ut postea gangræna ulterius & partes sanas invadere non potuerit. Sed quia serra ad hujusmodi operationes apta, bonus iste vir minime instructus, forcipe vero aut scalprio (ut plerique Chirurgorum facere consueverunt) ossa abrumpere, rem nefariam, ac artifice indignam esse censuit, miserum huncce peregrinum Lansannam ad me misit: ubi præsentem viro clariss. ac doctiss. Du. Alberto Roscio, ejus Reipubl. Doctore, Medico ordinario atque celeberr. Reverendo item viro Du. Johan. Retherio ibidem linguæ sanctæ professore dignissimo, mul-

tisque aliis, ossa omnium digitorum dextræ manus ad metacarpum serra abscidi, quo facto brevi convaleuit, & in patriam rediit *Idem ibid.*

Gangræna ex intemperie frigida & sicca cum defectu alimenti curata.

Cum senectus (G. L. Telle) intemperies quædam sit, ad frigiditatem & ad siccitatem declinans, mirum nemini videri debet, morbos ex hac intemperie ortos, in senibus vix curari posse: Dedit enim in iis calor nativus, qui omnia vivificat, concoquit & restaurat, deficit & humidum radicale, quod omnes partes corporis inhumectat, atque calori nativo pabulum subministrat. E contra abunde hæc ætas humoribus excrementitiis, quorum illi visæpe numero calidum innatum paulatim suffocatur, aut ad minimum debilitatur; inde diminuuntur vires, ita ut morbi minime resistere possint. Hinc fit ut gangræna ex intemperie frigida & sicca omnium sit periculosissima præcipue autem in senibus, & quibus partes principes male afficiuntur: Incipitque hæc species gangræne circa extremitates, quum partes illæ prius nutrimento destituantur. Non immerito itaque Benivenius scriptum reliquit, gangrænam a digito pedis (id quod de hæc species gangræne intelligendum) incipientem mortalem esse. Ego (ut ingenue fatear) inter omnes quotquot hactenus gangræna ex intemperie frigida & sicca, vel alimenti penuria laborantes vidi, unus tantummodo evasit. Quam hactenaciam hic in gratiam juniorum Chirurgorum subungere placuit, ut semper in morbis, quantumvis desperatis, de sanitate bene sperent, atque ad eam recuperandam summam diligentiam adhibeant.

Anno 1581. die 10. Augusti, cum essemus apud Illustrissimum principem Cliviæensem, & Juliæensem, Montensem &c. in arce Beneburgensi. Presbiter quidam homo septuagenarius & decrepitus, Gangræna ex intemperie frigida & sicca, vel (ut rectius dicam) defectu caloris nativi & alimenti, in dextra tibia correptus fuit sine causa aliqua externa. Nullus in principio morbi dolor aderat, nullumque inflammationis indicium, sed potius frigus in crure per sentiebatur unde statim ad se accersivit Clariss. D. D. Galenum Wierum Archiatrum Principis, ac Cosmum Slotanum, ejusdem principis Chirurgum primum Præceptorem meum summe honorandum. Invenimus autem paulo supra talum pustulam nigram nucis avellane magnitudinem vix excedentem, & (ut dictum) sine dolore, inflammatione, & tumore. Quæ pustula incisa, non nihil jechoris, coloris flavi effluxit, subiecta vero caro livida, & sensus experta erat. Pustula in fetidissimum ulcus degeneravit quod intra paucos dies tanta sævitia crurum invaserat, ut una ex parte semimortuum conspiceretur. Unde ex consilio Clariss. ac Doctiss. Wieri crurum ubi cumque suspicio aliqua gangræne aderat, scarificavimus, cataplasmata item, unguento, aliisque plurima, quæ putredini adversantur, & nativum calorem simul & nutrimentum attrahunt applicuimus. Cæterum Clariss. D. Doctor Wierus particularibus quibusdam internis medicamentis calorem nativum refocillavit & continuo bonis ac eucymis alimentis instauravit.

sic dei beneficio & Medici hujus ac Chirurgi diligentia summa, atque industria, revocato tandem colore nativo, & humido radicali, putredo remittit, reliqua quin etiam symptomata paulatim cessant. Mundificato dein ulcere & penè sanato, Clyviam reversus est ager, ubi domi suæ adhuc ad tempus aliquod supervixerat. *Idem ibidem.*

Quidam cum supra modum incaluisse, & ipsius corpus aqua frigida persusum fuisset, gangrena & sphaelo in tibia corripitur.

Cæterum antequam ad problemata tua respondeam, affectum gravissimum tibi communicare vultum est. Superiori ætate cum Basileæ apud serenissimum Principem ac Dn. Dn. Januarius Radzivilium Lituanie &c. Ducem, per menses aliquot (ut ex præcedentibus meis ad te litteris intellexisti) moram traherem, accidit noctu ut in platea quæ portæ proxima est, domus quædam incenderetur.

Cum vero cives accurrebant, ac quidam juvenis, viginti circiter annorum ætatis, robustus, plethoricus, & optimo corporis habitu præditus, tectum proximum concendisset, ibique cum propter caloris ab incendio vehementiam tum etiam propter labores, supra modum incaluisse, rogavit socios ut aqua frigida sibi corpus persunderent: hoc enim nisi facerent, ætatem maximum non amplius se sufferre posse, sed de vita periclitari, aiebat. Astutius aquam eamque copiose, ita ut vellimenta omnia ipsiusque corpus undique madefactum esset. Quid sit? corripitur horrore, ita ut vix co recto descendere & ad ædes suas pervenire posset. Postero die, ac deinceps etiam graviter laboraret & maximum incendium internum viscerum persentiret morbum tamen ne lexit. Circa quartum naturæ cui per criticam expulsiorem sese exoneraret, crur dextrum quoque intumuit, & inflammatione correptum fuit. Ad Xenodochium itaque deducitur, ubi clarissimi & æterna laude dignissimi Viro Dn. Dn. Jacobo Zwirgero, pater memorie, & Chirurgis commissus fuit. Post dies aliquot, cum inflammationem in tibia ad gangrenam tendere videret Dn. Zwirgerus, rogavit me, ut miserum quoque inviserem, ad ægrum itaque me consero, tibiamque ad popliteum fere usque, gangrena corruptam animadverto.

Porro etiam vires prostratas, febrem maximam tibiam quin etiam ad coxam fere usque supra modum tumefactam ac proinde rem istam in angustiis positam esse, latis superque videremus, attamen quia sæpissime, etiam in desperatis, divina clementia atque Potentia, præter spem atque opinionem Medicorum sese patefacere solet, & semper (ut divinus Hippoc. lib. 2. Aphor. 25. nos monet) omnia secundum rationem sunt facienda, ejus pudique scarificavimus unguentum Egyptiacum, aliaque medicamenta quæ putredini adversantur, applicuimus, sed frustra, sequenti enim die, ad coxam regionemque hepatis usque livida reperta fuit, Lipothymia, frigus extremitatum & sudor frigidus aderant, & eadem die vitam cum morte commutavit. *Idem ibidem.*

De gangrena & retentione urinae, historia singularis, nunquam rara nonnulla recensentur.

Cæterum quia statum generosi nostri ægri scire cupis, ipsius vultu pauci, sed ordine ipsam tibi aperiam. Reversus me ex magna Britannia sapulmæ de ardore urinae, nonnullam quoque de ipsius retentione conquiescit, sed sumptis emulsionibus à te præscriptis Enematumque, adhibitis quoque candelulis facie restituebatur. Ex sinistra tamen parte peritonæi a duabus aut tribus mensibus ante morbum usque diu ruptus fuit abicellus in perineo, ut postea intelliges, dolorem pungitivum, non utique adeo acutum tamen, continuo persensit. Circa principium vero mensis Aprilis hujus anni, cum præscriptam victus rationem non satis exacte observasset, in exercitiis quinetiam corporis, modum excessisset, scortorem quandam in urina percipere coepit. Scortor ille paulatim adeo auctus fuit, ut mirum sit, quomodo talis putredo adque febre, nausea, aliisque gravissimis symptomatibus in corpore tam diu delitescere potuerit. Eodem quoque tempore infuso urinae, materia quædam viscida, spermatis ranarum non abimilis conspiciebatur. Præterito mense Majo cum ad Alpes prædica sua invivendi gratia, profectus esset & scopulos pedes ascenderet descenderetque, & proinde præter modum ac consuetudinem suam incaluisse, longe vehementius quam antea ipsum invaserunt symptomata. Reversus Bernam cum esset, Emulsionibus exhibui, Enema ex lacte quod præscripsisti, injeci aliquoties: Renes unguentis & oleis refrigerantibus inunxi, post dies quoque aliquot corpus medicamento cholagogo leniter expurgavi, venamque in brachio incididi. Et quia materiam illam fetidam & viscosam cum urina copiose ipsum excohere videbam; suasi, ut per dies aliquot sero lactis cum saccharo uteretur. His per dies quatuordecim adhibitis medicamentis, & exquisitissima observata victus ratione, cum omnia salva esse videbantur; scortor quin etiam urinae nonnulli remittere videretur, Solodurum ad Illudrem Dn. Meronium Christianiss. Regis legatum vocor. Non diu post meum abitum, malum & longe acerbius & crudelius quam unquam antea, ipsum invasit, non solum enim febris ardentissima & continua, cum urinae retentione, verum etiam phlegmone in ipso perineo exorta est. Quapropter me absente, Dominum Davidem Regem, hujus Reipubl. Doctor. medicum ordinari. & doctiss. appellare coactus fuit. Insistit & ille Emulsionibus Enematibusque & locum affectum oleis convenientibus inungit; semicupio quoque propter doloris vehementiam, uti coactus fuit. Interim ego accersitus adeo ægrumque veluti in agone reperio. Febri enim vehemens, syncopæ frequentes, nausea cibi fastidium, urinae ardor & retentio, omniaque fere signa, quæ mortem præsentem præcedere solent, aderant. Phlegmone in perineo magnitudine ovum aserinum adæquabat cum maximo dolore pungitivo, tumore & duritie seroti & virgæ. Dn. Dn. Rex ante meum adventum anodynis, & quæ discutunt ac resolvunt

simul usus fuerat, sed frustra quapropter ad pus moventia nobis transcendendum fuit: sequens itaque cataplasma applicuimus.

24. Radicum & folior. althææ. malvæ. an. m. i. coquantur & pillentur, ut artis est, quibus adnuice farinæ tritici, ʒ. ii. farin. sem. fœnigræci, & lini. an. butyri recentis, Olei liliorum albor. & unguent. de althæa an. ʒ. i. f. croci. ʒ. ʒ. vitell. ovor. num. ii. misce, hac cataplasma, quod calide applicuimus bis terve in die. Vigesima nona maji cum in medio perinæ & quidem in ipso tauro ruptus fuit abscessus, pus adeo putridum & fortens in copia effluxit, ut totum conclave, incredibili & plusquam cadaveroso suo fœtore adimpleret. Fœtor ille per dies aliquot continuavit; talis enim erat sphacelosa putredo, ut totum perinæum emortuum excideret, & ulcus ingens post se relinqueret. Interim ego quæ putridini resiliunt, applico, ulceri unguentum Ægyptiacum necum in tractatu meo de gangræna descriptum, cum filamentis & duabus turundis, quarum una versus scrotum ascendebat, altera deorsum versus podicem descendebat, imposui; postea sequens cataplasma applicui.

25. Farin. lupinor. fabarum an. ʒ. i. ʒ. Pulver. summitat. absynthii. scordii. rutæ, an. ʒ. i. coquantur in oxymelite simplici, hacque cataplasma: adhuc calenti admisce. Aloes, myrrhæ, an. ʒ. i. ʒ. carnem autem emortuam quotiescunque ulcus deligavi, fornice & scapellis ad id aptis, quantum fieri potuit, excidi pus cum penicillis ex spongiis in decocto scordii, rutæ, ablinthii, & lupinorum, addito sale, madefactis absterxi. Sic per singularem Dei misericordiam putredo paulatim, & quidem intra triduum cessavit, nec ulterius scripsit: quapropter usum unguenti Ægyptiaci intermissi, & linimentum ex pulveribus radicum Aristolochiæ rotundæ, Iridis florentinæ, Angelicæ; Aloes item & myrrhæ, cum Extracto scordii, parumque vitelli ovi mixtus, ulceri imposui Cataplasmate tamen præscripto ultra hebdo, madas tres usus fuit. In perinæ autem non solum cutis & caro a putridine erosa fuit, Verum etiam membranæ multa putrida, ductus urinarii, procul dubio tunicæ, excidendæ atque extrahendæ nobis fuerunt: quapropter omnis fere urina per ulcus effluxit, idque in longum, ut postea dicam.

Circa initium junii in medio virgæ, & quidem in ipso latere dextro tuberculum, quod ab initio fere morbi duriusculum fuerat, in abscessum abiit, qui paulo post ruptus quoque est, non tamen ad ipsum ductum urinarium penetravit: quapropter adhibitis emollientibus, digerentibus, & mundificantibus haud difficile coaluit. Triduo à nupto in virgâ tuberculo, humor qui antea per totum scrotum expansus erat, in imam ipsius partem, versus ulcus in perinæo decubuit, ibique extuberantiam quandam duram effecit.

Postquam vero applicuissimus sacculos emollientes, unguentum item de althæa, & Emplastrum ex meliloto; materia ibidem collecta, per ulcus in perinæo paulatim evacuata fuit.

A carne putrida & membranâ sphacelatis factis mundificato ulcere, decocto Traumatico ex pyrolâ, alchimilla, sanicula, consolida sa-

racenica, artemissia, & beta rubra, cum vino rubro styptico uti fuimus, hoc modo: bibit æger hauritum tribus horis ante prandium & totidem post cænam: cum siphone quoque ulceri illud bis in die calide iniecimus, duabus quinetiam cum turundis eodem decocto madefactis ulceri immitimus, una videlicet sursum, altera deorsum versus prostata. Tandem linteum reduplicatum in eodem imbutum calide applicuimus. Non tantum autem ulceri cum siphone decoctum, verum & ipsi ductui urinario, tam sursum quam deorsum infudimus. Id vero ut commode fieret, rostrum siphonis incurvatum fieri curavimus.

Non autem admiratione caret, in hac gravissima maximeque putredine ipmuerem temper saluum & incolumen extitisse. Apparet id inde, quod æger etiam in morbi ipsius vigore urinam semper retinere potuerit, nec unquam illa involuntarie effluerit. Ulcus nihilominus quod deorsum versus vetricem tendebat profundum erat, & ad ipsas Prostatas, quas ego à longo tempore male affectas fuisse existimo tendebat. Quotiescunque autem urinam excernebat, partim quoque per ulcus effluebat, absque ulla tamen difficultate & dolore. Prædictum decocto Traumatico, eo modo ut dixi, in tertium mensem ulus est, ita ut paulatim ulcus plenissime consolidatum fuerit, nec nitula ulla remanserit. Faxit Deus Opt. Max. ut recuperata valetudine diu ad Dei gloriam frui possit. Porro præter Topica enuata etiam in universalibus nihil prætermisum fuit. Ab initio vires præter modum labefactates cibis optimi succi, cordialibus item medicamentis, quantum fieri potuit, intauravimus. Deinde paululum recuperatis viribus, de triduo in triduum, aut etiam alternis diebus, nonnihil Terebinthinæ optimæ exhibuimus, cujus beneficio aluum lubricam fecimus, & vias urinarias simul expurgavimus. Renes unguento rosaceo cum camphora inunximus, & laminam plumbeam ejus magnitudinis ut lumbos & os sacrum cooperiret, applicuimus. Nunc optimâ valetudine, laus sit Deo, fruatur generosus ille, nec ullum incommodum hujus mali gravissimi perierit. Urinam absque ulla difficultate & impedimento excernit, præterquam quod cum post cænam ipsam reddit, pruritum quandam dolorosum, eo in loco, ubi antea fuit ulcus, perferat. In urinâ præter ea nonnunquam suffures conspiciuntur. Præterea quotiescunque vult ipsam excernere, guttula una materiæ viscidæ, albæ & glutinosæ in extremitate ductus urinarii ante excretionem urinæ apparet. Qualis illa sit materia, & unde proveniat, ex Testire, cupit generosus? Ego materiam illam ex labefactatis & non dum satis corroboratis prostaticis pervenire existimo, esseque veluti excrementum seminis, beneficio naturæ ad extremitatem virgæ projectum. Deinde etiam quaerit, cur pruritus ille dolorosus in urinæ excretionem, post cænam, cum cubitum iturus est, solummodo, non autem mane aut interdiu perferatur? Arbitror ego, naturam locum illum membranâ suâ destitutum, noctu, cum naturales operationes præcipue fiunt, viscosa quædam & glutinosa materia in eum finem, ne ab acrimonia urinæ lædatur, munire; Interdiu vero

vero urinam, quia aliquoties excernitur, materiam illam abluere, partemque adhuc debilem vellicare. Hæc si non probabilia, verisimilia tamen mihi esse videntur. Sed ampliorem declarationem, & quomodo hisce symptomatibus in posterum occurrendum sit ex Te nobilissime vir, avide expectamus.

Generosum ægrum porro quod attinet, etiam nunc optimam exquisitissimamque observat victus rationem. Per intervala quin etiam utitur Terebinthinâ. Præterito quoque autumno Apozemate laxativo corpus expurgavimus & venam in brachio sinistro secimus. *Idem ibidem.*

De admirandâ curatione scroti post gangrenam delapsi.

Anno Domini 1616. mense Junio, vir quidam honestus, annorum circiter quadraginta vino obrutus, cum repente in scroti tumorem cum febre acuta, & virium subita deiectione incidisset, à Chirurgo vocato remedium petiit, qui cum livorem illius partis cum exulceratione penis totius, imo periculum, quod manifestam gangrenam deprehenderet, notaret, de cura sollicitus, petiit consilium Medici. Ego vocatus injecto prius clystere, quoniam alius à biduo non responderat, præscripti cataplasma ex scordio, ruta, farina lupinorum, orobi cum oxymelite, vino & similibus. Per os exhibui diasenam Hieron. Fracastorii, subinde aquam Theriacalem, quod malignitatem cordi communicatam observarem, sine hac enim vix respirare potuit. Die sequenti deposito cataplasmate super cuticulam, quam Epidermidem vocant, separatam vidimus: tertio die scrotum sponte opertum, circa vesperam vel libras aquæ decem effluxisse. Quarto die testes ex toto nudatos conspeximus, deciderat enim scrotum à pectine usque ad perinæum. Hic quod factum opus deliberavimus, reticantibus & incarnantibus remediis, quatuordecim dierum spacio tantum profecimus, ut non tantum testes scroto muniverimus, sed & natura scrotum novis pilis vestiverit, glans peni redierit integra, omnia ulcera penis consolidata fuerint, & officium viri deinceps patiens præstare potuerit. Ego nec quisquam Medicorum nostrorum similem nec vidit, nec audivit: luis veneræ nulla suspicio: nunc inculcata fruitur valetudine.

Ego naturam potius in conservatione speciei quam individui sollicit. in esse dixi: studet enim perpetuati, ut cum individuum servare non possit servet speciem, quod præstat partibus, quibus sobolescimur, si molestum non fuerit, & negotia ferant, iudicium Gl. T. officiosè peto. *Idem ibidem.*

De Gangræna Perinæ & scroti admirandâ curatione.

Monstra in morbis fieri, Vir nobilis, Amplissime, Averroem, summum illum Philosophum recte scriptum reliquisse, indies experimur. Testis est admirandus & fere inauditus ille casus, quem Clarissimus vir mecum communicavit. Ego infinitos propemodum vidi ægros, gan-

græni scroti laborantes, sed, ut ingenus fatear, ne unus quidem relictus fuit. Pudenda enim cum partes corporis sint humidissimæ, raræ & spongiosæ, facile excrementicios humores ex corpore descendentes recipiunt, sequiturque gangræna, uti sapissime in hydropicis observamus, in quibus gangrænam pudendorum, propter cachexiam corporis, & labefactionem viscerum, necnon caloris nativi partis affectæ imbecillitatem, planè insanabilem esse existimo.

Ægrum autem de quo Clariss. vir scribit, non fuisse diuturno aliquo morbo affectum, ex literis clarissimi viri colligo: scribit enim, ipsum vino obrutum repente tumore scroti cum febre acuta correptum fuisse. Vires itaque non fuerunt a diuturno aliquo morbo, quemadmodum sit in hydropicis, consumptæ, sed adhuc integræ: quapropter morbum facilius debellare potuerunt. Sinule quid videre mihi licuit.

Generosus quidam Bernensis, quadraginta circiter annorum ætatis, à multis annis caruncula laboraverat, quæ ipsi multum negotii faciebat. Ante annum, circa principium Aprilis, cum præscriptam à Medicis vicus rationem non satis exacte observasset & in corporis exercitiis modum excessisset, primo tactum in cadaverosum in urina (quæ sedimentum viscidum, spermati ranarum non absimile habebat) percipere cœpit. Ego quæ renes, viasque urinarias abstergunt & mundificant, præscripti interim tamen factor ad septimanas aliquot continuavit. Tandem penitus suppressa urina, & exorta inflammatione in ipso perinæo gangræna sequuta est, ita quidem ut totum illud interstitium, quod est inter podicem & scrotum, ductus item urinarius partim exciderit, partim quoque excindendus fuerit. Longa esset ratio, si omnia quæ annotatione digna in hoc ægro occurrerunt, recensere vellent. Clariss. Vir omnia ordine videbit in v. Centuria Observationum mearum, observ. 64. in qua paulatim progredior. Tandem omnibus admirantibus veluti ex cymba charontis evasit, & nunc integrâ fruitur valetudine, neque ullam molestiam in reddenda urinâ sentit. Caruncula enim omnes, quæ antea ductum urinarium coarctabant erasæ & ablatae fuerunt. Exigua præterea fistula in perinæo remansit, & maximo quidem cum ipsius comodo; Viscidi enim atque excrementicii humores, qui ex superioribus & labefactis partibus veluti renibus, vesica & vasibus spermaticis, descendunt, libere per ipsam urinam, non tamen involuntarie sed cum ipsa urina, quam pelvicula, ad id ex industria fabricata, excipit. Observatione autem dignum est, ante menses aliquot cum ulcus illud in perinæo, ita volente & iubente ægro, me vero dissuadente, maximâ adhibitâ diligentia, cicatrice obductum fuisset, ægrum retentione urinæ aliisque incommodis, quæ carunculas comitari solent, de novo tantisper afflictum fuisse, donec fistula iterum rupta fuerit. Porro ut redeam, unde digressus fui, nisi juvenis adhuc esset generosus hic æger, robustus, optimo quin etiam corporis habitu præditus, vix evasisset. Naturæ enim ut Clariss. Vir rectè quoque sentit, semper sollicita est in conservatione individui sui,

morbisque sese opponit: sed prout valida aut imbecillis fuerit, aut victrix evadit, aut victa succumbit. Memini aliquoties ex Dn. Cosim. Slotano, p. m. Chirurgo præstantiss. intellexisse curationem admirandam, nec obliuiscibilem illi, cujus Celeritas tua mentionem facit, cujus etiam memini centur. i. observ. 48, Eit autem talis.

Quadragesarius quidam Colonienſis, robustus, optimo corporis habitu prædictus, cum ætatis tempore supra modum incalvisset, & maximum haurum frigidæ bibisset, post dies aliquot febre continua correptus fuit. Ex qua potius naturæ beneficio & industria, quam arte & medicamentis Medicorum curatus fuit; interim tamen intemperies & vitium in hepate remansit, quapropter paulo post in cachexiam incidit. Et ita quidem, ut primo Icteria, postea quoque Aicte præhenderetur. Advocatus Dominus Doctor Bernardus Cronenburgius, si recte recordor Medicus colonienſis longe celeberrimus, omnia quæ ad morbum debellandum necessaria esse videbantur adhibuit. Tandem veluti per criticam expulſionem in serotum delapſo humore Dom. Slotanum quoque vocavit in consilium. Ambo omnem adhibuit diligentiam atque industriam, Interim tumor seroti non cedit, sed paulatim eo in loco, extincto calore nativo, in gangranam desinit. Serotum itaque undique phlebotomo scarificant, sale marino & theriaca aceto dissoluta ablunt. Unguentum Ægyptiacum & cataplasma ex farina Juniperorum, lolii, aloë, myrrha, scordio, aliisque putredini restituis applicant, nec quidem eorum quæ ad universali spectant, prætermittunt. Optimam victus rationem præscribunt, corpus per intervala leniter, leviterque expurgant: Corroboratione & obstructions aperientia, cum intus exhibent, tum carpis, hypochondreis, & ventri applicant. Interim dum aqua copiose per serotum effluit, æger melius vix habere, viresque recolligere cepit. Denum serotum sphacelatum partim naturæ & medicamentorum beneficio decidit, partim quoque quod sphacelatum erat, a Dn. Slotano novacula resectum fuit, ita quidem ut testiculi nulli conspicerentur, Ulcus per menses aliquot apertum manuit. Interim natura quidquid humoris excrementitii visceribus inhærebat, per hanc viam ita evacuat, ut partes nobiles in integrum restituerentur, & a morbo plane liberaretur æger, Circumcirca autem testiculos quod notandum, natura cicatricem duram, adeoque callosam procreavit, ut ipsos vice seroti, ab externis injuriis vindicare sufficiens esset. Sic Dei beneficio omnino restitutus fuit æger, & ad nuptos annos in matrimonio vixit, liberosque aliquot progenit.

Ante annos aliquot cum Lanſannæ Medicinam facerem, venit ad me sabaudus quidam. 14. circiter annor. ætatis, cujus nomini de industria parco, huic ulcus ex lue venerea ortum pluiquam dimidiam partem seroti & testiculorum eroderat. Adhibitis à me medicamentis, Deo benedicente restitutus fuit, & liberos ex uxore sua suscepit. Hanc coronidis loco addo historiam, etſi à præcedentibus diversa sit. *Guilielmus Fabricius Hildanus in observationibus Chirurgic.*

Gangrana Universalis.

Seni satuo, neque heri, atque hodie, sed diutius e debilitatecebant tandem usque eo, cum languidum cor; tum effectus partium calor: ut a nimia corporis offensa, sequeretur protinus perniciosissima gangrana. Dispergens te periners hocce corpus, tam libere, ac late ut id intra paucos dies, consumpserit universum.

Non licebat illi, vel natibus insidere; vel cubito incumbere: nedum calcem pavimento imponere, vel scapulam in parietem inclinare quin protinus extingueretur calor: & a gangrana obsideretur non minus pars premeus, quam pressa. Quæ labe, tam præpete penia, corpus universum, ubi pervolaret: vidimus brevi, vix ullam partem intactam: quin omnia jam emortua, antequam vere emoreretur, miserum hocce, lascivientis mortis ludibrium. *Nicol. Tulpius Observationum Medico-Chirurgic. lib. 3.*

Gangrana pedis.

Lucas Sircus, geometer Amstelredamensis, contraxit ex penuria coloris innati, gangranam pedis sinistri. Cujus digitis a parte tana jam avulsis, obtulit nonnumquam, homo natura jocundus, Chirurgo suo: ubi iam melius, cule ipsi foret, pedem dextrum; quasi recreandi causa.

Sed eo eadem labe paulo post, itidem infecto; deservit illum illico intempestiva hæce hilaritas, & quasi desperata, jam tum omni salute, credidit firmiter, penam hanc caltus sibi imitti: quod tamen intempestive jocularus fuisset. Quæ certe tristitia non deservit ipsi, antequam defereret ipsa vita. Adeo periculofum in seriis nugari.

In fortunium autem, quod ipsum oppressit, circum venit plerumque, quocunque a simili gangrana detentus. Neque fuit fortassis, ipsius conditio, eo deploratior: quod peccatum hoc peccasset: sed quia cordis robur fuit imbecillius, quam ut convenienter ab interitu vindicaret pedes: ceu longissime, à se remotos, Quorum partium exitium, propterea iudicium facit circum spectis medicis, brevi utique pessum iturum, & totum hominem. *Idem ibidem.*

Gangrana partium naturalium.

Innumera in feminas cadere incommoda, mensuris post partum, minus prospere succedentibus, vel Tyroni notum. at cui cognitum, exploratumve? Omnem expurgationis iterum impetum confertim propelli, in partes naturales, illasque inde, non tantum extrinsecis protuberare, Verum gangrana etiam obsideri, quorum infelicissimum eventum duo nobis oblata fuere Exempla, & utrumque puerperis æque exitiale.

Matrona locuples difficillimè enixa, cui nihil post partum, ex naturæ lege, à vuluâ secederet, doluit inipense circa naturalia, præ insigni illorum tumore, quem tamen invitis quum ostenderet, sategimus quidem cum per clyste-

clysteres ac potiones; tum per fomenta ac olea opem adferre. sed oleo ac opera deperditis, maloque in dies invalescente evicit tandem pudorem, facta copia illius tumoris, quem necessitas non sinebat ulterius celare.

At fluxus uterinus tam libere, tantoque impetu jam tum, se effuderat, in declives hæc partes, ut erosæ ac distentæ ab ani ac feiuido hoc uteri excremento, jam induissent naturam gangrænz; cum cute nigra, febre ardente, crebro animi deliquio, ini ventris dolore, ac summis præcordiorum angustis, quorum gravissima symptomatum vehementia, adactus Chirurgus, apervit non solum scalpello locum exitique inde plurimum concreti ac grumosi sanguinis. seu veras infusorum menstruorum reliquias. Verum fategit quoque loca sincera defendere, & quod induruerat, in pus convertere cuius voti propemodum compos, conceperat certe non exiguam sanitatis spem.

Sed heu vanas hominum spes & incerta conceptæ valetudinis arguenda. Vix animos fecerat sperata victoria, quin protinus in pejus rueret, atque ante duodeviginti,um intervenire puerperæ inexpectatum vitæ exitium, secundum illud Celsi: Adeo in medicina, ubi etiam perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est id quod sequi convenit. *Idem ibid.*

Vulva Rectique Intestini gangræna & perforatio feliciter curata.

In gravioribus affectibus haud decet Medicum facile desperare: sæpius enim finat, quæ fieri posse pernegares. Reperiuntur ardeliones qui non verentur mox exclamare: *Non curabitur non elutabitur. Moriendum est agro &c.* Attamen si nomini & famæ suæ cuperent consulere, cautius certe prognosticari deberent. Uxor cujusdam Pistoris Amstelodamensis, ob partum difficilem, incidit ante aliquot annos in vulvæ intestinique recti gangrænam adeo enormem, ut multi existimarent afflictam brevi è vivis excessuram. Post gangrænz separationem foramen vulvæ à nobis repertum fuit tantum esse, ut facilimè nux juglans viridi cortice obducta per illud ad intestini recti cavitatem inferi potuisset: unde fœcibus alvinis dabatur locus, ut ex intestino recto ad vulvam nullo negotio transirent; id quod in tali casu admodum familiare, Vulva enim tam arcte coheret intestino recto, ut quasi continuum sit corpus Itaque si alterutra pars afficiatur, altera nequit remanere immunis. Chirurgus qui mecum curationem suscipiebat, excogitabat instrumentum è bractea confectum, in forma pessarii excavati, cujus superficiem exteriorem obduxerat sarcotico medicamento: quale juxta Theoriam Chirurgicam equidem non erat improbandum, sed tamen in praxi præsentī inutile fuit repertum, neque enim illud perferre potuit ægra. Itaque dictis medicamentis, plurimaccolis exceptis, aperturæ dictarum partium prospeximus, quibus brevi in totum reconvalevit hæc puerpera. Ubinam jam sunt scioli, qui effutiant ejusmodi malum esse incurabile & sine fistula remanente nunquam curari posse absolui? sciant non solum hæc puerperam in totum fuisse restitutam, ita ut nulla superesset

labes, verum etiam diversas ex eodem affectu à nobis esse curatas. Hoc vero discrimen in gangrænis partium animadverto: Scilicet, si partes posteriores, nempe, quæ os sacrum respiciunt, tali afficiuntur morbo, facilius curantur, propter intestini recti carnositatem, vulvæque dispositionem, quæ versus intestinum rectum non gaudet tot rugis transversis, nervis & duris, curationi obstaculum interentibus, sed quod omnia ibidem molliora, curationique magis prona. Itaterea in parte anteriore, nempe, quæ meatum urinarium respicit, propter continuum urinx stillicidium sanatio præpeditur, unde tum sæpius & fistula relinquatur incurabilis. *Freder. Ruysch. obsv. Anatomico Chirurgic. Centuria.*

Sphacelus strictiorem ligaturam sequutus.

Patitur puer quidam rusticus ix. annorum in agro Goslicenæ tracturam sinistræ manus in medio cubiti & radii: Ligatur ab imperito æditus illis loci minus arcte unde subsequente aurora rubore nigricante in manu suborto, cum sanguinis eruptione circa apices digitorum manus cœpit gangrænescere cum intus ejusdem sphacelo, factaque hinc amputatione. *D. Ehrenfrid Hagendorn.*

Gangræna brachii ab incantâ venæ sectione.

Nobiliss. & magni nominis Jure-Consultus D. Oc. a f. Patricius Norimbergensis, tum juvenis, ex Hispania redux, Monspelii in galliis ex præcipitantia, Chirurgi alias percelebris, sanguinis missionem procurantis, in extremum fere vitæ discrimen inciderat. Nam iste, conspecta quadam in medio brachii flexu cicatrice, profundiorē venæ situm conjecturans, cutelli (*Lancette* galli vocant) cuspidē iusto longius arrepta, non venam tantum infelici ictu pertuderat sed simul nervum quoque sub vena latenti gravissime læsit. At Oc. infelicitis hujus sectionis ignarus, cum subsequente die horrorem febrilem sentiret, in emittendo sanguine ex altero brachio, ejusdem Chirurgi opera, sed feliciore ausu, ulus est. Sequentibus diebus, in primis septimo, brachium dextrum supra modum extumescibat, inflammabatur, ac tandem in sphacelum converti videbatur, tanto cum patientis exquisitissimo cruciatu & dolore, ut plurima sanguinis & laniæ copia excreta, ad interitum fere decumberet; variis quidem medicinis intus & extrinsecus, frustra tamen applicatis. Et quamvis singularis fomentationis beneficio ex catellis & felibus recentissime editis, atque summo studio ad id requisitis dolores aliquantulum mitigarentur atque calor brachii naturalis nonnihil redintegraretur; ipsum tamen malum à gangræna conceptum non nisi cum brachii abscissione, vel funesta totius corporis perniciē, curari, aut deponi posse credebatur. Quapropter totum Medicorum Collegium inclytæ iubi Academix in consilium convocatum, præmissa inspectione oculari, unum ex illis tribus ægro eligendum pronuntiabat, vel brachium ob incidens gangrænz malum incurabile, amputandum; vel nervum cum amortizatione totius brachii dissecandum; vel vitæ subsidii-

subsidium quodcumque. Is reputans seu sub toga, seu sub iugo, se brachio indigere, ultimum eligens, maluit vitam cum brachio amittere, quam sine brachio eandem misere & otiose producere. Ob id in tam desperato casu Medici & Chirurghi abeuntes ægrum misere reliquerunt. Postero vero die ordinis Medicorum illius loci supremus, D. Joh. Hucherus de Bellovac, ac ægrum jam quasi conelamatum acceffit, narrans in simili plane casu, olim Carolum ix. Galliarum Regem provida cuiusdam Medici ope & arte curatum fuisse, & si æger dubio artis eventui se committere, & tam ad gravissimos dolores obduratum, quam ad sumptuum plurimum erogationem lubenter paratum præstare vellet, suum quoque scientiæ & operæ studium ahibiturum se fidenter promittit. Annuente ægro Hucherus novacula arrepta, in affecto brachii loco novum vulnus cruciatum incidit, & ægro ipso vulneris incisi partes forcipe tenens & dilatante, fruticula quadam inserta, vulnereque rursus colligato, paucis diebus id effecit, ut vena perforata & nervus læsus conspicerentur. Cum vero fomentationibus præmissis, servido & bulliente oleo locum affectum Medicus crebro perfunderet, eo ipso patienti tantum cruciatum causavit, ut viribus plane consumptis denuo in mortis vicinia versaretur. Tandem immanis doloribus paulatim remissis, ligatura aperta, notabiliter apparuit, quomodo nervus præscissus infusi bullientis olei beneficio coaluerit, ac quasi conglutinatius fuerit; quo & peractio, vulnereque perfunato, ipsum brachium pristinam vires indies recipere, & patiens præter omnem expectationem in integrum restitui cœpit. *D. Thom. Bartholini.*

*An gangrena pedis ex Sp. C. C. rectificati
inunctione processerit?*

Amplissimi Viri amicæ petitioni satisfacturi, perlegimus iusta diligentia transmissum Casum Medicum, & ad quaestiones propositas brevissime respondimus. De facto tamen iudicium nostrum suspendere debuimus, quia deficiente Medici Semproni relatione, circumstantiæ variz desiderantur ex ægræ Viduæ statu, malo præcedente, remediis adhibitis &c.

Interea ad Quaestionem Primam officiose responderetur, videri pustulam in pede excitatam, fuisse mali moris ante farinarum Medicarum applicationem, alioquin enim cessisset, ad minimum ex parte, post admotas farinas, quin & pravitate ejus indicium esse, quod totus ille prior dolor, & cordis, & aliarum partium superiorum, defierit velut in punctum aut centrum pustulæ, adeoque ibidem tanto vehementiorem in angusto spatio excitavit, dolorem. Putamus autem minus convenienter illicitum postea Spiritum Cornu Cervi rectificatum, præsertim si purus ille fuit, & non temperatus misturis aliis, qualem scilicet mitiorem nostri pharmacopœi divendunt. Opportunius adhibuisset Sempronius diaphoretica interna, quam externum illum vehementem liquorem, qui non potest non, præcipue in affectu non frigido, causari tandem dolores & alia incommoda. Neque spiritus ille in hoc casu salutari potest *Schmerz stillender* spiritus, si acute loqui placeat. Solent tamen

Medici in Inscriptionibus medicamentorum propter diversas intentiones ludere quandoque vocabulis, atque id innoxie.

Deinde, postquam ex superioribus constat, pustulam fuisse pravi & mali moris, non credimus inflammationem illam, & supervenientem gangrænam, in totum Spir. illi Cornu Cervini adscribendam esse, cum etiam sine illo medicamento potuerit sensim ex pustula illa seu fonte infecto manasse, præsertim si corpus fuerit Cacoehymicum, & ætas in senium declinans. Potuisse tamen dolores accelerare, & aggravare non negamus. In sana autem carne gangrænam ab aliquot guttarum illitu, terque quaterve repetito, excitatam fuisse, hæcenus non observavimus.

Tandem, quanquam Theriaca diateffaron succo Sambuci permixta cum fructu applicari possit erysipelati incipienti, adulta tamen inflammationi sistendæ quomodo servire potuerit, non videmus, Solum rob. Sambuci applicitum fuisse innoxium.

Conclusum in Collegio nostro Medico, Hassnia. 26. Martii 1705. lxxix. Th. Bartholin. Fr. Bartholin. W. Worm. Ol. Borrichius. Gasp. Bartholini Th. F. E. clar. Thom. Barthol. Ad. Hassni.

Remedium iuv. easor ad Gangrænam.

Acceptis Miscellaneis Academiæ vestræ Curiosis gratias ago, quod me inter Principes Archivos primum in scenam producere voluerit. Instituto præclaro Deus annuat, ut tantum opus quod molimini ut Reipubl. Medicæ emolumentum cedat. Alias Observationes superaderem, sed Vulcanus omnes turbavit meos talculos. Quia aliis subsidiis jam destitutor, pro na voluntas inserviendi æqui bonique consulenda, donec ad me ipsum rediero; interea tantum unam alteramve mitto historiam, quæ scribenti occurrit. Grassabantur nuper apud nos Morbilli maligni: facies exinde puellæ gangræna adeo defædada, ut labia pene fuerint consumpta. Sedavi statim serpentem gangrænam aqua marina, cui absinthium incoxeram, quod experimentum in aliis quoque gangranis opposui felici cum successu Dn. Th. Bartholani in *Lit. Hassnia Danorum ad D. Sachsum datis.*

Scholion. J Remediorum simplicium maximam esse varietatem, nemo est qui dubitet, habuerunt Græci sua remedia, suppeditarunt Mauritani maximam eorum sylvam. sed ut Romæ ait Ep. 28. p. 98. Videmus adhuc alia in usum cessisse, quæ illi ne attigerint aut viderint unquam. Quanto non Remediorum cornucopia inaudita priscis seculis emergit inde ex utraque India, & ejus adjacentibus Insulis, adeo recte dixit Comicus.

Vfus, ætas, tempus aliquid apportat novi.

Vi qua te modo scire credas, nescias.

In Gargarea tali mense plurimi non sine certa ratione Remedia apud nos nata Exoticis præstantiora judicant, ut pote tum ob familiaritatem cum nostræ naturæ constitutione, tum quod frustra foris petantur auxilia, quibus domi abundamus, ut censet Andr. Libav. Ep. ad Schniz. 44. p. 135. in cista Hornung. Agnovit hoc in primis Exc. Joh. Beverovicus Med. Dordrecht. qui Lugd. Bat. Anno 1614. edidit elegantem

tractatum *culis* Batavia s. introductionem ad Medicinam indigenam, in qua demonstrat cuilibet Populo latis apud se esse ad necessitatem, cuique proinde morbo sua ubivis remedia, & cum Natura *non* *non*, *non* *non* nec frustra quicquam faciat, nec deficiat in necessariis) cur Orientis illa solum sit mater fecunda in superfluis largiendis; reliquarum vero terrarum injulta noverca, quæ cogeret ex alieno orbe advenire remedia. Indigena remedia sane quoad certitudinem, vigorem, puritatem, impensis, convenientiam cum natura incolarum (Beverovic. l. 2. cap. 2. pag. 65.) majorem habent quamvis longe petita plerumque æstimentur. Eandem simplicium defensionem suscepit Primoros. de Error. in Medic. lib. 4. cap. 7. jam suo tempore Plin.) quanquam fere nimis acerbe) L. 24. cap. 1. exoticis indigena prætulit, quando inquit Ex terra nascentibus Medicina: hæc sola Naturæ placuerat esse remedia, parata vulgo, inventu facilia, & sine impendio, ex quibus vivimus: postea fraudes hominum & ingeniorum capturæ Officinas invenere, in quibus sua cuique homini venalis proponitur vita. statim compositiones & mixturæ inexplicabiles decantantur. Arabia atque India in medio æstimentur, ulcerique parvo Medicina a rubro mari imponitur, cum remedia vera pauperrimis quisque cænet. Id l. 24. cap. 24. non placent remedia tam longe nascentia, non nobis gignuntur, imo ne illis quidem, alias non venderent Hæc plinius. Eundem in finem Excell. Thom. Bartholin. conscripserat libellum, cui titulus: Medicina Danica inquilinis remediis proprios morbos sanans, sed in miserando illo elapsi anni incendio cum reliquorum librorum incomparabili jactura periit. De eodem hæc ipsemet scribit in de Incend. Biblioth. pag. 69. vulgo inservire placui, non doctis, quanquam malam gratiam iure videar à Pharmacopæis: Dedit Deus inquilina remedia pro curatione morborum domesticorum, quibus uti potest quisquis ab officinis Pharmaceuticis remotior, nec Medicos habet, quos consultat, nec marsupium, quod peregrinis remediis impendat. Sic Paralysin lateris sinistri curavi spiritu frumenti cui herba paralytis incocta, Pleuritides populariter grassantes solo decocto hordei sanavi; Scorbuticos folio aquatico in Cerevisia veteri decocto: hydropicos purgavi foliis tenerioribus Sambuci. Hæc Bartholinus.

De malo Gangranoso totius corporis.

Describit tale fere malum à scorbutico Engelenus de Scorbuto pag. 19. quale non ita pridem in Xenodochio S. Crucis Goslarienti observavimus, in quodam cœlibe XL. annorum. Hic ab aliquot mensibus rigidior incessit, & quasi immobilis, ut pedes & crura, immo ipsum dorsum non satis ex animi sententia flectere valuerit. Ante aliquot hebdomadas fit clinicus, & in lumbis oritur primo intuitu quasi excoriatio, quæ à diuturno decubitu alias oriri consuevit. Hæc primis diebus ab ipso ægro negligitur, post paucos tamen dies advocatur, qui manum Chirurgicam admoveret. Ille pro viribus rem tentat, sed perperam, quip-

pe malum ipsos lumbos & dorsum adeo infererat, ut ad interiora serpendo ipsas vertebrae lumborum & os sacrum denudasset, cum insigni & intolerabili putredine: & ipsa caro lumborum plane indolens apparebat, & quasi canes dilacerassent ipsam hanc musculosam carnem. Accedebat *omnis* inferiorum partium & abdominis, quippe injuncta & excrementa & urina, modo corpus moveretur, effluabant. In pedibus & brachiis utcumque apparet macula nigricans, altera die tumor, tertio die subsidebat tumor, & apparebat ulcus gangranosum foetidum, uti & uterque calcaneus brevi spatio & sensum vitam exiit. Hunc, rogatus, miserrimum die ante suum obitum, desperato molo, visibam, ubi vix intolerabilem factorem cum aliis perferre poteram. D. lob. Georg. Trumbii,

Sphacelus fracti cruris.

Ratisbonæ observavi in Viro quodam, ac juvene alio, quod, cum in cura & deligatura fracti cruris, calcaneus non rite & subtus concave ponebatur, hunc brevi sphacelo infestari. D. C. B. Winkleri,

Scholion Schrockii.

Calcaneus cum in parte posteriori magis præ cruce exstet ac promineat, adeoque in supino decubitu concavitatem aliquam efficiat, si illa suppositis pulvillis non expleatur, cruris ossa, ob fracturam tono suo & robore orbata, pondere quasi concidunt, adeoque partes circumjacentes molliores comprimendo, vel etiam distendendo, inflammationem facile atque sphacelum inducere valent. Siquidem ut Hippocrates in lib. de Officina Medic. scribit, jacere eo habitu convenit, qui secundum naturam sit; & dolorem minime faciat: quod paulo post calcaneo in specie adplicans, in prominentibus, inquit, corporis positus mollis, æquabilis esse debet, & quisquis tendat, velut in calcaneo & coxendice, ita ut neque reflectantur, neque evertantur. Et lib. de fract. hæc habet: Ubi devinxeris, supra molle aliquod & æquabile deponere, ut ne in hanc vel in illam partem pervertatur, aut in anteriorem aut posteriorem partem inflectatur. Ad id vero plurimum confert pulvinum lineum, mollem non durum, medium in longitudinem, aut aliud quid tale cruri supponere.

Gangrana sanata.

Nobis à Grusfchreiber laborabat Gangrana, Chirurgus imposuit jus sive myriam de Brassica acida feliciter.

Brassicam acidam egregiam vim refrigerandi habere, nemo est qui negat. Memini Dominum Capitaneum à Weixel mihi enarrasse, quod aliquando pulvere pyrio adustus felicissime seipsum sanaverit, imponendo Brassicam acidam Sic D. D. Sim. Pauli 4. part. Bot. p. 16. refert: Gangrænam in femore sola applicatione pomorum putridorum contusorum, sine assuisione ullius liquoris coctorum sanata. De Brassica Gal. l. 2. simpl. med. dicit: Brassica esculenta

ta desiccandi vim habet, tam esca quam foris imposita. Quantum Brassicæ acidæ ad usum usque tribuat Hippol. Guarimonius ita Grevel der Bernuslung Menschlichen Geschlechtis. p. 570. videri potest. D. C. Winters.

De Natibus sphaclatis.

Glutuos sphaclatos videre frequentissimum mihi fuit in febribus malignis & chronicis multis a diuturniori decubitu supino. Licet autem ex illis amplæ habentæ atque lamellæ defectæ sint, atque optima quæque antiphagadenica tam intus, quam extra fuerint adhibita, mortis tamen præda fuerunt, uno duntaxat excepto, vegetiore viro, belli duce, purpurata febre correpto, de quo mihi toties à Chirurgis inclamatum, *tuere vite præsidia, nos externis prospecturi sumus*. Et revera quisque nostrum suas partes feliciter peregit, instaurando salutem Nummis afflatu. E. Clar. viri Carol. Dreisinger Collegii communicante Excell. D. Guyot. Med. D.

Gangrena ex Elleboro lethalis.

Rustica mulier juvenis, doloribus ventriculi molestata, intuum, e cortice radicum ellebori albi cum vino paratum assumpsit. Huius pharmaco incidit in Dyipniam cum strangulationis sensu, cardialgia, pulsu debili & frequente, sudatione, extremorum frigore, tussi, sputoque cruento. Ter aut quater alvum deposuit, postridieque cum tribus aut quatuor sedibus, lumbricos deiecit, cum intenso frigore universum corpus obidente, dolor in dextro crure oboriebatur. Non fomenta ex vino rubro cum herbis nervanis parata, non spiritus vini applicatio, ne embri mox emoriturus frigus sustulerunt. Sensu evanescente dolore, qui per biduum insellam cruciaverat, natus cruris color in purpureum lividumque mutatus fuit, membrumque sensu & vita carere compertum est. Nulli fuere auxilio scarificationes, permultaque alia Medicinæ præsidia. Amputata infra genu tibia, nullus manavit sanguis. Interim serpens & interiora pervadens gangrena ægrotantem à vivis abstulit. Ex communicatione Clar. D. Rivalier Medic. Doct. Celebrissimi.

GIBBOSITAS.

NE in frontispicio statim propositi nostri mazandris implicemur, sed luccincto & solido tranute procedamus, more recepto à vocis significato initium facturi sumus. Nomina enim sunt *κίββος* sive imagines rerum, quibus intellectui propositis ipsæ res, uti sunt, exprimuntur, & concipiuntur prout par est. Hinc eleganter Plato in Gorgia: *εἰς τὴν ἀόρατον ἰδέσθαι, εἰς τὴν αἰσθητὴν ἀκούειν*, nominum gnarus, gnarus rerum. Consistit autem illa nominum cognitio in tribus: *Etymologia, Homonymia, & Synonymia*.

Gibbus itaque, si *Etymologiam* spectemus, nomen græcum est & latinitate donatum, descendit enim à *κίββος* inflectere incurvare, à cuius præterito medio *κίββον*, abjecto augmento *κ* &

mutato *ο*, in *ο*, dicitur *κίββος* incurvus. Alii hoc nomen derivare allaborant ab *εἰς* curvus, inflexus. Hinc *κίββον, κίββος*, curvamur, tanquam ab *εἰς* curvo, quod *κίββος*, qui hoc affectus afficiuntur, non erecto sed magis depresso & inflexo incedant tergo; quæ tamen derivatio cum priori eadem est. Videri de hac Philologia imprimis meretur Pergamenus l. 6. aphor. comm. 46. Ex quo ipso loco & rei ipsius fundamentis potissimum arguere licet, quidnam sentiendum sit-quoad

Homonymiam, magni momenti quæ est, ut rite procedamus hinc in dicendis. Notandum enim est, *κίββος* vocem i. latissime pro omni convexo & extuberante, etiam naturali, unde notum est, non solum montes ab Helmontio & aliis dici gibbos terræ; verum speciatim hepatis dividi in partem gibbam & sinuam, convexam & cavam. Refertur huc meretur, quod ipse Cous spin. m. scribit à sacro osse usque ad magni verticuli *κίββος* gibbosam esse, lib. de ossium natura c. 2 t. 6. Quod repetit lib. de articulis c. 4 t. 8.

1. Late & improprie paulo gibbus notat omne vitium ossium circa ipsam cratem sive spinam, à statu recto in curvum abeuntium, & eminentiam inde consequentem, qualis tum in aliis ex consuetudine observatur, tum frequentius in senibus jam decrepitis, potissimum procerum corpus habentibus, quibus corpus præ siccitate aut imbecillitate nimia in anteriora incurvescit ac inflectitur, quæ tamen potius curvitas, quam gibbositas nominanda, ut quæ nullo pectoris aut spinæ vitio accedat.

3. Strictè magis gibbi dicuntur in universum, quibus luxata quoque loco diutius prominent spinæ vertebrae. Hæc autem luxatio varia est, & deprehendimus illius quatuor vel quinque potissimum annotari differentias, quas communem & recepto ordine recensebimus. Una ut exteriorum, quum foras sive in posteriorem spinæ partem, vertebrae convertuntur, Græcis *ἀνίσταται* sive *ἀνίσταται* Latinis gibber gibbositas dicta. Altera ut interiorum, quum in partem anteriorem vertebrae luxantur, ita ut in dorso sit cavitas, in pectore circa sternum præcipue tumor, Græcis *ἀνίσταται*, Latinis repanditas, recurvitas. Tertia ad spinæ latera, quando nempe vertebrae neque ante, neque retro recurvantur, sed in obliquum sive ad latus declinant, Græcis *εὐκλίνας* Latinis obliquitas, divaricatio; est autem sic dicta, quod tortuosum velut lumbricum terræ reptantem referat spirarum similitudine. Refert etiam Hieronymus Cardanus in Comm. de causis, Signis & Locis morborum part. 3. §. 56. id quod etiam obtigit cit. cit. id M. A. Severino, l. de gibb. c. 1. p. 324. & 11. 11. Præterea, visam sibi puellam, flexa ita spina, ut literam S. referret. Quarta est, quum vertebrae in loco quidem suo manent, earundem tamen compages laxatur, cum æquali magis in sedendo incurvatione, quod in tenellis infantum corporibus speciatim visitur, non item in senibus, exceptis, quibus id vitium incurvatum remansit, qualem sartorem novit D. D. Præses, qui continuo incurvato & prono sere corpore incedit, non aliter ac si aliquid æmulum studio curioso semper quæreret. Græcis dicitur *κίββος* Latinis *εὐκλίνας* sive concussio, quæ

satio vertebrarum. De singulis his speciebus videri potest Galenus l. 4. de loc. aff. c. 3. & comment. 3. de artic. l. 2. Quarta est, quando tum vertebris dorsali, tum lito ossi pectoris, quod sternum dicitur, ut illic ventur intus & extus, accidit, scdæque corporis existit, figura cum depressione colli & elevatione humerorum, atque exsiccatione coxarum. Et ita corporis tortura vocatur ante & retro gibbositas.

Ex quibus patet, quod singulas species probe discernendas, cum unamquamque illarum strictissima acceptione tenere posse, cumprimis vero, & magis in proprii nomine venit, quando, quod in æquidistanti est extrorsum sit spinæ protruberantia, qua de etiam in præsentiarum ægæus potissimum, ita tamen ut reliquarum hæc ipsa sit velut quædam norma, juxta quam illis opem ferre queamus.

Si synonymiam spectemus, variis hic affectus gaudet nominibus. Dicitur enim Græcis, præter dicta, *κύρσις*, *κύρσις*, *κύρσις*, *κύρσις*, *κύρσις*. Latinis gibbus, gibber, gibbositas, gibberositas, & qui hoc affectu laborant, vocantur gibbi vel gibberosii. Germanis *der hokerode der puckerl*. Et hæc de definitione nominali. Plura hæc de re scire si quis desiderat, Philologorum consulat oracula. Nos hæc vice de nomine non ulterius solliciti, progressum facimus sine ambagibus ad ipsam definitionem realem.

Jam investigavimus Gibberis nomen, ejus denique nominis significationem examinavimus nunc ipsam quoque ejusdem definitionem producamus.

Definitur autem gibber, quod sit eminentia præter naturam, in dorso cumprimis, vel thorace, cum deformitate & motus impedimentis, sine febre, dependens a spinæ dorsali luxatione vel contorsione.

Genus est eminentia seu tumor, in hoc enim gibberis essentia & formalis ratio consistit, ut sensu teste, id deprehendatur, in omni proprie dicto gibbo esse extuberantiam, etiam quando cavitatem extrinsecus videatur exhibere. Omne siquidem convexum corpus sua gaudet cavitate.

Qui vero per contorsionem spinæ morbum hunc definiunt, causalem definitionem offerunt neque nobis hinc contrariantur. Præter hinc vitium esse structuræ tum in conformatione, quoad figuram, quandoquidem quæ recta vel recta figura debet esse spina dorsalis, & in longum magis excurrere incurvatur, & actionem naturalem in motu laedit, ac symptomatum diversorum causa existit; tum in compositione, situ & connexionione mutata.

Differentiam specificam constituunt reliqua definitionis verba, ut facile patet, quod nimirum tumorem ob partes solidas sede suo dimotas. Ut enim ossa loco, suo excidentia partes ad quod contorquentur, intumescere faciunt, illo vero loco, ubi excident, cavitatem efformant, quod luxationis nomine in scholis Medicis venit; ita ad hujus latitudinem etiam gibbus pertinet, & simili contento solido est conspicuus.

Limitatum id speciatim fuit ad dorsum & thoracem, tanquam partes ad hunc affectum recipiendum quam maxime convenientes. Reliquæ enim partes corporis, præter dorsum, non facile & ferre in totum non sustinent gibbum,

ut mox dicemus pluribus. Limitatum etiam ab adjuuctis velut individuis comitibus primariis, deformitate & motus impedimentis, alii quoque verbis, ut in conjunctione spectatis facili oritur distinctio ab aliis tumorum generibus in dorso eventibus, siquidem partibus ejus musculosis, seu mollibus in genere, affectis enormes, & pe tumores, imo nonnunquam leucorrhoeos quoque & rebelles, ibidem oriri & gestari experientia rerum magistra loquitur.

Sede morbi prius bene perspecta atque perpenſa, felicius hinc in ejus notitiam & curationem pervenire quemque posse, movet Celsus l. 4. de re medic. c. 1. Cujus monitum ut nos quoque sequamur, in gibberis subjunctum seu partem affectam jam inquiremus.

Subiectum Principale gibberis sunt vertebrae spinæ dorsalis enim præcipue affici sensu & ratione patet; Adæquatum vero continentur vicinæ & connexæ cum istis partes ossæ alia thorax, sternum, costæ, scapulae. Neque enim nisi gradibus læsionis & speciali loco different tumores circa scapulas, dorsum, humeros gibbosi. Remotius subiectum est totum corpus. Unde ossium horum consideratio, quomodo affici possint, ultimum ad investigationem causarum peritiorum faciet.

Certum enim est, effectum generale Hippocraticum, præcipue huic parti conveniens, id est ossium natura c. 7. t. 1. & 2. (qui de venis in edit. Linden. inscribitur) *τὴν ἰστίαν τὴν ἀπὸ τοῦ σπινῆρος* & *ἐκ τῆς σπινῆρος*, ossa corpori stabilitatem, & rectitudinem, ac formam exhibere, nervos flexionem & contractionem ac extensionem.

2. Constat vero per Anatonem, spinam non uno osse continuo gaudere, sed pluribus, quæ spondyli sive vertebrae audiunt, a vertendo dictæ, quod harum beneficio spina in omnia motus genera aptari & verti possit, flectendo corpus antrosum, retrorsum, dextrorsum, sinistrorsum.

3. Vertebrae hæc sibi invicem superponi, foveantes in centro suo medullam a cerebro prolongatam, ut velut columna quædam sit, mobilis tamen, ut & conjunctis is corporis sustinere moles queat, & iidem conjunctim & æqualiter inflexis & curvatis motus peragi.

4. Ipsam spinam secundum longitudinem rectam, rectobliquam, & in quatuor velut sectiones exporrectam esse: collum, dorsum, lumbos & os sacrum. Ex his vero dorsum vertebrae, quod antica parte thoracem constituit, frequenter, hinc lumbi afficiuntur cumprimis, & gibbum pariont.

5. Ut motus fluxionis & extensionis possit contigi, *καὶ ἡ σπονδυλὸς οὗτος σπονδυλῷ*, copulari sibi invicem vertebrae per *σπονδυλῶν* & motum conspicuum edere; circumfusas cartilagine insigni utriusque extremis, quibus se excipiunt; connexas præter *σπονδυλῶν* nexu firmissimo per ligamenta & vincula crassa valida ac dura, implicari processibus, & præcipue vinculum membranæ validis intextum universam spinam extrinsecus obvolvere, a quo robur & firmitudinem aquirunt. Connexæ sunt vertebrae (ut loquamur cum illis, Rollincio differt. anat. l. 2. c. 35. p. 378.) dura extrinsecus membrana; intus vero ligamento membranosa, duro & robusto, a summa cervicis vertebra ad os sacrum producto. Elegans connexio.

xionis huius exemplum per speciale membrum, nunc vinculum, a suprema contiguatione spinæ protensum, curiosa speculatione videri potest in haleribus, modo certa *κατασκευα* adhibeatur, ut a caribus sepe statim, oculis pateat, ad cuius flexione, & spinæ cratem curvari oportet. Id vero non nisi in coctis apparet. Neque obstat, non perfectum attribueri alios ossibus hisce *κατασκευα*, quod non fiat hoc loco mutua duorum ossium intertio, sed moveri potius eadem per *κατασκευα*. Sufficit enim, concedendum omnino esse motum quendam & articulationem, ac eundem in finem & vertebrae sibi invicem inquebe te, sicut aptas, & articulari eandem apophyses ascendentes & descendentes inter se.

6. Speciatim etiam vertebrae dorſi, siue thoracicas, costas excipere, firmare, & hinc inde ad vicinas partes nervos emittere, ubi vis annexas intertentibus musculis.

Qua viscera speciant, vertebrae rotundas esse cum substantia tenera magis & rata, extorsura vero processibus eminere, per *κατασκευα* connexis, & aequali positi ut rectitudinem proportionati serventibus. De quibus evolvi præter alios possunt. *Archangel. Peccohom. præf. Anat. l. 8. lect. 8. p. 367. seqq. de junc. l. c. 7. & 37.*

Ex hisce, ut alias mittamus, clarum esse potest, illi principaliter morbum esse assignandum, ubi laqueo contingit & consequens vitiosa conformatio. Fitque id ipsum modo per essentiam, proprio & domestico vitio, quod frequentius est modo per consensum aliunde morbo inducto, ita tamen, ut successu temporis essentialis labe fiat.

Ut ut vero sint, qui subiectum hoc latius extendere velint, & præter spinam dorsalem gibbum pati etiam alias partes extra hoc clima medium uti Severinus l. de recond. abscess. n. t. manus & pedes quoque huc refert, cum hæ partes æque distorqueri queant, ad huc tunc exemplum in adolescente, quod videri potest l. c. p. m. 342. Proprie tamen loquendo reliquæ dictæ partes corporis sublimere quidem possunt luxationem perfectam vel imperfectam, curvitatē, eminentiam, at gibbum non item, aliam ergo solum conpetit spinæ & præcipue quidem, quoad dorsum frequentissime, cum annexis thoraci partibus, hinc & lumbos.

Cum itaque plurimum referat causam nosse, & in morbis his conformationis ad oculum pateat, non cognitam eandem nec auferri posse, merito ad huius inquisitionem provehimur.

Causa immediata est vertebrae spinæ dorſalis luxatio, laxatio, subluxatio vel *απορρι* distorsio, seu contortio nominata Hippocrati l. de art. c. 4. l. c. ut *κατασκευα* *κατασκευα* Galeno l. 4. de loc. aff. c. 1. quibus innuitur articulationem eandem esse laxam, *κατασκευα* *κατασκευα* & *κατασκευα* non pristino naturali deprehendi in statu, sed vel laxata vincula, quod in *κατασκευα* potissimum visum, vel luxatos penitus verticales. Hisce enim luxatis & non in tunc repositis, statim aliqua eminentia, aliqua protuberantia conspicitur.

Notari vero meretur, luxationem hic accipi paulo latius non pro dislocatione omnino perfectā, violenta, & simul ac semel contingente, quæ maiorem vim causarum externarum requirit, & si vera sit ob spinalis medullæ compressionem, prævia communiter paralyſis nervos inde accipientium partium, & aliis symptoma-

tibus, ut plurimum lethalis esse consuevit, vel alia facie saltem visenda; quæ de videri potest Celsus l. 8. c. 14. p. 580. sed in perfecta, minus respuere violenta, & successiva; unde & sede sua semel sensimque dimotis verticulus nutritiva & auxilii vis a matre suo aberrat.

Causarum Mediatorum Proximiorum vicem sublimet quæcunque *κατασκευα* trahere vel distendere nervosa corpora vitæbrarum possunt, quas commode in externis & internis dividere licet. Internæ, quoad elenctum, sunt vel vaporosæ, vel hum. proſæ. Vapores quidem concurrunt, quod videantur debiliores ex oranie suo dimovendis vertebrae; si tamen impetum horum respiciamus, etiam suo loco aliquid contere poterunt, exemplo illorum, qui iuxta 6. aphor. 46. ex tussi & asthma gibboni dunt, quatenus coactiva expansione thoracis in auxilia illa respiratione etiam vertebrae in dispositis extorsum coguntur cedere. Successive impressa debilitatis nota, licet magis videatur loqui aphorismis de asthma & tussi, tubercula latitencia conitante.

Hinc si retento anhelitu comprimatur abdomen, tunc manifestus huius rei sensus in dorſo se exerit.

Humores vero potissimum absolunt paginam si peccant, quoad essentiam, serosi cum primis luxare & laxare præ reliquis apti nati. Quoad elendi modum vero considerati, si delinquant quantitate, qualitate, & motu.

Quantitate, partim in excessu, tum primario interea, tum secundario & dispositive, facili tantes dimotionem illam, si male *κατασκευα* dispositi, si humores in articulis & junctis acerventur, qui articulationis ipsius ligamenta primum n. defaciunt, deinde laxiora reddunt & tandem ob opiam os ipsum e sede sua protrudunt; partim in defectu si sufficiens humiditas desit, ipsæque ligamenta velut magis nuda, minusque investita partibus carnosæ & adiposæ contractioni facilius ascendant.

Qualitate peccant, si vel alimentarem l. n. dam, rosicidam oleosam deponant naturæ, & acidis vel alcalinis partibus se teant, unde aridius corpus constringit, & tenebrius, vel ichoreſcant, concepta facili labe ab extravasatione vel *κατασκευα*.

Maxime ergo accusandus venit eorundem motus, tum generationis, tum localis Generantur sæpe in parte affecta ipsa per *κατασκευα* seu congestionem paulatim, inductam ob debilitatem naturam vel acquisitam, ob interperiem humidiorē, vel errores externos, unde non legitime nutriuntur partes teneræ, molles, cartilaginosa, nec debitum acquirere possunt consistentiam.

Idque ut paulatim magis sit, ita majori *κατασκευα* & impetu, si extra locum affectum generati vitiosi humores, seu latex viciatus ad spinalem medullam ejusque vertebrae per *κατασκευα* appellat, unde considerabimus partem mandantem, recipientem, vias & modum.

Partis mandantis vicem obtinet totum aliquando corpus, ob cacochymiam serosam, acetosam, nervisq; & ossibus minus benignam, unde ut ex hoc fonte feri vitiat *κατασκευα* sæpe conſurgit; ita speciatim quoque hæc gibbum conjunctum frequenter habet. Plethorici vero minus vident gibbosos

gibbosos, quod in iis totosiores musculi minus laxationibus sint obnexii. Interdum viscerum *ver-*
gym concurrunt particulares, ventriculi, hepa-
 tis, lienis, cerebri, depuratione & cohobatione
 sanguinis minus rite peracta, unde promptus la-
 ticus decubitus, & spiritus animales minus vege-
 ti in nervis decurrunt.

Pars recipiens est spina dorsalis, sustinendo
 corpori dicata. Cum ergo pars hæc sit spermati-
 ca, a sero incrementum sibi capiens, mollis natu-
 ra sua & frigidior, adeoque ibi jam tum glutino-
 sus humor existat, si huic ipsi alius & quidem in
 excessu peccans superveniat, haud difficilem
 vitium & tuberculum aliquod excitari potest.

Vix sunt arteriæ advehendo, venæ & vasa
 lymphatica non recipiendo superfluum.

Modus sit *αἰσθητός*. Pellit continuo spi-
 tuosi sanguinis & succedentium sibi undarum im-
 petus; obice ergo posito, sive concepto calore
 pori magis rarefiant, seu dolore velut spina in-
 gatur *εἰς*; prompta est, verbo, circulatione san-
 guinis vel lymphæ impedita, hoc vel illo speciali
 loco, promptus affluxus & *ἐκστασις* confurgit,
 huiusque hinc affectus, tubercula seu abscessus. Sa-
 ne summi Medicorum proceres Hippocrates &
 Galenus, binas has præcipuas & unas fere cau-
 sas gibberis laudant, quas verbis Galeni profe-
 remus ex 6. aph. comm. 1.6. *αἰσθητός* *παχὺς*, inquit, *ὅτι αἰ-*
εἰς *τὴν πλάκην*, *ἡ ὑπερτροφία*, *ὡς αἰσθητός* *ἔστι* *τὴν φύσιν*
οὐλοῦν *συνεχῶς* *ἢ τῶν ὀστέων* *χρῆμα*. Gibbositas spinæ
 fit aliquando propter ictum aut casum, fit etiam
 propter quædam tubercula dura, quæ in parte an-
 teriore consistunt. Et paulo post asserit, omnes
 qui sponte seu citra externam aliquam causam,
 sine ictu vel casu, gibbosi fiunt, propter dura &
 concoqui difficilia tubercula tales fieri, *ἡνίκα φύσιν*
ἐκτασθεὶς ἢ ὑπερτροφία τοῦ σώματος *χρῆμα*. Quæ ipsa mens
 quoque est uno verba eadem, divini senis lib. de
 artic. c. 37. t. 11 nisi quod *αἰσθητός* loco *δυσπαιστὶς* me-
 minit, additque plerisque propter tales *συστάσεις*
 collectiones, morbum fieri.

Quomodo vero à tuberculis hæc tractio, ten-
 sio & consequenter contorsio vertebrarum fit,
 indeque modo introrsum, si una saltem parte re-
 sideant, modo extrorsum, si utrinque, modo late-
 rosus vertebrarum exturbatio contingat, plu-
 ribus l. c. ir l. 4. c. 3. de loc. aff. & comm. 3. l. de artic. a.
 Galenus explanat elegantissime, ibidem videan-
 dus. Suffecerit nobis, exemplo tumorum extrin-
 secus oculis occurrentium idem concipi & illu-
 strari posse. Const. enim v. g. in colli tumoribus
 inflammatoriis, ea, qua residet malum parte, ten-
 sione fibrarum inæquali & laterali magis inflecti
 caput & curvari velut ad latus, & si in oppositum
 reclinetur, dolorem mirum quantum augeri, quod
 hoc pacto major fiat tensio & consequenter do-
 lor; ab æquali vero & majori in oppositum magis
 verti. Eadem ratio est, si tumor in inguine conse-
 derit, aliisque locis, ubi flexura imprimis opus est
 Tacemus exemplum mechanicum corporum fle-
 xibilitatem, bacillorum recentium, & calanorum
 scriptorum, itidem Galeno & ex eo Severino
 laudatum. Ut in aliis quoque luxationum gene-
 ribus, quando tendines & ligamenta extendun-
 tur nimis laxantur, flaccidiora evadunt & hinc
 dimittunt ex acetabulo suo ossa; ita & in affectu
 hoc nostro plurimum ipsi ligamentorum & ner-
 vorum vitio adscribendum est. Facta horum ten-

sione, necessum est vertebrae etiam una nunc dox-
 trorsum nunc sinistrorsum, alias introrsum rapi-
 sicque sua sede dimoveri & luxari. Et hac ratione
 tubercula quicquid præstant, quod non exiguum
 sed plurimum est, præstant vitium affricando
 illis corporibus, quibus vertebrae alligantur.

Hinc cum molem superpositam ferre non su-
 stineant vertebrae, non firmatae nec ferruminate,
 ut prius, sensim fatiscunt, cedunt, & anomalias
 in figura patiuntur, dimotæ magisque e loco suo.
 Pro varietate ergo loci, ex quo dicto modo li-
 gamentis & vertebrae dislocationis intentatur
 vitium, etiam modo hic, modo illic, idque ite-
 rum varie, conspicuum conestatur malum con-
 soctarium. Confer *Μ. γυν. lib. de rachit. pag. 124.*

Præter internas has proximiores etiam causa
 externa consideranda venit, cuius vicem obire
 potest omne illud, quod corpus grave durum-
 que quatit, alid e, percutit, qualia sunt ictus,
 casus violentus in scapulas vel coxas, nimirum com-
 pressionem, inflexionem nimiam & si niles causæ violentæ,
ἢ ὑπερτροφία αἰσθητός *ἡνίκα φύσιν ἐκτασθεὶς ἢ ὑπερτροφία τοῦ σώματος* *χρῆμα*. Gibbositates
 ex causis contingentes plerique hinc, si aut in
 collas immaturæ impingat, aut in humores
 cadat, inquit Celsus l. c. 45. t. 2. Quo pertinet, e-
 tiam nutrimenti imprudentia, quando infantes
 facilius nimis arte aut inæqualiter constringunt,
 (quod Hildanus in multis observavit, ob stric-
 tiorem scilicet involuptionem gibbum infantibus
 frequenter accedere: siquidem ossa adhuc ten-
 ra, mollia, ceræ quasi & carti aginosa facile re-
 torquentur, extraque sedem naturalem reprimuntur,
 quæ dein paulatim excrefcuntia indur-
 rescunt) aut in brachiis gestant prius, quam spi-
 na tam tinnata est, ut erecti sedere possint; ut si
 dum infantes e cunis elevant, dorsum manus al-
 tera non fulciunt. Huc referenda est & vestimen-
 torum nimia constrictio & angustia, dum puellæ
 Italiae matres junceo corpore esse studeant,
 tenella enim ista ætate mollia nimium & nu-
 cola spinæ dorsali ligamenta cum recto & con-
 stanti casu continere nequeunt, sed sequacia
 nimium ejus vertebrae in anteriorem, exte-
 riorem aut lateralem partem proruere & projicere
 se facile permittunt.

Est & ex causis externis memoranda con-
 suetudo, corpus quoque versum inflectendi,
 atque inflexum contuendi. Quænam admo-
 dum enim virgultis & viridibus lignis pon-
 dere pressis, assidueque contortis; ita &
 dorso nostri corporis curvitas accidit sub
 opificijs diversarum artium & sub institutis vi-
 tæ diversis. Ad hanc consuetudinem referendas
 videtur & indecorus juveniliū & mollium ad-
 huc corporum situs & positus in stando, am-
 bulando, saltando, gesticulando, aut simile
 quid agendo, de quibus omnibus plura legi-
 merentur apud *Severin. l. c. c. 3. p. 327.*

Prædictis causarum generibus obstetrican-
 tur tum *παλαιά* seu antecedentes, tum
καινὰ seu occasionales, quas sub natu-
 ralium, non naturalium & præternaturalium no-
 tione complectemur.

Ex Naturalium causarum censu est dispo-
 sitio corporum, si non hæreditaria, tamen
 individualis, qua alii præ aliis procliviores
 sunt ad hujus mali fomitem recipiendum, nam

omnes agens requirit patiens dispositum ad agentis energiam recipiendam.

Quoad Dispositionem Hereditariam, licet gibbus non sit morbus æque seminalis proprie sic dictus, nihilominus tamen multum ad illum producendum conferre valet vitiosa in utero conformatio. Hæc autem facile contingere potest ibidem vel interno humorum vitio a matre traductorum, tum quoque, ut colligere non ineptum aliquando est, ex situ tortus nutato, & exantlatis gravioribus in partu angustis, præcipue in primiparis. Hinc recte Helmont. libro Retenta inscripto p. 497. Ad continentis morbos, ait, spectant quoque spontaneæ excrecentiæ, gibbositates, luxationes & exarthroses; Quæ quia in ætam roboris inæqualitatem sequuntur, semini parentum plerumque vel nutricum defectibus acceptum ferunt.

Temperamentum frigidum & humidum, ut & frigidum & siccum maxime ad hanc proclives reddit labem. Nec solum totius temperamentum corporis, sed etiam & quidem præcipue reliquorum corporis nostri viscerum attendendum venit. Ventriculus si non recte dispositus, non recte concoquit cibum sed corrumpit, ex quo haud laudabilis fit sanguis, sed cruditatibus cumulatur corpus, quod vitium coctionis primæ non corrigitur in secunda, multo minus in tertia. Cor si non bene sese habet, non bonus elaboratur sanguis, & mala fit nutritio, cor enim est primaria sanguis officina.

Ætas unice huc facit & præ aliis quadrat infancilis & puerilis; a. 26. Illa quidem, quando considerare incipiunt, vitio frequentius patitur, hinc & ætate quale exemplum xvii. mensium infantis recenset Theodos. ep. 42. p. 250. & similia in praxi sæpe occurrunt, hæc quando jam ambulare coeperunt, anno cum primis quarto, quinto & sequentibus, donec ex ephebis excesserint. Rarius paulo ultra septimum annum provecti gibbosi, ab interna maxime causa, redditi obervantur, vel saltem quo serius malum hinc impetitur corpus, eo minus incrementum vitiat.

In primis vero id fit, si accedat habitus corporis gracilior & textura tenerior ac serosior, unde spina debilior, ex cartilaginibus magis quam ossibus adhuc constans, pro sustentanda capitis mole fulcrum minus firmum præbet, prompteq; si præsertim ictus vel casus superveniat graviori oneri cedit, & rectitudinem suam non sine insigni costarum sternique contorsione amittit. Hinc Hippocr. lib. de articul. c. 6. carnosus minus contingere luxationes, scribit, & si fiant, difficilius restitui, contrarium vero *λεπνότερον & αἰσχροπύρον* tenuioribus & magis ex carnibus accidere.

Juvenilis vero, crescendi terminum supergressa, ut & media consistens ætas libera ab hoc malo fere est, nec hujus insultum facile experiri cogitur, si quidem de gibbositate proprie dicta sermo sit. Talis enim incurvatio æqualis magis etiam in ætate senili & decrepita visitur, seu quod vires sint debiliores, unde imbecillitas corporis in genere multum huc confert, seu nimis exsiccata vincula & contracta, unde minus onus corporis sustinere norunt, quin spina noceat & incurvetur; hæc autem imbecillitas fit partim ex copia pravorum humorum, partim ex penuria succi alimentarii. Sin illud accadat, id magis extraordinarie & à causa graviore fieri putandum est, u-

ti exemplum de coquo recenset lib. 5. epidem. c. 22. §. 4. Hippocr. 1. de quo interius agemus m. x.

Quoad sexum, apprehendit hoc malum frequentius feminas, & quidem magis urbanas præ rusticis, quam viros, femine enim majorem præ viris habent molliem, tæneritudinem & serositatem sive feminæ serosiores sunt viris, unde ipsarum corpora deprehenduntur laxiora, & citius adolescunt quam viri.

Nec causæ non naturales suis delinuntur viribus penitus ad gibbositatem juvandam & producendam.

Aer qui inevitabile & perpetuum corporis velut integumentum est, crebris suis mutationibus cum partium aëni, tum ventorum vaporumque putridorum admixtionum respectu, in alterando saltem sero maximam est vim, idque tanto magis, quanto corpora sunt teneriora. Sic frigidus & humidus huc facit, quatenus colorem nativum obtundit, humoresque in corpore auget. Calidior vero æstivus, ob exsiccationem majorem.

Cibus & potus si peccent substantia, quantitate & qualitate multum ad hujus effectus conferre queunt. Sic commune puerorum vitium *adipositas* corpus vitiosis replere succis apta nata est in ipso si assumantur, quæ minus laudabile præbent nutrimentum, sed tantum generant præavos humores, ut sunt lacticia, piscium largiores, fructus quoque nimis frigidi & humidi, ut ceræ, pruna cærea, melones, cucumeres, nongi & similia terra ulcera aliæque putant cumulantia. Tacenus aquas crudiores, nivolas, uis suo continuato multum conferentes. Cervisia minus defecata ex aquis palustribus & putridis cocta nec lupulo bene condita usus huc facit, vini item intempestivus usus tenellis corporibus infantum summe nocet, eferendo humores & exsiccando nimis.

Motus summa vis est ad distorquenda ossa tenella, quocunque demum modo excedat, sive tendatur nimis corpus, seu contrahatur, seu tensum & contractum teneatur, unde ligam. & articulorum facile fatiscunt, & ex ordine distorventur.

Nec quies omnino culpa vacat, cum videamus etiam adultos sedendo & incurvendo dorsum hinc positum corporis obliquum reportare. Multo magis in infantibus id valet, quando cæco corpore superiori in trature desidere coguntur, plusque ipsis, ut solet, virium tribuitur, quam sustinere corpus queat.

Par ratio est somni & vigiliarum in accumulandis vel dissipandis humoribus. Excreta & retenta magni etiam sunt momenti non solum quando crassiora excrementa per alvum & urinam reddenda restitant, unde vitiosi humores cumulantur, & exinde semina pro morbo hoc excludendo sparguntur in reliquum corpus; verum etiam & potissimum tenuia per habitum corporis exhalari solita. Hinc retentis humoribus & transpiratione prohibita facillime febres & tubercula interna nasci solent. Sin nimis sudoribus fatigentur succosa corpora & depauperetur serum alimentarium ultra sphæram ætatis, tum nutrimenti tum augmenti defectus oboriuntur necessario.

Tandem Animi Pathemata ad hunc affectum producendum sua etiam non carent virtute, quo loco saltem memorabimus iram, si, contra Apollon-

li monitum, irriterentur ad excandescendum infantes & pueri, atque inde in inconditos ploratus, cum pectoris singultuosa quasi confusione, adigantur, facile noxa ad osium & ligamentorum itumorem redundante.

Nec causa Præternaturalis silentio sunt prætereunda. Intemperies & humida & sicca hic occurrit accusanda; illa quatenus ligamenta vertebrarum laxat, distendit & tandem e suo loco dimovet; hæc quatenus ariditate vincula vertebrarum spinæ in anteriora protrahuntur, sicut in ardente potissimum febre visitur.

Pertinet hæc exemplum ab Hippocrate visum l. c. τὸ μακρὸν, μακρὸν, ὅτι ἀναστὰς τὸ ὑψόμενον οὐ φωνάζει. Coquo in ipia gibbositas tacta est ex parentide.

Quod angina ad gibbum facere possit, legi meretur Celsus l. 2. epid. l. 2. c. 66. seqq. quod dolores, item l. de artic. c. 45. r. 1. Gibbositatem ex longo ventris dolore observavit epiph. Ferdinand. hist. 84. p. 279. seu ob conjunctam frequentem, longam & diuturnam ventris compressionem, & consequentem vertebrarum dislocationem, sive decubitus humorum ad spinam, uti notum est *epiph.* alias ex colica non raro oboriri, & tanto quidem magis, quia tumore hoc apparente dolore evanuit.

A palpitatione cordis costas e suo loco motas esse posternelium l. 5. pathol. c. 12. observavit Horitius l. 3. ob l. 17. p. 139.

Ex dysenteria prægressa gibbum factum in puella quinque annorum notavit D. D. Praeses, ubi gravissimo malo succis vitalibus depauperatis cutis vix ossibus hæsit, & hinc vertebra ex sede sua sentim excreverunt. De aliis externis injuriis jam satis diximus superius, hæc vero frequentissima sunt causa.

Si Res Supernaturales addere lubeat, certum est, per venenicia quoque & incantationes ut contracturas & convulsiones horrendas, ita quoque gibbos oboriri posse. Neque opus fuerit immediato damno, satis est per diabolicas artes casus, iculque in partes ossis hæc & consequenter gibbum concitari posse. Alias vero opere Diaboli in *miraculis* talia contingere luxurionum stupenda exempla notum est, & tale refert *Hildanus Centur. 5. observat. 68. pag. 458.*

Cognitis nunc causis, differentias ut proponamus, ordo postulat. Præter differentias itaque gibberis essentielles, quas repetere denuo non opus est, alias quoque considerare operæ præstium fuerit, quandoquidem hæc & diagnosi & prognosi, adeoque ipsam quoque curationem limitant & modificant.

Ratione Generis, alius gibbus est major, alius minor, unde & minor vel major deformitas; alius in acutum magis, alius in orbem magis versis vertebris.

Refertur hæc, & nominatum ad *cervicem*, etiam à Sennerto l. 1. p. 2. prax. c. 21. p. 294. affectus, quem Germani *das Gehbun* appellant, a tensione membrarum & ligamentorum circa vertebrae itidem ordus.

Ratione subjecti, gibbus alius est in cervice, alius in thorace; alius supra, alius infra septum; alius in lumbis. Quemadmodum enim vertebrae sunt inter se distinctæ pro vario situ, quem in spinæ obtinent, ita gibbositas, quæ vertebrarum spinæ vitium est, quoque variat, pro eadem in-

ducta læsione, unde & diversitas symptomatum, quæ lingua tecum invehunt.

Ratione Causarum tot sunt differentia, quot causa, ex recentitis petenda. Alius ut a causa interna alius ab externa; alius a repletionem, alius ab inanitione; alius ex intemperie frigida & humida, alius ex intemperie calida & sic. a. Alius ab humorum influxu citiori, & in inflammationem; alius a congelatione; alius cum fractura, cum picere, alius sine his.

His omnibus in ipsis, advertimus vertebrae rarissime, exterius frequentissime, ad latus vero frequentia obliquari.

Si ullis in morbis diagnosi opus est, sane in gibbositas quam maxime id valet; deoque & hic quæ cor verba sunt, solus is, qui ignorantium horum cognitionem habuerit, hæc curationem aggreditur.

Duplicia vero signa Diagnostica sunt ratione Generis alia imminuentis, alia præsentis. Inacuta incipientis gibbositas, verba sunt Rolandi. epit. affect. part. 1. 4. c. 2. p. 39. adeo intereum latent musculosis in spinis occurrunt, ut etiam peritos fugiant. Augescens omnium exposita est oculis. Illa vero metue oportet, quæ nunc ex jam dicendis minori gradule *phosphora* exhibebant.

Spectabimus ergo ordine fontes confectos, ut demonstrative hinc concludere liceat, gibbum adesse, vel non.

Ex Essentialiter inherentibus, quæ quidem hoc in casu ipsos in sensus incidunt, viximus adhuc in situ, in figura, & rectitudine, cum magnitudine aucta, quoad locum affectum, ita ut non in arcum in navi decurrat *ipsum* ac *per se* præbeat spina dorsalis, sed nunc exprogetur ante & retro vertebrae, ut in gibbere proprii. dictomodo velut excavato dorso intro spectent, ut in *apertum* modo linuatur in latys, modo vixinis in modum incutitur unguis, ut in reliquis speciebus. Juxta vero reliquæ quoque partes figuram vitiatam exhibent, humum magis acuminatur, scapulae, colæ magis protuberant, prout varia præcessit læsio, c. put thoraci arctius insidet, breviori collo.

Ex Essentialiter consequentibus symptomata gibbum patefaciunt v. in generis; in acutiori v. lætis animalibus cumprimis motus immutatio evidens sit. Neque enim *ipsum* luctu sensu possunt, stare diu nequeunt, neque sedere, nisi corpus vel mentum suscipiat manu, donec confirmato vitio aliud consuetudo & dulcor acas induxerint. Inflexi dorum reuult versus interiora, ut si terram contingere manu velint demissis poplitebus id facere cogantur. In sternutando molestiam sentiunt, magis ob angustiam concussis partibus. In vitalibus pulsus celerior, respiratio difficilis, defluxiones frequentes, alihna & cussis succedunt, idque tanto magis angustatur spatium thoracis, & vice versa. Cum enim in thorace cor & pulmo residerent, horum actiones potissimum lædi necessum est. Variant ergo hæc ratione loci, seu partis affectæ specialis, si enim infra septum transversum n. alium contingat, minus hæc observantur. In naturalibus actionibus nutritio & actio naturæ quantum fatiscunt corporis succedit macies & incrementi penuria, ut ad solitam proceritatem non extendatur corpus æqualiter, neque incrementum sumant una carnes

Haurire hæc ex fontibus Hippocraticis operæ pretium est, ex quibus quippe alii fere hæc sua fecere. Quibus inquit divinus senex, gibba sit spina, du pueri sunt, prius, quam corpus ad augmentum plenum perfectum fuerit, his corpus juxta spinam *ἐκφυλάττει* coangeri non amat, sed crura quidem ac manus perficiuntur, illæ vero partes defectuosiores sunt. Et quibus supra septimum transversum gibbositas est, his & costæ in amplitudine augeri non solent, sed in anteriorem partem, & pectus acutum fit, sed non latum ipsique & difficulter spirant & stridulam faucium asperitatem habent l. de artic. cap. 37. t. 4. seqq. Caulis maciei porissimum debentur cum rectitudini vitiatæ, unde in latum magis quam in longum fit extensio; tum sero nutriti magis rarefacto. Aliæ videri possunt apud *Helm. l. v. a. brevis p. 388. Barthol. de l. a. thorac. c. 14. p. 107.*

Notatu dignum vero est & hoc phenomenon peculiare in gibbosis, quoad thoracem occurrens, quod nempe abdomen superiori parte circa epigastrium contrahatur, & cincturam quasi patiatur, durante expirationis actu, quod sine dubio contingit ob diaphragmatis vitiatum una situm & tractionem. Constat enim per Anatomen, testante Galeno l. 4. de loc. aff. c. 3. septi transversi nervos sub quartâ vertebra emergere. His igitur patientibus necessario motus hujus, uti decet, expediri non potest, sed magis versus superiora trahitur, unde non sola angustationis culpa libera spiratio impeditur, verum etiam plurimum, ut ad respirationem alias, confert diaphragmatis consensus hic, ut & musculorum pectoralium & intercostalium ipsorum.

Quandoque & paralysis succedit, sed rarius, quale exemplum notavit D. D. Prales Ann. 2. Ephemer. Germ. observ. 230. p. 333. & Hildan. cent. 5. obs. 7. ea tamen differentia, quod posteriori casu dolor & affluxus præcesserint, à cuius decubitu & *μὴ συνίεναι* successit crurum solutio; in priori non item. Licet enim non subitanea æque vertebrarum dislocatio in gibbere fiat, ipsa tamen paulatim hæc & pedetentim facta nonnunquam obstructions pororum nervorum causari potest.

In excretis sæpe tentantur hæmorrhagia narium, quod & angustiori spatio decurrere cogatur sanguis, & ob respirationem difficiliorem moveatur velocius, unde quocunque errore externo, vel aliunde rarefactione majori inducta, prompte stillant nares, illic exitum affectante sanguine.

Causæ Prægressæ quoque patefaciunt affectum, sive externæ, si præcesserit ictus, lapsus, contusio violenta, vel alia injuria evidens; sive internæ, quando nil tale deprehendi potest, dolores, pectoris angustia, febris & similia.

Hæc ipsa etiam ad signa causarum lustranda faciunt. Si læsæ fuerint æqualiter magis vertebræ, quoad *ἀρρυθρίαν*, per quam sibi connectuntur secundum corpora, mediante cartilagine non pauca, fit *κύρσις*, seu incurvatio æqualis; si versus interiora fiat extensio fit *λόφωσις*; si versus exteriora, qua processus, ubi per *σύνφυσιν* fit connexio. fit gibbus, & *ἀνίσταται τὸ ἴσχυος* dicta. Par ratio est costarum, scapularum, versus exteriora protensarum; sin ad alterutrum latus *εὐγλίσσεται*.

Nec Similitudo abludit, sed hæc omnia confirmat magis, sive ægri spina cum alterius sani hominis comparetur, sive ad priorem sanum statum ipsiusmet cogitatione recurratur.

Signa subjecti specialia, ex visu & sensu patent. Si superiori parte malum hæreat, caput humeris contiguum, cervix & collum brevius deprehenduntur, humeri non depressi, sed velut alati; in inferiori non item.

In morbis etiam externis hisce multum interest, ut munimentum tamæ Medici prognosim observetur, ne vel tenerario pronum desperato malo promittatur salus, vel prognostico relinquatur, cui adhuc mederi licuerit.

Eventus prædictionem quod concernit, illa in salutis & mortis, curationis item possibilis vel impossibilis signa concinne dividi potest. Quoad priorem quidem distinguendum meritis & hoc loco est inter luxationem perfectam ac repentinam, quæ à solo casu externo graviore accidere potest; & imperfectam, successivam, propulsoriam. Illa ut vel lethalis est, vel satis gravis; quando scilicet angulosa sit spinalis medullæ luxatio, cum non paulatim sed affatim, perinde ac si frangeretur, pars aliqua curvatur, subjectas partes omnes lædi necesse est, paulatim vero facta luxatione atque in orbem magis, nihil notatu dignum patiuntur partes teste Galeno l. 4. de loc. affect. c. 3. Ita secundario magis huc spectat. In gibbere vero videnda in se lethalis minus est, licet satis molesta, nam juxta Hippocratem l. c. de artic. c. 45. t. 5. spinalis medulla ejusmodi distorsiones facile fert, eo quod circularis ipsi distorsio contingit, non angularis, sive in acutum.

Id ipsum tamen quoque intelligendum est de violenta magis in angularem seu acutam figuram propulsione. Dari enim casus possunt, ubi, citra illam prægressam, id minus periculum infert. Ita serulis teretibus, ligneis, cavis itidem spinam lumborum in acutum gibbum una aut altera vertebra prominentem in infantibus quique, sex, septem mensium, quod sæpe contingit, aliquoties correxit B. Rolsincius l. 4. epis. affect. part. c. 2. p. 381.

Quoad posteriorem, ratione Essentialiter inhaerentium *λόφωσιν* omnium difficillime curatur, imo fere incurabilis est, ob inaccessam opem medicam, ut extrudi possint & exporrigi vertebræ. Post hanc *ἀπὸ* casu non facile etiam cedere consuevit, nisi læsio fuerit levior & recens. *εὐγλίσσεται* vero & *κύρσις* cum primis facilius fere auscultant medicæ arti. Omnibus vero commune est, quod non nisi recenti malo & imminente nondum factò & confirmato, eoque minori & in corpore adhuc molliori, cereo & succulento, ubi flexilis adhuc spina commodius tractari & pro lubitu decenter flecti potest, æque curabile sit malum; sed satis grave, tantoque gravius, quo magis à statu naturali, & *ἀφ' οὗ* naturæ facta est mutatio.

Quo magis itaque æqualis fuerit & pluribus vertebris communis distensio, eo levius & facilius curatu est malum judicandum, & contra In lumbis si extiterit prominentia, facilius curatu est, imo quo magis versus inferiora declinat, eo etiam promptius cedit; quo magis versus superiora pectoris, eo difficilior, tum ob alias causas, tum quod ibidem commodior & con-

constantior fieri potest deligatio & compressio, hic vero minus.

In essentialiter consequentibus, quo facilius fertur malum in respiratione, motu, incremento aliisque; eo etiam mitius est, & contra. Intuitu causarum, si malum fuerit hæreditarium, diu duraverit, & callum jam contraxerit, de speratum est. Ab externa exortus gibbus curationem magis admittit, tanquam magis evidente & obvia; non item ab interna, nisi mature obviam eatur, per discutientia & roborantia.

Quoad tempus eventus, seu longitudinem & brevitatem, variat id ipsum prolationis, peccatoris angustia majori vel minori, adeoque tolerantia & respiratione facili vel difficili. Hinc assertum Hippocraticum 6. aphorism. 46: Qui gibbi ex asthma aut tussi ante pubertatem hunc, moriuntur; non alio quam hoc intuitu videtur intelligendum, quatenus producta sunt hæc duo à tuberculis latitantibus, ut suppurarentur, & in bronchia pulmonum effundantur, unde vel suffocationem, vel phthisin post se trahunt, utramvis vitæ inlidiantem mature, idque ut plurimum. Confer Galenum in comment. Neque opus est, quod Severinus contendit, ut in graeco textu loco & legatur *ἴσθαι*, cum, quod sciamus, unanimis sit illa lectio.

Et sane anni pubertatis de salute & morte in posterum definiunt fere prognosin in gibbosis quandoquidem vel incrementum tunc aliquod capiunt mutatione illa sollemni ætatis, quod eo usque dilatum fuerat, ut hinc ætatem reliquam facilius assequantur; vel sensim ad mortem sit transitus, exacerbatis symptomatibus. Hinc diuturnum est malum gibbus, ad plures annos ductus & *καταστροφικόν*, ita tamen, ut præter dicta, etiam *ἀσθενὲς* & *ὀδυνηρόν*, facile ac sanorum more degant maxime illi, quibus ad carnositatem ac pinguedinem promotum fuerit corpus. Pauci vero talium sexaginta annos superarunt, plerumque brevioris vitæ, teste Coo l. de artic. cap. 38. t. 5.

Quin & omnis quæ sperari potest curatio, si *καὶ* exceperis in parvulis, lento & paulatino fere gressu sit, non cita manu.

Modus eventus ad salutem sit repositione vel perfecta, vel quasi tali, ut saltem tolerabilius sit malum & ad naturalem modum magis pertingens, cavendo hoc ipso, ne nimis excresecat, majoremque deformitatem acquirat. Inferiorem finitam in nonnullis dysenteria & varicibus memorat Hippocrates l. cap. 37. t. 4. Ad mortem suffocatione, asthma, phthisi, omnibus fere pulmonum morbis expositis hisce ægris, nonnunquam & apoplexiâ, quod D.D. Præsidi visum est in juvene, terminari consuevit.

Cum Gibbus ex illorum morborum censu sit ubi natura cedit arti, ejusque opem & auxiliares manes unice exposcit, ad curationem devolvimur. Absolvitur hæc ipsa, ex Medendi Methodi regulis, indicationibus, morbis figuræ & situs aliis communibus, & indicatis seu materiis præsidiorum huic fini aptatis.

Curatoria morbum ipsum respicit per repositionem, adæquationem & complanationem partis affectæ eminentis, ut figura naturali conformis, quantum omnino possibile est, consurgat, quorsum solita illæ luxatorum indicatio-

nes subordinatæ, extensio, repositio, deligatio & collocatio spectant. Ut enim videmus in vegetabilium genere, quæ curvitatem crescendo affectant, facta ad rectos comites deligatione, inflexione blanda vitium corrigi; ita etiam in corpore se res habet. Totum enim & præcipuum artificium curandi gibbi in hoc consistit, ut extuberantia vertebrarum reprimatur retrorsum, seu in locum pristinum, alioquin omnia frustra tentantur.

Præservatoria causas vel internas affluxu suo malum foventes, vel externas, morbum deteriores indies reddentes, removet, & reposita firmare jubet.

Vitalis denique viribus subvenit, & symptomatibus urgentibus, atrophiz, respirationi difficili & aliis occurrat.

Materiæ Præsidiorum ex Chirurgico, Pharmaceutico, & Dietetico fontibus desumuntur.

Maxima spes in Chirurgia sita est, quæ sola suppetias & genuinum juvenem ferre apta est, vel primario saltem, reliquis ministrantibus, tum revera, tum palliative, prout conditio obvenientis mali variat. Cum ergo *ἀσθενὲς*, seu reductione vertebrarum læsarum & contortarum in suum locum, opus sit, triplex etiam hic modus usitatus locum obtinet: palæstrites, methodicus, & organicus, pro apparatu scilicet minori vel majori ita dictus, pro ratione subjectorum, malique majoris vel minoris accommodando.

Primus Palæstrites dictu, præ aliis est *ἀνίγειν*, sola manus Compressione, vel Extensione proprie dicta instituendus. Illa in tubere ipso & in plerisque gibbi speciebus, hæc in vicinis quoque locum habet, in *ἀσθενείᾳ*, item & luxatione recenti leviori & graviori. Extensio hæc, quorsum & conjuncta concussio pertinet, mature facienda, quod unice prodest, in locum reducendis quoquo modo vertebris. Solent id & vulgo frequenter cum successu instituere in quassatione aliquali vertebrarum, de quo consuli potest Sennertus l. c. qui modum vulgi describit, licet ad superstitionem sæpe & accusetur illa & curetur, præsertim in infantibus. Cum vero rarò statim in ipso principio factæ læsionis extrinsecæ advocetur Medicus ubi extensio primario instituenda fuerit; facta jam extuberantia, compressio in ejus locum cedit. *Τὰ δὲ ὅτι ἰσχυρὰ, ἵσταται χεῖρας ἀνταρὰς & ἰσχυρὰς ἰσχυρὰς*, nam ea, quæ extant, ad locum suum redire cogit depressio.

Modus nempe hic est: fota prius parte affecta vel solo vino calefacto, vel cum nervinis mixto, ut cedere facilius & emolliri partes ligamentosæ queant, sinistra manu sterno apposita, dextra, interjecto lintheamine, vel in pugnū conformata sit intrusio, continuo velut semicirculo per motum ejus facto, vel, quod Hippocrates l. c. 45. vult, imposita manus vola supra gibbum, & altera manu insuper alteri superimposita deorsum cogitur, habita ratione loci affecti & status p. n. diversi.

Et hæc coagulatio maxime innoxia & tuta est, cui affinis & altera, cujus meminere etiam laudati medicinz procures, quando insidere vel pede inambulare gibbo jubent, quod tamen minus fere usitatum est. Inde vero empla-

stris unguentis, fotibus subjunctis, & ex fonte pharmaceutico repetendis, deligatio instituitur, quo magis magisque & intro adigatur. tumor, ut decet, & armentur repositæ partes. Tali usus est *Epiphani. Ferdinand. hist. 84. p. 180. 1699.*

Ministrant hinc deligationi fasciæ, splenia & alia, in situ suo detinentia vertebrae affectas, adminiculæ. Et convenit maxime hæc operatio in tenellis & aëis personis, sola, ut fere sufficit in *adultis*, hinc & in reliquis, si cætera consentiant; Præcipue vero in lumbis, ubi fortius comprimere licet. Utiliter adhibetur eadē *exemplum* in scapulæ & alius lateralibus eminentiis, in lateri acuminatione ipsa, redigens in ordinem thoracem.

In cervicis vero gibbere & *anomaliam* extensio magis administranda, quæ ipsa & conjuncta concussio etiam in reliquis in principio statim, recenti adhuc malo, spem restitutionis in integrum facit.

Alter Methodicus modus eidem fini dicatus, sed mediis diversis, locum habet magis pro successiva impulsione. Referemus. huc primo *Ferulas*, quas teretes, cavas seu imbricatas adhibere consultum est, seu ligneas quales l. c. B. Rolincius utiliter adhibuit, seu æneas, quæ in *exemplum* sub axillis commodè gestantur, erigentes corpus & rectum tenentes. Sufficiunt illæ sola cum deligatione in climate lumbari, cui paria faciunt etiam alibi, æque ac ferulæ pro re nata applicandæ, laminæ ferreæ plumbeæ itidem imbricatæ, magnitudinē gibbi conformantæ, aliæque spleniorum in modum compressioni velificantiæ. Sic M. Antoninus Imperator, cum esset longus & senex, adeoque exacta ætate nimiam ob proceritatem incurvesceret, tiliaceis tabulis infasciabatur, ut rectus incederet, quod refert Julius Capitolinus in ejus vita. Vid. etiam Scaliger lib. 1. de plantis p. 286. qui thoracem, ait, tiliaceis assulis illum corrigere solitum, potius quàm aliis, propterea quod calore suo foverent senem. Ipse tamen non tam ob calorem expertam ad Imperatoris fomentum tiliam addit, quam quod mediocris est inter rigiditatem ac lentitudinem. Valet id quoque in *anomaliam* cum primis ipsa.

Deinde in dorsali & thoracis regione eximius est thorax, seu coriaceus uti ex cute humana, præcipue ejus parte crassissima in dorso gestatum costas à gibbo distortas intra limites fidelissime coercere aserit Rolinc. l. c. p. 381. Seu lineus, firmus tamen & ossibus seu fetis balenarum interstinctus, ut firmetur rectitudo & erectum teneatur corpus; seu ferreus quoque, sive postica parte firmandus, si antica compressio magis requiratur, seu antica, si contra. Singuli hi iterum vel minoris vel majoris sunt apparatus, qui posteriores ad tertium magis modum referendi.

Notabile tamen est: 1. thoracem talismodi magis convenire emollitis prius cartilaginibus & ligamentis.

2. Obduci posse commodè corio, & leviores cum sint laminæ, per se gestari, vel quoque, quo leviores sint & perspirabiles magis multis & crebris foraminulis perforatæ, corpori aptæ.

3. Continuandum esse usum thoracis hujus per bene multum tempus, donec umbecillitas

membrorum & mollieties plenarie cessaverint.

4. Pro corporis incrementis & mali remittentis modulo novum fabricari & aptari posse, exactis aliquot mensibus.

5. Constrictione interim probe facta, ad *anomaliam* tamen, & juncto, si opus fuerit pro extensione cervicis, in thorace pollice nonato, capitis elevatorio, gradibus additis, pro majori vel minori intentione vel remissione variandis.

6. Thoraces hi in iis magis usum habent, qui incrementi, adhuc magis tunc compotes, qui enim incrementi sui modum maximam partem acquisiverunt, minus ab iis ipsis quoque juvantur, nisi forsitan, ut fimeretur magis debilior ossium crates, suadendi illi & tunc videantur. Confer Hildan. cent. 5. observ. 6. pag. 458. Paræum l. 22. c. 8. qui thoraces tales depingit, & alios.

Pertinet huc quoque *anomaliam* Fabricii ab Aquapendente, cujus icon antica & postica parte videnda in operibus ejusdem depicta videntur. Consulendus etiam seorsim idem pag. 187. operat. Chirurg.

Porro huc etiam pertinet suspensio artificialis quando firmatum sub axillis corpus, capite sub mento seorsim fasciâ excepto, antisque geminis aptatis manibus, libero in ære libratur agiturve corpus pendulum, una alteraque hora de die, ut hoc pacto pondere suomet extendat & exporrigat curvaturam, id quod non minus, ac reliqua plura, cum primis succedat ex voto quando interius paulo declinat gibbus, non æque quando superiori loco refidat. Meminit hujus etiam Mayo W. l. c. p. 148. Cujus succedaneum est, si capite manibus utriusque prehensio sustollatur corpus per vias.

Tertius denique mechanicus compressionem extensionemque; expertam absolvit, vel intendit potius, scalarum, scamnorum, torcularium comprimentium & laqueorum beneficio, de quibus Hippocrates, Galenus, Oribasius aliique legi possunt. Memorandum hic quoque est instrumentum mechanicum, quo aorigæ utuntur ad attollendas rotas & ponderosiora, cujus mediante impulsu gibbositatem curatam refert River. obs. commun. p. 668.

Geuinum tamen & probe attendendum monitum est Hippocraticum aureo libro de articulis c. 39. t. 1. parum sæpe his effici extensionibus, adde & compressionibus, quin sæpe optimum remedium est, graviore malo & frustra tentatis reliquis, remedio non uti, nisi non per in principio statim adhibeantur, prius quam callo obducto, vel ossibus etiam coalitis, malum desperatum sit. ita luxationem ipsam vertebrarum dorsii introrsum factam hoc modo curatam legere licet Ann. 4. Ephemer. German. obs. 77. p. 64.

Pertinet huc extremum illud spinæ reponendum, in *anomaliam* puta, remedium quod prius incisionibus manu in ventrem injecta perficitur, ex interna parte ad externam in nuda restituitur, quod mirum est Hildanum, tam infirmum Chirurgum, centur. 5. observ. 69. p. 460 admittere & commendare, imo tenacula manus loco adhibere velle, quod lætius ibidem videri potest, cum tamen divinus Senex l. c. c. 41. t. 6. id in mortuo quidem fieri posse, in vivo autem non item, expressis verbis edixerit. Quin visus fuit

sunt aliquando abscessus in dorso ortus, spontaneo naturæ conatu, citra tamen mali ablationem.

Hæc vero proposita hæcenus ut propria quasi sunt parti hic affectæ; ita communia præsidia chirurgica huc arcessi quoque possunt, si eadem indicata ex usu esse videantur, quod tamen rarius paulo fit. Ita venæsectio non habet locum, nisi forsitan lapsu vel actu graviore facto statim in principio ad revulsionem.

Sui affluxu feri major & copiosior ad spinam dorsalem fiat, consentientibus reliquis, cauterium potentiale vel fonticulus admoeri potest, quale exemplum recenset Poterius cent. observ. c. 36. p. 136.

Cum chirurgia ipsa ex fonte pharmaceutico sibi mutuatur remedia, etiam ad gibberis curationem, cum ipsa pharmacia non minimam de suo addit momentum, potissimum si ab interna causa ortum suum trahat, si cacochymia conuncta eundem foveat, si laticis vitium sit extantius, quæ præsidia ordine brevi videbimus.

Ex universali penurientia serosiores & laxiorem habitum corporis, eductis e primis viis quiescentis, & omnino respiciunt, ipsaque pro re nata proprie dicta purgantia. Notum quippe est, non solum optime ferre purgantia infantes, contra ac nonnullis usum esse, verum etiam non minus ac alias ætates admittere, imo opus habere iisdem, & indicare, siquidem ob id præcipuum facile cumulantur recrementa, & corpus infarciendo vitia in nutritione & auctione accerunt. Tacemus mature sese exerere saluum scorbuticorum vel hereditariam labem, unde expurgari possulant corpora nonnunquam & ut præserventur a morbis, & ut facilius curentur gibberis fieris vitia.

Notabile quoniam etiam est, in abscessibus internis latitantibus sæpenumero purgantium ingenium fuisse virtutem observatam. Cavendum solum, ne hypercatharsin patiantur tenella corpora, & hinc exhausto & depauperato nutritio succo nutre occupant corporis sustentacula, partes ossæ, robur omne suum à spina dorsii veluti basi quadam derivantes.

Hunc in finem dari possunt eligenda & individuis aptanda purgantia ex gualapa, mechoacanna alba, manna, rhabarbaro, aloe, sena Alex. & ex præparatis, sic ros. solut. de eich, c. rhab. elect. lenit. resin. scammon aliisque abinde notis.

Præter hæc, ut potiora saltem libemus, plurimum opis situm est in usu Diaphoreticorum. Cum enim hæc ipsa omnem ferri & sanguinis, ubi fierem & factam, dissoluant, affluxum arceant, & circulum humorum vitalium in ordinem redigant, merito suo à Severino li c. c. 4. p. 35. habentur præcipuum & primum ad morbi huius causas aut eximendas & minuendas. Laudari hunc in finem merentur, angim. diaph. C.C. phil. bez. martiale. cachect. ens veneris Boylei, seu flor. sal. armon. vitriol. seu ex terra vitrioli dulci sublimati, M.S. sp. tart. cinet. bez. Exterius verò ænuaria, balnea laconica, tepidaria, thermæ, ad tolerantiam habitus corporis, ætatis, naturæ instituenda.

Par ratio Diureticorum, quæ aperiendi & resolvendi virtute serum superfluum partim imminuunt, partim in ordinem cogunt, ex

succin. alb. ppt. n. agist. oc. cancri arnan. duplic. cujus insignis vis in atrophia, h. obstruptione glandularum meientericarum, si a trahibus abierimus, accurationibus præcæcis dudum notata est; arcano tartari & similibus.

Alterantia specina interna licet non adeo proflent, vel ad gibberis curationem revolvantur; summo tamen jure huc referri possunt & pro his haberi (1.) Resolventia ex lap. eque. autim. diaph. spermi. cer. matr. pect. ppt. pulv. absorbente Wedel. pulv. contr. casum. euc. resilio, scabiosa, cinnabari nativa, quod divinum ad omnia feri stagnantis vitia remedium laudes omnes superat, & aliis. Non tunc causa etiam horum censum subeunt laudata jam diaphoretica & anodina ipsa, ingula cum eademque intentioni debita.

(2.) Aperientia, quorum nomiae complectitur, quæ glandulas intestinales obstruatas referant, amurcam venarum extergunt, humores acetosos saturant, edulcant, absorbent quæ & diuendo temperant, sicuti densi humor debilis. Talia sunt apripis martialia esse quædam, quæ instar omnium sunt, modo innectantia & roborantia in flectione statu magis eliguntur, ut emet. mart. posata, cydonata mart. solar. cum arcano tartari tinctoria, tartari balsamica, Zvelchei, essentia mart. autim. tartar. anima rhabarbari, elixir antiscorbuticum, ut alia antiscorbutica taceamus.

(3.) Nervina & Cephalica, illa præcipue quæ & vincula roborant balsamica virtute, & feri ichorellorentiam & fluxilitatem peregrinam saluam corrigunt, ex chamædr. chamæpit. rosmar. saly. major. Roshad. arab. castor. rad. chin. salsaparilli. essent. succin. liquor. specifi. cephal. canabario, pulv. epil. March. & similibus.

(4.) Traumatica, quæ characterem suum alcalinum vel balsamicum sanguinem melle, & latici præcipue impetunt, ut impedimentis magis in cartilaginosa & oleosa duritiem possit, ut decocta, aquæ & infusa ex plantis vulnerariis, facile cum resolutivis & nervinis miscendis, essent. traumat. Rosh. Wedel. quæ omne absolvit punctum, seu per se, seu cum tinct. bez. elix. pector. essent. succin. anod. prout indicantia variant, miscenda; ut lapides cancr. illorumque infusum vel decoctum cum vino non denuo laudamus.

Inter roborantia hæc (5.) reponi merentur & Pectoralia, tussis, respirationi difficili, phthisi, seu mitigandis, seu præservandis, appropriata, non omnis, quæ calorem hecticum, si quis obrepit, attendunt. Hinc pulv. pector. D.D. Præf. uterque, elix. pector. spec. diamarg. fr. pulv. Haly contra phthisin rec. diss. hic nominari merentur. Quin imò ipsa quoque pinguedo canina recens iusculis non inutiliter inferri potest, ad oleosorem reddendum laticem.

Tandem & alterantia externa seu topica recensenda veniunt, quæ vi traumatica, nervina, enaleptica, emolliente, vel roborante sunt conspicua. Sic feri possunt lotus ex cephalicis & roborantibus cum vino vel sp. vin. infusis & digestis; ex aq. anhaltina, essent. rosmar. castor. ejusque spiritu, sp. sumbric. junip. &c. Unguenta

ex oleo momord. laurino lumbric. lil. alb. ophio-
gloss. euphorb. n. m. petrol. medull. crur. vitul.
sev. hircin. piugu. human. taxi, unguent dialth.
agripp. martiat. nervin. popul. resumptiv. addi-
tis quoque oleis destillatis pro lubitu. Sunt qui
pinguedinem auferis muribus juvenibus pluri-
bus impleri & aſati, pro secreto remedio ha-
bent. Quod tamen præſtat, ſine dubio arceſ-
ſendum eſt ab emolliendi virtute, cum aliis
communi. Compoſitum tale unguentum ad gib-
boſitatem infantum deſcribit Stroberg. ti. de
aſſ. puer. p. 61. Emplaſtra ex cerato citrino,
ſandal. empl. ad fracturas & ruptur. uſit. oxycroc.
emplaſtr. ad gibber. Hildan. deſcripto cent. 5.
obſervat. 67. pag. 418. de rad. althææ, opotel-
doch. Roſſ. &c. additis adſtringentibus, robo-
rantibus & diſcutientibus, pulv. lumbric. terr.
g. tacamah. carann. &c. Tale quoque eſt à Fo-
reſto commendatum l. 29. obſ. 23. in ſchol. p.
814. ſimplicius quidem ex gummi ammon. & la-
dano, pro pueris, & compoſitum magis, ſi
deſideretur.

Ex his vero non difficile fuerit medico ratio-
nali & experto ſeligere pro cauſarum & ſub-
ſtorum diverſitate, quod magis ex uſu putet.
Alia enim ratio eſt ſicciorum, alia laxiorum
vinculorum habenda, unde & emollientia &
odſtringentia, ſed diverſo tempore & reſpectu
proſunt, cujus rei exemplum videri poteſt apud
Ant. Luſi. cen. 5. cur. 47. p. 143.

Feliciorem tandem curationem præſtat vi-
tus ratio, ſeu vivendi regimen, Diæta, quæ
ingenere ita comparata eſſe debet, ut ætatis
& corporis temperiei ſit conveniens.

In naturali cibo præbeatur *αγνός* & *ωλόγη-
τος*, imprimis ſi ſiccitas conjuncta ſit major &
aridura. Vitentur vero nimis viſcoſa, ſalta,
infumata, frixa, aromatifa, obſtructionibus
generandis vel rarefaciendo ſanguini magis
apta.

Potus ſit cereviſia defecata; recens & vetu-
ſta nimis noxia. Vinum parca præbeatur manu,
imprimis generoſum.

In vitali aer eligendus temperatus. Frigidus
cum nervoſis partibus inimicus ſit, & tuſſi ac
catarrhis generandis aptior, à corpore arceat-
ur. Nocet vero & calidus nimis, ſanguinem ad
motum magis ciens ac ſudorem.

In animali quies cordi habeatur præ motu.
Infirma illa corpora omnia laſantur & læduntur
motu, qui jamdum difficilis ſuccedit, & respi-
rationem aduget magis.

Somaus cum humectet, & humidum, quo nu-
trimur, magis ad lentorem debitum diſponat,
convenit præ Vigiliis. Opus ſæpe eſt & de die
& noctu ſimul geſtare thoraces & ligamenta, ut
conſtantius & reprimantur & reſoſita firmentur
ex ordine dimota. Supinus decubitus, capite
tamen paulo acclivi, hic reliquis modis ſere
preferendus. Vitandæ & in lecto, quas vocant,
jeſtigationes.

Alvus & veſica recrementofas ſpiſſas & te-
nues alimentorem partes juſto reddant tempo-
re, ne deſidia vel exiccatione nimia indurata
ſcybala conatum in egerendo majorem inferant,
unaque oſſibus laborem ſœnerent.

Animi Pathemata ad rationis juſtæ normam
moderari, ſas eſt. Gaudium moderatum infantum
& creſcentium ætatum reliquarum temperiei eſt

aptiſſimum. Ita, terror, metus & trilliſtia, quæ
exiccant oſſa, abſint. Lachrymandi & plorandi
occaſiones, quantum licet, vitentur. *Excell.
Fridericus Kaſeberg in Diſſertat. Medic. ſeſſell. Clar.
Wedelii.*

*Gibboſitatis ab humorum affluxu incipientis cura
propria, quam maximo cum ſuccellſſu
ſapius adhibuimus, hæc eſt.*

1. *℞.* Turbith. gummoſi, ſol. ſonn. mundat.
radic. mechoacaun. herneodaſty. cremor. tart.
diagrid. cranii hum. extract. liquirit. ana ʒʒ.
M. F. pulvis dividendus in doſes 12. totidem
ſeptimanis aſſumendas.

2. *℞.* Baccar. juniperi ʒʒ. caſtor. camphor.
ana ʒvj. rad. imperator. ʒj. flor. chamom. la-
vendul. ana ʒij. conſcindantur & contundant.
omnia atque immittantur lagenæ vitræ, ſupe-
raſiſſis ſp. vini ʒb. v. inſolentur, aut igne arenæ
digerantur per dies 14. poſt deſtillentur orga-
nus vitreis.

Spiritu hocce, ſingulis diebus, bis aut ſe-
mel gibbus incipiens prope ignem per horæ
quadrantis ſpaciū perfricetur.

3. *℞.* Sol. ſalv. recent. major. menth. criſp.
rutæ, lavendul. paralyſ. hyperic. chamom. ſil.
ſummit. ana Mj. baccar. laur. & junip. ana ʒj.
rad. pyretr. ʒi. Conſcindantur & contundant
poſt inſund. per ſeptimanas tres loco calido, in
olei lumbricor. hyper. roſar. anethi ana ʒiij. ad-
ditis a xungia human. catellorum cati ſylveſtr.
ana ʒj. inſolatione, aut inſuſione in loco cali-
do peracta, coquantur omnia vaſe clauſo ad
humidi abſumptionem; poſt colatis, & forti-
ter expreſſis, adde blei terebinth. ʒj. maſtich.
pulver. ʒʒ. terebinth. Cypr. ʒiij. tinctur ben-
zoini ʒj. ceræ albæ ʒiij. Coquantur rursus horæ
ſpacio, materias continuo agitando, ut fiat
ballamus, ſeu unguentum.

Eo inungatur Gibbus poſt per frictionem fa-
ctam ex ſpiritu mox deſcripto.

4. *℞.* Emplaſtr. de gratia Dei, de pelle arie-
tin. & conſol. maj. ana ʒj. ballami ſulphur. tan-
tundem, M. in emplaſtrum, quod toti gibbo
poſt inunctionem applicetur. Removendo & re-
applicando bis de die, ſcilicet in ſingulis perfric-
tionibus & inunctionibus.

Potus ſit decoctum radic. chinæ pauco cinna-
momo aromatifaſum, & ſaccharo ad gratiam
conditum, illudque vel ſolum, vel pauco vino
admixtum.

Conſultatio

*Gibboſitas cum corpore partium
infernarum.*

Nob. Adoleſcens vigefimum primum annum
agens, temperamentum & habitus melancholici,
à nativitate caput Morphaæ ſive lactumine affe-
ctum habuit, quæ affectus progreſſu in Tineam
migravit, quæ decimo ſexto ſuz ætatis anno
Topicis remediis abſque diligenti totius expur-
gatione omnino ceſſit; ſed quinque abhinc an-
nis ſuccellit deſtillatio quædam capite per doc-
ſam, quæ circa mediam ſpinalis medullæ par-
tem

tem firmata dolorem quemdam gravativum & obtusum excitabat, ad pectus & costas mendosas sese extendentem, & exiguo temporis spatio curvatum eidem spinæ induxit, figuram ad miltar. s. representantem, licque non exigui gibbositatem; neque toto jam dicto præterito tempore ullum internum tunc administratum medicum præsidium. Ætate autem proximè præterita remitti cœpit in illa spinæ parte atque costas jam dicta moventia, sed supervenit difficultas quædam deambulandi, cum pedum & crurum inbecillitate, & dolor gravativus atque obtusus qui antea mediam spinæ partem occupabat, gibbos molestante cœpit cum quadam musculorum atque tendonum sub genibus contractione. Tunc convocati fuerunt Excellentiss. Viri Urbis primates & consultum fuit Nob. Adolescentem generosis remediis fore curandum, cuius curatio mense Septembri proximè præterito incepta fuit, redundantiam excrementorum melancholicorum atque pituitosorum deponendam. In quem finem primis viis expiatis,eductus fuit sanguis, primo ex brachio, deinde ex hæmorrhoidibus; præterea reseratae fuere obstructions quædam in visceribus existentes, inde totum venosum genus fuit diligenter expurgatum, mox caput ipsum, tandem institutum fuit Decoctum ex China, salsa, visco querc. santalis, necnon cichoraceis & capitalibus herbis paratum, & sudor moderatus in lecto fuit excitatus. Præterea inunctiones partibus lætis administratae. Conservæ capitales cum cranio humano & ungula Aleis atque succino in usum ductæ fuere. Progressu jam dicti decocti melius habere videbatur; verum ambientis invalescente frigore, in deteriorem statum quam antea lapsus est; liquidem impotentia ad ambulandum adeo adacta est, ut fere ex toto motus progressivus ablatu sit cum torpore & stupore in cruribus & pedibus ipsis, quinimo quandoque motus aliquis convulsivus qui contrahit crura ipsa, observatur. Interim de capite nulla adeit querela, licet prægressi fuerint timores, animi agitationes ob varia contingentiâ accidentia modo de agendis & quando pro salute consulit.

Mirandum quidem, quod Nob. Viri parentes scitum epidem morbosum tandiu neglexerunt; siquidem licet lactamen seu Morpha in infantia, progressu in Alopeciam sive lineam conversa, bona fuerit, ut causa, mala tamen, ut signum procul dubio semper fuit. Etenim aut totius venosi generis impuritatem, aut capitis insignem intemperiem, aut utrumque nobis significabat, & ideo radicitus extirpanda; quod cum fuerit omissum, ætatis progressu capitis cute cum membrana carnosa crassiori atque densiori reddita, & ideo excrementorum egressum impediens; factum est ut ipsa linea evanuerit, sive potius non amplius apparuerit, supersit tamen humore excrementitio, ejusque reproductione vigente, quem à prædominio picuicosum fuisse in capite genitum, subdominio vero melancholicum atque serosum, à toto ad caput transmissum credendum, qui vias ad egressum sibi impeditas inveniens, quinque abhinc annis per spinam ad vertebrae dorsales decumbere incipit, & sua acrimonia, seu potius aciditate partes nervosas vellicans atque pungens, dolorem

quemdam excitavit, sicut multo magis vertebrae ligamenta madefaciendo atque laxando, ejusdem spinæ in illa parte contortionem, licque gibbositatem induxit. postea vero vel o, aut magis compressis nervis ab adacta gibbositate, aut quia humor redundans interius ad vertebrae quoque lumbares pervenerit, compressione potius, quam obstructione infernarum partium motum dimittit, imo tandem fere ex toto ademit, præter torporem stupore etiam inducto, dimittit nimirum etiam sensum cum ipso motu. Nec mirum quod convulsivum etiam quandoque obsequitur, qui tamen vera convulsio non est, quoniam non ex nervo & subitanea repletione, sed ex irritamento, vel ab aciditate melancholicum humoris, vel ab aliqua molestia, à vertebrae male suo situ dispositis, eidem illata provenire speramus, nimirum portio aliqua melancholicæ leticitatis à nervorum principio per medullam quoque spinalem sese innuaverit, ut non semel in praxi à nobis observatum fuit, quod Deus avertat. Deus, inquam, hoc avertat, quoniam non solum infernæ partis, verum & supernæ, futuræ Paralytis raro curabilis periculum immineret: licet si extra nervosam substantiam reperitur jam dictus humor missus, non adeo difficilis evadet curatio: & si causa morbifica immediata adaugetur, compressio nimirum vel à vertebrae ipsis, vel ab humore multiplicato, motum quoque naturalem infernarum partium aboiere, & præter naturam, convulsivum scilicet, frequentiore ac molestiorem reddere valebit.

Quoniam vero ex adducta relatione comprehendimus malum hoc quotidie magis ruere in deterius; idcirco quanvis anni tempus verum exigat ipsa curatio, ad eandem tamen festinandum esse credimus; duorum enim mentium spatium tantum posset vim assuere morbus ipse, ut difficilem curationem non sine vitæ usqueque admitteret. Quare statim repetenda curatio, primas vias mundando. Secundo totum venosum genus depurando. Tertio caput expurgando. Quarto arteriam ad vertebrae jam fluxam resolvendo. Quinto intemperies partium mandantium corrigendo. Sexto caput nervosumque genus roborando; & tandem vires totius conservando.

Tribus autem prioribus intentionibus iisdem jam administratis remediis erit satisfaciendum, omittam tantum ex hæmorrhoidibus sanguinis eductione. Quarta quoque intentio adimplenda, decoctum sudorificum erit instituendum, præscripto non dissimile quod parari poterit in aq. stillat. cich. atque beton. addendo pulv. viperini gr. xv. aut xx. Sed quod omnino necessarium censemus, est sudoris provocatio in hypocausto, ultra horæ dimidium nunquam moretur Nob. Patiens; & in hoc remedii genere supra trigessimum perveniat; ideoque non adeo tenui victu utendum, licet à vino eo tempore sit semper abstinendum.

Terminato sudore, in viperini pulveris usu erit perseverandum, ut diaphoresis ad aperta servetur de quo dicebat Gal. quod extenuantis est facultatis. valde enim excipit ac digerit, & ad cutem properat; & interim non interposita mora ad Thermas sulphureas Aponitapas sese conferre debet, ut luta prius emollientia, si opus fuerit, deinde certo solventia spinali medulla administrari possint; & forsitan etiam Balnea sulphurea,

ut facilius sulphurea vis emolliens atque resoluens penetrare valeat; quo tempore & capitis succiduum non parum profuturum credimus; tuncque & de aliquo ferreo instrumento adaptando cogitari poterit, sicut forsan & in presentibus: quod excellentiss. presentibus atque videlicet committere debemus. Interim ne humor magis incrassetur atque exicceetur, quotidie exteriori sudore tota spina iungenda utque ad os sacrum, inunctione parata ex oleo lil. alb. de lunbricis, vulpino & viperino: non autem crura ubi detent motus, exemplo Pausaniæ: sub genibus tantum ratione motus convulsi, oleum lil. alb. cum amygdalino conveniens erit.

Quibus jam dictis omnibus congrua victus ratio erit addenda; à vaporosis omnibus, tum calidis, tum humidis abstinendo, vinumque medicatum pro mensa parando, ligno roris mar. visco quere. lentisco & santalis alteratum; cæteraque observando quæ Viris Excellentiss. præscribend, sicut reliqua omnia dijudicanda atque corrigenda relinquimus. *Kaym. Joh. Foris Consult. & Respons. Medic. T. 1. Cent. 1.*

Observationes

Gibboso cuidam Puero nobili, cui spina dorsi extrorsum admodum extuberabat, thoracem ferream qualem armati ferre solent, ex tenuissimis laminis fabricatum, atque intus foris, ut ne nimium illum premeret, pannis suffultum, indutum ut gestaret docui, quotacto, cum cum integri anni spatio, dies noctesque gestasset, eique sic assuevisset ut non magnum inde sentiret molestantiam, sensim pressa illa curvatura, spina rectitudinem iterum suam naturalem est adepta, posteaque semper recto corpore incedens, procerus admodum est factus. *Felix Platerus. observ. t. lib. 1. pag. 164.*

Puellula quædam octodecim mensium excresecientia vertebrarum dorsi laborare cepit. Ad eam vocatus, tertiam & quartam vertebrae lumborum extuberantes inveni ad cui Anatæ magnitudinem, quas secunda & quinta nonnihil sequebantur, ita ut in maximum gibbum excreverit spina, præcipue versus sinistrum latus: quapropter sinistrum crus dextro longe imbecillius fuit. In curatione sequenti modo processit.

Primo dorsum totumque crus sequenti aqua ad nervos corroborandos inunxi.

℞. Aquæ gran. juniperi sine vino destillat. aq. salvia, betonicæ, lavendulæ, an. ℥ij. pulveris radicis bistortæ, tormentillæ, rosarum an. ℥ij. M. fiatque infusio in ampulla magna per dies octo vel decem. Deinde per inclinationem à pulveribus separata aqua ad usum reservetur. Post inunctionem, sequens. Emplast. quo etiam in tracturis ossium utor, applicui.

℞. Emplast. Slotani ℥v. ceræ novæ ℥ij. lapidis osteocoll. ℥ij. pulveris radicis consolid. majorem terræ sigillæ an. ℥ij. pulveris balaust. nucis cupressi rosarum odoriferarum an. ℥ij. misceantur lentissimo igne, fiatque emplastrum addendo ol. rosæ, aut n. asslich. quantum satis, totum autem præcipuumque artificio in curatione gibbi in hoc consistit, ut extuberantia vertebrarum reprimatur retrorsum alioquin omnia frustra tentantur. In hunc itaque finem laminam ferream, aliquantum incurvatam, & ejus quidem longitu-

dinis & latitudinis, ut totum gibbum cooperiret, in thoracem ex reduplicata ella ita adaptavi ut extuberantes vertebrae reprimere posset, Laminam tamen carbaso obtexi, ut puellæ minus esset molesta, thorax nudo corpori induatur & ita quidem adaptandus est, ut totum ventrem ad muliebria usque comprehendat: Per medium ventrem ligula oblonga constringatur: circa pectus quidem mediocriter, ne metapneum & costæ constringantur; post costas vero mendasas usque ad in unum ventris arctissime, quo iam ina ferrea extuberantes vertebrae reprimere possit. Ne autem thorax à scapulis sursum trahatur, fasciæ duæ transversum digitum latæ, in utroque inguine annectendæ erunt thoraci, quæ descendentes subter nates, in utroque latere thoraci ligulis annectendæ. Emplastrum autem & inunctiones de quarto in quartum, aut etiam de sexto in sextum diem renovavi, coxam vero totumque crus singulis diebus præscripta aqua inungere jussi, sic divino favore, intra menses sex, gibbus depressus fuit, thoracem vero, laminamque propter imbecillitatem & molliem membrorum in secundum usque annum gestavit. Nunc cum annum ætatis tertium attingit, quam belle se habet. *Guilielmus Fabricius Hild. obs. 67. cent. 5.*

Anatomica Inspectio.

Gibbositas ob sinistrum Pulmonem & Pericardium firma cicatrice costis adnata.

Quidam purulenta tussiens, circa diaphragma sinistrum vehementissime doluit, tandem ascitide obijt. Aperto cadavere, parenchyma sinistri pulmonis tere totum consumptum; bronchia vero relicta cum paucis parenchymate, & ipso pericardio firmissima cicatrice, ceu callo, costis adnata coaluere, ita ut propter diuturnum dolorem, hoc latere compresso depressoque, gibbus altero latere factus fuerit miser. *Sal. Reiselius in miscell. cur. anni 1673. Observ. 191.*

Gibbositatis causa in capite reperta, ob vitiosam ossis Ethmoidis conformationem.

Adolescens à pueritia Gibbo & althmate vexatus, tandem ex phthisi obiit, circa annum ætatis 16. Hujus cranium aperui, & inveni processum sive interstitium, aut septum illud quod eminet in medio ossis ethmoidis, seu cribrosi (qui processus crassitiem papyri excedere vix solet) in latitudinem & altitudinem ita auctum, ut tere totum os cribrosum obregeret, adeo ut foramina hujus ossis, per quæ pituita ex cerebro ad nares solebat effluere, plane oppleta viderentur, quamvis percocto cranio, vix eorum ullum pateret. Denique ossicula superioris maxillæ, quæ in magno oculi cantho compiciuntur, adeo excreverunt, ut septum nasi hinc inde propemodum attingerent: Hanc præcipuam fuisse gibbositatis causam verisimile est: nam cum pituita per nares minime posset expurgari, verius spualem medullam tendebat, sicque vertebrae, earumque cartilagine, assidue irroratæ pituita viscida & relaxata, tandem excreverunt in gibbum maximum. Nec solum pars illa Dorsi ex hac defluxione & irroratione pituitæ relaxata fuit, verum etiam omnia ossa à collo usque ad pedes, præcipue vertebrae, os sacrum, os pubis, ossa pedis, denique

nique omnes epiphyfes live appendices, præter consuetudinem molles ac tenellæ erant, ita ut fere instar cere tractari possent. Illud præterea in hoc cadavere notandum visebatur, quod 6. 7. 8. 9. & 10. vertebræ metaphræni, quæ Gibbum efficiebant, exesæ erant carie, præcipue autem 7. 8. & 9. quarum nihil præter exteriores semicirculos, & eorum processus conspiciuntur. Interiores autem partes harum vertebrarum, in quatuor aut quinque fractas partes, non sine admiratione, in ipsa pulmonis substantia invenimus; Pulmo enim in parte, quæ dorsum respiciebat, ulcere magno & calloso laborabat, per quod ea fragmenta, ex continuo pulmonis motu attracta fuisse, dubium non est: Tanta enim est pulmonis ad se attrahendi facultas, ut nonnunquam tuendas ex vulneribus pectoris penetrantibus ad se traxerit. Fabricius Hildanus cent. 1. Observ. xli. Diximus in Gibbo illo 7. 8. & 9. vertebram metaphræni ita exesas fuisse, ut nihil præter exterioris semicirculos & eorum processus reperiuntur sit: ubi admiratio non caret quomodo spinalis medulla conservata fuerit, Erat enim plane denudata, & nonnisi membrana sua cooperta: interim tamen insigni illa putredine ossium carioforum, & ulceris pulmonis sordidi circumdata, neque tamen sequutum ullum symptoma ex iis quæ spinali medulla læsa accidunt. *Idem cent. 5. Observ. 66.*

Gibbositas Pectoris & Dorsi à magnitudine Hepatis extraordinaria, Rachitis Anglis dicta, Tabes Pectoræa.

Pectoræam Tabem appellamus, non quæ intra Pectus sedem habeat, quo factò Phthisis Pulmonia eo nomine comprehenderetur, sed in qua ipsa Pectoris crates vitietur - id quod fit in morbo quem describendum suscipimus. Est autem hic Puerilis duntaxat seu infantilis, & vulgatissimus in Anglia, uti & in Hibernia ab aliquot annis, ubi antea solebat rarissimus esse ac vix cognitus. Invadit autem non grandiusculos tantum infantes, sed & valde teneros ac recens natos, Sicuti contra rarissime trimis majores adoritur, & ut plurimum intra bimatum se continet: Multæ corporis partes in hoc morbo afficiuntur, pectus, caput, artus, alix, sed præ omnibus ac ante omnia pectus, cuius pars anterior, quæ lata esse debebat ac plana, angustior fit, & utrinque acclivis in medio, seu sterni regione, altius assurgit, tandem prorsus carinatur: Costæ inferiores, ad latus foveæ ventriculi, introsum retrahuntur, ac quandam utrinque velut scrobem faciunt, totoque sui ductu, quibusdam velut nodis asperantur ac inæquales fiunt: vitiata pectoris figura respirationem facit impeditiorem ac crebriorem, quam etiam tunicula plerumque sicca, comitatur: Caput grandescit ultra debitum modum, ac portione inferiores corporis partes, coxæ, femora, crura, extenuantur & debilescunt; unde infantes incessui inepti redduntur; non modo illi qui nonquam adhuc eo usi fuerant, sed & qui firmiter admodum agilitate incedere ac discurrere cœperant, diu antequam hoc morbo prehenderentur: Dorsi spina in multis curvatur, atque arcus instar in exteriora flectitur:

Olia articularum in brachiis & cruribus, non omnium, sed carporum ac talorum augmentur, ac tantopere protuberant ac si duplicata esset fere eorum moles; unde etiam Doubling of the joints, i. e. juncturarum duplicationem id vitium nominant Angli, qui morbum ipsum, hoc symptomate stipatum Tent indigitant, quoniam alioquin eum generaliori vocabulo, omnemque ejus speciem includente The Rickets appellant. Præter hæc omnia dextrum hypochondrium intumescit totum, tumore æquali, magno ac tenente, sic ut digitos sub costas notias adigere non possis: Et sane omnis mali vel origo vel fomes later hoc in loco: Tumor iste cum pectoris aliqua angustia, statim initio morbi apparent, sic ut interdum quidem ambo ista simul, eodemque tempore se prodant, alias vero vel hoc vel illud altero nonnihil antè sit: Nodi in costis, ac scrobes istæ in imis oris pectoris postea accedunt: quando etiam pectus fit magis magisque angustum: Capitis incrementum istis posterius est, nisi quod pectus toto morbi decursu arctius redditur, donec ad summam angustiam deventum sit, sic ut carinæ instar acutum fiat, ac promineat, quod fere non fit nisi paucis ante mortem diebus: Et enim lethalis hic morbus, si vel negligatur penitus, vel sero aut prave curetur, purinosque quotidie absumit, neque ullus est annus quo non aliquot millia infantium pereant: Articulorum granditas fere nonnisi ultimo loco supervenire solet: quanquam multi sunt qui eam nunquam patiuntur, ac moriuntur prius quam ad eam deveniant: sicuti rursus ex iis, quibus illa accidit, permulti evadunt, etiam si minus habebantur, quippe haud ita periculosa est illa Tabes Pectoræa specie quæ hoc symptoma trahit, quam quæ eo caret.

Origo hujus labis à Jecore est, persæpe non vitiato ullamve noxam patto, sed supra modum adaucto, ita ut plerumque duplo, imo ferme triplo majus sit quam par erit, totamque anteriorem epigastrii partem occupet, & ipsum quoque sinistram hypochondrium attingat, interdum quoque impleat Jecur sic adauctum, cum in ipso ventre non inveniat spatii satis ubi se commode explicet, à thorace mutuatur quod ipsi deest, ac versus superiora attingens, diaphragma longe impellit, adeo ut interdum pectoris cavo vix dimidam partem spatii ipsi debiti relinquat: Pulmones sic marcescunt, contrahunt sese ac in sese colligunt, unde fit ut pectoris quoque crates, ipsorum causa facta, iis se accomoderet ac angustior evadaret: Quandoque ab ipso pectore & pulmonibus incipit malum, hæctica quadam siccitate, cum nonnullo etiam caloris excessu, obsessis, qua sensim marcescentes illæ partes, ac sese contrahentes, quum vix ullum nutrimentum tunc capiant, sanguinem quem in statu naturali valde copiosum ad se trahere ac absumere solent, Jecori reitundunt; quod eo circumfluens, plus justo incrementum, atque in omnem partem sese adauct: cujusmodi nimium Jecoris incrementum principalis hujus morbi causa est, ita in hoc quoque non parum ad eundem fovendum confert, atque in progressu eadem omnia mala importat, quæ modo memoravimus; atque sic morbum, quanquam non ab ipso cœptum, fovet tamen & magnopere adaucti

renixu aucta magnitudo reperitur, & quoniam nullus dolor, nullusque sensus, saltem secundum dextram partem adest, ideo scirrus secundum hanc legitimus est habendus, vereque scirrus, ut habetur à Galen. 14. Meth. & 2. ad Glauconem, præterea est immobilis ad strumam, & glandulæ differentiam, quæ etsi scirri dicantur, mobiles tamen existunt; Cæterum hunc non esse simplicem scirrum, sed complicatum cum rudimento quoddam cancri, ita ut scirrus cancerosus dici possit, facile est ex iniquitate, & liuore in ore ad partem illam perceptis ostendere; atque adest & ulcus, quia continuo ichor fetidus graueque olens emanat ab eminentis quibusdam erosis dolentibus ad tactum aliquo modo secundum partes internas; rursus quoniam ex Paulo, Cancer ulceratus vel est sordidus, vel purus, hic, de quo agitur, purus protecto est, quoniam cum liuore fluor quidam, & materia tenuis excernitur.

Causam scirri immediatum humorem constituo pituitosum crassum, & lentum per congectionem, non autem per defluxionem a capite (de quo nulla querela à patiente nostro habita fuit) ibidem collectum, item humorem melancholicum naturalem simul mixtos, de humore melancholico fidem faciunt prægressa quartana, necnon sub dominium melancholicum in proprio patientis temperamento. Concedo equidem antea tumorem à simplici pituita ortum duxisse, nam veluti meliceris fuit, uti à suppuratione substantiam similem melli reddente colligere potuit unusquisque; sed nunc ob colorem fuscum partis internæ humorem melancholicum admisceri pro certo habeo, ab his autem duobus humoribus & seorsim diuisis, & coniunctim unitis scirros fieri posse scribitur lib. de Atra bile, & 14. Meth. Cæterum duritiem acquisiuit scirrus prædictus tum à repletionem partis ob copiam humoris, tum à concretionem à frigidityte ossis mandibulæ facta, immo & ab ipsa siccatione, qua nimirum celebrata suppuratione, disruptoque apostemate pars tenuior est excreta, & quicquid crassum est remansit. Verum quoniam cancer fit ex melancholiâ genita per adustionem, vel melancholiâ naturalis, vel flauæ bilis lib. de Atra bile cap. 3. dico; præsens cancri rudimentum suam habere occasionem ex Atra bile genita per adustionem bilis, quod ætas iuventutis confirmat, necnon habitus, ac ægri temperies biliosa, quam pili flauis in toto fere corpore enascentes ostendunt.

Sed & causa remota eiusdem tumoris tum externæ, tum internæ non sunt contemnendæ, priores in errata externa, in quæ iuvenes incurrunt, referuntur omnes, posteriores vero, & mouentes esse, & generantes non habeo, mouentes ad facultatem expultricem totius, partisque laborantis imbecillitatem refero, nam partes oris laxæ, admodum sunt, & humidæ, ob idque ad suscipiendum aptæ, merito quarum causarum humores per transmissionem, coagentibus his, quæ sanguinem acuiunt, usum nempe alimentorum calidorum, motuque corporeo, quibus patiens usus fuit, ad locum confluunt affectum, causæ demum generantes in alimenta ad generandos humores dictos idonea, in jecorisque caliditatem meo iudicio referuntur.

Hinc scopos Medicos facile est elicere tum

præservativos, tum curativos, præservativi in causarum ablatione consistunt, primo scilicet in totius euacuatione. Secundo in prohibenda humorum dictorum per sublationem causarum mouentium, & generantium fluxione, atque generatione, proindeque refrigerandum iecur, ventriculus caletaciendus, & pars affecta ac temperanda, roboranda, & constringenda, quibus scopis Morbi tantum augmentum prohibebitur; Scopis vero curativi in unicam partis affectæ euacuationem reducuntur.

De prognostico ita sentio, quod liceat. scilicet scopos præservativos obtinere, quoniam patiens est ætatis iuventutis aliqua occurret difficultas, quoniam magnus observatur recessus à naturali statu, causæ valenter agunt, præsertimque in temperies calida iecoris est in habitu: At scopos curativos absolvere per ea, quæ discutiunt, apud me est impossibile nam facultas partis est abolita, medicamenta quæ actuari minime possunt.

An vero possit per recisionem, quæ fit & ferro candenti, & medicamentis corrodentibus malum hoc deleri, merito dubitari potest: non ex una parte id fieri posse videtur, quoniam pars est ignobilis, cui nulla vasa insignia, aliquiue momenti assistunt; præterea, ibidem alias est facta sectio, cuius occasione nil mali fuit subsequutum, & iure quidem: quia contra verum cancrum hand agebatur, hinc non obstat Aphorismus ille sextæ sectionis trigessimus octavus utpote qui de veris canceris, intus, & non ulceratis, adhuc ægros fatigantibus, & magnis existentibus, 2. ad Glauconem, loquitur, non autem (ut notat Gal. ibidem) de his, qui in summa cute exulcerati, & in parte, quæ rescindi possit existunt. Et si aliquis obijceret ex Gal. videri ab Atra bile esse prorsus insanabilia, responderi posset pro hac parte, quod Galeni sententia de ulceribus ab Atra bile sinceræ genitis venit intelligenda. Ex altera vero parte (quod erat principale institutum) recisio nullo pacto videtur convenire, non quidem per ferrum candens, quoniam alias absque fructu tentata fuerit, & summa cum ratione in similibus namque tumoribus dubio procul vasa materiam continuo suppeditant; adhibito autem igne, insignis à vasis fieri solet attractio, hinc augmento tumoris perbellè datur occasio; præterea, corrosiva partes præmitiores non petunt, quocirca frustra adhiberentur; demum incisio scalpello non probatur, non enim est tuta propter vasa externa.

At quid ego sentiam nunc, ubi de materiis chirurgicis loquar brevibus aperiam, quas materias respicio, primum ut disponentes, quæ sunt sectio venæ in cubito dextro, & hirudines antea applicitæ. Secundo ut curantes, inter quas ego seligo ferrum candens; Ad propositam autem difficultatem respondeo, quod tametsi non possit ita perfecte sanari vitium huiusmodi, potest tamen ea ratione præcaveri, qua saltem ne augeatur, præhibetur, nam alias posset ad tantam pervenire molem, quæ omnino intolerabilis existeret; tandem materias chirurgicas ut præservantes intueor, ac inter has unam instat omnium propono cauterium in brachio dextro.

Medicamenta, quæ totum respiciunt, primum occurrunt, hinc pro lenienda alio casu

mus, brevi molestam hanc carnem nos ablatus. Instrumentum ad ejus extirpationem convenientissimum nobis videbatur, quod parte 5. obs. 27. delineavit *Hildanus*.

Instrumenti hujus ope, celeri manu, ablato fungo, sanguinis, rivulose admodum, eo imprimis loco, qui denti oculari ac maxillari interjectus, effluentis impetum sistere coacti; hic multum effecimus pulvere nostro styptico beneficio lintei combusti vulneratz parti applicato, descriptio ejus hæc est:

℞. Nuc. Gall. immatur. ʒ 1j. Boli Armen. ʒ 1j. Terræ Lemniz ʒ 1i. Vitriol. Cypr. ʒ ʒ. Alumina. Crud. ʒ 1j. M. f. Pulv. subtiliss.

Pulveris hujus usus in eo consistebat, ut primo conciliatur mixtura quædam ex albo ovi conquantato & spir. vitriol. get. aliquot, huic imponatur linteam combustum, hinc linteo hoc excipiat pulvis loco vulnerato applicandus debite & per fasciam externam, & per manum ægrotantis in ipso situ detinendus.

Cauteris in hujus fungi ablatione haud indiguimus. Sequenti die adstringentia hæc vulneri applicata auferri curavimus eorumve in locum substitutus decoctum hordei cui aliquid unguenti Ægyptiaci mixtum, pro collutione usurpavimus.

Tandem ad omnimodam consolidationem mel rosar. præscripsimus, cui gut. v. aut vi. sp. vitrioli mixta, pro linimento. *Joh. à Mecklen in Observation. Medico-Chirurgic.*

Gingivarum erosio incurabilis à vermium abundantia in intestinis.

Puer quidam Dusseldorpiensis erosione gingivarum a longo tempore gravissimè divexabatur; multa remedia frustra adhibita; tandem vitam cum morte commutavit. Aperto corpore tanta inventa est abundantia vermium, ut aliquibus in locis intestina eroserint, multique in vacuo ventris reperti fuerint. *Guilielmus Fabric. Hildan. observat. Chirurgic. cent. 1.*

GLAUCOMA

Vid.

HYMORVM OCULI VITIA

Titulo Oculorum Morbi

GONAGRA.

Vid.

ARTHRITIS.

GONORRHOEA.

Gonorrhœam melioris doctrinæ ergò duplicem facimus, veram scilicet & notham. Vera est, quando vera materia seminalis, aut ipsi saltem proximè similis in testibus tamen elaborata, crebro nimis excernitur. Nova gonorrhœa vero est, quando alia materia vitiosa loca seminis excernitur.

Gonorrhœa vera, est triplex. Fit nempe 1. à nimia copia & abundantia seminis; unde non tantum uberius veneris tumulus: sed etiam ubi

serum paulatim turgescere incipit, impetu facto ex vesiculis seminalibus prorumpit, in quod contingit præprimis nocturno tempore, dum supini jacent, ubi scilicet propter sanguinis circa partes dorsi interiores & posteriores, & ita tum partium interiorum incalificentiam, seminem abundans calefactum turgere & erumpere solet; Id quod fit non tantum in juvenibus, sed etiam in viduis, qui a venero solita abstinerere coguntur. Dico veri in primis nocturno tempore; in vero cum hac seminis abundantia conjuncta sit laxatio quædam vesicularum seminalium, aut certe quod harum ipsarum meatus in urethram sunt paulo patentiores facti: in talibus etiam interdum seminis hæc effluxus, accedente nempe retentione, & aliquali venereo pruritu: quod excernitur semen est copiosum, crassum, spissum & naturaliter coctum. 2. Fit gonorrhœa vera à seminis acrimonia præternaturali. Unde & irritantur partes continuo pruritu venereo, & præterea illa irritatione vesiculæ tumplata vicinæque musculosæ partes se contrahere & ita seminem stimulas exprimere incipiunt, præcesserunt imprimis causæ quæ semen acrius generare valent, ut sunt aromata copiosius assumpta, in specie piperata: sic enim Schenck. Observationum lib. 4. refert de quodam qui semper quoties voluit, stilimbrio seu gallurto gonorrhœam provocare voluit, ex acrimonia scil. sal. volatilis assumpti stilurii, quæ stimulo seminem copiosum genitum talem producit gonorrhœam. Imo & purgantia acris assumpta venerem stimulare & interdum gonorrhœam provocare solent. Exempla vid. in Plater. & Timæo, quin & cantharidum abusus hoc ipsum malum, acupendo semen, inducit. Facit & huc constitutio massæ sanguineæ, paulò acrior, aut serò salisore temperata: quod ipsum serum acrius imminuens chylosam materiam semen reddit acrius & stimulant: & tales continuo stimulo venereo, ac turgine, sæpius urgente fortiori turgillatione excernere solent, idque non absque voluptate venerea, die ac nocte. 3. Fit gonorrhœa ex nimia tenuitate & flacciditate seminis, concurrente tunc simul laxitate nimia vesicularum seminalium, non secus ac prostaticarum glandularum: Unde & aquosum semen effluit; & hinc laxatis ac atonia, seu nimia relaxatione affectis vesiculis illud continere, aut retinere nequeunt: unde sine voluptatis insignioris & turginis acutioris sensu interdum non advertentibus effluit talis semen, aut statim ad levem imaginationem, vel ad levem seminis contactum hoc semen sponte quasi prolabitur, & est tenue admodum & fluidum plus solito. Vitium in primis hæret in testibus in hoc casu eorumque fermento debilitato, quod ineptum est elaborando semini, & hinc vitium est in vesiculis seminalibus nimium laxatis; si nempe illud citò elaboratum, & hinc non convenientem naturam seminis induxerit. Hæc posterior gonorrhœæ species sæpius à dmonata oritur masturbatione, quæ sæpius reterata, & testes laxantur, & fermentum eorum debilitatur. Exemplum hujus rei habet Timæus cas. 49 lib. 3. de studioso juris, qui tali damnato modo gonorrhœam sibi contraxit.

Species gonorrhœæ veræ sunt varæ, sed ex modo dictis facile possunt dignosci. Hoc san,

tum adeo; quod dum loco seminis effluentis continui novum supplementum ex massa sanguinea suppediatur, oriatur denique ut defraudata massa sanguinea succo suo chilo corpore tabescat, & in primis tales ægri debiles & pallidi fiunt, oculorum orbitæ excavatæ apparent, & fulgor oculorum deficit, quin potius oculi cornei, & minus lucidi videri videntur, cum semper cum semine aliquid spiritus animalis simul effluere soleat.

Tales gonorrhœæ ex se quidem non adeo insignis sunt momenti: verum si diutius continuentur hominem contabescere & succumbere lethalliter cogunt. Superaverit in primis febris hectica similis cum tali atrophie specie qualis est tabes dorsalis noviter nuptorum. Qualis hæctica tunc difficillimè est curationis. Ulterius: Gonorrhœa diuturna subito nimis non est suppressenda, imprimis ubi nonnihil inclinat ad virulentiam veneream: metus enim est, ne suppressa subito materia antea copiosius affluente, hæc ipsa stagnando in testibus occasionem tumori suppetat; unde postmodum periculosius malum superveniat.

In hoc in primis sunt causæ movendæ, & ita semen minuendum, aut ejus fervor temperandus, aut denique testium fermento roborato partium tonus legitimus restituendus, laxusque nimis adstringentibus firmandus.

His scopis quæ satis faciunt remedia, in primis quæ semen, aut copiosum turgescens, aut acrius stimulant compescunt, sunt, præ cæteris radix nymph albæ & flor. nymph. item sem. agni casti, seu vitæis, uti etiam semen malorum, papaver. alb. lactuc. plantag. in specie semen cannabis ad inveteratas etiam, & tantum non desperatas gonorrhœas contundatur; si ex eodem, non secus ac ex reliquis feminibus narcoticam: Convenit præterea urtica mortua, seu galeopsis flore albo, quæ ex signatura commendatur Carichterio, egregio in hoc puncto botanico, si decoctam propinat in vino. Præterea res nota est de mentha, item de ruta, de portulaca & similibus. Millefolium item laudatur, si nempe succus millefolii ad ℥iij. exhibeatur cum lacte dulci gonorrhœam totaliter sistere referunt, in primis ubi simul succus lactucæ cum camphora externè testibus applicetur. Præterea succus limonum & succus citi præ cæteris sunt remedia, licet simplicia, ad gonorrhœas sistendas, si sint ex acro semine, si ex abundante, quæ ab omnibus autoribus mirè laudantur. Unde experimentum Sylvatici cent. 1. est hæc non inefficax compositio; nempe

℥. Aq. rosar. ℥iij. succ. limonum ℥j. album ovi crud. nu. i. Et hanc misturam quarta qualibet die propinat non sine sperato successu. Petrus Jo. Faber ad curandam gonorrhœam propinat succum limonum cui intillavit spir. terebinth. unâ cum tantillo camphoræ.

Porro de essent. castit. de essent. absinth. de ejus vino & essent. menthæ &c. nihil dico, quia sunt satis clara & cognita. Terebinthinæ in primis conducit, ac in specie spir. terebinthinæ si ipsi addatur sacchar. saturni: hinc enim evadit mistura eleg. utrimque rubicunda, quæ crebrius usurpata mire compescit gonorrhœas.

Deinde etiam succinata sunt commendata gonorrhœam, scil. pulvis succin. in alb. quotidie

propinatus in jusclo calido jejuno stomacho mire ad gonorrhœam valet, quin & oleum lucin. in talis calu usurpari potest, quod tamen est paulo fortius ita ut tutius solus pulvis usurpetur. Trochisci etiam de carabe possunt usurpari, ulterius, alla sapie piceis admodum conducunt; præparata specificum fuerunt Harthmanni, ut & etiam D Michael qui sæpissimè ad gonorrhœas compescendas adhibuit pulverem ossis sepiæ præparat. unâ cum antimon. diaphoretico, quæ mista a ℥℥. ad ℥j. propinavit; nam & antimon. diaphoretic. in aq. plantag. haultum gonorrhœas sistit, sicuti etiam bezoarticum martiale, item bezoarticum venereum usurpari solent.

Pertinet huc electuarium sequens quod a quibusdam laudatur.

℥. Conserv. rosar. & menth. crisp. an. ℥j. vel ℥i℥. ossis sepiæ præpar. ℥ij. borrac. calcin. ℥j. nucis moichar. ℥℥. syr. de ros. sic. q. s. M. F. electuarium, quod quotidie bis vel ter usurpetur. Obiter nota de borrace calcinata, quod multarum aluminis adstringat, præcipitet, sistat gonorrhœas, coerceat venerem, dum crudus insigniter venerem in stimulat. Ulterius chrystall. ont. præp. etiam compescunt gonorrhœas nimias. Quidam præscribunt pilulas contra gonorrhœam hoc modo.

℥. Extract. rad. torment. ℥ij. spermiol. croll. ℥j. (hoc etiam admodum laudatur ad gonorrhœam) pulver. sem. agni casti, plantag. an. ℥℥. terebint. coctæ camphor. an. gra. M. F. pilulæ.

Vel ℥. Extract. tormentill. ℥j. sacch. saturn. camph. an. ℥℥. M. F. pil. quæ subinde usurpentur.

Corallia, in primis eorundem tinctura, cum spir. ignis, aut etiam tinctur. corallior. salsiffra, ta egregiè est usus in gonorrhœis. Sic etiam martialia, ac in primis tincturam martis adstringentem laudare solent.

Modernorum experimentum est balsamus de Copaiva ex Indis allatus, cujus 4. aut 5. guttæ haultæ mirum sunt experimentum ad gonorrhœas sistendas, propinatur cum vino Hispanico vel alio liquore appropriato, & pro mirabili habetur remedio. Ex modò dictis. mixturæ, emulsiones, & aliæ formulæ pro usu prædestinato fieri possunt.

Essentiarum quas vocant castitatis compositio est varia; præ cæteris efficax est, idque propter terebinthinam admittam, aqua ad gonorrh. Riverii, cujus descriptio extat in ejusdem cent. 1. obs. 25. item in cent. 2. obs. 30. Prostat etiam aqua castitatis Mynticht. sed admodum inepta, multa enim continet quæ nihil per alembicum transmittunt: potius loco ejusdem e seminibus ingredientibus fiat emulsio, cui postmodum adduntur pulveres reliqui appropriati. Dabo exemplum talis emulsionis contra gonorrhœam. in specie si simul fervor quidam adjunctus sit in inguinæ circa perinæum, & hinc usque ad lumborum principem.

℥. Sem. melon. agn. casti an. ℥ij. papav. alb. cannab. an. ℥i℥. cum s. q. aq. nymph. & portulac. f. la. emuls. cui adde ossis sepiæ præp. ℥j. antim. diaphor. succin. alb. præp. an. ℥℥. spermiol. croll. ℥j. edulcoret. cum s. q. rotular. man. Christi perlatæ.

Præterea sunt etiam qui insigniter ad has gonorrhœas commendant sequent. pulv. scilicet.

℥. Folior. rut. sic. sem. agn. casti. menth. gallar. pulveris an. q. v. cujus pulver. ℥ij. hauriantur

tur in viuo chalybeato; repetendo quotidie: *Virgini*, hoc est Halidei Paduani, qui non tantummodo ad gonorrh. sed præterea ad fluorem album mulierum commendat; ubi simul tanquam expertum specificum extollet succum cetherach, seu scolopendrii, si ad cochleare j. repetitis vicibus adsumatur, idque habet obs. 170. & 171. Quod si vero præter dictas causas sententia quosum, ac vesicularum laxitas inducat gonorrh., in tali casu interne, ex mentha, abintio, succino, thurib., & similibus conferunt, in specie corall. alb. & thus, essentia item lignor. & essent. lign. sassafr. tinct. corall. cum sp. lignor. item tinct. mart. adstringens admodum laudantur in specie succus menth. cum melle coctus & ad consistentiam syr. inspissatus, si ad ʒi ss. usurpetur, commendatur a Foresto. Item thus pulverisat. in aq. plantag. propinatum feliciter has gonorrhoeas sistit: sed non est tam sæpe hoc ipsum repetendum, quoniam alias etiam urinae fluxum cohibet.

In genere conveniunt interne omnia quæ inspissant, & fluxilia coagulant, ut sunt martialia adstringentia, corall. & similia. Externe sunt fomenta adstringentia cum vina austiore in quò decoquantur cortic. granat. ba' ault. & rosæ; item radix consolid. major. plantago & similia: aut fiat inunctio perurinae ac radic. penis cum oleo myrrillor. scilicet.

℞. Olei myrell. ʒiij. mastich. destill. ʒj. caryophyll. destill. nucis mosch. an. ʒi ss. cum paucis cera fiat linimentum quod vesiculas seminales nimis laxas nonnihil roborabit atque adstringet.

Quod si recessum fuerit ut etiam interdum purgatione instituantur, præ cæteris in usu erunt terebinthinata, v. g. pilul. de terebinth. Mynsicht. vel etiam pilul. factæ ex sola terebinth. cum rhabarb. pulver. Item pilul. factæ ex mast. pilular. de fumar. & terebinth. cum mercur. dulc. ubi suspicio subest luis vener. Sic namque D. Michaël curavit aliquando militem quendam diuturna gonorrh. afflictum per solas pilulas de terebinth. Cypr. cum croco mart. adstring. nullis aliis adhibitis remediis. In genere terebinthinata, cum laxent blande, & simul vias urinarias ac spermaticas detergant, hic sunt convenientissima.

Ha fuerunt species Gonorrhoeæ veræ; quod attinet gonorrhoeas nothas, in quibus loco seminis aliud quoddam liquamen vitium excernatur; hæc ipsa denuo est duplex, vel benigna, vel maligna, seu, ut alias vocatur, virulenta. Benigna est quando citra causam manifestam, v. g. citra prægressum actum venereum suspectum, effluit continuo liquamen, seu materia tenuia aquosa & copiosa, idque citra pruritus venereum, aut citra membri tentionem: fluxus talis die nocteq; diu satis continuatur, adeo ut observatum fuerit etiam ad aliquot annos durasse citra ullam intermissionem, & absque insigniori, & tali fluxui (si semen verum esset) proportionata virium prostratione.

Fluxus talis gonorrhoeæ nothæ virorum respondet fluori albo mulierum: alia à quibusdam, utut pauci fuerint Autores qui ejusdem fecerunt mentionem, gonorrhoea catarrhalis appellari solet. Autores pauci, uti dico, qui de tali gonorrhoea agnoscunt Langius in suis epist. lib. 2. epist. 5. item Laurentius in suis consil. p. 60. ac denique Marcellus Douatus, Histor. Medic. mirab. lib. 4. c. 18.

Si pressius exanimemus hanc gonorrhoeam notham inveniemus quod subjectum, seu pars affecta in eadem sint prostatica glandula, seu spongiosa in radice uretræ circa cervicem vesicæ litæ, quas ipsas esse subjectum tantis gonorrhoeæ sufficienter declarat & confirmat Cuius in novissimo suo tract. de organ. viror. generat. interviert. Sicuti hæ ipsæ prostaticæ glandulae mirabilium morborum prout sunt subjectum. Scio enim ex iisdem intarctis & insigniter tumet. cæcis lithuriam seu suppressionem urinae letalem Romæ in quodam Principe tunc inducimus, cui contra hæ ipsæ prostaticæ glandulae nimis laxæ, aut alio modo vitiatæ sunt subjectum huius gonorrhoeæ nothæ dicendum. Naturaliter enim præparant & secretunt quandam lympham tenuem & lubricantem, quæ inservit pro vehiculo seminis ex vehiculis in antrum expressis quod semen, cum fuerit glutinosum, huius lymphæ indiget vehiculo ad fortiores ejaculationem. Quod si ergo nat. ut laxatis his ipsæ substantiis glandulis, aurium copiose, ac frequentius tantis lymphæ in urethram excernatur, quæ tunc simul a naturali statu ad quandam viscositatem inclinat, exinde oritur hæc gonorrhoea. Ut hoc quando ipsa mast. sanguin. tali humore aquoso superfluo saturata qua data porta sese exonerat. Ubi ergo hæc ipsa corpuscula, aut ex equitatione nimia, aut ex lapsa, aut ex alia quacunque ratione, erant lacerata, aut distenta, aut alio modo vitata, tunc talis latex mast. sanguin. superfluo per has ipsas prostaticas glandulas, tanquam colatorium excernitur, & ita gonorrhoeam talem notham constituit.

Remotior causa hæret in primis in stomacho, qui non rite digerens alimenta sed hæc ipsa in cremorem aquosum pervertens, exinde vitium sanguinem etiam generare facit unde & talia subjecta ad cachexiam sunt disposita. Aut si non mox in principio resolvatur talis gonorrhoea, postmodum cachexia supervenit.

Ex modo dictis signa tam diagnostica quam prognostica per se patent. Quod attinet curam in hoc affectu, scilicet ad hanc gonorrhoeam, seu superveniens quoddam symptomata minus est dirigenda cura, sed potius prima ratio habenda est stomachi, rehuenda ejusdem digellio, & massæ sanguineæ cruditates emendandæ ac corrigendæ, idque quod superest laticis aquosi per vias urinarias est expurgandum: tunc tandem externis adstringentibus prostaticæ glandulae firmandæ & in tonum naturalem sunt restituendæ. Remedia quæ his satisfaciunt scopis ex illis quæ superius de cachexia diximus petenda: præ cæteris conducunt ex ligno sassafras parata remedia ejusque essentia cum spiritu serpentis parata crebrius & in majori dosi assumpta. Huc & ea quæ ex mentha & abintio parantur, quæ & stomacho & gonorrhoeæ satisfaciunt. Item succinata, in specie sal. volat. quod cachexiam imminuentem subinde prævertit, ciendo potenter urinam.

Inimò observatum fuit acidularum potum, uti in aliis morbis chronicis, ita & in hac gonorrhoea diuturna contulisse; in primis si post hibitas acidulas theriacum externus usus circa partes genitales exhibeatur, pro restaurando tono prostaticarum lesarum: aut etiam balnea alumi.

noia artificialia, aut similia adstringentia externe erunt commodè in ulum vocanda.

Non cito nimis suppressenda est hæc gonorrhœa, quoniam natura abutitur his viis ad evacuandam massam sanguineam; emendetur scilicet prius imminens cachexia & vitium stomachi, & fere semper iponte cessabit gonorrhœa.

Quod attinet gonorrhœam notam malignam hæc est ea quæ ex coitu cum scemina impura, ac lue venerea directè contrahitur. Effluit in hac ipsa liquamen aquosum liquidum absque dolore, hinc successive flavescit, tandem viridescit, magister aciescit, adeo ut tandem non acerbissimo dolore effluat, imo non raro pus ac purulenta sanies simul excernitur, & ipsum semen odore foetido & singulari foetet: nonnunquam talis gonorrhœa accidit illis qui visitant Galliam & Italiam, interdum fit ut nimia aciditate seminis, seu materiæ profluentis, corrodat ac exulceretur meatus urinaris, ex quibus ulcusculis tandem excreseunt carnes sylvestres, ut sic dicam, seu verruca, quæ hinc canalem urinarium obstruunt, & vulgo carunculae meatus urinaris appellantur. Affligit hæc gonorrhœa continuè, in primis, secundum indolem luis venereæ, vel perpetuo aut nocturno tempore cruciat, adeo ut eodem tempore acerbissimi dolores crucient penem, sique eo acerbiores, si forsitan se erigat ac extendat membrum: sin malum ulterius procedat, superveniunt crudeles ardores nocturni laborum.

Causa hujus gonorrhœæ est contagium Gallicum fermentativum, per coitum ex muliere infectatâ attractum, ex tali scilicet quæ ulcuscula gallica in vagina uterina habet. Malum enim profluum est hæc ipsa gonorrhœa gallica; adeo ut referat Bailionus Consilior. lib. 1. cons. 92. de quodam viro qui ex coitu impuro gonorrhœam virulentam contraxit. Unde postmodum non tantum propriam uxorem inquinavit, sed cum eadem filium quoque generavit mox à primo ortu eodem malo affectum.

Subjectum huic gonorrhœæ sunt eadem prostata glandulosa quas modo nominavimus: id quod experientia anatomica confirmatam dedit Bartholinus Cent. 12. Hystor. anatom. 36. ubi aliquot memorantur hac gonorrhœa affecti, & exinde mortui, in quibus prostata glandulosa fuerunt reperta ulcerata. Nam dum hæc ipsæ jam excalescunt in coitu intentius incalescunt, tunc ulcera gallica vaginæ uteri exhalant & exspirant miasmata fermentativa, quæ post excretionem seminis virilis se insinuant in urethram penis ibique se affigunt, & permeatus à modo excreto semine patentes se insinuant in prostata glandulas & sua fermentativa vi corrumpunt successivè lympham in illis prostaticis elaborandam, ut degeneret in aciditatem corrosivam & virulentam seu malignam; sicuti notum est, quod in lue venerea abundet acidum virulentum corrosivum. Unde postmodum talis succus acris & acidus fluens, non tantum corrodit proprias prostata, easque exulcerat, sed etiam meatum urinarium excoriat, & exinde tam dura, & atrocia & dolorifica symptomata post se trahit.

Promotum ulterius & altius serpens contagium, ita ut per vasa deferentia testes ingrediat horum tumorem & dolorificam inflammationem infert.

Diagnos hujus gonorrhœæ ex primo dictis symptomatis patet. Quoad prognosin, quo citius ei occurritur, eo facilius curatur. In senibus ut plurimum ad mortem terminatur. Nisi brevi ipsi occurratur in perfectam luem Gallicam, inquinata massa sanguinea degenerat: ut hic est modus communissimus quo lues venerea contrahitur.

Quod curam attinet; in hac virus Gallicum acidum appropriatis partim mercurialibus, partim acidum destruentibus corrigendum, & quæ data porta evacuandum. Quod si cui libeat præservare se ab hac gonorrhœa, quem nempe vexat appetitus venereus, nec tamen interim certus esse potest, an cum infecta coëtat præservatio nis loco, mox ante, aut post coitum, assumat spir. seu olei terebint. volatilis gut. 6. 7. vel 8. in haustu vini generosi. Hujus enim absterforia vis meatum urinarium abstergit, ac corrigit contagium virulentum forsitan haustum. Quod si vero quis jam infectus sit hoc malo & laboret gonorrhœa, ante omnia præmittendo universalia purgantia mercurialibus mista, succurrendum v. g. Fiant pilule ex extracto ellebor. nigri, aut ex extracto catholico Andernaci cum ana mercurii dulcis his pro stimulo addantur aliquot grana extract. trochiscor. alandhal. Colocynthidis enim efficacia mire commendata est ab Helmontio in cura luis venereæ, prælata usibus liquorum; et in loco mercurii dulcis, mercurius præcipitatus viridis venereus cujus descriptio videatur apud Schroderum cap. de mercurio, commodè usurpatur. Aut pilulis de terebinthina misceatur mercurius: vel fiat bolus ex terebinthina Cypria cum rhabarbore, ac mercuriali remedio dulci, vel alio. Nam licet mercurialia talia in principio videantur augere malum, infidentamen audacter insistendum; cum non detur magis appropriatum remedium contra virulentiam Gallicam. His ipsis commodè subiungatur aqua Quercetani contra gonorrhœam circulent. m, quam se centies expertum esse gloriatur. Vid. etiam Scultetus in Armamentar. Chirurg. obs. 79. qui ipse etiam inclinat hujus aquæ experientiam. Loco hujus aquæ etiam spir. terebint. mistus cum saccharo saturni egregie conducit in hac gonorrhœa, non absumendo semen, ut vulgò putatur, sed absorbendo acidum vitiosum in hac gonorrhœa peccans; quæ ratione etiam camphora conducit, non quod castræt per nates, ut putant, sed tanquam sal volatile oleosum detergit & corrigit acidum venereum. Ex hoc ipso fonte infusum cantharidum in vino expertum est remedium cujusdam medici Belgæ: quatenus cantharides acerrimo sale volatili abundant. Vid. Bartholinus Cent. 4. Epist. pag. 344.

Decocta lignorum, essentias lignorum ceteri per se notas, & ad luem veneream, & ejus prodromum gonorrhœam commendatissimas siccæ pedepatere. Fractura corallior. cum spir. lignorum parata est egregia, sed crebrius usurpanda gummi guajacum appropriatissimum est remedium ad hanc gonorrhœam. Commendatur sal ammoniacum, essent. aut extract. gummi. guajac. parat. cum sp. vini tartarifato & in aqua plantag. propinat. Nam in gummi guajac. hoc perfectum consistit cura gonorrhœæ malignæ. Aliæ etiam balsamum de Cobayva ex fida Belgarum experien-

experientia ad gut. 5. vel 6. propinatum singu-
laritas laudatur. Antimon. diaphoretic. be-
zoartic. murex. ac similia etiam laudantur; item
succum limonum cum spir. terebinth. & cam-
phora ex Fabro jam proposui? uti succum. expe-
rimentum videre est in Sculteto obs. 79. Arma-
ment. Chirurg. Bartholinus loco citato refert
curam gonorrhœæ virulentæ per pulverem sym-
patheticum, id quod eatenus verum est quate-
nus eo processit exulceratio prostaticorum, ut
corrosis vasis sanguis quoque effluat.

Quod si fiat, ut sæpius etiam fit, exulcera-
tio meatus urinarii, tunc etiam conducunt in-
jectiones in panem, quæ fiunt ex succo plantagi-
nis cum melle rosato, quæ diluantur aqua ap-
propriata, ipsique pro re nata additur mercuri-
us dulcis & aloë rosata: aut si altius proces-
serit malum, injectiones aloëticæ cum modico,
mercurij præcipitati, aut etiam ubi ferocius
fuerit malum, cum mercurio sublimato erunt
instituendæ. Singulare experimentum cujusdam
Medici est aqua mercurialis hermetica: scilicet
accipit mercurium vivum, coquit in aqua com-
muni per sex horas, decantat aquam & rema-
net mercurius in eodem plane pondere quo fue-
rat ante ebullitionem, & aquæ hujus singulo
mane proponat bonani haustum: Unde succes-
sive sedatur gonorrhœa virulenta. *Michael Eu-*
mullerum in Collegio Practico.

In gonorrhœa ℞. Resin. jalapp. scammon. an.
gr. vi. mercur. dulc. gr. xii. succ. liquir. ʒj. olei
lign. guajac. rectif. gutt. 2. M. F. pilulæ nu-
mer. vii.

Vel ℞. Extract. diacathol. ʒß. mercur.
dulc. gr. xv. olei lign. sassafr. gutt. iij. & F. pi-
lulæ num. vii.

Seu ℞. Confect. Hamech. ʒj. pulver. rha-
barb. ʒß. oculor. cancri ʒj. M. F. bolus.

Vel ℞. Pulp. cassiæ ʒj. resin. turbit. gran.
viii. terebinth. Venetæ ʒij. M. F. bolus.

In India ℞. Conserv. flor. cassiæ, tamarini-
dor. an. ʒj. resin. turbit. gr. xii. mercur. dulc.
gr. x. olei ligni ebeni rectificati gutt. 5. M. F.
bolus.

Vel ℞. Pulp. cassiæ conserv. flor. cassiæ an.
ʒß. resin. scammon. turbit. an. gr. v. gumm.
elem. liquid. ʒj. mercur. dulc. gr. xii. M. F. bo-
lus. Qui boli quolibet septimana semel exhi-
beantur. Interim ex sequentibus unum his per
diem in emulsione quadam, vel appropriato ve-
hiculo, usurpatur.

℞. Bals. sulph. simpl. ʒj. dos. à gutt. x. ad xii.

℞. Bals. sulphur. succin. ʒß. dos. à gutt. vi
ad viii.

℞. Bals. sulphur. juniperini ʒß. dos. à gutt.
vi. ad gutt. xii.

℞. Spir. vini terebinthinati ʒj. dos. à gutt.
x. ad xii.

℞. Spir. vini succinati ʒj. Dos. à gutt. xv.
ad xx.

℞. Tinctur. succini & tinctur. tartar. anti-
moniatæ an. ʒß. M. dos. à gutt. x. ad xx. Ad ar-
dorem urinæ ab ejus acrimoniæ, spiritus salis
per diem bis usurpatus, ægrotum felicissimè ad-
juvat. In India.

℞. Olei still. gumm. elemi ʒj. dos. à gutt. x.
ad xii.

℞. Olei baccar. cinnam. ʒj. dos. à gutt. v.
ad x.

℞. Bals. sulph. elemiati ʒj. dos. à gutt. 8. ad xii.
℞. Spir. vini elemiati ʒj. essent. juniperi ʒß.
M. dos. à gutt. x. ad xv. cui boli magis placent
potest usurpare sequentes.

℞. Conserv. rosar. ʒj. flor. hyperit. ʒß. pulp.
c. stiz ʒul. terebinth. Venetæ ʒij. tart. vitriol ʒß.
oculor. cancr. ʒj. tinctur. succin. ʒß. M. F. bolus
dos. ʒj. mane & vespert. In India.

℞. Conserv. lion. cassiæ ʒj. pulp. cassiæ ʒß. la-
pid. pessar. præp. m. tris perlar. præpar. an. ʒj.
pulver. liquirit. ʒi ʒ. olei gumm. elemi ʒß. M.
F. bolus dos. ʒj. emulsionem hanc tales.

℞. Sem. 4. frig. maj. an. ʒj. amygdalarum
dulcium ʒj. aq. hord. rosar. an. ʒiv. t. emulsiot
huic adde aquæ petroselin. portul. an. ʒij. sal.
oculor. cancr. ʒß. syr. liquirit. q. s. m. Ægroti
juxta præscriptum modum tractato, curationi
tandem finis per sequentes pillulæ, pro valetu-
dine plenario restituenda, imponendus est.

℞. Terebinth. Venetæ in aq. rosar. lotz & in
eadem ad justam consistentiam coctæ ʒj. ball.
Peruvian. ʒß. pulver. rad. tormentil. con. olid. an.
ʒj. oculor. cancr. præp. mercur. dulc. an. ʒß. M. F.
massa pilularis. Dos. mane & vespert. ʒß.

℞. Terebinth. Cypriæ in aq. plantag. lotz &
ad justam consistentiam coctæ ʒj. ball. copaiva
ʒi ʒ. resin. guajac. ʒß. pulver. liquir. torment.
rhabarb. an. ʒj. cortic. guajac. pulver. sangui-
dracon. lapid. hamat. an. ʒß. M. F. massa pilu-
laris dos. ʒj. in die.

℞. Specier. diarnartis ʒij. conserv. rosar. ʒij.
m. dos. ʒj. ad ʒij. mane & vespert.

Vel ℞. Conserv. rosar. flor. cassiæ an. ʒj. psslv.
ad gonorrhœam ʒij. m. dos. ʒij. mane & vespert.
Si autem defluens materia coagulatione indura-
ta dolores creat in viis, & ulcerum atque car-
runcularum capsula est: illa frequenti decoctionum,
quæ ex abstergentibus & emollientibus, sine ad-
stringentibus consistunt, injectione abluitur
Herman. Nicol. Grimm. compendii Med. Chym. lib. 3.

In principio Gonorrhœæ laborandum ut fer-
mentum illud peregrinum, acre corrosivum,
per contagium contractum, expellatur vel sus-
tinetur, antequam sanguinis materiam aggre-
di, eamque malignitate sua inficere queat.
Quod potissimum fit per purgantis sudorificæ
diuretica & acre fermentum enervantia.

℞. Extract. cathol. ʒj. mercurii dulcis gr.
viii. Trochisc. alhandal. gr. iv. olei juniperi,
gut. v. m. F. pilulæ num. vii.

Vel, ℞. Pulp. crassiæ recent. extract. ʒj. te-
rebint. venet. lotz, ʒij. mercurii dulcis, salis
prunellæ, ocul. cancr. præparat. an. ʒj. salis
vol. succin. ʒiv. syr. de althæa Fernel. q. s. ad
form. conditi. m. F. conditum, multi curantur
hoc condito in principio, & hujus capiat æger
ad magnitudinem nucis moschatæ, bis terve
de die.

Corpore purgato, ad diuretica festinandum,
ut venenum per eadem expellatur, per quas
admissum est vias, ut

℞. Tinct. vermium majalium cum alkali
tartari præparatæ, à gutt. x. ad vv. in aq. pe-
troselina, vel vino propinentur m. F. haustus
diureticus, quod si vero post exhibitionem hu-
jus tincturæ, æger conquærat de intolerabili
stranguria, hanc facile superaveris, exhibendo
patienti, lac tepidum saccharatum; vel emul-
sionem ex semilibus frigidis; addito sem. pa-
paveri

paveris, temperatoque cum syr. de althea Fer-
nel.

Ad venenum expellendum multum conducit
aqua quercetorii in gonorrhœa.

Vel, ℞. Olei succini, gut. x. terebint. lu-
cid. gut. v. balsami peruviani, gut. 3. dentur ex
vino calido saccharato, m. f. haustus diure-
ticus.

Balsamum cobaiba non tantum educit vene-
num, sed postmodum consolidat, & adstrin-
git, hujus balsami dosis à gut. x. ad xv. exhi-
beantur cum potu calido.

Præ cæteris balsamum sulphuris antimonii
therebintinatum quod sequenti modo sulphure
antimonii impregnatur.

℞. Scoriarum antimonii in confectione re-
guli simplici provenientium q. p. his affunde
olei terebintinæ lucidi ad emin. trium digit.
transversor, stent in digestionem, donec oleum
terebintinæ sanguineum extraxerit tincturam,
cujus dosis est à gut. v. ad x. in vehiculo con-
venienti.

Ad evitandum, ne contagium aliquam mate-
riæ nostri sanguinis imprimat labem, & ulterius
serpendo glandulas inguinales inficiat, præscri-
batur sequens sudoriferum,

℞. Resin. ligni guajaci, aut ejus loci gummi
3j. dissolvatur in f. q. sp. vini. m. f. haustus præ-
servans una dosi exhibendus.

Vel, ℞. Theriac. venet. 3j. ocul. cancr. præ-
parat. 3j. salis volatilis succin. gr. xv. campho-
ræ, gr. 3. olei juniperi gut. v. m. f. bolus præser-
vans.

Si vero malum vel diuturna mora, vel activi-
tate sui veneni testes, vel glandulas inguinales
prehenderit, vel urethram eroderit, vel ulcera
maligna circum glandem excitaverit, pro ra-
tione loci & veneni, medicamenta sequentia
applicentur.

In inflammatione testium.

Si testes inflammentur & tumeant, præpara-
tur sequens focus ad inflammationem auferen-
dam.

℞. Lithargiri auri, 3iv. flor. sambuci, rosar.
pallidor. m. ij. coq. ex f. q. aq. & vini & aceti,
an. m. f. Forus, calideque applicetur. Majoris
discussionis gratia, si opus fuerit, nobilitari hæc
focus poterit cum spiritu vini camphorato.

Inflammatione sedata, postmodum tumori
& duritiei obviam eatur partem affectam balsa-
mi sulphuris succinato calide inungendo, appli-
cando postmodum, emplastrum diasulphuris
Rulandi, cujus præparationem vide in empyri-
ca Rulandi.

Vel, ℞. Scoriarum reguli antimonii simpl.
q. p. terantur in pulverem antequam humido
aëris insinuantur, usque affunde olei succini, te-
rebint. an. q. f. ad eminentiam duorum digito-
rum transversorum, digerantur ut artis est. Fiat-
que balsamum magnarum virium, in tumoribus
duris emolliendis.

In Bubonibus.

Bubones si in inguine appareant, exploran-
dum primo, utrum discuti queant absque supe-
ratione, illis applicando.

Emplastrum de ranis cum triplicato vel quadru- plicato mercurio.

Quod si æger conqueratur de pustulis cutis,
hoc cum emplastro miscetur pauxillum sac-
chari saturni, quo mediante prædictum hoc in-
commodum evitabis.

Vel, ℞. Mercurii vivi cum aq. fort. 3viii.
soluti, 3iv. axung. porcine, 3viii. coq. simul in
fistili vase, continuo spatula lignea movendo,
donec inspissari incipiant; mattemque obtine-
bis mollem, adde cer. flavæ, 3ij. mastich. oli-
bani, an. 3vi. m. f. emplastrum discutiens.

Vel, ℞. Lithargiri auri sub. pulv. q. p. huic
affundo aceti stillatic. q. f. coq. simul, donec
acetum de acrimonia sua remiserit, & dulce-
dinem saccharinam acquesiverit, ultra.

℞. Hujus solutionis, 3vi. mercurii præpa-
rati albi vulg. 3ij. lento igne evaporentur ad
siccitatem pulveris.

℞. Hujus pulvi 3j m. f. unguentum discuti-
ens tophis, glandulisque induratis applican-
dum.

Quod si bubonum discussio ex voto non suc-
cedat, ad maturationem festinandum cataplas-
matis ordinariis, vel emplastro diachulo sim-
plici, ulcus porro aperiendo, mundificando &
emplastro opodeldo consolidando.

In ulcere urethrae.

Urethra si ab acri & corrosivo sale corrodatur,
intollerabilis oritur dolor, ubi urinæ red-
dendæ sunt; acre enim sal urinæ transiens, lo-
cum erodum, hunc infestissime mordicat, & pun-
git, per seringam itaque hæc injectio talis

℞. Lactis tepidæ, vel aquæ rosarum 3ij. sac-
char. saturni, 3i β. m. f. injectio anodina.

Vel, ℞. Balsami saturni rubicund. gut. xx.
aquæ ros. vel lactis tepidæ, 3β. m. f. injectio
anodina, quæ continuatur, donec pars erosa
consolidata fuerit, sed cum à præterfluente uri-
na curatio valde retardetur, patiens, dum ipsi
inungendum erit, fistulam argenteam, oleo oli-
varum illitam, in urethram introducat, ut hujus
beneficio præcaveatur, quo minus urina locum
affectum attingere queat.

Ulcus, si se manifestaverit, mundificetur se-
quenti

℞. Vitelli ovi, ad duritiem cocti, nu. i. mell.
optimi, 3j. misceantur exacte terend. cum pi-
stillo, donec obtineas colorem spadicium, adde
mercurii sublim. 3ij. vel 3j. m. f. mundificati-
vum.

Sæpius ulcus tangatur oleo ligni guajaci me-
diante candela cerea.

Quod si summe pertinax fuerit, neque ordi-
nariis cedat remediis, tangatur oleo uriginis,
de quo vide Hartmannum in praxi sua chymica,
capite de gonorrhœa, vel aqua forti, & postmo-
dum aqua tepida eluatur, & cicatrifetur, cum
prædicta oleo guajaco.

Virus ubi expurgatum est, fluxus seminis
sponte sedari solet, quod si vero ex debili-
tate vasorum, vel erosionem nimia, ex voto
medici hoc non succedat, adstringentia, &
confortantia sunt utenda, ut.

℞. Trochisc. de terra sigill. 3j. corall. rubr.
præ-

præparat. ʒʒ. Terebint. cum aq. plant. lata, ʒvi. M. f. pilulæ inftar pilorum, quarum pro dosi v. vel vi. dentur mane & vesperi.

Vel, ʒ. Vini rubelli. aq. sulphur. vel consolid. major. ana ʒv. In quibus infunde per noctem fol. schordei, m. j. cort. granatorum, Bacc. juniperi, ana ʒiʒ. Boli armen. ʒʒ. Mane leviter ebulliant, & colentur, & post unam redditam. fiat injectio per seringam.

Vel, ʒ. Sem. alkekengi, ʒij. quatuor frig. major. p. pap. alb. lactuca, plantaginis, ana ʒj. agni casti, ʒj. Rhabarb. electi, ʒʒ. malliches, ʒij. boli armen. Gummi arabici, Succini albi, Gummi tragacant. Amyli, ana ʒij. ros. rub ʒj. Terebint. q. l. pro materia pilularum. M. f. pilulæ, dosi a ʒi ad ʒij.

In ulceribus malignis glandis.

Ulcuscula maligna si glandam infestent, ordinaria que medendi methodum respiciant, medeunt aqua sequenti,

ʒ. aq. vulgar. q. p. ebullit in lebetæ ærio, in ea dissolve calceis vivæ parvi, adde vitrioli hungar. tantum. ut coarulescat solutio, si cretur. M. f. fofus, & repide applicandus. ad hoc suum confert aqua divina Ferreli, vel

ʒ. lactis virgin. q. p. in eaque solvatur, Mercurii sublimati paulillum M. f. liquor, quocum tanguntur ulcera maligna sapius.

Vel Axung. porcum q. p. quocum misce olei tartari per deliq. tantum, donec obtineas unguentum acre, cui si tandem non auscultent Loco olei tartari per deliq. misceatur oleum vitrioli. M. f. linia entum mundificativum.

Mercurius dulcis, ut & turbiti minerale, mixta cum unguento convenienti non inferiores hic obtineant. *Anonymus Traxeos chymica rationalis cap. 25.*

Consultationes.

Pro Juvene Perillustri, & Nobilissimo Gonorrhœam patiente.

Quod perillustri, & Nobilissimo Juvenis detineatur gonorrhœa, jam omnibus est perceptum, quæ nil aliud est quam involuntarius seminis exitus. Verum quoniam quandoque semen purum, quandoque mixtum cum aliis humoribus excreatur, in casu nostro mixtum cum bile semen exire, color flavus exeat, indicat sed an huic fluori conjuncta sit aliqua malities venerea merito dubitari potest, & pro utraque parte rationes non desunt. Primum quidem pro parte affirmativa est ratio desumpta ex commercio, quod habuit cum pluribus sceminis suspectis, pro parte verò negativa est ratio desumpta ex consequentibus hunc fluorem solent enim alia symptomata, ubi est adjuncta malities venerea, fluorem subsequi, quorum nullum observatur in Juvene Nobilissimo. Ex quibus utraque pars sustineri posse videtur.

Verum quamquam symptomata alia non appareant, dicerem hoc evenire posse, quia malum est in principio, & utinam non superveniant, nam ut verum fatear ego quasi certus sum de infectione, & eo magis quia novi patientem ul-

timo rem habuisse cum muliere luc illa venerea obruta & infecta.

Jan igitur causæ hujus floris sunt ad eandem, qui nunc quoniam est symptoma secundarium necessario in aliquam actionem latam refertur, hæc autem nulla alia esse potest, nisi retentio vasorum seminalium, quæ cum possit ladi, vel per se, vel ex accidenti per se quidem vitiatæ valis seminalis, ex accidenti vero irritata facultate expultrice ob seminis a. rediunem, quam accedere puto ex dicta bilis cum semine admixtione, atque forsan à luc illa venerea sanguinem, & semen inficienribus.

Sed ut ut seminalium vasorum dilatatio aliqua conjugatur, jure quæreret aliquis, cui ego responderem, in hujusmodi vitio fere semper aliquam vasorum dilationem conjugari, vix enim fieri potest, ut fluor prædictus aliquot diebus perduret, nisi aliqua vasorum relaxatio, ac aperto suboriantur.

Quare ex dictis patet ad medicum attinere seminis acredinem removere per evacuantia, & attemperantia, atque etiam materiam prædictam retrahere, & si aliqua adsit qualitas venetica, eandem propriis alexipharmacis domare; Amplius oportebit vasamina dilata contrahere, maximeque viribus prospicere.

Quare omnia ardua erunt, ac difficilia, quoniam factus est satis progressus, & suspicio non levis occurrit venereæ infectionis, ut ex hac immineat etiam defluvium capillorum. Danda tamen erit opera, ut quamprimum affectui præsentis, & huic imminenti, & aliis quamplurimum hunc subsequi solitis occurratur.

Ideo lenita alvo venam cubiti secare, & si opus fuerit cucurbitulas natibus cum scarificatione adhibere oportebit.

De pharmacis ita decerno, ut quæ citò leniatur alvus cum Diasebelsten lenitivo, vel Diacalia cum manna. deinde præparentur humiores decocto endiviæ, sonch. acetosæ, plantaginis, & coriandrorum præparatorum cum syrupis accommodatis, postea deturbentur, cum diaprino lenitivo, & ab hac purgatione uteretur ego sero calyce. to cum succo acetosæ, vel themis frigidis, postquam ubi saccharum rotatum antiquum cum pulvere corallinorum, lemmum cannabis, coriandrorum præparatorum, plantaginis, & similium propinare. Sed præter hæc si suspicio luis venereæ præsens erit, nil præstantius decocto salis, & cluæ esse poterit.

Externis autem convenit unguentum Comitæ, infrigidans Galeni, Renibus adhibitum.

Quibus tandem addendus est victus accommodatus, qui erit, ut patiens degat in aëre temperato, vescatur prisana, lacte seminum melonis, & cannabis, carnibus optimis in aqua calyceata decoctis, ovis. piscibus petrosis, oleribus refrigerantibus, & utatur vino paucifero, vel aqua diluto, quod magis expediet, si sandalis, salis, itemque china medicabitur, somnus sit longior vigilia, alvus proprium officium exerceat adjuncta si opus fuerit, clysteribus emollientibus, ac refrigerantibus, demumque animi, & corporis quies imperetur. in quibus omnibus ad majorem efficaciam a D O M auxilium implorandum est. *Julius Caesar Claudius in Consultationibus Medicinal.*

rubro gallico ad lib. j. cum sacchar. q. s. Et fiat Apozema, de quo sumat haustum. *§vi.* omni mane & vespera.

Et inungatur regio lumborum & perinæ, inter scrotum & anum, hoc unguento.

℞. Ol. mastichini *℥j.* rutacei, menthacei an. *℥ii.* Sem. agni casti, urticæ, rutæ an. *℥j.* Menthæ, cariophyll. an. *℥ss.* cera q. s. Pulverisatis pulverisandis. F. Unguentum.

Postea utatur dragma una sequentis pulveris, cum haustu vini rubri, vel cum lacte, cubitum iturus.

℞. Gland. quercus in furno exsiccatarum *℥vi.* Sacch. ros. tabellati *℥i.* mastiches, thuris an. *℥i.* Sem. cortand. *℥ss.* succini *℥j.* Viticis, fol. menth. an. *℥i.* Oculor. cancri *℥i.* f. Pulvis subtilissimus.

Si hæc & similia parum juvent, poterit per cauterium potentiale fonticulus excitari in utraque tibia, paulo infra poplitem, in paribus internis, ad humores puritulosos, cum materia seminis ad genitales partes fluentes, easque nimis laxantes, alia deducendum.

In dicta alimenta sint exsiccantia & calefacientia, & frequens oris usus. *Henric. Regius apud Theodor. Craanen Medicationum lib. 3.*

De Gonorrhœa virulenta, & Ulcere præputii meatusque urinarii.

Juvenis 30. annorum, jam à quatuordecim diebus patitur fluxum à tera cujusdam purulentæ & foetidæ, ex meatu ejus urinario perpetuo fere effluentis, & induratum ipsum cominulantis. Ardor in fine mictionis adest immensus, præputiumque ipsius extrinsecus est exulceratum. Hæc omnia præcessit coitus, cum femina non satis pudica aliquoties peractus.

Morbus, quo æger hic laborat est intemperies prostatica, & forsitan etiam vicinarum partium, maligna contagiosa, acris, & nimis laxa & rara; cum urethræ ulcere & præputii externa exulceratione conjuncta: quæ perpetuum fere materiam purulentæ & foetidæ ex urethra effluxum, urinæque, ab ejus excretionem, ardorem producat, vulgo Gonorrhœa virulenta appellari solet.

Morbus hic originem duxit à coitu, cum femina in pudica & impura aliquoties instituta. Inde enim, per contactum partium genitalium, maligna interperies laborantium, partes genitales hujus ægri, & in his præcipue prostaticæ, similem interperiem pravam contraxerunt. Eaque humores, ad alituram & semini generationem eo propulsi, in materiam purulentam & foetidam convertit. Hi vero prostaticas laxantes & acrimonia sua vellicantes, urethramque cum præputio erodentes & exulcerantes, partesque illas ad excretionem perpetuo stimulant, perpetuum materiam purulentæ & foetidæ ex urethra profluvium, urinæque magnum, ab ejus excretionem, ardoris, vel potius acrimoniæ, sensum producant.

Morbus hic periculosus est: cum luem veneream & carunculam in meatu urinario, producere possit.

Curatio itaque prudenter instituenda: quæ in interperiei per contraria correctione, & ulcerum inundatione, consolidatione, consistet.

Primo itaque talibus purgetur bolis.

℞. Rabarbari pulv. *℥i.* Terebintina venetæ *℥iii.* Cassia recens extracta *℥ss.* Mucil. Boli mane & jejuno sumendi cum nebula; qui subinde reiterari poterunt.

Postea mane, & vesperi circa horam 4. sumat cum lacte trochilorum alkekengi purv. *℥i.* continuando per aliquot dies.

Si malum perseveret, utatur bis in die, de hoc decocto, haustu *℥iii.*

℞. Rad. petroleum *℥i.* althææ *℥i.* *℥.* Liquiritiæ, consolida an. *℥ii.* Bistortæ *℥ss.* Herba pl. utag. alchamillæ an. m. a. Flor. naly. arborescentis p. i. Sem. lini, cydonior. an. *℥ii.* glandium *℥i.* Nuculor. perlicor. *℥ss.* Decoq. in aqua hord. q. s. ad lib. ii. & coeantur ad usum.

Quamvis utitur, in penem prius o. c. lis fiat injectio detergens, tyng. m. i. c. e. n. d. a.

℞. Lithargyr. argenti. ceruæ, tuthiæ præpar. an. *℥i.* Sacchari candi *℥ss.* camphora *℥ss.* aluminis *℥i.* Aq. rosar. plantag. an. *℥v.* Mille.

Postea ad cicatricem inducendam, tali injectione utendum.

℞. Trochiscor. alb. Rhasis *℥ss.* Boli armen. *℥ss.* Aq. rosar. plantag. an. *℥iv.*

Uicri in glande adhibeatur hoc Unguentum

℞. Candelæ fossilis, sive lepid. cal. maris. *℥ss.* Sulphuris, argenti vivi an. *℥i.* Cuni terebintinu. nasceantur in formam. Unguenti, addendo parum exungie porci.

Si malum pertinacius perseveraret, *℥i.* vel *℥ss.* sumatur quotidie de hoc pulvere cum lacte.

℞. Rabarbari opt. myrobalanor. citri Mercurii dulcis an. *℥i.* f. Pulvis.

℞. Coralli rubri præp. succini an. *℥ss.* camphoræ gr. v. Terræ lemniæ veræ *℥ii.* naccis nasceantur *℥i.* f. f. art. Pulvis subtilis.

Vicius ratio, hic intuituenda humorum acrimoniam obtundat. Propterea utilis est ptis. hordeacea cum an. ygdaalis dulcibus & q. sem. frig. majoribus. Utatur frequenter o. y. z. & lacte. Vitentur acida, salia, acida, & diuturna. *Idem ibidem.*

De Hypersarcosi.

Juvenis 27. annorum, postquam per aliquot menses gonorrhœa virulenta, admodum acris & mordaci, ex coitu cum impuro scorto peractio nata, laborasset; ab ea liberatus coepit laborare magna viruæ difficultate, ita ut ea aliquando penitus supprimatur, nonnunquam paulatim & guttatim magno cum urethræ ardore & dolore emittatur. Inani illa in eam c. n. dela cerea libere non transit, sed in medio meatus urinarii impedimentum invenit, quod tamen paulo fortiore ejus pressione cedit.

Afficitur in hoc agro media pars meatus urinarii in penem; quod ex urina & candela teret immixta impedimento, & magno urinæ excretionis ardore ac dolore, in eo ibi percepto, patet.

Morbus, quo hic æger laborat, est oblitusio meatus urinarii, orta à caruncula in media urethra nata; urinæ justam excretionem impediens; magnamque dysuriam inferens.

Hæc cum à gonorrhœa virulenta, ex impura Venere contracta, & carunculam in urethra

penis producente, sit profecta, græce Hyperfarcosis Urethræ Venerea, & latine Caruncula in meatu urinario, à causa proxima & parte affecta, appellari solet.

Causa procatartica hujus morbi est coitus, cum impuro scorto ab hoc juvene aliquando peractus, quo ejus partes genitales per contactum pravam intemperiem contraxerunt, indeque succus seminalis & alimentarius in eis corruptus antecedentem huic morbo præbuit causam. Pars vero ejus ad prostates delata, ibique in liquorem virulentum acrem & mordacem conversa, antehac suo profluvio gonorrhœam virulentam aliquot menses durantem, & postea acrimonia sua urethram erodens, primo ibi ulcus, & deinde poros ibidem vitans, & nimis laxans, carnem nimis laxam & copiosam sive hyperfarcosin, meatum urinam obstruentem, in urethra genuit, eaque ibi ita genita proxima & continens hujus obstructionis Urethræ, symptomatumque, inde sequentium, nempe urinæ modo suppressæ, modo guttatam cum magno dolore & ardore effluentis, est causa.

Morbus hic periculosissimus est, difficillimæque curationis; propterea quod sit in loco valde angusto, acutissimoque sensu prædito; ad quem remedia difficillime applicari, & applicata ægerrime ferri possunt; atque i deo sæpe per totam vitam durare solet. Sæpe etiam, urinam penitus sufflaminando, mortem inducit. Non tamen de sanatione desperandum censeo; quia hoc malum est recens, caruncula est non mollis, non callosa, sed pressioni fortiori candellæ immixtæ cedens.

Curatio itaque diligentissima hic est adhibenda. Eaque primo in carunculæ extirpatione & consumptione, & deinde in ulceris, post carunculam ablata reliqui, exiccatione & cicatrizatione consistet.

Quæ ut recte peragantur primo æger noster blando hoc medicamento purgetur.

℞. Electuarii lenitivi, Cassiæ recent. extract. an. ʒss. Dissolve in f. q. aq. hordei, & f. Haustus brevis.

Potridie venæsectio instituatur ad uncias sex.

His peractis, adhibeatur carunculæ in meatu urinario cannula lintea, intus cera alba & foris sequenti erodente linimento oblita, transversum digitum longa, & jussu cavitatis latitudine prædita, longoque filo appendente transfixa. Medicamentum illud tale erit ex gr.

℞. Mellis in cineres usti, Turhæ præp. Butyri recent. in aq. plantag. loti. Terebinth. similiter lotæ, Cera flavæ. an. ʒss. Aluminis usti ʒss. Misce F. Linimentum.

Hoc crebrâ experientia teste, carunculas meatus urinarii, absque dolore, & sanarum partium excoaratione, consumit.

Quidam hoc experimentum summis laudibus extollunt.

℞. Pulv. argenti viv. Merc. præcipit. Viridis æris Antimonii crudi an. ʒiii. Cera albæ ʒi. Misce f. a. in mortario plumbeo ad formam unguenti.

Cannula igitur, cujus jam memini, ubi uno ex his medicamentis foris fuerit oblita, stylo, extra fistulam argenteam ad digitum transversum longitudinem prominenti, adpreetur, at-

que una cum argentea fistula & stylo inserto, in urinarium canalem immittatur, donec occurrat caruncula, & cum jam est in loco carunculæ, primum stylus & deinde argentea fistula extrahatur; quo fiet ut cannula, ex linteo cera inducto parata & immixta, relinquatur in meatu urinario, ut per eam urina excernatur, eaque simul prohibeat, ne medicamentum, carunculæ adnotum, ab urina elui possit.

Cum volumus renovare n. medicamentum post unum vel alterum diem, tum ope affixi & propendentis huius cannula extrahenda est, aliaque modo jam explicato adhibenda.

Vel extirpatio carunculæ institui potest sequente unguento, quo extremitas candellæ cereæ inungitur, eaque ad partem affectam per urethram immittitur, ibique noctu diuque relinquatur; & cum mejendi est prius, extrahitur, & postea rursus adhibetur.

℞. Præcipitati ʒii. unguenti de cerussa ʒi. Misce. quibus pro magnitudine affectus aliquid olei vitrioli addi potest.

Consumta carunculâ, quod ex facili & libera urinæ excretionem deprehenditur, ulcus erit exsicccandum, & cicatrice obducendum tali medicamento.

℞. Butyri recentis ʒii. cerussæ lotæ in aq. ros. ʒi. Camphoræ ʒi. cera parum F. Unguentum, quod candela cerea immixta loco affecto adhibetur.

Vel ℞. Aq. fabrilis lib. ss. Nucum cupressi, Gallæ, Cort. mali granati an. ʒi. Alumin. rocha ʒss. Bulliant omnia.

Ex hoc decocto tepido fiant injectiones in meatum urinarium syringa, donec ulcera sanentur.

Vicius ratio hic exsiccet, & humorum acrimoniæ etiam obtundat: propterea convenit pituitosa hordeacea cum amygdalis dulcibus & 4. sem. frig. major. Utatur quoque frequenter oriza & lacte. Vitentur acrida, salia, & acida, atque etiam diuretica. *Idem ibidem*

Observationes.

Gonorrhœa Virulenta.

Nobilis mulier à marito inita, qui cum prostibulo in puro concubuerat, inquinatur: hinc gonorrhœa virulenta male fluorem muliebrem representans. Quæ excernuntur, cum virore pallescent. Jam fluxus ille per annos perseveraverat, illam à variis morbis vindicans. Tamen propter contagionem massæque sanguinis labem valetudinaria est; quoniam credo, non satis largiter virulentur ille humor decurrit. Menses plene subsistunt. Atque hinc illinc metus ingruit quidam. Num si supprimatur illud *Agrippæ* & virulentum, perniciës consequetur? si non fluat tamen suo exitu commoditatem affert, siquidem in maciem ita laborantem conjiciet? Quod plerisque usu venit; siquidem non potest non afficere partes per quas traducitur ineunte vere quo præsertim tempore omnia repuerascunt, summam in renibus gravitatem sensit. Dejectur appetentia: languet: munia non obit sua: Dolores in ventro excitantur toto. Quo medicamento ex orbeo & syrupo laxativo sæpe adju-

ta fuerat, eodem occurrat: malum recrudescit. Tandem diu noctuque ita vexatur, ut ferendo non sit. Pullus languidus & sepultus: facultatum omnium fere concussio, ac maxime vitalis. Sursum deorsum fertur materia. Quæritur quid sit opus. Sensim atque sensim crescent dolores pungentes & ferientes, divellentisque membranas. Dolor turgens est, & quem Galenus describit lib. 3. de locis aff. i. c. in partibus quibundam sentitur dolor veluti a remota alia parte velut radice derivatus; quod notandum est, falso credunt colicam esse doloem; proptereaque, ut fere sit, liberales nos esse debere in usu rerum calidarum: imo t. li. usû ægrescebat magis; in eam sententiam ventum est, ut crederemus in provocando illo fluore incumbendum esse alioqui frustra operam dætuos. Atque ita provisum est. Primum is elixir injectus.

℞. Maluz bisinal. artemisiz, an. m. j. sem. pæoniz rubeniz rubentis ꝑ. j. agripalmæ p. i. rad. petrosel. asparagi an. ꝑ. j. sem. lini, foenugr. an. ꝑ. j. fiat decoct. in colat. dissol. terebinth. ꝑ. j. sacchar. rub. ꝑ. j. olei liliorum Eodem die excitatus vomitus materiei virulentæ & ejus quæ olim per inferiora ferebatur: Non a ventriculo erat, sed ab jecinore & regione Renum, ut conjecturis deprehendebatur. Quæstio an esset sistendus an juvandus. Non placuit juvare, ne materiam quæ per inferiora moveri deberet, aliorum revelleremus. Virgentibus doloribus coacti sumus adhibere balneum, uti sacco amygdalar. dulc. cum vino Hippocræ. Cessabant istam dolores: balneo egesta redibant. Secta vena in malleolo, adhibiti pessi ex hiera dicolocynt. Pulvere hieræ & galyops addita styrace liquida: & involuti sunt tantalo. Deinde pilulis de hiera cum agarico & rheo consultum est. Tandem repetiti clysteres primo similes. Et præscriptus bolus sequens post balnea.

℞. Terebinth. venetæ ꝑ. iii. rheih. ꝑ. i. cum syrup. capill. ven. capiat. Secta vena in brachio ob turgentem in lumbis dolorem. Applicatæ cruribus cucurbitule. Tandem ad decoctum laseparillæ ventum est ad proliciendos sudores. Provocati sunt atque ita admodum satentes. utcumque convaluit. *Ballonius Consilior. medior. lib. i.*

Mercator quidam una muliere non contentus, quantum licuit libidinose vixit: & cum prostibolis versatus, inquinatus est; unde & gonorrhœa & ulcuscula cacoethica in pudendo manaverunt: Tamen sibi præcavens advocato Medicorum consilio; in luem non incidit. Sed cum rem leviculam putaret, semine illius virulenta gonorrhœa intempestivius suppressa redidivo, sensit dolorem æternum in spina, & lumborum regione imo in pene ulcuscula repullulant, statimque evanescunt difficultatem spirandi nonnullam habet. *emero.* est, macrescit in dies, dolet totam spinam, & lumbos. Initio consilio dictum est id totum esse a reliquis istius virulentia: quæ sensim vires acquirit: imo & rudimentum esse illius affectionis quam Hippocrates in libris de morbis libem ex dorso vocavit. Itaque tamen ad oppugnandam vim morbi valerit usus gajaci, tamen de macie erat verendum. Itaque creditur satius corpus reficere, & interea non esse

alienum ut interponeretur usus hydropicorum temperatorum ut non prolixi esset sudores, sed ut potius sensim humores deticerent, & maligna qualitas emendetur. Conium hæc sunt capita.

Bis hebdomade injiciatur clyster emolliens & detergens. Imo quodque tempore statim bolo cum terebinth. Apiciatur basilica dextri brachii ad tria vascula.

Utatur semel panis terebinth. cum syrupo de althæa. Pancha autem sit quantitas, ne hinc alius solvatur, sed tantum ut vasa minida fiant.

Linatui frequenter pma oleo masticæ, cytonio, rosæ, & cætero. Deinde utatur lacte asinino per dies viginti continuos.

In partibus decocto laseparillæ diluto factis idque cum pilulis. Tandem cum renutritus fuerit, ad decoctum rhinæ, & laseparillæ minime dilatum adducetur, si semen mali longius dissiminetur. Et cum perseveraret dolor, & calor firmus in renibus, hoc quod sequitur fuit institutum.

℞. Sapa lib. s. mucaginis decoctionis malvæ bisinal. violarum, seminis psylli, melonum: adde opti ꝑ. i. & applicetur iuxta cataplasmatas regionem renum. *Idem.*

Mulier quædam cum Gonorrhœa laseparillæ, hoc uno decocto, & pronatio seminis, & urinæ ardore, post universalia remedia adhibita, ex incontinenti per se curata fuit.

℞. Liquirit. ꝑ. vi. sem. myrtillor. coriandr. præpar. plantag. agn. cast. an. ꝑ. i. sem. papav. alb. ꝑ. iii. sem. hofeyam ꝑ. j. hord. mûn. M. j. acaciæ, sumac. an. ꝑ. i. semina contond. crasso modo & bulliant omnia in aq. thalybeata pro tribus. colat. adde troch. alkikeng. ꝑ. i. M. Sumebat cyathum bis in die, neque aliis medicamentis opus habuit.

Benedictus Faventinus. Præceptor mens hoc in simili casu magno cum succedat & experientia utebatur. Si & Gonorrhœa adesset dolor & ardor, dabat tepide septem diebus factis ovilli ꝑ. iii. aq. plantag. vel succi ejus ꝑ. j. boli. armen. ꝑ. i. M. *Petrus Forestus. observ. 15. lib. 10. De Penis Viris.*

D. Bontius in Gonorrhœa, ut J. Heurnius inter secretoria remedia sua, annotavit, usus fuit his pilulis.

℞. Sem. lactuc. papav. an. ꝑ. iii. rad. nymphææ ꝑ. iii. ros. rub. ꝑ. i. coralli rab. ꝑ. i. camphoræ ꝑ. j. sem. agn. cast. ꝑ. i. cum mibecagine tragacanth. P. massa ex ꝑ. i. fiant Pilule vii. In Notis ad sap. 13. lib. 6. *Pathologie Joann. Ferri.*

Vir quidam Gonorrhœa antiqua laborans, & me consilium petiit: cui primum præscripta purgationem ex Mercuri dulcis. *Idem.* pill. coch. min. eadem quantitate, & sequenti die venesectionem. Deinde Bolum ex rhab. pill. ꝑ. j. cum terebinth. ꝑ. iii. quem continuavit per quinque dies, eoque purgabatur ter aut quater in die: iterum sumpsit Pilul. Mercuriales, & prædictum bolum per alios quinque dies: ac tandem aquam sequentem per octo dies.

℞. Menth. sic. ꝑ. iii. sem. lactuc. ruta. agn. cast. an. ꝑ. i. iros. h. ꝑ. i. dictamn. eretic. ꝑ. x. sacch. albi. ꝑ. i. omnia pulverentur addendo terebinth. venet. ꝑ. v. vini albi gessetosi ꝑ. xxx. F. destillatio in balneo M capiat enchlearia duo mane duobus horis ante cibum. His remediis

à contumaci illo affectu liberatus est. *Lazarus Riberius observ. 25. cent. 1.*

Juris quidam utriusque Doctor Gonorrhœa laborans a me consilium petiit: illi bolum præscripsi ex rheo & terebinth. per quinque dies suavendum: & cum nondum fluxus cessaret, postea usus est aqua ad Gonorrhœam Quercetam in illius Pharmacopœia descripta: prima exhibitione omnino sublatus est fluxus, & ideo per tres aut quatuor dies tantum illius usum continuavit, neque amplius rediit affectus. *Lazarus Riverius observ. 36. cent. 1.*

Vir quadraginta annorum ex impuro concubitu Gonorrhœam contraxit, cui ab initio præscripsi bolum ex cassiæ ʒi. rhei pulv. & crytall. tartar. an. ʒi. Sequenti die volebam sanguinem mittere ex pede, quod ipse æger renuit. Emulsionem præscriptam sunt ad tres aut quatuor dies quibus urinæ acrimonia temperata est fluxu eodem modo perseverante. Postmodum pituitosa laxante usus est per septem dies continuos, in hunc modum præscripta.

℞. Tamarind. ʒii. aq. fontis fʒiv. coq. ad fʒiii. in colat. infund. frigide per noctem semund. sem. coriand. liquirit. & ros. rub. an. ʒii. capiat cyathum unum mane hora una ante primum, Hoc remedio fluxus valde in minutus est, ad quem omnino delendum bolum sequentem præscripsi.

℞. Terebinth. venet. ʒiii. rhei pulv. ʒi. F. bolus quem capiat mane per quinque dies deinde aqua superius descripta usus est per septem dies. Hoc modo Gonorrhœa curata est: quia tamen exigua quædam humiditas in extremitate glandis frequenter apparebat, ut in fine hujus morbi plerumque fieri consuevit: ad eam prorsus cohibendam & exsiccandum sequentes pilulæ præscriptæ sunt.

℞. Gummi arabic, tragacanth. carab. nummiz, bol. armen. an. ʒi. pulverentur, & cum syr. de ros. sic. F. pilul. massa de qua capiat ʒi. singulis diebus mane, duabus horis ante primum per octo vel novem dies, & ita fluxus omnino cohibitus est, *Lazarus Riverius. observ. 74. cent. 4.*

Conserva fructus brusci à ʒii. ad ʒʒ. per aliquot dies exhibita Gonorrhœas multas curavi.

Idem præstat aqua ejusdem fructus distillat. *Samuel Formis observ. 47.*

In Gonorrhœa commendatur pulvis sequens.

℞. Fol. menth. mumiz, corall. rub. agn. casti, carabes, an. ʒi. M. F. Pulvis: de quo accipiat æger aliquid mane jeuno ventriculo cum ovo tremulo. Vehementius sistit profluvium seminis pulveris ossis Sepiæ ʒi. cum conservæ ros. ʒiii. bis vel ter sumptus. Excellentissimum est Magisterium ejusdem cum conserv. ros. antiqua à gr. vi. ad ʒʒ. sumptum. Tinctura etiam corall. mirabiliter prodest.

In Gonorrhœa virulenta intetdum inflammantur testes cum maximo tumore: in eo casu præsentissimum remedium est Cataplasma ex foliis rutæ & ebuli aceto coctum & applicatum *J. Hartmannus. Practic. chymiatr. pag. 265.*

Juvenis viginti quatuor annorum, mirus formarum spectator ac verus Veneris alumnus, post coitum cum impura meretrice peractum patiebatur continuum ferme materiz

albicans ac viscidæ ex urethra profluvium non tantum absque voluptate, sed præterea etiam cum dolore scindente, qui quoque aderat, cum æger reddebat urinam.

Fermentum nempe acido corrosivum in partibus genitalibus hujus scorti delitescens per penem hujus juvenis in poros prostaticarum ac vesicularum seminalium a coitu plus solito apertos, sicque acredine sua & semen & humores nutritios alluentes infecit ac ulcuscula excitavit in illis partibus; hinc itaque vellicatio & continua fere contractio prostaticarum ac vesicularum seminalium semen ac humores nutritios corruptos modo prædicto assidue prope modum cum dolore fundentium.

Malum hoc gonorrhœa plerumque nuncupatur, estque satis periculolum, quia loquidem sapius degenerat in luem veneream, si differatur ejusdem medela, tunc etenim fermentum acido-corrosivum abripitur & cum massa permiscetur sanguinea.

Nulla itaque mora interjecta ad curam properavi, ac ad acidum corrosivum temperandum & evacuandum, ut & ad ulcusculorum sanationem sequentia præscripsi.

℞. Extr. cathl. Gr. xxiv. Mercur. dulc. Gr. vi. Sal. prun. antimoniat Gr. v. M. F. pil. N°. vii. Has pilulas tempore matutino assumpsit patiens, ac sequentibus quinque diebus semel quotidie jejunus devoravit bolum hunc.

℞. Thereb. ven ʒiii. Rhab. ʒi. M. S. Post iterum max præscripta purgatione & bolis usus est ut ante, atque hoc octo pristinam sanitatem adeptus est æger.

Therebinthina à quibusdam tam diu coquitur, donec pilulæ inde formari queant, sed male, quoniam coctio oleum spirituosum in aëre propellit, cum tamen in eodem præcipua therebinthinæ virtus consistere reperitur.

In hoc malo iterum acidum criminor, sed mira fortasse alicui videbitur mea opinio, acidum scilicet in animali vivente adeo noxium existere ac inimicum sanitati, cum interim acetum carnem mactatam conservet integram per longum temporis intervallum; sed ut & hunc amoveam scrupulum, respondeo rem longe aliter se habere in vivo animali ac in mortuo.

In vivo animali ad vitæ ac sanitatis conservationem apprimè necessaria est sanguinis ac humorum libera per vasa tubulosque satis patulos circulatio, quæ tamen haud parum impeditur ab aceto aliisque acidis sanguinem ac humores coagulantibus. In mortuo autem animali ad mactatæ carnis conservationem prædicta non requiritur circulatio, sed tantummodo opus est, ut præcaveatur, ne valde parvæ carnis mactatæ particule ab aëre nimium agitentur, fermententur, ac è statione propellantur; acetum autem particulis suis crassis ac gravibus ab hunc effectum producendum idoneum est.

Quod autem caro mactata maneat incorrupta, si motus particularum valde parvarum, alias futurus, hac aut illa de causa sistatur vel hinc manifestum evadit, quod caro mactata brumali tempore per multos dies integra servetur, cum tamen eadem æstivo tempore citissime corrumpatur ab aëre tum temporis, in motu valde celeri constituto.

Quod

Quod vero acetum constet particulis, crassius ac gravibus, liquet ex destillatione, quæ docet, spiritum vini citius ac prius quam aquam, & aquam adhuc citius ac prius in alembicum elevari quam acetum.

Præterea dici posset, quod carnis macerata sal volatile cum aceto coaguletur, ac ita immotum conservetur & impediatur, ne fermentescat cum aere, figuram suam mutet, ac avolet in aera, sicut cernimus sal volatile cornu cervi aut aliud quodvis cum spiritu acido coagulatum non avolare, ut alias facere consuevit.

Dum ago hic loci de gonorrhæa, in memoriam mihi redit haud illepidum alicujus medici responsum; interrogabatur hic aliquando inter pocula, quid foret in causa, quod homines tam facile supplicium paterentur in penem, ubi cum hac aut illa meretrice concubuerint, dum interim canes masculi cum canibus alterius sexus in numeris cotunt impune, ad quod medicus subridens reposuit, hoc contingere, quia canes, hac in re hominibus longe prudentiores, statim post cotum peractum cultellos suos liguendo bene purgare solent a fordibus, quæ forte adhærescunt; ex quo responso interrogator illud adhuc didicit, ut postea mox a coitu peracto membrum virile propria semper abluat urina. *Iohann. Mays in Praxi Chirurg. rationali.*

Gonorrhæa periodica.

In sexum sequiorem num cadat seminis profluvium jam non disputabimus: Patet utrinque rationes: Silentio autem præterire minime decet laborasse apud nos Juvenem Gonorrhæa periodica: Reditum hujus hospitis nunquam non nuntiabant dolorifica labiorum disruptio, nec non prævius universi corporis rigor: Prostratis inde notabiliter viribus ad nos accessit petitiu Medicinam, quæ facile impetrata, brevi convaluit: Præsentaneum auxilium præstitit sal cotallorum ac Magisterium saturturni cum aceto nitrato paratum. *Ioh. Petri-Pruckelti.*

In Gonorrhæa affecto balano, insectulum limaciforme fuit inventum. *Petrus Borrellus observ. 53.*

Gonorrhæa virulenta cum excrescentiis.

Juvenis quidam temperie biliosus, opulentus & salax ab impuro & impudico prostibulo numisma venereum pro aureo permutaverat, ut de seminis profluvio dolorifico eoque flavo querelas haberet, monstrando insinuat excrescentias verrucosas ad subulam, unicam principio quidem, postquam vero eandem acu aperuisset, proliferam, nam quousque sanguis infectus fluxerat, eoque novarum notaverat exortum, ut etiam numerum tandem sexagenarum transcenderent. Huic in antecessum nodulum ex lignis, rhabarbaro &c. cum vino ordinavi, deinde Pilul. de Terebinthina cum paucis mercurio dulci præscripsi, tandemque decoct. nigri Mynsichti composui, exterius applicandum, qui nunc aliquot liberorum pater vivit sanus. *D. Christophori Seligeri.*

Anatomica inspectiones

Gonorrhæa diuturna laborantis Glandosum corpus Semine repletum inventum est, cum Testibus eodem repletis.

In involuntario seminis fluxu laborante, quem Patavii dissecimus, corpus Glandosum cum divideretur, non minus quam testes ipsos semine oppletum conspeximus: Et si verum fatendum est, inter dissecandum nullâ petitis corporis parte tanta seminis vis inquantum atque in hoc glandoso corpore invenitur, quantumvis id a testium substantia, mollitie, æquabilitate differat. *Vesalius de Hum. corp. Fabrica lib. 5. cap. 15.*

Gonorrhæa affecti cadaver vasa semen deferentia in penem maxime dilatata exhibuit.

Vasis semen in penem deferentis insertio conspectum quodammodo fugit. Et coitus, aut alias excretionis seminis tantum tempore aperitur: Quod Patavii quidam dissecus facile edocuit, qui ante suspendium involuntario seminis fluxu laborans, hos meatus omnes apertos laxosque habuit: eos potissimum qui ex testibus in Deferentis semen vasis revolutiones gyrosve pertingunt, & quibus dextrum & sinistrum deferentia semen vasa in velicæ cervicem terminantur. *Vesalius de humani Corp. fabrica lib. 5. cap. 13.*

Gonorrhæa excitata ab ulceribus orificii vesicæ vicinarumque partium.

Mercatore febre exigua laboraret, ut fere decumbendi necessitas non esset, & lueret Gonorrhæa ut propterea lectio venæ disteretur, tertio post die exacerbatus est dolor, & continua febris tenuit, &c. Nono mors.

Qui sectioni cadaveris interfuit Chirurgus, retulit reperta esse ulcera in orificio velicæ & partibus, Et tamen de his non querebatur. *Bartholinus Epist. lib. 2. pag. 160.*

Glandosum corpus (Prostata.) Gonorrhæa virulenta sedes est.

Gonorrhæa virulenta protrahitur interdum ad decem annos, quale exemplum Patavii videmus in viro Bergonense, cetera sano sed vix ossibus hærente: unde in Gonorrhæa hujusmodi non excernis semen, sed pus ulcери, ex prostaticis vero videtur proximum: Certe in omnibus Gonorrhæa laborantibus in Nosodochio dissectis, ulcera reperimus, seu callum, ulceris præteriti: Impossibile alioqui foret tanto tempore effluvium seminis vita superstitie perstare: Severinus Neapoli in dissectis invenit inflammationem & abscessum in parastatis: *Bartholinus cent. ii. Observ. 36.*

*Gonorrhœa muliebris Glandoso corpore
affecto excitatur.*

Fluor muliebris, si continuus, & Gonorrhœa, ita inter se conveniunt, ut nisi mentem adhibeat Medicus præ similitudine facile in errorem abeat, quanquam a diverſis partibus procedant & per deſtinata loca excernantur, quidem Fluor iſdem quibus menſtrua fluunt, ductius ejicitur, quod vel ideo judicamus, quia menſtrum cruorem ita ſubinde immutari cernimus, ut qui primo veluti à victima, referente Hippocrate, prodibat, nunc minus floridus, poſtea pallidus ac lenſim albus appareat, Fluoremque muliebrem, Album dictum efficiat: Gonorrhœam vero ex Glandoso corpore provenire, & per lacunas circum, & in meatus urini exitu collocatas erumpere, Cadaveris cujusdam mulieris hoc vitio infecta palam fecit, Nam utero ejusque vagina innoxius corpus glandoſum ſive Proſtatas, urethræ circumpoſitas ſolum male affectis offendimus.

Dicit aliquis, Quomodo illa Medicus internoscere valebit, ſi mulier affecta ſe caſſam & ab omni virili conſortio alienam proutetur? ut cunque dijudicare poterit ſi ad prolabantem materiam, ægræque querelas diligenter attendat? materia namque Fluoris alteram in Gonorrhœa manantem longe quantitate ſuperat: Querellas ſi conſideret, Fluore ſedatas lumbari dolore cruciari, alias vero Gonorrhœa laborantes de oborta circa pudendas partes acerbitate lamentari audiet: Sin minus his contentus certior eſſe velit, genitalia inſpiciat, ſiquidem meatus urinarum exitum circumſiſtentes partes (in quibus lacunarum exitus terminantur) mucosa quadam materia obſeſſas, ac interdum ulceratas reperiet, reliquis vaginæ partibus decenter ſeſe habentibus, cujus contrarium in Fluxu albo fieri aſſolet: Sed hæc vulvæ inſpectio non ſemper neceſſaria eſt, cum Medicus haud ſit culpandus ſi medicamenta ſecundum ægrotantis querimonias præſcribat: Si vero illum eludat, nec optatum præſcripto medicamine ſucceſſum contumax mulier conſequatur, id ſibi imputet: *Regn. Graaf. de mulierum organis cap. 9.*

GRAVEDO

Vid.

CATARRVS

GRANDO

Vid.

HORDEOLVM

GRAVIDARVM MORBI

Vid.

PRAGNANTIVM MORBI,

GURGULIONIS MORBI.

Gurgulio ſeu Uvula eſt corpus glanduloſum ſupra laryngem è regione foraminum interiorum narium inter tonſilas ſitum, ſtrictum

ſtar rotundæ è palati limbo poſteriore dependens. Contegitur involucris ori quidem & faucibus communibus, ſed paulo craſſioribus. Quidam aſſerunt binis ſuſpendi muſculis interno ſcilicet & externo pari, ut antrorſum & retrorſum moveatur in deglutione, ſive ut humores contenti ſic continuo exprimantur. Alii vero volunt in hoc muſculorum apparatu rariffime ornari, id interdum ab involucri proceſſus oſſis ſphænoidis ad ejus latera muſculofas dimitti nbras, unde etiam quandoque totum ipſius integumentum carneum appareat. Aperto involucri glanduloſa partis retegitur conſtructio fibræ membranofæ ac vaſculis variis cohærens, quorum vaſculorum extremitates inter papillas ex interiori membrana ipſam inveſtiente aſurgentes, hiant, ac ſegregando cibi liquori cuidam ſalivali, ſicut & alia omnes glandoſæ palati & oris partes, inſerviunt. Non tamen in hoc totus uvulæ reſtringitur uſus, ſiquidem etiam inſervit impediendo cibi & potus in nares aſcenſui; præterea, ſecundum aliquot, modulando aëri a pulmonibus propulſo pro voce articulaanda non parum facit, ut & reprimendo aëris ad pulmones in inſpiratione tendentis impetu, ne ſcilicet in illos liberius irruens ſuffocationem inducat.

Variis pars hæc tentatur morbis, qui partim ex congelitione in ipſa facta partim ab acrimonia aliunde adveniente enaſcuntur: Si enim humor ſalivalis in illa ſecretus, ac per vaſa in faucibus hiantia evacuandus, per oriſtiorum ſuorum obſtructionem in propria ſcaturgine diutius continuatur, illicque moras longiores trahit, non tantum partem tumefaciet & prolongabit, ſed etiam in acrius quid ac corroſivum effectus inflammationes & ulcerationes non parum moleſtas, procreabit, imò in cancerum abibit. Rurſus ſi virus in ſanguine nidulans vel ex ſcorbutica conſtitutione vel ex venerea luce illic copioſius deſcendat, ſine mora inflammationes & ulcerationes aliis non abſimiles, progignet ſed quæ curatâ morbi radice, per ſe, aut ſaltem paucis adhibitis aut particularibus ac topicis, evaneſcent. Aſt quid hiſce diutius inſiſtimus quum de Curationibus, Conſultationibus, obſervationibus, varia è varis huc adducenda ſeſe offerunt.

Curationes.

In uvulâ exulcerata commode uſurpatur hoc remedium, quod in aliis etiam affectibus oris & anginâ eſt præſtans.

℞. Herb. malv. hort. m. i. flor. roſar. rubr. prunell. veronic. ſalv. an. m. ſ. radic. polypod. querc. ʒi. coq. in aq. portulac. lb. iv. aceti vin. ʒvi. uſque ad carum tranſverſi pollicis, poſtea colentur & colatura leniter exprimitur. Pro uvulæ relaxatæ ac nimis tumentis abſeſſione ſingulari deſcribit inſtrumentum Barthol. Hiſt. 8. Cent. 2. Alias re centem uvulæ prolapſum, ac relaxationem curat fermentum cum ſpir. vini humectatum & vertici impoſitum, una cum gargarismo & decocto ſorum liguſtri cum ſale pruneilæ, aut nitro. Item ſal. decrepitatum cum p. uco pipere applicari poteſt uvulæ ita prolapſæ. Loco ſalis communis optimum eſt ſal. armoniacum ſubinde uvulæ applicatum, ſpiritus

Spiritus aluminis comendant alij. Quod si simul uvulæ inflammatio adlit optimum est decoctum herbæ aut radicis taraxaci; succini suffitus ore exceptus specificum est Rulandi. Vel semen canabæ in poscâ parum coctum & colatum, pro gargarismo adhibitum, est unum ex optimis remediis. Vel radix tormentill. & uvulariæ an. coquantur in cerevicia secunda, & cum modico mellis edulcorata exhibeantur pro gargarisinate. *Michael Ettmullerus Collegii Præficus l. 1.*

Laxatur lapissime gurgulio, & linguæ superin umbens vocis modulationi incommodat, ut in catarrhis; atque adstringentibus siccantibusque remediis in pristinum utum restituitur, præsertim gargarismo ex decocto rosinarini, rosarum punicearum, plantaginis, uvulariæ baccarum myrtearum cum diantho, vel diamoro; itemque pulvere ex pipere longo, corticibus myrobalarum, tormentilla, alumine ustò, bolo Armena, & similibus. Fermentum capiti adhibitum cum succino, & spir. vini purus, optime confert ex *Frider. Hoffmann.* Suffitus etiam ex mastiche, gumm. arabicæ, balsamo Peruvianò & Tolutano, pulvere nicotianæ, rosinarini, betonicæ. Piperis contactus quoque prodest ex *Borello.* De inflammatione uvulæ, vide ubi de Tonsillarum affectibus. *Lucas Tazzi Medic. Practicæ parte 1.*

Consultationes.

Inflammatio Tonsillarum & gurgulionis laxatio.

Serenissimæ Reginæ Seccæ Consiliarius, Sediti Pomeranorum in solenni quodam convivio præter intentionem; vir altoquin temperatissimus meracioris vini potu inebriatus, postero die molestiam quandam & dolorem circa radicem linguæ sentiebat cum ardore, siti, & quædam deglutitionis & respirationis difficultate.

Tonsillas, aut columellam, vel utrumque aliquid præternaturale pati suspicabar, ac proinde depressa lingua fauces inspexi, ubi primo intuitu amygdalas, uti vocant, sive tonsillas ex utroque latere tumidas, rubentes & inflamas, mox & gurgulionem relaxatum & propendentemprehendi.

Occasionem malo, procul dubio dedit largior vini generosioris potatio, quatenus sanguis ab ea incallescens & tenuior redditus, ad partes has immatura molles & laxas defluens, tumorem ac inflammationem excitavit.

Confestim itaque aperta basilica dextri brachii sanguinem detraxi; mox ad fervorem sanguinis extinguentium iulapium refrigerans præscripsi.

℞. Aq. fragor. acetosell. endiv. an. ℥vi. rob. ribium syr. berbr. rubi idæ; an. ℥ii. succ. citri ℥i℥. M.

Ex topicis gargarismum, vel potius collutionem oris ex repellentibus & alstringentibus exhibui.

℞. Fol. plantag. prunell. an. m. i. flor. ros. rubr. m. ℥. cortic. granat. ℥i℥. coque ex liq. aq. simpl. pro ℥bi℥. Colatur. adde rob. ribium ℥ii. diamor. ℥i. syr. de agresta ℥℥. m. Mixture hæc resupinato capite in ore contineatur tepide; inflammata enim nec frigus ferunt nec calorem, & valida gargarisatione plus materiæ ad locum affectum attrahitur.

Columellam elongatam sequenti pulvisculo undique conspersi, beneficio instrumenti a *Guiliemo Fabricio Cent. 2. obs. 21. depicti.*

℞. Flor. scabios. balaustr. ros. rubr. cortic. granat. ℥℥. rad. bistort. torment. gallar. inunatur. an. ℥ii. alum. usti ℥i℥. M. i. pulvis.

Sedata paulisper inflammatione, repellentibus moderate discutientia admiscui; extra etiam guttur oleo amygdalarum dulcium & liliorum alborum inunxi.

Tandem corpus biliosis humoribus refertum extracto casia & pulvere meo cholagogo purgavi, sicque virum integerrimum, meique amicissimum. Dei gratia, bonæ valetudini restituit. *Baldassar Timæus in Casibus Medicinalibus.*

Uvula Relaxatio.

Juvenis viginti sex annorum, plethoricus, postquam aliquot dies liberaliori vini & cervisie potui indulsisset, incidit in magnum dolorem faucium, quo non nisi cum dolore & difficultate quicquam deglutire potest. In faucibus etiam aliquid, instar boli deglutienti tumens, ab ipso perpetuo percipitur. In ore ejus cum linguæ depressione aperto, apparet uvula valde tumida & laxata, vicinæque partes valde tumentes rubentes.

Afficitur in hoc agro uvula, ac præterea fauces, quod ex dolore, deglutienti difficultate, & tumore, instat boli fauces prementis, in illis partibus percepto: item, ex ipsa fauces ejus insipientium autopsia, est manifestum.

Morbus, qui ipsum affligit, est faucium, & præcipue uvulæ, a sanguine calidioris & pituitoso ortus; qui partes illas vicinasque sua copia distendens, uvulamque nimium relaxans, atque hic dolorem & deglutienti perpetuam difficultatem, suffocationisque subinde insursum metum, inducens, uvulæ relaxatio, a præcipuo hujus tumoris symptomate, reliqua alia symptomata potissimum producente, vulgo appellari solet.

Procatartica hujus morbi causa est potus ille generosus & liberalis, cui hic juvenis per dies aliquot plus julto indu sit; inde enim multi humores sanguinei & pituitosi, in ejus corpore geniti, antecedentem huic morbo præbuerunt causam. Pars vero eorum in corpore incallescens, & poros vasorum circa fauces, uvulam, vicinasque partes plus julto, ex præcedenti potione illas partes præ cæteris magis laxante, apertos inveniens, & per eos se in partes illas copiose effundens, continentem hujus morbi, ejusque symptomatum, constituit causam.

Dum enim per illum humorum sanguineorum & pituitosorum, in partes illas copiose illabentium, ibique vehementius incallescentium, influxum, tumor in faucibus vicinisque partibus & uvula nascitur, gula & guttur ita arctantur, ut ea, non nisi magna vi, & magni doloris necessario inferente, in deglutiendo aperiri queant. Uvula vero hinc julto longior & laxior evadens, & fauces sua nimia mole replens, facit in iis perpetuum, tanquam boli ibi hærentis, sensum. Interdum vero illa plus solito intumescens, & humores quosdam in asperam arteriam per rimas epiglottidis copiosius immittens, tanta n subinde inducit respirandi difficultatem ut æger suffocationem metuat. Hæc autem om-

nia in ore tam sunt evidentiā, ut insipientium oculis cerni possint.

Morbus hic, cum deglutionem & respirationem tollere, & uvulæ corruptelam inducere possit, atis est periculosus.

Diligenti itaque Curatione erit impugnandus. Eaque in causâ antecedentis, & continetis, item in tumoris & intemperiei, per contraria ablatione consistet.

E vena igitur in brachio dextro apertâ mox educatur sanguis ad uncias decem. Idque etiam postea repeti potest.

Paulo post talis injiciatur clyster

℞. Decoct. emollientis lib. i. Elect. diapruni. i. an. ℥vi. Ol. violar. lilior. an. ℥i. salis ℥i. Misce, F. Clyster.

Curcubitula etiam scapulis & humeris sunt adhibendæ. Et utatur tali gargarismo;

℞. Hordei mundati p. i. Fol. violariz, portulacæ, plantag. an. m. i. n. yrti m. ℥. Cort. malor. granat. ℥i℥. l. lor. ros. rubr. malvæ arbor. an. m. ℥. Sem. cydon. malvæ an. ℥j. Auricular. judæ ℥i. Decoq. in aq. com. ad lib. i℥. in colatura dissolve diamori, dianuci, mell. ros. an. ℥i℥. Misce pro gargarismo, quo sæpius in die gargarnet.

Et sæpe lambat de hoc linctu.

℞. Diamori, dianuci, sir. violacei an. ℥i℥. Misce.

In ingenti dolore, interdum gargarisandum cum lacte recenti.

Potius sic pinguetur tali haustu, si tum deglutire possit; nam alioqui repetendus esset præcedens clyster.

℞. Sennæ ℥i℥. Sem. anisi ℥i. Decoq. in aq. hordei q. s. ad ℥iv. In quibus dissolve el. diapruni ℥ii. Misce. F. potio, mane exhibenda; & si inde malo perseverante, iteranda.

Corpore bene purgato, uvula cum pulvere sequenti, cochlearis, ab Hidano centur. 2. oca. 2. descripti, vel alterius convenientis ope, sæpius in die erit sublevanda.

℞. Rosar. rubr. balaustrior. cort. granat. an. ℥i℥. Rad. bistortæ, tormentil. g. llar. immatur. riu. florent. an. ℥i. aluminis ulsi ℥ii. M. F. pulvis.

In dixta aer sit temperatus; cibus ex jusculis & ovis forbilibus: vitentur omnia aromata: potus sit tenuis cerevisia: corpus quiescat: somnus sit moderatus: fugiantur animi affectus.

Hemicus Regius apud Theodorum Craanen Medicationum lib. i.

Ulcus in gargarone cum exesione tonsillarum & uvulæ.

Vir Illustrissimus, quadragesimum tertium annum agens, temperamenti totius calidi & humidijecoris calidioris, boni & carnosi habitus jam quintus decimus currit mensis, ex quo præcipiti & copiosa destillatione in fauces correptus fuit cum febre & insigni deglutiendi difficultate. Medicus autem domesticus accersitus sanguinis missionem jussit, gargarismos præscripsit, clysteribus ventrem exoneravit, & victus rationem congruam instituit quibus equidem melius habere visus est Nob. Patiens. verum duobus transactis diebus, rursus invaluit affectus & præsertim inconfilla sinistra cum ejusdem exul-

ceratione: idcirco sanguis rursus extractus fuit & gargarismi deterfori instituti; quibus licet febris, inflammatio, deglutiendi difficultas tuerint omnia remissa exulceratio tamen progrediebatur uvulam versus, & non obstantibus medicamentis quoque refrigerantibus, & humoris acrimoniam atque aciditatem demulcentibus assumptis, ulcus tamen quotidie serpens, non solum uvulam, sed & dexteram quoque tonsillam occupavit, tuncque luc celtica humores infectos fuisse Medici aditantes suspicari ceperunt: cum inceptam destillationem Gonorrhæas, & caries passus fuerit; propterea ad alexipharmaca gallica devenire decreverunt, & Decoctum ex salsa, guajaco, ligno cydioniorum & santalo in aqua fumariz atque chichorii præscripserunt, quod solutivum reddiderunt sennâ polypod. & tartaro superaditis; pro potu vero conueto aqua ex salsa parata utebatur: interim melle ros. & syr. de ros. siccis cum spiritu sulphuris partes affectæ tangebantur. His per mensem adhibitis, non solum levatus sed ex toto sanatus, videbatur; verum transacto mense, recrudit affectus & ulcus in isdem partibus apparuit. Causam autem retulerunt in novum commercium cum infecta muliere. Quamobrem repetita fuere quadraginta continuis diebus jam administrata remedia, omnia tamen in casum tentata, liquidem ulcus serpendo semper magis unde quaque sese dilatavit; ob idque Medici decoctum sudorificum instituerunt per plures dies, capite tamē extra sudatorium servato, veriti ne nimium illud incalesceret, sed frustra omnia & irrita fuerunt; etenim & uvulam, & ambas tonsillas destillatio corrodit vocemque & deglutionem adeo læsit, ut loquendo vocem etiam per nares emittat, acque potus præsertim, nonnumquam etiam potulenta alimenta ad nares regurgitaverint atprodierint, corpore toto interim valde emaciato. Hoc infausto eventu perterriti medici aeris mutationem consulverunt, & ad locum quandam suburbanum tanquam ad Tabiaz Virum Illustrissimum dimiserunt, à qua loci mutatione juvamen majus, quam a medicamentorum administratione Nob. Par. cognovit. Attamen ad nos perveniens, accuratissime locum affectum exploravimus, & tonsillas, necnon Uvulam ex toto ablatam atque corrosam invenimus; præterea ulcus tum superius ad os sphenoidæ, & inferius per oesophagum repere cum callositate atque non exigua sorditie observavimus. Et quoniam à nobis auxilium petit, ideo de agendis, ut infra consilimus.

Ad quadragesimum usque annum, vitam incolumem duxit Vir Illustrissimus iste totius temperamento calido & humido præditus, boni & carnosi habitus, cum capitis caliditate & humiditate non valde excedente, & ideo sine sensibili molesta capitis destillatione, quæ ex tempore præceps ad gurgulam irruere cepit, postquam Gallicam Gonorrhæam cum Carie contraxit, sicut eodem tempore totius corporis macies incipit; cuius veritatis ratio facile adduci potest, namque si à calore temperamenti propter ætatem acutiori reddito, sanguis calidior & acrior factus fuisset, qui ut ineptus ad nutritionem, maciem introduxisset, & postea per venam cavam

cavam ad cor, indeque per arterias carotidas ad cerebrum circulaudo perveniens per jugulares venas internas ad fauces atque tonsillas, ut inutilis à natura transmissus affectum anginosum produxisset; id contigisset eo tempore quo magis calor ipse temperamenti viget, nimirum circa trigessimum aut quintum annum; quod non evenit nisi post quadragesimum; postquam scilicet à Luc Gallica, non solum vasa spermatICA, sed & hepar una cum massa sanguinea inquinatum fuit, cujus Celtica qualitatIS impressio & characterisimus cum sit exulsiO, idcirco visceribus & ipsi sanguini gradus caloris p. n. superaddidit, ipsumque sanguinem ad nutriendum ineptum reddidit, unde macies: naturæ autem molestus extra venas detrusus inflammationem in faucibus excitavit, ubi diutius remorans sua prava & exurente qualitate tonsillas primo corrodit, & serpens exedendo Uvulam quoque consumpsit. Non igitur mirum, si prioribus medicamentis minime cesserit affectus, & parum quoque alexipharmacis gallicis: etenim cum calida & humida capitis naturalis intemperies non valde excedens, à Luc Gallica magnopere adaucta fuerit, caputque ipsum valde excrementosum redditum, hæc corrigi non potuerat sine sudore, nec sine ipso Gallica qualitas in humiditatibus excrementitiis & partibus solidis fundata extirpari; & propterea nonnihil quidem remissa, at nunquam ablata fuit causa fluxionis & exulcerationis; imo fusi tandem humores in toto à Decocto sudorifico in hypocaulito sicco ad caput impetum fecerunt, quod extra hypocaulitum exillens, nec ideo satis exundans, eosdem infectos humores in seipso retinuit, sicque fluxio necessarius ad tonsillas & gargarion adaucta fuit, simulque adauctum ulcus. Ut autem Uvula impedit quominus alimenta, & potulenta præsertim ad superiora ascendere possint, & eorundem descensum atque deglutitionem adjuvat, ita eadem dempra atque consumpta in causa est, ut ad superiora regurgitent & ad nares ferantur, præsertim quia ab ulcere dolorem inferente impediabatur iisdem alimentis descensus: quod impedimentum tandem cessavit, quoniam ob callositatem vlceri obductam non amplius percipitur dolor; vox tamen ob columellæ defectum fertur ad nares, & non tota per os emittitur. Utinam vero in præsens ulcus non amplius depasceretur; in parte namque inferiori vix terminus conspici potest, sicut nullo modo in superiori, adeo ut ad os sphenoidæ facile pervenire possit, & prætererea cum palatum quoque calorem mutare inceperit, ideo & proximas partes brevi infici posse dubitandum: viget enim & abundat, copiosa Gallica destillatio, cujus aliqua portio in pulmones noctu delabens tussiculam excitat, copia vero major per œsophagum in ventriculum descendens subversionem excitat, ciborum amplexum & concoctionem impedit, ac chylosæ, & forsitan etiam saniosæ materiz catarrho immixtæ regurgitationem inducit.

His autem ita se habentibus, facile videre est statum Illustrissimi Viri adhuc, esse pe-

riculi plenum, primo quoniam ulceris dilatationem & propagationem prohibere difficile erit, cum ejusdem termini non satis oculis patent, & præterea quoniam macies inualuit, & à perseverante in pulmones destillatione, & simul ab aeris frigidityte ob Uvulæ defectum pulmones immediate feriente, Phthisis facile introduci poterit.

Quare sedulo agendum etiam hoc incongruo anni tempore, ne ulcus ulterius progrediatur, Topica adhibendo primo, & potissimum Cachectica, mox Sarcotica, atque tandem Epulotica, dum interim expiato ventriculo, acrimoniam humorum demulcentia, & Gallicam qualitatem respicientia, (non tamen suadentia) sunt in usum ducenda. Proximo autem ineunte Veræ ineunda quoque erit regularis Purgatio, caularum extirpatio & ulceris perfectæ Curatio, sine tamen perditæ partis restitutione; tunc enim primis mundatis vis, massa sanguinea erit depuranda. Caput purgandum. Celtica lues penitus debellanda, simulque humida capitis intemperies, & coris calida remittenda, sanguis temperandus & totum corpus renutriendum; Topicis vero ulceri incumbendum.

In præsens igitur ulceri totis viribus proficiendum, primo detergentibus & cachecticis quoque, non solum saniem, sed etiam callositatem auferentibus, deinde exiccantibus, ideo gargarismi frequentes instituantur ex aqua Lettuciana, cum melle rosato simpl. cui aqua hordei potest etiam commisceri; verum quoniam jam dictis callositas non adeo facile tolli poterit, ideo etiam ad Escharotica & adurentia, ad ignem scilicet erit deveniendum, idoneo instrumento applicandum; vel saltem valde exiccante gargarismo erit utendum (quod tamen tolerabile sit) ut tinct. rosarum, spiritus vitrioli extracta & aqua plantaginis, vel aqua Villensi parata,

Interim ventriculus à præsentis infarctu est vindicandus, præbendo primo mel. ros. sol. cum manna, cui superbibat mulsæ dilutæ lib. ij. et. Mox die sequenti assumat.

℞. Oxymel. simpl. ℥. iiii. aquæ flor. citri ℥. i. m. pro syrupo. Tertio vero die assumat crem. tart. ad ℥. ss. in jure pullæ, aut vituli, cort. citri alterato. Die postea sequenti rursus assumat oxym. deinde cremorem tartari, & ita alternatim perseveret x. aut xii. diebus, ut ventriculus cum œsophago mundificetur & primæ viz exinaniantur, repetito superius præscripto Leniente. Qua paracta primarum viarum expiatione, in usum ducat lac hujusmodi artificiale.

℞. Sem. melon. mundat. ℥. j. sem. cucurb. mundat. ℥. ss. amygd. dulc. mundat. n. xv. nucleorum pineorum n. xxv. m. contendantur omnia, & cum jure carnis pro cibo consueto extrahatur Emulsio ad ℥. vii. aut viii, cui adde sacch. albi cochlear, & irroretur hujusmodi emulsio ad suavitatem guttulis aquæ ros. aut è flor. citri, & summo mane præbeatür quatuor aut quinque horis ante cibum. Ius autem carniæ, tum pro hac emulsione conficienda, tum pro ferculis omnibus parandis, sit semper optima china algeratum. In usu jam dictæ emulsio-

nis perseveret tota Quadragesima, usque ad tempus futuræ eradicativæ Purgationis: poterit enim inservire, tum ad denulcendam humorum mordacitatem, tum ad totum corpus nonnihil enutriendum: Interim decimo quoque die assumat cremorem tart. ad 3j. cum sacch. in jure, ut supra dissolutum. Et congrua utatur victus ratione, evitando aeris inclementiam & nimis frigidam, & in cubiculo nimis calidam. Vitet quoque alimenta excrementosa, coctum difficilia, calida, vaporosa, sitque cœna parca. Vinum sit album, tenue, aquosum china & santalo albo medicatum, ita ut pro singula situla ingrediantur ʒ.ii. dictorum liquorum. Somnus nocturnus, diurnus quoque prodorit. Exercitium fiat ante prandium. Venus omnino ableganda, & alvus lubrica servanda passulis aut prunis coctis in prima mensa cum sacch. assumendis. Tandem ab applicationibus & studiis abstinendum, animique alterationes & perturbationes arcendæ. Et hac pro nunc.

Purgatio autem eradicativa sub finem mensis Martii incunda, tunc erit a nobis præscribenda, si de statu Illustrissimi Viri tunc temporis certiores facti fuerimus: consilium enim erit in arena capitandum, & supra propositis indicationibus pro viribus erit satisfaciendum, sanguinis missione, primarum viarum expiatione, humorum præparatione succis depur. cich. borag. betonica pluribus diebus assumendis; & non semel electivæ purgantibus Cacoehymia erit tollenda. Caput pilulis capital. Paracelli expurgandum. Lues Gallica Alexipharmacis extirpanda, nimirum Decocto sudorifico, medulla guajaci, salsa, visco quercino & santalis albis in aqua cich. & beton. parato, quo humida quoque capitis intemperies corrigetur. Quibus peractis, ad jecoris atque sanguinis caloris moderationem & totius corporis renutritionem, intrinsecus facile convenire poterit lactis asin. usus, & extrinsecus balneum aquæ dulcis herbis refrigerantibus alterata, non omissis Conservis capitalibus, & habita semper ulceris providentia, si opus fuerit. Quæ omnia Illustrissimo Viro à summo Deo salutaria precamur. *Raym. Job. Fortis Consult. & Respons. Medicin. Cent. 1.*

Observationes

De uvula relaxata curatione.

Nunc quomodo ego raro maximas quidem & ingentes relaxatas columellas sanaverim, paucis addam. Relaxatur autem ut Hippocr. docet libr. 2. de morbis, quotiescunque pituita à capite ad fauces defluens, à columella excipitur. Id quod facile fieri potest, cum sit pars admodum rara, mollis & spongiosa. Estque affectus hic periculosus: Aliquando enim columella cum tonsillis adeo inflammatur, ut æger neque cibum, neque potum de glutire, imo vix spirare possit. Horum ego nonnullos vidi, ac etiam feliciter curavi. Transit & interdum in gangranam, ut ex præallegato loco. Hippocratis elicere licet. Quod & forestus lib. 15. Observat. 5. annotavit, mihi tamen videre non dum contingit. Potest

& in anginam terminari, ut tu ipsemet mecum hic in Dno. Joanne Merula, sene omnimodo reverendo vidisti, & procul dubio annotasti. Is enim cum inflammatione columellæ laboraret, me absente, Empirico & homini plane ignaro se curandum commisit. Hic per dies aliquot pulverem calidissimum atque adurentem faucibus inflavit unde mox inflammatione & angina sequuta, de vita periclitabatur. Curationem non addo, cum tu ipsemet inter fueris. Itaque ut Chirurgus in hoc affectu caute & præmeditate procedat, est necesse. In primis autem explorandum, an affectus sanabilis sit, nec ne, ne agro temere quicquam polliceatur. Deinde etiam, an sit cum, vel citra inflammationem: si enim scirrhusa fuerit columella, & cancro proxima, quemadmodum illæ quarum in præcedentibus observationibus meminimus, prudentis erit Chirurgi, manum non admoveere aut si ægri, amicorum aut adstantium precibus obtemperare cogatur, nihil quicquam tamen, nisi de eventu morbi prius facta prognosticatione tentet, ne nomen imperiti Chirurgi sibi acquirat, suadeo. Porro ex quacunque orsum duxerit causa, statim ab initio vitæ ratio tenuis instituenda est, corpus clysteribus, sæpiusque iteratis, Areteo præcipiente, evacuandum, & materia, quæ ad fauces defluit, deorsum trahenda, ligaturis item extrenitatum, sectione venæ in brachio cucurbitulisque scapulis adhibitis, defluxus aliorum revellendus est. Gargarisma ab initio sit repellens, quale hoc quo ego uti soleo.

ʒ. Folior. plant. g. Myrtillor. Caudæ equinæ, Rosar. rubr. an. m. folior. scabiosæ m. f. gallar. ʒ. ʒ. Coquantur in aqua ad consumptionem tertiæ partis. In lib. 11. colatura dissolve mellis. rotati, aut diamori ʒ. ii. aceti rosar. parum. misce, & fiat gargarisma. Loco decocti possunt sumi aquæ dilutæ cum melle ros. & diamoran. Aliquando & sola posca feliciter usus sum. Nonnulli statim ab initio pulvere piperis longi gula inflato, Uvula relaxata auxiliari conantur quod quidem periculo non vacare, tu ipsemet in reverendo Dn. Merula observare potuisti. Collum quoque oleo rosar. inungere solitus sum. Et si affluxus vehemens, sequens applico cataplasma.

ʒ. Farinæ hordei. ʒ. ii. Pulv. rosar. Myrtillor. nucum capress. an. ʒ. iii. Coquantur posca, fiatque cataplasma, addendo sub fine olei rosar. parum & vitellum cum albumine ovi.

Os singulis ferme momentis, superiori gargarismate abluendum. Si dolor ingens adsit, gargarismati addo parum seminis tænegreci cydoniorum & florum chamomillæ. Nonnunquam quoque ut loco gargarismatis lac. recens sumat æger, jubeo, videndum tamen, ut quam semel os lacte deinceps quinquies, aut sexies gargarismate abluit: lac enim magis lenit dolores, quam vere affluxum repellat, quod tamen in hoc affectu circa initia præcipuum. Ceterum quotiescunque æger aliquâ de causa per se fauces non satis recte ablucere & gargarizare potest, soleo gargarisma ut lac ægro, syphone elementer in gulam injicere. Corpus præterea à pravis humoribus expurgandum: si bilis abundat, conveniunt electuaria diacatholice de succo

sacco rosar. lenitium, syrup. rosac. solut. compos. cum Rhabbarbaro, Agarico, & & lenn. Diaphœnicum. Si vero pituita, Pilulæ cochlear, aureæ, & de Hierâ cum Agarico, ex usu esse possunt. Si æger pilulas deglutire non possit, potio ex electuario Indo majori aut minori, vel ex diacarthamo cum decocto betonicæ, scabiosæ semine anisi & fœniculi dissoluto, est; khlebotomiam (si nihil adsit quod impediatur) in brachio, tum revulsionis gratia, tum quod humores omnes simul evacuet, tam in defluxione frigida, (si vehemens & suffocationis periculum fuerit) quam calida administrare soleo. Cucurbitulas item scapulis, & musculis bicipitibus, cum fructu applico, Hippocrat. lib. de affectionibus, vult ut capiti ralo in postica parte applicentur; indeque plurimum detrahatur sanguinis.

Id tamen extra laconium, ut fiat, suadeo. Fabianus scheinerus lib. de catarrhis, capite de catarrho oculorum, cucurbitulas in lodagricis improbat, ne materia ad spinam, indeque ad articulos trahatur, Recte quidem, sed quia Podagrici sæpissime hoc affectu corripiantur, morbus item sit gravissimus, suffocationis quin etiam periculum nonnunquam adsit, ad id quod magis urget, Chirurgus præcipue respiciendum est. Interim etsi aliquid ad articulos defluerit, minus tamen periculosum erit, quam si ad gulam, & facile postea corrigi poterit. Affluxus autem in petu sedato, ad ea quæ magis discutiant, transeundum. Unde sequenti gargarismate magno cum successu utor.

℞. Folior. & flor. betonicæ, salvia, scabiosæ an. m. f. Rosar. m. j. summitat. rosinarum & florum chamomel. an. p. i. Coquantur in lb. iiii. aquæ ad consumptionem tertiæ partis. Colaturæ adde mellis rosac. ℥iij. etiam aluminis ℥ii. misce fiat gargarisma nonnunquam etiam prædicta simplicia vino rubro in coque. Exterius collum oleo chamomillæ aut oleo ex floribus solani inungo, & lanam succidam applico.

Aliquando columella propter continuum affluxum materiæ, intumescit adeo, atque relaxatur, ut non minimum negotii, tam ægro quam Chirurgo, faceat, sicuti mihi, tum in multis aliis, tum præcipue, in viro quodam honesto, ac cive Paterniacensi videre contigit.

Huc uvula ad magnitudinem fere nucis jugulandis excreverat. Quare impetu affluxus sedato, corporeque semel atque iterum purgato, applicatis item cucurbitulis, sequentem pulverem, bis aut ter in die inflavi.

℞. Pulv. ros. rubr. balustior. cortic. granator. an. ℥i. f. fol. & flor. scabiosæ & ligustri ana ℥ii. aluminis usti ℥i. f. misce, & fiat pulvis. aut.

℞. Radicum bistortæ, Iridis florent. tormentillæ, gallar. immatur. an. ℥ii. ros. rubr. & flor. scabiosæ an. ℥i. lapidis calam. præparati ℥i. f. aluminis usti ℥ii. misce & fiat pulvis subtilissimus. Modus autem ejusmodi pulveres inflandi, talis est. Lingua speculo oris depressa, mox spatula aut cochleari parvo, & ad id apto, pulvis uvulæ admoveatur. Ut autem pulvis undique uvulæ aspergi atque inflari possit, sequens excoctavi instrumentum, quo multoties usus sum.

Est autem cochleare ex capro cujus manubrium

stultulosum, octo pollices longum, & interiori cochlearis parti annexum, ex altera parte tolliculum (ex corio, eo modo, quo aucups mitibus suis ad fallendas coturnices, alligare solet, factum) annexum habet, cochleari itaque impleto pulvere, uvulæque admoto tollis corrugatus est, quo aer pulverem in altum pellat, sicque uvula ac palatum eo undique aspergantur. Sed quia necesse est, ut muniter speculo linguam deprimat, interim dum Chirurgus hoc int. uncto pulverem admoveat, ac proinde sic unus alterum impedit, hanc ob causam, aliud instrumentum longe ad hanc rem commodius effixi, quo Chirurgus interim, dum sinistra speculo oris linguam deprimat, dextera pulverem admoveat.

Follis hic similiter alligatum habet cochleare cupreum cum sua titula, longitudine pollices octo continens. Follis vero longitudo quinque, uti latitudo trium pollicum exiit. Ut autem tollis depressus per se in altum relevaretur, atque unica manu innatio heri posset, in interiori parte sua instrumentum veluti plectrum sive elevatorium ex chalybe fabricatum, continet, beneficio cujus, superior pars follis in altum relevatur. Nonnunquam adeo contumacem uvulæ inflammationem, aut relaxationem vidi, ut ultra mensem ejusmodi pulverem quotidie inflare, necessum fuerit. Hæc ideo monco ut de salute ægri semper bene speres, etiamsi ab initio res per se difficilis appareat. Quod si levioribus hisce remediis morbus non cedit, ad fortiora progrediendum est. Nonnulli aquam fortem per se aut aquæ Plantaginis vel rosarum dilutam, aliaque medicamenta caustica admovent: prudenter tamen & caute hac in re agendum est, ne malum ingravescat. Quotiescunque enim malignitas aliqua adest, facillime malum ab ejusmodi medicamentis acrioribus irritatur: si quis tamen his uti voluerit, ea quæ a Paulo Æginethâ lib. 6. cap. 31. hæc de re traduntur, observet.

Sæpenumero quoque uvulam forticibus abscindere aut filo ligare, vel cauterio inurere coacti sumus. Videat tamen Chirurgus ante omnia, ne aliqua subsit malignitas, vel dispositio ad cancerum, quod facile cum ex duobus proxime præcedentibus observationibus; tum ex Paulo Æginethâ loco præallegato, elicere licet, ubi monet contractas, rotundas, sanguinolentas & subnigras, Chirurgiâ agrediendas minime esse. Quæ vero contrario modo se habent, nimirum quæ ut idem Paulus docet, tenues sunt, oblongæ, & in supremâ parte immutæ, neque nigre aut sanguinolentæ sed subalbicantes, Chirurgiam admittere. Tantum autem de uvulâ quantum naturalem excedit modum, auferendum convenit; est enim veluti plectrum rotis, quæ ea carent, raro distincte ac clare vocem loquelamque proferre possunt, Raro inquam, quandoquidem mihi unum aut alterum videre contigit, quibus licet uvula erosâ fuerit, adeo tamen distincte & articulate proferebant sermonem, ac si instrumenta omnia integra ac illæsa adfuissent. Alter eorum Ozenicus fuerat noster, cui per annum integrum ozænâ laboraret, uvula plane erosâ conspiciebatur ut suo loco dicemus. sed hæc rara sunt atque inrequentia.

Porro abscissio hoc modo perficitur. Cuspide uulvæ rostro ciconiæ Chirurgus apprehendat, deinde quod superfluum, forcibus abscindat, parumque sanguinem effluere permittat. Si autem plus æquo effluerit pulvis noster ad sanguinem sistendum cochleari parvo, applicandus est. Postea gargarismis ejusmodi, quales antea præscripsimus, utendum. Quod si æger incisionem abhorreat, aut sanguinis profluvium vereatur tum sequenti instrumento, à nobis primo invento uulam absque omni difficultate atque periculo ligare, & abscindere soleo.

Est autem stilus fistularis, longus pollices octo, nudi ex ære fabricatus, cui ex una parte annulus, adaptatur est. Is vero ex inferiore sui parte tantum excavatus, quantum ad recipiendum solum opus. Postea seminodus, faciendus.

Isti deinceps una pars per foramen, quod in superiori parte annuli est, similiter traducenda. Tum neorum angustissimum foramen quod in externa parte annuli existit traducto illo, parti inferiori alligare oportet. Si autem externa pars annuli, similiter non nihil excavatæ, quo filum, ne hinc inde vacillet, continere possit. Quò facto minime speculo oris linguam deprimat, Chirurgus vero partem uulvæ abscindendam, annulo apprehendat, dextraque filum, vehementer attrahat, ac uulam stringat. Sic enim nodus efficietur. Facto nodo ad uulam, filum, abscindatur: & extracto instrumento, ut extradentes propendeat, relinquatur, si enim in ipsa contractione uulam non absciderit, eadem tamen, aut sequenti nocte, id præstabit.

Sin vero immodicus sanguinis fluxus supervenerit, cauterium ætiale admovendum est, hunc in modum. Habeat Chirurgus duos minitros, quorum unus caput humiter teneat, & agrotò oculos velat: alter linguam oris speculo deprimat.

Chirurgus viro fistulam æneam, octo pollices longam, linteoque madidam, undique excepto foramine excipiat. Postea stylo ferreo ignito fistulæ intronisso, uulam cauterizet, vicinis tamen partibus illæsis. Tandem gargarismis idoneis, melleque rosaceo curatio absolvenda est.

Ut retractio aliqua si adfuerit, efficacissimum erit cauterium. Sed quia ægri vehementer ab eo abhorrent, & totam, si res ad votum non succedat, Chirurgus adscribunt, ideo prius medicamenta hæc, quæ sequuntur experiri soleo, quibus magno cum successu utor. Institutâ igitur optinâ victus ratione, purgato corpore reliquisque adhibitis universalibus, ut antea monui, sequenti gargarisinate os continuo abludere jubeo.

℞ Hordei integri m. i. Radicum plantag. ℥i. Folio. Scabiosæ. geranii, scordii an. m. f. Rosarum & folior. plantag. an. m. i. Coquantur in f. b. iii. a. quæ ad hordei crepaturam tum admixta mellis rosacei, & diamori, an. ℥ii. misce, fiat gargarisma. Ter quoque aut quater in die unguento nostro Ægyptiaco, cujus descriptionem pete ex tractatu de gangrænâ affectam partem penicillo innungo, idque eo usque continuo donec pueredo, ac morbi sevia remiserit, tum ea quæ superius in

relaxatione uulvæ tradidi adhibeo, iisque curationem absolvo. *Guilielmus Fabricius Hildanus observat. Chirurgic. Cent. iii.*

*De ulceribus oris, ex lue venered contractis:
Item de uulva relaxata periculosa
curatione.*

Nobilis ac strenui viri, Dn. Joh. Held i. alytæ R. ipublic. Freyburgenlis Helvetiorum consulis prudentiss. uxor, cum quadam die sub ardentissimo sole equitasset, caputque plus, quam pro conservanda valetudine licebat, excalescens fuisse, catharro ad uulvam & fauces corripa fuit. Advocatus Barbitorfor, cum uulam intumefactam esse deprehenderet, pulverem summe calidum & acrem quotidie ter quaterve inflavit. Hinc exorta inflammatione & abscessu periculotissimo, non tantum uulvæ, verum etiam cartilagine narium erofæ fuerunt, ulceraque hinc inde in facie eruperunt. Tandem miseram calamitosamque hancce vitam, misera illa ægra (quæ nulla arte sanari potuit) misere, sed constanter & pie finivit, melioremque vitam sibi elegit. Hæc ex ore genere, & virtute nobilissimæ matrona Dn. prænoninæ ægræ filia, Anno 1616. Martii. præfente clarissimo V. Do. Seb. Sti. no Mejero, Reip. Solodurensis, Do. medico ordinario excepti.

Anno 1612. ex Belgio rediens, una cum viro clariss. atque doctiss. Dn. Georgio Fabro, Cæli imperialis Fridbergenfis doctore Medico ordinario atque celeberr. matronam piam & singularem virtute præditam, nec non Dn. Fabro sanguine junctam vidi: cui cum propter catharrum uulvæ relaxatam inflammatione fuisset, & Barbitorfor aquam quam Regis vocant, nimis indifertè applicuisset, talis sequuta est inflammatio, & humorum affluxus, ut per dies aliquot de vita periclitaretur ægra. Tandem, cum Dn. D. Faber. (qui peregre profectus fuerat) advenisset summa suâ & indefessa diligentia restituta quidem fuit: sed uulva & portio aliqua ossis palati & cartilaginum narium exciderunt, maximo cum ipsius incommodo & loquelæ depravatione.

Ex pulvere piperis longi & croci, gulæ faucibus insperlo atque insufflato anginam periculotissimam sequutam fuisse, in reverendo viro, Dn. Johanne Merula p. m. Ecclesiæ Paterni censu pastore fidelissimo observavi anno 1607. uti in 3. centuria observationum mearum fufius videre poterit.

Quapropter curandum est, ne corpore existente impuro, aut inflammatione & affluxu humorum tentatâ parte affectâ huiusmodi. Medicamentis calidioribus & erodentibus facile utamur, uti etiam si maligna aliqua qualitas, ex humore atrabiliario progenita, quæque canem sapit, adfuerit. Cancrofa enim ulcera à medicamentis erodentibus exasperantur irritanturque. In his potius medicamentum ex cineribus gammarorum & ranarum, cum eorum menstruo confectum applicarem. Illud quanto tum successu in egregio isto sene Dn. Claudio Monteiletto antea annum fecerim te non latet. *Idem Cent. vi.*

Pro Columella inflammatione.

Premissis Clystere & venæ sectione, hoc gargarisma (cum essemus in principio) ad fluxionem reprimendam præscripti.

℞. Aqua plantag. ℥iij. aqua equiseti. ℥iij. fl. ros. rubr. p. j. β. β. gallarum contritarum numero iij. ebulliant unica forti ebullitione colat. adde diamori ℥iij. M. Postea venas sub lingua secari, & vulvam etiamnum inflammatam, & propendentem pulvere aluminis utri & boli armeni simul mixtis sublevavi. Hoc deinde gargarismo utens convalevit.

℞. Plantag. bellid. min. fl. ros. rubr. an. an. p. j. balaut ℥iij. coq. in aqua ad ℥ adde aqua plantag. ℥ij. sem. Cydon 3j. sem. maln. 3β. rursus bulliant. addendo diamori ℥iij. β. Mell rosat colat 3. M. pro gargarismo jubebam quoque ut ex dianuco lambreret, quo utebatur Galenus in Hortulano. Petrus Forretius obs. 1. lib. 15. de faucium, guttur. gulæ, & asperæ arteriæ affectibus.

Mulieri cuidam consilia vehementer tuebant, columella inflammata & valde laxata erat, ut deglutire & respirare posset, illam curavi in hunc modum.

℞. Aqua font 3j. olei vitrioli tot guttas quoad acidam multum reddant. In hac aqua intinctam pennam ad fauces tumentes immittebat aliquoties in horas singulas: cujus usu ore permulta phlegmata continuo emittebat & expuebat. Post aquæ immisionem ex præcepto meo Succinum album carbonibus imposuit, & per infundibulum ore fumum excepit, & sic cum multorum stupore intra diei spatium sanitatem obtinuit. Nam mox sine molestia deglutivit, facile respiravit, bene dormivit, tumor & inflammatio protinus sublata fuit *Martinus Ralandus*, cent. 2. cur. 97.

Pro Vulvæ elongatione.

Fiat ratio capitis super commissura sagittali, & applicetur ibidem ventosa habens orincium satis amplum & oblongum, & teneatur saltem per unam horam, vel mediam, ter vel quater in die reiterando ipsam: violenter etiam sursum attrahantur capilli ejus ita ut cutis capitis exfoliatur à cranio suo: per tale enim ingenium statim uvula mirabiliter sublevatur. Vidi ipsum fieri & instanter profuit: sed non debet fieri nisi in casu arduo magnæ suffocationis. *Barthol. Montagnana cons. 88.*

℞. Gummi gott. gr. vi. tartar. vitriol. g. vi. ol. succin. gt. iij. cum syr. ros. solut. F. pil. v. ante vesperam scarificatione cum cucurbitulis utebatur: & paulo post isto gargarismo usus est.

℞. Aqua verben. plantag. equiset. an 3iij. fl. ros. rub. cortic. granat. an p. j. sem. cydon. 3β. ebulliant omnia simul. in colat. dissolv. diamor. dianuc. an. 3vi. syr. papav. mell. ros. colat an 3β vini granat 3j. syr. de granat acid. 3β. sal. pruell. 3j. spirit. vitriol. q. s. ad grat. aciditatem coletur de novo ut F. gargarismus pellucidus.

Tale circa collum inducatur cataplasma.

℞. Rad. alth. 3j. fl. scabiol. sambuc. ros. rub.

melil. chamam. an. M. j. sem. alth. 3β. coq. in vini albi q. s. ad mollitudinem & pistentur: adde farin. sem lini & fenugrec an. 3β. Pulv. nidi hircundin. 3j. mell. ros. 3β. theriac. el. 3j. ol. sili 3β. ol. chamam. amygd. d. rec. an q. s. M. pro cataplasmate.

Contra Uvulæ elongationem hoc etiam proposui.

℞. Rad. bistort. irid. tormentillar. imaturar. an. 3ij. fl. ros. rub. scabiol. an. 3j. lap. calamin. præp. 3β. alumin. utri 3j. M. F. pulvis subtiliss. lingua speculo oris depressa, cochleari parvulo ad id facto, pulvis vulvæ admoveatur, imo si fieri potest undique insuffletur Petrus Loricivus. obs. 1. & 2. cap. 3. lib. 2.

Ad faucium glandulas tumentes, lo. *Henricus* hoc in secretis habuit.

℞. Argentinam coq. ex cerevisia, & fiat gargarismus, notis ad cap. 9. lib. 5. *patholog. 1. Fernelii.*

Columella duplex, vel divisa.

Columellam duplicem, imo potius divisam, vidi in puëlo, qui Labio Leporino ita deformatus erat ut simul palatum ad imas usque fauces fissum conspiceretur. *Henr. Vollgnadit.*

De Vulvæ Gemina.

Uvulam ad bene loquendum esse necessariam, ideoque non adeo inepte vocis plectrum audire, a plurimis Anatomicorum creditur; id quod absentia etiam ejusdem, & prava, eaque vel conata, vel a morbo inducta, constitutio evincit; ceu inprimis ab Excell. D. Carolo Raygero in discursu, aglossotomographiæ, Jacobi Rolandi, Anno tertio Ephemeridum chrysolarum German. adjuncto, præclare illud ostenditur. ubi adpositum exemplum gargarionis duplicis, in memoriam revocat. quæ simili in materia observare mihi bis licuit.

Prima vice, dum annis duobus abhinc juvenis 14. annorum, curæ meæ subiectus, singularem in Columella naturæ lusum exhibendo, duplicem eam concessisse ostenderet, non quidem immadiate palato juncta, tanquam e basi quadam propendentem, cæterum naturali plane situ locatum, ac figura & magnitudine juxta præditam.

Alterum exemplum hoc demum anno ancilla annorum 12. præbuit, cujus palatum duæ pariter uvulæ unitæ occupant, quoad figuram insoliti ostendentes, magnitudine saltem naturalem illam haud æquantes, ita ut ambarum quantitas junctæ, si cum hac conferatur, non nisi parum eam sit superatura.

Revera autem binas in utroque subjecto uvulas adesse, non saltem divisas, quales tum præfatus D. Raygerus l. c. pug. 568. tum D. Henric. Vollgnad in Schol. ad obs. 239. Anni 1. Ephem. laudatarum sibi occurrisset, testantur, ipsa earum conformatio docet, cum ex latiori basi in obtuse acutum mucronem singulæ terminentur. Cæterum rara hæc aberratio in illis personis nullum aliud incommodum affert, quam quod vocem non ea gratia, qua fieri alias solet, edere possint, sed raucam nonnihil, & obscuram, e naribus quasi descendente, eadem emittant.

Similem plane affectum in liris utriusque sexus hominibus, quas lues enere particula hac multavit, vel saltem ex parte mutilavit, in nostro nosocomio Gallico. Cujus cu. am jam per unde viginti annos ago medicam, observavi, ita ut omnes rauca quodamtenus voce deturpati fuerint; hinc me illos in partes abire permoverunt, qui experimentis edocti, Gabr. Fallopio, nullum vocis detrimentum exese uvula supervenire, in Obseru. Anton. adfirmanti, contradicunt, sicque ampla Riolano fides sit habenda, dum lib. 4. Enchirid. Anat. cap. 1. de gargareone agens, quibus deest, inquit, vox rauca evadit. Cujus veritatem etiam nuper à Nobil. D. Nicol. Guil. Beckers, observatione Anno 4. Ephem. Germ. Observ. 66. inserta fuisse confirmatam vide. Lucæ Schröckhii.

Columella absens à nativitate sine noxa.

Beatiss. Dn. D. Johan. Hagendorn patrue-
lis meus, in praxi amplissima observavit ab-
sentiam Columellæ in puella quidam à nativi-
tate, quæ nihil inde incommodi passa est, ex-
terum sana. Ehrenfrid Hagendorn.

De Vvula Abbatione

Perillustis eques Romanus, temperamenti sanguineo-melancholici, pluribus annis deluxio-
nibus itatis temporibus super fauces ruentibus in Italia laborare solitus, Principum dum ne-
gotia Cæsarea in Aula pertractaturus, Vien-
næ moraretur, acri ac terrena circa solstitium hyemale anno præterito super fauces & circum-
scitas partes distillatione corripitur, quæ tan-
tæ erat acrimoniæ, ut (quanquam medica-
mentis tam totum, quam partes affectas res-
picientibus, ex Pharmacia & Chirurgia de-
sumptis abunde agro prospectum fuerit) Vvu-
lam cum Tonsilla dextra corroderet, ac ex in-
tegro sustulerit. Quo facto Perillustis eques,
non loquelæ, neque respirationis difficultatem,
ut variè opinabantur; Verum cum uvula sit as-
peratum ac levium arteriarum tanquam oper-
culum, aliam, præter levem vocis raucedini-
nem, nullam sensit molestiam.

(Simillimum exemplum apud nos. h. l. vi-
dere est in scemina primaria, quæ ob deluxio-
nes salinis corrosivas ante aliquot annos ple-
tæro hoc vocis orbatæ effari quidem omnes li-
teras, & loqui, sed tantum rauca & submissa
voce non clara potest. G. W. Wedelii.)

De hiato Palati & Vvula.

Anno 1674. die 4. Aprilis evocatus sum rus
ad quendam Nobilem, cujus Generosa uxor
tum ante 21. septimanas fetum masculum pul-
chre formatum peperit, qui in oris palato quæ-
dam insolita ostendit. 1. magnum hiarum ab
anteriori oris parte ad locum uvulæ vergentem,
ibi qua (2.) Uvula duplex & in medio divisa
videbatur, ita ut quis uvulam geminam dice-
ret. 3. Labia hujus hiatus in palato ab invicem
digitum lata distant, ibique (4.) palatum spu-
rium maxime rubescere in locum naturalis pro-
ductum cernitur. (5.) liquida bene deglucit,
nisi quando importune ingeruntur, tum per na-

res effluunt, si autem placide comedat minime,
quomodo autem solidiora deglutiet, tempus
docebit: 6. in ploratu per nares nihil revolvi-
tur, & si quis juxta ploratum judicaret, nihil
vitii ori inesse diceret.

Causam hujus affectus ipsa Generosa Ma-
trona relicit in hunc casum: contigit aliquando
ut quidam Nobilis ephesus cum ancillis nu-
garetur, Itrophiolunque ad eas mitteret, quo-
cum forte adveniret generosa Matriona, in ejus
os invasit; hæc idcirco terrore affecta, linguam
in ore retrahens, hinc missi Itrophiole hæc
insolita accepta refert. An ergo imaginatio hic
locum habeat, dicant Naturæ Amatii. Paulus
Zacchias hunc vim adimit imaginationi, & cum
eo alii. Verum meo judicio difficile & arduum
erit contra tam receptam, torquæ seculis asser-
tam, tanque innumerabilibus observationibus
confirmatam sententiam, &c. Job. Zudov. Hanne-
manni.

Exsecta propè uvulam carnea excrescentia.

Præfens excrescentia carnea nuper ex collo
Conjugis civis nostri Argentinenfis prope uvu-
lam antrosum à Chirurgo fuit excisa, & felici-
ter, Deo nobis favente, peracta ita operatio,
ut nunc scemina illa nil detrimenti exinde sen-
tiat. Seb. Schefferi.

De ablatione Vvulae forfice peracta.

Uvulæ laxitatem ex decubitu mucosi humo-
ris à capite oriri Hippocrates docet l. 2. de
morbis.

Affectus hic, per se sitis gravis, deterioris
sæpius notæ efficitur ab iis, quibus vel morbi,
causæque ejus conditio ignota est, vel adhibi-
torum medicamentorum virtus, quæ de ma-
teriâ legi possunt quæ Fabricius Hildanus de
Angina cap. 1. parte 6. obs. 15. parte 2. obs. 21.
proponit. Hoc faciunt illi qui in uvulæ laxitate
& elongatione, accedente illius cum partibus
vicinis, amygdalis, palato, alisque, inflama-
tione ex sanguinis affluxu, medicamentis
utuntur summe calidis, qualia solent esse, eo-
in casu usualia, piper, zinziber, sal ustum si-
milique. Quæ improbat magnus Galenus 6. de
sanit. tuenda & 6. de comp. med.

Placet variis in uvulæ prolongatione pilos
quosdam verticis sursum attrahere, adeo ut so-
nitum quendam (quem se audire referunt)
edant, sic enim eorum opera elevari censent
pericranium, cujus ex elevatione locum conce-
di uvulæ sibi persuadent.

Uvula hæc non raro ex sanguine & pituita
eam ad magnitudinem increfcit, imprimis ubi
pituita malum producit, ut Nuci juglandi
æquiparari queat, Hæc de re videri possunt quæ
adferunt Hipp. lib. de affect. Aetius lerm. 8. cap.
41. Hildanus part. 2. obs. 21. Quod si longe ma-
jorem corpulentiam ipsam quandoque assumptis-
se dicamus, vera nos proferre scias.

Paulus ab Ushelen, Mercator celebris, vir
temperamenti pituitosi, cui tamen cacochy-
mia biliosa aliquomodo accedebat, Vvulæ tu-
more ex affluxu humorum copiosiore sæpius
afficiebatur. Accidit ut ejus magnitudinis eva-
deret, ut coactus fuerit medicum domesticum,
nobiscum, advocare. Primo omnium ad eva-
cua-

Evacuationem humorum biliosorum, pituitosorum que exhibuimus Purgans conveniens, imo etiam ad tubulationem materię p. n. in uvula collectę gargarismum hunc.

℞. Fol. Rosar. rubr. Plantag. caudę equin. an. Mj. agrimon. vineę Pervinę an. P. ij. Cor. ric. Granator. 3j. β. nuc. gallar. 3j. flor. balaut. 3 β. coquantur in aq. purę & enalyb. an. part. æqual. ad consumptionem tertię partis. colaturę sū ij. adde syrup. Diamoron. granator. an. 3 ij. ol. Vitrioli gutt. v. M. F. gargarismus.

Collo appli. abatur linum præparatum (vlas) quod ex thure accenso fumum exasperat; Cervici imponebantur cucurbitulę præmissa scarificatione debita.

Uvulę admovebatur pulvis sequens cochlearis commodi ope.

℞. Gallar. inmat. 3j. β. cort granator. 3j. flor. Rosar. rubr. Fol. candę equin. an. 3 ij. alum. ulsi 3 β. Terrę Lemnię 3 j. M. C. pulvis subtilissimus.

Instrumenta alia quorum opera pulvis hic aut similis uvulę applicari queat, qui desiderat, in picat quę delineari curarunt Fabr. Hildenus, & Ioannes Schultetus part. 2. cap. 21. Tab. 9. fig. 8. commodius licet nobis nullum occurrat cochleari nobis usuali. Medicamentorum dictorum usu, & affectus ipse & trilitia ægrotantis plurimum remiserunt.

Tempore aliquo elapso, convivio cuidam quod adiuisset æger, ex immoderato vino rhe-nani generosioris usu, subito uvulę in tumescencia ipsum de novo invasit, pituita plus iusto aucta, humiditatibusque superfluis denegato loco satis capaci, conternatos hæc fecit consanguineos, maxime ubi sine ullo levamine incrementum sumebat enorme, adeo ut gangręnam minari videretur, colorem sub nigricantem assumens, qualem uvulam describit Forestus lib. 15. obseru. 5.

At usu dextro medicamentorum, prægressis magis calidorum, id effecimus, ut, colore purpureo remittente, flavus inductus fuerit, at ex affluxu flavescens huius humoris in eam longitudinem increvit uvula, ut supra linguam ad labia ipsa se extenderit, unde & linguę notus, ipsaque adeo loquela, deglutitio etiam, & respiratio ipsa, fere fuerint abolitę.

Symptomata hæc tollere (nostro iudicio) impossibile, nisi per extirpationem; hanc quo convenienter institueremus, luci oppositi ægrotantis linguam sinistra manu ope glossocotchi depressimus, dextra forficem admovimus acutissimum manubrio longiore præditum; videri possunt quę hac de operatione habet Ægineta lib. 6. cap. 31.

Thomas Bartholinus cent. 2. hist. 88. delineationem exhibet instrumenti alicujus pro uvula abscindenda à rustico quodam Norvvego Canuto Thorberno, ingenio minime plebeo excogitati, et omnibus aliis, etiam acutissimis, merito forficem præfero, secutus hac in re magnum Hier. Fabr. ab Aquapendente, qui part. 1. operat. chirur. cap. 37. vossellam Celsi reiecit, & forfice uvulam male constitutam corruptamve aufert.

Ut redeamus ad ægrotantem nostrum, uvula abscissa exspuebatur, oris facta cochlearis ope applicabatur cataplasma ex linteo tolto

(Tondel) farina volatili, & Spir. Victriolitan-tilio, utile ad id ut sanguinis fluxus, qui tamen parvus admodum, inhiberetur. Hinc melle Rosaceo absolvebatur curatio.

Modum hunc uvulam auferendi nil periculi habere certum est nec est quod cum Chirurgis rerum Chirurgicalium minus peritis sanguinis fluxum metuanus, facilissimum enim, cochlearis dicti ope, rei necessitate id exigente, ubi calefactum, minime ignitum, parti affectę applicatur, cum illere, quale quid fieri posse Hildanus loco citato docet.

Materię huic antequam finem imponamus, in gratiam Chirurgicę artis cultorum, quibus haud grave fuit observationem hanc perlegere, redolimentis loco medicamentum aliquod communicare placet, cujus vires insignes ex perti sumus in non uno, quoties exulceratio adfuit uvulę, imo ubi exulcerationi conjuncta ulceratio Amygdalarum, pharyngisque, siquidem penicelli ope parti affectę applicetur, præmissa usu gargarismatis ex Decocto Ligni guajacini, Rad. cassaparill. similibusque parati.

℞. Mell. Rosar. 3 ij. chelidon. 3 β. aqua. Mercuriall. 3 β. mercur. præcipit. 3 ij. liquor. Ægypt. 3 ij. M. F. situs.

Aqua Mercurialis cujus hic datur mentio, descripta est à Carolo Batto Tract. 2. cap. 11. estque Aqua Fallopii. Job. à Mexren in observat. Medico Chirurgic.

GUSTUS MORBI.

Quibus organis perficiatur Gustus in Lingua morbis videbimus dum scilicet tum partem uno describemus verbo. Hic itaque tantum ejusdem ipsius morbidas affectio res per Consultationes & Observationes, adnotabimus.

Consultationes.

Gustus depravatus.

D. Joacinus Navin Episcopus Caminensis Cancellarius optime meritis, intemperie calida hepatis affectus, insignem oris & linguę patiebatur amaritudinem, adeo ut suavissima etiam, seu esculenta, seu potulenta, gusta admodum amara & ingrata penitus averfaretur, cum notabili virium dejectione.

Gustus depravatur ab humore bilioso, linguam profundente, inprimis tunicam sive membranam quę os & palatum luccingit.

Bilis, vitio hepatis intemperie calida affecti, producitur.

Vires dejiuntur ob alimenti defectum, quatenus æger cibos propter saporis amaritatem averfatur.

Humor itaque biliosus evacuandus, intemperies calida hepatis alterando; & vires reficiendę.

Ad bilis evacuationem, præmissa convenienti præparatione præscripsi potiunculam.

℞. Rhabarb. electi 3 ij. tart. vitriol. gr. v. infund. per noctem in aq. endiv. & calendul. an. 3j. mane colent. adde syr. de cichor. cum

rhabarb ʒvi. specier. electuar. de succo rosar. gr. xi. M. F. potiuncula.

Pro alteranda intemperie epatis calida ordinavi electuarium.

℞. Conserv. rad. cichor. ʒij. conf. ros. vi-triol. ʒij. spec. diatiron santal. ʒiʒ. spec. diar-rhod. ʒj. condit. lactuc. Hispan. ʒvi. syr. ber-beror. q. s. M. F. electuarium.

Cum nondum remitteret oris illa seu linguz amaritudo repetii potiunculam laxativam modo descriptam additis resin. scammon. gr. iij. unde sufficientissime purgatus est.

Pro alteratione serui lactis capriui cum rad. cichor. & succo acetosæ præparatum exhibui.

Oris colutiones ex aceto rosaceo & aqua endiviz institui, interdum etiam lapide prunella in aq. plantag. soluto, gargarismi loco usus est.

Ad viri non refectionem aquam meam cordialem frigidam & subacidam, emulsionem item periaru. Cratonis tinctur. rosar. & alia cordialia commendavi, non minus ac cibos bene nutriendos, iuscula in primis connummata ex carnibus, vitaminis, vervecinis, caponum &c. cum acetosâ & cichorio alterata, quibus tandem a molestissimo hoc malo plene liberatus est. *Balthasar Timæus in Consiliis Medicis scribit.*

Gustus, & Olfactus Depravatio, cum Inappetentia, & totius spontanea Lassitudine.

Proponitur nobis Matrona Nobiliss. quinquagenaria, cui tribus ab hinc mensibus coepit depravari Olfactus & Gustus; quæ quidem depravatio iugis est, & tunc præsertim se prodit, quando assumit alimenta, & speciatim potulentia; percipit enim tetrum quendam halitum, qui potissimum alimenti tempore molestior est. His accedit inappetentia, & spontanea totius lassitudo; de quibus tamen non constat num præcesserint odoratus & gustus depravationem, an vero post apparuerint; audendum quinetiam uno ab hinc anno destitutam fuisse purgationibus menstruis. Quare supponendum in primis, affici organum sensus odoratus, & gustus; quia eorum facultas depravata est. Quærendum autem, an primo & per se læsatur, an vero per consensum ab infirmis partibus. Et primo quidem essentiali esse affectum inde colligi posse videtur, quod diuturnus sit; siquidem ante tres menses incepit; secundo quia continuus; tertio quoniam de aliis partibus male affectis nullæ adsunt querelæ, quarro quia mentem quodammodo esse perturbatam referunt, quamvis quod spectat ad hanc perturbationem rationi potius consentaneum videatur quandam duplicitatem, quam veram depravationem esse; cum referatur nunc labori, quia ab esculentis & potulentis exasperatur affectio. Nihilominus organa dicta per sympathiam pari, multis & potioribus argumentis convincitur. Primo quidem, quod laborat inappetentia, ex quo apparet male habere Ventrículum, à quo facile affluere possunt aliqua materia, h. rum affectionum causa, Secundo quia totum corpus lassitudine afficitur, quæ cum oriatur ex materia aliqua malæ conditionis, facile potest organis gustus & olfactus impertiri. Tertio quia jam per annum suppressi sunt menses; quod certe materiam has affectiones indu-

centem, ex alterutro horum locorum promanare convincit. Præterea, si olfactus essentialiter afficeretur, aut propter vicus neret, aut propter objectum improporcionatum. Vicus vero, vel extimas partes, vel internas, nimirum supra os ethmoides obsideret, & externas, in conspectu esset; si supra colatorium os, indicarent excreta, sanies scilicet. præterquam quod perciperet etiam ex hac materia morium, & difficultate respirationis per nares laboraret, ex materia foraminulis oculis impacta. Quamobrem statuendum heri malum per consensum, elevata scilicet à subjectis partibus tetra quadam exhalatione, ex qua tamen sensoria alterationem quandam essentiali contraxerint.

Cuiam hujus affectionis quod spectat. Vir Præclariss. qui ad nos scribit, existimat esse materiam in capite hærentem, quæ halitu suo utrumque sensorium afficiat; hancque non quidem putrida esse, aut ex ulcere manere, sed in capite nascisci corruptionem quandam; interim vero fieri posse ut à Ventrículo & ab utero vapores expirentur, affectionem foventes. Hinc priori sententiæ assentiri non possum; si enim supra os cribrolum hæreret, coryzam induceret obstructis ossis illius foraminibus. Præterea nullo prorsus modo affici posset sensus gustus ab hac materia; sicut facillime sensus odoratus, ab illo enim loco ad palatum nulla alia patet via materiæ, nisi tertius cerebri ventriculus, & extima palati orisque partes; at si tertium ventriculum permearet materia, graviores excitarentur affectiones, puta Vertigines, Epilepsia, & huiusmodi; Si vero extimas partes pervaderet, ab assistentibus perciperetur. Rationi ergo consentaneum magis videtur, pendere malum ex tetra quadam exhalatione in caput, à subjectis partibus effluante, ut dictum est; quæ nihil aliud sit quam nidorulentus fumus cum aliquo factore, vel vapor inexplicabilis cuiusdam odoris, ex corruptione materiæ ad extraneam qualitatem, aliquando contingere monet Avic. licet hoc parum faciat ad curationem; prout certum est gustum ab eo affici specie saporis, quatenus est acris; olfactum vero specie mali odoris.

Cæterum cum hic fumus à triplici loco efferi possit, à toto Venoso genere, à Ventrículo, aliisque visceribus naturalibus, & ab utero; atque cognitu facile sit ab omnibus his locis aliquid affectis organis impertiri, diligentiori inquisitione illud dignum videtur, à quam scilicet parti potior ac immediata mali causa proveniat. Etenim præcipua causa ab Utero pendere videtur; primo quidem, quia fortasse suppressi sunt menses, ante statum tempus, quamvis enim quinquagenaria sit, & ex Arist. habeamus, hanc ætatem menstruis purgationibus naturaliter destitui; hoc tamen non est perpetuum, neque ita facile est statuere determinatum tempus in omnibus, vis præsertim quæ sunt boni habitus, & sanguine abundant. Hoc etiam confirmare videtur spontanea totius corporis lassitudo, ortum fortasse ducens à sanguine ab utero refluente ad totum venosum genus. Neque obstat, quod spatium novem mensium à suppressis purgationibus, immixtus à dictis accidentibus vixerit; probabile siquidem est, materiam eo tempore non contraxisse corruptionem, ad hanc depravationem necessariam;

cessariam; cuius rei certius quinetiam haberetur indicium, si menses non sensim ac sensim defecissent, ita ut prius imminuti, mox suppressi fuissent, fieri solet; verum ex scheda hoc non constat. Quæ si vera esset mali causa, posset inappetentia ab eadem originem habere, collecta enim huius sanguinis copia circa venas superni orificii ventriculi, aliquam adipiscitur corruptionem, cuius causa sit ut appetitus tollatur; præterquam quod repletis illis, venis, nulla sit succio, nullaque cibi attractio; hinc alimentis assumptis agitur illa materia & molestior ne affectio. Causa vero suppressi sanguinis circa uterum, vel est crassamentum aliquod, ob adustionem à Jecore fervido congelatum; vel crudi humores, a debili ventriculo suggesti; vel tandem utriusque imbecillitas; de quibus tam ex scheda nihil conjectura colligere licet. Pro alia vero parte præcipuam mali causam ventriculum suppedicare, multa indicare videntur; primo quidem, quia frequentissimum est has depravationes, præsertim olfactus, oriri ex ventriculi affectione. Secundo quia ventriculus evidenter læditur, laborat enim inappetentia. Tercio quia ex ventriculo utrumque sensorium non commode afficitur potest. Læditur autem ventriculus, tum per essentiam, quia intemperatus tum per consensum ab utero & aliis visceribus naturalibus. Intemperatus vero est, quia jam diu laborat; quæ intemperies est caliditas præter naturam, juncta uberiori humiditati; unde sit ut alimenta non probe coquantur, sed corruptionem quamdam extraneam patiantur, nidorulentæ fortasse similem, dependentem ab interno calore, qui tamen insignis non est, ejusdem acrimonia ab humiditate retusa & refracta. Verisimilius itaque videtur immediatam mali causam à ventriculo subministrari, & potissimum, quod mensibus suppressis proprios non videmus suscitari affectus, cum vapores ab utero ad ventriculum & septum transversum elevati pariant suffocationem, præsertim dum Diaphragma impetunt, præterea rarissime accidit hac ætate menses fluere; adde quod si à suppressione mensium hoc contingeret, affectus multo prius sese prodidisset, cum anno abhinc inceperit. Verum quicquid tandem statuamus, in casu, quo divinatione potius opus, credere fas est partes dictas sibi invicem consentire, adeo ut quæcunque demum fuerit pars magis affecta, vel uterus, vel ventriculus, concedendus sit mutuus non solum consensus harum partium, sed etiam Hepatis & Mesenterii, quibus quodammodo obstructis materia ad ventriculum, & ab eo ad organa odoratus & gustus transfunditur. Doctiss. autem Viri, qui curæ præstet, partes erunt ex propriis singularum harum partium affectionibus perpendere, quænam ex dictis potiorum mali causam præbeat.

Malum hoc ex se non quidem periculosum; signum tamen est dispositionis in corpore, non omni periculo vacantis; si enim materia, quæ nunc ad organa odoratus & gustus fertur, in cerebrum aliasque præcipuas partes puta cor, impetum faceret, posset inducere vertigines epilepsias, convulsiones motus, palpitationem, synopen, & id genus morbos, maxima parte lethales; ut idcirco optimum sit consilium, tum ad præsentis molestias auferendas, tum ad immi-

nentes præcavendas, uti quibusdam remediis, licet ab his non facilis sanatio sit futura præterea, si in utero mali causa resideat; sperandum tamen, diligenti adhibita curatione Pat. liberandam esse, quia affectus nondum est confirmatus, neque validioribus remediis tentatus.

Ut itaque liberetur, revellendæ terra illa evaporatione a supernis ad infernas partes; prospiciendum causæ, materiæ scilicet in ventriculo & utero itabulanti; viscerum & uteri obstructions tollendæ; tandem iisdem, & affectis organis conciliandum robor. Hæc autem fiunt remediis Chirurgicis. Pharmaceuticis & Dieteticis.

Chirurgiam quod spectat, necessaria est sanguinis missio, non solum ob suspicionem suppressorum mensium, aut statum non tempus sed ad revellendam materiam petentem supernas partes, quæ, potissimum si lassitudo ex plenitudine fuerit, & viscera sint obstructa, omnibus numeris juvabit. Quare aperiuntur venæ interiores, utriusque pedis, & detrahatur sanguis ad eam quantitatem, quam videbitur ferre virium conditio, & corporis plenitudo. Quod si ob venarum exitum non possit ex illis educi sanguis, subtrahuntur scarificationes in suris veterum more; aut admoveantur Cucurbitulæ cum scarificatione, internis coxarum partibus; deinde vero ad derivationem ab utero, referendæ sunt hæmorrhoides. Neque obstat, quod fiat ab utero derivatio; quia si ea evacuatio nondum subtiliterit, statim omnino subsistet. Si fonticulos in cruribus gestet, eos conservet; secus, inuratur in us brachio dextero; & si graviores corporis affectiones invaluerint, alter etiam sinistro, ut, utique enim magis affectæ sunt infernæ quam supernæ partes. Si tandem insignis aliquis materiæ impetus ad caput observaretur, non profus inutilia forent duo vesicantia, partibus itidem infernis applicita; quæ tamen hoc statu parum juvare possunt; quia vapor, sursum petens, habet antiquatum & habitatum impetum, & vesicantibus non revocandum. In hoc etiam fonte, lotiones, frictiones cucurbitulæ siccæ & ligaturæ, ad materiæ diversionem utiles erunt.

Reliqua remediis à Pharmacia desumptis perficienda. In primis vero purgandum corpus universum, præmissis præparantibus idoneis, & ante horum usum, exhibitio leniente, ad primum viarum expiationem, quod constare poterit, ex mel. ros. sol. & syr. de Polyp. si placeat potio, si bolus Elect. lenit. & spec. hieræ. Præparantia, erunt attenuantia, incidentia & deobstruentia, paranda ex diluto Capil. Ven. Pentaph. Borrach. meliss. Viol. Fumiter. & Lupul. additis syr. de Pom. de capil. Ven. de Lupul. de Artem. de Cortic. citri. Inde purgentur humores, aut elect. lenit. Diacat. cum confect. Hamech, aut infus. agar. cum portiuncula helleb. nigri. Verum quia corpus valde est impurum, & excrementis redundans, ideo repetenda purgatio, præparatis humoribus syr. de pom. & Fumiter. comp. addito syr. de duabus & quinque rad. diluto vero adjectis puleg. Artem. Orig. & Agrim. Tandem petatur eadem purgatio ex Confect. Hamech. cui addatur, si placet portiuncula extracti helleb. nig. His expiato diligenter corpore, placet Aquar. Tettucian. per triduum aut quatrimum usus; detergent enim, roborant, aperiunt, quæ

us; detergent enim, roborant, aperiunt, quæ hoc casu sunt necessaria. Mox ad obstructions expediendas, & ad roboranda viscera, nil præstantius fuerit decocto in jure columbæ turticollæ parato, ex port. oæ salistras, quod fragantis odoris est, & deobstruit, China. & ligno indicis, aut lentisci, quæ aperiunt & roborant omnia viscera, additis Melissæ, borrag. Fumar. Puleg. Capil. Ven. Mentha, Absinth. cicer. rubris, portione Sabinæ, rad. Asp. rag. & Fœnic. Pimpin. Fragr. & Cich. in cuius mû pergat 15. aut 20. dies, vel prout videbitur exigi à morbo, & à viribus tolerari, ejusdem tamen quotidianum usum præcedat bolus, ex Troch. aperiensibus, puta de Absint. de cappar. & de myrrha, cum succo cichor. & borrag. condens. Familiariter etiam utatur spec. hieræ, & aliquando triphera sine opio; quandoque & magnis Antidot. speciatim vero, frigidioribus temporibus, quibus & Castoreum erit adinstar omnium. Ex quorum ope luculentum quidem speramus emolumentum, verum pro continuo quadam revulsione, & derivatione ad alvum, laudamus quam maxime Elect. ex spec. hieræ & Riab. paratum, cum mel. Ros. addita interim portione Diamoschi & Ambræ, cujus Elect. familiaris & frequens sit usus Placent quinetiam inter cætera Pil. de Aloe, quæ hoc casu sunt ac comodatissimæ; nam ratione Aloes, detergent & evacuant ac derivant, quod maxime optemus.

Extrinsicis conveniunt Fomenta, Balnea & infusio, ut laxentur viæ, calorque contempereatur; quorum mater. as omittimus, utpote clariss. Viro notissimas. His omnibus peractis, non erit inutilis usus Conser. roborantium, qualis erit Conser. de Absint. & Rosimar. quibus addatur portuncula spec. diam. vel diamb. Juvabit quinetiam Vinum Absinthices, cum portione rosimar. & meliss. interim ad ingratum odore extinguendum & obtundendum, præstabit pila odorata ex aromatibus, Ladano scil. puro, alia odorata, rad. ireos, cum pulv. Viol. & ros. & portione moschi & ambræ griseæ. Et naribus tandem indifferens potest quinta essentia rosism. cujus spiritus, si suppeteret, omnium præstantissimus esset.

Tandem ad roborandum Ventriculum nil præstantius stillicidio, aut ex aqua marina addito vino, absint. Mentha, Puleg. & chamæmel. aut ex oleis. iisdem additis herbis.

His omnibus tandem addatur congrua & accurata victus ratio, quæ ejus sit conditionis ut caput non repleat, & excrementa non augeat. aquæ Aponenses, si possent haberi, post Tettucian. s exhibet, utilissimæ forent.

Hæc in casu admodum perplexo dixisse volumus. Faxit Deus, ut singula proficiant, ac optatis curatio respondeat. *Raym. Joh. Fortis Consult. & Respons. Medicin. Tom. 1.º Cent. 1.º*

Observationes.

Gustus privatio, ob vitiosum nervorum situm

Maxima admiratione me affectit inspectio Lazari vitrivoracis vulgo dicti: Hic nullo prorsus gustu dum viveret, prædictus erat, nullam in edendo voluptatem, nihil injucundum per-

sentiebat, insipida, amara, dulcia, pinguis, salia, acria non distinguebat, vitrum, lapides, ligna, viva, animalia, carbones, piceæ & vivario extractos adhuc salientes vorabat, item lutum, lineos laneoque pannos, scænum, stipulam, & ut brevi omnia complectar quicquid homines, quicquid animalia vorant, quicquid edendum, seu deglutendum potius ostendebatur, proposita mercede, dictum ac factum, ingurgitabat.

Cum igitur hoc naturæ monstrum mihi dissecandum esset Patavii, cœpi hujusce rei diligenter, quoad ejus fieri potuit, causam veniri, quam me tandem Deo duce ex particulari anatomica structura allequutum esse confido: Nam quædam nervorum conjugatio, quæ Gustus gratia in aliis hominibus a natura producta est, in hoc Lazaro neque ad palatum, neque ad linguam, sed ad occipitium reflectebatur. *Columbus lib. 15. Anatom.*

Similem naturæ monstrum in sartore naturali morte extincto notavimus. *Rosincius. Dissertat. Anat. l. 4. c. 35.*

Gustus privatio à lesione nervi illi sensui destinato.

Cur in Laryngibus vulnerati sæpe sermonem, sæpe quoque saporem amittunt; equidem non sine admiratione spectavi Wilhelmum Aurantium Principem, accepto in collo vulnere tenum Gustus amissile est enim nervus duplex à tertia conjugatione manans qui in laryngem inferitur, altero quidem ramo lingua termoni apta redditur, altero sapores percipiuntur: hoc quidem relecto Gustus, illo sermonis usus amittitur: Quod cum Aristoteles, (1. de histor. anim. & l. de sensu,) non prospiceret, pro decreto posuit nullum animal sine Gustu vivere posse: At Princeps Aurantius amisso Gustu tam diu vixit quoad occideretur: ac tametsi cibos condimentis acerbis, acidis, salis, potari juberet, nihil tamen gustu percipiebat, ut quidem ab illo accepimus: Minus quidem mirum est Gustum amissile, sed amitti sermonem ab eo qui audiat Lingua integra, incredibile antea mihi videbatur nisi experientia compercum haberemus. *Bodinus Theatri Natura lib. 4. p. 460.*

GUTTA SERENA.

Gutta serena est oculorum affectus ubi visus propter obstructionem nervorum optico- rum aboletur dum interim nihil vitii in oculis animadverti potest, nisi quod pupilla & nigrior & amplior apparet.

Pro hoc affectu explicando tota mali fabrica, ac visionis historia nobis describenda foret; verum præterquam quod hoc jam quamvis compendiose, non minus tamen accurate perfectum est à Clariss. Gulielmo Briggs, cujus elaboratissimus tractatus Bibliothecæ nostræ Anatomicæ Tom. 2.º insertus videri potest; ali- quid etiam hæc in re ubi de Oculorum morbis suo loco adducemus. Hic tantum pauca per Curationis & Consultationes, tradimus.

Cura-

Curationes.

Cum gutta serena causa sæpissime quidem sit Nervorum opticorum obstructio ab humore pituitoso à cerebro in Nervos istos illabente; aliquando autem eorundem adstrictio seu compressio ab eodem humore vel alia materia circa illos cumalata materia obstruens, vel comprimens sedulo evacuanda, est, primo universalib; postea particularibus; tum demum topica locum habent, visumque acuentia.

Incipiatur evacuatio cum pil. seq.

℞. mass. pil. coch. minor. ℥j. aggregati. 3℔. ol. itillac. anis. gut. ii. ms. f. pil. ■ s. deauratæ, quas deglutiat post primum somnum, levi cœna præcedente, cum debita custodia, dilato ad 4. horas iusculo.

Vel ℞. Mass. pil. purgant. chamæpit. (p. s. præscript.) ℥ij. pil. macri ℥i. pulu. subtilis sol. helleb. nigri hecator. post præparatione in pane calente ℥ij. folia terantur in alkool. omniaque nuxta cum .q. syrupi de spina cervina & panta-gogi nostri amari redigantur ad consistent. pilular. Dosis ℥j. in ingressu lecti ad minus hor. 3. post levem cœnam quotidie per 4. dies consequentes, deinde plures pro ratione operationis.

In robustioribus dentur extracti seq. gr. xv. septimo vel octavo quoque die, purgantibus debilioribus frustra exhibitis.

℞. scammon ℥i℔. fibrar. rad. hellab. nigr. veri ℥℔. pulp. colocynth. ℥j. cinam. opt. ℥vj. zinzib. 3j. Extrahe cum optimo sp. vini in frigido per 3. dies, cola & festinanter exhala, continuo agitando circa finem coagulationis, in extractum satis solidum, ut ex eo possint formari pilulæ.

Quibus medicamenta forma liquida magis arriserint, potio vel apozema seqq. maxime conveniunt.

℞. Sarsaparill. ℥iii. bacc. junip. recent. ℥il. cremor. tart. ℥iiij. fol. senn. mundat. minutim incis. 3v. turbith gummos. ℥iiij. zinzib. ℥℔. f. omnium decoctio & colatura, in qua reducta ad dosim dissolv. syr. ros. pallid. comp. cum agaric. & syr. de spin. cervin. ana ℥℔. ms. f. potio danda mane in aurora hor. 3. ante iusculum cum debita custodia.

Vel. ℞. Rad. oxylapath. ℥iiij. rad. fragar. filic. sem. ana ℥ii. sal. agrimon. hepatic. fumar. cetrach ana m. m. j. hyperic. sambuc. herb. paralyt. euphrasie totius ana p. ij. passul. mund. jujub. ana ℥j. poma redolent. perfrusta secta cum corticibus n. 3. omnium decoctio in. f. q. aqua fontan. in qua prius macerata fuerint per hoc. 6. fol. senn. mundat. ℥ii. turbith gummos. 3j. tart. alb. 3x. f. colatura sæpius per manicam, quæ levi coctura reducatur ad ℥xv. In quibus dissolv. syr. de fumaria & de cichor. simpl. ana ℥j. syr. magistralis ad melancholiam ℥i. m. s. f. apozema pro 4. dos. matutinis, sumend. diebus consequentibus vel alternis pro ratione operationis & virium.

Potus ordinarius sit talis.

℞. Rasur. buxi 3v. rasur. lign. sanct. 3iv. sarsaparill. 3vi. lign. saiss. 3ij. rad. cyperi 3i. cornu cervi, ebor. ana 3xii. summit. salv. & rorismar. an. m. j. beton. euphras. an. m. ij. chamæpit. ceterach. tamarisc. n. ythrid. an. m. i℔. flor. calendul. herb. paralyt. peron. hyperic. sambuci

an. p. iv. sem. fœnic. dulc. & nigella Roman. an. 3j. nuc. moscat. 3vi. omnium decoctio in galonibus v. cerevis. non lupulata & tribus aia recentis ad duorum commun. prion. Adde eorundem liquorum galones tres, sinatur heri fermentatione per noctem vale probe tecto; mane f. per setaceum colatura, quæ indita doliolo iuxta capacitatis (addito paucis cerevisiæ non lupulatae fermento recenti), sinatur fermentari ad perfectam depurationem. Liquor limpidus ad medietatem usque depromatur ex doliolo, deinde excipitur lagenis lapideis probe obturatis recondendis loco subterraneo, unde depromantur ad usum pro potu ordinari.

Post evacuationes generales, ad particulares deveniendum est, quæ videlicet sunt errhinis, fontanel. gargarismis, cucurbit. &c. post hæc ad dilectientia & roborantia.

℞. Major. 3ij. salvia minutæ, rorismar. an. 3j. flor. lavend. & itor. kad. Arab. an. 3℔. elleb. alb. 3j. agar. albi. 3iv. dictamni Cretici 3ij. 3 tabaci Indici ad pondus omnium, in 3. f. p. vis subtilis. hauriendus in minima quantitate per tubum sive fistulam pyxidis. Post hujus pulveris operationem attrahatur aqua tepida ex vola manus ad narium collutionem; si nimia sit acrimonia aquæ, poterit conmisceri lac in æquali quantitate.

Vel si micus Errhinum velis,

℞. Fol. asari, quæ liccentur optime in asseræ in furno longe ab exemptione panis; redige in pulverem, qui paulo ante ingressum lecti attrahatur in nares, in quibus relinquatur per totam noctem. Mane id quod ex naribus effluet, diligenter emungendo & iterutendo extrahatur.

Applicentur pyrotica tria, duo pone utramque autem, unum inter primam & secundam colli vertebra; & ab iis excitata ulcera aperta teneantur immixtis majoribus pisib; & superponatur emplastrum tenax.

℞. Rad. pyrethr. & staphidis agrie an. 3℔. summit. major. p. ij. fol. laur. minutim concit. m. 3℔. cubebat. granor. paradisi. cardam. an. 3ij. f. omnium decoct. in vino ali. generos. 3℔. aceti sambuc. 3℔. ad medietatis consumptionem. f. colatura, de qua cape 3iv. cerevis. lupulat. fortior. 3viii. mellis 3j. sinap. ad condimentum præparati 3℔. m. s. pro gargarismo usurpand. quotidie mane, sumend. cochleatim calid. donec hujus mixtura 3iv. absump. fuerint, sedulo excreando id quod à capite attractum fuerit. Ante gargarisma caput diu multumque peccatur retrorsum, & fricetur panno aspero, vel f. cutis in cap. i. de frigida cerebri intemperie descriptis.

Parari autem potest gargarisma minori sumptu & labore, viz. ex cerevis. acida, aceto, melle, & sinapi. Post gargarism. colluantur fauces frigida.

Paulo ante ingressum lecti affigantur cucurbitæ sicæ humeris cum multa flamma per hor. quadrant. quibus remotis dum tradet se somno, applicetur oculis clausis catapl. seq. per totam noctem desuper continendum; mane autem oculi (clausi) abluantur calid. propria urina cum æquali portione vini Canarini mixta.

℞. Pulp. passular. ab arillis mundat. 3j. sem. anis. fœnic. fœnogr. an. 3j. terantur terenda subtilissime, & incorporentur cum pulpa. addit. pauc. aq. verben. & chelidon. maj. f. veluti cata-

plasma extendendum in stuppis lineis mollibus pexis; applicetur moderate calid. additis gr. 4 croci.

Excipiat fumus seq. per tubum instar tabaci mane & sero.

℞. Major. salv. rorism. an. ʒss. flor. stœchad. & lavend. an. ʒij. sem. anis. fœnic. siceris montan. an. ʒij. tabaci Indici quartam partem ponderis reliquorum, f. pulvis crassiusculus, cujus quantitas sufficiens indatur tubo, & intusluntur guttz 2. vel 3. ol. stillatit. luccini.

Vcl ℞. Rad. siccar. raphan. rusticar. ʒss. fibr. rad. elleb. utriusque an. ʒij. rad. pyrethi. & Itaphidis agr. an. ʒij. fol. siccor. major. sal. lavend. rorism. terpyl. an. ʒv. capici, piperis albi & longi an. ʒij. corticis vinteran. ʒiv. salis ammon. depurat. ʒiiss. (pro quo si habeatur, utiliter sumetur sal volat. luccini) tabaci Indici ad pondus omnium, m. ʒ. f. pulvis crassiusculus pro sultu excipiendo per tubum, reduendo sumum ore attractum per nares, mane præcipue. Add. usus tempore gutta ol. luccini.

Ad materiam obstruentem vel comprimentem discutiendam, visumque acuendum, ex. 1b. apozema seq.

℞. Sem. pœon. mar. baccar. juniper. recent. an. ʒss. rasur. buxi rec. ʒ j. tol. beton chamapit. euphras. verben. vulgar. an. m. j. flor. sambuci p. iij. sem. nigell. Roman. ʒiij. sem. myrthid. & fœnic. dulc. an. ʒiiss. f. omnium decoct. & colat. quæ clarificata coletur ad ʒb j. adde vini alb. tenuis ʒb j. sp. vitr. ʒij. agita, mox adde liquamnis tans tartari q. s. ad exactionem aciditatis: adde syr. pœon. & syr. veton. rubr. an. ʒiij. aq. cinam. cochlear. j. m. ʒ. cap. bis in die ʒv. longe a patibus, superan bulando.

℞. Rad. chelid. major. concis. ʒiiss. elleb. nigri veri ʒj. beton. m. j. major. rorism. Itœchad. utriusque an. m. ʒ. summit. abrotani utriusque, nor. lavend. an. p. ij. sem. anis. & fœnic. an. ʒss. rasur. lign. sancti ʒvi. lign. Rhod. & cass. fr. an. ʒiij. Ex omnibus comminutis f. sacculi plures itius magnitudinis quæ sufficiet solum ad tegendos oculos. Eorum quatuor stent continuo in infusione in aq. stillatit. fœnic. verben. ruta. an. ʒiv. vini Canarini generosissimi ʒxii. Mane caleat liquor, & sacculi vicissim applicatis foveantur oculi per hor. dimid. deinceps optime deterfo madore excipiat fumus supra præscriptus per tubum instar tabaci.

Horâ item unâ ante cœnam foveantur oculi liquore sequenti.

℞. Aq. stillat. chelid. maj. verben. ruta. an. ʒviii. vini Canarini generosissimi ʒxvi. croci metall. subtilissime pulverizat. ʒij. vitri autin. ʒss. Bulliant simul aquæ cum pulveribus donec ʒ viii. liquoris consumptæ fuerint, mox detracto ab igne vase vinum addatur, & sinatur heri infusio. Usus tempore caleat liquor limpidus pro sultu faciendo e spongiis mollibus intinctis & leviter expressis vicissim applicandis paulo plus quàm tepide palpebris clausis.

℞. Alex. avenæ concis. ʒbss. fol. mal. parietar. violar. sambuc. beton. an. m. ij. ruta, chelid. maj. verbenæ, fœnic. lauri, pœon. maris an. p. iij. flor. chamam. nobilis, melii. summitat. thymi an. p. ij. sem. anis. fœnic. baccar. junip. nigell. Rom. an. ʒj. fursuris macrim i ʒss. Incidantur omnia, & totius istius quantitatis pars dimidia coquatur in ga-

lon. j. aquæ, quart. j. vini, & pint. j. aceti pro sultu migio seu vaporario usurpando per hor. dimid. mane, vaporem viz. excipiendo inclinato & velato capite, & oculis apertis.

Si ex horum usu Nervi optici non deobstruantur, ita ut libera spiritib. ad oculos tendentibus via concedatur, visioque renovetur, vide de salivatione ad colliquationem pituitæ & cerebri strenuam depletionem. Theod. de Mayerne Prax. Medic. lib. 1.

Consultationes.

De Amaurosi, seu Gutta serena. Pro Nobili Viro Francisco de Alexandris.

Dum attentius considero, quæ statutis temporibus passus est in oculis Perillustis D. Franciscus de Alexandris, annos natus 57. diligentissime relata ab Excellentissimo Viro, quam maxime hæreo, numquid præsens cæcitas ipsi supervenerit ex suffusione proposita, an potius ex Gutta serena, à Græcis Amaurosi dicta. Refertur enim quatuor abhinc mensibus circiter oculum sinistrum de repente obæcatum fuisse, eandemque affectionem in oculo dextrum sensim irrepsisse, ita ut in præsentia nihil videat. Propterea dubitari potest, numquid hoc ex suffusione proveniat. Ad suffusionem namque producendam necesse est confluere humorem, vel vaporem crassum ad oculum, atque vel reddere crassiorem humorem albugineum, & sic suffusionem spuriam interres, vel contineri inter corneam & albugineum, ibique ita densari, ut in membranam quandam convertatur, impediens spirituum emissionem, & objectorum visibilium receptionem. Quorum utrumque difficillime confectim fieri potest, non dixerim in possibile, si verum est, quod à Fernelio proditum, se vidisse suffusionem in uno oculo confectim factam. Et certe difficile admodum est, cum quia materia confluens non adeo crassa est, ut illico specierum receptionem, & irradiationem facilitatis prorsus interciperet; ac propterea sit primò imminutio, deinde, & visus privatio: tum etiam, quoniam suffusionem factam a vaporibus densatis, præcedere solent imagines illæ volitantes ante oculos, quorum tamen neutrum contingit in oculo sinistro. Cæterum à Viri doctissimi sententia recedendum mihi non est, quando jam fuit observata materia crassa in ipsomet oculo sinistro, ut scribitur. Quod si verum esset, non locum haberet, quod mihi relatam fuit, sc. noxam extrinsecus in oculis non apparere, ipsos intuentibus, sed videri sanis per similes.

Quare in eam propendeo sententiam, quod cæcitas hæc proveniat ab obstructione nervi opti corum, vel potius densatione ipsorum, cum præcesserit continua scriptio, & errores in victu materiam congerentes, & ad oculos allicientes. Habemus enim ex Gal. 4. de L. Aff. inter signa Guttæ serenæ hoc esse præcipuum, quod sc. affectus confectim fiat, cujus adhuc certius habemus indicium, si nil exterius appareret, ut referatur neque omnino hæsitandum esset, si dolor quidam, seu gravitas perciperetur ad oculorum radices. Quo tamen sunt quæ huic nostræ opinioni repugnare possunt; primum est, quod in Amaurosi talis affectus in utroque oculo eodem tempore suboritur: alterum, quod patientes lumen non vident: neutrum tamen eam planè oppugnât.

oppugnat; non primum, si vera est Vesalii, & Columbii sententia, ex Anatome confirmata, nervos opticos non esse prius unitos, sed per intersectionem, ac propterea in alterius oculi cecitate iuventum fuisse nervum minorem altero; non secundum, quia densitas seu obstructio poterit esse magis vel minus intensa, & sic lumen magis, vel minus impediri. Omnia tamen subiciantur iudicio Viri Doctissimi oculata fide rem ipsam certius comprobaturi.

Quicquid sit, certissimum est affectum hunc curatu fore difficilissimum, ne dicam impossibilem, prout anno elepio observatum fuit in Illustissimo & Excellentissimo Comite de Soura Regis Catholici Legato, in simili affectu, aliquandiu a me curato. Quod si adesset tussio, cura facilius esset, quia iperari posset ipsius saltem deposito: quam vidi tenuiter successisse etiam in aetate longe provectori: qua de re lithotomos peritissimos consulendos censeo.

Non tamen omitam illa quæ opportune censuero, si fuerit Amaurosis. Si enim statutum fuerit esse tussionem laudo ut quibuslibet medicamentis supersedeat ager, sed ea perfecte maturata ad operationem manualetm deventur, si verò de Gutta serena sit suspicio, laudo setaceum occipiti inultum; aliquam item levem sanguinis missionem ex vena frontis, præmixto fermento eidem parti. Vesicantia retro aures apponenda; & peculiarem capitis expurgationem cum feniculi radice dentibus attrita, & coriandris. Validioribus etiam errhinis non omissis, post diligentem capitis expiationem per os. Conatus enim ille sternutationis materiam deturbare poterit, non omissis collyriis ex siccis de fellibus, cum aqua panis cocti jam feniculo calentis, inter duas patinas reconditi in cella vinaria: quo vapor ille concreseat, & in aquam convertatur. Et hæc opportuna censeo, præter ea quæ a Viro Doctissimo summa cum ratione fuere præscripta. Faxit D. O. M. ut cedant in utilitatem Perillustri nostri patientis.

De eodem affectu pro eodem patiente Responsum ad Perillustrem & Excellentissimum Illustrum Recaleum.

Quas ad me dedisti literas legi de cecitate Illustri. D. Francisci de Alexandris, quæ meam confirmant opinionem, affectum scilicet hunc alium non esse, quam Gutta serena, à Græcis Amaurosis dictam, ex obstructione nervorum opticorum ab humoribus pituitosis & melancholicis. Quam propterea remedium beneficio superari posse, vel saltem summa cum difficultate levamen aliquod suscepturam censeo: atque facile mihi persuadeo, eadem te mecum sentire, quauquam ex tuis litteris nihil hac de re statutum videam. Ideo illa tantum remedia in usum revocanda censui, quæ circa partem affectam applicata, materiam peccantem sensibiliter, & insensibiliter evacuare sunt apta, impossibile existimans ipsam evacuare per partes magis distantes.

Propterea præmixta universali totius evacuatione, ab Excellentissimo Caprilio præscripta, lapidationem vena frontis, præmixto fomento, quo facilius turgent, propter angustiam venarum jugularium, & per concitatum illum mo-

tum sanguinis educti, fiat, vel saltem tentetur aliqua agitatio humoris jam firmati in nervis opticis: eo prius modo, quo ab Hipp. dictum fuit 7. Aphor. 5. Quod mania ecstasis superve-niens bonum. Per ecstasin cum balano intelligendo vehementem insaniam, quam dixit idem in Commento liberare ab insania leviori, propter validum caput motum: qui non est sperandus ad applicationem hirudinum venterum temporum, aut angulorum oculorum; cum alio tunc sanguinis detractio ex venis capitis non sit opus, nulla existente inflammatione: aut insigni incallescencia capitis: in quibus casibus tenuissimam sectio venarum temporum, vel angulorum oculorum; quas venas alias secandas curavi phlebotomie, & non hirudinum applicatione. Quod statuendum est de vesicantibus cauteriis & mulsionibus propositis. Setaceum in occipite proderit, non solum ad revulsionem a parte anteriori, verum etiam, & longè magis, ad derivationem materiae fluxæ, si locum habet Laurentii & aliorum opinio, septem illa nervorum paria quæ in cerebro sunt originem habere a spinalis medullæ interiori portione, a qua longe minus distabit occiput cui setaceum inurendum scripsi, quam futura coronalis: quæ admodum & vesicantia retro aures apposta, tanquam loco proximo, & maiorem consensum habente cum opticis, quam omoplatæ. Vasorum temporum mulsionem proponi solum, ad interceptandam fluxionem in ophthalmia, in casu tamen nostro non fuit materia per venas temporum, propterea non erit adeo necessaria prædicta operatio.

Sternutatoria quidem & errhina erunt utilissima, facta prius imminutione materiae per masticatoria. Qua ratione scripsi errhina quædam validiora administranda esse, post diligentem capitis expurgationem per os. Collyrium a Galeno Proteus dictum, descriptum & de Compos. Medicamentor. per loca. 7. est sane validissimum ad digerendos humores, dummodo inflammationis periculum non imminet: illud diacentetum ex Demothene, ab Aërio descriptum in hippitudine sicca, dura & scabra, commendatur ab ipso, nec inutile futurum censeo in præsentis affectu. De pisciculo autem à Foresto commendato in visus obscuritate lib. observat. 35. quid sim dicturus ignoro, cum mihi sit ignotus, scribatque piscem hunc in Hollandia prope Delphensem urbem reperiri. Quod si forte terrarum haberi posset ejus periculum Vir Doctus faciat, liquorem ex jecore ipsius defluentem in usum revocando, ut consulit Forestus. Ego enim illa tantum collyria præscribenda duxi, quæ si non juvant saltem, neque nocuum afferre poterunt. Decoctum ex radice Chinæ, ligno sassafr. Visco quercino, & similibus, cum herbis floribus, & seminibus odoratis, & propriis, opportunissimum iudicio, cuius formulam non est meum præscribere Viro in Arte versatissimo, ne sus Minervam doceat; ideo cuncta subijcio prudentissimo iudicio Viri sapientissimi. Faxit Deus ut ex voto succedant. Benedic. Silvaticum Consil. & Resp. Med. Ceni. 1.

Amaurosis, sive Gutta Serena.

Fœmina 38. annorum, postquam ab ulceribus multis, per totum corpus diffusis, tan-

dem esset curata; incidit in hebetudinem visus utriusque oculi, quæ ad longinqua & propinqua cæcutiebat. Malum ad aliquot septimanas ita est auxum, ut altero jam oculo vix quicquam videre queat. Cum insipientibus apparent clari: nihilque vitii in his animadvertitur; nisi quod pupillæ iusto ampliores & nigriores videantur. Alii sensus sunt integri. Materia pituitosa ex naribus copiose excernitur. Gravitationem sentit in synepite, circa frontem, & supercilia.

Adiungitur in hac ægra potissimum nervi optici; quod patet ex tali visus nostræ ægræ hebetudine, in qua ipsa ad propinqua & longinqua ita cæcutit, ut oculos ipsius insipienti nihil vitii in his appareat. Afficitur etiam interior anterioris cerebri pars; quod gravitas, in synepite circa frontem & supercilia percepta, & materię pituitosæ copiosa e naribus excretio evidenter docet. Reliquum cerebrum non afficitur: quia reliqui sensus vitio carent.

Morbus quo ægra hæc affligitur, est amaurosis sive gutta serena; quæ est obstructio & compressio nervorum opticorum, hebetudinem visus in longinquis & propinquis conspiciendis in uno oculo, & in altero tere plenam cæcitatem, citra conspectum in his vitium, inducens.

Causa præcatartica huius morbi fuit humorum pituitosorum, per ulcera e corpore egredi solitorum, post eorum curationem retentio. Humores vero pituitosi, inde per totum corpus collecti, constitunt eius causam antecedentem. Pars eorum ad anteriores inferiores cerebri partes, & nervos opticos delata, eosque in una parte magis, in altera minus comprimens & obstruens, existit continens eorum obstructionis & compressionis nec non istius jam descriptæ visus hebetudinis, & cæcitatibus, causa.

Cum enim causa continens tam profunde in oculorum nervis lateat, nec aliæ eorum partes sint affectæ, nihil vitii in his insipienti apparet; & tamen hic adest in uno hebetudo visus, & in altero oculo cæcitas; propterea sc. quod quævis imagines rerum objectarum in fundis oculorum pingantur; eorum tamen, sive propinquarum, sive longinquarum motus, ob nervorum illam obstructionem & compressionem, ad cerebrum, & hinc ad sensorium commune, ubi à mente fit sensatio, deferri non potest.

Pupillæ autem oculorum sunt iusto ampliores & nigriores, quod, propter nervorum opticorum obstructionem & compressionem, perceptio objectorum, quæ mens ad spiritus ad pupillam arctandam & crystallinum humorem iusto modo ad anteriora movendum, excitari solent, partim nulla, partim exigua hic fiat; spiritusque etiam, propter ideam obstructionis impedimentum, ex cerebro in fibras pupillarum, & ductum ciliarium, quibus hæ partes moveri solent, fluere satis copiose non possunt.

Morbus hic difficillimæ est curationis; propterea quod humor nervo optico infixus non nisi maxima cum difficultate inde tolli solet. Quia tamen hoc malum in guam partem à compressionem externa humorum, inferiorem anterioris cerebri partem, circa nervorum opticorum

originem, obsidentium, oritur: & observationes medicorum testantur, nonnullos, hoc affectu laborantes, sanatos fuisse; non penitus desperandum, sed Curationem tentandam censio.

Eaque in causarum, & obstructionis, per contraria ablatione consistet.

Primo itaque, ad totius corporis evacuationem, tale præscribitur purgans.

℞. Fol. tennæ ʒi. vel ʒvj. Sem. anisi. feniculi an. ʒi. euphrasie m. j.

Decoq. in aq. hordei q. s. ad ʒiiij. Colaturæ adde diaphanici ʒij. misce. F. H. ulus.

Post triduum eadem repetatur purgatio, vel hæ exhibeantur pilulæ.

℞. Pil. cochlearum ʒi. Scammonii gr. x vel xij. Cum syr. ros. sol. l. Paulæ N. vii.

Ubi purgatio prima peracta fuerit quando quidem hoc malum ab ulcerum consolidatione originem duxit, non tantum posteriori cervicis parti velicatorium est adhibendum, & coëctato fonticulus, circa tertiam & quartam cervicis vertebram, per cauticum est excitandus; sed fonticuli in utroque etiam brachio, circa musculum humeri bicipitem, in o etiam in utroque crure, excitari debent.

Fonticulis excitatis, & corpore aliquoties purgato, palpebris & extremis oculorum cilibus in die illis, tur liquor, qui ex hepate piscis, *pipi* vel a batavis dici, regulæ alligato & radis solaribus exposito, in vitreum scyphum subjectum extillat. Ille enim summæ emeticæ in hoc affectu à nonnullis prædicatur.

Si malum his non cedat, ad diætam sudoriferam, purgatione præmissa, tali decocto toto mense intrituendam, est accedendum:

℞. Scobis ligni a guaraci ʒiiij. Corte. ejusdem ʒj. Lign. salaphras Rad. salaparillæ an. ʒi. s. Infund. per noctem in aq. comm. lib. o. uem de decoquantur ad medietatis partis consumptionem, addendo, sub finem decoctionis. Herb. chelidonæ major. euphrasie, verbenæ, feniculi an. De colatura per ramicam Hippocratis tracta exhibeantur ʒvj. vel viij. calidæ, & promoveantur sudores corpus bene tegendo.

Sunt etiam, qui per salivationem mercurio & mercurialibus factam, hunc affectum curari volunt.

Corpore aliquoties per purgantia & sudorifera recte evacuato, saliva tali mallicatorio, mane, & vespertina hora quarta, erit evocanda:

℞. Rad. pyrethri, ireos dor. an. ʒj. s. noctis molcata; sol. semz, Sem. staphid. agriz, synapi an. ʒi. Pulverisatis adde malliches dragm. j. ceræ q. s. & formentur globuli multietur unus mane, & vesperti, prono capite, frequenter exspuendo.

Quidam etiam sternutatoriis hic, post iustas purgationes, utuntur, quale hoc est.

℞. Pulv. hellebori albi, tabaci an. ʒij. piperis albi, ʒj. euphorbii gr. vi. F. pulvis sternutatorius, qui vehementius per nares inspiratur.

In diætâ aer sit calidus & siccus. Cibi boni succis conditi hyssopo, feniculo, majorana, euphrasia, salvia, & imprimis nuce molcata. Potus cerevisiæ mediocris. Somnus. mediocris, & quantum heri potest, supinus. Exercitia moderata, Avus laxa. Affectus animi moderati. *Henne. Regius apud. Theodor. Craanen Medication. lib. i.*

Observationes.

Pro Amaurosi seu visus imbecillitate.

Comes quidam Lotharingus de visionis imbecillitate conquerebatur, quod res exacte, sive propinquas, sive distantes, dijudicare non posset, obitare dicens veluti fumum, seu nubeculam quandam, quæ sibi visum obscuraret. Cum omnia diligenter inquirerem, nihilque in pupilla obscuri apparet, & non semper in eodem statu permansit: hic visionis defectus, sed nunc major, nunc minor esset, a vaporibus potius, quam vitio in oculo hoc evenire judicavi, atque ostendi vapores non oculum subire, uti credebat, sed cerebrum, juxta nervorum optico-rum exortum, impetere. Ubi jam erat multis evacuationibus & diversionibus, & inter reliqua etiam setaceum in cervice gessabat.

Præscripti illi pilulas sequentes.

℞. Fol. sen. (oculis appropriata esse creditur) ʒij. sem. fenicul. ʒij. pil. sine quibus, & lucis, an. ʒij. cum syr. de sumaria, quæ & ipsa oxydolica est. ℞. Massa. Capiat ʒj. singulis mensibus ter sine custodia, cum leviores sint.

Cucurbitulas applicet menstruatim, duas collo, duas scapulis sine scarificatione, continuando per triduum.

Paretur vinum hoc Euphrag. tum visioni convenientissimum, de quo nonnunquam haustum in mensæ principio, vel manè bibat jejunus: sic enim ejus vis, per vapores cum vino rectius ad caput ascendit.

℞. Fol. euphrag. sic. ʒj. rad. fenicul. ʒij. fol. caryophyllata ʒvi. beton. verben. majoran. an. ʒʒ. stor. rosinar. ʒij. sem. fenicul. ʒʒ. gran. juniper. ʒj. incitantur, & in doliolo collocantur, atunde vini ubi generos. mensuras 10. vel 12. serventur ad usum vel vindemiarum tempore affunde mustum recens, & finito effervesce. Poterit & cinnamomum ad gratiam addi.

Pulverem sequentem mensura unius cochlearis, noctu cubitum iturus, præcedenti laxi cœna, sumat, super bibendo parum vini, vel projectum in vinum cum eo bibat.

℞. Sem. Coriand. præp. ʒij. sem. fenicul. anis. an. ʒj. carvi, Sileris mont. an. ʒʒ. Sirupi ʒj. fol. Euphrag. majoran. an. ʒʒ. Cinamom. ʒij. maceris ʒʒ. Caryophill. ʒ. sacchar. ros. tabell. ʒij. fiat pulvis subtilissimus.

Sal in mensa ad manum habeat, quo ova recentia, vel etiam alios cibos quandoque saliat.

℞. Salis puri ʒij. sem. Carvi ʒj. fol. Euphrag. majoran. an. nuc. mosch. ʒʒ. F. pulvis.

Comedat frequenter jecora caprarum juniorum assa, confixa caryophyllis & Cinnamomo, hæc & illi & alteri cuidam, admodum profuerunt. *Felix Platerus obs. lib. 1. pag. 106.*

Pro Amaurosi ad principem quandam.

In visus genere, inter alia hæc celebria habentur.

Raparum in cibo usus acutiores reddit oculos. Passerum & columbarum esum visum mirifice tueri ferunt, nucis moschata in cibis pro condimento, & extra cibum, manè mediocris visus seminis fenicul. herba in jusculis inter ole-

ra, & semen frequenter à cibo inter bellaria humanum, & deglutitum juvant; in cibis & cum cibo utinon sale commisto licebit, quo observatum est oculos caligantes & hebetiores nutritice recreari.

℞. Nucis mosch. macis, cinamom. opt. cardamom. an. ʒj. fol. & fl. Euphrag. sic. ʒij. vel ʒij. salis communis ʒj. F. omnium pulvis ad usum, vino mediocri, non admodum fumo, o. aut generoso, non dulci, neque crasso non nullo, uti juvat.

Euphragati vini continuus usus plurimos restituit hoc vitio laborantes, etiam tene, qui ocularium ope antea vix difficulter viderant.

Arnoldus de Villa nova Medicus celeberrimus, mirum in modum laudat, & ego aliquoties in operibus artis verum comperi. Non temere hæc herbula in floribus, oculorum characterem, & signaculum à natura impressum habet.

Euphrasis bene asservata sicca, pro magnitudine vasis quantitate convenient multo injicitur dum effervesce, cum defœcatum expurgatumque vinum est, asservatur remedio probatissimo.

Si ventriculus ferre potest, nec concoctio labefactatur, cum simplicis puri puri vini in mensa usus fuit, magno comodo haustus aquæ fontis puræ prandium & cœnam claudat, nam ita minus vaporum e cibo in cerebrum fertur. Aristoteles in Probl. scribit, eos acutius videre qui aquam bibunt.

Præparanda quoque ex flosculis Euphrasie recentibus, & saccharo. conserva ætate, cum frequens Euphrasia floret, eo modo quo rosacea conserva apparatus, ex florum parte una, sacchari duabus, & si haberi tum possunt rosamarinum flores, etiam istorum partem addere licebit; ista conserva mane & vespere sumenda juglandis quantitate potissimum vespere, cum decumbendum erit: ita juvatur contractio tolluntur viscerum obstructions; visus hebes non solum instauratur, verum & lateri sensus vegetiores sunt, & memoria confirmant.

Ad corporis quoque & capitis ab excrementis purgationem laudo, ut Celsus. tua subscriptis pilulis utatur, subinde noctu cum decumbendum erit, deglutienda una atque altera pilula, tenuis aut quaternis quibusque diebus, ita emper aliquid excrementitium paulatim, & quasi insensibiliter à capite abducitur, & si quando in oculos major humorum influxio urgeat, illarum pilularum, statim ʒiv. plus minus, i.e. xi. pilulæ post mediam noctem, vel summo mane deglutiantur. Pilulæ hæc esse possunt.

℞. Massæ pil. hier. cum agar ʒij. aloës rosac. ʒj. pil. lucis, asajeret ʒn. ʒij. rhab. opt. aq. Cinam. irrorandi ʒj. cum syr. ros. solut. F. pasta mollis instillando ol. fenic. gr. ʒ. F. pil. molles ex qualibet ʒj. pil. nu. 8. super pulvere nucis moschatæ.

Oculis quæ insequuntur tutissimè, & cum singulari juvamento admoveri possunt manè, cum nullum efficacis medicamentum admodum est, masticentur grana aliquot feniculi, item aliquando tantillum chamomil. istis jam infecta saliva tingantur & illinantur leviter oculi summo digito. Item fenic. & cumini semen puniatur in pane, is calens e furno extractus, & discillus admoveatur: ita ut oculi vapore madescant. Vel hordeaceus paus. calens e furno extractus dividat.

nullo vitio in oculo apparente. Postmodum etiam cæcus ille, convulsionibus laboravit, quæ illum per vices, tota hyeme affligebant; quibus initio veris cessantibus, supervenit tussis, febris hæctica, expulsio purulenta, & tabes, quæ diu molestatæ & consumptæ, tandem expiravit. Corpore per anatomen aperto, pulmonum vitiumprehendimus: verum cum causam cæcitatis, aperta calvaria in cerebro perquireremus, invenimus cerebrum, aqueo copioso humore irriguum, partemque illius anteriorem, sinistra præsertim in sede, tumidiorem, à quâ cum portio adimeretur, inventus est tumor seu globus quidam glandulæ seu strumæ instar, inclusus in cerebri substantia, ab ea tamen separatus, propriaque membrana dura contentus, per quam venæ aliquæ capillares dispersæ erant, ovi gallinæ magnitudinem superans, inæqualis & formam pineæ nucis exprimens, cujus interior substantia, albida & æqualis ovi albumen coctione induratum, referebat, sed durior illo erat. Hic, cono obtusiore, nonnihil sursum prominebat, basi verò latiore, ventriculo cerebri, anteriore sede innitebatur. & pondere suo, quod erat ℥xliij. nervorum opticorum exortui in cerebro, incumberebat, eosque comprimebat. Quam causam fuisse cæcitatis, quod spiritus animalis transitus ad oculos fuerit impeditus, conclusimus; cum alioquin in nervis opticis, nulla obstructio, aut aliud vitium, uti nec in oculo apparuerit. Hinc con-jicere licet, graves & diuturnos cerebri vitio accedentes & incurabiles morbos, ab ejusmodi, occultis in cerebro latentibus tumoribus, aut vitis, frequenter accidere, & cum rarissime hæc sectione indagentur, Medicos qui causam, cerebri intemperiei, aut humoribus attribuant, atque hisce remedia accomodando, oleum & opem perdunt, latere. *Felix Plateri. obs. 1. pag. 108.*

GUTTA ROSACEA.

DE ea admodum scripsit nunquam satis laudandus, accuratissimus Marcus Aurelius Severinus, suo de recondita Abscessuum natura vere aureo tractatu. Nos hic nihil hic iis addimus quæ jam supra in cutis affectibus attulimus sed tantum observationem unam atque alteram dabimus quas collegit *Clariss. Burnsius in suo Medicina Practica Thesaur.*

Gutta Rosacea, rubedo est Faciei maculosa, seu potius rubor cum tuberculis, quibus tota Facies defœdatur, ac si guttis roseis conspersa esset cognoscitur visu. Ortum dat sanguis crassus & fervidus, ad faciem delatus. Hoc malum sæpe contrahunt, qui poculis & ebrietati nimium dediti sunt: quibusdam vitio naturæ obtingit.

Pro Gutta Rosacea.

℞. Lithargyr. auri 3j. ceruss. 3ij. axung. anser. & gallin. an. 3ss. argenti vivi cum saliva ex-

tincti 3ij. F. unguentum, com quo sero indulgatur facies, & mane lavetur cum aq. fursuris. Item pineæ nuces recentes pistæ cum cremo lactis in modum unguenti coeant, quo inungatur Gutta rosacea. Mirabile habetur.

Vel. ℞. Lithargyr. bene triti & pulveris. ℥ij. acetis fortis ℥iiij. M. Stent. per duos dies. Postea coq. ad consumptionem tertiæ partis: deinde adde aq. fl. fabarum ℥ij. & simul ponantur in alembico & destillentur. Postea ista aq. destillatæ adde gummi tragacanth. & arabic. q. s. ut f. unguentum quo facies ungetur. *Petrus Forestus. scab. observ. 9. lib. 2. obs. Chirurg.*

Pro Gutta Rosacea.

Puellæ nubili facies admodum defœdata erat, jam multos annos pustulis siccis & averscentibus serpentibus, accedente rubore, ita ut de lepra suspecta esset. Vocatus ego veris tempore, primo venam aperui brachii. Scarificatione postea adhibitis curevitalis in scapulis, jussi uti singulis mensibus. Vescicatorium quoque nuchæ applicui, quod magnum illic vesicam excitavit, & quod admirandum, ut aliquandiu sanguinem mîxerit, fecit: Bibit aliquoties hoc decoctum.

℞. Summitat. lupul. rec. fumar. rec. an. Mj. fol. sen. 3ij. coque in sero caprino, colaturam bibat uno haustu, & aliquoties repetat.

Unguentum pro facie sequens præscripsi.

℞. Lithargyr. auri, ceruss. an. 3j. unguenti citrini 3ss. thuris alb. malleich. an. 3ss. rad. serpentar. ossis sepiæ, an. 3j. ol. tartar. 3ss. succi limonij 3j. M. Inungat faciem. Mane abluit aqua flor. fabarum: recesserunt hæc ratione pustulæ, sed iterum de novo oborta sunt. Denuo itaque cum phlebotomia uti jussi, alteroque mox die scarificationibus. Purgavi quoque de novo sic.

℞. Fol. lupul. fumar. an. Mj. fl. cordial pi. sem. anis. 3ij. fol. ten. anis. 3ij. fol. sen. 3j. epithymi 3ss. decoq. in sero lactis. bibat duabus vicibus sed in posteriore dissolvat conf. Hamec. 3ij.

Electuario deinde hoc utatur.

℞. Conserv. fl. cichor. viol. an. 3j. conserv. fl. bugl. nymphæ, an. 3ss. pulv. triolental. duplicato rheo 3ij. diarthod. abbat. diamarg. frigid. an. 3ss. medull. sem. melon. 3ij. syr. conserv. cortic. citri q. s. f. Electuar. capiat alternis diebus bolum.

Postea illinat faciem singulis noctibus hoc unguento.

℞. Spec. unguenti citrin 3ss. camphor. 3ss. 3ss. boracis usti 3i. ossis sepiæ 3ss. rad. serpentar. 3i. lactis virginal. parati ex lithargyr. cum aceto & aq. fabarum 3ij. succi limon vel arantior. ol. de tartaro, de frumento. an. 3ss. fugitivi 3i. (plus addidisset, sed valde denigrabat) misceantur bene, siccabatur sæpe, sed rursus succis melle reddebatur: mane abluit hæc aq.

℞. Cuspid. rosar. p. j. fl. viol. Mj. fursur. 3ij. cicerrub. conqass. p. 3. rad. ireos, 3i. rad. lilior. 3ij. rad. serpentar. cyclamin. an. 3ss. add. aquæ mensur. 3. eliciatur aqua, quam cum faciem ea lavat, aqua fabarum diluat: absumpto semel unguento & denuo parando addidi li-

flammatione. In imprimis emollientia & discutientia per aliquot dies applicui: sed cum viderim his nihil profici, causam penitus inquisivi. Illa respondit se ante biennium interjedendum spinam piscis devorasse, quæ œsophago adhærisset, indeque statim exortum dolorem maximum ita ut difficile cibum & potum deglutire posset: tandem dolore sedato, collum paulatim intumuisse. Ex hac declaratione cognovi spinam aut ipsius portionem adhuc remanere, hinc ad suppurationem confugi. Suppuratus tumor à Ludovico Glandorpio, tum temporis Chirurgi studio, cui alio proficiscens curationes commiseram, incisus est. Manavit materies plurima: spina post apparuit, quam ipse integram & incorruptam extraxit. Ulcus post paucos dies coaluit. *Idem ibid.*

Ex deglutita acicula horrenda symptomata.

Anno 1592. Hildenz in arce Hosti ancilla nobiliss. viri Otton. Schenck von Nideck. 18. annos nata, aciculam grandiusculam forte deglutivit. Hinc tamen quia triduo nullum sensit dolorem, aciculam jam dudum per secessum dejectam fuisse sperabat: sed decepta fuit misera illa. Quarto enim die, primo in fundo, mox quoque circa pylorum exortus dolor & cruciatus, adeo vehemens & acerbus, ut dies noctesque exclamare & ululare coacta fuerit. Ego sexto die à morbo incepto vocatus, inveni ipsam plireneticam cum ardentissima febre, lingua arida, vultu inflammato, mente adeo captam adeoque furiosam, ut neminem agnosceret, nec cibum & potum exposceret. Convulsiones colli, brachiorum & crurum, maximæ & horrendæ aderant. Aliquando sese ex una in alteram partem lecti, tali impetu projiciebat, ut res viri quantum vis robusti, vix illam tenere possent. Exclamabat, ululabat, & manibus ventrem, non aliter quam si ipsum dilacerare voluisset, tractabat: (ut verbo dicam) videbatur potius à Dæmone obsessa, quam morbo laborare. Quum vero aliquando per horam integram, aut circiter, ita vexata & convulsionibus horribilibus, cum incredibili cruciatu, ex una in alteram agitata & fatigata esset, conquiescebat paulisper, & tanquam semimortua jacebat: rursus & repente priora symptomata invadebant eam. Ego interim jusculis pinguiusculis castratorum, item crematura hordei mundati, quibus admiscebam butyrum recens, & oleum amygdalarum dulcium, pitissima quoque & lacte amygdalato, corpus continuo nutrire curavi. Præterea ne excrementa, in parte aliqua intestinorum indurata, aciculæ impedimento essent leniter illam purgavi. Sic divino favore aciculam in illo cruciatu tandem decimo quarto die egressit. Postea sedati sunt dolores, reliquæque symptomata, ita ut brevi pristinae sanitati restituta fuerit. *Idem ibid.*

Ex rebus extraneis, gutturi infixis mors.

Inter comedendum sæpius accidit, ossiculum, spinæ piscis, aut simile quid gutturi inha-

reat: inde compressa trachea arteria, quæ gutturi incumbit, protinus suffocatur animal: quod sequentibus confirmo exemplis.

Anno 1595. Colonia Agrippinæ, Mercatori cuidam frustum cutis perne allatæ, ac mica panis sale & pipere aspersæ, infixum est gutturi unde protinus dolor vehemens convulsiones, rigor, ac tandem suffocatio, orta sunt.

Eodem anno Colonia mulier pertransiens pistoris officinam, ac manu ducens puellum, lagannum emit, quod puellus in manum sibi datum eundo comedebat: hujus frustum quum adhærisset gutturi, statim suffocatus est puer, antequam mater ad ades suas perveniret. Hoc quoque anno puer erat Colonia, *aussdem Bullbender Schildergassen*, cui globulus plumbeus deglutitus, tracheæ arteriæ se insinavit. Vocatus fui, sed puer ante meum adventum suffocatus decessit. *Idem ibid.*

Modus eximendi ossicula, & alias res gutturi infixas.

Quam periculosa sit mora hac in re, ex superioribus satis constat. Subito igitur diligentia adhibenda, ut quidquid gutturi infixum est; quamprimum extrahatur. Ideoque statim oleum amygdalarum dulcium, aut olivarum (cave tamen ne substituis butyrum) in œsophagum infundendum. Deinde digito, penna, aut simili aliquo instrumento in os immisso, vomitus provocandus: his enim sapius secum expellit, quicquid gutturi inhæret. Postea speculo oris lingua depressa (si ossiculum visui sese præbeat nostro corvino incurbato apprehendendum, atque extrahendum est. Si vero profundius fuerit, nec rostro apprehendi possit: Nonnulli spongiam novam, avellanæ magnitudine, eamque compactam, filo longo & forti alligatam, & oleo amygdalarum dulc. inunctam, agro deglutientem suadent, filum digitis tenente Chirurgos fieri enim sic potest, ut deglutit agro spongia secum simul in ventriculum depellat, id quod gutturi inhærebat, aut retracta filo eadem, simul nunquam extrahatur, vomituve rejiciatur. Aut potest globulus plumbeus filo alligari & deglutiri, atque denuo extrahi: ut de spongia jam dictum est.

Nihil vero præstantius aut aptius ad extrahenda ossicula, & spinas piscium è guttore, hoc sequenti instrumento, quo ego feliciter usus sum, tum alias, tum præcipue anno 1603. 16. Augustini Ludovico Tissot Lustriacensi, qui inter cæmandum ossiculum, triangularis figuræ, sed crassum deglutivit.

Hac profundius œsophago, è regione scilicet inter ultimam vertebra collis, & primam metapneuri, se adeo insinuat, ut id neque deglutire, neque rejicere posset. Adstantes statim portum profundius in ipsius gulam intromiserunt, & vomitum provocarunt, sed frustra: ita quidam ut noctem in magno dolore & suffocationis metu transigeret. Sequenti die penè suffocatus ad me ducitur. Ego oleum amygdalarum dulcium œsophago satis copiose infudi, & undique exterius collum eodem oleo inunxi. Postea jussi, ut ei tenerentur manus & caput, interim ego, depressa prius lingua speculo oris,

instrumentum meum in gulam intromisi, usque ad ossiculum, sensimque & modice circumdverso ex una in alteram partem instrumento, donec id paulatim ad latus ossiculi, profundius depulerim. Deinde retrahendo, ossiculum simul suo loco amotum & extractum fuit. Atque brevi convaluit. Hujus operationis & curationis testes sunt, Daniel Tavellus & Samuel Galliardus, ambo Ludimagistri in schola Paterniacensi.

Est autem hoc instrumentum fistula argentea aut aenea incurvata, crassitie pennæ oloris, longitudine vero unius pedis cum dimidio aut circiter. Est & undique perforata. In sua extremitate vero habet spongiolam novam, avellanæ magnitudine, firmiter alligatam. Hac fistula in Æsophagum immissa & circumducta, quemadmodum autem diximus, postea extracta, ossiculum aut quicquid simile fuerit extrahimus. Si enim accedit, ut foramen aliquod fistulæ ossiculum aut spinam excipiat, tum simul cum fistula extrahitur: sin minus asperitas ossis spongiæ adhærebit, & suo loco amovebitur: quod & ego experientia comprobavi, antequam habere in fistulam perforatam. Non tamen ossiculum aut spinam prima vice, dum intromittimus fistulam, extrahitur, nec propterea ab incepto opere desistendum: aliquoties enim quinque aut sexies fistulam intromittere coactus fui, donec tandem ossiculum suo loco amotum & extractum, vel (si aliter fieri non potuit) in ventriculum depulsum fuerit: quod & periculo vacat: præstat tamen per os extrahere, si fieri possit.

In hac operatione autem circumspecte agendum, ne instrumentum in asperam arteriam loco æsophagi, immittatur, quod valde periculosum esset. Itaque ut Chirurgus harum partium anatomiam sciat, necesse est. Incumbit autem æsophagus vertebri colli: aspera vero arteria anteriorem partem occupat. Itaque quamprimum Chirurgus linguam speculo deprelserit extremitatem instrumenti sui, ubi spongia (quæ oleo amygdalarum dulcium, aut olivarum prius inungenda) alligata est, vertebri imponat, ac leviter leniterque deorsum immittat. Sic enim ratione spongiæ instrumento alligatæ, epiglottis (hoc est, operculum laryngis) deprimitur, & aspera arteria clauditur usque dum instrumentum immissum sit profundius.

Quantum ad spongiam filo alligatam de qua mentionem fecimus, non usque adeo illi est fidendum. Contrarium enim enarrata operatione expectus sum. Et quomodo fieri possit, ut spongia levissima, vel simile quid transeat in os infixum in æsophago? Hujus monitum volui lectorem, ne rei inutili confidat: at interim æger periclitetur. Habeat igitur Chirurgus semper in promptu instrumenta, ad hanc operationem necessaria: cunctari enim hac in re non licet. Si in asperam arteriam quidpiam illapsum fuerit, sternutatorium admovendum est naribus: veluti aliquid piperis, aut Euphorbii vel ellebori albi: ab acidis & tussim provocantibus, contra opinionem quorundam, omnino abstinendum. Tussis enim sua sponte satis accidit: acida vero & æsophagum & asperam arteriam & quicquid attingunt, coarctant, con-

stringunt & angustiora efficiunt. Quapropter ore continuo teneat syrupum de liquiritia, de polytricho, violarum aut (quod ego expertus sum) oleum amygdalarum dulcium, saccharo ad partes æquales commistum.

Post extractionem ossis, guttur sæpe abluendum est decocto hordeaceo, aut aqua plantaginis, cum mellerolaceo & aliamorone: si dolor adest, sumat ter aut quater interdum cochlear ol. amygdal. dulcius vel rosacei, aut utatur sequenti Electuario lambendo.

℞. Specierum diatrageant. Frigi, Diaridis ana ʒij. ol amygdalarum dulcium ʒij. syrupi violarum line spiritu vitrioli q. s. misceantur natque electarium mediocris consistentiæ.

A vino, & ab eis omnibus quæ calefaciunt, abstineat, ne inflammatio & dolor excitentur. Utatur jusculis, panatellis, crematura hordei, lacte amygdalarum dulcium, emulsionem seminum frigidorum majorum, iisque omnibus, quæ deglutiri & concoqui facile possunt si æger juvenis fuerit, & sit inflammationis suspicio, electuario de succo rosarum evacuandum est. Et vena basilica brachii dextri incidenda. Exterius inungendum est collum oleo rosaceo & myrtino & unguentum de bolo applicandum.

Descripti autem instrumenti inventorem Dni. D. Gualterum Ryffium, apud Argentoratenses Medico Chirurgum longe celeberrimum fuisse arbitror; qui & delineationem in magna sua Chirurgia, mihi pagina 30. habet. Antequam vero ego prædictum instrumentum à Dno. Ryffio mutuatus essem, cathetere, quo utimur in affectibus vesicæ (cui spongiam annexi) Cum successu usus sum; præsertim in fatore quodam Coloniensi, Mag. Casparo, de quo vide supra observat. 3. si catheter ad manus quoque non fuerit, filo ferreo nonnihil incurvato, spongiolam firmiter annecte & utere. Hæc in eum finem scribo ne Chirurgus propter penuriam instrumenti operationem (quæ moram non admittit) procrastinet.

Esti autem prædictum instrumentum à D. Gualtero Ryffio acceperim, nonnulla tamen perquam necessaria, in ipso correxì atque emendavi, nunc enim atque imperfectum esse Ryffii instrumentum, lector haud difficulter cognoscet, si Dn. Ryffii instrumentum cum meo conferre voluerit. Primo enim quia aliquomodo in acutum definit, facile in operatione ac incredibili corporis agi agitatione, in asperam arteriam intrudi, ægrumque suffocare poterit, obtusum enim ut sit necesse est. Deinde spongia tam utilis tamque necessaria, in ipso desideratur, triplicem enim usum habet in hoc instrumento. Primo impedit, ne in operatione & maxima corporis agitatione, instrumentum in asperam arteriam intrudatur, idque facile fieret, si instrumentum nudum esset. Spongia Epiglottidem deprimit, asperamque arteriam claudit. Hic tamen monendus est Chirurgus, circa Epiglottidem moram non adhibendam, ossiculumque diu querendum non esse, ne spongia asperam arteriam obturet, respirationemque impediat. Secundo impedit spongia, ne Æsophagus ab asperitate instrumenti lædatur, excorieturque, quæ excoriatio periculo non vacat: plerumque enim dolores, inflammationem.

flammationes, & gangræna sequuntur, uti lector exemplum annotatione dignum observ. 35. cent. 5. videre poterit. Tertio modum & aliquomodo in acutum delinens instrumentum, faciliè juxta os gulæ intitum, descendere, & nihilominus illud relinquere poterit. Si vero annexa est spongia, os vel ad ventriculum detrudat, vel sursum secum extrahat; uti ego cum alias, tum 18. Aprilis 1633. in Juvene Bernensi, Johannis Bietermanni filio expertus sum. Hæc mihi, carissime lector, non contradicendi studio, quin potius, ut te in hac operatione, tum magni momenti, erudire possem, tuum erit, omnia benigne interpretari.

Viro clarissimo ac Doctissimo Dn. D. Petro Offenbaltio, Illustrissimi Landgraviæ Hassiæ &c. necnon Electoris Reip. Francfurtensis medico ordinario ac celeberr. Amico meo singulari studio observando.

Fabricando nos fabros fieri, vir clarissime, juxta ac Doctissimi. ante menses aliquot, in juvene isto viro cujus mentionem feci circa finem observationis 35. cent. 1. reipsa expertus sum. Tam vehementes etenim in ipso erant convulsionibus, & corporis concussionibus jam antrosum jam retrorsum ac sinistrolum, ut tres viri, quantumvis robusti, ipsum, ne membra disrumpere vix continere possent, donec tandem osculum, Œsophago intitum ad ventriculum detruiderem, per os enim educi non potuit. Quod sit? In maximis istis convulsionibus, & dentium contractionibus, instrumentum meum sit forte, & ex aurichalco fabricatum, sub dentibus adeo contregit ut plane inutile factum sit. Sed in quem finem, inquires, proverbium? Dicam sincere in hac operatione me edoctum esse, instrumentum ut à Domino Kyffio inventum, & mihi aliquoties ului fuit, non semper tutum esse. Si enim in ipsa operatione inter dentes ægri frangeretur, & fragmentum ad ventriculum descenderet, quoniam, bone Deus mala? Quotnam symptota periculosa atque mortalia sequerentur? In prædicta itaque operatione edoctus fui, prædictum instrumentum (quod omnium quæcumque in hoc affectu excogitari poterunt, aptissimum est) quia propter multitudinem foraminum per se nimis imbecille est, corroborativo aliquo indigere. Idque facile fieri potest si stylus ex cupro vel aurichalco, prædicto instrumento ab artifice infixus & ex utraque parte, videlicet manubrium & spongiam versus firmiter annexus plumbatusque fuerit. Crassus ut sit stylus ille, necesse quidem est, ita tamen adaptari debet, ut in medio fistulæ collocatus, foramina ne obturentur, & usus instrumenti imminuatur, non attingat.

Porrò quia gravissimus & periculosus, imò mortalis est affectus, uti ex observatione 35. cent. 1. apparet, suadeo; ut fidelis ac diligens Chirurgus, prædicto instrumento semper instructus sit, moram enim nequaquam admittit affectus iste, ut in prædicto juvene & aliis observavi. Nisi enim ego instrumentum, quod nulli in hac verbe, nisi apud me reperitur, in promptu habuissem, de ipso actum fuisset, propter doloris enim vehementiam, statim affluunt humores, intumescit collum, sequiturque suffocatio, plerumque etiam inflammatio & gangræna, uti ex observatione 35. cent. 5. videre

poteris. De his, clarissime mi Dn. Doctorem quia lectorem admonitum esse cupio, tuam excellentiam etiam atque etiam rogo, ut epistolam hanc observat. 36. cent. 1. antequam apud vos excudatur, ad calcem annexere velit. *Idem ibidem.*

De modo frustra carnis, casei, panis, aliaque corpora fueribus inhaerentia auferendi.

Quam difficilis eorum sit respiratio, quibus ex Catharro Œsophagus angustatus, experientia quotidiana abunde docet. At difficilius longe is obvenit, qui ex corpore a quo durior, pane, carue multibique angustiam eius incurrunt. Quandoquidem enim Œsophagus aspera arteriæ firmiter cohereat, incumbitque, impossibile est, quoties frustum aliquod ei inhaeret, ætrem pulmones respiratori dicatos accedere posse, aut contra pulmonibus contenta exue.

Quæ de numeris, ætymis, similibusque anchoris referunt, non est quod a proposito nos divertant, frustra carnis, casei, panis, aliaque his similia, ex gula auferendi hic est modus.

Ad manus Chirurgi sit stylus ferreus flexilis, cussus extremitas una manubrio gaudeat debito, altera instructa sit spongiæ particula, strictissime alligata, spongiam hanc oleo olivarum madidam, ad faucium posteriora atque inferiora, ubi Œsophagi ingressus, dimittat, hinc sensim, ne respiratio magis ledatur, in Œsophagum ipsum, in hoc, ubi ad frustum aut corpus aliud ei inhaerens instrumento dicto devenit, spongiam, ad postica premendo, studeat supponere corpori contento, quo simul cum ea frustum retracta id extrahere liceat. Sapius hæc operatio non raro iterari debet. Quod si corpus gula inhaerens hac arte extrahi nequeat, & quidem magis si à ventriculo digeri queat, diutiusque blanda ei offeratur.

Ne hic errorem committat Chirurgus, stylum suum in asperam arteriam, non vero gulam dimittendo, quod Chirurgus cuidam contigisse novi, sciat lector gulam à parte postica vertebri dorsi atque cervicis incumbere, asperam vero arteriam ab antica incumbere gulæ.

Hildanus obs. 36. part. 1. instrumentum delineat circa extremitatem foraminibus plurimis præditum, cujus ope spinas, ossicula, ejusque generis alia gulæ inhaerentia extrahi posse scribit: Est hæc ex descriptione authoris fistula argentea aut aenea incurvata, crassitie pennæ olivæ, longitudine vero unius pedis cum dimidio aut circiter; est & undique perforata, in sua extremitate vero habet spongiolam novam, avellanae magnitudine, firmiter alligatam. Hæc fistula in Œsophagum immissa & sensim medicaque circumducta, postea extracta, ossiculum aut quicquid simile fuerit extrahitur. Si enim accidit, ut foramen aliquod fistulæ spinam aut ossiculum excipiat, tum simul cum fistula extrahitur: sin minus asperitas ossis spongiæ adhærebit, & suo loco amovebitur.

Qualiter gula tractanda materia inhaerente

vel extracta, vel in ventriculum detrusa, notum
satis Chirurgis. Vel hic usurpari potest garga-
rismus ex aqua hordei cum Syr. Violar. paratus,
eius etiam portio deglutiri potest, vel litus de-
glutiendus Oles Amygdal. dulc. cum syr. viol.
Non est quod hoc loco prætereamus ea quæ in
tali casu solius naturæ ope peracta observavi-
mus.

Filius 5. aut 6. annorum Huberti petri, casu
particulam bractæ ore receptam deglutit. Me-
dia nulla, quæcunque etiam adluberentur, hic

profuere, tandem particula dicta ex deglutitio-
ne fortiore in ventriculum ipsum delata. Hic non
nisi continuum usum decocti hordei cui com-
mixtus syrup. viol. & Alth. commendabam;
interim excrementorum alvinorum haud ne-
glecta inspectio, nec tamen deglutitum cor-
pus unquam in iis observatum; nulla pueru-
lo ullo tempore gravis cardiagia, nulla illa-
ca passio. *Job. à Meckren in observat. Medico
Chirurgic.*

Finis Libri Septimus.





BIBLIOTHECÆ MEDICO-PRACTICÆ LIBER OCTAVUS.

De Morbis à Litera H incipientibus.

HEMATOCELE.

Vid.

HERNIA.

HÆMODIA.



Unt qui hoc nomine omnem prorsus dentium dolorem intelligunt: verum propriè sic denotatur Itupor ille qui in dentibus gingivisque cum dolore percipitur, vel pel propter manducatos fructus, aliaque edulia austeriora ac acida, vel propter succorum salivalium per vasa glandulis eorundem secretioni destinatis, appensa; in os derivatorum qualitatem etiam austriorem. De hisce vide in Dentium morbis.

HÆMOPTYSIS.

Sanguinis è pulmone sputum & per tussim modo leviozem & fere nullam, modo fortiozem ejectio, affectus satis frequens (& mirum est quidem, quod non frequentior) existit. Quippe cum vasa sanguifera in surculos & propagines innumeras, & perquam exiles dividantur; cumque per illos omnes, inter se multifariam complicatos, & varie intortos, sanguis usque immaniter æstuans rapidissime deferatur; vix concipere licet, quomodo circulatio ejus, adeo perplexa & tortuosa, simulque impetuosa, absque impedimento aut interruptione quavis peragatur. Et quidem in viventibus hanc difficillimam esse concludimus, quoniam in defunctis per injectiones ægre succedit: quippe liquor, Arteriæ pneumonicæ per embolum immisus, haud prompte statim & facile per venas redibit; quin diutius in transitu hærens, & ductus usitatos transiliens, in vesiculas alioque tracheæ canales, inque lobulorum inter-

stitia aliosque hiatus varie excurrit.

Circa Hæmoptoem considerare oportet, primo è quibus vasis, & quali eorundem affectione, sanguis erumpat; secundo in quibus locis sæpius deponatur, dein tertio quot modis, ut per os excernatur, sursum duci, aut ejici solear.

Quoad prius, ex circulationis lege supponendum erit, sanguinem, sponte erumpentem, omnino ex arteriis prodire: nam venæ, donec integræ manent, cum versus cor reducunt, ac minime effundunt, quamvis inficiat non canus illas interdum, à vulnere, casu, contusione, alioque accidente violento, quoad unitatem solutas, sanguinem extra sinus suos dimittere. Veruntamen sæpius sanguis, Hæmoptoem faciens, ab arteriarum osculis referat, aut disruptis procedit; & tunc in culpa esse solet, aut ipsius sanguinis dyscrasia, aut vasorum mala conformatio.

Utriusque horum variz sunt species, ac differentiz; quæ item ad sanguinis sputum excitandum diversimode concurrunt. Enimvero sanguis quandoque tenuior, simulque acris existens, arteriolarum oscula referat, aut exedit, quandoque item crassior, & ad coagulandum aptus, cum à venis satis prompte excipi nequeat extravasatur. Propter hujusmodi sanguinis vitia, Scorbutto aut febre pestilente laborantes, etiam qui venena quædam biberunt, frequenter in Hæmoptoem cadunt. Nec minus ex vasorum culpa hic affectus exoriri solet, quatenus nimirum ista vel tenera nimis vel gracilia, nonnunquam à motu violentiore, uti à tussi, vociferatione, saltu, alioque exercitio vehementi disruptuntur; vel in quantum ea laxa nimis & humida quoad oscula sua dehiscunt, & sanguinem è circuitu erumpere sinunt: porro interdum quatenus venæ à frigore contractæ & corrugatae cruorem non prompte trajiciunt, iste relictagnans arteriolas distendit, & ex earum osculis erumpit.

Circa arterias, è quibus sanguis Hæmoptoem faciens erumpit, multum interest cujusmodi illæ, ac ubinam loci constitæ fuerint; præterquam enim quod sputi cruenti differentiz insignes of-

antur, juxta quod cruor vase perexili, aut magno; ac alterutro aut pulmonis luminitate prope laryngem, aut in regione ejus media inter vasorum ramos majores, aut denique in extrema inter vesiculas orbiculares confuso erumpit: insuper advertimus arterias sanguinem expuere solitas, vel ex earum numero esse, quæ e turpe pulmonari oriundæ tracheæ ramos ubique comitantur; vel quasdam ex illis esse, quæ, originem suam aorta debentes, tracheæ tunicam densa ramificatione obducunt.

Quippe manifesto liquet (prout supra declaravimus) ex harum, uti & glandularum, osculis, humorem unctuosum ad tracheæ superficiem internam lubricandam exudare: porro, quatenus ex istdem humor serosis affatim in asperæ arteriæ cavitatem destillat, catarrhum exoriri. Quapropter minime dubitamus asserere, etiam ex narum osculis referatis, merum cruorem in ductus tracheales quandoque exudantem, in perexigua licet quantitate sputum cruentum parere. Observavi plures sine tussi, aut pulmonum in diu positione quavis, semel aut bis in die sputum unum forsitan aut alterum cruentum excrevisse: quod quoties ingruit, patientes in imo gutture, aut summitate pectoris, quandam quasi destillationem perferunt; unde statim mera fibrarum trachearum contractione, sive motu velut cochleari, parum sanguinis fluidi pituita permixti, ac minime spumosi, expuitur: cuique interdum per plures menses talis affectio perdurasset, exinde nihil incommodi, aut quod Phthysin inferret aut minaretur, insequutum est: quod nunime fieret; si quædam ex vasis pneumonicis aperta fuissent.

2. Hæc de vasis Hæmoptoicis, eorumque in sputo cruento affectione diversimoda. Quod spectat ad loca in quibus sanguis extravasatus deponitur, hæc præcipue, & fere tantum sunt asperæ arteriæ, ejusque partium cavitates internæ. Quippe in hanc, velut in cloacam, ductuum quorumque cæterorum sacrementa quæque, aut superfluitates, per ultimos, quæ licet, naturæ nixus, foras statim amandanda derivantur. Quod si in lobulorum interstitia sanguis extravasatus impingetur, vel membrana extima exudans in thoracis cavitatem decidet, hic empyema, & illic frequenter abscessum creât. Ut plurimum vero cruor, à circuitu pulmonari, deciduus, varias sputi cruenti species producit; juxta quod nidum suum, vel superius intra laryngis cavitatem, vel paulo inferius circa intermedios ductus tracheales, vel denique ulterius intra vesiculas orbiculares nanciscitur. Prior affectus solummodo procedit ab arteriæ cujusdam, quæ tracheæ truncum obducit, osculis referatis; proximus quandoque forsitan ab hac causa, sæpius tamen ab ipsis arteriis pneumonicis apertis, aut disruptis; quæ vasa, cum majora fuerint, sanguinis quantitatem sæpe horrendam profundunt; cuius item expuitio, & totius pectoris musculis, simulque ipsius tracheæ fibris multum irritatis, & valde contractis, copiosa & violenta existit. Sin vero sputi cruenti scaturigo in ultimis vesiculis consistat, sanguis in minore quidem copia, sed cum tussi profunda, sæpius iterata, & valde molesta rejicitur.

3. Atque hinc, (quod tertio erat propositum) excretionis e pulmonibus sanguineæ differentiæ, & multiplices sputi cruenti ritus, siue modi innotescant. Nam cruor in laryngem exudans, post levem in gutture titillationem, sine tussi aut scæatu, facie & fere insensibiliter in os ascendit; & si hujusmodi cruoris extravasatio in formis continget, vigilanti usque Hæmoptoe vix conscia statim ore effluit; quatenus nimirum tracheæ fibræ motrices, etiam inter dormiendum contractæ, sanguinem recens extillatum jag-jag in fauces exhalant. Sin vero e vase majore, circa medios pulmones descescente, aut disrupto, sanguis (qui semper spumiosus est) affatim inductus tracheales erumpat, ille mox tussi concitatur exinde factum cum impetu & copia ingenti ejicitur; ut videantur affecti cruorem evomere potius quam exsuffire. Quod si denique cruor ex vasorum plexibus, quibus vesicula orbiculares cinguntur, erumpens in cellulas istas decidit, inde per vices in quantitate minore, nonnisi per tussim profundam & sæpius repetitam, excernitur.

Hæc de Hæmoptoe ratione torn ali, causis conjunctis, & differentis: quod ad causas procatarticas & evidentes spectat, utraque harum multiplices & varia exiunt. In priore censu habentur, imprimis pulmonum induratio hæreditaria, uti cum ipsi debiles & teneri cum pectoris angustia originaliter fuerint. Porro illorum atussi, in pyemate, aut pleuritide prægressis mala affectio, & præsertim oblitum, aut mala conformatio, ad Hæmoptoen valde disponunt; ac ita potius, si tali Diathesi sanguinis acrimonia, siue dyscrasia, à mala victus ratione, aere malubri, aut aliis modis contracte accesserit. Fluxus menstrualis, Hamorrhoidalis, aut e naribus effluentis suppressio, quosvis fere ad sputum sanguineum inclinat. Secundo inter causas evidentes referri debent, imprimis caloris aut frigoris excessus: quippe cum sanguis supra modum æstuat, aut transpiratione ejus per poros cutis impeditur; immantiter exinde turgescens, frequenter e vasis pneumonicis erumpit. Hinc notavit olim Hippocrates, & etiamnum vulgi observatio est, *deperit* sæpiissime in hyeme stante Borea accidere. Nec minus raro Thermarum usus multis, antea satis sanis, hoc malum intulit. Quinimo hoc plures à vini, aut aquarum ardentium potu, ab ictu, lapsu exclamatione, vomitu, tussi, aliisque violenta totius corporis aut pulmonum agitatione passim contrahunt. Porro venena quædam, & juxta Heurnium radii lunares, (cujus ratio non facile patet, neque fides constat) hunc affectum excitare perhibentur.

Morbi hujus prognosis satis vulgò nota est; cum nullus fere e plebe sit, qui non sanguinis sputum protenus susceptum & periculo plenum habeat. Attamen cum variz hujus species existant, alia quidem alia plus, aut minus periculosa deprehenditur. Sanguis e tracheæ vasis exudans malo sæpe vacat: porro e vasis pulmonaribus extremis & minoribus erumpens, curationem sæpenumero admittit: saltem multo tutior est, quam Hæmoptoe copiosa ab arteriarum ramis majoribus, in tracheam apertis, contingens. Cæterum patientis prædispositio magnam circa morbi hujus prognosin differentiam facit.

facit: nam si Hæmoptoe propter causam evidentem solitariam excitabitur, atque corpori prius sano & quadrato acciderit, longe major salutis spes erit, quam si affectus sponte exoritur, cachectico, phisico, scorbutico, aut alias valetudinario contigerit. Utrumque hunc morbum minus tutum, & semper curatu difficilem existeret communis observatio est: cujus item ratio liquido patet, in quantum scilicet pulmonum munus, in motu perpetuo consistens, continui soluti therapeitz, ad quam imprimis eductio & quies requiruntur, omnino contrarium est. Cui etiam medelæ impedimentum hoc majus accedit, quod moles pulmonaria non (uti putabatur) parenchyma est, sed vasorum innumerabilium textura, sive tela admodum subtilis; cujus unitas si quando solvatur, impossibile prorsus erit vasculorum disjunctorum fines rursus coire, aut spatium, uti in aliis partibus, carne aut callo adimpleri. At vero unicum hoc superest, ut, dum vasorum extremitates incongrue semper & imperforate coalescant, sanguinis circulatio, in parte affecta cessans, per aliam vicinam suppleatur: quod quidem raro sine totius pulmonis noxa, aut incommodo, succedit.

Quod spectat ad Hæmoptoes Therapeiam, indicationes curativæ erunt potissimum hæc duæ viz. primo sanguinis effluxum protenus sistere & cohibere; dein secundo continui solutionem absque tæbe in pulmonibus relicta sanare.

1. Circa priorem hæc duo erunt imprimis procuranda, primo nempe ut sanguis ad partem affectam non confluat; secundo atque interea ut valis apertura quoque modo claudatur.

1. Ut sanguis ad partem affectam non confluat, plures medendi intentiones simul in usum veniunt; viz. sanguinis copiam minuire, æstuationem ejus compescere, intemperiem alterare atque motum deprimere, aut alio diversere oportebit: in quos fines phlebotomia, ligaturæ, & frictions sæpissime conveniunt: porro julapia, decocta, emulsiones, & succulentæ herbarum expressiones propinari debent. Quinetiam Hypnotica moderata, & imprimis Diacodiata, cum fructu exhiberi solent: hæc enim, cordis motum sufflammando, sanguinem deservicere cogunt.

2. Ut valis apertura claudatur, remedia astringentia & agglutinantia imprimis conveniunt. Horum præcipua in forma linctus exhiberi solent, ita ut inter deglutendum, quædam ex his particulæ, asperæ arteriæ illapsæ virtutem suam parti affectæ immediatius communicent. Verum hæc *dispositio* ratio haud magni momenti esse videtur; quia medicaminum ipsorum efficacia potissimum, ac fere tantum, sanguinis commeatu ad morbi sedem pertingit. Quare non solum eclegmata, sed etiam decocta, pulveres, & pilulæ ex traumaticis & balsamicis, cum fructu præscribuntur. Horum formulas infra subdemus.

II. Indicatio secunda, quæ & Præservatoria continui solutionem, absque residua pulmonum noxa, sanandam respiciens, duo malorum genera præcavere debet, viz. ne hæmoptoe (in quam affecti postea fere semper erunt proclives) subinde repetat; & ne Phthisis, quæ

hæmoptoicos quosque minatur; succedat. Propter hos fines circa morbi hujus prophylaxin, & sanguini & pulmonibus cura assidua; sive medendi ratio constans; adhiberi debet.

1. Quoad sanguinem; massa ejus in debita semper quantitate, recta temperie, motu leni & æquabili, contineri debet. Hinc ne superabundet, aut, dyscrasia affectus, turgescens ineat, aut impuras facultates in pectore deponat: phlebotomiam, & blandam catharsin interdum celebrare oportet. Exacta victus ratio semper necessaria est. Porro ad cruorem depurandum & edulcorandum; lactis Asinini, aut acidularum potus nonnunquam egregie conferunt. Cæterum decocta, aquæ distillata, herbarum succi, quæ sanguinis dyscrasias tollunt, atque serum, aliasque impuritates à pulmonibus derivant, & per diaphoresin aut urinam foras deducunt, sedulo erunt propinandas. Præterea in hanc rem fontanellæ summe conducunt.

2. Nec minus ipsius pulmonis ratio haberi debet, quod nimirum tota ejus compages, & imprimis locus affectus, in debita confirmatione, & recto tenore, præservari queant. Hinc motus quisque violentus, à quo unitas magis dissolvatur, aut restitutio ejus impediatur, sedulo vitetur. In aere nitido & perfato, attamen haud aspero nimis & acuto, degatur: à cibis crassioribus, somna meridiano, cœna lautiore, aliisque in victu erratis, quæ præcordiis repletionem, aut obstructionem inducant; abstinetur. Cæterum remedia, quæ vi peculiari, seu virtute quadam specificâ pulmones curari perhibentur, in crebro sunt usu.

Adumbrata ad hunc modum medendi methodo ad Hæmoptoen requisita, restat adhuc quoad singulas indicationes therapeuticas, & juxta varias, quæ ad eas pertinent, medendi intentiones, remedium formulas quasdam selectiores subicere, quarum agmen merito ducant, quæ symptomati plurimum urgenti occurrentes, sanguinis per tussim, aut alias à pulmonibus ejecti effluxum, subito cohibeant.

In hujusmodi Medicamentorum principilo habeantur ista, quæ impediunt, ne sanguis ad partem affectam confluat; simulque virtute quadam astrictiva; simulque agglutinativa; qua valis apertura claudatur, possent; atque post alvum per euenia subductum, & Phlebotomiam (nisi per pulsum debilem & caloris defectum prohibeatur) celebratam, protenus exhiberi solent in forma julapii; decocti; emulsionis; succulentæ expressionis, pulveris, pilularum, aut eclegmatis. Singulorum ex his, uti etiam Hypnoticorum; præscripta quædam elegantiora, & maxime efficacia subiiciemus; quæ tamen non passim & indifferenter, sed juxta prudentis Medici consilium unatqueque methodice & tempestive, pro varia patientis constitutione, & morbi conditione usurpari debent:

1. Julapia, & Aqua destillata.

℞. Aq. portulacæ, papaveris Rhæadosi ana ℥vi. sanguinis Draconis tenuissime lavigat. ℥ss. Syrup. papaveris rhæad. ℥ij. Spirit. vitrioli Martis ℥ss. misc. Dosis ℥ij. repetendo intra vi. vel vii. horas.

℞. Aq.

℞. Aqua plantaginis lib. j. gum. tragacanth. Arabic. pulv. ana ℥ss. misce & dissolve; deinde adde Syrup. è Rosis siccis ℥i℥. Julapium. Dosis ℥iij. vel iij. hora quaque tertia vel quarta.

℞. Aqua gemmularum quercus, rosarum rubrarum, Nymphææ, ana ℥iij. lapidishæmatit. tenuissime lævigat. Bol. armon. pulv. ana ℥ss. syrupide Nymphææ ℥ij. misce. Dosis ℥iij. vel iij. ter aut quater in die.

℞. Roris vitrioli, sive phlegmatis fere insipidi lib. j. syrup. Myrtini ℥ij. misce. Dosis ℥ij. aut iij. sæpius in die vel nocte.

℞. Summitatis cupressi M. viij. folior. aut florum salicis M. vj. radic. Symphiti majoris, Nymphææ, an. lib. β. balauft. M. ij. omnibus simul concisis, affunde lactis recentis lib. viij. destillentur organis communibus. Dosis ℥iij. vel iij. ter aut sæpius in die.

℞. Hujus aquæ destillatæ, & aqua plantaginis, ana lib. β. gum. tragacanth. Arabici, ana ℥ij. dissolve. Dosis ℥ij. tertia quaque hora.

Sequens mixtura in Hæmoptoe cochleatim à Frederic. Derkero præscribitur, & remedium utile videtur.

℞. Aqua plantaginis ℥ij. cinnamomi ℥ij. confect. de hyacintho ℥i℥. acet. stillat. ℥i℥. corallii rubr. præpar. ℥ss. florum Balauft. sang. Draconis, ana ℥ss. laud. opiat. gr. iij. syrupi Myrtini ℥j. misce.

℞. Aqua plantaginis, rosarum rubr. portulacæ, ana ℥iij. lapidis hæmatitis, & sanguinis draconis in pollinem redacti, ana ℥ss. sacchari candi ℥vi. f. Julapium.

Solutio vitrioli communis, vel vitrioli Martis in aqua fontana facta, & cum pecia vulneri applicata, hæmorrhagias quascunque egregie sistit: eam vero intus exhibere haud convenit.

2. Decocta, tinctura, & Emulsiones.

℞. Folior. sanguinariz, pervinæ, pilosellæ, plantaginis, lujulæ, bellidis utriusque ana M. i. florum rosarum rubr. M. β. hordei ℥ss. passularum ℥ij. coque in aquæ extractionis ferri lib. iij. ad ij. colaturæ adde syrup. è succo hyperici, ℥ij. vel de pilosellæ f. Apozema. Dosis ℥iij. ad vi. ter in die.

℞. Foliorum hyperici, tormentillæ totius, Pimpinellæ majoris, ulmariz, ana M. j. sem. portulacæ, plantaginis, acetosæ, ana ℥j. conserv. rosarum rubr. lib. β. aqua fontan. lib. iij. ebulliant clausa in B. M. per horas xii. colaturæ adde spir. vitrioli Martis ℥ss. Sumatur eodem modo.

℞. Aqua hordei, cum radicibus rubiæ tinctorum incoctis, lib. iss. affunde tepide florum rosar. rubr. M. i. adde spiritus vitrioli ℥i. f. infusio clausa & calida per horas iij. f. tinctura; colaturæ adde syrupi è succo hyperici ℥is. sumatur ℥iij. vel iij. ter vel quater in die.

℞. Decocti radicis urticæ recentis lib. iss. sem. papaveris alb. hypocyami, ana ℥ij. sem. melonum excorticat. ℥vi. f. a. f. emulsio edul-

corat. cum saccharo penidiato. Dosis ℥iij. ter vel quater in die.

3. Herbarum succi, & expressiones succulentæ.

℞. Succifolior. plantaginis iib. ss. fume ad ℥ii. vel iij. ter in die cum aq. destillata superius præscript. ℥iij. edulcorand. ad placitum.

℞. Foliorum urticæ recentis, plantaginis, bellidis minoris, ana M. iij. simul contusis affunde aq. portulacæ ℥vi. f. expressio fortis: sumatur eodem modo.

4. Pulveres & Pilula.

℞. Pulv. lapid. hæmatit. sanguinis draconis, cum aq. rosar. in marmore triti, margarit. ana ℥i. bol. armen. terræ Lemniæ, ana ℥ss. trochisc. de Alchekeng. ℥ij. f. pulv. divide in xii. partes, capiat i. ter in die cum aq. destillata superius præscript.

℞. Sim. hioscyami, papaveris albi, ana ℥x. terræ sigillat. corallii rubr. ana ℥v. idoneo in constantiam mollem redacta, Electuarium Helidzi olim in Germania percelebre vocatur.

Prædicti pulveres etiam possunt in pilulas & Tabulas idoneas, adiciendo solutionem tragacanth. vel syrupum idoneum redigi.

Excrescentia spongiosa cynorrhodii fructibus adnasci solita, in pulverem redacta, ad ℥ss. bis in die exhibita in Hæmoptoe remedium valde proficuum est.

℞. Millefolii contusi & astivo sole siccato. q. v. redigatur in pulverem subtilem, & in vitro servetur ad usum. Dosis ℥ss. ad ℥j. bis in die in vehiculo idoneo.

Pulvis Iulii Cæsaris Scaligeri, seu potius Serapionis, valde commendatur. Dosis ℥iij. bis vel ter in die.

Eclegmata & Electuaria.

℞. Conserv. rosar. rubr. cynorrhodii, ana ℥ij. pulv. sem. papaveris albi, hypocyami. ana ℥ii. spec. diatragacanth. frigid. ℥is. lapid. hæmatit. sang. draconis præparat. ana ℥ss. Syrup. papaveris Rhæad. q. s. f. electuarium. Capiat qu. nncis castaneæ vesperi & mane; aliis temporibus lambat cum bacillo liquiritiæ.

℞. Conserv. florum symphiti majoris, nymphææ, ana ℥i℥. trochisc. de Alchekengi. diatragacanth. frigid. ana ℥ss. syrupi lujubim. q. s. f. eclegma molle, de quo sæpe lambatur.

℞. Albuminis ovi fortiter agitati ℥ii. sacchari rosacei ℥i. amyli ℥iij. f. lohoch. sumend. sæpe ex cochleari.

℞. Conserv. rosar. rubr. ℥iij. balsami Lucatellæ ℥ss. trochisc. de Alchekeng. ℥ii. syrupi papaveris rhæad. q. s. fiat eclegma molle. Qu. nucis castaneæ mane & vesperi sumatur.

II. Secunda indicatio præservatoria, ejusmodi remedia suggeret, quæ sanguinem in recta temperie, & pulmones in debita conformatione continendo, & hæmoptoes recidivam, & phrisesos successionem præcaveant. Talia quæ respiciunt sanguinem, vel sunt blande evacuantia per sedem, urinas, & diapnoen; vel mere alterantia. Unaquæque horum præscribi solent, vel in for-

ma Potus Pulveris, Bleſſuarii, aut Pilularum quorundam ex iis præcipuorum typos ſelectiores hic ſubjiciemus.

1. Quoad evacuantia, lenis purgatio ad hunc modum quandoque inſtituatur.

℞. Senn. opt. ℥iij. caſſiz cum fiſtula contuſ. ℥j. tamerind. ℥iij. ſem. coriandri ℥is. coquantur in aqua fontan. ſ. q. ad ℥vj. colaturæ adde ſyrup. de cichorio cum Rhabarbaro ℥i. clarific. cum ovi albumine vel.

℞. Decoctionem Geteonis ℥iiij. ſyrup. de pomis purgant. ℥j. niſce, ſ. porcio.

2. Ut ſanguinis inſuſcepta præſervetur, ejuſque recrementa, à pulmonibus derivata, continuo per diaphnoen & urnas amendantur, alterantia ſequentia aut quædam ex iis, ſere in conſtanti ſint uſu; quæ item virtute ſanativa pollentia pulmonibus infirmis, aut quoad unitatem ſolutis, ſuccurrunt.

Pro potu ordinario, aqua ſimplex, præſertim in conſtitutione calida; aut aq. vino clareto parum tincta bibatur. Quibus hic potus haud congruit, Bochetum ex china, ſarſa. cum raſura eboris; C. C. & ſantalò albo; vel cerviſia ſive alba tenuis, cum foliis linguæ cervinæ, botryos, & ſimilibus inſuſis bono cum fructu uſurpari ſolet.

Decocta pectoralia, aut hydromelita cum herbis traumaticis temperatis ſumantur bis, aut ter in die, ad ℥vj. vel vi.

℞. Radicum urticæ recentis, chereſolij, ana ℥j. foliorum linguæ cervinæ, veronicæ, pilloſellæ hederæ terreſtris, hyperici, ana M. j. coque in aq. fontan. lib. iij. ad ij. addendo paſſularum ex acinat. ℥iij. liquiritiæ ℥ij. colaturæ adde ſyrupi Byzantini ℥ij. clarificentur cum ovi albumine, ſ. Apozema ſumend. ad ℥iiij. vel vj. bis aut ter in die per menſem.

In conſtitutione frigidiore, aut phlegmatica, omiſſis liquiritia & paſſulis cum ſyrupo, adde circa ſinem mellis optime deſpumat. ℥ij. coletur, & uſui ſervetur. Doſis eadem.

Horum uſus interdum intercalatur cum aq. deſtillata in eundem ſinem appropriata; quæ item in nonnullis, quibus apozemata naſcem & radio eſſe ſolent, crebrius uſurpetur.

℞. Summitatum Cupreſſi, foliorum hederæ terreſtris, ana M. vj. limacum ſemicoct. lib. iij. ſantalor. omnium contuſ. ana ℥j. inciſis & contuſis affunde lactis recentis, lib. viij. deſtilla organis communibus. Doſis ℥iij. vel iij. cum cochlear. j. ſyr. & ſucco hederæ terreſtris bis in die.

3. Reſpectu pulmonibus, nempe ut ſine vaſorum obſtructione, vel apertione, partium unio, & totius debita conformatio præſerventur, Baſſanica temperata imprimis conducunt. In hunc ſinem baſſam. Lucarellæ hæmoptoicis quibuſdam aſſiduo & longo tempore ſumendus etiam vulgo præſcribitur. Chymici & ſeminæ quedam illuſtres oleum baſſamicum deſtillatione prolicitum, Baſſami matrem ab iis dictum, ſummis laudibus prædicant.

Facile hic eſſet alia complura remedia hæmoptoica, tum ab antiquis, tum à Neotericis plurimum celebrata huc reſerte; attamen horum meſis modo congeſta jamjam ſatis locuples videtur. Superest vero hujus morbi tum Theoriam, tum Therapeiam ſupra traditam, per Agrotantis hiſtoriam unam aut alteram

illuſtrare.

Juvenis inſignis, cum poſt Cachexiam ſcorbuticam paralyſi afficeretur, atque pro hoc morbo ſanando; remedia non ſolum magnæ ſed & ſanguini & ſpiritus improporcionata, viz. ſalivationem & Thermarum uſus expertus eſſet, Hæmoptoen contraxit, cujus paroxylini (omnia n. quos unquam novi non ita illam lethales) atrociffimæ fuerunt.

Statim à prima hujus morbi apparentia, pulveris Huiſani operationem (à qua ſcilicet oris fluorem aliquandiu paſſus, ſine paralyſi curata ad magnum languorem redigebatur) Hæmoptoe inſequuta eſt: tunc catarrho & tuſſi perquam moleſta afflictuſ, ſputum diſcolor & languine modo tinctum, modo interperinum excernere incepit. Verum hic morbus ab initio mitis, remedium uſu cito evanuit, & deinceps ruſ proſectus; & ærem puriorem hauſiens, melius habuit, & propediem in pectore ſatis ſanæ viſus, Bæthoniæ paralyſeos ſananda gratia adiit; ubi per ſeſquimenſem in aquis calidis quotidie balneatus, denuo tuſſim, & paulo poſt hæmoptoen horrendam contraxit, adeout Nycthemeri ſpatio ſanguinem, creberrimo & copioſe extuſſiens, in vaſta quantitate effunderet.

In hoc ſtatu eum primo inſenſens, facta totius proviſione, ſtatim revulſionis gratia phlebotomiam præſcripti: à qua tamen adminiſtratione (& tunc & poſtea ſemper) ſputum ſanguineum aut repetebat, aut exacerbabatur. Porro julapia, eclegmata, decocta, quinetiam Hypnotica exhibui; quibus parum aut nihil juvantibus, ligaturæ circa brachia & crura adhibiti, primo hujus morbi Tyrannidem coercebant. Cuique ſubinde malum recrudeſceret, ſuaſi denuo, ut potu cerviſiali relicto, conſtanter biberet decoctum chinæ, & ſarſæ, cum pectoralibus. Hujus uſu ſere continuo, inſuper exactam victus rationem obſervans, atque vino; alimentis calidioribus, & ſale & ſaccharo omnino abſtinens, ſupra biennium ſatis recte valuit.

Poſtmodum vero cum in cætu forenti ſtipatus valde incaleſceret, ruſus in hæmoptoen terribilem incidit. Medico aſcito ſtatim phlebotomia in brachio celebratur; unde ſanguinis ſputum atrocius factum eſt cuique die ſecundo ac tertio ſanguinis niſio repeteretur; quaque vice malum exacerbabatur; tandem ligaturis (uti primo) adhibitis, atque decocto pectorali, & linctu ſedulo aſſumptis, morbus illico remiſit, & brevi penitus ceſſavit; nihilominus decocti pectoralis uſum; atque dictam tenuem, ſcilicet proſus excarnem, ſupra ſeſquimenſem continuabat; indeque per tres annos ab hoſte ſuo inducias obtinuit; cumque poſtea interdum à vini potu, aut victu lautiori ſanguis turgelſcens è pulmonibus erumpere ceſſiſſet, ſtatim à ligaturis; ac inſimul decocti, & linctus uſu & dicta tenui impetus ejus reprimi ſolebat.

At vero non ita ſecurus evaſit, quin necelle habuit contra morbum iſtum uſque inſidiantem, excubias ſere perpetuas agere. Etenim haud diu abhinc propter intemperantiam anni catarrhum valde moleſtum,

enim tussi, sputo copioso & subinde cruento contraxit; & tunc medicamenta priora minus effecere. Quare ex proprio consilio, ad nova se contulit; atque imprimis cepit vespert & manu cochlear. j. syrupi è succo hederæ terrestris, indeque juvamen insigne consequutus est. Sed cum syrupus iste ob saccharum brevi tædio fuerit, sumplit herbæ istius pulverem bene præparatum ad ʒss. vel ʒj. bis in die in cochleari cujuslibet liquoris; quo remedio diu usurpato quoad catharrhum & tussim multo melius habuit. Sed cum sanguinis sputum etsi in perexigua quantitate subinde erumperet, medicamentum rursus mutavit, cepitque bis in die pulverem è summitatibus & præsertim è pilosis excrecentiis Cynosbati; quo totidem unico fere remedio, medicus quidam propter curationem Hæmoptoe olim insignis magno cum successu usus fuerat. Nec minus secundum ab isto pharmaco effectum patiens noster retulit; nam exinde statim tussi, catarrho, & sputo cruento prorsus immunis evasit, adeoque perquam diu perstitit: donec tandem huic pectoris morbum penitus subjugatum, proindeque contemnendum existimans, contra alterum antiquiorem, viz. Paralyfin arma sumeret. Itaque dum Hæmoptoe neglecta ad affectum istum debellandum medicamenta calidiora, scil. aquas Magistralles cum vino destillatas, spiritum C. Cervi, salis Armoniaci, & pulveres ac confectiones Aromaticas, in doli larga quotidie sumeret insuper victui lautiori cum Allæ & vino potu moderato indulgeret, Leo Rugiens prius sopiri visus denuo excitatur: Viz. methodo isti Antiparalytica haud diu insisteretur, quin sputum sanguinis cum maxima atrocità rediret, adeo ut nycthemeri spatium supra tres lib. sanguinis spumosi extrusisset. Deinde vero cum medicus accersitus illico phlebotomiam præscriberet, à sanguine misso Hæmoptoe remitti incipiens (uti prius semper assolebat) rursus exacerbabatur: quæ tamen à ligaturis adhibitis, atque linctu, & decocto pectorali sedulo assumptis, statim mitigabatur, & propediem penitus cessabat. Cumque exinde supra tres menses decocto pectorali & diætâ prorsus tenui, nimirum ex carnî, & ex meris herbaceis, frumentaceis, & lacticiis, uteretur, brevi pristinam valetudinem recuperabat; jamque in eo statu vivit, contra morbum istum crudelem adeo triumphans, ut plures Hæmoptoici hunc velut oraculum consultant, & curationis gratia hujus methodum & vivendi genus, posthabitis medicorum consiliis, imitanda proponant.

In hoc casu mirari subest, quod post magnas continui solutiones in pulmones toties habitas, vir egregius per intervalla non tussi afficeretur, nec demum in phthisin incideret, cum plurimi post vasa quævis minutula in præcordiis aperta, deinceps aliquandiu tussi cum sputo copioso & crasso laborent, & tandem sæpe tabidi fiant. Quod autem secus Hæmoptoico nostro contigit, imprimis attribuendum censeo sanguinis ejus constitutioni balsamica, viz. in cujus massa recrementa serosa aut minus congeruntur, aut adeo stricta immiscentur, inde ut rursus non facile abscendant; quare post vasa disrupta, sive unitatem solutam, ichor copiosus (tussim & sputum procreare solitus) non uti in plerisque

aliis exudat. Porro quod observavit ille, contra ac in plurimis aliis, Hæmoptoen sibi nunquam in hyeme, sed tantum in æstate contigisse, etiam ob hanc rationem ita habuit: quippe cum sanguis recrementis vaporosis minus leateret, pororum apertio aut constipatio ei nec commodo vel incommodo cessere; attamen cruor plus debito incalescens cum minus exhalaret, necesse habuit è vasîs erumpere; cumque iste rursus in quantitate diminutus, ichorem serosum è vasîs orificio parum aut minime ablegaret, Hæmoptoe absque tussi residua cessabat. Ratio eadem tenet de plerisque aliis hæmoptoicis, quare nimis alii plus aliis in phthisin proclives reperiuntur. Decocti pectoralis ulum vir insignis semper sibi proficuum invenit: quare cum aliâ Medicamenta subinde variaret, eandem illius compositionem semper retinuit: quin & eam multis aliis hæmoptoicis cum fructu commendavit. Præscriptionis formula hæc erat.

℞. Santalorum omnium ana ʒvj. infundantur per horas xij. in aq. fontan. lbvj. deinde coque ad tertiæ partis consumptionem, postea adde foliorum Tussilaginis, Cap. veneris, pilosellæ, veronicæ, florum hyperici, ana M. ij. sem. dulc. ʒvj. liquiritiæ ratæ ʒss. pastillarum exacinat. lbss. coquantur ad lbij. din f. colatura, usurpanda pro potu ordinario.

Porro sanguinis sputo urgente vel imminente cepit ter aut sæpius in die electuarii sequentis quantitatem nucis moschatæ, superbibendo julapii cochlearia septem.

℞. Conserv. rosar. rubr. ʒiij. cynosbat. symphyt. ana ʒiss. sang. dracon. ʒj. speciec. de hyacinth. ʒij. coral. rubr. ʒj. cum f. q. syrup. papav. Rhæad. misce, f. electuarium molle. Sumat vespert & mane primo circiter ʒiss. superbibendo haustum julap. sequentis. Aliis temporibus lambat cum bacillo liquiritiæ.

℞. Aq. plantag. sperm. ranar. ana ʒvj. syrup. è coral. è res. sicc. ana ʒj. sang. dracon. ʒij. misce, f. julap.

Inter hæmoptoicorum exempla præteriri non debet casus viri Reverendi D. D. Bervick S. T. P. & nuper Ecclesiæ Divi Pauli Decani, quem partim ab ipso patiente olim didici, partimque frater ejus D. D. Bervik Medicus peritissimus mihi amicissimus communicavit.

Insignissimus ille Theologus ante quindecim priusquam obiret annos, tussi pertinacissima, & subinde sputo cruento & falso cum gravi anhelitus scetore cocyten propemodum æmulante laborabat; unde maximo corporis marcore emaciatus, parum aberat quin plane tabidus extingueretur. Quoties hæmoptoe aliquandiu intermitteret, etiam sputi & anhelitus graveolentia cessabat; dein hujus reditus alterum istum affectum mox affore constanter pronuntiabat. In languido hoc statu cum vir egregius, regius partibus tunc temporis gravi tyrannide oppressis fuisse deprehensus esset, ac in arctissimum carcerem conjectus loco potus ordinarii meram aquam biberet, præter omnium spem & expectationem revaluit, adeoque supra decennium mediocriter sanus perstitit. Postea tamen, nescio propter quam occasionem, nisi forsitan ob hiemis frigidioris inclementiam non solû prædicta mala

scil. tussis cum puto cruento, falso, & graveolenti recrudescabant, sed insuper superpondii loco, ventriculi debilitas, inappetentia, & febris nocturna accedebant. Deinde vero haud multum temporis præteribat, quin symptomatis hæc paululum remittentibus sudum denuo affulgere videretur; donec quodam die cælo derepente in frigidissimum mutato, sub noctem magna pectoris angustia, cum respiratione difficilissima, pulsus celeri & imbecilli, cumque spirituum omnium (quali jam mo ibundus fuisset) fatiscencia incelleretur. Attamen ex hoc discrimine, per diacrises, scil. primo Hæmoptoen copiosam, & mox diaphoresin satis uberem, cito evasit: verum ex eo tempore sputum ejus multum de solito fœtore, & nonnihil de sanguine remittebat; cumque brevi postea ultimus & gravissimus immineret Hæmoptoes insultus, solum istum ab anhelitus graveolentia præsigium omnino deerat; subsequens vero sanguinis sputum valde copiosum vires adeo deprimebat, ut exinde sensim declinans, intra mensis spatium expiraret: cumque paulo ante obitum, propter acutum lateris dolorem vena tenderetur, cruor adeo deficere videbatur, ut fere nullus efflueret sanguis. Porro in cadavere post obitum dissecto sanguinis quantitas perquam minima reperiebatur: nec quidem ulla symptomatum aliorum maxime notabilium, viz. Hæmoptoes, atque sputi & anhelitus fœtidissimi vestigia comparebant; quippe nulla fuit in pulmonibus aut cavitas ab ulcere aut solutione continui facta, nulla uspiam puris, aut materię putidę vel fœtentis collectio; sed tantum visceris hujus lobus, ceu potius totum latius sinistrum, à tumore scirrholo adeo obriguebat, ut sanguis molem istam ita constrictam, & quasi lapideam, non facile, aut minime pertransierit, quare non mirum est, si cruor rapidissime per pulmones traiciendus, alicubi è vasis, quæ ob scirrhositatem minime cohærebant, aut circulationem sustinebant, subinde erumperet.

Attamen hic major difficultas oritur, nempe cum pulmones ulcere quovis, aut notabili solutione continui prorsus immunes reperirentur, undenam iste sputi, & anhelitus odor terribissimus, sputi cruenti semper præcursor & comes (exceptis tantum ultimis hujus morbi insultibus) procederet. Super his alibi advertimus, Phthisicorum ulcera pulmonaria, & sputa purulenta, raro aut nunquam, materiem vero è pulmonis vomica ejectam sæpius fœtere: quod autem in ægrotante Domino pulmones utroque affectu immunes anhelitum adeo tetrum expirarent, ratio optime constabit, si inquiremus de causa & productionis modo fœtoris in genere. Hunc autem excitari observamus, quando sulphur impurum, à sale lixiviali, aut acido, scil. alterutro dissolvitur, ac ab altero præcipitatur. Sulphur commune, aut Antimonii ab oleo Tartari, aut ab aqua Stygia dissolvitur; dein si huic solutioni, salis fixi deliquium, ac isti acetum infundas, fœtor terribissimus emanabit. Pariter in casu proposito opinari subest, sanguinis valde impuri particulas sulphureas, è sale fixo, quo latex ejus abunde scatet, corroditi; dein quando humor acidus fluorem passus, è partibus nerveis in massam sanguineam

redundat, sulphur solum præcipitat, proindeque e pulmonibus fœtorem istum exhalari facit, ac insimul dum sanguinem in turgescentiam adigit, paulo postea Hæmoptoen accieri cogit. Novi quosdam pectore satis firmo præditos, atque tussi omni ac diathesi tabida liberos, anhelitum valde tetrum fere semper expirare: quod equidem a nulla alia causa, præter eam quam modo notavimus, procedere possit. Sanguis impurus & sulphure a salibus dissoluto scatens, si fortan dum intra pulmones rarebit ac in compage laxatur, humori acido occurret, inter expirandum effluvia putida & tetra exhalabit. Propter consimilem sanguinis alias dispositi rationem, accidit, quod uti quorundam anhelitus valde putens, ita aliorum suaveolentus exilit. Revera spiritus si ve aer per respirationem reciprocatus, quatenus sanguinis intra præcordia, maxime rarefacti effluvia secunda foras evexit, vaporem modò gratum, modò summè ingratum dispergit. *Thom. Willis. Pharmacut. ration. Part. 2.*

“Antequam praxin in hoc symptomate maxime describam, præmittendam duxi (Lector) Epistolam doctissimi Doctoris Bate, consilium ab Authore nostro petentis de quodam hæmoptico cui remedia communia parum profuere; una cum Authoris nostri responsione. In his enim quæcunque fere symptomati huic opem potissimam ferunt, deprehendes.

Amico suo honoratissimo

Theod. Mayerne, Eg. Aur.

Excellentissime Vir, Nobilis eques cui anno novissimo tua feliciter subvenit *interia*, ad idem novis constitutus angustiis confugit asylum. Præcedentibus (quos tuum consilium & nuncius in memoriam refricabant) eluctatus est affectibus. Diu ne catarrhi vel tussis vestigium extitit: Sola per circuitus erraticos lacebabat hæmoptoia; leviuscula tamen & quæ sua sponte intra bîdium lisi solebat. Longior ero lustroria præsentium retexenda.

Circa duos retro menses ab equestri cursu per octo milliaria concitatissimo consilieta supervenit hæmoptoia, quæ moras trahebat solito longiores, & nullis oppugnata pharmacis per clandestinos progressus ingruit rapaci adeo torrente, ut parum absuerit quin extremo funderet cum sanguine vitam. Ipse in consilium accersitus, repetita medianæ, nec non saphenarum phlebotomia, ligaturis & frictionibus extremorum dolorificis, cucurbitulis lienis hepatisque regioni, suris plantisque pedum adhibitis; julapiis ex tinctura rosarum rub. & santali rub. cum aq. ros. & sp. vitrioli, latice fontano cum album. ovi, cretæ alkool & syr. nymphaeæ transfusat. stillatitiis aquis sperm. ranarum, & portulacæ cum magisterio corall. & syr. consolida; eclegmatibus ex conferv. ros. & consolid. cum lap. hæmatit. & terra sigillat. & bolo syrupoque ros. sicc.; mucilaginis ex sem. cydon. & gum. tragacanth.; pulveribus ex amylo, bolo, &c. non intermissis urticæ succo, musco de cranio humano, sanguine arefacto, laudani grano non semel adjecto, ma-

terix torrentis minuendæ, convertendæ, incraslandæ, nec non illius orgasmo compescendo, indefinenter incubui. Sed frustra diu, donec post tres dies indefessis victi conatibus, alveis recondi propriis hi fluctus inceperunt. Deinde spirit. vitrioli aliquantulo, pauculisque aceti ros. guttis syr. jujub. decem non consolidæ immixtis *hypocistis* exciere spiritalibus studui. Postremo quietem imperavi; victum refriger. & viscosum & analepticum ex gelatinis de pedibus ovinis & vitul. cum rasura C. C. eborisque coctis cum sem. frigid. majoribus & auricula muris, panatallis hordeaceis, cum radice consolidæ coctis præscripsi. Potionem ordinavi traumaticam, & levem succivam ex hydragogis cathartic. Ceratum santalinum regioni pectoris & hepatis adhibui. Quibus stimulo sanguinem privare, venam ferruminare, vires refarcire habituque fas erat illis dum diligenter incubuerit, belle se videbatur habere; ne specimen sanguinis intra sex vel septem septimanas vetitum affectabat iter, habitu viribusque pristinis eo spatio redeuntibus.

Circa octo novemve dies retro ab hoc tempore, ex violentiori brachii motu (frigore tunc temporis ingruente) fluctuabatur denuo sanguis, leniter tamen adeo ut levissimis compeli medicamentis simularet per. 3. vel 4. dies. Postluminio tamen subitanæ fecit eruptionem, & magis quam prius effranem, nec minori molimine potuit in ordinem redigi. Jam fractus per 3. dies succubuit imperus; sed nulla fiducia pacis. Tumultus in sinistro latere (quod mali minera) sæpe sentiuntur, lachrymatur adhuc frequenter vena, & sanguine sputum inficit. Vires tanto Nectaris dispendio vitales fatiscunt, habitus inedia defraudatoque genio extenuatus, ut facies parum ab Hippocratica distare videatur. Macies in corpore toto. Iussis instat (nutris autem adhuc) — & persæpe quædam spiritus angustia premit. Fugaces infestant genarum rubores, & aliquando phlogosis universalis. Hæmoptoia semper prænuntium habuit rosorium lateris sinistri dolorem. — Affectus ipse fatetur ideam; & de differentiis, causis aut affecta parte parum scrupuli. Cura vero negotium domitori faciscit Herculi. Tu ergo, nostri gloria chori (petunt obnixæ quotquot amici Nobilis præsentis sunt) in istam hydram istringas hygeiæ tuæ tela. Quæ ratione vires refarciendæ, & Patiens Phthysicos fancibus excipiendus: Annon alimini lactis ulus quadraret illis; vel decoctum limacum in lacte vaccino? Quæ ratione vena potest obfignari & præcaveri reditus? ut & quid agendum, si canalibus iterum erumpat sanguis? Hi angunt nodi — de his precor impartire sententiam; & præter gratitudinem Patienti, injicies nexus officii Gordianos.

Novemb. 8. 1641.

Servo tuo

Georgio Bate.

Responsum.

Vir Doctissimè. Utinam in præsentis affectus (quem inexpugnabilem fore metuo) depulsioue jam propitium artificiosis & accuratis

tuis conatibus velit esse Numen, quam cordate & graviter medicam nullius aciem ad debellandam hanc hydram, quæ agrotantis, non Medici, culpa, nova subinde sectura, cum ingenti discrimine repullulat. Voleo morosum forsitan ægum & nimis delicatum non annuisse continuo nato de latere aperiendo, dum post pleuritidem stagnans in thoracis cortina sanies purulenta molle pulmonum parenchyma infelicer illueret. Quippe licet naturalis via sit per *ἀναξαρτον*, veri tamen non potest quin subitus à pulmone nullo sale tartareo prægnans humor, cum viscus perlabitur, & in asperæ arteriæ tubos lento progressu sese insinuat, partem corrumpat, & vatorum membranas attenuet, eaque magis obnoxias reddat disumptioni. Sed siquidem quod factum est, miectum esse nequit, id quod nunc instat agamus.

Ancipitis & funesti, immo præcipitis eventus generolum ægum fatigat hæmoptoe, ad quod formidabile symptoma merito posset consilium æger, quoniam ut plurimum diuulsis, aggeribus & mantibus vi. in iunctis canalibus, qui graviter confluantur hoc affectu, purpuream animam vomere consueverunt. Vitanda hic quædam, alia faciendæ.

Alterum caput est in rebus non naturalibus, in quatum cetera maximi est momenti quies, tantummi quam corporis, quæ potissimum imperanda est pulmomi, ejus flabellatio indelens plurimum officit curationi tracti vasis, male in motus ad vitam necessariam continuitate, fidam admittit terruminationem. In cæteris satis abste prospectum ex literis tuis colligo, & peritæ tuæ conodo.

Circa agenda, præcautioni diræ tempestatis per sanguinis inspilationem, cuique plus æquo tervidi contemperacionem, & vasis aperti constrictionem incumbendum. Paroxysmi autem præsentis furori utque & utque resistendum, donec sedato astu tranquillitas denuo illucescat. Præter dictam abs te jam præscriptam, ad *σφύλαξιν* & *ἡγασίαν* facient lactis asini, saccharo rosarum, perlato & corallato conditi, usus; Lac illud abs te exhibitum bubulum coctum cum limacibus & eodem saccharo dulcoratum, cui aquam spermatis ranarum adjici velim; Heculum ex lacte asinino, vel vaccino chalybeato, cui incoctæ fuerint lymphæ majoris radices; Imprimis vero assumptio lapidis hæmatitis in omnibus exhibitionibus, circa quem consule Alexand. Trallianum, lib. 7. cap. 1. cui titulum fecit, de sanguinis rejectione. In minerialibus magis quam in vegetabilibus fixæ sunt virtutes, illæ præsertim quæ à substantiæ secundis qualitatibus pendent. Inferro (mirum dictu) æqualiter triumphant vis aperiens & astringens, quæ licet adversis frontibus inter se pugnare videantur qualitates, attamen forsitan simul & semel in hoc subiecto sunt profuturæ, præsertim siquæ sit (ut procudubio est) debilitas, si quæ obstructio in partibus naturalibus, earumque principe hepate, cui in omni hæmorrhagia unice est consulendum. Ex syrupo corallorum exacte, syr. de sympyto. & saccharo Martis in tinctura Rosarum dissoluto concinnetur medicamentum potens, cuius cochlear j. ex aqua plantaginis bis in die longe à pastibus propinetur. Deinceps pro re nata

&c

& ægri *diſcrepans* magis ſpecificus liquor chalybeatus poterit inſtitui, Corallo rubro particularis vis ineſt ad hepar roborandum & ſanguinem rectificandum. Proderit quocunque modo, ſive magiſterium per alumen præcipitatum aut vitrioli ſpiritum, ſeu ſal edulcoratus, ſive tinctura per acidum quercus ſpiritum extracta propinetur. Purgetur aliquando corpus caſſia & Manna in potione; aut eleſtuarium diacaſſiæ cum manna deglutendum præbeatur. Sæpius (etiam non erumpente per os ſanguine) tundantur venæ brachiorum & malleolorum ſucceſſive ad 3. vel 4. uncias pro vice. Fiant frictiones partium inferiorum quotidie. Denique conſtanter pergat in iis quæ ab te hæcenus fuere præſcripta. At ſi ingruat infortium ex latebris veluti proſiliens, fiant revulſiones jam factæ. Propinetur decoctum pimpinellæ totius & radicis tormentillæ, præparatum in oxyerato ex aq. plantaginis & ipermætiſ ranarum & aceto roſaceo. Pectori applicetur cataplaſma ex ſantal. albo & rubro, cortice quercus, ſubere, radicibus ſymphyti, biſſortæ, tormentillæ, ſanguine bubulo ſiccato, oſſibus humanis & C. C. ad ſummam albedinem calcinatis, ſuccino, ſeminibus plantaginis & ſophiæ chirurgorum, roſis rubris & myrtillis in ſubtil. pulverem reductis & exceptis melle de ſpumato cum ſuccis ſempervivi maj. plantaginis & decocto tenui ichthyocolle: applicetur e ſtuppis lineis pexis linteis duplici allutis ante & retro. Bufo ſiccatus ſacculo ex ſyndone tenui incluſus ſuſpendatur e collo, ita ut nudam attingat cutem. Si quæ expectari vel ſperari poſſint ſupperit, perſelecta ita medicamina præſtabuntur *anæſiæ*. At ſuper omnia. lapidem hæmatitem tibi commendatum eſſe velim. Ægrium meo nomine ſaluta, ipſique agito gratias ob collatum in me munus. De omnium eventu (quem ſcilicet vix poſſum portendere) fac me ſcertiorem. Vale & me nomini tuo ad dictiſſimum eſſe crede.

Datum Londini Novem. 10 1641.

Th. Mayerne.

Intentiones curativæ ex antediſtis ſatis innotefcunt, viz ſanguinis à pulmonibus revulſio, ejuſdem acrimoniæ & fervoris correctio, impetus domatio, & vaſorum hiantium conſtrictio & ferruginatio.

Revellunt ſanguinem, præcipue quidem veneſectio, vel è brachiis vel tibiis, ſed & cucurbitulæ regioni hepatis & ſub mannis applicatæ, ac frictiones deorſum coxarum & tibiærum.

Sanguinem attemperant tinctura Roſarum præparata cum ſp. vitrioli & roſis rubris in aq. plantag. portulac. oxalid. tormentil. è ipermætanar. &c. lapis prunellæ in priſana, ſaccharum Saturni à gr. v. ad x. cum conſ. roſ. rub. Emulſiones ex ſem. frig. in aq. prædictis, vel hordei; cereviſ. medicata cum C. C. ebore, plantagiæ, pilofella, pimpinella, ſeminibus oxalidis, portulacæ, oxylapathi, ſantal. braſſiæ, &c. Abſtineat æger ab omni generoſo potu præſertim vino. victus ſit ex pedibus vervecinis, vitulinis; capitibus animalium eorumque partibus nervolis; gelatma carniæ, oſſum bu-

bulorum, eboris, chinæ, præſertim. C. C. purata cum aq. plantag. & tol. tenell. quercus. Victus ejuſmodi acrimoniam humorum obtundit, ſanguinemque incræſcat.

Sanguinis impetum domant & ſiſtunt, præſertim ſomnium conciliantia, v. g. Laudanum & diacodium; item incræſſantia, & attemperantia ſupradicta; ligatura denique in brachiis & cruribus ſcæ.

In hæmoptoes autem curatione cum intentio præcipua ſit vaſorum ruptorum vel hiantium conſolidatio & conſtrictio, ad hunc ſcopum materia medica ut plurimum dirigenda eſt, quæ in variis formis, ad Patientis placitum, exhiberi poſſunt.

Notandum vero, cum huius generis medicamenta alvum adſtringendo dejectiones debitas impediant, alvum ſæpius movendam eſſe vel enemate injecto, vel mitioribus purgantibus per os exhibitis. viz. præp. ex rheo, caſſia, tamarindis, manna, &c.

Decoctum ſequens pro Arcano habetur.

℞ rad. tormentill. millefol. totius ana ʒiij. pimpinell. ſanguiforb. m. ii. aut iii. Coq. in. aq. f. thvi. ad med. Colaturæ adde conſerv. roſ. rub. antiq. ʒj. pro quaque libra. Doſ. ʒvi. aut ʒviii. bis in die.

Vel ℞ Scabioſ. pimpinell. ulmar. plantag. veron. utriuſque bugul. ſanicul. burſ. paltor. ana m. j. ſem bombac. ʒij. aut iij. caner. fluviatil. furno exſiccant. ʒʒ. coq. in aq. f. thviij. ad med. Colaturæ adde ſacchar. roſ. ʒiij. M. Doſis ʒvj. aut ʒviij. bis in die. Decoctum hoc vulnerarium, ſi metus ſit phthiſeos, nulli ſecundum eſt.

Rad. ſymphyt. maj. tormentill. ana. ʒj. plantag. totius m. ii. portulac. ſanguinar. centinod pilofell. pimpinell. totius ana m. j. ſummit. archang. alb. p. iv. roſ. rub. p. ii. tamarind. rec. ʒx. prunor. brignoleſ. par. ii. ſumach ʒvj. coq. in aq. hord. thvi. ad med. Ex colatura cum ſacchar. roſ. q. ſ. ſ. Syrupus Aromatizetur ʒij. ſantal. citrin. & ʒii. ſem. coriand. nodulo inclui. & aciduletur gutta una aut altera, exhibitionis tempore, ſpirit. vitr. corall. aut ſucco ber. Doſis ʒvi. ſentim deglutendo, mane & hor. 5. p. m.

Syrupus quoque ex album. ovi multum præſtat, viz.

℞ Album. ovi fortiter agitat. ʒij. ſacchar. roſ. ʒiij. amyl. ʒij. Incorporentur ut ſ. Lohoch. addi poteſt lap. hæmatit. ad ʒij.

℞ Syr. e corall. ʒvj. ſyr. mororum rub. Idæi, rob de rib. ſyr. ex ſucc. tormentil. totius & plantag. præparat. ana ʒij. ſyr. noſtr. martial. ſeq. ʒxii. niſ. cap. huius mixturæ ʒj. primo, dein paulatim augendo uſque ad ʒij ex aquæ. tormentil. & plantag. quotidie mane.

℞. Syr Martialis. ℞. Animæ hepatis ʒvʒ. diſſolv. in ʒiv. aq. tormentill. vel plantag. aut portulac. Adde ſacchari roſat. tabulat. ʒij. ſyr. ex ſucc. tormentill. vel plantag. vel portulac. ʒiv. vel v. ut ſ. juſtum pondus animæ hepatis gr. 24. ad ſingulas uncias ſyrupi. Omnia ad levem balnei vaporofi calorem miſceantur, & ſ. ſyrupus ſervandus ſedulo in an. pullâ vitreâ probè obturata.

Julapia ſ. ex tinctura roſarum cum aq. plantag. & ſp. vitrioli extracta, vel cum aceto for-

tilimo, addit. syr. moror. rub. Idzi aut de corall.

Utiliter suavi potest brodium seq. post singulas doses syrupi supra præscripti.

℞. Hord. n. und. p. ij. paul. non exacinat. ʒj. rad. symphyt. maj. tormentill. ana ʒss. Includantur omnia ventri junioris galli, qui confusus elixetur cum frustis poplitis vitum. addend. sub finem coctionis portulac. plantag. n. m. j. pimpinell. pilosel. pul. onar. an. m. ss. flor. bor. g. buglos. archangel. alb. betou. an. p. ij. macis florem unum aut alterum: redige ad quæritat. ʒij. pro 4. dos. in quantum lingulis dissolv. marg. ur. corall. rub. cum succo limon. præp. an. gr. x. ad usum prædictum.

Tabellæ seq. æpissime in ore teneantur, sensim deglutendo id quod dissolvetur.

℞. Lapid. hamatit. rubicundiss. in tenuiss. alkool reducti ʒj. C. C. ad summam albed. usi & præp. cum aq. tormentil. plantag. & ros. r. ʒij. sang. diac. boli Armen. finit. loti in idem aquis, ros. rub. an. ʒj. sacchar. rosat. triplum pondus omnium M. ss. & cum s. q. gummi. tragacanth. dissoluti in decoct. limpidiss. glycyrrhiz. H. s. pan. s. p. alla, ex qua trochisci hypoglottidas. N. B. Totum artificium est in subtilitate pulverum.

Vel ℞. Lap. hamatit. præp. ʒss. croci Martis corallum. ʒij. C. C. vitriolat. (spodii ex ebore in idem vitriolat.) ossum humanor. aut cervi vitriolator. an. ʒj. rad. tormentil. bistort. an. ʒij. cinamom. crassioris ʒiv. alum. roch. crud. ad pondus omnium, s. omnium alkool excipiendo, macag. gum. tragacanth. extracti. in aq. ros. rub. vel spermat. ranarum, s. p. alla addito si opus sit, paucis amylo triticeo, ex qua tormentum gloriolum in hypocaullo siccandi, ad usum continuo donec substituerit sanguis.

Ex eodem pulvere cum gummi. tragacanth. sive ovi albumine siccato ad solem & syrupo ex aq. spermat. ranar. & sacchar. rosar. s. Lodoch.

Cerevisia medicata seq. sit pro potu ordinario.

℞. Rad. larspar. chinæ per taleolas sect. an. ʒviii. rad. tormentill. lapath. sanguinei, pimpinell. an. ʒiv. santal. alb. rubr. ras. choris, C. C. ossum bubulor. major. an. ʒij. sem. portulac. plantag. lophiz chirurgor. an. ʒx. nuc. moschat. ʒj. gum. Ar. hic. ʒiv. ferri multulati divisi ʒij. lende. ut omnia in sacculo ex tela sara in galon. 6. cerevis. non lupulat. post sufficientem decoctionem promend.

In vase ex quo hibatur liquor, sit nodulus seq. quotidie renovandus, & ante potum cochleari versandus.

℞. Lap. hamatit. prius in porphyrite cum aq. tormentill. plantag. spermat. ranar. lavigat. ʒss. C. C. calcinati, spodii ex ebore, ossum pedum vervecin. calcinat. an. ʒij. m. ss. f. pulvis impalpabilis: hujus ʒss. sit pro uno nodulo ex udone coccinea r. r. p. rato.

Si medicamenta parabilia & simpliciora vel ægro, vel Medico magis arrideant, hæc sunt haud infima notæ. Succus vinæ pervineæ ad ʒij. in vin. rub. Succus urticæ rubræ (urentis) potatus fluxus sanguinis ex quacunque causa, sive per os, sive per nares, sive per menstrua, sive per hæmorrhoid. sive per plagas optime restrin-

git. Item pulv. virg. pastoris ad ʒj. in brodio, vel istius herbæ decoctum. Lintum meum vere imbutum spermate ranarum, ut a. e. totum anteriorum thoracem tegat, idque vel siccum, vel oxycrato ex aq. spermat. ranar. & aceto rosaceo imbutum, præsertim sanguine profusus, qua data porta, ruente. Centinodia in ore contenta, aut linguæ supposita. Frustum aluminis in ore contentum sensim deglutendo. Lapis scissilis Hibernicus cum conserva rosarum rub. antiqua eodem modo.

Quidam Miles in bello Anglico inter Regem & Parlamentum 1644. Windloriæ glande punicea transfossus fuit à pectore in dorsum. Vulnerrati pulmones primis diebus satis largam sanguinis fudere copiam. Pertexit animose Chirurgus Langley in applicatione omnium remedium vulnere & periculoso symptomati debitorum. Hæc methodo utcumque lenitum malum. Cum autem aliqua certior affulgeret salutis spes, ecce nocte juveni pestis vocatus Chirurgus invenit agrum continuo cruorem exspuentem tam profusè, ut rejecta una & altera pelvi, planè deploratus ager videretur. Chirurgus consilii inops, remediis fere destitutus ad obvia & parabilia condugit. Erat in camini conclave infrioris angulo calx viva in cumulo, hujus bonæ quantitatem in medium conclave traxit affudit, quam cum aceto, & lapideum. Iramaticum calcinatum, quæ fortuito gestabat tunc in pera, insperfit. Junus a calore humectata pro more evaporans totum replevit locum, & vapore illo plenus ær plenis buccis inter respirandum haustus pulvis onilus, unde sanguis illico substitit. Qui effectus, postea recurrente his eodem hæmorrhagiæ symptomate, certitudinem experimenti felici successu comprobavit. Ager hic reddidit etiam urinas cruentas, quæ etiam post illum vaporem ad primum statum redierunt. Tandem perfectè convaluit æge. 1644. Theodor. de Mayerne Prax. Medic. lib. 2.

Recentia sanguinea sputa, undecumque proveniant, curando adoriuntur nonnulli iteratis phlebotomis, frictionibus, ligaturis, cucurculis, catharticis etiam lenibus, in diarræsi, & diarrhoea ad purgandum sanguinis vitium: mox vero refrigerantia, & glutinantia exhibent ex farre, limacibus, testudinibus, aliisque parata; itemque lac, ejusque serum.

At aliis parum vel nihil fidentes solum cohibentia usuntur, quibus etiam vitia sanguini adimere conantur, ut sunt succi depurati urticæ, polygoni, plantaginis, verbasci: pulveres terræ armenicæ, & sigillatæ coralliorum, sanguinis draconis corticem myrobalanorum, hamatites, croci martis colchotariorum vitrioli, spermiolæ, C. C. usi: gummi tragacanthum, & Arabicum, thus, storax mastiche, succinum: syrupi de rosis siccis, de papavere albo, & rubro, de bacis myrtis, de cydoniis, de portulaca; de nymphæa: trochisci de succino, de terra sigillata: theriaca recens, phlogonum persicum requies, magna, pilulæ de cynoglossa, & de styrace, laudanum opiatum, & id genus alia.

Curam datur Hermannus sputum sanguinis e pulmonibus semine hyoscyami; ex quo tabellas conficit. Platerus, additis gummi Arabico, corallis rubris, violis recentibus, succo

succo berberis, & saccharo. Helidius verò De-Paduanis ex seminibus Hyoscyami, & papaverum alborum, terra sigillata, coralliis rubris, & saccharo ros. parat electuarium, quod ad sputum sanguinis mirabile dicit esse. Apud Du-Ramel memoratur aliud à Boyle confectum ex seminibus hyoscyami, & papaveris albi contulis, & cum conditura rosarum rubrarum mistis. At Cardilucius monitu Carrichteri semen hyoscyami infundendum vult per noctem, in tribus partibus aquæ fontis, duabus acri, & una parte vini albi veteris, mox exsiccatum in usum adhibet.

Idem Hartmannus feliciter cohiberi ait sanguinis sputum usu aquæ stillatitiæ radicum urticæ majoris ad \mathfrak{z} iv. cum oleo vitrioli ad gratum acorem. Ab aqua plantaginis ad \mathfrak{z} iv. cum \mathfrak{ss} . spiritus vitrioli subito etiam fluentem ex pulmone sanguinem tisti affirmat: quod & Riverius quoque fatetur. Præter aquam plantaginis, & spiritum vitrioli addit Cardilucius pulverem nativum, præparatum ad \mathfrak{z} j. & granum j. laudani opiatum. Interea vero potandam præcipit aquam solani, in qua hydropiper, seu persicaria urens decocta sit, ea postmodum desolita in loco humidiore ad putrescendum.

Quercetanus in sua Pharmacopœa describit aquam summo opere efficacem ad Hæmoptysim. Et derapio tract. 1. cap. 25. atque ex eo Antonius Valerius, pulverem valde utilem, qui sub nomine Julii Cæsaris de Caligari circumfertur, & passim ab Authoribus memoratur.

Riverius amylo sine calce parato, in aqua decocto, & per mensem integrum assumpto, sputum sanguinis omnino desinere scribit. Alii looch inde conficiunt cum albumine ovi vehementer agitato, & saccharo rosaceo, apud Willium.

Amatus Lusitanus succum urticæ mirabilem dicit, si eo utatur æger per sex dies ad \mathfrak{z} iv. jejuno stomacho: quia & urticam ipsam jure pulli incoctam comedendam consulit. De hujus vi notabilem quoque historiam scribit P. Bo-rellus, quamvis nonnulli suspectam illam habeant in principio Hæmoptysis, quod tenuium sit partium, & menses, urinamque promovere dicatur à Dioscoride.

Præscribit ad quemcumque sanguinis exitum Leboë Sylvius misturam, quam pluries efficacissimam ego comperi, addendo succum urticæ, & polygoni, seu sanguinarie ad \mathfrak{z} j. in aquæ plantaginis uncis duabus, semisse aceti stillatitiæ, ac tantundem aquæ cinnamomi, cum syrupo baccarum nyrtearum miscet coralliorum rubrorum præparatorum semidrachmam, & sanguinis draconis sextam drachmæ partem laudani demum opiatum grana ii. Alibi Apozema memorat astanti sanguini compescendo valde accommodum.

Quanta autem sit vis Polygoni seu sanguinarie vulgo centioidæ non solum in sistendo sanguine, verum etiam in omnibus immodicis ægestionibus, experientia testis fida est. ut plane dixerim me nunquam fefellisse, sicut pariter de plantagine, & verbasco testari possum: ex dupla enim foliorum plantaginis parte, & una radicum recentium consolidæ majoris simplicitate addita sufficienti quantitate saccha-

ri purissimi conficitur syrupus ad cruentum sputum efficacissimus. Pulvis etiam ex foliis verbasci arefactis, cum pari portione terræ damnatæ vitrioli optimus est ad domum semidrachmæ. Idipsum affirmant alii de bursa pastoris.

Maximi facit Pulverem sperniolæ Crollius in omnibus Hæmorrhægiis. Laudant alii pulveres vel extracta tormentillæ, bistortæ, & mullesolii. Alii Crocum Martis, lapidem hæmatitem & tincturam sulphuris vitrioli. Pulverem, & summatisibus, & spongiosis Cyosbati elictum efficacem remedium esse inquit Willisius, si bis die ad \mathfrak{ss} . exhibeatur.

Quoniam vero sanguis è suis vasis egressus subito concrevit, ac mox in pus vertitur: unde Empyema, & Phthisis, propterea grumi illi omnino dissolvendi, ne præter Pulmonis corruptionem, glutinamentum vasorum impediunt, ut scite advertit Bernettus, & Fridericus Hofmannus. Veteres utebantur oxycrato, seu poica, quam Cuius s. meth. cap. 8. jucundam, neque multo aceto saturatam præcipit, ne talem exaret, & nos camphoræ modicum addere solemus, ac tepidam pro gargarismo præscribimus: quamquam nonnulli potandam quoque exhibent: interea vero Milturam Sylvianam ad cohibendum per intervalla propinamus additis pulvere oculorum Cancer, Antimon. diaphoretico, & spermate ceti, monitu ejusdem Authoris. Specialius etiam commendat milturam aquæ hyssopi, & fœniculi singularum unci in unam, vitæ Matthioli \mathfrak{z} ij. aceti stillatitiæ \mathfrak{ss} . oculor. Cancer, \mathfrak{ss} . Antimon. diaphoretici \mathfrak{z} j. syrupi Capillorum veneris \mathfrak{z} j. At Paulus, Ætius, & Oribasius coagulo hædi, vel leporis utuntur: & Iorellus mumia, & spermate Ceti Exhibent alii rhabbarum (ex quo pulvis Meles contra casum) cum modico mumia, & tincturæ in vino rubro, vel aqua plantaginis.

Ante horum exhibitionem, utile existimans levi aliquo cathartico vitiosos humores a sanguine secernere. Verum caute procedendum, ne sanguis a purgante medicamento citatior fiat, & ad exitum magis promoveatur. Hoc cum ideo solum habebunt quæ potius corrigunt, & blande admodum acres succos per epicrasin educunt, ut est rhabbarum, pupa tamarindorum, cassia recens, cavendo ab his quæ Aloem admittunt, sicut a cæteris purgantibus validioribus.

Cæterum victus ratio eo vergat, ut fluentem sanguinem quoque cohibeat, illiusque vitium pro rata sua emendet, & mediocritatem non excedat. Vitentur acris, salsa, flams excrementa acida. Vinum leve, & rubrum præferimus consuetis concedi potest, atque eo magis si fuerit dilutum aqua consolidæ majoris, plantaginis, aliæve. Motus, clamor ira, cantus etiam prohibeantur: admissis solum, quæ sanguinis motum retardare, & glyssen adaugere valent.

Inter externa, Fridericus Hofmannus Rufonem transfossum, sole existente in Leone, exsiccatum, & manibus detentum, vel super os in pectore, certo experimento sanguinem ipsum si mederi ait: pariterque bursam pastoris re-

contempulsibus applicitam. A decocto etiam centinodiz axillis. aut genibus imposito id ipsum præstari addit. At ipse memini hæmorrhagiam e naribus aliquando stetit sanguinaria, & plantagine contusis plantisque pedum adhibitis. *Lucæ Tozzæ. Medicin. Prætic. part. 1.*

In Hæmoptysi. ℞. Aq. plantag. bul. pastor. an. ʒij. tinctur. sulph. vitriol. gut. xv. syr. stiplici ʒj. M. utatur ex cochlear.

Vel ℞. Aq. portul. rosar. an. ʒj. succi plantag. ʒj. tinctur. martis gut. xii. syr. stiplici ʒj. essentiz vulnerariz ʒβ. ulupetur cochlearini.

℞. Decoct. radic. torment. bistort. an. ʒij. tinctur. l. pid. hæmatit. gut. xv. syr. corallior. ʒij. M. per diu interdum exhiberi potest.

In India. ℞. Aq. plantag. rosar. an. ʒij. succi portulac. ʒj. tinctur. lign. caltur. ʒiβ. tinct. martis gut. x. M.

Adjunctu Febribus. ℞. Sen. 4. frig. maj. an. ʒij. aq. portul. rosar. plantag. an. ʒij. F. emulsiō. Huic adde syr. perlar. corallior. an. ʒij. tinctur. martis gut. xii. santal. rubr. ʒβ. M. utere hoc si ut præcedenti.

Sive. ℞. Conserv. rosar. flor. consolid. maj. syr. stiplici an. ʒj. tinctur. martis ʒj. sal. perlar. ʒβ. C. C. pphice præpar. M. F. bolus. Dosis ʒj. mane & vespere.

Vel ℞. Tinct. rosar. sant. rubr. corall. an. ʒj. essent. vulnerar. ʒβ. M. Exhiberi potest in decocto ligni quercini, radic. symphyti, torment. aut alio appropriato.

Ad Empyema si succedat.

℞. Essent. vulnerar. ʒj. sal. oculor. cancer. ʒβ. tinctur. croci ʒj. antim. diaphor. ʒj. aq. hyper. ʒij. syr. pectoi. ʒj. M. detur cochlearini.

Pro ordinario habetur potu decoctum hordei compositum ex herbis saniculâ alchimilla, veronica, hypericô, centauriô, pulmonaria, ligno quercino radic. polypodii, ireos, liquiritiz & uvis passis.

Essentiz vulnerariz, de qua hic passim, hæc est compositio.

℞. Tempore isto quo vegetabilia multum balsamica continent, flor. hyperici, centaurei, an. m. j. consolid. major. raphi. barbari an. m. ʒ. radic. torment. ʒj. extrahe tincturam cum spir. vini terebinthinati. Quando nulla amplius tinctur. sequitur, alios infunde flores & radices, fiat extractio, postea effunde, & ad usum serva. *Hermann. Nicolau Grimm. Compend. Medicæ-Chimici lib. 2.*

Consultationes.

Pro Nobili Viro sputo sanguinis cum punctione ad partem exteriorem thoracis circa mammam dextram, anhelandi difficultate, febrequæ detento.

Inter casus formidabiles, qui Medico curandi occurrunt, omnium potissimus est sputum sanguinis, quoniam sub eo non tamen Medicus, verum & Aeger vitæ periculum imminens præcognoscit quandoquidem sputo sanguinis (sputum puris, sputo puris phthisis, cui demum mors ipsa subsequitur, hinc Areteus occasione ægri hoc vitio laborantis dicere solebat, ecquis est videns instar victimæ nuper

mastrata se jugulari, qui non expavescat? Et eo magis, quia plura sese offerunt, quæ jam dicto vitæ periculo solent attestari, quod scilicet tere nunquam hujusmodi malum accedit, quin alia secum adiungat, & quod præcipuum esse consuevit, ulcus pulmonum existit, quod propter illorum irrequietum motum, & quoniam continuo destillationibus sunt obnoxii medicamenta que non ita commode, ac sunt ad ipsos perveniunt, nullo pacto sanatur; Ut non sit mirum, si patiens noster prædicto malo detentus obhasce ac similes rationes in maximo versetur animi angore, vitæque discrimine, quocirca illi citò succurrendum esse censeo, ut saltem à majori ruina præservetur.

In sputo itaque sanguineo, quod à multis diebus per incerta quædam intervalla patitur vir præsens, affici thoracem, duo præter tussim præsertim suadent, primum est sanguis nigericans, alterum est punctio ad anteriorem thoracis partem circa mammam dextram percepta ut facile sit intelligere, nullo modo sanguinem à pulmonibus prodire quoniam, ubi pulmones emittunt sanguinem, hic ipse floridus est, & spumofus, nullus dolor, nullaque punctio ad thoracem sentitur: sed neque ab aspera arteria, quoniam positus doloris extra regionem ipsius observatur, præterea sanguis non ita modicus excernitur, ut fieri solet ab aspera arteria; verum nec à gingivis, quoniam non simplici expuitione, sed tussi ejicitur, propter quam sanè causam nec à palato prodire potest, quoniam tunc excreatus requiritur necessarius; adhuc & ad palatum titillatio percipitur, quæ interim non proponitur, immo vero neque à capite prodit interea sanguis, quia per asperam arteriam solet in pulmones decumbere, ac postmodum nisi excerni, quoniam tunc præter id, quod nullus dolor in pectore percipitur, sanguis tantum secundum superficiem spumatur, non autem secundum partes intimas, ut nunc observatur, sed pulmones etiam affici secundum bronchia, facile comprobari potest ex aliqua anhelandi difficultate conjuncta; quæ dispnoea, difficilisque spiratio simpliciter dici poterit, quia somitus adhuc in aspera arteria, ut in asthma solet evenire, non est præsens patiensque respirat, & si maneat cervice non erecta, ex quo nequaquam ortopnoea laborat; Atqui postremo secundum totum corpus, unaque cor ipsum, occasione febris, male se habet, ut patet.

Quorum omnium vitiorum generatio inde colligitur, quod sputum sanguinis est symptoma secundarium necessario à retentione venarum læsa dependens, retentio autem cum lædatur ob morbum vel in mala compositione, vel soluta unitate, hic in hanc vitium refero factam non per fractionem, quia non præcessit causa externa ad id idonea, non adfuit plethora, aut saltem cacochimia materiei fl. tulentæ conjuncta, neque per incisionem, nam quod potuerit incidere, non adfuisse referunt, ergo quia patiens à pluribus annis passus est destillationem à capite lassam, quæ facultatem habet exedendi, puto sanguinem hunc per erosionem potius rejectari, cui ussio vehemens plurimum favet, huc accedit & illud, quod sanguis paucus & sensim egreditur, quod non

in fractione non in incisione, immo vero neq; in mala compositione per anathomum solet accidere, nec aliquis diapedesim morbum pariter malæ compositionis proponat, quoniam tamen in hac sanguis modicus excernatur, hic ipse tamen tenuis existit, & aquosus.

De spiratione verò difficili ita sentio, eam scilicet accidere propter materiam catarrhalem bronchia pulmonum occupantem, acrisque ingressum, ac fuliginum egressum liberum prohibentem, nam sic lucta veluti quidam excitata inter id quod ingreditur, & egreditur necessarium est, ut difficilis fiat respiratio.

Tandem febris occasionem ego maximè adscribo alicui putredini, quæ destillationem in pulmonibus & quoquo pacto sanguinem etiam a venis effusum apprehendit, quandoquidem postremis hæc diebus, in quibus hic æger sanguinem expuit, inflammationem quandam subortum fuisse suspicor, ut ipsa putredinis notam aliquam præ se ferentia luadent, ex quo quia impotenter eadem omnino purulenta, saniosaque sint evalura, nullus datur meæ judicio dubitandi locus; Sed febrem esse putridam docent leves illæ accessiones, quæ ad vespertas circa noctem patiens experitur symptomatam tamen cuius meminit Galenus primo Aphorismo. 12. cui febris hectica quoque superadjugetur, nam febris, quæ hujusmodi pulmonum vitia sequitur solet demum esse mixta naturæ, partim inquam putrida, partimque hectica: Cæterum & causas hujusmodi vitia generantes quas coadjuvantes dicunt (præter capitis intemperiem humidam cum excessu, & calorem aliquem illius) addere licet, quarum alteram internam, alteram externam arbitror, illa ichor est biliosus in jecore fervidiori genitus, & capitis communicatus, hæc vero ad malum aeris usum pertinet, nam omnibus aeris injuriis indifferenter se exposuit vir propositus, merito quarum tussis, gravedines, aliaque similia mala suboriri scripserunt Hipp. & Galenus.

Quocirca, ut ille quantum fieri potest ab hæc malis sublevetur, a majoribus præcaveatur, necessarium est contra causas omnes prædictas pugnam inire, per remotionem, aut saltem correctionem destillationem, recur attemperantia, bronchia pulmonum ab intarcta vindicantia, & quicquid in illis continetur præter naturam absummentia, verum prius sanguinis grumæ, si qui erunt in thorace dissipatis, sanguis omni studio, & diligentia erit cohibendus.

Curatio itaque, & primum per Chirurgiam sic instituenda, ut modo ex uno, modo ex altero brachio sanguis extrahatur, nam hic motu quidem magis peccat, sed etiam copia subpeccat, morbus immineat magnus, vires validæ sunt, atque florens existit, hyruidines quoque uno applicitæ, sicuti & juges frictiones, deligationes, ventosationesque partium extremarum conveniunt; cauterium etiam in sinapite inultum videtur esse maxime opportunum, atque ut una quoque pars in morbo tam verendo suis non destituatur remediis, putarem satius esse cauterium, vel setaceum in nuca excitare; vesicantiaque sinapiti adhibere, ac in progressu antequam Medicus de sanando cauterio nuca cogitet, Cauteria in brachiis exerceat.

Medicamenta quæ hoc tempore mihi videntur opportuna ad sanguinis grumæ dissipationem, ejusque vitio, ut non emendandum dirigantur oportet, quibus & quæ destillationem aut itellina retrahunt sunt conjungenda, idcirco continua oris collutio ex posca, ejusdemque potus, veluti pitulando factus, itemque coagulum leporinum ex eadem poscha cum l. ccharo ad lambendum exhibitum pro grumæ dissipatione probantur, simulque eodem tempore narum atque cum aq. violarum irroratum, & postea dilutum cum decocto myrobalanorum citrinorum, seminum plantaginis, acetosæ, tamarindorum, ac pitulatum propinatum mihi maxime placet, & ubi destillatio huic non cesserit medicamentum, à pilulis Galeni quinto Met. pro illa Matrona Romana præscriptis non abhorretem: Deinde pro supprimendo sanguine præter Philonium Pericuri cum violarum conserva, præter diaspersionem Galeni, mihi sunt in ulu primo polvis testæ ovi, & quæ pilulis externis, ex aq. plantaginis datus secundo succus plantaginis, vel per se, vel cum sero calibeato bibitus, tertio medicamentum, quod sit ex duabus uncis sacchari violacei, & dimidia uncia seminis hioisiani albi datum ad dragm. j. vel alteram, quarto trocisci de carta combusta qui

24. cartæ est drag. ij. suberis corticis interni ilicis caudæ equinæ pilorum leporis combustorum boli Armeniæ orient. lingua serpentis sem. hioisiani albi ana ʒj. Philonium p. r. i. scrip. iv.

M. & cum succo plantaginis, & saccharo fiant trocisci, quorum drag. i. vel duæ duri poterunt. Verum ante cibum per horam mane, & vespere immo vero & ad lanbendum singulis horis poterit patiens uti syrupo myrrino. (qui non nocet pectori) cum pulvere sanguinis draconis in lacrimis, lapides hematites & boli Armeniæ, ac ubi difficilis spiratio urgebit, ab his conveniens erit h. u. l. aquæ sarsæ, vel scabiosæ: Atque plurimum etiam ad supprimendum sanguinem conducet immergere scrotum in gelidam, maximè enim est consentius inter spiritus, & genitalia membra.

Suppresso sanguine, ad destillationem est descendendum, quocirca præmissa levi præparatione totius corporis per medicamenta primum concoquentia ex cicoracæis, lingua serpentina, pulmonaria, f. ifara, hordeo, & sem. melonum cum syrupo myrrino de cicoreo simplici, & de capillo veneris, deinceps per purgantia ex trociscis de violis absque scammonio, infuso Rhabbarbo, & manna, dilutis decocto rerum pectorarum, & myrobalanorum, citrinorum, oleo amygdalino dulci fricatotum, de aliquo medicamento siccante, dissipanteque destillationem est cogitandum: nullum autem præstantius meo judicio excogitari potest jure pulli, in cuius ventre sit incocta copiosa china cum simplicibus superius commemoratis, eo tamen constituto, ut ante syrupum matutinum exhibeatur pillula facta ex therebintina cocta, vel Ammoniacum cum pulvere cornu cervi illi & pulmonis vulpis, his enim si quid in pulmonibus præter naturam continetur, desergetur, siccabiturque, hora somni saccharum rosatum cum bolo Armeniæ, vel corallis rubeis, vel pulvere baccarum myrti offeratur, quæ spectat theriaca recens, atque

hoc eodem tempore capiti adhibendum est cataplasma ex sinapi, rapia, hmo columbino, cum aceto scillino paratum, ceratum quoque ex pulvere linaciarum in clibano siccatarum, succo tabascei excepto, & secundum artem factum probo, tempore vero opportuno stillicidium ex aqua Villenti, vel Porrectana veteri, vel alia simili, in qua coquantur oliua, rola, grana myrti, balautia, camomelum, stœchas, cariophylli, sandali, & modicum aluminis, quod si capitis lotionibus erit assuetus æger utatur lixiuio dulci, & valde temperato decoctionis sandalorum. Ante hæc tamen oportet caput herrinis expurgare, in quem usum esse potest ex usu decoctum hordei, hederæ terrestris, ac maluarum, cum melle violato solutiuo, verno etiam tempore aduentante, si, quod timorem ulceris in pulmonibus incutiat, aduerit, nil præstantius lacte Asinino per plures dies assumpto, quod etiam iccoris terrorem compescet; nec febris ubi tunc temporis aderit, quæ nunc adest, huiusmodi lactis genus prohibebit, quoniam solum febris putrida, quæ est venarum passio lac prohibet, febris autem, de qua agitur est putrida secundum quid, quæ eo tempore ulcere existente, hecicæ naturam sapiet, quamquam etiam sperem futurum, ut diligentia excellentissimi curantis tunc febris imminuatur, siccharum quoque rosa tum recens tempore ius lactis mihi maxime opportunum videbitur, deinde ad emendandam omnino lecoris calidam intemperiem iua tempestate ab usu aquæ Villentis non abhorreo, quemadmodum neque ab usu balnei aquæ dulcis, à quo regionem lecoris iungere unguento facto ex oleo rosato completo in posca loto, & ex succo endiuiz, ac hepaticæ adiectis cera, aceto, tandemque speciebus cerati sandalini maxime præstabit.

Ceterum (quod ad vivendi modum attinet) hoc præsentis tempore puto insillendum esse victui ætatemperanti, ac insillanti, cavendum ideo est ab ære calidiori, a cibis acerbis, dulcibus, salis, ac utendum oriza, farre, milio cum hordeo decoctis in iure pedum vituli, vel porci cum carne aliqua laudabili coctis in aqua calybeata, pedesque dicti, atque carnes etiam comedi poterunt, sublataque omni suspitione hæmorrhagiz ova haud erunt deneganda; Cibatis omnibus nunc etiam inspergatur pulvis ex amilo, coriandris præparatis, & saccharo, quininio & carnibus incoqui poterit ophioglossum, cidoniaque sub cineribus cocta, item poma ac pira subaultera, dactyli, & uva pastæ concedi poterunt. Verum ob difficilem spirationem victum mutare, & ab adstringentibus abstinere oportebat, quare pistana, & panis, vel ova ex iure patienti offerre non erit inutile. Pro potu nunc conveniens est aqua calybeata, in qua saccharum rosatum fuerit dissolutum, vel in qua tamarindi, ac sebesteni sint incocta, vel vinum granatorum medium saporis cum eadem aqua dilutum; in posterum vero vinum album tenue, non valde austerum aq. cocta cum china mixtum convemet; Dormiat tamen eger capite humili, & ubi somnum voluerit adire, cochlearium affirmat mixturæ, quæ ex duabus partibus pulpa schellen, un. sem. melon. mundatorum, atque dimidia seminum papave-

ris albi exceptis cum juleb. violato componitur, quiescat animo & corpore, vitet motus omnes corporeos, clamores, & vociferationes, al. u. lubricam servet usu potissimum carne tum ætate mensam comestaram, Deusque sit illi propitius. & adjutor. *Jul. Cas. Claudinus in Corp. Medici.*

De Sanguinis Spato. Pro Perillustri, & Adm. R. Patiente

Perillustri & admodum Rev. patiens, temperamenti calidioris quoad jecur, & totum corpus, cum aliqua humiditate, Anno .67, dum esset Goritæ, sanguinem expuere cepit, non tamen multa copia; anno vero sequenti 1638. hiemino tempore multa copia cum rursus excrevit, & magno cum impetu, atque huiusmodi sanguinis excretio V. re subsequente bis aut ter contigit; frequentius iterum postmodum, & quidem spumosi aliqua copia, cum in agro Vincentino, tum in Bergonensi, cum rursus valde molesta, & excretionem catarrhi aliquando falsi, gravitate capitis, & molestia circa thoracem ex tussi violenta. Nunc vero cum nulla adsit sanguinis expulsiō, horis tamen matutinis excremitur copia catarrhi, ut refert patient, crassi, non tamen visceridi, qui sicuti ante hæc coloris erat flavi, & viridis, ita nunc albus est. A cibo incalcescit, febrilem tamen annotationem non observat.

Ex his facile colligere est, affectum præcipuum esse in partibus spiritalibus. Iustus enim, sensus erosionis, & excretio cum tussi materiz heterogeneæ, ut plurimum cruentæ, id confirmant. Et cum multæ partes in thorace affici possint in præsentis casu vasa pulmonum laborare statuendum est. Lacta enim sunt ipsorum anastomosis, mox & forsan diutius a catarrho falso, hincque sputum cruentum. Ceterum fieri quidem potuit, ut sanguis hic aliqua sui portione in thorace detentus, computruerit, erosionemque induxerit, ut hinc sit excretio materiz purulentæ aquam tamen cum non observaverim; neque de ipsius qualitate possum certum ferre iudicium; quanquam frequens illa sanguinis excretio cum tussi plures annos observata, non levem suspitionem inferat propter sententiam Hipp. à sanguinis spato &c. hincque & febris illa symptomatice, nulla habens, accessiones, a cibo invalescens facile supervenire potest.

Unde non immerito præsens affectus est plurimi æstimandus, medica præsidia pro ipsius debellatione sunt præscribenda, ex triplici ratione desumpta, Chirurgico, scilicet Pharmaceutico, & dietetico.

Inter Chirurgica, sanguinis missio primas habet, tunc potissimum repetita, quum apparet sputum cruentum, mittaturque ex sal. atella alterutrius manus, partibus vicibus, & pauca copia. Atque duo sunt iuxta endi fonticuli, nisi forsitan hætenus facium fuerit, sinistro scilicet brachio, & dextro femori.

Alvus lubrica est servanda frequenti usu flor. cas. rec. ext. & pulpa tamarind. parato interim electuario polychrasto ex oleo an. ygd. dul. cum sine, igne, pulpa passularum. manna flor. cassiz, liquir. rasa, & syrup. de ponis, quæ familiariter utatur. Præparetur, & purgentur.

humores blandis medicamentis, abstinendo ab illis, quæ recipiunt acetum, ne excitent sanguinis excretionem; & a validis purgantibus, ne calefaciant magis quam par sit. Facta purgatione totius, caput peculiariter purgabitur blandis natalibus, puta iucco maluz, aqua hordei, & similibus. Eclegmatibus blandis iuvabitur expectoratio materiæ, confectis ex syr. de farsara, de liquiritia, & capil. ven. cum looch de pulmone vulpis, & modico saccharo cand. Huiusque paratis, tria remedium genera nunc ex unâ futura censeo; primo quidem aqua vellentis, vel B. Vi giuis, vel Nocera. Iste sunt enim refrigerare, cum deterfione, exsiccatione & evacuatione, hisque ut potius utatur duodecim dies saltem lib. 8. 9. & plures, etiam, servando normam consuetam in harum mu. Horis autem nocturnis sumat saccharum ros. antiquum, cum modico terræ sigill. Postquam vero aliquot dies supersederit prædictarum aquarum potu, præscribetur decoctum ex radice china, & santalis, 25. & 30. dies, cum victu quidem tenui, non tamen valde attenuante. Quare concedentur auriculæ, & pulli; quo tempore ante horam decubitus sumet cochlear sacchari ros. antiqui, cum eadem terra sigillata. Tertium remedium erit autumnî tempore, lac scil. asinum pauca copia, & diu assumptum, cum saccharo modico, servata congrua victus ratione, præscribenda à viro Excellentiss. ipsius curæ præfecto. *Benedicti Sylvatic. Consil. & Respons. Medic. Cent. 2.*

*De Tussi, & Sputo cruento, cum Febre.
Pro Nobili Viro.*

Affectus Nobilis patientis sunt duplices; alii scilicet continuo fere infestantes, alii per longiora intervalla recurrentes. Conficitur fere continue febre, singulis diebus exacerbationes habente, cum artuum refrigeratione, ut plurimum circa vespertinas horas: à qua tamen immunitas observatur, idque quatuor abhinc mensibus circiter: quo toto tempore defluxum patitur pituitæ viscidæ, modo subdulcis, modo salæ, ad partes spirituales, cum quodam dolore earum partium, dum spiritum cohibet, accedente gravitate quadam, cum capitis, tum partium prædictarum, tunc primum remittente, vel etiam delitescente, quando tussi excernit aliqua copia; quæ tussi est frequentissima, non sine aliqua spirandi difficultate. Per longiora autem intervalla superuenit ipsi sputum cruentum, tribus abhinc annis subortum, cum tussi, post exercitium validum ex ludo pilæ ipsi familiarissimo, quod licet intra paucos dies tunc cessaverit, singulis tamen annis statuto quodam tempore recurrit, pauca tamen copia, & brevi tempore durans.

Horum ædium causam duplicem censeo, diuturnorum quidem, copiam pituitosæ materiæ in capite calidiore congestæ, cum per modum generationis, tum attractionis, & receptionis, a subiectis partibus; cum præsertim incompositissime vixerit. Hæc itaque materia in thorace collecta, febrem, atque symptomata permanentia fovet & conservat:

ideoque ubi primum tussi extenditur, à prædictis affectibus vel liberatur, vel minus molestat. Sputum autem cruentum per intervalla recurrentis singulis annis causam esse existimo, cum sanguinis eductionis copiam in toto venoso genere, cum vero laxitatem in pulmombus, contractam à continua luxione, tunc tunc aliqua excedenti ipsorum incallescencia ex immodico exercitio. Et hæc de essentia, & causis prædictorum affectuum.

Qui sane in uti sunt curatu difficiles, ita sedulo, & accurate sunt tractandi, ne hinc sequatur aliqua pulmonum erosio, febrisque fixa, cum macie corporis. A quibus Nob. patientem nunc immanem esse mihi, persuadeo; quandoquidem nec febris est continua, nec macies corporis, nec ullam virum labem patitur.

Agendum igitur & quæ materia in pulmones intulit, est attenuanda, incidenda, & evacuanda; fluens autem diuertenda; caput exsiccandum absque calefactione, pulmones exsiccandi, & roborandi, præmissa diligenti totius, & capitis expiatione. Hæcque præstabitur remediis Chirurgicis, Pharmacuticis, & Diæticis.

Remedia igitur Chirurgica quod spectat, non solum educendus erit sanguis: ducit uti vere, ex jecoraria dextri brachii, seu frequenter hæmorrhoides sunt aperiendæ, fonticulusque sinistro brachio erit inurendus,

Ac interim lenienda alvus, præparendique, & purgandi humores in toto recondantes, remediis opportunis, Viris doctissimis abunde notis. Caput, & thorax peculiaribus remediis sunt & ipsa expurganda: illud quidem ethinus, non masticatoriis, ne materia labatur ad pulmones; Thorax quincti. m. eclegmatibus paratis ex syr. de farsara, de liquiritia, & hyssopo, oxymel. composit. cum diacodio. A quibus, duo genera remedium apprimere profutura censeo, quorum alterum erit jus galli junioris, optime magulati, & exenterati, paratum ex medulla ligni datasi. visco quercino, & santalis citrini, cum radice enulæ campanz, pulmonaria, & radice iridis illyricæ præmixto bolo ex terebunthina larnina, cum lapide hæmatite: cuius usus erit 30. dies ejciter. Neque negotium facessat febris. Brevis prodest lignum Indicum in phitili, ut plures medicini scriptores, & ego quoque experientia comperi, quanto tutior erit ipsius usus in hac febre, dependente à catarrho: in cuius curatione magis incumbendum est causæ quam febri. Aliud remedium valde accommodatum erit conserva ex radicibus enulæ campanz, cum conserva ex flor. maluz, & saccharo ros. antiquo; cuius cochlear sumere poterit hora decubitus; detinendo deinde in ore tempore somni diacodium ipsum. Quod si tussis esset insensa, uti quinetiam posset aliquando Theriaca recentis, sex scil. mensium. Atque hæc erunt interna potiora; exsiccando interim caput externis, pulveribus scilicet ex agarico corticibus ostreorum ustis, ossibus sepiarum, betonica, & rosis siccis. *Idem ibidem.*

De Sputo cruento. Pro Iuvene studiosissimo.

De cruenta expuitione congeritur patiens studiosissimus. 10. abhinc diebus, modo magis, modo minus copiosa. ac diuersis diei & noctis horis

horis molesta. Quæ sane symptoma est in excretis toto genere præter naturam, dependens à soluta venarum continuitate: quæ quidem cum solui possint, vel per transudationem, & rarefactionem, vel per resectionem orificiorum ipsarum: vel per rupturam; vel per erosionem. In præsentia nunc non patiuntur; quia non præcessit causa erodens, scilicet pituita, aut alia causa acris, & mordax. Non per transudationem, quia tunc sanguis pauca copia effluxisset. Verum per apertionem quidem primo, mox & disruptionem, ob quam sanguis nunc effluit per os. Ex quo autem loco manet, facile nrisallor ex colore sanguinis, ex modo resectionis ipsius, aliisque, talem affectum comitantibus, colligi potest. Cum enim per tussim excernatur, non ex faucibus, quia tunc per solum secretum excerneretur, & minori copia: neque ex ventriculo, aliisque partibus naturalibus manat: sed vel e cerebro, primo tamen destillans ad asperam arteriam, vel ex partibus spiritalibus, vel ex pectore. Verum cum non præcesserit gravitas, & dolor capitis, non involatus alicuius rei, atque cum levi tussi excretus fuerit, ut plurimum spumofus, floridus, referens colorem, & substantiam pulmonum, cum aliqua præcedenti gravitate in partibus spiritalibus, statuendum est ipsum ex pulmonibus effluere, & quidem ex ipsorum substantia, quæ evidentissime hesternæ die se exhibuit. Neque contrarium suadent spura nigricantia. Hoc enim fit ob aliquam sanguinis moram extra propria vasa. Cur autem vasa ipsa primo fuerint aperta, mox & disrupta, à quibus effluit sanguis, triplicem causam censeo, vitium ipsius in substantia, quia scilicet sit crassus & statulentus, extensionem insignem vasorum inducens, item naturæ calidæ ob iecur præcalidum, accedente tempore anni calido, & itinere satis longo, & laborioso; quæ omnia sanguinem calefacere potuerunt: qui & copiosus est, cum exercitio, otio & victu pleniori sit usus, iecore præsertim calido, a quo sanguinis proventus.

Cum ergo hæc sint sanguinis vitia, atque patiens sit opportunus eius expuitioni, ob naturalem pulmonum, & partium spiritalium imbecillitatem; quid mirum si sanguis copiosus expuatur frequentius, & plures dies quin potius mirum, si patiens præservari possit ab imminente phthisi. Si enim verum est Hiop. effatum 6. aph. à sanguine pus, à pure tabes, à tube interitus, prout verissimum est; ab huiusmodi expuitione exulcerantur pulmones, ulcerati pus generant: quod dum fit, inducitur huiusmodi febris hectica quæ insanabilis cum sit, ob difficilem ne dicam impossibilem curationem ulceris pulmonum, comitatur ad interitum patientes. Attramen cum sinus in principio, quo ulcus nondum adest, vel saltem superficiale, pes aliqui affulget fore, ut patiens præservetur à tabe, si sanguis statim sistetur; vel saltem longius trahatur morbus.

Quod ut fiat, necessarium est sanguinem ad pulmones fluentem diuertete ad alias partes, fluxum refrigerare, & incrassare. Quamquam enim crassities potuerit augere disruptionem, quando sanguis erat copiosus, nunc tamen ex usu erit incrassatio, quo impeditur motus ipsius; fluxus, & extra venas hærens,

jam grumofus, est attenuandus, & expurgandus, venæ sunt obducendæ astruigentibus, & glutinantibus præfidiis; demulcenda est tussis, a cuius impetu reiectus est sanguis: quod si adest ulcus exliccandum, viresque conservanda. His intentionibus satisfacere conabimur cum hoc tempore, tum alio opportuno magis Chirurgia, Pharmacia, & dicta.

Quantum ad Chirurgiam, sanguis quinquies hæcenus missus fuit ex utroque brachio, ex utraque manu, & lumbis, ac coxis, per cucurbitulas: & quidem primo ad unc. viij. postea vero minori copia, sed quolibet fere die, ex Galen. consilio præcipientis, pro reuulsione sanguinem sæpe mittendum esse pauca tamen quantitate. Frictiones, & ligaturæ partibus extremis; lotiones aqua calente non fuerunt usurpatæ, ne sanguis plus satis attenuaretur. Nunc erat animus repetere sanguinis euacuationem per hæmorrhoides: & durante morbo, non mihi improbantur hirudines applicitæ retro aures; vel venæ frontis sectio; cum centeam magnam copiam sanguinis fluere a cerebro calido ad pulmones, cum præsertim antehac laboraret hæmorrhagia, quæ non multis abhinc annis est suppressa. Neque displicet, si iam partes extremæ in aqua actu frigida detineantur, atque linteo hac imbuto ictotum, & testes refrigerentur, ad refrigerationem scilicet totius corporis. Vtrum vero conueniant acria medicamenta, rubificantia nempe futura coronari, indicio Viri clarissimi committo.

Quantum ad medicamenta lenita fuit alius syr. rosarum solut. cum pulpa tamarindorum; postea exhibita iura refrigerantia, & astringentia ex plantagine, cicchorio, & soncho: addita deinum magis altringentia. Atque exhibui primo syrupum myrrinum, & de rosis siccis, cum acetoso simpl. ad dissoluendos grumos: cumque abhorreret ab usu syrupi dulcis, nec dulcia, nec dulciora sint adeo cura præscripti aquas plantaginis, portulacæ, polygoni, cum pulvere sanguinis draconis, lapidis hamatidis & portunculæ muniz; qui pulveres boli forma exhibentur cum syrupo myrrino, quibus aquas superbibit. Lambituum quinetiam præscripti ex syr. de myrto, de rosis, siccis, cum sangum. draconis, terra sigillata, & corallis rubris; conferuam item ex rois antiquam sumit bis in die, parum ante cibum, admixto pulvere corallorum rubrorum, & terræ sigillatæ, pauci tamen quantitate. His addo & incrassantia ad interceptandam fluxionem: in quam rem utitur diatragacantho. Externa interceptantia non fuerunt administrata, ne repelleretur magis materia ad pulmones: sed si perseveraret affectus, indicium erit penes Virum Clarissimum, an ad hæc externa refrigerantia, & altringentia deveniendum sit: qualia sunt oleum cydoniorum rosarum cum posca, penetrationis causa Cogitabit pariter, an ad opiata debeamus progredi, ac unica vice exhibere, vel drachmam unam Rhiloni, Persici, vel drachm. sem. Theriacæ recentis. Postea vero persistendum in emulsione semin. papau. albi, cum amygd. lis dulcibus; vel etiam quandoque exhibendus syrup. de papavere, cum syr. violato lambitui forma. Quod si persistet affectus, non improbarem rhubarbarum immaturum masticatorum, cum passulis dulcibus; vel alia proposita à Viro clarissimo.

Vitus

Victus hætenus fuit primo tenuis valde, mox & habita ratione vitium mediocris: semper tamen refrigerans, deinde & incrassans. Ideo usus est hordeo primo, mox farina, pedibus, & capite vituli, atque hesternæ cœna panatella ex farina amyli. A vino abstinet, cuius loco parata fuit aqua hordei: utitur & quandoque aqua Virginis. *Idem ibidem.*

Hæmoptylis.

Hæmoptoicus Vir hic Illustriss. à capitis destillatione, biliosis serositatibus immixtis, tandem evasit, sicut enim caput excrementorum ferax, ita jecur præcalidum natura fortituit, quæ destillatio jandiu ad pulmones delabens, tussim molestantem excitavit, quam non parva & frequens sequuta fuit sanguinis excretio. Et licet per analtomiam a pulmonum vasis profluxisse creditum fuerit, attamen circa bronchia pulmonum diuresin aliquam factam fuisse jure suspicamur, quod anhelitus difficultas, cum quadam raucedine huic successerit, dum scilicet materia catarrhalis delabens, antequam pulmones attingat in aëperæ arteriæ & bronchiorum continuo impedimentum & obicem nacta, hæret, incrassatur & aeris meatum intercipit, quæ ratione observatur, quod eadem materia quandoque levissima tussi extruditur, prout tussi violentiori eget pulmonum cavitati inhærescens, quæ dum à motu corporis, & potissimum per loca acclivia, commovetur & effertur ad bronchia, auget spirandi difficultatem.

Ut autem & caput & pulmones exsiccarentur, decoctum simplex primo, mox cum sudore fuit illi præscriptum, ut ab eo Patiens, non solum ad pulmonum exsiccationem, verum, & ad jecoris venarumque retrigenerationem, necnon sanguinis perfectam suppressionem, aquis acidulas, imo vitriolatas, in valle Solis nascentes assumeret, at neutram intentionem consequuti fuimus. Et primo quidem non capitis exsiccationem, quia sudor paucis diebus & parce fuit exsiccatus. Nec secundo jecoris & sanguinis contemperationem, quoniam aquæ vitriolatæ, licet in omnibus permanere ac præterfluere soleant, in hoc tamen Nob. nostro Pat. sublitescunt ut propterea aut tertia die earum secundum intermittere fuerit coactus, cujus infortunii causam quoque omnino ignorans, quam tamen, postquam ad manus nostras pervenit, solo tactu statim deprehendimus, hepar enim inveteratis obstructionibus implicatum nobis occurrit, eo quinetiam progressis, ut ipsius tensio tumoris potius quam obstructionis naturam, repræsentet, quæ si nobis literis significatæ fuissent, aquarum certe usu dimisso omnino, decoctum potius nonnihil deobstruens præscriptum foret.

Modo tussis persistit molestissima, nondum remissa immoderata capitis essentiali humida intemperie, & spirandi difficultas invalescit, à materia copiosiori ad pulmones irruente, & forsan quoque ab ulcere adaucto. Color totius corruptus est, & pedes quandoque intumescunt, affectio jecore non solum ex morbo instrumentalī, obstructionibus sc. contractis, verum & à propria intemperie, necnon debilitato

ob calorem influentem, qui languidus à corde non pro usu ventilato ad ipsum transfunditur. Quibus perpenis, non est qui non prævideat imminuentem vel tabem vel cachexiam.

Quare nihil cunctandum, quinimo omnia agenda, ut jam dicta mala à tanto Viro arceantur. Nec nos deterreat agendorum difficultas. Satiùs enim est etiam anceps remedium experiri, quam ægrum certæ morti relinquere. Et quoniam morbo magno convenit remedium magnum, ideo levioribus neque insistendum, neque adendum est. Quamobrem destillationem est præ omnibus aliis incumbendum, ut quæ tons & solboles omnium morborum sit; & ut causæ sine qua non reliqui affectus curari possunt. Verum id nos assequuturo nullo modo speramus sine sudore, ope accommodati decocti, utpote qui caput exsiccet, & ut præterea remedium, à pulmonibus fluxionem avertere possit, non tamen id usurpandum censeo, nisi immunitis prius jecoris obstructionibus. Quare hoc tempore statim cura jecoris est suscipienda.

Omnium itaque primo potio ex manna clarif. præbenda, cui superbibat aq. hord. saccharatæ, aut mullæ dilutæ, ex eadem paratæ lb ii. inde quinque diebus, matutinis horis, sumat. ℞ iij. oxymel. .i. diluti. cum tribus drachmis crem. tart. omnibus dissolutis in pauca aqua flor. citri. Quinque autem post diebus, eandem repetat pot. ex manna clarif. epotis ab ea, ut supra, vel aq. hord. vel mullæ dilutæ. Deinde ad deobstructionem deveniendum, ac propterea die sequenti, assumat rhab. opt. ʒ i. cum ℞ iij. flor. cass. bol. reform. à quibus hora post, bibat ser. destil. lb i. & tribus horis ab eo prandeat, in cujus usu persistat decem continuos dies. Deinde integra hebdomada, quotidie sumat syrup. Kermel. ex nostra descriptione, ad ʒ ii. in pauca aqua defusco cich. destillat. dissolutum, a quo hora post, bibat cyathum aq. cich. & agrim. syr. de succo lim. addito.

Dum jam dicta sunt, caput solis errhinis erit expurgandum, metu scilicet ne à purgantium validiorum usu, sputum sanguinis denuo concitetur. Patetur autem errhinum leve, ne materiam multum exagitet, neve stermentum moveat, expul. majoranz, & radicis iridis dorent.

Quibus præmissis ad sudorem, in quo omnis spes nostra sita est, deveniendum decocto prius assumpto, ita parando.

℞. salsa electæ ʒ i. f. visci quere. ʒ i. medullæ guaiac. rec. radic. enulæ camp. an. ʒ i. aq. still. cich. lb ii. beton. farf. an. lb i. m. f. inf. pes. hoc. 24. deinde bull. ad consumpt. dimittij, & colat. serv. pro tribus vicibus, mane ante ingressum hypocausti exhibenda. Propotu autem.

℞. Residuum lignot. aq. comm. opt. lb xii. sol. end. malv. pulmonariæ, si haberi poterit. an. m. i. pullam juniorem integram, sed incisam, m. bull. omnia ad consumpt. terræ. deinde B. M. destil. colat. addendo sacch. sin. ad libitum Pat.

Victus interim non sit tenuis, sed mediocris, adeo ut quotidie comedat, modo carnem pulli junioris, modo columbæ turricolæ, modo

modo ptyſanam hordeac. modo ova ſorbilia recentia ſemper autem nucleos pineos, ſaccharo incruſtatos, ſicut & amygdalas, nec panis ſit biſcoctus, cum omni indultia vires & humiditates ſubſtantificæ ſint conſervandæ, etiam cum minori capitis exſiccatione. Utatur de more conſervis, à prandio roſarum, ſub ingreſſum vero lecti beton. ſit quoque in uſu aliquod intercipiens, noctu ore detinendum, ut diatrageanth. frigid. cum bolo. Alvus lubrica ſervetur Clyſteribus ex lacte, butyro, & ſacch. paratis, vel flore caſſiæ, potiones enim validè nimis evacuant, prout purgantia nimis exſiccantia, hoc caſu valde ſuſpecta. Quæ anguſtis his rebus in medium adducendæ nobis ſuppetunt, meliora à Viris Excellent. præſentibus expectantibus. *Raym. Joh. Forſi Conſult. & Reſp. Medic. Tom. 1. Cent. 2.*

Sputum Sanguinis.

Licet Juvenis Nob. hæmorrhagiis è naribus obnoxius tribus abhinc annis ſanguinem per os excreverit, externa præcedente cauſa caput ipſum calefaciente, quem propterea ab eodem per infundibulum ad os deſluxiſſe ſit omnino credendum, nihilominus, cum ruruſ non ſemel, ſed iterum & pluries, per os fuerit eſectus, ſive ſolo ſcreatu, ſive levi quadam tuſſi. ideo negligendam non eſſe hujuſmodi excretionem cenſemus, ſed conſiderandam, ſi non ut cauſam, ſaltem ut ſignum malum. Etenim Sanguis quidem ſupra, qualiſcunque fuerit ſemper malus, non ſolum quia pravo motu peccat, verum etiam qualitate, dum ab expultrice venarum irritata, ob ejuſdem acrimoniam, ad earum oriſicia prius, inde foras extruditur, & quidem per ſuperiora potius quam per inferiora, quia utpote calidus atque fervidus, ſurſum potius petit, prout niger ad inferiora proclivis eſt.

Hic autem malus ab Hippocrat. exiſtimatus eſt, licet à capitis venis, quoniam eadem occasione, eodemque impetu quo in illius venas irruiſſe & aperit, eodem etiam ad pulmonum venas influere, inflare ac referare poſſet, imo, quod pejuſ, ut acris & mordax, eaſdem erodere, atque ita non ſolum anatoſiam malam, verum & diſereſin peſſimam temporis ſpatio inducere poſſet.

Quare ut Juvenis Nob. ab imminentibus aſſectibus tutus præſtetur, qui præſentes ſæpe curationem reſpuunt, medicam opem implorat, atque ideo noſtrum erit ſanguinis aliquam redundantiam minuire, eandem à ſuperioribus partibus divertere, & omnium maximè fervorem ejuſdem atque acrimoniam contemperare. Quibus intentionibus, hoc anni tempore, Paſcharis nimirum, peracto, erit ſatiſfaciendum, remediis Chirurgicis, Pharmaceuticis & Dieteticis.

Et ex Chirurgico fonte repetita depromenda ſanguinis miſſio, primo ex jecoraria dextera, ſecundo ex ſaphena pariter ejuſdem lateris. Præterea quam maximè conferre poterunt frequentes pedum lotiones, atque calente ante cœnam, prægreſſa potiſſimum aliqua cauſa, caput & totum corpus valdè excalefaciente.

Ex Pharmaceutico deſumenda Lenientia, Præparantia, Purgantia, Alterantia. Leniens

eſſe poterit ſyr. roſ. ſolut. rec. aut caſi. cum lenit & tart. præparans per hebdomadam julap. acet. ad ʒ ſ. cum viol. ad ʒ j. ſine diluto. Inde repetendum præſcriptum leniens. Mox ulterior adhibenda humorum præparatio, ſuccis depurat.

Ut ʒ. Succ. depur. cich. endiv. ſonchi an. ʒ j. decoct. cich. berr. g. eud. viol. plantag. hepaticæ ʒv. m. pro ſyr. & ſic pro aliis. Decem vero poſt diebus præbeatur purgans hujumodi.

ʒ. Flor. caſi. rec. ext. elect. diacathol. eluſ. de ſucco roſar. an. ʒ iiij. m. f. b. & hora poſt, bibat ſeri capr. depur. lb ij.

Vel ʒ. Rhab. opt. cortic. myrob. Thebul. an. ʒ ij. ſpicæ gr. vi. aq. end. q. ſ. m. f. inf. per horas 12. & facta expreſſ. colat. adde ſyr. roſ. ſolut. ʒ v. m. f. p. & tribus ab ea horis hauriat ſerum, duabus vero horis ab eo prandeat.

Hæc peracta purgatione, jecur, potiſſimum erit quam maxime refrigerandum, & hypochondriorum æſtus contemperandus, in quem finem aqua Noceriana, aut B. V. M. Montis Ortonis foret utiliſſima, primis quidem diebus dejectoria, reliquis vero diuretica præbenda. Quod ſi Pat. hæc reſpuerit, iuſtitu tur refrigeratio hoc modo. Bibat. tribus diebus continuis ſerum capr. ad lb ij. vel iv. præmiſſo vehiculo ſyr. roſ. ſolut. ad ʒv. deinde poſteris diebus, integro menſe, quotidie ſummo mane bibat cyathum de ſucco cich. deſtill. præmiſſa ʒ j. onier. roſ. Verum decimo quoque die aſſumat ʒ ʒ caſi. additis ʒ iiij. elect. de ſucco roſar. & gr. vi. magiſt. nœchoac. reformatis bol. à quib. hora poſt, bibat lb ij. aut ſeri capr. depur. aut aquæ Noceræ, & tribus ab ea horis prandeat, ſequentibus vero diebus aquæ cich. uſum repetat, tranſacto autem menſe, prima menſa, hauriat juſculum acetofa alteratum.

Quibus congrua addatur vivendi ratio, qua potiſſimum radiis ſolaribus non adeo facile ſe ſubmittat. Secundo abſtineat à cibis ſalitis, acribus, vaporolis, ab aromatibus, vinis generolis, & à cibo conſervam roſarum de more ſumat. Tertio capite elevato dormiat. Quarto vitæ violenta exercitia, nimioſque labores. Quinto moderata ſit Venus. Et ultimo alacriter vivat, ſed computationes & comæſtationes fugat. *Idem ibidem.*

Præſervatio à frequenti ſanguinis ex pectore excretionē.

Reverendiſſ. Abbas annum agens quinquageſimum primum, temperamenti totius ſubſanguinei, hepatis calidioris & humidi capitis, mediocriſ habitus, podagricis & nephriticis doloribus jam obnoxius; ex Matre quæ tabida periit, & Patre podagrigo & nephritico natus; in adoleſcentiæ ætate impetigini, mox frequentibus febribus, necnon podagricis & nephriticis inſultibus fuit obnoxius, & hypochondriacus redditus. Tandem anno quinquageſimo ſuz ætatis, dum Venetiis hyberno tempore morabatur, in Rheuma lapſus eſt cum tuſſi moleſta, à qua & domum reverſus excruciabatur, de nullo errore conquieſtus. Sputa eſiciebat modo cruda, modo craſſa, flavoſcentia, viridia quandoque ſalla, ſemel vel bis cruore infecta: à quibus paucos

paucos post dies, nocte quadam initio Veris, dolore, copiosum ad libram circiter, repetita vice, per os magna tussis sanguinem reiecit biliosum, in superficie spumantem, partim liquidum, partim concretum: comitante quinetiam febris, quæ in primis symptomatica videbatur, dein periodica, ex biliosorum specie, & postea catarrhalium judicata fuit. Quibus opportune prospectum fuit evacuandis, alterantibus, & præsertim Hæmorrhoidibus cito ex cubito & pede sanguinis detractio, priusquam inflammatio suboriretur: adhibitis cæteris revulsionum generibus, utriusque administratis astringentibus, ac modice incrassantibus, ut rosarum tinctura, ac syr. coraliorum: quibus statim cohibitus est sanguis fluens, fluxusque vero & jam concretus, optime posca eductus fuit. Peracta curatione nostrum erat prophylaxin Patienti parare, quam ab uberrimo tuz doctrinæ fonte accipere licuit; aderas tunc enim Vincentiæ, qui inter cætera succos depurato refrigerantes, aquas quinetiam B. M. destillatas refrigerantes, postremo loco lac Asinum & Caprinum iussisti, habita etiam ratione hypochondriacæ affectionis cui Pater obnoxius est. At majus emolumentum sperabas ad præcavendam sanguinis rejectionem, si hæmorrhides excitarentur, ex Principum Medicinæ consilio, ad quod præstandum duas vel tres hircudines singulis mensibus apponendas docebas, quo auxilio natura evacuationi assuesceret, sanguinisque cursus revelleretur; quod tamen per plures menses incassum tentatum fuit, licet paucis diebus ante sanguinis sputum ex hæmorrhoidibus sponte nonnihil stillasset. Convaluit attamen Pater Reverendiss. usque ad Augustiensem, quo in tertianam simplicem lapsus est, a qua paucis auxiliis levatus recidivavit, ab eaque erratice postremo invadente liber evasit. Cum tamen Octobri mense ruri degeret, gravidine pressus in tussiculam incidit cum sputis crassis, lividis, ponderosis bisque cruentis; insuper cum febricula, quæ circa vesperras invadebat catarrhalium more, non sine metu innotantis Tabis, ne dicam factæ, ut Vir Præstantiss. Collega assererat, pro quibus consultum fuit, Patri prospicere universali ac particulari expiatione, necnon Decocto ex china, santal. rub. ligno roseo & eboris rasura in jure pullæ cichoraceis, pectoralibus, cephalicis ac hepaticis alterato, præmisso bolo ex terebinth. aqua farsæ lot. cum sale tart. fixo; imperata pro ferculo ptisanæ hordeacea, ac pro potu aqua è santalis ac lentisco M. B. destillata, cui lapis hæmatites infundendus, si denuo sanguis excitaretur. Bene interim valebat Pater, cum statim ab assumpta portione ex Caphe, Turcarum more, die quinta præteriti J. nuarii iterum excitata tussis ac sanguis eiectus, sed minori copia, qui sequenti nocte oborta tussis ex deglutita rosarum Conserva iterum rediit, qui tamen cito repressus restitit: Tussis minor & febris minor hac vice observata fuit; Utraque paucis remediis evanuit. Attamen tertia vice sanguis excretus est die 24. nuper elapsi Augusti absque febre ad uncias circiter sex, cum paucis tussicula, a quibus ut alias Pater evasit, viribus bene constans, satis appetens, de quadam tantum hypochondriorum angustia conquestus, si cingulum ar-

ctius constrinxerit, ob flatulentiam fortasse affectionem quam patitur. Quia vero paucis mensibus ter sanguinem reiecit, necnon levi destillatione torquetur, licet ut plurimum saporis experte; ideo ut præservari valeat, maxime a repetita sanguinis excretionem, a qua cum Hippocr. Tabes, in Senibus lethalis ex Aretæo, cum sit sanguis omnium alimentum, omnium calor, omnium color, quo effuso, Senes facilius in Tabem labuntur, a qua eorum interitus. Necessarium ergo ducere sanguinis sputo occurrere, quod debilioribus redditis venarum otiosis, tum hæreditaria dispositione, tum irrigua destillatione qua pulmones facilius mollescent, iterum iterumque recurrit, pro quo igitur prohibendo, præscripta inviolabili optime vivendi lege, quæ ab omnibus caletacientibus Patientem arceat, opportunum censebam, si Verè juxta Galeni monitum purgationem iniret, sanguinem demendo ex cubito & pede; Autumno vero adventante loco pedis, ex hæmorrhoidibus, duplex Pharmaceuticum accipiendo, & per aliquot dies succos depuratos refrigerantes, quibus rosarum Conserva pro corumde familiaris succederet. Quæ tamen infallibili tuo consilio, Sapientissime Vir, subicio, cui obsequium interum meum perenne devotumque humiliter dico.

Præclarissime Vir. Tibi, qui Patrem Reverendiss. toties hæmoptoicum, Eruditissime Antoni, curasti, & ab Orco ad vitam revocasti, eundem ab hujusmodi pravo symptomate præservare, haud difficile fuerit; sed ut propriam prudentiam modestæ associatam magis patefacias, consilia petis & amas. Et quoniam ex eleganti sola relatione jam dicti repetiti symptomaticæ idea, causæ, prognosticæ indicationes præservativæ, præservandique modus innotescunt; idcirco pauca mihi pro confirmatione dicenda restant. Siquidem ex his quæ a Te relatæ sunt, facile conjici potest Patrem Reverendiss. pectoris & pulmonum imbecillitatem ab ortu primo hæreditariam contraxisse, & ab adolescentia pravos succos sanguinem inhicentes habuisse; quæ probatione non egent, cum tabida Mater obierit, & ipse adolescens pruriginem & impetiginem passus fuerit: mox frequenter febricitaverit, & podagrica atque nephritica affectione laboraverit, non sine capitis consensu, dum pravus sanguis circulando, a carotidibus arteriis ad venas jugulares in capite transitum faciens, pravorum succorum portionem aliquam deposuit, capiti nutriendo parum aptam: quod factum est ut rheumatismo frequenter obnoxium redditum fuerit, cum tractu temporis essentialem quoque labem acquisiverit, & ab eodem plura mala prodierint, dum enim catarrhalis materia redundans, per musculorum spatia ad articulos defluerat, arthriticas passiones inducebat; dum in ventriculum, cruditates, obstructions, indeque hypochondriacas & nephriticas affectiones; dum ad pectus tussim, cum ejusdem catarrhalis materiæ, modo tenuis, modo crassa, modo ulipida, modo salsa & varii coloris, atque tandem cum cruenta sputorum excretionem, imo cum copiosis sanguinis ad libras per intervalla iterata rejectionem semper comitante febre, excepto postremo ut

sultu; quæ tamen febris non symptomatice, sed essentialis cum suis periodis observata fuit, alteratis nimirum atque fermentatis pravis humoribus jam in sanguine ipso collectis. Ex quibus certo statuendum sanguinem non per diarelin, sed per anastomosis temper excretum fuisse: cum post plures iteratas sanguinis excretiones Reverendissim. Pater omnino convalescit, quod rarissime permittit ipsa diarelin.

Verum quoniam ab humiditatibus à capite defluentibus, tractu temporis, præsertim senectute ineunte pulmones laxitatem & flacciditatem, atque tandem frigiditatem pati solent, unde secunda Phthisis ab Hippocr. Epidem. descripta exoritur; & præterea quoniam humiditates jam dictas ex catarrhali materia, in capite genita, & ex serosa, acri & acida a toto capiti communicata, constare non est dubitandum, quæ erodendo diarelin, hucusque non secutam, sicque Phthisin primam cum ulcere excitare poterit, ideo omnino præsertione eger Reverendiss. Abbas, partibus mandantibus, nec non recipientibus prospiciendo. Quare etiam hoc Autumnali tempore licet Verno minus proprio, est ineunda Purgatio, cum sanguis & uentre Octobri, & Januario alias ab ipso fuerit excretus. Primæ igitur viæ expediendæ; deinde destructiones nonnihil memorandæ. Tertio Mæsa sanguine quoquo pacto depuranda & educoranda. Quarto Jecoris & sanguinis calor contemperandus; atque tandem humida capitis interperies & pulmonum laxitas corrigenda. Quibus intentionibus quamvis prorsus hac viæ satisfieri non possit, speranda tamen erit præsertio usque in Ver venturum, quo tempore de opere perficiendo consilium in arena erit capiendum.

Pro prima intentione duo Lenientia; quinque diebus intermediis Præparantia sine diuturno, non est quod Tibi Viro in Arte versato proponam; sicut pro secunda sat erit uti decoctionibus ex cichoraceis post ebullitionem ex liuto expressis, ut jus alteratum efficacius evadat. His addi poterit sal tartari lixus, vel sal prunellæ ad scrupulum. In his x. diebus inlittere licebit, in quorum medio & fine medicamentum ex Castia, & rhabarb. exhiberi poterit, cui superbibat seri aut aquæ Nocer. lib. ii. Interim sanguis ante primum Purgans erit educendus, parce tamen ex Jecoraria dextera, & Caeterum, si non gestet, sinistro brachio inurendum. Pro tertia & quarta intentione, hac arte factum in hunc modum præstari poterit.

℞. Semin. melon. mandat. ʒ. i. semin. cucurb. & angur. mundat. an. ʒ. β. juris pullæ ʒ. vii. contundantur semina, & cum jure f. emulsio, cui adde sy. de pom. aut viol. ʒ. i. m. pro potu matur, in cujus usu perseveret triginta aut quadraginta diebus; substituitur enim lacti naturali Asinino, tum quia hoc tempore non adeo proba & efficax est lactis naturalis conditio, tum maxime quia ratione capitis impune propinari non posset. Interim venæ sedales erunt aperiendæ, & rursus parce sanguis educendus. Postremæ intentioni ut satisfaciamus Decoctum exiccaus proponitur, cui ego assentiri non possum, primo quoniam Decoctum humores liquans atque suadens, sine sudore, capiti obesse, non pro-

desse censeo. Secundo quoniam eidem perexiguam fidem habeo ut nimirum, viribus integris & adeo valentibus ad caput pervenire, & humidam intemperiem sine sudore superare valeat. Idcirco multo efficacius foret vinum medicatum tota hyeme in mensa potandum; cum ipsius quantitas & qualitas facilius ad caput feratur, & diuturno usu ejusdem capitis humiditates abluere, & intemperiem corrigere possit: ut propterea Hippocr. asserverit Medicamentum in cibo esse valde bonum; Poretur igitur vinum in dolio, ita ut pro unoquoque cyclo sive titula ingrediatur Chinæ opt. incisa, & sanctali rubr. rasp. an. ʒ. i. ligni ros. mar. & lentisc. an. ʒ. β. quod transacta hebdomada bibere incipiat, sitque potus pro mensa confectus, vinum que eligatur non dulce, non austerrimum, non generosum, sed tenue & subtypticum. Pro pulmonibus roborandis, rursus in usum ducat Conservam rosarum statim ab assumpto cibo, pulvere pulmonis vulpis præparat. & lapidis hæmatitis reformatam; sicut, noctu tempore somni ut rotulam ex Diatragacantho cum bolo de more in ore detineat suadeo, & ferculum hordeaceum Excell. Saxoniz frequens pro cœna consu-

Quibus omnibus congrua vivendi ratio erit addenda, à Te, Præclarissime Vir, instituenda, cui cætera quoque omnia, non solum melius dirigenda, verum & alteranda & mutanda libenter remitto. Idem T. ii. Cent. ii.

Juvenis fortis nullam diatæ rationem habens cibis salis, duris & acerbis vesci solitus, postquam hiberni aeris frigori nudatum caput multoties exposuisset, atque hinc primo magnam gravedinē cum aliquo gravativo capitis dolore contraxisset, & postea validissima tussi, ab acerbis catarrhis in thoracem delabentibus, aliquamdiu exagitatus fuisset, tandem incidit in sanguinis sputationem qua copiosum sanguinem, per intervalla tussiendo, rejicit, idque sine dolore Medicus in principio advocatus venam in brachio secuit & mediocrem sanguinis quantitatem detraxit, qui refrigeratus, admodum tenuis & male coloratus apparuit, ut vix paucillum coagulabatur. A venæ sectione sputum sanguinis per biduum subsistit, sed postea rediit. Appetitus deiecitur & vires debilitantur, sed nulla febris adest.

i. Hujus ægri primaria affectio, quæ per se satis cognoscitur Græce *αιμόννησις*, Latinis sanguinis sputum, & rejectio nuncupatur. Quæ nomina licet quancunque sanguinis evacuationem per os significent, specificè tamen apud Medicos per *αιμόννησις* intelligitur illud sanguinis sputum, quando cum tussi, ex partibus respiratori dicatis, sanguis rejicitur, sine illarum inflammatione.

ii. Est igitur symptoma in genere excretorum, præternaturam è pulmone & vasis profluentium Morbus autem, quem symptoma illud sequitur est solutio continui.

iii. Pars primario affecta est pulmo cum suis vasis, quod patet ex tussi, & ex sanguine cum tussi rejecto; qui sine dolore prodit, quia pulmo est valde obtusi sensus. Præterea caput quoque affici, docent gravædo & catarrhorum descensus Secundario etiam nonnihil patiuntur aliz partes, quatenus à valida tussi delassantur, ab eaque & sanguinis evacuatione debilitantur

iv. Causa antecedens sunt humores acres & crudi in capite collecti, qui inde ad pulmones delapsi, acrimonia sua respiratorias illas partes, partim vellicando gravissimam tussim, partim erodendo solutionem continuam inducunt, ejusque causa proxima evadunt. Irocatartice cause sunt frigus externum, obstructio pororum capitis, alixve, quæcunque crudos humores colligi faciunt, aut collectos ex eo deturbant.

v. Ab inordinato victu, multorumque salforum & acrimium usu, copia pravorum & acrimium humorum in corpore fuit genita, ac ipse etiam sanguis tenuis & acris evasit, hinc in valida illa calidaque juvenili ætate multæ acres evaporationes ad caput elatae sunt, quæ per ordinarios ethmoideos meatus evacuari, ac per ipsos quoque poros discuti solita, cum postea à frigore externo condensata, per eodem frigore constrictas ordinarias vias transire amplius non potuerint, prius majore copia in cerebro cumulata, sua crassitie & visciditate spongiosa narium ossa obstruxerunt, sicque gravedinem excitarunt, quam à copia retentorum humorum, membranas cerebri distendentium, subsecutus est gravativus aliquis capitis dolor. Postea per alienas & insolitas vias ad asperam arteriam & pulmones deluxerunt, in quibus acri vellicatione, utrumque respiratoriarum obstruptione, validam tussim, ad vasorum erosionem inducerunt, ex quibus duobus concurrentibus solutio continui subsecuta est, quippe erosa vasa à validissimo tusus impetu facile disrupta & aperta fuerunt.

vi. In sanguine multos pravos & acres humores redundare, ex eo patet, quod qui venæsectione detractus est, sic male coloratus & tenuis, ac vix tantillum coaguletur.

vii. Per intervalla redit hoc sanguinis sputum, quia ubi aperta vasa semel evacuata sunt, tunc nonnihil concidunt, ita ut rursus aliquo tempore opus sit, antequam tantæ sanguinis copia turgeat, quæ cum impetu ex iis erumpere possit, ea autem data, & vasis nonnihil intumescens, iterum profluit sanguis.

viii. Quod à venæsectione per badium subsecutæ hæmoptysis, inde evenit, quia per illam sanguinis eductionem cor nonnihil debilitatum fuit, hinc pulsus ejus minores evaserunt, sicque minus sanguinis è dextro ejus ventriculo in pulmones fuit impulsus, qui minori copia in iis redundans, & per ordinarios meatus levi negotio ad sinistram ventriculorum properans, non minus tam facile leviter apertas venulas potuit effluere, sed post duos dies, corde rursus fortius pulsante, in pulmonum vasculis turgescens, facile effluxit, imprimis validiore tussis agitatione impulsus. Ad hæc, eandem ob causam, minus quoque acris sanguinis ad cerebrum impulsus est, & pauciores acres exhalationes sursum elevatae sunt, sicque pauciores acres humores in capite colligi, & ex eo ad thoracem delabi potuerunt.

ix. Appetitus deicitur, propter continuam inquietudinem & agitationem à tussi, nec non debilitatem, à sanguinis per sputa evacuatione inductam: quibus de causis etiam totum corpus lassatur, omniaque viscera una cum ventriculo debilitantur. Adde, quod proculdubio

etiam multi crudi humores in ventriculo, præter inordinatam dietam, generentur & colligantur vel aliunde in eum defluant, qui appetitus stimulum obtinuerunt, & coctione debilitantur.

x. Vires deiciuntur, partim à sanguinis copiosa evacuatione, partim à lassatione, per tussim inducitur. Febris tamen abest, quia humores non putrescunt.

xi. Hæc affectio admodum periculosa existit. Ratione partis affectæ, quæ ad vitam maxime necessaria est, cum nemo respiratione carere possit. Ratione magnæ causæ, quia hæc conitio solutio non fit ab aliqua valis anatomosi sed à diæren, seu valis partium erosione, partim ruptione. Ratione difficilioris curationis, quod solutio hæc in curando quæte opus habeat, quæ in parte respiratoria impetrari nequit: quoniam etiam solutio scorum tolli nequeat, verum etiam catarrhorum acrimium deluxus & validæ tussis simul curanda veniunt. His penitus consideratis, magna cum ratione a Benedicto Vici. Faventiæ hæc duo prognostica de tali hæmoptysi, præx. tom. 2. cap. 6. conscripta sunt. Rejeto sanguine pulmone tussi disrupta vena ipsa non solvabitur, nisi magna cum difficultate, & Medici providentia ac sollicitudine. Ubi ex vena pulmonis vel pectoris rupta sanguis cum tussi exierit, ab humore quidem erodente falso procedente, curationem moliri non parum difficile est. Ratio est, quia aperto aliquo vasculo facile oboritur ulcus, ulcus sequitur phthisis, phthisim mors tæte Hippocrati aph. 15. 16. Interim tamen, quia nostro ægro juveni virium robur mediocriter eoulat, febris nondum accessit, & malum super capio est, non omnino de felici sanatione desperandum est, cum alias etiam plures à tali affectione optime curatos fuisse constet.

xii. Curatio igitur quamprimum incipienda, in eaque multis indicationibus satisfaciendum. 1. Tussis sedanda. 2. Sanguis a pulmone revellendus & averteendus. 3. Vasa aperta constringenda & consolidanda. 4. Catarrhorum delapsus ad pulmones preveniendus. 5. Prospiciendum ne crudi & acres humores in capite colligantur. 6. Sanguinis & humorum prava constitutio emendanda. xiii. Præmissis igitur clystere aliove lenitivo per os exhibitos ad venæsectionem deveniendum, quæ postmodum subinde reiteranda est, prout necessitas illam urgere videtur, urget autem cum æger gravitatem aliquam in imo pectore incipit sentire, tunc enim mox instituta venæsectio valorem pulmonis nimiam repletionem, novamque apertionem prævenit & impedit.

xiv. Ad sanguinis & catarrhi incrassationem, atque tussis sedationem præscribendus talis haustus.

℞. Pulveris Haly contra tabem scrup. ii. s. coralli rubri præparati scrup. i. decocti plantaginis ℥. i. syrupi de symphyto ℥. s. misce, fiat haustus mane & vespere exhibendus. Eger etiam sæpius de die uratur sequenti linctui, ut & amygdalato.

℞. Syrupi de symphyto, de rosis siccis, de tussilagine, an. drach. vi. de papavere. drach. iij. misce, fiat linctus.

℞. Amygdalarum dulcium mund. ℥. iij. s. seminum lactuæ drach. i. s. papaveris albi ℥. s. decocti hordei q. s. fiat sarr. emulsio ad lib. i. cui admisce sacchari albi q. s. fiat amygdalatum.

xv. Interea etiam ad catarrhi diversiori fonticulus in brachio, aut potius in cervice excutetur

& cucurbitulæ scapulis ac dorso applicentur. Præterea, ad crudorum humorum in capite collectionem præveniendam, cucupha cephalica calefaciens, corroborans, siccans, & poros aperiens, capiti imponatur. Utque via per nares rursus pateat, clemens aliquis sternutatorius pulvis iis aliquoties immittendus.

xvi. Ubi his mediis tussis sublata est, & sanguinis sputum subsistit, nondum desistendum, sed malum illud diu suspectum habendum est, ac proinde ad ulteriorum troscæ aut rupræ venæ consolidationem, acriumque humorum sublationem pergendum; in quem finem æger per intervalla clementer purgandus est, ut acres humores per epicrasin paulatim evacuentur. Intermedio tempore ter de die exhibendus haustus apozematis.

℞. Hordei mundati unc. i. rad. consolidæ, majoris, tormentillæ, bistoriæ, glycyrrizæ rasæ, an. drach. vi. herb. saniculæ, veronicæ, pyrolæ; tussilaginis, agrimonix, alchymillæ plantaginis, an. m. j. rosarum rubrar. m. i. caput papaveris albi unc. ii. s. passularum cum arillis unc. iii. ficus num. v. aqua q. s. fiat. s. art. apozema ad lib. i. s. Hujus loco potest æger subinde sumere ex hoc condito particulam magnitudinis nucis moscatæ.

℞. Pulveris Haly contra tabem drach. i. s. coralli rubri præparati, lapidis hæmatitis, cornu cervi usi, an. scrup. i. s. conservæ rosarum rubrarum unc. ii. syrupide syn phyto q. s. misce, fiat conditum.

xvii. In victu abstinendum ægro ab omnibus acidis: & licet Galenus oxycratum e potum in hoc affectu commendat quam maxime, nos tamen illud nocentissimum existimamus; propterea quod talia acida acrem tussim irritent, qua nihil pejus in hoc casu, in quo summa quies maxime requiritur. Abstinendum etiam a salsis & quibuslibet acerbis eduliis & potibus. Aër convenit modice frigidiusculus. Cibi sint facili digestionis & subdulces ac boni nutrimenti, & succi viscidioris, quales sunt carnes vitulinæ, agninx, vervecinæ, pulli gallinacei, & ex his juscula, cum hordeo mundato, oryza, passulis, aliisque similibus. Maxime autem conveniens est lac dulce, imprimis caprillum. Potus sit cerevisia subdulcis, mediocris notæ. A vino abstinendum longo tempore: vel si forte ratione ventriculi, aut alterius cujusdam debilitatis, necessarium vini usum judicet, utendum erit rubro subastringente, eoque subdulci, aut alio vino subdulci, sed admodum paucò. Somnus solito longior existat. Corpus quiescat. Abstineat æger a cantu, alta locutione, vociferatione, & loquatur quam minimum fieri poterit. Alvus liquida servetur, ut siue multa compressione facile deliciat. Animus omnino quietus sit, a gravioribus pathematibus, quantum fieri potest, immunis. *Ubr. de Diemarbroeck Medicationum libro.*

Dominus Ioannes, Sacerdos Craneburgensis, anno 1636. 16. Februarii has ad me Litteras misit.

Expertissime Domine Doctor, maxima scientiæ & experientiæ tuæ fama me impulit, ut vestrum in meo morbo consilium experiri desiderem, sperans V. R. Ram aliquod salutare auxilium mihi allaturam: Diu valida tussis me infestavit, vix unquam requiem permittens: præterea ante mentis criticè spatium ad tussim adhuc accessit sputum sanguinis spumosi, quem exinde continenter (interdum majore, interdum minore quantitate) rejicere soleo, quæ expulsiō mihi valde molesta est. Ad hæc appetitum plane perdidī, ita ut nihil edere possim, nihi parum, cui acetum vel aliud quid acidi admixtum sit. Totus emaciōr, & vires jam ad extremum dejectæ sunt. Multa aliorum consilia nihil mihi profuerunt. Quæso V. R. tiam adhuc aliquid remedii adhibere posse existimet, illud nobis impartiri velit. Vale, 16. Februarii. 1636.

*V. R. na Deditissimus,
Ioannes Sacerdos.*

Huius eadem die sequenti modo Respondi.

Reverende Vir, Litterarum tuarum mihi datæ sunt, quibus breviter pro temporis brevitate respondeo. Acri & falso catharro ad pulmones decedente diu te vexatum fuisse, atque hinc vehementem illam & continuam tussim originem traxisse percipio. Tandem autem humorum distillantium copiā pulmonis aliqua vena aperta, vel tussis vi disrupta sanguinem profundit, qui e pulmone spurculus plerumque ejicitur. Malum hoc non curabitur, nisi catharri descensus impediatur, & tussis sedata fuerit. Ad has intentiones quatuor tibi mitto medicamenta. Primum, sunt septem pilulæ, quas cras mane assumes, atque his clementer purgaberis. Secundum est conditum, de quo peracta purgatione singulis diebus ter, nempe mane, meridie, & vesperti, assumes particulam magnitudinis avellanæ vel nucis moscatæ. Tertium, est, linctus, de quo, cum tussis maxime infestat, interdum linges. Quartum, est tabellatum, de quo sæpius diu noctuque particulam in ore liquecere sines. His quatuor adhuc addidi sacculum, cui quod inest, effundes in ollam novam fictilem, & super ignem calefacies sine ulla humiditate, crebro movendo spatulā, ne herbarum comburantur, deinde sacculo iterum infundes, atque ita calide capiti impones, imo quam calidissime ferre poteris, atque per unam duasve horas inhaerere sines, idque bis terve de die reiterabis, eoque ablato, statim caput laneum, fumo mastichis & gariophyllorum bene perfumatum, calide capiti impones, eique mantile calidum adhuc circumligabis, ut hoc modo refrigeratum & debilitatum cerebrum rursus calefieri, corroborari, exsiccari, atque ita catharri descensus impediretur, quo factò, reliqua curatio facilis succedet. Satis nobis constat vos propter bellorum turbas & milites hospitio excipiendos minus commo-

commode vivere posse, id terea tamen, quantum heri potest, aliqua etiam diæta ratio habenda est. Itaque continebis te loco calido, imprimis autem caput ab omni externo frigore præservabis. In victu abstinence ab omnibus cibis salatis & fumo induratis, ut & ab omnibus quæ sunt difficilis concoctionis aut mali nutrimenti, maxime autem ab omnibus acidis (licet te his maxime delectari scribas) ut aceto, succo limonum, pomis acidis, vino acido, omnibus denique, quibus aliqua aciditas admixta est, quia acida pulmones maxime lædunt. Conveniunt jusecula carnis ovillæ, agninx, vitulina, hœdinæ, gallinarum, ut & ipsæ carnes, cum rosmarino, majorana, hordeo mundato, vel passulis cocta; ova quoque sorbilia, & lac caprillum: ut breviter dicam, pleraque dulcia conveniunt. Si his non cessaverit malum, morbi statum post aliquot dies rescribito, Interim V. R. tiam Deo Opt. Max commendatum volens, ero

Tuus in omnibus,

I. de Dismarbroeck.

Medicamenta quæ præscripseram, hæc erant.

1. ℞. Massæ pil. cochiarum, scrup. i. f. diagridil gr. v. hanc pilulæ vii deaurentur.

2. ℞. Coralli rubri præparati, lapidis hæmatitis, trochiorum de terra sigillata, an. scrup. ii. flor. sulphuris, drach. i. olivani, tragacanthæ, spodii, cornu cervi viti, an. scrup. i. confere rosarum rubrarum, unc. ii. myræ cydoniorum, ꝑ. i. f. requiei Nicolai, drach. i. f. syrupi de papavere q. s. misce, fiat conditum.

3. ℞. Syrupi de jujubis, de tussilagine, de glycyrriza, an. ꝑ. i. de papavere, loch. sani, an. ꝑ. i. f. misce, fiat linctus.

4. ℞. Caput papaveris albi, n. v. confcindantur minutim, & coquantur per semi-horam in aquæ communis q. s. deinde colentur cum forti expressione colatura coquatur cum sacchari albi, ꝑ. iiii. ad tabellatam consistentiam, addendo sub finem pulveris radic. althææ scrup. i. f. glycyrrizæ rosæ, drach. i. flor. sulphuris, scrup. ii. coralli rubri præparati, boli arm. veræ ana scrup. i. fiant f. art. tabellæ.

℞. Herb. majoranæ, M. i. rosmarini, betonicæ, flor. rosarum rubrarum, meliloti, an. m. f. gariophyllorum, drach. i. nucis moscatæ, sem. cumini, an. drach. ii. grosso modo contusis adde, sem. milii m. iiii. salis communis m. iiii. misceantur simul, & dentur in sacculo lineo satis largo.

Cum his remediis per octiduum usus fuisset, transcripsit, tussim & sanguinis sputum non quidem curata, sed multum tamen fuisse imminuta. Ut malum prorsus sanaretur, rursus sequentia præscripta sunt. Reiterentur pilulæ, linctus, & conditum, antea præscripta.

℞. Radicum consolidæ majoris, bistortæ, tormentillæ, sceniculi, an. ꝑ. i. f. glycyrrizæ kassæ, drach. vi. herbarum hyssopi, tussilaginis, scabiosæ, veronicæ, plantaginis, betonicæ, rosmarini, an. m. i. salviæ, flor. rosar. rubrarum, an. m. i. caput papav. albi minutim conficorum, n. iiii. pestulatum cum arillis, ꝑ. iiii. datylorum, n. ix. decocti hor-

dei, q. s. coquantur fart. & fiat apoxema ad lib. 3.

Primo purgetur dictis pilulis, linctu utatur tussim, mane & vesperi post assumptum conditum bibat haultum apozematis. Circa finem Martii scripsit se a sputo sanguinis & tussi planè liberatum esse, optime quoque dormire & edere posse, minime pro meis consiliis maximas gratias egit. Idem in *Observationibus Medicis*.

Juvenis xxiv. annorum, constitutione corporis sanguinea præditus, postquam dolore capitis pulsanter per aliquot tempus laboraverat, noctu tussi molesta correptus, libram fere floridi & spumosi sanguinis sine dolore, brevi interjecto temporis intervallo per os excernit, tandem que etiam nares stillant sanguine unde non solum de virium debilitate, sed etiam dolore pectoris gravativo, tussi & respiratione difficili conqueritur, absente quidem febre, cumque nondum plane cesser sanguinis, concreti licet, rejectio anxius de salute sua agrotus noster Medici anhelat consilium.

Quisquis paulo attentius omnia atque singula in modo recensita Historia perpenderit symptomata, ei haud difficile erit, affectum, quo cum non sler ager conficiatur, æque ac ejusdem causas determinare. Quod enim navigantibus est pyxis hæutica, & in illa inclusa acus magnetica, aut etiam celo sereno tempore nocturno stella Polaris; Quod per terram iter facientibus statui Mercuriales; Medicis sunt insensu vel Medici, vel agrotantis, vel adstantium incurrentia Symptomata aliave signa. Hæc enim Medicum alias de ipso affectu ejusque causis dubium existentem certum reddunt, non aliter ac illa peregrinantibus in bivlo constitutis, aut in vasto Pelago errantibus, expeditum atque securum ostendunt iter. Hinc non tantum ipsa sanguinis per os eruptio, sed & ejusdem sanguinis rejecti spumosa atque florida consistentia, nec non excedens quantitatis, motus præterea excretionis tussi descriptus, gravitatis porro in pectore sensus, tandemque difficilis respiratio satis producit Hæmoptysin præsentem, De cujus Natura ac Essentia generalis quædam præmittere animo constituimus, antequam individualis hujus affectus resolutionem aggre diamur.

Dicitur Hæmoptysis, quò rem 1. primo, quod dicitur, ovo ordiamur, Græcis quibus sua in unacula debet, ὄψις ὡς αἷμα sanguis est αἷμα sputio. Latinis sputum sanguinis, sputum cruentum, rejectio sanguinolenta. Germanis *Blutspucken*. Accipitur vel generaliter vel specialiter. Generaliter sumitur Hæmoptysis, sive sanguinis sputum, pro quavis sanguinolenta per os rejectione, sive critica illa sit sive Symptomatica, sive per screatum, sive per simplicem expuitionem, sive per vomitum excernatur, sive ex capite juxta veterum sententiam, gurgulione aliisve etiam partibus accidat. Sic Galenus se sanguinem & cerebro & gurgulionis partibus internis ad fauces affatim descendentem rejectum tussiendo, conspexisse 4. de loc. aff. cap. 1. Ex ventriculo Riverius cent. 3. observ. 12. Ex Hepate Fontanus in observ. rarior. cap. 23. p. 68. testatur. Specialiter autem pro ea sanguinis per os rejectione quæ fit cum tussi ex vasis

pulmonum, de qua utpote propria acceptio-
ne hoc locosumus acturi.

Definimus eandem, quod sit sanguinis per
os cum tussi citra inflammationem rejectio, à
vasorum pulmonalium apertione ortum ha-
bens.

Generis loco ponitur rejectio sanguinis quæ
ipsis sensibus patet; quo ipso refertur ad clas-
sem symptomatum, nimirum quæ est Excretio-
rum & retentorum, in quantum illa toto ge-
nere peccare dicuntur. Reliqua in definitione
verba præter causæ proximæ, & partis affectæ
determinationem differentiam constituunt spe-
cificam.

Hinc rejectio dicitur per os ad differentiam
illarum sanguinis excretionum, ubi per alia
loca, qualia sunt; nares, alvus, uterus, me-
tus uterarius, vizque minus solitæ, ut oculi,
aures, papillæ mammillarum, cutis pori &c. san-
guis exit.

Additur ulterius, hanc sanguinis rejectio-
nem fieri cum tussi ex pulmonibus, atque sic
discretam eam volumus à vomitu cruento san-
guinem undecunque in ventriculum trans-
misso.

Sequitur porro citra inflammationem, ut
excludatur Pleuritis & peripneumonia, utpo-
te in quibus sanguinis illa expositio hisce affe-
ctibus etiam familiaris, Hæmoptyscos nomi-
ne ob inflammationem præsentem neutiquam
salutanda.

Ultima verba à vasorum pulmonalium aper-
tione p. n. ortum habens, causam hujus sym-
ptomatis proximam una cum parte affecta in-
nuunt.

Etenim cum Affectum Præsentem sympto-
matibus annumerandum superius censuerimus,
hæc vero in ordine ad causas à Morbis depen-
deant, ut à corpore umbra, secundum ea quæ
tradidit Galenus, atque uniuersa Ejus Inter-
pretum caterva. Sanguis præterea secundum
naturæ leges in vasis detentus ejici p. n. ne-
queat, nisi eadem vasa præter naturam appe-
riantur. Hinc consequens est causam Hæmo-
ptoes Proximam esse vasorum pulmonalium
morbum organicum, quem apertionem eo-
rundem præternaturalem dicunt. Et quando-
quidem tria sint apertionis vasorum genera. A-
nastomosis puta, Diæresis atque Diapedesis,
priora duo magis erunt inculpanda, infonte
relixa diapedesi, eo quod transfusio non suf-
ficiens videatur sanguini confertim erumpenti.
Causarum remotiorum nomine veniunt om-
nia illa, quæ valis vel *ἀνατομία* vel *διapedesis*
inducere apta sunt, quæ quamvis sint innume-
ra, commode tamen in Internas & Externas
dispecuntur, illæ potissimum sanguinis, in quan-
tum ille vel copia vel acrimonia peccat, ge-
nerationi inserviunt, ita tamen ut non planè
excludantur quæ sanguini ni motum præterna-
turalem concitare possunt, & fere tribus po-
terunt includi Classibus, Rerum nimirum Non-
naturalium & Præternaturalium.

Inter res naturales occurrit 1. Temperamen-
tum calidum & humidum, calidum & siccum,
quoniam illud sanguinem quantitate, hoc eun-
dem qualitate peccantem producere potest.

2. Ætas præcipue Juvenilis tum ratione sui
tum ob commissos indixta errores in hac æ-

tate frequentiores iisdem vitiis contaminatum
sanguinem generans.

3. Idiosyncrasia in peculiari partium affecta-
rum debilitate, vel jure hæreditario vel aliun-
de contracta consistens.

Rerum nonnaturalium agmen ducit aer ca-
litate excedens, sive ipsi adjuncta sit humidi-
tas, unde sanguis copiosior, sive siccitas, un-
de acrior idem evadens, vasis diutandis ap-
tus redditur. Spectat huc quoque Annitæmpus
Vernum pariter atque æstivum, quæ si sine
constantia, prout loquitur Hipp. l. 3. Aph. 8.
id est, si statum naturalem retineant, itidem
sanguinem vel augetur, vel acuit, adque
notum impetuosiorum propensionem concu-
liabunt. De Juvene Alcmariano quorundam tem-
pore verno Hæmoptysin passio, exemplum ha-
bet P. Forest. l. 16. obs. 11. itemque aliud in alio
instante vere periodice sanguinolentum sputum
ejiciente. Obs. 22. ejusdem lib. ubi similem cau-
sam ex Amat. Lusitan. Cent. 2. Curat. 13. Ange-
li cujusdam de Prato dicti, viri singularis eru-
ditionis allegat. Succedit cibus & potus qui si
vel copiosius assumantur, aut vero tales, qui
acredinem & huic affines qualitates junctas
habent. Et cibi quidem acres, multis aroma-
tibus ac sale nec non muria conditi, aceto ma-
cerati, carnes ac pisces fumo indurati, Nimi-
um generosioris potus usus, aquæ item salis,
nitrosæ similibusque impuritatibus scatens.
Spectant huc ratione assumptorum medicamen-
ta acra, imprimis crebrior aloeticorum usus,
nec non vomitoria fortiora adhibita.

Sequitur jam Motus corporis vehementior,
vim valis aliquando incitans, ut, sunt clamor
validus, efflatio immodica illorum, qui tubæ
canunt, vel lituo aut cornu, saltus, cursus, e-
quitatio, gravioris ponderis elevatio, nimius
conatus in excernendis alvi fecibus, fætuve
excludendo.

Ex Animi affectibus illi potissimum hic incu-
sandi, qui vel sanguinem cum spiritibus nimis
exagitant, vel vero circa cor eundem detinent
nimirum iracundia præpensis, tristitia item ac
mæror.

Suppressæ demum consuetæ evacuationes san-
guinis per nares, hæmorrhoides, uterum; in-
termittente solennis venæsectio, causam & occa-
sionem huic evacuationi præbere, & Historiæ
Medicæ atque quotidiana experientia sufficien-
ter edocent.

Ex Rebus præternaturalibus huc faciunt In-
temperies calida vel totius, vel viscerum prin-
cipaliorum, plethora, sanguinisque copiosa,
nec non ejusdem effervescencia immoderatio,
defluxiones ad pulmones, humorum præcipue
acrium, salinorum, vomitus vehementiores
palpitationes cordis &c.

Causis succincte quidem ad sufficientiam ta-
men ni fallor in medium adductis; Proximum
nunc est, partem affectam determinare. Illud
vero adeo difficile non erit, quin ex superio-
ribus jam dum innotescere potuit. Pulmonum
nempe hic laborare vasa sanguinea non est ut
quis dubitet.

Cum autem duo, ut in aliis membris, ita &
hic, sint vasorum sanguinem vehentium gene-
ra, venæ nimirum & arteriæ, hand injuria am-
bigeret quis, num utraque hæc vasa in Hæmo-
ptysi

tyli veniant incusanda & sane officium venarum, pariter ac ipsum sanguinis motum consideranti non deerunt argumenta, quibus venæ in hoc quidem delicto possent excusari, si per solius *arteriarum* motum apertio acciderit. Alit vero cum *apertio* hic etiam nonnunquam obvenire superius innuimus, huic vero non immunes sunt venæ, consequens est nec has omni omnino vacare culpa. Ita quoque sanguis excretus floridus, fervens ac tenuis, arteriam potius pati non obscure posset colligi; attamen cum etiam nonnunquam sanguis cum tussi excretus, dictis qualitatibus destituatur, nec venæ ab arteriarum consortio partium affectarum, in sputo sanguinis rationem habentium, erunt excludendæ.

Signa Diagnostica Pathognomonica suppeditant, Essentialiter inhærentia. Ipsum videlicet sanguinis sputum in sensus incurrit, quibus ex consequentibus se associat tussis, discriminans hoc symptomata à vomitu sanguineo. rectione ejusdem sanguinis per os, ex faucibus gingivis Palato &c.

Hæc cœu generalioribus præmissis, specialior casus propositi Resolutio nunc aggredienda erit, ubi quæ de Prognosticis atque Therapia dicenda restant, simul adjiciemus.

Præsentem ergo ægrum Hæmoptysi laborare proprie & specialiter ita dicta, non saltem ipsa rejectio, sed & huic adjuncta tussis, sufficienter evincunt.

Ortum autem eam duxisse plenitudine sanguinis in *ipso* rapti, atque sic arteriarum pulmonalium non tantum osticia aperientis, sed & fortassis oscillis arteriarum dictarum diæresin induxisse, non tantum ætas, sed & temperamentum & reliqua signa, ab antecedentibus essentialiter inhærentibus, nec non consequentibus desumpta, evidenter satis demonstrant.

Hinc in ætate Juvenili constitutione corporis sanguinea præcessit dolor capitis pulsans in *ipso* conciat osanguine, in arteriis utriusque meningis. Rejicitur post per os libra sanguinis, ob vasa muscula aperta.

Sanguinis *Floridi*, qualis est ille maximè, qui per arterias fertur. Spumosi, ob per mixtum; propter agitationem ejus à pulmonibus factam, ærem.

Sine dolore, sunt enim pulmones sensus admodum obtusi, quo vasa plenariè destituuntur.

Breve interjicitur temporis intervallum, ob læsionem arteriarum lævium non exiguam ob eandem causam.

Nares stilant sanguine, ob turgescentem sanguinem copiosum ad ad superiora raptum, atque valorum sanguineorum, in narium interiora membranæque pituitarias anteriores terminantium, osticia aperientem.

Sublequitur virium debilitas, spiritibus vitalibus, in quibus robur, cum rejecto sanguine perditis.

Dolor pectoris gravativus à distensione, & huic post factam reiectionem sanguinis subsequente subsidia sui statim pulmonum.

Tussis, à sanguine extravasato, respirationis organa molestante, adque hanc expulsiorem irritante.

Difficilis respiratio, ob angustiam bronchio-

rum aspectu arteriarum, quam idem sanguis extravasatus illis incumbens efficit.

Absit febris propter inflammationem pulmonum massæve sanguinæ turgescens effertur vasculationem adientem.

Quandoquidem ergo æger de salute sua sollicitus, eventum morbi desiderat. Generale ipsi vel potius adstantibus erit communicandum prognosticon quod tradit Hipp. nolter sect. 4. aph. 25. ubi sanguinem, inquit, superne; qualicumque sit, efferre malum. Periculo enim nunquam vacat hæc per os facta sanguinis expulsiō, quippe cum ob vasa pulmonum lassa & difficulter curabilia: ultus fere inmedicabilis & hoc insequentem tabem, aut vero dissipatis, cum sanguine copiosius rejecto, spiritibus, mortem inducere possit. Non tamen omnis plane abjicienda spes erit, tunc enim demum res pene conclusa est, Authore eodem Hippocr. si prout habet Aphor. 4. sect. 5. copioso sanguinis fluxui convulsio aut singultus supervenerit. Adhuc vero majus imminet periculum, ex mente ejusdem Medicinæ Parentis sect. 7. Aphor. 15. si sanguinis sputum exceperit puris sputum. Ex puris enim sputo subjicit aph. sequente Idem, tabes & fluxus, postquam autem sputum retentum fuerit, moriturus. Quibus funestis symptomatibus cum æger nolter hactenus fuerit immunis, neque enim aut singultus aut convulsio huc usque fuit observata supervenisse, nec etiam inter rejecta aliquod purulentæ materiæ vestigium conspectum. Hinc aliquid adhuc residuum est, quod dejectum ex mortis metâ animum aliquo adhuc modo erigere valemus. Quod si his superaddere quis velit sect. 7. Aph. 37. per nos utique licebit, quanquam hic Aphorismus secundum literam solamen potius afferat iis, qui sanguinem evomentes a febre sint liberi.

Ad curationem nunc ut accedamus animi fert sententia. Illa vero maturanda est, auctore Tralliano, qui *in* inquit, *di* *ne* ægro ex nimia profusione sanguinis alia graviora symptomata superveniant. Sed ne, remedia præscribentes, imitemur Empiricos, qui uno collyrio, ut habet proverbium; omnes oculorum ægrotudines curare satagunt; juxta Medicorum Dogmaticorum cynosuram; medendi inquam methodo, utemur, & juxta Indicationes curam instituemus.

Cæterum cum Hæmoptysin superius inter symptomata referendam dixerimus, hæc vero accuratè loquendo neutiquam indicent, sed omnis remotio eorum in morborum, quorum Symptomata sunt, & quos cœu umbra corpus sequuntur, remotione consistat. Morbum autem, præsentem hunc nostrum affectum producentem, apertionem p. n. valorum pulmonalium supra quoque innuimus, hinc Curatio eo dirigenda erit, & juxta triplicem Indicationem, curatoriam scilicet, præservatoriam & vitalem. Quarum illa morbum, illa causam; hæc vires respicit, procedendum, nisi fortassis symptomata nimis urgens, à sueta aliâ via recedendum esse suadeat.

Curatoria ergo indicatio; id quod p. n. apertum, claudendum & obturandum esse jubet.

Præservatoria; causarum remotionem præstat, atque adeo sanguinem copiam & motum

peccantem corrigendum, hinc non tantum sanguis minuendus, atque ad pulmones ruens alio invitandus, sed & omnia, quæ nimis fluxilem reddere, aut ad *hyperbæ* disponere poterant illum, removenda, nec negligenda, quæ parti recipienti, robur conciliando, assuantes humores excludunt.

Vitalis indicatio vires, quæ in hoc affectu non levem sentiunt jacturam, spectat, quarum restitutio, ne æger dubii eventus exponatur periculo, maturè procuranda.

Hæ autem convenientes cum sibi poscant auxiliorum materias, è consuetis tribus Fontibus, Chirurgico videlicet, Pharmaceutico ac Diætetico erunt illæ depromendæ.

Ex Chirurgico Fonte præsto est generosum illud ac omni Hæmoptysi conveniens remedium, Venæsectio, statim in principio administranda. Permittunt eandem Ægri constitutio, vires non plane dejectæ, ætas, idque generis alia. Secetur ergo Mediana vel Basilica dextri lateris, & quidem partitis vicibus, ne vires præter spem nimium dissolvantur, & ravulsio sit efficacior. Sanguis autem ad $\frac{3}{4}$ vel $\frac{2}{3}$ singulis vicibus emittatur. Venarum in talo quoque sectionem multum levaminis afferre posse testantur Prædici, at magis præsertationis quam curationis gratiâ illa instituitur.

Nec negligenda insimul, ubi opus fuerit cucurbitularum, vel cum vel sine scarificatione, in cervice, scapulis ac pedibus, affixio, extremorumque tum Frictiones, tum Ligaturæ. Expediet tamen venæsectionis prius successum circumspicere expectare, quam ut naturam officiosè turbemus.

Ex Fonte Pharmaceutico sese nobis sistunt (1) alvum leniter subducentia; Qualia sunt, Manna cassia recenter extracta, Syrup. rosar. violar. solut. pruna laxativa, aliaque id generis mitiora. Ex quibus & aliis varia formularum genera concinnari possunt. Præ aliis insignem meretur laudem Syrupus Magistralis Riverii, quippe ex moderate refrigerantibus, qualia hic requiruntur, paratur, aliquoties exhibitus.

\mathcal{R} . Syrup. magistral. Riverii cap. de sputo sanguinis descripti $\frac{3}{4}$ S. *Zarier-Casse auf einmal.*

Nec inutile fuerit Enemate ali caut. simili evacuationem simul & alterationem humorum intendere aut moliri.

\mathcal{R} . Rad. Nymph. $\frac{3}{4}$ Fol. polygon. branc. nrsin. violar. an. $\frac{1}{2}$ Mi. Sem. papav. alb. portulac. ana. $\frac{1}{2}$ anis. fœnicul. an. $\frac{1}{2}$ Fol. sen. Alexandr. f. f. $\frac{3}{4}$ vi. Coq. in f. q. Aq. fontan. collat.

\mathcal{R} . $\frac{3}{4}$ x. Add. Cass. extract. pro clyster. $\frac{3}{4}$ ol. violac. $\frac{1}{2}$ Sal. nitr. $\frac{1}{4}$ M. F. Clyster.

S. *Clyster laulich. in appliciren.* Hinc ad fervidioris accriorisque sanguinis alterationem, Tinctura flor. papav. thead. de consil. Timæi à Guldenklee l. 2. Obs. medicinal. cas. 15. p. 104. miva cydonior. & syrup. myrtino dulcorata, cum fructu exhiberi poterit, aut præscribi sequens aut simile Julapium.

\mathcal{R} . Aq. portul. papav. rhæad. an. $\frac{3}{4}$ vi. Sanguin. Dracon. tenuiss. lxxv. $\frac{3}{4}$ Syrup. papav. rhæad. $\frac{1}{2}$ de ros. $\frac{3}{4}$ m. f. l. a. Julepus.

Julep offi. dantun in trincken. Tempore somni non inconueniens fuerit ægroto nostro Emulsionem ejusmodi propinare.

\mathcal{R} . Sem. 4. frigid. major. an. $\frac{3}{4}$ Amyd. dulc. excordicat. $\frac{3}{4}$ Aq. Alkekeng. papav. alb. plantag. portul. an. $\frac{3}{4}$ l. Emul. cui add. Magist. ocul. cancer $\frac{1}{2}$ corall. rubr. Margarit. ppt. an. $\frac{3}{4}$ Julep. rosar. & violar. an. $\frac{3}{4}$ M. S. *Kenblende Krafft. Milch aus zmyrmal.*

His ita præmissis totis viribus eo allaboremus, quo vasa, antequam inflammatio, difficilem & periculosam relinquens medelam, accedat, statim occludantur. Testis est Galenus qui, 1. Method. Med. c. 13 & 14. scribit, se omnes curasse, qui è pulmone sanguinem expuentes, mox primo die ipsius opera usi fuerant, qui vero post biduum aut triduum Eò usi essent, horum aliquos sanatos esse, quos autem phlegmone occupaverat, ut febricitarent, eorum sane nullum perfectè restitutum fuisse. Medicamenta vero illud præstantia, sunt & recensentur varia apud varios, selectiora sunt: Rad. Symphyt. major. tormentill. pimpinell. plantag. Herb. sanicul. symphyt. plantag. portulac. heder. terrest. & omnia præparata ex plantag. portulac. heder. terrest. quæ palmam reliquis præripiunt. Flores hyperic. rosar. leilid. violar. bugloss. Gummiota, ut Gummi arabic. tragacanth. hederæ arboreæ, thus pro consolidatione valde conveniens. Semina quoque quædam, quæ simul anodynâ vim habent, ut semen papav. alb. & hyoscyam, sed cum insigni polleant vi stupefaciendi, non nimis frequenter, nec majori etiam in copia sunt usurpanda. Ex Mineralibus, lapis hæmatites, illiusque Tinctura, nec non medicamenta legitime ex sulphure parata. terra item sigillata, bolus armen. & ex his parata vel Officialia vel Magistralia, possunt enim ex hisce & similibus sequentes aut aliæ fieri formulæ.

\mathcal{R} . Conserv. rosar. antiq. pimpinell. symphyt. an. $\frac{3}{4}$ Rad. consol. major. condit. Cichor. condit. an. $\frac{3}{4}$ Croc. mart. adstringent. $\frac{3}{4}$ Tinct. mumiz. $\frac{3}{4}$ Syrup. de hispidul. q. s. M. f. F. Electuarium. *Katmerge, einer Castanien grob in essen* Non inutiles quoque erunt hæ Rotulæ, quæ præparentur.

\mathcal{R} . Lapid. hæmatit. ppt. $\frac{3}{4}$ Croc. mart. adstringent. Bol. armen. an. $\frac{3}{4}$ Ocul. Cancr. ppt. $\frac{1}{2}$ f. c. f. q. sacch. aq. portul. & papav. alb. solut. Rotulæ. S. *Kuchlein gegen das Blut. Aus messen offiers in gebrauchen.*

Vel \mathcal{R} . Pulv. Heurn. ad sput. sanguin. anonym. an. $\frac{3}{4}$ ocul. Cancr. $\frac{1}{2}$ Sem. cerefol. $\frac{3}{4}$ cum rotulis diacodu f. pulv. S. *Aulter alle 6. Stund. 2. oder 3. gute Messerspis voll mit Rosel Basser in gebrauchen.* Sequens etiam succus cum fructu adhiberi poterit.

\mathcal{R} . Aq. Plantag. equiset. burs. postor. an. $\frac{3}{4}$ Syrup. portul. symphyt. Fern. an. $\frac{3}{4}$ Tinctur. Sulph. vitriol. $\frac{3}{4}$ M. S. *Sessi, gegen das Blut-Ausmersefel voll. auf einmal.* Nec non Emulsio partem affectam corroborans viresque instaurans, hunc in modum fieri conveniet.

\mathcal{R} . Amygd. dulc. excort. $\frac{3}{4}$ sem. 4. frigid. ana. $\frac{3}{4}$ papav. alb. $\frac{3}{4}$ cum Aq. decoct. hord. q. f. f. Emulsio ad $\frac{1}{2}$ l. i. sacch. perlat. q. s. edulc. S. *Staritzende Mandel-Misch nach und nach in trincken* Cancr. vivi una cum putaminibus, sed novellis molliusculis, inmortario cum ejusculo carnis contusi, & percolati, succum præbent, & viribus, restaurandis & affectui Hæmoptico idoneum, si nimirum

numquam sæpius ad ℥i. agro propinetur. Sic Gelatina G.C. qua confortandi qua glutinandi virtute prædita, in hoc affectu summa est efficacia.

Quod si autem hæc, quæ hactenus sunt proposita aliæque, quæ addi adhuc possent, præter ipsam omnem paginam non sint absolutura, in casu necessitatis, Authore Rostacio l. 3. cons. consultat. 2. p. 141. ad narcotica, utpote sputum sanguinis miraculose lententia, transire licebit, sed illa cum ratione tanquam æquissima lance sunt perpendenda, ne impetive & viribus pene sepultis in usum trahantur.

Quo autem vasa eo promptius obturantur, insimulque impediatur, ne alia denuo ingruant graviora symptomata, de sanguine grumoso dissolvendo sollicitus sit Medicus. Quapropter in præsentis Agro cum sanguinis impeditus aliqua ex parte cessat, ejusque tamen portiones concretæ adhuc rejiciuntur, omnis nostra cogitatio eo dirigenda est, ut reliquæ illæ vasa pulmonis relicta primum resolvantur, cum sanguine misceantur, vel per expectorationem educantur. Necessarium itaque etiam in usum vocare, quæ sanguinem coagulatum & concretum dissolvere valent. Qualia imprimis sunt: Aq. chæresol. Alkekeng. flor. hyperic. bellid. utriusque, burs. pastor succus urticæ, qui summe pronicius censetur ita, ut etiam pro deploratis habitibus, hujus usu curati fuerint, vel in ipso paroxysmo, vel post, cessante fluxu, exhaustus, test. Anat. Lusitan. Cent. 6. spermo ceti. rhabarb. sanguis hirci, Mumia, diaphoret. Ex quibus ut & aliis, huic scopo inservientibus, pro desiderio ægrotantis varia possunt parari formularum genera. Unam vel alteram patientis nostri constitutioni convenientem apponere placet. Ad dissolvendum itaque sanguinem grumosum.

℥. Syrup. papav. errat. flor. bell. rubr. an. ℥. iil. Aq. Alkekengi. plantag. Chæresol. an. ℥. β. Essent. o. ul. Cancr. ℥. iβ. Misc. pro duobus dosibus.

Vel ℥. Ocul. Cancr. Corall. rubr. an. ppt. ℥. β. Sperm. cet. non rancid. Mumiz, rhabarb. an. ℥. i. ra. p. pro tribus dosibus in seq. Aq. sumendus.

℥. Aq. Chæresol. scabios. card. bened. an. ℥. i. Syrup. flor. bell. papav. an. ℥. β. Dum hæc sunt, poterit æger ad materiæ uberiorem expectorationem sequentia usurpare.

℥. Oxymel. pectoral. Horst. ℥. iβ. Essent. hypericon. ℥. iβ. aq. chamædryos, hyperic. plantag. chæresol. an. ℥. β. m.

Vel ℥. syr. de jujubis portulacæ an. ℥. i. è succo scabios. violar. an. ℥. vi. sperm. ceti non rancidi ℥. β. aq. aq. hæmopt. Dornereil. ℥. i. m.

Dixta tandem bis omnibus succedit, & ægmen claudens salutarem vitæ ciborum que præscribit normam quam merito æger noster observare debet, ne sæpiissime hocce malo affligi velit. Ratione *vitalis*, aërem suadenus agro nostro temperatum, aut moderate ad siccum & frigidum inclinante. Ratione *naturalis*, cibos initio tenues, frigidiore & vi emplastica, seu glutinandi pollescentes, ut pote cremorem hordei, orysam lacti incoctam, pulmenta ex milio, avenâ amilo &c. lentes fabas, pruna Hungarica acida juscula, & pultes amygdalinas admixtis pineis nucleis, pyra. cydonia mala, mespila, lactucam, portulacæ, in diviam, cicorium, carnes agninas, vitulina, vervecinas, imprimis extra pedes, aures, &

capita horum animalium. Potus ordinatus sit cerevisia tenuis rite excocta. Extraordinarius vinum aquosum rubellum, hydromel aqua hordei, lac amygdalatum, lac vaccinum. eburyratum caprilum; quo solo se curatille refert Trallianus sanguinis sputum.

In *animali*, somnus & vigilia non excedant mediocritatis limites. Motus nimius præcipue pectoris. per clamores & cantus, fugiatur. Ab affectibus animi vehementioribus absteineat. *lib. A. I. chælis Praxi Clinicæ speciali.*

Observationes.

Vir quidam Patritius hyeme media, derepente in copiosissimam sanguinis floridi & pulmonibus rejectionem incidit, ita ut una nocte, sanguinis heminas plusquam quatuor ore excreverit, unde pallidus & prope sine viribus redditus, pulsu exiguo & interfecto voce tremula, deliquis crebris oppressus, moriturus in horas sperabatur. Ad huic nos vocati, quum graviter urgeret affectus, huic protinus ac celeri manu succurrendum duximus: itaque protinus è cubiculo turbam omnem, quæ n. antea officii causa affinium & sanguine conjunctorum aderat, locum dare jussi, forasque prodire, præter eos qui ægro necessarij erant: ignemque qui tum ob frigoris inclementiam succensus n. ultus in cubiculo erat, extinguï jussi. Mox vero quum adstricta esset alvus ægro, mollem clysterem indere jubeo: atque interea dum apparatur clyster, post am devorandam atque gargarisandam do. Silentium ægro inpero, ut ne quicquam loqueretur, sed iuribus quæ tibi opus essent significaret, atque etiam ut ne magno respiratu uteretur: nam & loquutio & respiratio vehemens, thoracem atque pulmones exagitant & ob id sanguinem promoveunt. Protinus vero clystere soluta alvo, sanguinem è vena media dextri brachii antennis sectione jubeo, non affatim, sed bis eodem die, quatuor inter m. m. & alteram sectionem interpositis horis. Sic namque jubet Galenus, & eo pacto minus avertitur sanguis, servaturque virtus: quin & crassino ejus dici iterum, sed leviter sanguinem detraximus, quod & æger viribus valeret, florenti ætate esset & copioso sanguine abundaret. Ubi hæc peracta sunt, mox vinculis fortioribus crura, brachiaque deligavimus, & multa postea os colluere, ac portionem etiam devorare jussimus. ut si quid intro concreti sanguinis esset, dissolveretur: multos namque thrombos deorsum clysteris usu deiecit sanguine in ventriculum per gulam delabente: frictionibus etiam crurum ad diversionem usi sumus: quum vero sanguis nimium profunderet, sistere eum ante omnia potionibus datis adstringentibus glutinantibus & refrigerantibus coacti sumus. Hæc itaque potione bis, ter etiam in die data, usi fuimus.

℥. Lapid. hæmatit. cum aqua plantag. lot. corall. rubr. similiter loti. an. ℥. iil. terr. sigillat. ℥. iil. margarit. splendid. ℥. iβ. sem. plantag. arillorum uvar. exsiccat. an. ℥. i. m. redigantur omnia in tenuissimum pollinem, adde troch. de carabe ℥. i. atque ex hoc pulvere ad sistendum sanguinem efficacissimo ℥. iβ. ex aq. plantag. & peculi solar. & ℥. iil. syr. de ribes da. jussi: quum adhuc sanguinis ingens profusio perstaret, compescendam validiore præsidio censuimus. Dedit igitur sequentem potionem.

ham Conditum huiusmodi ad virium robur præscripsi.

℞. Conserv. rosar. antiq. ℥ii. conserv. symphit. mai. margarit. elect. corall. rubr. loti cum aq. ros. & subtiliss. pulver. an. ℥i. man. ch. perl. ℥i. conserv. bugl. ℥i. M. cum sacch. opt. F. conditum auri foliis coniectum. Interdum Electuario ex margaritis confecto utebar.

Extra vero ad sanguinis motum compescendum cervici & collo, tum & pectori linimenta admovi, & unguento hoc sum feliciter usus.

℞. Ol. mastich. cotoneo. & myrtill. an. ℥i. sevi hircini aq. rosar. diluti ℥i℥. pulv. pilor. leporis minutissime incisorum, corall. rubr. hol. armen. sang. drach. oliban. mastich. an. ℥i. ceræ alb. q. s. M. F. unguentum, quo thoracem illiniri & colli atque cervicis partes jubebam; clysteres lenes ad excrementorum subductionem (imbecillus namque viribus erat) parari huiusmodi jubebam.

℞. Decocti caponis lbi. in quo bulliat hord. p. sem. melon. cum cortice contus. ℥. colatura dissolv. mell. rosar. colat. ℥ii. vitell. ovor. numero ii. sacch. rubr. ℥i. M. F. Clyster. interdum catholici ℥i. nonnunquam vero caliam cum saccharo admiscebam. Quoniam vero bilis multa sanguini mista fervorem & profusionem non parum augebat, hanc confestim nulla expectata mora evacuandam duximus; hæc data portione.

℞. Rhei. elect. subtiliss. pulver. ℥i. rhei elect. in aq. endiv. cum tantillo cinnamom. per noctem infusi & mane fortiter expressi ℥iiii. (quia obstructa hic vir viscera habebat, infusum etiam rhei dare visum est, ad obstructions apericendas) syr. ex infus. rosar. ℥ii. decocti pectoralis. q. s. fiat potio.

Interdum etiam ad sistendum sanguinem confectio de Ilyrace usus sum, cujus hæc est descriptio.

℞. Passular. exacinar. & cribro setaceo transmissarum ℥i. liquirit. ras. & subtiliter pulveriz. ℥vi. xyloaloes, nucis myristica. an. ℥ii. gr. xv. cumini tantundem. Ilyrac. calavit ℥i. hol. arm. præp. ℥i℥. sacchar. in aq. beton. dissolut. q. s. F. Electuarium in tabulis.

Hæc methodo, hisque cum paucis aliis ejusdem generis præstidiis, magna cura & sedula opera abhbitis curatus est hic vir præter nostram & omnium opinionem, nutu Dei opt. max. qui sanat languores nostros. *Franciscus Valeriolus. obs. 2. lib. 2.*

Virgo quædam quadraginta annorum à sex circiter annis valetudinaria, sæpiusque sanguinis exiguum cum pituita expuere solita, tandem circa secundam noctis horam dum lateri dextro incumberet, ob maximam copia in os & asperam arteriam, affluentem sanguinem, à somno excitata, de suffocatione repentina periclitabatur, tussi & vomitu quasi, copiosissimum sanguinem excreavit. Accedens summo mane ex relatis & rejectis, venam pulmonum referatam à fluxione forte salsa, quam referebat in ore sensisse, vel ob plethoram, è qua tanta sanguinis copia prodierit, cognovi, quapropter præscripsi ei pulverem sequentem, de quo cum brodio statim coch. i. & postmodum cum syrupis portunculam sumat. cin. sem. hyosciam. an. ℥i. m. s. pulvis tenuissimus.

Andr. lib. 3.

℞. Sacch. ros. tabul. ℥ii. corall. rubr. ℥i℥. succ. Item. ℞. Syr. jujub. & myrtill. an. ℥i℥. m.

Circa octavam matutinam, me præsentem, dum lateri dextro incumbere conabatur, sanguinis copiosa profluvio, cum tussi, vomitu, horrore, & virium prostratione, eodem plane modo rediit, ut prius nocte ei accidebat: repræsentabat sanguinem è pulmonibus elapsum, spumofum & rubicundum, unciarum circiter quinque, postmodum expuebat cruenta. Circa tertiam exhibui ei julepum ex syr. præscriptis cum aq. plantag. & portul. q. s. Iost ænanam sumpsit julepum ex syr. de plantag. cum aq. plantag. rotarum parum & portulac. gargarizavit prius os aceto rosar. & aq. purasili cuti & postmodum frequente, loco potus bibit lac amygdalinum. Post mediam noctem hora secunda eodem modo rediit expuitio, cum tussi & conatu vomendi dixit se sentire semper ardorem in gutture præcedere, subsequente ita- tim copioso sanguine salso. Sumpsit de pulvere præscripto, sed nihilominus horis duabus elapsis, rediit cruenta illa expuitio, cum horrore & virium prostratione: illo die mane ebibit portunculam ex syrup. plantag. & portulac. an. ℥i℥. syrup. myrtill. ℥iiii. terr. lemniz veræ ℥i. aq. plantag. & but. pastoris, an. q. s. Postea jecori adhibita fuit cucurbita magna sine scarificatione bis reitera, ante somnum bibit hunc julep.

℞. Asi. plantag. & portul. an. ℥i℥. syr. plantag. & portulac. an. ℥ii. syr. papav. alb. ℥i℥. terr. lemniz veræ ℥i. m. Illa nocte, feliciter satis dormivit, nec expuitio illa sanguinis copiosa rediit, mire medicamentum hoc prædicabat, mane bibit coch. i. pulv. præscripti cum syr. de plantag. & portulac. reiterata, tunc cucurbita sine scarificatione in regione hepatis. Sub noctem bibit julepum priorem cum syr. papav. placide quievit, nec amplius excreavit sanguinem, ut grani sanguinis e corpore expurgarentur, & dissolverentur, præscripti potionem hanc.

℞. Rhei subtiliss. pulveriss. ℥℥. syr. ros. solut. cum infus. rhabarb. & maniz elect. an. ℥vi. cum aq. plantag. & portulac. q. s. Portio, addendo aq. cinnam. ℥ii. ter copiose deiecit.

Tandem ut sanguis si quis in pulmonibus remansisset facilius excreari posset, præscriptum fuit hoc Lohoch.

℞. Syr. de portul. ℥i. de plantag. ℥i℥. tab. diamar. frigid. ℥i. terr. sigill. lemniz veræ & pulv. supra præscript. an. ℥i℥. F. Lohoch. de quo lambat frequenter cum baculo liquirit. Postea præscripsi tabulas sequentes, de quibus singulis noctibus unam vel duas in ore, ut sponte diffuerent, continuit.

℞. Sem. hyosciam. alb. subtiliss. pulveris. ℥ii. gummi arabic. ℥i. corall. rub. ℥i℥. viol. rec. numero x. succ. berber. ℥ii. aq. ros. & plantag. an. q. s. sacch. ℥ii. F. tabulæ. Hisce omnino restituta est: nec ab aliquot septimanis quicquam cruenti in sputo apparuit. *Helix Platerus. observ. lib. 3. pag. 789.*

Quidam profuse sanguinem purum aliquot dies cum tussi per os effundebat, idque sequente mox summa imbecillitate cum vitæ discrimine. Dedi illi troch. de alkikengi cum opio, ut aliquot noctes cum lacte caprino dissolutos hiberet. Profuerunt paucum, sic- que

que à mortis imminenti periculo, vel subsequenti phthisi, uti fere ea sequi solet, & à lethali morbo sanus evasit *Felix Platerus obs. lib. 3. pag. 792.*

Quædam tusiendo excrebat sanguinem satis copiose, catarrho simul affecta, aivusque ei contipata erat: valde phthisin metuebat, quam venam ruptam in pulmonibus sequi solere, ex lectione practici cujusdam Germani didicerat, adeo ut vix eam consolari potuerim: exhibui ei manna ʒiʒ. cum jusculo, quam & pectori prodesse dixi: excrevit placide & copiose. Sanguinem postea detraxit & ediana; jussi mane & vespere sumere tabulas in hæmoptoica passione utiles ex semine hyosciami: in præcedente subiectione descriptas. Desit sanguinis excretio, sed mox rediit; jussi tabulas repetere, idque factum est tertio: sed post tabulatum utrum continuatum nihil amplius cruenti apparuit *Felix Platerus obs. lib. 3. pag. 793.*

Mane & vespere si sanguinem expueret, capiat ʒi. phion. persic. aut tantumdem nostri electuarii ad sputum sanguinis quod est mirabile.

ʒ. Sem. Hyosciam. alb. papav. alb. an. ʒx. terr. sigill. corall. rubr. an. ʒv. sacch. rosar. antiquiss. q. s. F. Electuar. Helidius de Paduanis. consil. 7. lib. 3. consil. Cratonis & aliorum medicorum à Scholtizio editorum.

Novi nostratem quendam Lemovicum Hæmoptoicum, qui cum alternis temporibus multum rejectasset sanguinem nec ullis potuisset remediis fâlescere, ad Iulium Cæsarem Scaligerum, Medicorum suæ tempestatis facile Principem, contugit, ex quo pulverem accepit; hujus formulam, quia mihi communicavit, libet hic adscribere.

ʒ. Spodii, ros. rubr. bol. arm. terr. sigill. hæmatit. an. ʒv. corall. rubr. carab. margarit. non perforat. an. ʒiʒ. gummi arabic. tragacanth. an. ʒii. sem. papav. portulac. sem. ros. rub. sem. arnogloss. C. C. combult. an. ʒiii. acaciaz. succi barb. hircin. succ. liquirit. an. ʒii. amyli torrefacti ʒiii. terantur, misceantur, & fiat pulvis, cujus dosi sint ʒiii. Datur cum aqua pluviali.

Hoc remedium tandem descriptum reperi apud Serapionem cap. 25. tract. 2. Antonius Valerius. ad cap. 27. lib. 1. De morbis intern. Jac. I. Jollerii.

Consiliarius quidam Monspelienfis circa novem incidit in sputum sanguinis spumosi cum tussi, & magnam illius quantitatem excrevit tota nocte. Sequenti die mane vocatus, venæ sectionem præscribo ad ʒviii. Deinde julepum ex aq. plantag. syr. de ros. sic. & sale prunellæ postea injectus fuit clyster cucurbitula admodum regionem hepatis, lohoch. incrassans & adstringens usurpatum: hora decima iterata fuit venæsectio ad ʒvi. Syrupus ex succo portulac. etiam præscriptus: post meridiem rediit sanguinis sputum, magna copia scilicet ad ʒbi. iteratus fuit julepus, oxycratu admodum testibus, epithema refrigerans hepati, linimentum refrigerans eidem parti, lumborum regionem, cucurbitula hypochondriis frequenter iterata, & circa vespere sanguis denuo missus ad ʒvii. præscripti julepi ex infusione millefolii. &c. qui magnæ sunt efficaciz in hunc modum.

ʒ. Millefol. fl. albo & luteo an. Mii. rad. tormentill. rec. & cum fol. n. haberi possit, in manus siccat ʒi. pimpinell. maj. M. 1. conserv. ros. rub. ʒbʒ. aq. fontis ʒbxi. ponantur in olla vitreat quæ cum suo operculo diligenter lutetur ut vapores non expirent. coq. ponea in balneo M. bulliente per horas xvi. colatura tervecetur in vase vitreo; de qua capiat ʒvi. mane, meridiem & vespere.

Pro potu utebatur conserva ros. cum decocto hord. & liquirit, ad noctem præscriptus est hic syrupus sequens.

ʒ. Syr. de ros. sic. de succo portulac. & papav. alb. an. ʒi. M. capiat cochl. 1. Sanguis duabus horis, ita ut intra noctem tres nix abluantur, mirum in modum profuit hic syrupus, & sequenti die fuit iteratus, ut per longiora intervalla sumeret cochl. 1. Sequentibus vero diebus nihil amplius sanguinis excrevit, & omnino covaluit *Lazarus Riverius. obs. 3. c. 11.*

Vir quidam militaris temperamento languineo & biliolo præditus, triginta annos natus, ab octo mensibus incidit in sanguinis excretionem per os, quem vomitu rejecit prima vice ad ʒb. in. à quo affectu frequenti phlebotomia liberatus, est. Idem tamen vomitus sanguinis post aliquod tempus semel atque iterum recurrit, sed minori copia, & jam per intervalla sputa cruenta, & sincerum sanguinem per sputum rejecit. Hinc sequentia præscripta fuisse remedia, injectio clystere laxante aperiatur primum vena basilica cubiti dextri, deinde die sequenti vena malleoli sinistri & mittantur singulis vicibus sanguinis ʒvi. vel vii.

ʒ. Fol. plantag. M. 1. tamarind. ʒb. coq. ad ʒvi. in colat. infunde rhab. elect. ʒi. n. yobalan. citrin ʒb. santal. citrin ʒb. in express. dissolv. mann. & syr. rosac. an. ʒi. thei ʒi. F. potio, quæ detur post tridie ultima venæsectionis, die sequenti applicentur duo caustica posteriori parti cervicis inter tertiam & quartam vertebra.

ʒ. Rad. bistort. tormentill. symphyt. mai. an. ʒi. fol. plantag. pimpinell. pilotell. vinc. pervinc. an. M. 1. santal. rub. ʒii coq. ad ʒbʒ. in colat. dissolv. syr. de ros. sic. ʒiv. F. julep. pro quatuor dosibus matutinis, addendo unicuique dosi salis prunellæ ʒi.

Finis julepis, reiteretur portio purgans prædicta: addendo pulv. julapæ ʒi. & totum rhab. infundendo.

ʒ. Rad. consolid. mai. ʒi. fol. plantag. pimpinell. bugul. prunell. & pilotell. an. M. ʒ coq. cum jusculo colli vervecini, & colaturam capiat mane tribus horis ante prandium continuando per duodecim dies.

Post quartum quodlibet jusculum, capiat portionem purgantem prædictam.

Finis juleculis, utatur opiata sequenti.

ʒ. Conserv. rosar. & rad. symphyt. an. ʒi. troch. de carabe, & terr. sigill. an. ʒb. corall. præp. margarit. præp. lapid. hæmatit. an. ʒi. gummi arabic. & tragacanth. an. ʒi. cum syr. de ros. sic. F. opiata: de qua capiat magnitudinem avellanæ duabus horis ante prandium, superhibendo parum aquæ potus ordinarii, quæ erit prisana confectio ex decocto hord. & liquirit. vel aqua ferrata in qua pimpinella vel pilosella infundatur.

Utatur per quindecim dies lacte caprillo vel ovillo leviter chalybeato.

Quam primum aggressus est horum remedium uim sanguis ipsum cessavit, neque unquam amplius in toto eorum decursu comparuit neque deinceps. *Lazar. Riverius obs. 12. cent. 3.*

Præmissis venæ lectione & debita purgatione soleo maximo cum fructu singulo mane ʒss. plus minusque seminis papav. alb. cum ʒss. sacch. rosac. antiquiss. quod remedii genus compluribus insignis juvenum attulisse scio. *Hier. Mercurialis. consult. 15. tom. 1.*

In hoc casu sæpissime expertus sum magnopere profuisse semini hyosciami alb. cujus pulvis acceptus cum sacch. rosac. antiq. & syr. de portulac. solet nigrum in modum fluores sanguinis compescere. *Hieron. Mercurialis. conf. 42. tom. 2.*

Civis quidam Monspelienfis Hæmoptoe laboraverat per triennium, qua sanguinem rejiciebat per intervalla satis magna copia: tandem post multa remedia, per mensem integrum mane sumpsit amylium in aqua decoctum (& sine calce paratum) instar panatellæ; & ab eo tempore sanguinis sputo nunquam correptus est. *Lazarus Riverius observ. 11. cent. 4.*

Andrea Baillao consulis regii filio annorum viginti, magna sanguinis per os rejectio: valde pulmonibus metuitur: omni arte pulmonibus studetur: forte fortuna dum hypochondria manu blande continguntur, pulsus percipitur, ac veluti *marcus*: nec non ab hypochondriis decurrentis sanguis ac partes superiores affectantis cursus percipiebatur, ac si manus sanguis duceretur: prout partes superiores petebat, horror quidam excitabatur: at tum confertim rejiciebatur e pulmonibus: talis rejectio erat hæmorrhagiæ loco, quæ juvenibus erat familiaris. Relictis tum præsidis quæ pulmone dicabant, conversum est ad hypochondria studium. Expurgata innumera coluvie præcepta est ei rejectioni sanguinis occasio: quod notandum valde est *Guil. Ballonius lib. 1. Epid. & Ephem. pag. 62.*

Syrupus ex stercore asinino in omni rejectione sanguinis plurimum confert, Lavatur primum aqua rosac. in eadem incoquitur cum sacch. rosac. & fit Syrupus *Guil. Ballonius conf. 22. lib. 1.*

Quater in anno corpus purgandum erit sequenti bolo.

ʒss. Cassiæ rec. extract. ʒvi. rhei el. pulveris. ʒiiss. elect. diatragac. frigid. aut sacch. alb. q. s. F. bolus.

Sæpe etiam sub noctem ad lecti ingressum uti conserva rosacea expediet. Si tamen accideret sputum hoc sanguinis repere, commodum videretur post blandam alvi mollitionem mittere sanguinem e basilica dextra, quæ est lateris fluxioni magis opportuna. Die sequenti haustulum rhab. torrefacti potare in hunc modum.

ʒss. Rhei el. torrefact. ʒiiss. syr. ros. sicc. ʒvi. ac plantag.

Utatur quoque frequenter, atque odeo omnibus horis hac familiari opiata, donec sanguis consistat.

ʒss. Conserv. ros. sicc. ʒi. bol. arm. ʒiiss. terr. sigillat. corall. rubr. carab. C. C.usti an. ʒss. syr. myrcill. q.

s. F. opiata. Ad præcautionem, etiam si sanguis non erumpat, hoc condito sæpe utendum.

ʒss. Conserv. ros. & symphit. an. ʒss. troch. de carabe & de terr. sigill. an. ʒi. corall. rubr. margar. elect. an. ʒss. sacch. rosac. q. s. F. conditum. Capiat cochleare unum hora una ante paltum. Usus boli arm. perutilis erit si sanguis rursus erumpat.

Deinde ipso supprello sequenti syrupo pulmones corroborandi, leniendi, & detergendi.

ʒss. Paltul. mundat. ʒi. polipod. q. liquirit, ras. ʒiiss. tussilag. scabios. pimpin. centinod. an. M. i. sem. althææ & bombacis, an. ʒi. F. decoct. ad ʒss. in express. dissolv. sacch. alb. quartaria tria. F. Syrupus mediocriter coctus: utatur omni hora ex cochleari sine aquis: pulmones roborat & deterget. *ic. Fernelius. conf. 12.*

Ioannes Hugo, tubicen Domini de Persil, cum nimia violentia cantilenas aliquot tubæ cecinisset, atque inde valde incaluisse, paulo post obscurum in pectore sentit dolorem, & simul etiam cum tussicula sanguinem spumolum, sed paucum, expuere cepit, adeoque debilis evasit ut anhelitum vix trahere, imo ne stare quidem nec loqui posset, sed continuo supinus in lecto jacere cogeretur. Erat à medicamentis admodum aversus, ac proinde nullius Medici consilio uti statuerat. Verum cum usque ad sextam septimanam in tali statu jacuisset, neque morbus in melius mutaretur, tandem 10. Martii n. cum consilium imploravit. Inveni ægrum absque febris, sed valde debilem, quæ debilitas ab anhelitus defectu aliquo proveniebat, nam thoracem ad lubitum extendere & contrahere nequebat, cujus mali hæc causa erat, quod fortissima illa tubæ inflatione musculos thoracis magna & nimia violentia intendisset, atque hinc adeo debilitasset, ut postea rursus contrahi nequiverint. Sanguinis autem sputum, quod non erat copiosum, ab exili aliqua in pulmone disrupta originem habebat. Curationem aggressurus, primo convenientem dietam præscripsi: secundo alvum medicamentum leniente subduxi: tertio e mediana dextri brachii sanguinis lib. s. extraxi. Denique hoc sequens ceratum toti pectori applicandum præscripsi.

ʒss. Castorei, croci orient. an. scrup. ii. maltiches olibani styracis cal. an. drach. i. benzoini, drach. i. s. gummi taccamaceæ, galbani aceto dissoluti, emplastri de meliloto, oxycroci, an. ʒss. i. fiat s. art. ceratum quod extandatur in corio rubro tantæ magnitudinis, ut totum pectus à cartilagine eniformi, usque ad asperam arteriam, atque etiam latera sub brachiis utrinque investire possit. Inungatur olei nucis moscatæ, scrup. ii.

Præterea cingulum ex corio alcis molliore, latitudinis manus, cum lata fibula parari jussi. Ceratum primo pectori impositum fuit: deinde pectus proxime sub axillis hoc cingulo circumdatum & quantum ferre poterat æger contractum, ac fibula firmatum fuit. Hoc facto, statum maximum levamen sentit æger, atque anhelitum multo liberius & fortius attraxit. 14. Martii sanguinis sputum una cum tussi prorsus desinit. Adhæsit hoc ceratum per integrum mensem, quo tempore muscoli thoracis adeo firmati sunt, ut æger nullis aliis medicamentis opus habuerit, atque etiam sine prædicto cingulo rursus optime tuba caneret. Monui tamen ut hunc cingulum sæpe gestaret, præcipue cum eo circumdatus, se multo levius, facilius, & melius tubam iustare diceret.

Ager hic præter medicamentum laxativum nullum aliud per os assumere voluit, quapropter summopere metuebam ipsum in phrenitid prolapsum, nam præter periculolam sanguinis sputationem, tanta etiam aderat virium dejectio, ut in lecto erectus sedere non posset, ac semper supinus jacere cogeretur. Verum cum animadverterem hanc debilitatem totaliter dependere à defectu motus instrumentorum spirationi inservientium, ipsum mirabiliter præter omnium expectationem dicto cerato & cingulo restitui: cingulo tamen non tantum curationis pars adscribenda erat, nam simul ac pectus eodem contrinxissem, statim erectus sedere, & anhelum multo liberius trahere potuit.

Tubicines sæpe nimis superbi, honori acquirendi gratia, omnes vires in tubæ imitatione & cantu adeo intendunt, ut non raro herosi fiant, vel sanguinem spuant, imo ubi ipsis vitæ filum ex improviso sæpe præcidant, quemadmodum id anno 1641. mense Novembri, vidimus evenisse tubicini Capitanei Bax, qui cum inter alios tubicines tuba cantando maxime excellere vellet, disrupta magna in pulmone vena, & sanguine copiosissime effluente, intra duas horas expiravit. *Isbr. de Diem. rbr. in Observat. Medic.*

Miri sunt illi affectus, qui sine signis suis Pathognomonicis & essentialibus nihilominus quandoque dantur. Contradictio in adjectio esse apparet, Dysenteria & pleuritis indolens, Hæmoptylis sine tussi, attamen revera dari interdum talia observare novum non est illis qui praxin solite exercent. Anno 1669. fœmina 54. ann. hic loci Hæmoptylin patiebatur, æque excernens sanguinem spumosum, & floridum, sine dolore, cum respiratione aliquo modo difficili, sed, quod singulare est, semper absque tussi. Eadem ante decennium eodem modo aliquoties excrevit sanguinem ad aliquot uncias, tunc à Medicis Ordinariis, qui miro hoc affectu mori vix credere sustinerunt, postea absque tussi è Pulmone ita sanguinem mitti, donec hæc frequenter eos convicit Curata à me est binis Medicamentis 1. Sem. Hyosc. cum Lap. 69. aliisque resolutivis & astringentibus mixto. 2. Infusura Catechu ad 60. gr. pro dosi propinata.

Eodem anno vidua 48. ann. in Muszum meum veniebat, consilium petitura, cumque, quid pateretur, ex ea quærerem, loco responsi floridum excrenebat per os sanguinem & spumosum sine tussi. Seveiebat cum impetu quasi sanguinem urgere exitum & ascendere; curabatur tinctura antiphthisica Michaelis, Opiatis, aliisque, semper interpositis illis, quæ sanguinem coagulatum dissolvunt.

Circa curationem cum methodicam hujus morbi notanda est cautela Pessagani 4. m. m. & 7. de comp. medi. rbr. scilicet, sanguinem exspuentibus, quæ adhibentur, Medicamentis, miscenda esse cum calida, tum tenuium partium existentia, ut Medicamenta astringentia distribui melius possint hinc v. g. m. el. admiscendum monet. Innuere vult, non adhibenda esse pro sistenda hac excretionem terribilis crassioris substantiæ Medicamina, quæ solum constipant, anxietatem præcordiorum & respira-

tionem difficilem pariunt, sed quæ simul herum aeri relinquant morum, & nihilo minus sanguinem effervescentem retineant. De hoc illud maxime observandum, ut vel immittatur vel interponatur provide sanguinem coagulatum dissolventia, ne ex intempestivo & too astringentium usu sanguis retineatur, putrescat, & in vicus Phthisicum degeneret Hæmoptylis, de quo conqueritur Ronceslet. Mem. curand. morbi.

Ad observationem superiorem addi potest distinctio: Hæmoptylis duplici contingit modo, vel simul & semel, una interruptione extravagante & quasi effervescente sanguine, ubi sæpe ad uncias aliquot, vel libram excrevit potest, & in hac specie rarior observatur tussis, tanta enim non adest irritatio, sed sanguis lubricat sibi ipsi viam per superius guttur affectans exitum. Vel exaceratur, & quasi exussitur, pederentia, ab erosio in Pulmone vas, & ob sanas particulas teneras solum omnium vesiculas simulat, & inde irritatione tacta tum propter cruentam Georg. Wolfgang. Wedelii

Hæmoptylis periodica innoxia

Hæmoptylin non semper in lethi semine desinere Phthim observare mihi licuit, Hædedia in Dom. Thuen, hospite diversorii publici ad magnæ auri Leonis, qui bis ut plurimum in anno tantum cuorinem patiebatur hæmoptylin ut sanguinem floridum aliquot librarum mensura leviter euiceret, nullo alio insequito incommodo, nisi quod pallidior inde, cætera similitudinis fieret, adhibitus in consilium sanguinis acrimoniam contemperantia, ejusque immodicam effervescentiam cohibentia, ut & laxa vasorum ostia modice adstringentia præscribo, ut quæ bis in anno venim secaret injungo, quæ us rite peractis per integrum biennium a meo discipulo ab hæmoptyli liber vixit, quid postea ipsi tacitum nonnum rescivi. Joh. Henr. Brechtfeld.

De Sanguinis sputo tercia vice apparente percussio.

Cum Doctissimus juvenis G. S. C. SS. theologi, & Philosph. cultor indefessus, aliquot supra viginti annos natus, primum in Academia Groningensi post vehementem corporis commotionem sanguinis sputum pateretur, eoque sedato, itinere se accingens, residuum expectatus esset iterumque naturæ robore ab eo liberaretur; tandem cum jam Thorunii in paternis adibus subsisteret, & festi tercia Nativitatis Christi sermonem prolixiorum è cathedra in templo Divi Georgii publice haberet, paulo post, die scilicet prima Januarii anni 1674. summo mane tercia vice affectu isto oppressus est, ejectionem cum tussi sanguinis spumosi libris fere quatuor. ego hora octava matutina vocatus, offendi ipsum satis debilitatum: nihilominus, quoniam sanguinis sputum nondum cessaret, nisi mox, accessito chirurgus è mediana dextera achi revulsionis gratia aliquot uncias sanguinis partitis vicibus optime cum successu detrahere; quod remedium etiam olim Excel. p. m. Dn. Johann Beckhero Phil. & Med. Doctore, Phy-

sico Thorunenſi Ordinario & Gymnaſii Profeſſori, cum ſimilem affectum pateretur, n ultum protulſſe re-ordor. Ne autem terribilis & periculū plenus hic affectus reverteretur, præſcripti eidem ad vaſa pulmonum lacerata conſolidanda & roboranda, tam curationis quam præſervationis grātia, ſequentia remedia. Primo quidem illud conditum.

℞. Conſeru. roſ. antiqu. ꝑij. flor. nymph. violar. papav. errat. conſolid. maj. ana ꝑij. flor. cichor. veronic. ſalvæ, enulæ ana. ꝑiij. ſpec. diatrag. frig. diamarg. fr. ana. ꝑij. corall. rubr. præp. ꝑ. ſulph. alb. ana. ꝑij. cum ſ. qu. ſir. de ſymphyt. Fern. F. l. art. Conditum molle, de quo nucis juglandis quantitatem ſæpius ſumebat. Secundo hunc ſyrupum.

℞. ſir. de ſymphyto Fern. ſucc. plantag. roſ. ſicc. ana. ꝑiij. M. D. ad vitrum, de quo ſingulis maturinis bina cochlearia cum hauſtu cereviſiæ calidæ uſurpabat. Tertio talem emulſionem.

℞. Amygdal. dulc. extort. 3x. ſem. 4. frig. maj. excort. ana. ꝑij. papav. alb. ꝑiij. cum aqu. plantag. nymph. portulac. roſar. ana. ꝑiij. F. l. art. Emulſio, cui adde ſir. de portulaca, papav. ſ. ana. ꝑij. M. Tandem hocce epithema collo & epati applicandum.

℞. Aqu. plantag. portulac. roſar. ana. ꝑiij. acet. roſac. ꝑij. pulv. roſar. r. myrtill. boli Armen. ana. ꝑij. M. D. Quibus ad præſcriptum uſurpatis, per Altiffimi gratiam priſtinæ ſanitati reſtitutus, in hanc ulque diem, elapſo jam annuo curriculo, bene valet: ut tamen à nimio & violento motu, calidis cibis & ſermone longo atque ſonore ſibi ad tempus caveret, ſerio injunxi. D. Simonis Schultzi.

De Hæmoptoe Periodica Menſtrua.

Illam in ſexu ſcæmineo naturam tam accuſatam temporumque obſervantem, ut niſi vitio corporis, nec properet ſe nec retardet, quis eſt qui ſatis mirari poſſit, adeo omnia ille ſecretum atomorum illapſum, figuratos Planetarum motus, aut quid neſcio ſpirant divini: nam ſanguinem menſtruum à nutrimentis tantum reliquum eſſe, illa ut plurimum parcior dixta. & in crementa ſæpe, quam in viris, copioſiora prohibent, ut credamus. Quæ deinde illa dixta toties à ſeſe diſcrepantis ratio, ut tamen menſtrua periodo certum Lunæ ſanguinem velut in tributum reddat? Sive autem occulta ſit Archæi Lunaris poteſtas, ſeu muliebris ſexus proprium ſpecificumque fermentum, ubique eſt, quod & novum & difficile appareat. id unum certum eſt, novitque ipſe ſexus, tam inevitabili neceſſitate in hac plaga ſanguinem illum proripere ſeſe, ut, ubi uteri viæ ſunt occluſæ, modo perſpirabile ſit & laxum corpus, in illas ſæpe partes erumpat, qua duci alias ſanguinem poſſe haud facile tibi perſuadeas. Plurimas repērias ejuſmodi obſervationes in Medicorum monumentis, quas niſi in ſingulis videre juvat, in magno Schenkii opere requiras, oportet: & ut plures ejuſdem naturæ hitoriz ſint animadverſæ, tamen, ne noſtra quoque & hodierni ævi obſervata conſeramus quiſque pro ingenio ſuo, vetare illa vel frequentia aut ſimilitudo nequit; ſemper

enim aliquid invenias à ſingulis divertum, quodque priorem hitoriam contrimet vel illuſtret. Joannes Rhodius, Vir meliore ſato dignus, Centur. 2. obſ. 30. Mulieris meminit Patavinæ ſingulis aut alternis menſibus ſine pectoris offeſſa ſanguinem exſpuentis, menſium per hoc penſato deliquio: in quo id tamen reperi dubium, an ſine tuſſi prodierit, cum ſequentis hitoriz lemma tuſſim adfuſiſſe haud obſcure teſtetur. In kerkringii ſpicilegio obſerv. 25. minus id quoque explicatum video, nam, eſſi index, ſputum ſanguinis præſerat, idque periodicum, & in ipſo deinde hitoriz recenſu, modo violentam ſanguinis ejectionem, modo vomitum Auctor repetat, tamen ut credam, illam ſputi ſpeciem ſuiſſe, quæ tuſſi in complectitur, vel hoc perſuaderit, quod in Philiſtin deſiſſe ſputum illud ipſe textus ostendat, & plerumque, qui tuſſi rejicitur ſanguis, ſputo prodire dicatur: certiffimum autem eſt, qui cum ſaliva erumpat ſanguis, infrequentem eſſe & raram, ſed qui ſcreatu, vomitu aut tuſſi provocetur, quos tamen etiam modos ad ſanguinis ſputum Galenus libro de loc. affectis retulit, quotidie videri. Non potui autem ſputi tuſſiculoli periodici obſervationem, quæ mihi hic obſtigit, ſilentio prætereire. Nempe mulier triginta duos annos nata, aliquot olim liberorum mater, nunc interſcunda, vultu pallido macilento & quali tabifico, ad labores tamen domeſticos alacri & expedito animo, poſtquam ſu negligentiore frigida aliquandiu tractaſſet, in hæmoptoe inſcidit vehementi tuſſi comitatam, illo ipſo tempore, quo nentes fluere jam incipiebant. Illa, quod olim virgo ſimilem affectum ſæpius experta eſſet, & propediem deſitutum hoc malum crederet niſi tum vel ab operibus domeſticis aut curis remiſſit, minus etiam de remediis ſollicita. Præterierat hæc tempeſtas quinque dierum ſine magno incommodo; ac cum proxima Luna cum menſtruo ſanguine rediret idem ille impetus, dolorem lateris gravativum & titillationem magis de nocte moleſtam perſentit, ille tamen ſui ſecura, donec tertio menſe in eadem incideret ſymptomata, ſed paulo deteriora, nam & dolor vehementius ingraveſcere, & ſanguis tuſſique copioſius urgere videbantur; magis ergo ſuſpitione morbi, quam morbo exterrita ad me accedit, narratque rem ſibi olim Virgini familiarem, nunc autem diu internuſam; quid deinde adveſus malum hoc præciperem, ſerio exquirat. Cum itaque ex querelis intelligerem, menſes non deficere, ſed ſimul fluere, abundare etiamnum in illa corporis macie plurimo ſanguine menſtruo, & tamen, quæ ab utero prodiret, copiam multo eſſe minorem, quam olim erat; ad ſingulas tuſſes, neque eas adeo difficiles, & velut prurigne aut ebulliente lateris fermento, *als wenn et kochie*, excitatas, ſanguinem reiici purum, cum dolore tamen nonnihil moleſto; non adeo per ſe morbum eſſe periculolum dixi, ſed errore & vitio rerum nonnaturalium, negligentiaque reddi non tantum deteriorem, verum, etiam ſuſtulum poſſe, caveret ſibi ſuaſi ab aere horrido, ab acidorum uſu animique imprimis affectibus, ſed & à motu corporis intempeſtivo, operiſque domeſticis, quibus nimum alias incumberebat diligens

bat diligens materfamilias : deinde laborandum
esse medicamentis , ut sanguis ad uterum in justa
copia revocetur , idque non alio facilius præstari
posse , quam sectione saphenæ , ita enim re-
vulli sanguinis pondere arctatis osculis veterem
conum redditurum esse : quibus accessit commen-
datio internorum , aquarum attenuantium,
uterinarum , tincturæ s. hyperici , bellidis , pa-
pau erratici , partim , ut pori uterini rare-
cerent , partim , ne sanguis in pulmonibus gru-
mum stagnatione conasperet ; ut ne autem à
nimia tenuitate periculum esset , curavi ad-
dici , quæ præcipitandi aut absorbendi vim habe-
rent , Antimonium diaphoreticum , ut utros
cancer &c . qui misit sanguis illud , lentæque pul-
sus temperies satis essent argumento , fermen-
tationem illam sanguinis nullam aut certe exi-
guam fuisse . Hæc quidem ego conatusui , verum
ipsa , cum duduo immutamentibus cessare fluxum
observaret , remediū usum distulit , differetque ,
nimis monitiones meas morata , sed quod ve-
reor , olim lutura , nisi gravidationis succe-
serit beneficium . Joh. Nicolaï Lechlini.

De Oleo Lini in Hamap'ysi.

Magnarum virtutum alias oleum lini com-
mendatur in peripneumonia, plethiti, dolo-
ribus colicis, maxime autem celebratur in
pleuritide, adipulante Gœnero, qui l. 2. epist.
46 inquit: ego multoties in istis pleuritici-
doloribus, nihil melius expertus sum, quam
oleum lini propinatum, hocque statim respira-
tione sensa allevavit, spumumque promovit. Proin-
de studiose apud nos a servatur ad foem depu-
ratum, qui modus optimus & tutissimus mihi
videtur, nam clarificatio, quæ fit per lixivium
ad mentem Hæsteri in Herc. med. l. 2. c. 2.
intuta, & quoniam Reumerus cum cepa assata
Obs. 67. proponit, ingrata, vix enim non
aliquid de lixivii acrimonia aut cepæ graveo-
lencia retinebit. Hungari recentior expressio de-
lectantur, cum dulce omnisque ingrati saporis
expers, verum minus salubre est, a recremen-
tis & fecibus nondum purgatum. Nonnulli
etiam extrinsecus adhibent, ventrem eodem
inungendo, aut linteo imbuto tegendo, ad
solvendam alvum in constipatione, quod &
quandoque cum successu factum recordeo, cum
oleum lini laxandi vim habeat, teste eodem
Gœnero. At nuppiam a thue memini me legisse,
aut observasse, quod conducit in hæmoptyi,
forte a nemine adhuc tentatum. Referam ergo
quod a me observatum.

Sub initium anni elapsi 1675. visitavi saepius fir-
minam quendam honestam, quinquagenariam,
quae fluxum patiebatur menstruum iam a longeo
tempore, non quidem adeo largum continuum
tamen. Jam vero catarrho facis molesto dave-
xabatur, cui ex meo consilio predebatur jussulo
ex hederâ terrestrî, char. sol. pulmon. marisylu.
liquirit. &c. facto. Aliquando summo mane ad
illam vocatus inveni cum stupore ultra mensi-
ram excreti sanguinis floridi, qualis e pulmo-
nibus solet egredi, hunc inter quartam & quin-
tam matutinam spuito rejecerat. Statim curavi
aperiri venam in brachio, & dedi, quonvis
invita tinct. lap. hemat. aliquot guttas in syr.
de symph. lern. sed exiguo cum fructu. Nam

citra vespertam iterum rediit spatum, & ultra triduum mane & vespere continuavit. Res actaria erat patiens, & omnia remedia vespertans, obdormite noctis cupida. It. anxius, cum ab adstantibus in absentia mariti summo opere rogatus, libenter auxilium tulisset, necio quomodo inter loquentium mentionem fecit oculi sui, quod ipsi placuit. Susi illa tactum cochleari unum sumit, ejusque usum continuo non per aliquot dies penitus convalescit. Cerebra ex ruptione valis in pulmionibus ortam hanc optum, oleum lini vero virgula ballardica iterum comendasse. Non tunc succedenti postmodum in alius tentavi. Nam valde tum tenui oris gastradactur catarrhi, & apud plurimos credo, a deflitionibus, acerbis & no. dactibus succedente hamoptysi, quibus pro titendo spatio sanguinis, trachuram primo lapidis hæmatita, mox pro consolidatione oleum dedimus: unus tamen ex his factus phthisicus & mortuus. Varr. m. cent. 2. is erat medicus, qui ex eiu nu tum tam recentium, quam postea aridatum in catarrhum, mox in hamoptysin incidit, quam excepit, licet omnia, quæ poterant, adhibita, piatibus & mors. Ascrebat is mihi se jam semel patium fuisse hamoptysin in Suecia cum Holmia theriacam dispensaret, & catarrhum non admodum gravem sine violentia ab igne revocare voluisset, sed remissile post unum convenientium in dicationum, jam vero quinque elapsis annis hic iterum theriacam dispensaturum eodem denovo correptum affectu. Non penetravi, an huic dispensationi quidquam tribui potuerit, cum parvanece multis indignerit viribus, potius autem, ut dixi, ex esu nucum contractam tussim, & ex ea propter validam pectoris commotionem, prius consolidatam veniam ruptam arbitror, D. Caroli Raygeri.

Anatomica Inspectiones.

*Hæmoptysis à Pulmonibus Sanguine nigro, li-
quido, cum sanie repletis.*

Illustr. Comes sanguinem tussiendo expuerat; Dillecto corpore, ut an recte de abscessu sentis-
sent iudicium fieret, Inveni sunt pulmones san-
guine nigerrimo, liquido, cum aliqua sanie,
citra propriam suppurationem redundantes,
Hier. Cardanus Ari. Curat. p. 294.

Hæmoptysis ab inflammatione Pulmonum & La-
cris dependens.

Vir sanguineæ & biliosæ temperationis in febrem assiduam delabatur, cujus cum diuturno rigore luit initium, tussis dolore pungente, Sputis cruentis &c. 7. die alba ea visa sunt, quæ transacta rursus febris invadit cum rigore & Spuitione cruenta nigricante uberrima &c. Mortui xiv. die secto cadavere, pars dextra pulmonum fuit inventa corrupta, nigricans, tanquam sanguis concretus, & ejusdem lateris etiam pleura male affecta. L. a Fontecor-
Jul. 9.

Settio Cadaveris Hemoptoici. A Clar Sylvio in Nosocomio Leidenſi adminiſtrata 1664.

ejus pulmones multum sanguinis nigri & concreti continebant &c.

Nou. ii. die ante sex circiter hebdomadas cepit male habere Jacobus de Vala: Tussi correptus est & sanguinem spuit, maxime lecto decumbens: Conqueritur de difficili respiratione: Quando plus potat magis etiam sanguinem spuit: Urina cruda: Sedimentum pituitosum: heri sensit dolorem circa lumbos, qui adhuc adeo continuat ut erigere corpus non possit: Cum primum inciperet male habere, per totum diem a laboribus incaluerat, noctu vero domum rediens à frigore læsus fuerat, unde primum tussis, quam post duas hebdomadas sanguinis sputum consequutum est: Jam tabescit & debilis sit: pro consolidatione vulneris, quæ promouenda cito, ne in ulcus evadat, utatur sequenti medicamento.

℞. Aqua plantag. ʒij. fœnic. ʒj. acet. stillat. ʒij. sangu. drac. ʒj. laud. opiat. gr. ij. syr. myrth. ʒj. assumet subinde cochlear: Nou. 13. melius in omnibus habet: dolores enim lumbares non sentit & paucum quoque sanguinis deiecit: Perget ulterius eo ut: Nou. 13. heri vespere edit lac dulce, unde noctu summis anxietatibus fuit preillus: Secunda nocturna sensit frigus; forsan paroxysmum febrilem habuit: Tum vehementissime (durante frigore) sitivit, cereviamque frigidam bibit, quam tamen præ nimia linguæ & faucium sicciæ siccitate non gustare, neque sitim illa extinguere potuit: A frigido sumptu adhuc magis anxius factus, vehementem cordis palpitationem passus est: Malum hoc, unaqueque frigus fere per 5. horas duravit. Die 14. sitis non tanta fuit, ob usum posterioris milturæ, (vide infra scholia) Pauciores sanguinem expulit: Die 17. melius habet: iteretur miltura 3. Nou. præscripta: Nou. 19. Hodie hora tertia pomeridiana assidens loco luculento habuit paroxysmum febrilem: Somnolentus tum fuit, sensitque gravitatem per unversum corpus: & frigus, simulque tremorem, nec frigus, nec dolorem speciatim sentit in lumbis, sed tantum in ventre circa umbilicum, partibusque extremis inferioribus: duravit circiter per horam, nullusque calor subsequutus: Multum jam sitit, sumpsit milturæ aliquid, Non quiescit, semel deiecit: Die 20. iterum habuit paroxysmum post prandium: Frigus iterum in abdomine & artubus, sed & in regione lumbari, vehementius quoque fuit hesterno, perque duas horas duravit: insequutus calor per horam permanens: Valde sitivit, utque sitim levaret comedit integrum malum citrium: Nondum alvus hodie suo munere functa.

℞. massapil. cochlear. ʒʒ. troch. alhand. gr. v. refin. Gial. gr. 4. ol. gargyoph. gtt. ii. m. f. Pil. n. 5. assumet cras lunæ mane: iteretur simul miltura 13. Nou. præscripta; adde laud. op. gr. i. Die 21. pessime habet, doloresque habet in hypochondrio sinistro, Non potest respirare graviterque anhelat: Nullum frigus sentit: à pilulis hodie mane assumptis, à meridie tantum semel sed parum deiecit.

℞. Aqua hyssop. petros. fœnic. ana. ʒj. tin& cinnam. ʒʒ. spir. salcom. gtt. sv. syr. fœnic. ʒj. m. assumet subinde cochlear. Die 24. Nou. valde statim ab usu milturæ ab angustis & an-

helationibus, à quibus videbatur suffocari, levatus est: continuabit usum ejusdem milturæ: Die 25. conqueritur de tussi sicca, quæ per biduum illum jam afflixit, unde non quiescit, item crura tument & quasi distenduntur, Non deiecit; habet adhuc milturam, Pro tussi.

℞. Matix pil. de Cynogl. ʒj. f. Pil. u. 2v sumat æger subinde unam: Die 26. Ante octo annos erysipelate laboravit in utraque tibia, à qua quidem nullam huc usque amplius molestiam sensit, rubor tamen permansit: Occupaverat rubor ille pedem quoque, sed à colore & cutim mutavit. Nunc iterum pes dolet, supraque & infra ruborem illum pedes valde tument & splendidi sunt: Non dolores tantos in pectore expertus est minusque tussit, commodius quoque quievit: continuabit in usu milturæ & pilul. de cynogl. Pro Erysipelate.

℞. Aqua plantag. fumar. ana. ʒiv. acet. sambuc. spir. vini vulg. ana. ʒij. m. lintea liquore illo repido madefacta circumponet pedibus & loco affecto. Die 27. heri vespere lac dulce comedit, & hodie mane, à quo & noctu & hodie pessime habuit: Non deiecit, unde abdo: en valde tenditur, Rubor ille pedum sensim minuitur & in livorem abit; Perget uti medicamentis præscriptis: Die 28. Novembr. iterum pessime habet, difficulter respirat & graviter anhelat, inprimis si incurvet corpus, tum videntur ipsi partes interiores quasi infringi: Ite deiecit crassa excrementa cum torminibus in parte superiore abdominis: sanguinem rarius excrevit, hodie octies, sed parum singulis vicibus: Abdomen jam non distentum neque flatus emisit: Conqueritur se jam nihil commodi à miltura sentire: iteretur miltura 21. d. præscripta, adde sangu. draconis ʒʒ. Obiit.

In Cadavere ejus dissecto 1. Dec. Liquor tenuis & serosus repebat in corporis habitu sub cute inter musculos & pinguedinem, unde ipsa pinguedo mollior & laxior erat: Omentum non tegebat intestina, sed ad latera dessectebat: Intestinum crassum inflexum infra umbilicum erat: Color Intestinorum carneus & solito rubicundior: Intestina crassa statibus turgebant, tenuia non item: Tenuium tamen vascula turgebant, quod fieri solet à doloribus Aqua abdominis cavitate continebatur substava & subsalsa; initium nempe hydropis; cui aliqua purulenta meteria juncta erat: Jecinoris color subpallidus, qui color fere ab aquis præsentibus provenit: folliculus fellis externe instar membranæ albicabat, nihilque omnino fellis continere ob tenuitatem videbatur: Lien satis grandis, & parti posticæ & vicinis annexus: color ejus pallidior julto, substantia firmior erat: Pancreatis substantia satis elegans; Ductus illius magnus: immixtus in ductum liquor variis in locis pancreas non ringeat; ex Thoracis cavitate aqua copiosa valde effluebat, clara, limpida, nec tam salsa quam quæ in abdomine erat: Pulmones costis annexi, imprimis sinister: Aqua illa ex dextro pectore promanabat; In sinistro pectore aliqua quidem aqua, sed pauca conspicienda erat: Color Pulmonum solito erat obscurior, lividior, substantia firmior & à statibus distenta, Multum sanguinis in ipsa Pulmonum substantia hærebat interiore, quæ nigricans &

cans & coagulatus illam distendebat, occurrentibus passim particulis durioribus, quæ sensim in apostema abire solent: Die 3. Dec. aperto capite cerebrum vidimus copiosum ac firmum, quod Cl. Sylvius post meridiem accuratissime demonstravit: Die 4. Dec. cum absente Cl. Sylvio, ipsius permisso ulterius scrutaremur cadaver, deprehendimus in utroque cordis ventriculo massam crassam, fibrosam, quasi carneam. Polypum vulgo dicunt, quæ in omnia vasa extendebatur in cor exeuntes: præcipue vero ex jugulari sinistra eduximus tres spithamas longitudine superantem: Erat autem illa materia in ipsis cordis ventriculis, crassitie insigni, cui multum grumosi sanguinis adhærebat, annexa cordis carneis fibris, easque suis fibrillis amplectens: in medio continebat sanguinem grumosum, videbaturque minuscule vasa habere: in aspera arteria aperta materiam spumofam, pituitosam, cumque paucis sanguine mixtam, qualem vivens sæpe excrevit, Humorem in pericardio copiosum, similem illi qui in abdomine repertus fuerat: In folliculo, testis bilingui & substantia & colore vere vitellinam, paucissimam, candidamque aperto per incisionem variam ipso hepatis parenchymate, in plurimis ductus Hepatici ramis hærentem vidimus: Renis sinistri pelvis erat magna, extra ipsum renem propendens, ureter naturæ li longe amplior: Facta incisione in tibia Erysipelate affecta, vidimus subleatam carnem integram, cute tantum læsa, à qua cuticula facillime: separabatur: Matthias Palsenius in miscell. curant. 4. & 5. observ. 193.

Sanguinis sputum à Pulmone sphacelo infecto manans.

Cum tussi sanguinem excerni, modo pulchre rubentem, alias pituitæ, puri aut spurci permixtum haud infrequens est: Nigrum vero atque spumofum ejici, ut concretus & undequaque porosus spongiam aut pumicem referre videatur, rarissimum, hujusmodi autem à nonnullis cum tussi rejectum, non ex vase aliquo rupto, huc ex pulmonis ulcere, sed ab ipsa pulmonis substantia ac parenchymate profusum suspicari fuimus, nec fecellit nos conjectura: Nam pictoris cujusdam, qui cum valida tussi hujusmodi sanguinem rejecerat, pulmonis pars quædam nigricans reperta sphacelo correpta, in qua magnus & profundus sinus, nulla interim sanie, nullo pure vel hanc vel reliquam partem occupante: atque ex hoc sinu sanguis corruptus, nigricans, atque cum eo siderata parenchymatis pars cum tussi rejecta: Similem & ichthyopola quidam sanguinem expuit, cujus & pulmo eodem modo affectus fuit. Cerevisiæ coctor ejusmodi sanguinem cum valida tussi ter reddidit: in hujus autem Pulmone, plurima parte nigro, tres patuerunt sinus: Semper autem talem affectum incurabilem judicavimus, vitam tamen produci ad aliquod tempus posse, bona beneque instituta victus ratione, haud alienum est: Pictor plusquam mensem supervixit: Cerevisiæ coctor bis evascerat, sed & in tertia expuitione subito perivit, veluti & ichthyopola qui & in sanguinis sputo defecit. Dodonæus observ. medic. cap. 24.

Hæmoptysis ab aneurismate in Pectore, aperto per exsectionem.

Joh. Pauli homo ebriosus, circa 30. ætatis annum in aneurisma incurabile incidit: anno 1640: circa Autumnum, cum supra modum inebriatus fuisset, postmodum anxietate quadam pectoris correptus fuit, quam primo negligebat consuetudo mere vivens: Circa initium sequens anni, Tumor cum valida pulsatione, circa claviculæ sinistræ & sterni conjunctionem subortus est, qui ab omnibus judicatum est aneurisma insanabile, eo quod ab internis initium sumpserat: Medicina ea tantum adhibita fuit quæ sanguinis calorem mitigaret, & quantum possibile tumoris augmentum prohiberet: Sed omnia frustra, nam tumor in tantum increvit, ut exterius pugni magnitudinem multum superaret, & interius respirationi non leve impedimentum afferret: 12. Novembr. circa vespertim, per tussim incepit rejicere grumos nigri & concreti sanguinis, unde tumor multum imminutus fuit: Sed cum continua ea esset sanguinis excretio, summo mane vitam finit.

Cadavere aperto, in Thorace statim sese conspectui dedit dilatata aorta arteria descendens, cujus paulo supra divaricationem tanta erat amplitudo, ut duas libras sanguinis & ultra capere posset adeoque iste tumor ad latus asperæ arteriæ increverat antrosum, ut cuti proxima esset ipsa arteria: Sed ea ipsa in loco sub aspera arteria exesa esse videbatur, simul & postica pars asperæ arteriæ, unde suprema ipsi nocte ea sanguinis evacuatio: Quæ tamen non confestim processit, uti plerumque in ruptione aneurismatis fieri consuevit: ideoque videtur verisimile ob summam ægri debilitatem, sanguinem in tumore contentum refrigeratum atque concretum fuisse. Ordo Hæmoptysis observat. 27.

Hæmoptysis à percussione Pectoris & contusione interna.

Rusticum eques quidam ebrius in campo adortus, in thorace sclopeto percussit, & in terram dejectum equo calcavit: unde dolorem protinus in latere sentiens; sanguinemque excreans, post septimanas aliquot expiravit. Judice criminali Medicorum judicium, an ab hac vi illata mortuus sit, inquirenti? Corpore aperto, internisque diligenter inspectis atque examinatis, talis ab illis sententia lata est. Cum prius ante hunc casum minime ægrotasset, sed tunc primum cum læsus fuit, dolorem vehementem & perseverantem in illo latere senserit, sanguinemque expuerit; atque post apertionem pectoris intrinsecus contusionis signa eo in loco apparuerint, sine dubio percussionem illam atque ictum ex calce equi, mortis causam fuisse. F. Platerus obs. p. m. 785.

Anatome Hæmoptici, cujus Pulmones summa parte obsidebat tuberculum crudum, e quo acris materia prodibat eos erodens.

Christ. Hallerus, homo proceræ staturæ, ætatis 3

tis 45. cholericus, laborabat destillatione tenui, aliquando salsa ad pectus & ad fauces, ita ut cum fluxus ille inciperet, aliquando per os ad pondus dimidiæ horæ effluebat, tandem incidit in sputum sanguinis copiosum cum tussi: Habebat etiam à multis annis Tuberculum circa furculam, in latere dextro pectoris, quod aliquando crescebat, aliquando decresebat, & mutabat interdum colorem: interdum enim album, interdum rubrum apparebat: Tandem tussiens in momento aperta denuo vena, vel potius rupta, in momento suffocatus est:

Secto ejus corpore, invenimus tuberculum crudum spongiz haud dissimile, adnatum pulmone circa furculam, in latere dextro, quod ex materia tam æri erat natum, ut fere adjacentis costæ mediam partem consumpserat, omnis etiam sanguis redibat in pulmone collectus, cum exteræ partes viderentur exangues. *Ex Joh. Hesse observ.*

Hæmoptoici dexter Pulmo tumidus à sanguine illic subsistente reperiunt.

Post sanguinis sputum in *quodam* corpore, ad duarum librarum mensuram, ingentis in dextro Pulmone sensus ponderis aliquot septimanarum decursu animadversus: rejecta materia flava, crassa, viscida, tenax, frustillatim tenui aquæ copiosæ innatans: adaperto iterum valiculo hæmoptysis urgebat: Ea sine negotio sedata, continuabat excretio priori similis: Aderant indicia Hæticæ non levia, putridæ internûta, & Dyspnœa, dextro potissimum in latere: Sanguis nullus excrebatur, sed alba solum, tenax, viscida materia viribus exhaustis anni quadrante elapso, suffocatus abiit ad plures:

Aperto thorace, dexter pulmo tumidus, adeo ut totam illam impleveret cavitatem: inciso Pulmone, in circumferentia sanguis sputum crassus effluebat: incisis & divisis bronchiis, alba ut materia fere tota referta erat, ita illa effluebat puris speciem præ se ferens planissimam, qualem multis ante septimanis eiecerat: quam si extussire potuisset, nondum vitæ terminus adpropinquasset.

Alius Hæmoptysi correptus, & ab ea sine negotio liberatus, statim gravitatem pectoris sensit, & tensionem in brachio dextro, circa axillas molestam: Aliquoties sputo sanguinis suppressio, de eadem gravitate conquerebatur: Tandem illa gravitate pectoris vires sumente, dyspnœa febrique hætica superveniente, suffocatus ultimum mundo vale dixit: Nullum dubium si cadaver apertum fuisset, eundem deprehensum fuisse statum. *Ralsinckius Dissertat. Anat. lib. 1. cap. 13.*

Hæmoptysis à fluxione acris, tracheæ partem cum Pulmonibus erodente & levem arteriam.

Lobum pulmonis sinistrum cujusdam erodebat ulcus, è tussi inveterata & fluxione salina Hæmoptysin inducente oriundum, quod levis arteriæ divaricationem lobo insertam una pereserat: Dissecto cadavere tracheæ pars erosa, cui cicatrix inducta fuerat varicosa: lobo vero pars adnata callosa conspiciebatur. *Bernardus Theatri Tabid. p. 95.*

Exspatio cruenta Vomica in Pulmone disrumpionem fere præcedit.

Non pauci subito è vivis crepti sunt, in quibus non alia mortis causa comparuit quam repentina Vomica disruptio in Pulmonibus: Omnibus sic affectis, multo tempore antequam vomica rumperetur, cruenta excretio præcessit e Pulmonibus, eaque cum tussi &c. *Fernelius Pathol. l. 5. cap. 10.*

Anatome Hæmoptoici, qui Phthisicus interiit.

Henricus N. Phthisicus obiit: in dextro thoracis latere, ubi majorem dolorem senserat, inventa sunt fragmenta bronchiorum à substantia Pulmonum avulsa, cum sanie copiosa: Laboraverat longo tempore antea sputo sanguinis, inde hujus miserandi mali principium. Bronchiorum fragmenta & sanie copiosam, dum viveret, in magna quantitate ejicere consueverat. *Vide tit. de Phthisi.*

Sanguinis & puris sputum sine Pulmonum offensa aliquando contingit.

Exspuunt non semel statim temporibus quidam cum pure sanguinem nec tamen phthisici sunt, nec ulcus ullum in Pulmonibus habent: Hujus census tres novit sala, quorum duo exspuerunt statim vicibus pus & sanguinem sine pulmonis ulcere, quippe sanati sunt & bene valuerunt, tertius adhuc vivit sanus: nam ex rupto abscessu inter thoracem per Pulmones quidem expurgata est materia, sed sine ejus lésione; quod in cadaveribus duorum dissectis eidem apparuit: adest quidem in hujusmodi impedita respiratio, febrisque lenta, sed absterio pure & exsiccatio ista signa disparent. *Bartholinus cent. 4. hist. 17.*

Hæmoptysis à cordis ulcere orta

Die 3. Janvar. 1634. vocatus sum ad filiam D. N. annos. 14. natam, quæ antea per multos dies laboraverat vomitu pituitoso semel aut bis in die invadente, horis præcipue matutinis, cum cardialgia per intervalla affligente: item patiebatur dolorem in summa scapula sinistra & summitate brachii qua humero committitur; Nocte insequente, quæ erat quinta à prima invasione, correpta est alvi fluxus & febre quæ tota die eam detinuerunt. 6. Sumpsit rheï pulveris. ʒj. cum jusculo, & pluries dejecit, febris perseverat, nocte bis tantum dejecit, per duas horas dormivit. 7. alvi fluxus perseverat, sed minus frequens, ut locum dederit venæ sectioni, qua missus fuit sanguis ad ʒiv. : Hæc duo peculiariter à febris invasione notavimus, quod Pulsus fere semper erat intermittens, Et cum dolor prædictus in eadem parte fixus permaneret. neque ad thoracem ullo modo pertingeret, ægra tamen non poterat in illud latus, quod erat sinistrum, decumbere, quin statim cardialgia & tussi corriperebatur; ita ut perpetuo super latus dextrum decumbere cogeretur: Tussis sicca eam infestabat per interalla: Status emittebat interdum superne & inferne: 8. Eadem sympto-

dem symptomata perseverant, præcipue cardialgia per intervalla recurrens, & pulsus intermittens inæqualiter: Dominus paucus: continuabantur cardiaca, sumpta & admodum, tum venies enecantia ac ventriculum roborantia: Urgente admodum cardialgia, exhibitus est Salis absynthii ʒj. cum succi limon. cochleari, unde optime habuit per horas aliquot, sed symptomata redierunt, noctu urine erant crasse & sævis pallide. 9. Admotum fuit vesicans cervici, quo tussis cessavit: antea dolor humeri lumbinatus fuerat, & supra latus sinistrum melius decumbebat: Eadem die sumpsit medicamentum ex infusione ʒj. Rhei cum hieræ pieræ ʒj. & Syrup. de cichor. comp.

quo valde purgata est cum fructu, & alvi fluxus perseveravit per aliquot dies, unde prius convalescere visa est, cum tamen pulsus continuo intermitteret in 3. 4. vel 5. pulsatione: Postquam à lecto surrexit, intermissio pulsus delitit, manente tamen frequentia & ægra tussi premebatur, noctu præcipue cum difficultate spirandi: Quæ symptomata per longum tempus perseverarunt, ac præter difficultatem spirandi aderat per intervalla dolor lateris pungens, qui magis urgebat cum ægra in latus sanum decumberet, & contra gravior erat difficultas spirandi quando supra latus dolens decumbebat: febris perpetua erat intensa, quæ omnia magnam suspicionem faciebant abscessus in sinistra pulmonis parte latitantis. Tandem die 34. morbi subito correpta est sanguinis sputo, quem per tussim excrevit ad ʒviij. circa meridiem; is autem sanguis erat satis crassus & non spumolus, quam ægra ipsa dicebat à capite descendisse: sequente illius exclusionem, in faucibus percepisse titillationem, tum aliquid ejus mungendo per nares eductum fuerat: Attamen vespertinis horis sanguinis sputo redeunte, satis apparuit cum e pulmone ferri, erat enim totus spumolus, ejusque quantitas fuit ad lb. Tum missus fuit de basilica sinistra, exhibitus julepus ex aqua plantaginis & papav. rhoead. cum tale prunellæ & syrupo de rosis siccis: utebatur tota nocte syrupis violaceo, de rosis siccis & de papavere simul mixtis, quibus Tussis sedabatur, excretionis reditus impediabatur & per intervalla dormiebat: Postridie mane iterata fuit s. m. ex brachio dextro, itatus julepus, & multa alia remedia in hæmoptysi usitata, præscripta fuere in communi consilio habito cum D. D. Ranchino & de Lort: Sptum sanguinis rediit ad ʒviij. circa horam 11. ante meridiem, continuabant remedia & V. S. malleoli usurpata: Hora 4. vespertina redeunte sputo sanguinis copioso subito extincta est.

Dillecto cadavere, inventus est Pulmo colore albicante, costis undique & diaphragmati adherens, tum etiam pericardio undique adharebat, ut unum corpus continuum efficeret: Cor vero albicans visum est, & media sui parte fere, qua diaphragma respicit, exesum atque exulceratum, ut fibræ carnosæ semiputridæ summis digitis avellerentur: Et animadversum fuerat frustula quædam carnea, hujusmodi fibris simillima cum sanguine per sputum rejecta fuisse: ita ut verissimum sit istam ægram cordis substantiam sputum rejecisse, quod est valde mirum, cum autem in

capsula cordis nullus humor repertus fuerit, exit stimandum est materiam hujusmodi abscessum seu ulcus, efficientem cum sanguine permixtam fuisse & per tussim excretam. *Lazarus Riverius centur. 1. observ. 27.*

Hæmoptysis ab inflammatis Pulmonibus, subsequente abscessu.

Pleuritis à Peripneumonia hæc præsertim nota distinguitur quod in hac sputum cruentum primis statim diebus & largius diffuit, si salubris præsertim tutus sit morbus, sed diutius & 40. etiam dies, ut observavi in Nob. A. de Gatinois, qui à pulmonia & pleuritide complicatis convalescit beuchero tam copiose excretionis cruenta, ut quotidie linteam unum & alterum lecto instructum tabo rejecto cõ plueret: Præterquamquod enim è pleura tanta cruenti sputi copia rejectari nequit, abscessus in Pulmone relictus, sed detectus quadriennio post in cadavere magni viri, à simili affectu recrudescente interempti, repertus satis docuit. *C. Piso de morbis a colluvie serosa sect. 3. c. ultimo.*

Hæmoptysis à sanguine melancholico è Liene & vasis mesaraicis transmissa

Vir 19. annorum constitutionis melancholicæ, hypochondriaca affectione per aliquot annos tunc divexabatur, maxime tamen de dolore hypochondrii sinistri conquestus est, tandem prægressa suppressione fluxus hæmorrhoidalis, quo alias cum levamine sovebatur, hæmoptysis intra semestris spatium corripitur, quæ etiam tertium redeunte purpuream cum sanguine vomit animam.

Impetrata licentia aperiendi cadaver, infimus venter à. ad examen vocatus, in quo Lien quidem lat. magnus, colore lividus & flaccidus: mesaraicæ, tam venæ quam arteriæ, tum & vasa gastro epiploica, atro sanguine turgescencia & quasi varicosa conspiciabantur: Adrenes vero cum deventum erat, eorum similiter flaccidior multo & magnitudine inferior dextro reperiebatur: hic vero dexter in parte superiori extorsum, cysti donabatur ad magnitudinem pilæ usoria; sero subflavescente turgida, qua dissecta, ac cum inpetu prorupte humore, nulla via conspicua erat perquam vel excretio vel ingressus sero pateret: quantum conjectura assequi licuit, videbatur dicta cystis ex membrana communi Renis conflata. Ad medium ventrem ubi deventum, in eo Pulmones sanguine nigro fermentescente turgescences ac inflati comparebant: Talis etiam sanguis in Liene, & continuo venæ portæ ec dextro cordis ventriculo conspiciabatur.

Hinc conjectari licuit ex fermentatione nimia humoris melancholici, massam sanguineam orgasmo concitatam, cum per consuetas vias evacuatio non pateret, per ramum splenicum in Hepar, inde in cavam ac dextrum cordis ventriculum, exindeque per venam arteriosam seu arteriam pulmonalem facta vel anastomosi, vel ruptura ad superiora regurgitasse, illicque ob copiam & viarum angustiam circulationem sanguinis impeditam, indeque huic viro flammam vitalem extinctam fuisse. ex observ. *Laur. Wolf.*

Strigel Medici Viennensis, inmiscellan. curiosis
anni 1970.

*Hæmoptylis à lecore per fibras castis nothis
annexo.*

Vidi in hac Civitate Senatorem Clarissimum, qui cum ardenti febre correptus spumantem sanguinem spueret, falso judicatus est Pleuriticus, quia non à thorace sed ab hepate inflammato sanguinem spuebat, cum hypochondrii dextri dolore, & sine dolore lateris, tandem interit.

Dissectio hujus cadavere, inventum est fibris quibusdam connexum hepar cum nothis collis, ut inde vix avelli potuerit: *Duretus annot. in Hollerii lib. 1. cap. 26. de morbis fni.*

*Hæmoptylis ob Sanguinem à lecore in Pulmones
tram usum, eo per totum dislentos.*

R. P. Hieronymus Griffius, ordinis Prædicatorum, Juvenis optimo habitu præditus, in sanguinis sputum copiosum incidit, spumofum valde secundum totam substantiam, ita ut post concretionem totus cavernosus inftar spongiæ appareret, ad differentiam sanguinis cum spuma, quam in superficie tantummodo conservat, una cum hypochondrii dextri dolore, Et dum sputi sanguinis curationi incumbere, idem fluxus repetit sæpius, concomitabatur etiam tussis vehemens, cum sputi pituitosi copia non mediocri, ita ut dum alii Medici huic curationi adhiberi, timentes tabem, humectare corpus, jam sanguinis fluxu sedato, tentarent, à sputi copia suffocaretur: Quapropter ego Coactæ 360. sect. 1. autoritate permotus, ad Hepatis curationem me contuli remediis communibus, quæ hepatica medicamenta dicuntur, & inter ea Trochiscis cypheos, quos singulo mane exhibui, à qua curatione adeo sublevatus est ut sibi sanus videretur: Quia tamen ante perfectam sanitatem frigidiori vento se exponens à febre magna correptus est, eaque continua cum siti, spirandi difficultate, tussi, aliisque symptamatis gravioribus, à qua 25. dierum spatium extinctus est.

Cumque aperto cadavere partes lasas inspicere procurarem, unum primo occurrit mirabile, quia ventriculus omnino vacuus est inventus, etiamsi antequam moreretur, spatium non ultra 4. horarum plurimum commedisset, videlicet ferculum ex pane contrito, tria ova, panem & carnes (erat enim per totum morbum vorax multi cibi, nec ab eo se continere poterat) sed & intestina fere penitus inanita erant: Hepar satis magnum erat, alioqui sanum; Pulmo totus sanguine repletus mirum in modum tumidus apparuit, ita ut non vasa tantummodo turgent, sed per totam substantiam sanguis conglobatus scirrhi duritiem æmularetur, Nulla tamen alia læsio in eo apparebat: Cor & circumlitæ venæ sanguine mirum in modum repletæ inventæ sunt, & in latitudinem immodicam distentæ, imo & sinister cordis ventriculus sanguine repletus erat: Turgebant pariter venæ omnes, quæ per costas disseminantur; *Prosper Martianus comm. in aph. 11. sect. 5.*

*Hæmoptoe, Tussis, Pleuritis, & Empyema,
à duobus Claviculis fortuito in Pul-
mones delapsis.*

Vir quidem ex occupatione Cæmentarius, cum pro more in munere fungendo claviculos in ore detineret, ex forti cachinnodum sursum aspexit duos in Pulmones fortuito demisit. Illico ingenti tussi correptus est, & hæmoptoe; & ab illo tempore molestiam circa pectus sentit, nihilominus fungebatur munere solito, & post elapsam annum uxorem duxit. A celebratis vero nuptiis Tussis magis sæviebat, an à Baccho, Venere, tripudius vel à suscepto frigore me latet. Post 4. dies ingenti dolore dextri lateris, anhelosa respiratione & febre detentus, Dominum Morton, ut ipsi medicinam faceret, accersit. A datis medicamentis dolor iste Pleuriticus evanvit, febris vero, vigilæ & importuna tussis usque perieverant. In tantum vero quandoque sæviebat, ut erecto corpore per longum spatium cum maxima violentia miserum defatigaret. In casum vero tentatis vel optimis medicaminibus, & habito jam Prognostico, expirans fere tandem Medicum admonuit, de deglutitis (ut ipsi visum est) clavis. Dissecto corpore, dextri lateris Thoracis cavitatem materia purulenta repletam offendimus. Pleura hic insigniter crassa, alba & putrida fuit, & membrana dextrum Pulmonis lobum investiens ejusdem indolis. In eodem lobo Cystidem observavimus pure valde foetente & inftar Meliceridis repletam. Pulmones discolors fuerunt, & fere nigricantes, utrique lateri adhærebant, & sanguine & pituitosa purulentia multum infarcti. Juxta Trachæam ubique glandulas frequentes advertimus, viscida nigricante materia obfitas; & in ipsis Pulmonibus alias insignes materia steatomatosa turgidas. In cavitate vero Trachææ intra Pulmones ubi se in bronchias seu ramificationes suas diffundit, clavos istos duos juxta sitos, purulentia quadam obfitos & rubigine obductos, miseri hominis fati misericordes invenimus. *D. Ednard. Tyson. Medic. Anglic.*

Exenteratio Ancilla Hæmoptysi extincta.

Hæmoptoicam passionem, uti videre est in Ephem. Ann. 2. observ. 45. cum sanguine spumoso & florido sine dolore, tussique excreto curavit Excell. ac Experientissimus Dom. Dom. Georg. Wolfgang. Wedelius P. P. Medicus Ducalis Saxonicus, Vir certe de Arte nostra multum meritis. Ejusmodi hæmoptysin in ancilla 18. annorum temperamenti cholericæ hac in civitate Hanovienfi servitiis addicta observavi, quæ tempore matutino surgens, patre familias adhuc dormiente, valvulas fenestrarum aperit, hoc peracto, illa ad hypocæustum alta voce, ejulans accurrit, à quo clamore ejulatuque herus domus expergefactus ancillam in terra prostratam, sanguineq; fere obrutam stupens aspexit; Ego vocatus

vocatus puellam in sanguine quasi natantem, exanimatamque offendi. Cadaver ad secandum ab hospite petii, hospes annuit: aperto cadavere sequentia notatu digna; multis viris spectatissimis præsentibus, reperi. Abdomen dissectum exhibebat cuncta viscera optime constituta ovarium multis ovis tenuissimis membranis præditis repletum, siphone intruso, lacteque per ductum Fallopiæ emissio, evanuisse oia, quæ illustrant nostram conceptam opinionem, quam de conceptu fovemus. Hepar justæ erat magnitudinis sine vitio, folliculus fellis totus bile vacuus reperiebatur, nullam enim (vera dico) guttulam bilis exprimere poteram: thorax pulmones exhibebat ad nigredinem vergentes, inflammatosque in isdem venam cavam disruptam, sanguineque multo spumoso repletam. Cor sanguinis albescebat, ventriculi cordis, arteriaque magna grumescens continebant sanguinem, & vix uncia sanguinis in toto relictæ cadavere. Hæc perperis, si causam mortis in bilem in sanguinem effusam eundemque nimis fermentantem conjiciat, fortasse hæud a scopo aberrabis. *Johannis Dolai.*

Hæmoptici post obitum dissecti.

Advocatus longo tempore sæpe sanguinolenta, deinde purulenta expuit. Quaritur de magno dextri lateris dolore. Tandem e vivis excessit.

Libuit post mortem pulmones indagare.

Utrique costis firmiter non tantum adnati sed & interius diaphragmati.

In l. tere dextro fragmenta quædam bronchiorum, cum pulmonum membranosa substantia erant avulsa & putrida: pus cruentum copiosum. Vox clangosa fuit.

A sanguinis sputo puris sputum malum: atque hoc in nostro causatum patrono manifestum; ab incunabulis ei pulmones diaphragmati connexos fuisse facile fidem meretur. A quavis occasione; idque à longo tempore, forte nimio corporis motu, aut alias, sanguis, quam potuit celeriter, per pulmones ruebat, unde valorum pulmones perpetuantium hæu, sanguinique effusio; cuius putredine adjacentes partes corruptæ, imò & tracheæ ramulus unus aut alter, quæ via materia sanguinolenta extusiri debuit. Interim cum plaga in principio neglecta fuit, tandem & purulenta ejecit; quia vascula lymphatica a sanguinis effusi compressione obstructa lympham effundebant, quæ post aliquid temporis moram in pus versa est.

Hæud mirum cum de dextri lateris dolore conqueri, cum ob diaphragmatis & pulmonum connexionem respiratio libera & denegata fuerit, nam respirando membrana connectens jugi fibrarum elongatione lasa fuit.

Porro cum pulmones perforati sint, aut alio modo lasi, vox ipsa variatur hinc clangosa facta est. Pro varia enim pulmonis & laryngis dispositione, etiam vocum efflatio mutatur, quod unicuique obvium. *Stephan. Blancardus in Anatomia Practica.*

Unde quadraginta annos natus vir, ut dicitur, melancholicus, & hypochondriacus, per aliquot annos de dolore sinistri hypochondrii vexatus, occidit post prægressam fluxum hæmor-

rhoidalis suppressionem in sanguinis sputum singulis tribus mensibus repetens, alio tertio requies animam evomuit cum sanguine.

Lien non tantum magnus, sed & lividus & flaccidus. Vasa mesenterii & orienti atro sanguine turgabant & varicosa videbantur. Ren sinister toto flaccidior & magnitudine inferior dextro: dexter vero in parte superiore extorsum vesiculam ad magnitudinem pilæ luforia, latice subflavescente turgidam habuit. Pulmones sanguine nigro repleti ac inflati.

Quorum quatuor aciditatibus: bund. & inspissata sanguine gaudent; non quod sanguis ad saporem usque acidus sit, sed cujus particulæ salivæ volatiles instar salis armoniaci sunt, quod in officinis venditur: illud quippe constat quidem ex particulis volatilibus, verum ab acidis particulis ita donatum, ut vix sui juris sit, nisi addantur alia quædam particulæ planè alcalicæ, tunc acidum domatur, & quod volatile erat, jus pristinum, in statu volatilitatis existens, possidet. Ad eandem plane normam res se habet in agro nostro, cujus sanguis ita est inspissatus, ut inde obstructions patiatur. Revera quantum acida nocent norunt ii qui acetariis quotidie vescuntur, vel in morbos vagos, vel chronicos, cum adoleverint, incidunt; nisi exercitiis inutile acidum (rustici enim, præsertim in Frisia serosa lacte, nec non sero acido multa copia utuntur) per diaphoreses vias evaporare cogant. Verum desides ac studiis continuis dediti, nullo exercitio corpus suum & sanguinem commoventes, non multum transpirant, acidumque in sanguine servant; & hinc, pro dolor! illæ lachrymæ.

Sanguis ita inspissatus & in liene à particulis tenuibus (lien enim multum lymphæ a sanguine segregat, inque chyli cisternam ablegat) liberatus magis densatur, adeo ut ipse lien obstruatur, hinc hypochondriaca passio sive lienis intumescens. Ob eandem causam, sanguis per arterias hæmorrhoidales in venas eiusdem nominis transire impotens partes anni dilendit, & aneurismata concitat, quib. ruptis sanguis effluens fluxus hæmorrhoidalis dicitur. Sæpe tamen varices eodem in loco concitantur, sed hoc plerumque fit à prægressa alvi constipatione, qua sanguinis regressus impeditur ita ut venæ magnopere distendantur, tandemque rumpantur.

Incidit quoque æger noster in sputum cruentum, seu hæmoptylum; quod non mirum, quoniam sanguis etiam per pulmonum vascula sanguinea liberum transitum non habens, & ab adveniente per arteriam pulmonalem, sanguine propulsus, tenera vascula ita dilatavit, ut tandem rupta sint, unde sanguinis extravasatio, & per tracheæ ductus excretio. *Idem ibidem.*

Mulier apud nos obstetricatoriam exercens artem & jam 73. annos nata, jam dudum hæmoptysi obnoxia vixerat, cui ultimis vitæ temporibus tantus se adjunxerat dolor radices mammae dextræ occupans, ut ibi canceri malignioris semina delitescere crederent quidam; Baccho interim non parum litabat ac merum paulò largius ebibeat, unde tandem, in inflammationem quid incidens, ac sanguinem pleno quasi alvo tussi rejiciens, animam efflavit.

Aperto thorace pulmones in universum male affecti viscebantur ac præcipuè dexter major lobus

bus, is enim per totam suam investientem membranam colius adharebat, ad latera scilicet, antè & postè; imò cum aperiretur cochlearia aliquot puris foetidioris ex abscessu contento fundebat. Notandum autem quod pars pleuræ abscessui memorato apposita, non parum vivebat, unde procul dubio dolor ille qui cum in ima perferiretur dextra mamma, cancer suspicionem faciebat. Scilicet ichor ex hoc foco continuo transudans, pleuram salinis suis aculeis, causticu n quid redolentibus, perturbans, ejusque texturam sentim destruens, gangrenosam induxerat dispositionem, unde non mediocri dolor enatus fuerat, in parte exquisito prædita sensu; cujus cum sedes non ita accurate perciperetur, non mirum si ipsi musculi pectorales mammiis suppositi recusatentur. Cor erat flaccidum in ventriculo suo sinistro poly-pum duos transversos digitos cum dimidio longum, octo vero lineas crassum complectens.

Referato dein abdomine vidimus ventriculum omnino flaccidum ac rugis prorsus destitutum; magnitudinis naturalem non parum excedentis. Jecur erat albidum a siccum intus & exius, non ablimile jecori quod aqua per aliquod tempus incoctum fuisset. Lien aderat naturali duplo major ac per sui substantiam & membranas prius dissolubilis, ita ut sub digitis ad instar luti tenuioris distunderet. Renes reperiebantur flaccidi, sed minime ulcerati, quamvis in eorundem pelvi sanguinolentum contineretur lotium &c.

Hinc inhaesitanter asserimus serum acius tot malorum causam extitisse, ac non tantum pulmonum vasa erodisse, sicque sanguini impetuosius per illa exiliens, viam aperuisse; sed etiam fibrois ac ex parte glanduloso renum corpori interfecisse, & cum cruore admixto in ejus pelvim visum esse. imò totam lienis compagem ac texturam destruxisse & in purulentum quid convertisse.

HÆMORRHAGIA.

Curatiores.

Sicut ars naturam imitatur, sanguinem copia, aut crassi, aut etiam motu peccantem, per phlebotomiam emittendo, ita huic laboranti, aut perperam agenti eadem succurrit, sanguinis effluxum, si quando immodicus, aut noxius fuerit, sistendo. Cum variaz, & multiplices sint hæmorrhagiæ species, ad eas omnes medicina non opus est. Si forsitan continui solutione, per accidens externum, uti vulnus, aut plagam excitata, cruoris effusio magna contingit, Chirurgia administrationum modos, quibus cohibeatur illa, suggerit. Porro hæmorrhagia dum critica fuerit, merito naturæ (dum sui juris est) regimini relinquenda, nulla medicina interturbare debet; quin ad symptomaticam, donec parva, ac minus incommoda est, interueni minime requiritur: attamen tum præcipue, & ferè tantum hac opus est, si quando sanguinis fluxus aut immodicus sit, aut per loca incongrua erumpat.

Eruptiones sanguineæ posterioris generis

medelam imprimis exigunt, si forsitan cruor tusus, aut vomitu sursum ejicitur, vel deorsum per sedem, aut vias urinarias excernitur. Eumvero in his casibus, licet sanguinis excreti quantitas læpissime haud multum timeatur: attamen quia continui solutionem ita in pulmone, vel in stomacho, aut intestinis, vel in vena facit, non raro ulcus periculorum, aut exitiale sequitur; ideo hæmorrhagiis istis a prima statim apparentia sedulo occurrendum est. Idcirco inter morbos illorum partium, tales excretiones sanguinolentæ recentur; atque nos jamjam Hæmoptoes, & affectionis dysentericæ theorias, & medendi rationes alibi tradidimus, ut non opus sit eas hoc in loco repetere. nec etiam urinæ ciuentæ, siquidem ad pathologiam nephriticiam pertinet, medelam hic proponere: quin vero ad pathemata illa, a quibus ob sanguinis effluxum immodicum, remediis ut jam præcipue opus est, transibimus.

Hujusmodi affectionum species potissima sunt hæc tres, viz. hæmorrhagiarum, nientium, & hæmorrhoidum fluxus immoderati. Utinam hujus curatio ad Chirurgiam magis quam ad Medicinam spectet, atque alterius considerationem ad pathologiam hylicam referre visum est. *Ἀιματόρρεια* e naribus generalissima istiusmodi pathematum species, utpote à cujus diagnosi & Therapeia rite designatis, medicamentorum usus, & efficacia optime vincant: nam quæ ad hujus eruptionis sanguineæ causas, & curationem explicandas proferimus, ad ceteras quasque hæmorrhagias immanes accommodari possunt.

Observatio satis vulgaris est, sanguinis e naribus effluxum plerique hominibus propter magnas occasiones passim evenire; non quoties sanguis vel ob propriam turgentiam, vel ob vasorum laxitatem, erupturus, alicubi viam facere, aut invenire aptus est, naturæ ultimum quodam læpissime ad nares, quasi partem facillime aperiendam dirigitur. Vana è quibuslibidem effluit, sunt propagines rami Arteriales à Carotide, postquam Cranio superato cerebri basin attingit, profectis hæc enim juxta processum manubares procedens, plures furculos quiquaversus a se dimittit, quorum aliqui notabiles, cum nervis olfactoriis foramina ossis cribrosi transientes, per membranas glandulosas summæ naris antractus investientem distribuntur. Arteriz hæc nasales, à carotidis trunco, intra cranium primo abscedentes, sanguinis partem maxime serosam à cerebro anticipant, atque serum ipsum, & recrementa alia aquosa, in naris glandulas, velut propria istius regionis emunctoria deponunt, unde in cavitatem ejus destillant. Quæ propter siquidem Arteriolarum istarum oscula propter feri exudationem serper paululum dehiscunt, nihil mirum est, si ipsæ sanguis turgidior facias, eadem [quæ non raro ex se nimis laxa sunt] paulo amplius referans foras erumpat. Postea hoc tum feri, tum sanguinis emissarium ordinarie, aut pro data occasione recludi aptum, cerebri, aut præcordiorum, imò nonnunquam totius corporis magnas incommoditates præcaverit aut curat.

Namque imprimis hac via serum (prout dixi) à capite derivatur, cumque vasorum istorum ora à Ptarmaco nari immisso vellicantur ac irritantur.

irritantur, serum exinde copiosius elicitur, quod tamen non a cerebro descendit, (uti vulgo putatur) sed ne ipsum petat, per arterias hæc nasales anticipatur; e quibus cum errhinorum usu uberius exprimitur ac emulgetur, propterea cerebrum magis serenum, & nebulis immunne evadit. Deinde secundo ne cerebrum à sanguine impetuosius inundante obruatur uspiam, portio hujus per hæc vasa abscedens, & foras erumpens facile impedit.

At vero interdum accidit, hujusmodi hæmorrhagiam in morbum, potius quam remedium cedere. Si quando enim sanguis à nare crebrius, & copiosius quam par est effluet, si non vix illico obnumia ejus impendia periclitabitur, exinde tamen reliqua cruoris massa depauperata, & crasin suam amittens, diathesin Cachecticam, & non raro hydropicam acquirat; quemadmodum in superioribus satis clare innuimus: ubi insuper ostendimus hujusce affectus Ætiologiam, cum aliis hæmorrhagiis nisi communem, aut in sanguinibus, aut in vasorum, aut simul in utriusque horum vitio consistere.

1. Sanguis per se hæmorrhagiam inducens, aut quantitate, aut qualitate peccat; proindeque dum occasionaliter efferverit, mira vasa contineri nequit, quin eorundem ora aut distendendo aperiens, aut acrimonia sua referans, foras exilit: quibus accedit, quod sanguis interdum in conpage solutus & quasi venenatus, circulationis filo continuando impar evadit, quatenus nimirum portiones ejus ab invicem decedentes, partim in carne aut cute delignantur necrosin paties; partimque erumpentes, hæmorrhagias immanes & non raro letales cient; uti passim in febribus malignis, & aliquatenus nonnunquam in scorbutico cernitur. Attamen sanguis mera quantitate, aut acrimonia peccans nisi vasorum culpa etiam superveniens effluxum ejus prorit, aut facile minus permittat, raro in hæmorrhagiam immanem erumpit.

2. Itaque vasa sanguifera, quoties ad affectum istum producendum conspirant, in vitio esse solent, vel primo quatenus ob fibras nimis laxas, & debiles, oscula illorum dehiscunt, sanguinem ex arteriis in venas non expedite transvalant; quod vitium in scorbuticis, & cachecticis passim contingit; vel secundo quatenus ob easdem fibras motrices spasmodice affectas, & convulsas, sanguis huc illuc, & in primis versus caput impetuose correptus, propter continuandum circulationis filum erumpere cogitur; prout ex Ægrotantis casu (quem infra subdicemus) plane apparebit.

Quoad I. cognosin, etsi primo immoderatus sanguinis fluxus, in variolis, morbillis, febribus malignis, ac in peste semper malum portendat, eumque sisti expediat; attamen non meris refrigerantibus aut revulsoriis cohiberi, sed per hydropica temperata in diaphoretin commutari debet.

2. Hæmorrhagia narium haud immanis, in cachecticis cum pulsu debili, & sudore frigido, multo periculosior est, quam valde copiosa in hominibus sanguine prætervido, & pulsu satis forti præditis.

3. Morbo huic propter sanguinis dyscrasiam, simulque vasorum laxitatem obnoxii, si insuper fibrarum Arteriarum diathesis spasmodica ac-

cedat, longe difficilius curantur; & non raro, propter magna sanguinis impendia, ad extremos languores rediguntur.

4. Quibus febricitantibus sanguis n. vitus & narius effluet, & morbum non judicabit, expe loco criseos, affectio delira aut soporosa succedit. Restant plurima alia circa hæmorrhagiam prognostica, olim ab Hippocrate accurate notata: quæ tamen ad præsentem proprie spectantia hoc in loco præterimus, siquidem tere tantum affectus hujus in genere therapia hic intenditur.

Circa quam tres erunt primariæ indicationes, scilicet Curatoria, vitalis, & præservatoria. Dux priores symptomata quoties urgebit illico sistendum respiciunt; ac ultima morbi causam, quo minus, aut minima hæmorrhagia insultus redeant, tollendam satagit. Præterea hæmorrhagia alio modo sine febre, & nonnulla diverso si cum illa urgebit, tractari debet.

Si quando igitur circa febrem, sanguis multus e nare effluerit, illico ut remedium erumpens opus fuerit, tres erunt præcipue intendendi intentiones, simul omnes in praxin sumenda. Viz, sanguinis turgescencia, quo minus in partem ordinatam aptus fuerit, compescatur. Porro itidem debet opera, tum ut fluxio ejus a naribus avocata, alio divertatur, tum ut vasorum ora intra nares dehiscencia occludantur: in quos fines remedia, tum externa, tum interna quam plurima ac diversimoda adhiberi solent; de prioribus ordine ac breviter dicemus.

Primo igitur Ægrotans cum situ capitis erecto quietus maneat, dein brachiorum, & crurum artus una plures, sed non omnes ligaturis arctis constringantur; quæ tamen subinde solvi, & in alias partes transferri debent; namque omnibus simul, & diu ligatis, propter sanguinem in externis detentum, & a corde nimis exulantem, lepythymias terribiles accidisse novi; secus autem hoc remedium prudenter adhibitum non raro juvat. Quippe cum hac ratione sanguis in membra per arterias exeuntes, inhibetur ne statim per venas redeat, impetuosior ejus in caput latio impeditur. Porro per artuum ligaturas dolorificas, arteriarum carotidum fibræ musculares à spasmis, quos sæpe movent, avocantur.

2. Ad sanguinis fluxum à naribus devocandam, quandoque expedit venam in brachio, aut pede aperire. Quippe quo plus sanguinis per arterias ad venæ sectionis locum feratur, eo minus erit affluxus ejus ad nares. Attamen hæc diminutio non usque adeo semper juvat, quin effectus ejus contrarius nonnunquam accidit; prout supra in Hæmoptoe notavimus. Cuius ratio est, quod vasa subito & non satis depleta, humores incongruos prius ejectos, & infra poros stagnantes, denuo resorbent; à quibus sanguis, illico in majorem turgescenciam eruptivam accietur.

3. Frigida fronti, ac temporibus, etiam nucha, ubi arteriæ vertebrales ascendunt, applicata, vasa constringi, & sanguinis affluxum nonnihil reprimi, aut repelli faciunt. Attamen niale est, quod nonnulli venis jugularibus Topica infrigidantia adhibenda consulant; ita namque sanguis in recursu tardatus, uberius e naribus effluet. Porro quod usitatum est lintea, aut spon-

giam aceto madefactam, pubi & genitalibus applicare, haud alia ratione quam ligatio membrorum juvat; in quantum scilicet sanguinis venoli refluxus impeditur. Aquæ frigida in faciem subita ac inopinata asperio, quatenus terrorem incutit, hæmorrhagiam non raro sistit.

4. Cucurbitæ hypochondriis, illis, internis femoribus, imo & pedum plantis applicandæ, apud medicos tum veteres, tum recentiores propter sanguinis ex naribus devocandam, celebre remedium habentur. Et quidem hujus ratio facile constat; quia scilicet ventosa inposita, per ostioli spatium, aeris impulsu prohibito, & circumcirca aucto; illico sanguis & humores, imo & vapores, & partes solida, ab alia quavis tendencia avocati, versus inane cucurbitæ subitratum pelluntur.

5. Frictiones extremorum à quibusdam practicis in hoc affectu commendantur, quas tamen non ulque adeo utiles, imo vix tutas censemus, quia licet sanguinis ad pedes aut manus apputum majorem sollicitant, adeo nihilominus, reditum ejus accelerant, ut tota cruoris massa in effluventiam concitata, de iis ejus ad nares violentiore periclitetur.

6. Zacus Lulianus inter revulsoria remedia, proponit cauterium actuale utrique plantæ pedum applicandum; & Crato digiti minimi ex eodem latere incisionem, quod si quidem nullo cum negotio fiet, experiri oportet, non ita de remedio altero consulimus, nisi juvandi ratio esset certior, quæ dolorem & claudicationem insequenturam compensaret.

7. Leptochymia quocunque modo excitata, hæmorrhagiam ut ut contumaciam illico ut plurimum sistit, quare cum animi languidi & lectio eximuntur, aut Phlebotomia tam etiam parciorem timidi admittunt, vel menbra habent diutius ligata, vel cum ore quolibet fieri subito perterrentur aliam quamvis occasionem, ut synopen sive animi denique moriunt, sanguinis e naribus effluxus e vestigio cessat. Cujus ratio satis evidens est; quia quamprimum cordis motus fatiscit, illic statim & sanguis, & spiritus, ruunt proinde ut effluxus omnis exterior derepente sistatur, & qui immodicus antea fuit non denuo repetat.

8. Ultimo in loco, ad reprimendum sanguinis e naribus effluxum, recenseri debent remedia quæ modo occulto, & per sympathiam, aut antipathiam operari perhibentur; cujusmodi imprimis sunt, pulvis sympathicus, ex vitriolo Romano per solem æstivum ad albedinem calcinato; item ligni e fraxino virgineo sive primum arborecente, & circa montem, quo sol Tauri signum ingreditur, incisi portio: cujus remedia efficaciam, in nupero bello civili, pro sistendis militum vulneratorum hæmorrhagiis, plures fide digni probatam testantur. Quin etiam adhuc nonnulli hoc cum multa fiducia, in qui usvis sanguinis eruptionibus præscribunt. Hujusmodi effectuum, si modo sæpius eveniant ratione sine latere fateor. Porro nec minus empiricum & remedium videtur, quod sacculus e serico, cui boso siccatu includitur, supra ventriculi scorbem gestatus, hæmorrhagiam quicunque sistat, ejusque reditum præcaveat: nisi forsitan (juxta Helmontii Aetiologiam) applicatura ista Archæum terrefaciens, sanguinem

illico percussum, ab excursu suo inordinato recedere aut desistere cogat.

Restant multa alia hæmorrhagiam celebrata, quorum operatio ad causas occultas, & virtutem quandam secretam reteri solet: uti sunt monilia ex lapide hamarite collo suspensa, item usnea, sive muscus crani humani, manu gestata; epithemata ex foliis urticae contusis, & plantis pedum ac volis manuum applicata; cujusmodi administrationes empiricas cum citra molestiam aut sumtum adhiberi possint, non est ut recusenmus: præcipue si quidem in casu periculoso fere nihil non agendum sit, cumque ejusmodi applicationes eo respectu interdum juvent, quod agitantis imaginationem corroborant.

Dum hujusmodi administrationes externæ, ad sanguinis effluxum a naribus reprimendum, aut devocandum usurpantur, etiam topica alia naribus indantur, quæ vaforum ora dehiscencia occludant; in quem usum liquidorum injectiones turunda, pulveres insufflati, & suffitus præscribi solent, quibus non juvantibus, ultimo ad escharotica deveniatur.

9. Inter liquida, non modo prima, sed instar omnium habetur, solutio vitrioli in aqua fontana facta, quidam in hanc pro magno secreto & certissima insuper venditant. Profecto eadem vulnere recenti applicata, quatenus vasorum dehiscentiam extenuat, tes, corrigendo occludit, sanguinis fluxum cohibet, ac potenter sistit. Verum applicatio ista in hæmorrhagia narium, ubi sanguis ad arteriarum ostia dehiscencia delatus, excipi debet à venis, quatenus his æque, ac potius quam illas occludit, minus, ac sæpe non omnino prodest, prout sæpius expertum novi. Paratur medicamentum hoc, ex vitriolo viridi, viz. Hungarico, aut Nostrato etiam ex vitriolo Martis facticio, in f. q. aq. fontanæ dissoluto. Scio nonnullos commendare vitrioli Romani solutionem, quam non tantum injiciendo, adhibere solent. Quia & aquam ex infusione vitrioli albi, cum bolo & camphora paratam, tum ad vulnera, tum d. alias hæmorrhagias frequenter, & quidem utiliter usurpant novi.

10. At vero si quidem aqua n. ri injecta vasorum ostiis non satis adhæret, sed à sanguine erumpente eluitur, priusquam virtutem suam exerere possit; iaculo potius expedit, vel pulverem stypticum insufflari, turundam aquæ vitriolice imbutam, aut per se, aut pulvere astrigente imbutam, ad naris summitatem introduci. In hanc rem pulveres styptici plures ac diversimodi præscribi solent; ego sæpiissime uteror ut croco martis ad summam rubedinem calcinato, aut pulvere vitrioli camphorati, aut fuligine vitriolica de fundo cacabi znei veteris derasa, cujus pulverem in hoc casu sæpe cum successu expertus sum. In obstinatis hæmorrhagiis aliisque remediis non cedentibus, turunda, cujus summus colcothare caustus, imbuatur, naribus altissime immittatur, ut vasorum ostiis multis, & eschara obductis sanguinis effluxus omnis illico sistatur. Errhina multa alia hæmorrhagiam apud praticos celebrata habentur, cujusmodi sunt sterces porcinæ naribus intrusæ, quod utroque odore terro sanguinem effluxum repellere putatur: item fumus sanguinis in ferrum candens exillantem, in naribus

sem repercussus, cuius etiam ita combusti pulvis intus exhibetur. Ufnea sive mulcus cranii humani inhumati naribus inditus, ad hunc effectum a nonnullis valde commendatur: sed huiusmodi applicationes posteriores si quicquam omnino valent, ad Ætiologia sympatheticam referri debent.

Hæc de remediis *externis*, quorum virtus, & efficacia nimis ab internis temperative exhibitis & cooperantibus promoveri debet.

Itaque victu tenui instituto, & Ægrotante in situ erecto, aut non multum supino se continere iussu, dum administrationes prædictæ ordinatim adhibentur, medicamenta in eundem finem appropriata etiam intus sumenda præscribuntur. Huiusmodi remedium duo præcipui erunt scopi, viz. primo ut sanguinis effervescencia sive incensive fermentativa suppressa, liquor ejus intra vasa coercitus, placide circuletur. Secundo, ut cordis motus impetuosior, sanguinem nimis rapide circumpellentis per suffraganea idonea deprimatur.

1. Intentio prima ejusmodi medicamenta requirit, quæ sanguinis accensionem nimiam supprimunt, ejusque fermentationem indebitam sedant, in quos usus sequentia præscribere soleo.

℞. Aq. plantaginis, papaveris Rhead. portulac. Ipermatis ranarum, ana ℥iij. syrupi nymphae ℥ij. salis prunel. ʒj. m. f. julap. dos. ʒij. ter aut quater in die.

℞. Aq. hordei lib. ij. flor. rosar. rubr. Mj. spir. vitrioli q. s. ad gratum acorem, sive circiter ℥ij. f. infusio tepida, ad tincturæ extractionem, adde syrupi de succo hyperici ℥ij. dos. ʒij. vel iij. ad libitum sæpius in die vel noctu.

℞. Folior. urticæ urentis, plantaginis, ana M iij. contulis affunde aq. plantaginis ℥vi. f. expressio fortis, sumatur.

2. Propter secundam intentionem, viz. ad cor vehementer nimis pulsans suffragandum hypnótica & opiata conveniunt.

℞. Aq. papaveris Rhead. ℥iij. syrupi Diacod. ℥ss. milce, f. haustus sumendus hora somni, vel.

℞. Conserv. rosar. rubr. ℥j. ss. pulv. sem. hyoscyami, papaveris albi, ana ʒ. ii. syrup. papaveris q. s. f. opiat. dos. qu. nucis molchat. sexta vel octava quaque hora vel.

℞. Laudani Cydoniati ʒj. dos. gut. xv. bis in die in vehiculo idoneo.

Hæc de Hæmorrhagia immodica, ejusque remedio quando sine febre contingit: quæ vero in febre eveniens, propter nimiam sanguinis impendia sisti debet, vel est Critica, propter accidens quoddam in immoderationem excurrent, ad quam methodus, & medicamenta modo præscripta, cum cautione quadam, & respectu ad febris statum habito, accommodari possunt; vel est mere symptomatica, quæ in febre maligna, petechiali, variolis, morbilis, aut peste excitata, remediis supra dictis repelli, aut sisti vix potest, aut debet. Sanguinis enim emissio non convenit; Topica repellentia, item iulapia vel decocta refrigerantia, aut narcotica, locum non habent: præcipua medendi intentio est, ut hæmorrhagia in diaphoresin commutetur; nam sudore blan-

do excitato, fluxus sanguinis, si non admodum sit periculosus, frequenter sponte cessat.

℞. Aq. ulmarie, tormentillæ, ana ℥iij. cordialis frigid. Saxon. ℥ij. Theriacalis ℥ss. Aceti ʒ. iij. syrup. e Corallis ℥ss. confect. de hyacinth. ʒ. ij. f. Julapium, dos. cochl. vi. per una quaque hora.

℞. Pulv. Bufonum præp. ʒ ss. camphoræ gr. ij. sumatur cum Julapio prædicto sexta quaque hora, vel.

℞. Confect. de hyacinth. ʒ iij. pulv. Pannonici rubr. ℥j. syrup. e Corallis q. s. f. Confect. dos. qu. nucis molchat. alternis horis.

℞. Radic. Bistortæ tormentillæ, ana ℥j. folior. ulmarie, pimpinel. lululæ, ana Mj. C. cervi usti ʒ ij. rasur. eboris, C. cervi, ana ʒ ij. coquant. in aq. fontan. lib. iij. ad ij. adde circa finem con. rosar. rubr. ℥iij. f. colat. dos. ʒiij. sæpius indic.

2. Hactenus de Indicatione prima Curatoria, una cum medendi scopis, & Remediorum formulis ad Hæmorrhagiam enare, cum, vel sine febre contingentem destinatis. Indicatio secunda vitalis solimmodo victum requirit, Cardiacæ temperata, & Ægrotantis tractationem idoneam præscribit, Priorum apparatus adeo parvus, & facilis est, ut non opus videatur ad ea modum, & regulas particulatim designare. Circa posteriorem præcipua quaestio est, utrum *supra* in, vel extra lectum detinere oporteat. Extra dubium est languidos, & crebræ leipothymie obnoxios, multo san tentaminis curativi (prout supra innuimus) gratia, excitandos non esse; quoad alios minus imbeciles ita statuendum videtur. Quorum sanguis ob poros contractos non facile transpirat, arque à lecti calore incitatus ille in turgescencias majores, & eruptivas aptior est, expediet eos non tantum extra lectum donec sanguis effluet manere, verum insuper nonnunquam, per applicationes externas, in toto corporis habitu, aut saltem in plerisque membris in frigidandos esse. Quamobrem Fabricius Hildanus narrat se quendam maximarium hæmorrhagia correptum, post multa præsidia ordinaria in cassum tentata, labro aqua frigida impleto immeruisse, & subito curasse. Cum pari item successu, Riverius alium simili modo affectum, lecto exemptum, & super matram laneam in pavimento recumbere jussu, linteis oxycrato madidis per totum corpus fovebat. Attamen hæc methodus non passim omnibus, aut omni tempore convenit; verum è contra quorum sanguis halituosus & poris apertioribus potius, facile evaporat, & à calore moderato ambiente in sudorem exolvitur, & proinde sedatius habere solet, eos intra lectum manere convenit, non modo dum sanguis erumpit, sed quandiu eruptio ejus subinde redire periclitatur. Profecto ob hanc rationem est, quod plures hæmorrhagiis immanioribus obnoxii, durante ætate, quando liberius transpirant, eo morbo immunes degunt, ut gente vero frigore brumali, ob poros contractos, insultus eos magis crebros, ac diros patiuntur.

3. Indicatio tertia præservatoria, quæ morbi istius causam tollendam respiciens, sanguinis eruptiones aut inhibet, vel easdem rariores

aut minores reddit, binas hæc præcipuas medendi intentiones suggerit, viz primo ut sanguis ad temperiem & mixtionem debitam re-stituitur; intra vasa absque turgescentiis, & eruptionibus placide circuletur. Dein secundo ut vasa sanguifera, quoad osculorum conformationes, & fibrarum muscularium tenores, usque in statu legitimo contineantur; ita ut neque sanguinis in caput inordinatas illa efficiant, aut e naribus effluxus sinant. In utroque hos fines imprimis sanguinis nimia copia, & magna impuritas, per phlebotomiam & cathartica tempestive celebratas, sedulo præ-veantur; dein propter *Angustiam* ejus procurandam & conservandam, alterantia sequentia, aptis medendi temporibus exhibeantur.

℞. Conserv. rubr. Cynorrhodii, ana ℥iij, pulv. santalorum omnium, ana ℥β. coralli præp. ℥j. croci martis rubicundissimi ℥ii. f. lis prunel. ℥iiij. cum f. q. syrupi e corallis, f. electuarium, capiat primo mane, & hora somni qu. nucis castaneæ vel per se, vel superbibendo aq. destillat. sequentis ℥iij.

℞. Summitatum cupressi, Tamarisci, ana Mviij. summitat. hyperici, Tamarisci, equiseti, ana Miiij. santalorum omnium contus. ana ℥j. mixt. panis albi lib. ij. Minutim concisis, atque de lactis recentis lib. viij. destillentur organici communibus; edulcoretur quæque dosi inter sumendum, cum f. q. syrupi e succo plantaginis.

℞. Folior. plantaginis, beccabungæ, urtice ventris, ana Miiij. contusa affunde aq. præscript. lib. f. Aq. cinnamomi tenuioris ℥ij. f. expressio fortis dosi ℥iij. ad iij. mane hora nona & quinta p. m.

Hujusmodi medicamenta sumantur vere ac autumno per xx. aut xxx. dies. quandoque leue catharticum intercalando. In ætate vero bibantur Acidulæ chalybeatæ per mensem, quibus in hoc casu non datur præstantius remedium. Emulsi quæ præsto sunt hæmorrhagia laborantium ac curatorum exemplis, liber modo unicum, sed rariorem, hic proponere.

Nuper ad distans consulebar, pro generoso quodam sanguinis eruptiones crebras, & immanes, modo ex naribus, modo vasis sedalibus, aliquandiu passio. Huic Phlebotomiz ex amicorum susçu frequenter celebratæ, nihil profuere; imo sapissime post venæ sectionem in sudores frigidos, ac leipothymias incidens, atque sanguinis eruptionibus nihilominus obnoxius, multo deterius habere solebat. Huic ego nondum viso iulapii, & decocta refrigerantia, & Anodyna, item herbarum expressiones succulentas, aliaq. sanguinem refrigerantia præscripsi; verum etiam his (quasi omnia adhuc essent à scopo aliena) nihilo melior adfuit successus. Tandem rus ad eum invisendum accersitus, reperi affectionem. qua laborabat iste mere aut potissimum spasmodicam fuisse; quippe cum sanguis quotidie erumperet, pulsus erat debilis, extrema frigebant, & vasa omnia quasi nimis inanita conciderunt; porro Aegrotans vertigine fere continua, ac cordis tremore, & subinde leipothymia, aut metu ejus afficiebatur. Profecto tantum aberat ut sanguis ob plenitudinem, aut turgescentiam nimiam e vasis erumperet, ut potius e contra ri-

vus ejus admodum depressus, & tenuis, vix circulationis fluente luamendo par videretur. Attamen quod res fuit, lapsus in die perientificabat in corpore suo aliquid modo, tumum, modo deorium sub status specie contestim obrepere, & plerumque motus illius tendentiam, sanguinis e naribus, aut hæmorrhoidibus effluxus sequebatur; hinc ut facile concludere eliet, valorum sanguiferorum fibras, quibus contrahuntur illa, morrices spasmio affectas, sanguinis fluxum, ut ut tenuem, & dimissum, huc, illuc morripuisse, & subinde in eruptiones compulisse: quod item facilius evenit, in quantum vasorum ora laxa, & desiccata, et orem ad ea compulsum absque remora debita effluere sinebant. Aetiologiam hanc medendi methodus instituta, quatenus tali supposito innitens feliciter successit, plane comprobatur; nam Phlebotomia: & medicamentum *ex quo* vii deinceps omisso præscripti utrum pulveris sequentis, cujus dosi sexa quaque hora, cum iulapio idoneo sumebatur.

℞. Pulv. radic. peroniz maris coralli rubr. margaritarum, ana ℥j. eboris, oculorum Cancri, Lapidis hæmatit. ana ℥ii. lapidis prunel. ℥j. f. Pulvis dosi ℥ii.

℞. Aq. ceras. nigr. ℥viij. meliss. cinnamomi horde. ti. ana ℥ij. lactiacalis ℥j. syrup. e corallis. ℥ii.

Ceterum præcepi, ut ligaturæ quibusdam locis ex ritu constanti, & subinde aliis pro data occasione, tum ad sistendos, tum ad interceptendos vasorum spasmos adhiberentur; atque huiusmodi remedium, & administrationum modis sine ulla morbi recidiva brevi convaleuit. *Thomas Wilis. Pharmacopoeia Rationalis Part. .*

Tritariam sanguinem e suis vasis effluere posse Medici communiter arbitrati sunt, nimirum per Anatonosim, Dierefim aut diapedesim. Anatonosis a vasorum molitie, & sanguinis plenitudine. Dierefis ab humore acri, vehementi medicamento, ictu, casu, vulnere, Diapedesim a venarum raritate, & sanguine tenuiori, serotiorique fieri dicitur. at plerumque prodit sanguis a suis conceptaculis, aut ab acido in se contracto, aliundeve suggesto; aut ab alkali abundantiori, acido convenienti non coercito. Utrumque enim cum moderationem non servant, fluxum sanguinis promovent: ut in scorbuticis, hecticis, ictericis, sæpe sæpius experimur.

Quocumque modo sanguis e naribus effluat, nisi virium imbecillitatem, ex pulso languido, visus, & auditus hebetudine, capitis languore, tactus tepore; aliisque symptomatis, indicatam minetur, non statim sistendus est. præsertim cum cruce erumpit, & cum manifesto levamine patientis. Sic capitis dolores, febres ardentes, phrenitides hystericas affectiones ex mensium suppressionibus, spirandi difficultates: aliasque ægitudines per narium hæmorrhagiam non raro curatas vidimus. Quin & plerisque novi, qui a redeunte per certa inter valla ejusmodi profusione nedum salubriter vixerint, verum etiam a gravibus morbis immunes, in quos facile laberentur suppressio sanguinis exitu. Quare solum cum iniectus est, vel immoderatus, aut etiam grave damnum inferens, puta singultum, aut convulsionem, ut dicitur 5. aph. quo citius fieri

citius fieri poterit sisti debebit. Consueverunt autem vulgares Medici in hanc rem, venas, & quidem e remotioribus partibus, incidere, putantes hac ratione sanguinem fluentem in oppositum cursum derivatum iri; deinceps triciones, ligaturas, cucurbitulas, etiam sub hypochondriis adhibendo: imo si diuresi, & viciis acrimie humorum sanguinem promovere decernant, purgantia quoque medicamenta propinant; indicata interim diæta ex cibis refrigerantibus, & adstringentibus potibus. Nonnulli præterea gelida aqua, quin & nive ipsa frontem, & collum pertundunt: naribus acetum iugendum præcipiunt, aliosque liquores refrigerantes, succum sempervivii, solani, plantaginis; indeque testes pariter madefaciunt, & hepatis regionem unguento rosarum, aut santalorum iungunt.

At tutius, & facilius cohiberi ab aliis visus est sanguinis fluxus sola bursa pastoris contrita cum ovi albumine, & aceto commista, ac trocisci applicata. Qui usdam nari stillanti ferrum ignitum admotum profuit, vapore sanguinis torret: et naribus suscepto Caro bubula recens acerrimo aceto conspersa, & occipitio impo- sita contulisse scribit Hæsterus. Pulverem hyssonis exiccati in nares inditum, idem præstare notat Hartmannus. Vrtica contusa sisti hæmorrhagias refert Borellus. Et Boyle, musco cranii humani in manu detento. In Ephemeridibus Germanis ann. 1670. obs. 24. refertur pulvis mirificus, qui componitur ex alumine crudo, & lacca Piciorum: admoventi autem is debet naribus, vel etiam immitti. Solo aluminis contactu fluentem sanguinem ex vena secta cohiberi testatur Borellus: putorque idipsum haberi à Vitriolo, ejusque colchotare; unde atramentum ad idem utile quoque esse subdit. Curatum similiter ab hæmorrhagia alium memorat oxycrato, pannis scilicet eo madidis toti spinæ admotis, sæpeque renovatis: testaturque Riverius hoc remedium genus aliis feliciter cessisse, itemque oxycrato naribus attracto stillantem inde sanguinem sistisse. Acetum quoque rosæ, auri & directo naris sanguinem fundentis inditum ad guttas aliquot sistere hæmorrhagiam meminit in observationibus communicatis. Cinere chartarum albarum combustarum naribus excepto, & frusto cretæ altæ digito annulari detento, & regione naris unde sanguis extillat. donec incalcescat, illum suppressi pluries se observasse comatur Forellus, Simus porcinus olfactus proclamatur ab eodem, itemque à Rulando, Mizaldo, Riverio, & Hæstero: si sept pariter sterco asinum à Roderico à Castro: atque ab aliis vitriolum ultum Gale- nus §. meth. cap. 5. cum ovi albumine misceturis partes duas, aloes partem unam, additis pilis leporinis ex ventre excerptis, & minutissime concisis. At cæteris præstantiorem experientia sæpius testata est pulverem sympathicum dictum ex Vitriolo ad solem gelivum in pulverem album ad formam calcis reducto; cujus vires, & usum declaravit Kinselmus Dyg- bous peculiari libello de pulvere sympathico, & post ipsum alii plures, quos legere est in Theatro sympathico.

Intrinsicus vero assumenda commendantur alia complura. Apud Robertum Boyle deuti-

litate naturalis Philosophiæ mentio fit de quodam electuario composito ex seminibus hyoscyami, & papaveris albi singul. ad ʒij. & conf. ros. ʒj. quo ad dosim nucis myrticæ Medicum quendam enormes hæmorrhagias narium, uteri, & aliarum partium brevi sanasse testatur. Succus urticæ mirabilis quoque dicitur Riverio, tum per os exhibitus ab ʒiv. tum naribus, exceptus, & fronti, ac temporibus applicitus. aque etiam spermatis Ranarum, plantaginis, & nymphæ optima creditur Hæstero cinis Ranarum, & sperniola Crollii, efficax ab eodem, & ab aliis fertur; atque à Petro Nitrum fixum. nihil præstantius esse, inquit ind. Hofmannus, radice zizaniz; & thomas bartholinus faba rubra in vino decocta. aquam buis pastoris ad ʒj. cum guttis x. olei martis, sanguinis per nares effluxum perfectissime sistere tradit Jo. Petrus Faber. Præparat que Hartmannus crocum Martis, quem ad gr. iv. cum aqua plantaginis exhibet. Landanum opium, assumptum, vel naribus intrusum commendatur ab eodem, præter alia plurima apud relatores auctores videnda.

Enarrata hæc medicamenta convenire quodque possunt hæmorrhagiis vulnere contingentibus, At vero speciatim ad sistendum sanguinem ex vulneribus experimento comprobatum edocet Borellus alumen esse in venarum orificiis intrusum. Hæntius ad Fernelii Pathologias recipit caphuræ ʒj. radice tormentillæ, & boli armeniz veræ singul. ʒ. ij. in pulverem redigit, huncque stupa aceto madefacta excipit, & vulnere in mittit. Acetum etiam asperitum cum aqua portione croci Martis, & semisse colchotaris, pari ratione permiscet, & cum stupa adhibet. Apud Wæckerum certo quoque experimento comprobatum refertur ex Rantzovio sanguinis profluvium ex vulneribus suppressi imposito cataplasmatibus iustarum pannorum lino, quorum summa, incuncte vere, excepta fuerint, ad solem exiccato, unguento Paracelsi Herculeo dicto magna vis tribuitur in cohibendo ex vulnere fluentem sanguinem, de quo Crollius, Goglenius, Helmontius, alique, Anselmus Boetius de jaspide testatur eam coilo gelatam sanguinis fluxum sisti: in quam rem historiam narrat cujusdam femine, quæ sex annos hæmorrhagia laboraverat, à Jaspide sanatæ: inquit autem Jaspidem fuisse rubrum, Lucas Tozz Medicinæ Practicæ lib. 1.

Consultationes

Pro perillustri, ac Excellentissimo viri. Pekalimense fluorem sanguinis ab ore patiente.

Perillustrem & excellentissimum virum sollicitari à fluore sanguinis ex ore, referunt excellentissimi curantes; Cæterum quoniam sanguis ab ore prodians potest vel à capite, vel thorace, vel à partibus oris profluere, ea propter locum affectum distinguere interim oportet; quoniam igitur rursi non excernitur, à thorace non potest exire, verum quod à capite, aliqua potest esse suspicio propter hæmorrhagiam, quam alias passus fuit vir perillustis, ac ut quod ingenue sentio libere fatear, puto ego per palatum sanguinem hunc à capite emanare quasi

do sanguis ulque adeo copiosus excretus ab ore, à thorace minime proveniens, nulla ratione possit à gingivis tantum, vel alia quolibet oris parte prodire, atque hoc eo magis, quoniam arbitror nobilem patientem absque sputationis occasione, sponte inquam, sanguinem excernere, quem ideo à capite non est dubitandum provenire, sed quod à gingivis idem prodeat, indicio est, præter sensus testimonium, simplex expulsiō sanguinolenta.

Quam ob rem ad causas descendens dico, quod cum symptoma hoc sit secundarium in genere excretorum præter naturam, necessario dependet ab actione aliqua læsa, quæ nulla alia interea esse potest, nisi quæ facultatis est retentricis, cumque actio quælibet ex Galeno tertio de sympt. causis, primo lædatur vel facultate læsa, vel propter errorem externum, utrumque in casu nostro locum habet, primum enim læditur facultas retentrix vasorum capitis ob anastomosin illorum ut patet ex copioso afflatum, atque periodice sanguine excreto, læditur pariter & facultas retentrix gingivarum propter diapedesim, quoniam cum nulla fiat in illis corollio, atque sensu iudice exiguus admodum, calidus, & mordax sanguis excernatur, necessarium huiusmodi pertranscolationem exire, est necessarium, quamquam & apertis exiguarum venarum ad illas pertinentium osculis, non sit impossibile sanguinem prodire modo dicto Error autem externus est vitium sanguinis tum in quanto, unde nascitur Anæstomosis, tum in quali, unde diapedesis, nasci etenim illam à copioso sanguine fatetur unusquisque, sicuti & hanc ex calidiori, atque tenuiori, defluit sanguis hic propter iecur à toto corpore in partes prædictas per transmissionem, uti ad locum imbecillum, quemadmodum hæmorrhagia prægressa videtur attestari propter iecur quidem, quoniam ut calidum, & humidum plurimum sanguinem gignit, ut vero calidius factum ab erroribus externis, & in visu proprietatis sanguinem secundum qualitatem culpatum gignere potest. Quibus ita constitutis, quoniam à qualibet sanguinis evacuatione immodica, spiritus dissipantur, calorque nativus maximam jacturam patitur, non est mirum, si ciborum inconcoctio, flatulentia, cæteraque huiusmodi ventriculi symptomata, & animalis facultatis imbecillitas fiant; Ad hæc quoniam in qualibet sanguinis evacuatione agitatio maxima in ejusdem massa succedit, non mirum si in proposito casu bilis commota in os ventriculi decumbens Cardialgiam, & pro inde lipotimiam inducat.

Quare universa medendi ratio tum in præservationem, tum in veram curationem dirigatur oportet, merito itaque illius copia sanguinis est minvenda, bilis ipsi commixta præparanda, ac inde deturbanda, tandemque iecur temperandum, caputque, ac gingivæ roborandæ merito vero huius sanguinis impetus in caput est coercendus, per revellentia, & per adstringentia sanguinemque incrassantia.

Quos scopos assequi, etsi haud impossibile putem, rem tamen operosam valde, atque difficilem arbitror, necnon sine periculo, nam malum est quasi, in habitu, causæ morbificæ sunt adeo intensæ, plura symptomata, eaque

non contemnenda complicantur, plures partes, eæque principes afficiuntur, & denique vires propter morbi activitatem, ætatemque declinantem non resistunt, ut jure graviora longo mala superimmineant, sicuti totius refrigeratio, ac phthisis ipsa, sed non ob id ad materias Medicas non est ut descendam.

Et quantum ad Chirurgicas spectat, ad præservationem laudo, ut bis in anno leceatur basilica dextra perquatvor dies ante tempus illud, quo symptoma huiusmodi prorumpere consuevit; præterea si studendum ut curationi, probò venæ sectionem in talo, aperturam venarum sedis per hyrumes, siccas cucurbitulas infernis partibus appollitas, ac denum iotio-nes, & frictions, & vincula dorso à cruribus.

Inter medicamenta præservativa, pro lenienda alvo laudo cassiam cum diacatholico, vel syrupum ros. sol. pro bilis præparatione arri-det mihi decoctum in aqua calybeata sonchii, cicorii, acetosæ, hepaticæ cum syrupis de succo cicorii, & acetosæ; purgans vero ex Rhabar. diacatholico, & cassia poterit institui, quibus ad usum deductis cogitandum de secunda præparatione, quæ commode fiet medicamento proposito, additis plantagine, portulaca, atque syrupis ex iisdem simplicibus, & ros. siccis paratis, pro catartico non displicebit Rh. b. cum eodem diacatholico cum decocto myrob. citrin. tamarindorum, sem. plantaginis, portulacæ, & acetosæ in aqua calybeata parato dilutum.

Atque ad alterationem jecoris intus probò serum caprinum, vel vaccinum depuratum & calybeatum, cum succo acetosæ, & cicorii exhibitum, quo pertinent thermæ frigide tempore debito epota, potissimum autem Villenses, præterea veteres Be. tæ Virginis Patavii, ac tandem Brandubenses, quæ etiam nullum habent frigoris excessum, summam tamen vim obtinent adstringendi; Exterius commendo jecoris perfusionem cum succo cicorii, hepaticæ, additis speciebus confectionis ex tribus sandalis.

Verum ad capitis robur theriaca recens, saccharum ros. antiquum cum bolo Armena, corallis, & pulvere ophioglossi hora somni deco-rataplurimū facio sicuti & embrocam sineipiti admotam ex thermis prædictis vel aliquo decocto ex arte parato, quod eandem cum thermis facultatem obtineat.

Deinde ad gingivas roborandas convenit frequens oris ablutio cum iisdem thermis, vel cum decocto equiseti ophioglossi, nucum cupressi, gallarum, & malicori in aqua calybeata facto, huc pertinet & succus plantaginis, in quo liquetur alumen, vinum etiam cydoniorum, extinctionisque lanipæ aut ex erit opportunum.

Pro curatione laudo diatrágagantum cum bolo in ore detentum, sic & succum plantaginis non solum in ore detentum, verum etiam & epotum, in quem usum pariter facit theriaca recens cum seminibus hosiæiani albi.

Quibus omnibus compar visus ratio est addenda, quare excellentissimus patiens vitet omnem aeris calidioris, atque ventosi incrementum, abstinere à gestatione granum supra caput, atque demum omnes causas externas caput ipsum calefacientes effugiat, cibum

sibi parat

sibi parari curet ad frigidum inclinantem, qui adhuc sit univiscans, unde carnes in aqua calybeata cum pedibus vituli decocta maxime probantur, sicuti & oriza, nilivum, ac fructus austeri; Condiuntur autem ciaria cum succo Aranciorum, corallisque rubris, & alterentur seminibus plantaginis, portulacæ, acetosæ, radice consolidæ majoris, & hujusmodi, Potus sit vini nigri subausteris, pauciferi, quod poterit etiam alterari cum sandalis, corpus exerceatur, modeste tamen, ac sine sudoris evacuatione, non statim a cibo, sed ventriculo jejuno, somnus debeat meridians, hatque capite humili super pulvinar, non plumeum, sed laneum cum floribus rosarum, & nenufaris, Alvus servetur mollis clysteribus emollientibus, ac postremo studium post cibum, curas, negotia, sollicitudinesque quantum fieri poterit, sicuti iram, ac excandescentiam evitare proficuum erit, quibus omnibus ut felicem successum D. O. M. benigne largiri velit, exopto. *Julius Caesar Claudinus in consultationibus Medicis.*

Hæmorrhagiâ Narium.

Juvenis robustus, viginti duos annos natus, ex intemperantiore dieta incidit in febrim synocham, ardore febrili continuo, sed blandiore, sese mantentantem. Hic postquam aliquoties post venæ sectionem esset purgatus, & iulapibus convenientibus alteratus, ex muliercularum continuo sumsit medicamentum, nescio quod, vomitum ingentem, cum rosione ventriculi, excitans; quem insecta est tanta narium hæmorrhagia, ut plus quam 4. libras sanguinis ex eis jam sit evacuatum; eaque vires ita sunt debilitatæ, ut jam animam agere videatur.

Præterquam quod in hoc ægro à febre afficitur cor & totum corpus, afficiuntur etiam ejus ventriculus & nares; quod ex vomitu, & sanguine à naribus tam copiose fluente, est manifestum.

Morbus præcipuus, qui ipsum jam potissimum affligit, est diæresis & diapedesis vasorum narium; quæ, copiosum sanguinem ex eis emittentes, Hæmorrhagiâ narium appellantur.

Causa procatactica hujus morbi est intemperantior illa dieta, qua copiosus sanguis in corpore genitus corruptelamque certam febrilem contrahens, ac synocham febrium producens, antecedentem hujus morbi constituit causam. Is vero vomitorio assumpto vehementius agitur, & in naribus vasorum diæresin & diapedesin excitans, copiosissimumque illum sanguinem ex eis effundens, eoque vires ægri summo opere prosterbens, continens hujus morbi & symptomatum est causa.

Morbus hic, propter prostratas ægri vires, est periculosissimus. Ideoque neglecta ad tempus febre synocha, quæ forsitan hoc sanguinis fluxu cessabit, Curatio ejus protinus est aggrepienda,

Eaque in humorum ventriculi acrium attemperatione, solutionis continui vasorum narium unione, & nimii sanguinis fervoris & motus temperatione & moderatione, consistet.

Iteaque primo sumat dragm. j. f. salis prunellæ,

quod in unc. ij. aq. plantaginis sit dissolutum.

Porro præscribatur tale lac amigdalatum, ad acrimoniam humorum temperandam; & vires restaurandas.

℞. Amigdalæ. dulc. ℥j. f. Sem. 4. frigidior. an. ℥j. Papaveris albi ℥ij. Cum aqua decocti hord. q. f. f. lac amigdalatum. ad lib. j. de quo subinde sumat ℥ij. vel ℥iv. Quantitatem.

Et mox in nares inferantur turundæ ex cotone facia, & atramento, lingue funari, & aceto rosaceo, imbutæ.

Ac præterea acetum rosaceum in aures instilletur.

Item linteam, in aceto madefactum collo frigide erit obvolvendum, & testibus adhibendum aliud linteam, aqua plantaginis frigidissima imbutum.

Ac ligaturæ arctiores brachiis & cruribus erunt injiciendæ.

Cucurbitæ quoque hypochondriis & scapulis sunt adhibendæ; venæ sectio vero, ob magnam sanguinis emissi copiam, hic prætermittenda.

Victus sit resumtivus ex ovis forbilibus, jussulis gallinaceis & vervecinis, cum pane candido, & vino tenui oligophoro. Motus corporis, & vehementiora vitentur animi pathemata. Somnus sit paulo longior. Alvus sit arte vel natura laxior. *Henricus Regius apud Theodorum Craanen Medicationum lib. i.*

Narium Hæmorrhagiâ immoderata.

Secretarius Illustrissimi Batonis de Funckirchen *Johannes Rieder* Aultrius, sanguineæ constitutionis & plethoricus, postquam in nuptiarum solennibus vino generoso largius se invitasset, & totam noctem noctem tripudiis & saltationibus consumpsisset, manè domum repletus in narium hæmorrhagiam incidit adeo profusam, ut de vitâ periclitaretur.

Resolutio) Hæmorrhagiam narium fieri per vasorum vel *arteriarum*, vel *veinarum*, vel *arteriarum* vulgò notum est. Præsens hoc sanguinis copia, nulla præcedente causa externa violentâ per quam *diapedesis* fieri poterat. In *diapedesi* verò sanguis in exigua tantum quantitate, & sentim guttatimque quali transudat.

Occasionem apertionis dedit vini potentis usus largior & immoderata corporis agitatio, quibus supra modum incaluit sanguis, fervidusque redditus, concepto *impetu* exitum per osculorum in vasis paulò majoribus refectionem sibi paravit.

Fervor itaque sanguinis ante omnia restinguendus: præscriptum est hoc nomine iulapium.

℞. Aq. fragor. ℥iv. burf. pastor. endiviæ, cichor. rosar. an. ℥ij. syr. de coralliis Quercet. ℥ij. syr. flor. papaver. rhead. & fragor. an. ℥ij. succi citri acidi ℥ij. M. Hinc revulsiones institutæ per ligaturas extremorum dolorificas damnatis frictionibus, quibus ut rectè monet Gulielmus Fabricius Hildanus Cent. 2. Obs. 19. sanguis magis incalcescit, & fluidior ac subtilior efficitur eodem fine & cucurbitulæ, primò abque, deinde cum scarificatione, scapulis & cervici applicatæ: Mox etiam topica refrigerantia

& adstringentia adhibita. Fronti quidem epithema instructum.

℞. Aq. ros. optim. ꝑ. iij. folior. quercus ꝑ. j. acet. rosacei ꝑ. j. boli armenæ terræ sigillatæ, lapid. hæmæthit. an. ꝑ. β. album ovi unus M. Epati vero emplastrum appositum, quod

℞. Cerat. santal. ꝑ. β. unguenti infrigidant. Galeni ꝑ. ij. specier. diat. non santalor. diarrhodon. Abbatis, trochiscor. de spodio an. 36. lapid. hæmæthit. ꝑ. ij. ceræ parum. M. F. emplastrum.

Interea etiam & naribus quædam indita ad osculorum in valis nati occlusionem facientia, additis appropriatis & specificis sanguinem sistentibus.

℞. Lanugin. cydonior tragachant. mastiches, sangu. dracon. boli armen. lapid. hæmat. aloës, farin. volat. an. ꝑ. j. M. F. pulvis subtilissimus ex quo cum albumine ovi & gossypio, vel carbaso hant turundæ naribus immittendæ, quod dum sit os aqua frigida repletum, teneatur, ne sanguis in fauces irruat.

Pro virium refectione, quæ interdum planè deficere videbantur, aquam nostram cordialem frigidam cum confectione alkermes & tinctura coralliorum exhibuimus, simulque & cordi & pulsibus epithemata convenientia applicuimus.

Sedatâ tandem periculosâ narium hæmorrhagiâ, altero die, resumptis quodammodo viribus, præcautionis gratia plethoram imminuimus venæ sectione in brachio instituta, vitæque tenuem & refrigerantem commendavimus, præscripto vini potentioris usu, ac vehementiore cum animi tum corporis motu. *Baltassar Timæus in Casibus & Observationibus Prædictis.*

Observationes.

Hæmorrhagia Gingivarum in prægnante, lethalis, cum supervenientibus maculis rubris & sudore sanguineo.

Honestâ fœmina juvencula, Pastoris in vicinâ conjux, in septimum mensem prægnans, mense Maio ann. 1624. incidit in hæmorrhagiam subitanæ gingivarum, sanguine confectim effluente, die noctuque per septimanas tres continuas, tantâ copâ, ut aliquot mensuras implere potuisset, unde non tantum matri, sed fatui quoque periculum præsentissimum imminabat. Tandem à capite ad calcem usque maculæ succedunt sanguinæ, quas cum sudorifero balneo discutere conaretur, sudores supervenit sanguineus, potissimum circa superiorem corporis partem, iis in locis, ubi ante maculæ sanguinæ sese manifestaverant, quem sudorem postea tanta virium omnium dejectio fuit subsecuta, ut paucis diebus post vitam cum morte commutaret.

Cum 17. Junii 1624. casus hic singularis, à marito prædictæ fœminæ per literas determinaretur, protinus recordabatur lethalis hæmorrhagiæ cujusdam honestæ matronæ, conjugis professoris Giesseni, quæ anno 1612. sub initium Martii febrim continuam patiebatur, ex qua convenientibus remediis adhibitis liberato,

circa tempus mensium instans, sub initium Aprilis, incidebat in gravissimam hæmorrhagiam per nares, quam excipiebat sanguinis continua secretio per gingivas, idque tanta copia per quatrimum continuabatur, ut tandem prævultu alvi quoque fluxu sanguineo viribus exhaustis, 8. Aprilis naturæ debitum solveret. Aderat autem hæc constitutio corporis macilenta, sua natura ad acrioris sanguinis collectionem disposita, quam præcedens febris, adituone plurimum auxerat; unde propter imbecillitatem ex præcedenti morbo relictam, loco menstrualis evacuationis per uterum, fortè viis ibidem reliquis peccantis materiæ infarctis, sursum vergebat sanguis acris, sero plurimo dilutus & symptomaticè per nares ac gingivas profuebat. Quanquam verò Dodonæus observ. cap. 15. Virgini cuidam 18. anno mensibus non succedentibus, superfluum sanguinem per oculorum angulos sanguineis lacrymis continuis, aliique per gingivas expulsionem sanguinis moliente natura, segregatum fuisse scribit, eventu salutari quemadmodum superius etiam sub finem observ. 3. varios alios modos annotavimus: distinguendum tamen ubi tale quid accidit naturæ robore concurrente, quod in hoc subiecto laborante deerat, ob morbum præcedentem naturæ viribus labefactatis. Similis vero casus nobis videbatur prægnantis illius in qua recte quidem, propterea quod utero gestaret, mensium defectus aderat, sed symptomaticè tanta sanguinis hæmorrhagia per gingivas superveniebat, idque propter sanguinis acrioris, serosi & aquosi constitutionem præter naturam, cujus ratione non tantum ob denegatam adæquatam nutritionem & refectionem, debilitas omnium virium introducebatur, sed insuper etiam referatis ab acri humiditate serosa sanguinis venarum osculis, præternaturalis, excretio fiebat in gingivis, tanquam partibus mollioribus, aliâ ad sanguinolentiam dispositis, cujus rei exemplum refert Marcellus Donatus lib. 4. hist. Mirab. c. 9. ex Matth. de Grado, qui in Moniali quadam, non ex abundantia humorum, nec propter causam aliquam violentam undequaque per sputum, per nares, per urinam sanguinis educationem ad 18. libras, vidit, licet natura exilis, macilenta & phlegmatica fuerit, quam tamen ab interitu per narcoticum liberatam fuisse dicit. Imò lienoso cuidam Fabro Ferrario per venulam gingivæ spacio diei naturalis ultro octo libras sanguinis evacuatam fuisse Marcellus ipse testatur, ut pote in quibus etiam sanguis acris sero dilutus abundat. Hinc ego in periculo prædicto, frustra suasimus illa quæ sanguinis effervescentis lenirent, acrimoniam ejusdem temperarent, & naturam corroborarent, præsertim cum symptoma rarissimum, nimirum sudor sanguineus, cum maxima virium debilitate superveniret. Ut autem Rondeletius lib. de dignosc. morb. c. 11. sudoris sanguinei observati causam in studioso quodam, ad venarum raritatem, illarumque osculorum laxitatem & sanguinis tenuitatem refert; Aristoteles vero lib. 3. de part. anim. cap. 5. & lib. 1. hist. animal. cap. 19. nonnullis *ὁρισμένην ἀκατάσχετον* accidere dicit, propter viciatum corporis habitum, scilicet ubi corpus laxum, fluxumque; nec non quod sanguis propter crudi-

cruditatem imbecillitate caloris humescit, & ut posterior locus habet *peritum i. expositum*, crescit: ita hic etiam accidens illud periculosum primum à sanguinis tenuitate & aquositate, caloris imbecillitate producti, nec non à cutis ejusque pororum laxitate; tandemque retentricis facultatis languore deducimus, unde neglectis ab initio convenientibus mediis, imò adhibitis iis, quæ morbi vehementiam augebant, inter quæ balneum erat sudoriferum, eventus lethalis subsequēbatur. *Gregorius Horstius libro de morbis mulierum.*

Pro Hæmorrhagia Narium.

Vidimus Pithueris anno 1545. puellam annorum octodecim pauperulam per quatuor integros dies sanguinis fluxum è naribus adeo enormem habuisse, viribus prostratis, mensibus ad longum tempus retentis, humi prolapsam, ut nulla spes salutis superesse videretur. Ad quam vicini cum omnia tentassent remedia, me tandem ad eam perduxerunt: statim arrepto utroque brachio circa carpum, ubi pulsus tangitur, aqua frigidissimam ex poculo stricci orificii embrocha instillat continuo instillavi, tumumque porcinum naribus objeci, & ut ore repleto aqua frigidissima, succum urticæ per nares attraheret, mandavi: nucham autem aq. plantag. frigida lavari permisi, quanquam hoc remedium febricitantibus sit suspectum; hæc autem non febricitabat. His remediis fluxus cessavit: viribus postea paulatim recreatis ut venam saphenam secaret consului ad menses revocandos.

Alteri puella cui & menstrua purgantes ad quatuor menses restrictæ non procedebant, & sanguis è naribus per tres continuos dies fluxerat, saphena ejusdem lacteis incisa non proficiente, irritisq; omnibus aliis auxiliis uti solitis, tandem ut venia magna absque scarificatione sub mamilla dextra ad hepatis regionem (è dextra enim nare fluebat sanguis) applicaretur, mandavi: quo protinus fluxus enormis cessavit, cum pro mortua & deplorata prius haberetur.

Alia etiam mulier cum profluvio sanguinis narium admodum vehementi & diu perdurante detineretur, neque aliis remediis restringeretur, tandem cinere chartarum albanum combustatum naribus demisso, præter spem sanata est. Addam & indubitatum experimentum ad sanguinem è naribus fluentem exhibendum, quod ipsimet vidimus sæpius expertum in Nobili matrona. Hæc cum sanguis è naribus supra modum fluere, frustum cretæ albæ digito annulari continebat è regione naris fundentis sanguinem, donec incalesceret, & statim sanguis supprimebatur: ut diversis vicibus in eadem Domina spectavimus. *Petrus Forestus obs. 10. lib. 13. De Nasi Affect.*

Vir quidam cum mustum in cœna largius bibisset in multam satis noctem, & in fine etiam vinum Hispanicum, die subsequenti manè in fluxum sanguinis narium enormem incidit, ita ut ultra sex libras ferè sanguinis è nare sinistra profuderit: cum debiliior fieret, me vocavit; ut de vena incidenda mentionem feci, id protinus amici ægro dissuadebant, cum sanguis è naribus largius profusus esset; à nobis tamen persuasus, cum sanguine repletus esset, & pulsus satis constaret, eo præsidio ad diversionem usus est. Se-

ta ergo vena brachii sinistri cum hoc anacolema fronti circumligatam, & stercus porcinum (asininum si reperiri potest magis laudatur) recens cum bolo armena mixtum, ne perciperetur quid esset ad asfaciendum naribus obiectilem ab enormi sanguinis fluxu præter astantium opinionem curatus est.

Anacolema tale erat.

℞. Aq. ros. ʒ. iv. aceti rosac. ʒ. i. β. bol. armen. ʒj. M. frigide cum panno lineo inculcato fronti alligabatur: & ubi incalesceret, novum denuo idque frigide apponebatur, neque aliis remediis uti necesse fuit. *Petrus Forestus, obs. 12. lib. 3.*

Cavendum ne ventosam umbilico applicemus, ne nobis accidat quod mulieri acciderat, Gatinaria referente, quæ obiit ventosa pinguedine repleta. *Id. Schol. obs. 12. lib. 13.*

Vir quidam Generosus sanguinis narium profluvio cum extreme laboraret, neque remedia commode adhibita juvarent, circiter ʒ. xii. sanguinis ex utraque nare per vices effluxere. Cum ad eum accitus essem, ut duas arenosas absque scarificatione, unam supra hepatis regionem, alteram supra lienis locum poneret, mandavi; quibus parum videtur fluxus subsistere. Verum post meum discessum, uxor cum videret sanguinem iterum ex utraque nare cum impetu erumpere, & quod venosæ hypochondriis, impositæ, nullo modo juvarent, alias duas, unam supra pedem dextrum, alteram supra sinistram affigi iussit, & dictum mirum, sanguis præter spem subito restrictus est: verum cum aliquanto tempore venosæ cum adhererent, æger in animi deliquium incidit, quare iisdem detractis, aqua in faciem conspersa excitatus est, & odore vini recreatus, ad se rediit: & à fluxu sanguinis mirum per venosæ miraculi aut incantamenti instar, præter omnium opinionem restitutus est. *Petr. Forest. obs. 24. li. 13.*

Primo digitum annularem cum auriculari constringo. Postea admoveo fronti, cervicique hoc cataplasma.

℞. Argill. ult. & contus. M. vi. aceti acris q. s. M. pro cataplasmate, quod duplici linteo indutum fronti atque cervici crebro admovebam actu frigidum: & sic intra paucas horas ingentem, diuturnum, continuumque sanguinis fluxum per Dei gratiam compescui. Fumum etiam ex electro albo accenso per nares clauso oro excipiebat æger manè ac vespere per dies aliquot: quo sanguis quoque cohibitus, ac vires animales & vitales roboratæ valde fuere. Victus rationem observabat frigefacientem & siccantem: potus erat aqua chalybeata. *Martinus Rylandus curat. 27. cent. 2.*

Vir quidam in sanguinis per nares fluxum valde copiosum, incidit, ita ut intra diem circiter decem sanguinis libræ profuxerunt. Consultus mox fluxum repressi sequentibus remediis. Olfaciebat sterces suillum, quo olfactorio statim remissus factum est profluvium: præterea lintea aqua chalybeata frigidissima imbuta applicabam fronti, collo, toti cervici & scapulis, item ad hepatis regionem: his factis fluxus desit & recte habere cœpit. *Martinus Rylandus. curat. 57. cent. 10.*

Cum præter naturam sanguis immodicè fluit, revulsionibus, diversionibus per sanguinis missionem, cucurbitulas & ligaturas, reme-

diis item astringentibus & à proprietate quadam sanguineam reprimentibus sinitur. Quidam compressione quæ ut in incurvatione vehementi digiti minimi in dextra manu si ex dextra nare fluat, vel in sinistra, reprimi sentient. aliqui arctius digitum istum seroco rubro ligat; sed hoc remedii genus, ubi vel magna est intemperies in sanguine, vel venarum mala compositio parum profuturum videtur inter medicamenta à proprietate sanguinem reprimentia, lapis qui in capite carpionum reperitur, tritus, & in pollinem redactus, præsertim si cum lanugine, quæ in malis cydoniis hæret, applicetur, imprimis commendatur, item herba atque radix fragorum axillis subiecta, vel collo appensa, radix etiam ista & lapillus in ore teneatur. Sed in fervore sanguinis aquam fragorum bibere & genitales partes aquæ frigidæ, cui acetum admixtum sit, imponere, & cum aqua fragorum sanguinem, qui effluit lamina terri cadente exceptum, & pulverisatum assumere, vel pulverem istum cum pulvere lapidis carpionum mixtum ut dixi, imponere rectius est. *Joannes Crato consilio. 7. lib. 3.*

Hæmorrhagia narium si moderata; & per intervalla advenerit, ad tuendam sanitatem conducit, & à dolore capitis, aliisque morbis gravissimis liberat, ideoque non illico sistenda est. Sin vero immoderata fuerit, protinus cohibenda, ne vires simul cum sanguine dissolvantur, partesque nobiles refrigerentur ac debilitentur, inde enim sequitur cachexia, ictericia, hydrops, & huiusmodi morbi curatu difficiles, statim igitur turundæ ex carbaso paratæ, albumine ovi imbutæ, ac pulv. re nostro ad sanguinem sistendum (cujus descriptionem vide supra lib. 6. sect. 9.) conspersæ, naribus immittantur lapis quoque qui in capite carpionum reperitur, in pulverem redactus, & turundis inspersus à nonnullis commendatur. Muscum tamen, qui cranii hominum aeri expositis, adnascitur, in subtilissimum pollinem redactum, multo præstantiorem esse, non raro expertus sum. Postea linteum replicatum, & postea imbutum, aut defensivum aliquod fronti & naso applicandum, quale hoc est quod sequitur.

℞. Farin. hord. ʒij. sang. drac. bol. arm. terr. sigill. croci martis, cortic. granat. an. ʒj. succ. prunor. sylvestr. inspissat. & aceto dissolut. ʒss. & cum album. ovi, aceto, parumq; aquæ aut omphacio, in mortario fiat defensivum, quod supra linteum extensum, fronti & naso frigide applicetur, sæpiusque postea irroretur, ne exsicceetur, & incalescat.

Si vero hisce floris impetus non sistatur, cucurbitulæ cum magna flamma, scapulis, cervici, natibus, & coxis primo absque, deinde vero cum scarificatione erunt applicandæ, maximum quoque cum fructu musculo anteriori cubitum flectenti, qui à nonnullis biceps appellatur, cucurbitulas cum flamma admovi, brachia & crura fortiter liganda, ut sanguis ad lumbos trahatur.

Juveni cuidam Lausannensi, propter maximam hæmorrhagiam de vita periclitanti, non solum genitalia linteis aqua & aceto madefactis, verum etiam totum fere corpus involvi, brachia & crura arcte ligavi, pulveremque no-

strum ad sanguinem sistendum naribus imponi: hinc sanguis fluor remisit, & brevis convaleuit.

Est & vena poplitæ aut nalicoli e regione naris sanguinem ludentis incidenda, dummodo id absque usu aquæ calidæ fieri possit.

Sequenti quoque potione fortiter utroque temperat enim fervorem sanguinis, fluoremq; sistit.

℞. Aqua. fragor. & centuod. an. ʒj. syrup. granat. aut de acetosif. citri ʒj. succus berber ʒss. terr. sigillat. bol. armen. vera & præp. an. ʒ. M. fiat potio, frigide exhibenda. Vel.

℞. Aqua. plantag. & rosar. an. ʒss. troch. de terr. sigill. ʒj. syr. de ros. sicc. & de succo acetosif. an. ʒss. M. l. potio.

A vino, & ab eo, quod actu aut potentia calidum est, item a tum, vociferatione, colloquio, ambulationibus, & quavis motione corporis, æger absteineat, hac methodo multos feliciter sanitati restitui. *Guil. Fabricius Hildanus. obs. 15. cent. 2.*

Est usnea cranii humani in pulverem redacta (ut ego multoties expertus sum) in hæmorrhagia narium præstantissima, per se, aut nonnullis aliis, veluti terra sigillata, pulvere ranarum præpar. & similibus mixta, applicata. Cranii suspensorum usnea non adnascitur. *Guil. Fabricius Hildanus. Epist. 27.*

Sanguinem restringit muscus cranii humani in manu retentus. *D. Robert. Boyle, tr. de Utilitate Philosoph. Natural. part. 2. sect. 5. cap. 14.*

Juvenis quidam robustus ac plethoricus, cum sub sole tempore dierum canicularium supra nodum incaluisse, pollicaque spongiam suam, quam noviter duxerat, ardentius, quam sibi pro conservanda bona valetudine conveniebat, amplexus fuisset, hæmorrhagia maxima narium correptus est. Vocatus ego, omnia, quæ profutura exstimaui præsidia, præscripsi & admovi, sed frustra, quam ob rem cum hominem propter urgentem ebullitionem ac fervorem sanguinis, in maximo versari periculo, probe cognovissem, extremo huic affectui, extremum potius remedium (in quo tamen spes aliqua) adhibendum esse, quam immaturam mortem expectare, adstantibus & amicis suasi, labrum itaque frigida impleri iussi, in quod totum corpus immersi. Sic frigidato ac inspissato sanguine, fluxus paulatim restrictus fuit. Postea per dies aliquot sequens Julapium bis inde exhibui.

℞. Aquæ bugl. & acetosif. an. ʒij. syr. de succo limon. ʒj. M. F. julep. victus regimen tenue & refrigerans observavit, & sic brevi convaleuit. *Guil. Fabricius Hildanus obs. 17. 2.*

Quidam hæmorrhagia correptus est adeo immodica ut vires deiceret, ad eam cohibendam cum multa usurparentur remedia, hoc unicum profuit, nempe oxycratum per nares frequenter attractum, quo statim cohibitus est sanguinis fluxus, eoque post biduum denuo prorumpente, oxycratum iterum simili modo usurpatum cessit cohibuit. *Lazarus Riverius, obs. 23. cent. 1.*

Vir quidam robustus contumaci hæmorrhagia ad extrema redactus fuerat, post multa remedia frustra tentata, tandem cujusdam medici consilio, è lecto in pavementum delatus est supra mattam laneam, & totum corpus contentum linteis oxycrato madidis per longum tempus, donec rigore correptus est, tunc etiam ad lectum

tum deportatus & rigorem febris subsecuta est, quam sudor excepit, a quo curatus est, collum etiam iisdem linteis obducebatur. *Laz. Riverius obs. 3. cent. 4.*

Episcopo cuidam quinquagenario circa vespertam oborta est hæmorrhagia, quæ per quatuor horas perseverans, sanguinis fere lb ij. æquavit, adhuc assatim fluebat, & vires concidebant. igitur cogitandum fuit de cohibenda hæmorrhagia, & præscripta fuit venæ sectio revellens in brachio dextro, sal prunellæ in aqua frigida diluendum, frontale adstringens, acetum in aurem instillandum, succus urticæ sumendus, cucurbitula regioni hepatis admoventur, linteum in aceto madefactum, quo frigide cervix erat obvolvenda & ligaturæ extremorum: quibus nihil proticientibus agere alium deponere vellet dixit, nec potuit cogi, ut in lecto deiceret; præmonimus si e lecto surgeret cum tanta exolutione virium, fore ut in syncope perieret, attamen eam cohibendo sanguini fore perutilem, ita tere successit, nam postquam surrexisset animi deliquit, passus est, a quo statim excitatus est vino exlubito, & aqua frigida in faciem projecta, postea copiose deiecit, & postquam in lectum delatus fuisset, sanguis nullo minore impetu fluebat, postquam vero paululum quiescisset, exhibitum est sal prunellæ ad 3ß. in aqua frigida diluendum, quo. Sumpto, statim sanguinis fluxus omnino fuit cohibitus, nec alius remediis opus fuit. *Lazarus Riverius obs. 48. cent. 1.*

Revulsionibus quæ in primum vocari solent, aliquandiu usurpatis, si fluxus nihilominus perseveret, ad repellentia veniendum remedia, quæ sunt ea quæ anacollemata vulgò nominantur, fronti & temporibus applicanda, quæ ita componi poterunt,

℞. Bol. armeniac. terr. sigill. sang. drac. thur. matich. aloes, an. 3j. farin. volatilis, & pilor. lepor. minutim incis. an. 3ß. al. um. ovi nri. succ. plantag. & solan. an. q. s. f. cataplasma fronti & temporibus applicandum.

In casu urgente promptissime parari potest cataplasma ex bolo arm. sol., cum, ovi & aceto subacta, fronti ac temporibus apponendum.

Efficacissimum etiam paratur cataplasma ex gypso cum aceto subactò, & ad crassitiem duorum digitorum fronti & temporibus admoto & si prius applicatio non succedat, iterabitur, & certo curare creditur.

Faba aut numisma argenteum radici narium inter cilia admodum & fascia arte alligatum, ut fortiter partem comprimat, eundem fluxum cohibet, animadvertendum est, an in temporibus, aut fronte venæ aut arteriæ tumeant; tum enim eas nuchisnate aliquo, aut faba sicca per medium in longitudinem secta comprimere, fascia interveniente, optimi & supremi remedium est.

Præter repellentia dicta, in usum revocanda sunt, quæ ipsas venas apertas occludere & conglutinare solent, in quem finem multa remedia in nares immitti consueverunt. Galenus thus & aloem in pulverem redacta albumine ovi excipit, & cum linteolo, aspersis prius pilis leporinis, in nares immittit.

Vel turunda in hunc modum parari potest.

℞. Thuris, aloes, sang. drac. farin. volatilis, & pilor. leporin. minutim incis.

an. 3ß. excipiantur succo plantag. & gossipio, fiantque turundæ in nares frequenter immittendæ.

Potenter etiam sanguinem fluentem cohibet gossipium atramento infectum, quod in thecis scriptoris asservari solet, si aliquantulum expressum, & in turundæ figuram efformatum in nares immittatur.

Tandem hæmorrhagia omnibus remediis pertinaciter obidente, ad elcharotica veniendum est, quæ venarum extremitates apertas comburendo crustam inducunt, & sanguinem inhibent, in ista enim magna cautio adhibenda est, quia dum elchara decidit, vatorum apertio plerumque renovatur, & sic fluxus redintegrari solet. Inter elcharotica autem principem locum obtinet vitriolum ultum, quod præterquam quod elcharam inducit, ad quemvis sanguinis fluxum cohibendum est efficacissimum, non ita tamen edium habere desideres, vitriol. aliis permiscendum est in hunc modum.

℞. Bol. arm. sal. g. drac. thur. aloes, gyp. vitriol. ult. sarcocoli. matich. an. 3j. i. pulvis subtiliss. vitriolum ultum, nepe elcharoticum est; hæmorrhagiam tamen potenter cohibet, & orificia venarum constringendo, si in nares cum turunda ex gossipio facta immittatur.

Optimum est hepar & lienem episthemate refrigerante, vel etiam oxycrato tepido fovere, & sanguinis ebullientis fervorem temperandum.

Denique in contumacissimo stecti & aliis remediis non cedente, ad narcotica est veniendum, & inter cætera laudatum ad gr. 3. exhibitum. principem locum obtinet. Cavendum tamen est, ne agro valde debili exhibeatur, periculum enim est ne calor natus admodum debilis, narcotica vi omnino suffocetur.

Inter specifica succus urticæ miris lapidis usque effertur ad quemlibet sanguinis fluxum ex quacunque parte prodeuntem, maxima efficacia cohibendum; & ideo tum per os exhibetur ad 3 iv. semel atque iterum, tum per nares attrahitur; tum fronti & temporibus admoveatur in formam cataplasmatum cum farina subactis, vel tota utrica contusa dictis partibus admoveatur; nonnulli alterum radicem urticæ in ore detentam sanguinis fluxum statim constringere. Simus porcinus inter præstantissima specifica etiam recensetur, si adhuc calens fronti & temporibus admoveatur, vel olfaciendus præbeatur, siccus in nares immittat. Posterioris formula talis esse poterit.

℞. Stercoris porcini exsiccat. 3ij. pulv. rosar. ad foetorem auferendum 3ß. excipiantur succo plantag. in eoque intingatur bombox in nares immittendus.

Finkius testatur busonem exsiccatum & pulverisatum in syndone rubra axillis suppositum, vel manibus retentum, ut incalescat, sanguinem statim rigere, eumque veluti Gorgonis conspecto capite, statim frigescere, alii busonem si badio suspendunt, donec caro universa absumpta sit, os femoris denudatum servant, idque nari inditum, hæmorrhagiam in instanti cohibere asserunt. Dum remedia prædicta in usum revocantur, de omnimoda causæ ablatione cogitandum est, quæ ut plurimum solet esse humor tenuis, serosus aut biliosus in sanguine redundans, etque motum præposterum concilians, naturamque ad

illius excretionem irritas; unde fit in humore illo evacuato, & sanguine expurgato, natura eum tanquam amicum suum & familiarissimum, ac vitæ thesaurum retineat, neque amplius excernat, ideo purgatio instituenda est, bis terve iterata, si opus fuerit expurgantibus adstrictione præditis, & refrigerantibus composita, in hunc aut similem modum.

℞. Fol. Tamar. nd. ʒβ. fol. plantag. Mj. coq. ad ʒiv. in colat. infund. rhei el. ʒj. rhei pulv. ʒj. f. potio.

In affectu inveterato & frequenter recurrente, talis purgatio semel in septimana repetita erit efficacissima; interim julepi adstringentes post singulas purgationes exhiberi poterunt.

Cibi sint intractantes & pauci nutrimenti, & sub forma liquida exhibeantur, ut sunt juscula refrigerantia, hordeata, avenata, & oryzata, cum aqua non jusculo parata.

Medicatio enim hæmorrhagiam promovet.

Si vites sint debiles, juscula carnum & panatellas exhibere oportet in quibus amyllum sine calce paratum, aut gummi arabicum dissolvantur. *Lazarus Riverius præv. med. lib. 4. cap. 7.*

Memini expertissimum Virum Emanuele Vaczu n. Avunculum meum quatuor Lusitanæ Regum Medicum cubicularium, qui que sanguinis fluore per nares am septuagenarius sæpe vexabatur, stercus alinum modicè exsiccatum in capsula semper ad manus habuisse, cui medicamento nullum aliud simile reperisse, sæpissimè referebat, præsertim si succo urticæ commixtum, cum siccum jam erat, aut recens per se naribus adhiberetur. *Rodericus à Castro. lib. 1. De Morbis Mulieribus cap. 5.*

Memini me virginem Pragæ curasse, quæ sex annis hæmorrhagia laboraverat ita vehementer, ut vix unquam hebdomada præteriret, quin aliquoties illi sanguis efflueret. Hæc cum nullis remediis juvari posset, à me consilium petiit, qui prætermisissis aliis omnibus, quæ à Medicis præscribi solent, utpote quibus ad n. uscām jam diu usa fuerat, Jaspidem, cujus facultas ad hujusmodi symptomata mihi experientia nota erat, illi commodato do. ut collo appenderet, paret illa, sanguinisque fluxus ilico sistitur, gestat per aliquod hebdomadas, nec rediit fluxus. Cum itaque se prorsus curatam opinaretur, deponit gemmam: post paucos dies redit fluxus, iterum appendit Jaspidem, cujus beneficio mox liberatur. Cum vero singularem hujusmodi facultatem & divinam miraretur (ut mihi retulit) experiundi gratia aliquoties a collo deposuit gemmam, ac semper animadvertit redire fluxum, nec curari, quin iterum appenderet. Observavit tamen, non statim seposita Jaspide redire, sed post multas prius elapsas hebdomadas; appensa tamen, statim sisti, ita ut nulli aliæ causæ fluxus inhibitiō ascribi ab illa potuerit quam Jaspidi, tandem cum per aliquot menses à corpore gemmam deposuisset, nec unquam hæmorrhagia rediisset, mihi illam reddidit. Postea cum illam sæpius convenirem, affirmavit non redire amplius nuxum, ac se omnino curatam esse. Erat Jaspis rubra. *Anselmus Boetius lib. 2. De Lapid. & Gemmis. cap. 102.*

℞. Sem. hyosciami albi. & papav. alb. an. ʒij. conserv. rosac. ʒj. F. S. A. Electuarium, dosis, quantitas nucis moscata vel juglandis. Hoc

simplici remedio Medicus quidam præclarus enormes hæmorrhagias narium, uteri etiam, & aliarum partium sæpissime curabat. *D. Robertus Boyle, tract. de virtute naturalis Philosophiæ. part. 2. sect. 5. cap. 6.*

Aperiam quod mihi cum maxima languentium utilitate semper adhibere profuit. Bursa pastoris contrita si cum o. i. albumine & aceto commista fuerit, & fronti applicetur, confestim sanguis contringetur, ut mihi non semel in infirmorum cura contigit. *Julius Cæsar Baricellus Horti. Genal. pag. 160.*

Cuidam febricitanti, die septimo hæmorrhagia copiosissima accidit, ita ut præ immenso sanguinis dispendio ager fere viribus exolveretur, atque opis medicæ pro sanguine sistendo maxime incumbere necessitas: in hunc finem cum venæ sectio in brachio, ligaturæ epithemata tum capiti tum imo ventri adhibita, & quamplurima alia remedia incassum tentabantur; tandem mulieris illuc casu occurrentis suavis, nari stillanti ferrum ignitum, admovebatur, & de repente a vapore sanguinis torrefacti in nares suscepto, illius fluxus sistebatur, hoc remedium postea in plerisque bono cum successu usurpatum novi. *Thom. Willis lib. de Febris cap. 11.*

A proprietate hæmorrhagiam sistit stercus suillum pro odore naribus objectum, Parens meus admiscuit fragmenta ollæ veteris pulverisata, & sic ad miraculum sistit sanguinem.

Medicus quidam celeberrimus hæmorrhagiam narium sic curavit.

℞. Pulv. altringent. ʒj. album ovi conquss. q. s. aceti parum M. applicetur fronti & circa colum.

℞. Aq. spermatis ranarum, plantag. nymphaez, syr. corall. an. ʒj. M. bibat frigide.

℞. Carnis bubulæ recentis, asperge aceto forti, & impone nuchæ capitis. *Wolfgangus Hoesferus. Hercul. Medic. lib. 1. cap. 10.*

Vir quidam hæmorrhagia insigni cruciatus, cum curari non posset, tandem relatum ei fuit, quendam virum secretum admirandum ad hæmorrhagias insigniores statim sistendas habere, sola herbæ contusæ applicatione, eoque remedio innumeros curatos fuisse; remedium igitur hoc habendum curavit æger noster, missa ergo fuit herbæ contusa & aqua in phiala, herbam plantis pedum & volis manuum applicandam esse, neque viginti & quatuor horis amovendam scribebat secreti possessor, & mantile aqua frigida madefactum testiculis involvendum, naribusque indendas interioris cepæ partis turundas in aqua supradicta medefactas, naribus primò eadem aqua mundatis: hoc omnia facta fuerunt tanto cum successu, ut nihil melius exoptari posset. Ego vero remedii addiscendi desiderio flagrans portionem herbæ asservaveram, qua diligenter explorata, manifestissime secretum agnovi, solum enim herbæ male contusum & fere integrum inveni, æquanique ex eadem herba esse percepit, ut autem miseris ægris prodesse possim, libenter eam nominabo. Urtica communis hæc herba tantæ virtutis est, hæc enim ut sæpe ab illo tempore expertus sum miros ad hoc produxit effectus, imo in vulnere equi magni præstii hæmorrhagia pereuntis; quod etiam præstat si fronti admoveatur. *Petrus Borellus cent. 1. obs. 95.*

Otho Heurnius stupam sequenti aqua madefactam

factum naribus inditam potenter hæmorrhagiam compefcere tradit.

℞. Aceti fortiff. ʒj. croci martis ʒj. colcotharis ʒβ. M. In Notis ad cap. 6. lib. 5. Pathologia *Joan. Fernelii.*

Pro Hæmorrhagia ex dente avulso.

Dominus quidam cum sibi dentem avulisset, tam copiosa hæmorrhagia successit, ut ferme moreretur, irritis omnibus remediis. Vocatus jussi ut emplastr. contra rupturam satis magnam tempori denti avulso respondentem admooveretur, item ut alveolo e quo dens extractus erat, parum colcotharis pulverisati adhiberetur cum cotono & digito contineretur. His factis intra horulam substitit sanguis. *Petrus Pachecus. observat. 28.*

Pro Hæmorrhagia ex Vulnere.

Cum miles quidam vulnus accepisset in brachio, quo radius & cubitus tranversim secabatur, tanta secuta est hæmorrhagia, ut post varia astringentia admotâ, tum etiam caustica & escharotica, fluxus tamen sanguinis per intervalla recurreret, ita ut Medici & Chirurgi de brachio penitus amputando cogitarent. Ego vero cui æger commisit fuerat, linteum complicavi in formam cylindri, longitudinis trium digitorum transversorum, & crassitie pollicis, quod perpendiculariter in vulnus demisi: deinde plumaceolis reliquum vulneris spatium implevi, & quia cylindri extremum extra brachii superficiem pollicis crassitie eminebat, plenaria quatuor admovi, quæ cylindrum æquabant firmabantque: ipsi vero cylindro quantum splenium, idque quadratum apposui, ac denique fascia arte ligavi: & ab eo tempore sanguis amplius non effluxit, vulnus autem non detexi per quatuor aut quinque dies, donec caro intus enata venæ orificium impleverit. *Samuel Formius observat. 1.*

Cum equus commendatori cuidam mordicus digitum abstulisset, sanguinisque fluor, multis frustra tentatis, non sisteretur, jussi eum in pulli gallinæci vulnus, recenter jures podicem sectum, intrudere, & sic quam diu caleret retinere, fluorque statim substitit. *Felix Platerus observat. lib. 1 pag. 772.*

Hæmorrhagia à vena secta quam nemo sistere valuerat, solo aluminis tactu curata est. *Petrus Boerllius cent. 4. observ. 7.*

Rusticus quidam vulneratus in manu, arteriæ lacerationem patiebatur, ubi hæmorrhagia sanguinis arterialis cum saltu frequenter invadebat, nullisque remediis communibus corrigi potuit, hic tandem ad collegam meum, D. Strozajerum accedens, auxilium in hac periculosa hæmorrhagia desiderat cui pauxillum magisteri ropii ad arteriam vulneratam opponitur, quo ad miraculum usque contumax hæmorrhagia mox restingitur: vulnere post emplastro itaico Crolliano facillimè consolidato, *Gregorius Harslm. observat. 12. lib. 9.*

De periculosa hæmorrhagia narium in senē, quomodo cohibita fuerit.

Reverendus Dominus Johannes de L'Olea,

apud Muratenses Gallicanæ Ecclesiæ, Verbi Divini Minister fidelissimus, homo ad sexagesimum ætatis annum appropinquans, varicibus in cunabulis laborabat, qui certis anni temporibus sponte erumpere, sanguinemque profundere solebant. Quam vero anno 1603. diutius solito retenti fuissent hæmorrhagia narium, eaque periculosa, correptus est. viginti enim quatuor circiter horarum spatio, sanguis continuo fere effluebat. Ego quarta Aprilis advocatus hominem pene in ortuum inveni, sanguis per nares & os copiose profluabat, & (quod mirandum) lachrymæ languinolentæ, simul exillabant: pulsus fere nullus & syncope frequens. Protinus itaque crura sub genu, & brachia ad cubitum arte ligavi: narium turundas, alburine ovi madefactas, & pulvere nostro ad sanguinem sistendum aspersas, imposui. Fronti vero sequens defensivum applicui.

℞. Farinæ hordei ʒij. Sanguinis draconis boli armeniæ terræ sigillatæ croci martis corticum granator. an. ʒj. succi prunor. sylvestr. infus. pilulati & aceto dissoluti ʒss.

Et cum albumine ovi, aceto, parumque aquæ aut omphacio, in mortario fiat defensivum, quod supra linteum extensum, fronti & naso, frigide applicetur, sæpiusque posca irroretur, ne exiccet, & incalescat. Renes & hypochondria, oleo & unguento rosaceo, parumque acetosacei simul mixti inunxi. scapulisque cucurbitulas siccas admovi, sequentem quoque potumculam exhibui.

℞. Aquæ plantag. & rosar. an. ʒi β. terræ sigillatæ ʒj. succi granor. berber. ʒij. Sacchari q. l. ad saporis suavitatem: confect. alkermes (propter virium lapsum) ʒj. Misc, fiat potio, quam per intervalla iteravi.

His remediis adhibitis, fluor paulatim cessavit, per menses tamen aliquot valde imbecillis fuit, quo tempore eum cibus euchymis, veluti jusculis carniū recentium, caponum, hordei decorticati, & similibus, nutrirī jussi. Vinum decoct. agrim. veron. parumque cinnam. diluebat. Hepar linimentis corroborantibus, obstructionsque impredientibus inunxi. Per intervalla quoque confectione alkermes, dissoluta aqua cinamomi absque vino destillata, utebatur. Sic divino favore, ad hunc usque annum 1608. laus Deo bona valetudine fruitur, nec ab eo tempore unquam amplius eiusmodi fluxum passus est. Tandem 16. Februar. prædicti anni pleuresi correptus, pie, placideque in Christo obdormivit, *Guilielm. Fabric. Hildan. Observ. Chirurg. Cent. 2.*

Alia hæmorrhagia periculosa, curatis.

Anno 1696. Juvenis quidam Lausannensis robustus ac plethoricus, cum sub sole tempore dierum cunicularium supra modum incaluisse, posteaque sponfam suam, quam noviter duxerat, ardentius, quam vero sibi pro conservanda bona valetudine conveniebat, amplexu fuisset, hæmorrhagia maxima narium correptus est. Huic à Pharmacopola varia, cum interna, tum externa, sed sine successu, adhibita fuerent remedia, Ego vocatus, omnia, quæ profutura existimabam præsidia, præscripsi, & admovi, sed frustra quoque. Quamobrem, cum hominem propter ingentem ebullitionem ac fervorem sangui-

nis, in maximo versari periculo, probe cognovilem, extremo huicce affectui, extremum potius remedium (in quo tamen spes aliqua) adhibendum esse, quam immaturam mortem expectare, aditantibus & amicis suasi. Labrum itaque frigida in pleri jussi, in quod totum corpus immerit. Sic trigefacio ac inspissato sanguine, fluxus paulatim restrictus fuit. Postea per dies aliquot sequens Julapium bis in die exhibui.

℞. Aquar. buglos. & acetosæ an. ℥ij. Syr. de succo limon ℥j. Misce, fiat Julapium. Victus regimen tenue ac refrigerans observavit. Et sic brevi convaleuit, adeo ut ad hunc usque annum 1699, bona valetudine fruatur. *Idem ibidem.*

Et maxima hæmorrhagia, cachexia, tandemque mors sequuta.

Anno 1607. die 22 Novemb. Reverendus D. If. ias Monnus, Verbi Divini Minister in Merz ad Muratum, Vir pius; & sexagesimum circiter ætatis annum habens, maxima hæmorrhagia correptus fuit. Qui vero de pulvere meo ad sanguinem sistendum a D. de L'Osea (qui illum, ut rem pretiosam penes, se semper conservabat) petiit, & sibi a barbitonore cum nonnullis aliis medicamentis, veluti defensivo & refrigerantibus, (ut paulo ante in curatione D. de L'Osea a me viderant, applicandum curavisset, hæmorrhagia cohibita ac restricta fuit. Ego eadem die opportune Soloduro, ex aula Inultris D. Eustachii Refugii, Legati Regis Galliarum Muratum veniens, accersitus fui, ipsumque propter sanguinis effluxi copiam, pene exanimatum offendi. Suasi, ut juseulis carniarum recentium, caponum, gallinarum, lacte item amygdalarum dulcium, ovis sorbilibus, & ejusmodi cibis multum nutrientibus vesceretur, quin etiam ut medicamentis nonnullis viscera corroborantibus, uteretur. Consilio meo ad dies aliquot paruerunt, postea vero cum in victus ratione æger deliquisset, neque medicamenta idonea adhibuisset, paulatim in cachexiam incidit. Tandem ascite correptus, sequenti anno 1608. mense Februario, animam Deo placide pieque reddidit.

Mirabilis Umbilici Hæmorrhagia.

Sanguinem ex umbilico infantulorum recentiorum aliquando nimis copiose profluere, multoties observavi, ut ex observat. 52. cent. 1. videre poteris. Vasa enim umbilicalia si post partum ab obstertrice nimis negligenter ligata fuerint, sanguinem maximo cum infantulorum damno & vite periculo profundunt, uti loco præallegato ostendimus. In adultis vero, quia vena umbilicalis contrahitur & in ligamentum transit, sanguinem non amplius per eam naturaliter prouocare posse, rationi consentaneum est. Verum naturam materiam aliqua morbifica oneratam, aliquando iterum venam illam reserare, per eamque serosos humores copiose projicere, nonnunquam in hydropicis observavimus, quare de re vide ob. ser. 47. cent. 1. Sanguinem vero in adultis ex hi pate per umbilicum adeo copiose, ut in sequenti historia acciderit, profluxisse, hæcenus non observatum fuerit, nunquam me legere memini: ideoque casum ordine recensere non gravabor.

Dn. Daniel Schertler, Apothecarius Solodurentis Helvetiorum, experientissimus, homo proutosus, obesus & trigessimum sextum annum ætatis agens, amicus meus singularis, cum superiori anno 1611. circa festum Divi Johannis II. petitz ad Nundinas Argentinenfes, negotiorum suorum causa profectus, ibique occupatissimus esset, ac quodam die supra modum incauisset, apertus sibi fuit umbilicus, ita ut ad libram unam & semis sanguinis efflueret, per se tamen & nullo adhibito medicamento substitit. Miratus simul & perturbatus hac de re cum esset. Medicos eruditos, simul & Chirurgum advocari jussit; qui hujusmodi medicamenta, quæ sanguinis fervorem retinere solent, exhibuerunt & exterius applicarunt; sed exiguo cum fructu. Altero enim die & subsequenter, usque ad undecimum, ex umbilico quotidie bis sanguis, non quidem guttatim neque in parva quantitate, sed cum impetu & copiose erupit. Tormentum adeo erat angustum, ut vix lentem excipere posset. Cæteris autem horis (quod probe notandum) nimirum præcisè inter septimam & octavam matutinam, & inter secundam & tertiam pomeridianam, hæmorrhagia illa accidebat. Ut plurimum quoque hoc tempore singulis diebus semel hæmorrhagiam narum patiebatur. Medici simul & Chirugi, etiam si omnem adhiberent diligentiam, sanguinem tamen medicamentorum beneficio sistere nunquam potuisse, æger ipsemet mihi affirmavit; sed sponte & per se substitit. Hoc modo, nimirum quotidie bis, totos undecim dies sanguinem profluxisse, & interim ad libras usque viginti septem emanasse, a Medicis & ipso ægro observatum fuit. Elapsa undecima die, ulcus umbilici accrevit, ex quo loco sanguinis materia purulenta per menses aliquot extillavit, paulatim tamen iterum coagulavit.

Cæterum quia quantitas illa sanguis, qui undecim dierum spatio tam ex umbilico quam ex naribus effluxit, modum excedere videtur, & vix hominem tanta sanguinis copia præditum esse, credibile sit; adeoque rem fabulosam esse aliquis æstimare possit, quæstio suboritur: nimirum sanguis an purus fuerit, nec ne? Ego ipsum non purum, sed aliis humoribus, imprimis serosis ichoribus permixtum fuisse, existimo.

Constitutio corporis phlegmatica & obstructions viscèrum, quibus antea per annos aliquos laboraverat, idem faciunt. Serosi enim humores isti, beneficio naturæ exitum petendus, venam umbilicalem paulatim dilatarunt: tandemque una cum portione aliqua sanguinis per umbilicum eruperunt.

Ex maxima porro evacuatione ista vires adeo prostrata fuerunt, ut non nisi summa cum difficultate Solodurum reduci potnerit. Ego 11. Novembris in anno 1611. ex patria rediens, cum ipsum inviserem, omnia ista quæ recensui, ex ipsius relatione annotavi. Umbilicum extensum, rotundum & aliquantum elevatum, & instar vesicæ aqua impletæ, molem inveni, nec non fluctuationem quandam in ipso percepi. Dolorem præterea per intervalla, imprimis vero tussiendo & noctu decumbendo, ambulando vero nullum aut exiguum saltem adesse, referebat. Venter extensus, durus, appetitus prostratus.

stratus, & sitis maxima aderant, parumque dormiebat. Postea vero quid cum ipso acciderit, ad meos redeundo, & Solodurum transeundo, si intellexero, tibi volente Deo, per occasionem communicabo. Nunc propter festinationem plura abscribere non possum. *Idem Centur. iij.*

Ex mictione sanguinolenta repentina mors.

Anno 1613. Mense Julio, nobilis quidam Lausannensis, Dn. Ferdinandus Lovisius, Dominus de Chesau, & Chandens, quem honoris gratia & propter eam, quæ inter nos fuit, familiaritatem, nonnisi Vir pietate, & Virtute excellens, cum quadam diem in publicum prodiret, & cum subditis suis sermonem haberet, in deliquium animi incidit. Ex Pago suo Chandans Lausannam in lectica deportatus, animam Deo piè placideque reddidit. Causa mortis fuit mictio sanguinis, quam per tres integras septimanas studiose celaverat, & Uxoribus vix, Medicis vero nunquam indicare voluerat. Veracundia, quæ sanitati adversatur, plerumque necem alterre solet. *Idem. Cent. vj.*

De admiranda Hæmorrhagia per Penem.

Aliquoties mihi, vir clarissime, Amice Colendissime, cum Lithotomis, rerum Anatomicarum imperitis, negotium fuit: Velicam enim ipsiusque collum, venis, quæ alicujus momenti censeri possint, præditam esse, in dubium vocare aui fuerunt. Atque hanc acceptam esse opinionem Lithotomorum Empiricorum in Germania existimo. Ex isto porro errore multa incommoda, & quidem gravissima sequuntur: In extractione enim calculi, dum hæmorrhagiæ & sanguinis, qui in vesicam confluit, ibidemque in grumos concrevit, rationem non habent, & ut effluat, subsidia non adhibent, putrescit, & gravissima excitat symptomata: videlicet dolores gravissimos, inquietudines, febres, inflammationes, Gangrenas, tandemque mortem ipsam. Verum enim verò rem aliter se habere, tibi, Vir Clarissime, omnibusque, qui fabricam humani corporis intelligunt, notum est. Ut autem ignorantiam horum hominum exemplo quoque resellerem, rationesque Chirurgos cautiore redderem, statui Historiam illam observatione dignissimam, de Affectu Dn. Anthonii Marionis, Centuriæ meæ inferere. Nequaquam tamen illam publici Juris facere volui, nisi prius ad Virum Clarissimum, ut qui ante me ad ægrum accessit fuit, referrem ea, quæ Ego hac de re consignavi, quod & nunc facio, submisit rogans, ut omnia perlegere, castigare, & si quid à me prætermisum fuerit, id abscribere non gravetur: imprimis autem obnixè rogo, ut excellentia T. quantitatem sanguinis, ab ipso rejecti, à Dn. Capitaneo Meißer, communi nostro Amico, qui etiam curationi interfuit, aliisque astantibus expiscari, mihiq; significare velit. His Vale, Vir Clarissime, Consultissime, & cum tuis æternum feliciter vivo. Dabam Bernæ 18. Septemb. 1626.

Anno 1623. cum viri nonnulli juvenes Friburgenses saltando ac currendo sese exercerent, accidit, ut quidam ex eis, Antonius Marion

nomine, homo viginti circiter annorum, robustus, & plethoricus, inter saltandum Perineum contra extremum scami angulum allideret, sine ulla tamen cutis vulneratione: quapropter etiam dolor protinus superveniret maximus, nulla tamen secuta est Hæmorrhagia, inde factum est, ut de affectu non ulque adeo sollicitus fuerit: sed aliquo modo sedato dolore, cum reliquis suis Sodalibus hilaris esset. Sequentes vero nocte adaucto dolore, cum sanguine copiose emingere cepisset, & intra paucos dies ad libras aliquot sanguinis per penem emixisset, ac ita quidem, ut vires mirum in modum imminuerentur, haud parum perturbatus fuit. Quapropter nobilem & clarissimum virum Dn. Franciscum Prosperum Gottrovium Reipubl. Friburgensis Medicum ordinarium atque celeberrimum, in consilium vocare jussit. Is considerato periculo, in quo versabatur æger, autor fuit, ut ego quoque accerferem. Quarta itaque Martii, 1623. cum ad S. Albinum, in agro Aventico situm, ad ægrum pervenirem, vires, propter copiam sanguinis, per penem rejecti, mirum in modum prostratas inveni: ea quoque die, & subsequente nocte, ad libras circiter duas excrevit. De urina, quæ jam separatim cum sanguine permixta erat, non loquor. Sed quod admiratione non vacat, vidi his meis oculis, etiam præsentem Dom. Doct. Gottrovio, ægrum grumos sanguinis, qui magnitudinem ovigallinæ excedebant, sine insigni molestia & conatu per ductum urinarium excrevisse, tam valida erat in ipso facultas expultrix. Inter effluendum autem veluti gelatina erat, & mox tamen in grumos spissos concrevit. Vix credibile est, quantum sanguinis per penem eminxerit. Interim tamen, divino aspirante numine, feliciter à nobis Santeati ritutus fuit, & pristinas vires ita recuperavit, ut sequente anno in Galliam profectus sit, ubi in hunc usque annum 1626. hæc scribo, castra regia sequitur.

Curationem autem ut sequitur, instituimus. Primo victus rationem, quæ refrigerat, humectat, nutrit, & corroborat præscripsimus. Sequentem potiunculam bis in die, videlicet mane & vespere propinavimus.

℞. Aquæ Fragariæ, Prunell. Plantag. ana ℥. j. β. Syrup. de papavere, Althea Ferncl. ana ℥. j. Tripheræ magnæ cum Opio, ℥. iij. Misce fiat potio, pro sex dosibus, matutinis & vespertinis.

Frequenter quoque interdum nonnihil de sequente potione ex cochleare sumebat.

℞. Aqua plantag. Bursæ Pastor. Centummo: ana ℥. j. Boli orient. veri ℥. j. confect. Alkerm. ℥. iij. Syrup. de papavere, ℥. j. β. misce. Perineo sequens cataplasma applicuimus:

℞. Farin. hordei ℥. j. β. pulv. Balanstior Nucum cupress. Rad. Bistortæ, tormentill. an. ℥. j. Rosar. ℥. j. Cum decocto rad. & foliorum plantag. parumque acet. rosac. fiat cataplasma, applicetur tepide. Imo ventri, quia de dolore extensivo, propter copiam sanguinis in vesica collectis, conquerebatur, hoc applicuimus cataplasma.

℞. Parietar. malvæ, altheæ, an. m. j. flor. chamomill. melilot. sambuc. an. m. β. sem. lini, fœnigræc. anisi, ana ℥. j. β. misce, fiat omnium pulvis tenuissimus. Hujus pulveris.

℥. Ana ℥j. ꝑ. farin. fabar. ℥iij. coquantur cum lacte vaccino, fiatque cataplasma, addendo vitellos ovorum num. ij. Butyr. recent. ℥j. applicetur tepide. Regionem Renum sequente unguento inunximus.

℥. Unguenti refrigerant. Galeni ℥iij. ol. nymphae. ℥j. Camphoræ dissol. in acct. rosæ. ℥j. Miscantur in mortario, fiatque linimentum.

Cæterum, quum propter maximam, & fere incredibilem sanguinis deperditionem, & proinde hepatis refrigerationem atque labefactionem, secuta fuisset viscerum obstructio, & cachexia, visum nobis fuit, ut sequente uteretur Syrupo Magistrali, qui non tantum viscera refecit, sed & internum ulcus circa collum vesicæ, propter casum factum, consolidat;

℥. Rad. feniculi, petroselinii, asparag. ana ℥j. ꝑ. herb. betonic. scabios. agrimon. veronic. Alchymill. Pyrol. fanicul. ana m. j. sem. anis. fenniculi, Urtic. an. ℥j. flor. trium cordial. Gemist. Hippuricæ, an. p. j. liquirit. mundat. uvarum exacinat. ana ℥j. Fiat s. an. decoctio in aqua fontan. ad consumptionem tertie partis. Colaturæ adde Mellis despumat. & sacchari miscellanei an. ℥bj. fiat syrupus s. an. aromatizetur speciebus aromatici rosæ. & Diarrhodon. Abbatis, an. q. s. de hoc syrupo sumebat æger singulis diebus per tres horas ante prandium cochleare unum aut alterum. Sumebat quoque per intervalla ad ℥j. aut ℥j. terebinth. claræ, cum pulvere liquiritiæ. His non sine admiratione multorum feliciter & perfecte sanitati restitutus fuit. Quid non potest Juventus in corpore integris visceribus prædita? *Idem ibidem.*

De periculosa Hæmorrhagia per pudenda, in Puella.

Casum illum gravissimum, quem vidimus tunc in Dn. Antonio Mirione, Vir nobilissime, Atnice plurimum honorande, non ita pridem consignavi, & ad T. excellent. missi. Ab eo porro tempore, cum quadam die adversaria mea revolverem, en incido in casum non longe absimilem quem tibi communicare volui.

Anno 1712. 5. Decembris, puella quædam ex nobilissima familia Bernensi orta, quinquæ circiter annorum, cochleare oblongo manubrio, qualibus in Culina utuntur, in manu gerens, cum ex scamno in pavementum hypocauli decidisset & mucrone manubrii infimam partem colli matricis, versus intestinum rectum vulnerasset, tanta secuta est sanguinis profusio, ut parens ipsa, & adstantes, non semel ad me dixerint, se nunquam credidisse, corpus tam exile ac juvenile, tanta cõpia sanguinis præditum. Ad libras enim aliquot effluxisse, ausus sum affirmare. Restricto tamen sanguine pulvere nostro ad sistendum sanguinem, & refocillatis atque instauratis viribus, vulnus, quod ad intestinum rectum fere usque penetrabat, brevi feliciter curavimus, & in hunc usque diem vivit.

Ex hac porro historia, nobilissime & clarissime vir, apparet imprudentia Lithotomorum quorundam, qui Hæmorrhagiam istis in locis esse pertimescendam, negare conantur. Videmus quoque, pueris urgente necessitate, & præsertim in morbis acutis, venæsectionem, quam vulgus tamen Germanorum tantopere re-

jicit, sine ullo periculo administrari posse. Si enim in hac puella ad libras aliquot sanguinis, sine vitæ discrimine, effluxerint, quid, quæso, obstat, cur Medicus rationalis ad paucas uncias non extrahat? *Idem ibidem.*

Hæmorrhagia Narium.

Theodorus Bill, vir circiter 55. annorum, mense Augusto hora quarta matutina hæmorrhagia naris dextri correptus fuit. Ego post tres horas ad ipsum vocatus, ad revulsionem statim per Chirurgum venam in dextro brachio satis largo vulnere aperiri, & sanguinis unc. xi. extrahi curavi: quo facto, & aqua etiam frigida fronti ac cervici admodum, sanguinis fluxus substitit. Post triduum, cum vespertino tempore ad convivium vocatus, vinum paulo liberalius bibisset, domum reversus eodem malo iterum correptus fuit, fluxitque sanguis tota nocte antequam me vocarent. Postridie ipsum invisens venæsectionem rursus institui, ut ante, sed nihil profuit, neque ob ætatem & vires jam dejectas eandem reiterare licuit. Turundas in nares immitti primo non permisit, quapropter hanc mixturam cum stupa canabina fronti applicavimus.

℥. Boli armenæ drach. ij. s. lapidis hæmatitis, masticæ, thuris, coralli rubri, anacrop. ij. albumen unius ovi, aceti rosæ, q. s. miscantur. Præterea oxycratum actu frigidum cervici, fronti, & testibus admodum fuit, revulsionem per ligaturas & frictiones dolorificas extremarum partium ac per cucurbitulas scapulis applicatas, factæ sunt, quæ tamen omnia nihil profuerunt. Tandem cum hæmorrhagia jam ultra 36. horas duraret, & ægri vires ob copiosum sanguinis fluxum admodum exhaustæ essent, ac de vita periculum foret, tunc sibi metuens, astringentia in nares admittere coactus fuit. pulverem itaque ex trochiscis de terra sigillata, bolo armena, masticæ, & thure compositum cum penna scriptoria utrinque pertusa (expurgata prius nare a sanguinis thrombis) quam altissime in nares insufflari curavimus, simulque turundam crassiusculam, ex tenui linteo ad digitum fere longitudinem paratam, aceto & albumine ovi madefactam, eodemque pulvere confersam, superimimus: atque eo pacto hæmorrhagia per duas trelve horas subsistere videbatur, sed postea sanguis per palatum ad os descendere cœpit, & excidente turunda etiam rursus pernatem. Tunc iterum expurgata nare, eundem pulverem inflavimus, & turundam ex frusto cretæ confectam, tante magnitudinis ut totam nares obturaret, immisimus, atque sic hæmorrhagia statim substitit, ad majorem tamen certitudinem, turundam istam tribus diebus inhaerere permisimus: ita hac vice ab imminenti periculo servatus fuit æger. Sequenti tamen anno in autumno eadem hæmorrhagia rursus invasit, in qua cohibenda cum anilibus quibusdam consiliis tota die & nocte frustra usus fuisset, tandem viribus pene exhaustis rursus ad me concursus est: hanc ego eadem ex creta turunda iterum citissime cohibui. Verum non diu post, hepate à nimia ista sanguinis evacuatione admodum refrigerato & debilitato, hydropi simul et asthmatis correptus, extremum diem clausit.

Narium

Narium hæmorrhagia immoderata (symptomatica nempe, non critica) cum hydropem, cachexiam, aliaque gravia mala inducat, quam citissime est cohibenda. Hæc autem (præmissa ceterum non naturalium convenienti regi nunc) imprimis curatur his modis: revulsione sanguinis ad nares affluentis ejusdemque à naribus repulsione: sanguinis incrassatione: & venarum apertarum occlusionem.

Revulsio optime & citissime fit sanguinis revulsione in brachio lateris affecti, qua Galenus, lib. de sang. miff. asserit se validas narium hæmorrhagias repente cohibuisse. Plurimi Medici exiguo facto foramine, & parva quantitate, sed iteratis vicibus, sanguinem detrahendum esse arbitrantur; verum magis nobis arridet opinio illorum, qui è largo foramine sanguinem confertum effluere sinunt, nam tili modo citior & melior ne revulsio. Præter venæsectionem etiam cucurbitula sanguinem potenter aliosum revellunt. Sic Galenus, lib. de præcog. ad Poll. maximam hæmorrhagiam in juvene curavit, cucurbitula magna hypochondrio adnata. Lorentius lib. 13. observat 14. hæmorrhagiam desperatam, quam nullis mediis luteri potuerat, tandem cucurbitulae pedi inpositis miraculi & miramentum affuit. Iam tunc relett: quod experimentum etiam nobis aliquoties felicissime cessit. Cucurbitulae scapulis inpositæ, quamvis multum revellant, multis tamen non sine ratione suspicæ sunt, propterea quod etiam ab inferioribus partibus sanguinem ad superiores potenter trahunt. Crato later revulsoris commendat minimi digiti in latere affecto incurvationem cum dolore: cujus generis etiam sunt, extremarum partium flexiones & ligaturæ dolorificæ, ut & caute. ium actuale plantis pedum adnotum, quo Zacutus Litanus gloriatur se desperatam hæmorrhagiam curasse.

Repellitur sanguis à naribus (nempe præmissa revulsione) aceto, aqua frigida actu, vel oxycrato, fronti, temporibus & cervici adnoto, vel cataplasmatibus ex bolo, terra sigillata, in stiche, thure, albu mne ovi, recto, & in mibus paratis, ac fronti adnoti, quibus plantago, pimpinella, aliæque herbæ estringentes & refrigerantes, recentes contusæ addi possunt. Cochlear cum suis domiciliis tritæ, du xto thure & aceto, atque sic fronti & naribus inpositæ multum commendantur. Riverius tanquam efficacissimum laudat gypsum cum aceto subactum, & ad crassitiam duorum digitorum fronti & temporibus adnotum. Acetum solum, vel oxycratum naribus sæpe attractum idem præstat ut & aqua frigida majore copia ex improvise in faciem projecta. Aetiæ tanquam expertum laudat vaporem ex aceto lapidi ignito infuso, in naribus excipitur. Pachecus (in observationibus Riverio communicatis, obs. 16) aliud experimentum describit: Rusticus inquit ex hæmorrhagia liberali jam vicinus morti me accersivit: sed cum nulla remedia contulissent, instillavi in aurem è directo naris sanguinem fundentis, guttas aliquot acetæ roatæ, & sanguinis fluxus statim subsistit. Didiceram hoc à D. Pontuado, qui viderat hoc remedium à Belgæ Medico factitatum: legi apud Scribonium Largum cap. de hæmorrhagia.

Sanguinis incrassatio peragitur medicamentis refrigerantibus, astringentibus & incrassantibus

per os exhibitis, usdemque etiam foris adnotis quo in casu foris conveniunt jam dicta repellantia, in primis vero oxycratum & aqua frigida. Sic Hildanus cent. 10. 3. in desperato casu totum corpus natis oxycrato mucus involuens hæmorrhagiam contulit. Idem cent. 3. obi. 2. totum corpus aqua frigida immergit, eodemque loco de naris remedia utilitate latius dicitur.

Venas reteratas occludunt & conglutinant astringentia naribus immissa. Galenus lib. de n. e. d. paratu facilitius & aloen in pulverem reducta albumine ovi excipit, & cum luteolo, aspersis prius piis leporinis, in nares immittit. Iu. unde astringentibus pulveribus aspersæ utilitas naribus induntur. Muscus cretens in cranis humanis aeri expositis, pulverisatus & quounque modo in nares immixtus potentissimum cernitur medicamentum. Ego turundam longam ex truto cretæ contextam, cithacantham eisdem aliquoties expertus sum. Gonyppium in cithacanthæ atramento diu intectum, antiquum expressum, & instillatum in nares immixtum, valde efficax est. In us potius inter præstantissima & specifica recensetur, si assuecens solus, vel cum bolo armena & aceto calefactus, fronti & temporibus adnotetur, & ostiendus præceatur, aut in nares immittitur: cuius vero desperatam hæmorrhagiam in nobis Germano me curasse meminimus. Rodericus à Castro & Zacutus Litanus maxime extollunt iterum ab aliis, eodem modo usurpatum, quod etiam Zacutus non pudet per os exhibere & omnibus cibis admiscere. Pulvis sanguinis humani exsiccati, ut & limacum cum coaleis combustarum, & ranarum comitutarum, in nares immixtus efficax censetur. Refert Pereda vetulam quandam in mania hæmorrhagiam tribus diebus durantem, curasse sola mentha naribus inposita. Succus urtica per os exhibitus & naribus attractus, ut & urtica contusa & fronti adnota, specifica vi nunc sanguinis fluxum efficacissime cohibere traditur. Riverius tanquam præstantissimum remedium a se non ultro probatum, commendat ipicam nardi subtiliter pulverisatam & ad drach. i. cum pu culo, aqua plantaginis, aliove liquore exhibitam, hancque non solum specifica vi, sed hepar roborando sanguinis fluxum cohibere tradit. *Isbrand De Die merbroeckii observat. & curationib. Medicis.*

De sanguinis Narium fluxu per oculum sinistram.

Teste Aristotele solus homo inter omnia animalia hæmorrhagiæ narium subiectus.

Sollicitos hæc non raro facit non solum ea laborantes, sed & adstantes, imo medicos ipsos, media quibus fluxum hunc inhibere studemus guttarum sanguinis exstillantis numero sapius respondere, fere sine ullo successu adhibita.

Heracides Tarent Galeno authore ablato prius cruore naribus inharente, ad fluxum hunc cohibendum, turundam lycio contulo immixtam naribus intrudere solitus fuit.

Chirurgi Germani, qui castra sequuntur, frustra adhibitis carpiionum lapidibus, vel moscho craniis defunctorum immato, vel etiam bufone preparato, ad verba quædam quibus vi tute occultam inesse certo sibi persuadent, plurimumque tribuunt, ipso Borello Cent. 1. obs. 94. asserente, quæ tacite (quod si enim liquis au-

diret, vana omnia habent) mustitant: sunt hæc idiomate germanico.

*Gelyck Christus stil bleef staan im Iordann, Also
muß ook dien bloede staan.*

Pro secrete habent alii ex guttis sanguinis ex stillantis quatuor aut quinque vitriolo cyprio pulverisato mixtis contereere unguentum axillæ illi quæ estejus lateris, cujus nares fluunt, illi- niendum.

Missis his similibusque aliis, nullius considera- tionis & efficaciz merito habendis, haud inutile quantum omni tempore negotii veteribus & que ac recentioribus, medicis, chirurgisve sangui- nis hic per nares fluxus creaverit, exponere, cognoscereque.

Hæmorrhagia narium quævis, docente Hil- dano, parte 2. obs. 14. si moderata fuerit, cum sa- lutaris, subito supprimi non debet, à dolore etenim capitis, variisque aliis morbis graviori- bus hominem liberat; confirmat hæc exemplo *Simonis Clerici aurifabri parte 3. obs. 11.*

Critica solutio morborum, salutaris sæpius, variis perficitur cau. & morbiticæ evacuationi- bus, per alvum, sudorem, urinam sanguinis flu- xum varium, etiam illum qui per nares fit; qua de re legi possunt quæ lib. 22. cap. 28. de *Fontan* refert *Ambros. Parac.*

Animus haud est, ea, quæ medicæ considera- tionis sunt, ut chirurgica proponere, faciunt ta- men hæc eo, ut chirurgiz tyrones attendere dis- cant, quam arduum malum narium hæmor- rhagia gravis, quanque necessarium, remediis certis huc conferentibus instructum esse.

Haud ita pridem ex inordinato sanguinis mo- tu non solum largior ejus fluxus per nares, in Wilhelmo ab Erpecom. mercatore hujus loci, à nobis observatus, sed & (quod nunquam antehac notare mihi in praxi chirurgica licuit, ab aliis, ut Barthol. cap. 1. Hild. 2. Schenk lib. 1. fol. 197. &c. propositum) per oculos ipsos, sinistram imprimis, sic ut linteo quoties tolleretur oculo colle- ctus, toties noves eundem illico repletet.

Hildano minus notam sanguinis fuisse per oculos excretionem vel ex eo colligere licet quod *part. 2. obs. 16 de Rever. D. Joanne de l'Osea* agens hæc proponat verbum: *Et quod mirandum, lachry- ma sanguinolenta ex oculis prorumpcbant.*

Hujus conditionis inordinata de ebullitione sanguinis Hild. part. 6. obs. 77. exemplum adfert, in Rever. Doctissimoq; Viro, D. Iacobo Blaunero, juvene robusto, observat. hæc verba præponens.

Huic viro sanguis non tantum ex naribus cum impetu promanabat, verum etiam ex gingivis & quidem sanis & incontaminatis exsudabat. ita ut sanguinem non solum responderet, sed & hinc inde circa gingivam, sub lingua & intra dentes in grumos concretum cogeretur digitis extrahere.

Mercator noster consilio Medici domestici venæsectionem admisit, imo potiones varias re- frigerandi, sanguinisque motum inhibendi vipol- lentes, quin & styptica quædam naribus recepit, at frustra adhibita omnia, suavis hinc Amici cu- jusdam lapides sanguinis effluxum cohibere va- lentes manibus detinuit, etiam si aliqua jam con- gulgatio in naso observaretur, & horum usu levi- minis aliquid percepit.

Mediæ hæc similiave alia cum successu licet sæ- pius usurpata, in gratiam nihilominus juniorum

placet nobis, antequam huic discursui finem im- ponamus, quædam eorum, quæ usui nobis fuere, nec unquam fere nisi cum optato successu adhi- bita, quoties gravis ejusmodi narium hæmor- rhagia ex sanguinis excedente ebullitione causata, homini fuit molesta, hoc loco proponere, quod exemplo uno alterove illustrabimus.

Ante aliquot annos Rusticus quidam, juvenis, validus atque carnosus hæmorrhagia tentabatur gravi admodum, venæsectione brachii dextri in- stituta sanguinis libram integram eduximus, mox succum plantaginis commixtum succo li- moni naribus recipi curavimus. Vincula itidem brachii, pedibusque insecimus, linteæ frigida madefacta fronti, testibusque apposuimus, ad- stringentia nostris in locis usualia applicavimus, at nihil his omnibus effecimus frumenti pro ce- revisia, aut sp. vini cocti reliquias, quibus sagi- nantur porci, quibus multum in hoc casu tribu- unt vari, cum succo plantaginis mixtas assume- ret suavisimus; at frustraneus omnis labor, conti- nuabat fluxio, nec ullo modo imminuebatur. In- cidebat obs. 17. part. 1. Hildani haberi, sponsum quendam periculosa imo ut videbatur, lethali hæmorrhagia narium laborantem suavis Hild re- frigeratione universi corporis, in aqua frigida fa- cta fuisse curatum; hujus ad exemplum etiam au- thor tui nostro ægrotanti ut fluvio vicino se committeret nudum, quod etiam fecit natatio- nique satis diuturna corpus suum adeo refri- geaverat, ut tremulus prodiret, at nec hoc medio fluxus sedatus.

Hic sic frustra usurpatis Limonis recentis particulas teretes, linteo combusto, pulvereque gallarum, incrustatas naribus imponi iussimus, & quidem ad eam altitudinem, ut vasorum sangui- ferorum extremitates, si quæ essent lætæ, attinge- rent.

Intus assumebat quantum cochlearibus tri- bus contineri poterat, singulis tribus horis, mix- turæ hujus, & quidem frigide.

℞. Aq. plantag. ʒvj. sal. prunell. ʒij. laud. opiat. gr. iij. camphor. gr. iij. syr. papav. errat. ʒ. ʒ. spir. vitriol. gutt. x. misce & detur usui.

Assumpta prima dosi, illico fluxus imminutus, imo sine ulteriore hæmorrhagia nox fuit quieta.

Joannes ab Heemstede, juvenis 18. ciciter an- norum, macilentus valde, & ex diuturno morbo debilis admodum, ex casu incidit in narium hæ- morrhagiam largam; vocatus ego, quo labo- ranti succurrerem, venam secare haud audebam, quod vires impedirent.

Remedia hinc alia in usum ducere necessarium, styptica nempe naribus imponere ordinaria, vincula pedibus manibusque imponere, linteæ frigida madefacta fronti, pudendisve applicare; at irritus omnis labor; coacti adeoque etiam in hoc ægrotante ad usum mixturæ modo præscrip- tæ, & limonum modo dicto naribus imponendo- rum devenire, applicato insuper frōti emplastro nobis in tali casu usuali, cujus descriptio hæc est.

℞. Succ. caud. equin. portulac. Solani, plantag. an. ʒij. ol. rosar. myrtill. cydonior. an. ʒij. coquau- tur olea & succi ad consumptionem succorum dein adde ceræ flavæ q. s. lapid. hamarot. boli ve- ri, nucis gallar. cortic. granator. an. ʒij. f. c. a. emplastrum.

Et horum mediorum usu brevi sanguinis flu- xio dicta sedata licet in deliquium animi grave- scatis

satis jam bis inciderit æger. *lib. a Mekren in obs. Medico Chirurgicis.*

Hæmorrhagia Narium.

Decus illud Anglicum, inuentionibus egregiis & seruenis naturæ latebrarum poliens G. Harvæus in Tr. de motu Cord. p. m. 48. ita exclamat: ecce jam duo sunt genera mortis, extinctio ob defectum, & suffocatio ob copiam (scilicet sanguinis in corde.) Hujus defectus causa sæpissime exiit hæmorrhagia enormis a quacunque parte proveniens. Quantum negotii frequentissime Medicis in praxi facessat hæmorrhagia narium, unicuique patet. Itaque medicinarum proceres egregie desudant, remediis approbatissimis congrue huic resistere, & thesaurum vitæ sartum tecum conservare; & hoc non tantum seculis præteritis, sed & hoc nostro, & præcipue in collegio nostro curiosorum. Videatur in illo 1. Epimeria. pulvis egregius Dn. D. Heitodii. obs. 12. Impiciatur decoctum præsentaneum in anno secundo Dn. D. Volkneri obs. 21. considerentur experimenta ad alia ferenda Dn. D. Bernhadi abentz anno secundo obs. 52. & sequi revolvantur, quæ Dn. D. Wedelius anno 3. obs. 106. protulit nec vitio vertetur, quod meum hic spartam condecorando, ipsorum vestigia sequi & quicquid in praxi mea hoc inualo experiri contigerit, auertere haud pigeat.

Domina quædam generoso stemmate nata, vidua annorum 59. intermissa ætatis decrepescens ratione, qua assueta erat, venæsectione, subito enormi sanguinis fluxu & naribus intellabatur. Sanguis non guttatim, sed quasi vena tusa confertim emanabat. Auxilium à me efflagitanti, à mitioribus incipiens, saltem ad inhibendum aliquo modo tantum, præscripti epithemata refrigerantia & repellenda pro fonte & collo, verumtamen fluxus concitator factus, ut priusquam redire potuerim, sanguis ad f. vj. effluerit. Chirurgus in propinquo habitans interim accersitus turundis, pulveribus sanguinem silentibus imprægnatis, nares implevit. Me supervenientem ægrotans anxie rogabat, ut removerentur, alias sibi suffocationis periculum imminere. Removi, ac tutum sanguis effluxit enormiter. Deliquia animi venæsectionem dissuadebant. Itaque ventosam magnam prius hepatis regioni, mox & alteram nuchæ adhibeo, & confestim fluxus retractus & sublatus est. Non satis laudari potest harum usus, non enim saltem in hac domina id remedii genus proficuum expertus sum. sed etiam alia vice in femina, ubi nec T. S. sæpius iterata, nec sexcenta alia ab alio Medico adhibita, quicquam emolumenti adferret, & omnia desperata & conclamata erant, quæ tamen ventosa unica nuchæ apposita sanata est. Non ignoro huic experimento opponi posse Fabr. Hild. obs. 47. C. 2. ubi inflammatio hepatis à ventosa ejus regioni apposita secuta. Sed ut in principio hæmorrhagiæ periculosum, ita in progressu, ubi magna sanguinis quantitas effluerit, vel corpori venæsectione prospectum sit, haud inflammatio metuenda, satis superque refrigerato hepate.

Hæmorrhagia Mensura critica.

Vocabulum Hæmorrhagiæ apud Hippocratem sæpe quodvis sanguinis profluvium copiosum indicat: interdum autem non addito partis nomine exprimit eam sanguinis eruptionem, quæ per va-

res fit, ut testatur Gal. 1. Epid. Comment. 1. Aphor. 9. item 6. Epid. Comment. 3. Aphor. 25. quo sensu etiam hic usurpatur, & significat fluxum illum criticum, per quem natura e venis & arteriis cerebri in ejus præsertim basi exsistentibus, sibi noxia & molesta certo tempore expellit. Clariss. Rhodensis in Epit. Method. cognosc. & curand. particul. corp. affect. lib. 1. part. 2. c. 4. hæmorrhagiæ narium arterias magis in culpa esse, quam venas autumat ibidemque suum tertium crassæ meningis per longitudinem falcis ad os cribrosum excurrentis in hæmorrhagiis aperiri, easque contumacissimas excitare statuit: quarum causa est sanguis calidus, acris, copiosus, serosus ad n. odum aptus. Talem ego hæmorrhagiam in juventute ab anno decimo nono ætatis per longum tempus in me ipso expertus sum, ubi singulis fere mensibus e nare dextre sanguis copiosus mihi cum euphoria effluere solebat. Hujus fluxus continuationem, at non menstruantem, sed rariorem, adhuc hodie patior, & quidem cum valetudinis commodo, quam semper capitis gravitas, dolor, & faciei inflammatio præcedit, quæ incommodo fluxus ille statim solvit. Si vero sanguis sponte sua haud fluxerit, soleo sæpe cum penia antema venulas in nare dextra irritare, postquam irritationem sanguis cum alleviatione effluit. Sic mentionem facit Oethus lib. obs. prop. 1. juvenis cuiusdam Canonici Eichstadii cui dicta largiori utenti, & à venæsectionibus abhorrenti hæmorrhagia narium tam familiaris fuit, ut singulis septimanis recurreret, ac jam quasi ordinaria ac naturæ consueta esse videretur, & quidem citra valetudinis vel vitæ dispendium. Historiam juvenis cui Gal. sanguinem critice e nare dextera profluxurum & nonnullis præcedentibus signis prædixerat, videat Lector benevolus apud eundem lib. de præcognit. ad posthum. c. 13. Simonis Schulzii.

Hæmorrhagia rebellis.

Strenuus quidam miles infeliciter in castris acidalie quam gradivi militaverat. hinc ex Lue inde reportata & male curata varia ipsi relicta sunt symptomata: inter alia & hæmorrhagia narium longa, frequens & rebellis: omnia tentavimus, quæ industria nostra excogitare potuit, sed prohibere potuimus, quin illa tanto sæpe cum impetu rediret, ut de vita perichitari videretur æger nollet. Interim confortantibus, sanguinem silentibus & acrimoniam ejus mitigantibus tam diu pugnatum fuit usque dum ipse natura medelam attulit: officulum enim oblongum & satis acuminatum, quod benevolus lector hic delineatum videt, à natura ex patte sana separatam & sensim ad nares protrusum, inde tandem chirurgi manu fuit extractum, quod factum, non amplius rediit enormis ille narium sanguineus fluxus. Ita subleata causa, tollitur effectus. *Thoma Bariskolini.*

Hæmorrhagia narium à frigore lethalis.

Puella quædam septennis, Senatoris cuiusdam Ratisponensium filiola, tempore brumali sub aura frigidissima nimis libere obambulans, unica saltem sternutatione noctu quassata, tantam hæmorrhagiam per os & nares passa est, ut subsequente die, omni medicina tam interne quam externe frustra exhibita, convulsione gravi infecta mortem obierit. Sine dubio, quod vase quodam venoso magno in capite sub cranio è sanguinis à frigore brumali moti impetu rupto, hæmorrhagia hæc oborto fuerit, ac meninges à sangui-

nis à acrimonia vellicata, & cerebrum sanguinis extravasati copia oppressum, convulsionem necemque induxerunt. *Halovigius.*

Scholion Schroekii. Sanguinem à calore agitatum & justo magis rarefactum, quod in longiori sub solis radiis mora, vehementiori à corporis motu, vini generosi liberaliori ingurgitatione, &c. sæpius accidit, majori spatio indigere, quod denegato, arteriarum oscula penetrare, referare, sicque ingenti sæpe rivo effluere, frequenti admodum constat observatione. At à frigore hæmorrhagiam maximam oriri, rarius licet sit, impossibile tamen haud esse, & ratio & experientia confirmat; idque præsentis ex auctoris nostri observatione abunde patescit. Scilicet non ipsum frigus exitum illum primario inducit, cujus potius est contripare, & vasorum extremitates occludere, ipsam etiam sanguinis turgescenciam retinere; ut adeo illis, quæ frigidiori natura sua ac virtute adstrictoria contractionem dehiscentium in vasculis sanguiferis oscillorum promovere valent, nec non quæ variorum epithematum frigidorum fronti, cervici, hypochondriis, testibus, &c. impositorum forma, aliisve modis fervorem atque concitatioem sanguinis motum compescunt, feliciter sæpe ingentes hæmorrhagias sili videamus. Sed qua ratione præstare id valeat, paucis dispiciamus: Si frigoris natura in sale aliquo volatili urinoso consisteret, quod quidem non nemini statueri nuper libuit, ratio in promptu foret, cum similitum salium in sanguine rarefaciendo, fluxilli reddendo, & ad celerioem decursum concitando, (non figendo, quod nuper cuidam imperito empirico placebat,) quin & humoribus serosis, ad apertis in cute poris, per sudorem expellendis virtus sit perspectissima. Tale tamen solitariu non adesse, ipse frigoris effectus haud admittit, quo nempe sanguinis ac spirituum naturalis in corpore motus inhibetur, & somnolentia, ipsaque tandem mors subsequitur, nisi concitatori corporis motuatione, sanguinis & spirituum liberior per corpus pervagatio & circulatio promoveatur. Unde altissimas Alpes hiberniæ tempore transeuntes, si in via quiescant, à somno, rigore, & morte confectum opprimi, Martinus Zeillerus cent. 1. epist. 52. ex Jo. Simleri comment. de Alpib. nec non Exc. D. D. Joh. Jacob. Wepserus Exercit. de loc. affect. in 2. popl. p. m. 260. memorant. Pariter si ab alio alioque sale qualitas ista deducend foret, quale est ammoniacum dictum gemmeum, commune, &c. dum acredine sui interiora narium stimulare, vasorum oscula referare, & sanguinem fluidiorem reddere valent, causam hæmorrhagiæ hujus reddere, itidem foret perfacile; quamvis enim illa, si in aqua solvantur, insigniter eandem frigefacere conperiantur, consimilem tamen aliquam regidissimam in brumali frigore fingere salum, vel particularum salinarum frigidificationem, excitationem vel extricationem quo modo liceat, equidem haud video; quinimo tale aliquod in aëre per naturam sal hospitari, & incertissimum est. & nullis hactenus experimentis demonstratum. Nitrosum autem, quale in aëre latere (licet & hi non una premantur difficultate) plures majori probabilitate statuunt, cum frigiditatem potius corpori inducere, ideoque in topicis refrigerantibus utiliter adhiberi, sanguinem item in febribus, augm., &c. æquantum compescere nitrum observe-

tur, eandemque ob causam in vulnere hæmorrhagiis internum ejus usum Joh. Agricola tract. 2. chirurg. parv. pag. 190. commendat, huc nihil contulit, verosimile videri potest; nisi forte æreum illud nitrum plane alterius alicujus naturæ fingatur. Si vero substantia aliqua spirituosissima frigus sit dicendum, quod Clar. Sebatt. Wirdigius lib. 1. de Medic. sp. c. 9. defendit, atque igne suo frigidus spiritus calidos ejiciat, exturbet, extinguat, suffocet, neque hac ratione, ad propositi nostri explicationem conferre quid posse, videtur. Sed frustra diutius his insisto, qui etiam hoc in negotio, de frigoris natura, illud quantum est, quod nescimus! & cum Poëta 2. Georg. exclaimare cogor.

*Sceleratum exquirere frigus,
difficile est.*

In hoc igitur casu nostro poros cutis à frigore, quomodocumque jam id factum fuerit, dentatos occlusosque, effluvis illis, per utilisibilem transpirationem naturaliter alias e corpore continuo eliminandis, exitum præclutit, credibile est; quæ dein sanguini remixta & conjuncta, eundem exagitare, calorem ejus intendere, atque ad fervorem concitare valuerunt, ita ut Archæus hic in furorem quasi actus, teneriori isto in narium loco, accedente in primis à communis aerioribus halitibus, qui præterea & terminationis, hæmorrhagiam prægressæ, & convulsions eandem consecutæ auctores fuerunt, fibrarum arteriarum motricium spasmo, verosimiliter factis à Cl. Willisio proposito, tandem perumpere licet ab onere liberare se conatus fuerit: licet vehementiorem ob conceptam turgescenciam, majori in copia, quam ad salutem conferre poterat, tam per nares, quam ex his, mediante foramine illo, quod ab ipsis ad palatum tendit, per os effluerit, simulque purpuream tecum animam exterrinaverit, sive jam, quod Magnus R. Baconus de Verulamio in hist. vit. & mort. statuit, ob meram vacui fugam, cità mors profluvium istud ingens & repentinum, omnibus nimirum, sanguine cum spiritu, affatim se ad spatia, quæ exinanuntur, implenda moventibus, insequuta fuerit; sive quod (vacui illa fuga ut commentitia à doctoribus rejecta,) probabilius, vis aeris elastica mortis causam attulerit, quatenus spiræ ejusdem, ut ita vocare nonnullis libuit, ætioribus antea terminis coarctatæ, magis, ob sanguinis per vasa aperta effluxum, nactæ spatium, in maiorem sese molem successive expandere, sicque sanguinem magis magisque premere, & per referata oscula exprimere atque expellere potuerint. Licet alias tam fuga vacui, quam aeris elateris remotior tantum mortis causa dici debeat, illoque solum respectu, quo ab utroque sanguinis spirituosissimi vivifici, & cum eo animæ ipsius e corpore fuga, expulsio, vel exitus adceleratur. Et hanc sanguinis excretionem, non e venis, sed ex arteriis, quæ à carotidis ramo interno ad nares feruntur, fuisse factam, certum est, postquam sanguinis naturalis motus, arteriis rubrum istum liquorem à centro ad circumferentiam derivandi, uti venis ab hac ad centrum reducendi, munus vindicans, extra omnem dubitationem positus est. Ut adeo tertio etiam crassioris in capite meningis, supra falsiformem hujus processum longiori ductu sub calvaria ob osse ejus, crista galli communiter dicto, versus posteriora repenti sinu, vel hac ratione hæmor-

0004

feriata quadam, nuper scilicet vernies quatuor, præcedente atrocissima cephalaugia, per nares eam excrevisse, albicantes, oblongos, minimeq; hirsutos. Ipse etiam Ebnusina lib. 3. fen. 1. tr. 2. c. 3. ex medicorum quorundam indorum fide, cephalalgiam quandoque generari jam edocuit à vermibus in capite generatis, motu suo, tensione & rosione latentibus, addens: nam vermes multoties nascuntur in anteriore capite & super locum, qui est in strictura narium; & possibile est, ut nascantur apud velamina, et si raro contingit. Locum generationis non semper eundem esse, verissime videtur; interdum enim, licet rarius, a partibus inferioribus, utpote ventriculo, &c. ascendisse, perq; palati foramina sic in nares perreplisse, interdum vero in ipsa nares investiente membrana, aut anfractuosa earum cavitate, quandoque in caverna ossis frontis ad radicem nasi sita, quandoque etiam in ipsis ossis ethmoidis spongiosis cavernis stabulari posse, aut in o; quin & si cerebrum ipsum per nares excretum aliquando fuisse perpendamus, quod celeb. D. Georg. Wolffg. Wedelius Physiolog. med. sect. 3. c. 24. se vidisse testatur, cur non ex ipso cerebro, in quo vermes quandoque inventos fuisse D. Th. Barth. cent. 1. hist. anat. 64. aliq; memorant, eosdem aliquando prodiisse, dicere liceat, haud video. Utrum vero ex ovulis insectorum cum cibis, &c. adsumentis atque ad partes illas delatis: an vero ex singulari humorum putredine oriantur, eruditoribus dijudicandum relinquo; uti enim ovula insectorum ejusmodi, præcipue minima cum sint, in remotam illam corporis partem cum massa sanguinea deferri posse, nemo dubitabit: ita tamen argumenta, quæ generationem absque seminio isto arguunt, & à Franc. Redi in libello de insect. proferuntur, quæ ratione omnimode enervari queant, non perspicio. L. Schrock, L. F.

Vena Sectio spontanea & naturalis.

Helmontius sanguinis evacuationes acerbissime infectatur propemodum omnes. Rationem inter alias adducit hanc: ejusmodi remedii genus à natura nunquam intendi, nec approbati divinitus, sed potius improbari per legem Moisaicam Gen. 9. v. 6.

Ut hoc ridiculum, ita illud experientia contrarium. Opponuntur hæmorrhagiæ criticæ narium, fluxus hæmorrhoidales, ut multis Hypochondriacis consueti, ita maxime proficui; nec non & aliarum venarum diarrheses spontaneæ, quæ satis probant naturam nonnunquam intendere sanguinis imminutionem.

Venam Malleoli in femina cruribus varicosis onerata vidi sponte apertam cum tanto sanguinis profluvio, ut adhibenda esset manus chirurgica.

Matronam novi affinitate mihi junctam, quæ Cephalalgia urgente aliquoties venarum sublingualium sectione quæsiit lenimen. Hæc aliquando sub furente Sirio faciens iter, dolore capitis ob æstum correpta est recidivo. Domum reversa sub cibi masticatione sublingualem sensit apertam, quæ pro more fluens, feliciter mitigavit dolorem. L. Sigismundus Grassii.

Hæmorrhagia cohibita sanguine in Araneum vivum derivato.

Vir quidam militaris, qui adjutant dicitur hæmorrhagia narium contumacissima laborans,

cum omne à Chirurgo adhibuit, hunc fluxum non susteret, cuiusdam Colonelli uxor hoc dedit consilium, vivam araneam caperent, atq; in eam vivam cruorem derivarent, huic consilio cum obedirent, statim hic fluxus sanguinis desit, non sine adstantium admiratione: & hac observatione medicina transplantatoria stabilitur: contigit id hoc anno 1674. die Septembr. Buxtehudz. D. Hamemannii.

Hæmorrhagia feliciter curata.

Quantum periculi munimeat sanguinem, ceu unicum vitæ thesaurum, & quacumq; corporis parte nimis copiose effluentibus, non est loci hujus longa verborum serie diducere. Quid vero in tam veloci & dubio casu extremum metuenti vale, auxilii super sit, norunt illi, qui præcipitem talem ausi sunt sufflaminare fluxum, quamvis irritato sæpius ausu. Decubuit ad bimellicæ temporis spatium quidam e mercatoribus nostris, nomine Auschicker, continua quidem, sed non vehementi narium hæmorrhagia laborans: Hic sedula licet cura à suo tractatu medico, opem tamen nullam sentit. Accitus & ego, aequiori sanguine, nec non totius corporis habitu conspiciente scorbuticum judicavi patientem. De qua re inquit corpus hujus medicus, varia quidem huicq; sinu accommodata usurpavit remedia, nil tamen effectum. Tandem visus syrupi scelotyrhici nostri dispensatorii, cum aq. Scolopendr. capill. vener. & lupuli, ad mentem Sal. Alberti, de Scorb. §. 233. ana dissoluti, intra biduum fluxus ille remisit.

Alius, Antonius Gtoz, nimis largo tantum non occubuit sanguinis per nares fluxu. Huic cum, præterquam quod in frigidior cubiculo moraretur, etiam nucham aqua e fonte allata liberius perfunderent domestici non attendentes pervorum inibi principium, ob actuale frigus extremo objectum iri discrimini, sperniolam quoque propinarent, extrema absurdo ausu ligarent, venam secarent, naribus utrinque turundis ex fungis obturatis, & nullo non ad eripiendum è faucibus orci decumbentem tentato remedio; nihil tamen auxilii allatum est, nisi quod maximam interea cruoris per guttur ad Oesophagum delapsi partem deglutit æger, adeo ut non saltem sanguinem vomeret, sed & nigræ dejectiones sequerentur, quæ plerisq; hepar vel lienem diffuxisse, (*die Leber oder Milz sen ihm Zersahren*) opinionem induxit Medicis Anatomia penitus ignaris, quicquid ignarum asserit vulgus, ignorante suo consensu comprobare festinantibus. In tanta rerum perturbatione, cum ubertatem sanguinis per sreatum excerni animadverteterem, ex capite hanc judicavi cataraetam delabi, & injecto per siphonem in ambas nares decocto aliquo astringente, venularum laxitatem coarctavi, unde ocyus fluxus fuit restinctus ac liber annum bene se habuit æger. Nimia ista frigidioris in nucham aspersio, quod metuebam, & futurum ominabar, (plethoricus autem fuit) paralytin dextri lateris sequenti anno adduxit, & redeunte, elapsis aliquot mensibus, eodem in sinistra regione consimili affectu occubuit. Decoctum in nares immisum.

℞. Rad. Symphyti, Bistortæ. Filipendulæ, tormentill. ana ʒss. Fol. acetos. Scordii. Beton. Saniculæ, ana mss. Con ar. Hyperic. mj. Raf. Santal. rubr. ʒj. Fl. Ros. siniss. mj. F. decoctio in ʒss.

l. q. aq. cornu. ad ʒvj. votæ, edde ol. ovorum
 ʒß. Ms. *In die Nasen zu sprützen. Joh. Georg.
 Volcameri.*

Annotatio ad Caput præcedens.

De conibenda Hæmorrhagia.

Ad hanc historiam Ipsemet Exc. Dn. D. Joh. Georg. Volcamerus Noriberg. Reip. Esculapius in adjunctis Litteris sequentem subiungit notam: hæmorrhagiæ curatæ exempla aduocare animus fuit, quod scorbuticis frequenter contingat, quibus topica non conducunt. Mentio insimul facta in anno primo rar. obs. f. 89. 90. curatæ feliciter narium hæmorrhagiæ beneficio pulv. Excell. Hertodis inere & alii consiliorum authores celeberrimi, qui longa & rationum & experientiarum teste curationem hæmorrhagiæ narium fuere polliciti, cum brevissimam eam censuerint methodum, quæ in adstringenda vel obturanda vena laxiore occupatur. Multi pedibus manibusq; frigida immisis velox experti fuere auxilium, tenuiore & calidior sanguine in extremis contenperato & incrassato. Certius vero subsidium non vidi, nisi injectionem decocti adstringentis per siphonem in narium calidiuscule usurpatam, cujus etiam beneficio non saltem largiorem fluxum uteri cohibui, sed etiam sterilibus plerisque fecunditatem restitui.

Hæmorrhagia Difficilis sanata.

Sanguinem esse vitæ nostræ thesaurum, animæ sedem, ac spiritus vitalis vehiculum, quo diffundente omnia in corpore pereunt, & homo cadaverosus relinquitur esca vermium, quotidiana nos docet experientia. Hoc idem testari debuisset Amicus mihi sincerissimus 36. circiter annorum, plethoricus & satis robustus, qui dum paulo largiori more radiis solaribus se exposuisset, improviso hæmorrhagia utriusque naris hora secunda pomeridiana correptus, eaque non intermittente, me circa septimam vocari jubet. Sanguis qui fluebat copiosus erat, cum saltu rubicundissimus, testis furiosi & ab atomis solaribus irritati Archet, excitantis turgentem particularem sanguinearum fermentationem, quam subsecuta est osculorum arteriarum apertio. Hic constantibus adhuc viribus illico sanguinem, tam in dextro quam sinistro brachio partitis vicibus mittendum præcepi, non neglectis cucurbitulis tam scarificatis ipsius scapulis, quam siccis ipsis furis ad revulsionem appositis. Ad contemperandum sanguinis fervorem julap. exhibitum ex aq. plantag. burs. pallor. Syr. de ros. sic. lap. pruell. &c. Ad sanguinis fermentativi motus inhibitionem ab intra propinata mixtura ex aq. equiset. portulac. syr. corallor. lap. hæmat. & croco Mart. adstr. Ab extra vero epithema ipsi fronti & testibus applicatum ex aq. fol. quercus, sperm. ranar. acet. ros. & lapit. hæmatit. Ad constrictionem osculorum inflatus pulv. ex stercore porcino, & ad factorem discutendum distemperatus pulv. rosar. & balaustor. Ore masticata & deglutita radix cichor. flor. albo in signo virgin. collecta, ad hæmorrhagiam alias specifica. Imo ipse pulvis ranarum calcinar. & mænea cran. hum. usurpata fuerunt: ast frustranco

effectum & spe plena periculi, nisi pulverem seq. in nares insufflarem, cujus authorem nominio exc. virum D. D. Matth. Francii Hertod. Inclyt. Stat. Marchionatus moraviæ medicum dignissimum, qui primus eundem communicavit & Tartaro-Maligi meo Moraviæ. cap. 4. p. 27. inferendum tradidit.

℥. Alumin. crud. q. pl. adde Laccæpictorum, Germ. *Rugel-Lack*, q. l. ad pulv. incarnato colore saturandum. Hoc pulvere sapius repetito, hunc ægrum ut & alios plurimos (nisi hæmorrhagia ab erosione valvulæ tertii sinus cerebri contigisset) ab orci faucibus, Deo benedicente, liberavi. Hujus quoque pulveris admirandas & eximias virtutes sat dilaudare nequit civis quidam Brunensis Ephippiarius, qui dum dentem per Chirurgum sibi & evelli curaret, & subjacentia vasa læderet, subsequente hæmorrhagia copiosissima, & vix non lethali, nullo medicamento licet efficacissimo quam hocce solo pulvere curari potuit. Plures hujus pulveris observationes, ubi etiam ad ferrum candens erat descendendum, adducere possem, ni tempus inaniter tererem, & B. L. tædio afficerem. Merito itaque sit Benedictus Deus, ex cujus in exalta nuntientia hocce nobis innotuit medicamentum. *Joh. Ferd. Hertodi.*

Hæmorrhagia narium critica.

Idem post biennium in febrem incedit, supervenit hæmorrhagia narium immodica, fluxit sanguis indefinenter, adeo ut æger ad summam virium debilitatem & mortis periculum deveniret, vocor in consilium, genitalibus epithema, interne corroborans & astringens præscribo; sistitur mox fluxus hic sanguinis.

Scholion. hæmorrhagia fuit critica & febrim procul dubio solvit, cum vero natura in excretionis quantitate exorbitaret, illam inter limites retrahere necessum erat. Genitalibus refrigerantia applicavit, ideo quod morbi prægressi memor, seminis retentionem & fervorem haud parum ad fervorem sanguini conciliandum facere putaret. Civis fuit Bregæ, qui à retentione seminis fatuus erat, durante viduitate, uxorem natus statim ad mentem saniozem redibat. *Danielis Wincleri.*

Hæmorrhagia Scorbutica Spiritu Vitrioli curata.

Inter alia symptomata, quæ ab effectu Hypochondriaco & scorbutico ceu ex equo Trojano producantur, non minimum est hæmorrhagia narium crebrior. Utut enim frequentius lutosus & seculentus sanguis, ut communiter habetur, ipsis per hæmorrhoides potius exsolvatur, nihilominus ut volatilis sæpe & serosior ipsorum est cruor, ita non raro affectat viam, & exitum per nares quarit, ea interdum copia, ut ægrorum vires maxime inde vacillent, & corpus jamdum cachecticum pleno passu ad hydropicam dispositionem ruat. Contingit hæc hæmorrhagia, ut alia immoderata sanguinis effluvia, præcipue duabus de causis in scorbuticis, primum ob enormes & ingentes viscum, hepatis potissimum & lienic, obstructions, quorum anfractus & mæandros cum

libere.

libere perturbare non possit sanguis, angustatus quali, qua data porta ruit, & in tali calu tantum abest ut ulla profint adstringentia, ut potius summe noceant, cardialgias, anxietates & dolores variarum partium excitantia; contra ea obstructions referantia, aperientia & calida fecilius longe exantibus sanguinis impetum retineant. Quo nomine præter alia omnium optime se gerunt Mercuria. Deinde fibræ debilitatæ & tonus partium nimis laxatus symptomati huic ampla alternant viam. Cum enim plurimo abundent sero salio, acri scorbutici & hypochondriaci, a sale hoc stimulaute oscula valorum laxantur & referantur, unde proditurus tunc sanguis titillationem quandam seu prodromum certum adventus sui excitat. Quod si postea aliquoties iterata hac insolita via dehiscant hæc repagula, quippe debilitata, sustinere cruorem renunt & frequens illius profluvium certo contingit. Scorbuticus vir 35. annorum, cum autumno 1669. tumore & maculis lichenosis pedum dolore hypochondriorum, capitis, articulorum, æstu vago seu *phlogistone* aliisque symptomatibus scorbuticis afflictus per aliquot septimanas esset, tandem & insigni hæmorrhagia narium corripiebatur, quæ frequentius redeundo vires admodum frangebatur. Adhibebantur interne & externe laudatæ aliasque probatissima Med. amen-ta, ana collemata, frontalia. Styptica ex Marte præsertim parata, ipsaque opiata, sed omnia frustra. Tantum abest ut ul' unsecutum fuerit commodum quod præsertim ab aperientibus prius adhibitis variis, quam hoc symptoma emigeret, sperari potuisset, ut potius alvus inde obstrueretur, malo interim non ablato, nova nimia mala. Ut igitur serum sanguinis nimis fluidum & acre temperaretur, ejusdemque & reliquo sanguine *Alexiphorice* impediretur, propinavi spirit. nitr. cum essentia violarum pro aciditate moderanda mixtum. Dictum, factum, hactenus per duos & amplius annos perfecte malum emanit. Alii bini hypochondriaci, cum alter singulo mane, cum *diapnoctis* humorum ex ventriculo, alter vale hæmorrhagiam narium pateretur, ab eodem Medicamento auxilium sensere. In quartana vero, ad hydropem inclinante duplici, conjuncta narium hæmorrhagia, novis indies Paroxysmis ebulliente sanguine, non ita feliciter adhibitum medicamen, nihilominus sensim & sensim fluxus cruentus narium destitit. Adeo laus hæc debetur acidis, quod & sanguinem coagulent nimis fluidum & attenuent grumescens quod de posteriori alias plura. *Georg. Wolsf. Wedelii.*

Hæmorrhagia Nyctalopiam subsequens.

Josephus Veronelli Italus Parmensis, Affinis meus, in ædibus meis a decennio jam commorans, dum annum ætatis ageret 21. optimaque alias frueretur valetudine, hoc sibi semel in vita contigisse narrat: Uno integro Mense lunari occidente sole notabiliter visu privabatur, etiam lumen candelæ intensissimum adesset, oriente denuo sole visum integre recuperabat: finito illo Mense tota illa affectio cessavit. Quæsitum est ab adstantibus de Mense, Refertur Lunam Martii fuisse; ab illo tempore nusquam illi quid simile contigit, cum tamen 15. anni sine elapsi. Hæc tamen subsequutum est, frequens & copio-

sa narium hæmorrhagia, ut quandoque ex sanguis dici mereatur, neque ullis remediis sisti potest, postquam incipit, quam frequentes iterationes præcedere solent. Nuper dum spatio 6. septimanarum continue sanguinasset, ita ut non amplius sanguis sed liquor sublavescens aquosus gullasset, præque virium debilitate de eodem conclamatum esset, usus lactis caprini & Sal Corallorum agrum restituerunt. *Jacobi Dobrzensky.*

De Aqua Styptica.

Hamburgi à Cl. Viro D. *Michaelis Kirstenio* nostri amantissimo accepi, missa ene Florentia à Fr. Redi ad Fogelium varia experimenta ad Aqua Styptica facta: præterea observatum interdum aqua communi vulnera arteriarum sanata, de quibus perlitteras idem *Kirstenius* ponnac est amice consulendus. Alioquin nuper Hamburgi egregie, ut accepi, probata est aqua Styptica in Nobilissimo quodam viro, cui sub brachio sinistro arteria gladio transixa interitum profluvio sanguinis minitabatur. Mihi etiam illi relatum est cochlear unum eius liquoris ipsi a Medico Hamburgensi propinatum.

A laudato *Kirstenio* exinde rem uberius expositam 7. Augusti, accepit n. u. Gaspar Bartholinus, & exercitationi septimæ Miscellan. Leiden 1675. editæ intervit, unde huc transferam quæ compendio adducunt. Exhibitum est vasculum, plenum aqua clara limpidâ, quæ libet omnem sanguinem ex quocunque loco profluentem, nullo modo subito & certo ut nulla opus sit fascia: sufficiat tantum madefacere, aut imponere gossypium aut pulvillum ex panino lineo, aqua madet. cum.

Et relatum est etiam ita canem sanatum, cui vena jugularis cum arteria fuit præcisa, & duos vitulos, quorum uni crura abscisa, atque n. u. lierem, cui manna resecta, denique viros duos, quibus crura amputata.

Franciscus Redi, jun. M. Ducis experimenta fecit, quæ tamen expectationi non respondebant. Anno 1673. d. 10. m. Julii & seqq.

Ovi detecta est vena, cum arteria, jugularis, sive læsione musculorum aut nervorum, deinde arteria cum vena plane dissecta per transversum, & statim adplicatum gossypium, madefactum liquore, & superimpositus pulvillus manibus firmiter tenerentur & apprimuntur loco lauciato, nullo modo sisti potuerit, ovisque sit mortua intra quadrantem horæ.

Idem evenit cani, cui præcisa erat arteria jugularis, sine læsione venæ.

d. XI. Julii. Rursus arteria jugularis detecta & separata est in ove, eaque phlebotomo secta per longum, eo modo quo aperiuntur à quibusdam venæ. Non permittum est exire sanguini, quoniam arteria digitis compressa tenebatur. Statimque applicatum gossypium, & pulvillus liquore malidus, per quadrantem horæ. Nihil exiit sanguinis. Hinc ligatum est vulnus fasciis, ovisque demissa. Verum post alterum horæ quadrantem, cum violento cursu ovis fatigata esset, & in sepem incidisset, fascia à collo decidit, & sanguinis copia profluxit, ut mortua sit.

d. eod. Iterum ovi jugularis arteria, & alii vena

vena eo modo aperta est obligataque ut antea. Nihil sanguinis exiit, dimissæ oves ad pascendum ita durarunt spatio hor. 41. Post id tempus vulnus arteriæ incisæ detectum est, & subito erumpente sanguine animal mortuum est idem alteri, cui vena secta, evenit. Conspicuumque est venam nullo modo consolidatam.

d. XV. Julii. Tres oves captæ, quibus arteriæ jugulares detectæ. Unius arteria dissecta per transversum, digitis comprehensa, ut nihil sanguinis emanaret. Aqua vulnus rigatum & digitis constrictum, per 10. minuta temporis. Retractis digitis statim sanguis exiit. Reditum est ad madefactionem & compressionem eam per 10. minuta alia, retractisque digitis similiter secuta hæmorrhagia. Ergo rursus irrigato vulnere & superimposito pulvillo, manu compressum est spatio 20. minutorum. Quo tempore cum exiissent sanguinis uncie quinque vel sex, tandem ille constitit. Obligataque plaga, onis dimissa statim cœpit comedere. Eodem plane modo tractata est altera, eventu quoque eodem, nisi quod loco aquæ stipticæ accepta sit aqua fontana pura, & octo vel decem uncie sanguinis exierint antequam sisteretur. Tertiæ ovi arteria dissecta est non per transversum, sed per longum, imposito pulvillo madente aqua stiptica, & detento firmiter per min. 20. Nihil fere sanguinis exiit. Obligata plaga in prætium missa est, in quod etiam priores duæ. Omnes hæ tres recte se habuerunt d. 15. Julii, quo in iis periculum factum, ut & seq. 16. sed circa huius vesperam primæ caput intumescere cœpit, crevitque tumor usque ad d. 19. mane, quando mortua est. Alteri caput similiter tumere cœpit d. 17. & d. 20. mane, illa quoque mortua est. Tertiæ ovis se semper bene habuit octo diebus, & tam fascia dempta est. Arteria consolidata inveniebatur, multa carne generata. Vulnere impositis pulvillus ex linteo secco & rursus fascia constrictum. Post d. 10. deprehendebatur vulnus plane consolidatum cicatrice induratum.

d. XVII. Julii. Secta est in ove arteria cruralis, & eadem aqua stiptica adhibita: sed post triduum mortua est reperta.

Eodem die in alia ove arteria jugularis per longum est aperta, & aqua stiptica adhibita sine ulla sanguinis effusione. Plaga fasciis constricta per continuos d. 8. detenta est, ut ne tangeretur quidem. Quibus elapsis inspectum vulnus est: optimeque habere se deprehensum, ut in aliis d. 10. sit prorsus consolidatum.

d. XVIII. Jul. Secta est arteria cruralis in ove & eodem modo ipsi medicina facta. Reperta est mortua post triduum.

Eodem d. in alia ove aperta est secundum longitudinem arteria jugularis & aqua adhibita eodem modo, ut nihil sanguinis effunderetur. Vulnus obligatum servatum est per octiduum, ut ne attingeretur quidem. Elapso eo se habuit, & intra X. dies prorsus convaleuit.

d. XIX. Julii. Arteria jugularis per longum aperta in duobus hoedis. Abhibita est pro medicina aqua fontana, & nihil fere sanguinis exiit. Unus mortuus est intra quinque dies. Alter perfecte curabatur d. XV. absque fasciis, quibus vulnus obligaretur.

d. XX. Julii. In ove arteria jugularis secun-

dum longitudinem incisa & vulnere satis longo in alia eadem aperta angusto foramine. Priori adhibebatur pulvillus madens albumine ovi, & nihil sanguinis emisit; alteri pulvillus madens aqua fontana. Utraque penitus convaleuit sine fasciarum solutione aut mundificatione vulneris.

d. XXI. Julii. Arteria jugularis in duobus agnis secundum longitudinem secta. Statim pulvillus super impositus ex gossypio imbutus aqua fontana, & appressus manibus per 10. min. hor. Nihil fere exiit sanguinis. Intra d. 18. deprehensum est vulnus perfecte consolidata sine ulla alia providentia. Non vero hi agnitarum, sed omnes oves prædictæ, sub dio relictæ sunt dies noctesque sine ulla custodia.

d. XXII. Aug. Truncatæ ala dextra in duobus caponibus, in medio ossis superioris, obligatumque vulnus gossypio imbutum aqua putreali, & evaserunt.

Similiter ii evaserunt pulli gallinæci in quibus omnibus truncata alarum una, quorum sex Medicina facta, adplicito gossypio aqua communi madente: sed aliis appositum gossypium siccum, sex reliquis nihil adhibicum, Naturæ providentiæ relictis. *Caspar. Bartholini Thesaurus Filiæ.*

Aqua Stiptica ex quibus conficit.

Cum de aqua stiptica nuper incidisset sermo in pharmacopolio Johannis Gottfridi Becker, ipse, quia est rerum Chymicarum sagacitate, non dubitavit similem aliam aquam sanguini sistendo appropriatam posse componi, quod alios quoque attentius accepimus. An vero paria cum aqua illa, quam Philippus Hacquart Hispaniæ jam componit, & usibus mortalium destinat, facere possit, non ausim dicere. Quamquam enim sapor eandem indicet, potest tamen latere alia simplicis alicujus virtus, quam ignorant qui vera descriptione carent, quæ jam clementia Augustissimi Regis nostri Chirurgi dexterrimo Hacquardio innotuit, cujus etiam aquæ efficaciam experti sumus non semel, & omnibus quantum possumus commendamus: suspicatur vero Beckerus noster ad huius imitationem posse componi aquam stypticam aliam, de qua, uti & de Vitriolo ipse ad acta nostra hanc dissertationem misit, quam ex mente illius hic subjungam:

Aliquam partem aquæ stypticæ Gallicanæ hæc sum, eamque diligenti examine deprehendi constare ex vitriolo & alumine, quamquam hic commune vitriolum, non intelligam, sed ex Metallico vitriolo. Licet commune vitriolum, quod vel nativum vel ex terra extrahitur, etiam ex metallis accidenteliter exsurgat, nam si nullum metallum in terræ visceribus reperiretur, nunquam vitriolum exinde produceretur. Sane cogitavi hic locum habere Juris Consultorum axioma: quo quidque modo ligatum est, eo dissolvitur. Quod axioma ad Chymiam Hermeticam applicari potest, & ab alio hoc modo translatum est, sed alio sensu, quippe ille de vera solutione aut illi loco cum illius homogeneo primo cuncte sive vero solvente explicandum judicat; scilicet, aurum debere radicaliter reserari, ut nova regeneratio & plus quam perfectio

perfectio producat, ita ut imperfecta metalla etiam tingat, & in istam formam commutet. Ego vero hoc modo applicabo, quo commodissime potest explicari: quodocunque quis se læserit, sive vulneraverit, quod solo fere ferro sive ferreis instrumentis ordinariis; (quanquam etiam vitro aliisque rebus vulnerari possumus, sed ratione vulneris inflicti res eadem est) cum optime curabitur eadem materia. Aquæ stypticæ id concedo, plus tum valere, quando in forma liquida adhibetur, quia facilius datur illi ingressus quam formæ emplastri aut unguenti in vulneribus, sympatheticum tale emplastrum ante plures annos confeci. At unguenta & emplastra, quæ plerumque ex oleo & cera conficiuntur, prohibent accessum, ut omnes vulneris partes attingi nequeant, & quanquam unguenta mollia omnes particulas attingant, non potest tamen materia ex Marte & alumine ita composita, quia aquosa, propter pinguedinem aggredi illas. Hinc, ut dixi, aquæ formam præfero, ita tamen ut vulnera bene claudantur, ne accedant impuritates. Ego meam aquam ita confeci. Recepi partem Limaturæ Martis, additis spiritus vitrioli rectificati tribus partibus. Blando calore quia per se calefit, imposui donec corpus dissolutum & spiritus coagulatus esset. Deinde tantum phlegmatis vitrioli (quod nihil aliud est, quam aqua communis, nisi spiritus aliquis in prima distillatione una ascenderit) additum ut bene solvi potuerit, & phlegmari. Mox alumen crudum in sufficienti, pro lubitu, aquæ destillatæ pluvialis quantitate solvi, ne aquam Gallicanæ acrimonia superaret, utramque aquas simul miscui, & per duos dies ita reliqui mistam, ut subsideret. Quanquam antea fuerit filtrata, tamen aliquæ faces remanserunt, per subsidentiā separandæ, quæ nihil aliud sunt quam Sulphur vitrioli. Causa, cur sanguinem sistat & sanat sine eschara, mira non est, quia simile metallum dissolutum majoris longe est efficaciz, quam si alio modo destruitur, quando solum aceto, quo non bene omnia dissolvuntur, vel etiam sulphure destruitur, qui spiritus in labore evaporat, & ita Mars sicut caput mortuum seu scoriz remanet, quod ulteriorem nullum vel certe exiguum ingressum habet, quia periit ipsi spiritus, qui ipsum dissolvere debebat.

Existimo etiam aquam istiusmodi vitriolatam solum sufficere sanguini sistendo & curando, sed quia alumen priori aquæ admixtum in examine deprehendi, etiam illud addidi, alioquin aqua vitriolata dulci foret sapore, & a priori differenti. Quia memoriæ meæ jam occurrit natabo quid nuper mihi eveniret. D. D. Simon Pauli senior noster medicus, præteritis diebus ad me revisens, alloquoque secum vitro aquæ flavæ, quod à Matrona quadam primæ notæ acceperat, quæsit, anne constare possit qualis sit aqua & ex qua materia composita? Ego quamprimum guttu explorassem, statim divinare potui in his diu exercitatus quid illi subesset, inde duplici processu instituto, inveni primam aquam purpureo rubram eodem pene sapore, quam credo eandem habere virtutem, sed quia faces per distillationem separatæ non sunt, colorem flavum accipere non potuit aqua, verum purpureo rubentem. Hinc mecum ratiocinari cœpi: si eo modo aquam siveris non credent illi, qui ea usuri sunt, eandem esse. Igitur secundam operatio-

nem tentavi, & ita destillatam aquam observari eodem sapore præditam & colore, adeoque eadem virtute. His finitis ex conditio reverfus D. D. Simon Pauli visum quomodo successerit operatio mea qui gustata utraque aqua, meam prorsus eandem esse iudicavit, ideoque eandem quoque virium: idcirco utrumque vitrum secum tulit exploraturus eventus veritatem, de quo nullus dubito. Est vero aqua cosmetica ad faciei rubedinem tollendam, cutemque levigandam, composita ex fixo & volatili sale unius subjecti. Igitur nisi similem hanc aquam cum altera mihi ellata effecissem, non habita fuisset pro eadem vel ejusdem virtutis, quanquam nescius non sim, ipsum authorem hujus aquæ ignorare sale mixtura & volatilem ex uno corpore esse. Quia vero hominem non novi; nec Chemiæ peritum credo, hæc relinquo: Sunt enim qui quidem componunt aliquid, idque recte, sed quia fundamenta rerum ignorant, sint licet periti, ulterius non inquirunt: Non facio cum illis, nec ita ego acquiesco.

De Liquore Styptico Experimenta.

Percrebuit hujus aquæ fama inter Gallos Anglosque naturæ curiosos, autore & inventore Gallo Da. Vivient Colonello, & variis experimentis in Angliâ confirmata fuit eo successu ut secretum hoc 3000. Imperialibus in usum classis suæ comparaverit Seren. Magnæ Britanniæ Rex, Hafniam nuper idem secretum adduxit Dn. Boudet, de quo hoc Progrâma in vulgus diueminavit.

La véritable & infaillible Essence Styptique, pour arrêter le sang, dans toutes les Playes en un moment.

On doit convenir de bonne foy, que tous les siècles passés ont ignoré la nature & les qualités merveilleuses de notre Essence Styptique; & que jamais on n'a trouvé un remède infaillible, prompt & sans crainte de retour, qui arrêta le sang sortant de toutes sortes de vaisseaux, grands & petits, Artères & Veines ouvertes, piquées, déchirées ou entièrement coupées; comme le fait cette liqueur, le bonheur & le prodige de notre siècle, le trésor abrégé de la vie & de la santé publique: Elle a une qualité très-particulière pour le seignement du nez pour le flux des hémorroides immodéré, & pour le dérèglement des ordinaires des filles ou femmes. Dans les playes on ne sauroit trouver un plus excellent remède; son effet se fait tout sur l'heure, & presque en un moment. Elle ne se corrompt jamais, & ceux qui la savent à fonds & d'original, la boivent comme de l'eau commune, en font l'essay sur leurs personnes; & que les Copistes ou Contrefaiseurs de cette eau n'oseroient jamais entreprendre.

La manière de se servir de cette Essence, est de tremper un tampon de linge dedans, & l'appliquer sur la playe avec une compresse par dessus, trempée dans ladite liqueur; tenant les doigts par dessus.

Ladite Essence se fait par le Sr. Boudet, & on la vend avec permission des Supérieurs.

Ut ab omnibus legatur, cruditorum lingua faciet. Hic igitur verborum Gallicorum senius est.

Vera & infacillibilis Essentia Styptica ad sistendum sanguinem momento temporis in omnibus vulneribus.

Bona fide fatendum est, omnibus seculis præteritis ignoratam esse naturam & miraculosas qualitates Essentiæ nostræ Stypticæ, nec unquam juvenum esse remedium infaillibile, promptum & sine recidivæ metu quod sistat sanguinem ex euntem ex variis vasibus magnis parvisque, Arteriis &

venis

Venis apertis, incis, ruptis aut prorsus discissis, neut liquor hic facit felicitas & prodigium nostri & uli, thesaurus compendiosus vitæ & salutatis publicæ. Habet singularem qualitatem id ærium hæmorrhagiam, ad fluxum hæmorrhoidum immoderatum, & ad inordinatos menses puellarum & mulierum. Ad vulnera excellentius inveniri non potest remedium. Ipso quasi momento effectum suum proditi. Nunquam corrumpitur, & qui principia ejus & originem norunt, bibunt aquæ militæ communis, in seipso periculum facientes, id quod nunquam ausiat tentare qui ad imitationem hujus limulem aquam præparare præsumunt.

Modus utendi hic est, ut linea petiæ eò liquore imbuta applicetur vulnere, super imposito comprimente eadem liquore tincto, digitisque impositis.

Laudatam Essentiam conficit Dn. Boudet, venditque cum superiorum licentia.

Quamquam efficaciam Essentiæ suæ passim probatam à se fuisse affirmaret Boudet, veritatem tamen ejus experimenti ad oculum nobis quoque Hafniæ probare voluit. Igitur ab Illustrissimo Legato Gallico Dn. Terlon Equite invitati complures Medici convenimus cum aliis Magnis parvisque spectatoribus curiosis, certissimi experimenti testes. Cani majori tenor amputatur ferra, mox petiæ in suam liquore styptico imbutam applicat Boudet, & manu imposita vulnus velut velamine comprimente stringit. Nihil amplius cruor manare visus, nec ulla convulsionum indicia apparebant. Post mediam horam remota manu comprimente & petiæ, sine eschara vulnus nullo sanguine protuberante, consolidatum, arteriis quamquam sub membrana tennerrima pulsantibus. Ut porro vulnus crudum curaretur, repetita petiæ vinculisque, & ligaturis injectis, canis in lecto stramineo quieti repositus, sed pede uno mutilus; laudantibus spectatoribus medicamentis aliis ingentis insolitam virtutem. Ex vitriolo confectam esse aquam, gustu divinare potuimus, sed singulari modo præparato, quia sine vomitu bibitur. Narrat ipse Boudet ex semis ingredientibus compositam, & ex illis unum esse venenum, ita tamen attenuatum ut nocere non possit. Credendum illi sine tectibus loquenti, quamquam rectius conscientia consideret & publicæ utilitati, si sine questu arcanum hoc propalaret; quod aliquando facturum non dubitamus si Magnarum indulgentiam fuerit expertus. Jam enim in Angliâ Serenissimo Britannicæ Magnæ Monarchiæ revelatum esse secretum, & ab aliis quoque Medicis in Regiâ Societate Londinensi experimentum factum nobis narravit Illustris Legatus Anglicus, Hafniæ residens, Dn. Thomas Heushav, Vir civilis prudentiæ & rerum Naturalium peritissimus, ut ceteras animi dotes quibus fulget, præteream.

De liquore isto astringente dubia non pauca occurrunt, quorum solutio facilior foret si arcanum non esset. An Chirurgorum nostrorum pharmaca sanguinem supprimentia ex aceto, ovi albumine, vitello, pulveribusque astringentibus, quibus magnas hæmorrhagias in amputatione artuum, mammarum &c. repressas vidimus non semel, paria facere possint, expendendum illis qui ignota in usum trahere dubitant. In eo tamen nota remedia liquor hic post se re-

linquit, quod citius vim suam exserat. Vix enim ante tertium diem vulgata aëræ aquæ removen- tur a vulnere, cum liquor iste secretus non quidem momento sed post semihorulæ moram vasa astringat & membranula obducatur sine eschara. Deinde magicam artem subesse, affirmare non audeamus. Cardano si credimus, si ter super vulnus recitentur hæc verba, statim omnis sanguinis eruptio compescitur:

Sanguis mane in te, sicut Christus fecit in se.

Sanguis mane in tua vena, sicut Christus in sua pena.

Sanguis mane fixus sicut Christus cum suis crucifixus.

Nomen Christi morborum esse terrificum mentum non ignoramus, sed an bona Dei venia hat, quod nomine sancto ad hæc abutimur, merito ambigimus. Novi amicum, qui ter repetito nomine Jesu, hæmorrhagiam suam quasi miraculo supprelsit, sine ulla alia, ut latebatur, superstiti- tione, oppositi oraculum: Non times non en dei in vanum. Reposuit, vanam non esse sanitatem. Respondi cum Theologis, solos illos recte usurpare nomen Dei, qui illud eo tunc usurpant, quo ipse Deus illud usurpanti mandavit. Ille vero quotidiana preces urgebat, quibus nos ab omni malo, etiam corporali, munimus, nomine Dei. Sed quod scilicet illi tractamulum regent qui ignotis verbis hæmorrhagiam sistunt? Ex Schedis Rnodii, olim Prævoti secretum accepi ab illo quidem, non me, probatum. Si re quæcunque inventa inscribas parti viciniori unde fluxu manat, in Viri Ophilon, in mulieribus Ophila, hæmorrhagiam cujuscunque partis sedari. Quicquid de his sit, pro magica curatione non pauci traduxerunt unguentum amarium, & pulverem sympatheticum, quo & vulnera curantur feliciter, & sanguis supprimitur; cum per naturam, quamvis nobis occultam, succedat quotidie operatio sperata. Hujus pulveris sympathetici virtus jam tot experimentis confirmata à vitriolo dependet, quod primas tenere partes in liquore hoc styptico, nulli dubitamus, quamquam de veneno aliquo, alii que ingredientibus, hebulæ quædam oculis nostris obiciantur. Illud sapore quasi foetæ suo indicio se prodit: Mera solutio vel coctio vitrioli videtur. Difficultas augetur unica, quod innoxie assumi dicatur. Et hic totum artificium later, ut vitriolo emetica vis adimatur. Quod ubi successerit, in sanguinis vomitu colubendo præclarum remedium inventum est.

Aliud experimentum ejusdem aquæ stypticæ Boudet postea factum est in Arce Regiâ, me in prædio meo absente, de quo ita ad me perscripsit conjunctissimus Amicus & Collega, D. Henricus de Moirichen.

Præsentē Serenissima Regiâ Majestātē feliciter heri successit experimentum aquæ stypticæ in cane molosso, cui post acce cum Urso cert. men postquam à motu & ira satis edervescere sanguinem constaret, circa horam decimam arteria carotis sinistra transversim dissecta est. Sanguinem ut in arteriarum viliatibus heri solet, antum & saltatim profluentem ex voto supprelsit Aqua styptica. In ea namque tincta linamenta præcisæ arteriæ imposuit Philippus Haquardæ ac manu super compressit, ita ut nihil sanguinis amplius ex vulnere elabi visum sit, Quo autem de Experimenti veritate certius constaret, placuit post horulam vulnus deiegere, quia vero a motu lin. mentis novum sanguinem præfecit

arteria evomuit, aliis eadem aqua styptica un-
buit, unus denuo inspectum est, ac fascia super
injecta. pte deligatum est, ac can. in ad tertia u-
cunda midis a meridie reliquimus. At tu n vul-
nere detecto omnibusq; iutea mentis a notis, nu-
dam me regimine cōmpevius dictam caroti-
de n arteriam, nec g. atu. am quidem sanguinis
amplius fundente, unde & simplex can. un li-
nea fascia vulnere injecta, & canis, ne quiescen-
tem jam sanguinem. hō. u. m. uris ite. um con-
n o. eret, ligatus ad Dondinatumum æonum cul-
todem dertur, ubi & hō. u. e. ipsum vidi solutum
& comed. are. q; & quod magis, ne guttura qui-
dem sanguinis hæc nocte evulnere stulaverat nec
adhuc it. l. t. Expediunt posthac erit m. gno-
ru. n. u. dertur. uratio, qui post aptam stypticæ
hujus quæ ad motionem sanguis statim conque-
scit nec amplius è lassa vena vel Arteria fluit, &
quod palmarium, nulli ab hoc medicamento
cruita inuenerit, sed soto ruentis sanguinis im-
petu inhibito, vulnere statim prospici potest di-
gestivis ac orolid. ntibus. Et si u. terior fides
adhibenda Boudetto (à quo serenissimus Rex
noster compositionem stypticæ hujus aquæ obri-
nuit) post ejus ad motionem nullus inflamma-
tionis, g. ngræ. xæ vel convulsionis metus erit un-
de cordatiores in posterum habebimus Chirur-
gos in arteriotomiis in magnorum vulnere ac
ast. et. u. n. curationibus, in artuum & can. rosa-
rum part. urn amputationibus, quas ob certissi-
m. ingentis hæmorrhagiæ pericula (alia ut si-
leam) permulti hæcenus subterfugere Chirur-
gi. Jusu Regio propria manu aquam hinc confecit
Pia Hippus Hæquart, ejusque copiam prouisit se-
daturum ut bis n. stræ Chirurgis, ut ejus vires da-
ta occasione ipsimet experiantur, ita ut non o-
pus sit ad alia peregr. n. & conquisita & com-
posita medicamenta coniungere. *T. Bartholini.*

Aqua styptica vis quousque se porrigat.

N. t. i. l. i. m. u. s. h. o. d. i. e. l. i. q. u. o. r. i. s. i. l. l. u. s. s. t. y. p. t. i. c. i. u. s. u. s.
quem Gallus ante triennium per Europam cir-
cumtulit, ubere ob divenditum hinc inde secre-
tum in marisupii proventu. Est sane cur inventum
laudatus in vulneribus casum inflicto, sed in
putum in m. p. r. u. n. d. e. experimur utilem. Quin &
in hæ. m. o. r. r. h. a. g. i. a. n. i. u. m. cōpescenda sæpe mu-
tilem dep. en. n. li. S. i. l. i. c. e. t. q. u. o. t. i. e. s. o. r. a. v. u. l. n. e. r. i. s.
ubiqu. att. n. g. e. r. e. h. e. t. e. s. t. s. u. s. i. p. s. i. h. o. n. o. s. , c. a. t. e. r. o.
q. u. i. n. h. e. b. e. s. c. e. r. e. v. e. l. , q. u. o. d. s. e. q. u. i. t. u. r. e. x. e. m. p. l. i. u. m.
clare docuerit: Joachimus Nichel civis noster, in
duello laucius ictum gladii excepit interna bra-
chii d. xtri parte, p. ulo supra cubitum p. n. e. t. r. a. v. e. r. a. t. a. u. t. e. m. f. e. r. r. u. m. l. a. r. g. o. & p. r. o. f. u. n. d. o. v. u. l. n. e. r. e.
ad ip. m. u. que alam, h. i. s. a. q. u. o. q. u. e. q. u. e. n. a. d. m. o. d. u. m. p. o. s. t. e. a. c. o. n. s. t. i. t. u. t. , a. r. t. e. r. i. a. V. o. c. a. t. u. s. c. h. i. r. u. r. g. u. s.
familiaris G. Urtedius arte vulnus tractavit ad
undecim u. s. u. s. q. u. e. d. i. e. m. a. n. i. b. i. g. u. u. s. t. a. m. e. n. s. u. t. u. r. i.
ob ichorem tenuem & sanguinolentum quotidie
profluentem, nullo puris laudabilis indicio. Sed
ecce unde. imo die improvise tanta vis artericæ
sanguinis subito prorupit, ut æger in deliquia a-
geretur, & in metum chirurgus. Scilicet grunus
sanguinis, qui tam ante hiatum arteriæ malefido
obice clauserat, nunc demum in pus conversus
Laxerat jam nam exitu. o. cruori. Accersitus ego
tentati jam frustra aliis, quæ ratio & consuetu-
do i. n. i. m. i. l. i. c. a. s. u. s. u. g. g. e. s. s. e. r. a. n. t. ; p. r. o. p. o. n. o. a. p. e. r. t. u. r. a. m.
vulnere ad usque locum male affectæ arte-
riæ, sed renitente ægro, ventam ad aquam sty-

pticam; qua per aliquot dies subinde injecta, li-
cet bis reverterentur immensa illa sanguinis
profusiones, novissime tamen iteritus in arti-
culos omnes artis exeunte, qui una adiunt Ph.
Hæquardo, cui artificium conficiendæ aquæ il-
lius styptica Jusu Regio crediderat Gadius. Vi-
sus sibi tum defunctus periculo æger, me o. m. i. a.
aliis suspicante tum ob superventum ardentissi-
mæ febris, tum ob respirandi iter angustius. Quid
piura? succedunt spasmi, tu. n. o. r. e. s. b. r. a. c. h. i. & i. n.
manu suam dolores, decimo octavo die obiit æ-
ger, laudatur nihilominus aqua styptica, quod
egregie fecisset officium. Aperitur Julius Magistra-
tus cadaver, ut de causa mortis conslet: in rum
dictu, deprehenditur arteria adhuc quidem ape-
ta, sed via quam gladius fecerat, circa arteriam
grunus ab aqua styptica generatis obduerit
quo minus cruorem profundat. Interit post
quam arteria per vulnus obduerit nihil potest
effundere, minor tamen sui officii alio derivat
sanguine, scilicet. vicinorum musculorum inter-
stitia oppl. rat omnia, nec eo contentus liquor
proserperat ad usque medium pectoris inique
inter collas, sternum & pectoralem musculum
dextrum inventæ nobis vel tres libræ corrupti &
færentis jam sanguinis, unde asthma, felis; &
denique mors ipsa pependit. *D. Olai horrichii.*

*Circa Hæstiensem Stypticum liquorem observa-
tiones particulares.*

Accepimus Hafnia sub præcedentis anni 1678.
principium, data sic occasione per serenissi-
mi nostri Legatum Dn. Præschénck a Lindenhofen,
famigeratum illum l. Hoc quarti nunc liquorem
stypticum. Et cum de effectu, externo scilicet, sta-
tis constaret, quodque promissis, licet experien-
tes nonnunquam deseruerit, aut aqua saltem sim-
plici, albumineve (referentibus in Actus Haf-
niensibus miscellaneisque Exercitationibus Ma-
gnis illis Bartholinis,) suppletus aliquando fue-
rit, de cætero tamen ut plurimum, sub compe-
tenti adhibitione satisfecerit; proinde potius
ulteriori ing. edientium, minus adhuc tuæ se-
cundum: nunc enim proportionemque determi-
natorum perquisitioni dicare vo. um usin com-
mune postmodum collaturi, quæ un. i. t. o. r. t. e. s. p. e. c. i. a. l. i. u. s.
obvenissent de interna. vero exhibitio ne
tantisper securi non tam ob internata veneno-
sitas cujusdam traditionem, quam opiatorum
securiorumque adstringentium in ventris pecto-
risque, (quo modo laudati Dn. G. Bartholini
observatio de Hæmoptico pertinet,) affectibus
præsentiorum (præ hujuscemodi strangulato-
riis,) suff. ientiam. Nam quod quidpiam, seu co-
chlear ejus, aliquando citra notabiles intera-
neorum turbas datum foret, præterquam quod
oppido sic minueret venenositas suspicionem,
id propter inhærentis vitrioli (magis forte mar-
tialis remissiorisque) paucitatem, abundiusque
restrictionem, in robustiori forsan simul ventri-
culo, contingere potuisse conjiciebamus. Sena-
rius autem numerus in liquore adeo limpidus, ea-
que stypticorum diaphanorum, aut perspicuita-
tem mxturarum saltem postliminio non p. e. r. v. e. r. t. e. n. t. i. u. m.
paucitate. hanc parum hinc fiebat du-
biis, Pachium in memoriam revocantibus, qui
occultationis gratia longe p. u. r. a. , quam Hæ. r. a. c. i.
jus requireret olim contudisse dic. tur. Unde
perreximus in suscepta perquisitione: donec ali-
quanto post D. D. Weherum, Med. C. a. s. a. b. r. i. i. d. e.
liquor.

liquore styptico, sub Anchoræ, fauciatorum inscriptione edidisse, in Germanicarum Ephemeridum Anno octavo legeremus. Et cum eodem tempore habitæ passim super ingredientia conjecturæ indices magis simul confirmarentur, insuper etiam per semestre, Serenissimos secuti, domo abesse teneremur, sepelivimus collectas tunc observationes; usque dum ægre tandem tandem desideratum libellum nuper nancisceremur, per sanguinis naturam ac generationem, ad ejus chirurgicam quoque conservationem, (medium cum applicatione sua perspicue tradendo) ducentem. Quod si compendio factum hic retulerimus, cum liber hodieque hisce in locis sit rarior, operæ pretium videmur facituri.

Constat itaque Viri Excellentissimi liquor vitrioli Ung. aluminisque cujuslibet libra dimidia: solvuntur per ebullitionem in phlegmatis vitri. libris quatuor, remotisque in fundo concrecentibus crystallis, reliquoque filtrato, singulis ejus libris drachma una olei vitrioli permiscetur. Applicatur autem quintuplicatis splenis, probe comadefactis, & sub competente deligatione per dies aliquot, ne sanguinis (statim quidem coagulati) crulta perperam detrahatur, sic relinquitur, vulnere perfecte subitus curato. Intus autem una, si placuerit, pro facilitando effectu, exhiberi posse putat prælaudatus Author, solutionem Terre sigill. cum vitrioli, vel etiam aluminis acque vitrioli conjunctim destillatorum spiritu paratam; utpote tinctura terræ catechu, similibus longe præsentiore. Hæc ibi Vir experientissimus. Quibus & forsitan aliis nobis nondum visis, an nostras quoque super Hæmorrhæm seorsim habitas observationes nunc demum superaddere queamus, equidem diu hæsitavimus: tandem tamen nihilominus particulariorē potiorum hic circumstantiarum considerationem iis saltem, ad quos, remotioribus præcipue in districtibus, iis in specie vix vel nondum pervenit, futuram putavimus hanc plane inacceptam.

Calor proin erat diaphanus, sed aqua simplici aliquanto obtusior; præcipue si vitrum simile vitrioli cujusdam præsertim nativi, in saturata hinc aqua solitaria vel supereminens index.

Odor nec ut recentiorum vel per asservationem minus alteratarum solutionum vitriolicarum; nec tamen etiam phlegmatis vitrioli vel aluminis (vehementiori denuo calori hanc expositi,) instar: sed ut duorum triumve dierum pulvis. An ulterius rosaceis quid mistionis initio affricum fuerit, (ut occultanda odoriferorum tingentium ve pauxillo quoque obnubere solemus,) ex mortui jam, & è longinquo quasi perceptione conjecturali saltem, nunc quidem determinare nolumus.

Sapor deprehendebatur nec pure vitriolicus, (martialis aut adversior venereus;) nihilominus nec pure solum aluminosus, stypticus interea, & sub qualicumque vitriolici illius dulcoris nota, mox in austeritatem acoremque talium metallicum definens.

Pondus, ni lagenula (de meliori luto adeo fere non ficta) aliquid impropotionalius, (quod tamen vel externæ efflorescentiæ defectu tantisper non existimavimus, (absorbuerit, erat collata aqua simplici in tantum gravior, ut vitrum quinque ejus uncias capiens, dimidiam insuper

liquoris admitteret.

Quod, quibus & quantis è contentis fieret, amplius investigaturi, evaporationem primitus tentavimus, sex (pro faciliore computatione) ejus uncia in patella vitrea successive, vegetiore tanè sub finem (cum ægrivs nec sine acidi cupuldam perceptione ultima expiret humiditas,) colore exhalantes, ad eam, quæ in ejusmodi concrementis haberi potest, siccitatem. Provenieruntque inde adstringentis & (inter quasi cærulei nonnullibi aliquid) viridescens coaguli drachmæ quatuor, fere cum scrupulo dimidio.

Exliccatum è guttis, lateribus vitri fortuito ad hærentibus, talis ochrei coloris; aliud præterea albicansius, in repletioris adhuc vitri orificio interioris concretescens, (utrobique primo quidem subdulce, hinc tamen statim stypticum, demumque quasi ferrugineum,) hic tantum inter accedentia sunt: quemadmodum etiam instillati cultro tantilli liquoris concrementum; super mediocrem ignem, post brevem & tere aluminiformem ebullitionem remanens; guttanti ab initio crocum mart. saccharum; inde satis quid adstringens metallizansque referens.

Quo proin circa pondus constitutivorum essemus certiores, præcipitationem insuper adscivimus: usque hinc sex dicti liquoris uncias, instillabamus unam Alkali (ex ana nitri atque tartari invicem detonatis,) in aqua simplici dissolutam, & titratione à terrestri sua materia separatam quo scilicet per alcalium prædominium eo certius securiusque pessundarentur omnia. Exoribat sic, si consertim id fieret, ebullitio sat valida, cum fatiscens quasi aquæ regis cujusdam odore fundum verò petebat massa, pingue quidpiam, aut aluminis per dictum oleum tartari præcipitati, liquorisve filicum Cl. conglomeratum crassamentum exprimens; albicans primitus, hinc affusa copiosiori aqua, concussisque inter se omnibus, saturate, (inter tenues quosdam tunc cærulei gyros) virens; separata demum (per edulcorationem quoque accedente) humiditate, post exsiccationem pulverem relinquens crocum, ipso tamen vitrioli Martis factiti croco longe vividior, mole diffusior quam pondere, quod drachmarum duarum & scrupulorum duorum cum dimidio erat.

Collectam vero prædictam (salinas tam ipsius liquoris, quam præcipitantis quoque alcali particulas continentem) aquam postmodo lente exhalantibus, proveniebant sicci, & tartaro vitri. longe magis lixiviosi coaguli desuper spicei, de cætero ex albo virentis drachmæ novem cum dimidia; adeoque detractis alcali drachmis septem, duobusque scrupulis, (quia terrestris ejus substantia filtro separata, cum ibidem absorpti salis tantillo, facile scrupulum unum excedit;) particularum salinarum liquori styptico propriarum drachmæ duæ, scrupuli duo.

Quod autem v. g. guttis octo vel decem aquæ simplici tribus uncias instillatis, invicemque (cum istæ prius in fundo conglomerentur,) concussis, totum lætescentem colorem induerit, parum huc fortasse conferet: singularius erat; quod post semestre demum domum redeuntes, in residuis adhuc quinq., præter propter uncias invenimus ad vitri fundum expansum aliquod liberè natans, crassioribus araneorum telis involvendis simile, colore griseum: atque post idem pene

tempus, (quieto in angulo vitro aquositateque magis consumpta,) simile denuo, in superficie primo collectum, hinc sidens, scrupulorum duorum (cum conjunctim filtro separata & edulcata essent,) pondere, odore in prunisatis sulphureo; pondus residui liquoris de cætero potius, quam saporem, nostra quidem opinione, mutantia.

Atque hæc quidem tum temporis, successive notavimus. Quo vero eundem, quoad ejus fieri posset, aut æquivalentem saltem liquorem hinc erueremus, post varias ponderum ac putatorum singredientium, præcipue vitriolorum, permutaciones, sapore tandem atque pondere (tam separatorum quam conjunctorum) eo ducente, in analyticam incidebamus proportionem aluminis atque vitrioli; non præcise martialis factitii, laboriosi ac præter rem carioris, (licet eadem inde eadem ratione oriuntur producta;) vel in venalibus speciebus eo titulo, seorsim selectis; sed Goslarientis tantum alteriusve boni sat virentis. Solvabamus proin utriusque unciam dimidiam contrusum moderato calore, & (cum operosum, necessitatique tempore vix requisita quantitate suppetens vitrioli phlegma, in sulphureitate sua, alias facile dissipabili, torte nil, in exigua vero vulgaris destillationis acetonitate parum consensere videretur, (saltem in aquæ simplicis (cui tamen ferata quoque seu laborum sua substitui posset) uncis quinque; in sex enim color pene liebat dilutior, sapor remissior, pondus duobus scrupulis minus; in minore autem quantitate, præter proportionis in sapore, pondere, æque colore intensionem, tractu temporis salini, quidpiam,) quod etiam in proportionem quadrupla supra laudatus D. D. Weherus notavit,) quasi concrefcere, (& quidem magis alumini formiter,) inciperet. Filtrabamus hunc totum, quod ob vitriolum, obscurior prius, limpidus nunc prodiret liquor, sededente simul ochra impuritatique vitriolicarum, (cum aluminato quidpiam deponat,) grano uno ad alterum interdum: variant enim ista ibi exoterica. Hæc erat nostra tum unctio.

Ut autem effectus in ophatis tantisper tunc sortuito vulncribus, &c. (nam ulterius progredi nec debatur nec vacabat,) similiter quoque statim erat evidens; in hæmorrhagia natum serenissimi cuiusdam, prius inconspicibili, per siphunculam, his aquis dilutum,) injiciendo præsentatus, adito, secundum D. D. Weheri animadversionem, vitrioli spiritu, adstringentior: ita sapor quoque atque sapor, de odore enim etiam affricio dicere supervacuum foret,) cum Hæmorrhæia, (nostra quidem opinione,) apparebat idem, aut saltem vix distinguendus. Pondus eodem recidebat, & liquor in vero quinque aquæ simplicis unciarum capaci, ut intermixtas aquositate minerales particulas,) uncia dimidia ad lancem pariter exultabat gravior altera dimidia uncia, (quod pristina sex provenirent,) restitente, pro drachmis quidem tribus, in vitro mixturam istam antea contingente; pro residua drachma in filtro, ut exiguæ & satis expressæ, hæc aut nobis munus præstat.

Dum autem simplex unciarum sex coagulum, eadem methode collectum, similiter superiori in colore pondere responderet; nec separatus per alcalinam præcipitationem crocus, aut pro-

ductum postmodum salium coagulum ab illis disterre videtur; colore croci ou candicantis aluminis terræ accessum æque diluto; odore vero sub præcipitatione salium pariter nullum; aquæ cuiusdam Regiæ, ob nitrolas adhuc in alcali isto latentes particulas, urinosque in alumine tantillum, de quo alibi,) exurgentes majorem proin potius imitanti nostri illustrationem experientorum, circa vitriolum atque alumen, eorumque constitutiva, reor sim ac diversimode (per præcipitationes aliasque separationes, coagulationes, proportionales ponderationes, lentas evaporationes, &c.) habitorum collatione, indeque instituta supputatione tum quasivimus; sed tamen (quod petimus,) sub unius alteriusve grani forte latitudine, & talis, quod ajunt, (in ea constitutivorum variatione, extraneorum dispersionum facilitate, &c.) errore calculi.

Infini itaque vitrioli, (pro modulo suo sicci, nec impuritatibus externis affluenteris,) uncie dimidia, (secundum prædictorum experientorum modos atque proportionem,) terræ sat edulcatæ & siccæ drachma una, scrupuli duo cum dimidio; utpote nondum per ignem quid, (ut in coferare) paula, coque minuta. Salinarum, hæc quam concentratarum, aquosique minus (ac in vitriolicis salificationibus artificioque confectionibus,) complicatarum particularum ad minimum scrupuli duo. Aluminis porro uncie pariter dimidia, terræ saturatæ albis & molis, antequam in tragacanthinum sese quidpiam coeat, diffusissima, communiter scrupuli duo, grana quatuor salinæ substantiæ drachma una præter propter; (utroque enim, quod uni parti, proportionis sinceritatis ratione, ac metallicarum ab ocido absorptarum particulicarum variante quantitate decedit, accedit alteri.) Si terra jam, ut dicuntur utriusque,) aluminosa scilicet ac vitriolica,) invicem miscentur, produnt dentio, eodemque colore, supra notata hinc drachma, scrupulique duo cum dimidio. Sin salinæ habentur pariter idem, ejusdem saporis ac coloris quinque scrupuli. Si denique utraque conjungantur, & exurgentes hinc, præter grana quatuor, scrupuli tredecim istis aquæ simplicis quinque uncis, aquolarum (natura sibi adherentium, & ut simplex ibi phlegma constituent, ita aquæ simplicis loco pondereque venientium,) particularum medio) seu in crudorum altorum duorum ingredientium dissolutione fit,) copulentur; e dimidia earum uncia (seu scrupulis duodecim) protinus ad vitri quincuncialis superpondium, quod semuncia secundum proportionem erat, provenit; residuis granis viginti quatuor in restante liquoris styptici semuncia hærentibus, sive natantibus; uti ex adverso absolute illa lex ejus uncia facile habentur, si, (simplici solum additione,) aquæ simplicis uncie quinque, mineralium inibi gravitantium, & ex alumine vitriolique professorum scrupuli, cum granis quatuor tredecim, ac utriusque phlegmatis spontanei quali nec violento igne, etiam a salina subtilia penitus expressi) scrupuli septem, grana sexdecim, ponamus e vitrioli semuncia drachmam unam semis, ex aluminis eadem quantitate drachmam præter propter, cum sex granis, in istam

computentur, sed tantum de liquore hoc. Si interea logica conjecturaque nostræ circa ingrediennia eorumque præcipue proportio- nem non fefellerint; (verum tela si ille, quid- piam in vitro negligentius obturato, sicque per menses aliquot reposito concrefcere occi- dit;) negotiosiori saltem curiositati, (quod peramus & rogamus,) ignoscat benevolus fe- ciorque circa talia Lector. Sane licet interea, cum duo faciunt idem, non prorinus sit idem: tamen aliud, saltem aliquantum variato in- redierunt, v.g. pulveris laxativi pondere, indem nihilominus effectum in catharsi adse- cutus fuerit, peccasse propterea non creditur. De cætero de renitentissimo, inter salina coa- gula, alumine, alibi forte agemus: ut & de vitrioli vitriolorumque (etiam in chirur- gi) singulati, (cui inter recentiores qui- dem, præcipue quoque notavit in Physica sua, hæteranea Experientissimus D. Kircherus) vulgo interea minus in usum tracta, efficacia.

Dan. Ludovici

*Medicamenta Secretiora ex Spermate Rh-
narum D.D.A.C.*

Sperma ranarum (Germ. *Iroschleich*.) à Pa- racælio spermiolum, sperma aquaticum, & gli- ten aquaticum, à Cl. Encephelio in observatio- nibus mucago aquatica dictum; est illa maci- lago instar albuminis ovi, quæ ineunte vere hinc inde circa lacus, paludes & stagna inve- niunt, unde postea beneficio Solis viva anima- lia, seu ranæ, generantur quamque medici & chirurgi huius seculi in summo pretio habent.

Colligitur à pharmacopolis brevi ante no- vilunium vel in ipso novilunio, quo tempore collecta, teste Hartmanno in not. ad Crollad annos triginta durare potest, è contra ea quæ in plenilunio colligitur, facile putredinem con- cipit & maxime lætet.

Conservatur autem beneficio aluminis li- quidum sperma, in doliolo è ligno querno recentè fa- brefacto, quem modum Cl. Dn. D. Cuperellius cum D. D. Zvesero observavit in hac propor- tione, nempe ad liquoris sperm. ran. per sacc. clarificati ʒxi. adiecit aluminis ulsi ʒi. tantum, aliquando ʒii. & sic sine ulteriore destillatione in loco frigido repositum hoc sperma ranarum in virtute & effi. acia conservatur, citra peri- culum corruptionis per totum annum, ac diu- tius. Virtutes à Cl. Hartmanno in l. 2. enu- merantur.

Spermiolum siccum ordinarium D.D.A.C.

ʒi. Sperm. ranar. mense Martio & in ipso novil. coll. q. v. (Not. in nostro climate vix ante mense Aprilem sese prædit) ponatur in saccum: quæ sponte defluit Aqua interim scor- sim asservanda.

Jam ʒi. Oculorum nigrorum in sacco reli- ctorum, q. v. in patella cuprea supra ignem spatula lignea continuo novendo, donec in pulverem subtilissimum redigi queant; vel quod melius, in calore solis, vel post fornacem sponte exiccantur.

Pulvis ex oculis sperm. ranar. tali modo pa- ratus, imprægnetur sæpius cum proprio sper-

mate, superius per saccum transcolato & de- nuo exiccetur: pulvis tandem asservandus.

Alius modus.

ʒi. Sperm. ran. iusto tempore, s. e. circa novill. collecti, q. v. immittatur in cucurb. vi- tream, ac appposito alembico cæco, bene mu- nito. leni carbonum igne in cineribus digera- tur & continuo detineatur, donec omne hoc sperma prius in liquidam & postea in crassiorem substantiam abeat. Continuada digestionem ma- teria coagulatur, & sic instar pinguedinis & tan- dem totaliter exiccari incipit, ut facile in pul- verem redigi possit. Pulvis demum ita laborio- se confectus altis medicamentis admiscetur, de quibus postea & suo loco.

Ciculis absolvitur negotium, si liquor prius per destillationem abstrahatur usque ad licci- tatem; materia in fundo vitri relicta pulverie- tur, & postea irroretur sæpius, cum liquore suo recenti & sponte resoluta, atque iterum iterumque exiccetur.

*Spermiolum siccum ordinarium ex Ranis.
D. D. A. C.*

ʒi. Ranar aquaticar. in aquis puris & circa fontes mense Martio & Aprili captarum & ad- hæc viventium numero xi. vel q. v. immittan- tur cucurb. vitr. apppositoque capitello, in MB. igne lento destillatio instituat, liquor egre- gius interim ad suos usus reponendus est. De- stillatio adhuc continuanda est, donec ranæ totaliter exiccatae sint, ut facile in pulverem teri possint, qui tandem ita paratus cum pro- prio spermate (per saccum recentè transcola- to) sæpius imprægnandus & rursus exiccandus est.

Vires magnæ sunt in quacunque hæmorrha- gia & ebullientia sanguinis; datur à ʒi. ad ii. in propria aqua destillata; externe inspergi- tur vulneribus.

Spermiolum siccum compositum D.D.A.C.

ʒi. Sperm. ceti ʒiv. thuris; mastich. an. ʒii. croc. ʒß. terantur singula in pulverem; postea miscantur; & cum spermate ranar. (in sacco resoluta) irrigentur pulveres ter, qua- ter & sæpius, & dein sponte exiccantur. Quo- facto hic labor etiam toties cum spermate ju- niperino & flore coeli instituendus est, tan- dem add. camphor. ʒiii. misc. fiatque pulvis in vitro puro asservandus.

Vires sunt æquales cum spermiola Crollii; in hæmorrhagia sc. m. rium, gutturis, uteri; hæmorrhoidum, sanguinem quippe frigidita- te & virtute specifica coagulat. Dos. à ʒß. ad gr. x v.

Exterius idem pulvis inflammationes om- nes mitigat, dolores podagricos lenit, (cum vino calide applicatus) insuper omnia ulcera antiqua, inflammata, dolorifica, & cancerosa curat.

Spermiolum mucaginosum compositum.

1.

ʒi. Spermatis ranar. sponte resoluti & beneficio

Ulmænis seu nitri affervati, ʒxlviii. myrrha commun. aloes sociot. à ʒii. Mixta afferventur in lagenis vitreis bene clausis locoque frigido, pro nostro topico externo.

II.

ʒl. Spermat. cet. mallich. an. lbʒ. myrrh. camphor. an. lbj. phlegmat. Vitrioli. spermat. ranar. transcolat. an. q. s. Misc. & sign. mixtura nostra localis externa.

III.

Sperniolum pro Illustriss. Principe van Eggenberg. in Syria, compositum.

ʒl. Spermat. ranar. & colati lbvj. ceti lbʒ juniper. lb. cœlisfolii, quantum haberi potest, myrrhæ el. thuris, maltich. an. ʒj. croc. pulv. ʒss. camphor. ʒiii. Misc. & in vitro bene clauso insolentur ad omnimodam resolutionem.

In chirurgia ejus usus est insignis, ideo ad sananda ulcera antiqua, fortida, emronca, cancrofa & maligna, præsertim ad cancerum mammillarum & taciæ, remedium est magis solatii. Applicetur cum plumaceolis seu floccis mollioribus circa semen cardui benedicti collectis, & in lac mixtura intinctis, superposito etiam emplastro spermatis ranarum, tollit etiam omnes dolores inflammationes partium externarum, ideo in doloribus podagricis cum linteis (sc. eo imbutis) singulari cum successu applicatur.

Non dissimilis mixtura sequens à Paracelfo, in libro von offenen Schaden p. 434. (operum latin. Tom. iii. sect. 2. tr. de Apoltem. &c. cap. 9. p. 42.) descripta, quæ.

ʒl. Serm. ceti sperm. ran. sperm. juniper. cœlisfolii an. p. xqu. Fiat destillatio in sole; ad erysipelatis exulcerati curam ab authore commendatur.

Hic adjungo etiam ex ipsius D. D. Cnœsselii M. S. quæ de mutagine juniperina sibi annotaverat, quid sit, & ubi colligatur.

Gelatina, sive gluten hoc juniperinum (teste experientia rusticorum in Syria) nunquam toto anno magis repetitur quam mense Majo, imprimis horam unam aut duas post imbres nimbolve, ubi circa nodos seu juncturas stolonum juniperi instar candidæ, interdum flavescens gelatinæ ex interna, diis exudat, quemadmodum Synovia ex articulis hominis, sibi que concreta adhærescit, non tamen ita firmiter, quin vento vehementiore concussa decidat, aut à solis radiis liquata defluat, Quod si contingat, ut gelatinam hanc nec venti nec imbres nec solis radii lædant, in fungos concedit, qui vitro inclusi, folique expositi in limpidum liquorem resolvuntur. Liquor iste virtute ea præditus est, ut membris paralyticis applicatus (juncturis quotidie bis inunctis) omnem contracturam perfecte sanat, quod certe summum arcanum est, ipsa etiam signatura præbente argumentum. Quare etiam ab arthritide confectos articulos eundem liquorem restaurare & corroborare necesse est. Experimentum dictis faciet fidem. Huc usque Cnœsselius, qui in allegato M. S. Germanico, quid sit & ubi inveniat cœlis folium, quod &

flos cœli dicitur, sequenti sensu hæcce annota vetat.

Cœlislos seu cœlisfolium, nonnunquam in æstate autumnino in ripis maris Baltici, quandoque etiam in viis, instar gelatinæ coagulatum invenitur, sed frequentius matutino tempore ante ortum solis; nam quæ imprimis solis illud radii attingunt, in aquam mox resolvitur, ideoque ultra horam post exortum solem non durat, nec usquam tota die reperiri. Vulgus huminum vocat istam gelatinam *das Sterngefesbos* oder *Sternnuben*, quali dicas, stellarum jaculum seu stellarum purgamentum. Tantum ille. Ipsemet ego in juventute mea peregrinando & postmodum hinc inde iter faciendo, gelatinam istam multoties in viis & juxta eas vidi, sed semper ante solis ortum, uti ludatus modo Autor noster annotaverat. Rursum ea utitur ad comæ productionem.

Observationi Cnœsseliana subjungo & hoc de Cœli Flore, quod in Joh. Ernsti M. D. tractatu de oleis p. 500. legitur: hos, inquit mense Majo circa Pentecosten temporeque nocturno instar mucoris narium in præta incidit, idque trepidantur & quasi in circulo; hæc aqua lente destillata (alias enim nimis cito ascendit) est corrosivum dulce, omnes dolores cum admiratione sedat, ulcera quocunque rebellia curat & sanationi oboediens reddit, cum emplastris ad puncturas mixta: in cancro & fistulis est valde admirabilis, cum panis lancis applicata, vermenque interficit.

Heivetus quidam ex eo fecit pulverem album & cum ejus granis duobus vel tribus sivebat omnes dolores internos intensissimos, eoque ut exterius in ulceribus, ita etiam intra corpus summa felicitate utebatur.

Paracellus hujus cœlisfolii etiam meminit aliquoties, & ab illo Nolloch. & Ceresfolium nuncupatur; videlicet Tr. de vita longa l. 4. c. 2. & 8. (Tom. ii. p. 65. & 67. edit. Lat. no. iss. Genev.) item de signat. rer. natur. l. 9. p. 910. (Tom. ii. p. 115.) porro l. 2. Berthoni. c. 7. (Tom. iii. n. sect. p. 32.) & Tr. von offenen Blattern. c. 5. (Tom. iii. sect. ii. p. 42. b.) denique loco jam supra citato.

Nolloch in Lexico chimico Jonstonii, est jaculum alicujus stellæ, vel potius ejus repurgatione dejectum quid in terram, invenitur potissimum Junio, Julio & Augusto super laticos campos vel in pratis instar fungi magni vel spongiæ, foraminosum quid & leve, tendens in fulvum & ravam colorem, & ut coagulatum jus tactum contremiscit.

Petrus Borellus Obs. 41. c. iii. Histor. rarior Medicophysicar. Vidi, inquit, nolloch. sive rorem cœli, speciem musci, terræ friabili & monticulosa incumbens, tanquam glutem, post pluvias à quibusdam Chemicis decantatum illum enim pro universi spiritui capiunt & ex eo spiritum dulcem, sed maximis præditum viribus aurumque solventem educunt.

Emplastrum spermatis ranarum D. D. C.

ʒl. Oleum isperm. ranar. lumbricor. cancror. an. ʒviii. ceruss. pulverizat. lbss. Coquantur igne leni in sartagine ampla, spatula continuo agitando ad consistentiam emplastri mollioris, cui

cui ab igne remoto, & parum refrigerato adde ceræ albæ, (seorsim liquef.) ℥iii. pulv. martial. thuris opt. an. ℥ss. ran. cum propr. sperm. insucc. ℥i. camphor. in oleo ovor. dissol. ℥iii. Misc. accutate; empl. debite consistentiæ, quod multum conducit in inflammationibus & doloribus coercendis, & ad ulcera contumacia fluida & antiqua in ribus curanda; insuper salutare topicum externum est in omni fluxu sanguineo, ac speciatim hæmorrhoidum; menstruumque dorso solum applicatum.

De usnea seu musco cranii humani, Item de ejus virtute, usu & comparatione.

Sub usnea humana intelligitur hic ille Muscus, qui in capitibus seu calvariis suspensorum rota confusorum; vel alio modo morte violenta pereuntorum, liberoque aëri expositorum adnascitur, & in illis adnascere solet; nam capita talia sub libero Cælo, ventis, pluviis, radius solaribus lunariisque continue exposita, tempore tandem mollescunt, ac ita disponuntur, ut nusquam de se protrudant. quem Patracellicus usneam, Libavius autem in Alch. pag. 185. Florem cranii appellant. Hildanus in cent. 3. observ. 38. in ultima Cent. Epistolarum p. 975. (qui Usneam sibi ipsemet ex ossibus humanis in angulo quodam Cæmeterii collegerat) dubitat Usneam hanc in Craniis suspensorum inveniri: quia eam nunquam in illis reperire potuerit, neque credit, quod in istis craniis, quæ ventis, pluviis, grandinibusque impetuosius in patibulo obijciuntur, Usnea nasci possit. Sed Clar. D.D. Daniel Beckerus in Microcos. Med. lib. 2. c. 5. scribit, id quod ipse non observavit, alios Clariss. Med. observasse: ait, quod venti grandines, pluvie magis disponant solidam Cranii partem, quo solis radii in caput totum agentes, facilius florem hunc ex ipso cerebro elicere & evocare possint: hinc teste Tabern. lib. 1. p. 488. nonnulli Medici aut Pharmacopœi cranium aëri locoque humidiori exponunt, ut sic facilius Muscus proveniat: nec impetus eorundem Meteororum generationem hanc impediunt, cum & e locis minus dispositis, imo saxeis; & illis tempestatibus æque expositis, herbulas egregias nasci videamus, etiam exemplo probat cum aliquo cranio ex patibulo desumpto & Usnea decorato, quod apud Clariss. Celsissimi Ducis Borussia Regiomonti Pharmacopœum D. Casparum Pancerum vidit, exotici & raris quoque gaudentem.

Clariss. D. Joh. Chemnitius in Indice Plantarum circa Brunsvigam scribit, se vidisse ante annos aliquot octo simul crania militum in prælio Casareo Danico occisorum, quæ annos septem tecum in sylva vicina delituerant, Usneam undique obductam.

Ego ipsemet aliquando in venatione cum Ser. Rege Joh. Casimiro, Domino meo Clementissimo; similem calvariam, Usnea in diversis locis incrustatam, casu inveni. Cranium hominis suspensi musco seu usnea in aliquibus locis obductum, vidi Anno 1641. apud pie memoriz Ser. Caroli Ferdinandi, Principis Pol. & Svec. Apotekarium, Du. Sebastianum Englerum, is prope patibulum Varsaviense, olim puratum, sub muro in capella antiqua id inve-

nerat, in quo adhuc nidus passerulorum conspiciebatur. Sed hoc notandum, quod usnea humana sit duplex, scil. vegetata; villicosa & herbacea, quoniam ex parvis filamentis herbaceis constat, in forma quasi illius musci, qui in tegulis crescere solet, & qui a Tabern. lib. 2. p. 488. in figura ibi delineata inspicitur, & iste muscus maxime in illis capitibus seu craniis invenitur, quæ in terra locisque humidioribus seposita sunt. Altera est crustacea, in ipso capite tanquam crusta adhærescens, simili modo illi, quæ in saxis & lapidibus canpetribus, ordinarie in multis locis non cultis apparet, & a Botanicis lichen saxatilis, seu lichen petrea nunc. (Germ. *Steinflechten*) appellatur, de cujus specie hic nobis sermo est, quia & illa esse usnea, quæ ab authoribus eligitur, quæ peculiari quadam virtute, ad diversos morbos depellendos & curandos, dotata est.

Virtutes & usus usneæ cranii humani ab authoribus attributi sunt mirabiles, & primo.

In Epilepsia & affectibus Cephalicis tanquam expertissimum & sæpe probatum remedium à multis habetur: cujus usum & affectum ego ipsemet in fortissima quadam à multis annis Epileptica, (& per pie defunctum D. D. Andre. Cnosselicum A. chiatr. S. R. M. curata) vidi, ubi usnea humana tanquam basis & fundamenti Antiepileptici erat. Quoniam vero prænotatus D. D. Cnosselius usneam istam non semper in copia ad manus habere potuit, loco ejus postea in aliis similibus curationibus ipsum cranium humanum suspensorum substituit, & maxime illud Osficulum triangulare seu triquetrum accepit, quod aliquando in craniis circa principium suturæ Lambdoidis manifeste apparet, quod cum summa diligentia avide quærere solebat, sed raro, nec in omnibus reperitur, ideo diversa capita inquirenda fuit. Hild. in Cent. 1. Epist. 6. scribit, se habuisse semen horum osficulorum ultra centum. Cranium cum osse triangulari in conthum Sagittalis & Lambdoidæ, variisque in hac osficulis spectatur in Musco Cl. D. Th. Bartholini. Sunt alii, qui scribunt, hoc esse illud Osficulum Lutz, de quo moderni Hebræi mirabilia somniant; in illo latere radicem vegetantem, cujus vivifica facultate corpora humana in novissimo die sint surrectura; de quibus vide Robertum Fludd de Fluctibus in Philosophia Mosaisca, qui vult osficulum hoc habere formam crucis, & solum in craniis recens cruciatorum inveniri. Alii scribunt in dorso reperiri vertebram, cui Luz nomen imposuerunt, Cornelius Agrippa & Vesalius in pede collocant.

Sed iterum ad usneam nostram.

In Hæmorrhagia narium præstantissimum usnea cranii humani est remedium, quod omnibus Medicinam proficientibus est notum. Hildanus Cent. 2. p. 34. insistenda Hæmorrhagia ejus præstantiam non raro expertus est. Paracelsus in Manual. pag. 49. Tabernontan. l. c. & aliquam plurimi Medici idem hoc de Usnea scribunt. Cl. Daniel Beckerus lib. 2. p. 133. Microcos. Medici dicit, se exoptatum ejusdem vidisse effectum, desperatamque correxisse Hæmorrhagiam, in juvene quodam, jam pro agonisante habito. Ego ipsemet in sistenda Hæmorrhagia narium desperata, ex usnea & fimo porcino, cum mu-

colagine Tragacanthi (per aq. spermat. ranarum fact.) turundas paravi, quæ prius exsiccantur, & postea in loco sicco servatz, tempore necessitatis naribus intruduntur, incantamenti instar sanguinem retinere solent. Circa frontem Anacolleina, ex Bolo, sang. Draconis Pulvere spermiol. nostr. (ex nigr. Oculis ppt.) & usnea an. q. s. cum albumine ovi & modico aceti paratum applicet. In defectu vero usnez ex capitibus suspensorum eligitur illa, quæ in cæmeterio aliquando in ossibus demortuorum, vel etiam illa, quæ in tegulis crescit, item usnea, quæ in ramis seu truncis antiquis prunorum sylvest. & acidorum adhærescere solet. Et ex illa prius pulverisata, cum adjecto albumine ovi, fiat dicto modo frontale.

Uixerus in lib. 3. de Pest. p. 167. vult, quod Usnea humana, solum manibus retenta, omnem hæmorrhagiam è vestigio suppressere & restringere valeat. Sennertus lib. 1. Pract. p. 977. eandem in Syndone rubra de collo suspensam, in simili casu commendat, ubi & sequens Amuletum concinnat.

℥. Cinerem bufonis utrius. Lap. Hematit. 3ß. Musci cranii humani pulver. Umbilici marini, coral. rub. ppt. an. ʒi. radic. Tormentillæ Bistortæ an. 3ß. bursæ pastoris, flor. Bellid. minor. Anagal. rub. an. p. i. f. pulvis, qui in sericum rubrum includatur, f. sacculus collo appendendus.

Amuletum aliud ex Usnea Microcosmi nostro more sic componitur.

℥. Usnez microcosmi, seu musci cranii humani (vel loco illius musci ex ossibus humanis defunctorum, in cæmeteriis collect.) Pulveris bufonis, Spermat. ranarum cum propria mucagine aquat. per creberrimam imbibitionem præparat.) part. æquales. misce & cum mucilagine Tragacanthi, per aquam spermat. ranarum fact. fiat massa, ex qua postea formentur Amuleta, cordis vel alia forma collo appendenda. Vel duo pona, quæ manibus tam diu tenenda sunt, donec incallescant.

In omni Hæmorrhagia tam narium, quam uteri, hæmorrhoidum & vulnerum miræ virtutis. Armillæ elegantissimæ & corallia circa manus & collum pro feminis parantur modo sequenti.

℥. Specierum præcedent. ex Usnea, bufone & Pulv. Spermiol. ppt. part. unam vel q. v. Ossium human. ex cæmeterio ad nigredinem ustorum (melius crudorum) & subtilissime pulverisatorum tantundem ad pondus omnium.

Et cum mucilagine Tragacanthi per aquam spermat. Ranarum fact. q. s. f. massa, ex qua postea formentur globuli vel tabulæ ad placitum, inter formandum vero inungantur digiti & massa ipsa cum Ichthyocolla, prius in aq. spermat. ranarum super ignem dissoluta, qui tandem acicula crassa vel alio stylo ferreo perforari, & in loco umbroso excicari debent, & postea in scamno tornatorio ab aliquo tornario explari & poliri possunt.

Nos. Vidi & olim ad hanc operationem perficiendam apud Dominum Gothofredum N. N. Apothecarium Thorunientem, dum Warfavia adhuc esset, instrumenta singularia ex ferro, quæ us ex Ebore nigredinem prius calcinato

& speciebus odoriferis, varia similia corallia efformare & elaborare solebat.

Sunt & alii, qui ex Usnea in cranio hominis suspensi inventa, vitriolo Veneris (prius in sole phil. calcinat.) & Nitro fixo p. æq. mediante Ichthyocolla in Aq. spermat. ranarum, prius dissoluta, Lapides & Tabulas formare solent. Lapides tenentur in omni Hæmorrhagia (ex quocunque parte etiam illa proveniat) manibus, donec incallescant. Tabula in majiori forma applicetur dorso in fluxu Hæmorrhoidum & mentium mulierum, in fluxu vero sanguinis è naribus, fronte, in febribus calidis, pulsibus: item vulneribus castris & aliis partibus, ubi sanguinis impetus cohibendus est. Alias in desperato fluxu nimio menstruum & hæmorrhoidum sæpissime & nunquam absque juvamine & solatio intus & intus, Usneam Microcosmi in forma Pulveris ʒi. per se, vel cum additione coral. rub. cum spermate ranarum (rec. collect.) præparatorum exhibui, etiam pro meliori usu & commoditate Pilulas sequentes paravi.

℥. Usnez pulverisatæ. Eboris fossilis, seu corallorum, prædicto modo potiorum an. ʒi. Opunostri correcti gr. i. Cum Syr. Idoneo f. Pilulæ parvæ, foliato auro obductæ, quæ semper die (in Emulsionem aliquam ex seminis 4. frig. cum aq. spermat. ranarum prius rec. parat.) circa decubitum sumuntur. C. Daniel Beckerus in Medico Microcos. cap. V. in simili affectu tales habet Pilulas.

℥. Musci Cranii Humani. Magist. Corallor. Perlarum. an. ʒß. Boli Orient. gr. vii. Misce f. Pil. & Usnea, linteolo obvoluta, inferiori immittitur parti.

Ego in fluxu nimio menstruum, ordinavi pessarium sequens ex eadem Usnea (vel etiam in defectu hujus Muscum ex corticibus sylvest. collect. Germ. *Schlehen Moeb.*) cum lino porcino & spermiola nostra ex oculis nigris, propria mucagine per iteratam insuccationem prius parat an. part. æqual. misce. f. pulvis. Ex hoc pulvere postea cum materia idonea, scil. gossypio, lana concepta, stupra purgata, vel materia lyndonea sive Zendalo, f. Pessarium, vel Pulvis incorporatur Cera, vel cum mucilagine Tragacanthi per aquam spermat. Ranar. fact. vel alio succo conveniente, scil. acatiar. sylvest. bursæ pastoris. f. & Pessarium in forma consueta, alligatur filo, ut pro libitu singulis 6. horis extrahi, & sinui pudoris novum inserere possis.

Fabricius Hildanus in Cert. Epistol. ad amicos Epist. 39. pag. 987. sequens, ex Usnea composita conposita commendat pessarium.

℥. Farinæ volatilis ʒii. Terræ sigillatæ. Sang. Draconis. gyphi. Cinerum aquat. ranarum an. ʒiii. musci cranii humani ʒi. misce pulvis subtilissimus. in quo turunda seu pessarium (ex stupis suavis, justæ magnitudinis prius formatum, & decocto fol. prunor. sylvest. vel alio liquore conveniente humectata) involvenda est.

Hinc Weikard. p. 356. & c. D. D. Beckerus ex illo p. 133. in uterum sequens Decoct. injiciendum efficax esse scribunt, quod & in prociencia ipsius Uteri & intestini recti etiam adhiberi potest, quod.

℥. Gland. exsiccat. ʒiii. Usnez cranii ʒi. lard. concol.

consol. bittort. tormentil. an. ʒi. Terræ Sigil. ʒiii. Lap. Calaminar. Ciner. Sament. Herniar. liccæ an. ʒii. Absynthi ʒi. coq. in aq. fol. Quercus, & ter tiam parte vini rubri ad mensuram pro injectione, quæ efficacior erit, si parum aluminis addatur.

In dysenteria & aliis profluviiis ventris & intestinorum Poppus lib. 2. Thesaur. p. 410. ʒi. Usneæ exhibet.

Ad sistendum sanguinis profluvium è vulneribus, vix invenitur Chirurgus exercitatus, qui Usneam in Oribus humanis mortuorum collectam non pro certo & infallibili experimento habeat.

Hildanus in lib. de Lithotomia vesicæ c. x. p. 714. & in Tract. de Gangræna & Sphacelo c. 19. p. 114. item in Cista Militari Class. xviii. p. 1046. pulverem cum Usneâ commixtum à multis annis jam probatum sequentem habet.

℞. Farinæ volatilis. ʒvi. Sang. Dracon. Thuris an. ʒi. Boli Arm. Terræ sigil. an. ʒi. Gypsi ʒi. Ranarum aquatiliū præparatum ʒii. Musci Crani humani ʒi. Pilorum leporum minutissime iuciforum ʒii. Pul. albuminum ovorum, Sole caniculari excicatorum Spumæ maris, Spongiz novæ torrefactæ an. ʒi.

Misce fiatque pulvis subtilissimus, quo in omnibus vulneribus etiam capitis, & detectis membranis, uti & in hæmorrhagia narium, cum fructu uti poteris. Weickard p. 366. hanc habet formulam, & Cl. D. D. Beckerus ex ipso.

℞. Thuris, Aloes, an. p. xq. pulveris subtilissime, & cum albumine ovi incorporentur, addendo Muscum de cranio hominis defuncti, excipiantur lanugine panni veteris, & utere.

In synovia. Chirurgus quidam Usneam (in cæmeterio ex ossibus & capitibus humanis collectam) cum æquali parte Laccæ rubræ globulosæ commiscebat, etiam aliquando in defectu Usneæ pulverem ex ipsis ossibus humanis seu calvaria admiscebat, & vulneribus, linteo concepto, applicare solebat: & hoc apud illum pro summo secreto in illo affectu tenebatur.

Helmontius ex Usneâ, sale marino & ente Veneris, cum Ichthiocolla soluta, summi parat Periapron Salutis Magneticum (Driss) seu Lapidem Butlerianum, quo solo attractu extremo lingue apice salutem alterre vult.

Usneâ in cranio humano suspensorum inventa, ingreditur quoque unguentum Amariū, quod alias Martiale & Magneticum dicitur, quod ut magnæ ferrum, abscondita & occulta facultate trahit, ita simili modo, occulta vi vulnus insiliens per hoc unguentum sanatur. Amariū & martiale vocatur, quod unguentum hoc non vulnere, prout ordinariè fieri solet, sed armis, (quibus vulnus insiliens est & iis adhuc cruor adhærescit) applicatur, cumque eo affricatur. Alii solum, quando illud telum seu arma habere nequeunt, aliud telum seu lignum, sanguine prius ex vulnere imbutum, & exsiccatum, in hoc unguentum imponunt, & vulnus singulis diebus, fascia nova, urina vulnerati madefacta, obtegunt. Huius unguenti primum inventorem dicunt fuisse Variagellum, sed Keckermannus lib. 1. System. Phyl. c. 9. Authorem vult Italum quendam Parmensem. Post ipsum à diversis authoribus diversæ compositiones & descriptiones compositæ sunt, scilicet à Crollio, Coëro, Weckero, Goclenio, Helmontio, Cornario, Weickardo, aliisque plu-

ribus Authoribus, qui de hoc unguento scripserunt, & in quibus omnibus Usneâ microcosmi tanquam basis & fundamentum est. Qui de huius unguenti effectu, virtute, usu, & præparatione plura desiderat, is adeat Theatrum Sympatheticum, Norimbergæ impressum, ubi omnes Authores, qui pro & contra huc usque scripserunt, Ben. Lecl. quasi in uno fasciculo inveniet. Hoc saltem hic admonendum, quod Usneam non solum pro confectione unguenti, sed & aliis usibus, tam internis, quam externis colligi volunt, Luna crescente, & in bona Domino existente, scilicet veneris, si heri possit, (non Martis aut Saturni) cur vero ex stragulati potius quam alterius cuiusdam capite, Usneâ eligatur, rationes dat Goclenius in Tract. de confectione huius unguenti, & Helmontius de Magni Vulnerum curatione, quos B. L. imitari potest.

Sunt & aliqui qui credunt, sed supersticiosè Usneam cum Zenith virginearum, & radice victorialis sin. ul. saeculo virgineo inclusam sub axilla sinistra vesti insutari, portatamque contra omnia arma & tela valere & defendere, hominemque inviolabilem reddere. Quod & Cl. Sennertus lib. 3. Part. 4. c. 14. Med. Pract. ex libello publice impresso scribit, quod Usneâ die Veneris ante solis exortum, ex hominis suspensi vel rotæ necati Crani, Muscus cum certis precibus (quæ ibi non ponuntur, nec poni debent) deradendus sit, qui si in veste sub sinistra axilla insutus gestetur, hominem eodem modo inviolabilem præstet. Sed uti hoc illicitum est, sese impenetrabili se reddere, ita & Christianum hominem non decet similia superstitiosa tractare. Et ego tale artificium conjuratione acquisitum malo credere, quam cum periculo corporis & animæ tentare, quia superstitiosa sunt, & nullius in hac re efficaciz.

Alii iterum sunt, qui Usneam ex cranio hominis suspensi, cum eodem Zenith seu linteo maculato primum menstrui, plumbo commiscant, quando spherulas seu Pilulas fundunt, & sic sibi certum scitum ex bombardâ promittunt, sed & ista sunt vana, nec ad nostrum propositum spectant.

Jam restat, ut, cum Usneâ Microcosmi tanquam remedium in multis morbis excellentissimum, alias ut supra dictum, raro & in exigua quantitate inveniatur, quomodo facilius & in majori copia acquirenda sit, hic ostendatur. Non pauci fuerunt, quos ipsemet nosco, qui diversis modis hoc tentaverunt, & crania similia, scilicet hominum violenta morte peremptorum, in loca humida super terram (ubi alias muscus copiose crescere solet) reponerant. Alii ponebant caput supra rupes in locis altioribus montium, ubi alias muscus similis, quasi crusta lapidibus & saxis adnascens, copiose conspicitur. Alii etiam ut rem promoverent, caput seu cranium circum circa similibus lapidibus (musco crusta ceo, contagio inter infectio) tegebant, & suo tempore muscum seu Botrem, simili modo in cranio crescentem, sperabant. Meliorem adhuc successum credebant & aliqui, qui muscum ipsum in tegulis & lapidibus collectum, cum aqua pluviali, seu rore solis commiscebant, & calvaria instillabant, ac postea supra murum in loco altiori & quietiori ad annos 3. vel plures reponerant. Quia modus defuncto & superius præmemorato Domino D. Cnoctellio non displicuit: nam ille ipse qui

qui adhuc meliorem successum sperabat, commiscebat muscum terrestrem minimum (qui in terris locisque humidioribus, item in regulis tediorum umbrosorum invenitur) prius manibus contritum, cum vino optimo Hispanico, mixtura postea ungebat cranium circumcirca, & reponebat illud in superiori loco domus, ad crescendo super nurum & sub aperto celo, interim irupit bellum cum Suevis, caput seu cranium ita confectum, in absentia hospitis, remotum & rejectum fuit, & nemo postea scire potuit ubi remanserit. Jam est septimus annus, ubi de hac materia cum amico aliquo curioso in discursum incidi, qui mihi jurando quasi confirmabat, se habere inventionem ad acquirendum hunc muscum brevi tempore, & quidem in copia, nullo alio modo, nisi quod calvariam hominis prius oleo olivarum bene inunctam, in loco remoto & sylvestri super lapides antiquos, tali musco crustaceo infectos, poneret. (qui in campis desertis aliquando in unum cumulum collecti inveniuntur) & per annum in illis quiescere relinqueret, sic acquisivisse certum muscum in cratio, quod sapius probavit. *Martinus Berhardi.*

Magna densis hæmorrhagia.

Anno Chr. iust. 1655. Civis quidam Ratisponensis nocturno tempore in subitam hæmorrhagiam è dente quodam intimo, ac carioso superioris maxillæ in latere dextro inciderat, ubi sanguis subniger, serosus, per horas septem continuas, tanquam ex siphone profiliit; post multa alia medicinalia, adhibitis ventosis siccis sine scarificatione, sapiusque deorsum in dorso ad lumbos usque deductis, & assumpta oris collutione ex decocto astringentium, sanguis quidem destitit, sed ad horam & ultra serum plane clarum, subalbidum ac salum adhuc sequebatur. Inde conjecturari licet, quod sanguinis acrimonia cum abundante sero falso hæmorrhagiæ tantæ ansam dederit. *Helwigii.*

Scholion Schrockii. Magnas ex dentibus, vel gingivis potius, hæmorrhagias alii etiam adnotarunt; potius quales in scorbuticis non raro observantur, vix aliam ob causam, quam quæ ab Auctore nostro in Casu præsentis à seri acris in sanguine abundantia desumitur. Unde Clar. Guak. Charleton lib. de sorb. cap. 14. art. 5. dicit huius in scorbutico symptomatis causam in sanguinem, luxuriante supra modum sero dilutum, vel sale volatili acris, à quo debita ejus consistentia pereat, abundantem, sicque orgasmo exagitatam, per arteriolarum oscilla erumpentem, rejiciendam arbitrabatur. Quo etiam referre liceat fabri illius ferrarii lienois historiam, cui è vena (ut quidem Donatus vocat, cui tamen rectius fortasse arteria subscituenda erit, quæ in superiori maxilla à carotide interiore, in inferiori autem ab exteriori ad dentes propagari solet,) gingivæ, ichorosi sanguinis libras amplius octo effluxisse, Marcell Donatus lib. 4. hist. med. mirab. c. 9. refert. Et Alex. Benedictus lib. 5. de curand. morb. c. 1. ex gingivis profluvia sanguinis incredibilia, supra modum salsa, vidisse se testatur. Tanta nonnunquam illa exoritur, ut ipsam etiam mortem comitem inveniat. Talem Hollerius Comm. 2. ad Aphor. 18. lib. 1. sect. 2. Coac. Hipp. memoravit, scribens. Nos vidimus è loculo dentis longo tempore sanguinem profluxisse, qui nullis remediis cessit ægrumque tandem substi-

tit. Idem accidit juvenculæ in septimum mensem gravida, apud Gregor. Horstium par. 2. lib. 1. observ. med. 25. quæ in hæmorrhagiam subitam gingivarum, sanguine confertim & magna copia per tres septimanas continuas effluente, inciderat, maculis sanguineis, ac sudore sanguineo, tandemque morte ipsa subsequitis. In cujus observationis resolutione aliud porro exemplum magnæ sanguinis per gingivas excretionis lethifera profertur. Feliciorum vidit successum Illustr. D. D. Paulus de Sorbait in Murario, cui sanguis post diuturnam tertianam ad 24. libras ex gingiva effluerat, pulvere tamen chalcanti hinc & altero actuali perfonato, ut ipse obs. 48. Anni 11. Ephem. Germ. Cur. recensuit. Et femina illa apud Nic. Tulpium lib. 1. observ. med. cap. 49. plus æquo poculis dedita, plurimum sanguinis quotidie ex gingivis effundens, difficulter quamvis, sanata perhibetur. Nonnunquam cariosa gingivas ex crescentia defœdans, magnum ibi sanguinis fluxum efficit, qui excisione illius feliciter curatur; ceu ejus specimina apud Joh. Meckerarum c. 16. & 25. observ. chirurg. occurrunt. A dentibus etiam evulsis immodicas sanguinis evacuationes contigisse scimus; qualem Valleriola lib. 5. obs. 3. à dente putrido sine ulla vi ac sine ferro, sola digitorum lenissima apprehensione educto, ex arteria subdita, rivuli iustar è fonte per triduum manantem, brevi tamen curatam, describit. Hæmorrhagia quoque ingens à dente evulso, curata habetur in obs. Laz. Riverio communic. à D. Pietro Pacheco obs. 18. nec non obs. 2. Achill. Gasperi apud Geor. Hieron. Welschium in Syllog. curat. & obs. ut & obs. 72. Joh. Udalr. Rumleri apud Eundem. Egregius ille Ulmensium Chirurgus Joan. Sculterus tria remedia part. 1. Armament. Chirurg. tab. 29. §. 11. adnotat, quæ varias hæmorrhagias & deploratam quoque illam gingivarum, extractiones dentium violentas excipientem, infallibiliter compescant, illudque, multa inter alia, exemplo Brætearii cujusdam confirmat, qui ob violentam à Circumforaneo dentis molaris evulsionem, incompefcibilem fere in gingivæ hæmorrhagiam delapsus fuerat. Sed neque in hisce sanguinolentis fluxionibus semper expectanda est salus, dum vel ob finitrum remedium usum, vel aliam ob causam, sanguinis impetus sisti nequit, & mors atra una cum humore illo vivifico ipsam effundit animam: Sic duos eruto dente, ob multitudinem sanguinis obisse Cardanus de caus. sign. & morb. ab Felix Platerus lib. 3. obs. fabrum ferrarium, ab extracto dente canino, quem sanguinis saltu quodam effluentis, subtilis, rubri, & fervidi per triduum eruptio, nullis remediis compescenda, insecuta fuerat, exspirasse notarunt. Quas occasione magnam Agyrtarum imperitiam, fraudem & audaciam obiter perstringere licebit, dentium extractionem sæpe non necessariam, inconsideratius, argenti scilicet una extrahendi causa urgentium; quorum inutile officium ut Magistratus auctoritate inhiaberetur, multoties necessum foret, ad Turcas potius ablegendum; Famosa enim illa humanitatis monstra, referente Menavio, scriptore Italo lib. 1. c. 22. Chirurgis suis olim interdixant, ne sine impetrata Regis licentia dentes extraherent, dubio procul non negligendum sanitis damnum declinaturi, uti Exc. Goth. Moebius c. 6. Medic. physiol. loquitur.

Christophorus vltat dignitatem, postea quod in con-
dendis pannis laevis occupatur, addidit. Anno 673. xliate
febre ardente corripiebatur, a qua iteratis vena: sedominibus
aliquo

ausque remediis, post trium septimanarum decubitus tandem liberatus, utcumque valuit, donec autumno adulto Quartana ipsum febris invaderet. Hanc, qui curam ejus gessit, rursus venæ sectione ac sæpius repetitis purgationibus fugire conatus est; sed ex simplice duplicem, immo triplicem effecit, paroxysmis quotidie ægrum exagitantibus. Hinc primo pedes, mox etiam venter intumuerunt, ita quidem, ut tandem spes salutis vitæque omnis evanesceret. Mortis itaque candidatum se vultus æger, ex Moravia, ubi tum commorabatur, in patriam se recipere constituit, ut ob morbi magnitudinem ipse frigori, quod tum temporis experiebatur. Vix itaque circa Calendas Januariæ anni 1679. se committit, statique hic volentibus die 7. Januarii Uratislaviam, vix animam adhuc tians, venit, & penes Adamum *hendemreich* consanguineum suum divertitur. Ab hoc ego mox in auxilium vocatus, hominem toto quidem corpore tumidum, sed ventre imprimis ad summum usque pectus, maxime dilatatum invenio, febrili horrore concussum, ita, ut qui ceteroquin ægerrius propter distentos musculos respirabat, tum saltem non animam agere videtur. Exhibui ipsi statim Spiritus Sal. Armon. aromatici cupisdam dosim; sequenti vero die, postquam in causam morbi statumque ægri paullo curatius perquisiveram (utut vix aliquam reconvalescentiæ spem speresse viderem, nihilominus aliquid potius tentandum, quam ægrum prognostico relinquendum esse dixi,) leni quodam purgante primum corpus lustravi; deinde mane & vespere quotidie Tartari Martialis dimidiam drachmam exhibui, paroxysmo vero febrili inveniiente spiritum Sal. Armon. aromaticum promandum dedi; quibus medicamentis altera tertii septimana effectum est, ut multiplex illa quotidie affligens febris, in simplicem rursus quartanam commutaretur.

Hoc viro, vix illi porro insistendum esse duxi, & Tartaro Martiali quidem Croci Martis aperitivi portionem remulci, Spiritum vero Sal. Armon. cum Elixir Propr. Paracelsi maritavi singulis septimanis aloes lotæ ʒß. ad alvum laxandam exhibui. Exinde, quamvis febris quarto quoque die non interrupto ordine repeteret, ventris intumescencia remittere, respiratio pederentim faciliior fieri, appetitus hæcenus penitus prostratus, utcumque redire, sitis tera sedari, viresque æger pullatim recipere cepit. Cumque posthæc Antimonium martiale cachecticum, quod tum recens paratum Marte saturatissimum ad manus erat, aliis medicamentis subinde intercalarem, ut naturæ conanti in sudore ciendo auxiliares manus porrigerem, en miram ea crisi mollita sanguinis stillicidio per nares à maxima oneris sibi molesti parte se liberare tentat, opti no cum successu. Siquidem in tertiam usque septimanam quotidie bis, interdum etiam tertio sanguinis seroli, vel potius feri cruenti copiam excrevit, singulis vicibus facile dimidiam libram pondere æquantem. Hæsitabam primò deque sistenda hæmorrhagia necum consilium agitare incipiebam; sed cum videbam ægrum ab ea non saltem non laedi; sed etiam levamen

accipere, atque indices melius habere, naturæ opus minime turbandum esse statui, quid potius methodo hæcenus adhibita porro intireti. Cessavit inde febris, venterque magis magisque detumuit: postquam vero hæmorrhagia sponte desit, decocto sudorifero, diureticisque, quod reliquum erat hydropis ex voto è corpore exterminatum est. Sicque tandem spatium trimestri, Deo sit laus! æger præter omnium spem & expectationem integræ sanitati restitutus est, & adhucdum Olsæ dilectorum, maritus ac Pater tactus, superstes vivit. *D. Goss. Schultze.*

Sanguis humanus curas fluxum sanguinis humani.

Anno 2. Decur. 2. Ephemerid. exhibui observationem 38. quæ habet, quod ossa humana profuerint dysentericis. Dum perlegi, inveni aditamentum Ingeniosissimæ & Excellentissimæ Domini Schockii F. Annæolii Jenæ non vulgaris, vidique quod malit abstinere, certo respectu talia dare medicamenta, ne læsæ humanitatis, non dicam crudelitatis notam incurrat. Ingenue ut fatear, mihi ipsi non sapient, ait ægrotis interdum exhibeo, præprimis us qui sunt durioris conuatis. Interim tamen cranium humanum multoties a Præcificis præscribitur, ut notum; & res in idem recidit punctum. Quid non facimus dum agrotamus, quid non, dum curamus? Esset hic amplissima discurrendi materies. Quod subnecto; videtur magis nauseabundum remedium. In districtu nostro Grumbergeni erat nobilis ab V. cui post partum difficilem sanguis copiosissime stuebat per uterum cuni periculo vitæ. Matronæ astantes excecabant aliquid sanguinis profluentis; & inscix sub forma pulveris exhibebant cum juvamine.

Dum accedebam, clanculum exprobebam quid dedissent, ego dictum est abominabile, Interim regerebant, hoc multoties profuit. Habet etiam quidem rationes ob solutum, sed si rescivisset puerpera, vix dubito quin non præsentaneum vitæ periculum incurrisset ob nauseam inde conceptam. Novinus sanguinem leporis Martio connecti, linteum exceptum recommendari in dyenteria & profluvio coeliatorum, si potius mutatur aliquid utem si asserit, ut vult Schroderus Pharmacopœæ l. 5. p. m. 300. Quomodo conciliabimus hoc cum Excellentissimi D. Ludovici relatione, contrarium effectum habente, Anno 9. & 10. Ephemerid. Decur. 1. sub finem observ. 35. Annon sit æquiparandus noster sanguis assatus & exsiccatum Croco martis adstringenti: Excellentissimi D. Ludovici veto linteum exceptum & in aere lente exsiccatum Croco Martis appetitivo, hæreo. Diversitas etiam querenda veniret inter sanguinem humanum & leporinum, præprimis leporis tenerioris. Sed quid nodum in scirpo querimus.

Schölium.] Sanguinem in sistendis hæmorrhagiis utilem præstare operam, si in pulverem redactus parti fluxum sanguinis patienti inspergatur, plurimorum constat experientis. Id quod glutinositati ejus, qua erumpenti alteri occurrens eundem demulceat & vasa conglutinet, adscribit Nobil. noster Wedelius tract. de modicam facult. lib. 2. sect. 2. cap. 5. Idem etiam præstare

in hæmorrhagia narium vaporem sanguinis, in ferrum candens elabens, naribus navitum; quod odore tetra, sanguinem effluxurum repellente, ceu Cl. Thom. Willis Pharm. ration. part. 2. sect. 3. cap. 12. de stercore porcino dixerit, num efficiat, prudentiores judicent. Ut plura alia quæ adduci hic possent, taceam. De ipso sanguine menstruo siccato & propinato in alium sanguinem menstruum agente tractat Joh. Bapt. Siconus Jatrotoph. miscellam. tract. 20. sinitere scilicet fluxum ejus qualitatibus manifestis, terrestribus, exsiccantibus & obstruentibus, ad modum boli. Armen. terra sigill. & limalum. Quomodo tamen in aliis idem sanguis moras necientem alium expellere queat, ceu in citata Ludoviciana observatione habetur, salvo doctiorum judicio, imo præsupposito, experimenta hæc non fallere, videndum. Si in utero peculiare fermentum hære, quod certo tempore in sanguinem agat, illum agitet, inque fluxum illum menstruum adigat, dicere mihi liceat, causam hujus forte invenire dabitur. Colligi autem tales in utero fermentantes particulas, Francisc. Bayle. in diss. de caus. flux. mens. mul. rationibus non prorsus consentiendis evincere videtur; nec ipsa structura uteri, glandularum haud expertis; de quibus conjecturas in Dec. 2. Anno 1. observ. 4. scholio dedi, repugnat; imo sicut fermentum in partibus genitalibus, præsertim testiculis, viribus admittere debemus, quod vel feminis ibi elaborati singularis odor demonstrat: ita cur mulierum organis genitalibus simile quid denegari queat, haud video, præcipue si, quod in appendix cent. 3. observ. Riverianæ pag. 10. 271. habetur, sanguis menstruus calendus odor em. spiret; quinimo principium aliquod in sanguine necessario statuendum erit, & quo menstrui illa ejus agitatio suscitatur; quod cum nec a Lunæ sit influxu, quisdam hic abferro, neque in sanguine malle per totum corpus circumflua, neque alia aliqua corporis parte hætenus deprehensum fuerit, ipso præterito commodius quid effingere haud licet. Hujus itaque fermenti particula, dum una cum sanguine procedente una evacuuntur, & in linteo exsiccantur, si in ventericulum semellæ mensum obstructione, quam sanguis v. g. minus temperatus, & viscidis multis particulis refertus & hinc vel ad subeunda illam fermentationem, vel per arteriolas uterinas minima transitum non ita aptus, aut ipsa etiam uteri dispositio morbosa ac fermenti in eo vitiatum torpor induxerit, ingerantur, ac postea cum sanguine permisceantur, solitam illam in eo turgescerentiam concitare, crudiore sanguinis partes attenuare, & uterinam tunc labem emendare, ac consequenter sanguinem expellere poterunt. Quam sanguinis agitationem noxa illa, a menstrui istius humoris, loco phlegmi, propinquantone inducta, mania & amentia, pariter quodammodo ostendit. Quod si ramentum cruor hic longo tempore adseruetur, & fermentans illa potentia in eo evanescat, tunc adsumptus non tam menstruum sanguinis fluxum promovere, quam potius alterius alijus cruoris ad modum cohibere valebit. Illud quoque fermentum cum graviditatis tempore, in mutata tunc multum uteri constitutione, ut plurimum aliter se

habere videatur, sanguis etiam ex utero puerperæ profluens fermentantibus illis particulis minus erit imbutus, ut ita reliqui sanguinis in corpore circumflui naturam magis amuletur, sicque etiam glutinosis suis particulis sanguinem demulcere, inviscare, atque ab excretionem hoc pacto, si propinetur, vindicare queat. Quidquid tamen fuerit, sordidum hoc remedium genus, ut à laudato D. Ludovici vocatur, Medicus non facile suadebit, qui delicias has mulierculis dispensandas merito relinquit. Ceteroquin remediis & Microcosmi partit us, ut ip-sis etiam excrementis pro usu interno petitis frui per me cuilibet sit integrum; quæ mvis, si carere Medicinam eis commodè posse, nec ægris meis aut illa aut alia à me præscribi solere dixero, nemo vicissim culpæ id jure valeat, D. Amelius Ledetii.

Hæmorrhagia peni spontanea.

Longius foret differre de multiplici usu quem corpori nostro senerat nectar illud vitale, sanguis, qui motu indefesso machinæ nostræ circumlat mæandros. Nec levius nobis facilliet negotium, si eundem esset per omnes vias, quibus diffuere potest tam pretiosus latex. Non tamen æque trita sunt hæc semitæ, cum hac catur frequentius illac rarenter. Tristius, hercle, omen habetur, si profluentem viderimus; ubi ne rivum expectassemus. Quamvis interdum, qui sponte referantur fontes, obsepentur gratuito, ipsa se corrigente natura, ne videatur errasse. Cum non ita pridem, per me, post Deum, in gratiam cum sanitate redisset aliquis cruenta mictione quam gravissime laborans; accidit, ut alius è vicinia meam contra Ophthalmiam efflagitaret operam medicam. Dum autem varios invicem sermones cardimus, narrat sibi, ante aliquot annos, ex insperato latgum profluxisse sanguinis imbrem, per membrum illud, quo viri sumus. Nesciebat plainissime quid de Thyrsio fieret, alia omnia expectans potius, quam sanguinis; qui observatus maximum incussit terrorem. Ubi vero per sesquihoram durasset hic æstus sanguineus, inarescens commodum, eadem, quæ proruperat, sistebatur indolentia, nullo, ne quidem levissimo, tristioris cujusdam relicto symptomaticis vestigio. Ego varia quæsi huc spectantia; interrogans, numne causas quasdam scire potuisset hujus hæmorrhagiæ? an non, vel calculus ipse, vel equitatio succussus, vel gestatio gravioris oneris, aut aliquis in diæta error præcessisset, vel usus Aloëticorum quorundam medicamentorum, quæ oscula reserassent venarum, hanc rupissent cataram? Verum omnia hæc negavit constanter. Hinc pater ipsam naturam, quasi provido consilio, imminens amoliri gestientem periculum, per hanc sentinam, superfluum tantummodo eructasse sanguinem. Atque ita hæc fidem celeberrimo conciliant Koz. kio, dicenti Tract. de Hæmorrhagiæ, lib. 1. cap. 11. pag. 102. Simplex sanguinis mictio non omnis est æque vel noxia, vel noxia; si d. ing. dum & quædam utilis patientes à multis gravioribus tum liberans tum præferyens aff. d. bus. D. Georgii Hannai,

Ex ulcere penis hæmorrhagia enormis orta facti quidam, at singulari cobibita.

Chirurgus quidam in affectibus venereis curandis satis bene veritatus me noctu ad ægrum accersit, qui ex aperta arteriola in ulcere inter glandem & præputium penis tantum sanguinis illa nocte protruderat, ut ipse ex sanguis propemodum videretur. Imò auri dicere, me dimidiam cupam lintheaminibus cruentis oppletam in cubiculo, ubi ille decumbebat, invenissem; non aliter ac si femina quidam in procinctu puerperii fuisset. Diversi generis styptica applicuerat Chirurgus ante meum adventum, me ullo tamen levamine, compressioni vix ullus quoque ibi locus erat, propter membri constitutionem: itaque in summis angustis erant & Chirurgus & æger, quam tamen momenti temporis spatium ab hoc periculo, Dei auxilio, liberavi, idque remedio simplicissimo: scilicet glandem penis præputio stinxi, & sic præputium arcte digitis compressi, unde ne gutta quidem amplius effluere potuit, sicque mihi fuit restitutus. *Frideric Koysschii in Observationum Anatomico-Medicorum centuria.*

Alia in eodem argumento Observatio.

Non ita pridem cum Henrico Annema peritissimo in hac civitate Chirurgus vocati sumus ad ægram, ex cujus membro virili per urethram 14. circiter sanguinis libræ effluere, idque interdum tanta vi, ut majori urinam excernere non posset. Quod cum sit hujus partis vitium dignum ut posteritati tradatur ejus lulloriam hic anneximus.

Jam Huybreckz annos 51. natus, vir robustus atque vegetus, habitans in vicò dictò Voquektert, ultimo Januarii 1668. onustus sacco tritici, dum per alteram super aquam positam transiret, pedemque versus marginem figeret, alter invertebatur ea ratione, ut inter ipsius pedes asseris acies existeret, in quam pondere tritici ita comprimebatur, ut peritonæi atque testiculorum mira contusio adellet, absque vulnere externo aut hæmorrhagia donec dimidia post calum elapsa hora urinam emitteret, tunc enim primò tria circiter sanguinis cochlearia effluxere, urina clata & sine sanguine mixta subsequente, quæ acrimonia sua summos in urethra excitabat dolores, nunquam tamen sanguinem effluxisse nobis retulit, nisi dum rursus urinam redderet. Cum itaque per horas 4. dies non nisi exigua quantitas sanguinis per urethram efflueret, operæ præteritum non existimabat Medici cujusdam auxilium implorare. Quid contingit? Quinto à casu die, cum supra sedem sese ponens, partes contusas aliquantulum durius agitant, sanguis cum pulsatione tanto impetu per urethram effluit, ut adstantes ipsum jam jam moriturum crederent. Ne tam omnis sanguis uno impetu efflueret, aliquis consanguineorum penis partem anteriorem tamdiu comprimebat, donec nostrum auxilium implorassent. Domum intrantes, inter uxoris, filiorum filiarumque ejulatum, imbutum, & sanguineorum suspiria, ægrum in miserrimo illo statu invimus. Lecti tegumenta & reliqua ipsi vicina non

aliter sanguine erant conspurcata, ac si tubos in loco illo, ubi æger decumbebat, iugulatus fuisset. Intelligentes modum quo cecidisset, & quod per 4. dies consequenter exigua semper sanguinis quantitas, solummodo ante urinæ emissionem effluxisset, judicavimus spongiosam urethra substantiam, ejusque arterias lalas esse, licet tam impetuosus illius sanguinis effluxus causas non sufficienter conciperemus. Præterea explorantes in interiore abdominis parte, immediate supra pubis ossa, tumorem multar capitatis intantis magnitudinis, asseruimus illum propter dictam penis contractionem a regurgitante in vesicam sanguine originem habere, quemadmodum dictum novitum eventus confirmavit: & explorantes ægrotantis pulsum, eum debilem ac languidum, propter tantæ copiar sanguinis effusionem, invenimus; quapropter hærebamus dubii, quibus inter tot ac tanta huic præteritum occurreremus, cogitantes præteritum, quod a sanguinem silentium, sanguis in vesica nimium incrassantur, & ab attenuantibus contra sanguis in corpore fluidior evadens, majori etiam copia per arterias, ob calum internè dilaceratus, efflueret. Tandem aliquando re, ut decebat examinata, ex arena cepimus consilium, & diximus invicem potiori malo succurrendum esse, quod cum à nimia virium debilitate, propter sanguinis effluxum immineret, similem mixturam qualem magnus Professor noster Franciscus De le Boë, Sylvius in praxi sua, nuper edita lib. 1. cap. 3. proposuit, ægrotanti nostro ad virium corroboracionem & sanguinis fluxum sistendum præscripsimus: quandoquidem propter summam virium debilitatem venæ sectioni non daretur locus, & præterea peritum, cum partis affectæ compressionem per ligaturas non possemus instituere, medicamentum astringens applicuimus, atque sic ægrotantis vitam per illam noctem conservavimus; sequenti die reversi, cum sanguinis fluxus necdum in totum cessaret, & vires paulo melius constarent, venam ipsi in brachio aperuimus, atque decoctum vulnerarium præscripsimus. Tercio die ægrum nostrum, quem medio riter pro tempore constitutum dereliqueramus, in pessimo statu invenimus; nam præterquam quod ex nimia inanitione singultus, etiam à sanguine in vesica & aliis partibus corrupto, ingens febris excitabatur. Gravissima hæc symptomata, cum post iteratam emetatum ex lacte dulci & electuarii diacatholici uncia cum dimidia injectione non mitterentur, decocto vulnerario quidam diuretica addidimus, quæ sanguinis grumos jam semicorruptos feliciter ex vesica propellebant, cessante sensim cum febre singultu. Paucis, præter ea quæ enarravimus, medicamentis ægrum nostrum in mortis bilance versantem. Deo benignè annuente, parvo temporis spatio feliciter restitimus. *Rignerus de Graaf libro de Virorum organis &c.*

Vena cruralis spontanea apertio.

Rustica quadrata triginta & quod excurrit annorum, plurimum liberorum mater, enim denuo concepisset, sub ultimum circiter gestationis mensem ann. 1685. quotidiano labori vacans, in seniore, sinistro, non procul ab inguine

sanguine, è vena crurali turgesciente, sed sponte aperta, hæmorrhagiam insignem patitur, cui ligaturis, aliisque vulgaribus album ovi cum aceto rosac. applicatis vicini occurrunt: quatuordecim ab hinc diebus, cum prætis verrendis sola incumberet, vulnusculum superum enormiter recrudit, cui misella aqua frigida, qua corpus tantisper potuit medelam quæsiuit, postquam bis hinc vicibus ultra quatuor libras sanguinis perdidisset, quarta septimana ægra mirum quantum intumescere cepit, imprimis collum versus, quod instar aquæ lymphæ pellucebat. Die 1. Augusti. cum nos convenirent, actaque narrarent, sinistram eventum prædiximus, in primis si dolores partus ipsam non corripere, huncque ob finem mutaram convenientem præscripsimus, quæ ex parte haulta, ab ipso matris infantulum feliciter enixa est. Sub vesper. cum ipsam inviserimus cum D. Schorhopf, de partu gratulati fuimus, juxta vero ægram pallore deprehendimus, tumore colli quamvis remittente, & circa præcordia per intervalla opprimi: exhibita hinc una altorave dosi diaphor. jovial. cum mixtura cordiali additis blandis volatilibus porreximus, commendatis juxta jusculis & prohibito vino: quibus cum ipsa sedulo obtemperasset, licet paroxysmus graviores quandoque intercurrerint, attamen, Deo benedicente, pristinam sanitatem feliciter recuperavit. *Job. Jacob. Harderus in observationibus Anatomico-Præclis.*

De hæmorrhagia ex ulcere tibia varicosa.

Femina quadraginta annorum ulcus in tibia dextra exortum est a causa interna supra varicem satis amplum, quod nullis remediis obtemperabat, aderatque tumor & erysipelas satis grave nullis medicamentis morem gerens.

Post aliquot dies inopinato ab humore acido, corrosivo illic hærente apertus est varix, ex quo admodum dux libra sanguinis nigricantis ac (ut astantes asseverabant) in effluxu valde fetentis promanaverunt.

Ego placentiam illam duriusculam ex medicamentis acidum temperantibus consilaram, quam in Observatione sexta primæ Decadis laudavi, & Chirurgo imponi curavi, & sic varicem non tantum obturavi, verum etiam acidum illud in ulcere hærens temperavi, quod alias corrosione sua varicem facile iterum aperuisset, ac præterea ulceris curationum impedivisset.

Erat visu mirabile, quod, postquam varix inexpectato apertus tantum sanguinis copiam profuderat, erysipelas, aliæque symptomata mox evanuerint, & ulcus, de die indiem melius habens, intra tres septimanas solius prædictæ placentiæ opæ profusè coaluerit.

Ego jam temporis minime mihi propositi originem ac medelam varicis, ulceris, ac erysipelatis tradere, quandoquidem illud in observatione sexta primæ Decadis satis accurate prædictum sum, & mihi semper, si cuiquam alii, præter his cocta mors est.

Sed animus mihi est hic loci per experientiam confirmare, quod dixi & egi in primæ Deca-

dis observatione sexta, quam indubitatum nempe si erysipelas ac ulcus originem suam trahere ab acido, & quam opportune instituerim sectionem varicis in ulcere illo tibia varicosa.

Hæc autem sine ullo negotio ex allato exemplo deducuntur, nam nec erysipelas nec ulcus, ullis remediis cedebat, quamdiu varix ille tanta nigricantis & absque dubio mora sua aciescentis sanguinis copia repletus erat, & quam primum sanguis ille peccans effluerat, erysipelas evanvit, ulcusque non longo post coaluit. *Johan. Adm. Præc. Chirurgica rationalis Decad. 1.*

HÆMORRHOIDES.

Curationes.

Quamquam sanguinis omnis fluxus periculosissimus sit, is tamen, qui ab hæmorrhoidibus est, si modum servare videatur, consuevit læpenumero prodesse. Advertit insuper Hippocrates a diuturnis sanato hæmorrhoidibus, nisi una servetur, aquam intercutem vel tabem imminere: hæc autem certo superveniunt, cum immoderate fluunt, aut ichores inde exudant, ut pluries experientia comprobavit.

Tument autem & rubent nonnumquam hæmorrhoides, & dolorem acerbissimum afferunt, inò & capiti gravamen cordi, & pectori oppressionem, stomacho nauseam, & alvo duritiem pariunt. Huic incommodo variis occurrere consueverunt Medici: conferentiora verò putantur linimenta ex oleo vitellorum ovorum, lenium lini, buxi, balsamini, balsamo sulphuris Rulandi, lacte aureo sambuceo, unguento linariæ, populeo, & malorum insanorum. Scribit Henricus ab Heers, seipsum à Castrensi Pastore edoctum, expertum esse, minimum quid scrofulariæ, sive radicis, sive foliorum cum cibo aut potu assumptæ, statim dolorem hæmorrhoidum sedare. Hartmannus, & Horstius maxime faciunt linariam, quam in linimentum redigunt cum vitello ovi. Et apud Riverium Paqueus ex Arnaldo Villanov. summè commendat infusum millefolii in aqua fervente, & per mensem integrum epotum. Chelidonium minus mirabile prædicat in omnibus hæmorrhoidum vitiis Solenander. Millepedes effert Quercetanus, & Hæferus, in oleo nucum excoctos. Alij ex illis oleum conficit Borellus, illudque sæpius in die frigidum admovent dolentibus umentibusque hæmorrhoidibus. Hartmannus nititur decocto scarabeorum rotundiorum in oleo lini, itemque cinere suberis cum axungia cari, vel oleo myrtino. Decoctum rapsi barbati, malvæ, althææ, parietariæ, & quatuor anodynorum efficax aliis dicitur; itemque corpora alba sub cineribus cocta, & cum butyro recenti subacta instar cataplasmatum. Helmontio commendantur annulus dentis equi marini, & morientium sudor, quo hæmorrhoides, & extuberationes quascunque solo contactu comprimi, & complanari scribit. Oleum ex floribus sambuci, vel ex cortice ejusdem interiori in oleo seminum lini, vel up-

cum incocto cum modico croci ex voto aliquando feliciter profecit. Cardilucius in Hartmannum, excellentissimum se expertum dicit emplastrum Apollolicum, quod dolorem sedet, & sanguinem effluere sinat.

His præterea immodice fluentibus medentur millefolium infusum; radix scrofulariz, tormentilla, bistorta, C. C. ustum, ut & suber essentia mart. in aqua sempervivi stillatitia, & alia sistendo sanguini opportuna superius relata. Constat Solenander pilulas ex bdellio, trochiscis terræ sigillatæ, & carabe, cum liquore & seminibus cotoneorum ex aq. rosar. expresso; quas mirabiles fatetur scribit etiam, tribus feminibus genitæ maneat quotidie sumptis, hæmorrhoidum, & cunctis sanguinis profluvium sisti; itemque epota aq. stillatitia chelidonii, aut etiam (quod tutius ait) vino, in quo chelidonium ipsum fuerit maceratum. Externe vero fluentem sanguinem cohibere referuntur fumigationes ex thure, aloë, mastiche, pice, carabe, verbasco, foliis quercus, crepitu lupi, qui solus siccatus, & venis sanguinem fundentibus admotus, remedium est: fluxum quoque inhiberi ex croco mart. infuso testantur alii: & Heurnius pulvere colchotariz, seu vitrioliusti, si tangantur inquit, Irid. Hofmannus, hæmorrhoides tuberosa radice chondrilla, siccantur, si chondrilla siccatur, corrumpuntur, si coriumpatur; quare sub camino exiccandam consulit. Cingulum conficit Hartmannus ex foliis hellebori nigri recentibus, quo nudum corpus circumdari ait succellu felicissimo: atque hoc etiam cohiberi etiam menses immoderate fluentes. Succus plantaginis injectus cæcis quoque hæmorrhoides sanare fertur. Lotio ex urina propria, mox fumus sulphuris per tritorium exceptus dolori, & fluxui aliquando medela fuit, ex Velschio. Cætera alibi ad sistendum sanguinem descripta ex vitriolo, alumine maris, opio, hic etiam adhiberi possunt.

Si denique à suppressis hæmorrhoidibus mala in corpus universum proficiantur, ac propterea opus sit illas referare, indeque sanguinem elicere, præcipuum erit elixir proprietatis paracelsi simpliciter etiam infusione paratum. Conferunt pariter pilule Aloëphanginæ, Ruli, Rhafis, Aloë, croco, & succo absinthii subacta, & quidquid ex Aloë est compositum. Interim adhibenda quæ venas ipsas emolliant, ac relaxent, uti potissimum sunt balnea ex decoctura laxantium herbarum, malvæ, althææ, anethi, violarum, quatuor apodynorum, & similibus. Post hæc solent nonnulli foliis ficus, aut frondibus parietaria illas perficere. ut sanguinem deponant. Id ipsum alii tentant succo cæparum aloë misto. At cavendum ne nimio affricu partes illæ exasperentur, & inflammationem contrahant quam non raro gangræna comitatur: quamobrem satius erit medicamentis internis sanguinis exitum promovere, vel ejusdem vitium moderari; externis verò blandioribus uti. *Lucas Tozzi Medic. Pract. lib. 2.*

De Hæmorrhoidum fluxu.

N. B. Hæmorrhoides diuturnæ non sunt statim supprimendæ, metu reuexus ad nobiliores partes; unde phthiseos, hydropis, canceri maniz, epilepsiz, aliorumque gravissimorum morbo-

rum impenderet periculum. Fluxus itaque non astringentibus illico sistendus est, sed potius revulsiōne, sanguinis acrimoniæ correctione, totius partium corroboratione, &c. sentim inveniendus.

Victus sit refrigerans & humectans. Vesceatur ut plurimum carnibus elixis juniorum animalium. Alterentur autem iuscula boragine, bugiosso, portulaca, agrion. plantag. pimpinell. pomis, trifolio, acetosa, sylv. fruct. herber. addit. C. C. ebore, dente equi marini, rad. chin. tormentill. Hiant aut in aqua sapisissime chalybeata, vel saltem in lebere terreo. Colatura acidula reddatur cum sp. vitrioli corallat.

Notandum, ea esse in cibo danda quæ non sunt, dūræ substantiæ, sed quæ facile pertranseant, & non solia reddant excrementa; siquidem durities fecum maxime noxia in hoc affectu. Ova sorbilia, succus carniū, sorbitiones crebræ maxime conveniunt. Abstineat ab omnibus acerbis, salis, præcalidis.

Potus sit psilana cum chipa, rasura dentis hippopot. ebore, C. C. rad. tormentill. glycyrrhiz. Pomaceum cum isdem & rad. hipendul. scrofular. major. &c. paratum, ita ut cum iis fermentatio. Amygdalata, & emulsionem ex quatuor frig. sem. maj. in aqua chalybeata, addit. sem. plantag. sophiz chirurg. & portulac. Julapiz item v. g.

2. Ros. rub. p. iij. flor. veton. rub. p. iv. violar. borag. bugloil. an. p. ij. rad. tormentill. 3 iij. sant. citrin. 3 j. aq. fontan. purissim. lb. iv. cum sp. vitrioli corallat. q. s. f. tinctura. Colaturæ adde tertiam vel mediam partem pomacei, & saccharo edulcoretur.

Somnus convenit visceribus, ut labor articulis: propterea cavendum à vigiliis & lucubrationibus quæ sanguinem acunt & fluxum augent. Somnus omnes fluxiones sistit, excepto iudore & seminis fluore.

Exercendum moderate corpus ante pastus, & abstinentum a vita nimis sedentaria.

Ad faeces ex primis viis eliminandas injiciatur clyster leniens cum cassia vel elect. lenitiv. Decocto autem admiscenda sunt roborantia & astringentia quædam, ut dum liquor enematis faeces educit, qualitas intestino impressa renascatur, verbi gratia, ros. plantag. sophia, alchymul. &c.

Validiora purgantia noxia: Conveniunt syr. ex cassia, violarum solutiv. de pomis solutiv. cum tamarind. polypod. cass. sem. sem. & rad. violar. Prima laxantia cum manna. Horum ope (si alias alvus non respondeat) toto curationis decursu faeces, antequam nimis induruerint, subducendæ sunt.

Revulsio, præsertim in plethoricis, tentanda est per phlebotomiam brachiorum sæpius iteratam in parva quantitate: id alius per cucurbitulas sæpiissime regioni hepatis applicatis.

Chalybs sive ferrum, specificum in hoc affectu remedium non est, obstructions viscerum tollens, atram bilem (nam hoc morbo laborantes plerumque sunt hypochondriaci) domans & plurimum dulcificans, viscera roborans. Incipiendum à syrupo de scorïa ferri vel aq. chalybeato cum cichor. tormentill. scrofular. hipend. portulac. plantag. prunell. yinc. per vine,

vinc. alchymill. &c. Inde veniendum ad vinum vel cerevisiam chalybeatam. Parentur autem ex croco Martis aperient. parato ex ferro, non ex chalybe; vel ex battitura ferri. Tandem f. progressus ad substantiam Martis, inter cuius præparata maxime in hoc casu convenit ferrum cum aceto præp. Ex hoc fieri possunt Electuarium vel pilulæ, addit. margarit. corall. &c. sumend. mane per longum tempus. Horum medicamentorum formulae sint huiusmodi.

Scoria ferri decies ignita & extincta sit in succo plantag. & portulac. addita vin. alb. Rheum. tertia parte. Pulveris huius postea exsiccati.

℞. ʒvi. rad. sic. scrofular. maj. filipend. tormentill. an. ʒj. rad. cichor. tapl. barbat. an. ʒi β. sem. sophia chirurgor. plantag. an. ʒβ. rasur. dent. hippopot. C. C. ebor. an. ʒiij. santal. citrin. ʒij. Omnia præparata macerentur in q. s. succ. depurat. bugloss. acetosell. sylv. granator. ceras. cydon. & vin. alb. supereminentiam viii. digitor. Postea coletur, & cum sacchar. rosar. q. s. f. syrupus. Sumat cochlear. ij. unoquoque mane ad dies plures ex aqua tapli barbati, portulac. plantag. & ros. rubr.

Cerevisia medicata ferrata pro potu ordinario in hac forma instituat.

℞. Rad. chinæ ʒj. rad. verbasci sic. ʒvi. rad. feniculi, asp. ragi, rusci an. ʒiv. rad. scrofular. major. ʒiij. rasuræ dentis equi marini ʒv. battitura, ferri in vino Hispanico sexies extinctæ, atque in porphyrite cum aqua rosarum pulverizata, sacculo inclusæ seorsim ʒj. nuc. moschat. num. vi. cerevis. lupulat. galon. vi. fiat, ut artis est. Bibatur per mensem unum vel alterum.

Si vinum magis arriserit, eadem in vini q. s. infundantur. Colaturæ bibat ʒiv. bis in die.

Electuarium tale sit.

℞. Conserv. ros. rubr. & flor. tapl. barbati an. ʒi β. flor. papav. rhæad. ʒj. pulv. rad. symphyt. major. tormentill. an. ʒiij. scrofular. maj. rasur. dent. hippopot. an. ʒβ. C. C. ʒii β. magister. perlar. corall. an. ʒiij. ʒi tinctur. corall. chalybeat. & sap. cydon. an. q. s. f. Electuarium. Dosis ʒj. cum chalyb. vel ferr. per acetum præp. ʒj. m β. f. bolus mane sumendus per dies plures sensim augendo chalyb. aut ferr. ad ʒij.

Vel ℞. Magister. corall. & perlar. dulcis (forsan satius esset ad dulcificationem ista communimodo præparata sumere) croci Martis corallini, gum. arabic. an. ʒj. Excipiantur pauca conf. mororum rubi idæi. f. bolus mane sumendus, & sæpe repetendus.

Vel Pilulæ chalybeat. formari possunt ad hunc modum.

℞. Salis tart. crystallini ʒj. corall. rubr. triti in alkool cum aq. menth. & absinth. gran. xv. succin. alb. præp. bol. Armen. præp. croci Martis corallini. alb. an. gran. xii. gum. Arab. gran. ix. cum succo liquido. sive extracto glycyrrhizæ mellagineo f. massa, ex qua form. pilul. viii. deglutienda mane hor. 4. ante prandium.

Aquæ spadeses & minerales acidulæ multum valent in hoc affectu.

Coralli syrupus sic fit.

Coralliata item magnæ sunt efficaciz, ut syrupus, magisterium dulce, & tinctura corallini.

℞. Corall. rub. opt. lavigat. ʒiv. acet. acerrim. succ. limon. an. ʒvi. macerentur in timo per dies xv. ad tincturæ extractionem, coletur, colaturæ adde succi depurat. cydon. ʒiv. succi fragor. moror. rub. Idæi sylvest. an. ʒij. sacchar. ros. dimid. ponderis, f. s. a. syrupus, cui indatur nodulus continens nuc. moschat. ʒij. santal. citrin. ʒij. Dosis cochlear. ij. mane & vesp. per.

Tinctura rosarum rubr. opem haud leviem confert, præcipue si extrahatur in aqua duodecies chalybeata & filtrata, & acidula reddatur cum spiritu vitrioli, addito syrupo rib. betaber. moror. corallor. aut julap. Alexand.

Julapium item seq. haud contemnendum est medicamentum.

℞. Succ. urtic. alb. ʒj. aq. ros. ʒiv. sacchari ʒj. f. julap. utendum bis in die cum aqua hordei.

Hæc sunt medicamina præcipua quæ interne exhibere soleo, & in quibus curationis symptomatis huius spem summam colloco. Neutiquam vero omittenda sunt Topica, quæ vel inflatas hæmorrhoidas externas discutiant & earum dolorem tollant, vel earundem fluxum nimium sistunt; vel hæmorrhoidum internarum (cæcarum dictarum) dolorem leniant.

Inflatas hæmorrhoidas externas discutiant & earum dolorem tollunt sequentia.

℞. Unguent. popul. (quod potentius præparabitur cum succis hyoscyam, cicuta; mandragoræ, solani, thramoni spinosi Indici) ʒij. cochinelæ (quam speciosam in hoc morbo asserit Rhedus) in alkool lavigatæ in porphyrite ʒij. plumbum ex mercurio facti, sive mercurii per plumbum odorem coagulati in tenuissimum pulverem reducti ʒβ. m β. & diuturna agitatione si unguentum applicand. & bombace, & continuo gestandum.

Vel ℞. Ol. lini puriss. & limpidiss. q. v. rad. bulbos. Telephii (Anglice Oram dicti) quantitatem convenientem: Hæc recentes detersæ non lotæ incidantur & terantur in mort. marmor. mox ollæ parvula fictili indicæ cum oleo, vel potius lapideo vasi opprimetæcto vel obrutato immittantur cacabo aquæ ferventis pleno, & bulliant per sex horas continuas; f. fortis expressio olei servandi ad usum, qui erit intincta pluma tubercula lidendo, & sumendo floccos lana nigræ circa ovis nates sive podicem crescentes, ex qua lana formetur pulvillus, qui tinctus & imbutus oleo prædicto applicetur.

Si sanguis discuti nequeat, vènas opplens, rumpentur, & effluet sanguis; in minus, detumescent vènz, & cessabit dolor.

Efficacius autem unguentum erit, si aut succum exprimas ex radicibus, & cum oleo mixturæ coquas ad succi consumptionem, aut radices novas contusas eidem oleo ter quaterve indas, coquas & exprimas.

Vernix, qua pictores utuntur, est remedium singulare in curandis hæmorrhoidibus tam apertis, quam latentibus: at si apertæ fuerint, & nimis tenaciter vernix cuti adhæreat, idcirco

tur ol. rosatum. In ista autem vernice tingatur pannus lineus & admoveatur. Hujus usus sanatus est Carolus quintus à muliere, cum nulla ope curari posset.

℞. Unguent. popul. ℥j. cassi. fistul. recenter è canna extract. ℥ij. mucilag. sem. psyll. & cydon. extract. in aq. tapli barbat. ℥ss. albi Græci ℥ij. m. ss. & agitentur diu multumque in mortario plumbeo, f. linimentum applicandum è bombace.

Vel ℞. Unguent. popul. ℥iiij. vernic. liquid. ex ol. sem. lini & gumm. juniper. fact. ℥ij. sacchari Saturni, albi Græci ana ℥vj. opii in aq. scrofular. vel tapli barbati dissolut. & inspissat. ad mellag. ℥v. m. ss. & adde usus tempore vitellum ovi crudum.

Fol. scrofular. maj. cum butyro in forma cataplasmat. ano applicata hæmorrhoidas externas purgant & dolorem sedant.

Denique oleum seq. ad hæmorrhoidas est specificum.

℞. Scarabæos in stercore bovis repertos numero 50. asellos vivos numero 200. rad. scrofular. majoran. succulent. per taleolas sect. rad. chelidon. minor. ana ℥iv. succi tapli barbati, solani hortensis an. ℥vi. succi cicutæ, mandragor. baccar. solan. somnif. an. ℥iiij. olei lini recentis ℥bj. medull. crurum bovis ℥iv. sperm. ceti. ℥iiij. Bulliant. simul ad succorum consumptionem & ingredientium putrilaginem, deinde f. expressio fortis, & servetur pinguedo, quæ cum æquali portione unguent. popul. mixta servetur in pyxide plumbea ad usum. Applicetur ex bombace. Ex isto litu addita cera poterunt formari suppositoria ad necessitatem.

Ad fluxum immoderatum sistendum utiliter externè admoventi possunt sequentia.

℞. Unguent. populei ℥ij. mucilag. sem. psyll. & cydon. extract. in aqua plantagin. & sperm. ranarum ℥ij. ss. osium humanorum ad summam albedinem calcinat. ℥vi. bol. Armen. croci Martis astringent. sang. draconis, sang. human. vel bubul. desiccati & subtil. pulverizat. an. ℥ss. vitell. ovorum numero 2. sacchari Saturni ℥ij. m. ss. & longa agitatione f. Nutritum applicandum ano cum bombace molli. Vel.

℞. Plumbi albi (vide de sumenda residentia præcipitata in parando lacte virginali) ℥ss. cretæ ℥ij. croci Martis astringentis, lap. scissilis (ardoise) an. ℥j. f. omnium alkool excipiend. unguent. popul. agit. diu in mortario plumbeo, & f. linimentum satis durum applicandum bis in die ex linimento carpro. Posset excipi partibus duabus vernicis pictorum, & una unguenti populei. Vernix autem præparetur ex ol. lini ℥xii. terebinth. Venet. ℥iv. sandarac. puriss. sive gum. juniperi ℥iiij. Liqueantur simul lento igne.

℞. Cochlear. limac. in viribus collect. mundat. & in elibano exliccat. ℥j. cum ℥j. butyr. recentis agitetur tamdiu in mortario plumbeo donec f. linimentum.

Item aselli, vel æs ustum cum ol. rosar. agitat. in mortario plumbeum unguenti instar.

℞. Suberis q. v. uratur, & in pulverem redigatur, qui mixtus cum ovi albumine applicetur.

℞. Terr. Sigillat. boli Armen. trochisc. spod. de carabe an. ℥j. succi urtic. alb. ℥ss. alb. ovorum q. f. i. litus quo ungatur anus ter in die.

℞. Ros. rubr. summit. rubi, verbasci, caudæ equinæ an. manip. j. cor. g. anator. balust. nuc. cupress. aluminis ana ℥ij. aqua plantag. ℥ij. f. decoctio ad ℥bj. Colaturæ adde mell. rosac. ℥j. f. f. otus.

Experimentum Patris Ottonai. Pulvis quidam instar fursuris qui adhæret filici, ceterach, osmundæ regaliz vino alb. vel aqua Rosar. locus humectatur, mox pulvere aspergitur.

Balneatio in aqua fabrorum multum juvat.

Anus abluatur decoct. virg. aut. sanguinar. vinc. pervinc. sanguisorb. &c. parat. In aqua chalybeat. & compergatur Cornu Cervi calcinato.

Suffitus fiat ex eodem decocto cum dimidia parte aceti projectis in scoriâ ferri caudent. excipiend. in sella perforata.

Cataplasma lumbis potest applicari ex argilla emollita succis plantag. portulac. sophiæ & acet. ros.

Si ab hisce fluxus immoderatus sisti nequeat, tunc rebus desperatis veniendum ad ferrum candens quo venæ sunt urendæ & cauterizandæ: quo casu venam unam intactam relinquere sæpe necesse erit, ne fluxu omnimodè simul suppressio pars aliqua ex nobilioribus pœnas luat.

Si sanguis ab hæmorrhoidibus internis immoderate fluat, quæcunque ex prædictis commodè ano injici vel indi possunt, similem his ac externis opem conferunt.

N. B. Ubi aliquid indendum est ano quod partes affectas tangat, sumatur tantum sebum cervinum, damæ, vervecinum, &c. ex quo, ut statim docebitur, præparato poterunt projici in modulos suppositoria variæ magnitudinis, quæ unguento populeo aut vernice liquida delibata immittantur ano.

Sebum sic præparetur.

℞. Tapli barbati florem album gerentis totius minutim concisi man. ij. foliorum hederæ terrestres, chelidon. majoran. totius ana man. j. rad. scrofular. majoran. & chelidon. minor. an. ℥ij. rad. hyoscyam. concis. ℥ij. capita papav. albi majoran. numero quarto aqua vel succ. rosar. plantag. solan. ana ℥ss. axungie suillæ recent. ℥bj. sibi cervin. ℥iv. Coq. ad herbarum putrilagin. & liquorum consumptionem, f. expressio fortis pinguedinis ad usum dictum.

Quoniam autem hoc genus hæmorrhoides cæcæ dictæ, cum non fluunt, sunt admodum dolorificæ, sedari potest dolor à seq.

℞. Emuls. sem. papav. alb. fact. cum decocto fol. tapli barbati. ℥iv. mucilag. sem. foenugræc. & psyll. extract. in aqua solan. ℥. unguentum popul. cum vitel. ovi dissolut. ℥ss. m. ss. pro injectione faciendâ, quæ quamdiu fieri poterit continuabitur, bis in die tepide.

℞. Sebi hircini, vel, si desit, alterius q. f. ad formandum suppositorium; huic adde opii ℥ss. Alliga filo; immitte ano, dolorem tollit.

collit, somnum consequenter conciliat, qui si sit nimius, extrahatur.

Unguentum anodynum potens sit ex succo stramonii & axungia, formantur veluti suppositoria quæ induuntur ano. Compescunt dolorem hæmorrhoidum quasi miraculo. Stramonium autem sumatur spinosum Peruvianum. *Theodor. de Mayerne Præcor Medica lib. 3.*

Hæmorrhoides narium, de quibus Marcus Aurelius Severinus aureo tractatus de recondita abscessuum natura; ut & hæmorrhoides uteri de quibus alii, hic non describimus, quia si quid in ejusmodi morbis agendum veniat, ejus materia in curationibus, consultationibus &c. ad ani hæmorrhoides facientibus, abundè sufficitur. Jam itaque continuo ad

Consultationes

Hæmorrhoides sine dolore fluentes.

Quæ sine dolore describuntur manantes hæmorrhoides, crææ sunt & interiores; quarum nihil putem foras prominare.

Hæ autem cum jamdiu & supra annos duodecim abundantius fluere consueverint, omnino suppressi non debent, ne tandem inconmoda sequantur quæ Hippocr. commemorat & metuit. At vero cum immoderatus illarum fluxus jam vires obterit, & jecur impendio refrigerat, ex quo icterus, & fortasse cachexia jam apparet, & impendet: illas certe cohibere non modo utile, verum in primis necessarium videtur. Sic tamen ut tertio, quartove mense quiddam profluere sinatur.

Cohibentur utiliter in hac descripta corporis constitutione, non revulsione per venesectionem à cubito, aut per cucurbitas hypochondriis affixas, non pulveribus, conditis, aut potionibus adstringentibus, sed hisce levissimis remediis, quæ profutura non dubito. Itaque si quæ purgatio necessaria videbitur non alia conveniat quam quæ ex rheo constitat.

℞. Aquar. rosar. & arnogloss. ana ℥ i β. in quibus infunde rhei elect. ℥ iv. cinnam. elect. ℥ j. in expressione dissolve rheubarbari elect. pulverisat. ℥ ij. syr. ros. siccor. ℥ β. fiat dosis.

℞. Plantag. centinod. rosar. rubr. balsat. stor. an. pug. j. fiat decoctio in lacte ad ℥ j. in colat. dissolve bol. armen. farin. fabar. an. ℥ i β. f. clyster in forma pultis, quem diu teneat, & iteretur bis, ter aut quater, si non satis primus cohibuerit: si miscella major placebit, addetur sanguis draconis. Juvabit etiam cataplasma extrinsecus podici adhibere ex bol. armen. optim. quæ in aceto, & arnoglossis, & ovi candido sit dissoluta, aut in succo plantagin. & centinodi, qui etiam in clystere conveniet.

In victus ratione vitanda sunt vina vinosa, admodum tenuia, & quæcunque alimenta sanguinem inflammant. Parcè vivendum, ne vires: jam imminutz nimio cibo premantur, neve sanguis supra modum increseat. Vitanda exercitatio vehemens, & quæcunque sanguinem ac spiritus inflammant ac exagitant. *Joh. Heroldus in Consiliis Medicis.*

Fluxus hæmorrhoidalis præter naturam. Dolor vehementissimus in pectore cum hypochondriaca affectione.

Reverendissimus Abbas, annum agens quinquagesimum primum; temperamenti totius, & potissimum febris calidi & sicci ex Parentibus hypochondriaci natus; & ipse multis abhinc annis eadem affectione hypochondriaca molestatus; & quandoque moderata sanguinis per hæmorrhoidas evacuatione cum sui levamine tentatus, quinque jam mensibus elapsis; post graves atque molestissimas animi perturbationes; fluxu sanguinis ex hæmorrhoidibus abundantissimo atque superfluo correptus fuit quo in animi deliquia incidebat, eoque suppresso; statim supervenit intensissimus lævæ partis thoracis dolor, difficilem reddens anhylum ipsum; cum ejusdem pectoris fervore maximo; quod tempore urinam copiosum; crudam & aquosam mungebat; & sedato dolore, febricula levis insurgerebat, quæ primo aut altero die solvebatur. Hæc autem omnia symptomata & affectiones ter hucusque reperierunt, semper præcedente aliqua molesta animi motione, & præterea quodam pondere in podice ad perinæum quoque sese extendente, non sine aliquo dorsii dolore & ventriculi imbecillitate. Modo quamvis ad finem mensis Junii jam pervenerimus; Patavium tamen se contulit, ut à gravissimis jam dictis symptomatibus ope medica præservari possit.

Abbatem Reverendissimum multis abhinc annis hypochondriacum fuisse & esse ex relatione tum à Viro Excellentissimo in scriptis adducta; tum ab eodem Reverendissimo ore tenus exposita necessario deduci potest; præsertim addita totius & jecoris calidæ intemperiei, ætatis, & naturalis ac hereditariæ dispositionis consideratione; quinimò cetera graviora symptomata de quibus nonnullis abhinc mensibus conqueri cepit, non aliunde quam ab hypochondriaca affectione ortum duxisse decerno; & præsertim superabundantem sanguinis per venas sedales effusionem, necnon dolores in lævæ pectoris parte cum ardore & cordis oppressione, præcedentibus rugitibus abdominis, non sine aliquo dolorifico sensu ad dorsum quoque perveniente, hisdem tamen etiam citra thoracis dolorem frequenter repetentibus; cum enim jecoris fervor naturalis à clausuris etiam & impedita ventilatione adauctus; propter mesenterii obstructions, à quibus flatuosa orta fuit affectio, & inde dolor ad dorsum usque pertingit, ubi scilicet ejusdem mesenterii duplicatura alligatur; cum, inquam; jecoris fervor sanguinem fervidum necessariò producat, nec ipse à corde calidiori existente corrigi possit, in vasis ita justo calidior & actior congestus, utpote ad carniū generationem & totius nutritionem ineptus; dum circulando ad mesentericas arterias pervenit, nature molestus, ab eadem irritatus per eadem vasa, indeque per hæmorrhoidas

dalia ad sedem detruditur, quibus vasis repletia sequitur pondus, quod perinæ quoque communicatur; imo quandoque monet Gal. quod lumborum & stomachi dolores antecedere solent, sicque hæmorrhoidalis sequitur ipsius sanguinis per sedem excretio, quæ tunc toto genere præter naturam non est, quotiescunque tempestive fiat: tempestive autem fit, quando id quod contristat excernitur. Cum autem in casu nostro probus quoque sanguis copiosus post improbi evacuationem excernatur, t. g. p. n. evadit huiusmodi evacuatio, eoque magis, cum niger non appareat, tunc enim Melancholicis magnopere prodesse solet, dum natura atrum humorem sanguini permixtum ad vasa sedis excernit, ut ad crura varices. at sanguis profluens talis non est, & copia peccat, robur, id circo viscerum naturalium totiusque vires prostermit. Quoniam vero ab eodem jecoris & hypochondriorum fervore ventriculi quoque concoctio labefactatur, dum fermentatio ciborum, quæ est via & præparatio ad chylicationem absolvendam, a nullo illo calore probe perfici nequit, hinc fit ut frequenter cruditates inde sobolescant, quæ antiquis & exiccatibus obstructionibus in mesenterio existentibus superadditæ atque commixtæ, eo loci stagnantes plures molestos & perniciosos effectus pariunt: primo namque ab eodem calore in halitus crassos & exhalationes magna ex parte conversæ, sinistri lateris cruciosos pariunt dolores; dum vero aut per porositates, aut per vasa ad musculorum intercostalium intersitia sese insinuant, distensione ac morfu illarum partium continuum solvunt, & dolores excitant, quo eodem tempore & febricula, & crudæ urinae copiosæ excretionibus observantur, dum earundem cruditarum portio relicta, partim in eodem ignobili loco fermentatur atque putrescit, & febriculas accendit, partim a fervore liquatur atque funditur, & per copiosas urinas ejicitur, quæ omnia tunc exacerbari videntur, quando animi passiones, motusque vehementes præcesserunt, cum perpetuo verum sit quod non solum corporis, sed multo magis animi motus sit causa caloris; ut propterea mirum non sit quod molestiarum tempore circa præcordia de æstu & insigni fervore conqueratur Reverendiss. Abbas.

Cui ut opem medicam feramus, vitium sanguinis potissimum, deinde & vasorum sedalium est corrigendum; jecoris & hypochondriorum calida intemperies est emendanda; antiquæ terrez & melancholicæ obstructiones sunt alterandæ & imminuendæ, & ante jam dicta omnia, ventriculus & primæ viæ a recentioribus cruditatibus sunt vindicandæ, adeo ut quod primum fuit in intentione, postremum evadat in executione.

Et quamvis fons malorum, nempe hypochondriaca affectio antiqua & confirmata sit, salus tamen desperanda non est, cum hucusque non nisi ad primos gradus Melancholicæ pervenerit, & ideo non nisi per exiguam melancholicæ sanguinis portionem circa viscere naturalia stagnantem opponamus; præterquamquod superabundans sanguinis evacuatio, si non ex toto suppressenda, saltem magna ex parte cohibenda est, alioquin calore nativo

progressu temporis valde imminuto, Cachexia succedere posset: hanc enim per hæmorrhoidas evacuationem tantopere formidavit ipse Gal. ut nulli ex consuetudine convenire existimaverit, ac propterea dixerit non esse attemptandum hominem; evacuationi per hæmorrhoidas, quoniam uterque excelsus periculosus evadit, sive sanguinis nimium effluat, sive nihil.

Quamprimum igitur Reverendiss. succurrendum; nec obstat anni tempus calidum, siquidem post prima administrata remedia, hoc tempore nondum existente, reliqua, implete alterantia & refrigerantia, fervidissimo quoque exequi poterunt. Expientur itaque primæ viæ portio ex manna clarificata. Quinque deinde sequentibus diebus cruditates in iisdem viis cominorantes præparandæ erunt Julapio acer. ad 3. ij. corticibus citri alterato, addita unciâ aq. flor. citri, ut dilutor, & suavior evadat. Mox repetatur potio ex manna clarif. ad 3. vi. cui duabus aut tribus transactis horis, superbibat seri capr. depur. lb. j. & duabus horis ab assumpto sero prandeat. inde ad antiquas obstructiones imminuendas deveniendum, quæ quoniam jam exiccatæ sunt, ideo humectantibus & moderatis incidentibus egent; in hunc igitur finem succi depur. aptissimi erunt.

Ut 4. Succi depur. & per aren. trajecti, cich. borag. endiv. an. 3. j. salis tartari fixi gr. x. decoct. in jure pullæ paratæ folior. malvar. viol. fouchi 3. v. m. pro syr. & sic pro alis. Et si fortasse decoctio a ventriculo non toleretur, cum aliquam concoctionem, & consequenter moram requirat, succi jam dicti diluantur cyatho aq. stillat. borag. & malvarum: citius enim e ventriculo ad mesaraicas perveniunt. Sequenti vero die præbeantur summo mane flor. cass. 3. ij. additis gr. x. salis tart. & post horam superbibat cyathum seri capr. aut asin. depur. tribus vero horis ab assumpto sero prandent. Tercio vere die rursum succos depur. assumat, ut supra, & ita perseveret alternatim, succos & cassiam assumendo, ad xx. vel xxv. dies Rhabarbari autem usum omisso, tum propter hypochondriorum fervorem, tum vero maxime propter sanguinis fluxum, quod alioquin cassia commixtum ad obstructiones referandas aptissimum foret. Interim secunda succorum die Jecoraria dextra erit aprienda, & sanguis moderate, prout excellenissimo Assistenti visum fuerit, erit educendus, quotidie toto Purgationis tempore unguento ros. Mel. totum abdomen illineandum.

Terminato succorum & cassiæ usu, serum capr. aut asin. depur. ad lb. iv vel v. ser. saltem tertio quoque die erit propinandum, præmisso vehiculo syr. ros. solutivi, idque eo fine, ut hypochondriorum partes humectentur, viæque laxentur, & apertæ reddantur ad aquæ nocer. transitum expediendum, siquidem c. lozem, & inde siccitatem primarum viarum interceptionis aquæ thermalis alias tentata, causam fuisse cenfeo. Nocerianas autem dixi propinandas esse, quoniam cum minerales non sint, nec adeo exiccantes, facilius perire & pervadere poterunt;

terunt; & si earum aliqua protio forte detineretur, nocere non posset, ut nocent thermæ, quæ nunquam, teste Hippocr. à natura nostra actuantur & superantur. Ut autem facilius eisdem reddatur transitus, tribus primis diebus cum vehiculo dejectorio sunt exhibendæ; reliquis vero diebus cum vehiculo diuretico, quale tutius esse poterit spiritus tart. ter rectif. ad semidrachmiam in primis tribus cyathis, cui addatur quoque syr. de succo limonum, ut potus quoque suavior evadat.

Tandem lactis asin. xx. diebus, totidemque capr. usus de more mane assumendi opportunissimus erit; quod tempore pro balneo aquæ dulcis, aut infusione administranda opportuno existente convenire poterit; sin minus, in annum venturum, dum reliqua quoque omnia repetenda erunt, differri poterit, ut ex toto obstructions extirpentur, jecoris feruida intemperies emendetur, & sanguinis vitium omnino corrigatur, sicque à natura toleretur, imo in vasis ad usum detineatur. Sed quoniam valorum quoque sedalium vitium, sive laxitatem nonnihil concurrere dixi, ideo opportune aliqua iisdem roboratio est afferenda, spungiola aqua rosacea cum albumine ovi madefacta, quæ pulvis astringens tangatur, & post sæcum depositionem atque consuetam absterisionem podici iterum atque iterum apponatur, ut pulvis ipse adhæreat, & iteratis vicibus vasa ipsa roborentur; pulvis autem erit constrictivus magistralis consuetus, eidem gypli vulgaris portione addita.

Jam dictis vero omnibus congruam vitæ rationem addere debet, & calidiora alimenta præsertim evitare, prout salita omnia, condimenta aromatum, allii, caparum, usum aceti & vini generosa, memor quod sumeripsum status insigni humectatione & moderata refrigeratione indiget; & ideo familiaris sit & quotidianus usus juris tenuis herba aliqua refrigerante alterati, in prima mensa hauriendi; herba autem poterit esse æstivo tempore oxalis, acetosa vulgo dicta, cæteris vero temporibus intybus, endivia vocata. Somnus diuturnior semper conveniet. Exercitium vero moderatum esse debet, & non nisi jejuno ventriculo. Consuetæ alvi evacuatio, nisi sufficiens fuerit, adjuvanda, prima mensa assumendo flor. cass. ʒ. ij. aut iiii. quam disponere quoque poterit jus prima mensa, ut supra, quædædam sumptum. Tandem animi motus vehementes, qualescunque sint, avertendi, sed præsertim molestæ perturbationes, quæ si casu occurrant, non sunt fovendæ, sed forti animo repellendæ. Quæ omnia Reverendissimo Abbati à Deo opt. max. salutaria precor. Raym. Joh. Fortis Consilio & respons. Medicin. Tom. 2. Cent. 3.

Fluxus hæmorrhoidalis quem supprimendus?

Illustrissimus Co. annorum quadraginta, temperamentum à primordiis usque ætatis calidi & sicci, feruidioris & sanguis, & hepatis, habitus potius gracilis, varia semper

passus est excedentis caloris inconmoda & symptomata, nam decimo quinto anno, dum Romæ degeret, repentino dolore sub planta pedis sinistri in mediâ parte, metatarsi elevatione, correptus est, postquam fere momento secuta est elevatio cuticulæ, cutisque ipsius ad instar velicæ nigrescentis violaceique coloris; quæ ferro adaperata, magna effluxit corruptorum humorum iluvies, quæ semper & per partem præscriptam perseveravit non solum, sed & per externum talum ejusdem pedis & cruris per duos circiter menses, cum valorem insuper per totum crur percurrentium extensione & infiltrationem, cum evidenti & manifesto periculo omnimodæ mortificationis totius cruris, adeo ut proposita fuerit non semel ipsius cruris sectio; attamen adjuvante valida virtute, quaque fervente juvenia, & remediorum usu, post quartum circiter mensem convalescit, remanente solum in cicatrice obducta, restituta parte, aliqua motus difficultate. Cumque jam prospera frueretur valetudine, circa annum vigesimum incidit in naris sinistra frequentem hæmorrhagiam, quæ etiam perseveravit ad trigesimum usque annum, cum quæ in vigesimo octavo; tempore Autumnali, dum in paludosis locis versaretur, febris tertiana duplici correptus est, quæ licet curata ex Arte, non tamen convalescit, sed in duplicem conversâ est quartanam, cum quæ cicatrix jam obducta, & tanto temporis intervallo in affecto talo confirmata, iterum sponte adaperata est, emanante ex ipsa pellucido, ad instar crystalli, acrimordacique liquore, qui & febrem per sex menses toto cursu comitatus est non solum, sed profectus. Post per aliquod tempus ex quo integre liber evasit, & abolita, ut dictum est, trigesimo suæ ætatis anno descripta naris hæmorrhagia, coepit trigesimo sexto, nullo ante præcedente vel sensibili dolore, vel quavis alia offensa ac molestia in exoneranda alvo statim in principio sanguinem, & rubicundum quidem & satis consistentem, affatim & cursim, modo per binos, interdum per plures veluti rivulos effundere, dum scilicet in primo impulsu redduntur fæces alvinæ; quo tempore aliquo delapsu intestini, protuberant foras cum ipso intestino oscilla valorum, cessatque statim ipsa fluxio ut plurimum per se post primam iniciatam expressionem, vixque in continuanda exoneratione sæcum stilla aliqua educitur. Cogitur tamen Patiens Illustriss. partem intestini aliquo pacto foras expressam auxilio quodam intrinsecus, & illico finitur effluxio. Semper itaque in principio exonerationis sarcinæ præcurrit sanguis emungitur in progressu, ex toto cessat in fine; nec tamen modo prosecuta est talis sanguinis effusio solum toto tempore æstivo, nec continebat, accidebatque hyemali tempore, etiam si violentioribus motibus immoderateque exercitu, ut pote Venationibus, summe indulgeret Illustrissimus. Verum proxime præterita hyeme non dissimiliter ab ætate, passus est fluxionem ipsam sanguineam; unde vix est sensibilibus detrimentum recepisse, & quoad vires ipsas, & quoad corporis totius nutritionem cum vitiatum colore, non naturali & solito, videatur inhiere totum corpus. Jure itaque majora extimescens pericula, medica exposcit auxilia.

Harar.

Hæmorrhoidalis affectus apprimè à Præstantissimo Viro in relatione delineat, fluxum sanguinis præter naturam, quia copia peccat, necnon earundem hæmorrhoidum excedentem, incommodam atque molestanti molem cum intestini descensu sub se continet. Et primo fluxus sanguinis quod sit t. g. p. n. non est dubitandum, quoniam non solum quod contrahit, excernitur, ut considerabat Gal. sed quod excernitur, contrahit, cum universo corpori congruum & necessarium nutrimentum detrahat, vires prosterneat, & viscerum naturalium calorem debilitet, adeo ut cum postremo præterito hoc anno, non solum æstare, ut antea, sed præter consuetudinem etiam hyeme perseverare inceperit, cum evidenti totius corporis detrimento, summa cum ratione inde deducendum sit, Comitum Illustrissimum impoiterum semper in pectus laesurum, & progressu ad atrophiam & Tabem, vel ad Cachexiam & Hydropem deveniturum, nisi ope medica succurratur: eoque facilius, cum hæmorrhoides, tumentes, laxa ac ponderosæ factæ fuerint. Verum quoniam ad sanguinis suppressionem & ad hæmorrhoidum exicationem devenire non licet, nisi maturo iudicio considerata & ablata causa, ne mala succedant, ab Hippocr. prænnunciata, nempe quod A diuturnis sanato hæmorrhoidibus, nisi una servetur aperta, periculum sit Hydropis, aut Tabis; idcirco radices altissimas plantam huiusmodi habuisse & conservare, prudentissime innuit in relatione Sapientissimus Vir: cacochymum etenim sanguinem, & biliosis ferocitatibus refertum fuisse etiam in tenella ætate manifestum indicium præbuit abscessus in pede, diu perdurans cum copioso & pravo humorum affluxu, Gangranam minante: quo ablato, paucis post annis narum hæmorrhagia successit, annis decem per intervalla perieverans, ut causa, bona, ut signum vero mala, dum sanguinis praviratem quæ à natura tolerari non poterat, nobis significabat; sed cum calor in sanguine ultro processerit, & ad exustionem pervenerit, ideo febrem duplicem tertianam primo excitavit, quæ in duplicem quartanam spuriam, ut pote ab exustione productam, degeneravit: cujus exustionis signum præbuit serum acidum, & ut aqua pellucidum, quod ad pedem jam primis annis affectum pervenit, & cicatricem tunc temporis obductam & confirmatam, propria acrimonia & aciditate rursus referare valuit, quod eo usque ab eadem cicatrice effluere & emanare perseveravit, quousque Quartana ipsa perduravit. At quoniam huius cacochymi sanguinis radices nunquam extirpatæ fuerunt, hinc factum est quod natura tandem pro totius massæ sanguineæ depuratione, ad venas hæmorrhoidales aperiendas converti fuerit, per quas sanguinem adustum, ac fæculentum, utpote à valis alviariz regionis defluentem deponere & extraducere solet, quæ quidem naturæ intentio optima est, at effectus sæpe malus, cum temporis progressu viis lubricis, & venarum osculis laxatis, uno quandoque callosis redditis, post exitum pravi sanguinis, probus quoque sequatur, ut modo contigit Viro Illustr. quem ætatis ratione, jecoris

& cordis calore causto & intensiori reddito, acriori quoque & adultiori sanguine scatere necesse est, & idcirco magis tumulata & irritata natura non solum æstare, sed hyeme quoque, & quovis anni tempore sanguinem pravam ad illam partem detrudere non cessat.

Quid igitur in hoc ancipiti casu nobis agendum? dum Comitum Illustriss. inter Scyllam & Charybdim vitam ducere videmus: uterque enim excessus, dicebat Gal. Hippocratem secutus, periculosus est, si ve sanguis nimis, si ve nihil effluat. Ex una parte habemus Hippocratem alicentem, unam hæmorrhoidam esse apertam servandam: insuper nos monet, quod sanguinis venis laborantibus medela intempestive adhibita, multa mala producat: Ex altera habemus experientiam, quæ multoties demonstravit nobis, sanguinis ab una tantum hæmorrhoida aperta provenire profuvium. Præterea difficultatem quoque non exiguum expertus sum in occludendis aliquarum venarum orificiis, ita ut unum tantum apertum servaretur, & sæpe in vanum laboratum est, Aëgris interim ad exitum tendentibus. Quare ego in casu præsentis, omnino suppressendam esse huiusmodi hæmorrhoidalem evacuationem, si possibile fuerit, censeo, ut quæ ex consuetudine corporibus non debeatur, & quæ tandem Virum Illustriss. in perniciem ducere possit; & idcirco in huiusdi statu consulit idem Hipp. Ferramentis candentibus urendas esse, donec resiccata fuerint: urere enim oportet, subdit, & nullam hæmorrhoidam sine unctione sinere, sed omnes exurere. Et ratio quæ movit Hippocratem ad sibi metipsum contradicendum, fuit, quod superflua & abundans sanguinis effusio certe Patientem interimit, suppressa vero ex toto, hydropis, aut tabis periculum inducit; quod periculum ut præcaveatur & evitetur, docet modum ipse Gal. in illo com. dicens. Medela importune adhibetur, quotiescunque neque vena per circuitus aperiatur, nec purgationibus & exercitiis utantur, aut una aperta non relinquatur; quæ eadem præservatio accuratissime & summa cum prudentia præscripta fuit etiam ab Actio, Medicos illos irridente, qui sanguinis profuvium ab hæmorrhoidibus salubre asseverabant, usque ad Patientum interitum.

Dixi tamen superius, ex toto suppressandas esse, si possibile fuerit, quoniam difficilis sæpe & operosa semper evadit huius intentionis executio, siquidem quod primum est in intentione, ultimum debet esse in executione: prius enim primæ viæ sunt expiandæ. Secundo Massa sanguinea ab impuritatibus vindicanda. Tercio sanguis ab hæmorrhoidibus revellendus. Quarto Jecoris intemperies calida corrigenda. Quinto ipsius sanguinis, acris & acida qualitas edulcoranda; atq. tandem vasa hæmorrhoidalia occludenda & roboranda, nimiaque moles excidenda.

Quibus intentionibus ut satisfiat, bis saltem sanguis à superioribus venis parce educendus, & duobus Lenientibus congruisque Præparantibus primis viis expurgatis, ad usum succorum refrigerantium sanguinemque depu-

depurantium erit deveniendum, nimirum cich. borag. acetosæ, & in fine etiam plantag. in decoct. cichorac. additis foliis plantag. violarum, portulacæ & hepaticæ. Quanto vero aut sexto quoque die elective purgans medicamentum erit exhibendum, ex infusione rhabarb. senæ, & myrobalan. cum syr. rosato; aut ex Cassia cum electuario lenit. de iucco rosarum, & granis magist. Mechoac. paratum; quibus serum aut aquam Nocerianam copiosam superbibat. inde de aquis theriacalibus acidulis cogitandum; inter quas vitriolatæ, aut aluminosæ hic principem locum habent: Chalcanthum enim in sanguine sistendo prærogativam obtinet, & ideo in Valle Solis nascentes optimæ forent. Sed si itineris incommodum evitare cupiat, aut domestica negotia non permittant, substitui poterunt aluminosæ Brandulenses, quæ à fonte delatæ vim & facultatem propriam conservant. Aquis autem assumptis, succedat lactis primo alimini, mox etiam caprii usus ad quintam intentionem explendam. Et interim postremæ in tentationi incumbendum, altringentibus, roborantibus, & molem resiccantibus. Igitur post fæces exoneratas, præsto sit albumen ovi quo spongiola imbuta illiniatur, hæmorrhoides, & præsertim orificia vasorum, deinde statim pulvere astringente aspergantur, ita parando, nempe ex pulvere magistrali contritico, addito quoque pulvere gypsi, idque quotidie repetendum; eodemque tempore reliqua hæmorrhoidum massa alia spongiola madefacienda, imbuta aqua, ita parandi.

℞. Vitrioli Rom. calcinati ꝯ. ii. aq. rosar. plantag. an. ℥b) β. m. infund. per xxiv. horas, deinde fiat colatura, quæ servetur ad usum præscriptum.

Jam dictis vera omnibus congrua & cauta erit addenda vivendi ratio, quam super omnia commendat cum Gal & ipse Aetius; hæc autem à Præstantissimo viro Adstanti erit præscribenda, simulque bis saltem in anno, Phlebotomia præcipienda, & cætera jam dicta ab eodem nec corrigenda. *Idem ibidem.*

Hæmorrhoidalis moles cum Ulcere.

Consultationes I.

Illustrissimus atque Reverendissimus Antistes quadragesimum octavum annum agens, temperamenti totius ad calidum & siccum vergentis, feruidi jecoris atque cordis, habitus gratioris & fusci coloris, arduis semper negotiis implicatus, & longis itineribus deditus, multis abhinc annis hypochondriacus fuit, eodemque tempore usque in præsentem diem hæmorrhoidalibus affectionibus obnoxius, quæ prioribus annis adolescentiæ dolores eidem Illustriss. inferebant, quia cæcæ tunc temporis erant hæmorrhoides ipsæ, sicuti isdem ad apertis itinerum occasione, dolores irruere cessarunt, semper tamen paulatim earum moles tantum augmentum suscepit, ut modo acini uva figuram repræsentent, & quatuor abhinc annis consuetæ fecalis evacuationis occasione, omnes extra mittantur, nec adeo facile mox intromitti possint; quæ interim præterito tempore quando-

que etiam sanguinem effuderunt. Verum postquam mense Augusti proxime præterito duplici Tertianâ fuit correptus, jam tumefactis hæmorrhoidibus dolor accessit, qui exacerbatur semper post fæcum depositionem, & plures horas, quandoque integrum diem perseverat; qui dolor utpote acutissimus, Virum Illustriss. Patavium ad me impulit, qui, facta loci diligenti inspectione, primo vidi hæmorrhoidas ad prædictam molem perductas, sed lividas & fere nigras, nempe atro sanguine repletas, sicut niger & crassus ex vena antea missus observatus quoque fuerat. Præterea in superiori parte versus coccygem, corosionem, ulcus præferentem & alias inferius leviores excoriationes observavi.

Quod ab ineunte ætate Præsul iste Illustriss. melancholicam dispositionem nactus fuerit, mirum non est: cum à nativitate cor ipsum feruidum, & jecur præcalidum sortitus fuerit, nec mirum pariter quod hujusmodi dispositio majus in dies augmentum suscepit, & ab immodicis exercitiis atque itineribus peractis, & à perpetuis animi applicationibus, quæ omnia viscerum dolorem intendere, sicque sanguinem exitum reddere potuerunt.

Quoniam vero provida natura totius massam sanguineam depurare totis viribus conata fuit, hinc factum est ut nigri & adusti sanguinis portionem ad vasa hæmorrhoidalæ deposuerit, quibus repletis, hæmorrhoidales dolores distensivos immature excitaverit, qui erumpente sanguine, quodammodo cessarunt. Verum quoniam Curatio, nimirum totius massæ sanguineæ depuratio, feruidæ viscerum intemperiei correctio, & vasorum hæmorrhoidalium roboratio neglecta fuit, ideoque invaluerunt semper quotidie magis & causæ morbiticæ, & pravi effectus, quandoquidem & sanguis niger, atque crassus, in vasis mesentericis stabulans, Melancholiam hypochondriacam firmavit, & ab eodem conspurcata massa sanguinea vitiatam reddidit totius nutritionem, naturaque stimolata, ejusdem atrii sanguinis portionem ad hæmorrhoidas perpetuo, non solum per intervalla sanguinis excretiones tentare coacta fuit, verum superioribus, postremis annis tanto cum impetu atque copia fuit sanguis effusus ut deficiente nutritione, fere ad Atrophiam vir Illustriss. ductus fuerit, qui tamen utpote robustam naturam alioquin sortitus, suppressio sanguine, pristinum habitum recuperavit, sed per interm hæmorrhoidum malo quotidie magis augescente

Tandem postquam mense Augusti proxime præterito biliosa febre correptus fuit, ab ipso febrili calore visceribus ipsis una cum sanguine super excalefactis, irritata natura ejusdem acriorem & magis acidam portionem per modum crisis ad hæmorrhoidas deposuit, quæ sua activitate vasa ipsa erodere valuit, & ulcusculum in superiori parte versus coccygem, aliasque leves excoriationes extrinsecus excitare: unde dolores atroces procedunt, qui exacerbantur à fæcum depositione, dum à fæcibus ipsis comprimuntur

vasa

vaia, & exprimitur ichorosa, acris & acida materia, quæ labia ulceris attingens, dolores infert, & ad cæteras hæmorrhoidas extrinsecus expansa, alias, sed leviores, excoriationes inducit.

Est quidem gravissima hæc hæmorrhoidalis affectio, non solum ratione causæ conjunctæ, verum etiam ratione antecedentium: naturales enim sunt viscerum intemperies, tota massa sanguinea atro sanguine infecta, & moles hæmorrhoidalis insignis & pravo colore affecta, quæ omnia ulcus iam contractum & excoriationes fovere valent, imo necessario foveant. Quare Curatione eradicativa opus habet, quam anni tempus non permittit, & ideo ad Ver venturum est differenda. Interim urgent dolores, qui attrahendi novos humores vim obtinent, & præterea vigilias inducendo, corpus extenuandi; ut propterea Hippocrat. Vigilias veraces appellavit; & quod magis ac pejus est, si moles hujusmodi hæmorrhoidalis adhuc à doloribus augeatur, calor naturalis partis, adeo à fronte remotæ, non adeo faciliè humores ipsos, multos & pravos regere & custodire poterit; ideo usque ad illud tempus diligenti cura & prudenti custodia opus est, ut dolores quidem leniantur, sed calor naturalis partis conservetur, & exsiccantibus pars ipsa à putredine & corruptione custodiatur.

Pro leniendis doloribus, materia illa ichorosa quæ a sæcum compressione foras exprimitur, omnium primò detersionem expostulat, ut citius & facilius & ulcus, & erosiones demulceri possint; id. utem procuretur spongiola madefacta vino tepido dulci, in quo capita papaveris ebullierint; vel aqua hordeacea, in qua pariter papaveris capita & rosæ ebullierint, addita mellis ros. simpl. porzione. Illiniri quoque poterit unguento populeo, additis gut. ol. Jusquiami; quod si præsto non fuerit, reformetur unguentum cum ol. nenupharum. Sed in usum quotidianum ducatur balsamus Saturei, ut qui refrigerandi, exiccandi, roborandi & unilendi quoque, imò & demulcendi facilitates obtineat. At nullo modo erit omittendus ignis usus, admovendo prope parte in laminam ferream omnino ignitam, adeo ut pars ipsa citra dolorem atque molelliam excaleat & exiccetur. Duæ igitur parentur laminæ ferreæ, ut altera admoveatur, altera interim igniri & repeti possit.

Quibus jam dictis congrua erit addenda victus ratio, humectans atque refrigerans, alimentorum boni succi, facilis coctionis & distributionis, ut facilius proximo verno tempore mesenterii obstructions referari, massa sanguinea purificari, intemperies viscerum corrigi, & tandem moles hæmorrhoidalis, aut valde immui, aut ex toto deleri possit. Interim tamen non erit inutilis usus emulsionis ex amygdalis & seminibus melonum, frequenter, vel summo mane, vel prima mensa assumenda, ut humorum prava qualitas quodammodo emendetur, eorum nimium acrimonia & aciditas edulcoretur, sicque minus acute hæmorrhoidas ipsas feriant. *Idem ibidem.*

Ab Hæmorrhoidibus Præservatio.

Consultationes II.

Quamvis Melancholiam hypochondriacam tot annis confirmatam & consummatam superare velle vanum videatur, eoque magis, cum tota massa sanguinea eodem humore melancholico sit infecta, adeo ut & hypochondria cum toto, & totum cum hypochondriis communicationem habeant, sibi que invicem materiam suppedient; nihilominus hanc & illam non parum diminui posse pro certo habeo, ita ut facultas expultrix ab atro sanguine minus molellata, minus quoque impotenter ad hæmorrhoidas expellat atque deponat, sicque illuatur. Vir non parum ab hæmorrhoidali affectu saltem levatur, si non omnino vindicari possit; præterquam quod ab aliis quoque plurimis Melancholiz hypochondriacæ symptomatibus multo minus divexabitur.

In hunc igitur finem primæ viæ à crudis humoribus sunt mundanda, Secundo Mesenterij obstructions aperienda. Tertio Massa sanguinea purificanda. Quarto Jecoris & hypochondriorum servor contemperandus; atque tandem hæmorrhoidum cura est habenda.

Pro prima intentione, primum Leniens erit potio ex syr. ros. solut. rec. & ex manna clarif. vel flos caliz. cum lenitivo. Primum præparans erit hujusmodi.

℞. Julap. acer. ʒ. iij, aq. florum citri ʒ. j. m. pro. syr. & sic præp aliis quinque. Quibus succedat hujusmodi Leniens.

℞. Syr. ros. solut. de polypod. an. ʒ. iij, aq. florum citri parum, m. f. p. vel præbeat elect. lenit. cum rartato, quibus superbibat jus hordei.

Pro secunda intentione, medicamenta aperientia debent esse humectantia, non exsiccantia, non calorigica; siquidem & cruditates jam exiccata, & sanguis ipse à calore crassior est factus; & in horum vii diutius persistendum; multo enim difficilius est humectare siccum, quam exicare humidum; quare succi herbarum depur. humectantes & aperientes sunt in usum ducendi ita.

℞. Succo depur. & per arenam trajecti. cich borag. pom. dulc. an. ʒ. j. decoct. in jure pullæ paratæ malvarum, violarum, lupulorum, sonchi ʒ. v. m. pro syrupo. Sequenti vero die assumat summomode flor. caliz. ʒ. ij. & post horam superbibat jus pullæ foliis malvarum, borag. & sonchi alteratum, tribus vero horis ab assumpto jure prandeat. Tertia vero die repetat succos, ut supra, & quarta florem caliz. cum jure, sicque alternatim perseveret ad decimum quintum usque diem. Quo tempore assumat potionem hujusmodi.

℞. Rhabarb. opt. ʒ. j. fol. senæ mundat. ʒ. iij. cianam. integri. ʒ. j. aq. cich. q. f. m. f. inf. per hor. xii. deinde f. fortis expressio, & expressio. ni adde syrup. ros. solut. ʒ. v. m. f. potio, cui, tribus transactis horis, superbibat seri capr. depur. aut aq. Nocet. ʒ. ij. duabus vero horis ab assumpto sero prandeat. Die autem sequenti repetat usum succorum aperientium ita.

℞. Succo

℞. Succī depur. & per arenam trajecti, cich. borag. agrim. an. ʒ. j. sal. tart. fixi gr. x. decoct. in jure pullæ factæ, malvæ, lupulorum, asparag. capill. Ven. ʒ. v. m. pro syr. & sic per integrā hebdomadā. Interim hoc tempore Jecoraria dextera erit aperienda, & sanguis modice educendus. Transacta autem hebdomadā, succedat talis expurgatio.

℞. Flor. cal. rec. extr. elect. lenit. an. ʒ. ʒ. Extracti rhab. ʒ. ʒ. m. f. boli, vel repetatur infusum supra descriptum, quibus pariter superbibat serum aut aquam, inde repetat eorundem succorum unum integrā alterā hebdomadā, & tandem quoque idem medicamentum purgans, modo descripto; & toto jam dicto tempore illiniatur quotidie totum abdomen unguento ros. malvino.

Pro tertia intentione explenda, rursus aliorum succorum usus erit opportunus ita

℞. Succī depur. fumariz, borag. pomorum dulc. an. ʒ. j. salis tart. volat. g. x. decoct. in jure pullæ ci. h. endiu. agrim. fumariz, lupulorum ʒ. v. m. pro syr. & sic pro aliis quindecim; in quorum intermedio assumat hujusmodi medicamentum.

℞. Flor. cal. rec. extr. ʒ. v. elect. de succo ros. ʒ. i. extracti senæ, polypod. an. ʒ. m. f. boli, quibus post horam superbibat seri capr. depur. aut aquæ Noct. ʒ. ii. quod idem medicamentum repetatur in hunc. interim primis diebus dictorum succorum aperiatur vena magis apparens brachii sinistri, & sanguis parce, prout Excell. Adstanti videbitur, educatur.

Quartæ intentioni satisfaciendum aquis stillatitiis potius, quam thermalibus, tum quia exiccantes esse solent, tum quia ab illarum copia facile calor nativus obrui posset; quare sat fuerit.

℞. Aquæ stillat. de succo cich. ʒ. x. julap. viol. ros. an. ʒ. j. m. pro potu matutino quindecim diebus summo mane assumendo; cui præmitti quoque poterit Conseruæ rosarum cochlear unum. Post hæc nullo vero modo omittendus est usus lactis asinini, ut quod & obstructionum reliquias valde exiccatas humectare & superare possit, & præterea jecur refrigerare, totamque massam sanguineam edulcorare valeat; in cujus usu quadraginta saltem diebus insistendum.

Tandem hæmorrhoidum cura est habenda, quæ, præsentē dolore, Anodyna requirunt, jam à me in altera Consultatione satis propoſita: absente autem dolore, exigunt exiccantia, non tamen adeo valida ut nimis attingendo & corrugando dolores suscitare possint, lat sit igitur, quod dum fæces deposuerit, ablavantur hæmorrhoides vino nigro tepido, in quo ebullierint folia verbasci, ros. rub. myrti & plantaginis; valebit enim earundem molem imminuere citra serositatum suppressionem.

Hisq; jam dictis omnibus congrua victus ratio, intentionibus medicis atque medicamentis jam propoſitis proportionata, necessario addenda erit, ab excellentissimo viro adstanti singillatim præscribenda, ut ad multo meliorem statum redigatur vir Illustrissimus atque Reverendissimus, quem eidem optimum à Deo ex corde precor. *Idem ibidem.*

Hæmorrhoides tumentes, & magnopere dolentes.

Nobilissima Mulier annum agens quadragimum quintum, temperamentum sublinguinei biliosi, habitus potius gracilis, annu decimo septimo suæ ætatis Viro nupta, statim concepit, & in partu tuberculum quoddam circa venas sedales externas contraxit, non tamen valde molestinum; sed succedentibus annis quibus pluries enixa, decem & novem edidit partus, tuberculum jam dictum non modo majus atque molestinum sibi redditum observavit, verum & plura alia proxima enata fuisse, cum intentis doloribus percepit, quorum occasione intumverunt hæmorrhoides, tum externæ, tum internæ, vehementes dolores inferentes, neque sanguinem fundentes. Convenerunt Medici pro sedandis doloribus, & hæmorrhoidibus ipsis extirpandis & desiccandis, non tantum locis medicamentis, sed humores divertendo, repetitis sanguinis ex superioribus partibus educationibus, quandoque massam sanguineam a biliosis humoribus vindicando medicamentis electis ve educentibus; quandoque acrimoniam eorundem demulcendo, refrigerantibus & Anodynis, aquis nimirum, herbarum decoctionibus & diuturno lactis asinini usu, verum omnia incassum administrata; perdurant enim tumores, perseverant dolores, & præsertim in exitu scum, siue compressione, si durescentes fuerint, siue acrimonia & morſu, si liquidiores. Quare pro tanto malo inveterato, si non ex toto auferendo, saltem paulatim imminuendo, medicum auxilium implorat.

Microsam Nob. quoniam in tenella ætate concepit & peperit, non sine valido nixu partum edidisse credendum, cujus occasione portio feruidioris sanguinis ad partes sedales transmissa tuberculum primum excitavit: quod forsā neglectum, in sequentibus partibus magis intumuit, & alios humores ad sedem evocavit, concurrentibus quoque in edendis fortibus conatibus atque laboribus: unde alia quoque tubercula emerſerunt, cum venarum sedalium intumescencia cæcas hæmorrhoidas constituinte. Et quia calor & dolor sunt dux potissima causæ attrahentes, Mulier vero nobiliss. cum ob proprium temperamentum, & forsā etiam non adeo caute vivens, feruido, bilioso, & tandem etiam crasso & adusto sanguine abundet, idcirco facilis fuit ejusdem sanguinis attractio & ad venas sedales transmissio, qui exitum querens, & non inveniens, in isdem vasis diutius stagnans, crassus adeo jam factus fuerit, & ad motum ineptus, ut Arte quoque adaperitis vasis, prodire non potuerit, sed intus manens, sui copia vasa distendens, & acri, & acida qualitate mordicans, perennes dolores conservat: qui majores & minores redduntur, prout magis, vel minus mordicat humorem confluxus, & quotidiana fecalium instrumentorum depositio; magnopere autem foveri & augeri solet ejusmodi fluxio in illis Mulieribus, quibus Menstrua immatura suppressa aut imminuta fuerint; de quibus in relatione nulla sementio.

Ab hoc malo adeo confirmato nob. Mulie

rem liberari posse, non solum difficile, sed impossibile arbitror, præsertim in hac ætate in qua Menstrua deficere solent, & natura sæpe redundantem sanguinem pravum ad venas hæmorrhoidales deponit. Augetur difficultas quoque, spesque immittitur, quoniam ex relatione generosiora & propria administrata fuisse remedia percipio. Nihilominus auxilium nunquam ægris est denegandum; & ideo nonnulla agenda, à me aliis non inutiliter experta, infra scripto ordine executioni mandanda præscribam. ut scilicet primæ viæ ab excrementis liberentur. Secundo Humorū acrimonia demulceatur. Tertio Jecoris, & sanguinis calor contemperetur. Quatto Dolores remittantur; atque tandem, si possibile fuerit, ut tumentes hæmorrhoides resiccentur.

Pro prima igitur intentione, primum Leniens erit syr. ros. & violat. solut. vel flos cassiæ. quibus superbibat jus copiosum hordeo vel malva alteratum. Præparans erit Julap. acet. syrupo de pomis temperatum, & transacta hebdomada, Leniens superscriptum erit repetendum, cui superbibat serum cap. m. aut alin. depurat. ad libras.

Pro secunda intentione, alterans hujusmodi erit in usum ducendum.

℞. Succī depur. malv. ʒ. ii. pom. dulc. ʒ. j. decoct. in jure pullæ paratæ endiu fonsch. viol. plantag. passularum, jujub. ʒ. iv. m. pro syrupo, & sic pro aliis; & quarto quoque die hora una ante dictum syrupum assumit flos cass. ʒ. iij. & tribus horis ab assumpto syrupo prandeat; ni hujus usu insitit xv. diebus. Mox vespere hora 1. ante cenam assumat seminum. m. floris cassiæ; sequenti vero summo mane bibat lac asinum ad heminas, nimirum ad lb. iij. quinque horis ante prandium, & hoc idem ter repetat tertio quoque die, vespere Cassiam assumendo, & summo sequenti mane lac bibendo.

Inde pro tertia intentione explenda, lac arte factum erit ita parandum.

℞. Semin. melon. mundat. unc. j. semin. cucurb. angur. mundat. an. unc. ʒ. juris pullæ unc. vii. m. extrahatur enulsio, cui adde syr. de pom. vel de violis ʒ. j. m. pro potu quotidiano quatuor aut quinque horis ante prandium assumendo; in cujus usu integro mense persistat: sed tertio aut quarto quoque die sub cenam devoret florem cass. ad ʒ. ii. vel iii. & interim hisce iisdem diebus aperiri poterit Jecoraria dextera, educendo sanguinem in ea quantitate quam Medico assenti indicabit major, vel minor crassities, & nigredo ipsius exeuntis sanguinis.

Pro quarta intentione, plura in usum duci solent anodyna & Narcotica remedia, quoniam quæ uni profunt, sæpe in altero nihil præstant; & propterea uni tantum remedio fidendum non est, sed mutanda, & experientia etiam consulenda. Ego igitur sæpius utilissimum expertus sum sequens linimentum, quod & dolores demulcere, & hæmorrhoidas decicare valet.

℞. Unguenti albi Pauli ʒ. j. Popul. ʒ. ij. ol. nenuph. ʒ. ʒ. viol. ʒ. ii. opij. Thebaici, camphoræ an. ʒ. iv. Lithargyri pulver. ʒ. j. m. & in mortario plumbeo diu agitando reformetur

unguentum. Unguentum autem Pauli ita paratur.

℞. Cera dealb. ʒ. j. ol. ros. compl. ʒ. iii. Litharg. Cernisæ an. ʒ. v. ol. an. ygd. dulc. ʒ. ʒ. albumin. ovorum n. j. m. S. A. t. unguentum. efficacissima quoque & præsentanea est talis inunctio.

℞. Ol. nenuph. ʒ. ii. ol. Hyoscyami ex seminib. alb. expressi unc. ʒ. m. pro illinitione hæmorrhoidum; cuius portio, diligenti adhibita industria, poterit etiam ad hæmorrhoidas internas inungi. Quæ omnia cum quoque in usum ducenda toto tenore curationis jam præscriptæ.

Post hæc intentione non adeo facile satisfieri poterit præsentibus cruciatibus ipsis: sed tempore minoris afflictionis. Patetur itaque vinum exiccans hunc in modum.

℞. Baccarum cupressi, baccar. Myrti an. manip. j. radic. plantag. aquatice, radic. consolidæ an. unc. i. aluminis crudi, camphoræ an. unc. ʒ. contunduntur contund. incitantur incid. & adde vini albi generosi, non dulcis lb. iij. m. bull. ad consumpt. tertie ipsius vini, & colatura servatur ad usum, apponendo hæmorrhoidibus ipsis spongiolam eadem decoctione imbutam. mirabilis quoque est aqua ita paranda.

℞. Vitrioli Rom. calcinati unc. ij. infusionis rosar. solutiva, aquæ plantag. an. lb. j. ʒ. m. infundantur per horas xxiv. deinde fiat colatura, & servetur ad usum, eodem modo, ut supra; applicanda; qua tamen urendum non est, nisi sedatis doloribus, & absente ab hæmorrhoidibus inflammatione.

Jam dictis omnibus congrua erit addenda victus ratio, præscriptis intentionibus proportionata; cavendo ab acerbis, acidis, salitis; ab aromatibus; à vinis generosis; à motibus violentis & corporis, & animi. Provoceatur quotidiana alvi excretio, & faeces humiliores serventur usu frequenti floris cass. ad ʒ. ij. vel iij. sub prandium vel cenam: nec non potu consueto juris malva alterati. Quæ, sicut cætera omnia, à Viris excellentiss. ad fontibus melius suggeri poterunt, ut nobil. ista Mulier minus molestam, uno & alacrem vitam imposterum ducere possit. Idem ibidem.

Hæmorrhoidalis sanguinis fluxus cum Dyspepsia in Hypochondriaco.

Quales fuerint prægressi Morborum labores, quibus anno elapso Excell. summus Venetæ classis Proconsul conquestus fuit, jam tunc expositum est Sapientiz, Rei Medicæ Præstantissime Pater, iisdem fere insultibus proximo Autumno rursus Amplissimus cœpit consistari Senator, à venulis nimirum sedis hæmorrhagia sed longe minori: in abdomine doloribus, cum liquidorum dejectione aliquantisper crebra, vigiliis, iugenti cibi fastidio, siti molesta; quibus omnibus conjuncta non tam levis fuit viri n. labe.

Flatus copiosi, rugitus molesti, cibi fastidium, sitis, vigiliæ, sunt omnia symptomata hypochondriacum affectum concomitantia, qui à venarum sedalium hæmorrhagia confirmatur, dum à clausuris adaucto jecoris & hypochondrii

driorum calore, etiam à nativitate fervidiori existente, in cruditates exiccatas agente, exhalationes inde elewantur, ventriculum intellantes, hypochondria distentes, caput exicantes, & spiritus animales agitates, unde vigilæ, inflationes, dolores emergunt: & excalesfacto quoque sanguine, utpote utitur quodammodo molesto, ad vasa hæmorrhoidalia detruso, hæmorrhagia quoque sequitur. Verum jam dictis omnibus associari deberet alvi itypicitas, cum ea non præter ordinem & supra necessitatem lubrica nimis observetur; quæ mihi suspicionem præbet non solum Bradypeptiæ, nempe imminutæ concoctionis ab imbecillitate privativa, sed etiam Dyspeptiæ, alicujus nimirum portionis alimenti corruptio- nis ab excedente caliditate corruptiva: Quæ omnia ab intentis & continuatis applicationibus, tanquam à causa externa, originem primo, mox recidivam habere potuerunt; ut propterea non sine ratione existimaverit Plato morbos omnes in nobis ab animo provenire posse, dum ab applicationibus distrahantur spiritus a ventriculo, unde cruditates & ob- structiones, & magis magisque incallescunt viscera naturalia, calidæque intemperies au- gentur, quibus duobus crucibus innititur & incedit hypochondriaca affectio, cæterorum aliorum quoque symptomatum fons atque so- boles.

Hujus autem affectionis & causarum cog- nio apud Virum Excellentiss. Assistentem nullo majora & pejora mala præcavere potuit; Vx- namque Illustriss. & Excellentiss. Classis impe- ratori Patienti, si ignorata idea & causis hujus affectus, perperam curatus fuisset. Id autem spem mihi præbet salutis recuperandæ, cum præmissis legitimis intentionibus, præter ad- ministrata, administranda quoque ab eodem medica proponantur congrua auxilia, ut ob- structiones referari, calida intemperies remit- ti, sicque venæ sediles etiam sponte occludi possint.

Quæ ut assequamur, expiatis primis viis levi Leniente, magnopere arridet mihi cassia usui ad ʒ. ij. addito scrupulo rhabari, cui post ho- ram superbibat Excellentia Sua cyathum seri capr. aut alinini destillati, tribus vero horis ab epoto sero prandeat. Sequenti vero die succos depur. assumat cich. endiu. & pom. dulc. ad unc. iij. per arenam trajectos, in decoct. cicho- raceorum, additis lupulis. Tertia vero die re- assumat cassiam cum rhabarbaro, & quarta succos, ita alternatim perseverando ad deci- mum quintum usque diem absque ullo alio pur- gante medicamento, præsertim aloetico, cum orificia ventrum aperiendi vim habeant. Qui- bus transactis diebus, si venarum sed alium hæ- morrhagia importuna esset, de aliqua parca missione sanguinis e venis superiori us cogi- tandum esset, tum ad revulsionem, tum ad ca- loris remissionem. Inde ad usum copiosi seri depurati, cum vehiculo syr. ros. solutivi, decoct. pulpæ tamarindorum deveniri poterit, quatuor aut quinque viis, alternis diebus propin- dus vel ad copiosum lactis alinini usum, d heminas more Hippocratico, quod non so- lum refrigerandi & hu-ectandi, verum & sol- vendi facultatem obtinebit, ut postea, valde im-

minuta dosi, præmissa hujusmodi refrigeratione & hu-ectatione, ad novem vel decem uncias in usum duci possit, ad hoc, ut non solum nutrire; verum & sanguinis acrimoniam & aciditatem moderare atque edulcorare valeat. Verum per- severante ab hæmorrhoidibus sanguinis eru- ptione & alvi superflua hu-ectatione, ante lac- tis alimentis usum acidulæ aquæ terrez pro- pinari poterunt, primis duobus aut tribus die- bus cum vehiculo dejectorio syr. ros. solutivi & decoctione pulpæ tamarindorum, reliquis vero cum diuretico spiritus vitrioli in primis cy- athis; eligendæ autem sunt Villeses, quæ à fonte sine ullo præjudicio devehuntur; quod si hæ præsto non essent, substituuntur Noce- rianæ, quæ cum terram samiam pro funda- mento habeant, præter refrigerationem attri- ctionem quandam & corroborationem in se continent, eoque magis cum vehiculo spiri- tus vitrioli; suapte namque natura sanguinem sistit. Mix, absoluto aquarum potu, lactis usus omnino instituendus erit, addito aquæ dulcis Balneo, refrigerantibus herbis altera- ta. Et dum jam dicta omnia fiunt, abdomen totum unguento ros. Mes. erit quotidie illimen- dum.

Quibus addenda est congrua, non solum victus, sed vivendi ratio, a Viro Excellentiss. Adstanti præscribenda, cujus prudentiæ etiam cætera omnia rite & recte administranda com- mitto; illud unum addendo, quod in ista Re- gione & laboriosa Administratione venturo Autumno Excellentia Sua nullo modo immo- rari debeat: evidens enim ego prævideo ejus- dem vitæ discrimen, cum hæc gravia mala at- que symptomata Autumni tempore recidivare soleant. *Idem ibidem.*

Hæmorrhoidum Dolor.

Juvenis triginta quatuor annorum, tempe- ramento melancholicus, poculis largioribus sæpe indulgens; jam à longo tempore, magnò dolore, calore, & tumore, per intervalla re- currente, circa anum laborat. Interdum san- guinem ex podice emittit, qui dolorem illum a- gnoscere levat. Potissimum autem, ubi alvum de- jicit, durioresque illam habet, dolor ipsum torquet.

Afficitur in hoc agro podex, sive inferior inte- stini recti pars; & præcipue secundum vasa hæ- morrhoidalia ibi existentia: quod ex dolo- re & tumore ibi conspicuo, est manifestum.

Morbus, quo hic ager laborat, est tumor ani, cum intemperie acri & calida conjunctus; qui ingentem dolorem in eo per intervalla, & præcipue dum alvus durior deponitur, ex- itans, Hæmorrhoidum dolor, sive Hæmorrhoidum sup- pressio appellari solet.

Causa præcatartica hujus morbi est potus intemperantia, qua, adjuvante melancholico ægri nostri temperamento, crassi sæculenti & acres humores in corpore ejus sunt geniti; qui antecedentem huic morbo præbuerunt causam. Pars vero eorum per poros arteriarum & venarum hæmorrhoidaliū, ob certam suam insensibilium particularum adspersionem, in partem podici vicinas propulsa, ibique hærens, sua quan- titate & acrimonia tumorem ac doloris, & ca-

lilitate caloris ani est causa continens.

Affligit autem hic affectus per intervalla: quod materia nova, non perpetuo, sed certis intervallis in corpore satis copiose gignatur & aptitudinem talem acquirat, ut in partes ano vicinas propelli satis copiose possit, ea autem materia, quæ in podicem jam ante fuit propulsa, paulatim dissipetur: atque ita inducias hic affectus facit. Dolor autem podicis ab excrementis alvi duris intenditur, quod dura illa excrementa dum excreantur, tumentem podicem quam maxime distendant & premant, ab excretionis sanguinis ex podice levatur dolor, quod, ea imminuat doloris & tumoris causam continentem.

Metus est, ne hic dolor ingentem faciat tumorem, qui in ani fistulam degenerare, & sanguinis totius corporis corruptelam ac hydroperem inducere possit.

Curatio itaque est tempestive aggredienda; quæ in pravorum humorum educatione & correctione, atque in tumoris & doloris ablatione consistet.

Primo itaque, præmisso clystere emolliente, educatur sanguis ex brachio dextro ad ℥viij.

Diende utatur hoc apozemate;

℥. Fol. lactucæ, buglossæ, malvæ an. M. j. Liquiritiæ rase, passulæ. mundat. an. ℥ß. Flor. borrag. bugloss. violar. an. p. ij.

Coquantur in aq. comm. ad lib. j. In colatura dissolvue cassiæ recent. extractæ, syr. violacæ an. ℥j. Misce, F. Apozema, de quo sumat ℥iij. bis in die.

Dum his utitur, adhibeatur podici hoc linimentum:

℥. Cineris combusti suberis ℥j. Vitellum ovi no. j. olei rosacei q. s. F. Linimentum.

Summopere etiam hic commendatur hoc linimentum:

℥. Herb. linariæ cum floribus M. ij. decoquantur ad mollitiem, usque, contusis & cum adipe porcino q. s. coctis, addatur vitellus ovi, ac fiat Linimentum, quod cum gossypio podici dolenti adhibeatur.

Ad doloris levamen hirudines etiam podici adhiberi possunt, usque sanguis ad ℥iij. vel iv. educi.

Ad curationem & præservationem summopere hic conducit aqua, in qua, dum fervet, millesolium est infusum sive maceratum, usus, per mensem continuatus:

Item sacculus, ex radicibus chelidonii minoris, cum gossypio in linteo contusis confectus, & circa os sacrum perpetuo gestatus:

Item tubercula, vel globuli, carduis silvestribus adnascentes, qui vermiculum continent, si in marsupio gestentur, magnopere hic commendari solent.

Dixit hic sit tenuis, ad humidum declinans, & alvum laxans. cum cibis itaque sumantur borrago, blitum, spinachia, malva, passulæ. Aromata & acria vitentur. Potus sit tenuis cerevisia, & vinum oligophorum. Alvus si durior fuerit, ea clystere, ex jure pingui vel ex decocto emolliente, emolliatur. *Henricus Regius apud Theodor. Craanen Medicationum lib. 4.*

Consultationes.

Pro Hæmorrhoidum dolore.

Nobilis quædam Matrona in puerperio doloribus hæmorrhoidum fere semper valde affici solebat, quæ cum multis frustra tentatis remediis, à dolore minime liberari possit, tandem consultum fuit, ut suberem lignum combureret, & cinerem ejusdem cum vitello ovi, & oleo rosaceo linimenti instar simul commisceret, quo remedio ut nobis retulit, dolores hæmorrhoidum miraculo quodam semper sedabat. ego autem in hæmorrhoidibus in quibus cruciat dolor, commode sæpe oleo ovorum solo usus sum, aliquando vitellum ovi cum rosaceo aut viol. oleo subegi: atque iis tantum utebat. *Tetrins Forestus, observat. 5. lib. 23. De Ani affectibus.*

Tria adhuc remedia mihi valde familiaria & probata hæmorrhoidum dolori mitigando destinata proponenda duxi, oleum ex vitell. ovor. rec. extractum, oleum balsaminæ. & unguentum populeonis cum opii modico ac ovorum vitello: quibus digito exceptis anus liniatur. *Jo. Zecchi consule 37.*

Pro hoc malo tollendo balsamum sulphuris ad ℥ß exhibeo: quo calido hæmorrhoidas sæpe maxime post excretionem perunxit, aestatum ab acerbissimo & odioso isto dolore liberans, quæ factus est nam valet hoc balsamum certo in hoc vitio, nec unquam fallit, ut experientia innumera docuerunt. *Martinus Rulandus, curat. 87. cent. 1.*

℥. Unguenti populi ℥j. opii. torrefact. pulv. ℥j. M. applicetur parti. Ad sedandos dolores secretum est oleum sem. lini; item medulla cruris vituli. Unum tamen præ cæteris tanquam secretum propono, & experientia comprobatum est & est balsamum sulphuris, in quo pessulæ iungantur, & applicetur tepide loco affecto, sic balsamum sulphuris ex floribus illius cum terebinthinæ spiritu. in eandem intentionem oleum buxi non minorem efficaciam habet in hunc modum.

℥. Ol. sem. lini ℥ß. ol. buxi ℥j. M. illinantur eo hæmorrhoides.

Si balsamum sulphuris non reperitur, misceantur flores sulph. cum terebinth. multoties in aqua rosac. lota, & loco balsam. sulph. imponatur, habent enim hæc vim dissolvendi, & aperiendi hæmorrhoides cæcas ut effundant sanguinem, quod præcipue procurari solet in hoc affectu in quem usum etiam aliquando applicantur hirudines: aperit quoque hæmorrhoides lac ficulneum, si contricentur folia ad invicem & apponantur. *Rodericus à Fonseca tomo 1, consule 27.*

Hic non celabo quod à Castrensi quodam pastore edoctus sapissimè expertus sum, quis hæmorrhoidum cæcarum infano dolore torqueatur minimum quid scrophulariæ, vel radiceis, vel foliorum, cum cibo aut potu capiendo, statim dolore liberatur, sive ipsam plantæ substantiam siccam aut viridem, sive decoctum ejus adsumat *Henricus ab Heers, obs. 20.*

Refert Otto Heornius radolphum Secundum imperatorem cum immuni hæmorrhoidum dolore

lore cruciaretur, vapore Casei Hollandici Edamensis prunis impoliti ab empirico quodam curatum. in Notis ad cap. 11. lib. 6. Patolog. Jo. Fernelii.

Cum aliis multis & selectis medicamentis non juvabatur, ad balanum ex sero hircino cum opio confectum confugimus, quo dolor evanuit, nec postea rediit, *Amatus Lusitanus curat. 61. cent. 2.*

Post multa & varia à medicis tentata præsidia, hoc remedio à nobis præsentato ulus fuit, & brevi illo infestissimo dolore liber evasit. Habuit autem hoc topicum sic.

℞. Arantium pomum, id cultro excava, in quo oleum rosac. & lavendulæ semina infunde, & ad cineres calidos admove, & calidum applica & sæpe innova, est enim mirum *Amatus Lusitanus. curat. 6. cent. 3.*

Protinus herbæ linariæ cum floribus M. j. aut ij. conquisivi: quibus contusis, & cum adipe porcina coctis linimentum fieri curavi: cui expresso & parumper refrigerato vitellum ovi permiscui, quo postea cum gossipio vel parti dolenti applicetur; quod hujusmodi dolores ad miraculum ulque contestimilit, hoc tanti fecit bene meritis & celestis in Hassia Medicus Dio. Wolhusus (quemadmodum ex ore ipsius habeo) tanquam secretum aliquod illustissimo suo Principi Ludovico seniori Holsæ Langravio toties rogatus, non revelare vellet priusquam ipsi annuatim bovem saginatum promitteret, qua promissione facta, non tantum herbam linariam ei monstravit, sed etiam addendo vesiculam consuetam, differentiam hujus ab esula patefecit: nimirum quod esula lactescat, sine lacte Linaria crescat. Alter per jocum vesiculam invertit hoc modo.

Esula nil nobis, sed dat Linaria Taurum. Gregorius Horstius, obs. 50. lib. 4.

Religiosus quidam mense Augusti correptus est dolore hæmorrhoidum acerbissimo cum tumore insigni, atque inflammatione. Vocatus ad eum, venæ sectionem præscribo ex brachio sinistro, præmisso clythere, postea forum anodynum cum cataplasmate de micapanis, quod ferre non poterat propter exquisitissimum partis sensum. Secundo die iteratur phlebotomia ex brachio dextro, sumptis julepos emollientes, & aliquantulum laxantes, ut alvus liquida servaretur, siquidem feces induratae dolorem admodum exacerbare solent, julepi erant hujusmodi.

℞. Fol. lactuc bugloss. & summitat. malv. an. M. j. liquirit. ras. & passul. mundat. an. ʒij. fl. bugloss. borrag. viol. an. p. j. coquantur ad ʒviii in colatura infunde cassiæ rec. extract. ʒj. colentur iterum & clarificentur addendo syr viol. ʒj. capiat bis in die.

Parti vero sequens unguentum admotum est.

℞. Ol. rosac & viol. an. ʒj. ungenti popul. ʒss. F. Linimentum.

Cum autem tumor & dolor perseverarent, admotæ sunt duæ hirudines hæmorrhoidibus extractusque sanguis ad ʒiiij. & tensio atque inflammatio aliquantulum remissa est. Postea suffumigium sequens præscriptum est.

℞. Semperivi maj. M. j. vini alb. lbij. bulliant, hujus decocti summum recipiat in cathedra perforata. Deinde sequens unguentum parti ad-

moveatur.

℞. Unguenti rosac. ʒj. mercur. crudi ʒij. M. fiat unguentum: quamvis Mercurius eximiam vim habeat emolliendi, & tumorem discutendi, durities tamen in parte permanebat, ideo ad molliendum, ac discutendum tumorem, duo remedia præscripta: prius un fuit suffumigium aceti in quo lincei igniti exstinguebantur, quo scirrhosos tumores emollii. Gal. docuit. Alterum fuit sequens liniment. post suffumigium admoveandum.

℞. Ol. amygd. amar ʒij bdell. & styrac. liquid an. ʒj. M. F. linimentum.

His dolor & tumor singulis diebus multum imminuebatur, cui rei etiam multum contulit decoctum millefolii, quod per biduum sumptis pro potu ordinario cum p. uco vino.

Quia vero alvus continuo ditrida erat, ad eam laxandam, & simul causam antecedentem per epicratin auferendam pilulæ præscriptæ sunt sequentes.

℞. Mass pilul. de bdellio ʒij. sen n undat. rheiel. & agar. rec tro hinc an. ʒj. cum tyrop. rosac. solut. f. n. a. s. pilul. de qua capiat ʒj. Singulis diebus mane, donec massa amara fuerit: & hæc per aliquot dies continuatis omnino convaluit. Suffitus ex aceto ad tumorem discutendum nunc profuit. *Lazarus Rovenius. obs. 7. cent. 3.*

Vir quidem sexagenarius dolore hæmorrhoidum molesto condiciabatur, cum tumore & inflammatione partis, qui multis remediis non cessaret. Præscripti totum ex aq. rosac. in u. us ʒvi. sal. saturat. ʒj. dissolvebatur: qui fortis pluries in die iterabatur. Postmodum cat. platina admotum est ex cepa liba sub cineribus cocta, & cum butyro subacta, partibus æqualibus intra biduum inflammatio sedata est, & tumor magni ex parte resolutus. *Lazarus. obs. 8. cent. 4.*

Ego à muliere stipem emendicante d. d. i. infundere millefolium in aqua fervente, & bibero infusionem illam per mensem integrum, aut diutius, & omnes tali affectu laborantes sanati sunt. Tandem hoc ipsum remedium reperimus apud Arnoldum De Villa Nova. cap. de Hæmorrhoidum doloribus, id ipsum remedium ad fluxum illatum immoderatum valde confert, si prædicto Arnoldo credendum, & ratio etiam suadet. *Petrus Pachegnus. obs. 5.*

Succus vermicularis (sedum minus intelligo) linteolis sæpius madefectis applicatus bene facit: mitius est, si cum hoc succo unguentum populeum miscetur, appliceturque ita dolorem sedat & pruritus tollit.

Elegans est remedium si crassulæ majores (cotyledonis speciem arbitror) prædictæ gentibus primo vere foliis contundatur in pilæ teraturque cum oleo rosac. seponaturque in loco subterraneo aliquandium, tum coquatur in duplici vase ad lentorem, isque illinatur & apponatur. Scrophulariæ etiam radicem verno tempore tundo, & cum recenti butyro subacta sepono aliquot septimanas, rectam in subterraneo loco, deinde coquo & reservo ʒi unguentum istis doloribus aptum. Solen etiam ætate, flores verbasci recentes legere & melle in ampullam vitream, eamque seculam exponere soli, ita p. uis diebus solvantur in liquorem, ut illitus ea idē dolentibus hæmorrhoidibus, iteq.

fluentibus, mirifice utilis est; quod comperi ipso
um probatissimum. Si vero sine insigni calore aut
acrimonia preterea aut tenuiter doleant, tum non uti-
le est refrigerantia adhibere: ea enim distillatum
impediunt, & impactum sanguinem in gis com-
pungunt: sed tum prodest laxantia discutientia-
que admovere, quæ si præter istas facultates,
etiam habeant quod dolorem sopiant, profutura
sunt magis. Hic convenit scilicet opium in aqua
mediocriter calida, quæ incoxit rad. & sol. al-
thææ, malvæ, rad. scrophular. fl. aneth. meliloti,
chamæmeli, & sem. lini: inde absterfus locus
dolens illinatur oleo momordicæ, quod effica-
cissimum est vel oleo ex floribus arboris persicæ,
quo ego sum in isto casu usus magna cum laude.
si desunt, commodissimum erit oleum ex fl. sambu-
ci, sic medius cortex Sambuci oleo simplici,
vel lini, vel nucum incoctus efficit oleum ad il-
lusionem in tumore & dolore hæmorrhoidum sa-
lutare. Si memini *Alexius Pedemontanus*, id idem
quoque annotavit.

Ego accepi lardum vetus rasum, cum cera
recenti aut propoli, ubi habere potuit, & pau-
co oleo lini, addidi corticem Sambuci interio-
rem tulum, inde simul cocta, & colata in aquam
frigidam, assumpsi ad ungendum dolentes hæ-
morrhoides, non inutile, ubi efficacius desuit:
paratæ etiam facile est & commodam, cepa al-
ba cocta vel porrum, & butyro subacta, vel vi-
tellus ovi cum rosac. utilia etiam sunt, quibus
si tantillum croci addatur, efficaciora sunt me-
dicamenta.

Facit aliquando doloris acerbitas, ut stupe-
facientia adhibere sit necessarium, sic opium
aliquando admiscemus linimentis: tamen id
agendum, ne podex narcoticis refrigeratus
non præter officium. Avicenna Philonium quod
Tarsense describit, applicat. Ego sæpenumero
recentibus theriacæ vel mithridatio admotis
& dolorem compescui, & siccata discussa que
influxa materia tumorem sustuli. Sunt præterea
alia medicamenta quæ & nimium fluentibus, &
quia attrictæ sunt, dolentibus utilia sunt: Ego
adhuc adolescens, vidi Tarquinium Schellen-
bergium Medicum Empiricum omne vitium hæ-
morrhoidum curantem chelidonio minore, is
secrete integram herbam siccitam in manipu-
los collectam cerevisiæ macerabat, eamque
propinabat, & aquam ejus destillatam adhi-
bebat lotioni & lotu exteriori per linimenta. Pos-
tea illa herba ego multis modis ad hunc effe-
ctum fecit ut sum usus: succus frequenter illi-
tus fuit, quam aqua: herba etiam trita appo-
sita medetur: flores quidam, alii herbam com-
miscunt, ovi vitello coquunt, & in placentu-
la mane edunt: hæc herba ego ad hæmorrhoi-
dum vitium mirabilem efficaciam tribuo.

Novi Chirurgum apud nos, qui in hæmorrhoi-
dum dolore, tumore, & fluxu, crassulam maj. nec
non scrophulariam herbas integras cum rad.
utriusque part. æq. pota Mj. concisas macerat
cerevisiæ. ea quoque offert mane & vespere biben-
dam: his si chelidoni minoris tantundem ad-
deretur, potio redderetur efficacior: in hatum
enim trium herbarum radicibus, characteris-
mum affectus huius evidenter natura impressit.

Adscribam medicamenta duo, oleum & un-
guentum, quibus ego usus sum antehac, & utor
sæpè, utrumque implicitæ rationis, in altero

tamen scientiæ evidentia major. Conficitur
oleum ex bruchis stercorariis autumno hoc
modo, quod oleum scarabæorum vulgari no-
mine voco.

℞. Ol. lini ℥ij. bruchos stercorarios vivos,
bene pultos, numero 56. eos ordine comprimam
conteroque inter duos politos lapides, atque
contritos, injectosque in oleum coquo lento
igne in vase terreo tecto, ad tertiam partis olei
aut medietatis consumptionem: inde colatum
oleum asservo, in eoque tutæ optime lavigata,
aut pompholigos aliquid dissolvo, quo iungo
hæmorrhoides si in conspectum veniunt, si in-
tus in ano latent, jubeo guttatim per assernam
pennam intillari, dolores sedat, & hæmorrhoi-
des mirum in modum per sanat.

Unguentum ad eundem affectum hoc modo
conficio.

℞. Ol. viol. ℥ii. asellor. in subterraneis &
humidis locis degentium ℥j. (si mediocres sunt
100. aselli ut plurimum ℥j. pendunt) istos in do-
leo, atque in vase terreo leviter coquo, tum
addo ceræ albæ rec. ℥ss deinde colo, & expri-
mo in aquam frigidam, atque subactum bene,
refrigeratumque recondo in usus. Si latent, lina-
mentum in formam glandis involutum isto ob-
litum suppono, atque splenium eodem indu-
ctum superaddo. Si exterius prominent, unguen-
tum in splenio superdare satis est. Desiccat hoc
idem, discutitque magis. Si una aut altera radix
serpentariæ vel ari decorticati & tui oleo sin ul
incoquatur: his ego magno agorum coma odo-
re uti soleo. quæ omnia lubens tibi communicare
volui *Reinerus Solenander. consil. 20. sess. 4.*

Ad hujus affectus curationem, primo sanguis
detrahendus est ex venis brachii, ut fiat revul-
sio a parte affecta: qua sufficienter celebrata,
derivationis gratiæ vena malleoli etiam aper-
ienda est.

Interdum ad humoris acrimoniæ demulcen-
dam, emulsionem quatuor semin. frigid. exhi-
beri poterunt.

Inter topica *Quercetanus* valde commendat
oleum meum expressum, in quo bullierint mil-
lepedes in oleo consummi, eoque dulci, possunt
etiam aselli decoqui, & dolorem mirabiliter
sedant. *Velf.*

℞. Mucilag. sem. psyll. ℥ii. ol. viol. ℥liij. F.
linimentum. vel;

℞. Mucilag. sem. psyll. & sanguæ, cum vi-
no extract. an. ℥ii. butyr. rec. ℥ii. sevi hardini ℥j.
agitentur simul in mortario plumbeo. F. lini-
mentum: vel butyrum solum in mortario plum-
beo ductum ad Solem donec nigrescat, est egre-
gium remedium. Pomata etiam recens parti ad-
mota est valde anodyna.

Cataplasma etiam ex modulla panis albi in
lacte decocti, addendo oleum rosac. & vitellos
ovorum commode usurpatur.

Portulacæ contusa & admota dolorem sedat,
tumorem imminuit, ulcera consolidat, & ex-
crescentias carneas absumit.

Cepa alba sub cineribus cocta, & cum butyro
rec. subacta instar Cataplasmati, dolorem se-
dat, & tumorem discutit.

Lotus admoventur eidem parti, ad dolorem
sedandum, ex decocto raphanibari, malv. bis-
malv. parietar. sem. lini. sanguæ, althææ, fl. cha-
mani & anethi in lacte parato: vel in hydrate,
vel iusculo

vel iusculo intestinorum vervecis : infusus ex eodem decocto, aucta quantitate simplicium, parari potest : aqua frigida pro fotu utilissima.

Ad tumorem discutendum convenit, lotus ex alumine in vino rubro decocto. Aquapendens admoveat spongiam ex aqua calcis expressam, & supra partem alligat.

Ad hæmorrhoides absorbendas & exsiccandas convenit suffumigium ex pulveribus lolii, tassi barbati, scrophulariæ, super prunas coniectis : at efficacius hæc suffumigium, si sulphur simul utatur. imo vero ex sulphure solo suffumigium paratur, & per tubulum exceptum hæmorrhoides cæcas, & latentes potenter exsiccat : mirum in modum confert injectio sequens frequenter usurpata.

℞. Succij plantag. oī. viol. an. ℥iij. balsami naturalis ℥ss. M. l. injectio in anum.

In communi usu est pulmo hædinus ex animal adhuc calens parti appositus.

In his qui huic affectui valde obnoxii sunt cautelicum tioris utilissime admoveatur. *Lazar. Riperius præx. med. lib. 10. cap. 11.*

Succus ceparum cum aloë mistus & panno asperiore fricando applicatus aperit hæmorrhoides. *Jo. Marimannus. Prætic. chymiatr.*

Habet sudor morientium mirificas vires mortificandi hæmorrhoides & excrecentias. *Jo. B. Imminat. ar. cui tit. Latex humor negligetur.*

Ad cæcas hæmorrhoides, quibus affligebatur avus meus, hoc pulv. experimento suo utebatur.

℞. Antimonij pulver. ℥ij. hemodactyl. ℥ss. bol. a. m. ℥j. M. l. pulvis : applicetur cum cotone quoties egeritur. *Achilles Gafferus. obs. 41.*

Ombretrix Gallica lib. 3. pag. 24. medetur dolori hæmorrhoidum etiam gravidis & parturientibus molesto, hoc unguento :

℞. Milleped. q. f. contund. & probe misc. cum pulpa porcorum acidorum cocta, & applica cum linteo bis in die mane & vesp. *Wolfgangus Haeserus lib. 3. Herculi. med. cap. 5.*

Pro Horrhoridibus nimium fluentibus.

Si profluvium grave est, internam venam in brachio secare poterit, quod id remedium expeditum est, & efficax. Si profluvium diu duravit, viresq; attrivit, ne spirituum fiat subitaeductio, partiri sectionem in vices decet, ita & viribus minus incommodi inferetur, & revulsio fiet iteratis retractionibus evidentior : sin nec ita impediat profluvium cucurbitula sine vel cum scarificatione affigendæ : affixa hypochondriis potissimum sinistro, profluvium egregie retinent, illud præcipue quod ex portæ venæ ramo derivatur : & scapulis primum, deinde lumbis admotæ efficaciter fluxum retinent, qui ex cavæ venæ propaginibus derivatur : exhibeatur demum porio purgans ex iis, quæ saculentum, grassumque item biliosum humorem & ichorem melancholicum ducunt, & membra interni ab obstructione vindicant corroborant : inter alia author sum ut rhabarb. usum tibi familiarem faciat. Si profluvium diutius protrahi incipiat ex horibus verbasci & ovoplacentulas confectas quotidie edat : & vesp. cum decumbendum est, suffum. ano excipiat e sella perforata a concissi verbasci foliis molari ignito lapidi injectis, excitatum : tum plan-

taginem & verbascum simul tufas ano abmoveat, vel calendula tufa succo porcorum incocia inponatur, quod est singulare : hoc modo sæpe firmatur nullo efficaciori adhibito. Si gravior urgeat sanguinis profusio, utamur illis pilulis, quibus in hoc affectui efficaciter soleo.

℞. Pilul. e bdellio ℥i. troch. e terr. sigill. troch. e carabe, an. ℥j. cum mucilagine sem. cotoneor. ex aq. ros. extract. f. massa, & ex qualibet ℥. pilula ix. ex his diglutiendæ iij. mane ante prandium, & vesp. ante cenam totidem : non est quod quem terreat in harum pilul. exhibitione Rondeletij censura. Vulgare nostrum bdellium myrrham esse arbitrantur : nam hic fidem tacere possum, me in usu illo, ut sunt præscriptæ, atque cum uncto bdellio compositæ, effectum quem promittunt tam evidentem deprehendisse, ut de compositione dubitare vix queam : nisi quis putet ab æthereis liccantibus & adstringentibus hoc quæcunque quod recipiunt myrrhæ obutum superatumque esse. Exhibui in hoc casu aliquando troch. e carabe solos cum decocto sumach. Cum alias profluvium fuit instantius, & humor co-delatus calorem induxit : applicui ad anum quod sequitur.

℞. Succ. plantag. ℥ss. aq. ros. ℥vi. pulv. summat part. iij. fl. verbasc. rosmarin. siccat. an. part. j. redige S. A. in emplastr. si postulat necessitas, licebit sanguinem draç. holum armen. malicorum & id genus alia addere. Ita enim foris adhibita minus nocent, licet intus frigidiora omnia sunt suspecta : atque omnia ista utilia sunt, undecunque sanguis profluat ; quod si confluit ex cavæ venæ propaginibus prodire, jam licebit inferiorem lumborum & dorsi partem unguento comitisæ vel simili astringente & refrigerante illuire.

Memini me in M. S. antiquo libro legisse quod tria semina genitæ quotidie mane sumpta, & hæmorrhoidum & sanguinis e naribus profluvium sistant, cui licet nulla manifesta ratio subsit, nisi quis putet, ideo hoc fieri quod 2d urinæ vias avertant, indicare tamen id tibi volui, quod experimentum sit facile & sine ullo periculo. Novi qui sanarunt quos nimium profluvium fere confecerat, ut hydropis periculum adesse videretur, exhibita herbæ chelidonia quæ destillata, sed quia aeris est admodum libentius utor herba ista cervisia vel etiam vino mace-rata. *Reinerns Solenunder, consil. 20. sect. 4.*

Pulvis busonis combusti vel raur. terrestris positus supra hæmorrhoides, dicitur eas stringere a proprietate. *Petrus Forestus. schol. observ. 6. lib. 22. De Scd. & An. virtut.*

Cuidam mediæ ætatis nimia præcipitatione fundebatur hæmorrhoides cum Medici & Chymici cuncta tentassent, nec successissent, iussu ut una intacta reliqua tangerentur colicophare ; ita appellant crassamentum illud a vitrioli ocl. destillatione relictum : ilico confluit, vivit, præstitisset tamen sensim aliquaque die ad actum fuisse. *Jo. Henrins ad aph. 1. sect. 6.*

A proprietate quadam valet cingulum ex folis recentibus hollebori nigri conquassatis, nudo corpori circumdatum : hoc scilicet usus sum, præstat idem in immoderatis fluxibus mensium, & sanguinis arteriosi post partum gravium, sumum sæpe magno conamine profluentis. Lap-datur etiam hic essentia croci Martij. *Jo. Mar.*

*Ex suppressis hæmorrhoidibus miltio sanguinis,
& paralyfis sequuta, ejusdemque
paralyfis curatio.*

Nobilis Dominus de Glane, Dominus in Cugy, Vir prius & probus, per annos multos hæmorrhoidibus singulis mentibus absque ulla incommodo, imò maximo cum fructu, laboraverat. Invenite vero anno 1605, & ætatis sue septuagesimo circiter, hæmorrhoides subsisterunt. Hinc lassitudo & gravitas totius corporis orta, & post menses duos nimirum principio mentis Martii, sanguinem purissimum per tri-duum absque dolore emixit. Corpore leviter purgato, mictio sanguinis sponte cessavit, uti & lassitudo corporis, hæmorrhoidibus tamen nihilominus adhuc suppressis. Sequenti deinde mense Junio Paterniacum venit, meque cum in consilium ejus rei gratia adhibuisset, quasi ut sibi hæmorrhoides aperire curaret. Id cum neglexisset, de novo se male habere cepit. Trigesima itaque die Julii, cum a prandio ex fenestra cursum Broie humanis, & circumvolutionem rote molaris inspiceret, dolore capitis & vertigine prius, mox in terram procidens, paralyfi unilateralis correptus est. Ego eadem die sub vesperam una cum D. Emanuele Urstisio liberal. artium Magistro, convictore meo suavissimo accersitus, curationem sic institui.

Illico sequentem potiunculam ei exhibuimus.

℞. Theriac optimæ 3 j. Aq. ciuamo. destillatæ sine vino 3 ij. Misce, & fiat potio. Deinde totum latus affect. & spinam dorsii sequenti linimento inunxitur.

℞. Ol. chamomel. lumbricor. rosar. an. 3 j. Misce. Non cenavit ea vespere, & nocte subsequenti, quæ ei aliquo modo gravis erat, bene sudavit. Altera die, prius exhibitio clystere aliquo leniente, sanguifugas venis hæmorrhoidibus applicuimus, sanguisque ad 3 vi. vel vii. extraximus. Postridie, prima scilicet Augusti, sequentem potionem sumpsit.

℞. Flor. & folior. betonicæ Salvie Rosmarini an. M. ʒ. Sem. anisi & folior. senæ mundat. ana 3 ij.

Coquantur in sufficiente quantitate aquæ, ut colatura redeat ad 3 iv. In quibus dissolve electuar. diaphœnici cum rhæbarb. & Diacatholici an. 3 j. Syr. rosar. solutivi 3 j. Misce. Fiat potio. Ex qua clementer purgatus fuit, sexies aut septies. Latus affectum totum præcedenti linimento quotidie bis inunxitur. Purgato corpore, sequenti usus est apozemate.

℞. Radicum fœniculi petroselinii polypodii an. 3 j. Flor. & folior. betonicæ primulæ veris Summitat. majoranæ an. m. ʒ. Sem. anisi & fœniculi an. 3 ij. liquoricæ rasæ 3 j. Coquantur in aqua, ut colatura redeat ad ʒ j. in qua dissolve, Syrupi de betonica 3 ij. Sacchari & mellis despumati, quantum satis, ad saporis suavitatem. Exhibeatur quatuor matutinis cum tabellis Diarrhodon Abbatis. Absoluto præscripto apozemate, sequentes sumit pilulas.

℞. Massæ pilular. cochiar. & aggregativar. an. 3 ʒ. Cum syrupo, de betonica, formentur pilulæ septem, involvantur pulvere cinamomi.

Interim præcedenti linimento totum latus

quotidie bis calidè inunctum fuerat.

Sumptis pilulis, aliud linimentorum, quo quotidie bis inungebatur, præscripsi us.

℞. Ol. lumbricor. Vulpini Cottini an. 3 j. ol. granor. Junipari 3 ij. aquæ vitæ 5 j. Misce, fiat linimentum.

Hæc sic usus medicamentis, cum spatio decem dierum nullum sumisset postea medicamentum, sequentes pilulas ipsi ordinavimus.

℞. Pilular. cochiar. & de hernod. ctyl. an. 3 j. pilular. de agarico 3 j. ʒ. Cum syrupo rosar. solut. temperentur pilulæ 7. & involvantur pulvere cinamomi. Pro corroboratione membrorum nobilium sequenti utebatur electuario.

℞. Conservæ ros. betonicæ Salvie primulæ veris rosinarum majoranæ an. 3 ʒ. Specier. aromat. rosati 3 j. ʒ. Cinamomi ppt. 3 j. Cum syrupo conservationis corticum citri fiat electuarium, de quo singulis diebus, tribus horis ante prandium sumebat ad h. agnitudinem castaneæ.

Ab initio morbi statim optimam victus rationem observabat. A vino, spatio viginti dierum omnino abstinuit, sed ejus loco hydromelita, in quo flores betonicæ, Salvie, primulæ veris, agrimonie, & veronica coxerant, urebatur.

His divino favore à paralyfi liberatus, atque feliciter sanitati restitutus fuit, & deinceps adhuc annos aliquot sanus & incolumis vixit, anno vero 1608. plane decrepitus pie in Christo obdormivit. *Guilielm. Fabrici. Hildan. Observat. Chirurg. Cens. 2.*

Hæmorrhoidum fluxus arte suppressus alios morbos fungulos accersens.

Gabriel ab Hund, Præfectus Grorgaviensis, diu vexatus est fluxu hæmorrhoidum, & sanari à nemine potuit. D. Sebizius curavit eum ungucito de tabaco, ut non amplius fluere, sed quartana & scorbutus sequebantur & extinctus est.

Scholion.) Intempestivè hoc malo curati, quibus morbis corripantur, videatur Hippoc. l. 6. Epid. Sect. 7. Intempestive vero secundum Galenum curati sunt: quorum corporibus nec venæ sectione, nec purgatione &c. prospectum sit. Intempestive hunc ægrotum, ut Galenus sentit, curatum fuisse, non præsumendum; diu enim hoc malo vexatus & à rationali & methodico Medico sublevatus fuit. Intempestive vero ratione constitutionis ejus perversæ, cujus causa humores melancholici & scorbutica labe infecti regenerati, & denegato isis exitu pristino morbos & mortem atrulerunt. Memini illustrem quandam personam à scelestissima Medicastra in fluxu albo Balneis vitriolatis curatam, Scrophulæ itaq. exinde collum occupaverunt, Phthisi subsequente insanabili, cum fluxus erat irrevocabilis itaque ut circumspiciat sit Medicus necessum est, nec se itatim exorari sin t pollicitationibus & efflagitationibus Ægrotorum, in fluxibus istis consuetis & inveteratis sistendis.

De Hæmorrhoidibus fluxu à prima juventute ad decrepitam usque ætatem durante.

Connotavi in præcedentibus observationem de fluxu hæmorrhoidum in viro quodam Clarissimo.

finio à juventute usque ad virilem ætatem durante: sed in propositum nostrum est, eundem fluxum in duobus decrepitis, uno senex & altero siliernio, hoc facere, isto genere, denotare. Habitat scilicet in horto meo extra civitatem senex quidam octogenario major, sed robustus & salacissimus, ex corbium sit pandorum opificio victum quærens, qui a prima statim juventute ad prædictam ætatem fluxum hæmorrhoidum patitur, & quidem quovis mense cum maximis dorsi doloribus & ventris torminibus ordinariè & uberrime redeuntem. Apud ipsum socer ejus commoratur mendicando vitam sustentans, nonagenario major, & cui idem ab ipsa quoque juventa huculque menstruatim contingit. Mirum certe, cum mulieribus ordinaria natura lege fluxus menstrualis tantum ad quadragesimum vel quadragesimum quintum annum ad summum prorogetur (quanquam novi mulieres quinquagesimo, imò & quinquagesimo primo ætatis anno eundem fluxum patientes) quomodo in hisce viris hæmorrhoides tamdiu aperiantur; ego credo fluxum istum longævitatæ vitæ utriusque causam esse, natura scilicet se a superfluo & impuro sanguine non sine fructu liberante. *Simonis Schultzi.*

De Hæmorrhoidibus in Fæminis.

Paucis mulieribus accidere hæmorrhoides vel varices, vel hæmorrhagiam narium, & si quid eorum acciderit, detrimentum imminens decumbere. Philolophi l. 3. H. A. c. 19. est elogium, quo loco & causam eundem investigat. Et observatus quidem est sæpius restitutum mensium loco hæmorrhoidum suor, cujus inter alios testis Heurnius comm. in 6. Aph. 11. se mulieres noile, scribit, quæ mensium vice hæmorrhoides fundebant, quemadmodum & venæ hæmorrhoidales quandoque a lochiis vel menibus detentis solum intumescere videtur; Verum illud non frequens adeo est, quod constante Lunaris tributi pensione, nihilominus nonnullis hæmorrhoides ad senilem usque ætatem fiunt.

Ita anno hoc 1671, die 19, Jun. consuluit me rhedarii Aulici conjux 64. annorum, faciei colore ad viriditatem inclinante (quod experimento Foresti Pathognomonicum signum est hæmorrhoidibus laborantium. Hæc mihi retulit, se & olim, mensibus non minus fluentibus, hæmorrhoidum fluxum passum esse, & etiamnum eodem laborare, licet naturalis mensium terminus dudum cessaverit, cum dorsi & hypochondrii sinistri dolore, sanguinem ut plurimum esse atrox, & cum saltu non raro exire, instar Siphunculi, quo factum est, ut sæpe nimium eundem experta sit, & vires labantes adstrictionem urserint. Hunc vero nimium fluxum, ante hæc aliis non facile auscultantem, Euporisto egregio hæcenus compescere solet, solo nempe polygono sub axillis posito.

Adeoque quod cum Porisma inde elicimus, purgatio hæmorrhoidalis utriusque solennis est sexui, & mulieres quoque hæmorrhoidalem fluxum quædam patiuntur, verbis Caroli Piso nis de morb. à ferof. collav. ort. p. 409. sect. 4. Quale exemplum etiam videri potest apud Hippocr. ipsum l. 4. Epid. c. 14. t. 8.

Confectarium alterum est, hæmorrhoides maximam cognationem habere cum affectu hypo-

chondriaco, unde & cacochymia & imperfecta sanitatis indicium præbent, & consequenter in horum symptomatum curatione maxime invigilandum esse obstructionibus viscerum, præsertim Lienis. Ita vir Magnificus aliquoties fluxum hæmorrhoidalem expertus, cum per aliquod tempus uteretur tinctura Mart. aperitiva, illum non sentit amplius in hunc diem. *Georg. Wolfgang. Wedelii.*

Appendix ad caput præcedens.

Quæ hæmorrhoidibus in fæminis, amicus noster, Dn. D. Wedelius, Miscellaneis curiosis inservit, memoriam refricant gemellarum aliquot historiæ, quarum bigam saltem addere placeat. Hæmorrhoidibus cæcis tumentibus & summe dolorificis, quæ tandem etiam suppurant, cognata quædam mea ante decennium affligebatur, & hoc anno, nobilis fæmina, gracilioris habitus, gibbosa, ad quinquagesimum vergens, decessit, quæ ante mortem mihi narravit, se quovis plenilunio menstrua, novilunio autem hæmorrhoidali fluxu laborasse, sine notabili virium dejectione, cumque in ter fuerit multorum liberorum, in gravidatione facta, etiam cum menstrualis hæmorrhoides cessasse.

De menstruo Hæmorrhoidum fluxu eoque nimio, in fæmina.

Honestæ matrona quinquagenaria affligebatur febre continua maligna, ad quam ego vocatus curavi ipsam methodicè, ab eaque post recuperatam, Deo benedicente, sanitatem, honorifice dimissus iterum post aliquot dies revocor, invenio ipsam maximè debilem, convulsionibus tentatam, quærenti mihi de causa hujus tam tubitæ imbecillitatis, respondent adstantes, honestam istam Matronam, postquam menstrualis ille fluxus, sequiori sexui aliquoties familiaris, ipsam defecisset, singulis mensibus per aliquot dies & quidem sine ulla debilitate, aut sanitatis dispendio laborare fluxu hæmorrhoidali, jam vero consueto quidem tempore sed copiose admodum ipsi fluere hæmorrhoides ut de vita periclitaretur, præscripsi decoctum sanguisorbæ pro potu ordinario & sic, Deo benedicente, licitimus fluxum illum enormem: non neglectis insuper quæ ad cætera symptomata tollenda & ad restaurandas vires necessaria videbantur. Ita in simplicissimis sæpe magna latent arcana. *D. Cassp. Kolichen.*

De fluxu hæmorrhoidali puellorum.

Cum ante aliquot annos Sororis meæ Germanæ & Bartholomæi Schaden. Civis & Dulciarii Thorunensis, filius unus annorum octo præter propter, aliquoties sanguinem per alvum decessisset, quum tamen neque tormina ventris, nec ullum dolorem sive in intestinis, sive circa intestinum rectum aut in podice perciperet, vegetusque adeo esset, & circa res non vitales optime se haberet, nisi quod interdum in dolore copioso corripere & hæmorrhagiam narium frequentius pateretur, cum calore præternaturali, sed non immodico, qui tandem sedato fluxu etiam mox sedabatur. Soror perterrita mihi quæ causam exponens, iussu à me partem affectam indicat.

ndagare, venulas tumentes & sanguinem rubicundum stillantes circa orificium ani deprehendit. Duravit symptomata hoc per aliquot septimanas æstivo tempore: sed jam puer 12. annorum vegetus munia sua in ludo literario diligenter obit. Alterum pullum minorem natu præterito an. 1676. mensibus Novembri & Decemb. Michaelis Teichken senioris, civis & mercatoris Thorunensis, eundem affectum, sed discrimine sanitatis aliquo, passum fuisse, mihi nuper relatum est: qualia ego exempla huc usque me legisse vix recordor, cum hoc symptoma tantum aliquando feminas, plerumque mares in virili ætate constitutos afficere consueverit. Simonis Schultzi.

Hæmorrhoides in Puellis

Hic puelli duo, trennis natus alter quadriennis, laborarunt gravi morbo Hæmorrhoidum, & quidem postrenum fungi specie extantium summo dolore; quibus præsens remedium fuit Oleum olivarum infusionis baccharum Solani illius, ital. *Belladonna. Caroli Offredi.*

De Hæmorrhoidum mensurorum & ordinario fluxu in Viro.

Excellent. Du. Simon Schulzius de Republica Aſclepiaden, nostra Societate Leopoldina præclari meritis, de fluxu hæmorrhoidum mensurorum in viro oppido raram observationem communicat Tomo 6. & 7. obs. eliu. p. 39. cui sociam similem observationem de quodam pastore in ducatu Bremensi volumini tertio actorum Hafnienſium insertam dedi. Accedit nunc alia. Hic kiliz Hofſatorum est quidam Vulcani vel Tubalcaini minister, qui quolibet Mense & Luna, nonsecus, ac scæminæ suæ pendit vectigal de rosa, eodemque modo sese præparat, quo scæminæ has lunulas habituræ, & terminum istius fluxus instare præsentire potest.

Scholion.) De hujus sanguinis motus causis hic nihil dicam, fiet forte alibi, interim nos sumus in hac hæresi, nostræ vitæ rosam sive illud nectar vitale ad Lunæ phasem mutationem quamlibet parti aliquam in suo motu vicissitudinem, citius tardiusve fluat, isteque fluxus variat juxta quatuor anni partium seriem; multa sunt quæ hoc nostrum assertum evidentissime probant, neque desunt authores idem attestantes, inter quos est nobilissimus Kozack Medicus Bremensis famigeratissimus. Sed subsistimus, discursum hunc in aliam occasionem rejicientes. *Job. Ludovici Hanneman.*

Hæmorrhoides in viro singulis stillantes mensibus.

Novi fabrum Murarium, nunc demortuum, quem ab anno ætatis vigesimo ad 60. usque, fluxus hæmorrhoidalis singulis fatigavit mensibus, perinde ac catamenia apud scæminam statim redire consueverunt tempore: Retulit etiam se isdem affligit symptomatibus quibus menstruatæ, retentæ, vel nimium fluentes isdem quoque promovcri, vel sisti, quibus scæmellarum, reme-

Vir quidam Hæmorrhoidum fluxu obnoxius, eadem symptomata quæ mulieres pati solitus si sifterentur.

Pastor quidam in hoc Ducatu Bremensi isdem hæmorrhoidibus laboravit, & si non fluere statim tempore ea symptomata pati solebat quæ patiuntur mulieres in mensium suppressione. *Hannemanni.*

De Hæmorrhoidum menstruo & ordinario fluxu in viro.

Cum nuper Ephemerides Medico-Physicas Germanicas anni secundi percurrerem, & sub titulo observationis 192. Hæmorrhoides in viro singulis mensibus stillantes Dn. D. *Ehrenfried Hagendorſ*, Gorlicensis, perlegerem, revocavi mihi in memoriam similem casum in Viro Clarissimo Haymone Rigio Hamburgente tum Phil. Magistro, postea Med. Doctore & Practico Rosochienti Experimentissimo, Amico & Consalino meo Lugduni Bavarorum dilectissimo, jam ætatis, cui ab annos ætatis decimo octavo hæmorrhoides ordinarie singulis mensibus per aliquot dies fluere solebant, non sine magno valetudinis commodo: siquidem cum interdum fluxus ille vel desisset, vel non sufficienter processisset, se male conqueritus est. Fuit alias vir iste coloris fusci, & capillitii nigri ingeniosus & judicii acerrimi. Similes casus consignaverunt Amatus Lusitanus cent. 5. cur. 3. Vesalius de Corp. hum. Fabr. lib. 5. c. 15. Ant. Zinara Comment. ad cap. 10. lib. Somn. Arist. atque *Georg. lib. observ. propr. Simonis Schultzi.*

Hæmorrhoidum fluxus albus.

Viro cuidam 49. annorum perpetuo valetudinario, post purgationem majorem hæmorrhoides, ut aperire curaret, consultum fuit, quibus apertis exivit materia instar spermatis canarum ad lib. 10. cum jactura tamen virium, convaleuit ab hoc momento, liberatusque fuit à suo diuturno morbo & millenis aliis accidentibus. *Job. Georg. Greifeli.*

Ulcus fistulosum post hæmorrhoides suppressas.

Vir Nobilissimæ proſapiz superfluitate fluxus debilitatus ab empirico radicem inter utramque scapulam suspendendam, radici cichorii simillimam, accepit, qui adhibita, totus sanguinis fluxus desit. Post semestris spacium tuberculum in perineo oriebatur, quod postquam proprio motu rumperetur, inter gravissimos dolores per duos annos effluxit sanguis cum serosa purulentia. Horum dolorum frequentia & materiæ profluentis constantia medicamentis externis & internis, levabatur quidem, aperta autem nullo modo mutabatur, per hæmorrhoidum fluxus medicamentis excitari poteat: denum usu thermæum Pirmontensium ulcus coaleuit & dem hæmorrhoides sensim redierunt, quamvis non raro superbia.

Scholion.) Quod Celsus lib. 6. cap. 18. generalius

salus, primum tunc in quibusdam hæmorrhoidum fluxum suppressit, scribit, in iis nempe qui sanguinis profluvio imbecilliores non sunt dum in generationem hanc, non morbum habent, ideoque curari quidam cum sanguis exitum non haberet, inclinata in præcordia ac viscera materiam, motilis & gravissimis morbis correpti sint, ut Hippocrat. lect. 6. aphor. 22. specialiter de hydropis & pthiaseos periculo edixerat, atque lib. 4. Epid. in hinc Alcippum insaniam, & lib. 6. lect. ph. 28. multos pleuritide, peripneumonia, phlegmone, furunculis, terminibus, lepra &c. correptos fuisse scripserat. Prout & Galenus hydropis lib. 2. de Natur. facult. cap. 8. melancholiz, insaniz, intercostalis inflammationis, morbi renalis, vomitus sanguinei, hæmoptyses, paraplegiz & hydropis lethalis cap. 6. de V. S. advers. E. aliter mentionem fecit. Sic etiam lassitudinem, sanguinis, & tandem paralylin ab hæmorrhoidibus, quæ maximo cum fructu singulis mentibus fluxerant, subsistentibus, fuisse iniecit, Guil. Fabricius Hildanus cent. 2. observ. 11. recensuit; exemplum etiam mictus sanguinei a fluxus hujus cessatione Th. Reinesius Epist. 44. ad Nest. protulit; hydropis autem Jon Rhodius cent. 3. obser. 5. hydropis atque meningum obstructionis Frid. Loßius lib. 3. obs. med. 2. & arthritidis obs. 24. insaniz Zacutus Lunt. Prax. med. adn. tr. lib. 1. obs. 51. hæmoptyses Amatus Lusit. cent. 2. cur. 13. & cent. 3. cur. 3. Cuius enim sanguis ille per hæmorrhoides evacuari solitus vel quantitate, vel qualitate etiam peccet, violentiori illa suppressione in corpore concervatus & turgescens, quacunque directione, ex tumescit, aut etiam impuritate, usque viscera inficit. Fuisse autem radicem illam, ab Empirico commendatam, ex Cichorii familia, facile credi potest, quam nempe hæmorrhagias finire ab aliquibus credi, alij jam intant; quos inter D. Joh. Schroderus Rhain. Med. Chim. lib. 4. class. 1. cap. 96. & D. Frid. Hoffmannus in animadvers. Quod vero in ipso a rivit. tis B. Mar. æfesto colligenda esse præcipitur, si quis diem illum simpliciter inculcare voluerit, vix à superstitione immunis erit censendus: secus verò si virium tantum vigorem, qui sane in illo autumnii principio non omnino deesse deprehenditur; id quod Schroderus voluisse dici forte debet, cum in sua exaltatione collectionem designat; licet idem lib. 1. cap. 23. cichorii radicem eas inter, quæ vere colligendæ, reponeret. Poppius autem, sole cor Leonis ingressu, integram cichorii plantam acervo formicarum impositam, in quo flores rubicundi evadant, pro miraculo ideo habiti à Jo. Bodæo à Stapel, quod tamen eximere studuit D. Sim. Pauli class. 3. quadrip. botan. cap. de cichor. & spiritui formicarum acris, iuxta cum Poppio, adscripsit, commendat. Aliis tamen virtutem illam non simpliciter cichorii radici, sed ejus flores albi sunt, & quidem certo tempore collectæ, tribuere tantum libuit; hinc varia, inere tamen superstitione, in collectione observanda, in Præctica MS. Petri à Castro præcipiuntur, mediam nimirum horam ante solis ortum eligi debere, unico tractu integram plantam evellendam, idemque circum circa terram novo cultro, cujus manubrium sit nigrum, prius esse excavandam. Aliud pro superfluo illo fluxu

admirabile, uti vocat; inque scripto expertum secretum Dominic. Audæ in decret. libello, radicem scilicet Caryophyllatæ montanæ maj. rotundifoliæ in vere collectam & adpensam commendat. Quorum Amuletorum virtutem in casibus & debita cum cautela adhibitam non prorsus neg verim; quo tamen modo operationem suam perficiant, non omni caret obscuritate, Licet enim Cichorio insint particule, præternaturales bilioli sanguinis motus compescentes, aut etiam alios impuros, crassos, acore vel aeredine infestos humores, qui liberum sanguinis motum impediendo, ejusdem per loca illa effluxum fovere possunt, quæ a Galeno sub nomine sanguinis crassi fecienti proponuntur, alterantes; & licet porro in Caryophyllata virtutem vasa nimium hiantia adtingentem, serpioremque sanguinem balsamico suo sulphure & sale emendantem agnoscere agnoscere teneamur, hæcque etiam per poros corporis intrinsecas, & cum sanguine totum corpus permeantes, operationem suam peragere posse, vix quisquam diffiteatur, tantum tamen effectum exin subsequi merito admiramur, si, paulatina exhalatione sic suadente, intrinsecarum atoniorum paucitatem consideremus, cum tamen ipsa in substantia, & quidem large satis similia in corpus adsumpta eandem vix non exierant. Nisi fortè hic digestio in ventriculo subeunda natives, virtutes multum immutet, antequam sanguini commisceantur; id quod, præcipue cum tenuiores, subtiliores & certo respectu præstantiores solum per cutis poros ingrediantur, at; immediate cum sanguine uniantur, imò & quandoque per fortiorum inperiapta similia hduciam, à tot observandis in collectione & præparatione ceremoniis non parum excitatam, in actione roborentur, ab externæ adpenlis non adeo erit pertimescendum. Joh. Georgii Sommeri.

An fluentibus liber aliter hæmorrhoidibus liceat uti cathartico?

Dubitandi ratio inde proficiscitur, quod purgamenta turbent, aperiantque, & hoc pacto ampliore profusione sanguinis videantur aperire tenellam. Contra, humorum acrimonia interea suadet catharticum, ne illi incubitu longiori hæmorrhoides patefaciant largius. In hoc bivio, tutius purgari, quam abstinere, docuere me experimenta. Fuere enim ex agris meæ fidei commissis, qui menstruis ejusmodi evacuationibus vexati, cum viderent se tandem deliberari non criticis, sed symptomaticis his excretionibus, opem flagitare, quibus ego frequenter infuso rhabbarbari succurri; observans tenuis alvi solutionibus, inter purgandum vix tantum cruoris effundi, quantum una vice extra purgationis tempus externi solet, immo sæpe in ipsa purgatione ne guttam sanguinis profluere, averfa alio humorum rodentium acrimonia. Sed quid audendum, si evacuatio menstrua foemina propria ultra debitum perseveret? Nec hic formidandus rhabbarbari usus, quamquam providentius incedendum. Nam alia purgantia plerumque hic infida sunt, & ab elœctis certum periculum. Quoties autem gravidæ supervenit fluxus hæmorrhoidum, ut sit quandoque

que

que, & is nec quiete, nec leniter adstringentibus sistitur, ægra interim quotidie languidiore, ambiguum est, utrum rhabarbaro sit; sed certum, potius istuc veniendum, quam cum evidenti periculo vel fœtus, vel puerperæ, vel utriusque rem naturæ beneficio permittendam. Qui fortioribus hic insilit, raro ita circumspicte rem transiget, ut non alterutri imminuat exitum. *Ol. Berrichii.*

Hæmorrhoidum cacarum & apertarum remedium

Illustri cuidam Viro, cui ante moderatius ad Uncias sanguis ex hæmorrhoidibus fluxerat, jam nescio qua sanguinis acrimonia vel viarum laxitate ad libras manat ad animi fere deliquium. Tentata ad revulsionem venæsectio, aliaque remedia solita advocata, sed frustra. Tandem præsens auxilium grana Granatorum succulenta subministrant, quibus masticatis succoque deglutito cessavit periculosus sanguinis fluxus, cujus idcirco remedium certitudinem, sæpius in se factis experimentis, apprehendit Hahniz.

Ad hæmorrhoidas cæcas amuletum suum mihi per literas revelavit Gothæ Medicus Doctissimus D. Georg. Wolffgang. Wedel. Est fabariz radix recens, dorso intra scapulas appensa, nodulorum numero tuberculis mariscarum respondente, sive ulla alias superstitione, varia circumstantia. Vidit inde effectus stupendos & mirabiles, neque unquam illum frustratus est eventus, nisi ubi inveteratum malum in verrucosum jam fistulosumque declinavit. In critis tentare volui. Non successit. Forsan moræ impatientes sunt nonnulli. Statim remedium vim possunt.

Amuletum contra Hæmorrhoides cacas, mariscas, condylomata certissimum.

Quæ de Amuletis vulgo scribuntur, raro admodum explent authorum effata, si ad experientiam amissum judicentur, ut fere omni exciderint præconio. Laudetur Hartm. in Epilepsia Sambucus in salice crescens; extollat radicem Rheumaticam Dodonæus, maneat Dioscoridi & Scaligero vermes Diplosi in Quartana: stet sua laus in Hæmorrhoidum dolore Linariæ, Scrophulariæ, aliisque in peste & variis morbis Peripetis. Hoc Amuletum firmo stat talo, & sine ulla superstitione, temporisq; vel loci observatione Medicum juxta ægrumque exhilarat. Quoties à partu difficili Mariscæ infelices vexant & torquent puerperas? Quam urgent sæpe dolore etiam fluentes hæmorrhoides? Quot dantur Hypochondriaci, quibus eo derivatur mali sentina? Omnes in hoc inveniunt auxilium. Linariæ pinguedine non raro exasperati dolores, (neque enim pinguiâ semper patiuntur tubercula hæc) Crocus Metall. M. giss. Saturni, Antimon. diaph. album Græcum, cum aliis remixta pigre se ut plurimum gerunt. Soli tot seculis ignorato huic amuleto manum dat molestissimum malum. Neque enim ullus author vel gry quidem de illo mentitur. Et ne lectorem curioso hoc medicamento excludam diutius, Fabariam seu Telephium illud esse, publice jam propono. Sin observationes desiderentur, ut fides fiat laudibus, ex plurimis hæc sint loco pignora. Serenissima

persona, matronæ plurimæ illud expertæ, post exantlatum partum novos dolores ab his tuberculis passæ. Vir primarius, cum hypochondriacis plerumque committeretur symptomatibus, fluentibus Hæmorrhoidibus tubercula experiebatur tum me dolorifica, reliquis omnibus, ipsaque linariâ incassum tentata, unica nocte ab appenso amuleto nix de illis sensit reliquum. Vir Reverendus illam devexatus, ad stuporem levamen percipit. Taccoplures, qui sedere nequiverunt, nec stare frustra macerati à variis unguentis, linimentis & aliis externis. Appenditur vero radix Telephii recens, (vel aliquot salicis nodi, prout nodi ipsi plures vel pauciores in ano protuberant) cum filo in dorso inter scapulas. Simul cum marcescente radice, tabescit & evanescit omne tuberculum. Usus alias externus hujus plantæ ab officinis hætenus fere exclusus, tum à maculis à lue venerea relictis, teste Solenandro in Consilio tum in venenis extrahendis non est contemnendus. *Georg. Wolffgang. Wedelii.*

Consilium pro Sereniss. Rege Polonia diuturnâ Anæ Hæmorrhagia laborante.

Ad consilium de syndrome morbosa S. R. Majestatis, a 15. annis jam quasi habitu. h. facta & à Serenissimo propter continuas peregrinationes neglecta, & sic derelicta, deque cura in præsentem periclitanda, pollicitum ego, cum Domino Collega, accedens, quasi post vulneratam causam remedium facturum, ad paucas septimanas, pro fide mea in S. Majestatem nihil supra naturæ vires spondeo; sed ne propendens hæc mala, in illa fistularum, spongiosarumque exulcerationum ut plurimum incurabilium pericula cum tempore erant, vel matrimonii ratione, robur partium relaxatarum & exsolutarum reparandum intendo; munus Dictatura Hippocratis: Quæ longo tempore afflicta sunt corpora, sensim & longo tempore retere oportet; protestando, ne plus, quam suffecerint vires, quæ solæ sunt medicatrices à nobis earum ministris medentibus exigatur. Præsens enim virium inventarium & parcum curationis nostræ beneficium exhibet, quos effectus post se reliquerit effusissima & inordinata anæ hæmorrhagia, anno 35. ad 36. fide impetuosi ruens, quæ nectaris vivifici syrrhoen (quæ est spiritus, sanguinis & caloris naturalis communio) solutis repagulis, solvendo omnium actionum vitalium & naturalium promptuarium & liberalem arcam, cor, hepar, & compaginem venosam & arteriosam exhaustit immodice. Cum natura certe omnem hujus sui thesauri profusionem, tanto magis, tam impetuosam & deleteriam, horreat, cique nihil esse possit præter copulam sanguinis & spiritus, quem ducendo vivimus.

Causam hujus profusionis cruentæ corporis nescio, quo Dei vel amandæ naturæ supplicio, è labe hæreditaria & quasi congeniali acerrimi & terebrantis fermenti, sive salis anastomotici universo sanguini, & officinis sanguificantibus ita congenitam, ut non tamen fixa & in mortem durabilis sit, esse puto, ea de causa, quod tres ad unum omnes Regiæ Familiæ Serenissimos Fratres, quos ego novi, hæc

cruentatione laborasse, & tamen tandem cum tempore suæ maturitatis, etiam non penitus liberatos, tamen maxime alleviatis fideli observatione cognoverim. Quam causam intinui esse puto, cur sanguis per se & quatenus sanguis, nondum sit facies corrosivus; alias immutabilis in vitam sic permaneret; sed quod cognata & prona in talis acrimoniæ genitura, viscerum confectione, nutritioni destinati, & sanguificandi liquores dulces, & non paucæ illarum partes immutentur in hostilia & exosa delicatissimo sanguini fermenta, & quasi novæ quædam superfaturæ superaddantur, sanguinem suæ paroxysmi periodo, nempe novæ subinde ebullientis huius & confusi fermenti occasione, in spumas dilatando, prout in omni fermentatione fieri solet; & sua sic ebullitione in corpore & venis alias exhaustis plethoram mentiente, unâ cum suo vehiculo acri ad infima hæc & ignobilia per naturæ impatientis orgasmon deturbato, longa annorum familiaritate hospitando in his partibus, & furente impetu venarum januas perrumpendo.

Huic virulentæ suæ vires addunt ingesta; siquidem hæc coctionum officinæ, hæreditaria, annis tamen mitescere labe, prout in talem acetosam acrimoniam, more antiquæ ollæ acetosæ, cui quicquid infundis, acescit, quæcunque è dulcium vel meracioris vini potus, vel cupediarum, vel aromatum (quæ omnia male fermentata & digesta in spiritus & salia acerrime resolventur) voluptuario, aut reliquorum calidiorum & acriorum proportionem caloris nativi excessive superantium frequentiori usu incipiunt, quia congenialia, degenerare ea magis faciunt in hanc acrimoniam, nutrimenti zizaniam, sanguinis incendium, venarum reprobam. Unde tandem secundæ nostræ positionis, & illorum symptomatum ibi recensitorum, effectus; nempe tumoris, doloris, incallescens, pruritus, tenesmi, & ex illo insolentiori, relaxatio & elongatio per continuos hos stimulos protrusi intestini, apertiones venarum hæmorrhoidalium enascuntur, quibus facile succedit, pro sanguinis, per fermenti insolentioris vel remissioris occasionem, majori vel minori tumultu, insolentior vel benignior hæmorrhagia. Ea vero, quod jam ab aliquot annis, maxima ex parte evanida, parca & fere nulla sit hucusque, nec per vitam perennet, id causæ esse puto; quod potestates seminales morbosæ per traducem in liberos translatæ, in parentibus aliquando illum gradum suæ exaltationis & nequitie morbosæ non sint assecutæ, ut fixum suæ pertinaciæ & in vitam durabilem characteris signare queant, potius veluti horarii fructus, maturitatis tempora non expectantes in successoribus filiis per optimum ætatis & naturæ vigorem, quasi excusso jugo devictæ & interemptæ mitescant, & Medico spem curationis haud pœnitendæ faciant: vel sanguinis profusione usque in virum & vaforum deliquium depauperati, quod non defuerit quidem hæcenus causa ad hunc tumultum arma & ignem conferens, sed vim naturæ priscam negaverit hæcenus. Absque hoc si esset, utique sanguine sic & sedato, & composito non perseverarent tertie & quartæ positionis nostræ, nempe in hunc usque diem recidivantiæ levi occasione

symptomata: Aurium pruritus, stillicidium earum & intestini recti venulis; acrimoniæ erodentis & prurientis hucusque sanguini cohabitantis satis fido argumento. Quæ acrimoniæ in aures, & maxime in anum proscriptæ, ejusdem semper importuni incolæ vellicando pruriunt membranas & vicinas musculosas intestinali partes, ad frequentem, & vehementiorem, sed frustratum semper deijciendi conatum, & hac stimuli frequentia, affluentis simul seri actû humectantis, ut & balnearum actu humidiorum irrigatione motuque insolenti & indecenti ab Anno 43. non tantum laxatum & sequax intestinum rectum elongari cœpit, sed violentia illa excessiva, à membrana mesenterii, à qua intestina suspensa tenentur, nonnihil avulsum & extrorsum delatum hucusque propendet, nec sua sponte amplius facile in locum naturalem remeat. Nam etsi muscoli, partibus genitalibus communes, intestino appoliti sint, anum leniter retragentes paulatim, tamen soli non sufficiunt, eoque minus, quando per prædictas insolentias jam relaxati procidunt quasi resoluti. Cujus relaxationis & resolutionis commune malum (siquidem communes sibi & subsidiariæ sunt musculorū genitalium & intestini recti partes ut & sphincteris) compatiuntur genitalia, & una cum aliis occasionibus ideo quasi resoluta & imbellia, & alia nunt positionis nostræ sextæ indigitata symptomata.

Inter quæ & reliqua omnia, equidem suspicor causam quandam corrosivam ad intimiora sanguinis penetralia habitalem fore, uno eodemque sero, sive lixivio acti, similiter graveolente tam per venas hæmorrhoidales, quam aurium terebrante, eoque confidentius, quominus per tot medendum tentatas curas, ne recrudesceret hoc malum per annos, in hunc usque diem quicquam fuit expeditum. Nam etsi non nesciam aurium illas ferentes & prurientes stillas sæpenumero degenerante aurium stercore (habent enim illæ & quælibet partes sua privata & peculiaria stercore à domestica sua digestionem) in fœtidum liquamen, digestiva facultate auris errante, excerni: attamen digestionem auris stercorearia per convenientia medicamenta semel & solide rectificata, postmodum raro aut nunquam recruduisse in tam fœtidas & acres sordes, observatione certa constat; quæ ideo in contrarium suspicionem bene fundatam facit illius pertinacioris miasmatis è sanguine, quod tamosis decoctis & aliis generosioribus medicamentis (sanguine in hunc diem impuro, ut ex fructibus apparet, subsistente) malum hoc per annos alleviatum quidem, sed in hunc diem nunquam totaliter sublatum fuerit; quæ omnia simul & semel hæmorrhoidalis stillicidii una cum aliis occasionibus causæ sufficientissimæ, eæque constantes in mortem esse possunt, præsertim sibi invicem indissolubili tot annorum connubio sic nuptæ firmiter.

Unde prognosis mea (saxit Deus sit falsa) enascitur sub fronte consilii mei prolata. Nempe corpus & robur huius sanitatis esse neutrum, cachecticum, exsolutum, ut merito huic valetudini à divina misericordia apprecari debeamus, ut hæc, incremento ætatis, decremento virium, partes relaxatæ (quibus sinum aliquem fistulosum etiam si non amplum, ob stillicidium

licidium illud constans, in canis exilium venatu n̄ subesse metuo) in illam soliditatem cogi & muniti possint; ne, quod in his partibus tali occasione neri non insolens est, majores, latiores, erosiones & cavernæ fistulosæ, una cum spongis ex impuro semine & sanguine hæmorrhoidali adnascantibus, in loca hæc impervia, & ideo male medicabilia, annorum decursu, tandem putrilaginem gangrenosam & lethalia pericula inducant.

Prognosis hanc mea n̄ excipit curatio, quæ cum malo ultra 15. annos inveterato debeat, chronica etiam, & per tempora repetenda & continuanda necessario erit, nos præservativam paucorum harum septimanarum spacio intendimus, eamque ob inveterati mali pertinaciam omnes medicinas deludentem, annuatim bis vel ter, si possibile erit repetendam.

Et siquidem negari non potest universum horum affectuum cillavum & sanguinis vniculo livelaticæ (*explant. vni vniculo*) in salinum lixivium caulis supra dictis contermentato, & quasi habituato, promanare, naturæque metastasi, hujus lixivii partes actiores sequestratas & proscriptas hinc hæc & auris & Hemorrhoidarum venarum emunctoria elegisse, & ex antiquo familiaria & fere quotidiana sibi tecisse, mala eaque cum *dispositis* potius, & periculo ægri conjuncta crisi, ideoque sui vel minorationem vel omnimodam ablationem significare & indicare. Quapropter quibus modis & mediis harum indicationum cura expedienda sit tuto & jucunde (siquidem in affectu hoc inveterato cito id præstare impossibile est) sincere inquirendum & decernendum est.

Meam mentem salvo cujuscunque judicio, pro conscientia sine affectu hic explicare debeo scriptotenus. Urget enim Serenissimi Regis, Domini nostri Clementissimi obsequium & necessitas, tot medicinis apud externos exercitati, antiquum nihilominus obtinente morbo, circa quem nostræ curationis solo hoc sine sit Consultatio.

Indolui certe sæpe mecum, quoties infusta molimina & medicationes tactas vidi morbis & causis morbificis intimius in ipso sanguinis thoro hospitantibus, per illa *disposita* præsertim pharmaca, quæ alvum & intestina turbando, naturæ constitutivos & bonos liquores, vitæ furto in foetidum, variegatum & cadaverosum liquamen æque in sanis ac ægris indifferenter solvunt, & tale quid in corpore non inveniunt, sed faciunt & abradunt, nulla ægri, vel saltem perfida & momentanea alleviatione, quamvis lenitiva illa *Christi* præsertim balsamica, eaque specifica, quibus ipse utor, quotiescunque ignava est alvus, & specificè purgandum est, & civitate & administratione medica, hac mea cautela minime proscripta esse velim: cum tamen altiores medicaminum potestates, non purgantes, sed mundantes sanguinem desiderent hi penitiores in universo corporis & sanguinis habitu affectus, eo modo, quo maculæ linteo nec lacerato nec destructo, sed mundato & integro illo per saponem eluuntur, vel illo modo, quo lues venerea, mundantibus sanguinem per sua cohobia repetitis, tandem sanguinis suoque vehiculo eluitur, quo nomi-

ne cæteris nihil proficientibus, nec attentis, generoso suo specifico mundativo Dominum Berigardum plus profecisse constat, quam cæteros omnes cauterizantes, phlebotomantes, purgantes, urentes, secantes, curando eo minori ægri damno & periculo, quo majori, non tantum generosa actia, stimulantia, aperientia cathartica irritando intestina, venas Hemorrhoidales aperiendo, earum fluxum promovendo, sed & leviora, laxativa (monente Platero p. 717.) nunquam intempestive adhibita, subdole talia damna augent, ideo, quod cum saltem alvum laxando movere credantur, cum etiam abstergente vi aliqua & adversa naturam ad excretionem sollicitent, nec tanta in illis sit humiditas, vel aliqua unctuositas, ut sic alvum vehementius laxando, solvere possint; superpurgationes, ut in cassia & manna exhibitione sæpe fieri solet, nunquam pariunt.

Dubium hic mihi moveri video. Ergo, siquidem penitus illa integris viribus non percutiunt brevi quatuor horarum spacio, quibus alvum laxant, & sic se penitus expediunt Purgantia, turbantia; Itaque sanguinis vitium & crimen, sanguine pianum est.

Homicidis hæc lex, etiam ante legem Decalogi, statim post diluvium, ob summam sanguinis & vitæ reverentiam scripta est, non Medicis. Dominus Deus enim creavit non phlebotomiam, sed medicinam; & sapiens non abhorrebit ab ea; ab illa vero natura ipsa, ut supra scriptum, horret, in corpore imprimis & aliis exhausto, exsanguis & exsucco.

Innocens quippe semper sanguis (nisi in gangraena & lepra morbis incurabilibus) est, & quatenus sanguis per se nunquam peccat, ideoque sui ablationem non indicat; quin potius necessarius æque ac humor in oculo crystallinus, constitutivus & primarius integritatis vitalis liquor & vitæ sedes est; sed aliena & peregrina fermenta ipsius vehiculum vivum seu partem coessentialiorem, indivisibilem ab ipso, nisi per morbum & mortem; laticem nempe sanguinis contaminantia parva quantitate, tales acres & acrimonias de sua indole, & earum postea effectus fabricant, cum teste scriptura & experientia quotidiana parum fermenti totam massam fermentare possit, quorum fermentorum vis & potestas in natura & tam generandis, quam curandis morbis fundata, ad seculum usque fratris Basilii Valentini & Paracelsi stetit neglecta: Offecisse illam videtur Hippocrates suo tempore; qui non calidum, neque frigidum (quæ potius effectus & producta symptomata non causæ sunt) sed Acre, amarum, & salum & alia innumera (videlicet fermenta incognita) morborum causas, easque non phlebotomandas aut purgandas, sed Comoderandas & Concoquendas dicit sect. 1. de prisca medicina pag. mihi 22. & Claudius Theodatus, insignis Helvetiæ Medicus, lib. 3. Panthei sui hygiastici cap. 2. pag. 11. Neque demum sanguinis vitium, venæsectionem indicat. Si enim intemperies sit facta, alteratione in contrarium curabitur, si putredo;

quatenus talis, non curatur venæsectione, sed suis idoneis remediis, putredinis causam & generationem tollentibus.

Specioso, ideoque Græco, verbo plethoras, quod nimietatem sanguinis denotat, prætexunt phlebotomi, sanguinem nimium esse profundendum, ne ipsius moles retenta, spiritum vitalem opprimens, apoplexiam, vel subitanæ vitæ præfocationem, vel alia similia, non sine metu periculi inducat, maxime cum Sua Majestas habeat hepar justo majus, & ideo copiosorem justo sanguinem generans. Insuper siquidem hæreditaria familiaritate natura erraret nimis, & sanguinem hospitio suo per incompetentes scalas, nempe ignobilia hæmorrhoidum loca præcipitaret, per phlebotomiam revulsoriam eundem amice revocandum & postliminio invitandum esse in pristinum hospitium.

Bona hæc essent, si, prout satis speciosa sunt, æque satis fida essent. Quam speciose mentiatnr nimietatem sanguinis sive plethoram dictam, & Medicis sic imponat illius ebullitio, è diversis fermentis exterius sanguini advenientibus, pluribus causis occasionalibus externis (etiamsi per aliquot interstitium sedata quiescat) denuo in spumam & rarefactionem majus quærentem spatium irritata, non tantum ex supra dictis patebit; sed & è scripto meo nuper publicæ censuræ, & securitati valetudinis Regiæ dato, à nemine quidem refutato, sed oppresso. Ne longus sim, consultationem hanc non commentarium scribens, peto me dextre intelligi exemplo ollæ non plethoricæ, sed ad dimidium cum cerevisia nondum fermentata repletæ. Injice particulam fermenti, quæ antea semivacua erat, plethorica jam facta supereminet; Venam ipsi secca, laterem lavabis; aufer, vel non da fermentum, non erit plethorica amplius, & parum illud, quod habet cerevisiæ nondum fermentatæ suis terminis facile detinebit.

Et quomodo Sua Majestas potest esse plethorica, quæ à juvene fere continuo stillicidio Hæmorrhoidali in tantum laboravit, ut tot annis inopiam illius sanguinis tandem etiam uxorata Suz Majestati, per sedulam prophylaxin, Dei extraordinaria benedictione, intra servitiorum nostrorum sexennium, cohibendo illius diluvium, hucusque vix reparare potuerimus? Cui accedit fluxus denuo modernus excessivus ab octo his mensibus præteritis, fere 16. septimanis indies continuans, non sine notabili & præsentissima virium vitæque depauperatione. Certius itaque est, hanc depauperationem realem magis esse cum vitæ furto conjunctam, quàm illam imaginariam plenitudinem, oppressuram tandem spiritum vitalem superius prætextam.

Venæ sectionibus itaque semper prætexta illa plethora, sive nimietas sanguinis, cum nimis magno Suz Majestatis hepate petit principium, id est, in quæstione adhuc est, An sit? Ridiculus forem, qui retinendi illius nectaris vivifici Sanguinis ergo, & in favorem meum, qui ab ejus perditione semper sum alienissimas, mihi prætexerem Serenissimum habere è contrario hepar nimis parvum. Pari enim fiducia id asserere possem

hoc argumento: Quis nostrum hepar Suz Majestatis vidit? an nimis magnum pro phlebotomis, an vero nimis parvum pro me, sanguinis abitemio, sit. Blasphemus forem in Deum æquissimum conditorem, & ejus amanuensem naturam, quæ, nisi ideis erroneis, sub plasmate deviaverit in monstrum, nihil facit nihil aliud, nec in quanto aut quali abundat, nec deficit, nisi, ut dictum, errans in monstris.

Revulsionem speciose prætextam quidem, sed e nugis Galeni loquaciter delirantis natam, non tantum irritam, sed & damnosam, & frequentius repetitam periculosam, ætimo. Certe curiose & officiosissime prætexta cautela venæsectionis revulsoriæ his annis non neglecta; sed ad minimum annuatim quater celebrata, & à Sua Majestate, me toties contradicente, fideliter fuit admissa. At certe non satis bene in hunc diem liberat suam fidem, quam de commodando tandem & continendo sanguine luxuriante & exorbitante toties magnis promissis fecit. Ex post facto irritam se esse, satis in contrarium docet.

Et quomodo sanguini ad peremptoriam Medicæ revulsionis citationem, dicam & locum scribere possumus, qui privilegio speciali vitalitatis in circulum & seipsum rediens, cum spiritu suo hospite nullius loci & temporis leges respicit, neque locum standi ullum in universo corporis foro agnoscit?

Revulsio insuper quam damnosa sit in viris æque ac mulieribus, gravidis præsertim, una eademque ratione constabit sequenti: Non est negandum ex hac aliquando momentaneam fieri alleviationem symptomaticam, dum scilicet natura studiosa sui thesauri conservatrix, hanc meram sanguinis & virium extractionem exhorrescens, & hanc ruinam sibi procuratam præsentiens atque formidans, non raro præfatorum symptomatum mitigationem tremula molitur; sed pacatio illa momentanea vires è causa radicali permanente resumens, persolvenda est crudelioribus subsequenter symptomatibus. Nam etli vena cubiti tota posset evacuari (quod impossibile) tamen mox iterum totus cruor, in se & circulum rediens, æquaretur per totum venarum contextum. Unde vanitas revulsionis & derivationis famosæ cuivis liquido apparebit.

Quàm damnosa sit in fluxu vere Hæmorrhoidali excrementitio, citra necessitatem facta, indeliquet. Quo natura vergit, eo ducere convenit sequacem medicum. At natura sub fluxu solito Hæmorrhoidali excrementitio, studio sanguinem Hæmorrhoidalem excrementi loco, è consortio venarum vitali proscriptit & damnavit, recte agens, & cum tolerantia ægri. Deplet ergo per phlebotomum superiores venæ, vacui impatientes; in momento, undecunque, qualemcunque etiam excrementitium jam, & mortuum cruorem ad se revocant, & proscriptum semel cadaver in totum retrahunt, bonoque & vitali denuo confundunt. Prout & menstruum suo tempore & ordine digesto in exitum dicatum, & sic cadaveratum eodem modo in venas inanitas, fuga vacui allicitur. Quæ communio sit vivis cum mortuis, vel in rejectamentum semel & plene à natura provida destinatis, ille

ille referet, qui excrementa demuo delibando, ventriculo refectionem & gratiam se facturum inepte sibi pollicebitur. Etiam frequenter ergo confusione heterogeneorum cum homogeneis, excrementorum cum vitalibus suis, quid boni sperandum tandem, illi norunt, qui tales sordes purum putum sanguinem inquinare, eundem turbatum & contaminatum, in viris pro indole deturpati nutrimenti nil nisi malum corporis habitum; in mulieribus præsertim gravidis & lactantibus, nutriendæ soboli insectum & deleterium nutrimentum minuit, & sic vivacitati præjudicare faciendo ratiocinantur argumento.

Quæ omnia æquis rationibus deducta, cum futilitatem, damna & pericula futura ex insolentiori abusu talium magnorum & generosiorum subsidiorum nobis non tantum minuantur in futurum; sed & impræsentiarum, pro sperata melioratione deteriorationem, nec minima reparationis incommoda & remoras faciunt; talium usus liberalior, extra urgentem necessitatem, restringendus esse videtur ad mitiora; & sanguini mundando, non simul & semel cum fermento morbilico ejiciendo, specificæque dote per naturam destinata; nec ideo ad qualvis animo obrepentes indicationes virium vitæque exsolutiones, per electiva illa purgantia & phlebotomias, sæpius ac par est repetitas, sensim sensimque cum tempore cumulentur; suspecto & inviso epilogsimo Hippocratis ad Democritum: Omne solutivum deprædari de viribus & substantia corporis nostri. Sitque eodem Hippocrate Dictatore, (in fragm. d. purgat. remed.) scæda calamitas à pharmaco purgatorio hominem interisse. Ne, quod Deus avertat, in eisdem nostros errores, eadem tandem, sed infelix plangat nautia, quam in memoriam facti, & præmaturum obitum Serenissimi Principis Ferdinandi, Hispaniarum Regis Fratris in Belgio, versu sacravit Janus Walhornius D. Regis Hispaniarum Consiliarius:

*Quid multis fidis Medicis, Dux optime? multum est
Si fidas uni, cetera turba nocet.*

Nonne vides toto vacuari corpore venas.

Hic fecat, hic uris; crescit ab arte malum:

Imperatorem medicorum turba peremit;

An medicos medicam credis habere manum?

*Pauca dabo tumulto: lacet hic, Dux optimus,
in quem*

Nil potuit Mars, dum corpore sanguis erat.

Quod Mars non potuit, Medici potuerunt secundo:

Sic Mavors ipso fuit minor Hippocrate.

Spero nemo bonus pro huic zelo indignabitur, si, (quod solemniter protestor me dicere de tuis, parcere personis) pro scientia & conscientia mea, de sanguine & iniqua huic vita suæ Majestatis liberius & fidelius dixerim, scripserim.

APPENDIX.

Consultationes Generalis Pro speciali & moderna affectione Majestatis Regia.

Explicatis sic affectionibus suæ Majestatis famiariis, nempe solito hæmorrhoidali eo, que sæpe excessivo fluxu, pruritu & stimulo

intestini recti, cutis universæ, aurium, si quidem uno ore Dominorum collegarum in confesio est, propter hæreditariam hanc affectionem hæmorrhoidalem totum quasi hominem esse morbosum, necessarium itaque videtur, totum hominem immutandum & quasi renovandum à sporcitie illa salsa, sanguinem in tales tantasque ebullitiones, & quasi profluvium ruptis venarum aggeribus, in tales pruritus scabiosos universi corporis, aurium, intestini recti, & stimulos ejiciendi & excernendi continuas irritante. Quod per modum insensibilis restorationis & mundationis per vices pro singula nova ebullitione me clandestina & pia quasi fraude Serenissimi impatientiam præveniendo, integro quinquennio fecisse nuper in apotheca confessus sum, prout & est res facti. Ita certe ille modus hætenus (Deus novit cujus impedimento) ab anno cum dimidio posthabitus, morbo & causæ huic morbi licentiam & tandem insolentiam fecit: quam tantopere habituata, vix eodem temporis spatio in pristinam æqualitatem & continentiam, quam sic connivendo excessit, lente & cum securitate suæ Majestatis reducendam, postea verò obtentam Dei gratia sancte in posterum & sic sanitatem custodiendam esse exultimo.

Qua methodo & quibus mediis Dei benedictione imprimis hic huius obtinendus sit, siquidem nostra medicorum consilia (charta ideo consignata, ut certa & immutabilia in uno eodemque hoc casu sint & maneat) singula ab invicem cum discrepent? Quam sanitatis & valetudinis curandæ securitatem nunc & in posterum è tali tantaque discrepantia sua Majestas habebit? Dicam pro captu meo & fide in suam Majestatem, salvo meliori cujuscunque judicio, pace & veniâ singulorum.

Cum prout in bello, ita in curanda valetudine, verba non spectanda sint (medicina enim est ars, quæ facere, non dicere docet,) necesse est, ut sua Majestas & omnes benevoli suæ Majestatis, in id summo rigore incumbant; ut ne in posterum sanitas pluribus plurium medicorum, iisque diversis & verbosis consiliis detineatur dubia & anceps negligatur. Sed post consilium cujuscunque singulum, medico per illud suam promittenti curationem, suæ Majestatis serio demandet, ut viam illam, quam semel elegit in consilio, ambulet. (2.) ut tempus, quod sibi medicaturus eligit pro cura, & modum curationis illius inturbare non permittat, ne medicus habeat, quod excuset, sed facienda faciat. Secius si fiet, inter consultationes multas multorum medicorum aliter fieri non potest, quam quod dictum & factum est, multitudo medicorum perdidit Imperatorem. Quo nomine suæ Majestati fideliter hoc suaderem, ut nec mihi, nec ulli suorum medicorum amplius credat, in quacunque etiam morbi specie peroranti aut disurrenti; sed in posterum medicos suos singulos mutos esse velit, & solum factores tales, qui, ne verbum mustitantes curatione reali positiva diversorum morborum reales in aliis prius præstent curationes, de quibus realiter & feliciter præstitis suæ Majestas nunc & in posterum assecurata esse possit (quod tamen Deus avertat) cui medicorum, & in quibus affectibus tuto & cordate citra ambitum talium consilio-

rum & disceptationum vitam & sanitatem concedere possit.

Si quidem autem in hac familiari suæ Majestatis affectione duabus vicibus fidem meam intra duo decennia decursum, per Dei in primis singularem benedictionem probasse me eoque puto, quo, me non audito, illa suæ Majestati facta est dubia; itaque pro illa reparanda lubens meritoque hanc curationis provinciam ad duos menses, quos suffecturos puto, pro insultu hoc hæmorrhoidali Clarissimo Domino Doctori Davissionio trado, & illam, quam communibus votis apprecamur suæ Majestati felicitatem curationis fundatam in reali & prædicta demonstratione pro securitate suæ Majestatis futura, nec modo, nec in posterum invideo, reputando pro honore & felicitate mea; meum Evergeten (per quemcumque etiam fiat) constanter bene valere & feciliter agere. Qua libertate concessa, si quidem ea, nil nisi sanitatem & severitatem suæ Majestatis intendit, peto, ut, si res aliter, ac in votis esset, cederet, ut eandem & ego, & reliqui Domini Collegæ, quibus injuncta esset curatio, secundum tempus, modum & media curationis habeamus mutuam & communem, ne in proposita bono, quibuscunque etiam artibus, impediamur in posterum, imo hanc libertatem jure merito pro pecuniaria mea medendi ratione exigo.

Quibus præsuppositis, cum unica & sufficiens causa sit, sal illud corrosivum, plumosum, pruriens incola universi sanguinis, ex quo generatur postmodum frequens cutis pruritus, scabies vaga, cum pustulis hinc inde emergentibus, pruritus auris & anis, & in illis extremitatibus, venarum hæmorrhoidalium, & inde natus perpetuus excernendi, sed sæpe irritus, stimulus. Ego vero sanguinis & virium, vitæque diminutione curare non didicerim, sed medicamentis, quæ Dominus Deus creavit, & suis morbis destinavit; illum, qui adhuc lupereit, & quem in thesaurum vitæ reverenter adhuc custodit natura, ejus observantissimus minister, ego medicus studebo integrum conservare, & solummodo liberare ab importuno illo hospite, & hoste suo peregre adveniente fermento falso corrosivo: patrante effectus modo dictos & suæ Majestati familiares, è quibus ultimo illa apertio venarum hæmorrhoidalium, & excessiva illa sanguinis, virium, vitæque profusio. Consistit itaq; mea curatio in totali sanguinis universi immutatione & renovatione, per unicum internum medicamentum eradicans sanguinis illius fermenta falsa, acrida, imo verbo, vitæ æruginem & zizania. Quibus liberatus non amplius ita ferociens, sed pacificus suis cancellis & officio debito se continebit. Illa tamen lege, prædicta sanguinis depuratio instituenda, ut si quidem fere biennio neglecta fuit, sub singula exaltatione sanguinis in novam ebullitionem paroxysmantis, quocunque tempore ea contingat, ad paucos dies ea repetatur eo usque, donec ea sanguinis & constans contingat continentia, quæ annuatim in posterum vernali & autumnali renovatione ad dies non multos facienda, contenta esse possit.

Hæc methodus medendi mea correctior ad Galenicorum regulas minime quadrans (cum illa non currat neque curet; quæ gentiliter itum

hætenus, sed quæ fideliter eundem fuit) illud meum arcanum est, nunquam & nemini, nisi meliora discere recusantibus, per me absconditum; invisum equidem multis; sed orando, laborando, divina gratia, vigiliis, laboribus, itineribus, molestiis, persecutionibus tandem impetratum; nullius monarchiæ studio, sed solum juvandi proximum ergo questum, de quo dator hujus luminis Deus in conscientia solus est testis; maxime cum tot annis præceos mea medicæ non tantum abominabilis illa paganorum medendi methodus, per tot & tanta martyria, à quibus benigna mater natura abhorret, sed & suspecta tandem fieri cœpit, cum per illam tot mileros ægros derelictos incurabilitatis subterfugio & excusatione frivola à medicis vexatos, tandem proscriptos & ablegatos ad balnea sulphurata, fontes acidos, salubres, vel prognostici vel dictæ tandem mancipatos viderim, & sæpe mecum ingemuerim; latius fuisse & non recepisse curandos ægros tali methodo, quæ tantum catalogum incurabilium morborum suæ incertitudini prætexit, quam tandem miseros & deceptos ægros gementes abdicasse ad talia subterfugia Christiana charitate indignissima.

Qui itaque hoc arcanum vult, orando, laborando, quærat & inveniet, quærens enim inveniet, & pulsanti aperietur, sed fideliter, & non nisi apud Deum, illo, quem mendavit, modo: per laborem & sudorem. *An. d. Cnosselii.*

Medicamenta Hæmorrhoidalium.

Etsi fluxus hæmorrhoidum multoties salutaris esse, & à multis gravissimis morbis hominem liberare & præservare soleat, ob eamque utilitatem non cohiberi debeat; aliter tamen se res habet, ubi fluxus iste nimia frequentia & copia peccat. Quo malo cum S. Reg. Maj. Joh. Calimirus, ob copiam & acrimoniam feculentæ sanguinis non raro, & aliquando sex vel septem septimanis, omni die vexata fuerit, fluxu vulgaris medicorum remedia spernente; nihilominus tandem adhibitis Cl. Dn. D. Cnosselii medicamentis S. M. sæpius curata fuit, qualia sunt sequentia:

*Emulsio coralliatæ Cl. D. D. C. in fluxu immo-
dico hæmorrhoidum, pro S. R. Maj.*

℞. Decocti hordei, aquæ spermatis ranar. destil. an. ℥ij. sem. melonum & cucumer. aa. ℥ij. amygdal. dulc. excort. n. viii. F. l. artis emulsio simplex. Adde manus Christi coralliat. ℥ss. coral. rub. cum sperniola infuscat. ℥j. ocul. cancr. præpar. ℥j. M. F. Emulsio coralliatæ. Hanc emulsionem S. Reg. Maj. per 10. dies continuavit, & ex solo usu hujus medicamenti convaleuit.

*Emulsio styptica S. R. Maj. in fluxu magno hæ-
morrhoidum, & menstruorum, cum metu
dysenteria, ex præscriptione Cl. Dn. D.
And. Cnosselii.*

℞. Decocti hordei cum rad. serpentar. s. q. parati, aqua still. spermatis ranarum an. ℥ij. sem. papaveris albi & nigri an. ℥ij. gland. immatur. n. ij. amygd. dulc. excort. n. vj. F. Emulsio Cui adhuc

adhuc adde gelatinæ C. C. ℥℥. miv. cydoniatæ ℥vj. magist. corall. butyr. ℥j. cornu mineral. fossil. gr. xv. extr. nopr. sedativi gr. j. Misce. Semel hanc emulsionem S. R. Majettas cundo cubitum bibit, unde fluxus uterque cessavit, ut Medico amplius auxilio non indigerit.

Oleum hæmorrhoidale.

℥. Rad. scrophulariæ ℥ij. chelidon. ℥j. herb. linariæ c. floribus m. ij. fol. hyoscyami, nor. verbasci an. m. j. spong. cynorrhod. n. iv. scarabæorum pilular. n. xij. olei spermatis ranar. ℥iiss. lini in sole albificati ℥℥. Facta maceratione adde succi cancerorum ℥ij. Bulliant lento igne, ad consumptionem humiditatis, hancque fortis expressio, insolentur adhuc per aliquot dies. Mirum in modum lenit pertinacem tumidarum hæmorrhoidum dolorem, sic alide applicetur.

Unguentum hæmorrhoidale D. D. C.

℥. Olei sperm. ranarum, hyoscyami, in quo rad. scrophulariæ sint coctæ, jmi, (in quo prius scarabæi & porcelliones bullierunt) a. ℥vj.

Quibus intundantur unæ in oleis humanis collectæ, vel loco hujus musci in tegulis domorum invent. ℥iiss. xris viridis. ℥ij. Insolentur per mensem, in vitro bene clauso. postea coquantur per mediam horam, oleum fortissima expressione separatim, interim asservetur. Jam.

℥. Aceti anodyni (ex acet. distil. flor. hyoscyami & verbasci, per infus. more consueto confecti) ℥iiss. lithargyri opt. pulverificati. ℥iiss. Stent in vaju terreo vitreato, per octiduum, quotidie bis vel ter, spatula lignea agitando. Hoc facio.

℥. Hujus infusionis lithargyrii q. s. & cum olei superius asservati an. p. xq. Fiat unguentum, sub continua agitatione, nempe, donec ambo concrevant, in butyrum quasi viridissimum.

Ad hujus unguenti jam parati ℥iij. adde a-xung. ursi ℥j. pulv. sperm. nost. ℥ij. opii gr. ij. Misceantur pro S. R. Maj. in doloribus & tumoribus hæmorrhoidum.

Unguentum hæmorrhoidale aliud S. R. Maj. à Cl. Dn. D. Cnoffelio præscriptum.

℥. Butyri hæmorrhoid. præced. absque axungia ut si & opio parati ℥iij. rebis suilla seu porci ℥vj. croci Martis nost. tryptici, sacch. Saturni, sperm. ranar. nost. coagul. an. ℥ij. M. F. unguentum. Memini etiam S. R. Maj. à gravissimo hæmorrhoidum fluxu quondam in Italia curatam fuisse, beneficio fruitul. spongix in atramento (ex vitriolo & galla parato) intinctæ, & in orineum confectum interusæ. Pro interno remedio præscripta fuit & infusio ligni lentisci, de qua ter in die bibit, scil. mane, à meridie & vespere, aliquando & in prandio. loco potus ordinarii. Ex relatione ipsius Reg. Majestatis, Domini mei tunc temporis clementissimi.

Mirabile remedium est illud, de quo Francisc. Olvv. Grenib. M. Doct. (in lib. 2. c. 1. §. j. n. 74. Arbor. scil. integr. & ruinosæ) scribit, quod sudor morientium intra lintedum collectus, & hæmorrhoidibus applicitus, fluxum sistat, quod remedium Archeum timidum reddit,

qui ex natura sua mortem tinet, ut propterea a furore remittat.

Pulvis externus hæmorrhoidalis niger.

℥. Spermiole simpl. nost. (ex oculis nigris præp.) cornu fossilis an. ℥℥. ℥ij. aluminis crudi, vitrioli ad rubed. calc. an. ℥ij. g. llar. immaturar. pulveris. ℥vj. M. F. Pulvis. U-us ejus externus est, non solum in fluxu nimio hæmorrhoidum, sed & in quavis hæmorrhagia, maxime vulnere, si gossypio exceptus, oculis venarum filantium imponatur.

Pulvis alius hæmorrhoidalis ruber.

℥. Cornu mineral. fossilis, & labiis adhaerescens, laec. rub. globulos. pictorum, musci crustacei ossium human. an. ℥. aluminis crudi, spermiole sicce nost. ex ipsis ranis cum propr. sperm. parat. an. ℥ij. M. F. Pulvis. Eandem habet virtutem & usum cum præcedenti, nempe externum, etiam in desperatissimis hæmorrhagiis cæteris remediis nihil juvantibus.

Pulvis hæmorrhoidalis internus, pro Illust. Princip. Raziuvil.

℥. Coral. rub. præpar. unicornu mineralis sed fossilis, spermiole sicce simpl. descript. an. ℥ij. sedativi nost. citrati simpl. gr. iij. essent. rosar. veri odorif. gtt. vj. Misceantur in mortario lapideo, post dividantur in 6. xquales partes ad 6. chartas. In emulsionem specificam seu aqua permixturarum sumendas. Omnem hæmorrhagiam sistunt.

Amuleta in fluxu hæmorrhoidum.

Omnia illa amuleta quæ in hæmorrhagia narium & fluxu nimio menstruum recentia sunt, & collo appenduntur, atque manibus tractantur, & hic locum habent:

Præ aliis à proprietate valet cingulum ex linteo urticæ crudo, (seu loco hujus cannabino) spermate ranarum insuccato. Item cingulum ex herb. bursæ pastoris recent. collectæ: Muliercula in Russia, ad hoc negotium muscum terrestrum clavatum C. B. (quem & ibi plicariam vocant) sibi eligunt. Hartmannus in praxi: chym. vult cingulum ex foliis hellebori nigri conquassitis recentibus, nudo corpori circumdatum, quo ipsemet feliciter usus est. Pelle leonis, si ei insideatur, hæmorrhoidum dolores efficaciter leniri, autor est Jonsson. de quadruped. bist. nat. p. 117. Laudatur etiam:

Annulus stellatus Helmontii.

Quem Clariss. Dn. D. Christianus à Paulietz S. R. Maj. p. m. medicus, amicus & collega meus charissimus, ab Illustriss. Principe van Eggenberg dono acceperat, & S. R. Maj. Joh. Casimiro p. m. (me. præsentem) iterum obtulit; quæ R. Maj. annulum, exterius auro, absque igne ornati jussit, & per multos annos digito manus sinistra gestavit. Annulus stellatus describitur ad Helm. in libro de Lithiâ cap. 2. & in tract. super verba in herbis verbis & lapidibus magna est virtus.

Quod cæteris nihil juvantibus (inquit Autor) si geratur annulus, subito & in ipso spatio orationis Dominicæ omnes hæmorrhoides, tam cæcas, quam apertas, & illarum dolores, uti etiam matricis affectus sistere solet. Memini & hujus annuli Vnzerus de epilepsia lib. 2. c. 91.

Hæmorrhoides sunt (ut multi volunt) nonnullis hæreditariæ, præsertim apud Judæos, qui graviter iis infestantur; & si hoc fortasse non male ad maledictionem divinam referunt, quippe qui clamaverunt, sanguis ejus super nos & filios nostros. Quod probare videtur Psaltes, dicens, quod percussit Deus eos in posterioribus dorso, opprobriumque illis dederit sempiternum.

Hæmorrhoides in viro jam per quadraginta annos periodo menstrua redeuntes.

Vir Amplissimus, Dn. Felix Hannibal Raufchart, Dominus in Heyna, nuper Præfectus Duc. Saxonicus, Amicus meus Honoratissimus, temperamento sanguineo-melancholico, anno ætatis suæ vigesimo, quo Ratisbonæ studiis incumbens, primum patitur fluxum hæmorrhoidum, quem natura ex eo tempore usque præfens quolibet mense, statim tempore repetit, quamvis hoc naturæ beneficio, (uti illud ab Hippoc. aphor. 15. lib. 4. aphor. 11. & 21. lib. 6. cum Galeno commentante merito extollitur,) nunc sexagenarius paulo parcius fruatur. Ubi notandum, quod quoties hæmorrhoides tributum suum ratione quantitatis aut temporis moræ non rite persolvunt, toties actiones naturæ principes huic inde turbatæ labascunt, iunimur sub hoc sanguinis *ἰσχυρὸς* calor quidam præter naturam, alvi obstructio, cordis angustia, hypochondriorum inflatio cum totius corporis & animi languore oritur: quoties autem hic fluxus restituitur, toties etiam disparent omnia symptomata.

Cæteroquin hos 40. annos Vir supra laudatus per Dei gratiam in tolerabili sanitatis statu transegit. Nominat etiam alium Virum maximi nominis, qui eandem cum ipso fortunam hoc in passu fuerit expertus, vegeta senectute felicem. Quibus confirmatur, quod talismodi à natura ipsa institutæ evacuationes sanguinis aliorumque humorum, quantitate aut qualitate peccantium, zizaniæ in prima, quod dicitur, herba evertere, adeoque per Dei gratiam vitæ salubritatem & diuturnitatem promovere valeant. *D. Joh. Georg. Sommerl.*

De arbitraria Hæmorrhoidum per solos odores resinosos suppressione.

Theologus quidam, temperamenti serosi, eruditione, Ingenio, Lingua præstans, sed Memorix labilis, quam fugacitati spirituum in Sero subtiliter dilutorum, & minus constantes in cerebro undulationes habentium, tribuo, ferente Discursu, queritur se à leviculo zelo, vini haustulo, voce aut motu corporis concitatore, confestim pati fluxum aliquem Hæmorrhoidum, qui ipsum aliquandiu post fatiget. Cui coercendo interne nunquam non utiliter Spemniola Crollii usus fuerit: sed metuens, ne natura medicamento adsueta, in posterum eadem minus auscultatura sit, parcius eodem uti statuit; & memor, myrrham inter alia ingredi compositionem ejus, à solo hujus sufficere, Naribus percepto, querit subsidium; qui etiam conduxit. Experitur hoc sæpius, atque à Myrrhæ odore quoque abstinere, ut videlicet habeat pro-

batum quid, quod in usus urgentiores servet. Eidem itaque suffitum Thuris & Matlichis substituit, eodemque iterum successu. Verisimile arbitror, nervos odoratos oleoso Nidore Resinarum, & Aura plane Balsamica, peculiariter rethi; unde circa radicem eorum, aut basin cerebri, motus spirituum æstus in ordinem redigatur, quominus impetuose ad partem affectam proruant. Quam speciem motus mutati, Galenice forsan, revulsionem dicemus. Præterquam in Riverio (lib. 10. Med. Pract. c. 10. p. m. 513.) non aliter ibi, invenio, fluxum hæmorrhoidum per odoriferum sedatum. In pulvis ille ex Thure, Aloe, Mastiche &c. quem Autor carbonibus inspergendum præcipit, non libero suffitu in nares, sed laboriose per infundibulum proxime fontem cruoris in posterioritate corporis est adhibendus. Neque etiam existimo, odores acetosos, & Salia mere fugacia, occasione carbonum elevata, nasoque excepta æque præfens auxilium præstitura. *D. Joh. Danielis Majoris.*

Anatomica Inspectio.

Hæmorrhoidum fluvio obnoxius raram Portæ, sub recto intestino decurrentem, pollicis crassitiem superantem habuit.

Ramum venæ Portæ, quem sub recto intestino declivem ac mesenterio suffultum porrigi scripsimus, nonnunquam ad fæculenti sanguinis per ani venulas, sanguine interdum manantes, expurgationem plurimum conducere arbitror: Quandoquidem dum, aut ob lienis obstructionem, aut aliud quodcumque ipsius vitium, fæculentus sanguis non universus, vel nullus plane in lienem absorbitur, vel lien eundem ad ventriculum eructare nequit, hujus rami beneficio, certis quibusdam intervallis, uti mulierum menstruarum purgationes solent, per anum excerni credo: Rarius enim ex universo corpore, hæmorrhoidum vitio laborantibus, ad venæ cavæ ramulos in sedem pertinentes, lutosum ejusmodi sanguinem regurgitare verisimile nobis videtur, dum veram venæ portæ distributionem perspectam habemus: Quippe ex hac conjectari est promptissimum, qui is sanguis à liene non attractus, aut ob meatuum obturationem non admixtus, unde stuebat rursus regurgitet, atque sua gravitate per ramum ad intestinum rectum pertinentem, deorsum procumbat, ibique tantisper reservetur colligaturque, donec nimium turgentes venæ, osculis referatis, per anum manare illum sinant: Huic mea sententiæ magnum robur adjecit is, quem hoc sanguinis defluxu per intervalla laborantem, non ita pridem resecuimus: Huic enim minor, sed durior lien fuit, & vena sub recto intestino excurrentem pollicis quasi crassitiem superavit, eoque modo sanguine turgibat, quo jam parturientium animalium venas iterum amplexantes, insigniter amplas distensasque cernimus. *Vesalius lib. 3. cap. 5. de Fabr. corp. hum.*

In Hamorrhoidibus periodicis obnoxio vena Porta ramus, sub coli intestini sine, & tota velli longitudine sanguine turgens adnata adversus.

Quidam ordinatis vicibus, ut mulieres suis mentibus, sanguinis fluxu ex vena in anum pertinentibus vexari consueverat, Et cum ex nigro arquato, jecorisque mira duritie periisset, Num portæ rami, an cavæ hunc sanguinem evacuant, judicatorius, illum dissecui, atque venæ portæ ramum, sub coli intestini finē, & tota recti longitudine in mesenterio ductum, pollicis fere crassitiem æquare & sanguine turgere animadverti, conterminis venæ cavæ ramis nihil prorsus immutatis. *Vesalius l. 5. c. 15. de Hum. corp. Fabrica.*

Hamorrhoidum inflammatio ob mesenterii Gangrena vitium.

Obiit uxor Rondeletii intra paucos dies ex hæmorrhoidum inflammatione, quam maritum celare voluit: Dum affecta sedes investigatur, extrema Mesarzi pars à gangræna occupata occurrat. *Ionbertus in Vita Rondeletii.*

HEMICRANIA

Vid.

CAPITIS DOLOR

HEMIPLÉGIA

Vid.

PARALYSIS.

HEMITRITEOS

Vid.

FEBRIS SEMITERTIANA.

HEPATIS MORBI.

Heparell magna glandula de genere conglomeratarum, ex cuius vasis excretoris in truncum abeuntibus enascitur vas illud amplum nomine pori bilarii insignitum, imo & valia alia minora, radices cylindricas bilariæ dictæ: quæ omnia inserviunt abducendæ bili, per viam fermentationis, aut percolationis, vel per utramque etiam simul, in hoc viscere, efformatæ; vel tantum à sanguine, per varias arteriarum hepaticarum ac venarum portæ ramificationes, in glandulas ex quibus tota ipsius assurgit moles, accedente, secretæ. Ex hac compendiaria admodum descriptione, quis non videt, si vel secretio bilis impediatur vitio glandularum viscus componentium, vel vitio fermenti, si aliquod tale in hac operatione naturæ detur, ut plurimis non mediocris nominis perplacet: vel eadem bilis secreta propter obstructum porum bilarium aut ejus præcipuos ramos, in intestina delabi non valeat, vel viscidior reddita imperfecte tantum illuc defluat: vel acrior, fluidior, ac serosior facta colatoria sua caualesque inde assurgentes vellicans, imo etiam corrodens, abundantius decurrat: Quis, inquam, non videt inde procreatum iri multiplices morbos, inflammationes, tumores, ulcerationes, fluxus biliosos imo fluxus hepaticos &c? de quibus hic particularius quid non adjiciemus, sed continuo ad ea quæ de hepatis morbis eorumque remediis, in genere adducit Clariss. Thomas Willisius descendemus, illique adjungemus pro more Curationes, Consultationes, Observationes & Anatomicas Inspectiones ex variis. Sic autem Clar. Willis.

Hepar siquidem colatorii, & juxta nonnullos, visceris mixtoris munus obit, raro aut nunquam atrophiz, aut extenuationi obnoxium reperitur; quin à contra plures ob causas & occasionibus quoad molem augeri, & diversimodis ingestis, & concretionibus intarere ac intumescere periclitatur. Hinc sanitatis ratio haud levis in hoc consistit, ut jecur rite conformatum, sanguinemque libere absque tributo, seu vectigali nimio bibimet arrepto, trajiciat.

Profecto multa huic visceri, uti & lienī, & quidem haud prorsus immerito vitia imputantur; quorum genera præcipua attingemus. Hepar sæpe, ac potissimum, in his duobus, uno scilicet aut altero solet delinquere: viz.

Primo quod succum nutritium aliis partibus destinatum intercipientis proprio impertit usui. Hoc passim cernitur in pueris Rachitide affectis, quin & multis aliis vitam desidem & otiosam agentibus. Olim apud Romanos ars fuit anserem ita pascere, ut hepar in immensum accrescens totum præterea corpus præponderet.

Secundo aliud hepatis vitium est, quod sanguinis depravati scæculentias & recrementa quæque oblata in recessus suos intimos, facile nimis suscipit eaque retinendo non modo grandescit, sed quoad ductus suos obstruitur; unde sæpenumero icterus, aut hydrops, quin etiam tumores & concretiones præternaturales varii generis contrahit.

Ad geminum hunc celsum plures & diversimodi jecinoris affectus referti debent: de quibus singulis pathologias particulares instituire haud nostri propositi est. Quod spectat ad generalem hujus visceris pharmaciam, unus erit principalis medendi scopus, nimirum ut fœcus ejus, quantum fieri possit, diminuat, aut omnino præscindatur. Itaque hæc duo procurare oportebit, viz. ne jecur succum nutritium sibi nimis accipiendo supra modum accrescat & ne sanguinis scæculentias retinendo, obstructionibus & tumoribus præternaturalibus afficiatur.

Utraque hæc visceris hujus delicta, multo facilius erit præcavere quam curare. Enimvero prius efficietur, habita tantum ratione ut sanguis in crasi sua bene constitutus, & circulatione libera potitus & succum nutritium ad partes & præsertim extimas dispenset, & recrementa quæque sua ad particularia cujusque emissaria propellens, ibidem deponat. Et quidem medicamina hepatica vulgo dicta, virtutem suam per sanguinis lustrationem, potius quam hepatis emendationem prius & immediatius exerunt: ista nimirum ejusmodi particulis constant, quæ cruorem subingressæ, cumque non miscibiles, massam ejus adeo exagitant, inque minutias frangunt, ut coagulationibus & concretionibus quibusque inhibitis scæculentiarum & impuritates omnes facile abscedant, inque propriis emunctoriis depositæ foras convehantur.

Remedia enim vero omnia quæ dicuntur splanchnica, primo in sanguinem operantur, ejusque partes constitutivas in effervescentiam quandam incitant, adeoque comminuant, dividunt, & huc illuc rapidius adigunt, ut effluvia vaporosa in habitum corporis, recrementa serosa in renes, biliosa in hepar, atrabilia in lienem, aliaque in alia emissaria quibusque adaptata, sine impedimento aut adhesionem secludantur.

Quapropter

Quapropter eadem Pharmaca quæ hepar, etiam hec, renes, pulmones, & reliqua viscera in secretionibus suis juvant, & plerumque diaphoretin & diuresin movent. Siqua unam aliquam præ aliis partem virtute quadam specifica respicere deprehendatur, ideo est, quia eorum particule, recrementis intra viscus illud fecernendis magis affine, & proinde associata, una cum ipsis illuc ferantur. Propter hanc rationem, Rhabarb. curcuma, chelidonia major, cum multis aliis humoris biliosi adjuncta, facilius ductus felles petunt, & in ictero prodelle solent. Huiusmodi medicamentorum energias, & operandi modos supra notavimus. Quod ad reliqua hepatica vulgo dicta spectat, primo eorum quæ hepatis accretionem nonnaturalem, dein quæ obstruktionem & tumores ejus præternaturales præcavere, aut tollere perhibentur, formulas quasdam breviter subdemus.

I. Contra hepatis, accretionem nimiam sive nutritionem inproportionatam, imprimis diæta parciore & tenuior, somnus brevior, & exercitia crebra & moderata conveniunt: quare infantibus & pueris, si quando huic affectioni, uti & Rachitidi obnoxii deprehenduntur ut lac tenue & serosum sugant, nutricum brachiis quotidie agitentur, & huc illuc oculus rotentur, aut in curru aut cathedra rapide vehantur, & quamprimum pedibus uti ac incedere discant, præscribimus.

℞. Aq. limacum, lumbricorum, an. ℥iij. Syrupi de cichoreo cum Rhabarbaro ℥ii. Spir. salis Ar. noniac. cum gum. Ammoniac. ℥i. misce, sumatur coch. i. vesperi, & primo mane.

℞. Radicum filicis maris, cherefolii, cryngii condit. an. ℥i. fol. agrim. ling. cervinæ, veronicæ maris, an. Mi. ras. eboris C. C. an. ℥ii. fantali albi citrin. an. ℥i. passul. exacinar. ℥i. hordei ℥iij. coquantur in aq. fontan. lib. iij. ad ii. colature adde aq. limacum, lumbricorum, an. ℥i. Syrupi de cichorio ℥ii. f. apozema, sumatur ad ℥ii. vel iij. in die.

℞. Pul. fantal. alb. citrin. oculor. canceri, ligni aloes, an. ℥i. salis absinthii. ℥i. f. pulvis, dosi ℥i. ad ℥i. bis in die.

℞. Emplastri diasaponis, cerati sentalini, ana q. s. f. emplastrum hypochondrio dextro applicandum.

℞. Unguent. splanchnici ℥ii. olei absinthii ℥i. misce, f. linimentum pro regione hepatis.

Possint hic plura alia medicamenta tum methodica, tum empirica ad Rachitidem usitata referri, verum ad alia festinamus.

2. Remedia ad plerosque alios hepatis affectus dicata, simplicia sunt vel composita Prioris generis quamplurima, ab authoribus quasi in hunc usum peculiarem procreata recensentur. Dicit Heurnius summum Deum huiusmodi remediorum magnam copiam, ob insignem eorum necessitatem mundo intulisse. Ad hunc censum referri solent, imprimis cichoracea omnia, oxalides, oxylapathi, & vegetabilia fere cuncta amara, & nonnihil acredine (in quibus virtus deopillativa consistere perhibetur) prædita, uti sunt absinthium, chamædrys, chamæpytis, fumaria, tanacetum, agrimonia, hepatica, lignum aloes, fantala omnia, cortex tamarisci, fraxini, radices cappari, cum pluribus aliis quæ Bocanices maximam fere partem constituunt, adeo cum hepar quasi diva quædam hamatosei præficere, quamplurima in ejus satellitum aut subsidi-um pharmaca conscribi solebant.

Sales herbarum fixi, & spiritus mineralium acidi per distillationem proliciti, jure optimo ad hunc censum pertinent, utpote massam sanguineam summe exagitant, concretiones ejus dissolvunt, infarctiones expediunt, ipsamque quoad omnes ejus partes ubique permeabilem faciunt.

Chalybeata si hic præteream, chymici plerique me hepati valde iniquum censebunt, nam liquidæ veneris prærogativa, ita ut amare cogat, huic visceri vulgo attribuitur, huic certe expectare licet. Martem ei semper benignum fore, quoniam vero tum ratione, tum experientia constat ferri præparata in affectibus hepaticis, uti imprimis ictero, & hydropse sæpius convenire, quare hæc & veterum & modernorum recepta, & compositiones pharmaceuticas ingrediuntur. Quia ratione chalybis præparata, uti etiam acidulæ terræ, tum naturales, tum artificiales massam sanguineam purificant, & per consequens affectibus plerisque hepaticis vulgo dictis succurrunt, alibi a nobis satis fuisse ostensum est, ut non opus sit hic repetere.

Pharmaca ab authoribus medicis jecino-ri destinata, in varias classes, imprimis vero in calida & frigida, insuper in humectantia & exiccantia dividuntur; juxta quod visceris illius temperies variis modis haberi supponitur, cum revera sanguinis tantum dyscrasia est, quæ ita diversimode peccans ita variam medicaminis energiam desiderat. Nec minus error vulgaris est, quod in æstimandis hominum constitutionibus variorum cujusque temperamentum sanguini debitum, hepatis imprimis, uti calido aut frigido, aut alias disposito ascribitur.

II. Veterum Antidotariis plures extant compositiones officinales in solius hepatis gratiam designari vidæ, cujusmodi sunt electuarium & scoria ferri Rhafis, crocus ferri. Balchusis, qui Theriaca mixtus ad affectus hepaticos commendabatur; species Diatrion fantalon, Diarrhodon Abbatis, Trochisc. de Rhabarbaro, de eupatorio, de capparibus, Diacurcumæ, Dialacæ, Syrupus de absinthio, de cichorio, de v. radicibus, Byzantinus, cum multis aliis, quorum omnium formulis, virtutum pro curandis quibusque jecino-ri catalogus ingens subjicitur. His autem posthabitis, libet modo juxta recentiorum praxin, pharmacorum quæ deopillativa habentur, species & exempla quædam proponere.

Itaque pro decocto speriente.

℞. Radicum filicis, cherefolii, urticæ majoris, Taraxici, ana ℥j. foliorum Agrimonie, ling. cervinæ, veronicæ, Botryos, hepaticæ, ana Mj. fantali albi, citrini, ana ℥iij. rasur. eboris, ℥i. cicerum rubr. ℥j. sem. coriandri ℥iij. passul. ℥ij. coq. in aq. fontan. lib. iij. ad ii. addendo sub finem vini albi ℥iij. f. colatura per manicam Hippocratis, cui impone spec. diarrhod. Abbatis ℥j. chalybis nostri præp. ℥ij. colaturæ adde Syrupi de cichorio cum Rhabarbaro ℥ij. Aq. limacum, lumbricorum, ana ℥j. dosi ℥vj. bis in die post dosin electuarii sequentis.

℞. Conserv. flavedinis Aurantii, limonii, an. ℥ii. absinthii, fumarie, ana ℥j. pulv. radicum Ari simplicis, fantali citrini, ligni aloes, radic. capparis an. ℥i. oculor. canceri ℥j. salis absinthii ℥ii. Syrupi de fumaria q. s. electuarium, dosi quæ nuncis juglandis bis in die superbibendo haustum Apozematis modo descripti, vel aq. distillat. sequentis.

℞. Folior.

℞. Folior. absinthii, centaurii, Tanacetii, Abrotani utriusque, comarum tamarisci, ana Miiij. Juglandium virid. lib. iiii. linguæ avis sive sem. fraxini viridis lib. ii. cortices exteriores 10. Aurantiorum: iiii. limoniorum, linacum, lumbricorum præp. ana lib. j. incisis omnibus affunde vini albi lib. viii. destil. organis communibus, liquor totus misceatur. Dosis ℥iij. edulcorando cum saccharo, vel syrupo idoneo.

Si formula pilularum magis arridebit, extractum sequens cephracticum in officinis dictum, utile videtur.

℞. Tartari albi pellucid. & limaturæ ferri recentis, ana ℥iij. simul terantur in pulverem, dein coq. in aq. fontan. lib. iiii. ad ℥j. (nonnulli vino albo utuntur.) Colaturæ adde summitem centaurii, absinthii pontici, cardui, ana Mj. rad. gentian. ℥ss. spec. diacurcum. ℥iij. effervescant clausæ per horas iii. vel iiii. s. colatura, quæ leni balnei calore evaporet ad consistentiam pilularum, addendo si libet Trochisc. de Rhabarb. vel specierum hieræ picræ ℥iij. dosis. Si ad ℥ss. in pilulas redact. vesperti cum vehiculo idoneo.

Propter eandem intentionem, viz. ad præcavendas, vel tollendas hepatis obstructions, cervisia medicata purgans, vere & autumnio per plures dies sumenda, a nonnullis valde prædicatur, & à quibusdam quotannis per totam vitam religiose observatur.

℞. Radic. lapathi acuti præp. polypodii qu. ana ℥iij. Rubiæ Tinctorum ℥ii. Rhabarbari Anglicani ℥ii. folior. sennæ ℥iij. epithymi ℥ii. sanctali citrii ℥i. sem. carthami, coriandri, an ℥iij. incis. & contus. s. a. f. sacculus pro iij. congiis cervisiæ, post vi. dies sumatur ad ℥xij. plus minus mane; expectando iv. vel v. sedes sine regimine.

Curationes.

Partium universæ corporis humani æconomiz studentium maxima est habenda ratio; earum præsertim in quibus fixere sedem facultates principes, unde veluti ex uberrimo penu ignobiliora membra sustentantur, & in eadem spiritus & humores functionum prima instrumenta tanquam ex scaturigine derivantur. Hepar sanguinis corpori alendo destinati promum condum viscus, benigni succi naturam foventis officina, maximam Medici curam præ nobilitate sua totum corpus in affectuum suorum paritatem trahente exigit; & sicubi principiis obstandum, id in hepatis morbis pernecessarium, qui eo gravius & periculosius provecti instant, quo lentius & minus perceptibiles sub obscuris principiis sese in intima parenchymatis sensus obtusissimi insinuant. Porro frequentissime Intemperie omni, quæ sanguini aliquam præternaturalem qualitatem impertit, conficitur Hepar non minus frequenter obscurum laborat, ob exiles venarum ex ipsius corpore in caudicem crescentium radices. Nonnunquam corruptelam in propria substantia patitur; sæpe imbecillitatem experitur, ejusque vitiatur tonus, ex quibus ejusdem visceris tumores, abscessus, ulcera, magna symptomatum caterva stipata enascuntur.

Medicamentis quibus hepatis affectibus variis obviam eatur, præmittendum duxi universale Specificum Hepaticum quod vel per se usurpetur vel aliis plerisque sit pro vehiculo. Quippe remedia partes formali qualitate vel similitudine

substantiæ respicientia, in easdem possunt etiam contrarias qualvis qualitates facile inducere.

Jecur sumatur ex recentè occiso animali, vitulo, neſtende, lupo, lepore, cervo, cujus hepar sicut & columbæ felle caret; tel ex aliis eximatur diligentissime. Hepar per tenues taleolas seceatur, atque in clibano post exemptum panem blandissimo calore siccetur & servetur usui. Eodem modo poterit præparari hepar hominis juvenis sanilaqueo intercepti.

Sanguis cervi mense Maio exceptus post coagulationem manibus rumpatur, multumque agitetur, distillatur in B. & excipiatur stillatius liquor. Massa vero sang. in asſere aut disco argenteo extendatur, atque exactissime in clibano siccetur ut supra.

Menstruum hepaticum optimum parabitur ex veronica, agrimonia, eupator. Aviceni. plantag. c. chor. scabiosif. card. bened. ulmar. absinth. plurimo, nasturtio aquat. o. anagallide aquat. pist. valis lapideis optime obturatis incluis & post aliquot menses distillatis. Si aliquid se. menstradatur, melius nec fermentatio, & aqua potentior erit, extillabitque cum spiritu ardente.

℞. Jecoris cervi præsertim, vel si desit, alterius animalis ut supra præparat. sicciſſim. ℔i. sanguin. ut dict. est siccat. ℔ss. rad. siccat. (quemadmodum omnia reliqua simplicia debent esse sicciſſima) enul. gentian. ana ℥iij. rad. chelidon. maj. ℥iij. rad. hili. sem. cyper. rub. tinctor. petroselin. fenicul. apii ana ℥iij. rad. cichor. eupator. Aviceni. plantag. ana ℥iij. fol. absinth. utriusque, eupator. Mesu. summit. centaur. min. ana ℥ii. fol. chamædr. chamæpit. veronic. mar. ana ℥i. fol. hepatic. sal. vit. alias rut. murar. herb. Robert. scabios. brunell. bugl. ophiogloss. fl. lupul. ana ℥ii. sem. Aquileg. & securidac. ana ℥vi. cortic. exter. citr. sic. rad. tormentil. sant. citrin. rhabarb. elect. ana ℥x. sele&issima omnia & sicciſſima incidantur minutissime, redigantur in pulverem, iisque affund. phlegm. t. vitriol. cum proprio spiritu volatil. acidul. ℔iij. aq. ex sanguin. extract. ℔bi. hydromelit malvatic. vin. Canarin. an. ℔iij. vin. Alicant. ℔ii. succor. per resident. depur. baccar. dulcamar. & alkekeng. ana ℔bi. succ. lupul. plantag. fumar. cichor. ana ℔iij. succ. limon. & berber. an. ℔ii. f. digestio in fimo equino vase probe clauso per octiduum, deinde expressio, liquoris in B. depuratio, & per chartam bibulam colatura, tandem ejusdem ad mellaginem coagulatione in B. vaporis.

℞. Istius mellaginis ℥viii. crem. tart. alb. ℥ij. trochisc. Mart. aper. ℥iij. tinctor. corall. cum acid. quercus ℥i. magister. eorund. & perlar. dulcis, ocul. caner. præp. an. ℥x. C. C. uſti, succin. alb. præparati an. ℥vi. spodi ex ebore & C. C. an. ℥iij. ambr. gris. ℥i. moschi oriental. ℥i. pulp. passul. cum decoct. cichorii & agrimon. extract. ℥iij. mſ. & lentissimo calore f. Elect. reservand. vase vitreo vel fictili vitreato probe clauso.

Poterit in morbis hepatis per se exhiberi istud specificum, superhaust. jusculo hepatico; vel etiam aliis admisceri pro vehiculo. V.g. si exhibeatur potio purgans hepar, dissalvatur ℥i. istius Electuarii. Si dentur pilulæ, sic præparentur.

℞. Mass. pil. de ammoniac & de rhabarb. an. ℥i. specific. hepatic. ℥ss. mſ.

Ad Bolum. ℞. Cass. fistul. rec. è cann. extract. ℥ss. diaprun. solut. ℥ij. rhabarb. elect. ℥j. specific. hepatic. ℥ss. sp. vitriol. gutt. iij. Mſ. Bolus.

Eodem

Eodem modo admisceatur alterantibus: v. g. si paretur Opiata chalybeata hepatica, ad ejus ℥iij. addatur ℥ß. specific. & sic de cæteris.

℥. Rad. cichor. tarax. fragar. oxylapath. ana ℥j. fol. hepat. fumar. pimpinell. agrimon. chamædr. ana m. j. flor. lupul. p. ij. santal. citrin. ℥ijß. lign. rhod. ℥j. f. decoct. in qua omnia hepatica poterunt dissolvi; sicut in aq. hepatic. sequente.

℥. Rad. siccar. cichor. tarax. fragar. pentaphyl. oxalid. oxylapath. ana lbß. rad. chelidon. major. lbj. rad. asari, fœnicul. asparag. petros. eryng. lign. rhodii, sant. citrin. ana ℥iij. fol. sicc. agrim. fumar. pimpinell. chamædr. chamæpit. eupator. Melu. ana ℥iij. absinth. utriusque ana ℥iijß. succor. per residens. depurator. cichor. endiv. acetos. plantag. ana lbj. succor. ribes, berber. limon. ana lbij. succ. bacc. solan. lignos. sive dulcamar. & c. bacc. alkekeng. ana lbij. pomacei defæcatissimi non vappidi lbxx. omnia debito modo præparata in uno vel pluribus vasis probe obturatis maceantur per octiduum in humo equino, deinde f. distillatio.

Aqua quæ extillat vel servetur per se, vel cum floribus cichor. veton. rub. ros. rub. & spir. vitriol. corallat. rubedine tingatur & servetur ad usum.

Aqua ista poterit exhiberi vel per se ubi simplici alteratione opus est, vel esse aliis potentioribus pro vehiculo. Quidquid sit, quoties partis alicujus curatio suscipitur, satius est specifica sumere, eaque juxta indicationes accommodare; quam vulgaribus vel obvis quibusvis promiscue uti, sine ulla solidi alicujus effectus vel expectatione vel certitudine.

Hæc de Hepatis affectibus eorumque curatione in genere: Pauca subnectam de correctione intemperiei hepatis calidæ indeque exsurgantis sanguinis, ptisanæ præsertim aliorumque liquorum consimilium frigidorum ope.

Ptisana erat hordei ad putrilaginem cocti pulmentum, ei haud absimile quod nunc præparatur ex hordeo mundato in olla fictili cocto, affuso jure capi aut gallinæ donec hordeum tenerescat, jus vero inspissetur. Sumitur vel pars liquidior seorsim, & pauxillo salis condita propinatur; vel teritur ipsum hordeum, & per setaceum pannum trajicitur, assula portione liquidior ad faciliorem transcolationem; colaturæ additur pro condimento (habita dispositionis ventriculi & affectuum corpus exercentium ratione) aq. rosar. sacchar. sal. macis, cinamomum. Huc referendum Hordeatum proprie dictum sive hordei cremor, ex hordeo eodem modo in aq. cocto in mortar. marmor. contus. & traject. cui, aq. decoctionis permisto, adduntur aq. rosar. & inter terendum nonnunquam amygdala, sem. frig. majora mundata, pineol. pistach. mica panis alb. pulpa capi aut perdicis, sem. papav. alb. & c. juxta varias intentiones. In principiis morborum acutorum convenit istud alimentum, quod satis sustentat naturam, eamque nullo modo onerat, vel ab humorum morbificorum coctione averteat, neque pravorum succorum incendio animum subministrat; immo multum refrigerat & humectat.

Nunc ptisanam vocant, præsertim Galli, decoctum glycyrrhizæ, vel simplex, vel quod ad-

dito hordeo, passulis, prunis, ficibus, rasura C. C. vel eboris, radicibus aut herbis hepaticis, pectoralibus, aliisve ad varias affectiones cōcinatur; ita tamen ut glycyrrhiza cæterorum basis habeatur. Radix ista ^{ad huc} est, & gratum præbet potum ad restinguendos febrium æstus, cujus quantitatem venis alioquin gravem & præcordiis noxiam, diuretica facultate blande eliminat, & per urinæ vias educit.

Ptisana sicca, sic vocata quod ejus species in sacculo ex aluta, vel pyxide circumferri possint, ut in rem præsentem, citra decoctionis incommodum, sola aquæ supra pulverem traiectione iterata, ad hunc modum sit.

℥. Pulv. subtil. glycyrrhiz. Hispan. ℥iij. sem. anij. & coriand. ana ℥j. cinam. inter. ℥j. sacchar. crystallin. ℥vj. f. omnium pulvis. Iota hæc quantitas est pro lbxxj. aq. quæ per manicam super pulverem toties traiciatur donec ejus virtutem attraxerit.

Ex solo pulvere glycyrrhiz. in aq. citra calorem externum macerato ad rursus extractionem fit ptisana grata, exime sitim sedans & refrigerans: huic autem species quædam ventriculo roborando dicatæ plerumque adduntur. Ubi vero impetius refrigerare, ardorem extinguere, & sitim sedare est animus, lapis prunellæ addi potest in ea quantitate, ut pars una lap. prunell. partibus 4. pulv. glycyrrhiz. respondeat.

Aq. hordei item ptisanæ accensenda est, agris æstuantibus quæ utinis ac grata Eam solent præparare mulieres ipsæ cum hoc modo: Hordei mundati parti 1. affundunt aq. partes 12. coquunt per dimidium horæ quadrante, aquam effundunt affundunt; aliam vicissim ad tertiam usque vicem: tandem quarta vice percoquunt, donec hordeum coctione emollitum digitis facile attritum diffuat. Aquam per residensiam sinunt depurari.

Aqua, primum frigidum, simplicissimus potus, bene dispositis, validis & perviis naturalibus visceribus non inconveniens: debili ventriculo, venis obstructis noxia, & tardæ distributionis. Levissima & maxime insipida optima. Hujus imaginariam cruditatem dum coctione longa plerique etiam Medici corrigere satagunt, abeunte in auras tenuiori & magis ærea ipsius portione, a refrigerandi scopo longissime aberrant. Equidem satis corrigi aquæ cruditatem arbitror, si crusta panis optime torrefacta, calens indatur, & per aliquot horas in ea maceretur. Aqua fit coloris flavescentis.

Permiscuntur etiam aquæ succi vinosi fragorum, cerasorum, ribes, & quæ ex iis concinnantur sapæ sive Rob; syrupi item aciduli, acetos. simpl. de limon. de acetosif. citr. & alii, violæ. pomor. & c. spiritus denique acidi, vitriol. sulph. salis. Ipse sæpius febricitans sitim foeliciter restinguo aq. cruda saccharata, in quam taleolæ integræ limonum projectæ longa agitatione, & liquoris de vase in vas transfusione, acidulum simul saporem, & corticis aromaticam qualitatem magno ventriculi cordisque commodo in aquam deponunt.

Locum hic habet Turcatum Sherbet, quo Mahumetis lex abstemios vivere jubet. Illi in calidissimis regionibus viventes acidos succos ribes, berberis, aurantior. citri, & similes cum saccharo coquunt in conservam solidam, cujus portionem aqua dilutam hauriunt, Hujus condituræ

dicturæ præparandæ hæc sint paradigmata. Succus (v.g. Citri) per residuum deperatus decoquatur lentissimo calore (in B. M.) ad mellaginem; saccharum purissimum pulverizatum in patina argentea caleat semper movendo spatula: Et bene exsiccatum, paulatim irrorando, affundatur mellago dicta in parva quantitate, continuo agitando donec tandem tantum saltem sit humidi quantum opus est ad ligandam & formandam pastam, ex qua adhuc calente hiant morselli reponendi loco sicco, & si neri possit aliquantu n calido. Id quod in omnibus confectio- nibus saccharatis solidis observandum, quæ a- liquand acidum recipiunt; quippe dum acidum sive spiritus sive succus in sacchari corpus (quod plurimo acido abundat) insinuant, solvitur cor- poris uno, & fit dissolutio salis qui abest in li- qua nen. Aliter ex Aurantium succo: Saccha- rum pulverizatum in patinide vel concha ar- gentea plurimum caleat, affundatur paulatim succus recenter expressus, continuo agitando donec fiat pasta, ex qua pene resiccata tormen- tur morselli penitus siccandi & reponendi in pyxide loco sicco. Eidem usui inserviet in aqua di solutum rob de rib. & rob de berber. in quo debite præparando est operæ pretium.

℞. Aq. fontan. q. v. superponatur igni, cumque erit ebullitioni proxima, non tamen bulliet, (id quod in tota hac operatione est summo opere ca- vendum, si enim vel tantillum bulliat materia, denigratur instar atramenti.) Injiciantur fru- ctus berber. maturi in ea quam voluerit quan- titate, post dimidium horæ quadrantem exi- mantur, & pulpa trahatur per setaceum; mox addita pari sacchari quantitate in ampla patina fictili vitreata, semper agitando, levissimo igne sine ebullitione coquatur ad debitam consisten- tiam, (saccharum autem prius clarificetur) & fiet rubicundissima conserva.

Prædicta omnia Aquæ vel cruditatem corri- gunt vel promovent distributionem; utramque verò intentionem omnium optime pericit Vi- num, cujus vel minima quantitas aquæ permi- sta cum in penitissimas venulas deducit, & fa- cit ut multo potentius refrigeret. Neque me- tuenda est vini noxa in quibusdam morbis etiam calidis, cum spiritus ipsius inflammabiles per a- quam reusi evanidi reddantur.

Ab hepatis obstructione mala plurima ena- scuntur; quapropter sedulo obfartus ejus a- movendi sunt; quod à sequentibus optime fiet.

℞. Mass. pil. stomach. cum gum. ʒj. extracti colocynth. cum spir. vini parat. gr. ii. vel iii. ol. anis. gutt. ii. m. f. Pil. numero 3. quas deglu- tiat alternis diebus horâ dimidiâ ante cœnam.

℞. Rad. cichor. tarax. oxylap. an. ʒiii. poly- pod. rec. fol. fenn. mund. an. ʒß. fol. hepat. & fumar. an. n. ʒ. flor. cordial. p. ii. sem. anis. & fœnic. an. ʒß. glycyrr. ʒi. crem. tartari ʒiß. f. omnium decoctio & colat. cui adde infus. ʒii. rhabarb. scordium factæ in aq. pomor. redol. cum ʒii. santal. citr. Reduc omnia ad parvam dosin in qua dissolve syr. ros. pallid. comp. cum agar. ʒi. man. Calabr. ʒß. M. F. Potio danda in aurora cum debita custodia horis tribus ante juseulum.

℞. Rad. cichor. tarax. oxylap. oxalid. an. ʒi. fol. agrimon. hepat. fumar. scabios. ulmar. capi l. omnium an. m. i. flor. cord. p. iii. sem. alkek. & milii solis an. ʒiii. prunor. Brigno-

lens. jujub. sebest. an. par. v. pom. redol. per- fulta sect. cum cortic. numero 4. somnium de- coctio inf. q. aq. hord. add. tartari alb. subtil. pulv. ʒj. Colatura clarific. leni coctura, reduc. ad ʒi. in qua dissolve syr. viol. de cichor. simpl. & acetos. citri an ʒiß. julap. rosat. ʒi. M. f. Apozema aromatizand. ʒiii. tant. u. citr. pro iv. dosibus bis in die sumendis longe a pastibus.

℞. Rad. graninis, fœnic. petiolel. an. ʒi. cicer. rubr. cappar. a sale mund. an. ʒß. sem. al- kek. & milii solis an. ʒiii. sem. melon. rec. ʒv. sem. carthami rec. in aqua subsid. ʒvi. includ. ventre pulli, qui confusus elixetur cum frusto carnis vitulinæ, addendo sub finem coctionis fol. agrimon. pimpin. borrag. bugloss. oxalid. oxylap. an. p. i. calend. charetol. hyssop. an. p. ʒß. reduc. ad quant. juseuli unius, in quo per pan- num stamineum colato dissolv. crem. tartari al- bi chalybeat. ʒi. exhib. mane horâ dimidiâ post totum.

℞. Conf. flor. genistæ, calend. summitat. me- liss. absint. pont. vel vulgâr. an. ʒi. conf. Alkerm. ʒß. rad. chelidon. maj. nec. verm. terrest. præp. C. C. præp. cu n aq. cinam. ocul. cauc. præp. an. ʒvi. flaved. citri & aurant. sicc. an. ʒiii. magist. perl. corall. lap. g. igatis præp. an. ʒiii. cinam. C. C. ad albed. ulti an. ʒii. diacureum. ʒiß. troch. dialacc. de eupator. & de abinth. an. ʒiii. ambr. gri. ʒi. crem. tartari chalybeat. nigri ʒiß. croci Martis aperient. ʒiii. M. f. & cum syr. veton. rubr. & caryoph. arom. f. Elect. instar opiæ, de quo capiat quotidie mane ʒß. superhausto vi- ni albi tantillo, superambulando horis 4. ante prandium quod differendum est donec ventri- culus ab omni pondere liber percipiatur. Si quod autem incommodum sentiat in ventri- culo, octavo vel decimo quoque die capiat ʒi. Pil. cochamin.

℞. Rad. cichor. ab interiori parte lignosâ mundat. & diligenter sicc. ʒß. rad. oxalid. gram. fœnic. cort. rad. cappar. & tamarisc. an. ʒiii. santal. citr. ʒii. rasur. C. C. rec. ʒiii. rasur. ebor. ʒi. fol. sicc. agrimon. scabios. veron fœnic. an. m. ii. fol. ceterach. m. in. sem. coriandr. ʒiii. nuc. mosch. numero iij. cerevis. fortior. gallon. viii. post debitam fermentationem propinetur cyathus magnus mane & vesperi horis duabus ante pastus. Poterit etiam in pastibus usurpari.

Rad. altheæ ʒiiii. rad. ebulli, Iridis, enula, bry- on. an. ʒiii. polypod. ʒv. fol. chamædr. chamæpit. ceterach. calend. chelidon. totius, absinth. cen- taur. min. chamæm. melilot. an. m. ii. flor. sambu- ci & genistæ an. p. iiii. sem. anis. fœnic. coriandr. an. ʒi. lign. rhodii ʒii. cort. citri & aurant. an. ʒ. in. f. omnium decoctio in tribus partibus aq. fabror. & unâ vini albi, addendo sub finem unc. vi. aceti scillit. pro fotu spongiis latis intinctis & expressis vicissim applicando per horam inte- gram mane & vesperi.

Linatur etiam Hepar litu sequenti.

℞. Butyri rec. ol. amigd. dulc. & viol. an. ʒi. ol. rosat. complet. ʒii. succ. cichor. agrim. oxylap. an. ʒi. aq. ros. & plantag. an. ʒiß. aceti vini albi ʒiii. Bulliant ad liquorum aqueorum consumpt. mox f. per pannum lineum colatura, cui adde pinguedinis gallinæ rec. spern. cœci rec. an. ʒß. M. f. Linimentum usurpandum ad regionem He- patis mane & vesperi superposito linteo.

℞. Mass. empl. diachyl. ireat. ʒi. diacaleit. ʒii. cerati santal. ʒß. picis Burgund. in oxycrato;

coct. 5ij. liquentur simul & f. Emplastrum cuius portio extendatur in alutā debitæ formæ, tegatur Sydone & applic. *Theodor. de Mayerne Prax. Medica lib. 3.*

Non dissimiliter accidunt obstructions, inflammationes, tumores, & abscessus jecori, ac lieni, qui tamen facilius dignoscuntur ex situ tumidæ regionis ad dextrum vel sinistrum hypochondrium. Obstructo namque, tumefactoque Hepate, præter duritiem, & inflationem, in dextro hypochondrio, percipitur sensus ponderis, præsertim in ampliori respiratione, & motu post assumptum cibum, quoniam Diaphragmati Hepar alligatur. Si vero inflammatione corripitur, etiam febris cum arida tussi comitatur, & respiratio difficilior, cum pulsu celeriori, frequentiorique. Unde deceptus Medicus ille Siculus 5. de loc. aff. cap. 7. arbitrabatur se pleuriticum esse, cum jecoris affectu laboraret. Memorat pariter Galenus eodem loco alia signa, quibus affectiones Iecinoris ab illis vicinarum partium internoscantur, ut & à Musculorum Abdominis tumore, vel inflammatione, quemadmodum refert evenisse Stefano Abscessum inter musculos abdominis passio, quem Hepati reliqui Medici adscripserant.

Cæterum lieni accidit frequentius scirrhus, hoc est tumore duro, & indolente, gravari: aitque Hippocrates lib. de Aëre, aquis, & locis a potibus aquarum palustrium, & immobilium, magnos lienes, & plenos effici, ventresque dueros. Inde autem universum corpus macrescere contingit, ac decolorari, ut notavit idem Hippocrates lib. de loc. in hom. & Galen. 1. de natural. fac. cap. 9.

Quod ad obstructions pertinet cum Iecoris, tum Lienis, eadem proderunt, quæ in Mesenterii ejusque ductuum obstructionibus memorata sunt. Speciatim verò in scirrhus adhibentur emollientia, & leviter dissolventia ex gummi præsertim ammoniaco parata, qualia sunt pilulæ tartareæ Bontii, & de ammoniaco Quercetani, atque emplastrum, ejusdem. Quæ item ex chalybe conficiuntur, salubriter conferunt, cum & incidendo obstructas vias reserant, & acidum corrigendo sanguinem repurgent. Ab Hartmanno conficitur aqua æquivalens spiritui aperitivo Penoti; itemque alia philosophica dicta, seu spiritus vini tartarisatus. Apud nostrates est in usu vinum medicatum ex chalybe & vitriolo ad subbrustum colorem igne pulveratis ope sulphuris & nitri. Efficacius est vitriolum ferrum Vinum etiam absinthites optimum, ut & aqua absinthii stillatitia, & ferraria. In cibum profunt nasturtium, eruca, asparagus, fœniculum, petroselinum, siler, cappar; itemque crocus, cinnamomum, zinziber. Sæpe numero tamen scirrhus cum ægrotante consenscit, præcipue si diutius opportunis remediis obstiterit; quin imo ex Hippocr. lib. de affect. in hydropem mutari solet.

Minime verò prætereundum ab obstructo tumidoque jecore, aut liene sæpissime hæmorrhagias oriri: quod etiam animadvertum a Volchero Coitero. Etenim ab horum viscerum obstructionibus, cum non bene secernatur, repurgeturque sanguis, in causa est, ut acrem, acidamque conditionem nactus, oscilla arteria-

rum, & venarum aperiat, sibi que viam faciat. Unde ejusmodi sanguinis fluxum nonnisi obstruentes humores inde deducantibus, acidumque temperantibus potissimum ex chalybe medicamentis brevissime cohiberi contingit, non sine vulgi admiratione.

His præterea curatum scirrhum narrat Forestus: Radicis filicis 3. i. & radic. Cuscutæ 3. ii. ebullire jubet in 3. viii. vini albi veteris ad tertiæ partis consumptionem. decedum autem colatum patienti exhibet. Hoc etiam cerato lienis regionem inungendam mandat: ol. cappar. 3. i. lilior. alb. amygdal. dulc. chamæmel. & butyri recent. singul. 3. ss. succ. bryoniz, & cyclam. 3. i. bull. ad consumpt. succor. deinde add. gummi. ammon. aceto sol. 3. ii. ss. pingued. gall. medull. crur. vitul. cesp. humid. singul. 3. ss. pulver. cort. rad. tamar. capp. ceterach. rad. filic. singul. 3. i. pulver. sem. agn. cast. & genist. singul. 3. i. ceræ parum f. cer. Testatur insuper minui lienem totum aceti acerrimi, in quo lapis pyrites candens extinctus sit, cum spongia in regione lienis. Et Benivenius utitur capparibus pro cibo, & aqua ferratorum pro potu: & quidem illis capras, hac vero canes lienibus diminui comperitum est. Apud Heurnium mirabile dicitur emplastrum ex Cicuta, & ammoniaco aceto dissoluto ad duritiem quamcunque emolliendam. Et ab Hildano conficitur, commendaturque unguentum de Cicuta dictum. Aliud proponitur ab Aquapendente compositum ex duabus partibus ammoniaci aceto dissoluti una succi nicotianæ, terebinth. & succi ebuli altera, dimidia resinae pruni cum ol. cappar. & ceræ novæ q. f. Merisque splen peracuta securi iteratis ictibus scinditur, cute non dissecta; mox vero cataplasma apponitur ex verbena, sinapi, capparibus, & farina hordei, quo per alvum magna atri sanguinis quantitas exturbatur, & lien in suam naturalem molem restituitur: quod remedii genus Rusticis est familiare; idque vidi aliquando tam dextrè actum, ut certè admirationi esset. Hanc etiam medendi duri lienis rationem commemorat Cartesianus de Rer. variet. De cætero purgantia validiora, vehementerque exagitantia, & obstructos ductus commoventia monitu Hartmanni vitanda sunt.

Postremo ad inflammationem Iecinoris, cautiones à Galeno traditas summopere observandas velim ab illis potissimum qui credunt nimium refrigerantibus, & acidis potionibus, & lituris relaxantibus, facile citoque illam sanatam iri: cum cæteroquin ab his mors certò expectanda sit, scilicet recrudescantibus humoribus, aut promota suppuratione, quæ huic visceri intensissima est: nam ex suppurato Jecore ii solum evadere dicuntur Hippocrati 7. Aphor. 45. quibus in tunica pus continetur; omnino verò pereunt, cum ad parenchyma usque corruptio pertingit, ex Gal. ibidem. Interdum etiam singultus, aut alvi fluxus inde subortus, est uterque lethalis, alter ex Hipp. alter ex Avicenna.

Ea igitur conducibilia duntaxat putanda sunt, quæ hærentes humores dissolvant, & per sudorem, vel urinam educant: quamquam, inquit Galenus, diuretica potius convenire in affecta parte

Iecoris gibba. Cum cibis commisceantur herbæ detentos succos ad vias urinæ deducentes. Viscus autem tenuis sit, neque glutinosa, neque acida, neque dulcia, & contipantia admittat.

Quamvis autem dissolventia cæteris præferenda videantur, ea tamen acria nimis haud sint; quamobrem sedulo his tantummodo incumbendum, quæ blande congestos succos diluant, & in proprios ductus promoveant. Sic quoque danda opera est, ne suppuratio insequatur. Quare ab initio suadet Petrus adhibenda esse epithemata ex saccharo saturni dissoluto in aquis; vel succis depuratis solani, plantaginis, rosarum fragarum, quibus utile erit addere luccum absinthii ex documento Galeni. At ab his parum vel nihil emolumenti sperare licebit.

Quo si suppuratio inhiberi nequeat, videaturque congestus sanguis in pus abire: quod dignoscitur ex superveniente insolito rigore, cum febris incremento, doloris reditu, & sensu fluctuationis sub dextro hypochondrio; ac patientius ex urina, vel dejectione purulenta, aut etiam ex anacatharsi, quod rarius, tunc quoad fieri poterit, promovebitur puris evacuatio per eam viam quam Natura indigitaverit, exhibitis quoque quæ robovent, & abstergant, ut & potionibus vulnerariis cum balsamo sulphuris anis. vel terebinthi. Vinum medicatum ex medulla ligni guajaci, floribus rosamarinum, & hyperici mire aliquando contulit; sicut pariter extractum hyperici in oratum oleo macis, vel cinnamomi. At in hoc Naturæ solertia præ cæteris valentior erit quæ ex Hipp. prima Morborum Medicatrix dicitur; & ut inquit Galenus, mille sibi parat vias; regenerandæque carnis præcipuus opifex exiit. *Lucas Tozzi Medici. Practic. lib. 2.*

De Tumore Iecoris, Rugitu ventris, & Spirandi Difficultate. Pro Nobiliss. Raguseo.

Cum Pericultris, & Nobilissimus Iuvenis ab anno 14. ætatis ad 19. usque hæmorrhagiam ex naribus copiosissimam, & frequentem passus fuisset, hac imminuta 18. anno incidit in febrem acutissimam, & mali moris, cum exanthematibus, & carbunculo circa os sacrum; à qua immunis evasit, superveniente copiosa sanguinis excretionem per nares, ita tamen convalescere visus est, ut in hanc usque diem de variis affectionibus conquestus fuerit, vertiginosa videlicet passione, capitis incallescencia, quam inflammationem capitis vocat, dolore ventriculi, cum læsa coctione, palpitatione, rugitu ventris inferioris, & difficili respiratione. Quæ quidem affectiones convalescunt æstuantem Syrio, & vigente hieme; quarum cura tentata fuit hætenus variis præfidiis cum internis tum externis: imprimis vero inustus fuit fœticulus coxæ dextræ maximo cum fructu, ita ut eorum plurimæ cesserint, aliz vero remiserint. Verum quia respirationis difficultas adhuc molesta est, cum ventris aliquando rugitu, & capitis inflammatione, quandoque vero absque aliis affectionibus, videndum quid facto sit opus, quo ab hoc affectu liberetur. Quod ut ex methodo fiat, præmittenda est eius essentia, cum causis. Sic enim elicetur methodus curativa.

Affectus autem hic alius non est, quam motus imminutus musculorum thoracis, ac proinde symptoma in actione animali læsa; rugitus

vero inferioris ventris, vel symptoma in excretionis immodice retentis, cum colubeantur flatus: vel actio sensitiva depravata hoc symptoma consequens, ob murmur illud insolens quod percipitur. Capitis autem inflammatio est qualitas mutata, ex primis quidem; non tamen est morbus, quia non est affectus permanens; neque luculenter lædens operationes, sed symptoma tantum. Quorum quidem omnium symptomatum causam antequam proponamus, quædam præmittemus, totius, & partium temperamentum spectantia, quæ nobis præluceant ad cognitionem morborum, & causarum à quibus ortum ducunt. Cum autem ex actionibus partium, colore, & juvantibus ac lædentibus potissimum depromantur indicia temperamenti ipsarum; censemus universale, & particulare partium principum, & ventriculi temperamentum utcumque excellere in caliditate; ita tamen ut cerebrum sit etiam humidius, aliz vero partes parum excedant in passivis qualitatibus, & potius ad siccum vergant. Caliditas totius patet ex fusco colore, Iecoris caliditate; à qua sæpe dependet temperamentum totius corporis, ex Lib. Art. Medicinalis Gal. Iecoris autem caliditatem prodit venarum amplitudo, redundantia sanguinis per nares excreti, febris acutissima, qua laboravit & excreta biliosa, & melancholica per alvum; caliditatem autem cerebri cum humiditate, color niger capillorum, erisporum utcumque, facilis capitis incallescencia, excrementa fursuracea, somni profunditas, & venarum in oculis conspicua turgentia. De ventriculi vero caliditate, vel frigiditate nondum satis constat; cum coctionis vitia utramque causam agnoscant. Licet autem major sit flatus proventus à frigido, quam à calido; attamen cum vitiosa concoctio in patiente Nobilissimo fuerit corruptio ciborum ad nidorem, quæ caliditati non verò frigiditati adscribenda, atque dolores, quos passus est, fuerint acuti, purgativi, & veluti erodentes, susceperitque juvamentum à refrigerantibus, usui scilicet feri lactis caprilli, nocumentum verò à calefacientibus, inunctionibus, fomentis, & pannis calidis applicitis, determinandum censemus ventriculum excedere in caliditate; à qua etiam intemperie flatus coacervari possunt, quando loco perfectæ chylicationis sit ciborum exustio in ipso: quæ tamen caliditas non est morbosa, nec valde præpollet: huiusmodi enim non solum flatus generaret, sed & resolveret. Quemadmodum enim ab excedente frigiditate non generantur flatus, quia non fit actio, ab intensa caliditate vicissim excitantur, & resolvuntur ob vehementem actionem: ita ab ea non valde excedente produci poterunt, non tamen resolvi; non secus ac anni tempore calidissimo, & frigidissimo silent venti, non autem mediis temporibus. Verum quidem est, quod affectionum propositarum aliquæ fieri possunt etiam sine intemperie calida ventriculi, corruptio videlicet ad nidorem, dolores, & flatum copia, ex sola nempe materia biliosa à jecore transmissa ad ventriculum; ut propterea inæqualis intemperies constituitur, calida scilicet ratione materiæ; frigida verò, ratione solidarum partium. Attamen in casu præsentis non fiunt hæc accidentia à

materiæ præsentia, sed ab intemperie solidarum partium, quandoquidem ante seriosum ventriculus vacuus esse debuit à materia biliosa; ut ideo ratione partis solidæ frigida seripotio noxæ esse debuerit: quod non contigit omnino, præterquam quod aliquando saltem adfuisset cruditas ad acidum, ob frigiditatem solidarum partium, cum non semper confluat bilis à jecore ad ventriculum; quæ tamen cruditas nunquam se prodidit. Ratum itaque sit, cerebrum ad calidum & humidum, ventriculum, jecur, & totum corpus ad calidum vergere, cum levi excessu siccitatis.

Quibus sic statutis, non est difficile reddere rationem symptomatum propositorum. Caliditas enim capitis, quam pro inflammatione habet dependet à vaporibus calidis ex venoso genere exhalantibus: rugitus in abdomine, & vitiosa coctio ventriculi, à caliditate ipsius, & jecoris cibos assantibus, & in status convertentibus. Obscurior autem & abstrusa magis est causa difficilis respirationis, cuius essentia in eo sita est, ut non possit libere attollere thoracem, quo totum aërem commode admittat, sed in media dilatatione cogatur quiescere. Hæc autem multas agnoscit causas, omnes tamen ad morbum in via reducendas, qui cum possit esse subsidencia, obstructio, compressio, coalescentia, & adstrictio; triplex erit in præsentia causa, subsidencia videlicet pulmonum: obstructio nervorum ad musculos perreptantium; & compressio diaphragmatis à jecore facta; quod ideo comprimit diaphragma, quia laborat insigni obstructione, quæ potius tumor ad scirrhum vergens nuncupanda venit, quam simplex obstructio. Quæ autem sit vis tumorum, cum lenis ad intercipiendam respirationem, fidem faciunt qui iis laborant, non solum inflammatoriis, quorum est indicium præ cæteris difficultas respirationis, sed etiam scirrhosis & scirrhosis exquisitis, quum à graviore pondere harum partium comprimitur diaphragma, ac proinde intercipitur respiratio. Accedit & secundo levis quædam obstructio, vel semi obstructio potius nervorum ad musculos thoracis dispersorum; cuius ratione non confluit ad eos ea virtutis, & facultatis vis, quæ illis movendis omnino, & thoracis commode perfecte diducendo par sit. Locum etiam habet aliqua pulmonum subsidencia, ex copia materiæ in ipsis contentæ. Quanquam enim de tussi non conqueratur, quæ solet indicare materiæ copiam in pulmonibus, hoc tamen non est signum demonstrativum eos vacare materia; quia quando hæc non irritat, tussim non excitat, qualis ista est, ut patebit. Atque ita constat symptoma propositum à tribus morbis dependere, subsidencia scilicet obstructione & compressione, ac proinde à morbo in via. Nunc causas horum morborum inquirentes, dicamus, subsidenciam, & obstructionem ab una eademque causa dependere, destillatione scilicet materiæ pituitosæ à capite. Quotiescunque enim caput est calidum & humidum, est semper opportunum destillationi, & multis excrementis redundat, collectis per attractionem, & generationem, quæ decumbunt ad partes inferiores, & potissimum ad nervos musculos thoracis dicatos, ad pulmones, tanquam partes imbecilliores; tempore calidissimo imprimis, quia ab inigni caliditate

liquantur humores; frigidissimo vero, quia & excedens externa frigiditas per compressionem destillationes inducit, ut propterea affectiones propositæ his temporibus convalescant, Verum præter has causas statuere quæritiam possumus; quod ad venas pulmonum confluat copia illius sanguinis, qui olim per nares excrebatur, qui cum sit & crassior, & copiosus, potest gravare pulmones, & sic impedire ipsorum dilatationem, non vero irritare facultatem expultricem, excitare tussim. Quia vero affectionem propositam auget jecoris tumor, huius etiam causam censens us materiæ cum pituitosam, tum melancholicam; pituitosam quidem, non genitam ob intemperiem frigidam ventriculi, sed potius ob excessum caliditatis jecoris attrahentis chylum à ventriculo non elaboratum, & crudum, atque ita coacervantis copiam humoris crudi, & pituitosi; accedente etiam inordinata vivendi ratione in sex rebus non naturalibus, quæ accumulare potest excrementa. Melancholica vero genita est ex sanguinis atlatione à jecore fervido; cui intemperiei naturali accedit & morbosa calida & ipsa, à virulentia Gallica, quæ alias laboravit, cum non semel, sed sæpius gonorrhœam passus sit. Quantum autem polleat lues hæc ad jecoris noxam, palam faciunt, qui censent subiectum huius esse ipsum. Unde etiam si non existimaverim superesse adhuc aliqua huius vestigia, cum multis annos nullo se symptomate proderit, suspicione tamen prorsus non vacat, a lue præterita recur intemperatum magis redditum fuisse. Atque hæc de causis præsentium affectionum. De præteritis enim frustra est consilium; ut propterea neque de vertigine, neque de ventriculi dolore, aut aliis symptomatibus agendi locus sit.

Ex His colligere est, patientem Perillustrem pristinae sanitati restitutum iri, cum quia juvenis est, tum quia affectus propositi non sunt adeo graves qui respuant medicam opem. Quod tamen adeo inproclivi non est, propter jecoris obstructions, quæ difficulter removebuntur, & partium intemperies naturales, quæ novam materiam iugiter subministrare poterunt.

Quo autem voti compores simus, materia in pulmonibus, nervis thoracis, & jecore collecta, necnon quæ in capite, & ventriculo, ut pote quæ potest affectiones propositas fovere, est evacuanda sensibilibiter & insensibilibiter; primo autem attenuanda, & incienda; intemperies partium quidem corrigenda, exsiccantibus humidam capitis, refrigerantibus vero cum eiusdem, tum calidiorem jecoris, ventriculi, & totius corporis intemperiam; præmissa tamen totius cura. Quæ præstabuntur præsidis Chirurgicis, Pharmaceuticis, & Diætæ.

Quoad Chirurgica, venæ jecorariæ sectio est apprimè necessaria, habita quæritiam ratione hæmorrhagiæ præteritæ iam suppressæ; statutisque temporibus educetur ex venis aut hæmorrhoidalibus, aut saphena, quando illæ non intumescunt.

Pharmaceutica sint primas vias lenientia, syr. ros. sol. & manna electa, cum decoctione flor. & fr. seminibus citri additis. Humorum fiat præparatio syr. de acetositate citri, de succo acetosæ & de cichorio cum aquis cichorii, borraginis, acetos. Furgabuntur iidem rhabarbaro intus in aqua acetosæ, adito syrupo rosato solutivo; ac statim hausta libra una seri lactis caprini optime depura-

depurati. Deostruentibus, demum locus erit, syr. de eupatorio, de quinque radicibus, & de cichorio composito cum aquis agrimon-
ta, cetrach, tamarisci additis leminibus qua-
tuor frigidis maioribus: cuius usus erit 15. dies in-
fundendo tertia quaque die drach. i. rhabarbari
noctem in prædictis aquis, ad Balneum Mariæ, &
facta valida expressione: atque octiduo post præ-
mittatur bolus ex ammoniaco, & trochiscis cy-
pheos; horisque vespertinis exhibeatur drach. ii.
pil. de tribus cum rhabarbaro, hora ante coenam;
facta interim unuotione jecoris oleo amygd. a-
mararum, de capparibus, & de absinthio; appo-
sito cerato oxycocco. Hic enim cum congrua
victus ratione cedit hypochondrii dextri tensio
& durities. Ad flatum autem in diuturnos, stilici-
dium ex Aquis thermalibus calidis toti ventri
opportuū erit. A qui us ad contenperan-
dam viscerum intemperiem, cum ventriculū
roborandum, summo pere ex usu erit potus a-
quæ B. Virginis in agro nostro Patavino, cum
Patavium venerit. Præscribetur autem ex more
cum vehiculo, quo per urinam ducatur 12. vel 15.
dies. Roborabit enim ventriculū, & jecur, præ-
scripta congrua victus ratione prædictis respon-
denti. *Be. ad. Silvaticus. Consil. & Resp. Med. Cent. 3.*

Jecoris Inflammatio.

Clarissimus Vir quadragenarius, temperamen-
ti totius & jecoris calidi & humidi, mediocri
habitus, libere vivens, sed præsertim strenuus vi-
vini meracioris & dulcis potor, hac ineunte æ-
state, postridie statim à copioso potu, circa me-
ridiem febre correptus est, cum horripilationi-
bus inæqualibus invadente, cui tarde, & non nisi
vespertinis horis calor successit. Interim vomitus
coarctavit materiam tenuis & amaræ, cum liti mole-
sti sima, non non dolore gravante in latere dexte-
ro, levi tussi, sine ulla materię excreatione. Do-
lor autem sub costis mendosis potissimum urge-
bat, verum usque ad jugulū protensus, cum spi-
randi difficultate, quo tota nocte adeo concitata
est Pat. ut in latus affectum decumbere mi-
nime poterit, præsertim ob agitationem à non
levi febrili calore. Quare sequenti mane Medi-
cus domesticus acersitus, Pleuritidem adesse
existimans, injecto statim clystere, venam me-
dianam affecti lateris aperiri, atque hora post
Flor. Cass. cum pulv. liquiritiæ exhiberi jussit, pe-
ctori quoque inundione ex Oleo Amygd. &
Viol. adhibita. Expectorantia pariter ex Iulap.
acer. & Syr. de Ibisco, vespertinis horis præscri-
psit, & Aquam hordeaceam Iujubis & Siliquis al-
teratam, cum Saccharo, ad potum parari præce-
pit. Hisce tamen, licet accuratè administratis,
dolor non cessit, neque febris, quinimo hæc tota
nocte eodem statu perduravit, sicut & dolor quo-
que iisdem symptomatibus comitatus, quibus
insuper, accessit ingens cibi fastidium, & fre-
quens paucæ bilis vomitus cum tussicula, ac sine
sputis. Quamobrem, summo mane sequenti, ego
quoque una cum medico domestico in Consilium
advocatus omnibus enarratis diligenter expen-
sis, partem dolentem contrectans, in hepatis re-
gionem durum, nec adeo exiguum deprehendi.
Quare in hanc sententiā sermonem exorsus sum.

Tanta intercedit similitudo Pleuritidi cum Je-
coris inflammatione, ut sæpe alteram alterius
loco habeant decepti medici, ut contigit, Siculo
Medico se Pleuriticum existimanti quem tamen
Jecoris inflammatione laborare primo intuitu,

cum Glauconis admiratione agnovit ipse Gas-
ex panni spirandi difficultate, pauca tussi & ari-
da, seniu, gravitatis & dolore ad jugulū dif-
fuso. Quare nil mirum nos etiam circa artem
conjecturalem variantes aliquando decipi, je-
coris siquidem, non pleuræ inflammatione Cla-
rissimus iste Patiens divexatur. Neque nos fal-
lere potest inflammatio inter transversales & ob-
liquos muscululos aliquando suborta, quæ conti-
git Stephanio, & M. illos illius temporis decepit.
etenim tumor hoc casu satis immeritus, & sub-
musculosus, si observatur, præterquam quod nec
tenus adeo vehemens esset, nec cætera sympto-
mata adeo gravia, quæ jecoris inflammationem
certo significant, præter durum quippe tumo-
rem, tangentem mantellum, dolor adesse gravans
potius quam pungens, pro partis conditione,
obscuro prædictæ iussu, qui usque ad jugulū
propagatur, cum dimicili respiracione, quoniam
septo jecur per ligamentum appenū est, quini-
mo quandoque contigit ut costæ nocte etiam
doleant, si, ut in quibusdam, jecur ope abra-
zæ iisdem amectatur. Exigua quoque tussis exci-
tatur, à calore quodāmodo irritante ad septum
& spirituales partes distulo, quæ propterea ari-
da est & sine sputis. Bilis vero vomitus hic ex por-
tione sanguinis ab inflammato iecore corrupti,
atque in bilem conversi, ab expultrice in ventri-
culū transmissi, & ab eo vomitu electi. Nec mi-
rum urgere sitim & appetentiam delicti, calore à
iectore in ventriculū propagato, præsertim à
vehementi febre, quæ urpote ab inflammatione
dependens, hepatica & symptomatica ab Anti-
quioribus dicta est.

Affectus igitur idea deprehensa, difficile non
fuerit causas ejusdem indagare, inflammatio eni-
m à sanguine dubio procul genita est, qui pu-
rus quidem foret, & legitimam inflammationem
excitaret, ratione totius & jecoris temperan-
ti; at quoniam consuetus vini meracioris usus,
conspirante nonnihil etiam ætate, jecoris sangui-
nisque fervorem auxit, ideo potius à sanguine
bilioso productam esse credendum, qui quanti-
tate & qualitate naturæ molestus, cum ab arteriis
in iecur effusus, rursus in venas non remearit, in
hepatis non solum vasa, sed parenchyma quine-
tiam transfusus & cohibitus jecur ipsum in tu-
morem inflammatorium, elevavit. Et quamvis
nulla inflammatio, aut cavam aut gibbam tan-
tum partem obsidere soleat, multo major tamen
manifestè apparet in gibba, ut ex tactu, dolore
inter respirandum ad jugulū usque protensus,
cum tussi molesta, sed arida facillime conici
potest.

Inflammatio hæc, ut incipiens, fluentis san-
guinis revulsionem indicat, atque hic, prout co-
pia peccans, evacuationem. Mox repellentia
conveniunt, inde repellentibus aliqua degeren-
tia addenda postea repellentia & digerentia æquis
partibus commiscenda postremo digerentia so-
la usurpanda. Febris vero, licet symptomatica,
refrigerationem & humectationem postulat.

Quibus intentionibus satisfacere aptissime
iam incepit Excell. Vir, licet admodum incertum
sit in reliqua æque explere possimus, cum du-
bus adeo sit acuti huius morbi eventus, ut hu-
iusmodi inflammationes, etiam in valentioribus
lethiferæ esse soleant, & potissimum præsentī cā-
su, quo convexa magis, quam concava pars in-
flammata est. Attamen quoniam tum propriæ

tam opportune adhibita fuerit medica auxilia, & præterea quia virtum robur constat, in quo salutis ipem reponerebat Gal. neque corpus calidum & siccum est, tunc enim ut plurimum egri moriuntur, ideo præsentis animo in curatione progrediendum.

Atque in fonte Chirurgico, cum statim Sanguis extractus fuerit revulsionis gratia, modo id repetendum revulsionis & derivationis causa. Et quamvis in maximis inflammationibus mensura evacuationis sit animi deliquium, nihilominus, nostris temporibus, cum Avic. multiplicationem potius numeri quam quantitatis eligimus, partitis vicibus, ut mox fiat Antispasmodicus, sanguine ducto. Quare jecoraria affectu lateris aperiatur, & sanguis ad libram educatur, etenim per venæ sectionem inflammationes celeberrime evacuantur. Statim autem repellentia sunt applicanda, quibus semper aliquod odorum & aromaticum commiscendum. Sic Absinth. in Oleo Rosæ. maceratum appositum Gal. quinimo ponticum, ut magis astringens elegit, qui etiam Rosam, ut medelam increscentium inflammationum usurpavit, præterea Emplastrum parari iussit ex pulpa Cydon. Myrob. & pulv. Ireos. Nos autem uti solemus succo Cich. depur. additis speciebus Trioniant. & aceto Ros. pro Epith. Vel Ung. Santal. Oleo Ros. & paucis Absinth. succo refor. quæ omnia semper tepida, nunquam frigida adhibenda. In progressu vero succi absinth. copia augetur, & species trioniant. remouentur, & Olea adduntur laxantia, ut Amygd. Chamæm. Liliac. sed prope hanc, semper tamen omnibus laxantibus & resolventibus astringentia aliqua commiscenda, ne in Attali Theophrasti errorem incidamus, qui Theagenem Philosophum Cynicum, jecoris inflammatione laborantem, solis laxantibus enecavit.

A fonte Pharmaceutico reliqua depromenda remedia. Et quoniam cassia assumpta jam primæ viæ expeditæ fuerunt, alterantia exuberare possunt, ut Serum Asininum, vel depur. vel destillatum, decoct. Cich. End. Acet. Sonci. Hepaticæ succi depur. atque filtrati Cich. sonci, End. in decoct. præscripta. Verum ego Aquas potius stillatitias, de succo Cich. End. & Acet. exhibere soleo, ad ℥i. s. vel ii. cum vehiculo diuretico Sy. de succo Lim. Etenim decoctiones & succi diutius in ventriculo morantur, cum aliqua coctione egeant, sicque refractis viribus refrigerantia ad hepar parveniunt. Serum vero depur. non adeo facile permeat, & destillatum igneam quandam qualitatem in destillatione acquirit, quæ Aquis, utpote impensius refrigerantibus, non inuritur, nec conservatur. Observanda autem Gal. cautio, ne quicquam actu frigidum exhibeatur, frigida enim partem densant & crudos reddunt humores.

Clysteres interim molles atque refrigerantes injiciendi ex Lacte, Butyro, & Sacch. Vel ex decoct. Malv. Viol. addito flore Cass. vel Syr. Ros. sol. cum Oleo Amygd. aut Violac. Jam dictis vero medicamentis apposis, & refrigerantibus per os assumptis, observandum quo natura, vergat, materia enim inflammationis causa, non solum insensibiliter digeritur, verum & sensibiliter per alvum, si cava, per urinam, si convexa hepatis pars laboret, expurgari solet, & si utraque, utraque etiam observatur evacuatio. Nos itaque

naturæ imitatores, & ejusdem recte operantis ministros esse oportet. Quare, si alvum petat. Clysteres acriores sufficere solent, ad ejusdem naturæ motum adjuvandum, ex decoct. Malv. Bet. Mercurial. cum Syr. Ros. solut. vel Elect. de succo Rosar. Si vero ad urinæ vias tendat materia, quod facilius fieri poterit calu nostro, quo convexa magis quam concava pars læsa observatur, tunc Aqua hujusmodi præscribi & exhiberi poterit.

℥i. Seri Asin. depur. ℥v. quatuor Sem. frigid. an. ʒi. Rad. Gram. Pentaph. an. ʒi. Folior. Capill. Ven. Agrim. an. m. contund. incidenda incidant. & macerentur in bero per noctem, & sequenti die destillentur, ut fiat Aqua ad ℥i. exhibenda addito Syr. de Succo Lim. Hoc etiam tempore applicetur Emplast. de Melil. utpote emolliens ac digerens. Quæ vera atque legitima hujus inflammationis cura, ejusdem suppurationem omnino prohibens, etenim si ad suppurationem transeat, neque curatio proponenda, dum enim pus in jecoris substantia conficitur, actum est de salute ac vita Patientis, quod nialum omnari possemus casu præsentis. tunc enim tantummodo spes salutis superest in suppurato jecore. quando pus coniectum inter jecoris tunica & ejusdem substantiam congestum est, facti namque, aut usti Patientes evadunt, unde dicebat Hipp. Quando hepar suppuratione aduritur si pus purum huxerit, & album, evadunt; in tunica enim huius pus continetur, si vero qualis a-nurca, pereunt. Addamus nos, quia pus in parenchymate concluditur.

Quibus omnibus congrua erit victus ratio ad denda, cibos & potus dulces vitando. Quare cibos tenuis substantiæ, non acres, non dulces non adstringentes exhibet ipse Gal. qui commendat quoque ptisanam in cistis, quia sine morbo su detergit, sicut in medicamentis Oxymel A qua mistum, cujus loco, vigente inflammatione nos Arabum exemplo, succo acido, Cit. & Lim. cum Sacch. uti solemus, prout in declinatione, Acetum cum Sacch. Jul. pium scilicet acetosum permitti potest. Quod vidit quoque idemmet Gal. dum Mulsam inutilem esse asseruit, quia in bilem vertatur. Hæcque tanto malo expugnando dicta sufficiant. Raym. Joh. Fortis Consult. & Resp. Medic. T. i. Cap. 3.

Jecoris tumor scirrhusus.

Illustrissimus Comes & Eques quadragesimum quintum annum agens, temperamenti totius & jecoris calidi & sicci, humidi cerebri ac ventriculi frigidi, jam diu destillationibus obnoxius, antehac liberam vitam ducens, anno 1669. febre correptus fuit cum copiosa à capite destillatione, rucedinem, tussim, & anhelus difficultatem producente, febris autem integrum annum perseverans ad maciem insignem deduxit Comitem Illustrissimum, adeo ut in hecticam migrasse Medici suspicati fuerint, licet & accessiones (quamvis obscuræ) & declinationes observarentur, pro cuius Curatione chinæ Decoctum, & alia adhibita fuere remedia, quibus tandem adjutus fuit. Sed mense Decembri proximo præterito rursus febris invasit cum accessionibus circa vespertas, & cum extremarum partium refrigeratione incipientibus,

bus, cujus progressu non mediocris calor accendebatur in capite, catarrhalem materiam ita colliquans, ut copiosiori evadente destillatione, rancedo & tussis adaugerentur, cum excretionem viscidæ & lentæ matetiz, insipidæ tamen & cruori commistæ, quam à capite derivari creditum fuit, cum quandoque guttatim e naribus sanguis deflueret usque ad seminumiam, & ideo noctu quoque in somno effluebat nonnunquam catarrhalis materia sanguini mixta. Sitis in febris accessionibus urgebat, & ab initio tumor cum dolore in hepatis regione apparebat, cum urinis ictericis luteum album flavo calore tingentibus. Curata autem fuit febris Alterantibus & blandioribus Chologogis evacuantibus & omnia remissa fuerunt, excepto jecoris tumore, qui adeo excrevit, ut ejus moles fere totum abdomen occupaverit; huic successerunt coxarum & crurum œdematosæ intumescenz, dum e lecto surgit, quæ tamen, eodem decumbente, evanescent: nec decumbens de spirandi difficultate conqueritur, sed solum dum erigitur & e lecto surgit. Pro Curatione varia deobstruentia adhibita tuere; atque tandem antimonium diaphoreticum; sed incassum omnia. Modo singulo mane rhab. sumit ad ʒ.i. in convenienti victus ratione insitit, modico potu ex vino albo aqua diluto utitur. De agendis pro salute consultit.

Jure merito omnium morborum fontem & sobolem esse posse Catharum proferebat Galenus, adeo ut Hipp. quoque divinus asseruerit, fluxionem à capite in carnes Hydropem anasarcam nonnunquam excitare, quod idem præstare posse non dubito, si intrinsecus ad partes naturales decumbat, ventriculi & jecoris robur exoluat, sicque coctiones vitiet, sanguinem totum cruditatibus inticiat, & Cachexiam, indeque Hydropem inducat. In iisdem autem visceribus naturalibus detentis obstructions cumulat, febres putridas quidem, sed catarrhales excitat; quod si ad partes spirituales sese convertat, & rucedines, & tussis, & spirandi difficultates inducere quotidie videmus; hæcque contigerunt Illustriss. Comiti, qui tandem mense Decembri proxime præterito acuta febre correptus fuit, à cujus calore liquata magis magisque in capite catarrhalis materia rucedinem & tussim adauxit, imo & oculis vasorum adaperitis, non solum fluxio cruore tincta apparuit, sed puri sanguinis quoque aliqua portio inde emanavit, & quod pejus est, statim ad initio ictericæ urinz apparuerunt cum jecoris doloroso tumore; ut propterea dubitari potuerit de jecoris inflammatione spuria, nimirum à sanguine exusto ob jecoris calidam intemperiem, & pituitoso tum ob ventriculi frigiditatem, tum vero maxima ob perennem à capite destillationem massam sanguineam inquinantem, qui tandem tumor inflammatorius non resolutus in insignem tumorem scirrhusum degeneravit à culus pondere deorsum tracto diaphragmate; difficillis redditur anhelitus, & ab eodem hæmatosi ipsa vitiata, œdematosæ intumescenz tum in coxis, tum in cruribus apparere ceperunt, quæ Cachexiam & pravum totius corporis habitum prænucciantes, Hydropem quoque minantur.

Omnia igitur agenda, ne in hujusmodi in-

fortunium imminens occurrat Illustrissimus Comes; & quamvis pruna cautela in capitis destillationem referri possit, quia tamen remota est, proximiori incumbendum esse censeo, jecoris nimirum tumori jamfacto, idque præstare tentandum Attenuantibus, Emollientibus Aperientibus, & sensibilibiter atque insensibilibiter Evacuantibus. Quibus intentionibus ut satisfaciamus, remedia sunt petenda à fonte Chirurgico, Pharmaceutico & Dietetico.

Et primo ex Chirurgico parca erit desumenda sanguinis missio ex Jecoraria dextra, ut exploretur totius sanguinis qualitas, & nonnihil jecoris feruor humores adurens remittatur. Reliqua vero remedia ex hoc fonte depromenda; ordine executio inferius describentur.

Ex Pharmacia desumenda essent medicamenta ventriculum & primas vias expiantia, quæ à me in præsens omittuntur, cum jam adhibita fuisse supponam. Expiatis igitur primis viis, ad jecoris tumorem curandum erit deveniendum; primo attenuantibus & humectantibus, secundo aperientibus, tertio aperientibus & evacuantibus.

Et primo pro attenuante parari poterit oxy-mel dilutum, aqua agrim. & aceto paratum, ad ʒ.iii. exhibendum, cui superbibat Comes Illustriss. jus pulli junioris, cichorio, borag. malva & cuscuta alteratum, huicque addantur succi depurati cichorii & agrim. ad ʒ.ii. in cuius usu integra hebdomada perseveret. Inde præbeatur ex lenit. cum ʒ.i. pil. de tribus cum rhabarb. Mox ad ulteriora aperientia erit ascendendum, cujusmodi esse poterit decoctio in iure pulli cichorii, borag. agrim. cuscute, pentaphylli petroselinii & tenebuli rec. in qua dissolvantur gr. xv. aut xx. tart. vitriol. & in huius usu insitit decem aut duodecim diebus; in quorum intermedio assumat pilulam iam propositam de tribus cum rhab. electuario diacath. reformatam, cui post horam superbibat ius malva alteratum.

Post hæc an syrupi Fernel. usum ducendus erit Vir illustriss. cuius descriptio vestris Consultationibus reperitur; hic autem alternis diebus, duodecim saltem vicibus, erit exhibendus ad ʒ.ii. in vino albo tenui, nec dulci, nec austero, quatuor horis ante prandium: diebus vero intermediis assumat decoct. iure pulli paratam ex superscriptis herbis; addita portione radicis althææ, aut lil. alb. cui decoct. addatur spiritus tartari ter retif. ad ʒ.i. sicque alternatim assumat syr. Fernel. & descriptum Aperiens; quorum terminato usu præberi poterit Purgans, ex lenit. confectio Hamech, & pil. de tribus cum rhab. paratum, cui pariter superbibat ius malva vel hordeo alteratum.

Tandem ad validissimum Attenuans atque Deobstruens devenire opus erit, ita parandum ʒ. Salfæ parillæ electæ ʒ. i. radicis Chinæ, radic. althææ an. ʒ. ʒ. aq. stillat. cichor. agrim. an. ʒ. ii. s. m. fiat infusio per horas xxiv. deinde adde dimidium pulli junioris, & bulliant ad consumptionem dimidii. postea fiat colatura pro duabus vicibus, summo mane Viro Illustr. exhibenda; in qua dissolvantur gr. vi. salis ammoniaci siccis sublimati: est enim præstantissimum & efficacissimum Aperiens, & in huius usu perseverandum erit integro mense; singula hebdomada

præbendo pil. de tribus, electuario lenit. aut flor. c. flaciformatani.

Dum iam dicta omnia intrinsecus administrantur, extrinsecus quoque emollientia & resolventia non sunt omittenda; sic cœlypus humidus regionis hepatis applicari poterit; adhuc efficacius erit stillicidium ex alto cadens, lotera l. narum paratum, pauco aceto ad penetrationem superaddito; à stillicidio vero quotidie per horam administrando, succedat appositio Cera- ti diachylonis magni cum ping. edulibus reformati, addito anseris adipe & exiguo absynthii succo, ut tonus visceris conservetur. Interdum apponatur cucurbitula magna hinc inde regionis hepatis, sed cito removeatur & reponatur.

Quibus omnibus congrua victus ratio erit addenda, mediocris quoad quantitatem, attenuans & emolliens quod aequalitatem, quæ tamen viscera non inflet, à Viro Excell. diligenter præscribenda, cuius prudentiæ iam dicta quoque omnia disponenda libenter remitto. *Idem T. 2. Cap. 3.*

*Jecoris obstructio post Lienis tumorem
scirrhum.*

Lienosus superioribus annis fuit Illustrissimus Comes modo ad virilitatem inclinans; tumidum enim adeo Lienem gestabat, ut mediam abdomini regionem, & ultra, occuparet, adeoque durum, ut verum, & legitimum Scirrhum æmuleretur, quinimo talis à pluribus Medicis judicatus fuerit. Et quamvis ejus Curationem difficilem reddiderit temperamentum jecoris calidum, pariterque totius: nihilominus iteratis Purgationibus, & P. Illustrissimi exacta in vivendi ratione custodia, paulatim imminutus, & annorum spatio ad molem fere naturalem redactus est.

Verum quoniam tumidus Lien tractu temporis per venas mesaraicas jecur quoque in consensum trahere solet, hoc ipsum evenit Illustriss. Viro, cuius hypochondriorum dexterum non quidem tumore, sed obstructionibus abundare manibus percepi, quarum partem maiorem in cava jecoris reperiri credendum: id enim non modo ratio suadet, verum & lœteritia universalis, & in facie, atque oculis præsertim quandoque apparens confirmat; Obstructiones enim aut in poro felleo, aut in ramo cholidoco reperiri, aut saltem adaugeri significat. At non soli Lieni jecoris malum est imputandum; verum vivendi quoque libertati tribendum. Sicut enim Comes Illustriss. dum Lien valde tumescebat, exacta & rigida vivendi ratione libenter utebatur, ita eodem viscere imminuto, liberæ vitæ se dedit, tum in cibis & potibus, tum maxime in imp. rtunis exercitiis & equitationibus. Quare in ltiplicatæ cruditates à delicatiori ventriculo ad jecur sese insinuarunt, & secundum crassiorem portionem in eodem stabulantes, forsitan, cum Fernel. crassæ bili quoque immistæ, obstructiones produxerunt, quarum portio crassior ad renes transmissa, diuque ob eorundem naturalem angustiam retenta, à calore in tophos conversa fuit. sicque elapso anno nephritici dolores super venerunt: pars vero tepior una cum biliosis humoribus ad venas de-

lata, circulando per venam cavam ad cor, indeque per carotidas ad caput elevata, dum ab arteriis in caput evomitur, nec à venis refluitur, ut una cum sanguine per venas jugulares circulationem perficeret, redundans in spatium ad synciput defertur, & gravitatis sensum inducit, donec ad aurem dexteram tanquam ab imbecilliore parte olim à folle percutam transmittatur, & per eand. m. saniosa, pravi coloris & odoris, emittatur.

Dum igitur Illustr. Comes ab his malis vindicari se desiderat, & in hunc finem ad omnia diligenter agenda seipsum accingit, præiens anni tempus, ut Purgationibus proprium est eligendum, antequam ob lrucciones in tumorem vertantur, tunc enim à jecore multo facilius, quam à Liene Hydrops provenire posset, transfusiones enim à Liene ad jecur periculosas, sicut à jecore ad Lienem utiles existimabat Gal. ut propterea Avicennas jecoris obstructionem matrem omnium malorum jure merito appellaverit. Sed præterea calculosus etiam reddi posset Illustr. Patiens.

Antequam autem aliquod aliud ex hac malum emergat, & altiores radices sibi ingat, evellenda à nobis & radicitus extirpanda, si non unica, saltem iterata vice, hujusmodi prava & venefica radix, primo primas vias exiundo. Secundo Cavam partem jecoris, nimirum ramos venæ portæ aperiendo. Tercio Pariem gibbam, nempe ramos venæ cavæ ab obstructionibus expediendo. Quarto Veno un. genus depurando; atque tandem ipsius jecoris & renum calorem contemperando, viasque patientiores reddendo; ita enim & capiti non parum prodesse poterimus, cuius vera Curatio in a. iud erit tempus differenda: non enim possumus Vere præsentibus Dominis ita distantibus inservire. Et à Chirurgico fonte omnium primo est depromenda sanguinis missio ex Jecoraria dextera, præsentis Medico, ut si niger & crassus appareat, ad vii. usque uncias exire permittatur; sin minus, supprimatur. Hirudines quoque venis sedalibus applicitæ, & ramis venæ portæ, & capitis prodesse possent, modice tamen sanguinem educendo. Sicut nisi Vir Illustr. abhorreret, Cauterium in brachio ad materiam ex aure defluentem divertendam & educendam, remedium esset insignis profectus.

Reliqua remedia à fonte Pharmaceutico sunt desumenda. Et Lenientia erunt potio ex mian. clarif. aut syr. ros. sol. vel elect. lenit. cum tartaro. Quinque autem aut sex diebus intermediis Præparans erit Julapium acet. cinnamomo aromatizatum, & aqua florum citri dissolutum.

Pro secunda intentione explenda succi depurati & per arenam trajecti cich. borag. ad 3. ii. erunt præscribendi, intem. jure pullæ cich. & præterea lupulis & malva alterato, in quo dissolvatur scrupulus salis prunellæ. Sequenti vero die offeratur rhabarbarum ad 3. i. flori cassiæ immistum, ita ut formentur boli duo summo mane assumendi, quibus post horam superbibat ius malvarum vel hordei, sicque alternatim procedat, succos & rhab. assumendo ad decimum usque diem. Mox hauriat portionem clarif. addendo infus. consuetæ rhab. & agarici portionem, cui post tres horas superbibat aut seri

feri asinini depur. aut aq. hordeat. ℞. i. ℥. Quod de lætione ab aquis conqueratur Illustrissimus P. substituaturs jus pullæ malva aucthordeo alteratū.

Tertiz intentioni, inno simul & quartæ satisfacere poterit syrupus Fernel. cum rhab. secundum descriptionem in nostris Consultationibus traditam, ad ℥. ii. in jure pullæ endivia aut cichorio alterato. Sequenti vero mane bibat cyathum aq. stillat. cichor. & agrim. in quo dissolvatur semidrachma Aperientis nostri circulati, quo efficacius adhuc erit sal ammoniacum septies sublimatum, & semel per chalybis limaturam tractum ad gr. vii. exhibendum; ita alternatim erit procedendum, syrupum Fernel. altera die, altera vero Aperiens exhibendo, ad vigesimum usque diem: tuncque potio à superiori non dissimilis erit præbenda, cui superbibat feri asinini depur. ℞. ii. in eum finem, ut ad lactis usum ventriculus & hypochondria disponantur.

Et quamvis quintæ & postremæ intentioni satisfacere posset lactis asinini usus, nihilominus quoniam præstantissimum sese mini offert medicamentum pro reliquis obstructionum extirpandis renibulque mundandis atque patefaciendis, ideo consulo ut Illustriss. Comes ad aquas vitriolatas in Valle Solis nascentes assumendas se ipsum conferat, quæ quoniam exiccandi quoque facultatem quandam obtinent, adeirco xv. diebus ante earundem assumptionem, ut præcedat lactis asinini usus humectans, optimum fore censeo, cujus usus post assumptas aquas erit reassumendus ad triginta saltem dies, & decimo quoque die ele& lenit. ad ℥. vi. aut ad suum ad unciam assumere sit contentus. Pro materia vero ab aure emanante nihil in præsens, nisi ut auris aperta conservetur; Decubitus in primo somno in latus affectum procuretur; per nares blande divertatur & evacuetur, pulverem radic. Ireos Florent. mane attrahendo, & pro nunc nil aliud agendo.

Congrua autem victus ratio est ad usum revocanda, abstinendo ab eduliis crassæ substantiæ & difficilis concoctionis, imo & ab aperientibus omnibus, ut quæ facile atque celeriter in coctæ & ad jecur, & ad renes ferantur, & reliquos cibos crudos ad partes easdem secum ducant. A vinis dulcibus pariter prorsus abstinendum, ab exercitiis post prandium, à vigiliis, à coitu frequenti & à nimis applicationibus. Interim alacri & confidenti animo vivat. *Idē. ibidē.*

Inflammatio Hepaticis.

Vir 36. annorum crapulæ passim indulgens, incidit in dolorem gravativum, hypochondrium dextrum, cum inani tussicula, & respirationis difficultate, occupantem. Dolor ab hypochondrio ad claviculam sese extendit. Facilius æger supinus, quam in latere jacer. Pulsus est valde celer, ac creber, & inæqualis. Lingua arida rubensque. Sitis adest inexhausta, cum nausæa, cibi fastidio, & singultu. Urina observatur rubicunda.

Afficitur in hoc ægro hepar, quod ex dolore gravi, hypochondrium dextrum occupante, & tussicula inani, ac respirationis difficultate, nec non nausæa, cibi fastidio, & singultu committatâ porissimum patet. Afficitur etiam cor, quod ex pulsus illis vitis; item ex siti inexhausta, & lingua arida, & urina rubicunda, est manifestum.

Morbus, qui ipsum affligit, est Inflammatio

hepatis: eaque ex dolore hypochondrii dextri, siti perpetua, febris continua, aliisque symptomatis in historia commemoratis, innotescit.

Causa procataretica hujus morbi est crapula; cui æger passim indulgit. Hinc enim multi sanguinei & fervidiores in corpore ejus geniti humores antecedentem huic morbo præbucere causam. Pars vero eorum nese extra vasa in substantiam hepatis effundens, ibique putrescens, & vehementer incalescens, continens hujus morbi & symptomatum est causa.

A copiâ enim istorum humorum, hepar occupantium, & in eo vehementer incalescentium, oritur in eo tumor inflammationis, indeque gravis sive gravativus hypochondrii dolor; qui propter pondus visceris, & viciniam, connexionemque cum diaphragmate & pleura, ad claviculam sese extendit, & respirationis difficultatem inducit: & quia ardor hepatis & ejus humores per evaporationem, propter viciniam, ventriculo & pulmonibus perpetuo & copiose communicantur, hinc oritur in nostro ægro singultus, nausæa & cibi fastidium, & sitis inexhausta, ac inanis tussicula. Parte vero istorum accensorum humorum perpetuo ab hepate ad cor per venam cavam ascendente, vehementiusque ac malignius ibi incalescente, & in os ex pulmonibus exhalante. Hinc in nostro ægro, febris est continua symptomatica, sese per pulsum celerem & crebrum & inæqualem, & sitim illam inexhaustam, nec non lingua arida, rubenteque se prodens.

Morbus hic, propter magnitudinem suam, ac partem affectam, graviaque, quæ inducit, symptomata, ac etiam ob metum atrophie hydropis, aliorumque gravissimorum morborum, est periculosissimus.

Curatio itaque diligens adhibenda est: eaque in causæ procatareticæ, antecedentis, continetis, & intemperici, per contraria ablatione, consistet.

Primo itaque mox vena in dextro brachio aperiaturs, sanguisque ad ℥viii. vel x. pro ratione viri, educatur. Venæ sectioque reiterari poterit. Sequenti die tali lenitivo medicamento purgeturs.

℞. Castæ recens extra& ℥i. Rhabarb. pulverisati ℥i. Aq. cichorei q. s. m. f. Haustus brevis.

Expurgato corpore, inungatur regio hepatis unguento santalino, & pannum, lineum eodem unguento inunctum apponatur. citra calefactionem. Interea etiam sequenti utatur decocto:

℞. Rad. cichor. endiv. an. ℥i. Taraxaci, petroselin. scnicul. an. ℥i. Herb. endiv. cichor. taraxaci. acetos. violar. Lactuc. an. m. i. fumariz. agrimoniz. capill. ven. Borrag. bugloss. chamæpleis, an. m. f. Sem. 4. frigid. major. an. ℥ii. anisi ℥i. Tamarind. ℥i. pruna. acida. No. vi. Uvar. pass. 3x. hord. mund. p. i. liquirit. rasæ ℥iii. Decoq. in aq. com. ad ℔i. f. Colat. adde Syr. de limonib. ℥ii. f. Apozema, de quo sumat æger subiinde haustum, ter quaterve in die.

Morbo magis inclinante, pro dolore utatur sequenti epithemate, regioni hepatis pannis lineis adhibendo:

℞. Herb. endiv. cichor. viridis, an. m. i. Florum camomill. melilot. Rosar. rubr. an. m. f. Summit. absinth. p. i. Coq. in aq. communi ad ℔i. in fine addendo Aceti opt. ℥ii. spec. diatrium sant. ℥i. f. Iterum ebulliant, & postea colentur pro Epithemate. Post Epithematis adhibitionem inungatur locus tali linimento:

℞. Ol. amygd. amarar. camomill. an. ʒi. Ol. rosa-
cet. unguenti santalini an. ʒii. M. pro Linimento.
Vorro si inflammatio invalescit, atque ejus sup-
puratio, (quæ tamen omni studio præcavenda,
ne ulcus immedicabile sequatur) prohibere ne-
queat, natura mollientibus & maturantibus ju-
vanda est; itaq; tale tum adhibeatur cataplasma

℞. Rad. althææ ʒi. Fol. malvæ. flor. camomill.
Farinæ hord. an. m. i. Sem. lini ʒi. Coctis iis & con-
tusis adde pinguedinis gallinæ q. s. F. Cataplasma.

Cognoscitur inflammatio ad suppurationem
tendens ex febris, dolore, aliisque symptomati-
bus ingravescens; confecto pure omnia illa
mitescunt, vires tamen debiliores relinquuntur.

Pus genitum vel in vasa per hepar diffusa, se in-
sinuat, & per sanguinis circulationem fertur il-
lud ad cor, & inde vel in ventriculum, vel intesti-
na, vel renes propellitur, vel pus genitum, disru-
pto, hepate, se infundit vel in cavitatem abdomi-
nis, quod sectione vel ulsione ventris est educen-
dum, vel illud peritonæo, cum musculis abdomi-
nis & cute exeso, ex eo foras expellitur, tumque
ulcus per vulneraria intro assumpta & foris ad-
hibita, est sanandum.

Vicus, pro ratione virium sit tenuis, ex ptisanâ
& jusculis carniū, endivia & cichorio altera-
tis. Utendum hic abstergentibus, citra acrimo-
niam. Aromata & vinum vitentur. Potus sit cere-
visia tenuis. *Henric. Regius apud Theodor. Craanen
Medication. lib. 3.*

Obstructio Hepatis.

Fœmina 22. annorum, temperamento pituito-
sa, victu crasso & humido longo tempore usa, fa-
ciem & omnia fere membra pallore habet squal-
lentiâ, genua & pedes, præsertim sub vesperam,
ipsi tument. Urina ejus alba est & clara. Gravitas
& distensio cum obtuso dolore, dextro insidet
hypochondrio; quæ ubi mox se à cibo nonnil ex-
ercet, ipsi potissimum est perceptibilis. Spiritum
impedite ducit, ubi altiora ascendit loca. Nulla
adeest febris vel sitis. Os saliva mader: nec ullus in
hypochondrio hæcænus observatur tumor.

Afficitur in hac ægra facies & reliqua externi
corporis moles, quod ex earum pallore; affi-
ciuntur etiam genæ & pedes, quod ex eorum
tumore: afficitur quoque, & quidem primario,
hepar, quod ex gravitate, distensione, & dolore
obtuso, dextrum hypochondrium potissimum à
cibo occupante, item ex urina alba & clara, nec
non respiratione à corporis motu difficilior du-
cta est manifestum.

Morbus, quo hæc ægra affligitur, est intempe-
ries pituitosa & viscida hepatis, quæ poros ejus
& meatus obstruens & chymosin vitians, reliqua-
que in historia commemorata symptomata in-
ducens à potiori suo effectu, reliqua producen-
te, Obstructio hepatis vulgo appellatur.

Procatactica hujus morbi causa est diutinus
crassorum & humidorum alimentorum usus, quo
adjuvante temperamento ejus pituitoso, multi
crassi, viscidos & tenaces & frigidi in ejus corpore
geniti humores, antecedentem huic morbo præ-
buerunt causam. Pars vero eorum, partim ad he-
par delata, ibique ejus meatus angustans & op-
pilans intemperiemque ejus vitians, partim ad
genas, pedesque, totumque corporis habitum
perveniens, continens hujus morbi, symptomati-
umque jam enarratorum, est causa.

Dum enim humor ille pituitosus, viscidus & re-
nax poros & meatus hepatis multis in locis oc-

cludit, ibique hæret, parit in eo intemperiem pi-
tuitosam & viscidam, ac præterea obstructionem
qua humores hepar postea transaturi, in eo reti-
nentur, illique retenti, ac suâ copia & pondere,
hepatis, in dextro hypochondrio siti, parenchy-
ma gravantes, & distendentes, pariunt in dextro
hypochondrio gravitatis & distensionis, obtuso
dolore citra tumorem conutata, sensum. Hic,
post cibum assumptum, & corporis exercitatio-
nem, altiorumque lobarum ascensum, magis est
perceptibilis, difficiliorque respirationem gi-
gnit; propterea quod humores copiosiores eo
ferantur, itque tum plus solito ibidem distanden-
tur, & quod diaphragma quod est præcipuum
respirationis instrumentum, vehementius premant

Et quoniam, ex hac hepatis intemperie pitui-
tosa, cum obstructione conjuncta, chymus gigni-
tur crudus & aquosus, qui deinde in aquosum in
corde convertitur sanguinem, per totum corpus
ad alituram diffundendum; hinc facies totaque
corporis externa moles, quæ tali pituitoso san-
guine nutriuntur, squalido pallore perfunditur.

Et quia hic sanguis ad nutritionem est ineptior
calorque natus ex eo debilitatus, iustâ excre-
menti vaporosi discussionem in habitu corporis
efficere non potest; hinc oritur ex sanguine illo
eo propulso, sed non bene agglutinato, & ex va-
poroso excremento retento, genarum & pedum,
vasis in nostra ægra porosioribus instructorum,
tumor; qui sub vesperam magis est observabilis,
quod ob corporis diurnum motum & erectionem,
humores eo tum paulatim copiosius fuerint pro-
pulsi, nec per sanguinis circulationem in alias
partes satis copiose referri potuerint. Pituitosus
vero ille sanguis, ad tonsillas oris delatus, ibique
aquosiores suas partes in os, per ductus salivales
aliosque deponens, facit sitis absentiam, salivæq;
in ore abundantiam. Ad cor vero citra putredi-
nem, & deinde ad renes, ex viscidis illis humori-
bus obstructos vel angustatos, perveniens, produ-
cit febris absentiam, urinamque albam & claram.

Morbus hic, ob magnam hepatis affectionem,
periculosissimus est. Metus enim est, ne in hydro-
pem, vel scirrhum, vel alium gravem affectum,
degeneret.

Diligentissima itaque Curatione erit impu-
gnandus; quæ in causæ procatacticæ, antecedentis,
continentis, & intemperiei, ac obstructionis,
per contraria, ablatione consistet.

Primo itaque utatur tali apozemate alterante
& purgante.

℞. Rad. apii, petroselin. fœnicul. an. ʒi. chelido-
nii major. ʒi. Filicis, enulæ campanæ, cort. ræd.
capparum, fraxini, Tamarisci an. ʒ. ʒ. Fol. absin-
thii, agrimoniz, capill. vener. chamædrios an. m.
i. Flor. centaur. minor. hyperici an. p. i. Sem. apii,
petroselini, anisi, fœniculi, an. ʒii. Fol. sennæ ʒii.
rad. polypod. q. ʒ. ʒ. Decoq. in aq. hord. ad lb. ʒ.
In Colatura dissolve syr. de cichor. cum rhabarb.
ʒi. ʒ. M. F. Apozema, de quo sumantur ʒiii. bis in
die vel semel, pro ratione operationis. Dum hoc
utitur apozemate, hypochondrium dextrum hoc
foveatur fomento, mane & vesperi, ante usum
decocti.

℞. Rad. bryoniz, althææ an. ʒi. ʒ. Ebuli, cyperti,
eryngii, cappar, fraxini an. ʒi. Fol. malvæ al-
thææ, violariæ, agrimoniz, chamæd., Menthæ, ab-
sinth. an. m. i. Sem. lini, fœnugraci, baccar. lunip.
coriandri an. ʒii. Flor. genist. sambuci, chamomill.
meliloti, an. p. i. Ligni santali citripi, ʒi. F. om-
nium

nium decoctio in duabus partibus aq. chalibeatæ, & una vini albi sub finem additi; colat. adde aceti lbj. & fiat Fomentum cum pannis laneis eo imbutis adhibendum, ut fuit dictum.

Post fotum inungatur locus tali unguento:

℞. Ol. lilior. de capparib. an. ℥ii. succ. bryoniæ, apian. ℥i. Bulliant ad succorum consumptionem. Addendo ung. de althæa, gummi ammon. acet. dissol. & Extracti an. ℥i. Sem. dauci, spicæ nardi, an. ℥i. Cera flavæ q. s. F. Unguentum, cui tempore usus, addatur ac. rosacei parum.

Post horum usum, ad obstructionum reliquias tollendas; & partem affectam roborandam, conveniet sequens opiata.

℞. Conserv. flor. absinth. Flor. tamarisci, capill. ven. an. ℥i. Rad. enulæ campanæ, cort. citri cond. an. ℥ss. Myrobalan. cond. No. i. Nuc. moschat. cond. ℥iii. Spec. diarhod. abbatis ℥i. Chalibis præp. ℥ii. Salis absinthii, tamarisci an. ℥ss. Croci ℥i. Ambre gryseæ ℥ss. Cum syr. cond. cort. citri l. Opiata, de qua capiat singulis diebus magnitudinem castaneæ majoris, duabus horis ante pastum; superbibendo vini Hippocratici parum.

Plurimum etiam conducunt balnea tepida, in quibus emollientia & aperientia ebullierint.

Obstructiones si contumaces fuerint, utatur sequentibus pilulis:

℞. Aloës optimæ, succo absinthii diligenter nutritæ ℥ss. Gummi ammon. aceto dissoluti & trajectæ ℥iii. Myrrhæ electæ in vino calido solutæ & trajectæ ℥ii. Pulv. diatrium santal. cristall. tartari an. ℥i. Agarici recenter trochisc. rhabarb. electi an. ℥ii. Salis absinthii, tamarisci, an. ℥ss. Croci ℥ss. Cum syr. ros. sol. F. massa pilularum, de qua capiat ℥ss. bis in septimana, duabus horis ante pastum.

Ad obstructions pertinaces tollendas præ cæteris conducunt remedia ex tartaro, vitriolo chalybe collata, quæ apud practicos occurrunt; & ideo hic etiam adhiberi possunt.

In dieta, Aer sit purus, calidus, tranquillus. Cibibus attenuans & calidus ex pane bene fermentato, & carnibus gallinaceis, vervecinis, ovibus forlibus, capparibus, asparagis, hyssopo, petroselinis. Potus sit cerevisia & vinum mediocrium virium. Alvus respondeat arte vel natura. Gaudio det operam: moderatè se exerceat. *Idem ibidem.*

Scirrhus Hepatis.

Vir 40. annorum, pituitosus, alimentis frigidioribus & humidioribus diu usus, diutinaque ac contumacem obstructionem hepatis passus; paulatim incidit in durum tumorem, dextrum hypochondrium occupantem; qui ipso erecto vel decumbente & in sinistro lateri inclinato, tactu facile percipitur. Situ & figurâ jecoris circumscribitur. Decubitus ipsius dexter est facilis, sinister verò adeo gravis, ut ægro; sinistro lateri intumbenti moles quædam, velut suffocans, ventriculo & præcordiis inniti videatur.

Afficitur in hoc ægro hepar, quod ex præcedentibus ejus obstructionibus, & subsecuto tumore duro, qui in hypochondrio dextro percipitur; difficilemque in sinistro latere decubitus paret, est manifestum.

Morbus, qui hunc ægrum affligit, est intemperies crassa & viscida hepatis; quæ tumore duro & obtuso sensu prædita, comitata, Scirrhus hepatis vulgò appellatur.

Causa præcatarrhica hujus morbi est diutinus ille frigidorum, crassorum & humidorum alimentorum usus, quo adjuvante temperamento

nostri ægri pituitoso, humores frigidi, crassi & tenaces, in ejus corpore geniti, antecedentem huic morbo præbuerunt causam. Pars vero cordi ad hepar delata, & deinde poros ejus obstruens, & postea suâ copia & transiit illud distendens, & in tumorem attollens, duritiemque sua partium firma coactione concilians, continens hujus morbi & ejus symptomatum est causa.

Hinc enim nata est intemperies illa hepatis, tumore duro, & stupido sensu, comitata, cujus pondere, cum per sinistram decubitus ventriculus & præcordia premantur, quæ per dextrum decubitus a pressione sunt libera; hinc ut de cubitus dexter ægro sit facilis, sinister vero adeo difficilis, ut difficilem respirationem suffocationisque metum inducat.

Quia, autem, per corporis erectionem & in dextras partes inclinationem, tumidum hepar magis versus exteriora a vicinis partibus propellitur, idcirco tumor ejus, figuram & situm hepatis habens, corpore erecto & in dextrum lateri inclinato, facile est perceptibilis.

Morbi hujus magna solet esse pertinacia & periculum: cum viscus hepatis meatus habeat angustos, qui præcedente obstructione valde sunt obstricti, & a subsecuto hoc scirrhus sere omnes sunt occlusi, ita ut vis medicamentorum eo difficultet sit perventura; unde vel hydrops vel atrophica hic est metuenda.

Curatio itaque diligens instituenda est, quæ, in causarum, & intemperies, ac tumoris, per contraria ablatione, consistet, Primo itaque purgetur tali medicamento cathartico:

℞. Syr. rosati sol. cum sol. fennæ, & rhabarb. ℥ss. Elect. diaphæn. ℥ii. aq. decoct. hord. q. s. m. f. Haustus. Deinde utatur tali apozemate alterante & purgante. ℞. Rad. fenic. petroselin. asparag. in aceto macerata. an. ℥i. Herb. marrubii, ceterach, cuscuthæ, capill. veneris, Scolopendrij, chamædryos an. m. i. Sem. anisi, feniculi, an. ℥ss. Fol. fennæ ℥ss. agarici, mechoacan. an. ℥i. Passul. ℥i. ficus sic. No. v. Decoq. in aq. hord. ad lib. i. s. Colaturæ adde syr. de cichor. cum rheo ℥ss. M. F. Apozema, de quo sumat semel, vel bis in die, haustum trium vel quatuor unciarum. Reiterari subinde simile apozema debet, omisiss vel additis purgantibus, prout res huc desiderabit. Purgari etiam subinde poterit tali haultu.

℞. Fol. fennæ ℥iii. agaric. trochisc. rhabarb. an. ℥i. Sem. anisi ℥ii. infunde in aq. hord. ℥iii. Colaturæ adde diaphæn. ℥ii. M. F. Haustus. Interea dum his utitur, admoveantur fomenta, unguenta & emplastra sequentia. ℞. Rad. bryoniæ, lilior. alth. an. ℥i. Cucumeris sylvest. ℥ss. Fol. malv. violar. parietar. absinth. agrimon. an. m. f. flor. camomill. melil. rosar. an. p. i. Coq. in tribus partibus aq. com. & unâ vini sub finem additi. Colaturâ foveatur, cum pannis laneis, hypochondrium dextrum.

Post fotum adhibeatur tale linimentum.

℞. Ol. lilior. camomill. melilot. amygdal. dulc. an. ℥i. Rosar. absinthii an. ℥ss. Gummi ammon. in aceto dissolut. ℥iii. cera. ℥ii. M. I. Linimentum. Postquam pars affecta linimento illo inuncta fuerit, tale ei imponatur emplastrum. ℞. Mass. emplastr. de mucilag. ℥i. De melilot. ℥ss. Gummi ammon. liquati in succo absinth. ℥iii. Malaxentur cum ol. absinth. & liliorum q. s. F. Emplastrum, extendendum super aluta. Si vero durities contumax nondum his cederet, sequentes pilulæ per plures dies erunt usurpandæ:

℞. Gummi:

12. Gummi ammon. in aceto dissolut & trajecti & iterum inspissati ℥ii. Bdelli, Syracis, an. ℥iiii. M.F. Pilulæ justæ magnitudinis, capiat ℥i. alternis diebus.

Intermediis diebus utatur opiatâ roborante & aperiente, in obstructione hepatis præscriptâ.

Ulus etiam chalybis præparati, luperius & inferius a nobis descripti, hic magnopere conducit.

In Victus ratione, Cibus sit attenuans, ut in obstructione hepatis, moderata quantitate exhibitus. Item incidens & detergens. Vitentur dulcia. Vinum sit tenue, odoratum, vel cerevisia clara, mediocrium virium. Cappares sint in frequent usu. Alvus moderate fluat. Exercitia sint moderata Vitet tristitiam. *Idem ibidem.*

Observationes.

Pro Hepate calido.

Inter omnia remedia quæ hæcenus ars invenire potuit ad hepar præcalidum refrigerandum atque roborandum, primas obtinet tinctura coralliorum: cujus cochlearia duo æger sumere poterit singulis diebus manè duabus horis ante pastum. Ita præparatur.

13. Corall. rubr. crassiuscule triti ℥vi. reponantur in vase vitreo, quod matrarium vocant, iisque affundatur succus limonum, ut supra materiam quatuor digitis emineat; (in penuria succi limonum, substitui poterit succus berberorum) vase bene clauso ponatur in B. M. per quatuor aut quinque dies continuos, & tincturam separa à facce, & in alio vase serva ad usum dictum, gustui gratior hæc tinctura, si cum sacchari candi pari quantitate reducatur in syrupum; sed multò inefficacior evadet, at melius addetur saccharum cuilibet dosi exhibitionis tempore. Ad eundem usum valde commendatur conserva ex fructu cynorhodi confecta, cujus sumat singulis diebus ad nucis magnitudinem. Uti etiam poterit Electuario sequenti.

14. Elect. triasantal. quadruplicato theo in tabell. redacti ℥iiii. capiat tabellam unam ponderis ℥ii. superbibendo parum potus ordinarii.

Tinctura etiam rosarum ad usum prædictum utilissima erit.

Hæc quatuor remedia in usu continuo ita habenda sunt, ut manè alterutrum sumatur horis duabus ante pastum, vespere vero alterum, in introitu lecti, postmodum vero alia duo iisdem horis, ita frequenter remedia immutando, ne natura nimium iisdem assuescat. *La7. Riverius. obs. 49. c. 1.*

Si reperiri posset aliquod pharmacum, quod uno eodemque tempore stomachum foveret, jecurque refrigeraret, maximum esset inventum, cichorium sylvestre duas hæc facultates possidet in cibis administratum, nam amaritudine qua pollet ventriculum roborat, sicut reliqua amara, & bilis fervorem compescendo immensos æstus ipsius hepatis coercet. Hoc remedio plurimos sanatos vidimus, *Dominicus Panarolus. obs. 47. pentecoste. 3.*

Quia hepar habet natura calidum, contemperatione aliqua interdum indiget, utque ea hepatis refrigeratio sine ventriculi incommodo instituat, suadeo; ut utrique membro, etsi dissimiliter affecta sint, sic contulas, ut saccharo rosato aliquot grana piperis per medium incisi indas, & simul deglutias, ita piper calefaciet ventriculum

frigidum, nec ultra progredietur, & sacch. rosacei frigiditatem, inhibebit; saccharum vero rosace. postea hepar contemperabit. Caspar Hoffmannus consil. 9. lib. 3. consil. Cratonis & aliorum Medicorum a Scholtzio editorum.

Pro Hepatis dolore.

Dominum Sangermanum dolor ad gibbas hepatis vexabat: irrita omnia fuerunt remedia ex arte comparata, & cum natura totum negotium relinqueretur, rusticus advocatus est, hic timilem affectum se aliquando curasse asseveravit, æger confidenter ei sese credidit accipit radices hederæ pulverisatæ ℥i. aut ℥ii. potui dat cum decocto capi aut pulli, non longo post juvatur plurimum: ejusmodi remedia a veteribus sunt præscripta, a nobis neglecta; & eadem magno nostro vituperio cum summa laude usurpant Rustici. Aëtius caput scripsit de iis quæ purgant cava & gibbas partes jecoris. Guil. Ballonius. lib. 1. Epid. & Ephem. pag. 41.

Vidi pultorem quendam qui cum in itinere se fatigasset, ac in gramine dormisset, querebatur de aliquo at non valido dolore hepatis: febricitabat non ardentem: interdum Leipothymia tentabatur: cum obiliet hepatis parenchyma, intacta ac integra membrana, in pus merum degeneraverat. *Io. Fleurnius. ad aphor. 45. scil. 7.*

Pro Hepatis inflammatione.

Vir quidam crapulæ deditus inflammatione jecoris correptus est. Huic febris continua aderat, & dolor valde gravis in hypochondrio dextro, cum tussicula quadam inani: dolor ad claviculam ascendebat. Habebat etiam sitim inexhaustam, nauseam, cibi fastidium & singultum, cum lingua arida in principio, postea nigra & aspera, & lotio rubro. quæ omnia inflammationem hepatis indicabant: ad hunc accitus, venam illico tundere feci ad ℥viii. sequenti die cum non satis alvus responderet, lenitivum sequens ut exhiberetur mandavi.

15. Cassiæ rec. extract. ℥i. rhei pulv. ℥i. fiat bolus quo quatuor sedes biliosas habuit, ita ut ex hac levi purgatione & sanguinis detractione febris mitior evaserit, dolore parum diminuto, in unxi-mus etiam regionem hepatis unguento Santalino; & pannum liueum eodem unguento mundum apposimus sine calefactione: interea & hoc decocto utebatur.

16. Endiv. Cichor. cum toto, dentis leonis cum toto, acetos. viol. lactuc. novell. an. M. i. sumat. agrimon. cap. ven. borrag. bugl. an. M. ss. chamæpiti chamædr. (cum esset etiam quædam obstructio) an. M. ss. rad gram. petrosel. an. ℥ss. sem. quatuor frigid. maj. & min. an. ℥i. sem. anis. ℥ss. tamarind. ℥i. prunor. damasc. numero xiii. uvar. pass. ex-cinat. ℥i. liquirit. ras. ℥ii. hord. mundat. p. i. F. decoctio in aq. pro thiß. colat. adde syr. de cichor. cum rheo ℥i ss. syr. viol. de limon. de endiv. ex infusione ros. communium, an. ℥ss. M. quo apozemate cum usus esset, febris valde diminuta est, & alvum quotidie deponebat. Morbo magis inclinante, pro dolore usus est sequenti epithemate bis aut ter in die, atque ita dolor omnis evanuit, neque ad apostema devenit, de quo metuebat, sed sanus cum nostra laude, ab astantibus pro deplorato habitus evasit.

24. Eu-

℞. Endiv. vind. cichor. an. Mj. fl. chamam. melior. & ros. rubr. an. M. fl. summitat. absynth. p. j. coq. in aq. commun. pro ℥ssj. in tunc adde aq. absynth. cudiū. an. ℥j. aceti opt. ℥ij. spec. triolantal. ℥ss. iterum bulliant, & F. epitema pro hepatis regione: eo peracto, iungatur linimento infra scripto.

℞. Ol. anygd. amar. chamam. an. ℥ss. oi. ros. unguent. santal. an. ℥ij. M.

Quod ad victum attinet, tenuissimum adhibuimus, in principio nil nisi citiuorem pituitæ, & poma cocte administrando, abstinendu a dulcibus, quibus tum jecur, tum lien intumescent: à valde etiam attringentibus abstinendum Petrus forestus. *obs. 7. lib. 19. de hepatis Affectionibus.*

Quidam febre acuta corripitur: dolor ad hypochondrium dextrum: satis colligebamus non esse pleuretim: tamen summa erat difficultas ducendæ animæ, & quæ in horas increveret. spes erat eam sedatam in uno medicamento: contra aucta est: metus suffocationis: revera phlogosis erat pituitosa circa eas partes, & inter sectione venæ provisum fuisset, metus erat abscessus. *Guil. ballentius consil. 91. lib. 1.*

Indubitatum auxilium in hepatis inflammationem corruptione adfert hep. galli nigri vivi exemptum & adhuc calens in ℥v. aceti rosæ, vel aceti simpl. minutissime contritum, resolutumque, & a libris colatum tepidemque exhibitum. *Franciscus Joel. præf. sect. 1. lib.*

Senator quidam Paterniacensis quadragenarius, constitutione corporis gracilis, & natura biliosus, ob exercitia nimis violenta, cum supra modum incalueret, inflammatione hepatis cum dolore ventris correptus fuit. Advocatus ego, agrum febre acuta, cum linguae ariditate, tussicula sicca, respirandi difficultate, cibi fastidio, siti maxima, nauseo, vomitu, inquietudinibusque laborantem offendi: duritiem quoque e regione hepatis manifestam persens: inflammatio enim præcipue gibbum hepatis occupabat, in curatione itaque processu, victus rationem refrigerantem & humectantem præscripsi, loco vini, decocto agrimonie & veronice, admixto nonnihil syr. de succo citri & acetosæ, utendum iussi, mox sequens enema ordinavi.

℞. Rad. & fol. alth. malu. viol. pariet. agrimon. & veron. an. M. j. fl. chamam. melior. an. M. fl. sem. anis. fœnic. an. ℥j. lini & fanugrac. an. ℥ss. F. decoctio in colat. ℥ssj. dissolv. sacch. ℥ij. vitell. ovi. ol. viol. & ros. an. ℥i. sal. p. j. M. F. enema, quo relecto, venam in brachio dextro incidi, & ad ℥vi. sanguinis extrahi. exterius totum latus sequenti linimento tepide inunxi.

℞. Ol. ros. & viol. cerati santal. an. ℥j. ol. absynth. ℥ss. M. F. Linimentum. Post duas à cena horas, ad inflammationem internam arceandam, & somnum provocandum, nonnihil laudani ipsi exhibui, adeo ut ea nocte, & sequenti die melius se habere coepit: Symptomata enim multum, ut & vires aliquo modo refocillatæ, fuerunt, quapropter sequentem potiunculam ordinavi.

℞. Fol. agrimon. veronice. cuscut. scabios. an. M. fl. sem. anis. fœnic. an. ℥ij. liquor. ras. ℥j. coq. in colat. ℥ssj. dissolv. elect. diacathol. ℥vi. syr. rps. solut. compos. cum rhab. agat. &

leaa. ℥ss. M. F. potio, qua clementer expurgatus sit.

Victus rationem interim optimam observabat: pro potu ordinario utebatur decocto agrimon. & veronice. lacte amygdalino, & emulsionibus sem. 4. frigid. mar. oleis convenientibus quotidie iungebatur, chyli res quinetiam urgente necessitate injectionis, corpique per intervalla inunctione rhei, cum syr. ros. solut. compos. purgavimus, & sic diuino favore dolor, reliquaque symptomata remiserunt, tandem hep. partisque nobiles sequentibus tabellis corroboravimus.

℞. Spec. diarrhod. abbat. ℥ij. aromat. rosat. tro. h. e. rhab. an. ℥j. sacch. dissolv. in decocto agrimon. & veron. ℥ssj. M. F. S. A. tabellæ, de quibus sumantur ℥ssj. horis tribus ante prandium. His plenissime convalescit. *Guil. Fabricius hildanus. obs. 4. cent. 2.*

Hominem inter per se frigida ventriculi, & calida intemperie hepatis laborantem cognovi, cui ab empirico quodam plurima tam comparsa quam unguenta, eaque præcalida, veluti e pipere, cardamomo, oleo caryophyll. cinnam. & similibus præscripta, atque cartilagini xyphoidi admodum fuerunt: inde inflammatione hepatis correptus, vix ab eadem liberari poterit, tandem vero Dei beneficio, iis quæ hep. refrigerant & corroborant, veluti jussu ex aq. cichor. cudiū. agrimon. veronice cum syrupo de succo linonum acetosæ & unguento santalorum exterius applicato, sanitati cum restitui. *Guillelmus Fabricius hildanus. observat. 46. cent. 2.*

Memini me apud Suetonium & Plinium legisse Augustum vitato jecore laborantem, tomentis calidis sine fructu à Medicis tractatum esse, accito autem Antonio Musa, cum frigidis remediis fuisse sanatum; quam rem libenter commemoravi, quod cum viderim à solertissimis Medicis remedia calorifica huc usque administrata, aut nullam aut exiguam Medicinam contulisse, in ea sum sententia, ea medendi ratione paulisper omittenda, ad refrigerantia moderate potius omnem curam esse convertendam, ita tamen ne calore nativo hebetato, ultra vis inferatur. Hieronymus Mercurialis tomo 2. consult. 59.

Pro Hepatis intemperie frigida hydropem morante.

Præscribenda victus ratio, quæ calefaciat, moderate siccet, incidat, attenuet, ex iis quæ facile concoquantur & subigantur, ex usu erit hoc conditum, quod ex condit. cort. arantiorum, rad. enulæ, rad. cichor. spec. arom. rosat. diarrhoid. &c. confectum est item maxime probè electuarium hoc quod Arabes de vino, greci Cyphoides vocant, hoc modo secundum Holleum præparatum.

℞. Paulul. coriath. ℥ss. coq. in vino veteri generoso ad pulpæ consistentiam, rufas excernere per seraceum, tum adnatæ conserv. anth. cortic. condit. cinnam. an. ℥j. spec. arom. rosat. diamargar. calid. diacinnam. an. ℥j. lign. aloes odor. ℥ss. croc. ℥ss. M. dosis. ℥ss. Reinerus 504. lenander. consil. 2. sect. 1.

Pro Hepatis obstructione.

Pro Hepatis Scirrho.

Digestione facta, semel atque iterum pulverem hunc purgantem cum truxa præscriptum us.
℞. Sepec. matuib. cum rheo ʒj. tartar. vitriol.
ʒj. M. F. pulvis, in brodio pisorum. Sumendus
Gregorius Hortius. obi. 30. lib. 4.

Rusticis & agrestibus hominibus hepatis & lienis obstructionibus laborantibus, epotandum dedi proprium lotum magno successu, illud enim extergit & incidit, illud etiam calidum cum canabina stupa applicare juvat. Hepar etiam vulpis conestum a quadam proprietate convenit, ut & corallium valde tritum. Prodest etiam urtica mortua que lanium dicitur, ea quo quodcumque assumpta, induratos & obstructos liberat. Ego soleo eam exhibere mane incocta in ovo in formam placentule. Hoc medicamentum didici a Monacho Hetrusco, qui solum lingulis diebus hujus herbar aliquot folia contrita & ovo incocta exhibebat edenda, & per ultos curabat. Ego postea solos ipsius pulvere felicititer in vino albo in eodem affectu exhibui, debet in usum vocari illa duntaxat lamina species, quæ in foliis manifestam habet albicantem. Est etiam huius decoctum efficacissimum in hoc casu, id quod antiquis cognitum Gal. lib. 8. De comp. med. S. loca, feliciter exhibet in hepatis obstructione, & optimum pharmacum vocat *Keinerus Solenander. consil. 12. 33. fest. 1.*

Studiosus quidam ex intemperativis lubricationibus in gravissimas obstructiones hepatis & lienis incidens, quæ cum ad extremam maciem perduxerunt, cum potiones purgantes, apoze-mata aperientia aliaque remedia parvi contulissent, sequentibus a me præscriptis intra mensem restitutus est.

℞. Aloes opt. & gummi ammoniac. in aceto soluti & per setaceum trajecti atque iterum infusati, an. ʒiij. sen mundat & myrrha el. an. ʒiij. croci ʒij. cum oxymel. scissit. I. massa pilul. de qua capiat ʒij. alternis diebus duobus horis ante pastum, Lazarus Riverius. observ. 34. cent. 1.

In omnibus hepatis obstructionibus dextre demolendis principes partes obtinet Mars seu ferrum, cujus scobs cruda (a ʒss.) sæpius ingesta, mirum quantum valeat in talibus affectibus. Martis præparaciones excoctæ sunt multipliciores vero quo fuerint, eo meliores: simplicitate ipsa natura gaudet, est pulvis cachecticus sin plex elegantis virtutis in omnibus obstructionibus internis. Ille sic fit.

℞. Chalyb. præp. part. j. cass. lignæ, part. iij. sacch. albul. part. iij. M. F. pulvis (chalybs in bracteas rufas contisper tunditur super incudem donec prorsus in sortiam abeat, postea subtiliter pulverifetur; incus bene mundetur undique) ejus tantum, quantum mucrone cultri arripi potest, seu a ʒss ad ʒ, detur ter quotidie, mane jejuno ventriculo, hora tertia vespertina, & ituro cubitum; tandiu donec omnis obstructio fuerit expedita, etiam ad aliquot septimanas.

Essentia croci Martis quoque laudabilis est.
Jo. Martinianus. præf. Chimicæ.

Cum ex mensibus retentis hoc malum provenit, tota cura consistere videtur in coram evacuatione: per octo dies ante tempus mensium purganda erit bis aut ter per ponum coctum in quo radix hellebori nigri ad ʒss. affigatur (ut intra Sectione De podagra videre est) lingulo quoque mense repetat eandem purgationem. Dolet enim hoc medicamentum præcatens novere menses, sed continuare oportet per tres aut quatuor menses juxta tempus consuetæ purgationis: ita cæteris vero chelidonium remedium est ad omnes vicerum scirrhus usus chalybis in hunc modum.

℞. Chalyb. præp. pulv. ʒss. rhei, agar. an. ʒj. spec. hier. in pl. ʒj. diarrhod. abut. ʒij. mall. despinat. q. l. F. electuarium: hujus tantum singulo quoque mane ʒij. per quindecim dies, Rodericus a Fonseca. tomo 1. consult. 61.

Pro topicis in usu erunt emplastr. diachyl. de meliloto & ceratum a melape cum successu usurpatum: quod,

℞. Empl. de mucilag. ʒiij. bdell. ʒj. ammoniac. ʒx. (gummi solvantur in aceto acerrimo) bulliant in ol. ablynth. ʒij. cum vini alb ʒiij. adde spic. nard. ʒij. cum cera alb. q. s. F. ceratum emolliens & digerens obstructiones & tumores scirrhosos ac præsertim jecoris. Jo. Zechius. consult. 11.

Domina quædam Cachexia laborans, cum duritie hepatis, palpabilis, sequentibus pilulis per viginti dies usa perfecte restituta est.

℞. Chalyb. præp. cum sulph. ʒss. aloes opt. senz mund. agar troch. & rhei el. an. ʒj. pulv. el diarrhod. abbat. ʒss. croci ʒss. cum tyr. roiat. solut. I. massa pilul. de qua capiat ʒj. singulis diebus mane leviter deambul. nco: postea hor s capiat jusculum in quo folia & rad. petrolei bullierint. qui hæc pilulæ non purgabant, bis aut ter addita sunt uni dosi diagridii gr. iij. Lazarus Riverius. obs. 68. cent. 10.

Hepatis tumore scirrhoso diuturno premebatur Nobilis vir, cui nullum auxilium prodesse potuit, licet præter providentiam totius ex ebeno sudorifica tantasset, uteretur medicamentis chalybeatibus balnea naturalia admitteret, & varia unguenta & emplastræ parti apponeret: hic solum conserva ex marthubii floribus cum melle parata quadraginta diebus ad ʒj. d. luculo assumpta, & desuper aqua exhibita, quæ foliis & radicibus ipsis, vitreis organis stillat, sanitati integræ fuit restitutus: n in sensum ac sine sensu emolliatus & resolutus est tumor. Zacutus Lusitanus. lib. 1. præf. med. admirand. observ. 48.

Hepatis abscessu.

Cum anno 1675. Parisiis Chirurgicæ operam daremus, curæ nostræ commissus fuit Vir consistentis ætatis faciei colore flavescens, pilis subruis, sed minus lautæ conditionis, qui vulnere à gladii ictu profundiore intra collis nothas inflicto, abscessum hepatis incurrit, ita ut per sex septimanas n ateria purulenta copiosè manavit, eo majori cum periculò, quò in hepatis parenchyma stylus profundius adigi potuit. Hic octo circiter septimanarum spatio ab abscessu

funesto liberatus fuit, medicamentis balsamicis ac vulnerariis, detergentibus ac consolidantibus, internè & externe usurpatis; Nobili alio, quem simili malo laborantem eodem tempore curæ suæ creditum, D. Morellus Chirurgus peritissimus ter de die invasebat, paucorum dierum intervallo è vivis excedente; adeò abjectioris sortis homines quandoque præ divicibus natura favere dicitur. *Joh. Jacob. Harderus in Observat. Anatomico-Medicis.*

Hepatis durities & suppuratio feliciter finita.

Quantum sufficere possit pars adeò nobilis prout est hepar, Medicorum monumenta testantur. Hic quoque recensemus exemplum non inauditum atque rarum, quod in eadem parte accidit. Juvenis quidam Amsteledamensis qui Chirurgi operam dabat, ante tres fere annos nobis querebatur de epigastri tensione, cum dolore gravativo ad hypochondrium sinistrum se extendente, tandem tumor durus ibidem ortus, cum aliqua difficultate respirandi & febris. Huic exploratis, hepar esse induratum judicavi diversisque emplastris emollientibus applicitis, tandem cataplasmatibus maturantis ad miniculo tumor mollior redditus ad suppurationem pervenit, quo post cauterii potentialis applicationem, phlebotomio apertò, multum puris effluxit, & brevi post, ulcere purgato, sanatus est. In hoc casu non est dubitandum quin à prægressa inflammatione, gibba hepatis pars fuerit conquata peritonæo, unde ulcere apertò, puri denegatus fuit in abdominis cavum decubitus. Ejusmodi exempla reperiuntur quoque in observationibus curiosis Nobiliss. Viri D. De Marchetris, Professoris Patavini, pag. mlii 110. *Frideric. Ruyschii in Observation. Anatomico-Chirurgicarum centuria.*

Hepatis vomitu curata.

Mulier quintum completura climactericum, inflammatione hepatis cum tussicula sicca, spirandi difficultate & pungitivo in hypochondrio dextro laborans dolore, phlebotomis aliisque non obstantibus remediis, juxta estatum Hippocrat. 4. acutor. eodem in latere suppurata est, atque xl. die puris crassioris sanguine striati libras sex sponte evomit & convaluit. *D. N. Gulielm. Beckeri.*

Calculi ex Abscessu circa hepar.

Pauci elapsi sunt anni, quod hic Uratislavix vixerit, Johannes Groschius, Oeconomus Xenodochii ad Spiritum Sanctum, Vir robustus ac validæ Constitutionis, temperamenti sanguineo-cholerici. Hunc quondam mense Junio, anno ætatis 60. defubito Rigor vehemens invasit, cui postliminio dolores in Hypochondrio dextro ad regionem Hepatis una cum Tumore, nucem juglandem æquante, accesserunt. Tumor is, doloribus persistens, intra semetree spatium adeo increvit, ut tandem panem sili-ginem Uratislaviensem quantitate tantum non superaret, sicque induruit, ut scirrhum referret. Quanquam vero Affectus huic diligentior adhi-

benda fuisset, ægrotus tamen nec Medico nec Chirurgo usus, sed sui ipse curam suscipere ausus est: interne quidem Balsamum Sulphuris, aliquandiu singulis diebus deinceps bis terve in septimana, ut & nonnunquam pulverem cardui benedicti adhibuit, & pro Evacuatione quandoque, velut pro libita, Rhabarbarum; Externe vero ab initio ad finem morbi nil nisi Emplastrum Jenuigeni Norimbergense Tumori applicuit. Tandem aliquando contigit, ut circa Festum Nativitatis Christi, dum noctu ægrotus dormiret se hanc sentiente, tumor rumperetur, unde magna quantitas materiei, pulvis instar crassæ, cineracei coloris, integris 4. septimanis profluxit, donec tumor quasi pinguino delideret.

Posthæc ex vulnere, quod interea in fistulâ degeneraverat, atque in novum usque annum, indito in id instrumento argenteo, apertum servabatur, juxta cum humore ichoroso, necessarè plurimi lapilli provenerunt, diversæ magnitudinis, formæ & figuræ, sic ut alii triangulares, alii quadrangulares, alii sexangulares, deprehensi sint, inter quos majores, glandibus taginis, minores vero, granis ericæ similes erant.

Jidem Coloris sunt extrinsecus sub-punicei, instar Caltanearum nondum omnino maturarum, inducti tenui quodam cortice, intrinsecus lutei instar Rhabarbari, quo ægrotus sæpius utebatur. De cætero lapilli dicti sunt friabiles, pondere admodum leves, ac numerum eorum novem annorum spatio excretorum, quingen-tenarium aut sexcentenarium æquare, hæredes ægroti affirmant: Eorundem etiam lapillorum numerum ad 80. apud me asservo. Quamdiu vulnus apertum conservatum est, & lapilli excreti sunt, cætera vir ille bene valuit, & ad quævis sua munia obcunda, supra morem ætatis, expeditus & alacer; quam primum vero vulnus sua sponte coaluit, in alios Morbos incidit, præcipue vero interdum in Asthma, interdum in Icterus, sæpius in Diarrhœam, quorum morborum unus tandem quoque ipsi vitam extinxit, postquam 72. ætatis annum accessisset. *Godof. Thilesii.*

Anatomica Inspectio.

De Hepate insolita magnitudinis, pendente quatuordecim libras civiles.

Uxor Johannis Kippleri, textoris Uraensis ætatis 45. ann. temperamenti biliosi, per aliquot mensium spatium sub dextra axilla, facta à natura quasi fontanella, ulcus aluit, ex quo materia quædam alba cum flavedine permixta interdum copiose fluebat & ruebat. Hoc cum à chirurgo (quod hujus pertæsa amplius ipsi exitum concedere pollet) imprudenter nimis meo iudicio consolidatum esset, paulo post dolorem circa hepatis regionem sentire cepit gravativum, cum ciborum fastidio vomitu interdum bilioso, nec non siti, qua premebatur, intensa, cum insigni tumore; quem digitis tangere licebat, dextri hypochondrii, ea potissimum parte, qua hepar ventriculum ambit.

Ego in consiliu vocatus, postquam prognostico ancipitis & exigue spei me præmunivissem

artis præsidia arripui. remediisque tam internis quam externis curationem auspicatus sum; sed sine fructu, & exiguo cum levamine.

Nam cum symptomata indies graviora fierent, dolores non remitterent, præparatis autem tunor, à topicis nec emoliri nec discuti posset, icterusque totum corpus subito invaderet & occuparet, medicamentorum usum porro sibi salutarem fore dubitabat; proinde ab iisdem plane abstinuit, sola aqua comortativa, qua per vices ex cochleari utebatur, contenta.

Interim in sella dextro latere versus terram, declinato (à pondere & mole tumoris illius hac nuleram retrahente, & ferme opprimente) dies noctesque sedens, crebris & reiteratis genitibus blandam animum à corpore *separavi* a deo exoptavit, quam etiam ab ipso impetravit.

In tumoris huius ad aspectum & tactum protruberantis causam cum inquirere animus esset, apertionem cadaveris à marito & amicis, precibus & persuasionibus (quanquam initio omnes reclamarent,) tandem extorxi.

Cum itaque opus aggrederer, & circa parenchyma hepatis, tumoris indagandi gratia, occuparer, illud cum stupore & admiratione tam vastum ac mole ponderosum, videns adstantibus monstrum, qui perterriti vix oculis fidem habebant.

De pondere autem certior fieri volens, moneram chirurgum ut extraheret, & totum scirrhum repertum, ponderabat libras quatuordecim civiles. Cæterum in mesenterio adhuc carnosa excrecentia, magnitudine caput infantis æquans, inspecta & detecta fuit.

Reliqua viscera à nativæ bonitate nil desece- runt.

Sequentia in viro quodam honesto huius urbis, cuius nomen erat Urbanus Walker, notavi.

Hic ex vitio hepatis per annos duos, maximum dolorem perpeissus est, nili quicquam proficientibus medicamentis. Ex huius umbilico sæpe materia alba & serosa stillabat; qui tandem fati concessit.

Post mortem aperto cadavere hepar induratum grande & in gibba parte ultra triginta diversæ magnitudinis ulcuscula habens, inventum est; quæ aperta & dissecta, similem, prout ex umbilico fluxerat, materiam, cum fetore tamen aliquali conjunctam, fundebant; in parte autem cava, abscessus, vesicula propria inclusis, magnitudine ovi gallinæ-cæi deprehensus est.

Lien solito minor. Repes, quoad substantiam carnosam in totum consumpti erant; relictis tantummodo involucris seu integumentis illorum. *Joh. Frid. Crispi Fuldenseich.*

Hepar insignis magnitudinis in puella.

Puella octodecim circiter anno um recens nupta juniori M. mortua ex continua Tertiana, Dissectio cadavere exhibuit Jecur tantæ molis ut id quintam pectoris costam ex ossibus pertingerit, ubi usque ad o pulmones ardebant ut respirationi liberæ fuerint impedito, florida aliocum substantia & omnis labis experte. *Caroli Offredi.*

Hepar maximum in v. lobos divisum.

Inveni Hepar divisum in quinque lobos, una cum splene, figura referens ferram insolite magnitudinis. *Jac. Grandi Anat. Veneti; In Atlas. Phil. 1670.*

De Hepate insolite magnitudinis, & variis aliis in anatome infantis observatis.

Ano 1672. mens. Oct. nata G. W. civi. acmercatori Thoruniensi e primariis haud postremo, filiola egregia, optimeque, ut videbatur, constitutionis, quæretiam per medium annum integram servaverat. At hoc elapso, varia infatam affligere cœperant accidentia, quæ tamen, quia levia, facile superabantur. Usque dum sub medium Julium anni præteriti 1673, ingravescentibus malis in subsidium me vocavit parens. Apparebat tumor totius abdominis durus, qui in hypogastrio tantus erat, tamque dolorificus ac plumbeus, ut ibidem magnam latitare ulcus nemo ambigere potuerit, & quia puella omnem medicamentorum usum cum lumino aversabatur horrore, pro deplorata habebatur ab omnibus.

Pugnatum interim est inunctionibus atque cataplasmatibus, emollientibus digerentibusque, quibus id tandem, Deo benedicente, obtentum, ut sub Augusti incrementum, magna puris copia per aliquot dies cum lotio ejecta, melius se habere cœperit puella, & abdomen detumverit. Unde omni adhibito astu id tandem obtinuius, ut syr. de tribus insus. cochleare unum absumperit illa. Cæterum vix elapsis aliquot septimanis rediere pristina infirmitates, quæ tamen, ubi macule quædam ad instar scorbuticorum, in pedibus imprimis & collo, eruperunt, denuo renuierunt, ita ut rursus restituta crederetur puella. Idem post tres septimanas iterum accidit.

Et licet postmodum quædam medicamenta assumpserit, accedente tamen diarrhoea, viribusque prostratis, die. 18. Decembr. naturæ debitum solvit, crumpebantibus denuo in pedibus dictis maculis. Post mortem, aperto à chirurgo Petro puls, me præsentem, corpusculo, omentum cum mesenterii magna parte putridine consumptum apparebat. Hepar vero insolite magnitudinis pallidique coloris totam fere cavitatem abdominis repleyerat. Quod excoisum, pondere suo sesquialbram civilem fere æquabat. Vesicula fellis satis magna bile subpallida scatebat. Lien nigricans, quadratus & scirrhusus, vix triuncialis erat magnitudinis. Venterculus cum vesica urinaria, nihil peculiare fovebant. Pancreas putridum erat; Intestina flatibus distenta videbantur. Ren uterque eam magnitudinem, quæ in adultis occurrit, obtinebat. Horum dexter satis naturaliter erat constitutus, sinister vero disciformis copiosam fundebat sanie, in quam tota renis substantia ita mutata erat, ut diffuente pure sola vasorum concurrentium intersticia, quæ apud loculamentis haud absurde comparat Highmors, remanserunt. Pulmones flaccidi & subnigricantes, inque plurimos lobos divisi, cor justo exiguum & pallidum stipabant. Plura scrutari non licuit. Hoc quoque addo. In-

factem

tantem hunc per totum vitæ suæ corticellum nunquam sudasse, etiam assumpto sudorifero. *Georgis Sageri.*

Hepar magnum, cum lapide in Cysti fellea.

Princeps Hassovicus Hadamarensis ante mensem Catarrho suffocotivo defunctus est, in cujus cadavere præter alia reperta fuere sequentia, Hepar erat unmenisæ molis octodecim librarum, in folliculo fellis repertus fuit calculus, uncia unius ponderis, quem Principissa adhuc sibi reservat inter rara tanquam non ~~removet~~. *Johannis Dolat.*

Anatome pulli septennis scirrbo hepatis exstincti.

Natæui indulgens puellus, dum undis marinis nimium credit, ab isdem per infortunium abripitur, mergiturque profundo agrè à sociis inventus, deiecitur in litus, & inter frequentes rotantium manus oborta vomitione salsam aquam copiose reiciens eripitur quidem morti subitæ, sed ager tamen domum refertur, & amicularum suavis ut est illa ratio molestè officiosa, & ad consilia longe paratissima, succulis arena marina plenis, calentibusque obruitur, potissimum, qua parte hepar delitescit, quod de illius partis regione conquereretur. Sed cum jam diu sacculorum nullus finis esse, ille quidem lectum deserit, obambulatque cubiculum languidus & paliens, verum ignoto amicis morbi genere paulatim contabescit. Tandem huc translatus mihi committitur, animam agrè tradens, Ego re exarsa ostendo conclamatum esse, hepar ferventibus arenis perustum, sanguinis motum illa parte non parum sufflaminasse, eoque ex coarctatis ibi humoribus scirrhum hepatis natum, meo quidem judicio jam immedicabilem. Quid sit? biduo post expirat puellus, & quidem viginti quatuor horis ante convulsus. Rigor ab amicis, saluum hepar suspicantibus, ut aperto cadavere mortis causam indagarem, profuturum id fratribus reliquis, etiam temperamenti imbecillioris, ut sibi relictius prospiciant. Itaque reiectis integumentis dum hepar intentius contemplor, naturali longe majus, duriusque ostendo, atque ostendo adstantibus non tantum viscus durissimum, sed & parenchyma ejus mille abscessibus minutis refertum. Erant autem abscessus illi non fluido pure distenti, sed duro, alboque, quale fere in elephantiacarum suum Carne quandoque videmus, & abominamur. Nec immunis ab eodem malo Lien. circulatione sanguinis luem in diversa transferente. Pulmo superna parte maculis nigris, flavisque hinc inde versicolor, sive aqua marina illuc quoque novam calamitatem deportante. sive catarrhis ex capite sensim in pulmones destillantibus: notavi enim sæpe alias in pulmonibus mortuo, um, quos catarrhi infestaverant; nigrantes illas pulmonum maculas, vera vel præsentis, vel brevi secutura corruptiones argumenta. *Olai Borrichii.*

Anatome Mulieris, suppuratione, sive abscessu Hepatis mortuæ

Honestæ honesti spud nos Civis uxore, cujus

nomen dicere nihil attinet, 41. circiter annorum, bilioso-sanguine temperamenti, annuo jam abhinc spatio, utero tum gerens, de gravi dolore, tumoreque circa hepatis regionem, & calore præternaturali per intervalla redeunte, conquesta, me primum vocavit Medicum? ubi ego, præscriptis paucis remediis dicta symptomata vix ac ne vix quidem prius mitigatum iri prædixi, quam fortis exclusus fueris; quo factò, dum eadem symptomata adhuc persisterent, advocatus est & alius Medicus, Excellentiss. D. D. Joh. Christian. Halbach, præscriptaque tum ea medicamina, quæ contra abscessum, quam subesse ex signis suis collegimus, optima visa sunt. Sed omnia frustra. Tantum enim abest ut remiserit dolor, ut potius indies magis magisque invaluerit, augescente insuper & tumore & vomitu superveniente molestissimo; Verbo: obiit patientis femina; cumque sic volentibus Marito & proximis Agnatis Anatomico cultro secaretur, en ablatis communibus abdominis integumentis, facta eo loci sectione, quæ dolorosum tuber, duorum circiter pugnorum magnitudinem æquans, se obtulit, tanta puris tenuis copia effluxit, quam vix integra mensura capere potuimus. Unde hujus originem curatius scrutati per longam hepatis inferiorem partem absumptam, & inspurcissimam foetidissimamque putrilaginem versam invenimus, cui pauca tantum ejus frustula caudicantia, mollia & exesa parvisque glandulis similia innatabant; ut hinc ea quoque peritonæi portio, quæ tumore contextit, adeo infecta fuerit, ut plumbeum, æruginosum, lividumque colorem altissime inde contraxerit, & omnino putrida atque squallida apparuerit. Hepar sima sui parte prope felleæ vesiculæ fundum duas oblongas quasi appendices gallinacæ ovi magnitudine, velut duo jecinora succenturiata exhibuit, & gibbere suo adeo excrevit, ut præter naturam valde intumuisse videretur, intus marcidum & lurido colore deturpatum. Mesenterium universum, quod mireris, nil nisi dura atque densa pinguedo erat & intestinorum tenuium extremitati glandulæ itidem pingues, citrinæque, concinno ordine velut quædam in partes divisæ læcidie superficietenus eleganter appensæ conspiciebantur. Et omentum, non ut naturaliter solet, super intestina se expandebat, sed ventriculum versus contractum corrugatumque, quin & satis densum ac multa pinguedine intertextum deprehendimus. Cætera viscera intaminata vidimus, præter pulmones, qui subranci ac purulenti non nihil erant. *Georg. Abrah. Mereslini.*

De Abscessu hepatis in Gravida morte repentina terminato.

Nobilissima Matrona annorum 38. temperamenti calidi & humidis, habitus carnosus, coloris rosei & floridi acris ingenii, fixæque imaginationis, postquam sexdecim partus feliciter in lucem edidisset, tandem decima septima vice concepit, quam conceptum, cum ultra tempus consuetum gestasset, sibi præsagium fecit, ultimam hanc uteri gestationem fore fatalem. Dictum factum. Cum enim tempus parienti ipsi fuisset præterlapsum, nullaque apparo-

rent partus indicia; necone nico operam dabat, ita ut vix unica die, antequam natura debita persolveret, lecto affixa hæretet, & obstetrica se submitteret, quo tempore subinde tormina, & doloris in diversis abdominis & lumborum partibus percipiebat, qui tamen, proportionatis adhibitis remediis, cessabant, ita ut desuper se melius habere mulierculis indicaret. Quid sit i sumpra cœna, ex improvviso convulsionem epileptica corripitur, accurrunt omnes, sed frustra, jam enim natura succumbente, animam suo reddebat Creatori. Circumstantes terrore percussi, apertionem cadaveris urgebant, ut foetus, si adhuc vitalis, salvari posset. Vocatus Chirurgus propteranti manu uterum discindit, sed nihil vitale infœtus sed potius cum jam ante biduum fuisse extinctum, experientia edoctus confirmat, erat enim totus lividus, & gangrænz indicia præ se ferebat. Secundus etiam putrefactus, uteri cornubus humilissime annexæ, & non nisi summa cum violentia poterant avelli. His perspectis, hepatis constitutionem explorare fuit desideratum, tractatur cultro anatomico Hepar, sed totum corruptum, & manu Chirurgi in centum particulas, instar Lanæ, discerptibile, in cujus cava parte ingens se monstrabat Abscessus, quo disrupto materia heterogenea copiosissime prorumpibat, cum sanguine gromoso diu extra venas fuso & refrigerato, non exigue calidum innatum extinguendi otatio.

Scholion.) In hac Historia offerunt se nonnulla inquisitione digna: primo, qua ratione nobilissima Marona cum tanta Hepatis corruptela colorem faciei tam floridum, album & rubicundum habere potuerit, cum Color bonus sit character illius Hepatis, color vero malus viscerum latens vitium ostendat. Secundo, utrum hic casus non confirmet, quod pulchriores, & colore vividiores citius intereant. Intemperans est natura pulchriorum celerius aliis morientium. Pulchriores citius intereunt, aiebat Cardanus, quia plurimum habent calidi innati, quod sua acriuitate facilius depopulatur humidum radicale: licet enim color vividus opti nos supponat humores, intellige de humoribus in superficie, non autem in centro existentibus: hinc Alexander Petronius dixit, ideo Homines magis coloratos citius interire, quo humor deterior in centro consistit, Recte Celsus, qui viridiores sunt sua bona suspecta habere debent. Tercio indagandum est, cum Hepar totaliter corruptum fuerit inventum, & præcipuum sanguificationis organum credatur: quam par vices hepatis egerit, & sufficientem pro nutritione sanguinem & matri & foetui suppeditare potuerit? Nonne hic dicendum cum Hipp. lib. 4. demorb. Sanguinis fons est Cor? Idem vult Aristoteles, & cum his sentit tota virorum doctissimorum huius seculi Coteria, uti per Anatomiam omnibus notum esse potest. Verum hac omnia non otio, & sordida pigritia immergis, sed doctrinæ cupidis Philistis relinquo ruminanda. *Tobias Craesbilii.*

Hepatis prolapsus Tumorem circa umbilicum inducens.

La Nosocomii nostri, civit. Padotrophio

Viennæ, ante menses plures totus infans natus cum tumore circa umbilicum ad pugni magnitudinem coloris lividi: Chirurgus, loci omphalocel. n. grana tactum ratus, medicamenta calidiora gangrænam & tandem sphacelum compescentia applicuit: inde aucta adhuc inflammatione nifellus expiravit. Medicus Ordinarius, Excell. D. D. Ursinus, collega plurimum honorandus, vocato chirurgo civico, Richardo nomine, alias læ dextro, aperire cadaverculum iussit, & inchoata lectione ad tumorem dictum, vixque cuspidem cuitelli adacto, jam hepatis substantia conspectum prodit: inde patebat, tumorem ex prolapsu hepate (forsan a conformationis vitio) & non ex umbilici protuberantia ortum traxisse, divulsa linea candida, quæ inter rectos musculos constituitur. Cum vero mihi à prædicto Domino Ordinario cadaverculum pro confectione sceleti, quod nostrum etiamnum exornat Theatrum Anatomicum, concessum esset, præter inflammationem hepatis, ac dispositionem gangrænosam in mesenterio, observare mihi nil licuit quod insoliti ac curiosi quidpiam in se contineret. *Laurent Wolfstigel.*

Lapis in Abscessu hepatis.

Dominæ quædam 33. Annor. Temperamenti sanguinei, gravida jam dum decimo mense, Catarrho suffocativo repente exstinguitur: & cum tempus partus jam dum imminerebat, & cum ex cidi extracto foetu matricem iterum componere, matrisque cadaver conuere incipiebant, cum ultra aperiendi num non data fuerit licentia. Inter consuevit cum Manculi Ad dominis extracto foetu confederat, & cingit, & tam quandam oblongam unius spithamæ, duram aliquomodo in dextro hypochondrio, quam cum etiam tangendam darem Dominabus & Mulierculis adstantibus, omnes clamarent esse alium foetum, putantes se pedem infantis retigisse: impossibilem talem imprægnationem extra matricem licet illis deprædicaverim, sed aliquid aliud esse prædixim, nihilominus incredula hæc gens, quæ nullis rationibus, sed tantum palpabilibus autopsiis ducitur, & non vis quidem, hunc pedem, ut putabat, & per consequens totum foetum videre & habere desiderabat. Cui petitioni quam libentissime annuens aperui faciem futuram, incisionemque feci, & inveni in inferiori parte Lobi hepatis accratam cystidem longam unius palmi, duriusculam, parumper plenam & bene infarctam, quam a substantia hepatis modeste liberavi, & absque ulla venula, aut alio canale intrantem reperto, ad tabulam extraxi. Huius membrana ita densa & fortis erat, ut forcice eam scindere vix potuerim, cultro vero minime, aut certe cum summa difficultate, cujus concavitas erat repleta humore aliquo glutinosissimo, ex nigro resplendente & rubricante instar visci nigri, quo capiuntur aves, qui humor tam glutinosus fuit, ut eum vix cultro à manu plane non, nisi ea sevo inuncta, uti fit cum Terebinth. abradere potuerim. In huius humoris medietate repertus fuit Lapis paulo minor ovo gallinæ, qui per medium securi contractus resplendebat, ac luto plenus, & cortex erat durior medulla.

mediculis, alias insipidus & nullius odoris. Mirum est, quod in illa parte nunquam ullum dolorem, aut saltem gravitatem persenserit, licet de calore Hepatis Domina hæc semper conquesta fuerit. D. Greisel. è vienna ad D. Sachtium Vratislaviam.

Scholion.) Pars hujus Lapidis Vratislaviam transmissi pondere Drach. iij. æquat, si itaque reliquæ duæ partes addantur, totum erit Unc. j. & gr. 18. coloris est subgræsei interioris, exterior cortex durior subsulcus cum aliquot punctis albis. Si manibus contractetur interior & exterius semper unctuosus apparet instar saponis: microscopio ubi subjectus, interiores splendentes particule quasi mercurium vivum exhibuerunt hinc inde aspersum. Quia porior est, pro magnitudine levius est ipsius pondus.

Marc. Aurelius Severinus inde a Ascensi. Natur. L. iv. cap. 18. p. 160. Tubercula Lapidum, seu Lapides in Abcessibus duplices faciunt, alios qui immergantur quasi & innascent prope odum in sinu cystive anomalorum subintactu pultaceo, qui totum sinus ambitum complet: & talis fuit hic Viennensis quoque alios vero cum sinus arte materiam comprehendunt & hinc inde comprehenduntur ab eadem cum mutuo adhaere perfectio, habentque simplicitatem materiam. Talem idem Severinus. l. 2. p. 259. Neapoli Anno 1640. è tuberculo circa jugularia vasa exscit castanea forma & magnitudine, inaequalem, semisepulcris quasi botris undique discretum, Lapideam densitate, qui aquæ injectus rubellus perlitit. Tales lapides humores interdum Chirurgos fatigare novit. Tulp. l. iv. obs. c. 21. Vidit D. Christoph. Tinctorius Electoral. Medicus Regiomonti, in femina dilecta duos Tumores faxeos dependentes à suspensorio hepatis, quorum unus 16. alter 1 pond. libravit apud D. Barthol. Cent. iv. obs. 28. Chirurgus Albigensis ab ulcere antequo tibia lapidem tophaceum, nigrum, durissimumque extraxit. Borell. Cent. i. obs. 4. & alium ex abscessu in humero ovi magnitudine 16. obs. 87. ex Umbilici abscessu profluentem Andregetti de Andregettis Prof. Patav. observavit lapidem apud Joh. Rhodium cent. II. obs. 99. Concludo cum recenti exemplo. D. Petri à Castro, quod consignavit in Observat. ms. observ. 18. Mensis Aprilis, inquit, Anno M. dc. xlv. Veronæ Casp. Gaponis uxor. quæ habitabat ad Portam Episcopi, abscessum super os Ischii passâ, qui dum suppuratur ingentibus cruciatur doloribus, qui parum cessante rupto abscessu. Tandem applicato Cerato Castrensi Lapillos produxit magnitudine pisorum coloris tuberocei, intra 3. dies plusquam 40. Georgi Greiselii.

Lapis in Hepate.

Excellentissima Comitissa de Nadausti, cum esset in procreatu partus, de repente extincta fuit: Aperto uter foetus baptisaretur ventre, repperit fuit Lapis magnitudinem ovi asserini referens, ponderis levissimi, intrus candidans: ac si ex contritis diadematis coagmentatus fuisset. Lapis autem hic adhaerebat tunicis hepatis: Similem fere historiam narrat Benivinius L. de Abditis morbi causis, Pauli de Sordani.

De Sacculo membranaceo calculis repleto, hepati innecto.

Plena calculorum in corpore humano esse omnia, sufficienter testantur observationes, satisque quotidiana loquitur experientia: hinc nulla fere corporis nostri pars à Gorgonicis istis spiritibus immunitis exillit, frequenterque miserabiles instituntur tragediæ. Exemplum præter alia nobis præbet vir quidam hujus urbis primarius & consulari quondam dignitate conspicuus, 40. annis plurimis annis hic calculo vehementissime laboravit, & in tanta copia lapides, lapillosque cum urina excrevit, ut hodiernum à reliquis liberis aliquot scatula calculi, variis, coloris figuræque diversæ referret, tanquam portio paternæ hereditatis, ostendatur. Sub gravissimis tandem doloribus, atrocissimisque cruciatibus ante aliquot annos succumbere fuit coactus, prægressa totali lotii suppressione per novem dies perdurante, quam calculus dactyli formis sat grandis excitaverat, remediis multis frustra tentatis. Post beatam exanime corpus cultri aciei subjectum, & exenteratio instituta: ad renes ubi devenerat, nulli fere vel parvuli saltem inventi lapilli: in uretere vero dextro non procul à vesica calculus, uti jam dictum, se conspiciendum præbuit, dactyli formam representans, nonnihil friabilis, & instar pumicis spongiosus ac candidus, hic ischuricæ lethalis causa extitit unica, ista vero fatalem introduxit horam.

Præcipuum autem quod admirationem subit, fuit sacculus quidam sive involutum membranaceum in peritulatione hepatis & vesiculæ felleæ oculis sese offerens: rotundus hic fuit & oblongus, non procul à cystide fellea sinistram versus, adnexus parte sui medie hepatis substantiæ per fibras quasdam exiles, extremitatibus utrinque petiolulis & minime adfixi: inferne ex medio sacculi hujus ductus quidam, instar ureteris, conspicuus fuit ad & in vesicam ulque tendens, quo dubio procul prædictus lapillorum proventus receptaculo urinarum suppeditatus fuit. Inferior sacculi pars & ultra quidem dimidium, repleta fuit innumeris calculis concinne impactis ad formam seminum tritici Turcici: in superiori vero parte liquor quidam coloris spadicei & nonnihil spissus, lapillis superfus, quem puto materiam generandorum calculorum subinde suppeditasse, spiritu lapidifico turgidum, Ex vesicula fellea ad folliculum hunc nullus observatus ductus, ita prædictas fibrillas liquor in sacculum ex hepate videatur effusus, de quo tamen nihil certi definitum, sed curiosis Naturæ scrutatoribus decidendum illud relinquam. Giosfredi Samuelis Potissu.

De Calculo in Vesicula Fellea.

Mulier quædam ætatis lxi. annorum, uxor sutoris Vracensis, à multis annis de atrocissimis quos per intervalla sentiebat in abdomine doloribus conquesta, cum quodam die maritum comitem habens, negotiorum causa proximum pagum peteret, inter eundem iisdem correptis doloribus, alvi exoneranda gratia, ad arborem multis virgulis circumseptam, non procul à ripa fluvii stantem, confidere coacta fuit.

Interea maritum viam prosequentem, subit

magno clamore vocat, seque viperam per alvum rejecisse constanter affirmat; qui accurrens, facto strepitu inter virgulta, viperamque (quæ procul dubio ibidem loci delituerat, prout exitus historiarum docebit) in fluvium sese immergentem videns, mulieri postmodum majorem fidem habuit, præsertim cum jurato omnibus rem ita se habere, affirmaret.

Cum autem ventris tormina etiam post exulsum, uti opinabatur, viperam non remitterent, sed per intervalla iisdem ut antea passionibus recurrerent, aliam adhuc vivam viperam prolem in ventre domicilium habere firmiter sibi persuasum habebat; hancque sarciminis instar sæpe per intestinorum contubernium circumgyrari ajebat; quam licet interdum manibus apprehenderet, statim tamen rursus iisdem sese subduceret, & evanesceret: nec ullis rationibus, ut contrarium statuerit, flecti potuit.

Affectus iste, cum miseram (quod aliquoties vidi & observavi) invaderet, ambabus manibus ventrem comprimendo, pedibusque tremens, o tanto clamore & ejulatu ædes replebat, ut etiam extra easdem in vicinia longè exaudiri potuerit: firmiter credendo, dolorem hunc inmanissimum & jancinationem intestinorum à vipera veneno emisso excitari; fidemque adstantibus hoc ipso conciliabat majorem, dum diceret, se sæpius vexari his tormentis, cum jejuna esset; quamprimum autem lac tepidum hauriret, vel jusculum sorbillaret, aut panis frustulum comederet, venenatam in ipsius ventre hospitantem bestiam placari, doloremque exinde mitigari, præsertim cum sedato illo munia domestica rursus obire posset.

Multi super hac re variis opinionibus distracti; quidam uteri symptomata, alii lienis affectum, nonnulli colicam biliosam accusare solebant: Reliqui, nescio quid morborum apparatus in abdomine delitescere arbitrari, singuli suo, tam Medici (à quibus passim consilia & auxilia emendicata & emagitata fuere) quam empirici, ut & alii in consilium adhibiti viventes iudicio, non exclusis, ut sæpe fieri solet, ex hoc medicantium consortio, aniculis; quæ malum demoni & sagis adscribebant; aliæ, certo vesperamadesse, quam sibilare & cantillare audirent, hariolabantur.

Durante vero per triginta annorum curriculum hoc atrocissimo affectu, multa (quamvis interdum etiam inepta) à multis pro exturbando hoc peregrino, uti opinio ferebat, hospite, adhibita fuere remedia: sed tot assumptorum quibus ferme enecta, pertæsa, (cum etiam omni argentario destitueretur præsidio ægrota) rem totam Deo & naturæ commisit; nil quicquam medicaminis porro assumendo.

Tandem sub finem vitæ hydrope correpta fuit unde dolorem pristinum jam in totum sopitum esse, nec quicquam de vipere motu se amplius sentire ajebat.

Cum autem affectum hydropicum naturalem, & interdum etiam curabilem ex fortuna quadam (à me & chirurgo per paracentesin in umbilico factam eductisque 12. circiter in hujus abdomine restagnantis laticis mensuris feliciter curata adhuc hospite) intelligeret, me rursus in consilium vocavit, ventrisque apertionem

Renui propter virium imbecillitatem, & quod umbilicus ipsius, non ut præfata mulieris aqua plenus tumeret: itaque medicamentis hydragogis & velicatoriis pedibus applicandis, nec non aliis, rem molendam & experiendam esse prædixi.

Ultero citroque habito sic sermone, opinionemque confirmante chirurgo, rem omnem meo arbitrio commisit.

Hinc curationem medicamentis, affectum hunc propriè respicientibus aggressus, ventrem successive omni aqua exoneravi, detumescentibus etiam, velicatoriorum ope, pedibus: sed brevi ægrota gaudio, quæ jam perfectè curatam se putabat, & prædicabat.

Recrudescente enim malo abdomineque aquarum copia aucto, tandem exantlatis tot annis, incredibilibus dictu doloribus mortalitatem exuere coacta est.

Facto sic dolorum vehementium, & calamitatum ingentium sine, amici & cognatide certitudine hujus affectus solliciti, ut cadever aperirem, obnixè rogarunt, quod etiam pie defuncta, adhuc in vivis, me monendo, ne intermitterem urfit; quorum precibus ne deesse videret, cum & ipse summo desiderio causam tam diuturni & chronici affectus rescire teneret, rem statim ministrantibus duobus chirurgis expediti; & cum venter aqua plenus tumesceret, eandem per canalem ad sex mensurarum complementum eduximus.

Postmodum aperto decenter cadavere, inspectisque visceribus, omnium primò pulmones utrinque costis adherentes, totos purulentos & plenos tuberculis nigris & cæruleis, invenimus. Hepar grande & multis in locis durum apparebat.

Vesicula fellis autem (hic latebat anguis in herba) hoc, quem depictum vides calcenlo, infarcta erat; in cujus superiore ductu versus hepar supra præfiguratum calculum reliqui minores tanquam proles matris alvo exclusa quiescebant.

Etenim grandior calculus tam arte & tenaciter vesiculæ bilis adharebat, ut vix digitorum meorum ope separari & detrahi potuerit.

Perlustrato deinceps mesenterio hoc planè ab acrimonia bilis erosum, & ejusmodi calculosa materia (causa proculdubio hydropis) repletum vidimus.

Reliquis visceribus naturalis erat constitutio, neque in intestinorum contubernio vipera inventa; quamvis maxima pars adstantium hanc ibidem contentam crederet.

Itaque calculo hoc è cystide fellea à me exempto ad oculum demonstravi adstantibus & amicis causam dolorum & mortis, non viperæ, sed primario huic (scilicet calculo) adscribendam ac imputandam esse: neque ullam aliam me agnoscere posse nec velle: hoc per motus fundamento, quia vesicula bilis obstructa à novo isto possessore bilem nec recipere, nec emittere potuit; hinc natura aliam querendo viam hanc in mesenterii substantiam deposuit, unde ingentes istos dolores & crucians subortos esse nullus dubito.

Id quod etiam apparebat in muliere ista adhuc vivente; quamprimum enim (postquam dolores aliquandiu duraverant) per vomitum

esse expurgaret, brevi sublevata est, dolore omni penitus remitteute, donec nova bilis generatio, eadem inferens symptomata, eundem quaereret exitum.

Similes ferme duas historias ex eadem causa præter immunissimos dolores canerosam etiam partibus dispositionem interire valentibus, lector benivolus, in Armamentorio chirurgico D. Johannis Sculteti inveniet. *Id. Observ. 140. p. m. 102. 103. Joh. Frid. Haldenreschii.*

De hepate magno & Lapide Cystis felleæ.

Princeps Nassovicus Hadamarensis ante mentem catarrho suffocativo defunctus est, in cuius cadavere præter alia reperta fuere sequentia; Hepar erat immensæ molis: octodecim librarum: In Folla viro fellis repertus fuit calculus uncie unius ponderis, quam Principissa adhuc sibi reservat inter rata tanquam *Johanne Dolat.*

Ex Cystide fellea 99. lapides eductis.

Fuit quidam in Prussia Ducali Nobilis nomine Sakke, ex cuius cystide fellea 99. lapides, pisorum magnitudinem æquantes educti sunt: Is Ictero nigro tubactus cecidit. *Andrea Cnoffelii.*

Vesica fellea ad examen vocata.

Democritus olim in felle considerando versatus, ego & in fellis vesica: quam cum attentius intueor in genere bubulo, deprehendo quatuor constare tunicis membranaceis. Sub extrema live prima dehiscit copiosa pinguedo, & se puncta vasa sanguinea; consequitur secunda & tertia, inter quas nullum sanguinei vasis indicium oculis in eis patuit, ut neque inter tertiam & quartam live intimam, & bili excipiendam natam. Quarta hæc cæteris densior, crassiorque, & illa nullis vasis conspicuis interstincta, eo forsitan magni artificis consilio, ne ab acerrima bile eroderentur, & morbos statim ab ortu inducerent. Et hæc quidem tunica quatuor sola manuum ope, nulla coctione prævia in conspectum venire. Post levem autem in aqua salia coctionem extrema tunica eodem vultu perduravit sine incrementis, similis tunica allantoideæ proxima illi non admodum dissimilis, nisi quod fibris quibusdam torosioribus distincta apparet. Tertia & quarta, ut bili vicinissimæ, triplo evasere crassiores, imitata non amplius membranas, sed densum, firmumque & non pellucens corium, ut puncturas bilis, opinor, facilius sustinerent. Neque vero hæc tunica intimæ patiebantur se post cocturam in plures tenuari laminas, sed propter inexplicabile, ut conjicio, fibrarum textum attenuantis scalpelli industriam cludebant, quod idem corio accidere observavi. *Olai Horrichii.*

Vesicula fellis in equo,

Novi hic parum. Cl. Blasius in Anatome equi observavit falsum esse quod vulgo refertur, illam vesiculam fellis carere. quippe invenit ad pugni magnitudinem, sed in ipsi hepatis substantia insculptam, unde forsitan frustra ab aliis quaesita est.

Certe neque vesiculam fellis in Equo Regio invenit Hafnia senex venerandus & Anatomicus emeticus D. Simon Pauli, cuius verba digna sunt, velut ex tripode profecta, quæ relegantur ex Discurso eruditissimo Antonico & Medico de Equi Regii per Anatomem dilecti Halm. in Dec. 1671. morbo, ibidem typis impresso 1672. & 1674. Ita vero Miguus ille Anatomicus de hepate loquitur; Hepar ingens erat, & in concava parte, quæ ventriculum tegit, coloris plumbeo-grisei. Convexa pars mediocri coloris, & ita semisana, semimorbida inventa. Inter cæ in medio relinquere cogor, an cum omni equorum genere ita comparatum sit, ut vesiculam felleam non habeat. Certum est, quod in hoc individuo, de quo mihi sermo est, procul nulla vesiculæ fellis inveniri potuerit, quamquam maxima diligentia quaesiverim, & hoc siue hepar in frustula dissecari iusserim.

Variare igitur in subjectis oportet, ut modo addit, modo abste: Absentiam vero suppleat analogon aliquod. (*asp. Baribolui, Thomazilii.*)

Lapilli à Vesica fellea.

Magnificus ac Excellentissimus Dn. Rumoldus Wander Borch, Augustissimi Romanorum Imperatoris Leopoldi, nec non Serenissimi quoddam Archiducis Leopoldi Guilielmi Protho Medicus ætat. Anno 54. postquam annis quam plurimis atrocissimo lichenico dolore cruciatus, Asthmate ac Orthopnoea, ut nominati erecta cervicæ spirare posset, defatigato, auri-gino corripitur morbo, quorum morborum, diversorumque symptomatum vehementia (appropriatissimis medicamentis non neglectis) Natura devicta 24. Octob. 1668. satis cessit.

Cadavere per S. Cæs. Majestatis Chirurgum Dn. Pilas, me presente, exenterato, præter binæ in pulmonibus tubercula, 7. Lapilli coloris flavo subnigri fabarum minorum ac pisorum magnitudinem adæquantes in vesica fellea, ac poris cholidæotis repertifuerunt, & S. Cæs. Maj. ostenti. *D. Beckers Litter. à Vienne Utratislav. dat. 11. ad D. Raschium.*

Scholion.) Lapides in vesicula fellea reperiri plurima prostant apud Practicos hinc inde exempla, non minus quam apud Schenok. in Lithogenesis, & Kentmann. l. de Calcul. His recentia quædam nostri seculi exempla subiungi possunt. Fabricio Hildano monstrati fuere Lapides in vesicula fellea Coloniz 1612. in septuagenarii Comitæ cadavere reperti, excili, quorum major Drach. xiv. minor Drach. iv. ponderavit, quamvis pondus minus videatur propter insignem magnitudinem, quod factum, quia spongiosi fuerunt. Hildan. Cent. 2. obs. 44. fol. 320. qui etiam illos depictos exhibet. In foemina 65. ann. vesicæ cholidæotæ prægnans pluribus calculis fabæ molem excedentibus, usque viridantibus. Carol. Fiso Sect. 2. de morbo, ex Sero p. 2. c. 4. observ. 17. Ann. 1619. Mantua in femina Fabricius Bartoletus 300. Lapides magnitudine Cicæris in folliculo fellis invenit non minus in principe Mantuano Ferdinando Gonzaga, ad orificium ipsius vesicæ calculum triangularem Sectores repeterunt. Joh. Rhod. cent. 3. observ. 1. in Clemente VIII. Vesicula fellea monstravit Calculos, Hornung. Cist. med. Ep.

68. & ex Urbani VIII. vesicula quinque calculos, singulos magnitudine nucis avellanz extraxit Joh. Trullus Anatomicus. Barthol. Cent. 7. Hist. 45. sic calculos friabiles in Illustrissimi Comitis Thomæ Arundelii Angli Anno 1646. Patavii demortui vesicula fellea repletos fuisse describit & depingit G. Hieron. Welschius in Epistagm. observ. 65. p. 40. Cæcilius Solius egregius Anatomicus in Cent. 1. epist. 62. Bartholomæo narrat se diversis in Anatomiis diversi colores multiplicisque albos citrinos, nigros, atque rubros calculos ex folliculo felleo eduxisse.

D. Olaus Borrichius vidit Anno 1661. Leidæ in Nosocomio, secante Exc. Sylvio Mulierculam, in vesicula fellea plus quam 90. calculos magnitudine fabarum, angulosos, sed figurarum irregularium, tactu molles, & qui in aqua calida pene toti colliquefcerent, in Cent. 3. Epist. 85. Barthol. ubi in respons. Epist. 86. p. 472. Exc. Barthol. concedit eos in liquore calido facile frangi potuisse, quia leves sint, nec facile mergantur in aqua, a bile exsiccata vel assata originem ducente tanquam à causa calida; nam & in Regis Danicæ Christiani II. corpore, à Cornelio Amsfort Archiatro parvos rubros lapillos inventos, quod in carcere Regio, præcipue circa vitæ suæ frequentius usus fuerit generosis vinis imprimis Malvatico. Tandem unicuique adhuc addo exemplum, ab Illustribus aliquot personis mihi pro certissimo tum temporis narratum, cum Celsissim. Princeps Averspergi Coniux Comitissa de Lovenstain anno 1666. obiisset, in ejus corde & vesicula fellea varios lapides visos fuisse. D. Olsvald Grembs; ex mente Helmontii, felles hujus calculi seu Dulech originem putat fieri in Arbor. Hom. l. 1. cap. 7. sect. 3. 9. 9. quando Spiritus urinæ deviarit ex suo utero in fellis vicinum cruorem, tunc coactissimi lapides in felle obnasci.

In brutis pariter interdum tales inveniuntur felles lapilli, quos alios natales habere quam calculum humanum asserit Helmont. de Lithias. cap. 8. §. 23. anomaloque modo produci ab excrementis ipsis, non per modum alius infirmitatibus consuetum. In bove communiter eos in forma cæterum inveniri notat Exc. Joh. Dan. Major. Prof. P. Kiloniensis, in Anatom. Chilon. f. 9. major tamen est ab eodem ibid. descriptus, colore cereo ferrugineo ac splendente, magnitudine ovi gallinacei, ponder. drach. vi. Medic. quem possidet D. Henric. Vollgnadius Collega curiosus. Ipsemet Uratislaviæ ante biennium diversis temporibus binos à Lanioribus nostris accepi lapides è vesicula fellea è duobus bobus excisos, quorum major colore & figura pomum aurantium ordinariæ magnitudinis annulatur, & pondere 3 j. drach. ij. Medic. excedit, licet jam optine sit siccatus; alter minor drach. vi. qui ex parte fructus varios exhibet cortices, & in meducullo rotundum quasi nucleum inclusum pruni magnitudine, ex flavo rubescente colore. Alii è porcorum domesticorum felle oblatis ex viridi nigricantes, plurimi, sed minores fabas magnitudine non excedentes, maxime friabiles sunt, Nicolai Guliel. Beckers.

Calculi cystidis felleæ & meatus Hepatici.

Anno Dom. 1661. Illustrissima Domina Baro-

nissa Przechorzouskiana hic in Bæmia à longo tempore de tumore & duritie dextri hypochondrii conquerebatur, unde varus adhibitis remediis nihilque proficientibus tandem iacero correpta, intra aliquos dies fato cessit. Aperto cadavere hepar ipsius repertum est magnitudinis insolite, pondere æquantis circiter 12. libr., quod discissum durum, flavum, & hinc inde calculis flavis repletum oculis pateferebat. Dum ad vesiculam fellis perventum esset, eadem tumore bilioso vacua, sed loco ejus flavis arcuulis onusta deprehensa est, inter quas eminebant calculi duo rotundi flavi, scabroni, glandem sclopetiferè æquantes, præter hos paulo minoris rotunditas calculus meatum hepaticum ad vesiculam felleam tam arcte & scabrose obsidebat, ut discisso meatu difficulter erui posset. Ex hac observatione colligitur.

1. Vesiculam felleam esse receptaculum humoris bilioli.

2. Hepar continere materiam aptam pro humoris bilioso deponendo in vesiculam.

3. Si eandem deponere non potest propter obstructionem vesiculæ felleæ, eandem collocare in ipsum Parenchyma hepatis tam diu, quam diu illud est capax extensionis.

4. Ubi non est amplius capax, tandem iterum in massam sanguinis remittere, & in habitum corporis propellere, ut ex hoc casu patet; Sequitur igitur ex his bilem prius inesse sanguini quam in vesiculam felle deponatur: ubi autem illa generetur, an in hepate, aut corde, aut primam suam origine accipiat, in ventriculo, ubi idem bilis ex vesicula per porum choledochum ventriculo se insinuans per modum fermenti se commiscet cibis, chylicationemque adjuvat, & tandem reliquo corpori communicatur, hoc dubium felicissimo aliorum Medicorum ingenio confecto. *Joh. Jacob. Dobrzensky de Nigropontæ.*

De Ingenti Calculorum in felleæ Cystide copia.

Jacobus Nagy de Harfany, natione Ungarus, vir antiqua nobili prosapia oriundus, eruditus, & qui diu cum Turcis Constantinopolitane ratione sui status honorifice vixerat, tandem ex ditissimis suis territoris à Turcis ejectus, à Serenissimo Electore Brandenburgico in numerum Consiliarios suorum receptus est. In hoc dignitatis suæ gradu cum per aliquot annos vixisset, neque vitæ ea temporis familiarissime usus esset, incidit tandem in renum suppurationem cum purulentis mictionibus, dysuria, & id genus symptomatibus affectum jam enarratura consequentibus. Post multos medicamentorum usus, & à me & ab aliis Medicis præscriptorum, fato tandem functus decessit Senex annum sexagesimum sextum agens, pridie ultimi Decemb. anni jam elapsi 1679.

Medicus, D. Paulus Tarczali, natione quoque Ungarus, qui illum ad ultimum usque morbi conflictum curaret, diuque ipsius notitia & familiaritate usus erat, cadaver ejus à Chirurgo aperiri curavit, ut causam morbi cognosceret. Inveniebant itaque ambo renes suppurati, paucos eorum parenchymate superfluit, unde colluvies puris in vesicam, & ejus excretio cum strag-

stranguria, quandoque dysuria, tanquam mala necesse non concomitantia. Intestina erant exulcerationibus hinc inde exela. Cystis fellea calculis repletissima, adeo ut ne guttula quidem humoris biliosi in ea reperiretur, sed tanquam ex uno lapide concreta, vel tota lapidea appareret. Exenti lapides (quorum multi in intestinis putridis, dum exinebantur, hinc inde dispersi perdiri sunt,) a me numerati, illi tantum, quorum maximus nuclei castaneæ majoris; (cujus figuram quoque præsentabat, medii autem pili, phaeonque, minuti denique lentis magnitudinem æquabant, supra centum & quinquaginta inveniebantur. Relinquam calculorum saburram (quorum quidam erant superiores globulo, acus, quidam inferiores,) à famulo meo ultra quingentos calculos continente repertum est, sicut in universum plures quam septingentos calculos vesicula illa fellea, omnes conuerti nigricantis, viridis coloris concluderet. Quod licet purities humanis imbecillitatibus acciderit, operæ tamen præsum dixi, in favorem eorum quibus calus tot calculorum biliosorum inauditus est, miserandam humanam sortem hac in parte prodere. Scripsit vir ille p. m. ante quadrennium librum eruditissimum, Turcicum statum hodiernum ad unguem exhibentem, cujus titulum curiosis fastidiis hic apponere vixim fuit, qui talis est: Colloquia familiaria Turcico latina, seu statum Turcicus loquens, in quo omnes fere Turcici imperii ordines, ministrorum cujuscunque conditionis extra vel intra aulam regiam dignitates, qualitas, officia; regimen gentis, robur terrestris & maritimum, item natura, mores, ritus, consuetudines, variaz, religio, sectæ & religiosi, &c. per colloquia veluti in speculo quodam ad vivum repræsentantur, ac notis necessariis illustrantur per Jacobum Nagy de Harlany, nob. Ungar. Sereniss. & Potentiss. Electoris Brandenburg. Consiliarium. Subnexum est Testamentum seu fœdus Mahomedis cum Christianis initum. Coloniae Brandenburgicæ anno 1671. in 8. Observandum ultimo Medicis, quod Vir per quinquennium isthoc morbi genere laboravit, nec tamen continue, sed per intervalla statis anni temporibus, autum præsertim, ubi cum cæli tempestatibus in ægro quoque stranguria, mictio purulenta, dysuria, &c. ingruerant. *Christiani Mentzki.*

De Lapidibus Felleis.

Deyssoius Prof. Groninganus An. 1661. in folliculo tellis invenit calculos nu. 92. quorum alii pentaedri, alii tetraedri alii aliarum ngurarum, referente D. Deuringio in Examin. Pulv. sympat. p. 447. In Brutorum complurium Epate calculi, cum sicco vescuntur nutrimento & pabulo, & oriuntur, à quo affectu ex granulis, (diluitoris nutrimenti) in pascuis liberari solent. Par medela quibusdam contingit ex lactis asini potu, vel a Cerevisiæ tenuis, & aquæ aut comedendum ingurgitatione, imo solum herbarum infrigidantium succis semina quadam nobilis à n. uccagine tartarea alborumque calculorum infestatione una cum urini excretorum sanata est. Qui in vesica fellis generantur, calculi leves & friabiles sunt, oriuntur, cum pars

succi terrestris caseosi sero commixta in mucaginem degenerat & una cum bile in vesicam felleam delata est; unde Hippocrat. in Infantibus calculum heri asserit ex lacte valido & bilioso, uti dissert Joh. Bettus Anglus in de nat. Sangu. cap. 111. sect. 3. §. 14. p. 273. Medici Amstelodamenses in privato Collegio anatomico à Casp. Commelin. edito p. 18. observant Anno 1664. 8. Dec. in Hepatis Bubuli rano ductus Hepatici quidam in locis varios lapides, imo ipsos cistiles lapidea crusta obtecos, & subinde lapideus canaliculus in canali membranoso hæsit, cujus partem D. Abrahami Quina Medic. Amstelodam. servat. Ph. Jacob. Sachs.

Calculus in Vesica Fellea.

Sartoris cujusdam ad montem Arcis Regiæ hic Poloni habitantis Uxor, postquam triduum parturiendo consumpsisset, nullique medicamentis secus injam mortuus extudam potuisset, super venientibus Liporhynis moritur. Peritu mariti & obitricis apertum fuit corpus, exemptusque infans picens lapidem quasi corpore per transversum Uteri, capite similitum, pedibus dextrum attingens os ilion, brachio vero sinistro extra uterum pendulo. Scrutando deinde una cum D. D. Zolicofero nunc Archiatro Brehensi affine meo longe doctissimo, & D. D. J. Georgio Elshero, amico meo integerrimo, qui forte fortuna Vienna hac concesserat, reliqua viscera, ex vesica fellea præter morem magna, bile lenta & ex viridi nigricante repleta extraxi calculum oliva majoris (quis Regias vel Hispanicis appellant) magnitudinis, nec colore & figura ipsi abssimilem, cæterum æqualem, & Drachmam unam civilis ponderis pendentem, quem adhuc obformæ raritatem & elegantiam domi inter alia curiosa seruo integrum. Hæc enim sola oblitit quominus fregimus, & quid valeat, probaverim; annon forte eandem vim & facultatem habeat, qualis forte Lapidis in Cysti fellea bovis nigri ad cusandum lacerum, aut Lapidis Porcini, qui in felle porcorum, aut etiam ventriculo Hystricum in India reperitur, & Lusitanis Piedra di luerco dicitur, in profligandis febribus tribuitur. Lapidem enim id cavitatibus & ventribus lutorum repertos usui esse, humanos vero illo destitui, cum homo omnium ani alium sit nobilissimum, & inter omnia delicatissimis utatur cibus, mihi cum Jac. Bontio animadv. ad Garc. ab. orto p. 48. non credibile videtur. Sed quod, dum non adeo infrequenter, quia teste Joh. Rhod. Cent. 111. Obs. 2. & sæpius inveniunt, & fœre inventi nunquam & à nemine adhuc in usu deducit aut probati, merito miror; Licet hic ingeminare illud Sartyici, Externa nef. quo fœco se adornant, & plerumque Patria rebus (quoniam & illis quæ ultra nos & nobis nascuntur) beatiora videntur. Cæterum, quia incidenter mentio facta Lapidum ex felle bovis nigri & Lapidis porcini, non ingratum aut incongruum erit de hisce aliquot experimenta addere, Contigit mihi primo videre lapidem porcinum in Musæo Illustriss. Equitis & Medici Corvini, Romæ qui vires ejus in se ipso probasse quidem, sed an bonum eventum, & a 6

bris quidam (ni fallor) continua liberationem ipsi, an aliis Medicamentis debeat adscribere, adhuc se dubium esse affirmavit. Certe soror mea Viennæ post obitum Mariti Anno M. dc. Lxii. feori maligna laborans, & ab omnibus Medicis pro deplorata habita, bibens de infusione Lapidis hujus (quem e Serenissimo Archiduce Austriæ Guilielmo Leopoldo feliciss. memor. dono acceptum Magnif. D. D. Managetta S. C. M. Proto Medicus b. m. ipsi concesserat) in aqua simplici facta, brevi fuit restituta. Accidit forte, ut quidam ex Domenicis febris tertiana detentus residuum, quod illa reliquerat; sumserit, & blando excitato sudore ab illa liberatus etiam convalescit. De lapide autem vesicæ biliaris Bovis nigri bina experimenta mutuo ex D. D. Pauli Spindleri Practici quondam Polonensis, post Ratipon. felicissimi, Cognati mei multis nominibus colendi, observationibus manuscriptis (quarum centum insigniores & rariores cum scholiis luci destinavi propediem publicæ) Caupo quidam hic Polonus ad Aquilam Nigram, icterities, assumpto pulvere talis Lapidis cum Salibus Anthi & Centaur. minoris, quibus solis antea diu, sed sine fructu usus, insigniter fuit adjutus, & accepto postea uno vel altero Laxativo, penitus à fædo faciei colore liberatus. Item: Mater prælaudati D. Doctoris, Matrona Nobiliss. laborans ictero pertinaci totius corporis, fere ad nigredinem declinante, à solius vini, in quo talis calculus infusus & liquefactus, potu, urina crassa prope nigra copiose excreta, fuit curata. *Caroli Raygeri.*

Lapilli in vesicula fellea.

Cum Anno 1620. studii medici gratia Montpelii in Gallia versabar, Dn. Georgius Scharpius, Scotus. tunc temporis in Academia professor Medicus Regius, in disputatione quadam publice narravit, se aliquando Montpelii dissecto corpore lictoris cujusdam, in cystide fellea triginta lapillos carbunculi, antea pellucidos invenisse.

Cum Eminentissimi. Cardinalis, Francisci Guilelmi, ex familia Comitum de Wartenberg, A. 1661. demortui cadaver ad sepulchram sectione & conditura præparatur, inventi fuerunt, præter cranii partem deperditam, (de quo superius Observatione 18. plure,) cæteris corporis partibus ac visceribus sanis in vesicula fellea, cum paucis bile, lapilli 67. forma partim triangulari, in medio plani, coloris prasinii, quorum novem avellanae parvæ magnitudinem, reliqui pisa adæquabant, Helvigi.

Ana. 1628. in apertione cadaveris cujusdam Senatoris & Septem viralis, repetiti in vesica fellea 27. calculi, quorum quatuor figuræ quadrangulares magnitudinem nucis moschatae æquabant, reliquorum magnitudo paulatim imminuebatur, ad pisi majoris, sed inæqualem rotunditatem item. Nullum ab illis vivente homine, hepatis, aut ejus, quod miceris, officio damnum inferebatur, nulla noxa. Vesicæ alterius vicus, quod totam ferme ejus cavitatem, in qua sex quippe continebantur calculi, occuparet, illum extinxerat. Quam observationem, dignam notatu confer cum his quæ ante & de-

licia nostræ, Riolanus, refert lib. 2. anthropograph. cap. 22. Ex schedis D. Gregor. Queccii, Scholion Schroekii.)

Quamvis verisimile utique sit, quod de biliariis calculis anticius meus D. D. Joh. Georb. Voleka verus in schol. ad observ. 71. Ann. vi. Ephem. Germ. cur. dedit. Judicium, inhiuta nempe & eorum exempla Anatomicorum oculis esse objecta, ut pro miraculo amplius haberi nequeant. Quod & Nobil. D. Andr. Cnoffelius Ann. 111. observ. 206. monverat, multos scilicet rerum naturalium Historicos ad latetatem usque horum fecisse mentionem, adeo ut sibi adquirendum fuisse reputaret, nisi admodum rarus calus cum ad errandum adegisset. Ad quod sane etiam præsentis inprimis Auctoris observationi primæ accommodare licet, ubi sese Lapilli fellei pellucidi, carbunculi ad instar se habere, commendant, numero etiam memorabiles redduntur. Ad quorum illustrationem, notabiliores aliquot mihi per indicasse non abs re fuerit. Sic curulum ad nucis jugulandis molem accedentem protert Guil. Fabricius Hildanus cent. 1. observ. chirurg. 60. & duos alios, oblongum unum, alterum fere rotundum, una cum delineatione cent. 4. observ. 44. illum quatuordecim drachmas, hunc quatuor tantum & dimidiam ponderantem, quamvis ab initio multo ponderosiores fuerint. Magnitudine quoque insignis fuit quem describit Exce. D. D. Sebast. Schesslerus in Analect. ad an. 111. dd. Eph. observ. 206. & 283. vel ex pondere æstimandus, unciam semis fere exæquante, postea vero ad medietatem propemodum imminuto: Humidi enim satisque molles esse ut plurimum solent ingrati illi hospites, ideoque quo molliores & humidiores sunt, eo etiam leviores cum tempore redduntur, exhalante sensim immixto illo humido; id quod inprimis in eximio rotundo vesicæ felleæ calculo bubulo, ex meris laminulis facile satifcentibus compacto, observavi, qui recenter inde extractus novem drachmarum pondus suggererebat, cæterum mollis adeo, ut comprimi quadantenus absque magna difficultate potuerit; nunc vero exsiccatus & durior factus, vix tres cum dimidia drachmas pondere exhibet. Duo etiam ovi fere magnitudine spectabiles in lib. 2. c. 1. 4. Gammarolog. beati Salsii nostri, & alii duo juglandis quantitate in Append. adh. 1. recensentur. Magnum, quatuor drachmarum pondere, vacuæ biliaris vesiculæ inclusum exhibet nob. D. Carol. Raygerus Ann. iv. Eph. Cur. observ. 11. Alium, totum fere receptaculum illud replentem Bald. Timæus lib. 3. Cas. medicin. 28. aliisque compactum, solidum, ea quantitate, quanta ipsius extensæ cystidis esse potest. Joh. Fernelius lib. 6. Patholog. cap. 5. his verbis: Deceperit quidam Senex in iram mire propensius, post decessum sine felle ac sine cysti juvenis est, in cujus sede calculus ingens creverat. Admirandum vocat Marc. Donatus lib. 4. de hist. med. mirab. cap. 30. & quod omnem propemodum fidem superat. Forte membraneus ille folliculus à calculo ingenti extensus admodum, attenuatus, eique adglutinatus, minus curiosis observatoribus, ac si abesset, imposuerat, vel una cum liquore suo bilioso in calculosam duritiem concreverat. Quam ipsam Fernelianam historiam celeb. quondam Medicus,

Medicus, D. D. Gothofredus Mæbius cap 15. fundam. medic. physiol. illustratus, in Polonia olim innumeros boves, exorta quasi peste quidam interisse, refert, in quorum cadaveribus dulcētis nil aliud notatu dignum fuerit reperiunt, quam vena fellea tota in lapidem conversa. Auro quasi micantes plus quam ducentos Bernhard. Stieberus apud Hortium l. c. lib. 2. sect. 5. Orbicularem, novemalium triangularibus splendentibus constantem Cnossellus l. c. nitentem etiam Petr. Borellus cent. observ. 22. lucidum vel pelucidum Zodiacus Medic. Gall. Ann. 1. epist. 14. observ. 7. & epist. 5. obs. 8. Nicolai de Blegny exhibent. Beatus quoque Joh. Theodor. Schenckius crinitatum possedit, qui extractus instar crystallorum tartari splendebat, uti refert in Epist. 2. ad Sachsum, ejusdem Gammarolog. annexa. Alias non unius coloris existunt, dum modo pallidi & cineriti, modo flavescentes, crocei, rubicundi, viridescentes, nigricantes, variegati deprehenduntur; prout enim bilis hac in parte se habet, quæ præternaturali in statu varios induere solet colores, sic & calculi ex eadem à spiritu coagulatore, quem descripsit Petr. Joh. Faber lib. 3. Sapient. univers. cap. 2. producti, varie eodem imbuuntur. Numero denique memorabiles sunt, quos describit lib. 3. observat. Felix Platerus, trecentellum nempe exedentes.

*De Lapide vesicae Fellicaminatili
& raro.*

Multi rerum Medicinalium Historici etiam ad satietatem uique lapillorum in Vesica fellea inventorum fecerunt mentionem, propterea, & meum fuisse, acquiescente, nisi admodum rarus casus ad enarrandum me adesset. Fuit magni nominis Vir Theologus Pomaniz nomine Dujin, Canonicus & Decanus capituli venerabilis Pomanientis. Is per bene longum tempus sensit graves lateris dextri dolores, post tunc inmodica pressus, & potu oppletus nimio, factus est hydropicus. Excellentissimus ac Experientissimus D. ibidem Medicus & Practicus Brodowski, ludibrium hocce Medicorum pro perte sua averruncandum præsumpsit, & quidem non parvo successu, dum aqua intercutanea fere omnis per urinaria vasa deviabat, & detumefactis abdomine & pedibus, spes sed vana restituenti patientis florescebat. Luctu namque hujus mali spina localem illum dolorem non poterat mentiri, quin de novo pedes & abdomen longe majori tumore extensi, mortis celeriori gradu accelerantis & ita misere anhelantem & suffocatum Dominum Patientem cultro Medico extradendi, expirante anno 1671. causa fuissent. Facti Cadaveris apertione, nihil magis spectatores in admirationem rapuit, quam quod fere nullum membrum index tanti mali apparuerit. Tandem forex se prodit, vesicæ fellea parum bilis, sed ejus in loco orbicularem ex novem, aliis figuræ triangularis, sibi invicem incumbentibus, faciliq; manu separabilibus lapillis, constantem lapidem, mole quam pondere grandiorum, subnigricantis, subviridantis & splendentis coloris exhibuit. Hæc sunt, quæ ex autoptica relatione Domini Jacobi Weisli

Chirurgi Pomanientis, mihi ibidem commoranti, patent. Ille mihi dono dedit unum ex istis lapillis, qui d. j. pendet, cujus forma pomi minoris sylvestris, per quinquagem disseci partem unam ex æte æquabat, quem pro majori fide Excellentiss. ac Experientiss. D. D. Martino Bernhardt a Berniz S. R. M. Pol. Personæ Medico, & D. D. Segero S. R. M. Med. & P. P. & Physico ordinario Thorunientium dignissimo videndum tradidi.

Paratus etiam essem non solum hunc lapillum, sed multo majoris & maximi momenti Metalla mineralia Academiæ Curiosis tradere, modo constet domum raritatum esse consecratam in qua more Anglicano possent reservari. *And. Cnossellus.*

De Liquore bilioso corrosivo per cystidem felleam exsudante.

Anno 1670. Auriga ex febre continua ardente quali furibundus, in via regia demortuus, jussu serenissimi ac Potentissimi Electoris Saxoniæ secabatur. In exenterato cadavere inter cætera observari, viscera omnia bene constituta, excepto, quod in ventriculo neque cibus, neque chymus sese offerret, erat autem repletus materia viscosa fluidiore, ex viridi nigricante (*schvartagrün*) gelatinæ spissiori, adhuc tamen fluidæ similis, quoad mensuram Cantharum Misnicum ferme excedente. E cystide fellea adhuc integra & illæsa, Ovo Columbino majore, exsudasse vidi tenuiorem bilis portunculam, duorum vel trium transversorum digitorum spatium, circum circa luperas, inferasque & adjacentes partes undiquaque croceo colore tingentem, irrigantem, itaque corrodentem, ut partes ea illinitas & attractas putredinem acquisivisse manifeste non solum apparuerit, verum & præter hepatis substantiam, magnam partem hypochondrii dextri tingendo, rodendoque putridam reddiderit, illæsa plane vesicula biliaria. Unde facile colligendum, erodentem vim bilis simul nervosum genus tetigisse, & egrotum furiosum reddidisse. Venulæ insuper & arteriæ in Cerebro turgebant sanguine nigricante, eque Corde dissecto sanguis nigerrimus, picis ad instar liquidæ, dimanabat. *Melchioris Fribe.*

Hepar magna ex parte in hydatides degeneratum & ab imperio temerè confessum.

Hepatis substantiam glandulosam, aut è minimis glandulis esse compositam, variis observationibus jam ante comprobavi; glandulas in hydatides degeneres multoties quoque demonstravi. Hic vero historiam satis mirabilem recensere animus est de hepate magna ex parte in hydatides degenerato. Chirurgus quidam temerarius in loco quodam suburbano habitans. paracentesin in thorace instituturus, ob hydropem pectoris, ut sibi imaginabatur, me in consilium vocari iussit; quando tamen ob adversam valetudinem illuc pergere haud potui. Quid sit? Proprio Marte, idque solus, non thoracem, sed in hypochondrio dextro abdomen perforat. E vestigio hydatides multæ incessivè erumpunt. Hinc visilis obitupescens turundam indidit, & me convenit, ast incautum, brevi egum post obiit misera femina amide nobis

rem penitus investigandi occasio relinquebatur. Aperto igitur thorace, nihil liquoris præternaturalis invenimus. Imo viscera bene ibi vidimus constituta. In abdomine vero hepar peritonæo connatum, & propriæ substantiæ loco ex hydatidibus magna ex parte coagmentatum se obtulit. Hanc hepatis partem peritonæo connatam perforaverat ille audaculus, cum apertionem in thorace institueret, & ex ea hydatides proruperant. Quod eo facilius contigit, quia tota substantia hepatis eo in loco in hydatides degeneraverat: ita ut inter cavitatem illam & peritonæum, sola membrana, hepar ambiens, peritonæo connexa, intercederet. *Frideric. Ruyschius in Observat. Anatomico-Chirurgicarum Centuria.*

Vlceris hepatis dissectio.

Cerdo quidam inflammatione jecoris laborans taliter qualiter se habuit, incidit tandem in fluxum alvini, quo sanguis concretus excernebatur. Languit sex menses, & emaciatus fuit usque ad mortem.

Cum cadaver aperiebatur, mirum! locò hepatis sacculus crassus & membranofus inventus est, cui pus cruentum & aquosa quædam inerant.

Dixi sæpius chylum acidum sanguinem ita inspissare ut circulationi ineptus evadat, exinde obstructions, sive in hepate, ut hic, vel in alio quovis viscere pariuntur. Particulæ caseosæ chyli in tenuioribus jecoris canaliculis sedem fixerunt, erant enim tam crassæ, ut eos permeare non potuerint: hinc primo obstructio. Succiporro, qui continua circumductione circa obstructionem resistere cogeantur, incallescere incipiebant: succi enim quodammodo stagnantes, occasionem majorem nanciscuntur, quam cum celerissimo itu vehuntur: atque hæc incalcentia à medicis inflammatio, seu phlegmonæ appellatur. Succi interim ibi tardius se moventes acorem contrahunt, unde pus. Pus enim nihil aliud est quam succus chylosus leviter coagulatus; quod si diu in parte quavis remaneat, foetet. In hoc cadavere omne pus in hepatis membrana remansit, & quicquid intus hepatis substantiam constituerebat, continua rosione consumptum est: hinc pus non unius formæ, sed cruentum & aquosum, nam vascula erosa, sanguinem & lympham aliquatenus adhuc adferebant. Non mirum videri debet eum fuisse imbecillum & mortis instar emaciatus, cum omnis succus nutritius continuo corrumpebatur. Imò corrupto chylo, latex serosus intestina erodit, adeo ut sanguinea vasa sanguinem effunderent, qui coagulatus per anum excernebatur; atque sic debuit extrema sua fata claudere. *Stephanus Blancardus in Anatomia Prædic.*

HERMAPHRODITI.

Absit ab hoc capitulo lasciva petulantia, & procul hinc, procul estote aures profanæ & salaces. Medicis scribimus, quib. & tangere subinde permittit necessitas, quæ natura, sollicita pudicitia conservatrix, velanda curavit. His er-

go non molestum erit audire, quid circa eas partes etiam extra ordinem aliquando ipsa ita omniparens mater molliatur. Obstupuit mecum Guilhelmus de Penyn Amstelodamenti nosocomio præfectus Medicus, & aliquot celebres, qui aderant, Chirurghi, dum puellam septennem visitabamus, quæ anno ætatis suæ sexto fluxionem menstruam passâ erat diuturnam & vehementem, atque ubi ea desierat, pleuritide correpta fuerat, ac diu colluctata cum febribus eam ordinariè comitantibus, & hic diu etiam sequacibus, tandem in regione pubis vehementissimos sensit dolores; parsque ea paulatim intumescebat, anno ætatis septimo, quo hæc oculis nostris usurpavimus, non puerum, sed penem produxit, qui perfectus, & perforatus erat: ita ut urinam commodè per eum redderet, testiculi j. m. etiam sui prodebant initia, nam in sinistro latere tangentibus occurrebat globulus, qui manui cedebat, omnium, qui aderant, iudicio extra omnem controversiam, testiculi laticantis adhuc, sed se foras prorumpere conantis argumentum. Quamquam autem parte recte adnate urinam redderet, non tamen eandem minus commode, quæ antea solita erat via, emittebat. Mirabamur ista tam insolita naturæ molimina, & quo tandem evaderent internos quærebat, quod succedentia docebant tempora, vivit enim & valet hæc parva hermaphrodita, quæ non minus obstupuit, credo, quam famosa ista Anna Weykle Angla, quæ ne quidem per umbram suspicans se aliam fore, quam feminam, sine ullo doloris sensu anno ætatis sexto sensit prodire testiculos, quibus decimo tertio adnatus est penis, ita ut utriusque sexus membra exhibeat, testiculis etiam, quam ordinarii virorum sunt, majoribus, titillabatur utriusque sexus libidine, sed quia penis non erat perforatus, semen, quod eum inflatum impleverat, siquidem id affirmanti fides potest haberi, deorsum per muliebria, deorsum per muliebria effluebat. Curiosa alia de hac perfectissima hermaphrodita referre possem, nisi illa per totam Europam pene vagata, penem & reliqua omnibus videnda, omnibus tangenda obtulisset.

Itaque aliud in hoc genere mirabile referam, quod etiam Amstelodami visendum fuit: puer est trium annorum, in quo nec testiculi, nec scrotum apparet, sed tantum virgæ cuiusdam imperforatæ exiguus tubus, & intra eum foramen, quod caput majoris aciculæ magnitudine non excedit, per quod urinam reddit sine incommodo. Sed hæc stupendis naturæ exorbitationibus tantisper immoratum esse, licet satis, Legat, qui curiosior est hac super re, Ausonii carmen, non unum hujus rei exemplum adferens, quod hic tibi suis admetior numeris.

Vallebanares nota, & vix credenda Poetis;

Sed quæ de vera promittitur historia.

Femineam in speciem convertit masculus ales.

Pavæque de pavo constitit ante oculos.

Cui si admirantur monstrum; sed mollior agna

Adstitit in tenerum de grege versa marem.

Quid solidi ad spectem nota novitatis habetis?

An vos Nasoni camina non legistis?

Canca convertit proles Saturnia Cor. sui,

Ambiguae fuit corpore Tiresiar:

Vidit semivirum fons Salinacus hermaphroditum,

Vidit

*Vidit nubantem Plinius Androgynum.
Nec satis antiquum quod Campana in Benevento,
Unus Ephēborum virgo repente fuit.
Nolosamen veteris documenta arceffere fama.
Ecce ego sum factas semina de puero.*

Legat Fortunium Licetum de Monstris, & Martinum Delrio in disquisitionibus magicis, ubi hermaphroditum genuisse & peperisse narrat, alios ex feminis subito in viros mutatos, alias ex amiculis in juvenculas, nec negatur vir ille, tempus, locum, aliasque assignat circumstantias, quæ solent rebus fidem adtribuere. Theodor. Kerckringius in Spicilegio Anatomico.

Conceptio Hermaphroditica seu Androgyna.

Fortunius Assayatus, Physicus atque Theologus Italus insignis, in suis considerationibus Physicis atque Astronomicis, Paulo 111. Pontificis Max. inscriptis, & Venetiis Anno 1549 impressis, de conceptu Androgynæ cap. 2. hæc habet: Mercurius Britannus, divinus vates, anno à Christo nato 446. ex ea matre natus est, quam constabat sine viro concepisse, cum forte, se cum viro jacere somniaret; id Sabellicus scriptor historicarum diligentissimus, alique Historici & Chronologi, præsertim apud Anglos, literis prodiderunt. Averrhoes asserit hujusmodi casum suo tempore accidisse, hoc est; virginem sine virili concubitu concepisse & peperisse. Divus quoque Thomas ait, suo seculo idem evenisse. Noltrates etiam paucis abhinc annis testantur idem Cremonæ contigisse. Vivuntque adhuc cum obitetrices boni nominis, tum probatissimæ quædam matronæ, cum quibus hac de re sæpe longos ipse sermones feci, quæ jurant, se huic spectaculo interfuisse.

Allegatus Autor cap. 4. suam hac de re sententiam fert, dum dicit: Dari hermaphroditos utriusque sexus munus egregie absolventes, & alterum tantummodo sexum foris ostendentes: feminea genitalia exterius conspicua esse, virilia intus latere, semine prolifico prædita, & per certum seminis ductum, quotiescunque opus sit, semen ad matricem deferre, vehementer aviditate illud excipientem: illudque penetrare illæsa etiam virginea membrana in loca ad generationem accommodata: illicque residere, & ita conceptionem fieri, eodem modo ac si cum viro rem habuisset: & hoc plerumque solere per somnum usu venire, quo tempore sagax natura ad venerem excitandam varia simulacra confingere facile potest. Servatis igitur naturæ legibus, satis constare arbitratur, mulierem sine viro foris a marito concipere posse: quæ in re providæ & aliæ naturæ gratias ingentes agendas esse censet, quæ nullo pacto genus nostrum perdi aut extinguere voluerit: etiamsi viri non invenirentur, aut feminas prorsus odissent: immo omnia procurasse naturam statuit, ut humanum genus tueretur & conservaret, illudque homine etiam invito latius propagaret.

Rarus hic Tractatus plurima alia paradoxa in se continet non ubivis obvia: Speciosas etiam rationes complectitur, cur magnæ se ad polum vertat, in quibus eruendis hactenus plurimi desudarunt. An autem Lectori curioso apud hic

in omnibus satisfaciatur, in medio relinquitur. Scholion.) Aristot. l. 4. de Gen. Anim. c. 4. judicat, de Hermaphroditis, quibus gemina sunt pudentia unum ratum, alterum irritum habent. Non verum hoc Aristot. decretum esse statuit Joh. Faber Lynceus in not. ad Hist. Medic. f. 547. certorum, inquit, mihi fide testimoniis constat fuisse egregia statura & venusta facie juvenem, qui modo gladium cungebat, modo colum tractabat, & agi pati que posset. Nisi Aristotel. intelligat, qui secundum virile profundit semen concipere non posse, aut vice versa, quæ gravida sit in alia femina generare non possit. Contrariam, ait fore soveo, Aristot. sententiam. Exenteravit Theophil. Molitor Lynceus in Fabri de murem majorem, Ratum, qui hermaphroditus erat & prægnans, novem masculos utero conclusos gessit, non majores quam aliqua magna foripica, vivos omnes, & in quibus cor pulsare visum est: Erant huic omnia foemina constituta genitalia & semen præparantia, constituta testes ac deferentia vasa una cum matrice: Altera ex parte aderant omnia vasa semen facientia & jaculantia masculina, cum ipso utero, testibus, veliculis semine denso & optime concocto omistis. Hactenus Faber: Memor. & Wolphius in memorabil. com. 2. Camer. cent. 16. f. 110. fuisse Hermaphroditum Hieronymo Montano Gallo satis cognitum, qui sexus mulieris putabatur, viro nupserat, cui filios aliquot & filios pepererat, sed nihilominus ancillas compellerat, & in his generare solitus fuerat: licet itaque rarum ut Hermaphroditus utroque sexu & incubum & succubum cum aliis agere possit, & utroque fecunditatem exhibere, ut tamen solus sibi ipsi utroque sexu sufficere possit, res videtur esse valde difficilis quæ & credi & probari satis possit. Georgii Christi Petri.

De Duobus Hermaphroditis.

Inter praxim, quam in castris Brandenburgicis ad Anclamum Pomeranorum locatis, apud multos dysenteria & febre maligna decumbentes, hoc Anno 1676. Mense Augusto, exercui, oblatus mihi fuit infans masculus, vix tertium anni quadrantem ætate superans, dysentericus, ex plebeia stirpe minime oriundus. Puellus hic, cum ultra octiduum laborasset dysenteria, & ea muliercularum medicalitricum ope jam esset sublata, accedenti videbatur mihi insultibus epilepticis iisque lethalibus decumbere. Cumque inter cetera indicantia Clyster esset applicandus, & nemo in castris adesset, qui manum operationi huic adhibere gnarus esset, ipsemet ego enema paravi, idque instrumento apto infantulo infudi, ne aliquid damni imprudentia alterius administrantis pateretur. Etenim non mihi aut alteri Medico candido turpitudini ducendum exitium, quandoque Pharmacopœi aut Chirurgi vices supplere, ubi id necessitas efflagitat. Cum itaque aniculum ol. amygd. dulc. oblitum cauta satis manu ano admovissem, ut sine noxa & dolore posset penetrare. Sphincterem ani (qui in dysentericis quidem relaxari solet) adeo amplum inveni, ut is primo statim intuitu mihi po-

tius membrum muliebre, quam anus videretur. Rima erat oblonga, ampla, labiis septa, quarugis quibusdam sed paucis erant plicata, anique partim sphincterem, partim vulvæ labra præsentare videbantur. Intererea cum syringam hinc inde in ano laxo agitarem, nec tamen illam penitus intrudere possem, cum semper aliquid obstruere deprehenderem, quaquaversum canaliculum movebam, & liquor enematiss etiam resisteret, paulo superius versus os coccygis reperi ingressum, quo syringa penetrabat & clyster plurimam partem infundi posset. Dubius igitur primo, an aliquid monstri & Hermaphroditici subesset in tenero hoc subiecto, an verosecus, &, (quod in his morbis familiissimum est) ani sphincter nimis esset relaxatus, atque intestinum rectum acrimonia humorum dysentericorum exesum foramina acquiritisset, rogavi Parentes, ut infantulum cum muliere, quæ illum a partu curaverat, lectica ad tentorium meum, quod inde ultra dimidium milliare distabat, duci curarent, ut per integrum diem eo melius infantuli curam haberem, quoniam officii Electoralis causa longius abesse non possem. Id autem feci ea de causa, ut præter diligentem curam illas partes exactius perlustrare mihi simul copia daretur. Consensere Parentes, & subsequenti die miserunt ad me puellum cum vetula. Illum ego lethalius laborantem symptomatibus, quantum opus erat, refeci medicamentis necessariis, & posticas partes deducendo interiora ani perlustravi. Ego & vetula quid lateret posuimus, quam natura loco sphincteris ani produxerat. Diductis itaque labiis externis, rugis quibusdam (ut superius innui) sphincterem ani mentientibus, inveni nymphas & carunculas versus abdomen, inter quas hiatus erat pro vaginula uteri: Paulo superius versus dorsum, sphincter erat intestini recti minime, ut alias, corrugatus, sed tanquam duabus membranis rubris ex adverso sibi correspondentibus, alvi excrementis exitum præbentibus; compositus: Hi: valvularum more aperiebatur, quotiens infans ejularet, & (quod ob dolores internos fere continuo accidebat) vocem rancam minime sonoram ederet. At, quod assequi ego non poteram, supra hunc ani sphincterem internum aliud foraminulum parvum, ad formam meatus urinarii, in mulieribus alias versus abdomen, hic autem versus os coccygis, conspiciebatur. Notabile & hoc erat, quod Perinaeum, forma sua futuram exactissime referens, ultra quatuor transversos digitos inter penem & hunc monstruosum anum distabat. Ita satis hisce partibus perspectis, infantulum hunc (puellum an: Puellam, vel quomodo unque eam appellare placuerit) cum vetula dimisi, qui etiam subsequenti die epilepticus moriebatur. Statimque in proximi pagi templo sepeliebatur, cum Parentes exenterationem, quam sollicitè implorabant ob internam partium structuram, penitus abnegarent. Mulier quæ infantis curam à partu usque gesserat, eandem mecum sententiam circa muliebre membrum fovebat, quæ (ut agebat) semper observasset, Infantulum circa illas partes sese non bene habuisse, præsertim cum egressis urinas & alvi excrementa.

Adjunxi hic Schema partium illarum infantis, mea quidem, sed rudi manu delineatum, cui etiam addidi aliam Hermaphroditici monstri figuram, qui eodem ipso tempore occisus erat ad propugnacula Urbis Anclanæ. Hujus Cadaver denudatum inter aliquos occisos ita cum suis genitalibus utriusque sexus fuit conspectum à plurimis, ubi membrum muliebre perinæ locum occupabat. Christiani Mentzelii.

De Hermaphrodito.

Die 12. Julij. proxime elapsi, comparuit puella quædam rustica, non imberbis, in nostro Othiniensi Consistorio, cui nihil in votis erat, prius quam ut nuncio & sexui sequenti, & ejusdem sexus habitui, misso, sibi integrum esset à Gynaecis ad masculinum & sexum & cultum transire. Erat autem.

Mercurio genitore satus, genitrice Cythera

Nominis ut mixti sic corporis, Hermaphroditus.

Androgynus hæc natus in pago Fionensi, Espe, cum salutari Regenerationis tingeretur lavacro, dictus est Petrus, teste ipso loci illius Pastore; postea autem, cum errorem Naturæ observarent Parentes, salutabatur Petronella, ultra annos unum & viginti, in hunc usque diem, quo captus vel rædio, vel odio sui generis, spreta nobilitate famine sexus & præcellentia, (quam solam laudavit qui omnia vituperabat Agrippa) ad castra Viatorum redire optabat. Causam hunc & causam ad forum Medicum non exolvebant Assesores, ideoque remittebatur ad utrumque Clarissimum meum Affinem Dn. D. Christianum Henricum Luja, Dn. D. Christophorum Balslavv. & me simul, ut nostra, qui una cum temporis aderam, valeret exstimatione. Nos varia primum huc spectantia rogantes, tandem ipsum hominem oculis subijcimus nostris. Ubi jam oculi nostri ad metam pervenissent, observavimus in perinaeo, sive interperinaeo.

Iudendum muliebre, exiguum quidem, sed non plane clausum aut imperium, quod tamen otiosum judicavimus, nec omnibus, quod dicitur, absolutum numeris, cum nunquam vellocium emiserit, vel tributum pependerit lunare. Prævaluit autem membrum illud quo Viri sumus, in quo defectus apparuit nullus, nisi quod Penis brevior videbatur, verum, præ pudore, ni fallor, brevitatem modo mentiebatur, contigendo in viscera mille operata rugis. Testes adeo accreverant, ut non mereantur nomen Testiculorum, communem quippe supergressi magnitudinem, Vervicum pene adæquant. Atque ita non modo bene testantur virilitatem, sed & salacitatem, cujus instimulatus dicitur (ut cum Plauto loquar,) præsentibus testibus petuleas adamare rusticolas. Percrebuit equidem rumor pamphilam quandam ex ipso gravidam esse, quod tamen ipse, à nobis interrogatus, negavit constanter, ideoque nec temere hoc affirmavero. Egregii hi Testes rarissimo teguntur scroto, non ad communem Naturæ legem formati, sed prorsus bifido, & in dextram sinistramque partem exacte diviso; quippe cum lineola illa, in intima scroti parte secundum longitudinem communiter excurrente; quam futuram vocamus, hæc sedem suam circa Penis elegerit radicem.

radicem. Atque sic iterato saepius luserat in hoc nostro Natura, in longum sui ludibrium ipsum reservatura. Immo & varias vices ac vicissitudines experta sunt hæc membra, ipso telte possessore. Tempore quippe nativitatis, & primis Italianis annis, favit Natura potissimum Virilibus, progressu temporis videbatur ad alteram inclinare partem, quasi organo muliebri dediticia futura verum ubi pubescere cepisset, rediit ad priorem locum, unde digressus fuerat, fuetus Naturæ vigor, quasi eandem remensurus fabulam. Cui vero se heic sentiret divertii commodius, transiit huc sitas sedes, masculo generi futuras hereditarias. His omnibus rite penitatis, ductum Naturæ sequenti, Virorum numero hunc adscripsimus; iubentes ut, qui hæcenus sub muliebri palla mas delituerat larvatus, jam, complicato sipario, in scenam sine fuce prodiret, velteque foeminea cum virili nutrita; masculeretur, & faciendo opere rustico, jam tum Vir futurus, digno Viros, laqueos posthac exerceret suos. *Geseygn Hamai.*

Andria. Sive mulier Hermaphroditica.

Emasculatam foeminam, non caridum luxu aut delictis pronatam Andriam, non illam Terentii ex Insula Lesbo ortam, sed rustica gente in superiori Bavaria editam exhibeo, cujus lepidum exemplar Marius Grapaldus lib. 1. Lexic. cap. 1. voce *and* in Latine reddito Epigrammate exhibet.

*Cum mea me genitrix gravida gestaret in alvo
Quid pareret feritur consuluisse Dios.*

*Mas est, Phæbus ait, Mars foemina. Junoque
neutrum.*

*Cumque fore natus, Hermaphroditus eram,
Quærens leibum, Juno sic ait, occidei armis,
Mars cruce. Phæbus aquis, fors rata quæque fuit
Arbor obumbrat aqua, ascendo, decedui ensis,
Quem tuleri amensu, labor & ipse super:
Per hujus ramis, caput i. cidit omne, tulique
Foemina, viri neutrum: summas, telo, cruce.*

Andria autem nostræ rustica Martha Lechna non ine, patriam habuit pagum superioris Bavariæ perantennum Ilmunster, quitero medium itineris inter Ingolstadtum & Monachium peregrinantibus exhibet, à præterlabente fluvio Ilne, & Canobio, quod circa annum R. S. 1641. ibidem exstructum Bavariæ annales referunt, ita indigitatam, quam corrupto idiomate incolarum dialectus nunc Idelmunster vocat. Parentem habet Johannem Lechna mercenarium, matrem vero, ob motum pedibus negatum ægerrime inque summa penuria decumbentem. Amor Judicis in egenam hanc decimum quartum annum ætatis nunc agentem literis hîscæ commendatitiis pro viri posse munivit;

*Demnach Mir Vorvaiser dessen mein Unterthan
Hans Lechna unterthanig zuvernehmen geben,
dass er unter seinen swiff Kindern ein massen
und armeliger, vvelches in gleichen Alam und
Weib, nicht vweniger dessen Chevvirrin vwegen zu
gestandenen Unglucks an beyden Füssen contract,
Sintemal er aber vvehon großer Wehemuth zu
vverirung dessen keine Mittel, auch mit seiner Hand
Arbeit, als Tagvvhler, jedtich zuverhalten nicht
vveist, sondern ihnen kann die Lechni Mittel
schaffen kan, dahero gedrung-n, gute, fromme,
treubertige Christen umb das vvirtdige Almosen*

*umb Gottes vwillen anzunehmen und zu bitten, bat er
mich ihme dessen Atteilation und Urkund zuver
theilen unterthanig gebeten und a. gelanget, vvel
ches Ich der Wahrheit zu Steur, vvor es auch der
Augenschein bezeugt, nicht verweigern vvolten:
demnach an alle u. d. iede, vvas Dignitaten und
Standes sie seyn, vvelche mit diesem Urkund ersu
chet vverde, mein gebuhr-dienstvwilliges und
freundliches Ersuchen, Sie vvolten gedachtem Le
chna aufs Christlichem Mitleiden die barum ritzig
keit erweisen, und ihme mit ihrer Gabe dem vvir
tdigen Almosen befohlen seyn lassen: Solches vvir
d Gott der Allmachtige seiner Verheissung nach hie
Zeitlich und dort ewig keloben, der arme Mensch
auch mit seinem Gebet gegen Gott vvirbittend nicht in
Vergessenheit stellen. Der Wahrheit zu Steur habe Ich
aufs berührten Hansen Lechna, sein gebuhrendes
Ersuchen und Bitten ihme diesen Schein verfertige
t, Zugestellet und g. ben. Actum Idelmunster 20.
Novembr. Anno 1679.*

(L. S.)

ULRICH VIRDE

Richter allda.

Hac ratione ostiatum victum quæritante Martha anno hoc P. C. N. & Inc. Mdcxxi. 5. Iduum Jun. quo die Romæ antiquitus Vestalia celebra bantur, ædes meas adiit, pro obtinendo Viatico: lectis literis salvi commeatus, copiam videndi ut faceret hanc naturæ aberrationem peti, quæ antequam inspiciendam se præberet, una cum fratre suo Jacobo Lechna facta est, se a primis unguiculis & dum sacra initi fœderis cum ea celebrarentur, Hermaphroditas suspitione detentam a potiori membri genitalis efficaciori signo, evitari Caipari impositione fuisse indigitatam: succrescentib, vero annis cum & pendenda mulieris inguiculi longiorem rimam evidentius ostenderent, circa decimum ætatis annum, alterum, quod in ipso S. Baptismatis fonte insimul Martha nomen acceperat, pro diluendo sexus idubio reallumere parentes anxie laborarunt: bavaro lunc Dialecto nostræ *Maribel* vocata. Monachiumque deducta est, atque censuræ & inspectioni prudentissimæ sagacioris Experientia Gratioli Ordinis Medici ibidem commissa fuit, horum iussu Martha nomen in hunc usque diem retinuit, atque virili exuto habitu, ob perpetuum urinae stillicidium, muliebrem utpote laxiorem vestitum induit. Pendulos vero testes cum seroto vidimus juxta adumbratæ figuræ lic. A. A. quas iusta figura & proportionem efformatas deprehendimus, supra quas brevior ac natura in viris finxit, præputii ac penis effigies BB. imminebat, liquidem præputii involucrum median glandis caput C. C. quadantenus obvelabat, nec omnino obtegebatur: autem glans penis turbinata, ut in aliis viris, cujus basis re iquo membri virilis corpori, abbreviato nimium circuli instat, sive in modum coronæ adhærebat, molli admodum acutic prædita: nec deerat *glandis inferiori partē*, quod quidam ex nervorum extremitatibus constitutum, pro contractione præputii factum, strenum esse autumant D. Hoc suberat discriminis, quod viratæ hujus penis in summa glandis medio apice non fuerat pro more perforatus, ac in maritali sexu, sed in superua membri parte rimā obtraherat satis longam & profundam E. E. quæ se infra præputii partem pubi substratā ad dimidii pollicis transversū longitudinem extendebat.

diducta rima alæ pudendorum muliebrium conspiciebantur, quæ & bini meatus F. G. horum prior & superior styli mediocri magnitudinem ad mittebat, perpetuo urinae stillicidio squales, inferior & longe minor satis difficulter & cum dolore non ita exquiritè pervelligari potuit: sticta rima, quæ mentis huic non in apicis medio, sed potius in superna parte sita conspiciebatur, diducto altius præputio, pollicis extimo articulo longior erat; tenebræ lanuginis vestigia in pube pubertatis imminuentis iudicia dabant. Penis de nunc male conformata ex brevitate nimia minori (quia præter glandis folius corpusculum tenebrum nil de coli extensa parte residuum cernebatur, quamvis alias pro membrorum proportionem conformatum deprehendamus, & parvi statura quandoque magno coquo pendulo membro conspiciantur) iudicium, quibus ante in mente hærebat, hi corporis proceritatem, macilentiam, vocem & vires viriles, promissiores comas, mammas ad latera minutas, & pudenda, non tamen ut in viris promissa adeo, cum appensis testiculis seroto obductis intuebantur, etiam elongatam cum binis ductibus altius evolutis parum habentes: qui vero altius rem ad rationis trutinam examinabant Tribades cum Cælio Aureliano, & ad nequicias attractantes lubigatrices comici referendam censebant. Hos curiosior Genitalium observatio in questionem intricatam satis adeo deduxit, ut de futura aut imprægnationis aut prolificationis munere sciscitarentur: alios movit Galeni auctoritas Comm. in 7. Aphor. 44. *mulierem non fieri æquimanum*, cum eadem nil virile insit, ex Divi Senis auctoritate: alij pro ratione roboris genitalium dimicantes, virili potius habitu incedendum duxerunt: inter utrorumque diverticula alij media incedentes via utrumque veneris exercitium Marthæ nostræ attribuerunt, quoniam juxta Suidam *ἡ ἄρσενος ἡγεμονία παρ' αὐτῆς*, adeo ut merito querendum.

*Num Dea scæmi eumjam negligit Hermaphroditum.
Amplexu teneri sollicitata viri.*

Favet horum sententiarum historia Keckermanni de milite Ungarico, qui in utriusque castris & Marti & Veneri litando assidue strenuum se gerebat tandem effeminatus puerperii vices subivit. Ut taceam binos Monachos, de quorum altero *hermaphroditus* illud.

Mari, Mulier Monachus, Mundi Mirabile Monstrum.
Sic Andriam Scoticam herilem filiam in unolento accumbentem stuprasse Anno. 1461. Boetius auctor est. Et hæc de Andria nostra dixisse sufficiant. Jo. Senicæ.

*Annotatio ad observationem præcedentem
De Andria.*

Quam ex cl. Dom. D. Joh. Sculteti relatione exhibuimus Andriam, illius descriptionem fufius tradiderunt alij Duumviri Noribergenses, quorum narrationem nunc subjungo, ita exc. Dn. D. Joh. Georg. Volkamerus.

Pueri, vidam Scrotum intra crura sub inguine convenientis formæ propendebat; exinde canalis quasi nullus sursum adharebat cuti, sub cute glans prominebat nullo tecta præputio, antrosum confimilis cum aliis figuræ, ventrem vero versus ubi adhaesit, diffusa, diduci potuit: extre-

munum digiti apicem longitudine sua vix æquabat, connata deinceps pone præputium glandem vulgarem & quercu referebat.

Alteræ relatio communicata à Dn. D. Georg. Abrahamo Mercino Juniore Medico Noribergensi explicat magis magisque Andriæ naturam, sic autem ille.

Quam multifariam ac mirabiliter in minimis, in maximis sæpe ludat natura rebus, præter Medicorum annuales quotidiana experientia passim ebunde docet: ludit quoque haud raro in nobilissimis etiam nobilissima ipsius humani corporis partibus, sed & vix unquam frequentius quam in generationi dicatis organis, adeo ut ejus arcanarum & occultarum virium ratio non semper subtilius querenda, sed effectus solummodo cum admiratione spectandus, fateundumque sit cum incomparabili Thoma Bartholino, De insolitis partus humani viis, cap. ult. multa in corporibus humanis quotidie fieri, quorum vim naturamque perspicere non possumus: Hujusmodi Natura lulum, dicam an errorem, notare licuit anni hujus 1671. mense Junii in genitalibus cujusdam vulgo, sed ut opinor, minus recte putati Hermaphroditi, quem puerum, si ita loqui licet, foemeliatum aliqui vocaverunt, xiii. circiter annos natum, in pago prope Bavarorum Monachium sito, infimæ sortis patre Joh. Lechna mercenario: Sacrum lavacrum nomen ei primum dedit Casparius quod mutarunt, qui de foemineo sexu aliquid cum participare primitus observavit, hincque non narrant Martel, quo & Martham & Martinum subintelligere voluerunt, quo etiam nunc audit nomine muliebri incedit habitu, licet ad masculinum quam foemininum longe manifestius inclinet sexum; an ut ex vesica continuo seaturientis urinae molestiam facilius eo ferret, aut promptius declinaret? an ut in curiosorum animis majus se videndi excitaret desiderium? an quod parum curans qua indutus sit veste, quæcunque suppetit polthabito delectu allumaret? Noribergam venit, non ob aliam quam ostentim stipem querendi causam, intercessionibus literis ab illo illius pagi præfecto instructus, qui pietate erga pauperum motus testimonium simul ejus inhumanitatis ac indigentiae impertivit; Mas est, maris enim generationi externa dicata exhibet organa omnia, Testes seroto inclusi ad naturalem alias eorum conditionem rite se habent, nisi quod minus quam par est propendeant, ac paulo latiores compressioresque sint, & pubis offitæ adhæreant: Penis præputio quidem, sed reducto, & glande, sed denudata, instructus in hoc insuper discrepat, quod longitudine vix digiti manus articulum superet, supra cujus regimem pubes quoque sparsum pullulare jam incipit. Mammarum quoque tantum abest ut sororientur, ut potius admodum graciles & puerorum mammae illis simillimæ conspiciantur, Foemineum autem nil prorsus habet, nisi quod Penis foramen, per quod & vesica urina consueta Natura lege profuit, per amplum sit, sublongum, vulvæ ad instar, labiis, quæ diduci possunt, & internis quibusdam carunculis conspicitur formatum, satis crassum admittens stylum, equo urina subinde stillat. adeo ut ne momentum quidem continere eam queat: Proluitque hinc subuculam, & ad fixam cutim ita irrigat ut sua acredine eam adurat, insipientis nares graviter offendente: Quam urina incontinens

ne incontinentiam ex sola foraminis amplitudine, hincque rite ac strictè se constringentis inepitudine deducerem.

De Hermaphrodita singulari.

Historiam (referam) de hermaphrodita, qualem nec Bauhinus, nec alii, qui hujusmodi meminerunt, admirabiliorem scripserunt; quamque egomet vidi Hagæ-Comitum, & examinavi: Est paupercula, quæ pro nummis lucrandis sese Medicis & Nobilibus quibuscumque denudat, quare nuper in Hollandia fuit, jam, uti audio, ad Gallos ivit. Historia ipsa Regiæ Societati communicata est, ex qua sequentia transfero. Nomen illi est Hannali Widge, nata mense Februarii A. D. 647, in pago Agri Hamptonienſis Ringrood dicto. Sexto ætatis anno inter saltandum cum pueris coætaneis, extuberantiæ duæ, pro herniis bubonocelis habitæ, primum emicuerunt, quibus in orationem redigendis, Chirurgi diu operam luserunt: Testiculi enim erant, qui jam prægrandes facti, scrotis duobus cutaneis, parum corrugatis, sed vix prominulis, pilisque obsitis videntur, ex quibus divisis & elongatis conflunguntur vulvæ labia: Adest sinus muliebris, in quo nymphæ, & caruncula una vel altera myrtiformium loco: Est & membranula, a perione sursum tendens, mediam rimæ partem tegens, unde non video, quomodo peni virili introitus esse queat. Clitoris non habetur, sed loco ejus penis imperforatus, nisi forsitan is Clitoris dici debeat: Usque ad decimum tertium ætatis annum pro scemella habitæ est, cum fortè panem subigendo strenuam navaret operam, derepente priapus hic, ad id temporis latens, magno cum impetu foris erupit, accedente non levi corporis metamorphosi. Penis hic aliquando erigitur, tum quatuor pollices pene æquat; præputio & frenulo, ut in viris sit, instruitur, sed ubi perforatio fieri debet, adest tenuis membranula foramen obducens, ut nihil inde excerni queat. Uteri vagina, quantum videre contigit, in cæteris à communi sequioris sexus lege non recedit; in quam non pauci digitos intruserunt; quare hymenem, si adiuisset unquam, corruperunt; sed nec hoc efficere potuerunt, sine flexura articulorum propter membranam mediam rimam obvelantem; ob quam etiam non satis explorari potest sive oculis, sive digitis, quomodo se habet uterus ipse, aut cervix ejus: hæc tamen ad esse valde verisimile. Cum annorum esset sedecim, menstrua periodico & modo debito fluere cœperunt, & jam nunc fluunt, ut ipsa refert. Barba satis densa erupit, in quo totum corpus est pilosum: Vox corporisque habitus viros æmuletur. Mammarum nullæ exurgunt, papillæ perquam exiguæ, pectus valde latum. Dicit se ad utrumque sexum comparatam esse, cum feminas concupiscit, penis erigitur, cum viros, flaccidus ininet. Oculos aliquando conjiciens in virum formæ venustioris, illum deperibat adeo, ut insequenti die, præ amoris æstro, in passionem hystericam inciderit, quæm comprobant: elevatio abdominis, crepitus, risus, fletus, uti & juvenia: convaluit enim ex en plastro de Galbano regioni umbilicali applicato, & aliis remediis hystericis exhibitis. Tandem utrum vir vel femina sit, nescio; Testiculos adesse mobiles, satis largos, extuberantes, scrotis

contentos, uti supra, his oculis vidi: priapus, qui erigi & flaccescere capax est, adhuc clarius videtur: quare vir dicatur. Ad sunt rimæ, uteri vagina, nymphæ, foramen intra pudendum pro urinae exitu, quare ad alterum sexum relegetur, vel ad utrumque vel neutrum.

De Hermaphrodito.

Ludere in humanis rebus Divinam potentiam, ac inter creaturas non raro monstruosa, & contra solitas naturæ vias accidere, singulis, qui æqua rationis lance Physicæ ventilant, non est incognitum. Similibus extraordinariis contingentibus non immerito adnumerantur homines illi, hermaphroditorum nomine quos insignimus, dum scilicet & virile & muliebre genitalia, bonam tamen partem ut plurimum imperfecta, à natura ludente vel errante talibus simul impertiuntur.

Cum horum historiarum in observationibus Medicorum non sint adeo passim obvix, junioribus autem Medicis, aliisque interest noscere circumstantias hujus erroris naturalis, ob divortium sæpe ideo quaesitum & alia diversa, lubet hæc aliquam proponere; præmissis cum nonnulla ab aliis similibus diversa contineat, atque rariora: Civis quidam in vicino aliquo oppido honeste vivens, simili, id est honesto proposito matrimonium ingressurus, eligit sibi virginem, parentum honestorum filiam, tamæ itidem non inhonestæ. Dum conjugii debitum sponsæ suæ perolvere aggreditur, dapes hæc veneras neutiquam experitur ita dulces, veluti quidem eandem sibi promiserat; (prima autem vice, dum vixerat, coitum tunc exercebat.) Rem enim suam in novellæ uxoris rem immittitur, (ignoscant mihi casti oculi, castæ aures; Ego met cæcus Medicus hæc castis scribo; si quis Genius protervus scandalum inde accipiat, sibi ipsi habeat,) invenit portam hanc nimis angustam, & vix duos digitos transversos amplam; Et quod majus adhuc fortunæ adversæ obtrigat tragicum symptoma, mentula conatu violentiore intrusa sentit aliquid interius contra audentius ire audens, atque ita huic introitum summe dubium reddens.

Misellus iste cæci Cupidinis miles duellum hocce amatorium, præter opinionem ingratum, satis ægré ferens, ex amicis calculum sciscitat aphrodisiorum castrorum exercitia, consuetasque circumstantias, atque ita desiderata castelli hujus mirabilis atque miserabilis expugnatione desperat, propterea rem gestæ in Magistratui Ecclesiastico denuntiatis, divortium petit, & quod petit, obtinet.

Ocularis enim inspectio, Magistratus jussu à perito Chirurgo instituta, docuit, hominis hujus pudendum muliebre duos saltem digitos transversos esse amplum, atque intra hoc superiore in parte membrum apparere virile, primo intuitu duas ad tres digiti articulationes longum, inter leves autem contactus in æqualem magnitudinem adhuc ex crescere, durius insinui redditum: Contrectatione ad curatorem eundem edocente, sub carne adhuc latitare ejus portionem digitum longam: Penem istum glans esse præditum non perforata, ac sine præputio: Labisque pudendi muliebris diductis solitas

non apparere nymphas; Collo item uteri anteriore existente quasi cartilagineo duro.

Ceterum sanguinea illa erat complexionis, ac satis vegeta; corpus obtinebat forte, vocem virilem, manus carens barba rudimentis & visum & tactum eludentibus, & quamvis tunc 26. ætatis lux annum abtolverat, menstruum tamen fluxum nunquam fuit experta. Modo dictis tamen non obstantibus, illa ipsa sese credebat feminam, pluribus jam annis masculorum inhians amoris ac contubernio; in eo è congressu maritum acrimonialiter desiderans & sentiens, modo monstruosa conformatio, & confusa partium genitalium structura hæc ipsi non invidisset. *D. Gabriel. Clauderi.*

Hermaphroditus.

In hermaphroditis Clitoris est quæ crescens virgam virilem effragit, ut ex eo patet quod nulla manifeste conspicua perforatio in ea observetur, quamvis testis ei toris inferius à lateribus additus. Talem meum me prope Andegavum vidisse, ætatis 28. annorum, qui circum os, instar viri, totus barbatus erat, & tamen muliebri vestitu utebatur, suaque genitalia pro vili pretio conspicienda exhibebat. Huic superiore pudendi parte clitoris excreverat ad medii digiti longitudinem & mentula crassitiem, cum glande, frenulo, & præputio, ut in viris esse solet, excepto quod nuda glandis non esset manifeste peritæ. Inferius meatus urinaris & vagina uterina stabant, ut in muliebribus; In singulis pudendi labiis unus testis continebatur. *D. Dr. Diemerbroeck.*

HERNIA.

Non est quod humores tantum in causa esse imperiti credant ubi tumidam cutem conspiciunt; cum circa umbilicum atque inguina hæc naud raro contingat, idque quod vel omentum, vel intestina, vel utrumque simul illuc decidant: Dicitur autem Latinis morbus hic Rumpitur, Ruptura, Hernia a Græco *ἑρνη* quod rumpit, vel a Sabinorum voce Hernia quæ idem quod laxum est. Græcis *κῆλη, ἄνι ἑρνη* noceo; Quorum differentias demonstraturi, ab ea quidem initium sumimus, quæ & incompleta, inguinalis, *Ἀνευρηκτική* dicitur, cum intestinum, vel omentum, repto vel dilatato tantum Peritonæo, in alterutro inguine subsistant.

Initio ne quid sicco a nobis pede prætereatur, partium intimi ventris structuram & usum, Peritonæum, vasa semen præparantia, Testes cum tunicis & seroto, quæ omnia hernias considerantibus explicanda præcipue veniunt, paucis repetemus ex Anatomicis. Peritonæum membrana visceribus circum tensa, firmo eadem nexu continet, operit. Pervium subinde conspicitur, ut vasa transmittat, circa uterum imprimis ligamenta rotunda, verniformia. In Viris Processus, spermaticis vasis exitum præbentes. In utrisque Vetho teste. Venam cavam, ventriculum cum nervis, aortam cum aliquot sextæ conjugationis nervis, vasa ad umbilicum, podicem, & in feminis ad uterum excurrentia, quæque ad musculos majores tendunt. Cohæret ve-

ro multis in locis musculis. Vertebra, septo transverso. Spermaticis vasis præparantes adnumerantur vena, arteria, (quarum aliquando defectum vel absentiam observavit Sebizius, Bartholinus, Kerckringius, & nuper admodum Alardus Hermannus Cummentus, Lunzburgerium Dacis Medicus, Carolus item Raygeus, Physicus Polonienis, & Joan. Rhodius, cui Epididymides, quoque desiderata viæ in Mantua Anatomica) ex aorta à dextris, ex cœli gente ab altera parte, originem petentes: quamvis ab utroque nonnunquam latere arterias spermaticas ab arteria magnæ truncus exortas, Antonius Molinettus. Venetus, Medicinæ Theoreticæ & Anatomix in Lyceo Patavino Professor Primarius insignis atque Celeberrimus observaverit; quæ corpora efformantes pyramidalia, vel pampiniformia dicta glandulosa inferuntur Epididymidum substantiæ, ut sensus contra testimonium Epididymides testium crediderit tunicas Geierus. Jam testes adfunt Epididymidibus conjuncti ac semini concipiendi destinati, sero nequaquam attrahendo, quæ eorum est temeritas, qui indoctam publicæ sententiam in theatris proferat, inter partium generationi intervenientium demonstrationes apli sunt, vel argumento inconsiderate stabilire: Si testes non junguntur Epididymidibus, semen neque per testes transmittetur ad Parastatas variciformes. Hoc vero imprudentiam sapit, fortè ignorantiam. At si nostra illis tanti non videatur animadversio, Auctores habeant dissectionis peritæ toto orbe Clarissimos. Veslingius.

--- Cujus solet eloquio florere Lyceum, Incumbunt inquit Epididymides lubicæ sibi testibus, quorum propriæ membranæ quam plurimis fibris meatibusque conjunguntur. Deprehenditur hic nexus circa utrumque testium extremum. Spigelius, Serum, ait, reperitur in testibus, sed alii usui dicatum, quia, juxta Galenum, serosa arteriarum substantia genitalis est, & ex sero à sanguine separato semen conficitur. Quid elegantius dici, quid clarius poterit? quid & hoc Glissonii paragrapho? Tunica testium nervorum ipsos adeuntium dilatatio quædam est & expansio, à qua nervuli undique emittuntur versus testiculi medium, ubi concurrentes vas nervosum oblongum constituunt, quod in epididymidis canalem manifestè exoneratur. Fernelius quoque habemus *de vasis*. In Animante, dicit, quæ à venere diutius abstinebat, dissecta, copiosissimum crassissimumque semen comperitur, quo & vasa, & testes, & epididymus turgent. Pergunt autem: si ex testibus testiculis semen generatur secundum, testes nil conferunt. Epididymides eo interdum fungi munere non refragabor, immo semen in illis contineri *παύλα* non est, ut illud, meo quidem arbitrio; Eunuchi semen emittunt, rariæ absque utero, animalia exsecro liepe, commode degunt, & canes voraciores redduntur, Politissimis Italo, Anglo ad stipulantibus; Testes igitur, lien cultro removendi? Desperatum omnino consilium. At si ex filamentis constant, aloysii Trissini, Nobilis Vicentini, ingeniorum suo tempore phœnicis, ratio valet: Cur sanguis in vasis quibusdam albescit, similisque sit vasorum tunicis albis, in omnibus vero non item? an in quibus tantum diutius moratur, in illis albescit. vasisque

vasilque similis sit pars enim omnis alimentum libi utile facit, ut in valis seminis, quæ ob multiplices flexus sanguinem diu continent, in nullo autem alio vase accidit, quod in nullo alio ita diu moretur: quanquam & valis cuiusque humidum nativum, a quo ipsorum tunica nutriuntur, estejusmodi: Verum quomodo animalia quædam absque testibus generent, Severinus quoque habet. testes membranosa circumdantur cute, scroti nomine insignita. Hujus non simplex structura est, nisi præter *xxx.* albugineam etiam propriam, *duplex* est, & *diversa* sive *diversa*, quam unam eandemque contra Thomam Bartholinum, Accuratissimum Anatomicum, & alios, notamus.

Accidit igitur, ut vel ex ictu, Celsi sententia, retento quoque diutius spiritu, vel ob læsam in genere facultatem, vel errorem externum, secundum Galenum, (neque prohibitum sperma inter herniarum causas cum Avicenna admittimus. Doctissimo norante Salio) illa abdominis membrana dilatata, ruptave interiori (duplex enim existit,) omentum, ex tenui extensa membrana, in sacculos & ilurias propagata, intus contenta pinguedine, constat, Illustris Marcelli Malpighii, Professoris Bononiensis Primarii, observatione, vel intestina, cæcum imprimis aut ileon (præter rationem esse, ut velamen sive peritonæum descendat, Salio contra Avicennam disputat) circa inguina subsistant, & tumorem, *peritonæum* dictum, primam Herniarum speciem ab Aquapendente constitutam, efformant. Hic cum sæpe impingant imperiti, signa proponenda erunt, quibus accurate ab aliis discerni queat. Bubonocèle quidem ex eo cognoscitur, quod tumor æqualis sit, rotundus, compressus etiam facile cedat, vel penitus evanescat ubi Bubo, renio adsuit, renitentia, aliquando rubor, calor, nonnunquam febris: ut plagiarius merito censeretur debet barbitonfor, cum in tenuioris fortunæ homine Bubonocelen, venereum bubonem credens, sectionem, abnuente ægro, aggredieretur quæ perpetrata, protuberantibus fecibus in lipothymiam incidit pauperculus, sed brevi tamen temporis spatium a Petro Marchettis restitutus, ut habet in Observationum Chirurgicarum Sylloge. Hieronymus Senex Juvenis recenset Historiam, qui, cum circumforaneo testium suam exposisset elevationem difficili illum laborare hernia, & brevi, si opem respiceret, satis cessurum prædixit. Credulus homuncio, quo præsentissimum evaderet mortis periculum scilicet, sectionem, barbitonforis usu admisit. In eo jam erat carnifex, ut testem extraheret, ubi Pater attonitus cientes retinuit manus agyræ accersito Medico, qui nulla puerum detineri hernia asserbat. Ioannes Prætorius Professor Medicus Patavinus Cæcæbris, rusticum vidit, intestino tenui dissecto a Curione, qui se bubonocelen curaturum probebatur, ex inguine toto vitæ decursu alvi feces exsistentem. Affectus prioris similis aliam descriptionem Hildanus notavit, qualis etiam decumbentis rustici fuit in valetudinario D. Francisci Patavini, cui intestinum in inguen prolapsum una cum scroto computruerat, ex Elegantissimis Rhodii Observationibus. Testiculus quoque in inguine lægens herniæ fingit speciem, narrante ex Jacobo

Ætheo, Joan. Schenckio, & in Spicilegio. Theodoro Kerckringio. Brechtelæus tunc cum circa annum ætatis octavum & decimum primum erupit, in Hamnientiam Actis Medicis recensuit. Alia igitur via tentanda Curatio, & prolapsum quidem intestinum digitis, quod si turgeat stercore accepto, vel ære, balneo, totu, lenientibus; vel imposito, ubi indurata feces, cataplasmate quod recipitur radic. v.g. alth. & lilior. alb. an. $\mathfrak{z}\text{iv}$. folior. mercurial. malv. viol. an. $\mathfrak{m}\text{ij}$. sem. lin. fenugr. an. $\mathfrak{z}\text{ss}$. flor. chamom. melilot parietar. an. $\mathfrak{m}\text{ss}$. coct. contul. ac per setaceum tractus add. farin. sem. lin. $\mathfrak{z}\text{ij}$. ol. lilior. q. s. vel corporis etiam concussione aut lubagitatione, capite deorsum relexo, id unice agendum, ut situi restituantur in abdomine contenta viscera. Quippe Michelotum quendam, quod imperiti barbitonforis curæ, qui inguen, intestino ad partes superiores nondum restituto, devinxerat, se commiserit, e vita discedentem idem introducit ex Benivenio Schenckius.

His pro virili peractis, novus intestinorum descensus facile prohibetur, si & diæta, vitandis scilicet quæ natus, borborygmos, ac humiditates nimias procreant, & exacta quietis & *sedentis* habeatur ratio. Purgantibus imprimis blandioribus opus est, clystims, medicamentis adstringentibus, agglutinantibus, exsiccantibus, quæ hinc inde ab Auctoribus recensentur prolixius, Fernelius inguen decumbenti supine fovet decoctione, quæ constat Pistidæ, Balanteriorum, Nucum Cupressi, Gallarum an. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Aluminis $\mathfrak{z}\text{ij}$. cum aq. fabarum. Ambrosius Paræus, Primarius Francorum Regis Chirurgus, forum habet ex corticibus granator. cupress. nucib. gall. alun. caud. equin. sumachio, herberibus, aq. fabror. incoctis, immo, amici fide, magnetem in pollicem redactum commendat, & limacum rubrorum pulverem. Crato, Trium Augustissimorum Imperatorum Medicus, in bubonocèle derales pilis, tumorem terebinthina inungit, cum pulvere inispergit, qui habet Sang. drac. mast. thur. myrrh. an. $\mathfrak{z}\text{ij}$. sumach. balust. an. $\mathfrak{z}\text{ij}$. aloës, tormentum. coloph. hol. arm. an. $\mathfrak{z}\text{ss}$. xyloal. spic. an. $\mathfrak{z}\text{ss}$. Hieronymus propositis Avicennæ, Pauli, Celsi etiam medicamentis, & emplastro, quod ingrediuntur malicorii, boli armen. sang. drac. an. $\mathfrak{z}\text{ij}$. tegul. pulverat. $\mathfrak{z}\text{ij}$. pulver. bilinguæ $\mathfrak{z}\text{ss}$. cum ovi albumine, modico aceto & colopnoni. Ægotantem quadraginta dies in lecto continet, risu, venere. balneo prohibitis, ac bis de die sequentis electuarii dimidiam unciam præscribit. Accipe rhabarb. ass. consol. maj. nuc. mosch. nuc. cupress. cymum. tragacanth. gum. arab. mast. h. bol. arm. sang. drac. mum. pic. græc. an. p. æq. in alcohol contundantur, & cum melle despumato s. electuarium. Nonnulli pulverem leporis combusti addunt. Propinetur virum austerum, vel aqua chalybeata, aut fluvialis cui folia cupressi, myrtique incoxerint. Schroderus, in Phatnacopea, ad quamvis herniam excepta hydrocèle, emplastrum posuit, cujus sunt, gluten ex anguillarum exuvii paratum, lapis hamatilis, saccharum Saturni stann. ultig. ammoniac. in aceto rad. solut. & cum yrrh. ol. $\mathfrak{z}\text{ij}$. nulli reperitur in gedanensium dispensatorio. Mihael Johannes Paschalius: mihi crede inquit, quod si juvenis triginta resupinus dies quiescat, & de die $\mathfrak{z}\text{ij}$. pulveris consolide majoris vel minoris

minoris cum jure pedum arietis, vel vino ad-
stingente, mane accipiat, recens curabitur
hernia. Nec virtute, si Medico fides, inferior
v. lernanæ radix, succus scabiosæ, pentaphyl-
lonis radice pulvis. Decoctum contra Herniam,
Unguentum Herniosum, Emplastrum contra
Herniam, Myulichus describit in Armamenta-
rio, Christoph. Roeslerus, Principis Lignicensis
Medicus, filio, cui intestinum dimidii digiti
longitudine a scroto prominebat, postquam di-
gitis intro adegit, sequentem pulverem præ-
scribit: Acc. fol. Conf. Sarac. Sem. & fol. Per-
fol. an. ʒij. fol. Pilosell. rad. conf. maj. an.
ʒb. Sacca. pen. ʒ. v. l. Pulv. quo indies usus in
jussulo, & horas aliquot quievit. Insuper ingui-
na inunxit oleo Momord. & Emplastrum con-
trarupturam cum subligaculo adhibuit, quibus
felicitè restitutus, mortem evasit. Joannes
Fridericus Allmacherus, Chirurgus Franco-
furtensis, desperatam Enterocelen in pago,
præter alia hac potione restituit: Acc. Herb.
Equil. Mj. rad. Liquir. Sem. anis. Caran. ʒss.
Ebull. in aqua. Joannes Baptista Siconius ad
qualemunque Herniam Emplastrum habet,
quod accipit: Rad. Consol. utriusque an. ʒij.
Laventur optime, siccantur, pistentur, & in pul-
verem sedigantur, deinde per horas duas in vase
ferreo bulliant, igne lento, & addendo Te-
rebinth. ʒvj. optime misceantur, postea Masti-
ch. ʒij. Inur. ʒij. pulver. & per se fac. traj. sem-
per agitando, donec bene misceantur, jam
adje. Gummi. Elem. in pollinem redact. & Ta-
camahac. ʒii. remov. ab. igne, & usui serv.
ut distendi urgente necessitate super corium
possit. Nicolaus de Blegny hoc habet: Acc. Oli-
ban. Thur. Masc. Gummi. Ammon. Opopan. an.
ʒii. dissol. in acet. destil. cum acc. piper. alb. sem.
linap. fol. bux. an. ʒj. Ebull. omnia in aqua
Fabr. cotylis tribus ad ʒ. part. reman. Cole-
tur Decoctum, & servens adhuc aff. Gummi.
dissol. mixta lento igni impon. & diger. per duas
horas, deum aucto igne adde ol. Lumbr. ʒii.
& bull. quousque humiditas consumpta fuerit,
jam, add. Pic. Nav. lbj. & serv Bernardus Ver-
rascha, Medicus & Scholarcha Basileensis, post
Emplastri contra rupturam applicationem, vul-
nerariam Potionem mane & vespert propinan-
dam præscripsit: Acc. Rad. Torment. Conf. maj.
Bistort. an. ʒss. Herb. Sanic. Pyrol. Alchim. agri-
mon. an. Mj. Fl. ros. rubr. pap. rh. Granat. an.
p. ii. Sem. anis. ʒij, incisa & contusa dentur ad
sacculum, cui dux mensuræ vini albi & una aq.
font. affund.

At his non obstantibus, ubi neque medica-
menti Tumor cedit, neque imminuitur papyro;
in aqua quadam adstringendi vi prædita ma-
cerata, atque imposita ex Aetii & Paræi con-
siliis, paratove Aquapendentis Emplastro, quod
recipit: Terebinth. ʒss. Ceræ, Thur. s. Myrrhæ,
Ichthyocollæ, Carnis cochlear. an. ʒj. Quod si,
inquam, adhuc conspiciatur, manu curari debet
ex Celsi Sententia, atque effato Hippocratis
ὅταν φάρμακον ἐν τῇ τῆν, αἰδὲ θ' ἰστέν, ὅτε αἰδὲ θ' αἰ-
δῆται, πῶς αἰδὲ θ' αἰδὲται, ὅτε αἰδὲ θ' αἰδῆται.
Quæcunque non sanant medicamenta, ea
ferrum sanat, quæ ferrum non sanat, ea ignis
sanat; quæ ignis non sanat, ea incurabilia judi-
care oportet. Quidam locum inurunt cum Ara-
bis. Cum Guidone contra alii adductis Peri-

tonzi portionibus Vasis Spermaticis, & crema-
stere musculo ad Ischium usque; reliquæ Apophy-
seos parti Pyrotica imponunt, ut contractio
callo, omentum a prolapsu vel intestina cohibe-
antur; sed cum periculo non careant evidentissi-
mæ Curationes, ideo haud facile a Chirurgo
in Usum introducendæ, Paræo, Chirurgo in arte
Exercitatissimo consentiente ac adjuvante,
Incisionibus Curationem absolvent Celsus cum
reliquis, quarum methodum non attinet ex Au-
toribus excerptam adjicere, cum nuper admo-
dum prolixior & accuratior eandem Histo-
ria Lucetæ, gallico Idiomate, Auct. Theveninæ,
Chirurgo Parisiense Claris. prodierit. Verum non
possum, quin Exercitat. Aquap. consilium quod
nobis & prudentiorib. omnibus, vel maxime ar-
ridet, hic annectam: Quod si dilatatio, inquit, aut
ruptura ingens sit, eo casu sit Chirurgia cum ex-
tractione testiculi, quæ ita periculosa ut quini-
vis plures evadant, plures tamen aut lub ea, aut
paulo post moriantur: propter quam causam ego
tui semper hujus opinionis, ut nullo modo ægro-
tantes hujusmodi periculum lubeant, cum præ-
sertim tota vita bracherium gestare possint, id-
que eo lubentius consulo, quod hæc dieb. Ho-
ratus de Noscia, cum ea de re loqueretur non ai-
xerit, se ante aliquot annos plus quam ducentos
singulis aneis incidisse, nunc neque viginti, &
causam retulerit, quia bracherio & adstringente
medicamento imposito, plerique sanantur. Fa-
teor, leve quoddam esse supplicii genus fasciis
uti, & bracherium gestare in tumulum usque, &
novi aliquos, qui nescio quid præoptarent, cum
& quam maxime corporis debeant evitare exer-
citia, Mercuriali præunte: Quos Hernia labor
solicitat, omnem averfari debent exercitatio-
nem, quæ majorem, quam ipsa ambulatorio, defa-
tigationem parit. Deinde, præter doloris sen-
sum, quem in utroque latere impertiunt muscu-
los comprimendo & curim, pudoris quandam
prætere speciem *ἐν τῇ ἀποφύσει*, omenti gesta-
tores, plerumque solent. At cum incerta peni-
tus sit atque ambigua Curationis spes, Dodo-
næi accedente prognostico: Non omnes qui a
ramice curantur, in vita servantur, plerique enim
eorum moriuntur, cruciatus omitam & maxi-
mos dolores: non nisi serio instituta delibera-
tione arripiendam esse censeo. Non me movent
blandiora Aquapendentis verba; nec Hildani,
celeberrimi Chirurghi, exoptatissimi latent even-
tus. Hic quidem Rupturæ quiete & decubitu
in Senæ Sexagenario curatæ exemplum habet in
Observationibus Chirurgicis: Ille periculoso-
rem credit operationem & Empiricis vitatam,
quæ cum testiculi exsectione periclitatur; alteram,
cum testis relinquatur, Chirurgis summo de um-
bentium emolumento & sibi summo opere proba-
ri ailerit. Sed, Hieronymi venia, hanc cœu inuti-
lem proseribo illam cum periculo vitæ conjun-
ctam profiteor, ægri vero cum levamine instituit
quod ejusdem plane opinionis *Ἀρχαῖος* Celeber-
rimum & Experientissimū deprehenderim, q. i.
post institutam, Hieronymi quoque præcepto
ac jussu, hebdomadarum aliquot Curationem,
adhibitis etiam, quæ conducere præsertim & e-
re videbantur, Emplastris, Ceratis, Pharmacis
adstringentibus, tum post celebratam sectionem
Seni adeo commendatam nihil quidquam profe-
cit; cum recidivam plerumque decumbentes

senferint; ab illa verò, quæ tellem eximit, curatione multis revixisse, frequenter annotavit. Mercurialis, ut est Auctor Elegans & Doctissimus, reprehensionem incurrit severa nimis approbatione. Verba attexam ut examinentur: Advertendum, inquit, licet facilis sit Curatio, præsertim in puero, tamen non ita est relinquendum inveteratum malum, nec etiam facile permittendum erit, quod facere amant isti Chirurghi, ut testes auferantur: ut castrati homines sapientissimi pone dimidium intellectus habeant. Jure Magnus ille Avenzoar scripsit, nullum fuisse unquam virum castratum qui esset optimi intellectus & bonorum morum, unde Vos considerate, quæ ratione homines cæcos & stupidos appelleretis testiculos. Næ Eunuchos, Castratos, Spadones iratos sibi habeat Arabs, ob connexam fabulam, vel sacra Philosophorum Decreta, propter translatam in testiculos animam. Incomparabili Cartesio, quod in pineali glandula animam quæsierit, vitio veretur, quæ tamen verisimilior longè, quàm vetus illa de Testibus sententia. Historias taceo, quibus ea, quæ diximus comprobantur, Homines altero scilicet orbatos teste, virorum strenue obisse officia, si locus requireret, nullo negotio possent. Sed & alium eadem de albare fidelia pariter oportet. Nox de *compensatio* Dissertationis Auctor ad Indos, qui castrant, *apud* temere relegat, nullis instructus argumentis, aut aliena, vel sua suffultus fide. Miror Hominis audaciam, qui *compensatio* vulgarem sectionem, iteratis vicibus revocatam, vidit Pariliis, quod miser Perizonatum usum neglexisset. Sapient tandem cum Phrygibus nascutuli, & exemplis discant, communem operationis methodum in junioribus, si unquam, locum obtinere, quod vicinæ partes facilius coalescant; ac in provectioris ætatis Viris, quibus mederi chirurgus aut barbitonsor studet, testiculum eximat. Neque Paræi quidquam obiectio inferat à barbitonsoribus desumpta inscitia: Castratores dum timeant ne Curatione absoluta superstes sit relaxatio, violento tractu Peritonæi processum à partibus divellunt, unde dolor, Convulsio. At Chirurgorum imperitia operationi nil detrahit. Quod si neque illucidium, inquit Crato, ex aquis Montis Orthonis, in quibus res adstringentes bullierint, contulerit, consulimus, ut ad extrahendum testiculum deveniatur, adeo enim dextræ à nostris Ministris hoc munus obitur, ut omnes incolumes evadant. Fredericus Hoffmannus Emplastrum magneticum conficit, quod lumbis impositum intestina sursum trahit, & iliaca licet passio adsit (verba sic habent,) tormina juxta sopiendo Ventris atrocissima, intorta, dislocata (ossa rectius dislocata pronunciamus) & incarcerata in seroto intestina quàm primum incaluerint, ad pristinam abdominis transfert sedem, ipsis etiam ærotis non quidem sine molestia vim eius attractivam animadvertentibus: si habenda Auctori fides, qui in Clavi Pharmaceutica paginas nobis vitiis plenissimas obtrudit dictatorie, ut depictæ graphicè in frontispicio Tabulæ correspondeat volumen scilicet. Chartasius. Clarissimus in Gallis serenissimi Regis Pharmacopœus, inscitæ & Gallicæ levitatis memoriam Excessentissimo, si Dux placet, Germano rescribit. Processus

facta nobis est copia, cujus tamen inventorem non ita multum a veterum recessisse formulis experimur. Agricola, Hartmannus, ejusdem nature malagma ad malignos humores alliciendos, præputio velicante, commendant.

Credula multorum superstitio latius serpit, ut, posthabitis Prudentum Consiliis aniles fabulas, Magos, Præstigiatores, imprudentissimum vulgi genus, consulant. Voleo vicem plebeonum: quis enim sana mente præditus recta ratione orbatis credat mulierculis? ita me hercle est. Magos ut plurimum non venenicos, non fascinatores, sed insanos, vel superstitiosos credimus. Demonstratione quid facilius? Patet familias rudis, nullis instructus Scientiis, credulus, vinoque sepultus, in omnes se transisse noctes inter spectra, larvas, immo flumina maria transjecisse, & quot nescio consecasse miliaria momento citius, lustratis pagis, Urbibus, Regionibus, Regnis, infelici intere natis domesticis, ac pro veris obtrudit Institoris. Misera gens, verbis gestive senis perterrita, ne dubitare quidem audet: cum subsequenti mox nocte in eadem se versari navi existimet. Hac prorsus ratione incantatricum crescit numerus vel insipientium, & sola aliquando carminis violentia homines interemit apud Poetas. Quod si cum melancholicis impotenter aut maniacis ad Anticyras ablegarent fascinantes, ubi & de populi gentium conspiceretur præstigiatrix? Nemo tamen me adeo securum credat vel impium, ac si nihil posse præter vel supra naturam fieri, assererem: cum potius Deum O. M. posse, quæ & *divina* humano apparent capui, ex S. Codice & D. Augustino didicerim: plerisque tamen ex Veneticis pro deliris habeo. Nec mea hæc est & nova sententia, sed Scripturæ S. & Philosophorum suffulta testimoniis. Quidni Regnum satanæ destructum? Mundi Princeps in abyssum dejectus, & postquam Christus apparuit, nullam in nos habet Auctoritatem Cæli angelus? Coram Deo non inferis expavescimus. Bernierius, Doctor Medicus Monspelienfis, in contracta Cassendi Ceseberrimi Philosophia idem sentit. Joannes Schefferus, Vir Eruditus, ac Regius Upsaliæ Professor, specioso fortè Religionis prætextu, contrarium adstruit: Non pauci, ait, qui, ut sapere cordatius quam vulgo alii videntur, Magica omnia pro veris habent somniis, & anicularum credularum nugis ac commentis. Cur negant tandem! an, quod Diabolus non possit talia efficere, an quod nolit immo vult, regerimus, dummodo possit. Ad Permissionem enim Divinam, in his talibus, statim aut promiscue confugere, res est non simplicitatis tantum pudenda, sed & insignis impietatis, certè superstitionis. Quid igitur de Curationibus magica ope factis? Ad Hernias quercum perforant ut *in* puer aliquoties excavatam subest arborem: Sunt qui de viridium ovum Gallinaceum e nido adhuc calidum sorbent, & testam herniosi urina repletam in caminis suspendent. In Pleuritide, dolore lateris, cultrum lanionis, qui cruore madet, vino imponunt aut potui, ut propinetur: Seri collectionibus sive Catharris, Indulis medentur: Singulis, inverso cultro: & quid attinet de mentium somnia exponere: Theologum ferunt quærenti,

quærenti circumforaneo, & solida sua facinorâ iactanti, annon adstantium plerique vellent decipi, appl. utum dedisse. Idem nos facimus. Vulgus, quo est peruerso animo, nullis subinde patet legibus; dissolutis moribus, quousque à scelestissimo seducatur, obtemperat. At quo feror! qui iudicio polleat, ea non abripi se sinunt recordat, ut magicis ac ineptis signaturis vini quandam iustitiam aut virtutem opinentur.

In *herm.* si quid decidat, (hinc *herm.*) vaginalitunica exitum præbente cuius studio superedemus recensere causas, quod e Practicorum peti queant voluminibus, & levissima sæpe numero occasione eveniant. Naturæ illius calculo, cui, peritonæi processu ob factum naufragium atque æris accepta incommoda in inguine relaxato, intestina in scrotum devoluta, perhibente Nicolao Tulpio, Amplissimo Amstelodamentium Consule, fungorum elu ex Hildano) duplex oritur Rupturæ species, intestinalis quidem *intest.* & ubi omentum descendit, in mulieribus præcipue, *intest.* dicta. Omentum siquidem ita Vesalius vidit in testis tunica auctum, ut quatuor aut quinque librarum pondus excederet, ventriculumque deorsum ita traheret, ut deficiente munere, multisque obortis singultibus, id pondus mortis causa fuerit. Intestini prolapsi signa Celsus habent & Mercurialis: Tumores facti ab omentis & intestinis ubi tanguntur, diversitatem quandam elationis & demissionis nec non levitatis habere videntur. Amplius, qui sit ex omento, prorsus est sine dolore, & sine multa rotunditate: iterum Tumores facti ab intestinis & omento, dum ægri balneo se lavant, vel fricantur, vel rebus emollientibus tractantur, vel corpora motu vehementi movent, incrementum insigni suscipiunt. Accedit postremo, quod qui sit Tumor ab omento prorsus digito absconditur, & cedit facile sine rugitu. Tactus vero ab intestinis, redit cum rugitu, cum intestina vel plena sint flatu vel fecibus. Hac quam gravia sequantur symptomata, Hildanus duobus demonstrat exemplis, & Meckeranus, quod Tumor ad genua usque prolapsus fuerit. Verum ut contineri aliquo modo possint sacculum idem præscribit Hildanus ex ros. rubr. absynth. fol. prunor. sylvestr. cand. equin. fol. salv. musc. querc. Cort. querc. sem. scænic. anis. vino rubro incoctis. Quoad Curatricem, eadem utriusque quæ inguinalis ratio est, & si *herm.* morbi initio instituat, felicem nobis spondere eventum licet: cum hac imprimis ratione Parisiis quosdam in valetudinario à certissimo mortis periculo liberatos viderim. Senem Hernia laborantem, cui intestina ad scrotum delapsa gravissima excitaverant symptomata emollientibus & relaxantibus intra paucas horas restitutum, ex Holtzachio Schenkio habet in Observationibus. Enterocelen in quadragenario abique sectione subligaculi solius ope evanuisse, Parzum, Meckeranum fidissimos habemus testes. Quid de Hollerii herba proferamus aut polygono minori, novem diebus rupturas consolidante, si Hollerio credimus, Gallopio, Matthiolo, Pisoni? quid de aqua ejusdem stillatitia, cujus haultu puer sanatus, & emplastro, quod accipit: Emplastro, con-

tra rupturam, & de gratia Dei an. 3j. Sanguin. dracon. osmund. regal. olib. an. 3ij. cum ol. myrtill. f. massa apud Vallesium? si hætiolari fas est, ac divinationi locus, temerarios aut plebeculam gentem Medicis sæpe imponere, suspicor. Quis enim rei peritus aquam credat destillatam simplicem, vel succum herbæ expressum, cum vino albo propinatum, uno eodemque impetu versus Peritonæum ferri, ut ramici medeatur, ubi Ceroti Virtus exultat? Morbus ille nullis mehercle in adultioribus cedit Medicamentis, nullis Medicorum formulis, omnia respuit, præter manuum operam. Ubi facta est per fracturam Hernia, Mercurialis dicit in pueris quidem, ob corporis teneritudinem, posse per medicamenta curari; sed, ubi est in corporibus adultioribus, nequaquam nisi manuum opera. Nam, ut habet Hippocrates, Peritonæum discissum in durioribus corporibus non coalescit. Timæus puero Enterocelen ex rupto in dextera parte, Peritonæo, laboranti sequens Electuarium & Emplastrum præscribit, post decoctum Herniaræ ex vino rubello cum syrupo de symphyto dulcoratum. Rec. Rad. consol. maj. 3ß. fol. herniar. perfoliat. fanicul. millefol. an. 3ij. in pollinem redacta cum syr. de symphyto q. s. f. Electuarium. Rec. Pic. Naval. 3ß. Aloes 3ij. lythugyr. colophon. galban. ammon. an. 3iij. visc. quern. liquid. 3vi. Aristol. rot. myrrh. thur. mastic. bol. armen. an. 3iij. Conf. major. 3vj. lumbricor. terrestr. gallar. an. 3iij. sarcocoll. 3j. Terrebith. & Ceræ q. s. f. Emplastrum. Joannes Uldaricus Rumlerus, Medicus Augustanus, in Observationibus, unguentum habet Medici cujusdam Viennensis quod in magno ipsi secreto fuit, eoque infantes plurimos, nullum autem adultiorem, restitutos, affirmavit: Acc. Conf. Maj. 3iß. Consol. Saracen. Agrimon. Caryophyll. scænic. ped. Peon. Millefol. prim. ver. p. ant. an. m. iß. mastic. thur. cupul. gland. nuc. cupress. gallar. an. 3vi. rad. tormentill. serpent. an. 3j. butyr. majal. q. s. f. s. a. ungu. cui admi. vin. sublimat. ut fiat illuxile, instar liniment. Hieronymus Reusnerus, Medicus Nordlingensis hanc Curam proponit. Acc. Beton. Auric. mur. veron. alchinn. pyrol. conf. Saracen. agrim. fanic. an. m. ß. rad. caryophyll. 3ß. incul. & confus. coq. in mij. aq. ad consumpt. med. bibat manè & vespere haultum. Postea acc. Lap. magnet. mastic. an. 3ij. lap. calam. sangu. drac. an. 3j. ferri 3ß. boli arm. 3ß. vin. sublin. quart. mens. in hoc pannus duplicatus intinctus herniæ fortiter adligabatur bis quotidie, mane & vespere cum subligaculo, ac brevi convaluit. Monachum Deggingensem in utroque latere ex casu hernia intestinali laborantem, præter alia Syrupo quoque vulnerario feliciter sanatum in iisdem habet observationibus. Ad Syrupum autem conficiendum acc. rad. Caryophyll. 3j. Dictamn. alb. conf. maj. an. 3ß. H. Leontopodii Sanic. pyrol. auric. niut. Solidag. Sarac. consol. med. vine pervinc. perfoliat. numular. agrim. an. m. ß. thapson. opt. acor. commun. an. 3iij. ros. rubr. p. v. f. f. f. rubr. 3iij. ß. calam. arom. 3j. mac. mosch. an. 3ij. aq. font. f. b. iij. stent. 21. hor. in loco calido itaq. bene obturato, & primum lento igne, post hæc hementiore ferveant ad conf. med. ubi extraxerint, col. & cum sacch. albiss. 3vi. coq. ad consist.

consist. Syrup. Scultetus hoc sibi habet inter allumenda expertissimum: Accipe conserv. symph. ʒij. ros. antiq. ʒj. cort. citr. cond. arant. cond. an. ʒʒ. pulv. herb. persol. herniar. ling. serpent. rad. consol. maj. an. ʒʒ. semin. plantag. Div. cichor. foenicul. an. ʒj. corall. rubr. præp. ʒi ʒ. narg. præp. ʒʒ. lap. chrysol. præp. ʒj. Syrup. myrtin. vel corall. q. s. M. F. electuarium, quatuor ante prandium & tribus ante cenam horis nucis juglandis quantitate deglutendum, cui vini rubri austeri, suspensis nodulo, haultum superbibat. Acc. herb. fragar. consol. med. vinc. pervinc. equiset. ling. serpent. persol. an. in j. rad. sigill. salom. ʒʒ. consol. maj. ʒj. sem. plantag. ʒʒ. cichor. ʒij. foenic. ʒij. cummin. ʒj. incis. & contul. misc. ad sacculum in trib. vin. rubr. vel alb. nient. suspend. Marcellus Cumanus medulla Citri herniæ intestinalis Curationem molitur: Acc. Medullam Citri subtiliter incisam, bulliat in axungia porci recenti, post coletur per petiam, & iterum ponatur ad ignem, in hac misceatur malthix, olibanum, cera alba, eritque optimum unguentum Citrinum.

Vitum recorder Parisiæ eruditum, operam 6. Literis strenue navantem, qui, ut superbissimas quasdam Aulæ Solemnitates intrueretur, equum conscendit, nullis credo instructus subligaculis, ac si corpusculi extenuati latis, & ruptura affecti, curam studio posthaberet. Postridie, si recorder, in serotum devoluta erant intestina, devolutum *επισπασσας*, cum rubore, inflammationis principio, ac gangræna metu, contentibus, quibus demandata erat Viri egregii cura. Aderant ex præcipuis & famæ inclytis, qui sectionem omnibus modis urgebant, e contra sinistram atque lugubrem pollicebantur eventum, ac certo certius prædicebant: aliis alta voce reclamantibus, feces intestinorum induratas caraplatmate vel foru posse emolliri, inflammationem facili negotio curari, neque extremis subito exponendum esse corpusculum remediis. His relinquebant ægrotantem prognosticis, hæc adstantium erat altercatio, immo, ut, quod res est, eloquar, quorundam in optimum Chirurgum invidia accersito siquidem, paucis interjectis diebus, novo Magistro, sectionem molebatur funestam, quæ maximam artifici conciliare debuisset ignominiam. Rem, ut accidit, expono ac exitum, quod cadaver postea diligentius ipse inspexerim. Rhasis quoque methodum in curatione rejicio, qui inguinis adurere locum, ubi intestina vel omentum descendunt, ad os usque pubis ferris candentibus, vel caustico medicamento, ex sapone nigro, calce viva & tartaro, vel sapone nigro, auripigmento, sulfure & calcantho, quod potentiale conmuniter rudiores vocant, consuevit: De puncti aurei administratione, cum facti super os incisione, speculum juxta Prientonæ i processum immittitur, prehensisque cum cremallere musculo vasis spermaticis, acus fila aliquot ducens per reliquum processum ducitur, vel relictis vasis spermaticis, virgula, aut filum aureum, vele plumbo, per processum adigitur, Paræum consulant, celebrem Auctorem. At vero accuratior nostris temporibus sectio inventa fuit à Chirurgis Parisiensibus, quorum fama & dexteritas multis superant reliquos parasangis, quam ne longior justo sim, ex Thevenino, Operationum Chirurgicarum Scrip-

tore, cuilibet repetere facile admodum erit. De gangræna ex herniæ intestinalis ortu curatione, gangræna itidem & subsequuta morte ex male curatis *επισπασσας*, Hildani evolvantur historiz.

Non intestina tantum & epiploon, vel utraque in serotum delapsa *επισπασσας* & *επισπασσας*, sed humores nonnunquam, aqua, flatus, caro, humoralem herniam, *επισπασσας* & *επισπασσας*, *επισπασσας* & *επισπασσας* consuevit. Haud raro enim evenire solet, ut viscerum quorundam vitio, non hic tenues solum colligantur liquores, sed per universum corpus *λεπτοφλυκτα* insignis conspiciatur. Sic sanguis in his vel biliosus magis, serosus aut melancholicus, affectus præternaturam varios & symptomata excitat, atque in tumores vel abscessus abit, vel lateralem morbum, ac pus in thorace, *επισπασσας* producit. Horum eventuum causa evincens: accedunt vero subinde, *επισπασσας*, percussio, vasorum disruptio & quæ non? Nec infrequens est limpidam typicas inter testiculos coeperientes reperire, quam & propriæ inclusam cuticulæ subinde vidimus in cadaveribus, & semel in Leydensium Nosocomio, annuente Illustrissimo Christianissimi Invicissimique Galliarum Imperatoris Consiliario & Medico, Præcos atque Anatomiz Professore Primario, C. rolo Delincurtio. Discrimen facile deprehenditur Humoralis Rhex cum calore, tensione, immo inflammatione oboritur: *επισπασσας* impositis digitis sonum edit, inæqualis est, lubrica, levis. *επισπασσας* calore, duritie, tumore dignoscitur: tumor enim manui resistit: secus in *επισπασσας*, gravis est, obscurus, Fernelio docente; *επισπασσας* opposito lumine distinguitur, & a *επισπασσας*, quia obscurior, nec ita levis, interdum *επισπασσας* obsidet, *επισπασσας* subinde inter & *επισπασσας* reperitur. Quamprimum curationi nos accingimus, evacuationes instituendæ humores ac serosam massam absorbentes, cui intentioni inserviunt purgantia, diuretica, diaphoretica, præmissis tamen ubique serè clystims & ad diu inunctionem ac derivationem, Celso judicante sanguinis detractio.

Digerentia seroto admoventia, quæ Aëtius, Aquapendens, Paræus habent, vel illo luadente, unguentum Comitissæ, vel desiccativum rubri nomine donatum. Hydrocclen à illar capitis breviter curatam refert Borellus. Lotichius, loco cum spongia fomentato, emplastrum præcipit: Acc. herb. origan. rut. absynth. chamom. an. in j. bacc. laur. j. sem. anis. foenic. cummin. an. ʒʒ. coq. in l. q. aq. comm. & acet. pro lotu. A c. empl. de bac. laur. itereor. capria. an. ʒʒ. cochlear. contul. cum testis ʒʒ. sem. cummin. sulfur. an. ʒij. malax. cum ol. rut. cham. an. q. s. f. emplastrum. Rondeletius, Professor Regius, & Cancellarius, forum habet, qui accipit: lixiv. barbiton. sor. ʒij. coq. cum cummin. ʒij. ceterach. vel petrosel. apii. an. ʒʒ. sal. com. ʒij. Hicronymus Rensnerus Nobilem quendam hernia aquosa laborantem, his liberatum remediis introducit. Acc. vini sublimati quartar. sem. ol. cham. mel. cochl. j. Croci parum M. optime in vitro, coque calefacto ungatur quotidie hernia mane & vespere. Postea fac sacculos ex geranio cocto in vino rubro, & inter duos orbes lignos expressos calidissime applica, semper applicato

relinque noctu & interdiu, donec humor omnis omnino absumatur. Ubi ad aquarum effusionem deveniendum, scalpello, vel acu absolvatur negotium. Arabes Cautica introducere, ut vetus terebat consuetudo, quæ à Polteris rejecta sectio. In hydrocele medicamenta septica live caustica non sunt tuta, quia gangrænam excitare possunt. Novacula itaque una incidatur Scroti pars, & posteaquam omnis humor probe effluxerit, cicatrix inducatur. Setum si arripserit, aliquoties de die trahendum huius, ut aqua paulatim desillet, setaceum tamen non est ante parandum quam aqua per foramen emissa. Duum mihi prævideo illatum, iri quod a causa *πρωτογενής* proveniens aquosus ramex nonnisi tantum occupet testem, aut ab hac parte *ἔξω*, vel *ἐκτὸς* *ἐκτὸς*. Manifestum superius dedimus, milti lateris lemnalem venam non ex magnæ venæ trunco, sed renis emulgente, originem ducere. Rene vero male habente, serum, quod excernitur, cum per consueta demandari loca nequeat *ἐκτὸς* incurrit, & hydrocelem in scroto efformat, notante, in Anglo quodam, Dodonæo. Sexagenarium Besantheus vidit Hildanus, cui ob *ὀρθή* Chirurgus singulis annis *ἔξω* perforabat ex inferiori parte, postea ulceri cicatricem inducebat: id quod & mihi in Galhis videre contigit. Habet tamen & idem ille Historias, quibus lugubri multorum fata abunde satis cognoscuntur, Crotesi in primis Senatoris exemplo. Aquapendens decocto salis, cum sudore copioso, aquæ exticcationem in abdomine molitur & universo corpore. Salus calculus apponit: Iucior est Curatio, si impediatur aquarum generatio, ex viscerum mala dispositione ortam habens, ut hydrocelem, in xv. Dierum puero cum gangrana conjunctam curationem admisisse, testetur Binningerus in observationibus.

Προστατή & *πρόσθια* Scrotum à flatibus in tumorem elevatum innuit. Affectus cum facile dignoscatur, quoad causas, signa & prognosin, formulas concinnare, *χημικῶς* instituire, nobis etiam tacentibus, in promptu erit. Mercurialis aridet: Flatusosam dicunt herniam Medicinam non admittere, in qua re non satisfaciunt, quoniam si spectemus huius rei materiam, cum sit flatus, medicamentis dissolvitur & dissipatur. Si spectemus etiam locum affectum, siue fiat relaxatione, seu fractura, non est ita alienum ipsum persanare. At si malum in arteriis, quæ per *ἀρτή* repunt, curam respicit. Ceterum pulverem magnificat Geierus: Acc. anis. fenic. car. dauc. cumin. bacca. laur. contus. an. $\frac{3}{4}$ j. liquirit. ras. zing. alb. galang. an. $\frac{3}{4}$ β. Caryophyll. cubebæ. piper. long. sem. rut. an. $\frac{3}{4}$ j. anis. sacch. obduct. $\frac{3}{4}$ iij. Sicch. $\frac{3}{4}$ vi. M. F. S. A. Tragea. acc. spec. arom. rosat. dianis. an. $\frac{3}{4}$ ss. ol. fenic. $\frac{3}{4}$ β. sacchar. in aq. aurantior. solut. $\frac{3}{4}$ iv. f. Tabellæ. *Πρόσθια* ex vulnere manantæ dextræ Curationem Meekeranus proponit in observationibus Chirurgicis. Rondeletius ramicem foveit vino adstringente & lixivio in quo ebullierint cumin. bacca. laur. fescel. rut. an. $\frac{3}{4}$ j.

Σπέρμα à carnea mole, vel fungosa carne dicta quatuor & triginta semunciarum in mercatore Samio annotante Borrichio, testes aut vasa sibi spermatica raro quamvis moneute Celso accidat, Medicamentis vix cedit ac per-

sanatur nisi amputatione Salus duram facit & cancerosam, a Medico nullatenus tractandam: Non cancerosam alteram, quæ simplicem admittit scirrhorum curationem, *ὁ κατὰ τὴν ἀρχὴν γέννηται, καὶ ἡγεῖται ἐν βέλτιον ἡγεμονικῶν καὶ ἀποδιδωμένη ἔχει μὴ ἡγεμονικῶν ὅτι πλεονεχέει ἐν τῇ τῆλε*. Quibus Cancri occuli oriuntur, eos non curare præstat Curati namque cito pereunt, non curati vero diutius perdurant. Aquam virgæ aureæ destillatam præclare agere, ac nonnullis esse in pretio, Patavii accepi a Clarissimo Carolo Offredo. Rommeus ad herniam carnosam suam, quod Rommeianum vocat, Emplastrum commendat: Acc. succ. fenulæ galbanæ feræ resinæ, ammoniaci resinæ an. $\frac{3}{4}$ j. infund. per noct. in $\frac{4}{5}$ scillitico solve super igne, & cola, ut a sordibus liberetur. Iacobi aceti exhalatione add. radic. aristol. necos Iorent. an. p. 5. Marcatiz saturi $\frac{3}{4}$ j. lapid. calamar. myrrhæ an. $\frac{3}{4}$ iij. ol. laurin. & ceræ q. s. f. emplastrum. Scultetus pulvere radicis ononidis tumorem resolvit & emplastro, quod habet: Gum. ammoniac. galban. bdell. an. $\frac{3}{4}$ β. dissolutis in aceto add. adip. anas liquat. & col. $\frac{3}{4}$ i β. ceræ citrin. $\frac{3}{4}$ ij. ol. lilior. albor. medull. crur. bovis an. $\frac{3}{4}$ x. M. F. Emplastrum. Herniam carnosam fœtu testiculorum ex vino sublimato fomitis calore in vaporem resoluta, & impolito cataplasmate ex absynth. maly. chamam. rad. alth. & sem. lin. an. part. æq. confectus, & in lacte caprillo coctis, curatam, Joannes Uldaricus Rumlus in observationibus habet. Georgius Hieronymus Velschius, Medicus & Polyhistor. Augustinus Celeberrimus ex Guilielmi Quarrei ad Joannem Pravotium, Professore Patavinum, Literis adfert, visam a se curatam Sarcocelen tam contumacem, ut omnia frustra tentata fuerint, solo emplastro illo Paracelsi, quod in Tractat. de Cur. vuln. Chirurgiæ minori adnexo copiose describitur & fodicationis alteram appellatur, quo scirrhos etiam durissimos & diuturnos sanatos Pravotius quoque in secretis adnotavit. At, Borrichius, non satis providi rei altimatores mihi videntur, inquit, qui confirmatam *πρόσθια* vel Medicamentis discussisse se, vel discussi posse evulgant, quod nimirum occidat massa illa, & nulle plexibus nervosis, illque solidis, contrahat invictam duritiem. Aquapendens in testis, carcinomate affecto, qui pileo major erat, vasis prius circa inguen forcipe prehenis, inde confutis, & vinculo contrictis, eadem tranivisse absceidit, & universum abiecit testem, postea feramentis candentibus inussit, hac ratione intra viginti dies sanatus, qui alioquin peritum superfuisset. Quidquid sit, periculo non vacat operatio. Studium it. q. ac cautionem adhibeat Chirurgus necesse est, ut observato hernia siue tumoris loco, scrotum ad carnem usque incidat. Quod si firmiter cum annexis partib. coaluerit, vasa cum testibus præstentur. Hic in illos animadvertimus, qui, peracta sectione, *Πρόσθια* & *Σπέρμα* temere præscribunt, ut superflua caro absumatur putredine, cum hac ratione nullâ plane admittat curationem, sed symptomata frequentius exciter cane pejus & angue fugienda carnosam moles. Hæc vaus faciliorem suggerit methodum: ad arteriarum, inquit, officium siue circulationem respiciens, ingentes aliquando hernias carno-

fas, præter omnem spem, perfecte curavi; id solum. gens, ut præcisa, vel ligata arteriola, nihil nutrimenti spiritulve ad partem laborantem accederet, quo factum, ut tumor facile polleat vel ferro vel igne exstirparetur. Habuit quidam præ cæteris sarcosin in scroto seu herniam carnosam humano capite majorem ad genu ulque deorsum pendulam: indeque sursum carnosæ moles ad carpi magnitudinem, cum tunis nauticus, abdomen ingrediebatur; adeoque manu increvit, ut nemo ferro, vel aliter curam aggrederi auderet. Hanc tamen ingentem excrescentiam scrotum tantopere distendentem, testiculi quoque in medio involventem, quo dixi modum plane abstruli, & curatione perfecte defunctus sum: relicto intereat testis vase suo præparante & deferente, reliquisque in scroto per vaginalem tunicam descendentibus, salvis & intactis. Sarcocœles in nupte sectionem, cui testiculus dexter ad capitis puerilis magnitudinem excreverat. Bartholinus describit in actis Medicis Hassnientibus. I yroticis subinde caro absuntitur, & remediis convenientibus vulneris promovetur Consolidatio.

Simplex es quasdam herniarum species hucusque in medium adduximus. Compositas, quas singularem non exigere Curationis methodum, in propatulo est, silentio involvere satius esset, quam ingeni imbecillitate deterere. Ac ne sponte quidquam nobis excidat, vel lubentes quardam transire videamur, nomina dabimus, ad reliquas ramicum differentias progressuri. Dicuntur itaque *ὁ πρῶτος ὁ δεύτερος ὁ τρίτος ὁ τέταρτος ὁ πέμπτος ὁ ἕκτος ὁ ἑβδόμος ὁ ὀγδοὺς ὁ ἐννεὸς ὁ δέκατος ὁ ἑκάστος*, Ponremum ruptæ per genus in valetudinariis vidi in Nisocomiis, sed Curationem cum sinistro plerumque decumbentis lato adhibitam. Fabricius curam aggredditur & modum exponit, cui Rhodii præterea Doctissimi ex Fallopio monitum: Si cum hernia aquosa caro circa testiculum concreverit, operatio periculosa, & in cancerum proclivis, Testis enim corruptus facile inficit, *ὁ ὀγδοὺς ὁ πέμπτος ὁ ἕκτος*, ni fallor, Lugduni ad Rhenum meo tempore conspexit, depictam tabulam, inter chartulas reposuimus.

[illegible]

præstare, Curationem omnino relinquere, quia
à curatis, Cancri, mamma, suffocatio anentien-
te illo Hippo-eratis Genio, Joanne 1o. ti. Ce-
lebrerrimo Praxeos Doctore atque Troicidore
Patavino: Quando Varices, inquit, immature
& præpropere, Medicorum imperitiis, prohibi-
ti tuere, videt ego atra bile & infama exatos,
immo & in erectibili inflammatione, & renal-
catore, sanguinis iputo. Attonito morbo, & in-
tercutanea aqua eosdem detentos. Quod si vel
à violenta provenierint Corporis excretionē,
g. stato pondere, & stando in aëre, sed eleganter
& ad rem mercurialis: Mercurium scimus om-
nes, ex Plutarcho in ejus vita, laboriosum virum
existisse, ob quod, si quis, dicat, ei varices qui-
bus afflictabatur, in ambobus curibus ortos,
ob nimios in stando labores, cum natus erat
turum, existinare. Fortunatus vero Fidelis
Proditunt, ait, memorie est, gignendi facilitatem
his tolli, quia variculis tenentur. Quod si,
inquam, his de causis varices oriantur, auxi-
liares in plorare minus convenit. Veterum mos
erat referente Celfo terramentis à vitis candenti-
bus serotum adurere; tum farinam ex aq. trigi-
da subactam superponere; tertio die lenticulam
cum melle imponebant; post ejus crassam,
ulcera melle purgabant, rosis implebant, & ad
cicatricem atidis linimentis perducebant. Simi-
liter, tumentibus mediæ tunicae venis, in quibus
incidebant, venas digitis separabant, & filo
utrinque injecto, sub vinculis precipidebant re-
posito testiculo. Ubi vero inter imam membranam
& testiculum generatus varix, testem absolvere
veterum ductu oportet. Nostra ætate, cum gi-
gantum humeris insidentes pygæi longius
prospiciant. Magno Angliæ Can. celsario, Barone
Verulano, explicante, vix reperies, qui id per-
ferre supplicii aut injungere ausus fuerit. Recen-
tiores ranciis curam aggressi, ab utraque va-
rici parte venam hamulo aut digitis elevatam
constringunt, ut scalpello incidatur, ac sanguis
probe eximi possit. Aquapendens hoc loco, ad-
stringentia componit ex tragacantho cum vino
granatorum, bolo armena, mastiche; sanguine
draconis, juxta varicis longitudinem confor-
mata.

De *βρογχίτιδι*, *εσθρονίτιδι*, *επιδιδυμίτιδι*, *επιδιδυμίδι*, *σπληνίτιδι*, *σπληνίτιδι*, *σπληνίτιδι*, *rupturis in inguine*, *scroto*, *interioribus partibus conspicuis*, *verba fecimus*, & *ad nauticam fortè*. *Superiora versus herniæ contingunt*, *Græcis* *εξομφυλλοῦ* & *βρογχίτιδι*, *umbilici procidentia*, & *cervicis vitium*.

Tumor qui umbilicum obidet; umbilicus prominens, prociudus, umbilici eminentia, hernia umbilicalis; puerorum plerumque morbis accendi solet: quavis femina laborioso quoque & difficili partu umbilici herniam incurant. Mercurialis rupturam vel cum inflammatione facit; vel sine inflammatione, *ἄλγος* *ἔρρι*. Tumorem auctæ magnitudinis perhibet: cum dolore, & pulsû: ubi scilicet umbilicus in recens natis malè præscinditur. In hernia vero umbilicali, proprie dicta; omentum, intestina; aqua; flatus, caro supercrescit. Diagnostica; prognostica; ex Celso ac superius adductis repetenda. Quod si *ἄλγος* Curationem exigar, iungantur refrigerantia, humectantia, nodyna; quæ scopo cor respondeant. Ad peritonæi vero consolidationem, antequam manu, ferroque

utamur, subducta alvo, Celsus super-umbilicum imponit: Cicutz & fuliginis, singulorum P. I. Ceruillæ elotz P. I V. Plumbei loti P. V 111. cum ovis duobus, quibus solani succus adjicitur, Auctores, repositis onienro vel intestinis, id quod memoria perpetuo tenendum, pilulas, electuaria conficiunt & ceratum umbilico. Habeant tyrones formulas. Acc. limatur. ferr. ʒj. Nuc. cupress. ʒij. mum. sang. dracon. thur. corall. rubr. an. ʒj. conc. cum melle. dos. ʒʒ: mane & vespere, superbibendo medicum vini adstringentis. Acc. radic. consolid. maj. caud. equin. burs. pastor. rub. canin. an. m ʒ. coq. opt. vin. adstring. add. mastich. corall. rubr. bol. armen. nuc. cupress. an. ʒi ʒ. cinamom. ʒj. cum melle f. electuarium cujus dos. dimid. cochlear. Acc. gum. Arab. tragacanth. mastich. bol. armen. sang. dracon. corall. pisc. coll. de corio bovis an. ʒij. thur. ʒij. Pic. græc. ʒj. Pic. nav. ʒij. liq. ad ign. t. Magdaleon. vel. acc. boli armen. sang. dracon. mastich. sarcocol. an. ʒj. bishing. regul. pulver. an. ʒij. resin. pin. ʒi ʒ. Ov. album. & ceræ q. f. puerum exomphalo seu umbilici exitu laborantem, facillimo remedio sanatum Hieronymus vide Reusnerus. H. nempe & rad. sanicul. in aq. cocta & calide applicata Eodem cum inflammatione & humiditate adlieta filiola, seq. pulvere insperso convalescit acc. bol. arm. ver. ʒj. myrrh. ʒij. pompholyg. ʒi ʒ. f. pulvis. Aquapendens subligaculum ex linteis componit, in cujus medio globulus intestinum vel omentum protuberans reprimat, & herniæ umbilici fasciâ sublevatæ exempla afferunt Hildanus, Ulinensiumque olim Physicus Joannes Scultetus. Quod si vel in tenellis corporibus Medicinam respuat, vitium lectione curare incumbit. Hæc priusquam instituantur, repetenda quædam ex Celso erunt, & in limine quidem curationi neque infantem aptum, neque decrevitum exponendum. Quod superest, de *χρησιμότητι* nihil adiciamus: cum ne nini non, vel primis Artis rudimentis instructo, quam notissima esse debeat. *Ludovic. Van Haumen Dissertazione de Hernia.*

Curationes.

Etiamsi quævis hernia non facile Curam suscipit. in infantibus tamen facilius curatur; in senibus difficilius, aut nunquam. Quod si intestinum flatibus aut excrementis repletum sit, sequitur dolor, atque hunc, si non illico tollatur, inflammatio, gangrena; hinc passio iliaca, ac ipsa denique mors succedit. Rarum est, quod refert Fabritius Hildanus Cent. I. Observ. 55. feminam septendecim annos hernia laborasse, & circa annum ætatis tertium & sexagesimum maximis vexatam fuisse torminibus, intestinumque in abdominis rupturam impulsam ac ubi retentum dolores non leves, simul & inflammationem, aliaque graviora excitasse symptomata. Vocatus ad Curam Hildanus invenit dextrum inguen gangrenâ affectum: Tumore itaque scarificato, & cæteris quæ ad gangrenæ curationem attinent adhibitis, caro putrida & callositas rupturæ exciderunt: unde dolor, inflammatio, febris, tormina, lipothymia, nausea, vomitus, omnia denique symptomata sedata sunt: sed intestinorum materia, non-

dum penitus excrementitia, velut ilei & cæci, per abdominis rupturam excernebatur, circumter duos menses. Ægra tamen admirantibus omnibus curata, & a ruptura perfecte sanata fuit, nulla relicta filiula.

Atqui Ratio Curandi Herniam, in primis intestinalem, in hisce tribus constitit: viz. in intestini intra abdominis cavitatem repositione; in repositi conservatione, ne rursus descendat; in relaxati peritonæi contritione.

Verum ante repositionem Chæirurgus diligenter consideret, an hernia sit parva, vel magna? an recens, vel inflammatione correpta? an flaccidum adhuc, vel materiâ aliqua repletum sit intestinum?

Si hernia parva sit & recens, intestinumque vacuum, facillime reducetur si æger supinus in lecto collocetur, capite declivi, pedibusque elevatis, quoniam hac ratione intestina iursum fluentia secum trahunt id, quod prolapsum est.

Sin vero magna sit & recens hernia, oportet Chæirurgum intestinum nulla materiâ distentum digitis tractare, idque, ægotantis capite declivius posito, sensim tandem moliter circumagere, donec paulatim abdominis cavitatem ingrediat.

Atqui herniæ quum associatur aut inflammatio, quum indicant dolor, calor, febris; aut flatibus adlunt, qui cognoscuntur ex eo, quod æger percipiat totum abdomen a flatibus distendi, si flatus emittat, & rugitus in intestinis audiantur, dolorque extendens sit sine gravitate; aut fæces, alvusque supprimitur, tumor sensim incrementum, & pondus majus, majorque durities percipitur: tunc a reductione intestini desistendum est, utique dum inflammatio abierit, fæces egressæ, & flatus dissipati fuerint.

Igitur inflammatio cum adsit herniæ, scrota vel inguin calide imponatur cataplasma emolliens, digerens, simulque robotans, ex farina hordei, turfuribus tritici, foliis malvæ, althææ, floribus sambuci, rosarum, vino rubro, &c. idque identidem renovetur. Etiam ex lallopio, pars affecta foveri potest lixivio calido, in quo cineres ex ligno sagmo ebullierint. Accipiantur itaque dux ñli crudi massæ, indantur cacaibo, & coquantur cum m ʒ. seminis cumini in lixivio acro; deinde massarum una extrahatur, quæ inter duos discos exprimatur, atque expansa calide, quantum ferre potest æger, apponatur; verum tepescens removeatur, & alia substituantur, eaque repetatur, donec omnino sublata sit inflammatio.

Si cum inflammatione concurrant fæces, quæ repositionem intestini impediant, casus quidem est maxime desperatus: nihilominus tamen fecum tentetur eductio clysteribus lementibus, identidem injectis nec non fomentis, aut cataplasmatibus distensionem relaxantibus. v. gr.

℞. Fol. parietariæ, malvæ althææ an. m ʒ. flor. camomillæ, meliloti, sambuci, sum. anethi an. m ʒ. sem. cumini, feniculi an. ʒʒ. incisa & confusa coq. in s. q. lactis vaccini pro soru.

℞. Rad. liliorum alborum rec. ʒij. fol. malvæ, violariæ, parietariæ, flor. camomillæ, meliloti an. m ʒ. furfurum m ʒ. coctis in aqua pura ad mollitiem, & in mortario minutim confusis add. farinæ althææ, Hordei, lini an. ʒij. olei rosarum, liliorum alborum an. ʒi ʒ. m. f. cataplasma

plasma. Vel Tumor continuo soveatur mappis calefactis, Oleo camomillæ & Anethino imbutis, atque subinde renovatis.

Sed & status non raro absque inflammatione Intestinum replent; quo in casu utruptanda sunt fomenta ex emollientibus, calefactientibus & discutientibus composita; nec non Clyster caletaciens & carminativus injiciendus est, haud secus ac de Intestino Prolapso, & vel inflammatione obfesso vel facibus repleto, Reponendo nunc diximus.

Sublata vero Inflammatione, excretis Facibus, Flatibusque dissipatis, reponatur in propriam sedem Intestinum. Viz. collocetur Ægrotus capite plurimum demisso, affecta autem parte elevata, deinde manibus Tumor capiendus, tentandumque ut materies paulatim eo, unde exiit regrediatur; digitum neape sub tumorem reponendo, repellendoque leniter in ventrem quod ex eo delapsum est, atque diligenter cavendo, ne contusio livorve intestino adieratur, quod ea pars Gangranæ obvia sit, & opportuna.

Atqui e contrario cum, omnibus frustra tentatis remediis, Intestinum prolapsum, & vel inflammatum, vel facibus flatibusve repletum, reponi nequeat, adeoque præsens Ægroti imminet periculum, extrema quoque tentanda sunt. Quo in casu Ambrosius Paræus Chirurg. lib. 7. cap. 15. ad Chirurgiam accedere, & ducum illum, per quem intestina elapsa sunt, sectione dilatare suadet, sic ut digito reponi queant. Sed ardua est Manualis hæc Operatio; quæ quomodo sit instituenda videre insuper est apud Pigrum prax. Chirurg. lib. 2. Cap. 41. & præsertim apud Jobum Meckeranum observ. Chirurg. Cap. 45. 46.

Ubi jam intestina reposita fuerint, proximum est cavere, ne iterum excidant. Quem in finem maximi sunt momenti fasciæ seu Subligacula, adeo ut in Herniis recentioribus totatere Curationis spes in his sita sit. Parandi autem fasciæ commodissima hæc videtur ratio. Fiat cingulum seu fasciæ ex corio, quæ lino molliori seu panno gossypino, atque etiam gossypio nonnihil sustulato inducatur, quæ ligula stringi possit. Atque hæc fasciæ ventri infra hypochondria supra coxendicem prope inguina applicetur; ita tamen, ne partes quæ sunt supra illa & ossa lædat, & atterat. Huic autem fasciæ seu Cingulo alia fasciæ cum splenio seu pulvinari quodam ita adaptari debet, ut quantum opus est contrungi possit, ipsumque pulvinar recta loco affecto, seu parti ubi intestina excidere solent, incumbat, luoque incubitu intestinum prolapsum prohibeat. Quod ut rectius præstet, fasciæ, quæ ventrem ambit, nonnulli geminas habenas adaptant, quæ ad humeros ascendunt & collum ambiunt.

Fasciæ loco parari potest Cingulum ferreum cum scuto ferreo, quod locum ubi Intestina prociidunt arcte tangit, & Intestinorum Prolapsum prohibet. Rationem vero conficiendi omnia hæc instrumenta Praxis docet. Icones habentur apud Paræum Chirurg. lib. 7. cap. 15. Scultetum Armament. Chirurg. Tab. 39. aliosque.

Equidem Intestinum postquam repositum est, priusquam adhibetur Bracherium, Adstringens aliquod relaxato peritonæo applicari potest Emplastrum, quale est oxycroceum, seu Emplastrum ad Rupturas in corio extensum, vel limi-

le v. gr. illud Pigræ,

℞. Gummi elemi ʒi Matlichis. ʒij. olibani, Sarcocollæ an. ʒj. Emplastri contra Rupturam ʒiij. Pulv. Bolæ armeni ʒiij. Olei therebinthinæ. q. s. M. f. s. a. Emplastrum. Emplastri loco nonnulli laudant totas Adstringentes, adeoque relaxatum peritonæum Roborantes. ex Corricibus Granatorum, balustia, Sumach, nucibus cypressi, floribus camomillæ, alumine, limilibusve, in aqua fabrorum, & vino rubro adstringente decoctis. Alii inungunt oleum ovorum. Sed imprimis Quis hic in pericula est, quæ sola nonnunquam graves sanantur herniæ; cuius rei memorabile adfert exemplum Hildanus cent. 5. Observ. 54. cuiusdam generosi Beronensis sexagenarii, qui viginti annos insigni Hernia Intestinali laboraverat; cui curanda cum Hildano, cum alios in Galia & alibi expertissimos frustra adhiuisset Medicos & Chirurgos, idem cum de recuperanda sanitate ne quidem cogitasset amplius, & subligaculis, re malum ingravesceret uteretur, in morbum incidit, quo ultra sex menses lecto affixus fuit. Post morbum hunc ne minimum quidem herniæ, quæ tamdiu laboraverat indicium persentit, nec amplius splenis aut subligaculis uti necesse habuit.

Igitur fasciæ intestina, ne rursus prolabantur, contineri possunt: quod ubi factum danda opera, ut excrementa potius mollia sint, quam dura, & vix ne supprimatur; atque in egerendis facibus observandum, ut manu inguinis & scrotum probe contineantur, ne faeces emittendo intestina extrudantur. Deinceps abstinendum a cibis flatulentis, ne flatus intestina distendentes producantur. Insuper omnis vehemens motus, saltus, cursus, oneris gravioris gestatio, vociferatio, aliæque vehementiora vitentur exercitia. Denique in tussi & sterminatione idem observandum, quod modo in egerendis alvi fecibus attendendum diximus.

Hicce alii addunt ad accelerandam relaxati peritonæi confirmationem varia intus sumenda medicamenta, & inter illa huic affectui curando specifica, quæ dicuntur R. alix consolidæ, osuanda regalis, herniaria, hypericum, &c. quorum formulæ plures habentur apud auctores.

Veruntamen si integram sanitatem his æger consequi non possit, bracherio contentus sit; quo solo si recte contineantur intestina, omnibus vitæ actionibus sine magno impedimento vacare poterit. Atqui huic qui contentus non est, semet ipsum Chirurgiz tradat, quæ per aliationem Didymi Herniam penitus curare potest; de qua videantur Pigræ prax. Chirurg. libr. 2. cap. 40. Scultetus Armament. Chirurg. Tab. 40. Cl. van Horne in Microtechnie Sect. 2. part. 1. § 14.

Quæ autem hactenus de Cura herniæ intestinalis dicta sunt, quoque applicari possunt herniæ ex omenti prolapsu ortæ. Idem enim in ejus curatione sunt scopi. Primo nimirum reducendum est Omentum manuum opera; deinde prohibendus elapsus, quod itidem bracherio fieri solet. Atqui si omenti prolapsus non exacte prohibeatur, adeo ut frequentius illud elabatur, facile peritonæi processui per fibras ætissime accrescit, hinc reduci in abdominis cavitatem nunquam potest, manetque in medicabilis epiplocele.

Hydrocele porro pro Caularum varietate nunc magis nunc minus periculosa est: quæ enim cum Hydrope conjungitur, non curatur, nisi sanato prius Hydrope, ejusdemque causa ablata. Nam licet aquosus humor vel discutatur, vel Scroti apertione evacuetur, novus tamen rursus affluit. Si vero causa Aquam generans minus gravis sit, facilius curatur. Equidem inveterata hydrocele, ne Testes corrumpantur, haud immerito suspecta est.

In Curatione autem herniæ aquosæ, Universalibus ad tollendas Causas Antecedentes haud neglectis, ut de oedemate, nec non de Tumore tum flatulento, tum aquoso curandis dictum fuit; vel Topica Scroto pratunido applicentur calida, Siccatia, resolventia, Digerentia, contentam adeo in eo aquositatem absorbentia; vel Scroti quocunque modo apertione aquosa materies educatur.

Kalopius tom. 1. tract. de tumor. p. n. cap. 34. haud abs re duplici: statuit herniam aquosam; unam, in qua dilatato nimium peritonæi processu, aqua ex Abdominis cavitate in Scrotum descendit, adeoque fluere & refluere potest: hæc autem non curatur nisi prius ex Abdomine omnis educatur aqua.

Altera herniæ aquosæ species est, in qua nimium non aperto peritonæi processu, aquosa materies per extrema tum sanguineorum, tum lymphaticorum vasculorum oscula in Scrotum, vaginalem inter & albugineam testiculi tunicam, effunditur. Atque in hac specie Topica Medicamenta calida, Resolventia, & Digerentia adhibita multum profunt, eaque semper experiri oportet, priusquam ad Scroti apertionem veniamus. v. gr.

℞. Rad. cucumeris asinini ꝑj. fol. calamentæ, abrotoni, rutæ, Sum. Anethi, flor. Camomillæ, ros. rubr. an. Mj. Sem. cumini ꝑvj coq. in aqua puræ & vini albi an. p. xq. ad ꝑxxx. colatura sit pro Fomento. Mignæ quoque efficaciz talia dicuntur medicamenta, si Aceto incoquantur.

℞. Rad. Cucumeris Asinini Bacc. Lauri, Sem. Cumini, Agni Casti an. ꝑß. fol. lauri, rutæ, ros. marini an. Mj. decoq. in aceto ad ꝑxxx. colatura pars affecta cum spongia foveatur. Vel Fomentum fiat ex lixivio cinerum Samentorum vitis, in quo similia cocta sint, nec non sal, sulphur, aut alumen liquatum fuerit. Etiam Litus hic multum profunt. ex. gr.

℞. Olei Cucumeris Asinini ꝑj. Rutæ. Lauri an. ꝑß. Cumini stillat. gutt. x. Misceantur pro Linimento. Laudant. Alii cataplasma ex Stercore vaccino, mixtis cineribus Plantarum Digerentium, aut Seminibus Rutæ, viticis, cumini, baccis lauri, Juniperi, similibus.

Nonnulli imponi volunt Emplastrum de meliloto, de cumino, vel simile.

Scoltzius Consil. Medicin. 131. vehementer laudat id, quod sequitur,

℞. Rad. Cucumer. asin. rec. contus. & in Aceto scyl. macer. ꝑbj. Mellis despumati ꝑbj. Misceantur, & bulliant in cerati consistentiam, addendo in fine Sem. Cumini sub. pulv. ꝑdij. M. F. S. A. Emplastrum.

Sin his, similibusve remediis Tumor resolvi nequeat, ad cheirurgiam, hoc est, Scroti apertionem veniendum. Quo modo autem & ordine

Scroti Apertio instituenda sit, docent Paulus Ægineta lib. 6. cap. 61. & C. Celsus lib. 7. cap. 18.

Nonnulli Scalpello Scrotum aperire solent, cui tamen methodo vix assentimur, quoniam id ex collecta aqua distentum admodum, & hæc dum difficulter consolidatur; atque non raro ob partis affectæ porositates obstructas, spirituumque per eam radiationem valde immunitam Gangrana accedit.

Alii hanc apertionem Causlico, vel Ignitis ferramentis efficiunt, atque apertum diu servant foramen cannula immixta Argentea vel plumbea.

Quidam Scrotum aperiunt, Acum illum duplicatum vel quadruplicatum ducentem detacei in modum trajiciendo, & quotidie bis terve protrahendo.

Avicenna in Inguinis regione candentibus ferramentis inurit, ut pars corrugetur, sine aqua iterum descendere possit.

Sed potius Scrotum aperiatur acu perforata Barberiana, vel Blockiana, sicque aquosa educatur materies. Atque hac methodo sæpius hydrocelem curavimus, eduximusque aliquando ex Scroto tres, aliquando quatuor aquæ libras. Etiam nunc inter mortales versatur Vir septuagenarius, cui singulo præter propter biennio Scrotum perforata acu aperiri solet, ad collectam in eo aquam evacuandam. Similiter Fabricius Hildanus Cent. 4. obs. 66. scribit, se novisse virum Sexagenarium cui ob Herniam aquosam singulis annis Scrotum ex inferiore parte perforabatur, & sero usque humor evacuabatur, ac postea ad cicatricem ulcus perducebatur: additque hunc nem illum ad summam pervenisse senectutem. Equidem circa Scroti apertionem utiles quasdam admonitiones & observationes proponit idem Hildanus Centur. 4. observ. 65. 66. 67. 68.

Adesse Sarcocelen cognoscitur ex eo, quod Tumor in Scroto durus sit, sine inguinis tumore, sensimque ad auctum quo signo distinguitur ab hernia Intestinali, quæ mollior est, & subito oritur: insuper major hic molestia est, quam dolor, nisi pravi humores confluant. Indagandum quoque diligenter, ne Hydrocele vel alius Testiculi Tumor pro Carnosa Hernia habeatur; quod interdum contingit, si aqua profundius lateat, & foris nulla sui signa exhibeat. Tale exemplum profert Forestus libr. 27. observ. 25. in scolio, de quodam, qui testem unum cum scroto in modum scyrrhi, paulatim majorem in molem auctum, & durum per quinquennium habebat, ut omnes Sarcocelem putarent. Postea tamen cum emollientia & maturantia applicarentur, tumor mollis evasit, & factò abscessu magna aq. copia, quæ intus latuerat, cum impetu erupit, unde scrotum & testiculus detumuit, ægerque penitus curatus fuit.

Equidem medicamentorum ope vix unquam curatur Sarcocoele. Sed Cheirurgiæ opera tolli solet, ut plurimum cum didymio, cui adheret, vel inhaeret heterogenea hæc substantia. Ad inguina ubi se extenderit, fere incurabilis est.

Quoad Medendi Rationem; ea duplex est, scilicet ut vel tumoris incrementum prohibeatur, & porro tumor absorbatur: vel substantia hæc carnosa cheirurgia tollatur. Primæ intentioni ut satisfiat, medicamenta interna ad tollendam Sarcocelen quoque commendantur. Ex

scribit

Matthiolus in Dioscoridem libr. 3. cap. 18. se novisse quendam, qui ononidis radicis pulvere duntaxat plures menses sumpto, carnosum tumorem absumpsit, & sanatus est, licet à Medicis nullo aliò remedio, quam sola sectione, tumoreneque hunc curari posse esset statutum.

Inter Topica Medicamenta velde hic commendat Rolandus Cent. 9. Observ. 66. sum oleum Sulphuris, hoc est, Balsamum Sulphuris quotidie bis illitum. Alii imponere malunt hoc emplastrum.

℞. Gummi Ammoniaci in aceto soluti ℥i℥ Bdelii similiter soluti, pulv. seminis sinapi, urticæ an. ℥j Aristolochiæ rotundæ ℥vi. Sulphuris ℥ss. terebinthinæ, Lapidis spongiæ an. ℥j. spiritus vini ℥i℥. Cereæ ℥vj. olei olivarum ℥iij. Ex hisce S. A. fiat Emplastrum. Scultetus post armament. Chirurg. Observ. 74. scribit, plures se curasse, exhibito quotidie pulvere radicum Ononidis, & imposito hoc in Emplastro,

℞. Gummi Ammoniaci, Galbani, bdellii an. ℥ss. dissolutis aceto adde adipis anatis ℥i℥. Cereæ citrinæ ℥ij. Medullæ crurum bovis, olei Liliorum alborum an. ℥x. Misceantur in formam emplastri, quod linteo inductum Scroto applicetur, & quarto quoque die renovatur.

Sin hoc modo Carnosa Hernia non imminuat, sed e contrario augeatur, sequenti methodo tentari potest Curatio. Fiat foramen exiguum in Scroti parte superiore: per hoc peritæ ope medicamenta applicentur suppurantia, quæ hic carnosa hæc substantia tolli possit, quavis deligatione pus expurgando; verum non totum, ad meliorem reliquæ carnosæ substantiæ consumptionem.

Quod si nec hæc successerint, Testiculus extrahendus, & sectione tantum carnosæ excrecentiæ tollendum, quantum sine læsione fieri potest; hinc restitendus iterum in suum locum Didymus, & quod reliquum est carnosæ substantiæ suppuratione auferendum.

Quum vero nulla spes sit, dictis modis sarcocelen tollendi, Didymus, cum adnata ipsi carnosa substantia, vel tota sua substantia tumefactus excidendus est.

Præterea Venæ spermaticæ in Scroto Varicum adinstar dilatantur nonnunquam, & Tumorem in Scroto efficiunt, qui Circocèle seu Varicosa hernia nuncupatur. Ea namque nihil aliud est, quam circa Testiculos spermaticæ Venæ dilatata, & Varicum modo conglomerata, contortaque.

Hinc & eadem huius affectus causa est, quæ Varicum; viz. sanguis crassus ac terrestris, circa valvulas venarum spermaticarum subsistens, atque Varicosum huiusmodi Tumorem in Scroto excitans.

Facile quoque manifestum fit hoc malum, quod in Scroto supra Testiculum circa Peritonæi Processum venæ turgidæ, conglomeratæ, & capreolorum modo intortæ tangantur; quodque deorsum magis descendat Testiculus.

Cura equidem huius Affectus facilis non est. Ea tamen ut absolvatur, commodo aliquo subligaculo, aut fasciâ convenienter appositâ Scroto cum inclusis testibus sustentetur; hoc namque tam certum est remedium, ut teste Fallopio, quidam eo solo curatus fuerit, quod testes per duos menses fasciâ suspensos gestaverit, & quo-

tidie aquam Nucibus cypressi destillatam adhibuerit, eaque Scroto humectaverit, & perse exliccati siverit.

Alii emollientibus & discentientibus Curam moliantur, ideoque Balneum utuntur, seu emiscupium ex Radicibus althææ, semine Lini, sinapi trusse in aqua decoctis, ac deinceps oleo amygdalarum, vel quovis alio locum unguunt. Ad id quod sequitur, imponunt emplastrum.

℞. Picis navalis ℥vi Colophoniæ ℥ij. Gummi Ammoniaci, bdellii, opoponacis, Mastichis, lithargir. terebinth. an. ℥j. bol. armen. thur. sanguin. dracon. sarcocoll. aloës, centaur. symphyti, gailarum, malicori, nucum cupressi, lumbricor. terrestr. an. ℥ij. glutin p. Illisarietia. dissol. in aq. chalyb. & aceto q. l. M. F. f. a. Emplastrum.

Quod si nec istis remediis morbus hic curetur, ad Cherrurgiam deveniendum; & vel, apertura in scroto facta, varicosa testium venæ incidantur, vel simul cum didymo eadem excidantur. *Joh. Marnick in Chirurgia ad Praxin Modernam adornata.*

Omnes illi qui Hernias gerunt, sive veras, sive falsas, si prudentes fuerint, sobrietatem colent, venere immoderate non utuntur, ea omnia quæ harum invaletudinum causa esse possunt, vitant, & quandoquidem partes quas occupant debiliores evadunt, earum indulgendum imbecillitati, & ad dietam attendendum. Vitanda itaque veniunt omnia ipsis contraria, qualia sunt legumina, fructus recentes, omne artocreatis genus, vel panis butyro conditus, & non satis excocctus, carnes muria conditæ, pisces, & caseus; inter equitandum lorom scandalarium brevius faciendum, eo latere quod hernia afficitur, in sede humiliori non sedendum, nec brachia nimium elevanda, in extremos præterea assurgendo pedes, pro aliqua re in altiori collocata loco arripienda, caligatum zona non nimium constringatur, alvus servabitur libera, & si aliquando difficilius solvatur, in ipso nisu manus subligaculi pulvilo imponentur, violentiora devitantur exercitia, præcipue si herniis laborantes veris aptis & validioribus subligaculis chalybeis aut aliis à filo ferreo confectis, non fuerint instructi. De hisce subligaculis jam mihi verba veniunt facienda.

Subligaculum apud Gallos variis donatur nominibus, siquidem apud plurimos bandage, apud aliquos tamen vetustiori nomine brayer, apud Normannos ceint, apud alios retreint, ceinture aliisque synonymis insignitur quorum primum est & decentius & convenientius.

Pro conficiendo subligaculo apto vel e chalybe, vel e filo ferreo, attendendum ad ea omnia quæ in superioribus de herniis curandis diximus, indeque indicationes veniunt deducenda pro subligaculi forma: nam si corpus fuerit nacilentum, alia debet subligaculum ratione confici, quam si obæsum foret.

Viri macilenti & obæsi duas constituunt generales differentias formarum subligaculorum, ut & eorundem applicationis, sed aliæ eaque innumere particulares dantur, corpora siquidem omnia in sua variant forma, unde necessarium est etiam innumeris modis subligacula variare, ut superius adnotavi. Hoc non parum facit difficultatis ignaris, qui unius tantum generis

subligacula conficere norunt, arbitrari satis esse, si pro varia corporis crassitie valide contringant.

Non sic se gerit ille qui ad perfectionem tendit; quam magna revera inter meam theoriam & praxim quam hic demonstrandam suscipio, intercedit differentia, & quamvis Guido dixerit peritum practicum, operari pro modulo theoriae suae, dantur tamen quaedam facienda quae scriptis explicari nequeunt, & quae in demonstratione oculari portia sunt. Exempli gratia pro apte flectendo subligaculo, illoque iis proportionibus donando quae herniis maxime conveniant, necessario subjectum inspiciendum venit, alias in aliquibus semper dencit: itaque multo commodius foret me operantem cernere, quam docentem audire, sed quandoquidem in omnibus Ditionis Gallicae regionibus praesens adesse non possum, ut inspicar ab iis quos cupio doctos facere in cura Provincia- lium, qui tam saepe ineptis afflicti subligaculis Lutetiam adveniunt. Hoc unicum mihi liberum est, scil. pro ea qua polleo accuratatione scriptis edoceam methodum in subligaculis mihi familiarem, cui si adiungatur perspicacia iis necessaria qui Chirurgiae dicant, non dubito quin facillime acquiratur quod summo plurimum annorum labore conquievi.

Primum quod faciendum venit examinationis indicationibus necessariis, positum est in mensura crassitiei, sive viri, sive mulieris, sive puelli; haec autem mensura instituenda est cum iis materiis quae nec elongari, nec abbreviari facile valeant, v. g. cum charta pergamentina, vel tenia limbo donata validiori, incipiendo ab eo loco, in quo hernia apparet, & toto circumducto corpore ad eandem redeundo partem: illa autem circumductio varie institui debet, unde non parva tironibus creabitur difficultas; alii quippe subligacula altius collocatas alii inferius, pro corporis formae genere debent. Quibus altius sunt applicanda subligacula, sunt illi qui crassiores habent nates, nam si undum earum maiorem aut minorem crassitiem subligaculum varie flecti & ad superiora reflecti debet. Iis vero quibus sub- sidunt nates minus necessarium est subligacula ad superiora reflexa dare, imo aliquando omni- no haec ad superiora flexione abstinendum est.

Subligaculum pro subjecti sui crassitie, debet ut plurimum ad duas suae longitudinis tertias partes, aut paulo plus, e chalybe aut filo ferreo componi, reliquum vero debet ex corio robu- stiori confici, si subligaculum duplicem pulvil- lum lamina armatum ferrea habuerit, pro secun- di pulvilli longitudine minuenda erit corii praedicti longitudo.

Chalybs autem debet esse melioris notae & ejus generis quo effinguntur loricae, ita ut illud subligaculum non possit abrumpi etiamsi frigi- dum cudatur, & interim ea flexibilitate & vi ela- stica polleat, quae aptae corporis circumductio- ni necessaria sit. Haec Fabrum spectant Terra- rium, cui probe & accurate significandum quod ab ipso exquiritur, ut qui in Chirurgia instru- mentum aliquod aliud adinvenit, illud opera- tionibus suis instituendis aptum, cultratio cu- dendum exhibet.

Secundum quod in subligaculi fabrica atten- di debet, est validitas necessaria.

Duabus de causis necessarium est subligacul-⁴ satis robusta effingere. primo in herniis majori- bus, atque fluxibilibus, secundo in obaefiori- bus subjectis, quod tamen committit prudentiae chirurgi qui malum attentius examinavit, unum admonendo, attendat scil. exercitio illius cui applicabitur subligaculum, nam si fuerit homo magni laboris, aut exercitiorum violentiorum, subligaculum debet esse validius, ne herniam patiatur elabi, aut inter usum abrumperetur.

Tertium quod adnotari debet in eo positum est, quod chalybs aut filum ferreum e quibus ef- finguntur subligacula, a scuto sive pulvilli la- mina, ad suae longitudinis dimidium, una quar- ta parte validior & crassior fabricari velit, sensum minuendo ad finem usque, ut sic vis ma- jor adsit elastica. Si vero necessarium fuerit pro duabus herniis subligaculum conficere, oportet ut illud scutum quod zonae seu cingulo conti- nuum est ponatur super molestiori hernia, sive illud a latere dextro, sive a sinistro fuerit. Ob- servandum autem quod omnium subligaculo- rum laminae sint suis pulvillis minores, nam hi illarum oras ad dimidii saltem digiti quantita- tem excedere debent, & praeterea quo magis elevare velis eodem pulvillos, commiores de- beant esse laminae, inguina enim quibus appli- cantur, nequeunt grandiores laminae pulvillis instructas elatioribus ferre, praeterquam quod parum adierant commodi.

Quarta etiam notatu dignior subligaculo- rum pars, pulvillus est, qui compressae vices ge- reat, atque partibus e quibus herniae elatuntur imponi debet, ut sic in-pediatur quo minus vel intestinum, vel epiploon vel utrumque simul excedat.

Generalior regula exigit, ut quantum fieri poterit pulvilli effingantur minores, nam sic & utiliores & minus importuni evadunt, & praeter- rea ad peritonaei annulos commodius perve- niunt, nec ita facile de loco noventur ac gran- diores. Interim necessarium est eos tam varie effingere, ut illud describere sit impossibile, in hoc iudicium exercendum, advertendo ad her- niarum exitum unde tam multiplices enascun- tur effectus. Praecipue vero observandum ut praedicti pulvilli proportionentur parti cui im- ponuntur, nam aliquando requiruntur depressi & molliores, ut in subjectis macilentis, in qui- bus hernia non superit grandior, nec in inguine cavata; ubi vero cavitas adfuerit major minor- ve pulvillus exigitur plus minusve elatus ac tur- gens, ita ut cavitas repleatur, nec tamen pars ad atrophiam deducatur, quod evenit quibus- dam novis Sectatoribus qui instrumentis utun- tur acuminatis, quibus praeter dolorem substan- tiae deperditionem faciunt per impedimentum spi- rituum irradiationem, & nutrimenti appulsam; sic etiam annulos apertos servant, & unioni ad curam quam maxime necessariae, obstant.

Omnes herniae contineri debent in eo in quo egrediuntur loco, non vero in illo ad quem de- volvuntur, itaque semper supra os pubis debent reprimi adque coxam propius, ubi annulorum sedes est, & ubi vasa vitantur spermatica; nam si subligaculi scutum propius ad penem addu- catur dolor in praedictis patitur vasibus, quae inter pulvillum & os pubis sic arctius incarcerantur, praeterea cum os pubis sit hic elatius quam prope

prope coxam, impedimento est ne pulvillus cavitatem repleat, sicque hernia elabitur, praesertim inter sedendum, aut corpus curvandum, jam vero hoc attentius observandum ut devitentur mala quibus vix mederi valeas pro voto, cum sc. subligaculum elabi sinit intestinum, unde periculosissima nascitur strangulatio.

Regulam generalem flexionis subligaculorum quod spectat, attendendum ut circum totum corpus circumducta illi undique quam accuratissime & immediate applicentur, ne sc. facile de loco moveantur quod ipsorum operationi non parum officeret. Particulares flexionis differentias quod attinet, in variis subjectis, illa nullatenus possunt edoceri, & etiam, subligaculum quantum ante applicationem possibile, ad perfectionem suam deductum, necessarium est ipso applicationis momento varie flectere, ut corpori aptius accommodetur, propterea e melioris nota metallo constitui omnino debet.

Qui subligacula e filo ferreo conficere norunt hoc trunantur privilegio. quod sc. filum ferreum minus facile in variis sui flexionibus abrumptur, si fuerit melioris notæ; quod e Germania adfertur ineptum proflus est.

Hæc Subligaculorum species inter præclarissima reponi meretur inventa, nam sic omnibus prope in locis, nulla fabri ferrarii adhibita opera, subligacula & apta & firmissima possunt effingi.

Pro condendo hoc e filo ferreo subligaculo eadem quæ in subligaculo chalybeo sunt adnotata observanda veniunt, & quoad mensuram sc. & quoad ferri longitudinem, validitatem vero quod attinet, siquidem varia crassitie dantur fila ferrea, illud pro prudentia sua seliget artifex, aptum illi limitati suo subligaculo conciliandæ quam intendit. Observandum tantum quod cujuscunque demum crassitie filo utaris ferreo semper duplicandum sit, ad utrumque sc. subligaculi ut & ejus scuti limbum, & quandoquidem filum ferreum ejusdem est per totam suam longitudinem crassitie, igitur temperandum est ut ab ea parte cui corium alligari debet minus firmum evadat.

Conficiendum subligaculum postquam ad corporis modulum exegeris, & ad indicationes necessarias attenderis; validitatis aptæ filum ferreum seliges, ejus longitudinis ut commodè duplicari possit, & ab altera parte manuali aliquo instrumento flectes extremitatem tam ferri superioris, ut ex ea constituas scutum, vel a dextris vel a sinistris, ejus figuræ quæ aptam videbis pulvillo sustinendo herniæ tuæ continendæ accommodato. Hocce peracto producetura serra usque ad fili ferrei partem igne temperatam, ubi subligaculi futura est extremitas; indeque illud duplicabis, Quando secundus iste ramus duplicatus paulo ultra scutum deductus fuerit; cum priori subicies, & filo multipliciter complicato subligabis; tum ea extremitas quæ scutum excedet lima corradatur ut depressionem aliquam acquirat, postea eandem ad interiora contorquebis ad prædicti scuti figuram, ut illud e ferro duplicato contruatur, ut ipsum cingulum. Continuas validam ligaturam duarum extremitatum, quæ in unum scuti locum coibunt; postea subligaculum pro lubitu flectes duabus adhibitis manibus, flectere inci-

piendo quasi ovalem aut aliam aptiorem figuram contingere in animo eilet, recurvabis postea cingulum prope aut longe a scuto, prout necessarium fuerit altius illud applicare; reliqua & perfectior flexio malleolo conciliabitur, tantum ferreum interius leviter tundendo ut ad mensuram corporis exquiritè adaptetur.

Quando subligaculum pro voto efformatum habueris, duos ramos simul deligabis, eos invicem complicando, & tertia fila tres lineas lata circumducendo: Hæc ligatura duplici adhibetur usus, sc. validitatis æqualitatem ramis duobus conciliat, & præterea prima est subligaculi instructio, cui secunda e tela contexta, bombace, aut lana tenui & bene carpta repleta, per totam longitudinem interius adfuitur, ut sic ferrum minus lædat. Secunda hæc instructio non adfuitur quin prius extremitatem loro coriacea, clavo adhxo, vel tali spissiori ad aliquam longitudinem producta, arnaveris, postquam eandem illam extremitatem minima corrasam depresso rem tederis, ut sic minus crassa fiat atque minus lædatur.

Pauci admodum eudendorum subligaculorum ch. lybeorum sunt periti, nullique in provinciis Gallicis tales reperiuntur, quantumvis aliis instrumentis eudendis; apti interim illud utilissimum foret, cui ego pro virili me debordummodo urbium chirurgi attentiori animo & magno cum studio legere velint quæ hactenus à me hic fuere perscripta.

Verum quandoquidem n. enstra à me descripta fabro pro conficiendo subligaculo est ipsiusmodi, consulo unicuique chirurgus præfibi exemplar aptum ex unico filo ferreo ejus crassitie quæ facile flecti possit; ut sic apte curvetur ad figuram corporis cui applicari debet, & postquam filum illud ferreum ad corporis mensuram exquiritè exegerit, tum faber visò exemplari facillime subligaculum eudet, unicum supererit, scilicet præscribatur & crassities latitudo cinguli, cui demonstrandæ cartaceum omnino aptum fuerit: Scito quod attinet conficietur ad normam illius quod per flexionem filii in altera extremitate & quoad magnitudinem & quoad figuram necessariam, descriptum erit.

Habemus subligacula chalybæa fracta miræ inventionis; quæ sæpissime Magnatibus exhibui Unico aut duplici armantur scuto, prout libuerit.

Quæ duplex scutum gerunt per scuta sua disjunguntur mediante cochlea à dextris vel sinistris posita, hoc est si e duabus herniis quas reprimere necessarium est major à dextris fuerit, cochlea in eodem latere poni debet, & à sinistris, si hernia præ ipsa ipsi eo fuerit latere. Hæc cochlea insinuat in striarium cavum in altero scuto efformatum. Subligacula hæc, præter scuta sua & quatuor aliis concinnantur partibus, quarum prima, eaque brevissima, cochleæ continuatur; hæc à secunda secunda à tertia; tertia à quarta; & quarta à quinta concluditur; quintæ autem debet adigi lorum coriaceum validum pro subligaculo claudendo.

Subligacula fracta unico armata scuto, e quatuor tantum conficiuntur partibus quæ clavæ ferreo ita compinguntur, ut ad interiora teneantur.

tum flecti queant, sic magnum subligaculum in pera gestari potest. Eadem ratione mununtur et alia simplicia et chalybe aut filo ferreo, & in eo tantum differunt quod pro flectendis partibus clavo compactis, necessarium sit tria foramina, seu potius aperturas, in instructione quæ ipsis adhibetur, conficere.

Subligacula hæc sunt ad odum commoda atque præcipue iis qui de die & nocte ea gerere necessarium habent.

Omnia subligacula chalybea quæ noctu gerere animus est, latitudine trium aut quatuor pollicum breviora esse debent, quam ferant duæ tertie crassitie corporis partes, ut quando super subligaculi extremitate cubatur, mini ne sic scutum aut ejusdem pulviscus de loco moveatur.

Pro infantibus fasciis suis adhuc dum circumvolutis, aut ab eis excrementis se inquinantibus, componenda sunt subligacula quibus urina & sordes adherere non possint ut ea putrefaciant; eius conditionis sunt quæ et duplici fili ferreo tenui ramo concinnantur, ad modum quem supra in majorum descriptione enarravi, sed alia instruantur ratione, rami sc. duo non simul colligantur ut in majoribus, sed inter eos cartaceum reponitur legmen, duas aut tres lineas latum, circum adnecta valida et filo canabino tania, in totum cingulum producta, & etiam nullo ulterius pro pueruli crassitie, quod ultra cingulum producitur ter replicatur ut sic ligula coriacea quæ hamulo aut productioni ferreae scuto ex luteo ad magnitudinem olivæ confecta, alligata alligatur, vices gerat: mox memoratum scutum parva adhibetur lamella, quo peracto, interducitur tertia ramos ferreos inter & cartaceum per totam cinguli longitudinem, post cere albæ fusa per totam sui longitudinem exquisitè immergetur, ut sic ab urina non corrumpatur: frigidata cera cultello lavigabitur, atque ita subligaculum applicationi aptum habebis, quod de die & nocte gestum necessario hernias infantulorum intestinales, curabit, & iis minime molestum erit.

Pro umbilico conficitur etiam subligaculum ex chalybe aut filo ferreo, sed ad dimidias tantum, pro varia magnitudine corporis varie curvabitur ut in aliis dixi, in hoc tamen differt quod sc. partes quibus hocce in casu applicatur, sunt omnino dissimiles iis quibus alia admoveatur. Lamina media sit grandior & ovalis figuræ, aliquando rotunda; vastior conficitur hæc lamina, ut abdomen quod in obæsiis semper prope acuminatur, contineatur.

Si subligaculum hoc fiat pro intestino, & intestinum integre reduci valeat in media hac lamina collocatur mollior globulus ad umbilici formam constitutus, ut cavitas eo repleti possit.

Si subligaculum et filo ferreo construatur necessarium fuerit postquam laminam mediam duplicat. spissioris textus tela intruxeris, illi adhas aliam laminam et tenuiori subere Hispanico, aut et duplici carta lusoria confectam, prius appposito atque alligato hamulo ferreo illius laminæ per rei mediam. Hujus subligaculi cingulum latius esse debet, per vaginam lineam aut xylinam, quæ propterea ab utraque cinguli parte frequentibus densabitur punctis.

Subligacula omnia quantum fieri potest levia sunt facienda, siquidem eorum magis ponderus post aliquod tempus molestum est. Si materia et qua concinnantur melioris fuerit notæ, frigide facile auditur, & subligaculum exhibet leve, quodque eo validius est quo magis auditur, sicut tenuior lorica malleo probe cusa, ictibus fortius resistit, quam quæ et peioris notæ metallo & ponderosior fuerit.

Subligacula chalybea, ut & et filo ferreo tripliciter voluit vestiri instruan, tam quoad scuta, quam quoad cingula.

Primus instructus et spissioris textus tela canabina confici debet, quæ adhibetur tum lamine scuto sustinendo destinatus, tum cingulis; sed super memoratis laminis semper duplicari debet, ut sic scutum sive pulviscus, validius colligari atque parari possit, ut & hæc plus ferreus ipsi commode inherere valeat in subligaculis et filo ferreo constructis.

In omnibus subligaculis hamulus cui ligula coriacea connectitur in media lamina pui. illo subjecta semper collocabitur; hamulus vero ejus mucro ad inferiora vergit commodior erit, & indurum non lacerabit.

Ligula coriacea cui oscilla inseruntur pro claudendo subligaculo, et corio constituetur valido ne facile elongetur & oscilla confestim inseri possint, ut sic constrictio pro libitu fiat, & prædicta oscilla nullatenus lacerentur.

Secundus instructus cinguli vagina erit, de qua mox verba feci, & quæ compositus et fascia linea oblique scilla & gossypio aut lana repleta, post subtus cingulum chalybeum a pulvillo ad oscilla usque confuta. Hic instructus efficit ut ferrum minime lædat, utque rubiginem non contrahat; ejus loco potest etiam substitui limbus panni lanei tenuioris.

Pulvillorum secundum instructum quod attinet, multipliciter in forma et materia variant, forma pendet ab ipso artificis judicio; superius pronunciai minimos esse optimos, quod non ita intelligendum, quasi omnes eadem ratione efformari deberent, penes opificem erit magnitudinem aptam seligere.

Si necessarium fuerit pulvillum paulo longiorem conficere, adeo ut usque super os pubis ascendat, quia sc. intestini eruptio juxta illud os reperitur, parsque macrior est, oportet pulvillum sit mollior, ut prædictum os in illam pulvillum inferi queat, alias vacuum fiet in loco unde intestinum elabitur, & præterea si durior foret pulvillus hoc in casu, partem cui applicatur laderet; ut autem mollior evadat pulvillus replebitur lana carpta, aut gossypio.

Quando agitur de duriore conficiendo pulvillo, adhibebitur tomentum pannem malleo contritum, & in sacculum et largioris textus tela canabina immissem, qui sic melius super lamina ferrea collocabitur; pilus equinus ad id etiam assumitur, qui medias inter laminam et tomentum occupat. Aliquando subere utor Hispanico pro ea quam in pulvillo expeto duritiæ, semper satis lanæ superimponendo, ejusque bene carptæ; ut pars præ pulvilli applicati duritiæ non atrophietur aut marcescat.

Pulvillus pro Epiplotele, in iis qui magnum gerunt abdomen debet brevissimus fieri & obtusus, atque

us, atque in sui superiore parte depressus, latus, & inversionis commodæ, ut abdomen non lædat, nec effectum impediat quem ab ætæ compressione exquiris, hæc autem compressio per partem pulvilli inferiorem percutitur, quæ propterea magis aut minus tumebit, pro cavitate partis; observandum præterea quod semper pulvillus a parte coxæ magis turgere debeat, nec durior effici. Jam vero ut quilibet ligaculum gerit illud inferius quam par est appropinquare non valeat, in quo error committitur satis ordinarius, oportet pulvillum magis in transversum deducere, ut immediate intra os pubis semper remaneat, oportet præterea cum & molliorem & depressiorem a parte valorum & penis efformare.

Tempus mihi deficeret si tot pulvillorum genera, quot herniæ pro sua varietate contere cogunt describere tentarem, in hoc exercebitur artificis iudicium, nec mirum si qui chirurgie genus non satis possident, nihil boni contere queunt.

Medium omnium pulvillorum, cujuscunque demum fuerint formæ, durius esse debet, quam ejusdem limbi, excepto eo qui pro testiculo retento adhibetur: Necessarium autem est pulvillo luminis suis probe assuere, & postea corio ovillo albo, aut potius caprino tegere; eadem ratione tegitur cingulum, hæcque tertius & ultimus instructus est; futura vero cum pulvillorum, cum cingulorum, debet quantum potest a limbis eorundem removeri, ut sic minimè lædat.

Aliquando fascia quæ coxam conplectatur opponitur, cujus aliud extremum cingulo appenditur, aliud vero hamulo scuti alligatur; hæc autem fascia ante ligulam coriaceam hamulo debet inferi, ut sic solvi nullatenus possit.

Et quandoquidem sæpissime de vita proximi agitur qui subligaculis in suis herniis confidit, eorum faber per propriam tenetur conscientiam, se in hoc negotio peritum reddere, & omnes herniarum species nosse, propterea si artem cui se voverit dilexerit, in eaque delectetur peritus evadet, sin minus in difficultates multas impinger.

Debet præterea & prudens admodum esse, & in arcano tegendo religiosus, ne scilicet morbi ipsi commissi divulgentur. Inopibus etiam in charitate incurrer, ut sic ab omni parte conscientia satisfaciatur; sed potissimum quod ipsi impossibile est nunquam pollicebitur. *Nicolaus Le Quin Tractatus Gallico de Herniis.*

De Operatione in Herniis alias incurabilibus.

Herniarum causas cognitæ facile intelligi potest in quo consistat curationis ratio. Nam sicut causa herniæ est illius meatus apertio, seu per relaxationem, seu per rupturam: Ita curatio e contra ejusdem est meatus contrictio. Illa contrictio aliquando conficitur per pharmaciam, nempe per medicamenta atridiora, vel consolidativa intus exteriusque adhibita, & per Zonam simul gestatam cuius constrictione impeditur, partium prædictarum exitus extra illum meatum: quo impedit, paulatim meatus consolidatur, præsertim cum tan-

tum est dilatatio, & non ruptura; vel cum ruptura est exigua, & in ætate puerili. Interdum non potest per medicamentum, & Zonam curari, præcipue cum hernia est non a dilatatione, sed a ruptura, & quidem ruptura magna, ac jam antiqua, & inveterata, tunc enim debet curari per Chirurgiam, nempe, vel sectione, vel ulsione. Quando ergo per chirurgiam curatio instituitur, tota ratio eius in eo consistit, ut illi meatui, seu dilatatione seu ruptura dilatati contringantur. Contrictio illa non fit per sectionem, sed sectio præcedere debet, ut postea contrictio fieri possit. Contrungi cum meatui non potest, nisi prius sectio ad meatum usque fiat, & tunc per quam Chirurgus ad meatum illum possit pervenire, ac cum possit contingere, non enim potest meatum contringere, nisi prius ad eum manibus pervenire possit. Cum ad meatum non perveniri potest, tunc ille vel sutura, vel ulsione, vel strictura sili aurei aut plumbei circumducti coarctatur, de quo latius.

Interim ex præcedentibus & ex eo quod sectionis hæc sunt pericula colligere potestis, quod non facile, neque tenere ad eas sit progrediendum. Nam si tantum sit hernia inguinalis, quia illa tantum est incipiens, & incompleta, & tantum a dilatatione peritonæi, & quia ibi omentum vel intestinum facile per Zonam retundi potest; ideo sectio non est necessaria, sed tantum per pharmaciam cura est instituenda, nec propter parvum malum debet tam periculosum remedium sustineri. Si etiam si hernia seroti, & sit parva; sic ut omentum tantum incidat, non est opus sectione; omentum enim quia superius est ligatum, non potest procul, & non nisi exigua sui portio in serotum incidere, & sic illa hernia non est tam magna, ut tantum remedium exigat. Si sit maior, sic ut intestinum in serotum incidat, sitque parva & recens, & in juvenili ætate, primum tentanda est cura per medicamenta: nam sæpe adhuc curatur, & ideo non est temere ad sectionem veniendum. Si inveterata sit, & tumor maximus, & pharmaciam omnis frustra adhibita, tum primum de sectione debet cogitari: debet autem ea fieri in ætate juvenili, senilis non sufficit tanto remedio ferendo. Est porro hæc sectio omnis valde periculosa.

Verum quia plures ejus differentia sunt, illa quæ fit modo ordinario, quo utuntur Empirici, & circumforanei, hernias seceantes, quæ scilicet cum exsectione testiculi fit, omnium est periculosissima: quæ vero fit per punctum aureum vocatum, etiam etiam sit valde periculosa, minus tamen est periculosa præcedente. Insuper quæ fit modo empirico, exponit hominem periculo sterilitatis, propterea quod fiat cum ablatione unius testiculi primo, si hernia sit ab utroque latere, & ab utroque latere fiat sectio, facit hominem absolute sterilem, quia talis fit cum ablatione utriusque testiculi. Vero aureum non auferit testiculos, ideoque hoc periculum sterilitatis non adducit. Sed in universum modus Chirurgicæ curationis est triplex. Vnus fit per ulsionem. Secundus est ordinarius, & communis empiricorum, & fit cum extractione testiculi; Tertius, vocatur

punctum aureum, propterea, quod fiat cum filo aureo, meatum per quem intestina labuntur, contrahente.

Primum modum curandi per unctionem docent, Avicenna, Rhafus, Nicolaus, Theodoricus, Guido, & alii. Alii autem faciunt eam cum cauterio actuali, alii potenciali, qui istum modum docent, dicunt, quod æger debeat collocari supinus, cruribus elevatis, capite depresso, quodque intestina, si excederint, debeant intra abdomen reponi. Inde, inquit, debet aduri, super inguen cum cauteris ignitis, usque ad os pubis, eo scilicet loco, per quem descendere solebant intestina: & debent heri unctiones plurimæ, incipiendo à sursum, & descendendo per totam regionem rupturæ. Tunc curandum est, ut escharis collapsis loca ulsa consolidentur, & cicatrificentur, & ut æger interim 40, diebus maneat supinus, nec moveatur, ut intestinum non descendat. Cavendum autem est, ne intestinum aliquod vim ignis sentiat, nec vasa quoque spermatica; nam sic virtus generandi laderetur, quamvis, inquit, ægre heri possit, ut illa non ostendantur. Theodoricus, & Guido, docent, unctionem facere cum potenciali composito. Ergo, ut prius, ægro & intestinis intra abdomen repositis, laxiorem productionis peritonæi partem, unaque spermatica vasa, & cremasterem musculum ad ischii os adducunt: tum reliquam processum peritonæi partem caustico medicamento validiore, vel debiliore, pro ratione corporis morunt cauterio recta ad ossis perpendiculari affixo ea parte, qua intestinum prociidebat, escharam, quæ inde producet, ad vivum usque divellunt. Tum aliud iterum causticum, eidem loco, quod ad os usque exurat apponunt, ut sic processus ille peritonæi aduratur, & in escharam convertatur, tum faciunt medicamentis, ut illa quoque eschara cadat, & in locum escharæ caro, & dura cicatrix, ac quasi callus succrescat. Nam cum processus ille peritonæi, per quem intestina incidere solebant, sic dura ac solida, ac callosa cicatrice est obstructus, sit, ut omentum, & intestina non possint amplius per ipsum in scrotum prociidere. Hæ ergo unctiones ea ratione curant heriam, quatenus faciunt talem constructionem, & coarctationem in loco, in quem intestina relabuntur, ut deinceps delabi per illum non possint. Cardanus Comment. ad Aphor. 27. l. 6. Hippocr. ait; quod ille modus sit facilius, & securior quam secundus modus, qui ordinarius, & empiricus dicitur, quique cum exsectione testis sit, idemque etiam Paræus. Verum tamen monet, ut ista curandi ratio tunc non tentetur, quando ipsum omentum, vel intestina ipsi processui peritonæi tam fortiter sunt agglutinata, ut inde divelli, & in locum suum compelli non possint: tum enim intestina adustione illa tangerentur & violarentur, unde gravissima mala sequerentur. Secundo etiam, ut non tentetur, cum illius processus dilatatio est valde magna, aut cum processus est ruptus, & intestina magna mole excidunt, tunc enim uestio ad curandum non sufficeret; quia satis callosa cicatrix non esset tunc satis fortis ad illum molem incumbentem retinendam; sed effringeretur & malum recideret. Tertio, ut etiam non tentetur, cum ægri

adhuc in illa ætate sunt, in qua non possunt se immotos continere, & excrementa alia ad arbitrium tenere.

Secundus modus, qui est ordinarius, & empiricus, & per sectionem sit, describitur à P. Ægineta c. 65. lib. 6. & sit hoc modo. æger debet collocari supinus super scammum, aut mensam, cruribus divaricatis, & extensis, non autem curvatis. Tunc intestina reponi intra abdomen, & retrudi diligenter debeant: & porro palpandum est, ut testiculus sit in bursa, un vero sursum retractus. Si sit in bursa, erit tum atramento faciendum signum, pro vulnere faciendo; vulnus debet heri in inguine lateris, tam alte aut paulo altius, ac est origo seu radix penis. Obliquum debet esse vulnus, longitudinis fere duorum digitorum transversorum. Huius signo sic atramento notato, debet cutis in illo signo apprehendi, & secundum latitudinem transversam plicari, sic ut plicatura, cum linea notata, faciat crucem, & unum extremum plicaturæ tenebit, & attollet lamulus assistens: alterum extremum, quod verius se est, attollet sinistra manu, ipse Chirurgus. Tunc secundum, & supra lineam ipsam, cum rasorio facienda est sectio profunda. In vulnus debent immitti duo digiti anteriores, & cum his vasa spermatica, & processus peritonæi, illa vasa cingens, apprehendi, & a paribus, quibus adhæret, violenter separari, & separata uno cum testiculo, ipsis vasis annexo extrahi per vulnus factum. Cum extrahuntur, & extra vulnus pendent, debent vasa spermatica, & processus peritonæi illa vasa circumdant, altiori, quo possunt loco, ligari serico filo valde longo, & tunc sub locum ligaturæ amputari: alii amputant tantum, alii extrema in super adurunt. Quod amputatum est, nempe testiculus cum portione illa vasorum spermaticorum, & processus peritonæi, terra mandari potest; quod supra amputationem est, ei corpori interius adhæret, reponi per vulnus intra abdomen debet: sic tamen, ut fili oblonga particula extra vulnus pendula maneat, quo postea possit filum extrahi, ut in corpore non remaneat. Per foramen potest olei aliquid rotari immitti: penicillum cum oleo rosato, & vitello ovi imponatur, & desuper stuppa cambrina cum unguento stiprico, & repellente, quod sanguinem compescat, & inflammationem arceat, ex albumine ovi, aceto, oleo rosato, bolo, sanguine draconis, &c. Ad latus vulneris interea multiplicata, quasi pulvinare quoddam ad comprimenda labra vulneris adhibeantur. Postquam intra corpus, quod sub ligatura est conputruit, & filum decidit, filum extrahendum est: extracto, vulnus curandum, claudendumque. Interea dum illud quod sub filo est, putrescit, & decidit, generatur caro & callus durus in locum vinculi decidentis, qui callus extremum processus peritonæi abscissum, per quem intestina incidebant, & seminarium vasorum, qui in illo processu sunt, occludit & obturat: Illo extremo sic per callum occluso non possint deinceps per illum processum intestina delabi in scrotum, & illa hernia est curata. Si hernia sit ab utroque latere, quod jam de uno latere dictum ab utroque esset faciendum.

Tertius

Tertius modus vocatur aureum punctum. Vocatur autem sic, quod fiat stringendo cum filo aureo. Verum est notandum, quod sub hoc puncto acro comprehendantur varii modi operationis, qui omnes vere & proprie non deberent dici punctum aureum, cum non hant omnes cum filo aureo, nec omnia hant eo modo, quo punctum aureum proprie dictum, tamen improprie vocentur punctum aureum, & comprehenduntur sub eo per hoc, quod tere sic fiant, sicuti punctum aureum, & in eo cum puncto aureo, ab empirico, & ordinario secandi modo differant. Hac lata puncti aurei appellatione sunt plures aurei puncti modi.

Primus est; Aegro supra mentem collocato, & repositis si exciderint intestinis in inguine, supra radicem virgæ, fiat oblonga, & obliqua sectio, tam profunde, quo uique perveniat ad vaginalem peritonæi processum. Cum jam ille processus detectus est, debet blande digito à circumjectis partibus paululum separari, ut sub illo aureum filum duci posset. Cum ergo separatus est, tenue aureum filum, crassitudinis aciculæ majoris, subcurvum, sub illum processum duci debet, duplici circumductione, circumducti extrema debent conjungantur dissolvantur. Itaque debent per tenacula ferrea sibi mutuo intorqueri; Ab intortis, quod superest debet abscindi, & extrema abscissionis ita deorsum, & ipsi nodo implicari, ut ipsa circumjectas partes non pungant. Hoc est proprie punctum aureum, quo hernia curatur hac ratione, quatenus scilicet per illud filum aureum circum vaginalem peritonæi processum circumductum, ipse processus qui antea laxatus, vel ruptus, & per quam propterea omentum, & intestina in scrotum incidabant, ita contrahitur, ac coarctatur, ut illa deinceps non amplius per illum dilabi possint. Verum sciendum est quod cum per illum processum debeant naturaliter spermatica, & deferentia vasa transire, ideo illa attritio per filum aureum non debet esse nimis arcta; nam si esset arctanimis, tunc illa vasa ita comprimerentur, quod per ea non posset esse materię seminalis transitus; & sic homines imprimis fierent steriles. Deinde, si nimis arcta esset, testes qui sub loco constrictionis sunt, putrescerent, quia privarentur fluxu sanguinis alimentarii, & spiritu vitalis, qui per illa vasa spermatica ad testes debent pervenire. Debet ergo strictio cum filo aureo esse moderata, sed ita arcta, ut nec omenta, & intestina per illum meatum & circum aureum circumductum ei prolabi possint, & tam laxa, ut commode, & sine coarctatione possint spermatica, & deferentia vasa per eum transire.

Notandum propterea, quod in pueris strictio debeat minor esse, quam in adultis, propterea quod pueri adhuc debent crescere, & ille processus & vasa spermatica debent in iis cum ætate adhuc ingrossari. Itaque debet in iis strictura proportionari crassitudini, quam processus, & vasa illa sunt habitura in adulta ætate, ut illa nimium tunc adhuc sit satis libera, & laxa in ætate profecta, quia illa vasa non amplius crescunt. Potest strictio proportionari crassitudini processus, qui tunc est. Filum illud aureum debet ibi tota vita relinqui, & vulnus factum debet desuper uniri, ac consolidari, modo quo alia vulnera curantur. Postmodum debet æger adhuc 30. diebus

in lecto contineri, capite demisso, & pedibus in altum elevatis ne intestina contra partem sauciata, & à sectione & contractione debilitata incumbendo, eam dolore, & inflammatione afficiant. Capitur vero ad hanc rem filum aureum potius quam alterius metalli, quia illud est imprimis valde flexile, & ideo apprimè accommodatum, ad ita facile intorquendum. Secundo illud metallum in corpore remanens non corrumpitur, nec putrescit, nec æruginem contrahit, nec maligna qualitate afficit partes, quas attingit. Et hic modus est proprie dictum punctum aureum.

Secundus modus puncti aurei est, qui fit fere eodem modo, sed non omnino. Differt autem à priore, quod filum, quod circumducitur, processus illo peritonæi, ad eum constringendum, non relinquatur in corpore, sed postea educitur, qui modus à nonnullis ideo est excogitatus, quod putent, malum esse in corpore metallum aliquod, aut aliquod naturæ nostræ heterogeneum, in corpore relinqui. Incidunt ergo in inguine, ne prius, & processui peritonæi seu vaginali, eo modo, quo antea dixi, uno tantum circulo circumducunt, virgulam plumbeam, & quantum sufficit coarctando intorquent, & simul extrema virgulæ, quæ longiora esse debent, extra vulnus propendere simul, tum ægrum in lecto continendo expectant, donec naturam in loco coarctato jam callum duxisse verisimile sit. Cum hoc factum arbitrantur, eam virgulam plumbeam iterum evolvunt, & explicant, & blande extrahunt, & tunc vulnus consolidant, & tunc hernia est curata, hac nempe ratione, quatenus in loco illius processus vaginalis, ubi coarctatio à filo plumbeo facta fuit, est à natura productus callus, qui facit quod ille processus non amplius possit dilari, & intestina non amplius possint per illum (ultra locum, in quo callus generatus est) procidere, qui callus non potuisset à natura produci, si processus ita laxus permansisset, & si locus per circumductum ejusmodi plumbeum, filum non fuisset sic coarctatum. Ideo autem hi capiunt filum plumbeum, & non aureum, quia plumbeum adhuc est mollius & ideo postea facilius extricatur & educitur, quam filum aureum. Verum mihi non placet iste modus, quia imprimis per hoc, quod filum aureum in corpore remaneat, nihil mali potest corpori inferri. Videmus enim aliquos globos plumbeos multos tota vita in corpore sine noxa gestare. Secundo, quia non puto per ejusmodi callum inductum, sufficienter herniam curari posse, præcipue, si magna sit: nam incumbens denuo magnum illud intestinorum pondus supra calli locum, cum facile effringere potest, neque videtur, quod callus semper tam fortis generabitur, qui possit incumbentibus intestinis resistere.

Est & tertius modus filii aurei, quem ex Paræo vobis tradam, & est talis. Incisio fiat super os pubis, in vulnus imponatur specillum simile cannulæ. Illud specillum per foramen sub peritonæi processu, secundum ipsius processus longitudinem impellatur, tum surrigendo specillum, divellatur eo dictus peritonæi processus, à vicinis, & fibris nervosisque partibus, quibus adhærescit, mox & spermatica vasa à cremastere, testiculi musculo, abstrahente. Quibus perfectis, Chirurgus ipsum processum seorsum adducet, ejusque quantum laxius est, exiguis, & laxis tenaculis, so-

raminibus in medio præviis comprehendet, atque acu duplex filum ducente transadiget, proxime, prope vasa spermatica, & cremasterem testiculiculi musculum, sed & iterum ducenda erit acus in ejus, quod ex processu peritonæi restat medium, una cum prehensis vulneris labris: tum arctio modo filum restringendum est, & postea perfectandum: sed ipsius tantum relinquendum est, quantum satis est, ut extrorsum à vulnere pendeat, illud filum putredine sensim ex se dissolvente, nec vero ante abstrahendum, quam natura in ligaturæ locum carnem generaverit & repositur, alias frustra omnis labor. Inde vulnus detergendum, carne implendum, & cicatrice obducendum, cujus callosa durities delapsuro iterum intestino, vel omento obstabit. Hunc modum illis verbis describit Paræus, & ponit in modos puncti aurei, quæ vis proprie non sit punctum aureum, sed ab eo multum divisum. Ideo tantum nomine puncti aurei appellatur, quod sit sine exemptione testis, sic ut punctum aureum, & quia in hoc cum puncto aureo convenit, quod sicut in puncto aureo processus ille peritonæi, seu meatus vaginalis, in quem ruptum, vel laxatum, intestina, vel omentum incidit, mediante filo aureo circumducto, constringitur, & moderata strictione contractatur. Ita in hac operatione, idem processus primo mediante futura, postmodum vero callo in futuræ locum succedente arctior sit, quæ arctione fit, ut omentum & intestina non amplius per eum incidere possint. Verum Paræus hunc modum valde obscure describit, & multa sunt, quæ vix intelligi possunt, nec ipse intelligo. Interim tamen notandum, quod hæc sit summa operationis, nempe ut in inguine oblonga sectio fiat, donec processus vaginalis detegatur: cum est detectus aliquo specillo seu instrumento, à vicinis fibrosis partibus blande abducitur: cum est abductus, videatur quantum processus ille excidat in laxitate, vel ubinam sit ruptus, & quanto sit meatus ille laxior quam debeat esse, aut quam pro transitu spermaticorum vasorum requiretur, in quanta parte laxitatis excedit, in tanta debet mediante futura conjungi, sic ut sufficiens tantum portio cavitatis restet, per quam libere spermatica vasa possint deferri, sic ut non sit totus processus suendus, aut futura occludendus, sed tantum aliqua portio unius lateris ipsius. Ut autem futura illa commode fiat, debent vasa spermatica, quæ in isto processu sunt, ad unum latus illius processus seu meatus abduci, nempe ad latus, quod non debet sui, ne ab acu pungatur. Tunc portio ejus quæ superflua est in laxitate debet apprehendi, & attolli, & conjuncta una cum labris vulneris, aut cum ipsa cute sui, cum filo serico, cujus extrema extra vulnus pendeant. Sutura facta, tam diu æger in lecto detinendus est, donec filum putrescat, tunc in locum futuræ à natura generatur callus. Callus in illa portione superflua laxitatis ipsius processus productus sit, ut ille processus sit strictior, & quia sic strictior factus est, sit, ut omentum, & intestina per ipsum non possint amplius decidere, callo nempe transitum impediente. Verum quia totus processus non est sic futura, nec callo occlusus, sed tantum portio ejus, quæ erat superflua in laxitate, aliqua vero portio ejus est relicta, & non confuta, & consequenter, in ea callus non est factus, ideo per illam possunt vasa spermatica li-

bere transire; Ergo per hæc operationem hoc efficitur, ut ille processus peritonæi pro tanta solum portione restringatur, pro quanta erit nimis laxus, quo fit, ut hernia curetur, & tamen seminaris vasis transitus non impediatur, atque si sunt aurei puncti, & omnium herniæ sectionum modi.

Modo quaeritur, an hæc sectiones in viris tantum, an vero etiam in mulieribus locum habeant? Videtur enim, quod non habeant locum in mulieribus; quia hæc sectiones maxime sunt pro hernia scroti, ea autem mulieres non laborant. Secundo omnes hæc sectiones sunt pro hernia, quæ fit ab omento, & intestinis incidentibus per illa foramina peritonæi, quæ sunt in inguinibus, per quæ vasa spermatica extra peritonæum ad testes extra corpus pendentes feruntur, & sic tantum pro illa hernia, quæ fit ab omento & intestinis in processum illum peritonæi à dictis foraminibus ortum habentem, & usque in scrotum, per modum canalis pendentem, decidentibus: atque illa foramina peritonæi, & illi processus non videntur in mulieribus esse; Ergo illis hæc sectiones, quæ pro tali hernia fiunt, non videntur locum habere. Quod talis processus, & foramina in mulieribus non sint, docet Vesalius c. 2. l. 5. & ratio videtur suffragari; quia illi processus, & illa foramina tantum sunt facta, ut per eos deducantur vasa spermatica, extra corpus ad testes, quia testes earum interius latent, ergo non sunt in iis foramina illa aut illi processus. Verum respondeo Vesalium in eo errasse, ut Colimbus, Fallopius alique notaverunt, quod mirum est, & ideo dico in mulieribus etiam illa foramina & illos processus peritonæi esse, verum per illos non deferuntur in eis nec spermatica, nec deferentia vasa ad testes, sed uteri musculi, cremasteres, & sic quia illos processus & foramina etiam habeat, ideo quoque in eis hernia illa, quæ ab omento & intestinis, in illos processus delabentibus, fit, contingit, quæ hernia in illis, tamen non est hernia scroti, cum scrotum non habeant, sed tantum hernia inguinis. Verum cum hernia inguinis eodem modo, & ab eadem causa fiat quæ hernia scroti, & hæc sectiones etiam in hernia inguinis locum habeant, etiam hæc sectiones in curandis mulierum herniis locum habent. *Thom Frenus de præcipuis Artis Chirurg. controversiis.*

Consultationes.

De dolore colico & hernia Bubonocæle. Pro Illustrissima Matrona Angla.

Dolor ille, quem à multis annis in ventre inferiori non raro recurrentem patitur Nobilis Matrona cum nausea, vomitu, & adstrictione alvi, quique aliquando annexum habet tumorem insignem in inguine dextro, cumque valde dolorificum, & insensibiliter evanescentem, alius non est, quam colicus, excitatus à flatibus in intestino colo conclusis, & præsertim in regione ejus dextra, ubi facta peritonæi dilatione, ex prolapsu intestini ilei, illa herniæ spurie species suboritur, quam Græci bubonocelen vocant, quæque plurimum sponte subsidet, ubi primum flatu discusso, inopinante recurrit in naturalem situm. Flatulentæque hæc materia elevatur ab humoribus crudis in ventriculo genitis, imbecilliore redditocum ob errores præteritos, tum & magis ob intemperiem frigidam, & humidam ejusdem ventriculi.

Affectus

Affectus equidem curatu difficillimus, cum sit antiquus, & confirmatus, qui propterea, nisi congruis remediis occurratur, vel in liccum hydropem definet, ex Hippocrate 4. Aph. II. vel in paralyfin, populis Transmontanis familiarem: vel Iliacam saltem passionem, propter nauseam, & vomitum in dies graviores factio. Propterea medicis præsidus tentandus est.

Ac proinde præmissa universali corporis expiatione blandioribus lementibus, præparantibus, & purgantibus, attenuandi, incidendi, & evacuandi sunt humores peccantes, flatus discutiendi, ventriculique & intestina calefacientibus sunt corroboranda variis præsidiorum materiis.

Propterea si nobilis Patiens haferit Patavii, totum hoc negotium absolvetur aquis Thernialibus, primo Iettutianis, cum melle ros. sol. triduum assumptis. Hæ etenim sua talsedine attenuabunt, detergent, & evacuant materiam peccantem per alvum; deinde aquarum Apontanarum intervallo usu, & externo forma nullicidii administratis: discutient enim flatus, & intemperiem corrigent, calefaciendo, & exsiccando. Quod si alibi locorum curæ Medicorum se commiserit, tunc decoctum præscribi poterit, præmissa semper universali purgatione, quod parabitur ex lassafra, tamarisco, seminibus feniculi, dauci, in jure Galli junioris saliti, præmisso bolo ex castoreo, & Theriaca antiqua, interpolitis clysteribus attenuantibus, detergentibus, & discussoriis ex melle ros. sol. electuario de benedicta laxativa & de baccis Lauri, cum oleo rutaceo, & decoctione cymini, fœniculi, utriusque centaurei, & florum chamæmeli. Conferet quoque summopere familiaris usus specierum Hieræ simplicis, & aliquando Hieræ Archigenis, cum castoreo, additis à proprietate juvantibus; qualia sunt intestinum lupi exsiccatum, avis Galerita uita, & in cinerem redacta, ad unc. i. hæc tamen lege, ut ligaturam sibi curet parari herniosis familiarem, cujus beneficio compressa continuo decineatur dextra pars, quæ intumescere solet, metu scil. volvuli, a quo præsens imminet periculum, si ea solutus fuerit. Pro ventriculi corroboracione vinum generosum absinthites, ex usu erit; vel aqua vitæ, cum cinnamomo, si buccella panis prædictis intincta summo mane singulis diebus sumatur, mensis circiter spatium, & alvus continue lubrica servetur pilulis de hiera cum agarico.

Cæterum congrua victus ratio instituat, omittis placentis, lacticiis, limacibus, piscibus palustribus, aliisque omnibus flatulentis, & crassi succi, ac difficilis coctionis. *Bened. Silvaticus Consil. & Respons. Med. Cent. Iij.*

De Hernia Sarcocœle, Tumore lienis, & Dolor ad os Coccygis. Pro spectabili Mercatore Vicentino.

Ingenuus juvenis, temperamenti calidi & sicci, gracilis, octo abhinc annis gonorrhœa virulenta menses aliquot laboravit, quæ alexipharmacis extincta, aliud nullum symptoma Gallicum ab eo tempore se prodidit. Nunc vero de

tribus aliis potissimum affectibus sunt quærenda: tumore scil. ingui, duro, & doloris experte in hypochondrio sinistro, in totum fere anteriorem ventrem distulo; & quidem a pueritia, non licet. Huic accessit ab anno tumor alius in inguine sinistro, propagatus ad sinistrum testiculum, qui lentini ad magnitudinem ovi aucterini excrevit, dolorincus antehac, attollens se, & subsidens, nunc vero consistens, durus & doloris expertus. Accedit & dolor ab eo tempore in articulo sinistri femoris, mox circa os coccygis, ubi nunc continuo cum torquet, licet non acutus, invalescens tamen per vices, cum potissimum equo vehi cogitur. Copiosa insuper illi fuit elapsis annis expulcio materiæ aquosæ, quæ nunc omnino fere nulla est.

Ex enarratis constat tres esse partes affectas, lienem scil. testiculum sinistrum, & politremas dorsi vertebra; quarum & varii sunt affectus. Lien siquidem afficitur tumore scirrholoso, duro, doloris experte, ad inferiora declivi, amplo, totum fere abdomen obsidente; qui licet in pueritia ortum habuit ab heterogenea materia, crassa, & melancholica, a febre diuturna superficite, & cruditate puerilibus annis coacervata, ob errores in victu, ita nunc sensim adeo excrevit, & continuo hujusmodi materiæ pituitosæ & melancholicæ confluxu, ut inscirrhum verum, & legitimum obduruerit; ad inferiora declivem, ea mole, & amplitudine quaquaversum, cujus Hipp. meminit 2. in 6. Epid. 34. his verbis: Lien durus, non superius, sed inferius, latus crassus; ut propterea non comprimat diaphragma, ac proinde respirationem gravem non efficiat, sed decumbente saltem ægro in latus dextrum, pondere quodam sit molestitus. Testem autem sinistram tumor occupat carnosus, sarcocœle à Græcis nuncupatus; vel potius scirrholosus, amplius, ad lividum vergens, ab hujusmodi materiæ heterogeneæ decubitu, per vasa spermatica ad partem affectam; præpollente tamen melancholia, ut ex colore patet. Dolor tandem primo ischiadicus, mox circa extremam spinam, seu os coccygis, causam habet catarrhum, a capite calido & humido ad partem affectam ex frequentibus equitationibus in becilliolem decumbentem: quæ prius ratione Hipp. ævo Scythis contigit, ischiadi opportunis ob equitationem continuam.

Quorum affectuum alii sunt incurabiles, alii difficillimæ curationis; quam alii admittere possunt. Incurabilis est scirrhus lienis; quippe antiquus, & confirmatus, ex Gal. 2. ad Cræc. 4. ubi de scirrho; nec solum incurabilis, sed hydropem quinetiam minatur, ob consensum jecoris. Non tamen propterea medicis præsidus supersedendum, præservacionis saltem causa.

Præmissa itaque totius evacuatione, utrumpanda erunt emollientia, attenuantia, & sensibilibiter, ac insensibiliter evacuantia, quorum ope dolori quinetiam coccygis occurremus, ratione autem sarcocœles putrefacientibus, & sensibilibiter evacuantibus utemur.

Leniatur autem alvus melle ros. sol. & syrup. de polypodio composito, cum decoct. cord. Præparentur humores oxymel. sin pl. syr. de pomis, & melle ros. simplici, cum decoct. betonicæ, fumariæ, lupulorum, agrimonie, & cetrach.

cum decoct. betonicæ, fumaricæ, lupulorum, agrimonicæ, & cetrach. Purgentur demum agarico trochisc. & solusennæ, in decoct. cord. infusis, addito syr. de polyp. compos. & manna electa. Repetatur mox ipsorum præparatio validioribus attenuantibus, incidentibus, & emollientibus, puta syr. de fumarica composito, deponis composito; & byzantino cum aceto, addita decoct. radic. fœniculi, asparagi, cortic. radic. cum capparum, & althææ, præmissa drachm. i. ammoniaci, boliforma, assumpto alternis diebus decocto epithymi Mesues loco prædictæ decoctionis: quorum unus erit novem dies. Repetatur tandem purgatio extracto hellebori nigri, confect. hamech. & elect. lenitivo. A quibus jus galli antiqui ex usu erit, sic paratum.

24. Cortic. radic. capparum, fraxini, asparagi, an. unc. sem. radic. emulæ campanæ, fœniculi, malvæ, an. unc. i. seminum cardui sancti cymini an. unc. ij. incidantur incidenda, contundantur contundenda, & immittantur in ventrem galli antiqui, flagellati, deplumis, & eviscerati, atque decoquantur in libris x. aqua fontis, & tribus libris aceti, lento igne, ad perfectissimam carnis cocturam, addito sptene bov. minutim conciso; factaque forti expressione, subidentia, & colatura servetur ad usum; cuius singulis matutinis horis assumantur unc. v. cum decem guttulis chalybis potabilis, præmissa drach. i. ammoniaci, viginti diebus spatio; usurpatis interim clysteribus ex crassiori juris parte, cum mel. ros. solut. oleo chamæmel. & decoct. carminativa; præscripto exercitio duabus horis ab epoto jure; atque applicato lini cerato ex ammoniaco dissoluto cum aceto & succo herbæ reginæ, Cui parti apprimere quin etiam conferrent luta emollientia Divi Bartholomæi in agro nostro; vel stillicidium ex oleis chamæmel. anethino, liliorum, rutaceo, & laurino. Ceratum Rualis item 7. ad Almanforem, omnibus scirrhis accommodatissimum, sic paratum.

25. Bdellii, ammoniaci, galbani an. partes æquales, oleo icino, vel liliorum alb. emolliantur in mortario calido; deinde adde mu.ilag. fœnugr. & sem. lini. ad pondus omnium, atque additis caricis pinguib. fiat emplastrum, applicandum, præmissa fomento ex decocto malvæ, althææ, & fœnugræci. Sudor autem tunc temporis excitari poterit in aquis Thermalibus, vel in roseæ, ad umbilicum, utque quo discutiat materia in extrema spina impacta; applicato deinde cerato sacro, vel citrino. Sarcocoele item difficillima est curationis; ad quam nihilominus commendatur quammaxime a Matthiolo radix ononidis pluribus mensibus assumpta: cui tamen præferrem curationem Hieron. Fabricii ab Aquapendente, libro primo sui Pentateuchi Chirurgici cap. 29. ut nempe citius patefiat tumor in medio scroto dummodo herniæ carnosæ accedat aquosa, ac deinde immitatur turunda longior, medicamento pus movente oblita, puta Terebinthina, cum thure, ovi vitello, & butyro; superaddito emplastro de melliloto, vel diachylo, primo cum butyro, seu de pinguedinibus, mox ex gummi parato idque plures dies, absque puris evacuatione. Hoc enim citabit pus, atque ita per partes putrescet tota caro superflua; exsiccata deinde, & cicatrice obducta parte. Quod si

non observatur aqua, superledendum erit operatione illa; siquidem sive sectio fiat, sive non, res periculi plena est, solaque perforatio gangranam inducere pollet. Atque hæc in medium attuli, patientis precibus potius satisfacturus, quam de ægri valetudine ulla spe concepta. *Idem ibidem.*

De Hernia Enterocoele. Pro Nobili Raguseo.

Tumor ille, quo laborat generosus patiens in inguine dextro sex abhinc mensibus, alius non est, quam qui à Græcis *ἑλμῶν*, à Latinis vere Hernia nuncupatur. Cujus cum plures assiguentur differentiz, epiplocele scil. sarcocoele, hydrocele, phlyocoele, & enterocoele; pro varia materia eam producente, omento scil. descendente; vel carne adnata, aqua, flatu, vel intestinis ipsis; hæc species enterocoele censenda est; cujus utpote causa est intestinum extra peritonæum protuberans, in eam quandoque molem, quæ manuum compressam æquet. Est tamen imperfecta; intestino non prolabente in testem, vel scrotum sed hærente in inguine: quo nomine a parte affecta, bubonocoele nuncupanda venit.

Cujus causa est flatuum, & humorum pituitosorum copia; qui antehac in ventriculo coacerati, ejus dolorem, nauseam, & vomitum induxerunt; atque ad intestina, & peritonæum decumbentes, hoc potissimum dilatato, & laxato, illapsum intestinum ad inguina, tumorem in co excitant, dolorificum, ac sensim incrementem ex in essu; quod sane non contingeret, ex rupto peritoneo, quinimo intestinum confertim protuberaret, nec tanto cum dolore. Causæ autem producentes hanc pituitæ copiam, sunt errores in victus ratione; cum decubitu materiz catarrhalis à cerebro humido ad ventriculum: quæ vero eandem in ventriculo genitam ad intestina propellunt, sunt magno conamine concitatus vomitus, exercitia violenta, & equitationes, verbo, errores externi.

Quæ cum ita se habeant, quoad essentiam, & causas præsentis affectus, si de prognostico sermo sit; quanquam herniæ in adultis plerumque sint insanabiles; de hoc tamen in bona spe sumus; nec diffidit forsan negotio, cum quia recens est, tum quia imperfecta, tum potissimum, quia levius, tumore vix conspicuo, compresso licet spiritu, tussis excitata, & adhibitis aliis conatibus, soluto cingulo; quanquam sensum excrescat, cum aliquandiu ambulavit discinctus patiens.

Curatio autem in eo sita est, ut exsicceretur, adstringatur, & roboretur pars affecta; prohibeatur generatio materiz, quæ illuc confluit; vel saltem alio divertatur; præmissa totius curæ, exigente usu; quod ideo monemus, quia fortè abunde fuerint externa, & quidem leviora præsidia.

Nunc itaque sufficiet, ex medicis præsidiis, ceratum adstringens magistrale, quod hic prostat, parti affectæ applicatum, obductum membræ pergamene, aceto imbutæ, superaddito cingulo, continuo gestando, cum accommodata victus ratione, in qua abstineat ab omnibus cibis flatulentis, & crassi succi, quales sunt placenta, legumina, brassicæ, lactaria, rapæ, calturæ,

caros

carnea bubula, lipocina, suilla retentes. Vina item crassa substantia, & recentia, aliaque huiusmodi. Quorum loco pane utatur condito tuniculo, aniso, & carnibus avicularum, cum cydoniis, vel diacydone vel saccharo rosaceo, aut aliis huius generis cibis facultate adstringente pollentibusque duos, aut tres menses. Quod si eo temporis spatium non cedat affectus, ad generosiora deveniendum erit, de prompta ex Chirurgia, & Pharmacia, una cum recta victus ratione præscripta.

In Chirurgicis convenit missio sanguinis ex vena communi dextri brachii; commendatur & fonticulus in brachio sinistro; & si possit usus, in ultio partis affectæ, ad validiorem ejus exsiccationem, & roborationem; quod tamen licet irritis cæteris.

Ex Pharmacia, leniatur alvus electuario lenitivo, & speciebus hieræ, vel melle rosaceo solutivo, & manna. Præparentur humores syrupo de mentha, de betonica, & oxymelite simplici, cum decoctione betonicæ, menthæ, seminum citri, & cichorii. Purgabitur demum corpus medicamento jam præscripto; addita portuncula agarici, & rhubarbari. A quibus utatur quatuor dies aquis Terentianis, ad libras quinque, cum melle rosaceo solutivo. His peractis, localibus internis & externis demum locus erit. Interni erunt decoctum ex radice chinæ, salis, & visco quercino, addito polygono, consolida minore, baccis myrti, & cupressi, cum foliis plantaginis, rosarum, & portulacæ. cujus usus erit semel in die, horis matutinis, ad uncias sex; præmisso holo ex pulvere radices figuli Salomonis, valerianæ, mumie, & chalybey tenuissime pulverizato, exceptis syrupo de ribes, citato tunc sudore, cum tenui victus ratione, & continuo decubitu triginta & quadraginta dies. Extrinsecus parti affectæ applicabitur ceratum ex mastiche, olibano, sarcocolla, sanguine draconis, mumie, & limatura chalybis, cum aceto, & albunine ovorum, commendatque. Alius globulum ex charta pergamentina in aceto macerata, supra partem affectam continuo gestatum, non neglectis caput purgatis, & lotionibus capitis ex lixivio uulci alterato betonica, agarico, salis, theæ, thade, roremarino, rois, & corticibus granatorum.

Victus autem ratio sic superius præscripta. Quibus ad amissionem observatis a Nobili Patiente, pristinam valetudinem ipsi spondere audemus. Idem ibidem.

Hernia ad Scrotum.

Adolescens XX. annorum, temperamenti sanguineo phlegmatici, habitus mollioris, cum ante biennium motu fortius ageretur & certatim totam quandam transiliendo fatigatus esset, domum redux sentit in scroto præter gemellos testes tumorem quandam indolentem sinistro latere emergere, primum magnitudine castanæ, hinc nucis, ino pomi majoris, cum movendi imminuta promptitudine; inde studiis diligentius operam navans rarius motu digestis corporum, cibis delectatus grossioribus, brassicæ, carniū infumatarum, suillarum, leguminum, esu, sola fere cerevisia contentus, neque corpus æque à frigore defendens, sentit à passu ordinario dolorem gravativum abdominis, ad locum affectum protensum, inde vero tumor magis inflatur, cum

tensione & torminibus circa umbilicum, nec prius conquiescit, quam desidendi vel decumbendi quoque detur occasio. Dolores iidem à diutina fessione & corporis inclinatione ac motu continuato; tumor vero ab iracundia vel motu increvit. Decubitu longiori retrocedit & quasi nullus est tumor, extraverso vero & caput quandoque dolet. Petit Consilium.

Affectus, historia præsentis expressus hernia est, generali nomine, speciali *scroti*, seu hernia scroti dicta, quo ipso ad omnium alios speciemus, sub uno eodemque genere militantibus, distinguatur. Uti enim hernia, si latinam significationem, sabinis debitam spectemus, duram monticulum & asperum notat, proprie hoc loco in abdomine, in proprie paulo in gutture ubi bronchocele auditur, in originem græcam, ubi tantum significat, qui videtur quasi protensus à trunco, res eodem recidit; si utrumque hic visitur, tumor durus idemque aliunde velut ramis protensus.

Omnis hernia nomen sortitur vel à subjecto, vel prædicato, quo ipso differentia specificæ confluit & internoscuntur statim. In nostro casu dum hernia scroti seu enterocelen dicitur, ab hernia quæcunque locali alia, non minus ac duritie modis, ut hernia aquosa, carnosa, flatulenta, varicota, vel ipso nomine fit distinctio. Id vero ut ad diagnosis sic ad prognosin & curationem quoque multum facit. Ruptura adest, ut Latine alius vocatur ruptura vel in continuitate, vel in contiguitate, ruptura partis continentis. *ruptura*.

Demonstrant id ex usitatis fontibus signorum I. Essentialiter Inherens, seu *inherens*, tumor mentiri nescius, isque in se indolens & subitaneus, testibus gemellis contra in sinistro latere exortus, de quo & hic valet, ubi tumor, ubi dolor, ibi morbus.

II. Essentialiter Consequentia symptomata idem confirmant, potissimum ex actionibus lassis animalibus, seu imminutam movendi promptitudinem, seu dolorem gravativum ordinario à passu ad locum affectum protensum, seu abdominis circa umbilicum tensionem & tumentem sensum seu hoc ipsum quoque circa meningis capitis expressum spectemus.

III. Causæ prægressæ subscribunt, & præ aliis quidem saltus intuspeffive institutus & frequentatus, cibi item grossiores & flatulenti, corporis infrigidatio & alia.

IV. Similitudo denique ultimum momentum addit, cum tali modo decumbentes hoc affectu laborare lippis quoque & torminibus notum sit.

Subjectum huius morbi est scrotum, si quidem herniam ut tumorem reputemus, illud enim intumescit, sicque in dimensionibus suis augetur.

Est vero & scrotum de horum genere, quæ ut membranea contrahi & corrigari, hinc & dilatari possunt & solent pro modulo contentorum, qualia quidem in aliis varia occurrunt.

Si subjectum causæ illustrare velimus, non aliud nisi peritoneum est, ejusque processus lateralis sinister. Proprie enim scrotum est subjectum recipiens, cum tumor præsertim hic non sit in manens, non substantia scroti proprius, sed transiens, pro illapsu ponderis vel egressu.

Subjectum Adæquatum sunt intestina, proxime huic loco accumbentia & ordinario ab his thermopylis seclusa, uti per mechanicam quoque notum est, per minores canales concedi pos-

se transitum peculiarem, citra ad apertam portam pro aliis quibuscunque. Hic verò ampliori concessio spatii & pondere suo prolabantur mox intestina, & eodem ampliant sibi spatium, cum primis & ipsa magis expansa. Nonnumquam speciatim hinc ileum, quod & longissimum omnium & lubricitate magis ad exitum pronum, & quod palmarium est, accubans huic regioni; illud enim excidit, citra ullam *expansio* quod proximum est, trudentibus vel cedentibus quoque superioribus.

Locus illapsus est processus peritonæi, quo mediante communicant cum reliquo corpore testes, extra membra quasi publica locati, satis illuc valis spermaticas, & communis speciei viui & proprio testium dicatis. Processus concedit transitum his canaliculis, & per accidens quoque intestinis facta hic locorum latione particulari, nam & plura alia dantur, & vicina inguina etiam in viris, ut ut minus constantem, ramicem sustinent non raro.

Causa immediata est decubitus intestinorum laudatus. Omnes siquidem tumores materiale aliud possident, quod velut causa continens eosdem fovet, quo ablato tolluntur & ipsi. Triplex tumore esse possit materia, fluida, vaporosa & solida, posterior hoc loco accendenda est. Omnis enim tuor fovetur ab intestino huc delatente, adque immediate.

Causa mediata Proximiore est extensio peritonæi, quæ Extensioem vocamus, ut sic satis fiat, quibus vel ruptura, vel relaxatio saltem in causa videtur. Medium hoc aliquod est præcipue morbo conveniens, & utrumque complexens. Næquam fieri potest hernia citra extensionem, eamque inæqualem. Inæqualitas hæc proprie herniam facit seu protuberantiam; in itera enim naturali æqualiter obtensum undique visceribus infimi ventris visitur. Siquæ extensio natæ æqualis, sive per ætatem, exemplo adulatorum, seu per morbum, exemplo hydropicorum, nulla sit hernia. Ubique vero inæqualitas talis manifestata in extensione observatur, ibi eadem sedem suam figit, seu in umbilico, seu inguine, seu scroto, seu aliis quoque his illis abdominis partibus.

Ita enim cessat minus hoc non infirmum membrum hujus, quo integumentum est proprium intestinorum, quod cum musculis cum habeat commune, nec illi extra omnem culpam sunt, tum aliis in spatiis definitis, relaxatis & inæqualiter tensis eorundem fibris membraneis, tum in nostro casu inferius ad pubem, quorum & moles intestinorum reclinat magis, & ad exitum vasorum pro testibus perforatio datur.

Liceat speciatim & musculos laudare pyramidales, quorum usus inter alia est firmare basin musculorum reliquorum & una processus peritonæi, ne tam facile laxentur vel tendantur.

Inæqualis extensio est tum absolute & considerata in se, ibi facta, quorum tendentium aliorum vis incubuit, tum relative. Consentunt enim in hoc anatomici & medici, disrumpi in hernia hæc tunicam peritonæi interiorem, externam vero duntaxat relaxari. Id omne extensio inæqualis supplet & comprehendit.

Mediataz causæ Remotioris titulum subeunt omnia ea, quæ quocunque modo extensioni huic & consequenti prolapsui velificantur.

Temperamentum ægri est sanguineo phleg-

maticum, cumulandis in corpore cruditatibus & impuritatibus serosis aptum natum, & ob id laxitati maxime conveniens, imo partium dispositio mollior & rarior, concurrente causa violenta, multum ad herniam confert.

Ætas consentit ipsa. Cum omnis ætas huic malo obnoxia esse potest, tum plerumque tamen infantes & pueri, ob texturam teneriorem, adolefcentes & juvenes, ob licentiosam vitam & errores diataz varios frequentius sibi hoc malum accersunt, quod damno suo expertus non minus est æger.

Habitus corporis mollior fibrarum minus robur ac carniū deorat, unde facilius labes oboriri potest tam ab interna humorum indispotione, quam ab externis injuriis.

Ex non naturalibus accusandus venit Aër frigidus, qui & in genere calorem concentrando, poros cutis occidendo, insensibilem transpirationem prohibendo, sanguinem coagulando, ad varios morbos corpus nostrum disponere potest, & speciatim intestinorum tono intestus est. Inde flatuum proventus largissimus, ac exacerbatio ramicis. Videas sæpe quiete degere herniosos, simul vero aeri frigido exponunt corpus, accendi dolorum facies tumorem augeri, indurari, incarcerari, & minitari symptomata horrenda alia. Idem longe magis fit in mollioribus, & tali temperamento, quali æger noster gaudet.

Cibus & lotus magnum morbo addidere momentum. Cibi grossiores negotium facessunt archeo, minus obsequi calori & menstruo, *digestio* & *transmissio* iustituentibus, nec prompte evolvuntur inde alimentariaz particulae, multum vero accumulantur recrementitia. Pingua, oleracea, leguminosa ex hoc censu sunt præcipua, flatibus producendis & gravandis intestinis aptissima. Ex hoc vero inflata magis, non contenta spatio pristino, novum affectant, extuberant, prolabantur magis, ut contra ea si temerata subsidant, contrahi amant magis secumque habitare.

Intemperantia ergo in victu cum morborum genitrix, tumatrix amplissima etiam herniosis onerosa evadit & lugubris. Excelsus omnis talis cruditates, cruditates flatus, flatus tumores, tumores dolores, singula obstructions & iliaca passionem facile inducunt herniosis. Accedat, quod non vini potu cruditates corrigere sategit roborando sic calore, & præpudiendis flatibus. Tacemus inde quoque laxari magis debuisse vincula.

Motus gemino vitio accusandus venit, excessu & defectu. In promptu affectus causa est potissima, motus excessus, saltus citatus cum violentia conjunctus, quando certatim fossam transilivit plus vice simplici, Vix ex adultis centesimus corripitur hernia, citra hunc tyrannum, ut in tenellis quoque motus sui generis tensivi clamorum, & jectigationum malum hoc toto die producant. Motus talis herniæ autor est, tum nisu illo summo & conatu ad impellendum, unde diaphragmatis socium & sororians peritonæum intenditur magis, facileque laxationem vel rupturam subit, tum pondere & mole corporis gravioris, quod ut non labatur, periculosam tamen quoad hoc concussionem patitur utrobique conjuncto violento impetu, quod sensus ipse testatur, si de loco in locum fossam transiliat quis vel transilientem videat, abdomine non cincto vel

muoito

munito, nec corpore alias satis robusto, vel jam
dum disposito.

In defectu peccavit vita illa defentaria, quæ affectui quadrat quidem, eo ipso vero excernenda congerit magis, unde nec alvus responder debite, nec transpirant fuligines serosæ, sed in glandulis stagnant & cum massa sanguinea remittuntur.

Inno violentia hæc motui conjuncta ad Causarum Præternaturalium classem referri meretur, siquidem aculædit magis, unde ut ruffis, Alternationes vehementes, vomitus contumaces, alvi obstructions pertinaces indeque orti nifus coactivi, &c. plura alia hujus mali certissimi autores esse solent; sic & ipsa hæc exterior violentia.

Atalifmodi ac tantis caulis productus affe-
ctus, non mirandum est, quod sequentia post se
trahat symptomata, quæ signorum loco habita
explicanda nunc veniunt.

1. Tumor subitaneus scitoti notat præternaturale contentum ibidem non natum, sed factum, & speciatim ab ingressu intestini per procellum p. rionzi.

2. Tumor lenim incrementum primum castaneæ,
hinc nucis juglandis, postmodum = pomi majoris
magnitudinem assequens, magis magisque dilata-
tum ductæ bincumbeute volu ine intestino-
rum, sicque perruptam magis parietem designat.

3. Tumor indolens est, ob equalitatem lationis
majoris sequitur & conjunctam habet, quæ si adie
timor vel nullus est, quod per solutionem conti
nui in fieri & facto explicant communiter.

4. Immota movendi promptitudo adit,
partim ob articulationem femoris per accidens
ac consentiam laesam, ob tuorem sensim sentien-
que aductum, qui illam impedit, partim ob ten-
sionem majorem, motu & decubitu gravium in-
ductam, utrobique spiritibus magis fatigatis &
impeditis.

5. Sentit ordinarie à pascu dolorem gravativum abdominis, ad locum affectum protentum, ob chyli evolutionem & *diæternæ & viciæ* impediant, indeque coniucentes flatu dolorificos. Hi cum per intestinorum glomeramina volvantur, ad locum affectum tanquam debiliorem pertingunt quoque, ibidemque magis exprimuntur.

6. Tumoris inflatio major, cum tensione & torminibus circa umbilicum, debetur inflationi & obstructioni; flatus enim adacti distendunt colon & reliqua intestina, distenta majus occupant spatium & pondere suo fibras intestinales vellunt, licque tanquam in centro tristem sensum exprimunt.

7. Desidenti vel decumbenti levamen contingit, cessante sic tendente pondere, & motu peristaltico seu circumpressorio liberius succedente. Imo tumor sic recedit omnino, concessio ob positum hunc corporis pristino spatio, quo pondus extraversum remeat.

8. Exacerbatio dolorum à diutina sessione, corporis inclinatione ac motu continuato, eidem adscribenda tensioni, ponderi ac communioni intestinorum minus æquabili.

9. Tumor à motu animi & corporis increfcit. Illud ob fpiritus effertatos, viis minus patulis facilius in motu ordinario turbatis; hoc ob pondus gravius laudatum inteftinorum, cæteroqui lubricorum, fucceffione illa magis delabentium.

10. Caput quandoque dolet, extraverso tumo-
re, tum ob vapores illos peregrinos, inæqualit-
menibras afficientes, tum confensum nervo-
rum sexti paris.

Perlustrata nunc insigni hac symptomatum
turna, ad Prognosin faciendus est accessus.

In se affectus hic nullum lethalitatis merum incurrit, intestinis loco quidem alieno exceptis, ibidem tamen non extra archei forum & imperium penitus latis. At in adultis rebellis est, & saepe incurabilis, ob indolentiam negligentiam neglectus, sicque productus ut plurimum, præcipue vero ob interpositam huius rei orati naturalem, ipsius valis genitalibus ad testes euntibus, & intestino illic p. n. inhaerente. Nulla vero solutio continui curari potest, nisi extranea quævis unctionem impediencia tollantur vel removeantur. Accedit diuturniore mora velut callus quidam, siue consuetudo potius. Nihilominus remotis illis ablatis, dicendis remediis, visi sunt etiam adulti curati, eademque spes agro integra esse potest.

Ab altera vero parte metuendum est, ne vel ruptura negligentia reddatur major, sicque ad mortum inconueniens dispositio, vel incarcerationa, obsolescente frigore, obstructione aliuque ca- vendis. Incarceratam vero vocamus, quando in- testina non tam quoad continentem su in tuni- cam includuntur huius malæ mansioni, quam quoad contenta scybalis, ut provolui nequeant pe- nitus, occlusa ob tumorem & duritiem extraor- dinaria porta, qua eluciari eadem oportet, sicut iliaca passione inducta id enim si fiat, lethalis eventus accidere potest, quod tamen aliis est loci.

Si, citra heroicam operationem ad remoram
illam tollendam, curatio speranda fuerit, illud
quoque Longius temporis requirit spatium, unde
facile solet & ad mortem usque co-
mitari. Id vero cum variet secundum praesidia
proponenda, liberum fuerit aegro, salutis suae cu-
pido, eligere quod magis ex usu est. Est enim hic
morbus ex genere illorum, qui dum facile ferun-
tur, nec periculum intentant majus, servantur in
seatu tolerabili, ceteroquin parum sanitati vel
vita: officiant.

Modus Eventus erit ad salutem, vel in totum, repositis in pristinum locum intestinis, inque co- detentis per deligationem & applicationem em- plastrorum fortiter agglutinantium, membrana- rum tunicarumve tono roborato; vel in tantum, ut cedente symptomata à malo exacerbato ori- unda, ipsum vero conquiescat & iudicatas incó- lumnitati reliqua præbe-t.

Curatio in iuxta methodo medendi ad indica-
tionum modulum instituenda. Curatoria pro di-
verso respectu variat, mala enim, quae molestiam
non foverant, seu non laedunt, suo modo sanitati
quasi aequiparantur. Si ergo lationem hanc intu-
eamur, ex hujus regula vel ablationem comple-
tam meditabimur, curando intestinorum prolap-
su hocce, vel incompletam, seu quasi talem, repo-
sitione & gestatione tolerabili solum procurata.

Præservatoria, causis intenta, omnia illa atten-
dere jubet, quæcunque vel tendere vel ampliari
intestina possint, seu præcavendo, ne id fiat, seu
auferendo fomitem imprimis flatus.

Vitalis vires attendit delectas, & tonum viscerum tibi restituit ac conservat.

toria, quorum usus etiam hic locum aliquando habere potest, apparatus vero cum in officinis sufficiens extet, non opus est denuo prescriptionem heri.

Purgantia tum præservandi sine, verno vel autumnali tempore, ex usu esse possunt, tum curandi, si fors ita ferat. Observatum quippe est, in *diu* nihil magis prodesse quam opiata & purgantia, illa compellentia archeum, hæc in viam ducentia cum iuvamine.

℞. Spec. diagalap. ℥j. scam. rosat. mag. g. g. an. gr. iij. crystall. tart. ℥ss. ol. anis gr. j. M. F. Pulvis D. ad chartam. S. Purgier Pulver.

℞. Conserv. rosar. c. mann. rob. patular. an. 3j. pulv. laxativ. veget. ℥j. polychr. gr. iij. crem. tart. ℥ss. syr. de pom. laxativ. q. s. f. l. a. Bolus.

Cumque in laxitatibus ejusmodi membranarum in lymphæ copia & qualitas plurimum momenti addat, tum ad ipsam lubricitatem, tum affluxum & *carum*, huic sufficient Diaphoretica, vi sua habitiosa lympham in motum cientia, rarefacientia, dissipantia & per poros cutis expellentia. Imo hoc pacto depurato sanguine & discussis, ob affinitatem operandi-ribus, consolidatio non leviter promoveri, inptomata vero arceri possunt.

℞. Bez. martial. gr. xv. mag. C. C. ℥ss. cinnab. nativ. gr. vj. laud. opiat. gr. ss. M. F. Pulvis D. ad chartam. S. Scheveisz Pulver.

℞. Tinct. bezoard. essentif. M. S. an. 3j. ess. carni. sp. sal. armon. vin. an. 3ss. M. D. in vitro. S. Zertheilende mixtur.

℞. Rob. ebul. 3j. antimon. martial. cachect. g. xij. conch. ppt. ℥ss. cinnab. antim. gr. iij. sacchar. q. s. M. F. Bolus S. Schveisz-Zucker.

Diureticis abitergi amat amurca venarum, fluxilitas vero & ferocitas superflua salendoque corpori inconveniens educi, quo facto, minor pituitæ proventus torporem minorem intestinorum relinquit, eligendo imprimis magis polychrestis, v. g.

℞. Migrit. oc. cancer. tart. vitriol. an. 3j. sal. onon. ℥ss. ol. lign. sassafr. gr. j. M. F. pulv. D. ad chartam. S. zertheilendes Pulver.

R. ess. antim. tartarisat succin. an. 3j. ol. lign. sassafr. gr. iij. M. D. in vitro. S. Eroffnende Eilenz.

℞. mixtur. antiscorb. sp. aper. Penot. an. 3j. M. in vitro. S. Eroffnende Mirtur.

Complementum addunt Alterantia & Roborantia, non tam archeum universalem attendentia, qui cæteroquin bene habet, & si vacillet, aliunde repetenda, quam intestinorum & processus affectorum. Specifica hinc, quæ puta indicationibus determinatis satisfaciunt, esse possunt duplicia, carminativa & traumatica, quibus nervina, paregorica, adstringentia aliisque ministrantia & secundaria includimus.

Carminativa sæpe omnem absolvunt paginam, quatenus & archeum irritatum placant, & discussis flatibus intestina, minori spatio contenta, domi manere discunt. Unde, Helmontiano experimento optimum est in reducendo timore duro & inflato, vinum leviter bullitum cum sem. 4. carmin. & coriandri ana.

Traumatica verò lympham alimentarem aptant, ut *glaux* sua gaudeat, sicque firmari magis laxæ membranæ & stringi possint.

℞. Ess. contr. hern. Mich. 3ij. tinct. mart.

D. in vitro S. Geilende Tinctur.

℞. Ess. traumat. Wedel. carminat. an. 3j. anodyn ℥ss. M. in vitro. S. Mixtur.

R. Aq. plantag. zedoar. gentian. traumat. an. 3j. magist. corallior. ocul. canr. an. 3ss. extr. torment. antim. diaph. an. 3j. syr. de symph. Fern. cort. citr. an. q. s. M. F. l. a. Porio. S. Starck Tranchelein.

℞. Rad. consolid. maj. aristol. rot. plantag. ulmar. an. 3ij. herb. herniar. sanc. millefol. chamom. flor. hyper. balaustr. an. p. ij. sem. 4. carmin. coriandr. sand. omn. an. 3j. oc. cancer. Div. nteist. n. j. Concis. contus. g. m. D. in ch. S. hellende species.

℞. Rad. onon. 3ss. fol. herniar. 3ij. sem. 4. carmin. perfol. oc. cancer. ana 3j. macis 3j. sacchar. ad pond. omn. M. F. Pulvis D. in scat. S. Starck. Pulver.

Externa, immediate loco affecto applicanda insignem ferunt opem, merito hinc commendanda, tum balsamica traumatica, quæ vigorem archeo addunt, bals. Hispanicum; tum oleosa, ut quæ repositionem adjuvant, ubi præ aliis ol. ovor. & momordicæ optime se gerit; tum emplastica, quæ firmant, conglutinant & roborant.

Facta sunt hinc Emplastra de pelle arietina, ad hernias Fernelii, Weckeri, Empl. ad rarnices Agricola, Grülingii, Schroteri, Jessemi, contra rupturam Felicis Würzli, & alia.

℞. Empl. contra hern. Myrs. 3ij. sem. perfol. cumin. an. 3j. bacc. laur. 3ss. pulv. Hypt. Croll. 3j. gum. tacamahac. 3ij. ol. ovor. q. s. pic. naval. parum. M. F. l. a. Empl. S. Bruchpflaster.

R. Empl. contra rupt. 3ij. magnet. A. S. 3ij. ol. aneth. carv. chamom. destill. ana gr. iij. momord. q. s. M. F. Empl. S. Heilpflaster.

Agmen claudit Dieta, in rerum non naturalium legitimo usu comprehensa, quem merito æger nosse attendere debet.

Ex Vitali aer vitandus est frigidus & humidus, nervis enim & membranis simul & intestinis inimicissimus est. Eligatur purus, amœnus, temperatus, nullis obicibus inquinamentis aut aliis miasmatis imprægnatus, qui facile sternutationem excitare potest, herniolis cane pejus & angue fugiendam.

In Naturali Cibus, cum suggerat succis vitalibus pabulum, sit *diu* temperatus, boni succi pro optimi sanguinis generatione. Vitentur frigidi, flatulenti, crassi, leguminosi, incoctiles, oleracei, acres, salsi, panis non probe fermentatus, carnes fumo indurata, fructus æstivi & omne genus ciborum, quod ventrem constipare & flatus inducere aptum natum.

Potus sit cerevisia, ab omni heterogeneitate seculenta libera, non recens, nec acescens, medicata etiam ex herbis traumaticis & roborantibus usum habebit egregium. Vinum, imprimis rubrum, tam adstringendi, quam roborandi suæ, maxime erit conveniens & stomacho gratissimum.

In Animali motus quieti oppositus, moderatus & parcus suadendus: ut enim taceamus communes noxas, in nostro casu nil magis prolapsui intestinorum velificatur, quam potus.

motus. Quieti ergo potius indulgendum est, ita tamen ne obstructions pariat, atque calorem nativum obruat. Hinc leniter & aequaliter omnes partes exerceat, & nullo tempore modum excedat. Equitatio, saltatio, cursus per loca declivia, eo, quod corporis viscera quassent, summo vitentur studio. Elevatio oneris gravioris, jaculatio & quicquid musculos & ligamenta extendere & rumpere valet, procul absit. A clamoribus & vociferationibus maxime sibi caveat, quæ omnia peritonæum tendunt & exerceant gravius.

Soninus cum animalium facultatum quies sit, vires restauret, & dolores mitiget, ægro commendatus esse debet, ut sufficiens sit, non immoderatus, ut sic alterna requies etiam intestinis quietem vel ipso decubitu concedat. Vigiliæ productæ exulare debent.

Excreta assumtis respondeant & curiose imprimis alvi munus cordi habeatur, ut non cesset, vel, si id fiat, admonetur lenientibus landatis.

In Animali, Animi Pathemata omnia dictamen sanæ menti sequantur. Vitet æger iram, quæ sanguine circa cor effervescente humorum varias commotiones excitat. Animi sui sit compos & placidus. Pellat timorem, nec dolor adsit. *Ioh. Martinus Ehnlich in Dissertationibus Medicis selectis Clar. Wedelii.*

Observationes.

Gangrana ex hernia intestinali, cum intestini erosione curatio.

Nobilis matrona Margaretha à Glersse, septendecim annis insigni hernia laboravit, quæ circa annum ætatis sexagesimum tertium, mense Decembri Anno 1597. torminibus maximis vexata est. Intestinum in abdominis rupturam impulsum, ac inibi retentum dolores non leves, simul & inflammationem, aliæque graviora symptomata concivit. Vocatus demum K. Januarii 1598. inveni dextrum inguen gangrana affectum. Scarificato itaque tumore & cæteris, quæ ad gangranæ curationem attinent, adhibitis, caro putrida & callositas rupturæ exciderunt: unde symptomata, dolores, inflammatio, febris, tormina, lipothymia, nausæ & vomitus sedata sunt: sed intestinum materia, nondum penitus excrementosa, velut ilei & cæci, per abdominis rupturam exercebatur, circiter menses duos. Ægra tamen, multum mirantibus adstantibus, favente Numine, sanata & a ruptura perfecte curata fuit, nulla relicta fistula, aut herniæ indicium.

Curationi sæpius interfuere, qui & sanationis testes sunt, Nob. Gabriel à Bloney, Baro en Chastelart, & Nob. Philippus Cerialius, Dominus de Denesi, & Reverendus Claudius Merlinus, Villetanz & Quilcens. Ecclesiæ pastor, Moyses Battetus, & plurimi alii, quorum etiam mentio facta fuit in prima Observatione, vixit autem matrona illa usque ad finem fere anni 1613. obiitque peste. Ex his duabus jam recitatis Observationibus,

palam fit, intestinum vulnera non esse proflus deplorata, *Guttselm. Fabric. Hildan. observation. Chirurgic. Cent. 1.*

Ex epiplocele & enterocèle, gangrana & mors sequuta.

Anno 1585. mense Augusto, robustissimus quidam taber lignarius, quum Genevæ elevasset pondus ingens, omentum ei prolapsum est in scrotum; & quia reductum non fuit, intumuit, inde dolor acutissimus, inflammatio, febris, vomitus, aliæque graviora symptomata exorta, denique mors lequuta est septimo die. Ego una cum Joanne Grifonio, Chirurgo præstantissimo vocatus, scrotum præserte Jano Antonio Saraceno, Medico regio, incidimus, & invenimus omentum, imo etiam testes & vicinas partes plane corruptas & gangrana infectas.

Anno 1596. cuidam intestina in scrotum ceciderunt. Unde, quia reducta non fuerunt exortus est dolor aliæque symptomata graviora. Barbitonforem in consilium advocat æger. Is fomentum ex absinthio & rosis, vino rubeo coctis applicari iussit: sed ut erant aliena a morbo, sic quoque ingravescerebat morbus. Ego vocatus cum clarissimis doctissimisque D. Jano Antonio Saraceno, & Andrea Boneto, apud Genevenses Medic. Doctoribus, scrotum magnitudinem capitis excedens invenimus; febris erat vehemens, syn-copæ, & vomitus frequentes.

Statim fomentum ex radicibus altheæ, semine lini, fœnigræci, feseleos, floribus chamomillæ, meliloti, foliis malvarum & violarum applicuimus. Deinde capite inclinato & pedibus in altum elevatis, reductum est intestinum. Sed quia propter inflammationem & compressionem, in ruptura abdominis jam cœperat corrumpi intestinum, paucis post horis à vita decessit. *idem ibid.*

Ex hernia gravissima symptomata & mors.

Nobilis quidam in Cuilly ad Lacum Lemannum, Daniel de Challon nomine, per annos aliquot Enterocèle lateris dextri laborans, tandem 20. Octobr. anno 1606. cum violento nimis exercitio atque motu usus esset, intestinum in scrotum delapsum fuerat. Unde statim dolor ingens totius ventris exortus, eadem nocte quoque vomitus frequens, inquietudines, urinx item, & excrementorum retentio supervenerant. Ille vero remediis neglectis, symptomatibusque indices ingravescens, propter doloris vehementiam, die 2. 3. coactus fuit accersere D. Jacob. Marrionem, apud Lausannenses pharmacopolam exercitissimum; Qui agrum in summis angustiiis constitutum videns, iussit ut me advocaret, verum ne interea temporis in mei absentia, ociosus ibi degeret, fomentationes & Emulsi emollientia, anodyna & flatu discutientia exhibuit & applicuit. Ego 24. mensis huius die, qui quartus

quartus morbi erat, illum invisens, maximis doloribus & inquietudinibus, vomitu quinetiam continuo infestatum, retentione item excrementorum, & urinz laborantem, offendi, id tamen, quicquid urinz excerneret, subrubicundum erat. Atque illa retentio urinz ad 25. diem usque persistebat, qua sub crepusculum urini maxime fusciorum excernebat. Exinde vero absque omni difficultate, imo quod magis mirandum, ad ipsam horam mortis usq., urinam tum colore, tum consistentia sanorum urinis plane similem reddebat. Scrotum porro inflatum ac durum adeo erat, ut tactui omnino reniteretur.

Statim itaque illi sequens Enema præscripsi:

℞. Radic. & fol. malvarum althææ fol. violarum betæ, parietariæ an. M. j. flor. chamomel, meliloti, sambuci an. M. s. sem. fenigræci, lini an. ℥. s. anisi. feniculi an. ℥. j. Coquantur ad tertias. Colaturæ sume ℥. v. In quibus dissolve electuar. diacathol. ℥. s. vitellor. ovor. n. ij. ol. chamomel. anethini, butyri recent. an. ℥. ij. Misce, fiat Enema.

Scroto vero sacculum ejusdem Enematis radicibus, herbis, floribus & seminibus confectum & aqua coctum, calide applicui.

Idem quoque scrotum & ventrem oleo anethino & chamomelino ununxi.

Enemate rejecto, aliud denuo exhibui, sacculum præscriptum calide applicui, scrotumque & ventrem, ut prius, sinunxi.

Rejecto vero & hoc enemate, ægrum in lecto capite reclinato, pedibus vero elatioribus collocaui, atque intestinum in locum suum reponere tentavi, sed frustra. Quamobrem ne quid forte mihi exprobraretur, si res ex animi sententia minus succederet, suasi, ut D. Abelem Roscium, apud Lausannenses Medicum celeberrimum ac doctissimum, accerferent, ille, cum advenisset, voluit, ut eadem die denuo de intestino reponendo periculum facerem, id si minus succederet, fomentationes, inunctiones & enemata continuarem, quinetiam, ut herbar. radices, & residuum ex decoctione clysteris in mortario lapideo contunderentur, postea per cribrum cupreum pistillo ligneo traducerem, ex iisque cum mica panis, vitellis ovorum, oleo anethino & chamomelino fieret cataplasma, quod calide ac frequentius applicaretur. Idem quoque Medicus, ut æger sequenti nocte ter aut quater aliquid olei amygdalar. dulcium biberet, altera vero die tempore matutino potiunculam laxativam sumeret, imperavit. Circa vespertinam itaque an intestinum reponi posset frustra cum tentarem, Enemata, fomentationes & inunctiones continuare cogebat. Oleum vero amygdalar. dulcium, quia sibi nauseam movebat, assumere non potuit.

Altera die Potiunculam hanc à Roscio præscriptam illi exhibui.

℞. Expressionem rhabarb. in aq. menthæ infusi ℥. j. syr. rosar. solut. ℥. j. syr. violac. ex infusionibus ℥. s. Misce, & dissolve in aqua menthæ & hyssopi, fiatque potior quam horis quatuor ante prandium sumat.

Sed quum potiunculam hanc paulo post cum pituita multa, & nonnihil humoris biliosi evomisset, denuo fomentationibus usus fui. Enemaque ex præscripta decoctione, in qua parum Electuarii Benedictæ laxat. & hieræ simplicis cum vitellis ovorum, sale & oleis præcedentium clysterum, dissolutum erat, insudi. Cujus beneficio

nonnihil excrementorum induratorum ac foetidorum excernere coepit. Hinc dolores aliqua ex parte fuere diminuti, inflatio item & tumor nonnihil subdidit, ut scrotum manibus tractando, murmur intestini obaudiretur. Circa vespertinam cum denuo simile Enema exhibuissem, multum reddidit excrementorum, intestinum quoque levi compressione manus simul reductum fuit, scroto tamen adhuc vehementer intumefacto, indurato, ac dolore affecto, adstringentia applicare non licuit, sed sequens Cataplasma emolliens, & flatus discutiens admovi.

℞. Farinæ fabar. ℥. iij. Pulv. flor. chamom. meliloti, Sambuci an. ℥. j. pulv. sem. anisi, feniculi, cumini an. ℥. s. pulv. baccar. lauri ℥. j. Cum decocto radicum althææ, malvæ, parietariæ, florum chamomel. meliloti, sambuci, & seminis fenigræci, fiat Cataplasma, quod bis autter in die calide applicetur.

Die 28. mensis hujus circa vespertinam, jusculum quod paulo ante sumperat, cum multa pituita foetida evomuit, cum nihilominus tamen ea nocte sponte alvum, & quidem excrementum laudabile, beneque digestum exoneravisset.

Vigesima nona die mane rursus sponte beneficii ventris habuit, sed excrementa livida, aut cinericei coloris int. r. & foetidissima erant. Eadem quoque die bis juscula illa, quæ absumperat, mixta pituita foetidissima revomuit. Nocte vero sequenti vomitus continuus & foetidissimus cum lipothymia supervenit, unde cordi Epithema aliquod applicui.

Die trigesima mensis, quæ morbi dies decima erat, continuo, & quidem materiam foetidissimam adeo copiose evomuit, ut mirum ubi tanta in corpore copia materiæ retenta fuerit. Assiduo quoque egerendi conatu, cum medica tamen egestionem vexabatur, atque excrementa foetida, nunc solida, sed cinericei coloris, nunc vero liquida, purulenta tamen, aut sanguinolenta excernebat, atque sic tota illa nocte, quæ principium erat undecimi, in eodem statu permanebat, ita ut juscula, viuum, & quæcunque offerbantur, recusaret: Sequenti enim die, quæ finis undecimi; circa meridiem placide ex hac ærumnosa vita ad beatorum sedes demigravit.

Porro nonnulla in hoc morbo observatione digna occurrunt. Imprimis enim urina à sexto morbi die usque ad extremam vitam sanorum urinz similis plane conspiciebatur. Contra vero pulsus à quarta die morbi, quæ primo ad ægrum vocatus, ad finem usque continuo tam debilis, tamque exilis & obscurus, ut hominis jam tum morituri pulsui similis omnino esset, reliquæ tamen facultates & actiones adeo validæ, ut interdum vestes indueret, & in conclavi ambularet. Materiam illam viscidam, pituitosam, ac foetidissimam, quam evomuerat, non omnino ex intestinis, sed partim aliunde, ubi diu inclusa fuerat, processisse, inde apparet, quod ante morbum aliquandiu valetudinarius adeo fuerat; ut & à passu anhelitus (qui gravis ac foetidus, præcipue tempore matutino) aliqua difficultate laboraret, tussicula quoque sicca, ad mortem usque illum comitante, continuo vexaretur; de dolore item stomachi sæpissime conquereretur. Ex quibus perspicuum fit, ipsum non solum propter intestinum prolapsum, sed aliam quoque internam

norum viscerum putredinem extinctum fuisse; facile tamen concessero, intestinum aliquam corruptionis notam præ se tulisse: Quandoquidem fieri non potuit, quin pars illa intestini, in ipsa abdominis ruptura, sex dierum spacio compressa atque coarctata, alimento suo privata, ac tandem corrupta fuerit, (sicut etiam ex Observ. 72. Centur. 1. colligere licet) ex qua tamen intestini putrefactione tantus lætor, quantus hic aderat, promanare non potuit. Utinam igitur Amici post mortem ipsius cadaveris dissectionem concessissent, multa dubio procul rara & notatu dignissima nobis innotuissent. *idem Centur. ij.*

De nobili Enterocelico. Et Enterocela curata Divinitus.

Observatione transmissa, præstantissime Medice, amiceque observande, verum te Hippocraticum exhibes, referisq; *anecdota* singulari, divinum nostrum senem in epidemiis, describendo singula morborum Nobilis Enterocelici tempora.

Quantum vero istiusmodi conducant singulares, confirmandis medicinz catholicis theorematibus observ. testatur Galen. noster, argumento primi epidemiorum, verbis hisce notatu dignissimis. Singularia, inquit, autumant Empirici universalis constitutionis esse principium, illaque tandem asserunt vera præcepta esse, quæ constituuntur ab experientia. Nobis multo aliter, adeoque numerosa præcepta inventa esse ratione videntur quorum tamen de veritate iudicium facimus, prout stabiliuntur ab experimentis, & fidem accipiunt. Nam sic quidem, etsi quæ inventa ratione, ac demonstrata sunt, de eo quid magnitudine Sol à Luna distet, his credamus tamen, cum à sensibilibus multis aliis, quæ Geometricæ doceant rationes, & ab Ecclipsibus singularibus, confirmantur, fidem habemus majorem. Quando igitur ab experimentis singularibus comprobata quæ per Geometriam demonstrantur, accipiunt majorem fidem, stabiliuntur firmitus: longe magis, quæ ex Medica disciplina sunt in universum inventa, singularibus sunt probationibus constituenda. Quæ nos observari in libris vulgariis morborum docebimus. Hactenus Gal. cum igitur, Præstantissime Fabr. quæ ex medica disciplina in universum sunt inventa, singularibus suis tamque accuratis probationibus cõstitutæ atque fulciæ, profecto institutis hoc præclarissimum prosequi, tuumque sic nomen, & publicam utilitatem amplificare constanter debebis.

Neque vero Pathologicæ tantum parti Medicinz lumen affert observatio tua mihi communicata, verum etiam Therapeuticæ, dum remedia reponendo intestino feliciter, & ex arte adhibita Enemata, Focis, cataplasmata, inunctiones, & reliqua commemoras. Quin & illud ex eadem patet, haud solo prolapsu intestini, sed alio quoque interiori affectu, nempe corruptela visceris alicuius extinctum ægrum. Qui viscidam illam, confertamque odore terram, vomitu reiectam materiam, mesenterii profecto sedibus diu conclusam aluisse videtur. Recte item urinz illæ sanorum similes, observatæ abs te. Quæ declarant eorum de vulgo insipientiam, qui medicos (celato etiam æroci nomine) ex sola urina de morbo ut pronuntiant, cogere volunt (quales & mihi nonnunquam molesti sunt) cum urina nullius sæpe morbi vestigium præ se ferat, quemadmodum ex hac tua liquet observatione. Ego vero ingra-

tissimus sane erga Deum Opt. Max. censeri possem, si duobus nobilibus Viris commemoratis, enterocela mortuis, ego eodem affectu denum, decimo nempe octavo anno, solo Dei nutu absque sectione liberatus, id beneficium tam memorabile silentio præterirem.

Anno superioris seculi octogesimo quarto, tempore belli Colonienfis, in peramplo Gymnasio, & cœtu amplius centum discipulorum, ideoque contentiore voce docenti mihi, primum sola rupture interioris membranz peritonæi, prolapsuque intestini tumor in solo inguine exortus est, non longo vero post tempore, cum dilatatio quoque accessisset, ejus membranz, quæ in scrotum devolvitur, hoc pariter distentum fuit. Adhibeo Emplastrum vulgatum ad rupturam, sed eo diu frustra usus, uno cingor perizomate, à dicto jam octogesimo quarto anno ad annum usque hujus seculi secundum, meæ vero ætatis quadragessimum primum, hoc est, ad annum usque morbi decimum octavum. Quo spacio toto cum nec quies curando necessaria concederetur, nec orchotomia mihi probaretur, graves perferenda, nec molellæ (per ventositates præsertim) elabente sæpius intellino, fuere. Gravissimus supremus mali dies extitit. Nam dum Einshemii, Asiaticæ Urbe, stipendiis Cæs. Majest. Rudolphi II. Curæ Austriacæ medicinam facerem, celebri quoque vicino Xenodochio, D. Antonii Eisenheimensi ejusque Administratori Reverendissimo Domino suffraganeo, Francisco Bero, summo Viro, salario annuo obligatus fui. Itaque inde Gebvveilerium, Principis Murbacens. (qui opera quoque utebatur mea) tandem, verno tempore proficiscenti, immani cum dolore, universum intestinum erupturum videbatur. Nunquam ante, totos octodecim annos tumor major. Revertens ab amicis domum, in seipso quodam anodyno dolore paulum lenivi, moxque petito læcio, summo expectetis mane, & restituta concinne suo loco *in ortu*, & peritonæum ita firmatum atque consolidatum deprehendo, ac si nullo unquam tempore enterocela laborassem. Cumque nullo unquam ante die perizomate carere ausus fuisset, jam abjicere illud, & absque eo incedere minime dubitavi, nec in hunc usque diem eo egui, annosque amplius jam quinq; nec quicquam illius affectus (Conditori æternæ laudes ac gratiæ) perecipio. Certe tam inveteratus affectus, in homine quadragenario, tempore præsertim, quo summum incrementum sumpserat, Physis remediis, tamque brevi depelli non potuit. Quare verum *aliquid* & liberatorem meum D. O. M. agnoscam, laudaboque quandiu fuero, cujus proinde inusitati, & hactenus (mihi quidem) inauditi beneficii prædicandi gratia, ac gratitudinis ergo, loco ut arbitror, non incommodo, sub mentione scilicet duorum nobilium hoc malo sublatorum, hæc adscripta volui. Gravissimo sub id tempus, per summam manifestamque injuriam affectus rerum mearum damno fueram, quod Majestatem Divinam tanto beneficio (quod quidem multis prætulcrim) compensare, sarcireque voluisse crediderim. Eademque ab aliorum quoque me adversariorum machinationibus, quæ denuo paratæ mihi videntur, paterne teneatur, teque diu incolumem servet & sospitet. Fryburgi Aventicor. Calend. Feb. Anno 1677. Sebastianus Moyerus Med. Friburgens. ad Fabric. Hildan. observat. Chirurgic. Cent. II.

Intestina

*Intestina in scrotum prolapsa, quomodo
reposita?*

Quam gravissima symptomata, ac tandem mors quoque, ex prolapsu intestinorum in scrotum sequuta fuerint, tum præcedenti observatione, tum etiam Observ. 72. primæ Centuriæ, satis superque demonstravimus. Nunc quomodo iis in situm naturalem reductis, ægri convalescant, exemplis tribus sequentibus delectare operæ pretium erit.

Generoso cuidam ex familia Hatzfeldiorum, à multis annis herma laboranti, cum quadam die intestina in scrotum prolapsa, statumque protinus dilenta essent, dolor maximus totius ventris, vomitus continuus, cibi fastidium, vigilæ, inquietudines, præcordiorum angustia, & lipothymia exorta sunt.

Ego altera die ad ipsum vocatus, quamvis graviter, & non absque mortis periculo ægro- tantem offenderim, tamen aliquid tentandum suasi. Quocirca statim sequens exhibui Enema.

℞. Radicum althææ, malvarum cum toto foliorum, violarum, parietariæ, flor. chamomil. meliloti, sambuci an. Mj. sem. fœnigræci & lini aliquantum contusi, an. ℥ss. sem. anisi, fœniculi, carvi, cumini an. ℥j. Incidantur & contundantur omnia, postea indantur sacculo, ejus magnitudinis, quo totum scrotum possit cooperiri, qui intersutus coquatur in lb. 12. aquæ font. Hujus decoctionis.

℞. lbj. In qua dissolve Electuar. diacathol. ℥j. vitellor. ovor. n. ij. butyri recent. non saliti, & ol. commun. an. ℥ij. Misce, fiat Enema, quod protinus injiciatur. Sacculus vero parum expressus calide applicetur scroto, & recalcet in eodem decocto, & applicetur, quotiescunque opus fuerit.

Post mediam horam reiecto Enemate, rursus aliud ejusdem decocti Euematis, cum admixto Electuario, oleo, butyro, vitellis ovorum, parumque mellis infudi, & sacculum calide applicui. Quo enemate denuo reiecto, & sacculo calido intestino probe lubricato, ægri in lecto capite declivi, pedibus vero in altum elevatis, collocavi. Postea manu sinistra scroto apprehenso, coque ventrem versus sublevato, & aliquo modo compresso, dextra vero imo ventris admotæ, reliqua intestina sursum versus pectus retrusi, sicque intestinum prolapsum felici cum successu in locum suum naturalem reposui. Deinde ad intestinum suo in loco cohibendum, sacculum hunc adstringentem applicui.

℞. Rosar. rubr. absinthii vulgar. folior. prunor. sylvestr. caudæ equinæ fol. salviæ & musci quercini an. M. f. corticum querc. ℥ij. sem. fœnic. & anisi an. ℥j. Incidantur & contundantur, postea indantur sacculo, qui filo intersutus, & vino rubro incoctus, calide frequentius applicetur. Postera die, corpus sequenti potiuncula expurgavi.

℞. Radic. fœniculi. petrosel. granun. poly-pod. querc. an. ℥ss. herbar. agrimon. veronica, cuscute an. Mf. sem. anisi fœniculi ap. ℥ij. folior. sem. mundat. ℥ss. Coquantur in aqua, ut colatura redeat ad ℥ij. In quibus dissolve Electuar. diacarthami & diaphœnic. an. ℥ij. aq.

cinamom. destill. sine vino ℥ss. Misce. fiat potio.

Tandem Emplastrum aliquod adstringens applicui, & subligaculum adaptavi. Sic in vno favore gravissimo hoc periculosoque affectu liberatus fuit.

Joannes Hoff. Grammateus Hildenz, Compater meus plurimum honorandus, à multis annis Enterocœle gravissime vexatus, cum anno 1593. in itinere aliquo modo defessus, in terram sonni capessendi gratia decumbens, obdormivisset, intestinum ad magnitudinem fere capitis infantis in scrotum prolapsum est; quod quia illico repositum non fuerat, ab aere tum temporis sat frigido in ipso scroto frigidatum & inflatum est. Hinc dolore exorto, ipsoque à somno expergescens, vix donum (aqua iter unius horæ aberat) præ maximo cruciatu redire potuit. Ego ad illum accessus, ipsum quasi seminanem cum animi deliquis, vomitionibus frequentibus, itaque foetidis, ostendi. Dolores item tam maximi, tanque frequentes aderant, ut subinde sese ex una in alteram lecti partem jactare, coactus esset. Statim itaque supra scriptum Enema exhibui, & sacculum loco affecto applicui. Postea pedibus elevatis capiteque declivi posito, intestinum feliciter reposui. Tandem expurgato corpore, & subligaculo applicato, plenissime convalescit, multosque dehinc annos sanus vixit.

Anno 1607. die 16. Augusti. Johannes N. dler, faber sclopetarius, civis Paterniacensis, homo septuagenarius & herniosus, dolore colico cum intestini descensu correptus fuit. Ego quarta die morbi vocatus, ipsum febricitantem, cum maximis doloribus inferioris ventris ostendi. Intestinum cum nonnullis excrementis in eo contentis in dextrum inguen prolapsum erat, supraque modum durum percipiebatur. Quapropter cum illud vi reducere, consultum minus fore animadverterem, protinus ventrem, scrotum & inguen, oleo liliorum albor. pinguedine anser. & caponis inunxi, sacculumque ex emollientibus qualem supra descripsi, calide applicui, & enemata infudi. At quia in reductione intestini quæ citra violentiam maximam fieri non potuisset, timendum erat, ne intestinum laderetur, in usu medicamentorum prædictorum, per dies aliquot pergere visum fuit. Interim excrementis in intestino prolapsis inclusis, emollitis, injectis quoque per intervalla enematis emollientibus & attrahentibus, intestinum paulatim in locum suum naturalem retrocessit, ita ut ex maximo isto periculo Dei beneficio liberatus fuerit. Idem ibidem.

*Sarcocelen ut plurimum dextras occupare
partes probatur.*

Generosus quidam juvenis, cum amasiam suam amplecteretur, atque cum ipsa in actu venereo esset, & jam semen ejaculare vellent, à quodam cubiculum ingrediente in actu ita deturbatus fuit, ut semen retrocesserit, retentumque fuerit, quapropter dolor in inguine exortus est, & testiculi intumuerunt. Cum vero morbum propter crecundiam celasset, dolor in sinistro inguine paulatim per se remisit, intumescens evanuit, & testiculus ad naturalem statum re-

AAAA

diit, circa dextrum vero tumor remansit, qui successu temporis in ingentem herniam carnosam excrevit. Ego cum aliis magni nominis Medicis in consilium tandem adhibitus, non solum carnem circa dextrum testiculum concretam, verum etiam scrotum serosis humoribus ita extensum reperi, ut magnitudinem capitis infantis fere adæquaret.

Ante annos aliquot patritium Coloniensem una cum clarissimo viro Dn. D. Johanne Slotano Medico celeberrimo iuvili: Laborabat & ille maxima hernia carnosæ, eaque ex dextra parte.

Anni elapsi sunt tres, à quibus Bernam Helvetiorum ad virum quendam nobilem una cum clarissimo viro Dom. D. Paulo Lentulo poliatro Bernensi vocatus fui. Laboraverat ille per annos aliquot hernia carnosæ ex dextra parte, tandem quoque hydrocele accessit, ita ut scrotum in illam magnitudinem extenderetur, ut membrum virile plane absconderetur.

Ante menses quatuor Paterniacensis quidam Johannes Comes nomine, viginti quatuor circiter annorum ætatis, Lausannam ad me venit. Huic testiculus dexter in massam carnam durissimam, quæ magnitudinem pugni longe superabat, excreverat. Deliberavimus inter nos, ut ineunte Vere manum adhiberem. Verum cum aliquantisper diutius apud vos moram traherem, & affectus de die in diem mira celeritate accresceret, Freiburgum se contulit, ibique curationi cuiusdam Chirurgi sese submitit. Quid vero cum ipso factum sit, nondum intellexi.

Cum ante menses duos apud vos viverem, in pagum Vauxallançon ad Reverendum Virum Dn. Casparum Perretum, ibidem presbyterum vocatus fui. Illi autem non solum testiculus dexter, verum etiam vasa spermatica veluti in lapidem induruerant, ita ut manu compresso abdomine, duritiem illam in ipso quoque hypochondrio dextro sentire possem. Malum autem ad ipsam originem usque vasorum spermaticorum ascendere, dolor ipse, quem è regione vasorum spermaticorum ad remem usque dextrum continuo persentiebat, indicabat. Aderat præterea vomitus, & appetitus prostratio, non tamen propter herniam, ut quidam, qui ipsum ante me inviserat, statuit, sed ratione tumoris dolorosi & duri, è regione fundi ventriculi existentis, quique compresso abdomine, tactu facile percipi potuit. Quid plura? in tota praxi mea unicum solummodo, ex sinistra parte laborantem hernia carnosæ (quæ tandem in cancerum exulceratum atque insanabilem degeneravit) me vidisse memini. Peculiaris itaque huius rei ut aliqua sit causa, necesse est. Te, Vir doctissime, ut pro acumine ingenii tui, usu, atque experientia rerum medicarum, illam inquirere, mihi quæ haud gravatim communicare velis, obnixè rogo. Ego quid sentiam hac de re, paucis annectam.

Hernia carnosæ, quam Græci Sarcocelen vocant, teste Galeno, fit testiculo indurato, & utidem Galenus testatur, cum scirrhus convenit. Causam vero, humorum crassorum, ad testiculos decurrentium abundantiam, atque

partis affectæ debilitatem esse, Guido & alii statuunt. Platerus ex contusione vasorum spermaticorum in scroto, item ex succo è vasis illis luxuriante: Petrus Pigray vero ex humore non naturali e venis exiudante, ac paulatim in carnis substantiam transeunte, fieri scribunt. At vero Vigo docet, per affluxum alicujus humoris fieri herniam carnosam, nempe cum hujus materiæ subtilior pars propter calorem testiculorum in halitum resolvatur quicquid vero crassum & viscosum est, remaneat, in scirrhum tandem illam indurescere. Prædictæ porro causæ, etsi minime rejiciendæ, attamen cur potius in dextro, quam in sinistro testiculo locum habeant, nondum satis manifestum sit. Etenim potius circa sinistram testem herniam carnosam gigni debere, non inmerito cupiam videri possit. Dexter enim testiculus cum propter vasa à magnis vasis eo delata, sit calidior sinistro, ipsum robustiorem quoque esse sequitur. Ad calidum enim & siccum temperamentum (Galeni verbis utor) quod actionum robur consequatur, omnibus in confesso est. Torus itaque circa sinistram testiculum, qui dextro imbecillior est, sanguinemque impuriorem, ut idem Galenus testatur, ad se trahit, fluxum illum humorum delabi; ac proinde carnosam illam substantiam procreari posse, verisimile esse mihi videtur. Id vero cum rarissime observatum sit, causam carnosæ herniæ obscuram esse, cum Paulo Aeginetæ statuo. Quod si tamen præter prædictas causas, retentionem & alterationem, aut veluti corruptionem quandam seminis huius mali causam quoque esse, concedere velis, non usque adeo difficile erit causam invenire, cur in dextro testiculo potius quam in sinistro gignatur. Et revera retentionem seminis in Generoso isto viro, cujus ab initio memini, causam totius mali fuisse, certum est. Cum enim vasa omnia semine & spiritibus turgent, & natura ut sese exoneraret, intenta esset, retentionem, ac veluti refluxum illum seminis absque ingenti periculo fieri non potuisse, dolor ille, qui in inguine subortus est, testis fuit. Idem fortassis & in reliquis, quorum facta fuit mentio (qui forsitan causam morbi propter verecundiam celarent) accidit. Huiusmodi enim herniæ ut plurimum in juvenibus, qui sanguine & semine abundantes, & in coelibatu vivunt, accidere solent. Raro autem fit ex sinistra parte) quandoquidem senilis vena sinistra non à vena cava, quæmaximè dextra, sed ab emulgente sinistri renis exoritur. Itaque verisimile mihi plane esse videtur, cum semine ex vena emulgente nonnihil falsedignis & nitrositatis, quæ crassos viscososque humores incidat & resolvat, exsiccet, & putredini adversetur, ad sinistram testem deluere. Idem Cent. 4.

De Hernia aquosa, in qua præter sperm & opinionem carnosæ quadam substantia, vasis spermatici adnata, reperta fuit.

Argentina discedens, in Alsatia nobilissimum quendam juvenem, hernia aquosa laborantem invisi. Huic quia spacio quatuor annis

rum varia medicamenta, cum à me ante annum, tum etiam ante ab aliis frustra præscripta & admittita fuere, petierunt parentes, ut tentarem an aliqua alia via sanitati restitui possit filius, se quoque fore contentos, ut invideretur scrotum, dummodo conservaretur testiculus. Parvi, intra 3. septimanas curationem me feliciter absolvere posse sperabam: quandoquidem exterius nihil aliud præter aquam, quæ sive ad radios solares, sive noctu ad candelam exponerem scrotum, limpidissima, & in vesicula veluti in ampulla inclusa, apparebat: tactu quin etiam nulla durities percipi poterat, ita quidem, ut nihil præter aquam subelle putarem, uti & ante me ab aliis Medicis & Chirurgis iudicatum fuerat. Sed bene Deus, quam me fecellit opinio! quam verissimam esse divini Hippocratis sententiam, *Judicium difficile*, recipiam. Inveni purgato enim & præparato prius corpore, cum castro conio, absque ullo tantum dolore, scrotum perforassem, & tertio die post applicationem escharam separassem, præter aquam etiam carnosam quandam & induratum in teriam circumscire vasa spermatica inveni. Post excisionem itaque escharæ, cum nonnihil humoris serosi effluxisset, dolor ingens in infimo ventre, imprimis in inguine dextro (qui erat locus affectus) subito exoritur, sed momentaneus: antequam enim anodynum præparassem, per se, & nullo adhibito medicamento, remisit. Sequenti nocte scrotum aliquomodo litumuit, & tumor durissimus in superiori parte vaginæ, circumcirca vasa spermatica plenius percipiebatur. Tunc gravissima illa & periculosa symptomata, quæ ex hujusmodi æpitionibus aliquando provenisse sciebam, mihi in mentem venerunt. Ante annos enim aliquot, cum præstantissimus ille atque Excellentissimus Medico-Chirurgus Dom. Johannes Grissonius, piz memorie, Sabaudo cuidam Lausannæ scrotum aperuisset, & nihil aliud præterquam de hydrocele cogitasset, carnosam quoque substantiam, testiculo & Vasis spermaticis adnatam sed seroso humore velut submersa & tecta, reperta fuit, quæ & paulo post in cancerum malignum degeneravit: ubi medicamenta, ferrum simul & ignem, frustra adhibuit Grissonius.

Ante annos circiter tres Lausannæ idem fere mihi in quadragenario accidit. Sed ambo isti viri, quod non omittendum, pravis humoribus referti erant. Nobilis vero noster æger sanus est corpore, interim tamen serio apud me perpendens periculum, anxius fui, præcipue eam ob causam, quod de periculo ab initio nihil prædixeram. Ager tamen ætas juvenilis, constitutio corporis optima & sana, & quod ad illud usque tempus ab omni dolore, inflammatione, & febre immunis fuerat, obediens præterea, cordatus, & ad omnia, quæ agenda & patienda, paratissimus esset, animum meum à solitudine abducebant. Iterum igitur expurgato corpore, quæ leviter emolliunt, simul & discutunt, veluti emplastrum de mucilaginibus cum gommis, de mellisoto, & de ranis, per dies aliquot applicui. Ex illis cum malum minime ingravescere, quin potius duritiem decrescere, ac nihil maligni subelle (ab emollientibus enim medicamentis, inquit Galenus

de simplicibus medic. lib. 5. cancerosi tumores exasperantur; uti quoque in prima centuria observationum mearum exemplis demonstravi) inde cognovissem, ad fortiora perveni. Ulceri itaque pulverem insigniter emollientem, & materiam ex profundo extrahentem quotidie semel inspersi. Exterius humimenta, emplastra, cataplasmata, & similia emollientia applicui, quibus remediis Deus Opt. Max. ita benedixit, ut per singularem Dei misericordiam (cui in omne ævum laus sit & gloria) spatio quinque septimanarum, curatio feliciter ad optatum finem perducta sit. Vides clarissime mi Dom. Schlanovi, quanta in hunc affectibus sit difficultas, quantaque diligentia & vigilantia requiratur, quod si corpus cacochymicum extitisset, procul dubio propter accursum humorum de ipso actum fuisset. Hæc non sine causa, quæ te non later, ad te scribo, & ut literas nobilissimo viro, simili affectu laboranti, communicare velis suadeo. *Idem ibidem.*

De Hernia aquosa felicissima sectione.

Hernia aquosa, si ex causa interna ac latente originem habet, ut plurimum sinistram partem scroti occupat, serosusque ille humor in membrana testem involvente, Erythroïdæ dicta colligitur: idque præcipue fit rene sinistro, ut Dodonæus recte annotavit, male adiecto: quapropter serosos humores non attrahens, & ad vesicam mittens, per venam seminaariam, quæ illo in latere ex emulgente procedit, in membranam Erythroïdæm delabitur. Sectio autem herniæ aquosæ, si ex hujusmodi causa originem traxerit, & testiculus simul exemptus fuerit, periculo non vacat, ut idem Dodonæus observat. cap. 39. & 40. annotavit. Itaque ne temere quicquam hac in re tentet Chirurgus, suadeo. Ne tamen Tyrones cum meo in præcedenti observatione exemplo, tum exemplis à Dodonæo recitatis deterreantur, & ab officio atque instituto abducantur, sequenti exemplo illis animum erigam.

Jacobus Gerbetus, vir pius & illustrissimus Reipublicæ Bernensis Cominissarius dignissimus; quadragenarius, robustus, & bono corporis habitu præditus (cui & in juventute calculus per incisionem ex vesica extractus fuerat) à multis annis hernia aquosa ex sinistra parte vexabatur. Multa ipsi cum à me, tum ab aliis Medicis doctis præscripta & adhibita, tum interna, tum externa fuere medicamenta, absque fructu tamen omnia: ita ut tandem in maximam molem excreveret scrotum. Cum vefo æger tumorem indies abgeri vidisset, denuo me advocandum iussit, petiitque, ut extremum sibi auxilium adhiberem; quod etiam si periculo omnino non vacaret, experiri tamen potius maluit, quam in hujusmodi miseriis vitam diutius trahere. Quamvis enim dolorem non adeo gravem inferret tumor ille, equitando tamen & ambulando ipsi maximo erat impedimento.

Præparato itaque satis corpore, tum optima victus ratione præscripta, tum purgationibus aliquoties reiteratis, & venæ sectione, septima die Maii Anno 1602, ægrum in sedem

collocavi, deinde in superiore parte usque ad tunicam Erythroidam inciso scroto, ipsum ex anteriori parte ab ipsa membrana aliquantum separavi. At quia tota aqua in tunica illa continebatur, ita ut testiculus ei innareret, ne in posterum denuo descenderet aqua, acu incurvata, ac filo reduplicato universam hanc tunicam (præter vasa seminalia) apprehendi, & medio-criter construxi atque ligavi. Postea ex inferiori parte ligaturæ, membranam jam ante dictam secundum longitudinem incidi, & aquam ad libras aliquot extraxi, paulatim tamen, ne vires dehererent: Deinde turundam satis longam crassamque, ex stupis factam, ex albumine ovi madefactam, ad latus testiculi & inferiorem partem scroti versus iunxi. Inguina & imum ventris oleo rosaceo inunxi, & hæspum cannabis vitello atque albumine ovi, cum paucis aqua rosacea conquassatum madefactum applicui. Postero die iterum ventre & inguine iuncto, sequens digestivum applicui,

℞. Terebint. lotæ ʒij ceræ novæ ʒß. gummi elem. ʒj. ol. rosac. & amygdal. dulc. an. ʒß. ol. de vitellis ovo. unj. ʒij.

Dissolvatur gummum lentissimo igne cum oleis, terebinthina, & cera leparatum cum & pauxillo olei liquefactis, & additis, fiatque unguentum: tum admisce vitellum ovi, croci ʒß. Unguentum turundis longis & crassis vulnere imposui, & emplastrum Basiliconis applicui. Neque processu huncce, antequam vulnus probe esset digestum, mutavi. Tum pulverem mundificativum ulceri, & turundis quotidie semel aut bis inspersi, & ulcus per menses duos apertum retinui: interimque scrotum omni diligentia undificavi, corpus item per intervalla purgavi Tandem vulnus cicatrice obduxi, bona agri cum valetudine, qua etiam ad hunc usque: nunc 1608. quo hæc scripsi, fruitur. Ab eo tamen tempore optimam victus rationem observat, & singulis annis aliquoties superfluos humores pharmacis expurgat.

Annotatio.

In hac operatione cautus ut sit Chirurgus, atque circumspectus, propter pessima symptomata, quæ supervenire solent, necesse est. In primis autem nullo modo operationem hæc, nisi prius bene preparato corpore, incipiat. Quod si intemperiem aut vitium aliquod in rene subesse cognoverit, aut ab ipsa operatione omnino abtineat, aut scrotum in inferiori sua parte tantummodo incidat, ut serosus ille & inclusus humor effluat, via tamen nullo modo (ut sit cum testiculus abscinditur) obstipetur, & serosus humor, qui à rene attrahi non potest, in abdomine retineatur, sed si opus est, denuo illic defluere possit. Vidi ego Bisantiis sexagenarium virum pium ac probum cui Dom. Johannes Griffonius, Chirurgus præstantissimus propter herniam aquosam singulis annis scrotum ex inferiori parte perforabat, & serosum humorem evacuabat, postea ulcus ad cicatricem perducebat. Pervenit homo iste ad summam senectutem. Sin autem in rene vitium non fuerit, & defluxum planè impedire volueris, incisionem superiori parte scroti prope ingui-

na fieri expedit, quandoquidem duplex Chirurgus est scopus, prior evacuare serolum humorem, posterior prohibere, ne rursus de novo aqua in scrotum defluat, coarcteturque. At cum aqua hæc ut plurimum ex corpore in tunicam illam erythroidam dictam defluat, eamque extendat, necesse est ut incisio in superiori parte scroti fiat; sic enim tunica dilatata corrugatur, & cicatrix impedit, ne aqua postea facile in scrotum defluat. Ut autem hæc operatio rectè & majori cum facilitate administraretur, non super scammum ligandus est æger, nec supinus decumbere, sed in sella sedere debet, ut melius aqua deorsum descendat, & tunica in inguine facilius separari, & acu apprehendi possint. *Idem ibidem.*

De hernia aquosa periculosa sectione.

Hernia aquosa aut simplex est, aut composita. Simplicem appello, in qua sola aqua scrotum extenditur; Compositam, ubi circumcirca testiculum materia putrida collecta, aut denique varices ortæ fuerint. Accedit & nonnunquam, Cameratio testis, aquosa hernia, prolapsus intestini in scrotum, quod & ego observavi. Caro item sapissimè testiculis & eorum tunicis adnascitur, serosus enim humor iste nonnunquam acris factus, venas capillares, membranasque leviter erodit: hinc pars illa sanguinis, quæ paulatim exsudat, quæque optima & laudabilis est, beneficio caloris innati in carneam substantiam concrevit. Indurefcit autem sensim, propterea quod calor natus paulatim debilitatur: interim tamen in illam aliquando molem augetur atque accrescit, ut magnitudinem capitis humani, Montagnana consil. 127. Foresto lib. 27. scholio, observat. 23. attestantibus, accedat. Reliquum vero sanguinis, quod serosum est, paulatim membranas totumque scrotum adeo extendit, ut caro ista, quæ testiculo adheret, digitis palpari non possit. Hujus rei exemplum memorabile clarissimo, ac longè celeberrimo Viro Dn. Johanni Griffonio, Præceptoris meo perpetuo honorando observare contigit.

Quadragenarius quidam, natione Sabaudus, à multis annis hernia aquosa laborans, in Hispania à Medico quodam per scrotum trajecto setaceo, parvo cum negotio primo sanatus fuerat. Post annos vero aliquot, cum in victus ratione peccasset, & in Pharmacis sumendis negligens fuisset, denuo in scrotum delapsus est humor serosus, qui non solum membranas totumque scrotum in maximam magnitudinem extendit, verumetiam carneam substantiam procreavit, quæ tractu temporis supra modum indurata, naturam canceris sapiebat, idque eventus demonstravit clarius. Accedens enim Lausannam, ubi Dn. Griffonius tunc temporis degebat, nulla in ipso cognosci potuit hernia carnosæ, ita seroso humore extensum erat scrotum. Inciso scroto plurimum effluxit aquæ. Hinc scrotum primò suble-dit: post paucos tamen dies sequutus est dolor vehemens, inflammatio & cancerosum ulcus, maximeque malignum, quodque adeo impetuose adjacentes partes occupavit, ut ipsius malignitas nullo modo arceri posset. Itaque intra paucos dies maximo cum cruciatu & vita discessit.

Admonitio.

Admonitio.

Diligenter itaque Chirurgus signa omnia, quæ de herniis à Celso, Paulo Ægineta, aliisque medicis & Chirurgis describuntur, examinet, essentiamque morbi accurate investiget, antequam manus operi adhibeat, ne malum in pejus ruat. Præterea videat, ne corpus multis humoribus prævisceat, aut vitium aliquod insignis in renibus subit, quemadmodum fuerunt in istis viris herniosis, quarum Dodoneus Observat. 39. & 40. mentionem facit. Quotiescunque vero Chirurgus una cum aqua carnem circumcirca testiculum concretam subesse cognoverit, præstat scrotum incidere, testiculum, & quicquid circa ipsum conretum, separare atque excindere, dummodo id radicitus fieri possit: si enim scirrhusa illa materia processum sive didymum, ut vocant, jam occupat, & abdomini adhæret, frustra tentabitur incisio, & chirurgus infamiam. ægro vero immaturam mortem inferet. *Idem ibidem.*

Ex hernia aquosa inepta sectione immatura mors sequuta.

Dominus Petrus Grottesius, Paterniacensis Senator prudentissimus, Vir genere, virtute & pietate vere nobilis, quadragenarius, robustus, & optimo corporis habitu præditus cum anno 1606. ex equo in terram cecidisset, scrotum & testes sibi adeo contudit, ut inde exorto dolore, sequuta sit inflammatio, scrotum quintetiam & testes mox in tumorem magnum elevati sint. A principio propter vetecundiam malum celavit. Tandem cum me in consilium adhibuisset, viduus rationem tenuem præscripsi, corpus purgavi, & venam in cubito incidi. Loco vero affecto ab initio anodyna, discutientia & quæ simul aliquo modo repellunt, quale est sequens cataplasma, applicui.

℞. Farinæ hordei ℥ij. farinæ fabarum ℥j. Coquantur postea ad formam cataplasmatidis, in fine admisce pulveris rosarum odoriferarum ℥ss. & post unicam ebullitionem remotis ab igne, admisce vitellum & albumen unius ovi, olei rosarum parum, fiatque cataplasma, quod scroto per dies tres tepide applicui, bis in die. Deinde quæ magis resolvunt adhibui: quale est sequens cataplasma.

℞. Farinæ fabarum ℥iij. hordei ℥j. Coquantur vino rubro ad formam cataplasmatidis, postea admisce pulveris rosarum, florum chamomillæ, meliloti ana ℥ss. Olei rosarum & chamomillæ ana ℥j. Vitellum & albumen unius ovi. Misce, fiat cataplasma.

Horum medicamentorum beneficio dolor & inflammatio omnino remiserunt, inflatio quintetiam præcipue ex dextra parte scroti subsedit. Circumcirca vero testiculum sinistrum in membrana Erythroidæa, tumor quidam ex setoso humore remansit. Venuo itaque corpus per intervalla purgare visum fuit: loco affecto fomentationes & cataplasmata, quæ incidunt, resolvunt, & discutunt, admovi. Verum enim verò cum frustra hæc omnia esse viderem, quasi ut scalpello aut novacula scrotum incidi permitteretur hæc enim inclusum humorem facile & absque pe-

riculo evacuari posse, ipsi promittebatur. Ille etiam non recusaret, quia tamen tunc præ aliis occupationibus ipsi non licebat totum negotium naturæ tantisper, donec tempus esset aptum, committere voluit. Porro etiam tumor scroti paulatim accresceret, & setosus humor magis magisque in membranam Erythroidæam deflueret eamque distenderet, exiguum tamen incommodum inde ipsi sequebatur. Quapropter cum hac de re non usque adeo sollicitus esset, res in annum usque 1608. prolata fuit. Tum me absente, plane imperiti in manus empirici incidit. Is nulla habita ratione corporis, neque quod hesternis die in magnifico quodam convivio fuerat, & proximam præcedentem noctem inter pocula cum amicis absumperat, vigesima tertia Maji, postquam laute jentasset, & vino generoso atque mero iterum incaluisse, ipsum in scamnum callocavit, ac testem vi quadam extraxit. Post operationem mox supervenit & febris ardens atque continua, vigilia, aliaque symptomata, qui plurimum ac optimum huncce virum, ad finem usque vitæ usque continuo ac misere extorquebant. Et quia artis periti homines in consilium vocati minimè fuere, lipothymia quoque & sudores frigidi tandem supervenerunt, ita ut vigesima die morbi animam Deo pie reddiderit, maximo cum luctu civium & reipublicæ dispendio. Post mortem scrotum totumque sinistrum latus supramundum intumuit, nigrum lividumque erat. *Idem ibidem.*

Pro Hernia Inguinali.

Puella quædam duodecim annorum per dimidium anni hernia inguinali laborans, quæ à Medicis quantunvis doctis, quorum opera usa fuerat, sanari non potuerit, ad me accedens, in hunc modum cum ea processit: ut sequentem bolum omnium primo leviores præcepi.

℞. Cass. rec. extra ℥vij. sem. dauci. pulv. ℥ss. sacch. asperlo. F. bolus. Deinde hoc totum usum.

℞. Rad. alth. ℥ij. fol. malv. fl. chamæ. melilot. summit. aneth. an. M. j. sem. lini ℥ss. F. decoctio in aq. pro ℥ss. quo totum sine magno negotio intestina in locum suum reducta fuerunt. Deinde iussimus, ut quotidie locus affectus inungeretur oleo ovorum, myrteo, & hyperici simul mixtis, & ut mox emplastrum contra rupturam applicaret per plures dies: & ut subligaculis ad hoc aptis utens, recte cincta semper procederet: præterea præcepi, ut interea perpetuo uteretur cerevitiæ in qua decocta esset radix consolid. maj. adjecto exiguo saccharo ad saporem: illis continuatis hæc tandem recte curata fuit. Petrus Forestus, obs. lib. 17. De Scrot. & Testiculorum vitis.

Inter arcana Io. Tiengii Medici quondam amstelrod. mensis hoc erat, quod quidam potans tribus septimanis ex decocto rad. sigilli Marie in vino curatus sit à ruptura. Ego etiam sollicitissime utor rad. sigilli Mariæ vel Solomonis. Petrus Forestus, obs. lib. 17.

Avenzoar refert de Juvene quodam qui hoc malo laborabat decubuitque duobus mensibus in dorso suo, & cum bono regimine sistit.

medicinarum applicatione liberatus est *Idem.*
obs. o. lib. 27.

Danda opera ut alvus sit lubrica : tumorem totum inungat terebinthina, sed prius foveatur decocto ablynth. ex vino : sacculus etiam parvus ex foliis absynthii apponi poterit. *Jo. Crato. consil. 17. lib. 7.*

Oleum hyperici compositum, quo utor per se illitum subinde calidum, mirum in modum in hoc effectu efficax atque utile comperi, quemadmodum aliis ruptis, convulsis, recens vulneratis, maxime ubi membranz aut nervosi generis aliquid oblatum est. Oleum ita fiat.

℞. Ol. opt. ℥ss. sem. & fl. hyperic. ʒix. vini Hispan. vel malvat. ʒviij. rad. tormentill. ʒiij. myrrh. gummi elemi, sarcocoll. thur. aloes, an. ʒss. lumbric. lotor. vino ʒiij. M. S. A. contusa bulliant ad dimidii consumptionem in duplici vase, deinde exprimendo coletur oleum : in eo dissolve croci ʒiij. ol. abietin. (resinam vel lacrimam abietis ita vocant) vel ejus loco terebinthin. puræ ℥ss. fl. maturor. hyperic. M. j. infunde mista per dies sex aut octo, ad solem diligenter obturata, Solis calore deficiente, post panem extractum, imponentur furno, deinde diligenter prioribus floribus expressis infundantur secundo, tertio, quarto, alii recentes hyperici flores, prioribus exemptis atque ita comparatum oleum servetur in usus.

Emplastrum sequens continuo geratur.

℞. Empl. contra ruptur. ʒj. maffi. h. glutin. piscium, sarcocoll. an. ʒij. pulv. rad. osmund. regal. sang. drac. an. ʒj. thur. alb. pulv. rad. consolid. maj. mumie, an. ʒß. gummi dissolvantur in aceto & cum olei hyperic. supradicti, q. s. f. empl. S. A. *Reinerus Solenander. consil. 14. sect. 4.*

Pro Hernia intestinali of theocole.

Novimus Illustriss. principem, qui jam annos circiter viginti & tres intestinorum satis magnam ranacem perfert solius fasciæ aptæ beneficio, & tamen sine ullo valetudinis dispendio omnes principum actiones etiam vehementes & graves in venerationibus, equitatione frequenti etiam in succussante equo, in longis & difficilissimis peregrinationibus, in intenso frigore subire solet. Si quando tussendum erit, item quotiescunque alvus egerenda, maxime si ea durior fuerit, inguen oblaxum retinendum atque utraq; aut saltem altera manu adducendum comprimendumque in cibis cuncta, quæ ventrem flatibus implere nata sunt ac distendunt, vitanda : quod si acciderit ut ileum intestinum vel quid aliud procidat & descendat in scrotum, & mora ibidem flatibus, ut induratis fecibus ita distendatur, ut difficulter reduci possit, ex usu erit (quod in ista necessitate subinde factum utile comperi) ut ex stercore ovillo dulci lacte incocto foveas adhibeatur, tum etiam idem cataplasmatibus in modum apponatur, reitereturque ut postea blandis manibus contrectatum reducatur. Ego fidem facio me aliquoties isto fove prædicto, cum res aliqui videretur in præcipiti esse, prolapsa & aliqui indiu extra corpus existentia intestina reposuisse, antea tentatis frustra aliis remediis, quæ propter hoc te celari nolui : quidam ab hernia sanatus fuit persolia-

æ usu, non tamen sine apta fasciæ. Ego non paucos hernia affectos juvenes in quiete degentes fasciæ commode ope percuravi, non admodum multis adhibitis medicamentis : ad hernias probantur lyncphytum majus, sanicula, jacea alba & nigra, ligulum Solom. quinquifolium, tormentilla, filix, pilosella, cujus integræ herbe pulverem Maio collectæ, infantibus & pueris herniosis continuo in cibis, in lacticiis, puerilibusque pulvis exhibitu comperi mirum in modum profuisse. Quidam persoliata ad rupturas sanandas feliciter utuntur. Novi qui hunc affectum novem ex ordine diebus cinere lactantis leporis in vino rubro vel decocto consolid. maj. exhibitio sanarunt.

Caspar Peucerus, Vir & pietate & doctrina insignis narravit D. Adolpho Occonti medico & mihi, se puerorum hernias recentis coagulati & in caseum formati lactis inpositione curasse. Scribit Hollerius se herniarum herbulæ succo expresso affuso vino exhibitio novem diebus perfecte hunc morbum curasse, & Antonius Valerius, qui luculentis exercitationibus Hollerii praxin ornavit, testatur aquæ ejus herule stillatiæ unico haultu percuratum Parisiis adolescentem, cui citatior saltus insignem herniam induxerat; adhibito tamen, ut scribit, emplastro. Vocatur hæc herba Holleriana, quod Hollerius primus ejus in hoc affectu efficaciam observaverit. Præscripta hæc omnia ex simplici medicina desumpta remedia tam exterius admodum, quam intro assumpta in propriis d. etis herniis prodesse mirifice possunt : quæ tamen in præsentis casu maxime profutura arbitror, hæc infrequentia ex prænominatis selecta notare placuit : itaque reducto intestino applicetur ceratum hoc triquetrum inguini iuxta posito splenio (quod fasciæ annexum inguene dehiscat aut laxetur continere debet) ut totum inguen contegat, prius nudato loco pilis.

℞. Nuc. cupress. gallar. an. ʒj. balaustr. hypocist. veri, an. ʒij. maffich. ʒiij. rad. consolid. maj. pulv. persoliar. herniar. an. ʒss. bdell. ʒß. boli armen. ʒij. sang. drac. ʒij. pic. græc. ʒj. resin. pini, ʒvi. cum terebinth. cera & oleo, vitell. ovor. vel hyperic. magistr. q. s. f. ceratum : hoc feliciter usus sum.

Vermis utaturum illud commune Arnoldi de Villa Nova ex pelle arietina dictum mihi præ ceteris omnibus maximopere probatur.

Recordor me Medicum exercitatum vidisse, qui assumpto quantum volebat gummi elemi, affundebat acetum, eo macerabat donec acetum in superficie obduceretur, alba pinguedine, tum affusis olei paucis guttis (oleum e vitell. ovor. vel hyperic. magis probarem) coquebat gummi lento igne liquatum ad formam cerati. Quando ego ipsius usum commodum scire, improbare haud queo. Ego hoc in pueris aliquoties feliciter sum usus.

℞. Persoliatæ viridia folia, & rad. consolid. maj. contero ut plane subacta simul sint & lavigata, addo ceræ novæ vel propolis tertiam partem, vel paulo plus : concorporata & bene commixta induco pittatio, ut inguini affecto sub splenio imponi possint : te autem suadeo, ut hoc quod sequitur simplicissimo utaris.

℞. Consolid. maj. radicem solam ab omni sordē

forde ablutam, munda nihil interim abradens, istam exquisitè tritam, & lavigatam, calefactam leviter induc pittura aliquo lineo albo & impone emplatri modo inguinis rupto sub splenio: nateetur bis in die, induto alio. O. servari intra dies quindecim ita ratione coalescere: possunt consolid. maj. radices saccharo conditi, subindeque exhiberi. *Reimerus Solenander. conf. 13. sect. 4.*

Alius jubet papyrum (nos charta emporetica uti poterimus) induto in aqua macerari atque in globum coactum inguini apponi, reposito prius melleo: Solet enim trichiana adhesionem a delapso vindicare: sed erit efficacius si aqua astringenti ut puta rosæ, myrtæ, papyrus vel quædam maceietur: hoc remedio ait Paræus le multos sanasse. *Rodericus à Fonseca. tom. 1. cons. 36.*

Filius cuiusdam pharmacopœi hernia intestinali laborans hac ratione feliciter curatus est.

℞. Beton. auric. naris, veronic. alchymill. pyrol. solidag. larrac. agrimon. senucl. an. M. ℞. rad. caryophyllat. ʒss. mell. & contusi coq. in M. ij. aqua ad consumpt. medietatis bibat mane & vespere haultum. postea.

℞. Lapid. magnet. mallech. an. ʒij. lap. calamar. sang. urac. an. ʒj. ferri ʒss. bol. armen. ʒss. vini sublimat. quart. j. M. in hoc panus duplicatus inactus herniæ fortiter adligabatur bis quotidie, mane & vespere cum lascia: brevi convaleuit. *Hieronymus Kousnerus. obs. 95.*

Enteroceleni adsumpta limatura ferri atque empl. magnetico appposito in seipso sanctam narrat Thom. Canpanella. lib. 6. Medicin. cap. 20. art. 1. quam tamen curandi rationem frustraneam doctrinæ ostendit Athanasius Kircherus. lib. 3. De Magnete. para. 7. c. 2. & contra Paræum urget Uop. For. Hemptius. schol. in Ebn. sin. lib. 2. quamquam non magnetismi ratione, sed propter vim siccantem admittat author Enchiridii medic. pract. cap. De Enterocèle. qua ratione hic quoque probari debet. Hieronym. Vellehius. *notis ad obs. 95. Kousneri.*

Generosus quidam Bernensis sexagenarius spatio viginti annorum insigni ac maxima hernia intestinali laboraverat, ad quam curandam cumque, tum alios in Gallia & alibi expertissimos adhibuerat Medicos & Chirurgos, sed frustra, tandem cum de sanitate recuperanda ne quidem cogitaret amplius, & subligaculis, ne ingravesceret malum, uteretur, incidit in morbum, a quo ultra menses sex lectro affixus fuit. Post morbum hunc ne minimum quidem indicium præcedentis herniæ sentit, nec amplius utitur splenis aut subligaculis. Ex his manifestum sit, quietem & decubitum in dorso, unicam esse panacæam herniarum. *Gul. Fabricius Hildanus. obs. 54. cent. 5.*

In Enterocèle, Bubonocèle & Epiplocele valet balsamus salis gemmæ, arcæum innumum in rupturis, qui hoc modo fit.

℞. Salis gemmæ lbj. suavit. igne (in sigillo) & postea solvatur in aqua pluviæ destillatæ filtratur, & vicilim coaguletur: has operationes quefactionis, solutionis, filtrationis, & coagulationis tantisper repete, donec sal gemmæ ad summam subtilitatem fuerit perductum, quod

inde cognoscitur, quando ejus particula ad candelam admota, statim liqueat: serva in vitro bene clauso: cura sic fit.

Repositis, si opus est (ut in Enterocèle & Epiplocele) partibus prolapsis, locus affectus lavetur cum aceto destillato acerrimo, vel cum spiritu vini quotidie bis post fomentationes ita cum iungatur locus cum arcæo salis gemmæ ad intra exhibe singulis diebus mane jejunio ventriculo ejusmodi consolid. maj. coenæ unum cum guttis ij. balsami salis gemmæ.

Si intestina & reliqua prominentia difficulter, reponi possint, etiam si emollientia per inestiones & fomentationes fuerint adhibita, ut facilius absolvatur cura, ceteris non neglectis, sic procede. Post adhibitas fomentationes quotidianas patienti exhibe per tres aut quatuor dies corticem exsiccatum & pulverisatum (quotidie cor unum) mense Maio collectum cum aq. cinnam. & foelicem videbis operationem. iungatur locus cum balsamo sulphuris. *Jo. Hartmann. practic. chimiar.*

Pro Hernia intestinali & omentali.

Post universalium & ordinariorum remedium ulum, exhibetur cochlear insequentis pulveris, mane & vespere, hoc a una ante cibum, continuando usque ad perfectam sanationem.

℞. Cortic. myrobal. indar. chebul. an. ʒss. nasturt. portulac. plantag. sumach. an. ʒss. corail. rub. lapid. hem. tit. carab. an. ʒj. cinnam. el. ʒij. sacch. rosat. ʒiij. f. pulvis. *Id. Fernus conf. 66.*

Pro Hernia hydrocele.

Vir quidam herniam aquosam, ὕδρωσιν, vocant Græci, patiebatur, quam citissime removi oleo sulphuris: quo totum rannicem perungebat mane ac vespere, & applicabat saccum ex calentibus cineribus factum. *M. Petrus Ananias. curat. 82. cent. 8.*

Paretur cataplasma ex stercore vaccino rec. & tertia parte pulv. bol. arm. ad. idem maxime valet & mihi valde probatum est. Cataplasma nunc describendum.

℞. Stercor. capræ ʒss. cochlear. cum suis testis contusis ʒj. curum. pulv. sulph. an. ʒij. M. f. cataplasma, parti affectæ applicandum, & sæpe renovandum: quod si hinc non cedat malum, punctione cum phlebotome vel sectione tandem utendum est. *Io. Zecchini. consil. 64.*

Infans quidam unde. in menses natus, laborabat hernia aquosa dextrum & item occupante; ita ut testis ovi exigui magnitudinem æquare videretur, vocatus ego, sequens præscribo cataplasma.

℞. Farin. ʒss. decoq. cum vino generoso ad pulvis consistentiam, deinde adde oxymel. simpl. ʒij. f. cat. plasma, admovendum sero & mane: intra octo dies hoc solo remedio tumor omnino dissolutus est. *Lazarus Rivierus. obs. 4. cent. 1.*

℞. Sol. origan. rutæ, abiyuth. chamæm. an. M. j. bac. lauri, ʒss. n. anil. fœnic. cumina. an. ʒss. coq. in f. q. aq. & aceti pro soru, quo foveatur ferotunter in die cum spongia: Postea applicetur hoc emplastrum.

℞. Empl. de bacc. lauri, sterc. caprin. an. ʒiʒ, cochlear. contus. cum testis. ʒʒ sem. cummi. sulph. an. ʒij. malaxentur cum oleiturac. chamem. an. q. s. F. Emplastrum. Hæc puer convaluit. *Io. Petrus Lotichius. obs. 10. cap. 3. lib. 6.*

Vir quidam Nobilis hydrocele laborans, ita sanitatem obtinuit, primo, consilio D. Ferrandi peritissimi medici, & meo, jalapio purgatus fuit, postea totus emollientes & discutientes adnoti, & tandem lanceola perforatus, in parte decliviori scroti, vitando testiculum, & lineam interstitium inter testiculos facientem, totus autem transversii digiti profunditatem attingit antequam aqua exiverit, quæ iteratis vicibus extracta fuit, clara & non fetida, eaque ad libras duas, cura hæc satis rara fuit, cum paucis post diebus ad negotia iverit. *Petrus Borellus. obs. 4. cent. 1.*

In Generoso quodam Viro, quam omnis periculi plena sit scroti, & erythroidis membranz in hydrocele per scapellum apertio, teste non subito, comperitum est, ab aliquot annis sinistra parte hydrocele huic molesta fuerat: frustra cataplasmatibus, ac aliis remediis crebro ulsi tandem temerarii Chirurgi consilio acquiescens, aperiri sibi scapello tumorem permissit: effluxit cito omnis humor: tumor quoque subsedit sed cum testis ipse omnino esset corruptus, vicinas partes facile infecit: subsecuta mox scroti universi, ac etiam penis cum tumore & ingenti dolore gangrena. Delirium cum vehementi febre propter doloris magnitudinem supervenit, ac non ita multo post mors accessit: ren hujus sinister corruptus fuit, & seminalis in erythroiden descendens valde ampla & multum patens. *Rember. Dodonæus. obs. 40. vide etiam obs. 39.*

De Hernia Omphalocele.

In oppidulo quodam mulierem inspexi, cui ex hernia omphalocele, universa pene intestinorum mole, è peritonæi cavitate providente, tumor immensus ac velut novus venter, a vero ventre flaccido & depresso, & in hunc tanquam Saccum inanito appensus propendebat, quem & fascia circumducta, ut onus hoc sublevaret, collo suspensum gestabat. *Felix Platerus. obs. lib. 3. pag. 719.*

Pro Hernia sarcocoele.

Juvenem quendam hernia sarcocoele laborantem absque incisione facile ita curavi.

℞. Pulv. sen. laxat. ʒʒ vini absynth. ʒijʒ. macerentur pro infuso. De quotidie bibit ad ʒij. colatas. Post sufficientem purgationem, utebatur ante & post meridiem balneo aquæ, in qua coquebatur tartarus ad ʒij. ante & post balneum inungebatur tumor oleo sulphur. nostro, motus rarus erat, quies vero in lecto multa, atque his sine remediis tumor indies decrevit, & per Dei gratiam spatio quatuor hebdomadum ex toto evanuit. *Martinus Rulandus. curat. 66. cent. 9.*

Chirurgus quidam insignis contra herniam tam carnosam quam aquosam emplastro sequenti feliciter utitur, quod singularis loco secreti mecum communicavit, eoque nobilius

aliud in hoc affectu remedium se non habere diserte profitebatur.

℞. Gummi ammoniac. ʒij. bdell. ʒj. farin. sem. sinap. sem. urtic. lap. spong. an. ʒj. aristolot. ʒvi. sulph. ʒʒ. terebint. ʒj. sp. vini ʒij. ol. olivar. ʒij. cera ʒvi. M. f. S. A. emplastrum. extend. super alutam, & loco affecto applicetur, continuo gestando. Si hoc non juverit substituitur ceratum de pelle arietina tam à Medicis Augustanis commendatum: intus vero de sequenti pulvere quo alias contra hernias prodesse soleo, aliquot mensibus assumat.

℞. Pulv. rad. consolid. maj. ʒʒ. pulv. herniar. ʒj. persoliat ʒvi spong. combust. spongiæ, cynosbat. adnascent. an. ʒij. lap. spong. ʒij. spod. terr. sigill. an. ʒij. cinnam. formic. d. an. ʒj. F. pulvis.

Aliquando etiam assumpsit de sequenti pulv. contra strumam, qui Arnoldo de Villa Nova ascribitur.

℞. Spong. combust. pilæ marin. tost. ossis sepis, piper. long. nigr. zinzib. cinnamom. sal. gemmæ, pyrethr. gallar. lap. spongiæ, an. ʒj. M. f. pulvis. *Io. Petrus Lotichius. obs. 9. cap. 3. lib. 6.*

Vir quidam Sarcocoele laborans quum cataplasma ex althæa, farina fabarum & lacte caprino frustra usurpasset, iussus à Gastero decocto lentium in aceto facto locum fovere, deinde suffire cum thure, & superponere emplastrum demelidoto cum licibus contulis mixto: cumque non statim resolveretur tumor, thermas feminas cogitare cepit, quas ipsi Gasterus dissuadere noluit. Sed his ipsis quoque non satis operantibus, quod unicui supererat remedium, ad sectionem devenit, quam testiculi iactura, tandem admittere coquebatur. *Io. Valerius Rumboldus obs. 91.*

Alius quidam hernia carnosæ laborans à Chirurgo quodam curatus fuit testiculorum ex vino sublimato, & imposito cataplasmate ex absynth. malo. chamam. rad. alth. & sect. lini, an. part. æq. confectis & in lacte caprillo coctis. Alius etiam eodem affectu laborans, sectionem postulavit, sed Chirurgi præsentia terrens, mutavit sententiam, & emollientium ac resolventium usu continuato, ramice in abscessum transeunte, & suppurato, feliciter tandem percuratus fuit. *Idem. obs. 92.*

Ileos ex Hernia curatus.

Septuagenarius in scroto vexabatur tumore valde magno ac dolorifico, ejusdem cum cute farina coloris; tormina sentiebat in abdomine ac evomebat quicquid assumebat; jam per viginti quatuor horas hoc in statu constitutus opemineam implorabat.

Æger inter examen à me institutum retulit, se jam per longam annorum seriem laborasse hernia, quæ sæpius eum, intestino in scrotum prolapsa, mirum in modum molestabat, ac iterum nullum afferebat incommodum, cum intestinum in locum suum recessisset; intestinum autem hoc nunquam antehac tandiu extra abdomen exulaverat, quam jam; & quicquid molebatur æger, illud reponere non potuit.

Morbum hunc satis periculosum esse, amicis prædixi, quia tandiu extra abdomen per-

permanerat intestinum; (Sic vir 40. annorum Ultrajecto Arenacum pedes profectus incidit in herniam scrotum iucitantem, cui antea etiam obnoxius erat, sed tantum in inguine, & tamen adhuc per quatuor horas accessit pedibus, unde tumor valde excrevit, eratque valde durus & dolens; æger interim semper vomebat, ac trigori expositus infra minne per totam noctem jacebat apud rusticum; postero die curru advectus est Arenacum continuo vomens. Mixture ægro propinabatur status discutiens, sed eadem mox vomitu rejiciebatur; tres præterea clysteres injecti sunt, sed sine fructu; æger in bono situ positus est, lotus humidi liccique imponebantur parti affectæ, sed his nihil juvantibus ægrotus quarto ægrotationis die e medio sublatus est pulsu sentim diminuto. Aper. II cadavere intestinum ileum inventum fuit gangrenæ affectum spirithamæ longitudine, ac sicut in scripto cum statibus & excrementis duris; præterea magna pars omentæ continebatur in scroto convoluta intar pilæ cum vasis sanguiferis valde distentis.) Interea autem amicos ægri admonui, ne animum animis desponderent, ac cum in finem iis narravi observationem octavam Riverio communicatam à Domino Ozia Aimar Chirurgo Gratianopolitano, in qua post multa remedia per novem dies in casum usurpata, intestinum per totidem lucas in scroto commoratum, repositum fuit feliciter incisione facta usque ad productionem peritonæi quæ intestinum strangulabat.

Sed unde provenit, quod in hernia intestinum prolatur in scrotum, aliasque partes? Ob relaxationem peritonæi, quæ exoritur ex eo, quod multi ejusdem tubuli obstruantur, inque illis fragent ac coacerventur humores, qui progressu temporis se insinuant inter fibrillas peritonæi, illudque hoc pacto relaxant.

Cur jam intestinum in scrotum nostri patientis delapsum, non tam facile rediit in abdomen, quam inde egressum est, cum via sit eadem? Hoc præcipue contigit, quia intestinum tandiu extra abdomen permanerat, ubi minor est calor; nam pori intestini eo modo aliquatenus obturati impedivere quo minus vapores obminorem calorem etiam aliqua ex parte condensati ex intestino in scroto decumbente libere quaquaversum egredierentur, quapropter illi coacervati sunt in intestino, illudque distenderunt flatibus vulgo nuncupatis.

Hinc igitur manifestum satis evadit, præcipuam hujus mali medeam consistere in eo ut pori intestini extra ventrem exulantis obstructi recludantur iterum, ac vapores aliquotque condensati, majore motus ac agitationis quantitate donentur, ut sic rursus citato gradu circa propria sua centra rotentur.

Utrumque hunc effectum consequutus sum lino nendo recenter contorto ac nondum coctione depurgato, nam ubi hoc prius in lacte dulci coctum calide per quadrantem horæ fuisset impositum parti affectæ, intestinum blanda manus agitatione, in abdomen ægri in bono situ collocati remigravit.

Æger hoc pacto ex vicinis orci faucibus ereptus postea cum piscatore icus sapuit, ac gestavit vinculum terreum externe velturum ad intestinum intus retinendum; non homines provecia ætatis à tali malo prorsus velle sanare, est oleum ac operam perdere contingit enim admodum raro, quod Fabric. Hildanus refert in lib. suarum observationum. nimirum sexagenarium per 20. annos hernia magna laborasse intestini, quæ à nullo Chirurgorum aut Medicorum potuit sanari, cumque senem postea sine medicamentis in totum esse restitutum pristinae sanitati, postquam morbo aliquo periculoso decubnerat in dorso per semel tre spatium, ideoque optimum contra herniam remedium citatus Autor esse affirmat quietem & decubitus in dorso.

Hernias vero puerulorum sæpissime sanatas esse vidi, & quidem præsertim circa octavum ætatis annum, bona fasciæ ex linteis confecta ac emplastro carminante Sylvii extenso super corium, quod reperitur præx. lib. 1. cap. 12. tit. 58. in quo tamen unum errorem, quem neminem secuturum spero, annotare lubet, sc. quod gummi, galbanum, aliaque solvantur in aceto saleis volatilibus eorum non parum infringente.

Juramentum Medicorum in Academia Ultrajectina jubet, audita vel visa inter curandum, non enuntianda, involvere silentio, hocque stricte observandum puto in h. r. n. i. juvenum, quandoquidem hoc malum puellis invisum magis esse solet quam par est, quod, antequam hanc observationem finiam, exemplo declarare mihi proposui.

Recenter nupta virgo, u. i. prima vice lectum cum suo sponso esset ing. ella intrepida manu mox illas mariti partes contrectat, quas Adamus sibi ficum solis statim post lapsum contexisse legitur, atque ita eundem hernia divexari ex vinculo quod gestabat animadvertit, unde fere in furorē ætia, hæc in verba erupit: pudeat te conjux quod Asiam tuam tam impiè deceperis; quid consilii mihi misera? Perii profecto; num tam male conformatum corpus puella in flore ætatis constituta, ac annuū decimū octavū nondum egressa satisfacere potest? Minime, actum est de me; emori mallet, quam tecum amplius habitare.

Maritus, hæc super re interea temporis serio philosophatus, placido sermone tandem respondit; bono animo sis, anima mea, vanam ac supervacuum hanc, meum corculum, repelle sollicitudinem, quoniam pollicor tibi, me proviri conaturum efficere, ne unquam hæc de te conqueraris amplius, ac novem mensibus vix elapsis experientia mariti verba confirmavit gemellis, quos enixa est uxor, postea mutire vix audens de imaginaria conjugis impotentia. *Joh. Mayr in Prax. Chirurg. Rationali.*

Hernia inguinalis, cum gangrenæ.

Thomas Adeler, eques Anglus sexagenarius, herniam in inguine sinistro per multos annos habuerat. Anno 1637. mense Septembris

intestinum, quod in herniam inciderat, nimis flatibus distentum, atque hinc disruptum fuit, ita ut itercōra in herniæ capacitatem prolaberentur. Hæc prolavies gangrænam cum fœtore intolerabili partem statim induxit, quæ inde cito putrefacta & disrupta fuit, atque ita fæces alvi ordinariæ per terniam foras profluxerunt, nunquam per anum. Ego vocatus prædixi ægrum evadere non posse: ne tamen incuria mea perfici videretur, per Chirurgum applicare iussi spiritum vini cum melle rosato & unguento ægyptiaco, usque dum partes gangrænosæ à sanis separarentur & deciderent. Tunc intestinum non tantum ruptum, sed omnino transversim abruptum esse, ejusque partem superiorem foras propendere, hincque itercōra profluere animadvertimus. Hic intestini fidei progressu temporis carnosior evasit, & quasi carneum induratum acquisivit, qui annulus cum vicina carne firmiter coalluit, ita ut postea intestinum hoc loco semper fixum & apertum remanserit, atque inde ægro præter voluntatem alvi fæces semper effluerint. Huic parti postea cacabum parvum zincum, comode adaptatum, semper appensum gessit, sic reliqua sanus, quocumque vellet deambulans. Nonus jam agitur annus quo huic molestissimo oneri assuetus nunquam ægrotavit.

Rarissimum hoc est & notatu dignum exemplum. Antehac nunquam credideram intestinum abruptum in inguine cum vicina carne coalescere posse, quod tamen in hoc ægro oculatus testis mihi vidisse testor, nunquam antea à me observatum; licet hujusmodi intestinorum rupturas in aliis aliquoties viderim. Si forte intestinum abruptum inter carnosos abdominis musculos foras erumpat, tunc quid aliquando contingere posse verisimile videtur, cujus rei notabilem casum Platerus observat. lib. 3. sic describit. Capitaneus quidam ante annos multos in ventre vulneratus, itercūs per fistulam, quæ sanato vulnere illic remanserat, multos annos incolumis aliquoties & superflues, excrevit. Cujus causam investigans ex anatomicis observationibus, certis argumentis collegi, intestinorum vulnera, si illis in locis, ubi carnes musculorum abdominis portiones exiliunt, ventrem penetrent, agglutinationis tunc utriusque, & intestinorum & musculorum carnis, vulnere in ambitu labiis, viam fieri posse, per quam stercus extra corpus educatur, & in abdominis cavum excidere prohibeatur, eaq; vulnera licet consolidari nequeant, minime tamen esse lethalia: quod etsi rarum sit, tamen & in aliis partibus, ut vesica, accidit. Idem Platerus proxime sequenti observatione adhuc alium similem casum enarrat. Joannes Hornung Medicus Heldenheimensis, epist. ad Gregorium Horstium, enarrat historiam rustici cui vulnere abdominis intestinum rectum vulnere lato apertum exivit, neque à Chirurgus reductum est, sed sanato abdominis vulnere, toto vitæ tempore foras propendit, naturalem colorem retinens, sed paulatim crassius ac carnosius evadens, per quod propendens intestinum fæces alvi cum magno fœtore excernebantur, neque amplius ab ano prodibant. *J. Brand: de Diemerbroeck in Observat. & Curation. Medic.*

Epiplocele cum sarcocèle conjuncta, ex erosione omenti complicata, emata carne in spithamam longitudinem ex inguine propendente.

Quidam Estensis in Patavino Xenodochio habuit prominentiam longam spithamam, instar priapi ex inguine luxuriantem, ubi procellus peritonæi, crassam vero duos digitos transversos, adeo ut non inconcinne æmularetur, formam alterius membri virilis. Cum vero ab ægro quærerem hujus morbi originem, atque negaret esse intestinum prolapsum, ex ejus verbis conjectura assecutus sum, esse omentum complicatum, cum prius Bubonocèle laborasset, postmodum abscisso, quod disrupto, prorupit omentum, atque sensim ita convolutum fuit, illique propter erosionem caro quædam inter plicas accreverat in prædictam formam, quem hoc modo curavi. Primo expurgatis humoribus redundantibus, portunculam dictæ prominentiæ secui, ampliato usque adeo vulnere, ut omentum implicatum se proderet, quod duobus, vel tribus post diebus secui ex toto ad inguina usque, tum digerentibus, demum consuetis exsiccantibus cicatricem obduxi, incolumi adhuc ægro, & omni molestia vacuo. *Petrus de Marchettis in Observat. Medicæ Chirurgical. Sylloge.*

Bubonocèle loco bubonis Venerei ab imperitâ barbisonfore secta, prodeuntibus alvi facibus, brevi temporis spatio sanata.

Villicus quidam Bubonocèle laborans, barbisonforem accersit, qui Venereum bubonem cum existimaret, ejus proinde sectionem suadebat; quanquam æger cum nulla alia muliere; uxore propria excepta, rem se habuisse sancte affirmaret, honesta equidem; ac pudica; cum vero tonsor opinionem suam tueretur mordicus, atque omnino sectionem opus esse, eam tandem miser villicus admisit; ex qua cum fæces erumperent, statim in lipothymiam prolapsus est; tonsore obstupescente. Ego vero cum casu illac transirem, vocatus, statim digito compuli intestinum in locum proprium, applicato ovi albumine, cum sanguine draconis, atque linteolo quadruplicato compressione facta atque nonnihil construxi quatuor dies, à quibus cerato denuo ad herniam ab Aquapendente usus, spatio decem dierum, sectæ partes coaluerunt. Tandem meo consilio totum vitæ tempus gestato cingulo, multos annos incolumis vixit. *Idem ibidem.*

De Hernia intestinali.

Filiolus nondum bimulus prænobilis Viri S. P. herniosus, prolapsis per peritonæi processum intestinalis, catarrhis & tussi molestissima gravissime affectus, ægrotavit hyeme jam adulta, Adhibita in rem plurima. Concussio corporis à tussi intestinali, quamvis, reposita & fasciis ac subligaculis contricta, sed tamen sua contineri non est passa. Accessit Lithotomi uxor, adducta à peregrino Chémistæ, quæ ventri Cobitides barbatulas imposuit, ut hæsilo quæ virtute in-

testina

testina prolapsa retraherentur, & loco suo firmarentur. Sed puer tamen obiit. Unde contentionem haud leves mixtis conviciis inter Medicos utrinque, parum decoræ: magnetilimum hinc illo defendente, illinc autem altero mortis causam internumante, quæ quomodo tandem transactæ fuerint, non satis constat. Nos interim interrogati respondimus, curationem ejusmodi mere empiricam, non quidem lethiferam, sed tamen ineptam, & inutilem fuisse, ipso eventu attestante, dum nugis ejusmodi certiora præsidia intermitteri oportebat. *Georg. Hieronymi Velschii.*

*Hernia intestinalis cura temeraria
lethalis.*

I. B. I. F. de K. hernia intestinali, seu bubonocoele per multos annos laboraverat, cui sæpius intestinorum pars, neglectis tortasse fasciis & decente subligamine, in inguine aliquando valde prominens ac refrigerata dolores acerbos causavit, & nullo modo quam sumentis tepidis emollita in ventrem recessit. Sed cum sexagenario ob flatuum abundantiam iterum accideret hoc malum, intermissa deligatione soluta, intestinum diu nimis propendens refrigeraretur & induresceret, circumforaneus quidam perseveranter promiserat, se intestinum propendens facile intrusurum, & herniosum hunc affectum perfecte curaturum; verum ob renixum & contractionem cutis dilaceratæ, ac intestini inflati & indurati magnitudinem, scalpello eugem & peritonæi membranam prolixius dilatavit, intruloque violenter intestino nec prius emollito nec tepelato, cutis discissæ ora confibulavit, ab emplastro imposito fasciis deligavit, attamen brevi post patiens febrem ardentem cum animi deliquiis sentiens, & accedente sphacelo intestinorum, paucos intra dies vitam cum morte commutavit. *Helvigi.*

Schulion Schraegii.) Ut Agyrtarum in decipiendo promptitudo temeritate ubique circumvallatur, sic & in herniis eandem multoties spectandam impune exhibent, quas dum pter tractare, & absque necessitate crudeliter secando adgredi sunt paratissimi, necessaria partium, quas incidunt, cognitione vacui, nec symptomatum supervenientium medela instructi, sed unico experimentorum, quam morte aliorum sibi comparant, fulcro cæci incedentes, vilissimoque ut plurimum ab ortu ad opus hoc accedentes; qualem herniotomum Guil. Fabr. Hildanus præfat. Oper. chirurg. delineat, qui subulcus porcos castrare cum didicisset, in hominibus postea idem tentaverat, sed præstat unum alterumque exemplum in curando & secando temerariorum hominum ægriperitorum pebulonum indiguisse; Hernia omentalis in lanione, nec non intestinalis in alio perperam, & cum ægrotum interitu curatæ habet Malach. Geigerus Kelegraph. cap. 3. Adolescenti in præpostera hernia inguinalis sectione, ab agyrta pennago cuius fallax injuria sacco holperico inclusa fuerat, intestinum vulneratum narrat Philipp. Hochstetterus dec. 30. obs. med. cas. 3. Intestinalem agyrta rulticus, sarcocelen forte reputans, suppuratione curaturus, in exitum decubaverat ægrum,

ceu refert Henr. Salmuth. cent. 1. obs. mēd. 11. Contra Gallum agyrtam, herniarum curam nullo aureo certissimum pollicitum, Henricus ab Hees obs. med. 22. invenitur, quem nullo ferreo mercurio crudo oblito, intestinum ileum una comprehendisse, & valida contorsione secibus per inferiora exitum letaliter præclusisse, memorat, Barbitonfor imperitus villico bubonocoele, quam venereum bubonem crediderat, laboranti, ejusdem sectionem persuadens, purulenta materia loco, feces erumpentes obtupuit; ægroto tamen exercitatissimi Petri de Marchettis ope, restitutum, quod ipse recenset observat. med. chirurg. 55. Cui simile exemplum producit Hieron. Fabricius ab Aquapendente tract. de operat. chirurg. cap. de bubonocoele, Sic etiam, quodam Naturæ lusu aut errore, testiculum in inguine reconditum habentes, aut tertio insuper præditos, pro herniis miserrime frustra que divexatos scimus: quales vidisse se tentatur citatus Geigerus, nec non Ambros. Peraus lib. 7. oper. chirurg. cap. 16. Notabilis quoque est historia, quam Aquapenden. cap. de intest. hern. exhibet, adolecentis nimirum, testiculorum naturalem in magnitudine diversitatem ignorantis, atque ex sinistra maiore mole herniam pertinenscentis; quam cum herniotomo ostendisset, & nisi testis extraheretur, mortem instare, persuaderi sibi passus fuisset, jam legatus castrationem expectabat, nisi Fabricii consilio a castratione ista liberatus fuisset, scilicet quatuordecim cum sit illa sectionis crudelitas, quam præter dolores, testiculi iacturam, ipsiusque vitæ periculum, care satis redimere ægroci coguntur, herniotomi isti inhumani ad persuadendam cum ferro medelam sunt expeditissimi; quamvis plurimi, non pueri tantum, sed adulti quoque, solo medicamentorum usu, sedulaque deligatione, vel omnino curari, sed saltem minori cum discrimine degere possent. Hinc Bartholinus cent. 4. Epist. med. 22. Herniam, scribit, inguinalem in adultis pro inoperabili non habeo, si vel recens sit, non inveterata, vel imperfecta tantum sit, si pica vaginali nonnihil dilata sit. Utrique enim casu non difficulter primo reponendum est intestinum; deinde pars emplastro adstringente & vinculo munienda. Sic Paulus Ægineta lib. 3. de re med. cap. 5, multos pueros citra manus operam medicamentibus impositis, & convenienti deligatione persanatos refert, Joh. Sculterus innumeros, longo temporis progressu, magna adhibita cura remediis, bracherio, viculisque honoratione pristinae sanitati se restituisse; quos vero vel ob affectus magnitudinem, vel ejusdem diuturnitatem integre sanare non potuerat, incrementum saltem enterocœles se prohibuisse, testatur part. 1. Armament. chirurg. tab. 39. Hinc malefacere, part. 2. obs. 64. judicat, qui maluit a Castratoribus torqueri, quam Medicis iustiora bene consulentibus per mentem obedire; prout nec illos Medicos laudem mereri, qui ab ægro rogati Orchotomis adstant, & Circumforaneos male operantes non corrigunt. Quod etiam de inguinalibus puerorum herniis Ambros. Parvus l. c. cap. 15. fatetur, remediis opes multos à se sanatos, & castratorum manibus, testiculorum puerilium avidis, ereptis scribens, quin & de adultioris ætatis homine exemplum proferens, hæc præfatus Fabricius ab

Aquapendente, Horatium de Norlia, operatorem hac in re maxime exercitatum, & qui plus quam ducentos quorannis castrando curaverat, postea nec etiam viginti sectioni huic subjecisse refert, cum bracherio & adstringente medicamento imposito plerisque sanari observasset. Quin & Nicol. Monardus de simpl. medic. ex Novo Orbe delat. cap. 72. solam ligaturam decentem sufficere posse existimans, nulla herba aliave re imposita, cuiusdam Cordubensis mentionem facit, qui omnes herniosos eo modo curaverat. Atque Joh. B. pr. Helmontius herniæ bene ligatæ citra expectationem sanatæ meminit tr. Pueril. humoril. vindict. p. in 33. cum patiens ex ossifragio diu lumbis decubisset.

Hernia inveterata periculosa.

Dn. V. C. de W. Ann. 1663. die 19. Aprilis ventris contipationes flatulentas & dolores lancinantes sentiebat, & inquieto dormiverat, ideoque sequente dieculo Medicum accersiri iussit, de his doloribus, præsertim in lumbis ad latus sinistram ac in inguine dextro, calculum renalem fore putans, querebundus remedia petiit. Sed cum ex gressu & loquela difficultate Medicus jamdudum herniam quandam suspicatus, quam æger per viginti septem jam annos tolerans, præ pudore celaverat, nihilque unquam medicamine, nec auxilio, nec ligatura ad sublevandum tam grande pondus usus erat, inde omnium medicamentorum successus difficiles fore hic aperte pronunciavit, nihilominus pro morbi itatu & qualitate caute procedens ad ventrem leniendum, ac dolores flatulentos amolientos, portionem brevem laxativam & carminativam, atque somentationes externas, itemque alia interna, non omisis cordialibus, præscripsit, per quæ die 21. Aprilis evacuationes tres leves ille habuit, dolorum mitigationem quandam sensit, sine ulla urinae difficultate, aut suppressione, quapropter patiens bonam revalescendi spem conceperat. Subsequente vero nocte diei 21. Aprilis morbus, seu dolores lancinantes cum corporis in lecto circumjectione magna, recruduerunt, quocirca inter alia mitigantia, ad instantiam ipsius ægri, infusus balnei ex decocto emollientium & flatus diffutientium, cum bono, quamdiu infederat, sublevamine, quod ipse prædicabat, concessus fuit, sed subinde adveniente ob longiorem moram in balneo, virium prostratione & spirandi difficultate, ventre rursus contipato, circa vesperam portionem quandam cassiæ extractæ in jusculo sumpsit, suppositorioque sub nocte applicato, quæ tamen præter spem nullam sedem moverant; nox quidem paululum quietior fuit. Mane autem, die videlicet 23. Aprilis circa horam quartam, coram Medico nihili pene quam anhelitum difficultatem querens patiens, maturius levamen desideravit, & cum Medicus vix quicquam scriberet, & ad pharmacopolium materet, æger ad alvi secessum se propere commovens, administrantes advocavit, tunc subito illi spiratio deficere videbatur, & lente sic inter suorum brachia occubuit. Post obitum hernia inspecta, quam vivens ille valde pudibundus ab aliis conspici &

contrectari unquam noluit, inventa est magnitudine caput viri robustissimi excedens, atque pondere aliquot librarum extra corpus dependens, vixit vero ille ad mortem usque in calibatu. Helvvigii.

Scholion Schrocki.) Ex incuria, pudore & negligentia maximas tandem oriri posse hernias, non est dubium; intestina enim, via ad scrotum inventa, cum pondere gravia sint, sensim magis magisque eo devolvuntur. Tales amplissimas hernias Olaus Borrichius in centur. 4. epist. medic. Bartholini 92. Joh. Mækeranus cap. 5. observat. chirurg. Felix Platerus lib. 3. observat. pag. 736. & Johann. Freitagius apud Gregor. Hortium lib. 2. epistol. medic. lect. 19. &c. descripserunt. Quarum sane cura difficilima & ut plurimum frustranea existit; præcipue si, quod facile accidit, inflammatione, & quæ eam insequitur, gangræna corripiente intestina prolapsa, sive a frigore externo lædantur, flatibus sæcibusque distenta compressionem patiantur, adeoque sanguinis liberior ibi transitus inhibeatur; sive justo calidiora interna externave remedia in usum ducantur; aut etiam violentiori manu tractentur; qua ratione, alias inter animadversiones, in curatione enterocæles notandas Dominic. Panarolo cent. 2. observat. med. 49. primo loco non onere placuit, à Chirurgo sæpius manum haud admovendam esse, cum alias dolor; & cum dolore attractio crescat.

Hernia Curata.

Filium meum Henricum, cum in Patriam meam misissem, ut fugeret pestem Brigæ grassantem, ibidem herniosus factus est, intestinum prominebat in scroto dimidii digiti longitudine. Postquam id digitis intro adegissem, præscripsi pulverem, qui Rec. Fol. Consol. Sarac. Sem. & fol. persol. ana. 3iij. Fol. Piloselli rad. Consol. maj. ana. 3ß. Sach. penid. 3v. M. F. Pulvis. De hoc indies mane usus est in jusculo & quievit aliquot horas. Inunxi etiam inguina Ol. momord. & imposui Emplastrum contra Rupturam. Subligaculo etiam usus est aliquandiu, quod tamen postea amovi, & ita integre Dei beneficio curatus est. Egit annum fere quintum.

Scholion.) Fuit Enterocæles, Curatio, quam eventus conprobavit, est egregia, & nullus dubito, quin in aliis eundem exitum & emolumentum præstitura sit. Æger fuit Avunculus meus, qui in senium & ad Mortem usque nunquam huic malo amplius fuit afflictus. Ita ut sane integre & perfecte restitutus fuerit. *Christoph. Roessleri.*

Enterocæle desperata, curata.

Andreas Nuck Gottlaviensis, anno 1661. d. 8. aug. hernia intestinali diu laborans, agros suscepiendi ergo campum adit, sulcando autem, nimium que se movendo, intestina in scrotum prolapsa sentit; domum itaque delatus, varia adhibuit remedia domestica. Parum autem istis proficientibus, quin potius symptomatis aliis pluribus irruentibus, in pejus ruit. Obortus enim deplorandus ille affectus Miserere mei, singultus iussu per

insuper vehementissimus, à vicinis ultra sextam etiam domum auditus. Summo itaque in periculo constitutus æger meum implorat auxilium. Intuito autem misero agri statu, ipsemet expavit, tum, quod remediis convenientibus non satis essem instructus, tum quod scirem frustraneos esse tali in casu sæpe conatus. Quo autem adstantium, ægri imprimis, votis satisfacerem, de his, quæ in pago ad manus erant, medicamentis, fui sollicitus, ex horto itaque prope ædes ipsemet collegi seq. herbas pro clystere fomentoque v. g. herb. malv. alth. viol. alfin., chamom. an. M. ii. coq. in lb. iii. lact. vacc. & dissol., butyr. rec. ℥iii. mell. ℥ii. diversis vicibus injectus est clyster & c. Species autem facculis duobus inditas, fomentationis ergo alternatim calidè imposui, totumque abdomen fovi. Coxi & insuper potionem sequentem, quam frequenter assumpsit.

℥. Herb. equis. M. i. rad. liquirit. sem. an. i. carvi. an. ℥ss. Quamvis autem hæc omnia ritè facta sint, de mortis tamen necessitate nemo non cogitabat. Convocatis itaque amicis, Parochoque Dn. Scheffero, voluntatem suam intimavit ultimam, viaticoque sacro accepto, & mihi & adstantibus cæteris porrecta manu, vale dixit. Continuantibus autem nobis medicamentorum applicationem, fomenta imprimis diligenter adhibendo, insigni repitu ac strepitu, intestina in abdomen sunt regressa. Hinc forcum per superiora ejectio, singultusque inhibitus. Æger autem paulo post optime exoptateque restitutus est. Vivunt autem hujus rei in Gottlav. hodie nunc adhuc, & æger, aliique adstantium testes veridici plures. D. Johannis Friderici Illmachersi.

Enterocèle enormis dextera manu reducta Recidivæ metu castratione post feliciter instituta.

Devolvebatur frequenter in scrotum intestinum Mag. N. B. Horologiopero Genevensi: Anno 1670. tam enormis supervenit illi delapsus ut omnia intestina illuc devoluta credidisset; scrotum ad capitis biennis pueri magnitudinem intumuerat; Advocati Chirurgi, iique non imperiti, operam inanem ludebant, nec enim reductionis ullum progressum fecerat ut gangræna in pro-cinctu esset, jamque spes omnis salutis ægro & assidentibus excidisset. Notus mihi erat peritissimus Herniotomus in proximo districtu operans, Colerius Filius; Fortuito & fauste ea die in urbem advenerat; & quanquam de successu dubius essem, ille tamen repositionem intestini aggressus, tam celeri manu eam absolvit, ut duodecima horæ pars interim vix effluerit. Combitto gangrænae progressu, sedata inflammatione, ac spatio concessio ut æger vires collapsæ reumeret, Eunuchismus ab eodem Colerio susceptus, cui non invite se subiecit miser, eadem felicitate & celeritate perfectio, adeo ut intra octiduum plane convalesceret: Eandem Operationem, in non dissimili Enterocèle, ante biennium in consanguineo cognomine, eadem industria eventumque æque felici præstiterat: Ut hinc, aliisque exemplis, colligere liceat affectum hunc hereditariis adnumerandum esse: Neque tamen artis peritia (præ chirurgorum quorundam tu-

more & *anagisiam*) jus civitatis comparare illi Herniotomio licuit, etli apud nos endemium sic id malum, *Ib. Boneti.*

Hernia Curata.

Dominus Balthasar à Rotkirch cum jam 50. & aliquot annorum esset, dicebat se curatum Subligaculo & crebro usu Consolidæ saracenicæ & persoliatæ in jussulo cum axungia gallinæ, melle & butyro majali. Sed per annum lusus est.

Scholion. In Pueris quidem cura herniarum non tantum difficultatis habet, quantum in Senibus. cum ipsorum Humidum radicale adhuc inexhaustum, nec huiusmodi tanta acrimonia scateant, ut glutinationem impedire possint; tamen aliquando hanc curam etiam in senibus succedere, si in usu medicamentorum perseverent, inter alia & hoc Exemplum testimonium satis luculentum exhibet. Sed in hoc voluptuoso seculo necessum esset ut Medicus Patientiam, si vendibilis esset medicamentis admisceret, nam delicatissimi homines, cum adhuc in primoribus labiis medicamentum versatur, effectum & levamen desiderant. Ad curam quod attinet, Consolidæ saracenicæ vulneraria est, & attrahit, ut & persoliatæ: itaque diutius usurpatæ optimum effectum dederunt. *Christ. Rastori.*

Enterocèle per tiliam fissam sanata.

Puellus annorum octo hernia intestinorum laborans cum aliquandiu hic Chirurgi alioquin satis periti, opera frustra usus esset, quod sectionem non admitterent parentes, revocatur domum, conferunt consilia vicini, exempla narrant felices tiliæ ad urbem Halmstadium enatæ, cujus ope plures ab ejusmodi malis liberentur. Quid multis persuadetur sollicita mater, & cum filio ituc excurrit; quaeritur in nemore viribus incluta arbor, & tandem reperitur. Hic puellus exuere se omni vestium apparatu, & in morem Dianæ nudæ (ita enim jussit arti huic præfecta nescio quæ Canidia) per rimam tiliæ hujus junioris manibus duorum valentulorum juvenum eo ipso temporis articulo distinxit ter saltu celeri se proripere. Peracta fabula vestitur iterum puer, tiliæ arboris cetera & terebinthina admittis coeunt, & nobilis effectus sensim promittitur secuturus. Ne longus sim, convalescit paulatim laucia arbor, & cum arbore paulatim æger, utque frondere iterum illa incipit, ita firmari sanitas puelli. Quo audito subijt animum conatus Maroniani illius amatoris Ecl. x.

*Certum est in silvis inter spelæa ferarum
Malte pati, tenerisque meos incidere amores
Arboribus: crescent illa, crescentis amores.*

Similia memini ante paucos annos in Harlemi nemore attentata fuisse, & tum quidem in filia quercu successisse experimentum: Scrutentur hic alii occultas rerum abditarum causas, Ego nihil video præter superstitionem. D. Olai Borrichii.

Sarcocèle ex operatione instituta lethalis.

Vir quidam honestus septuaginta circiter an-

nos natus ad nos non ita pridem adveniebat. Is jam dudum Sarcocelen gestaverat, ejusque grandioris pondus, quantumvis n. oleum, tacito concluserat pectore; verum dolores ultimo adjuncti, cum tandem ad opem chirurgicam implorandam compulerunt, idque sanè malò suo fatò; nam cum Chirurgus & nostris alias dexterrimus, ac in ministeriis suæ artis peritissimus, separationem sarcocelen, moliretur, nec satis explorasset an hæc à separatio intactò testiculo fieri posset, incisione sufficienti factâ, arreptoque tumore per eam extrahendò, testiculus unlique adhærens identidem subsequutus est, sicque castratio in decrepito peragenda fuit à minus ad hanc operationem præparatò artifice. quæ quidem satis bene pro tempore cedere videbatur at tertiâ die derepente suborta est pessimi ominis raucedo, atque mors quinta subsequuta. Videant itaque quibus talia committuntur negotia ne temerius rem aggreantur.

Anatome Sarcocelen.

Sarcocelen variè definiunt Auctores. Celsus l. vii. c. xviii. Raro, inquit, sed aliquando caro quoque inter tunicas (testiculi) increvit *μυρμαλίων* Græci vocant. Galenus l. de tumor, prænat. testiculos vocat induratos, & l. xiv. meth. med. eandem scirrhis non improvidè comparat. Hodie tamen Medicorum plerique, ut clarius rem expriment, Sarcocelen interpretantur, quoties carnosum quiddâ in scroto testibus adnascitur. Atque id quidem nonnunquam contingere, haud inficiandum, prostantque apud Hildanum, & Lotichium exempla, frequenter tamen sarcocèle nò tam adnascitur testibus, quam innascitur, hoc est, totum testem, ejusque vasa omnia materiæ novæ accessu ita infarcit, & porrigit, ut aliquando etiam vigecuplo se ipso gravior, ampliorque evadat. Hoc ut sæpe alias, ita superiori quoque hyeme in mercatore Samio mihi observatum, cui ablatus ferro chirurgi ramicosus testis pendebat semuncias xxxiv. durus ille quidem toto corpore, & massæ carnez nervosæ hinc inde gyris distinctæ similis, sed neque ad latus, neque in gremio suo ullum aliud testiculum naturalem complexus. Dissecta enim quaquaversum informi mole, ut testiculus verus, quem intus delitescere quidam suspicabantur, in conspectum veniret, deprehensum clarissimè fuit, totum illud enorme corpus testem fuisse, sed testem à sanguine, ut conjicere licet, admissò, verum propter vel contusionem, vel frigus, vel pituitam nimiam ad superiores partes non remisso, eoque in carnem degenerationem coagulato distictum. Proinde non satis providi rei altimatores mihi videntur, qui confirmatam *σπινθηρία* vel medicamenti discussisse se, vel discutere posse evulgant, quod nimium occalleat massa illa & mille plexibus nervosis. iis quæ solidis cōtrahat invictam duritiem. Crediderit Marthiolus in Dioscoridem, crediderit Scultetus in Artam. chirurg. sese sarcocelen pulvere ononidis percurasse, mihi tamen mihi sit verissimilius, quam fuisse hydrocelen duriori cortice circum datam, atque ideo sarcocelen mentientem. Atque ut id credam. præter jam allata, persuadent tum similia passim exempla apud Forestum, Sennertum, alios, docentia artifices sæpe aqua

profundius in testiculorum sinibus latente deceptos pro carnosis altimasse herniis, quæ fuerint aquosæ; tum docet radix ononidis, quæ cum inter nobilissima diuretica sit, aquas haud dubie in sinu testium intimo occultatas paulatim eduxit, atque ita coincidentibus sensim in se involueris durioribus, sarcocelen altimata fuit sustulisse. D. Olai Borrichii.

Ufus Catechu in hernia varicosa.

L. L. Studiosus 24. ann. cum ante aliquot annos laborasset hæmorrhoidibus, splenicis, in sinistro latere in vasis spermaticis, ubi ex peritonei processu in scrotum interuntur, tumorem varicosum mediocrem duos jam annos passus est, duriusculum & dolorificum, præsertim, si stare diutius cogitur. Adhibitis resolventibus & aperientibus, externis & internis, mollior redditus est tumor, a frigore jam recedens, contractis sc. vasis, quod etiam decumbenti contingit, tandem dato pulvere terræ Japonicæ præp. tamolo, quam cum Antimonio Martiali cachectico remixto, optimum præ reliquis sensit levamen, imminui scilicet eundem referens, & melius habere. Non dubito, si continuaverit, ut est affectus chronicus, & pars corporis remotior, plenariè propediem ipsum restitutum iri. D. Georg. Wolsgang. Wedeli.

De Enterocèle abscessu inguinis spontaneo sanata.

Opèrarius quidam enterocèle laborans sinistri inguinis, repositis intestinis, gestatoque trium mensium spatio subligaculo, per integrum postea triennium, absque ulteriori incommodo vixerat. Quo tempore elapso, a motu vehementiori, laboribusque durioribus, denuo in herniam loci illius, maximis junctam ventris doloribus, inciderat, quos variorum calefactientium fomentorum, ex cumino &c. concinnatorum, adplicatione uxor ejus abigere diu, sed frustra tentaverat; tandem a Chirurgo intestinum quidem, difficili licet & multo cum labore repositum, atque subligaculi ope egressui via rursus occlusa fuerat. Paucis tamen post diebus, inguinis illius dolor & inflammatio supervenit, in abscessum denique terminata; quo brevi, ab imposito pharmaco, rupto, copiosum pus evacuatum vulnusque amplum satis & profundum debite tractatum, labia inprimis ejusdem invicem adducta, & in cicatricem ut abirent, curata fuerunt; quæ partes subjectas duritie sua comprimens, ne delapsuro iterum intestino transitum concederet, præcaverunt. Adeoque, quod antea bracherii solius gestatione effecerat, jam callosa cutis duritie per iculum feliciter avertit. D. Luca Schroëckii Luca Filii.

Sarcocèle.

Sectioni Sarcocelen in milite in vico Aurigarum interfui cum D. Moinichenio & D. Kollichen, a Lithotomo Laurentio Nicolai feliciter & dextre administrata. Aperta cute inguinis dextri, testiculus dexter, quid à capitis puerilis magnitudinem excreverat, separatò & *scrotum* scroto, extractus & resectis vasis spermaticis, prorsus exemptus fuit, magno militis alias corda-

cordatissimi ejulatu. Ligatis vasis, confutum serorum, & cætera, ut vulnus decet, curata. Dissectus hic testiculi dextri tumor, glandulosam substantiam ostendit ea magnitudine auctam, ut oneri esset militi satis valido. Intima vero parte veliculas intra membranam continebat, sanguine plenas, quæ parte de maximo semper dolore, ob distentionem tunice sensilis, conquestus fuerat. Tormentorum oblitus ad militares functiones postea rediit. *D. Jacob. Schmid.*

De ossiculis ex Sarcocoele suppurata prodeunibus.

Quam varia sæpe & insolita reperiuntur in corpore humano, & subortis imprimis in eo abscessus corporecula, siue aliunde eo translata, siue in ipsis etiam genita, plurimus observationibus passim extantibus docemur: lupinus vero Calculos in omnibus fere partibus genitos quis nesciat, qui etiam nec partes generationi dicatas immunes abire permittunt, velut in prostaticis lapidem inaxum fuisse deprehensum refert *M. Donatus lib. 4. H. m. mir. cap. 30.* Calculum magnitudine pisum fere superantem describit. *I. R. Saitzmannus* in obser. anat. u. timis: Ex testiculo quoque ulcerato lapides exenitos habet *Pachecus* in obser. *i. Riveri. lib. 44.* Ipsum semen in vasis ejaculantibus petrificatum legitur in *Zodiaco Med. Gall. Ann. m. Mart. Obi. 4.* Alii ossa etiam in abscessibus quod reperta fuerunt, id revera inter rarissima est connumerandum, Cujus tamen fidem faciet sequens, quam communicare libet observatio. *D. P. G. aurifaber*, per plurimos annos dextri testiculi tumore ad capitis infantilis magnitudinem tandem adaucto, & ipsum ingueni ut hinc brachii crassitiem æquaret, simul occupante, a variis in consilium adhibitis Chirurgis primo Hydrocelem, postea cum testiculum equo insidens durius ephippio impigisset, Sarcocelen pati creditus; tandem frustra in usum ductis plurimis remediis, ante septennium a Natura ipsa, optima morborum medicatrice, auxilium invenerat; siquidem in eodem latere sponte aperto seroto, serum primo aliquandiu, tandem plurima, & vel ad quinque uncias quandoque, purulenta materia egressa fuerat, sicque usui mundificantium & traumaticorum per siphonem injectorum, tumore paulatim decrevisse, durum quid in orificio ulceris Chirurgis, *Joan. David Freitagii*, patri & filio, quorum dexteritate tum curabatur, sese obtulerat, quod vossella extractum, esse ossiculum plurimis eminentis asperum, & inæqualem comparuerat; cui deinceps successive plura alia diversæ figuræ & magnitudinis infecuta fuerant; usque dum tandem alterum, etiam non sine magno labore exentum fuerit, consolidatione vulneris mox sponte succedente, & integra cura intra novem septimanarum spatium ad finem perducta; ita ut nunc salvus adhuc, & senio licet pressus, sat tamen vegetus vivat, testiculumque morbosum bene jam constitutum circumferat.

Scholium. Adfectum hunc ad nullum alium commodius quam ad Hydrocelem cum Sarcocoele conjunctam referri posse, mihi equidem haud est dubium. Quamvis enim (ut de hydrocele, a seroso stillicidio ex vulnere primo observato satis demonstrata, nihil dicam,) sarcocoele testium & vasorum adnexorum in molem insignem à sanguine in eis subsistente & concrescen-

te, factam extensionem, ac in massam quasi carnosam indurationem, ut plurimum denotet, quam ideo diluculentibus posse curari negat *Ex cell. D. Ol. Borrichius Vol. 1. Act. Med. Havn. observ. 97.* & si quæ hoc modo sanata perhibeatur, hydrocelem potius fuisse statuit; sicque etiam per suppurationem, salvo remanente testiculo, tolli haud posse, adferere liceat. hic non tam testiculum auctum, quam potius carnosam tantum quandam substantiam fuisse eidem adnatam, statui posset. Licet tortasse, sanguine extra vasa effuso & in eo, via interstitiis subsistente, aut alio quocunque modo incrassato & indurato, per succedentem autem suppurationem evacuato, vascula illa & membranas lentius sic denuo contrahi, & naturalem, quam antea habebant, conformationem adipisci, dici posset. Unde vero ossicula illa in locum istum plane ex ossibus pervenerint, magis intricatum esse videtur. Non enim ab ossibus aliquo per corruptionem abecedente, & in hunc locum deponas tunc particulas, sanitas ceteroquin sat integra, juxta cum ossiculorum istorum multitudine, persuaderet; nec per fascinationem, cujus nulla hic suspicio, injecta fuerunt; nec etiam externa saltem forma osseam substantiam referunt, cum solida admodum sint, rasura in osseam scobem abeant, & igni subjecta, præter odorem, ab ossibus crementis aut etiam congenere cervino cornu exhalanti similem, remanens corpus, ipsis talismodi ossibus omnino respondens suppeditaverint. Unde a sero extra vasa effuso eorundem ortum deducere opus erit; quod uti in statu naturali consistens, membranæ, cartilaginis, ossisve naturam adsumere aptum esse, siue particulas in ejusmodi corpora coagulari prona continere, nutritio istarum partium nos edoceri ita & hic gelatinosa ejus particula, discussis a quotoribus, in ossa abire corpuscula potuerunt. *D. Luca Schroëckii Luca Filii.*

De Hydrocele à Catarrho orta.

Inveteratam hydrocelem medicamentis externis impositis uti raro & vix curari, celebriores Practici observant, ita recentem exortam istidem aliquando cedere, notum est. Sic *Laurent. Riverius cent. 2. Observat. 4.* in puerulo herniam aquosam per cataplasma ex farina fabarum cum vino generoso coctum, admixto etiam oxymelite simplici, intra octiduum fuisse discussam, memorat, ingentem quoque testiculi sinistri tumorem aquosum, adhibito ex convenientibus cataplasmate, sanatum refert *Henr. Salmuth. centur. 3. Observ. 93.* Idem & mihi anno præterito observare contigit in Juvene 17. annos nato, qui dolore capitis insigni & tumore genæ sinistræ, ut & colli, circa mensis Augusti principium correptus, cum ab adhibitis 5. & 6. die dicti mensis, medicamentis serum blande per sudorem evacuans, externe vero adpositis discutientibus, levamen habuisset, remittente nempe dolore, & subsidente paulatim tumore, eodem tamen tempore per latus sinistrum juxta dorsum descendere aliquid persensit, testiculumque sinistrum non sine dolore in molem ingentem attollere; quod cum vesperi d. 6. mihi anxius indicasset, hydrocelem esse deprehendens, Cataplasma ex malliche, floribus chamæmeli, sambuci, salvia, & rosarum rubrarum cum lacte paratum imponere jussi, quod non tantum sopiendo do-

lorem, sed tumorem etiam notabiliter immi-
nuendo, optimè conduxit, ut, cum insuper
7. die Aug. potiuncula ex resina jalappæ parata
purgatus fuisset, paulo post plane convalescit.
Mira hæc serosi humoris, copia & stagnatione
peccantis, & hinc tristem capiti sensationem in-
ferentis, nec non tumorem genæ collo inducen-
tis, *punieris* maiorem admirationem parit quod
serum discutientibus interne & externe in usum
ductis, ob Copiam non promte cedere valens,
non in vasa sanguinea readsumtum, sicque ad
scrotum, sed rectori viæ per latus sinistrum sen-
sum eo derivatum fuerit. Quod si consideretur,
catarrhosas defluxiones non simpliciter delira-
menta in posterum esse dicenda, evidenter satis
adstruitur. Vias tamen, per quas fluxio hæc pro-
ceiserit, satis obscuras nobis reliquit Natura; ni-
si forte nervorum, & quidem, si ordinem à Ch.
Willisio nervis assignatum sequamur, quinti pa-
ris, buccarum musculis sarculos mittentis, & po-
sterea una cum sexti paris ramulis, nervum inter-
costalem, ad testes etiam abeuntem, producen-
tis, id beneficio accidisse dicere liceat, intra
quorum membranulas insinuans se lymphæ illa
extravasata, per latera eorum sensim usque ad
testiculum descenderit. *Idem.*

Monstruosa umbilici procidentia.

Superiori anno Bernæ matronam quinquage-
nariam, robustam, sanam, obesam & pinguem
valde, in viâ illa ante multos annos in difficili
partu relaxationem umbilici contraxerat, ex
qua relaxato peritonæo, paulatim exomphalos
plane monstruosa facta fuerat, quandoquidem ad
magnitudinem uteri, qui foetum maturum gestat
umbilicus propendebat, venter nihilominus
suam servabat proportionem. Extuberantia ve-
ro illa umbilici, veluti ingens sacculus ita propen-
debat, ut manum facile inter ventrem & saccum
illum imponere possem. Porro tumorem huncce
ex omento prolapsa, & sensim in istam magnitudi-
nem aucto, prognatum fuisse, verisimile mihi
videtur, absque dolore enim tractuque, mollis &
lindæ æqualis erat, a naturali colore non di-
crepabat, murmur nullum per sentiebatur, ut in
hernia ut intestinali in ventrem retrocedebat
nunquam, etiam si alvum exoneraret, vel in dor-
sum ægra decumberet, sed semper in eodem per-
manebat statu. Ex quibus apparet, fuisse omen-
tum, idque in istam molem & magnitudinem au-
ctum, sed hæc obiter, quæ si non probabilia, ve-
risimilia tamen esse videntur.

Cæterum etsi sacculus ille ingens & ponderosus
esset, ita tamen corpore erat valida atque sana
fœmina illa, ut negotia sua domestica ipsamet
administraret. De generatione verò tumoris o-
menti, cuius mentionem facis, nescio quam a-
liam adferre debeat causam, præterquam illam
ipsam, quam tu quoque statuisse. Ludit enim ali-
quando natura, ut plus nutrimenti ad partem a-
liquam, quam pro sua nutritione opus, amanderet.
Hinc accrescentiæ præternaturales & aliquan-
do monstruosa fiunt. *Gulielm. Fabrici Hildan. Obser.
Chirurg. Cent. 3.*

De ingenti umbilici procidentia, historia altera.

Ante aliquot annos de quadam monstruosa ex-
tuberantia umbilici ad te scripsi, fœminam illam
etiam nunc superstitem esse arbitror. Ab eo tem-
pore similem affectum in Germania, in nobilissi-
ma & singulari virtute prædicta matrona vidi. In
illa tamen non umbilicus ipse, sed paulò supra

ipsum peritonæum, & pars quidam abdominis,
veluti in saccum maximum dilatata propendit.
In isto autem sacco non solum omentum, sed &
intestinum aliquod continetur, aliquando enim
murmur in ipso percipitur, & tunc quoque do-
lor adest, nunc vehemens, nunc vero remissior,
pro flatuum copia. Affectum huncce in difficili
partu se contraxisse, mihi affirmavit.

Cæterum quia huiusmodi procidentia umbili-
ci aut abdominis, raro in ventrem retrudi pos-
sunt, aut si retruduntur, difficulter tamen reti-
nuerunt, maximeque molestias ægris pariunt,
dum propter portus superiores partes secum
deorsum trahunt, fasciam quandam sacculatam
excogitavi, qua extuberantia illa tam com-
modè sursum retrahitur atque sublevatur, ut nullam
ferè molestiam aut incommodum pariat.

Primo autem ex tela reduplicata, parandus at-
que adaptandus est thorax; ita tamen ut ultra
primam collam mendosam non descendat. Tho-
raci porro isti in dorso, & quidem e regione ho-
moplatarum, ex utroque latere fasciæ, duos digi-
tos in latitudine politos lata, & undique perfo-
rata, annectenda est. Istis præterea fasciis parvis
fasciæ magna & sacculata, beneficio lororum an-
nectenda est. Elevatur autem & delabitur secun-
dum necessitatem & voluntatem ægri, beneficio
lororum & foraminum.

Fabricatur fasciæ illa, ex duabus particulis
tele, in exterior parte confuta; ita ut in medio
sacculus efficiatur. *Idem ibidem.*

Hernia umbilicalis monstruosa prorsus magnitudinis.

Nobiliss. Dom. annos circiter 40. nata, consti-
tutionis ex naturâ admodum laudabilis ac ob-
tissimæ, Hernia laborabat umbilicali, cuius pris-
mordia inde enata fuere quod jam à 14. annis,
dum lecticâ veheretur, fluxuolumque extra ripas
eum excurrentem transiretaret, non parum con-
tentionis adhibuit ne in medio subverteretur flu-
cto. Statim scilicet magnitudinis tumor visus est, qui
subsequentibus annis, cum ob matronæ obzifica-
rem inde que productam totius habitus corpo-
ris molliem extensionibus admodum aptam,
tum ob plures advenientes partus, in eam ac cre-
scebat molem, ut tandem capite humano duplè
major foret: in hoc tantum ab eo quem mox ex
Clar. attutimus Fabricio Hildanò, diversus quod
umbilicus supra illum esset, ac contra huius me-
dici occuparet peritonæum, musculi abdominis,
accutis ipsa, inde quasi lacera ac monstruosa ex-
pansa, facile permittebant ut contrectarentur o-
mentum ac intestina contenta, imò etiam illo-
rum motus peristalticus deprehenderetur. Strâ-
gulationem tamen nullam patiebantur intestina
in tam amplum devoluta saccum, quia ejus ori-
culum non parum patebat, atque itui & reditui
eorum non officiebat; nunquam interim ad di-
midiam sui partem decrecebat tumor etiam
post longum decubitus. nec omnino in propriis
situm reponi valebant intestina, quin ex levi et-
iam compressione in deliquium animi incurre-
bat ægra. Continuo præterea dolorem non me-
diocrè in lumbis per sentiebat, quem nec suspen-
soria Herniam, prout licebat, reprimentia, ali-
que artis præsidia, satis mitigare valebant, Præ-
terea Lutetiam Parisiorum, egregios illic
subligaculorum confectores, Hernariosque
celebres consultata ivit, sed nihil inde le-
vaminis retulit. imò ampliior ex itinere fa-
ctus tumor, doloresque colici qui subinde
matronam

matronam nobilissimam exercebant frequentiores tacti, tandem in illam abiit passione in qua trium dierum spatio, postquam per 12. horas alvum exomisset fæces, magno noiturno, omniumque sane proborum luctu, rari admodum exempli mulier sublata est. Iaccho illa omnia quæ adhibuimus auxilia, hic quæ tantum consultationem edidit quam Clar. quidam Medicus Germanus Lugduni Gallorum, dum Parisiis reverteretur pro Nobilissima Aeg. a concipit.

I. B. Consilium Medicum.

De Nobilissima Dom. Morbo & ritate curioso, & curationis difficultate gravi huius causa, amplum ut etiam discursum in perpetuum duco, de hisce quoniam Judicium illi nunc erit difficile, qui vel prius saltem labris delicatis degultavit anatomicas; Omisâ proin rari huius casus prolixiore delineatione, ad ipsam statim progredior curationem seu potius allevationem, totius cum curæ omnis spes non sine ponderosa ratione ab Experimentis. Chirurgis sit præcisa, palliativa proin quæ restat Cura in hoc consistit ut quantum possibile & presens malum demulceatur, & incrementum in modis omnibus impediatur ad quem scopum pervenire licebit, exquisita remedium appropriatorum selectione, eorum demerita applicatione; Ordinar ab ipsa Venæsectione cuius usus non solum prociuus sed & necessarius videtur vel ob solam meningum fluxus cessationem, addo Nobilissimæ Dom. Temperamentum sanguineum ut & corporis obesitatem, unde facillimè accidit ut Vasis sanguiferis a pinguedinis mole valde coangustatis, motus sanguinis necessarius retardetur, qui hinc circa intestina contorta sensim sensimque majori copiâ collectus, itagnatione ve acrior redditus facile inflammationem causari in illis possit, accedit quod ex ipsâ hac ratione venulæ alicujus capillaris vel in Cerebro vel in Pulmonibus rupta cum funesto exitu contingere queat, interveniente præprimis a vehementi quadam animi commotione, impetuosiore sanguinis motu, funestus proin hic ne accadat effectus singulis annis ad minimum bis, Vere nempe & Autumno largi Venæsectione celebranda est, ut ita detractâ quadam sanguinis portione sanguinis motus liberior reddatur, hæc vero ut salutaris esse possit, corporis præparatio perquam necessaria, quæ sit vel clystere solummodo, vel purgante leni si nempe primæ viæ succorum vitiosiorum saburra obfusa sunt, quod sit vel syrup. de cichorio cum meo ad aliquot uncias in jusculo assumptis, vel si insufficientis sit, infusum rhabarbari convenientissimum erit paratum ex rhabarbaro electo herbi cardui benedicti, cortic. citri siccis, santalo rubro & nitro præparato cum Aqua cichorei, addito sub finem syrup. de cichor. cum rheo, observatâ interim circumspecte rhabarbari dosi, exulent pulveres, extracta, pillula &c. utpote quæ sæpe tarde & non sine torminibus operantur, quæ hic omnibus modis evitanda sunt. hanc ob causam manna, folia sennæ, jalapa &c. mihi sit suspecta, si verò Nobilissima Domina statibus admodum divexata sit, non absere erit ante huius usum clystere carminativo uti, parato ex radice althææ, feniculi, Herbi malvæ, violarum, mercurialis, absynth. floribus hyperici, chamomillæ, semin. lini; anisi, additis melle mercuriali & oleo anethino, omnis omnibus acerbis dissipatis ita

statibus sequentis diei assumptum purgans melius & minore cum dolore operabitur, cavendum tamen probe a frequenti purgantium usu, utpote a quibus Intestinorum tonus destruitur & tota Massa sanguinea acris redditur; Et quia totius huius curæ palliativæ cardo primario in hoc vertitur ut alvus temper sit libera, hæc proin ut conservetur aperta omni studio allaborandum, quod obtrinebitur diligenti Medici in dandis remediis circumspeditione ut & exacta nobiliss. Dom. præscripti regiminis observatione. Medici ea propter ex presentia molesta & periculosa symptomata pro virili corrigere & mitigare Nobiliss. Domina vero exquisita Dietæ observatione impedire ne eadem mitigata recrudescant; Frequentissimum verò & periculosissimum quod in hocce affectu contingere potest symptoma est Colica passio, cuius præprimis contumacioris Pedisequa sæpe est ut plurimum funesta illæ passio; Cum verò Colica triplicem agnoscat originem, triplici etiam methodo tractanda venit, vel enim provenit a fæcibus induratis, vel ab acido viscido tenitum intestinorum tunica tenaciter adherente, vel etiam ab acido acri vitriolico, a vitiosa bilis & succi pancreatici constitutione oborto ac tenellas intestinorum fibras vellicante; Illius signum evidens alvi pernix obstructio; Illius copiosa flatuum insipidorum eruptio, ructus acidi, appetitus dejectus a ciborum viscidorum esu proveniens &c. Huius verò ardor in intestinis insignis junctus cum exquisitissimo dolore a vitiosa succi Pancreatici cum bile fermentatione, flatuum acrium ejectio, ructus faecoris cuprei, oris siccitas, sitis magna, appetitus adauctus, prægressa vehemens animi emotio, ut & ciborum acrium & aromatibus nimis conditorum usus. Probe hic attendendum, quamnam præsentē insultu colico ex dictis tribus peccet species; si prima fæces sc. indurata remediis humectantibus & emollientibus internis & externis certandum, quæ inter primatum tenent clysteres emollientes parati ex radicibus lilior. alborum, althææ, herbis 5. emollientibus, floribus chamæmel. summitat. anethi, seminibus, lini, foenogreci, additis oleo lilior. albor. & butyro recenti non salito, quod si constipatio adeo pertinet, ut clysterum ejusmodi reiteratorum ut & interne assumptorum & externe applicatorum remedium effectum eludat, & metus sit subsequentis passionis iliacæ, dictis clysteribus permiscenda fortiora, ut mell. mercurial. scyllitic. electuar. lenitiv. simplex, de hiera picra Logadii, sal commune, gemmæ. syrup. emetic. Angeli sal. vin. emeticum, cum hisce potremis summâ cum prudentia procedendum, quæ non usum in sunt vocanda, nisi urgente extremâ necessitate, ubi extremo morbo extremum adhibendum remedium; suppositoria hoc in casu experientia teste, sæpissimè magis obsunt quam profunt, etenim ab irritatione quam faciunt fibræ intestinorum læssitæ vehementius constringuntur, fæcibus hinc devenientibus magis induratis, per os quæ dantur remedia varia sunt, maxime juscula emollientibus herbis alterata frequenter deglutita, Oleum amygdalar. dulc. recenter express. (si Nobilissima Domina ejusmodi pingua sufferre potest) ad uncias aliquot in jusculo propinatum, vel cum syrup. de althæa Fernel. permixtum po-

tatum magni sæpe effectus est, sperma ceti recens & non rancidum ad ʒi. in iusculo dissolutum assumptum, item serum lactis caprilli cum cremore tartari præcipitatum & copiose haustum, sæpe acidularum largus haultus pertinacissimas solvit alvi obstructiones, conducit & butyrum recens assumptum, quoad purgantia, lenia nullius effectus, validiorum eventus dubius sæpe auxilio fuerunt sæpe etiam damno, ego omnibus aliis præferrem mannam Calabrinam elect. ad uncias aliquot in sero lactis caprilli. dissolutam, assumptam; externe conducunt linimenta, Fomenta maxime verò Balnea medicata (Gallis demy Bain) hæc parari possunt ex dictis emollientibus, & discutientibus, pro fomentis dictæ herbæ lacti incoquendæ quos sæpe foveatur pars affecta tepide imponendo sub finem inter lintea duplicata ipsum malagma; Illa verò parari possunt ex unguento de althæa, martiato, spermate ceti, pulvere florum chamomillæ & oleo lilior. alborum, quibus statim post fomentationes inungatur ventriculi regio calide: si hæc non sufficiant addi possunt unguentum Agrippæ, de arthanita ol. colocyrid: Si verò secunda colicæ species orta ab acido viscido seu pituita peccet, Discutientia & incidentia remedia locum habent, Clysteres carminativi magni sunt usus, paratis ex radicibus althææ, angelicæ, Herbis malv. parietar. origin. rutæ, floribus lavendulæ, sambuci, hyperici, Baccis lauri, seminibus fenugr. fenicul. oleis additis Electuar. de baccis lauri, oleis anethin. & hyperici adjectis, oleo destillato chamomillæ guttis aliquot, & si dolor valde urgeat theriacâ optimâ & castoreo, qui pro ratione durationis reiterari possunt; Per os exhibentur Potiones cordiales, Electuaria, Trageæ, Pulveres essentia &c. Potiones parari possunt ex Aq. menth. meliss. flor. tiliz, præonia cinamomi cum aqua destillat. syrupi cortic. arantior. spiritu nitri dulci confectioes de hyacint. &c. cochleatim sumendæ. Electuarium parabitur ex conservis betonic. menthæ, borragin. meliss. flor. pæoniz, corticibus arantiorum conditis, radice helenii condita, speciebus diarrhodon. abbatis, Oculis cancr. præparatis, succin. albo præparato cum syrup. de cortic. citri, de quo manè & vesperi duabus horis post cenam magnitudine Nucis moscatæ deglutendum superbibendo 3. cochlearia aquæ flor. tiliz, Tragea stomachica fiat ex pulvere stomachico Birkmanni, herbâ melissæ, flor. arantior. semine pæon. Oculis cancr. præp. cinamom. & saccharo perlato, de quo sub finem prandii & cenæ cochleare unum pani tosto & vino madido inspersum assumat. Pulveres carminativi fiant ex Oculis cancr. ppt. Ebore sine igne præp. Unicornis fossilis, antimon. diaphoretic. recenter & bene præparato corticibus arantiorum siccis, tartaro vitriolato, salibus juniperi, absynth. &c. adiciendo guttulam unam vel alteram oleorum destillatorum citri vel chamomillæ, vel anis. &c. si materia adeo tenax ut horum remedium vim respuat, deveniendum ad fortius penetrantia, qualia sunt Essent. corticum arantior. Zedoariæ, Tinctura Castorei cum spiritu salis armoniaci parata, Elixir Proprietatis Paracelsi cum spiritu tartari volatili paratum, spiritus salis armoniaci anisatus, maximam vero meretur laudem

spiritus nitri anticolicus sequens, recipe flor. hyperici & chamomillæ recent. & humidâ ex parte siccatorum ana quantum vis affunde spiritus vini optimi ad eminentiam 2. digitorum stent in infusione in loco calido aliquot horas in vase probe recto, postmodum eundem spiritum vini affunde aliis floribus repetendo ita tertiâ vice, hujus spiritus Vini & spiritus nitri recipe an. partes æquales destilla per alembicum lento igne ter repetendo & ita paratus erit spiritus anticolicus; Ejusmodi vero volatilia semper aliis liquoribus permiscenda & cum grano salis præscribenda, probe notandum ne hiæc contraria acida scilicet addantur, sæpe enim talia volatilia sinistre exhibita in parva etiam dosi maximo fuere sæpe nocumento, purgantium loco esse possunt pilulæ de ammoniaco & de tartaro Quercetani; externe conveniunt Balsamum stomachicum status resolvens paratum ex ol. absynth. anethin. Nucestæ express. destillato cortic. arantior. anis. Balsamo peruviano & cera, item Fomentationes ex carminativis ut radic. pæon herb. menth. calaminth. meliss. summitatib. anethi, florib. hyperici, Baccis juniperi, Corticibus arantior. sic. & semine anethi, quibus in aquâ & vino decoctis linteis quadruplicatis foveatur ventriculi regio tepide, imponendo sub finem ipsas herbas; profunt & Balnea ex iisdem herbis parata; Devenio tandem ad tertiam passionis colicæ speciem cujus natales sunt acidû acre vitriolicum, quod participat & de bile & de succo pancreatico acidiore, in hocce colloco insultu eximium apportat solatium nitrum & omnia quæ nitrois sunt virtutis, quæ inter admirandi effectus clyster ex simo equino adhuc calido paratus v. gr. ʒ. Fimi equini adhuc calidissimi. flor. chamomill. mʒ. affund. aquæ communis q. s. stent in infusione in loco calido 4. horarum spatio colatur. expressæ ibi. admisce olei violacei & hyperici an. ʒiʒ. F. clyster, vel si timus haberi non possit fiat clystina ex radic. lilior. albor. cichor. Herb. violar. malv. endiv. flor. papav. rhæados, chamomill. semin. melon. & feniculi, fiat decoctio cum sero lactis caprilli, colatur admisce olei violac. & chamom. & si uterus compatiatur aliquid de trochiscis de camphora; Interne conducunt iuscula alterata herb. violar. cichor. lactuc. flor. papav. rhæados, cichor. ut & Iulepi parati ex Aquis cichor. violar. flor. tiliz, cardui bened. syrup. violar. papav. rhæados, Corn. cerv. philosophice pp. & nitro perlato per cochlearia sumendi, item Electuarium confectum ex conservis borragin. flor. violar. meliss. radice cichor. condita, corticibus citri conditis, Oculis cancr. pp. Corn. Cerv. philosophice ppt. & syrup. papav. rhæados, de quo manè & vesperi hora somni capiat magnitudine Nucestæ. profunt & tincturæ violar. cichor. papav. rhæados & præprimis si magnus æstus præsens sit, nec non serum lactis caprilli succo citri paratum. si Bilis abundat leni purgante supra indicato educi potest, imo si tota Massa sanguinea valdè æstuet venæ sectio modica negligi haut debet; Quoad remedia externa Balnea temperata lenimen afferre poterunt, sed cavendum ne nimis sint frigida, capropter fomentationes ex frigidis parata haut magni æstimo, quia ab insicâ quadam virtute infrigidante fibræ constriunguntur poris hinc

hinc strictioribus existentibus exhalationibus à cōtinuā effervescentiā obortis exitus intercluditur, & ita ætus adaugetur, accedit quod ejusmodi fomentationes sæpissime, scirrhus post se relinquunt. Si vero dux ex dictis speciebus simul junctæ sint, malum judiciose examinandum & maxime cavendum, ne a remediis nimis violentis propinatis, excitata convulsio funellam post se trahat passionem Iliacam, Medium proin in tali casu tenere beatis; Ut vero Nobiliss. Dom. hujus passionis Colicæ frequentem invasionem evitare possit, ne exactissimum observet vitæ regimen, necellum est; Fugiat proin Aerē calido siccum ut & nimis frigidum, tempestatem ventolam, abstinere ab omnibus cibis qui fermentum ventriculi enervare, bilem adaugere, succum pancreaticum corrumpere & flatus progignere valent, ut sunt omnia viscida, dulcia, saccharata, acida & pingua, ex quorum censu sunt legumina omnia, fructus omnis generis, caseus, lac, pisces, acetaria, placentæ farinacæ ut & cibi nimis salici ac nimis aromatizati, panis nimium fermentatus nec satis coctus &c. e contra alimenta assumat boni succi & facili digestionis ut sunt Carnes vitulina, ovina, caponum, gallinarum juscula alterentur cerefol, beronic. petrosel meliss. violar. &c. hordeata etiam profuit brodio, carnis parata; conducunt & poma regia (Gallis Renettes) cocta præprimis si alvus adstrictior sit assumpta horā una ante cænam, ut & pruna damascena cocta &c. Potus ordinarius sit Vinum album, vel rubellum tenue aqua (in qua prius fructulum panis solit fuerit extinctum) dilutum nec nimis frigide hauritum, post pastum Nobiliss. Domina nō statim teris vacet negotiis, quia spiritibus animalibus alio vocatis, digestio in vetriculo non adeo feliciter peragitur. Ad stomachū contortandum & flatus dissipandos ficuum nec ingratum remedium erit sequens. Recipe Malum aurantium dulce, quod cruciatim incisum indatur vasi terreo, affundendo vini rubri generosi aquā parum diluti ad eminentiam unius digiti, in quo dissolve sacchari finissimi quantum placet, coquatur invicem lento igne vase probè cooperito ad consistentiam syrupi tenuis, de hocce potino ita cocto Nobiliss. Domina. singulis diebus & horæ ante prandium & cænam assumat fructulum rotundum superbibendo duo Cochlearia liquoris admixti, quo remedio vero non semper sed certis solummodo temporibus utatur, si nempe flatibus se valde molestatam sentit; Omnes dein violentos Animi & corporis motus cane pejus & angue fugiat; Somnum nimis vigiliis haut turbet; Alvus semper respondeat, si non, dicto modo sollicitetur; Hisce ita rigide observatis Nobiliss. à Domina non opus habebit, multis remediorum Præsidii, nec approbarem frequentem horum usus, quæ tamen urgente necessitate non sunt negligenda; Remedia proin quæ in hocce meo Cōtelio medico consignata sunt pro lubitu & circumstantiarum varietate in usum vocari possunt; Verum cum frustra plantet Paulus, & riget Apollo nisi Deus det. i. Benedicere, calidissimum capropter meum est Votum ut Archiater Celestis ad cuncta, quibus Nobiliss. Dom. opus habebit, Remedia divinam suam Benedictionem largiri velit; Cujus Divinæ Protectioni Nobilissimam Dominam una cum Tota Nobilissima Familia recomendo.

Periculosa Hernia sanata.

Nihil herniæ intestinali perniciosius est, quam stercus per os reddi. Arguit quippe hæc regurgitatio manifestam motus peristaltici offensionem. In quo cum consistat verum intestinorum stabilitamentum, mirum non est, si eo labefactato, pessum eat homo. Licet interdum reperiantur nonnulli adeo validi, ut devicta tam exitiali noxa, adipsantur iterum pristinam sanitatem. Quod tamen albo corvo rarius.

Nautæ ex hyberno naufragio diu madido, ac frigido intendebatur tantopere a spiritu intestinali, plus æquò refrigerata; ut dilato peritonæi processu, descenderint non modo in inguina, verum in ipsum scrotum. Unde difficulter retro compulsi; sive ob distendentem spiritum, sive ob induratum stercus, læsere non parum motum peristalticum, Et cum non possent se infra exonerare, ejecere supra per os, cum bilem flavam, tum sordida alvi excrementa.

Quæ præternaturalis excretio aliquandiu continuans, licet videretur habere certam desperationē; vidimus tamen die tertio decimo intestina hæc à Cornelio Salsbouthio rite in locum suum reducta, & agrū quantumvis summè debilem, in dō mortis jam vicinum, præter omnem spem, enavigasse feliciter periculosam hanc carybdim. *Vid. Nicolaus Tulpus observationum Medicarum lib. 3.*

Similem sane casum vidimus in viro quinquagenario, is enim postquam ex Herniâ grandiori in ileon miserè deductus, & continuus doloribus iisque atrocissimis imo horrendis vomitibus per sex dies excarnificatus fuisset, tandem in totalem *anæsthesiam* cum stercoreæ materiæ per os regectione, incurrebat. Cum advocabar jam à 24. horis in tam desperatō statu versabatur æger, nec erat quid consilii illi darem; Quādoquidem tamen opem meam, mente omnino constans, voce admodum languidā, avidissime exposcebat, accersiri curavi Celebrem Chirurgum D. Stephanum Dentand, qui cum arte sibi sane singulari intestinum prompte ac sine violentiā, reposuisset; cessavere symptomata, pulsusque & vita tum prorsus fugitiva, sensim reducebantur. Ex hisce addiscant Medici atque Chirurghi prognostico minime esse derelinquendos ægros etiam despectatissimos.

De Enterocèle in viro senē, lethali.

Inter affectus omnes, qui magno numero hominibus molestiam adferre solent, haud infimæ notæ intestinales Herniæ, utpote quæ variis exitiales.

Johannannus Niekerken, Pellio, senex, temperamento siccus, per multos annos Enterocèle molesta, incisus omnibus, laboraverat. Anno 1653. mense refrigeratis pedibus, imo totus frigidus, lectui se commisit, ventris hic subito corripitur, dolore, mox vomitu gravi, undē intestini inferotum secutus prolapsus.

Vocatus Chirurgus arte nulla efficere potuit, ut in situm restituerentur intestina; in cōsiliū adductus ego, summo mane, inveni hominem dolore ventris, febris, vomitu, suppressioneque excrementorum alvinorum & urinæ, decumbentem, consultum videbatur Enema hoc præscribere.

℞. Rad. Lillior. Alth. an. ʒii. Fol. Violar. Malv. Parietar. an. M. i. Flor. Chamomil. Melilot. Anethin. an. M. ʒ. Semin. Lin. Anis. Cumini, Fœnugr. an. ʒß. Coquantur in aq. pur. & cerevis. an. part.

æqual. q. sin. col. 3. viii. dissolve Elect. Diacarth. 3v. Vitell. ov. in. i. Ol. chamomil. Verbasc. Aneth. an. 3i. Anis. g. ii. 1. Clyster. Pro tomento Tragæam hanc præscripsimus, in lacte dulci decoquendam 2. Fol. Parietar. Malv. Verbasc. an. M. i. nor Chamomill. Melilot. Aneth. Sambuc. an. M. 3. Sem. Anis. fœnic. an. 33. Præparata dentur ului in charta. Totus hic antequam applicaretur Litus hic usurpandus.

2. Ol. Aneth. Melilot. Chamomill. an. 33. Anis. gr. x. M. f. Linimentum. Mediis hisce exiguo tempore adhibitis, cum, in intestino sacculo, contento non tantum flatus, sed & alvinas fœces reservari, constaret, leniter intestinum manibus nostris tractare, secundum monitum Hieron. ab Aqua pendente quod habetur parte 2. de tumor. præternaturalibus lib. 1. cap. 31. aggressi sumus, quod sic, fœcibus emollitis, sensimque ad interiora protrusis, etiam intestinum ipsum reponi suo loco posset. At irritus omnis labor, eo quod partes omnes, durius justo à Chirurgo nocte præcedente tractatas, inflammatas, & non parum cõtusas, sine dolore gravi apprehendere haut liceret.

In re ejusmodi gravi nobis jungere placuit consanguineis Virum Ampliil. D. Nicolaum Tulpium qui, ex tempore accedens, habita consideratione affectus perceptisque his quæ prægressio tempore fuerant peracta, necessarium omnino duxit Enematis ad modum à nobis præscriptum præparati injectionem, hinc, pannorum ope Olei sequi applicationem.

3. Olei Anethin. Chamomill. an. 3i. m. Usurpetur calide. Imò quo molliter intestinum reponere nobis liceret, consultum indicavit ægrum eo in situ dirimere, ut pedes sursum sint elevati, caput verò inferiora spectet. At ne quidē hoc tempore de novo ad intestinum prolapsum delatz fœces ad interiora deduci à nobis potuerunt, quamcunque etiam diligentiam adhiberemus; imò ab opere delisteremus vomitus gravis materiz pituitosæ, biliosæque, cõggit.

Ita sine ulla doloris in ægro anxietatisve remissione tempora nostra trivimus usque in diem tertium, qui, cum doloris equidem decremento, at vero febris incremento, vomitu fœcum foetidissimarum gravis valde atque molestus fuit, quod ob angustiam intestini descendere inhiherentur. Considerabile enim in hoc ægro, intestina scroto detenta convoluta aliquomodo fuisse, unde impossibile stercora per anum evacuari, quin contra, ad gyrum intestini delata, retrogredi necesse habuerunt.

Ad hujus affectus curationem, quo & dolor & anxietas tollatur, medium aliud hætenus haud cognitum, periculosum licet, incertique exitus, quæ quod lib. 2. cap. 40. describit: Chirurgus Regius Petrus Pigræus, nec est quod id rejiciat Marcus Aurelius Severinus; nostro sane, imò & Ampl. Dn. Telpii judicio facilius longe operatio hæc instituitur quam sectio cæsarea.

Declarata operationis hujus utilitate, incerta licet, periculosaque, consensu ægrotantis, consanguineorumque, die quarto ægrotum accessimus, nil ob stare sperantes quo minus eam institueremus. At opus hoc inhiuerunt varia, animi imprimis deliquia, deliria, sudores frigidiore imò scroti ipsius gangrena, quæ omnia, ad mortem usque, circa meridiem supervenientem, continuaverunt.

Quo vero junioribus constet, qualis operandi modus in desperato ejusmodi casu a Celeberr. Pigræo describatur, cum semper ex sententia Celsi, aliorumque in morbis gravioribus præter remedium adhibere anceps quam nullum, & necessario ejusmodi herniolus mori debeat, si nullum adhibeatur medium. Verba Authoris hæc sunt.

Si, inquit Vir expertissimus, intestina contorta, fœcesque in iis conclusas esse contigerit, nullatenus proderunt quæcunque manibus factæ concretiones sive contractiones, aut cujusvis generis exhibita medicamenta, ita ut ad ultimum remedium, peritonzi nempe sectionem confugere sit necesse.

Quæ quidem ut debito modo perficiatur, primum, secandus facie cælum verius, sive supinus sternendus est, atque adhibenda scissura duorum circiter digitorum latitudine supra cum locum, qui arcte cõclusus est; quoniam ipso hoc loco sine manifesto lisionis discrimine jam petagi nequit.

Factâ ad peritonzum utique apertura, in adversum latus componitur secti corpus, quo facilius intestina ab eo loco, in quo peragenda sectio recedere valeant; immissoque in vulnus digito (qui butyro recenti aut oleo Amygdalarum Dulcium inungendus) intestinum molliter ac pedetentim loco naturali restituetur. At vero si tanta intestinorum copia erupisset, ut opus esset apertura latiori, ad conclusum locum usque ea perducenda foret, supposito interim ad intestinorum tutelam digito aut specillo apto, quod si intestina lationibus referta, unde operatio difficilior, ac (res etenim periculo caret) perforanda, quo eisdem exitus præbeatur. Postremo repositis loco suo intestinis, vulnus, si ita res exigat, consuendum, ea methodo quam nos in ventris vulneribus adhibendam præscripsimus, ac tandem vulneri consueta in aliis admovenda medicamenta.

Hætenus Pigræus, cujus accurata descriptio explicatione nullâ indiget, addemus tamen sequentia.

Locus operationi huic accommodus lucidus sit oportet, detineatur eo mensa pulvinaribus variis instructa, his imponatur æger, dorso incumbens, adhibita, vel, pro rei exigentiâ, neglectâ, at tuum mensæque connexionem. Hinc cucum abdominis, ad duorum digitorum transversorum à processibus peritonzi distantiam, pollice digitisque manus sinistra elevet Chirurgus, altera vero dextrâ manu, loco eo, qui ad latus musculi recti, proximus est parti angustiori constrictæque, vulnus cuti partibusque subjectis insingat, de sanguinis fluxu, qui levior, haud sollicitus, sectione hac institutâ, hamo peritonzum elevet, quod manu levi, sensim dissecet, sedulo cavendo ne intestina subjecta cultello vulnerentur. Foramine in peritonzo facto, cultellû in extremo, ne partes subjectæ lædantur, globo donatum, per illud inferat, ejusque ope, sursum, deorsum, ad latus hoc, illudque, pro placitu, peritonzum dissecet. Pigræus loco cultelli dicti aliò instrumentò utitur per cuius sinum dum cultrum ducit, lisionis partium subditarum nullus metus.

Peritonzo dissecto indicem suum, imò, si possibile, cum eo pollicem, digitumvè alium, oleo lubricatos, dimittat in ventris cavum, ad usque peritonzi processum, ubi inveniet intestinum contortum, & prius omento nexum; ad scrotum descen-

descendisse hæc, digitorum incurvatorum ope, leviter trahendo, sursum in vètris cavitationem deducat. Operatio hæc felicius, citiusque absolvetur, si manu alterâ, plantiore, scrotum leviter commoveatur, ventri quo appropinquetur, sic enim convolutio intestini melius solvetur.

Hæc peractis vulneris habenda ratio; intestina quod si extra vulnus prodierint, adeoque ab externo aëre alterata fuerint, flatu sæpius insuper dilatata, acu acutiore, locis variis, ad flatuum eruptionem promovendam, perforanda, ex doctrina Pigræi, hinc vulnus futura ea claudendum, quæ Pigræo in vulnerum abdominis curâ usualis est, tandem curatio ea obtinet quæ in vulneribus aliis locum habere solet.

Suturam in ventris vulneribus convenientem, quæ Gastroraphia dici solet his verbis describit lib. 5. cap. 2. citatus Pigræus. *Sutura hic instituenda incarnativa etiam est; hic peritoneum una parte acuta perforandum est, altera manente integra, mox hæc pars perforanda, relicta imperforata ei opposita, & sic procedendum, quo inter quamvis perforationem carnis particula protuberet, sicque incarnatio, interiorque cicatrificatio promoveatur.*

Explicatione proluxa verba hæc haud indigent, per se satis clara; notari tamen necesse, acum, quæ hic ad vulneris consuetudinem usurpatur, faleatam debere esse, filum itidem duplicatum requirere, etia incrustatum.

Carnis cum mentionem facit Pigræus lib. 6. meth. cap. 2. Musculos abdominis intelligit, futura hic obtinet similis illi quam pelliones instituere solent, ubi alternatim utriusque lateris partes, exteriores, interioresque, acu perforantur.

Audi quæ Galenus de vulneribus ventris imò proponit. *Ad id, inquit, ut intestina reponantur, vulnus amplius necesse est, hinc futura comodo inflatur, ut modo muscoli cum peritoneo, modo iterum peritoneum cum musculis connectantur.*

Plura huc facientia qui desiderat legat quæ de gastroraphia habent, inter varios alios, C. Celsus, Hier. F. brinb. Aquapend. Jacob. Guillemeau, aliique, quæ qui saturatum species varias, curiosas, facileque, in vulnerum abdominis curatione summe necessarias describunt.

Superest, ubi, intestinis prolapsis repositis, gastroraphia hæc instituenda, utrinque ventris partes vulnere adfite manu molli minitri comprimantur, quo minori cum molestiâ futura perficiatur, eaque sit certior.

Molestiam hanc, licet doctam, operationem ne fugiant Chirurgi, placet, observationem aliquam in eam bus annotatam adductis addere. Cl. Henricus Blaii, Medicus, haud ita pridem in cane Lienem excindere volens, peritoneo illius magnitudinis vulnus infixit, similiter ac ventris integumentis communibus, ut iutromissorum digitorum ope & intestina miris modis loco suo dimovere, & lienem extra id extrahere, potuerit, hoc facto, illicita futura ea quæ pellionum est, vulnus clausum, brevisque canis curatus, qui etiâ postea sanus vixit impossibile dixisses, si quidem vulnus dictum, miramque intestinorum agitationem manu operatoris peractam, considerare licuisset, animal ullum, ita constitutum, vivere posse.

Capiti huius ut finem imponamus, Auctor sum, quoties occasio conveniens se offert, operationem hanc instituendi, nunquam eam fugiat Chirurgus, tanti periculi haud est, quanti eam habet variis, in morbo per se absolute lethali, præstatum

instituere remedium dubium, quo salvari possent ægrotantes ratio & experientia docent, quam nullum. *lib. 4. Meekren in Observ. Medico-Chirurg. De Enterocoele ex processu peritonei laxare in Viro.*

Nec intestina, nec scrotum Herniæ causa utriusquam dici haberique possunt, sed tenera constitutio processuum peritonei, his enim, leviter corporis motu, dilatatis, antriorumque extensis, imò, ut volunt alii, omni modo ruptis, facilis intestinorum ad aliena loca prolapsus.

Civis quidam Amstelodamensis, siccioris constitutionis, ex inordinato pedum motu, dum ex sedili surgeret, subito contraxit bubonocoelem, mox, ex prolapsu intestini in scrotum, Enterocoelem. Chirurgus se committere non audens, ex Herbario. *Remb. Dodonæi*, qui in promptu erat, herbas floresque dolores mitigandi vi pollentes collegit, ex pharmacopœia petita hæc medicamenta in lacte decoqui curavit, tumori que applicari; bene cessit negotium, dolor remisit, tumor imminuitur.

Hoc in statu, sine ullo vinculi s. bratherii usu; solâ oleorum inunctione contentus, aliquandiu vixit. Tandem cum in convivio quodam cibo potu ventriculum plus iusto replevisset, in tumorem inguinis non solum sed & scroti incidit, periculosum non minus quam doloris, accedente illico intestini in scrotum prolapsu, horrendo adeo, ut & scroto rupturam, & ægrotanti mortem minaretur.

Vocatus inveni hominem pedibus manibusque ædes perreptantem, quod dolores ex rupturâ dicta intolerabiles, in scrotum prolapsa intestina manibus tractare permittebat; causabant hæc tumorem magnitudinis immensæ.

Miserò nostro ægrotanti quo quantum possibile succurreremus, primo Enema aliquod ex emollientibus & anodynis paratum, ita tamen ut decocti minor adsumpta quantitas quam ordinario fieri solet, oleorum contra, ut Amygd. dulc. verbasci &c. major.

Ad inflammationem ex intestino, flatu, scrobis que causatam, quæ gravis his aderat, cataplasma hoc præscripsimus.

℞. Farin. Triticeæ, hordeæ, anthr. fursur. Tritic. ʒiij. Flor. Chamomill. Sambuc. an. M. i. Ol. Myrtill. Rosar. an. ʒi. Vin. rubr. q. s. M. F. Cataplasma.

Hæc interea dum præparabantur, nostrum fuit molliori manu, adhibitis linteis calidioribus, intestinorum repositionem procurare, quæ etiam bene successit, magna enim intestini huius portio jam suo loco restituta, antequam præscriptæ pharmacopœus adferret.

Injecto hinc Enemate, applicatoque Cataplasmate, (quod post horam, duplici quantitate renovari curavimus) repositio intestini longè facilius fuit, integreque absoluta.

Repositum suo loco quo reservetur, consultum vinculum processui peritonei dilatato applicare, ad eum modum formatum, quo parare ea solitus Nicolaus Minnebroeder, Chirurgus huius loci, qui etiam varios simili malo afflictos curaverat. Vinculum hoc haud differt ab aliis, nisi quod duplex fasciâ, utrinque una, ad maiorem firmitatem, ne deorsum decideret humero incumbat. *Idem ibidem.*

De Herniâ stultentiâ scroti, s. pneumatocele ex vulnere Thoracis.

Vulnus thoracis non penetrans, Fabr. ab Aquapendente inquis, curatur ut vulnus simplex: in penetrantibus

autem, præmissa corporis totius procurations potissimū in id incumbendum, ut evacuetur colluvies, & humiditas, quæ in thoracem à labiis vulneris descendit, ne putrescens ingremem inferat. Evacuatur autem per tres vias, per vulneris orificium, per os, scilicet, tussiendo, & per urina viam.

Georgius Stronk, discipulus Notarii cuiusdam à condiscipulo vulneratur cultello exiguo pectoris latere dextro. Propter exilitatem foraminis & aeris & sanguinis transitus omnis denegabatur.

Vocatus febrei adesse reperiebam gravem, cum altissime, pectorisque duritie. Minutiorum nostrorum aliquis per vulnus suctione notabilem sanguinis quantitatem extraxit, quo facto ad modum ab Aquapendente præscriptum processimus.

Die tertio quartovè scroti pars dextra eam in mole intumuerat, ut caput infantis minoris magnitudine referret. Flatulentus hic tumor, cujus causam cognoscere ut arduum, ita curationem instituire. Haud improbabile nobis videbatur status hic collectos ex cavitate pectoris descendere, adeoque diaphragma etiam perforatum esse in ventre autem hærentes, ubi vario tumores in externis notabiles producere videbantur, per processum peritonæi ad latus vasorum spermaticorum testes accedere.

Curatio difficillima, atrophia aderat, indies magis magisque notabilis. expectoratio materiam foetida continui, cum tussi gravi, febris continua cum ardore frigido, vomitus molestus, adsumptorum maxime, vigilæ diurnæ nocturnæque valde vexabantur.

Terti. septimanâ tussi eiecit materiam quandam crassam, longam, rotundam, porosam, impuram, hanc particulam carnosam diaphragmatis habebamus, quod hic vulneratum conjiciebamus. Ea excreta febris, ludor, respirandi difficultas, debilitas plurimum remiserunt, unde consultum visum naturæ operanti succurrere; in locum adeoque aposomatis ex Rad. Chinæ parati, quo hætenus vius, vulnerarium hoc substituere placuit. R. Herb. Tussilaginis. Mj. Capill. Vener. hyssopi. Sanic. Verben. an. Mj. Vinæ per. Mj. Rad. Petroselin. ʒ ii. Flor. Beton. Liquirit. O. ulor. caneri an. ʒ ß. Coq. in aq. hord. par. iij. Multi patet. Utebatur hoc quotidie bis terve. Syropum etiam confici vulnerarium curavimus ex brassicæ rubræ & consolida succo.

Et horum usu id effecimus, quod vires corporis indies increverint, purulentæque materia per fistulosum pectoris foramen, evacuatio successerit; Hinc plumaceolum planum Oleo cereæ maderactum vulnere imposuimus, plumaceolo linteo quadratum, quadruplicatum, linteo verò ferrum ignitum, & hac ratione olei dicti virtus interioribus communicata. Ter quaterve hac methodo ubi in curatione nostrâ processimus, vulneris foramen claudi permisimus, & sanitati restitutum ægrum observavimus.

De aeris ex thorace per diaphragma apertum in scrotum motu in prægressis egimus, haud erit exemplo aliquo notabili dicta illustrare.

Petrus Jacobi, Diemensis, rusticus, ebrius cultro interfecit Cognatum, vulneratur interim à cognato. Vulnus erat abdominis inter costam spuriam secundam & tertiam per quod eo impetu aer extrorsum proruebat, ut vix detineri potuerit. Unde hic aer controversiam inter medicos Chirurgoſve movebat; erant enim qui non

nisi in ventris imi cavum penetrare vulnus credebant, at horum opinioni accedere haud poteram, quod & ratio suaderet, & præcedens observatio docuisset, non nisi Diaphragmate laeso aeri per vulnus viam concedi; unde oblique hoc vulnus sursum per diaphragma in thoracis cavum penetrare credibile mihi videbatur. Post diem tertium quartumve aeris per vulnus dictum egressus haud amplius notabatur. Hic nova querendi occasio, quid causæ subellet quod status haud diutius se exhiberet? ad hoc respondere nobis placuit, probabile omnino nobis haberi, vulnus intra coltas & hepatis partem anteriorem penetrare in thoracis cavum, hoc autem ab hepate incumbente hoc tempore claudi.

In aperto cadavere (infidenti enim sella carnicis manu caput ablatum) suspicioni nostræ correspondere omnia, visum. Primo enim hepatis partem convexam sursum versus diaphragma elevatam notavimus, unde vulneris in eo obduratio. Secundo non solum vulnus diaphragma penetrasse, sed & pulmonis partem anteriorem fuisse ablatam, quam sero in thorace collecto innatantem vidimus.

In gratiam curiosorum hic loci addere placet, in Cordis ventriculo dextro sanguinis ne guttâ a nobis fuisse repertam, in sinistro vero spumolam omnino sanguinem; quod sententiam scriptorum illorum confirmare videtur, qui volunt, in iis, qui violenta morte intereunt, sanguinem spumolam in venis contineri. Idem ibidem.

De Enterocela gravi.

Anno 1652. occurrit nobis vir satis annosus, qui Hernia scroti laborabat enormi, erectus quoties incederet, tumor se extendebat ultra genua, evadebatque crassitie satis notabilis; confertur figura addita.

Tumor hic quoties in scroto appareret, ventres adeo detumescere, ut etiam manu planâ premendo vertebrae lumborum attingere liceret. Hinc ubi tumorem hunc tollere animus, elevatione leni omnia intestina in scroto prolapsa, per peritonæi patentem valde aperturam facilissimo negotio ventrem repetebant, nec uliâ in hac restitutione molestia afficiebatur, nisi quod, ubi intestina reposita diaphragma attingebant, animi deliquium non leve incurreret.

Admirationem omnem superabat, hilari adeo ipsum animo fuisse, atque ad opera navalia promptum, ut etiam mal. conscendere, ea celeritate dexteritateque valuerit, qua nullus sociorum.

De quo præcipue conquereretur hoc munus erat, quod urina ad latus scroti distenti stillaret, unde excoriatio gravis & dolor insignis, membrum etenim virile scroto ita arctè unitum erat, ut impossibile esset urinam ex debito emingere. De curatione hujus affectus videri possunt quæ in prægressis observatione duplici habentur. Idem ibidem.

Anatomica inspectiones.

Hernia à ruptura Peritonæi.

Anno 1613. Septembris 24. aperui corpus cuiusdam decollati, in quo cum ruptura intestinali laboraret, affectum & peritonæum ruptum ostendi, quomodo per eam rupturam intestina vel omentum decidunt. Modum etiam incidendi & ligandi demonstravi. Plures idem in utroque latere habebat venas & arterias emulgentes. Job. Rydolphus Salzmannus Observ. Anat. p. 42.

Enterocele à dilatatione sola processus peritonæi citra rupturam dependens.

In Hernioso hydropico lecto post mortē, ejusmodi foramen per quod intestinum in scrotum descendens transmittebatur, rotundo margine integrum, nec dum scissum vel ruptum illo modo deprehēdimus. Per quod intestini tenuioris portio illa, quæ supra cœcum est, in scroto, aqua pleni, infimam sedem usque ferebatur, totoque illo ductu huic processui peritonæi hujus aque causa, quæ tunicas has erodendo ut conglutinentur facit, hinc accreverat & adnatum erat, nihilominus sine incommodo excrementa egerente, nec dum de dolore conquerente. *Platerus Practic. lib. 3. cap. 2.*

Vasa Seminalia Peritoneo obvolvi ex sectione Anatomica Herniosorum patet.

Notandum quod quando musculi oblique descendentes tendo modice relaxatur, hic Hernia illa species quæ Bubonocèle vocatur: Quando vero valde dilatatur, tunc sunt Herniarum duæ species, Intestinalis & Omentalis: Valent namque corpora hæc in scrotum descendere, Neque si alicui sit mirum si contra opinionem cujusdam Excell. Medici sententiam, qui cum Fernelio credebatur vasa seminalia à Peritoneo non esse inducta, neque ita de facili tendinem hujus musculi perforari posse, cum jam sæpe, ut vidi, & celeberrimis Medicis ostendi rem aliter se habere, nō solum in cadaveribus, sed in vivis, præsertim anno 1596 in quo vidi puerū qui Hernia intestinali afficiebatur, & cum a Chirurgo a Nursia per incisionem curaretur, Testiculo cum suis vasibus avulso manifeste inspexi, atque ostendi vaginam, ut ita dicā, testiculo à peritoneo factam, quæ ita erat dilatata in suo exortu, usque ad hanc & fundum, ut dno digiti manus meæ facile ingrederentur, quod credo omnibus facile esse vili. *Hippolitus Bosius de Facult. Anat. Lib. 1. p. 9.*

Mulieres Herniis esse obnoxias ostendit dissectio virginis, cui à relaxato Peritoneo Inguina is accidit.

Ligamenta uteri Rotunda oriuntur à fundi uteri lateribus, his præsertim in locis ubi Tubæ Fallopianæ utero committuntur, & inter duplicaturam Peritonæi versus inguina utrinque ascendunt, & ut vasa spermatica in maribus, ita hæc Ligamenta in mulieribus extra abdominis cavitatem prodeunt; hinc illæ eadem ratione ut viri Herniæ sunt obnoxie, quatenus scilicet Peritonæum eo in loco, ubi ligamenta exeunt, præter modum dilatatur: Quemadmodum hæc diebus observavimus, dum Filiam Hernia laborantem post mortem dissecaremus, eo namque in loco, ubi rotunda uteri ligamenta abdomen deserunt, Peritonæum adeo relaxatum invenimus, ut integram foveam live bursam efformaret, per quam intestina in inguon descendendo herniam intestinale producebant. *Regnerus de Graaf de mulier. organis cap. 10.*

Herniæ ope subligaculi solius curata, natura hiatum materiam adiposam offarciente.

Sacriticulus in ædibus S. Andreæ Artium sacris, nomine Ioan. Moretus, Hernia completa laborans me accessit, ope in efflagitans, maximo enim se dolore affici dicebat, præsertim ubi officii causa esset canendum: Viso loco laborante, à curatione abstinendum dixi, munere alteri concessio; hinc plurimis morbo congruis præscriptis, inter cætera subligaculo descensum cohibere jussi, quo & quinquenni vel sexenni spatio usus est;

atque ex eo querens quæ valetudine frueretur, se sanum esse asseruit: Quo de rei veritate constaret, in ædes meas eum deduxi, examinatusque genitalibus, nullum Herniæ vestigium comparuit.

Eo autem semeltri post ex Pleuritide defuncto, cadaveris apertione concessa, inquitivi sedulus quibus repagulis natura descendens intestinis obviam ivisset: Videm testor me circa foramen productionis peritonæi, invenisse substantiam adiposam, magnitudinis mediocris globuli sphaeræsterii, tam arte dicto processui annexā, ut vix sine dilaceratione adjacentium locorum divelli potuerit: Quæ sanationis causa fuerat: Multos præterea novi qui à pertinaci subligaculi gestatione, eaque sola citra aliud præsidium sanitatē consequuti sunt, quibus, prius macilentis, post obesitas factis, circa intestina colligitur pinguedo, à qua intumescunt, unde nullus in scrotum patet transitus, relicto postmodum sine recidiva subligaculo. Ex quibus patet temere instituendam non esse castrationem. Res certe admiratione non caret, naturam morbos incurabiles creditos, superare, levi auxilio adjutam. *Pareus Opera lib. 8. cap. 37.*

Extraordinariæ Herniarum species per Anatomem deprehensa.

Hæ sunt simplices Herniæ & compositæ, prout vulgo describuntur, sed nobis plures alias praxis demonstrat, & quæ apud scriptores non reperiuntur: nam experientia me docuit Peritonæum etiam in parte posteriori versus Dorsum posse dirumpi, & ibi Herniam efficere: Inguina sunt loci Herniis consueti, verum noli tibi persuadere Peritonæum in aliis locis etiam non posse dilatari aut dirumpi, & ibi Herniam efficere: Supra umbilicum contingit, sed rarissime: Infra umbilicum, & ad ejus latera, & longe supra Inguina, non duntaxat ego, juxta alios Hernias vidi, sed cum illis tanquam cum abscessu agebatur, & Chirurgus non aliam sui erroris rationem in medium producebat, quam quod ibi Herniis consuetus locus non esset. *Barbette Chirur. parte 1. c. 71.*

Bubonocèle à descensu Coli in inguen.

Occurrit ante aliquot annos mulier. 40. annorum: quæ jam à sex annis hernia gravi ex casu laboraverat: sic ut subligaculo forti propendentia, detinere coacta fuerit.

Aperto in cadavere: Intestinum Colon, rupto peritoneo, dilatatis externis, cavitatem ventris magna parte reliquisset observabatur, loco eo ubi ad constituendum Rectum flexuosum valde sinistro in latere detinetur. *Ger. Blasius observ. medic. 8.*

Hernia ab intestini Cæci descensu.

Cum Cæcum intestinum prope renem dextrū peritoneo contumaciter adhæreat, non possum adduci ut credam cum Galeno solum hoc intestinum omni vinculo solutum esse, ob idque facile in scrotum decidere: Experientia docet solum Ileum pubi proximum Enterocelen facere; Inveni tamen in puerulis quibus tum ossi sacro incubat, in scrotum delapsum. Et nuper in Pharmacopœi cadavere juxta inguen provolutum observavi. *Riolanus Anthropol. lib. 2. cap. 12.*

Hernia à descensu omenti.

In subjecto virili ob cusam moneta strangu-lato 1638. Parisiis, Omentum in inguen dextrum producebatur: Deinde vero musculo cremasteri ita adnatum viscebatur ut naturalem nexum diceretis: Epiplocele enim laboraverat: Uterque quoque

quoque Testiculus Hydrocele infectus. *Barbottinus cent. 2. observ. 85.*

Hernia à descensu intestinorum inter cutim & musculos.

Experimur etiam processum peritonæi in Inguinibus ita posse dilrumpi, ut intestina non in scrotum, sed inter cutim & musculos versus femur sese urgeant. *Barbottel. c.*

Hernia ab intestini & omenti prolapsu.

Pagano cuidam viro robusto cum duobus litiganti, & in terram dejecto, adversariorum alter pedem in inguinis dextræ regionem adeo impetuose inpegit, ut vehementem inde cruciatum mox sentiens, vix iterum potuerit assurgere: Inde in lectum collocato, statim tumor in eo loco amplius apparuit: Chirurgus & Lithotomus vocati, rupturam in peritonæo factam, atque procidentiam intestinorum sequutam judicabant, aliquotque die in reponendo intestino laborarunt, fomentis, inunctionibus & manuali operatione adhibitis: Quibus cum nihil proficeretur, dolorque in dies augetur, & tumor admodum ruberet, ad nos advectus fuit: Cum vero cognovissem illum totos octo dies, ex quo latus fuerat, nihil per alvum deiecisse, vomitumque ea nocte excrementorum alvi sequutum, & postmodum omnino intestina procidisse, uti & omenti portionem, tumore in inguine persistente, nec in scrotum descendente, intestina ex læsione inflammata, uti & vicinas partes alleveravi: Et quia tumor mollis, plenus & lividus erat, sanguinem quoque illic collectum ex læsione, eumque ex diutina retentione corruptum esse judicavi. Quibus consideratis, cum nulla alia spes salutis esset, & gangræ indicia, excitatis jam nigris in inguine pullulis, exsudanteque ichore apparerent, per sectionem cutis viam patefaciendam, & per rupturam peritonæi tunc conspicuam, intestina reponenda. Aegro etiam hoc unice rogante, necessarium fuit existimatum. Itaque Chirurgus, cutem tumori intratam attollens digitis, ne dum secaretur, intestina forte læderet, eam novacula aliquousque discidit, ægro nullum inde dolorem sentiente, quod emortuæ carnis è gangræna signum erat, statimque status foetidissimi & corruptus sanguis lividus, cadaverosi & abominandi odoris, per foramen peritonæi scissum, è vulnere erupit, tanta copia ut pelvim pene impleret: Inde sectionem longo vulnere continuans, omentum, quod omnino corruptum erat & prociderat cum intestinis, ab his, amplitudine duarum palmarnum abruptit, atque hæc eadem admodum rubentia cruentaque per rupturam intrudere, rursusque erumpentia retinere studuit, quod dolorem ægro pariebat, ut omnino interdum deficeret: Postea pannis duplicatis & involutis, applicatisque cum emplastro, ne erumperent intestina cavit, mortem interim prædicens, uti & ego, cum pulsus in eo deficeret, extremaque frigerent, quare tres tantum horas in agone versatus exspiravit.

Abdomine sectione resecato, intestina intrinsecus livida aliquousque, uti & peritonæi inferior sedes, carnosaque vicina loca confusa apparuerunt, ex quibus ea inflammata gangrenataque fuisse satis apparuit. *F. Platerus observat. lib. 3. pag. 756.*

Ob Herniam castrati plerique intereunt, vi illata peritonæi processui, nervo sexti paris & vasis spermaticis.

Et si ea curandarum Herniarum via, quæ anreo puncto sit, dolore ac periculo non vacet, tutior tamen est quam illa quæ sit per castrationem, quæ ægros remediis crudelitæ enectos manifesto mortis periculo exponit: Castratores enim dum timent ne curatione absoluta superstes sit relaxatio, violento tractu peritonæi processum a partibus quibus adhæret divellunt, unaque nervum a sexta conjugatione, qui ad testem pergit: eandem vim spermaticis vasis inferunt, quibus ex rebus dolor excitatur ingens, convulsio, hæmorrhagia, inflammatio, putredo, ac denique mors, ut ego in multis observavi, quos paucis post diebus quam exsecti fuerant, exsecui mortuos: Hæc pericula & damna, etsi nonnulli evadant, illi tamen generandi facultate per omnem dehinc vitam privantur. Quare nunquam exsectioni Testium subscribam, nisi forte sarcocèle aut gangræna ipsos invaserit. *Parent lib. 7. cap. 16.*

Entero-Epiplocele lethalis ob sequentem gangranam 1. Ob Ileum & Epiploem, cum aqua & fluitibus. 2. Ob Epiploon maximam partem devolutum. 3. Ob inflammationem Epiploem & intestinorum. 4.

Accersitus olim fui ad Senem quendam herniosum, cui intestina in scrotum prolapsa erant, & qui variis illisque gravibus ob id molestabatur symptomatibus: Apud quem Chirurgum reperi illa in suum redigere locum annitentem, applicatione totum & inunctionum, ex rebus magna ex parte adstringentibus apparatus: Ego animadvertens eorum usu impediri potius quam promoveri curationem, confestim ex emollientibus & relaxantibus curavi concinnanda remedia, quorum usu intra paucas horas suo loco fuerunt restituta intestina, & dolores quibus acriter infestabatur sublatis: Post aliquod autem temporis spatium, quia fasciæ ulum averfabatur, relapsa cum essent, denuo ad illum sum vocatus, ac eadem quæ antea per aliquot dies usurpans remedia, nihil profeci, nec ullo modo intestina potuerunt restitui, & sic me præsepe bonus senex exspiravit.

Ego hærens qua ratione id potuerit accidere quod usu convenientium remediorum morbus, quemadmodum antea, non cesserit, perii ex uxore defundi ut liceret dissecto cadavere ejus contumaciæ investigare causam: Illi non refragante, Ego & Chirurgus opus anatomicum mox aggredimur, & reperimus intestina, una cum epiploem, admodum livente, in scrotum decubuisse, & eo intestina adeo intricata, ut ob id impossibilis omnino fuerit eorum reductio, Et sic ægro in veram ejus contumaciæ pervenimus notitiam. *Ex Observationibus Cosmæ Holzachii.*

D. N. herniosus erat: In scrotum pars Ileum devoluta erat cum Epiploem, præter aquæ copiam Colon flaccidum turgidum. *Vide lib. 2. tit. de palpitatione cordis.*

Dom.

3. Dom. du Lac, annos circiter quinquaginta natus, ab incunabulis Enteroepiplocele vexatus, cum Tumorem ad immensam magnitudinem devenisse observaret, Tierrio Arvernorum, patria, Lugdunum medelam quaerens concessit: Convocati in consilium D. D. à Claustro, Graffius Ego, Mag. Panthotus & Benoit Chirurgi, exitum lethalem & calamitatis plenum prædiximus, qui sectioni soli cedere posset, evidenti periculo obnoxius, ob debilitatem partibus induram, gangraenæ & sphacelo expositarum: Obiecit æger se ab anno bis vel ter vulvuloso affectu affectum fuisse, ob quem in exitum pene deductus esset: malle se remedii aleam subire, quum nihil morte funestius ipsi accidere posset, languoribus finem impositura: Masculus ægri animus assensum Medicorum & Chirurgorum obtinuit: præparato ergo corpore Celotomen peregi, atque Omenti uncias octodecim exsecui, membranis tenaciter annexi, immutato quadantenus illius colore: Operatione peracta, curam juxta methodum institui: sed Anima ejusmodi domicilii perterrita, id atrophiam consumptum septima die deseruit.

Præsentibus dictis D. D. Medicis & M. Chirurgis cadaver aperui: Omenti vero tantum portunculam, ovo columbino magnitudine parem intestino ileo hærentis, reperi, cuius pars gangraena erat affecta, convulsionum & mortis causa.

Inde colligo in affectibus qui minus spei quam timoris præbent, non temere ad operationes accedendum esse, sed denuum habito consilio, & petito a vitis Artis peritis, quo præcedente maturâ deliberatione & prognostico, libera sit erga Deum & homines conscientia. *Iosephus Covillard Operationum IatroChirurgic. Gallicè editum 17.*

4. Illust. J. H. Heslerus, ab octodecim annis Herniosus, vehementi correptus tussi, intestinis vi deorsum pulsus & quasi incuneatis, tandem inflammatione & ingentibus doloribus supervenientibus, bis vomuit nigra, cum præ anxietate non posset contineri lecto, & omnibus invicis sæpe surgeret, à loci mutatione remedium dolorum sibi promittens, tandem sedili locatus, lethali animi deliquio correptus placide expirabat.

Aperto cadavere scrotum dextrum omento & aliquibus intestinis plenum inventum, ita erant impacta, ut quamvis corpus adhuc caleret, vix extrahi sine ruptura potuerint. Inflammata erant, tensa erant quasi: inde biduo ante obitum electo surgens, erecto non poterat ambulare corpore: ventrem semper pronus curvare cogebatur. *Rolsinkus Epitomes meth. & cur. cap. 26. lib. 3.*

Hernia à prolapsu partis mesaræ & intestinorum in scrotum, cum putredine.

Nl. Hernia laborans suavis amicorum agyrtam conducit, qui ad suppurationem illam perducere ausus est, (Exitumans, ut credo, esse sarcocolem) itaque ad eam stercore utebatur caprillo destillato: circa 14. diem oborta febre, vomor & ego tum propter febrem, tum propter urinae difficultatem: Adveniens igitur & omnia diligenter perpendens, periculum exi-

stimo agyrtæ cura ægro illi allatum: nimirum ob febrem symptomaticeam, iteinque dysuriam ex consensu istarum partium ortam, & impræmis quod hernia esset intestinalis, quæ creveret non nihil & decreveret: adde decubitu vel ascensum præterea membranosis illas partes ad suppurationem prorsus esse inhabiles, & rem nonnulli gravissimis intervenientibus symptomatibus in effectum posse deduci: Quin & ut effectus responderet, tamen corruptis illis membris functiones naturales necessario aboleri: Æger contra malle se periclitari quam ceptam curam intermittere, meque rogare ut febris tantum curam habere non gravaret: Pergit itaque adhuc per tres septimanas: tunc redit agyrta iste, rusticus qui erat, & cum phlebotomo incisuras instituit per fundum scroti satis altas, ad materiam exhauriendam, tertio vero die æger moritur.

"Aperio cadaver, altante ipsius agnato, & mesaræ partes cum intestinis prolapsas putrescentes jam & corruptas invenio, iteinque in collo vesicæ abscessum quantitatis nucis avellanae, ut non tantum ratione consentiens, sed & abscessus difficultas illa urinae exorta fuerit. *Phil. Salmuth. centur. 1. observat. 11.*

In consultatione referebat nobis I. Dom. Sala vidisse se mesenterium cum intestinis tenuibus omnibus in scrotum delapsum, abdomenque alterum præ se tulisse, qua mole compresso vesicæ collo, urinaeque impedito transitu, necessitatem moriendi ægro esse accitam. *Th. Bartholinus cent. 2. histor. 95.*

Hernia vicennalis, solo pondere molesta, ex decubitu ilei & Epiploei in scrotum.

Anno 1678. 18. Januar. dissectum est cadaver Caroli Ludovici, in Nolodochio Genevensi, à Mag. Bailly Chirurgo, me præsentem & Dom. D. de Communis, Nolodochii Medico ac Mag. D. Dentand Chirurgo peritiss. Septuagenarius erat dictus Ludovicus, Vir procerus, vino & veneri, dum juvenis, addictus, qui totam Persiam peragraverat: Obiit autem ex Peripneumonia Ante 20. annos Hernia laborabat; quam præ pondere & magnitudine subligaculis sustentabat, ceterum immunis omnium affectum quos hernia committes sibi accersit.

Dissecto scroto, primo se obtulit Omentum eo devolutum, paucula pinguedine obductum, flavescens: hinc intestinum ileum, cum annexo mesenterio, ad ulnæ nostratis longitudinem devolutum, extra ulla læsionis notas: Peritonæi productio adeo expansa & dilatata, ut nequaquam detractus intestinis & omento, quinque digitos conjunctos admitteret, manum integram, alias excepturum: Omentum autem peritonæo & intestina arte invicem cohærebant, ut hinc conspicuum sit operationem sine dilaceratione impossibilem futuram fuisse: Testes exigui, compressi, flavescens, nucis moschatae magnitudinem vix æquantes: Stentorea voce erat præditus: Diverforium, cui pro insigni appendebat effigies viri sylvestris, in suburbio San Gervasiano, ejus fuerat: Coma autem & barba hirta, effigiei prototypus videbatur. *Theophus Bonet in Sepulchreto.*

Ulteriorem cultri progressum adstantes prohibuerunt: Emplatri compositionem libens communicarem, nisi retraxisset quorundam objurgandi audacia, fiet tamen si benevolum aliquem offendero. *Fridericus Hofmannus meth. med. lib. 2. cap. 2.*

4. Mense Dec. 1676. obiit famulus Chirurgi Nosodochii Genevensis, Enterocela obnoxius: Ea tum temporis prehenius, præ vehementia doloris, accedente syncope, intra horas 24. extinctus est: Ante apertionem loci affecti, perpendit Mag. Bailly, Chirurgus peritissimus, vix trium digitorum spatium inter umbilicum & pubem intercessisse, Scrotum vero mire tumebat à fascibus in intestino conclusis; facta autem hypogastri dissectione, reperit Intestinum Ileum bis, in formam literæ s conduplicatum; adeo in via coarctatum ut neque hinc impellendo, neque inde trahendo, in sedem naturalem compelli potuerit, etiam ablatis in intestino contentis.

5. Anno 1674. Apparitor Genevensis, nomine Dominice, septuaginta quatuor natus annos, ab Enterocela extinctus est, post trium septimanarum languorem: In quo etiam Ileum intestinum eodem modo conduplicatum deprehensum, atque tam arcte incuneatum ut nulla vi, etiam remotis impedimentis, in abdomen compelli potuerit. *Theophilus Bonetus in Sepulchreto.*

Epiplotele lethalis ob corruptionem Omenti, Testium & vicinarum partium. 1. A maxima Omenti parte in scroto. 2. Epiplotele ab Omenti in Testis seminaliumque vasorum tunicam descensu. 3.

Anno 1585. robustissimus quidam Faber lignarius Genevensis, quum eleuasset pondus iugens, Omentum ei prolapsum est in scrotum, & quia reductum non fuit, intumuit, inde dolor acutissimus, inflammatio, aliaque gravissima symptomata, denique mors sequuta 7. die.

Ego scrotum incidi, & inveni Omentum, imò etiam Testes vicinasque partes plane corruptas & gangrena infectas: *Fabridius Hildanus cent. 1. observat. 72.*

2. Conspicatus sum Omenti selibram extra umbilicum; Et in scroto Omenti libram & amplius *Columbus de Re Anatom. lib. 15.*

3. Ego non semel sane Omentum in eam testis seminaliumque; ipsius vasorum tunicam (cui peritonæum originem præbet) devolutum, ac miris modis mediocrem omenti alias constitutionem adauctam deprehendi: Nam cum tota omenti pars alioquin intestinis incumbens in mediocriter pingui homine vix libræ aut sesquilibræ pondus excederet, Vidi tamen omentum ita p. n. in ea testis tunica auctum, ut quatuor aut quinque librarum pondus penderet, & ventriculū ex sua sede ita deorsum distraheret, ut ventriculi deficienter nūmere, variisque obortis singultibus id pondus mortis occasione fuisse inter secantum collegerim, cum in morbo quodam laterali, qui alioquin bene expurgatus fuerat, scrotum ex more ab agro adstantibusque subligari neglectum fuisset: Quin etiam quo

exactius ramicum herniarumque, uti vocamus, rationem perquiro, eo etiam magis omnes illos molles ramos, quos carnosos vulgus appellat, ac merito à varicosis affectibus distinguit, ex omenti prolapsu incrementoque progigni mihi persuadco. *Vesalius Anas. lib. 5. cap. 4.*

Hernia triplex lethalis, ob putrefactionem intestinorum in scroto incipientem,

In quodam magni nominis Viro, vitam sedentariam agente, temperie humida prædita, & diu in viduitate vitam transigente, hernia tum aquosa, tum carnea ac intestinalis (de qua ultima tamen semper fuit dubium, cum nullos dolores sentiret vehementes) excreverat in tantam magnitudinem ut ultra 40. libras penderet, & ipse amplius hoc pondus prope modum ferre non posset, propter difficultatem spirandi, cum omnia magna vi deorsum traherentur, semperque lecto affixus decumbere coactus fuit: Tandem cum nulli amplius remedio locus esset relictus, & mors illi brevi immineret, de consilio Medicorum & Chirurgorum, prius tamen prognostico indicato, cum omnibus copia aquæ adesse videretur, sectio fuit adhibita in loco inferiore, ubi videns aqua percipiebatur, Qua adhibita tunc magno dolore, effluxit cum impetu illius ad libram 1. sed foramine obstructo tunc, Medici noluerunt plus excerni: Sequentibus diebus tribus plus illius evacuatum est, & zger non male se habuit: Verum quarto die febris superuenit cum erysipellate, quod alioquin illi fuit sæpe molestum, præsertim in pede altero, qui ob scierthum oedematofum insulata quoque fuit magnitudinis, ac paulatim vires decreverunt: ut paucos post dies placidissime obierit.

Apertum scrotum, quod ex sectione alioqui satis detumuerat, & spem aliquam convalescentiæ præbuerat, Reperta intestina putrescentia, quæ proculdubio mortem acceleravit. *Observatio Ioachimi Camerarii.*

Hernia ex Aquosa, Varicosa & Carnea constata.

Nobil. Ramæus accepit in sinistra natis partem superiorem & externam intorsum & deorsum leviter tendens vulnus, ex quo statim concidit: Huic accessit vulnus, inter alia symptomata, sinistra testiculi cum tumore & summo dolore inflammatio, quæ tamen post magnam partem sublata, remanente solum levi duritie, rubore & dolore: vocatus deprehendo herniam, non ventosam, ob defectum flatuum nec simplicem aquosam, quia scrotum nec lucidum, nec aqua tumidum: nec Carnosam simplicem, ob dolorem: Sed Herniam ex Aquosa, Carnea, & Varicosa constatum: Aquosam quidem inculcat tumor instar ovi oblongus, cum testiculi occultatione quoad tactum & visum: Accedit & hoc quod sinistro lateri aquosa hernia valde sint familiares, quod non per venæ spermaticæ sinistra oriatur ab emulgente: Carnosa vulnus ad sinistram natis partem superiorem vergens ansam dare potuit & causam generatur cum hæc hernia ex sanguine testes & scrotum obruente, ibique in molem carneam mutato: cui affluxit vulnus

potuit, ut dixi, ansam dare, ut non solum in p. in quo itatem testiculi unius inflammationio, sed & dolor sequutus fuerit: Suppetas fert sanguis, adultus melancholicus a vitio venis oritur, cuiusque finituri debilitas: Varicolas non sicut dolor, qui exacerbat in distensione vasorum spermaticorum, unde erectionem penis cunctis interminis comitantur: Omnia incertum remedia, nam sequenti mense moritur.

Aperito corpore, Renum loco portionem pinguem quasi, Lienis vero locorum gal inacer quantitate nigrum frustum, sanguinis evaginati facie, inveniebamus: Cavitas, (circa vesicam) abdominis, aqua erat repleta, ut & scrotum circa sinistram testiculum potissimum, dextro longe maiorem: Vasa testiculorum varicum modo consistebant; Dextri testiculi substantia spongiosa & putrida, tunicaque unita erat, in dextro scroti parte caro adiposa. *I. D. Horstius observ. Anatom. 6.*

Hernia si calculosa vesica unam scroti partem implebat, intestina tenuia alteram.

Venetis quidam Herniosum novit. I. Dom. Sali, cui omnia signa calculi vesicæ videbantur adesse, nec tamen cathetere aut candela potuit deprehendi: In mortui cadavere calculus cum ipsa vesica unam scroti partem impleverat, intestina omnia tenuia alteram: *Tu. Bartholinus cap. 4. observ. 28.*

Hernia à d. sensu ilei in scrotum, subsequente illaco affectu, irretriebilibus ob excrescentiam circa mecum enatam.

Dom. à Charancon, Senator Camberiacensis, cum quodam die in Vinca aliquid magno cum nisu ageret, repente sibi immum ventrem crepare sensit, atque intestina in scrotum prolabi, quæ cum reponere conaretur, nec posset, in illacram passionem incidit, secunda cum die ructibus & vomitus albidus vexatus, & cum habuit penitus suppressam difficultas cum urina illum comitabatur: Sub vespere febris, sitis, oris amator ingens, vigilia, jactationes, ventriculi subversiones, dolores, seu potius cruciatus, clamores continui illum torquebant, adeo ut nihil per os admitte & retinere posset. Ego accersitus sub vespere secundæ diei, ex pulsus inaequalitate, inordinatione, parvitate & celeritate etiam ex tot symptomatum vehementia & subitanea virium dejectione, morbum acutissimum & quartum diem non præteritum pronuntiavi, Atque præscriptis quibusdam topicis, ne nihil fecisse videretur, cardiacis, anodynis, ad discessum me paravi: Sed victus precibus remansi, & protinus enema emolliens & anodynum parandum & injiciendum curavi, post tres horas iterandum: quæ antea ante diluculum tertiæ diei per os reddidit: Tertium post meridi injectum, sub vespere adhuc sincerum evocuit, & ea nocte faeces ipsas fortentes, & iterum bilis copiam cum violentia & cruciatu maximo per vomitum reiecit: sicque viribus & spiritibus exhaustis, corpore profusum manito, sub vespere quartæ diei defecit.

Dilecto cadavere, Ileum intestinum, quod in scrotum descenderat, livens invenimus, & supra os pubis, in meatu initio (quod notatu dignum) spongiosam, seu potius fungosam carnositatem reperimus intestinum circa meatum involventem, membranisque vitæ adeo adhaerentem, ut vix manibus & unguibus avelli posset: Eam excrescentiam primo itatim die enatam, & à sanguine ob dolorem & rupturam in plagam confluxo, & ad locum laceratum concurrente, genitum fuisse autem, qua fungositate viam obstruente, facta fuit impossibilis intestini delapsi reductio. *Abel Rostius ad Fabricium Hist. an. vent. 6. observ. 70.*

Hernia à vase deferente in scrotum delapso.

Præterea non semel tantum observavimus vas deferens corrugatum in scrotum descendit & ibi Herniam effecisse, quæ manu ope facillime reduci poterat: imo quæ, si corpus resupinaveris, sua sponte intro recedit, à qua tamen nihil mali expectandum aut metuendum est. Talis Hernia *Spermatocele* improprie à me vocatur. *Idem ibidem.*

Hernia ab aqua testiculum replent.

Quidam ex phthisi obiit: Ili Testiculorum alter in magnam molem creverat, durus, qui aquam fundebat citrinam, ut, in hernia aquosa: membrana, quæ aquam continebat, erat plane castilaginea & quasi cornea: ipse enim testiculus sua propria ab hac diversa cingebatur. *Rumlerus observ. medic. 52.*

Hernia ab aqua inter testiculi tunicas.

Ego in testiculo dextro hydrocelem vidi: Aquosus humor inter netveam tunicam & epithoidem continebatur: Evidentes erant tres aut quatuor propagines vasis deferentis intra testem vitiatum & sanguine sanioso repletum dispersæ. *Riolanus Anthropog. lib. 2. c. 29.*

Scroti apertio inutilis in hydrocele ob corruptum Testiculum.

In Generoso quodam viro, quam omnis periculi plena sit scroti & erythroidis membranz in hydrocele per scalpellum apertio, teste non sublato, compertum est: Ab aliquot annis sinistra parte hydrocele huic molesta fuerat: frustra cataplasmatibus ac aliis remediis usus crebro, tandem temerarij Chirurgi consilio acquiescens, apertio sibi scalpello tumorem permisit: Effluxit cito omnis humor, tumor quoque subsedit: sed cum testis ipse omnino esset corruptus, victis partes facile infecit: Subsequente mox scroti universi, ac etiam penis, cum tumore & ingenti dolore gangrena: delirium cum vehementi febre, propter doloris magnitudinem, supervenit, ac non ita multo post mors successit.

Ren hujus sinister corruptus fuit, & seminalis in erythroide descendens, valde ampla & multum patens. *Dodonæus observ. medic. 40.*

Tumor, seu Hernia Umbilicalis, lethalis ab laceris lobum alterum, extra Peritonæum prolapsum eidem accretum.

Beaverat Deus Illustr. M. riam Henly prole macula, in hoc infantulo fauta Junone Lucina recens nato, observavit obtetrix quendam umbilici tumorem, nucis moschatae magnitudinem æquantem: Uterque Parens Medicum & Chirur- gum in consilium adhibent, & me quoque ad octo nulliarii distantiam vocari curant: Convenimus omnes intra 30. horarum spatium, jamq; tumor ad pugni magnitudinem accre- rat: Quo diligenter examinato, candela ad- mota, conspicienda se præbebant intestina ver- sicolora, in eum prolapsa, rupto peritonæo; deluper vero, à dextra tumoris parte, quæ sphacelo correpta erat, nescio quam carneam substantiam, intestina deprimentem deprehen- dimus: Chirurgus cum altero Medico spem unam in tumoris incisione collocatam esse affir- mabant, fore, sic ut intestina in suum locum re- poni queant: Ego contra dissuadebam, quod intestina sphacelo correpta viderentur, & in- fantulum, admodum debilem, moriturum di- cebam, & præstare eum intactum relinquere, quam artem apud plebem maleficam defamare: Parentes vero, filii vite desideratissimi, his auscultantes, anceps potius remedium expe- riendum constituerunt, quam infantulum sine auxilio, etiam dubio, Libitinae absorbendum re- linquere: Facta ergo incisione, cum Chirurgus immisso in vulnus digito, intestina in suum lo- cum reponere anniteretur, remittente carneq; substantia, ipsis incumbente, eademque de- primente frustra laborabat; infantulo mox vi- talem auram, quam vix hauserat, innature ef- fundente.

Aperto à morte corpusculo, ne vestigium quidem omenti conspiciendum erat: Lien præ- terea exiguus admodum apparebat, intestina tenuia, rupto peritonæo, in umbilicum prolapsa & sphacelo emortua: Hepar vero, quod con- tinuum esse solet, nec in lobos, ut in quadru- pedibus, divisum, in duos lobos proinde se- ctum erat, quorum alter in proprio loco, dex- tro scil. hypochondrio, sub diaphragmate & costis nothis conspiciebatur: alter vero extra peritonæum prolapsus, eidem adeo firmiter ac- creverat, ut novacula ab eo separari minime po- tuerit: Cætera sana. *Fridericus Loffius observat.* 30. lib. 2.

Omphalocele ab oris contracta.

Puella modo nata, tumorem immensum in umbilico propendentem secum in lucem attulit. Quem cum vocatus inspicerem, deprehendi te- nuia esse intestina per umbilicum prolapsa, glo- bi magni instar convoluta, tenui membrana pel- lucida, qualis amnion foetum involvens existit, investita, inquam chorda umbilicalis desine- bat, & vesica ampla humore plena adhaerebat: infans cætera bene habitus erat: Cum autem intestina premendo reponere studeremus, vide- bantur nonnihil in abdominis cavum ex parte remeare, mox tamen rursus cum murmure egredi: Quæstio erat an vesica aperienda, di-

gitoque immisso, foramen per quod egredie- bantur investigandum esset, ut per illud intestina reponerentur: verum quia mox postea intestina inflammata esse conspiciebantur, atque in- fans iterum evomens, admodum debilis erat, nihil tentare voluimus.

Cum exspirasset, atque abdomen aperiretur, intestina quæ exciderant, membranz amnio qua ambebantur, adeo connexa invenimus, ut nulla ratione ab ea avelli potuerint.

An hoc situ in utero foetu existente & cres- cente intestina collocata semper fuerint, vel po- stea antequam nasceretur prociderint, vel in partu, in dubium vocabatur: Ego procidisse diu antequam in lucem ederetur ex eo collegi quod dum cum matre utero gestabat, ob ex- crementorum duntaxat, conatibus magnis ab- domen premere coacta fuit, & quod amnios membrana illi fuerit adnata: Potuisse autem fœ- tum, dum utero inclusus calore matris fovetur, citra incommoda hoc perferre, quæ postea cum à matre separaretur, supervenerunt, eum que e medio sustulerunt, censui, *Placcus Observatib.* 3. pag. 75.

Hernia cystica, cui ex terrore juncta bubonocèle.

Herniam magis esse expansionem, aut ex- tensionem peritonæi, quam rupturam, aut di- lacerationem ejus, haud dubito, quia inter me- dicorum filios, si quis constet. Hic affectus nomen mutuatur à contento: sic hernia dicitur intesti- nalis ab intestino in ea contento, & omentalis ab omento, &c. Non minus etiam quam vesica urinaria prolabitur interroti, hernia cystica di- cenda foret, qualis mihi his occurrit cum An- drea Boëkelmanno Chirurgo expertissimo. Amplissimus vir. Dom. N. N. Mercator Amste- lodamensis, ab aliquot annis in tantam mingen- di difficultatem incidit, ut urinam reddere ne- quiverit, nisi manu scrotum elevando compri- meret. Reticuit hoc malum tandiu, donec si- mul, mirum dictum! in Bubonocelen solo terro- re incidere: Dolum enim ingens vini de im- proviso rumpebatur in ejus cella, unde ita obli- tuit præsens, ut illico in bubonocelen incide- ret. Ad quod semel mihi adhuc observare con- tigit in alio, qui solo terrore subito herniosus fa- ctus erat, retulitque mihi supra citatus Chirur- gus in herniis sanandis versatissimus, sese hoc quoque pluries observasse. Hæc igitur bubono- cele coëgit ægrum aliorum manus auxiliares implorare; vocabar ergo cum D. Bellangerio, Medicinæ Doctore eximio, Andr. Boëkelman- no, Petro la Nou, & Petro Adriani filio, Chi- rurgis dextrimis. Vestimenimvero bubono- cele tam arctè comprimebatur à tendinibus musculorum adlitis, ut nullus nostrum opitula- ri ægro potuerit, ita ut brevi diem suum obiret. Multiplicis hujus herniæ aperturam concesserunt nobis consanguinei, in qua notavimus bu- bonocèle dissecta, intestini ilei portione in- flammata, & gangræna (ut sæpius contingit) obsessam, aperturamque (ut vulgò loquuntur) vel potius dilatationem adeo exilem aut ar- ctam circa tendines musculorum abdominis ut digitus pertransire vix potuerit; unde dicti in- testini portio reponi neutiquam potuit. In scro- to posthac totam vesicam urinariam prolapsam

tam offendimus. *Fridericum Ruysehium in Observationibus Anatomico-Chirurgicis.*

tum illud reduci non potuisse. *Ex iisdem Collegiis.*

Hernia intestinalis curata post mortem dissecti.

Enteromphalocoele fœminina virilisque.

Cantor quidam quadragenarius, sæpius cantando in herniam intestinale incidit, non absque dolore, præsertim inter cantandum. Chirurgus advocatus illum à cantilunis abstinere iussit, & bracherium inguinibus accommodare, quod sex annis gessit, interea temporis se curatum confectus. Post illud tempus, sex mensibus elapsis a pleuritide tollitur.

Mulieri ætat. 35. annor. in laborioso partu ob spiritus contentionem laxatus est umbilici circulus, & ileon leviter erupit. Retrusum est primò facile & contentum per aliquot annos; sed deinceps conamine quodam altius prorupit ileon, nec amplius ita regeßum, ut antea. Manfit ergo tumor, primis quidem mensibus æstivis indolens, sed autumnò & hyeme sævus, præsertim borea flante. Deinde autem, non ad unius boreæ flatum, sed ad quemvis imbrem dolor repungebat acutior & acutior, donec tandem intercluso chylo tam enormiter tumuerit, ut nec digitis nec renediis cesserit. Toto demum ambitu livescente, febris, vomitus, convulsio, sudor frigidus & syncope ægram de medio sustulerunt. Repertum est ileon duplicatum laqueo veluti contractum intra umbilicalem anulum, livens omnino & sanie olida fluxum.

Aperto cadavere invenit idem Chirurgus multum adipis in eo loci ubi peritonæum fuerat dilatatum, & per quod intestina deorsum premeantur, ad magnitudinem pilæ. Adeps dilatationi ita erat accretus ut nisi cum laceratione circumjacentium partium divelli quiverit. Omnia ea quæ peritonæum nimis intumescere cogunt, ad herniam procurandam aniam præbent. Hernia nihil aliud sonat quam dilatatio peritonæi, idque quovis in loco Bracherio posita ita contractum est, ut dilatatum concreverit: vascula tamen adiposa ob summam dilatationem tantam adipis quantitatem in se collegerunt, ut locum antea dilatatum repleverunt. *Stephanus Blancardus in Anatomia Practica.*

Id ipsum in Causidico sexagenario vidi qui ventricosus admodum erat, & per multos annos tumorem illum levi scuto compresserat indeminis. Sed venit tandem suprema dies qua umbilicus dire tortus est, donec accedente sphacelo febrili indolentia supervenerit cum animi deliquiis, sudoribus frigidis & ipsa morte vomitum occupante, alias in procinctu uti patuit è nausea & singultibus. *Ex iisdem Collegiis.*

Bubonocoele ileosa.

De Sarcocoele & Hydrocele quadam rursus ex iisdem Collegiis.

Puerum curavi quadrimum, dire torminosum, acutè febricitantem & interdium noctuque ejulantem, nec non susque deque omnia rejicientem alimenta, excrementa, remedia. Quarto die extinctus est. In inguine dextro ileon reperti ab agryta, *bubonocoeles curanda specie*, scuto ita compressum ut gangræna & sphacelo fuerit occupatum. *E Collegiis Clarissimi Caroli Drelincurii.*

Lucripetas exector barbitonfores qui sarcomati testiculorum hydrargyrosin adhibent, quæ loculos emungit, sed de causa conjuncta nihil demit; imò majus exinde & dolentius turrectum vidi sarcoma.

Epiptocoele mira.

In Hydrocele, tunicam inter clytroideam atque testiculi nervaceam, setaceum notavi utilius longè ad recursum morbi arcendum quam simplex paracenthesis. In Physocoele autem quam in recens natis millies vidi, neutrum convenit, sed cataplasma admotum e rosæ rubris, balauftiis, caphura, & salis armoniaci tantillo.

Puero saltu inguen sinistrum intumuit. Judicatum est, *ileon* eò delapsum. Retrusum & contentum. Sed rursus ludibundo puero cursibus & saltu non unum inguen sed & scrotum tumidius evasit. Trinis mensibus retrusum est de novo epiptoon suas in sedes & scuto firmatum. Sed tandem neglectum est ligamen, specie curati morbi. Verum interjecto tempore præparco tumor majorem in molem surrexit, sed quoniam indolens, in cura fuit nulla per menses plurimos. Tandem vero tumor inguinalis dolorem peperit, & id ligamen prius impulit. At industria nulla prior artifex omentum repellere potuit. Nihil igitur admotum, sed res natura commissa. Puer interim & adolevit & virilitatem attigit. Is vero febre synocha putri cadaver evasit, in quo summa cum voluptate omentum detexi intra scrotum tunica erythroideæ penitus accretum fibrillis scilicet veluti hederaceis in illam tunicam penitus infixis, singulas autem omenti arterias atque venas non modo crassiores detexi, sed elongatas omnino & per modum vegetationis intra scrotum ita radicata, ut non nisi filamentis disruptis illud è crypta sua in apertam lucem protrahere valuerim. Quid miri igitur omen-

HERPES

Vid.

CUTIS VITIA.

HORDEOLVM.

Vid.

PALPEBRARVM AFFECTVS.

HYDROCELE

Vid.

HERNIA.

HYDRO.

HYDROCEPHALUS.

1. **H**ydrocephalus Aquosum Capitis Apostema, seu aquositas quæ in Capite reperitur, dici consuevit. Congregatur autem interdum, inquit Manardus Epistol. Med. lib. 7. Epist. 1. in capitibus præsertim puerorum, aqua in medio aut cutis, aut pericranii, aut hujus & ossis, quam *ὑδροκεφαλὸς* Græci vocant. Pariter Galenus Aquam in capite extra cranium interdum esse admittit, tuncque mollem apparere tumorem; aut quandoque sub cranio existeret, neque tum foris conspicitur; vel nonnunquam utrobique inesse. Aferunt porro nonnulli, ejusmodi morbum nequaquam fieri, neque inchoari, nisi in recens natis puerulis, idque ex morbi hujus causis rite peniculis constare putant; nonnominus tamen observatum fuit, pueros septem, octo, decem, duodecim annorum hoc Affectu laborasse.

11. Est autem Hydrocephalus in minor aquosus, vel totam exteriorem capitis partem, vel majorem ejus portionem occupans; hinc quibusdam haud immerito Hydroys Capitis appellatur.

3. Causa itaque hujus Affectus est Humor Aquosus in toto corpore redundans, hinc in capitis partes, exteriores plurimum, effusus, qui nonnunquam serous, aliquando purulentus & subcruentus, semper vero lentus ac lubricus existit.

4. Ceterum quatuor hujus Affectus enumerari solent differentia, desumptæ ex sede diversa. Aliquando namque aquosus humor inter cutem consistit & pericranium, tuncque mollis est tumor, doloris expers, eique impressa digitorum inhzrent vestigia. Nonnunquam pericranium inter & cranium humor colligitur, estque tumor magno cum dolore, neque tam facile tactui cedit. Aut inter cranium & crallam menyngem; Vel sub menyngibus in ipsius cerebri ventriculis humor continetur, atque tum foris nulla tumoris mollescit, sed futurarum cranii dehiscencia sentitur, quemadmodum visum fuit in bienni puella, cujus meminit Andræas Vesalius, intra cujus cerebri ventriculos novem prope aquæ libræ deprehensæ fuerunt, uti refert. *Humani corpor. Fabric. lib. 1. cap. 5.*

5. Equidem Aquosus Humor si extra cranium hæreat, Hydrocephalus aliquando curatur, nisi ob tenebram patientis ætatem remedia adhiberi nequeant. Sed sub cranio, vel ipso in cerebro si humor collectus sit, lethalis est affectus: hinc recte ait J. C. Arantius lib. de Tumor. pr. nat. cap. 1. eorum qui ab interna causa Hydrocephalo corripiuntur, & præcipue altius latitante malo, neminem evasisse vidi. Si apoplexia aut Lethargus accedat, mors præforibus est.

6. Ut autem tollatur hic Affectus, Antecedentes Cause primò sunt removendæ. Quem in finem circa Victum, Resque ceteras Nonnaturales, & circa Remedia Universalia, si ægrotans adultus sit, eadem conveniunt, quæ pro Oedemate curando proposuimus. Sin vero infans sit, Nutrix parce tenuiterque vivat, &

siccantibus utatur, humectantia fugiat, ac parum bibat; dein curandum ut tum Infantum Nutrici alvus semper libera sit.

7. Sed ad Continentem Causam ex parte læsa tollendam, duplex occurrit Curationis Methodus. Altera est, quæ Topicis convenientibus absque manuali operatione omnem humiditatem absorbit. Altera vel unica incisione, vel pluribus scarificationibus aquosam materiem educit. Prima Curationis Methodus sane tutior est, in Puerulis præsertim natu minoribus; atque poros cutaneos Aperientibus, Materiamque Conjunctam Attenuantibus & solventibus perficitur, sub quacunque forma Capiti applicentur. ex. gr.

24. Rad. Calami aromat. ʒiij. Fol. betonica, majoranz, Salviz, rosmarini, Summ. Anethi an. Mj. Flor. Stachados Arabi Mʒ. bacc. Juniperi ʒi. Sem. Cumini ʒiij. Cerevisiæ tenuis vel Vini albi Gallici lbij. coq. S. A. in Diploma te pro fotu. Hoc tomentum cum pannis laneis Capiti calide admoveatur, ac identidem refovetur, exacte interim cavendo, ne unquam refrigeretur. Et quia sæpe id prohiberi nequit, hinc tomenti loco Capiti imponatur cucupha ex foliis majoranz, Betonica, Salviz, calamentiz, floribus Stachados, Lavendulæ, rosis Rubris, Nuce moschata, &c. quæ sæpius permutetur.

8. Malunt alii totum caput linimento inungere.

25. Olei cucumeris asinini ʒj. Rutæ, anethini an. ʒ ʒ. Abiynthii stillat. gutt. xv. M. F. Linimentum. eique inunctione facta mappam probe calefactam, vel modo laudatam Cucupham imponere.

In Adultioribus haud inutiliter Spiritu vini calido caput fricari solet, quod tamen non temere in Infantibus tentandum.

J. B. Cortesius laudat Unguentum à Foresto descriptum & probatum, quo spatium trium dierum, in puero quindecim dies nato Hydrocephalus curasse refert,

26. Pulv. Absynthii. flor. Camomillæ aut meliloti an. ʒij. butyri recent. Olei camomillæ aut Anethini an. ʒiij. Cera parum q. s. M. F. S. A. Unguentum. Aut Cataplasma ex Cephalicis in vino coctis compositum, & capiti applicatum multum laudant.

Cataplasma ex Cochleis cum Decocto Cephalico minutim contulis extollit Avicenna, eoque Agram se sanasse refert Carolus Piso.

IX. Sed remediis hisce si morbus non cedit, ad alteram Curationis partem, Chæirurgia deputa, deveniendum est, quæ proponitur ab Aetio & Paulo Aegineta, dicendo: "quod ubi aquosa materia inter cutem & pericranium, vel inter pericranium & cranium continetur, & quando tumor parvus est, apex ipsius unica incisione per diametron a parte posteriori ad anteriorem ducta incidendus. Si vero materia inter pericranium & cranium contineatur, & tumor major sit, duas per medium se mutuo secantes, crucis instar incisiones molimur, vel triangularis formæ. Sin grandior adhuc sit tumor, tertias inter Hægiram amulantes, aut etiam plures juxta tumoris magnitudinis proportionem.

10. Equidem Curatio hæc, quæ per Incisionem fit, quamvis a gravissimis descripta sit Autoribus, cum vix tuta sit, mihi non probatur; atque de periculosa illi Hydrocephali apertione testatur Fabritius Hildanus Cent. 3. obs. 17. imprudenter illos agere, qui in Hydrocephalis multa promittunt, sectionemque tentant. Si tamen per imposita exsiccantia & resolventia medicamenta aquosus humor absumi nequeat, atque adeo Chæirurgia requiratur, præstat in pluribus capitis locis maxime tumidis (cavendo à musculis temporalibus) cum Phlebotomo parvas facere incisuras, quales in Venæsectione, aut partis post apertas cucurbitulas scarificatione fieri solent: Deinde mappæ sicæ ac probe celefactæ imponantur, quæ identidem, quoties à suscepto humore seroso madefactæ sunt, permutentur, usque dum omnis aquositas ablata, & Hydrocephalus sanatus sit.

11. Alii Cautericis capitis cutem aperire, vel Actuali Cauterio murere, quinque, sex, pluribusve in locis suadent: sed videtur talis Chæirurgia merito suspecta, & ob Cerebri vicinitatem admodum periculosa. Atqui potius usu veniunt Vesicatoria, fonticuli, setacea.

12. Si sub cranio, viz. crassam menyngem inter & cranium, vel sub menyngibus ipso in cerebro hæreat aquosus humor, nulla tentanda Chæirurgica Operatio, sed per sola Topica est procedendum, & reliquum opus naturæ committendum: recte namque inquit Ambrosius Paræus Chæir. lib. 7. cap. 1. ex tumore & humore intus sub cranio contento neminem convaluisse vidi. At de variis, nec non monstris Hydrocephalis videantur Scenkius obs. Medic. libr. 1. p. m. 10. 11. 12. Fabritius Hildanus Cent. 1. obs. 10. Cent. 3. obs. 17. 18. 19. Cent. 4. obs. 10. *Joh. Munnicks in Chæirurgia ad Praxin hodiernam adornata.*

Curationes.

In Hydrocephalo limaces cum suis testis pistentur & reducantur in formam emplatri, quod capiti applicatum & relictum, donec sponte cadat, mirabiliter resolvit. *Johann. Hartmann. in Prax. Chymiarie.*

Curatio hydrocephali in infantibus adhuc lætantibus admodum difficilis est, quod infantes sint tenerissimi, & medicamenta purgantia non tolerant, quocirca caute admodum & summa cum prudentia cum his procedendum est. Solis topicis fovendum est caput, ut roboretur calor eorum natus & sic per insensibilem transpirationem materia hydrocephali evacuetur. Topicum autem medicamentum, quo solo tenellorum infantum caput refocillari, & materia hydrocephali evacuari potest, sic componi debet.

℞. Ess. rosimar. & salv. an. 3j. pulv. cinnam. & nuc. moschat. an. 3ß. caryophyll. ʒj. ceræ ʒij. picis navalis ʒij. fundatur & liquatur cera cum pice, quibus liquefactis adde pulvres, & ultimo infunde essentias, dum materia saltim repet, ne essentia evanescant, & lege artis fac cerotum, quod deraso capillitio semel in die capiti infantum applicetur, donec caput omnino detumeat. Quod si vero infantes sint robusti, ut purgantia medicamenta sustinere pos-

sint mercurio dulci spagyricè præparato purgentur sequenti modo.

℞. Mercurii dulcis ʒj. diagrid. è succo liquoritæ dissoluti & rursus exsiccati gr. v. conserv. viol. ʒj. m. f. bolus, detur mane et in regimine & custodia artis. Per capitis purgium nostrum ac sternutamenta etiam expurgari queunt, ut materia hydrocephali per nares educatur, sicuti pariter per sudores & urinas hæc affectio exterminari potest. Sudores sudorifico nostro cum jove & mercurio parato promoveantur.

℞. Milii solis ʒj. saxifrag. & rest. bovis. n. m. j. terebinth. Venet. ʒij. mell. opt. ʒiv. spiritus acet. rectificat. lbj. f. omnium destillatio per alembicum vitreum in cineribus ad materiæ siccitatem, ita tamen ut caveas, ne materiæ comburantur: Hujus liquoris destillati ʒß. misceatur cum jusculo pulli, & detur mane semel in die. essent. etiam salv. gutt. 3. aut 4. in jusculo pulli propinatæ ad hydrocephali curationem valde conferunt. *Joann. Petr. Faber in Patholog. Animal.*

Autor hic docet, quid sollicito medico in cura hydrocephali cum primis agendum, ut scopum suum consequi feliciter valeat: Nimirum talia esse adhibenda dicitur, quæ calorem nativum specifica virtute (medicamenta cephalica, eaque calida dubio procul hic subaudit) exhilarare ac recreare ita queunt, ut refocillatus denuo functiones suas exserere, ac potissimum collectam aquosorum recrementorum copiam expellere auspiceretur: Hoc enim nisi fiat prognosticum mali ominis instituit Autor, & infantulis hinc moriendi necessitatem innuere non inmerito prædicit: Exinde enim non tantum calor natus penitus demum extinguatur aut suffocari potest, verum etiam tenelli cerebri violenta ob pondus retenti copiosissimi seri compressio, vel lethalis ejusdem obstructio ac per consequens aut apoplexia aut ethargus pertimescendus erit. Duo sunt in Arte Medica juxta Epiphani. Ferdinandum ardua, quæ difficultatibus scatent non contemnendis, ac titubantem proinde Medicum, gravidis nempe & infantibus mederi. Infantes enim quod attinet, ipsi sanè secundum ipsius Galeni confessionem quam maxime intractabiles existunt, præsertim quod medicamenta convenientia, prout par est, insinuari ipsis nequeant; & quod tanto insuper robore non polcant, ut remedia illa & ex illis quidem purgantia, quæ tunc eaque fortiora medendi methodus requirit, tuto porrigi possint. Ergo ut in dubiam aliam hic atique, itur, & valde anceps propterea infantium morborum curatio deprehenditur, quapropter cuncta prudenter & caute hic peragenda erunt; ne conscientia sua Medicus injuriam faciat, hoc est neque temerarium nimis, neque formidolosius etiam se in hoc casu exhibeat: Hac ratione enim penitus vitanda non adhibebit & usurpanda non expavescet aut abhorrebit. Tuto autem hic tua progredi circa tenellorum lætætinque hoc malo afflictorum curam se existimat Autor, si ad sola topica tunc refugiat: Unde etiam hujusmodi formulam remedii seu ceroti adposuit, quod tamen ut ut juxta componendi leges se recte omnino habeat, nostro quidem animo nisi

universalia non est clysteres ad minimum ac sudorinea debite præmittantur, non tantum nequaquam inficitur, sed cum exitio potius applicabitur, quoniam eo ipso pori potius (qui nisi alius sunt, quam quædam intentionis transpirationis ac sensibilibus pariter seu sudorum portæ) obadmotum undique cum pice ceram conglutinantur aut obstruuntur, adeoque materiæ peccantis vitium quo minus excerni queat, citius retardabitur, verum etiam quum topicum illud vni c. letaciendi ac suspendendi habeat, sic comotato calore nativo aut spiritu, ac proinde excitata insinuat expultrice colluvies serosa deorsum citius pelli, atque ad vitalia seu præcordia præcipitari poterit, ut vehementissimam tussis, gravior anhelandi difficultas aut catarrhus suffocativus facile hinc succrescere valeat. Nos itaque huiusmodi characteris topica nisi balsamica & secrete habenda virtute (sic namque efficaciam præstabit aqua seu serosa hunc colluviem quasi magnete extrahendi) singulariter data sint, nullique in forma liquida præscribantur, nullo modo commendare possumus: Aut si nihilominus cupiamus hanc curandi modum vel hoc ipsum Autoris topicum attrahere, deinde ut in antecessum clysteres supra nobis designati & postmodum sudorinea nobiliora pariter superius laudata præmittantur: Hæc enim ratione tutius quodammodo Authoris methodum sequi licebit. Quid faciendum cum robustioris constitutionis infantibus hydrocephali sateina onustis nunc sit, pectitur, & propterea purgans his prærigendum, utpote cuius vim sustinere sic valebunt, absque hesitatione ulla consuetur. Verum nec forma cathartici illius nec dosis approbata nobis videtur, siquidem tam in forma boli medicamenta infantibus vix ac ne vix quidem insinuari posse ex præconstet; quam ipsam dosim mercurii dulcis videlicet ad ℥j. pro hac ætate esse evidenter nimiam, vel quilibet statim conspiciat. Verum insinabit fortassis quispiam primo, remedia ex mercurio preparata tutius exhiberi non posse quam in formula pillularum aut boli vel etiam electuariorum, quod mercurialia exactius sic subigi ac committeri queant, ut in deglutiendo faucibus vel œsophago non adhiærere, adeoque salivationes aut huiusmodi incommoda aliæ exinde loquimur provenientia oppido sic præcaveri possint: Deinde in huius mali cura mercurium dulce nequaquam negligendum esse, quod is ferocitates & humores noxios præ reliquis omnibus purgantibus masculis sed sine perurbatione ulla ac blande educat, & proinde infantibus etiam secrete præbeatur. Respondemus his omnibus nos etiam nullatenus contradicere, sed tantummodo in dosi huius mercurii primo desiderare, quod tunc gr. v. vel vi. ejusdem & diagrid. gran. i. vel 4. (accutur enim mercurialia purgantia non absque ingenio cum fortioribus purgantibus, ut eo citius nato hoc stimulo operationes suas perficiant, nec diutius in corpore permaneant) sufficere possint: Deinde de quod forma in pharmaci concernit, rectius electuarium liquidius ulum hinc conficietur, addendo scilicet confect. viol. ℥j. & parum insuper de syrupo viol. admiscendo, quo modo sicut nec minus vel cum syrupo solo purgans illud facilius insinuari posse infanti hydroceph-

lico non desperamus. De caputpurgiis seu sternutatoriis, quorum quidem usus præmissis rēdem universalibus in hoc affectu plurimum valoris est, dum materia peccans per nares vix per propiorem viam & confertim sic educi potest; adnotamus; quod infantes vix incepti existant ad applicandum sibi hoc remedii genus, dum fortiter id naribus attrahere, prout requiritur, non callent, nisi pulvis canaliculæ beneficio naribus insuffletur, aut si liquidum sit præmixtum per siphunculum immisceatur. Ideoque tunc balsamus majorana commodius substituitur, qui narium interioribus inunctus suaviori modo ac pedetentim sternutationem concitabit. Deinde circa sudorineum maximum seu joviale nullum est dubium, quin id cum subito successu tunc adhiberi poterit, præsertim si ad gran. 3. cum aqua ludorifica ac cephalica propinetur, sicut etiam diuretica seu pariter præstantiora multum auxilii præstare id poterunt; quorum mentio & catalogus ubi plenius oblata occasione examinabitur. Illud vero diureticum, quod in præfati ab Autore adscriptum concernimus, tenellorum constitutioni ita denique ingratum ac horridum erit, cum primis in tanta dosi ad 3 ℥. nempe cum iussu porrigendum: Cui accedit, si ingrediente nullo præoccupati affectu estimare non vereamur, quod singularis aut nobilis tantoque Chylitastro digni remedii titulus huic diuretico nulla ratione attribui queat. Præstantiora ergo quum habeamus hodierno seculo huiusmodi efficaciam medicamentis; & quum ipse Autor & alibi in hoc tractatu suo excellentiora diuretica nobis communicaverit; quorum dosis ad quasdam guttas dumtaxat aut grana se extendit, non minus levioris conditionis medicamenta proscribimus; aut sicto pede præterimus. Specifica cephalica; quorum numerum adornare etiam possunt essentia rosarum & saliv. spagyricæ aut peculiari menstruo parata non penitendum operationem exerent; modo præmissis universalibus cura huius primordii fuerit instituta. Quod autem tam frigide huius affectus curationem tractaverit Autor; forsati deficienti occasionem, & dum nullum hoc (prout rarum id est, ac proinde Medicorum patris huiusmodi observatio contigit,) ipse errandum non occurrat; non male adscribemus: Unde & nobis consultius videtur, hic nostro quoque loco abstinere manum, quod sub secuto experientia de hydrocephalo testatum dare parum aut nihil valeamus: Interim tamen hoc saltem adjicimus, Medicos illos non aberraturos, qui ad nobilissimum emeticum aliquod in pauca dosi datum in principio mali, ubi vires adhuc constant, præmissis tamen convenienti enemate, confugiant, utpote cuius beneficio ex capite (faciam exinde concussione compatiēte) serosa hæc materia commodiuscule & moveri & promoveri, hoc est evacuari poterit: Deinde etiam spiritum nostrum cephalicum in percutiendo hydrope tantquam singulare & probatissimum specificum fuerimus experti, quanto magis is & quidem duplici ut patet vel multiplici potius viscerum enim mirè confortat, calidum imatam recteat; sudorem & urinam suaviter provocat, imò cruditates digerit, ac superfluitates omnes potenter consumit;) nomine ad hydrocephalum

ex sententia tollendum conducet, videlicet in aq. quadam cephalica v. g. sal. vel ceras. nigr. vel flor. tiliz &c. ad gut. vi. vel vii. sedulo exhibitus: Ad extra tandem aquam nostram salutarem nunquam non feliciter in sublevandis omnis generis tumoribus calide adhibitam usurpavimus. *Christianus Langius in Animadversionibus ad Joh. Petri Fabri Pathologiam.*

Medicamentis ablumentibus aquosum humorem, simulque etiam affectam partem roborantibus utendum, qualia sunt sequentia.

℞. Ros. rub. fursur. melilot. aa. m. j. flor. anth. chamæmel. sal. beton. stæch. an. p. j. bulliant in f. q. aq. addita vini austeri quarta parte, quo decocto modice calente, infantis caput singulis saltem octo horis irrigetur quinque vel septem diebus continuis. dein.

℞. Ol. chamæm. aneth. an. ʒj. pulv. absinth. ros. rub. an. ʒvi. sulphur. exacte pulverat. ʒij. ceræ, q. l. f. lumentum, quo ter in die caput infantis liniatur, & lana succida obtegatur: interposito interdum præscribendi nunc cataplasmatibus usu.

℞. Mell. fss. origan. m. j. sal. ʒss. cum modico vini austeri & croci gr. iv. vel v. f. cataplasma capiti infantis de more adhibendum. De Chirurgia nihil proponendum ducio, quod tumorem hunc præfidiis præscriptis ex arte administratis omnino cessurum putem; verum si punctione seu incisione pro educenda aqua opus erit, aqua sensim ac paulatim, non autem tota simul evocetur, ne infantis vires deiciantur. *Jo. Zecchiæ consult. 64.*

Hier. Fabric. ab Aquapendente, in hydrocephalo infantium maximo, ut remedium efficacissimum, laudat aquam calcis vivæ, si ea calida spongia imbuatur, & capiti imponatur, ac hoc solo remedio se hydrocephalum curasse scribit. Idem commendat spiritum vini primæ destillationis, cum parte quarta aq. scabios. cum spongia impositum. Monet autem hic spongiam novam esse recipiendam, & arctè fascia capiti alligandam, ac ne refrigeretur, calido linteo superposito moderate calefaciendam esse. Exsiccant & thermæ sulphuræ ubi earum est copia, si spongia in iis madescat, & capiti imponatur; in defectu vero coquantur in aqua sal. sulphur. & alumini, & eodem modo applicentur. Avicennas usurpat cochleas, quas coquit in decocto artemis. stæch. calamenth. vel ebul. easque ita coctas contundit, & calide capiti raso applicat. Sed ante usum discutientium & exsiccantium medicamentorum evacuanda est aqua è toto corpore (si per ætatem fieri possit) hydrogogis, sudores & urinam moventibus. Adulterioribus pil. coch. exhiberi possunt, vel succus iridis, vel gr. ij. elaterii cum pil. convenientibus: per sudorem serosum humorem evacuant decoctum lign. guajac. sarsaparill. sassafras, vel balneum laconicum, & sudatorium: per urinam evacuant decoct. betonice. rad. fenicul. asparag. sem. anis. & alia. *Daniel Sennertus præl. lib. i. part. 1. cap. 28.*

Consultatio.

Puella unius & dimidii anni, per sex menses ablactato, cum à parentibus pauperioribus sepe negligereetur, nec ei alimenta convenientia,

sed lac pressum, crudum, fructus horarii crudi, aliæque similia darentur, & caput etiam hyberno tempore non satis tectum servaretur, caput in parte capillata & fronte usque ad oculos cepit intumescere; qui tumor spatio unius mensis in tantum adauctus est, ut fere ad virilis capitis magnitudinem excreverit: facies tamen non intumuit. Et autem tumor ille mollis & albicans, eique alte impressa digitorum vestigia inhærent. Puer interea mediocriter edit & bibit, non febricitat, sed somniculosus est, & totius corporis membra languide movet. Nares præter consuetudinem sicciore sunt, & saliva paucior ab ore profluit. Urina & liquidæ alvi dejectiones satis copiose procedunt.

Hujus pueri affectus Medicis hydrocephalus appellatur, qui est tumor capitis, quo, caput à serosi humoris collectione intumescit. Hic serosus & pituitosus humor collectus est extra cranium, & latet sub cute, quod tactu percipitur, quia nulla ossis dardities sentitur sed tantum mollis tumor. Serosum, pituitosum & copiosum, esse humorem qui colligitur, patet ex colore cutis albicante, & quod alte in pressa digitorum vestigia capiti inhæreant sine dolore. Causa antecedens hujus mali sunt humores frigidi & humidi in toto corpore, & imprimis in cerebro collecti, qui extra cranium elati, & sub cute condensati, causam continentem constituent. Humores hi generati sunt, tum ob pravam vitium pituitam crudosque humores producentem, tum ob frigidam & humidam totius corporis constitutionem, quippe horum ratione viscerum coctiones debiliores evasere, unde multi pituitosi & serosi humores generati sunt, qui partim per urinas & alvi liquidas dejectiones evacuati, partim ad caput delati fuerunt, cumque per nares & palatum more solito non effluerint, à cerebri calore in crassos vapores attenuati, cranii poros & suturas transierunt, atque sub cute rursus condensati, ibidem constitunt & collecti sunt. Per nares & palatum evacuati non sunt, quia sua crassitie ductus eorum tendentes obstruxerunt. Sub cute autem collecti sunt, quia ab externo frigore ejus pori angustiores & humores ipsi densiores evaserunt, ita ut ob crassitiam per constrictos poros permeare non potuerint. Cumque quotidie novi humores ad priores accesserint, & nulli vel admodum pauci per poros dissipati fuerint, hinc factum quod caput spatio unius mensis in tantam magnitudinem intumuerit. Ager alimenta adhuc allumit, quia ventriculi appetitus à cruditate saburra non multum impeditur, cum illa per copiosas urinas & liquidas alvi dejectiones satis evacuetur. Non febricitat, quia humores non putrescunt, nec calor est nimis excessus aut malignitas. Somniculosus est ob frigidam & humidam cerebri intemperiem, cujus ratione non tantum nervi sensorii flaccidi, & ad spirituum animalium transitum, atque objectorum sensibilibus receptionem minus apti sunt, verum etiam pauciores spiritus animales generantur, cum à frigida humiditate angustiores seu strictiores tactæ sint arteriolarum in plexu choroide, atque hinc pauciores spiritus vitales transmittantur, qui quandoquidem materia sunt à qua animales conficiuntur, sequitur si illa materia pauca sit, necessario quod inde

generatur paucum esse debere. Hæc spirituum animalium paucitas etiam in causa est, quod æger totius corporis membra languide moveat; cum enim dicti spiritus pauci ad partes & musculos influant, necessario motus animalis languidus est. Alvus liquida est ob copiam serosorum & pituitosorum humorum, qui in corpore generantur, & magna parte ad intestina detrahunt, quorum tenuior pars sanguini permixta, & in renibus ab eo separata, urinas quoque facit copiosas.

Hic affectus admodum periculosus est; licet enim collectio feri sit extra cranium, atque hinc magnam sanationis spem promittere videatur, tamen periculo non vacat, cum capitis intemperies, totiusque corporis cachexia magna sit; serosus humor copiosus, & ætas tenella; quæ fortia remedia non fert. Quia tamen in re dubia adhuc spes apparet, curatio quamprimum est instituenda, antequam affectio pejor fiat.

In curatione serosus & pituitosus qui in toto corpore redundat humor, in primis ille qui in capite colligitur, quocunque modo clementer evacuandus, & viscerum corroboracione ac intemperiei sublacione ejus copiosior generatio, & in capite collectio impedienda.

Primo cum cochleari exhibeatur syrupi de cichor. laxativ. ℥ β. cum pulv. jalappæ gr. vi. vel vi. vel passularum solutivarum ℥v. vel vi. comedendæ dentur. Postea subinde exhibeatur pauxillum theriacæ veteris, & si fieri possit, sudor provocetur. Offeratur etiam ter quaterve de die pauxillum conserv. anthos, melissæ, aut florum salviz. His præmissis sequenti fomento tepido caput sæpe foveatur.

℞. Herb. betonic. rosamarin. origan. thymi; flor. chamomill. melilot. stœchad. an. m. j. fol. laur. m. β. sem. anis. fenicul. cummin. an. ℥ij. vini alb. q. s. coquantur ad ℥ ij. pro fomento, cum magna spongia aut pannō lanco admovendo, diligenter cavendo ne refrigeretur. Postquam ulu hujus fomenti tumor capitis maxima ex parte dissipatus est, ad ulteriorem intemperiei sublacionem, inungatur caput mane & vespere hoc ungento calido.

℞. Olei chamæmel. unguent. alabastrin. an. ℥ j. olei nucis mosch. rz expressi ℥ iv. pulv. cassior. styrac. calatn. benzoin. an. ℥ j. misce, f. unguentum. Ibi inunctionem imponatur capiti tale capitium.

℞. Fol. rosamarin. majoran. flor. chamomill. melilot. an. m. β. benzoini, gariophyllorum; nucis moschatæ, an. ℥ iij. f. pulvis grossus, e quo in serico rubro cōnectatur secundum artem capitium interfuturum. Postea relicto etiam linimento, hoc solum capitium diu in capite gestare debet. Interea etiam ad viscerum corroboracionem bisterve de die exhibeatur cochleare hujusmodi mixturæ.

℞. Aq. flor. tiliz, liliorum convallium, ana ℥ ij. aq. cinnam. ℥ vi. syrup. de stœchad. ℥ j. misceantur. Vel hujus loco detur subinde pauxillum melicratl. Regioni ventriculi, hepatis & lienis hoc linimentum inungatur.

℞. Olei laurini; chamæmelin. unguent. martial. an. ℥ β. olei nucis moschatæ expressi ℥ i β. misce, fiat linimentum. Si hæc non profuerint, in capitis tribus quatuorve locis maxime tumidis lanceola perforatio exigua per cutem fa-

cienda est; non major quam in venæ sectione fieri solet, ut per illa foraminula serum paucum exstillare possit, quod mappis calidis impositis excipiendum est, usque dum fluere desinit; postea antedictum capitium capiti imponendum est.

In victu sit ær calidus & siccus. Cibi offerantur paulo sicciores quam ordinarie hujusmodi puellis exhiberi solent: ut panis biscotus matricatus: offæ ex pane albo cum decocto passularum, aut jusculo gallinæ humectata, ac cinnamom. & sacchari pauxillo consperitæ: Pultrula etiam cōnectantur ex farina tritici cum decocto passularum; hisque aliquantulum vini addatur. Bibat æger subinde lac amygdalatum cum pauxillo aquæ cinnamomi. Abstinendum ab usu lactis pressi acidi, feri lactis) cerevisiæ tenuissimæ, fructuum horariorum, & pomorum, licet coctorum. Somnus sit mediocris; non nimis longus. Excret. naturalia si non procedant arte provocentur. *Isbrand. de Diemerbroeck de morbo Capis. Medicas. 25.*

Observationes

Quamvis in ventre ut plurimum sese manifestat hydrops, cum tamen in omnibus fere corporis partibus nasci possit experimur. Præter abdominis enim hydropem, sive ascitem, pectoris etiam datur hydrops; capitisque ac testiculorum; tam virilium quam muliebrium, nec internis tantum, sed & in externis corporis partibus, cujus veritatem demonstrabo obs. 25. hic loci saltem acturus de hydrocephalo, quem mihi videre licuit 4. Decembr. ann. 1687. in filio Chirurgi cujusdam Hagienfis binulo, cujus caput latitudinem adulti capitis multum excedebat, hoc enim totum ambiens, a synipite videlicet ad occiput, linteum tres spithamas, sive linam longitudine æquabat. Infans ille sanus quamvis; & bene disposito corpore in lucem editus, sexto demum mense quodam correptus fuit morbo, a quo usque tenore caput primo incrementum, visusque sensim imminui cepit; tandem omnino sublatus.

Quemadmodum diversus admodum est abdominis hydrops; ita etiam hydrocephalus; qui tam partium capitis aqua distentaturum; quam causatum intuitu multiplex est. Collectio enim aquarum contingit; vel in toto capite vel in aliqua parte; siquidem nonnunquam in externis tantum advertatur partibus. Inter cūtem videlicet; & pericranium; vel inter pericranium, ad cranium, quandoque & internis tantum partibus inter cranium; & meninges, inter duplicaturam duræ meningis; falciæve, vel ipsas inter cerebri membranas, aut inter platū matrem, & cerebrum, imò aliquando in dimidia tantum capitis parte, interdumque simul tam in internis; quam externis. Attestante Vesaliō lib. 1. de humani corp. Fabrica cap. 5. Ut & Fabric. Hildano cent. 1. observ. 10. in ipsa interdum cerebri cavitate repetitur aquæ quantitas, hydrocephali capitis causa. Dionys. vassides Sterre tract. de partu fol. 168. se duos hydropes in embryonum partibus capitem exterioribus videri narrat, e quibus, aperta tantum cute; aqua profluxerit. Similis mentionem facit Carolus Piso de morb. & serosa colluvie sect. 2. part. 1. c. 6. fol.

fol. 49. Puellæ, inquit, cuidam frons, palpebræque supra admirationem tuebant adeo depresse, & conniventes, ut eas tollere, oculosi-que aperire nequaquam posset: sed & calantiam, sive redimiculum capitis abjicere à me iussa, universum pariter caput immaniter conspicatus, in eodem sapiusculæ manu contracto molliem deprehendo insignem, & humorem sub cute fluctuantem, qui tactum subterfugiens quidem, sed mox refluens, recurrentq: evidenter se proderet. Hoc malum, cum ad menstruanæ purgationem, hæcenus omnino suppressam, tum ob assiduam sub sole moram, cui ejus loci incolæ maximam vitæ in hortorum, vitiumque cultu transigentes vivunt obnoxii, ortum fuisse autumnæ. Non multum differt quod habet Epiphan. Ferdinand. hist. 11. fol. 66. & Joh. Bapt. à Lamzuverde append. obs. ad armament. Chirurg. obs. 33. fol. 253. Henricus Regius Prax. med. cap. 13. fol. 57. Pueri meminit trunuli, cujus caput contactum molle erat, & digitis prelium subsidebat in fossulas, radiisque solis, vel candelæ expositum pellucebat; quamvis ille judicaverit malum intus in cerebro latuisse, quia puer sensibus erat stupidioribus, & somnolentus, reliquo corpore, licet sufficienti cibo, potuque frueretur, macilentus, pallidusque. Credidit Riolanus humorem in externis hydrocephalis transire ad cerebri ventriculos, verum Joh. Jacob. Wepferus exercitat. de Apoplexia fol. 112. statuit ipsum non primò externe congregari, posteaque versus interiora prorumpere, sed viceversa originem habere in cerebri ventriculis, interdumque versus exteriora adeo expelli, ut ibidem animadverti queat. Andr. Vesalius lib. 1. cap. 5. de non exiguo agens hydrocephalo humorem nonnisi in cerebri ventriculis reperiri ait. Humorem illum omnium primò in iis provenire ventriculis G. Fabrit. Hildan. etiam cent. 3. obs. 17. scribit: alias enim (inquit) nonnullæ post mortem vix reperirentur, per quas ille è partibus externis deductus fuisset ad cerebri ventriculos, quas tamen, etiamsi diligenter indagaret, reperire non potuit. Zacutus Lusitanus prax. admir. lib. 1. obs. 5. humorem invenit inter duplicaturam duræ meningis. Theoph. Bonet. Anatom. pract. lib. 1. sect. 2. obs. 45. fol. 112. ejusmodi liquorem lymphaticum à Chirurgo Bayly non tantum inter duram meningem, & cranium, sed & in falce, & duræ meningis duplicatura, ad quinque circiter libras Medicas repertum fuisse refert. Expertiss. Steph. Blancardus collect. phys. med. cent. 1. obs. 73. fol. 65. se in septem mensium abortu inter duram, & piam matrem magnam aquæ sanguinæ latentem quantitate non animadvertisse memorat, cujus forsau causa, ut ait, fuerit præcedens matris lapsus: cerebrum autem ejus molle & aquosum erat. Johannes Jacobus Wepferus exercitat. de Apoplexia histor. 13. fol. 376. & histor. 14. fol. 398. se non cavitates tantum cerebri, sed & locum illum inter duas meningis plerumque vacuum sero repleta invenisse narrat.

G. Fallopius obs. à Francisc. Michino edit. indicat se intra pueri cujusdam sexennis piam matrem, & cerebrum, ut & inter hujus gyros aquam conspexisse. Andr. Vesalius lib. 1. de

hum. corp. fabrica, bimulæ puellæ meminit in cujus cerebri ventriculis septem mensium spatium novem aquæ libræ collectæ fuerint. Quamvis autem cerebrum ejus juxta verticem ita pressum, & in se contractum reperiretur, ut membranam aliquam crassiorem referret, & genuinæ cerebri membranæ sibi adeo essent contiguz, ut unum, idemque corpus viderentur, cerebellum nihilo secius, ejusque basis, & nervorum processus naturaliter se habebant, quare puellæ ad finem usque vitæ mens sana fuit. G. Fabrit. Hildan. cent. 1. obs. 10. fol. 15. pueri cujusdam mentionem facit, cui caput tantam excreverat molem, ut ejus rotunditas ulnam & quartam ejus partem, altitudo autem ab aure ad aurem totidem æquaret longitudine: is autem non ita natus fuerat; sed cum septimum ætatis mensem vix attigisset, caput mirum in modum ei tumescere cœperat. Intra triginta autem menses paulatim ad dictam magnitudinem excreverat, unde puer in lethargum inciderat, nec ita diu post obierat. Dissecto cranium in duobus anterioribus cerebri ventriculis aqua crystallo lucidior ad libras Colonienses 18. apparuit. Hæc autem non ventriculos tantum, sed & substantiam cerebri distendebat, ita ut totum cerebrum (cerebellum excipit Hildanus) in sacculum extenderetur, unde circumvolutiones, gyri cerebri, tangentibus omnibus, non apparuerent. Dura & piam matres integræ erant, atque ita dilatatz, ut totum cerebrum cooperirent: cranium similiter dilatatum erat, sed passim membranosum potius, quam osseum, nec reperiebantur meatus, per quos serosus ille humor ad caput delatus fuerat, quantumvis accurate dispicerentur. Omnia. Cur autem, dicit quispiam, hoc, quidquid est liquoris, in cerebri ventriculis apoplexiam non producit? Resp. Quia aliquo modo est spirituosior respectu aliarum aquarum, & coagulationis expertus, adde quod sensim in cerebro colligatur, & non subito; sensim enim ibi collecta sensim quoque poros, tubulosque cerebri dilatat, & non comprimit, vel obstruit, ut quidem heret, si uno impetu fuisset collecta. Idem Hildanus cent. 4. obs. 10. fol. 124. pueri cujusdam quintum ætatis annum nondum prætergressi meminit, cujus capitis circumferentia continebat pedes Geometricos duos, cum sesquipede, & pollice, altitudoque eadem erat: cranium utcumque durum erat, & nonnisi quibusdam locis membranosum: reliquæ vero corporis partes proportionem pueri ejus ætatis observabant, non ita, ut hydrocephalorum solent esse corpora, extenuata. Ingenio puer stupidus admodum erat, visu, audituque, necnon loquela destitutus: Id vero malum ex eo provenerat, quod circa annum ætatis suæ primum morbo laborasset gravissimo, & acuto. N. Tulp. obs. med. lib. 1. c. 24. fol. 49. de puero memorat quinque annu æ cuius capite post mortem educæ fuerint quinque aquæ libræ, quibus effusis omnia adeo vacua apparuerint, ut plerique Medicorum præsentium, sed præpropere, hic caput sine cerebro conspici judicaverint. Tale autem hydrocephali exemplum attert. Theod. Kerckring. obs. Anat. 46. fol. 102. & Zacut. Lusitan. prax. Med. admir. lib. 1. At oculi acie illuc penitus directæ satis perspicue liquebat non de fuisse cerebrum,

cerebrum, sed amissa figura globosa, formam convexi fornix induit, ut in illa membrana crassioris undique arcuata dissolutorum ossium circumferentia adhæresceret; quali etiam modo se habuisse puellam Andr. Vesali, de qua loco adducto, idem affirmat.

Demonstravit an. 1666. D. Joh. Hornius Anat. Professor Leydenfis hydrocephalum pueri anni unius, è quo aq. 3 36. hauriebantur. Th. Bartholin. cent. 1. hist. 20. fol. 40. exemplum habet pueri quinquennis hydrocephalo laborantis, cui caput tanta molis erat, ut tria adultorum superaret, circumferentia ulnam æquans cum quadrante, duasque spithamas altum, fronte ita elevata, ut oculorum orbitæ mediam faciei partem occupare viderentur. Sutura laxata omnes a iunmo capite ad occiput, & in utroque capitis latere. Nulla verba articulata protulit, nec ciborum quicquam manducare potuit, quia superior dentium series longè ab inferiori propendebat. Os perpetuo mædebat sero copioso utatur è capite profluente. Pedes sustinendo corpori impares erant. Hoc autem malum inde ortum arbitratur Barthol. quod matri pauperculæ, quæ undecim sine labe tali pepererat liberos, quum hunc utero gereret, præter consuetum morem gravia omnia evenissent, uterusque adeo intumuerit, ut prono in terram corpore progredi fuerit coacta. Plura huiusmodi habent M. Aurel. Severinus de noviss. obs. abscess. c. 9. Schenck. pag. 11. & 12. Paulus Aeginet. lib. 6. c. 3. Aetius tetrab. 1. serm. 1. c. 1. Philip. Ingrass. lib. de tumor. præter naturam tr. 1. c. 1. fol. 380. Nonnunquam dimidiam tantum capitis partem occupat hic hydrops, cui rei bina profert N. Tulpus, obs. Med. lib. 1. c. 25. fol. 50. liquorum, vel in dextro, vel in sinistro cerebri ventriculo hærentium exempla: in quorum alterutro se ultra duas aquæ libras tam strictè uni illi parti inclusas vidisse ait, ut altera illa plana esset, & integra.

Differunt autem hydrocephali ratione temporis, vetustatis, & magnitudinis. Nonnulli se ante partum in utero materno manifestant, sive ex imaginatione, sive lapsu matris, aut ipsius fœtus incommodo intra uterum situ orti, vel etiã matre nimis crassis alimentis, aut fructibus, aliisve refrigerantibus utente, unde sanguis ejus nimis evadit crassus, & tardus, vel etiam, quando illa tempore gravidationis aliis obnoxia fuit morbis. Baldvinus Ronssæus de extract. fœtus c. 23. Goudæ anno 1561. se puerum quendam vidisse hydrocephalo laborantem scribit, cui mortuo in lucem prodeunti caput toto corpore fuerit gravius; cuiusmodi plura extant apud Helvigium obs. phys. med. 3. fol. 9. Joh. Lechelephem. German. decur. 1. ann. 1. pag. 138. necnon Stephan. Blancard. collect. med. phys. ut & de morb. pueror. fol. 208. Nonnulli post natiuitatem denum serius, citiusve se manifestant hydrocephali, quamvis raro, vel non adeo magni conspiciantur in illis, quorum crania jam omnino clausa sunt, quia ossa tunc solidiora evasere, & per consequens intus contento liquori non facilè cedunt. Huiusmodi autem pueri prius obirent, quam semel oclusa crania dehiscerent, quamvis G. Fabrit Hild. cent. 3. obs. 19. exemplum habeat juvenis cuiusdam 18. annor. cui monstrosum valde erat caput; rotunditas enim ejus duos pedes Geometricos, & pollices decem continebat,

altitudo capitis ejusdem erat magnitudinis; reliquum corpus, in primis pedes (qui contorti erant, & retracti) & crura extenuata erant; cranium autem non membranaceum, ut plerumque hydrocephalorum esse solet, sed durum; solidumque. Mente non utque adeo constabat: loquebatur tamen satis distincte, comedebat avidè, & multum; sed mirum in modum ipsum à morbo epileptico vexari referebant Parentes. Caput verò accrescere inceperat tertio ætatis anno, cum morbo quodam liberatus esset acutior. P. Borellus hist. & obs. rar. cent. 1. obs. 38. fol. 43. de puella quadam 12. anni. nata narrat, quæ maximo continuoque verticis, suturæque coronalis diu laboraverat dolore sine febre tamen, tumoreve, aut rubore, cuique remedia omnia utiliora incassum admovebantur, ita ut tandem mors finem miseris, & doloribus ejus imposuerit. Aperto autem capite, abscessus repertus fuit natibus, & infundibulo cerebri in hærens, è quo aq. clarissima cum impetu ad libras duas exivit quasi e fonte scaturiens, & in altum profiliens: causa verò hujus mali fuerat, quod quinque vel sex ante morbum mensibus scabiem capitis, sive achores passa à Monachis quibusdam male curata fuisset remediis repellentibus, frigidisq; unguentis, unde caput refrigeratum, serositatesque in eo cumulatæ fuerunt. Zacus vidit hydrocephalum in puero decem annos nato. Roget quispiam cur magis affectus ille in infantibus quam adultis observetur? Ratio est, quia tunica arteriarum iis sunt molliores, atque porius, tubulique angustiores, nec motus sanguinis tam efficax. Interim quoque arteriarum facilius dilatantur, & particulæ crassiores in cerebrum deponuntur. Queritur autem, an & in brutis reperiantur hydrocephali? Eos in vitulis, bobus vaccisque observavit Joh. Jacob. Wepfer. exercita. de Apoplexia fol. mih. 69. & Thoms Barthol. act. Hufi. tom. 1. pag. 149. indicat quæ idem Wepferus, Colonos id animadvertere posse in brutis, quando in pratis vertigine corripuntur, testaturque se audivisse apud Subsylvanos in Helvetia frequentem hunc bovum esse morbum, ac se vertigine prodere. Addit & bubulcos esse, qui ipsi mædeantur. Hi primo malleolo post cornua pulsant, ubi ex sono aliud vacuum spatium, ac vulgo sunt in craniis bubulis, percipiunt, eumque mox perterebrant, ac foramini pennam inducunt, & attracto spiritu vesicas huiusmodi extrahunt. Si in superficie exillat promptè functioni cedit; si autem profundior, & cerebro immersa sit, successu frustrantur. Ac tum quidem quantocyus bos mactandus est. Idem hoc modo multa animalia curata fuisse ait, memoratque quum juvenca in pascuis crebrius vertigine corripere, se mactatæ caput, in quo caula mali latuerat, forte fortuna obtinuisse, quo aperto, ac cerebro denudato, sinistram latus sub syncipite tunidius & mollius reperisse; quod cum durius attrèctasset, profiliisse aquam limpidissimam, faciemque ei conspurcantem. Post quod, inquit, tumor subscidit. Divulso autem cerebro ad corpus usque callosum, ventriculum sinistram aperuit, invenitque vesicam tenerrimam, totam anteriorem ejus partem occupantem, quam citra ulteriorem lacerationem integram extraxit, ovum gallinaceum magnitudine superantem. In ventriculo, verticè verus superius, & infra, asperitas leviscula ubi vesica annata erat, apparuit, ac si seminib. papaveris

albi aspersus fuisset; Ventriculus autem sinister duplo major erat dextro: in anteriore parte superior ejus pars, & lateralis tempora versus, propter extensionem, tenuis vix cultelli dorsum æquavit: cetera omnia in cerebro sana erant. Similem, at paulo minorem vesicam idem Wepferus in bovino cerebro, dextri ventriculi anteriori parti undique accretam se invenisse ait, in cujus fundo macis inerat sedimenti crassioris, atque candidi lapilli, tanquam creta friabiles, subledeant. Si quis quærat, quo pacto liquor ille in cerebri cavitates perveniat: dicendum est, varias circa illud phenomenon occurrere considerationes, itemque adhuc sub judice esse. Existimant Riolanus, Regiusque poros in dictis cavitatibus exillere, humoremque illum à circumferentia cerebri ad punctum, hoc est, ad cerebri cavitates transire, hæc tamen opinio à Wepfero fol. 60. refutatur. Thom. Bartholinus lib. 3. cap. 6. anatom. reform. negat ibidem poros esse conspicuos, & etiam si darentur, facillime, utpote minimi, obstruerentur, unde hic illic defectus in sensibus, aut etiam apoplexia oriretur statuunt alii malum hoc interne ex debili cerebri calore originem ducere, quia hoc valde refrigeratum, humectatumque nutrimentum suum debite præparare, humoresque ab infernis partibus aliaplos sufficienter transpirare non potest. Quidam autem arbitrantur vitium hoc externè à quadam violentia, lapsu, alioquin, contusione, dura, imperitaque obstetricum contrectatione in partu, vel alio quodam violentiori modo provenire, unde cerebrum puerorum lædatur rumpanturque lymphatica vascula, sicque magna tandem lymphæ colligatur copia, qua nondum oclusum, tenerumque cranium sensim extendatur; unde etiam fiat (uti aiunt) ut morbus ille in pueris magis, quam adultis reperiatur. Nonnulli etiam, vasis lymphaticis obstructis, hydrocephalum produci autumant, unde lymphæ, cessante circulatione, aquosi causa sit tumoris. Nonnulli quoque opinantur aquam illam ex arteriolarum extremitatibus, vel etiam per modum transudationis ibidem colligi. Hydrocephalus autem externus meo quidem iudicio, quod tamen meliori nihil derogare opinioni velim, à superfluo plerumque quodam humore provenit, qui ex arteriarum extremitatibus, vasisque lymphaticis procedit, vel propter illorum abundantiam, vel obstructionem, vel etiam tardiores sanguinis intra arterias motum à viscoso, crassoque humore sanguini mixto ortum, unde hic necessario minori vi in vasa lymphatica propellitur: quamvis etiam fieri possit, ut tenerum necnon porosum valde infantis caput ab aëre frigido non bene defensum fuerit, unde humores in vasculis lymphaticis facilius condensantur, sicque ad motum evadunt ineptiores vasis ipsis magis, magisque intumescuntibus. Hydrocephalum hujusmodi externum provenire posse ab arteriarum extremitatibus vel hinc magis patet, quod tales hydrocephali non tantum à violentia, aliave causa externa nascantur, sed & quod in iisdem limosa quædam, vel sanguinolenta, turbulentaque semper reperiatur lymphæ, cum tamen in internis hydrocephalis ea clara semper, & limpidæ appareat, hanc sententiam confirmat præter alios Epiphan.

Ferdinandus hist. 11. fol. 66. Si verò quisquam dubius roget, undenam contigerit, ut in cane Richardi Louveri tr. de corde c. 2. pag. 123. ligata vena jugulari, omnes supra it; muscoli, & glandulæ liquido, pellucidoque repleti fuerint sero? Id forsitan contingit, quia sanguine per ligatam venam jugularem versus inferiora non retrogrediente, sed in ipsa arteria manente, per poros tunicarum arteriolarum, quæ in extremitatibus non duplices, sed simplices sunt, non nisi purum serum transcolatur; illarum enim arteriolarum textura transcolationi tenuis ejusmodi humoris satis idonea est. Quantum autem ad internum attinet hydrocephalum, lymphæ in cavitates cerebri, aliumve capitis locum eodem defertur modo, quo ille humor, qui in aliis corporis partibus producit hydropem, ut in tunicis viscera circumcingentibus, testiculis tam virilibus, quam foemineis, peritonæo &c. in quibus ultimis partibus multoties quidem centum, & quod excedit, aquæ libræ fuere repertæ. Verosimile est hoc, quidquid est lymphæ, per arteriolas in glandulas cerebri corticales delatum, ibidemque separatum per canaliculos (eodem planè modo, ac in renibus aliisve corporis partibus humores sequestrantur) ad cerebrum deduci, estque hæc hydrocephali lymphæ ejusdem plane naturæ, cujus est illa, quæ in ventriculis cerebri sanorum hominum semper reperiri solet, quemadmodum abunde e sapore & colore colligitur; qui humor naturaliter semper a subsequente novo unde propelli solet. Verum quorsum ille, cavitatibus cerebri irrigatis, in sanis deferatur, an scilicet ad nasum, sive oculos, auresve, aut oris cavitatem, non adeo exploratum est. Joh. Lechellus Ephem. Germ. decur. 2. an. 2. obs. 178. fol. 343. exemplum habet pueri masculi, cui recens nato caput hydrocephalo obsidebatur, cujusque non multo post mortui totus cerebri cortex non excedebat calami scriptorii crassitudinem, quo separato, loco ventriculorum ostendisse se ait amplam quasi vesicam limpidissima, & insipida aqua repletam, quantitate uncias 50. excedente, neglecta ea, quam spongiæ & lintamina imbibebant; effusa autem hac, collapsi cerebri ventriculi manifesto docuere illam in utroque ventriculo per corticis quosdam tubulos, à recentioribus Anatomicis passim descriptos destillasse, ac undique sui copia cerebri substantiam, cranium, pericraniumque extendisse, atque capiti illam deformitatem produxisse. Fieri etiam potest, ut abscessus, sive vesiculæ aquosæ in cavitatibus cerebri tam brutorum quam hominum repertæ primo ex aliis parvis vesiculis plexui choroideo annexis consentiant: quia glandulæ illæ tunc etiam tumidæ sunt & induratae, quæ successu temporis ita accrescunt, dum superfluum humor propter obstructionem reveli nequit. Ita Willisius glandulas illius plexus sæpe se vidisse testatur tumidas. Scribit etiam Ianc. Sylvius disput. 4. se glandulas illas in solis morbois reperisse; forsitan quia tunc temporis superfluo humore tumefactæ melius conspici potuerint. De glandulis hisce agit quoque Wharton Adenogr. cap. 24. fol. 142. ut & Theodorus Kerckringius observ. 10. pag. 29. Testatur D. Fred. Ruysch. Medicus, & Anatomicus Amstelodamensis expertissimus se in dissectione cadaveris cujusdam foeminei glan-

glandulas copiosas magnitudine sem. milii reperisse plexui illi annexas Joh. Jacob. Wepferus pag. 375. se non cerebri tantum cavitates humore plenas, sed & ipsum plexum sanguinis fere expertem vidisse ait, in quo multæ conspectæ fuerunt glandulæ, sed albicantes, limolæ, tactuque dura; fol. autem 415. se observasse tradit varias hydatides tam in sinistro, quam dextro plexu cniroideo, necnon fol. 410. se varias in plexu dextro hydatides animadvertisse scribit, quarum quædam pisco majores fuerint, ut & pariter in sinistro, quarum una avellanzæ nucis magnitudinem excefferit. Quando itaque liquor hic vasculorum lymphaticorum præter consuetudinem, & naturam viscosa quadam sanguinis materia incrassatus est, obstructionemque ibidem produxit, vasa lymphatica continua subsequenti lymphæ pressione tandem rumpuntur, sicque liquorem suum inter membranas effundunt, & receptaculum quoddam ibidem efficiunt, vel etiam inter vasorum lymphaticorum valvulas hydatides producunt. Contingit etiam, ut extremitates arteriarum à viscolo quodam humore sint obstructæ, vel vasculum quoddam alicubi tumore quodam prematur, unde sanguinis circulum suum per arterias absolvere non valentis tenuis, & aquosus liquor extra ipsas per poros transcolatur, qui ita hydrocephali interni causa est. Sunt qui dubitent an in cerebro vascula dentur lymphatica, verum testatur epistola quadam Steno sæpius se vascula quædam lymphatica circa glandulam pinealem animadvertisse, quæ, ut ait, totidem forsitan viæ fuere lymphaticæ humectationi ventriculorū cerebri destinata. Et si quidem eadem in pectore, abdomine, aliisque externis membris reperiuntur, non ita erraverit forte an, qui nec caput ipsis destitui dixerit, hoc enim instar gazophylacii cujusdam humorum, utpote lymphatico liquore, arteriisque liquorem istum advenientibus abunde ditatur. Ita ut dubitare non liceat, quin caput aquæ, ac thorax, ventræ, aut alia corporis exteriora membra, suis scatent vasculis lymphaticis. Ac quamvis nulla adhuc cerebro reperta sint hujusmodi vascula, non tamen non existere dicendum erit. Sed quamquam quæso, tuit causa, cur infanz corporis partes illius, de quo retuli, ut & in aliis, quæ adduxi, exemplis, adeo fuerint macilentæ? Nos causam fuisse putamus, quod durante hydrocephali accretione, ille parco admodum, imo sæpe nullo usus fuerit alimento, solo matris lacte contentus. Accrescente itaque capite, reliquæ corporis partes decreverant, quod nutrimento destituerentur, quemadmodum aliis partibus, nutrimento alio delato, accidit. Conferatur obs. 49. tom. nostri primi, ubi de magno liene. Sic etiam refert Thoni. Barthol. Act. Med. Hist. vol. 1. obs. 92. Quomodo D. Borrichius duarum gallinarum, quas macrescere quotidie & sine manifesta causa, suppetente licet sagina largiori, oppido attenuari videbat, in conspectum prolata viscera omnia flaccida, & exsucca, præsertim quæ in abdomine continebantur, repererit. Solum ibi hepatis præter morem imminens, adeo non videbatur imminutum ut plus, quam decuplo auctius cerneretur, & quod accedat, pinguisimum quale quid etiam observaverunt. Joh. Laſel, in renum scrutinio, Olausque Rubecq. obs. anatoin. Quod autem in gallinaceo

genere vitium deprehendit, id in anseribus delictiarum loco in canis antiquorum ælimatum fuit. Hinc *Martialis lib. 13. Epigram. 58.*

*Aspice quam tumeat in igno secur anseris majus
Miratus dices, hoc, rogo, crevit ubi?*

Juvenalis Satyra v.

Anseris ante ipsum magni secur anseribus par.

Certum autem est liquorem hydrocephali & succo quodammodo consistere nutritio; idem enim satis lentor, qui post ejus evaporationem animadvertitur, demonstrat. Infimarum partium maccor forsitan inde quoque ortus sunt, quod sanguis istarum partium crassior plerumque minusque spirituosus exillat quam supremarum, necnon quia ille per secretionem magnæ copię tenuis liquoris in capite aliquanto crassior factus, obstructione inde in vasculis suborta, infernas partes tam bene nutrire nequeat, vel denique, quia tubuli nervorum aliquomodo pressione lymphæ sunt obstructi, unde spiritus satis abunde in partes, pro circulatione humorum nutrientium propaganda influere nequeunt. Puer autem ille sensum visum amisit, quod tubuli nervorum opticorum paulatim magis, magisque materia viscosa intus contenta obstruerentur, vel etiam nimia ejus quantitate comprimerentur.

De signis, prognosique hydrocephalorum legi poterunt Paul. Ægineta lib. 6. cap. 3. D. Sennerius lib. 1. prax. part. 1. cap. 28. necnon Ambros. Parus lib. 7. oper. Chirurg. cap. 1.

Dicendum restat an, hydrocephalus queat curari? externis quidem facilius curatur, sed internus, præsertimque locum habens in ipsis cerebri ventriculis, nulla est sanabilis arte, teste etiam Galeno lib. med. introduct. Quam autem medicatio consistat in medicamentorum internorum usu, longoque tempore ea assumi debeant, difficile ad eorum assumptionem adducuntur instantes. Balth. Timæus lib. 5. de morb. infant. cas. 5. fol. 144. dicit se puellam bimestrem sanasse, quæ tumore capitis insigni, & pellucido ejusdem undique coloris afficiebatur, tumor in altum elevatus tactui cedebat, rursusque assurgebat; compressius aquæ fluctuantis notum prodebat sine dolore. Ab humore autem serolo extra cranium, inter cutem, & pericranium collecto, tumorem hunc excitatum fuisse signa modo enumerata satis ostendit ait, sensim autem, & in utero materno coacturatum esse serum exinde collegit, quod mater alioquin valetudinaria, & ad hydropem disposita, toto gestationis tempore potu cerevisiæ tenuis, sive secundariæ usa, multum aquosum, & seroli humoris cumulavisset. Quare nutriceem sanam, & boni habitus substituendam suavit, cuius que infanti tenello ex medicamentis internis nihil adhiberi posset, externis agendum esse censuit, inposito sequenti cataplasmate, cuius solius usu aliquandiu continuato sensim disparuit tumor. ʒ. Pulv. rad. cucum. asini, iridis an. ʒ. 6. sem. cumini ʒi. far. fab. ʒij. mell. anthos. q. s. f. cataplasma capiti raso calide applicandum. Laz. Riverius obs. med. a Sam. Formio communicat. pag. 350. infantis recens in lucem editi, hydrocephaloque laborantis meminit, qui totum caput, cum magna suturarum dilatatione occupabat, dicitque sine ullo impedimento aut alio remedio hunc se curasse, sola scilicet fasciâ Guidonis in formam cucuphæ concinnata, qua totum caput obvolutum fuerit. Hæc autem fasciâ,

Gallis *Capeline de Guidon*, quotidie renovabatur, & intra 15. aut 20. dies tumorem prorsus evanuisse tradit. Circa hydrocephali curationem inquit Steph. Blancardus lib. de morb. puer. fol. 208. optimum esse existit o, ut caput valde calidum intervetur, sique infantes in cunis decumbant, calidus aliquis lapis, vel arena calida circa caput ponatur, unde obstructions iterum referantur, & lymphæ liberum acquirat transitum; sudorifera quoque, ut cenetale, hoc casu utilia sunt. Idem collectan. med. phys. cent. 3. obs. 47. fol. 248. exemplum habet hydrocephali cujusdam in futura lambdoide sita, magnitudinem æquantis p. nis albi, quales binos argenteorum nummorum nummo nostrates emunt, qui lotu quodam ab eodem descripto, pramissa corporis debita evacuatione, sublati sunt. H. Montuus Pueror. Pr. gnat. cap. 8. Opinci cuidam militis bovini caput intumuisse memorat, ita ut eo tota facies, vultuque conegeretur. Huic autem consulere, ut ligneum in os immitteret frustum, quo facilius reprimere. Atque ita quidem porro avertentibus a capite remediis, sobriaque vivendi lege percuratus est. De puero sexenni sanato vide Ephem. Germ. ann. 1. pag. 137. Quæritur porro, an hydrocephalum, curandi gratia, incidere fas sit? N. Tulpus obs. med. lib. 1. cap. 13. fol. 51. binis hydrocephalis diu diu capitis, de quibus supra, Chirurgum varia inussisse ulcera, cutemque non uno dissecuisse loco, sed utrumque, æque improspere cessisse ait, exstillante humore magis gutt. tum, quam tam effuse, ut levaret cerebrum, & exhauriret fontem, vitalem calorem alioquin certo extincturum. Deinde, etiam si aqua majore copia ex cerebri cavitate simul effluisset (quod tamen isto modo fieri nequit) alia tamen in effusa locum successisset: adde, si malum diu duraverit, crania valde distenta, & aucta esse unde postea collabi nequeunt. Non minus intelleximus eventum habuit infans quidam, de quo Schenk. obs. med. lib. de monstros. cap. contormat. ex Joh. Franc. phys. Camicentitol. mihi in G. Fabric. Hild. Cent. 3. obs. 17. fol. 198. exen plum habet infantis cujusdam, cui cum tertium ætatis mensem vix absolvisset, caput paulatim accrescere cœperit, ita ut infantuli caput antequam ipse octavum ætatis mensem attigisset, magnitudinem capitis cujusvis hominis longe excederet; usque adeo namque aqua limpidissima extendebatur cranium, ut cutis, omnesque subjectæ partes pellucidæ redderentur, & posita ex adversa parte candela, aut ad radios solares collocato capite, aqua facillime conspiceretur: Interim Chirurgum juvenem, ingeniosum tamen satis, in consilium adhibuerant, qui, inciso bregmate dextro, aquæ claræ ad libram unam circiter, prima vice extraxit, mox turundam imposuit, & emplastro quodam vulnus obturavit, sed quia caput aqua valde turgebat, ita ut ea continue, & copiose efflueret, vires infanti adeo fuere debilitatæ, ut intra horas 36. è vita discesserit. Periculosa itaque valde est crania apertio, & aquæ evacuatio, nec sine ratione continetur enim, inquit ille, aqua ipsi cerebri ventriculis, ideoque si quis illam educere tentet meninges simul, & substantiam cerebri incidat, necesse est: cerebri unctiam præsertimque partes ejus internæ, iquore isto, præcipue si diutius ibidem hæreat, deo debilitantur, ut materia nutritiva illuc de-

ducta in laudabile mutari nequeat nutrimentum. Hanc quoque ob rationem Cas. Arant. lib. de tumor. sectionem in hydrocephalis internis non admittit; ut nec P. Agneta lib. 6. c. 3. neque M. Aurel. Severinus Chirurg. effic. part. 2. fol. 135. Nonnulli exteri it. q; incidendi erunt hydrocephali, nec quicquam adhibitis exterioribus, interioribusque remediis, approbante ipsonet Galen. lib. med. introduct. c. 18. dum dicit hydrocephali pericranium duabus, vel tribus, prout scilicet id magnum fuerit, incisionibus aperiendum esse; quæ tres lineæ secundum Agneta lib. 6. c. 3. instituendæ sunt ad figuram literæ H. Idem Paræus affirmat lib. 7. c. 1. ne non Epiph. Ferdin. hist. med. 21. fol. 67. ut & M. Aurel. Sever. G. Placentinus. 10. est. &c. Carol. Piso sect. 2. part. 1. de morb. cap. ext. ab illuvie serosa c. 1. fol. mihi 52. se ejusmodi hydrocephalum senis cujusdam multis tam internis quam externis remediis incassum adhibitis, fonticulo occipiti multo percussisse scribit. Joh. Bapt. de Lamzverde obs. ad armament. Chirur. obs. 33. fol. 133. hydrocephalum quendam in muliere quadragenaria curatum fuisse ait, cui diu & udeli capitis dolore interno detentæ, tandem media hyeme caput extrinsecus tumore œdematoso in tantum excrevit, ut duplo fere majus videretur, & oculi an plius aperiri non possent, auresque ad pollicis crassitiem intumescerent. Per quam humorum metastasin internis, acutusque dolor externus evalit, multoque levior. In curatione autem caput variis vulneribus lanceola factis hic illic perforari se jussisse dicit, è quibus serosus liquor copiose exstillavit, sique caput paucis diebus multum detumuit; adhibitis etiam fuere fomentationes, & cucuphæ è cephalicis calidis, ac discutiendis confectæ, & sic ægram convaluisse affirmat. Hoc autem malum infantibus, inquit, raro, sed adultis rarissime accidit. Cornel. Scalp. obs. raior. cent. 2.

De periculosa hydrocephali apertione.

Aquilex ad Rhodanum fluvium, in ditione Reip. Bernensis, superiori Anno 1608. puellus ex parentibus honestis, corpore quinetiam satis bene constitutus & temperatis natus fuit, nisi quod mater, quæ antea, si recte memini, bis utero gestaverat, etiam natura satis robusta, totum tamen gestationis tempus præter consuetudinem corpore aliquo modo imbecillior fuerat. Nihilominus nato infantulo, nulla deprehensa fuit in ipso deformitas, aut vitium in conformatione, omniaque ut videbantur, secundum naturam sese habebant, præter oculum sinistram, qui aliquo modo depressior altero videbatur. Quum vero tertium mensem ætatis vix absolvisset, caput paulatim accrescere cœpit, ita ut antequam infantulus octavum mensem ætatis attigisset, magnitudinem capitis cujusvis hominis longe excederet, ita enim aqua limpidissima extendebatur cranium, ut cutis omnesque subjectæ partes pellucidæ redderentur, & posita ex adversa parte candela, aut ad radios solares collocato capite, aqua ista facillime conspiceretur in capite. Interim etsi infans continuo valde morosus esset, lactabat nihilominus, & alimenta infantium ore sumebat, quibus tamen corpus minime nutriebatur; sed nutrimentum totum ad caput differebatur. Porro cum genere & virtute vere nobilissimus vir, Dn. Autovius ab Erlach, ejus

eius loci nomine Reip. Bernensis pro tempore præfectus prudentissimus, fautor meus omnimode observandissimus, hujus rei inspectionem ocularem ipsemet habuisset, meque rerum rararum curiosum agnovisset, Mense Martio proxime elapso, ut ad se pronficerer, per literas me monuit, idque ad eum finem, non solum ut infantulum suum hernia laborantem, quemque tunc sub curatione habebam, iuvarem, verum etiam casum huncce infrequentem annotarem, ac consilium imo & auxilium meum adderem. Sed quia Burgum Segusianorum, Galliarum Provinciam, ad nobilem virum Dn. Jacobum Walley icu Sclopeti graviter læsum, tum vocatus fueram, puerum huncce adire mihi non licuit.

Ceterum, interim dum per menses aliquot Burgi & Lugduni hæsi, Chirurghum juvenem, ingeniosum tamen satis, in consilium adhibuerunt. Is inciso bregmate dextro, aquæ claræ ad libram unam circiter pro prima vice extraxit; mox turundam imposuit, & emplastro quodam vulnus obturavit. Sed quia caput turgebat aqua, ita ut & continuo & copiose efflueret, vires adeo debilitatæ fuere, ut intra horas triginta sex à vita discederet, cum menses novem, & dies quatuor vixisset.

Hæc ex relatione ipsius parentis habeo. Quum enim vigesima die mensis Junii, Aquileiam ad prædictum generosum virum vocatus essem, parentem defuncti infantis, Jean Baptiste Pettau nomine, advocari jussit, qui coram generoso viro Dom. Præfecto, omnia quæ acciderant, narravit.

Vides itaque, vir clarissime, quam periculosa sit apertio crani & evacuatio aquæ hydrocephali, idque non immèdico. Continetur enim, ut ego bis in hydrocephalorum dissectionibus observavi, aqua in ipsis cerebri ventriculis, ideoque si quis istam evacuare tentat, meningis simul & substantiam cerebri ut incidat, necesse est. Hæc autem absque mortis discrimine fieri non posse, etiam tyrones norunt. Quid igitur, inquires, erit agendum? Præfecto ut ingenue fatear, morbum hunc plane inenrabilem esse, cum ratio tum etiam experientia mihi suadet. Quoad experientiam, scio clarissimum atque doctissimum Dn. Johan. Slotanum, apud Colonienſes Doctorem Medicum longe celeberrimum, in infantulo suo, cujus ad calcem observat. 10. Cent. 1. fit mentio, non solum omnem curam, diligentiam, industriam, atque scientiam suam adhibuisse, verum etiam aliorum in re medica clarissimorum viro- rum per Germaniam, consilium, auxiliumque implorasse, sed oleum, ut dici solet, & operam perdidit. In altero præterea infantulo, cujus in eadem observatione fit mentio, similiter multa variaque medicamenta à viris doctis frustra adhibita fuere. Quod ad rationes spectat, nullus negare potest, morbum hunc magnum esse, ideoque juxta Hippocratem extremis indigere remediis. Extrema autem remedia sunt sectio, ulsio, evacuationes item fortes, & exquisita vigus ratio. Sed quis quæso hujusmodi remedia in renellis illis intulit? Adhibere ausus esset? Adest præterea tanta cerebri labefactio atque imbecillitas, ut non solum major pars nutrimenti sui proprii in serum convertatur, ve-

rum etiam excrementa serosa ex infimis partibus corporis recipiat: solent enim membra fortiora continuo ad imbecilliora demandare. Hinc accidit, quod reliquum corpus hydrocephalorum minime nutriatur, etiam membra nutritioni inservientia, optime & secundum naturam sese habeant, ut in istis dissectionibus, quarum observ. 10. Cent. 1. fit mentio, observavimus. Imprudenter itaque agunt illi, qui in hydrocephalis multa promittunt, lectio nemque tentant. Tibi quid videatur rescribe, *Guilielm. Fabii. Hildan. Obs. curar. Cent. 3.*

Aristot. iofus Hydrocephalus.

Anno 1593. Lutetiarum Parisiorum puer quindecim aut octodecim circiter mensium ætatis visus est, cui capitis ita extensa erat cutis, ut in gustudinem capiti infantulorum, quorum observatione decima. Centuriæ primæ fit mentio, excederet, Parentes autem hujus infantuli ipsum de oppido in oppidum circumvehabant, ac ut monstrum videndum exponerent, indeque maximum lucrum quantumque recipiebant.

Tandem vero cum concursus hominum esset magnus, & magistratus Parisiensis pro singulari sua prudentia dolum malum & fraudem tubesse suspicaretur, parentes in vincula conjecit. Quæstione adhibita, delictum crudele atque impium fassi sunt, nimium se cutem capitis infantuli sui, circa verticem ad musculos usque incidisse foramine parvo, ac per illud ipsum (intra cutem & musculos immixta fistula) infilasse, ac papulam, & intra menses aliquot (insando singulis diebus aliquoties) cutem capitis infantuli in istam extendisse altitudinem, cunctisque hinc inde per Galliam, quantum faciendi gratia, visendum exhibuisse.

Foramen autem ea industria fecerant, ut extracta fistula, cera aut simili aliqua materia illud facile obturare possint. Nescando ac immani scelere satis explorato ac cognito, parentes ambo morte mulctati fuerunt.

Historiam hanc nobilissimus Dn. Ludovicus Wallier, (qui se puerum huncce Parisiis vidisse affirmat) præfate nobilissimo Viro Domino Philippo Destauaye, Domino de Mondins, mihi anno 1609. 23. Maji communicavit, eamque hic adscribere visum est. *Idem ibidem.*

Hydrocephalus Incipiens Curatus.

Anno 1667. Hæunoveræ curæ meæ submittebatur puer sex annos natus, huic in tantum caput auctum erat, ut mole vel Juvenis 18. annorum caput æquaret; totam vero cum naso faciem occultaret, artus è contra & venter tabescebant. Ego primo omnium suadeo, ut quantum fieri posset, baculo in os immisso illud apertum tenerent: hinc capite raso singulis diebus, bis aut ter, caput oleo chamæmelino in quo st. hæc Arabica, spica, lavendula &c. per aliquot dies infusa erant, ungo, inde aqua vitæ Anhaltina ablavo. Nonnunquam quoque aquam St. Elisabethæ Reginæ Hungariæ applico, linteiſque madefactis frequenter foveo. Utrique Cruri cautærium applico, corpus quater

singulis septimanis cum Syrupo diacnici purgo, in potu semper aliquid de oleo tartari per deliquium facti exhibeo, in cibo sapi^o aniso, cumino, aneto ut utatur su^o deo. Hoc modo, sensim caput detumuit, venter & artus nutritionem suam recipiunt, adeo ut intra duos menses puer integre sanitati fuerit restitutus. *Alardi Herm. Cunnii.*

Anatomica Inspektiones.

Bogislaa Nicolai, &c., Sexto mense grvida abortum rejecit, cetera non inelegantem, sed à temporibus & fronte nucham versus tumore ingenti deformem, qui mitæ Turcicæ similitudinem gerebat: Mox tamen sponte aperta propè sinistram aurem cute, evacuataque inde aqua loturæ carniū simili, concidit & flaccida cute quasi disparuit, nisi quod immisso flatu eandem figuram turbinatam & ovalem nancisceretur. Resecta ista in particulas membrana crassiore, calvaria ostendebatur naturali forma, sicut in puerulis solet: E jugularibus autem venis, intra processum ossis jugalis temporum, ambiens & futuris mendosus, ad os frontis usque sese ostendebat, proximèq; cum pericranio copulatus cernebatur, qui crassitie stilum terreum intortum referebat: Iconem non addo, illi hydrocephalo similem, quam dedit M. A. Severinus de Abscess. cap. 9. ut ovum ovo similis non sit. Th Bartholin. tract. de Cometa, pag. 97. ex communicatione I. Frederic. Hammoni Med. Helsingorensis.

Augusta Vindellicorum puellæ biennii caput in mensibus plus minus septem ita increverat, ut nullum viri unquam viderim quod non mole illi cederet: fuitq; is affectus quem veteres hydrocephalum vocarunt, ab aqua quæ in capite aservatur, sensimque colligitur: Quanquam ea non inter calvariam & exterius ipsam succingentem membranam, aut cutem, (ubi alias aquam repone Medicorum libri docent) huic puellæ fuerit collecta, verum in ipsius cerebri cavitate, adeoque in dextro sinistrique illius ventriculis, quorum cavit. s amplitudoque ita increverat, ut novem fere aquæ libras, aut tres Augustanas vini menturas continuerint: Adhæc, ut cerebrum in capitis vertice, membranz quasi modo erat & quodammodo continuum cum tenui sua membrana corpus, ita quoque calvaria fuit prorsus membrana, & tantaq; duntaxat sede ossa, quanta calvariaz puellæ erat amplitudo, priusquam caput extra modum cresceret: ea fere ratione qua in nuper natis pueris frontis os & verticis ossa constare cernimus, ubi illa alioquin mutuo sunt contermina, & in admodum pueris insigni intervallo amplitudineque videntur membranæ: Cerebellum interim, cerebrique universa basis secundum naturam habebant, uti & nervorum productiones: dein nullis prorsus sedibus quàm in cerebri ventriculis, adeoque atque dixi aduentis, aquam reperi, & puella ad mortem usque sensibus omnibus integris est usæ: Et quoties caput, quum illum paucis ante mortem diebus conspexi, ab adstantibus movebatur; & nonnihil, quantumvis etiam leviter, erigebatur, gravis illico tossis puellæ molesta fuit, cum difficili respiratione & totius faciei miro rubore, sanguinisque suffusione & lacrymarum proventus: Reliquo corpore mediocriter habuit, et si laxis infirmisq; sed non resolutis tamen fuerit articulis, neque præsentem etiam insigni macie,

aut etiam seroso in membris tumore, aut morbo conitiali, aut tremoris alicujus notis. Jecur cum paulo post mortem spectaretur, sub pallidum, se nonnihil naturali alias jecore contractius duriusque occurrit: Liene interim maximo & molli conspicuo, perinde ac si jecoris vices aliquandiu obivisset: Adeo ut cum præsentibus Medicis nihil æquè admiratus fuero ac tantam aquæ vim in cerebri ventriculis, absque majoribus symptomatibus tamdiu collectam fuisse. *Vesulius Fabr. corp. hum. lib. 1. cap. 5.*

Dissecabatur Lugduni Batavorum an. 1666. Infans unius anni, a puero hydrocephalus: Ex hujus capite D. Van Horne extrahebat uncias 36, aq. lin. pidæ subfalsa: quibus extractis adeo apparebant cuncta vacua, ut quis exstimare potuisset cerebrum hic plane dehincere: sed oculi acie eo penitus directæ, apparebat cerebrum nequam deesse, sed amissa saltem figura globosa, imuisse formam convexi fornicis & ab exuperante aqua sequacem ejus medullam adeo tunc distentam, ut instar alicujus crassioris membranz, adhæresceret undique arcuatæ ossium circumferentia, ita tamen ut tam exterior cinereus cortex, quam interior albicans medulla optime discerneretur. Præterea 1. sub cute nulla conspiciebatur pinguedo. 2. In thorace notabilis aquæ quantitas, illi quæ in capite continebatur similis. 3. renes adhuc inæquales 4. glandulæ pituitariæ & pinealis nullum vestigium, in pavimento tamen cerebri notabantur aliqua filamenta nervorum, materia quadam mucilaginosa obtecta, quæ credita sunt esse filamenta seu propagines nervorum sexti paris. Ex observationibus Alardi Hermannii Cunnii, Archiatri Brunsvicensis in Miscell. curio. ann. 1670.

Infantis octimestris hydrocephalo affecti à Cl. Hornio dissecto capitis perimeter erat 1½. ulnæ: Tumor digito prementi cedebat non remanente vestigio: Cranii ossa, quamvis hiabant ab invicem, eo quo pueris solent loco, solito tamen ampliora erant, magis tenuia, ita ut cultro commode secari possent, non multum abstinilia cornibus ex quib. lucernæ fiunt. Dura meninx cranio arcuiline annexa, aqua, nec inter cutem & pericranium & cranium, nec inter hoc & duram meningem, nec, quantum observari poterat, inter meningis sed intra ventriculos cerebri laterales continebatur: ejus quantitas octo pintas Leidenses, sive ibi uncias medicinales, h. e. tredecim libras excedebat aqua erat limpidissima, nullo notabili sapore prædita, nisi quod aliquantulum ore detenta, sanguine quadam linguam feriret: Cerebrum amplum, & pueri cerebro densius duriusq;. Ejus autem omnes penitus oblitterati, contra cerebri laminæ egregie distinguebantur, Cerebellum totum cerebro minus affectum, vasa quædam per superficiem cerebri serpentina sanguine turgida, sinus falcis superior plane sanguine vacuus: Cerebri sinus laterales, quibus aqua continebatur, pro quantitate aquæ distenti, adeo ut totum cerebrum nonnisi sacculus videretur. Glandula pituitaria flaccida & satis magna; glandula pinealis nulla inventa, nescio an errore dissecta ablatave: In plexu choroeide glandulæ nullæ observatæ: radix spinalis medullæ quasi in filamenta hirsuta, quod memini in cerebris ovium aliquando observasse. Omnes ferè corporis glandulæ solito majores, mesenterium totum plurimis

plurimis glandulis rubentibus, lentisque parvas æquantibus confutum. *Alantius Pisenius in miscell. cur. ann. 4. & 5. obs. 197.*

Solutio continui contingit aliquando in cerebro à causis internis &c. Vera autem tanta est aliquando ut capitis junctura solvantur magno spatio: quod vidimus an. 1598. in filio Dom. Merindoli Aquisensis, è cujus capite dissectio effluxit ingens copia serosi humoris, qui in ventriculis & tota cerebri substantia inclusus manebat: Distabant autem futura 4. fere digitis à se invicem. *Jacobus Fontanus pract. lib. 1. cap. 3.*

Vidi quatuor infantes hoc capitis affectu laborantes, è quo numero unum mortuum dissectui: Et lacte testor cerebrum me reperisse pilam palmariam vix mole æquans: neque lanatum vidi cui aquosus humor partibus internis conclusus est magna copia: si vero partes exteriores obfideret, sanationem non respuit: si ergo humor inter cutem musculosam & pericranium, aut inter hoc & cranium, si pauca esset quantitate, resolutibus tentanda ejus discussio. Si non succedat, ad incisionem transitus fiat, vitato musculo temporali, expulso inde humore lotura carinam similiter aliquando sanguis concluditur: si contusionis soboles ut sanguinis grumi humoris permissi aderunt: humore vacuato, linteis dissepitis unilicium vulnus oppleatur, factaq; idonea ligatura, eaque arcta ad cicatricem deducatur. *Pareus oper. lib. 8. cap. 1.*

Decennis puer percussus est cum ense in parte superiore capitis: hic passus est vulnus satis magnum, cum incisione ossis, vel animum, & deperitione substantiæ cerebri, nam hæc exivit quantitate nucis juglandis: curatus convaleuit citra noxam. Hic post tres annos, confluentibus succis ad partem debilem, hydrocephalo correptus emoritur.

Apertum caput sine cerebro est inventum: dura meninx in conspectum apparuit duplicata, habebat tamen in se aquam limpidissimam, boniq; odoris, quæ ab adstantibus gustata, insipida videbatur: at in præsentia putrilaginis tantæ jucundum odorem perferenti monstruosum est, cum ingens corruptio graveolentiam ex se prodaret manifestam. *Zacutus præx. admir. lib. 1.*

Coloniæ multoties in vili puerum robustissimis parentibus natum, cui caput in incredibilem molem increverat, ita ut ipsius rotunditas ulnam & quartam partem ulne Coloniensis, ejusdemq; altitudo, ab una aure ad alteram, ulnam cum quarta parte excederet, non autem sic natus erat: sed cum septimum mensem ætatis vix attigisset, exasperat ejus caput monstruose excreverat nullus præcesserat morbus. reliquum tamen corpus vitiose nutriebatur: verum caput intra menses 30. paulatim in illam magnitudinem accrevit, ac tandem puer in soporem lethargicum incidit, nec ita multo post obiit.

Cranio dissecto invenimus in duobus anterioribus cerebri ventriculis aquam crytallo clariorem, ad libras Colonienses 18. illa autem non solum ventriculos, sed & substantiam cerebri distendebat, ita ut totum cerebrum (cerebellum excepto) in æculum extenderetur: hinc fiebat ut circumvolutiones & gyri cerebri non conspicerentur, sedurgerent omnia, dura & pia matres integre erant atque ita dilatata ut totum cerebrum opirent; cranium similiter dilatatum

erat, sed passim membranosum, potius quam osseum: tertius ventriculus anterioribus confusus non apparebat: in quarto viscidam quandam materiam, parva tamen quantitate invenimus, reliqua in cerebri basi secundum naturam erant, nec reperiebantur meatus per quos serotus ille humor ad caput delatus fuerat, quantumvis accurate dispiceremus omnia: Partes vitales & naturales perquam sanæ erant, unde earum functiones parum ladebantur, ita ut vix febre unquam laboraverit, quinimo edebat, bibebat, excernebat, & dormiebat ut sanus, ipsa tantum deerat nutritio: totum enim corpus (excepto capite) perexiguum & extenuatum remansit: actionibus autem animalibus, quæ ex cerebro prodeunt, puta ingenio, loquela, visu, &c. destitutus fuit: brachia autem & tibias, labia, palpebras, oculos voluntarie vix movebat, ac involuntarie sæpius h. e. contrahebantur & convellebantur continuo, absque tamen dolore. *Fabrit. Hilda in Cens. 1. Obs. 10.*

Humor capitis hydropem induciturus, in lat, & extendit interdum tam late nobile hoc mentis palatium: ut in ætate tenella, nonnunquam excedat magnitudinem virilem. Delitescit æqua, non minus extra, quam intra calvariam & utrobique, modo supra, modiq; infra membranas: obvolventes, vel cerebrum, vel calvariam ipsi circumpositam.

Puer quinquennis, dissectus in valetudinario publico, congesserat in capite tantum liquoris ut vitata naturali figura, tantopere inter se deficerent dissoluta ossa: ut dilatata priorum compages, haud parum discreparet a virili magnitudine. Cui oneri impar cum foret exale corpusculum, cogebatur, vel perpetuo desidere; vel assiduo incumbere cubili: tandem conique, dum finem miseriæ imponeret mors.

Quæ defunctus ostendit, in capite suo detineri, quinque aquæ libras: quibus effusis, fuere omnia adeo vacua, ac inania: ut plerique Medicorum præsentium, sed præpropere, judicaverint hic conspici, caput sine cerebro. At oculi acie, illuc penitus directæ, vidimus satis peripicue, cerebrum non defuisse: sed amissa figura globosa, induisse formam convexi fornix: & ab exuberante aqua, sequacem ipsius medullam adeo fuisse distentam: ut instat alicujus crassioris membranæ, adhæresceret undique, arcuata, dissolutorum ossium circumferentia. Mirabantur autem summo opere, qui sectioni intererant Medici, qui, ex tam deformi cerebro, & medulla adeo extensa, ac utrigua, prodierint (quod tamen sancte adseverabat pueri pater) integra mentis munia. Quum in alijs, vel solius figuræ vitium, inducat, sive morbum attonitum, sive lethargum, vel saturatam vel insanabilem aliquam anxiæm. Alijs vero suggestit, confusa hæc intricata cerebri, congeries, inexpugnabile argumentum, adversus distincta illa loca: quæ nonnulli adsignant, cuilibet animæ facultati. Alii vicissim credebant, hic confirmari dogma Aristotelis: asserentis cerebri non mentis ergo, sed refrigerandi cordis causa constructum. Et prout quisque, vel amore, vel studio fuit, in hanc illamve partem, pro eo, etiam extulit, ejecitve, vel hujus, vel illius sententiam. Sed exercitiores, confugiebant ad ingenium illud: Quantum est

quod nescimus! velut namque in aliis, sic certe credibile est, potissimum nos cecurire, in genuino cerebri regimine: cujus opera multo fortassis sunt diviora: quam quipiam hactenus, suo comprehendit capiti.

Sicuti autem priori puero, totum caput: ita protuberat aliis, dumtaxat media ipsius pars: hærente liquore, vel in dextro, vel sinistro cerebri ventriculo. In quorum alterutro, meminime bis vidisse, ultra duas aquæ libras, inclusas tam stricte uni illi parti; ut altera foret planè illæsa ac integra, inuiderat quidem huic capiti, necera chirurgus; & dissecuerat non uno loco, cutem: sed utrumque, æque improspere; exillante humore, magis guttatum, quam tam effusæ, ut levaret cerebrum; & exhaustiret fontem, vitalem calorem, alias certò extingueretur, Nicol. Tulp. *Observ. Med. lib. 1.*

Anno 1676. Calendarum Januarii decimo septimo dissecui Leonardæ septem mensium abortum. Mater gravida ac paupercula desiderabat comedere carnem vaccinam saltam, quam præ egestate ad libitum habere non potuit; tandem à vicinis vel ab aliis civibus eandem nata est. Cum porro fere satiebatur, quidam cornice fores pulsati, quas ut aperiat, à mensa surgit & per gradus descendens, cecidit, frustum illius carnis adhuc bucca tenens. Postea abortivit. Abortum paulo post præsentè Augustino Reinaldo aliisque Chirurgis aperuimus. Caput permagnum, intra spatium crallæ & tenuis meningis duræ circiter libræ lymphæ cruciatæ continebantur, glandula pinealis solito major & lymphæ turgida. Cerebrum aquosum & molle. In ore habebat vesicam lividam & carni salitæ, coctæque similem: primo intuitu carnosum quid esse putabam, sed incisione facta, lymphæ unæ fere triginta ad laqueare vi quasi adactæ saliebant: hæc vesica totum os implebat ac linguam adeo premebat, ab interiore gingivæ oriri videbatur, cum alias orium multo posterius habuit. Cystis aquosa videbatur mihi esse partem œsophagi posteriorem, & nunc liquet cur ventriculus adeo parvus erat, hujus vesiculæ constituendæ gratia, ventriculus sursum trahi debuit.

Porro quoad hydrocephalon ex lapsu matris ortum, dicimus matrem unâ cum foetu eadem quasi vita frui, eodem modo ac surculus arbori insertus: omne enim quicquid patitur mater gravida, idem patitur embryon; matris terror fuit & embryonis; vascula lymphatica matris, satis rigida ac tenacia erant ne a terrore rumpantur, sed in foetu nondum excluso mollia admodum, ac faciliè fragilia, unde vascula lymphatica, cerebro contenta, ruperunt; liquorque effusus, cranium necdum coalitum, immensum dilatarunt, hinc hydrocephalos seu capitis hydrodrops. Sed unde vesicula ori contenta? Experientia satis docuit, quid non possit matris imaginatio. Fibra nempe œsophagi adeo à liquore exruptis lymphaticorum vasculis dilatata fuerunt, ut vesicula extra os quasi propendere coacta fuit: interim vascula quædam sanguinea, cruorem reducere impotentia, rubedinem & livorem vesiculæ induxerunt, eo modo ac si carnem salitam, voraciter à matre ingestam repræsentaret. *Steph. Blancard. Anatom. præc.*

Hydrocephalus cum vesica carnosæ circa suturam sagittalem.

Anno Christi natæ 1666. die 7. Martii, Noribergæ, uxor J. W. textoris leici, juvenula, & anno præterito nupta, nihilam peperit facie quidem tormolam, sed capite montu olam, in cuius apice, circa suturam sagittalem excrecentia vesicæ, instar aquæ repletæ, multo major puellæ capite prominuit, rotunda, rubicunda, tactu molis & pellucida, maculas aliquot habens nigricantes, putredinis accedentis indices; circa radicem cutis apparuit naturalis & pilosa: Tercio post die noctu vesicæ hæc multo quam ab initio minor, sponte per vesiculas hinc inde exortas & apertas multum humoris serosi & rubicundi instar loturæ carnis exsudavit: Ideo 10. Martii Fridericus Kühne, Chirurgus celebris, accersitus statim hanc vesicam montuosam in parte anteriore versus radicem aperuit, cumque multum humoris serosi instar loturæ carnis effluxisset, totam vesicam in seniputridam, ad cutem usque naturalem abscidit, absque ullo puellæ ejulatu, Digito cavitatis superficiem explorans, ad magnitudinem ovi gallinacæ, cranium nullum, sed loco illius cuticulam expansam reperit. Adhibitis postea in plastris suppurantibus aliisque remediis convenientibus, effecit ut cutis ad radicem vesicæ abscissæ posita sensim abiceretur. Infans inde lac quidem maternum sugens, & putes pro more comedens, valde tamen debilis, die decimâ denique vitæ lux noctem obiit. Isthinc accuratiori & inspectiōne in loco concavo excrecentiæ abscissæ, subtus cranium nullum, sed meninges apparere, nec intus in latere dextro cerebrum, sed loco hujus carnosæ & glandulosa moles, in sinistro vero latere cerebri substantia naturalis inventa fuit. Ex communicatione D. Pauli Freleri.

Scholion Hellwigianum. Practici communiter statuunt Hydrocephalum esse tumorem, seu collectionem humoris serosi, vel in toto capite, vel in parte aliqua capitis, scilicet nunc inter cutem & pericranium, nunc inter pericranium & cranium, nunc inter cranium & cerebri membranas, nunc inter membranas & cerebrum, itemque, Vesalio attestante lib. 1. de corp. human. fabric. cap. 5. & Fabricio Hildano cent. 1. obs. 10. in ipsa interdum cavitate cerebri. Causam autem hujus morbi constituunt duplicem, internam, nempe cerebri calorem debilem, cum cerebrum nimis refrigeratum ac humectatum, alimentum recte elaborare, vel humores ab inferioribus partibus transmissos discutere nequit: vel cum vasa capitis rarefcent, & aquosam illam substantiam, quæ sanguini mista, in locum aliquem effundunt; Externam causam atque evidentem, plagam seu contusionem, quæ præsertim ab Obstetricibus facta in partu, vel alibi rudius contrectato & appresso capite infertur. Inde morbus hic in infantibus, quam in adultis, ob calvarie teneritatem, frequentior, periculosior, ac ut plurimum lethalis. De diagnosi, prognosi, & curatione hujus aff. Quælibet satis scripserunt Daniel Sennertus lib. 1. Præc. part. 1. c. 28. & Ambrosius Paræus lib. 7. Oper.

chirurg. c. 1. Hydrocephalum nostrum in utero ex interna causa ortum suum habuisse, historiarum series demonstrat, ac paucos dies vixisse. Alioquin cognovi Ratisponæ uxorem cuiusdam vigiliæ Præfecti, temperamentum frigidi & humidi, corporis obesi, fere quadragenariam, quæ sæpius singulis per hæc annis, accrescente Luna, calvarie suturis se dilatantibus & aducto capitis tumore, hydrocephalam singularem patitur, sed malo huic mature hydragogis, præsertim gargarismate quodam certo occurrit. Duorum hydrocephalorum etiam meminit Thom. Bartholinus observat. anatomic. cent. 1. observ. 28. Curationem & anatomiam hydrocephali ab Alhardo Hermanno Cummio conscriptam lege in Miscellaneis Anni primi Academiæ Naturæ Curiosorum. obs. 46. & 47. Nicolaus Tulpius habet etiam lib. 1. observat. medicar. c. 25. historiam hydrocephali, ac ejus curationis infelicitas. Jo. Petrus Lotichius lib. 2. consil. & observat. medic. cap. 1. obs. 7. refert, sibi Anno 1633. Minde puellum ejusmodi semestrem consilii causa oblatum fuisse, sed noluisse quicquam tentare, ac sub prognostico illum dimisisse.

Addamentum Schroekii. Omnis morbus monstri quid in se continet, cum præter Naturæ ordinem & intentionem generetur. An vero Hydrocephalus proprie sic dicta inter Monstra referri queat, merito dubitatur. Communiter non monstrorum, sed morborum in catalogo ponitur; & Illustr. Thom. Bartholinus in tract. de Concretis, abortum Helsingorensis hydrocephalum, quem pater monstrum vulgus habuerat, morbis, non monstris, adnumerandum fuisse, decernit. Hydrocephalus utique, dum non nisi hydrops capitis existit, semper morbus est. Quandoque tamen revera monstrorum numerum augere probabile est. Id quod patebit, si monstri definitio ei adplicetur, quod, juxta Licetum aliosque, est Vivens subcœleste, membrorum constitutione enormi, videntibus horrorem cum admiratione incutiens, raro admodum nascens, ex secundo natura instituto genitum, propter aliquod impedimentum in principis sue conformationis. Fœtus enim, cujus caput ab ingenti feri copia in immensam molem extensum est, deformi illo & improporcionado capite, videntibus, non tantum vulgo, sed & Medicis horrorem cum admiratione facile incutere potest, in primis cum rarus admodum sit, paucisque Medentibus videre tales contingat, ac fœtum magnopere deformet. Cæterum ex secundo Naturæ instituto semper generatur, varias ob causas, interdum etiam propter aliquod impedimentum in principis sue conformationis. Hydrocephalum itaque & morbosum, & interdum quoque monstruosum dari, dici posset. Ille non tantum embryonem, sed & adultos invadere valet, collecto nimirum p. n. in capite aquoso humore; præterea intra cranium quandoque consistit, lateque, qualem Petr. Borellus cent. 1. histor. 8. describit; unde nec deformis nec horridus videntibus apparere potest; interdum in fœtu sine errore formatricis in utero, abundantis, & vel ibi sponte stagnantis, vel ob externam aliquam violentiam, ut percussione, casum &c. cum-

primis in partu contrectatam durius & compressam ab incauta vel imperita oblietris manu tenellulam calvariam, collectu feri toboles esse potest. Hic autem, scilicet et monstruosus Hydrocephalus quod detur, ipse Bartholinus laudatus non plane contradicit, dum a non oso illo Helsingorensi actionem sympatheticam excludi haud posse, cum Cl. Friderico Hammerico affirmat; habuisse eum, refert, mulieri hoc fœtu gravidæ in fixa memoria infortunium, quod pridem ejus culpa infantis Chirurgi acciderat, qui in leberem ferventis aquæ demersus paulo post exspiraverat. Sic etiam Guil. Fabric. Hild. cent. 5. obs. 3. puellam ætatis undecimæ aut duodecimæ circiter annorum, ob intemperatam curiositatem, contutuæ circa infantulum hydrocephalicum fuisse versatam, caputque ejus tractante commemorat, tam alte in eorum idea hydrocephali impressa, ut aliquot post annos viro cum nupsisset, toto gestationis tempore monstruosum illud caput continuo fere ante oculos ipsi obviaretur, fœtumque pariter hydrocephalicum enixa fuerit. Imaginationem it. que hujus mali præcipuam fuisse causam apud me, sic Hildanus subjungit, nullum est dubium. Idem confirmare posset historia à Levino Lenino lib. 1. de occult. natur. miracul. cap. 4. descripta, si internam etiam capitis, stupenda magnitudine, à phantasia matris, ex conspectu hydrocephali pictura attonita, deformi constitutionem traderet; ubi quidem fœtum copiosum non defuisse, suspicari licet. Et cur phantasia carnosas, aliasque præternaturales excrecentias in bryonis capiti sapius adnectens, humoris serosi cursui uberiori ad partem illam pariter ansam præbere nequeat? Quidquid sit, præsens casus, ob miram, quæ post mortem conparuit, capitis constitutionem, monstra inter referri utique poterit. *Abhardi Hermanni Cummi.*

Hydrocephalus vitio spinæ bifide.

Anno 1683. d. 12. Febr. natus est infans masculus Parentibus quibusdam magni nominis, non sine in quo gaudio, sed ubi statim post partum tenelli infantis corpus paulo exactius examinatum, duos tumores, unum in occipite, alterum in spina dorsi offenderunt. Ille in medio occipitis juglandem magnitudine æquavit, tactu mollis, colore fusco, multis pilis obsitus, similibus murium pilis. Mater hujus tumoris causa fuit, uti postea dicitur. Alter tumor in spina dorsi, magnitudinem ovi anserini habuit, initium sumens ab ultima thoracis vertebra, tendens usque ad os coccygis, colore sanguineo, tactu mollis, instar fungosæ carnis. Ad latera vero tumoris spinæ dorsi divisa, margines utrinque satis luculenter digitis tangi & distingui potuerunt. Medicos & Chirurgos consulente, quid circa istum tumorem agendum? Chirurgorum intempestiva suppuratio rejecta, Medicorumque opinio admissa, nempe & naturam tumoris & conditionem corporis infantis requirere lenia exsiccantia ex variis herbis & floribus, quæ etiam adhibita, & sæpe quotidie tumori calide imposita.

Secundo à partu die apparuit totalis utrius-

que

que pedis paralysis à coxendice usque ad plantam, non inie suspitione illum morbum ortum vitio spinalis medullæ. Varii spiritus & aquæ spirituosæ membro affecto adhibita, sed incassum, uti etiam exsiccantia pro curando tumore.

Interea caput sensim sensimque in molem præternaturalem extensum, ossa calvaria nec dum interrupta ad pollicis latitudinem & amplius ab invicem distare observata, pericranium pellucidum, & reliquum corpus macie confusum deprehensum. Lacte interea rite tenuis nutritus, excrementa debite reddidit, somno relictis & cætera mediæ & infimæ ventris functiones integre repetitæ, nisi quod tussiret quandoque & difficulter respiraret, quæ tussis eo aucta, ut suo init. Manu uaque ad finem vitæ cum ictore & sonitu clausum duxerit spiritum.

Interea moles capitis adeo aucta, ut truncum corporis præponderaret, cum summa infirmitatis molesta.

Die 18. Man placidissime hic infans absque morbo convulsivis animam efflavit.

Die 29. ejusdem, permissu Parentum, corpus examine disquisitioni anatomicæ subiectum.

Aperto abdomine, nullum fere omentum, nisi tantillum, quod fundo ventriculi adhæsit; intestina vero laudabiliter constituta-repeta. Ventriculos, hepar, lien, renes, optime in pectore pulvones & cor absque omni culpa.

Exemptis his, spina dorsii ab altera parte tumorem supra descriptum, obtulit.

Quo dissecto duo cochlearia aquæ insipidæ & limpidissimæ, crystalli intar effluxere, nihil cruoris, nihil substantiæ fungosæ vel peregrinæ; nihil, quod magis, spinalis medullæ, repperit, filamenta quædam alba & tenuissima li excipias, rudera potius membranæ inveniatis spinalem medullam, quam nervorum.

Vertebræ vero ipsæ, ab ultima thoracis usque ad os coccygis supputando, in utramque partem dilatatæ, admodum deformes, quarum structura depravata spinæ bifidæ, quam Tulpius obs. 38. l. 3. exhibet, tam similis est, quam ovum ovo. Per foramen ultimæ thoracis vertebræ hians in apertum tumorem & explicatas lumborum vertebras, stylo Chirurgus penetravit, usque ad tertiam colli vertebram.

Medulla spinalis in utrumque crus nulla divisa, quare tota in liquorem limpidum reoluta, cruribus nihil virium afferre potuit.

Porro caput in tantam molem cretum insolita promuit.

Pericranio facili negotio in crucem dissecto, ossa erant infantum more nullibi conglutinata, in naturali statu omnia apparebant, nisi quod longius quam solent, & latum pollicem ab invicem seungerentur.

In medio quoque occipitis osse, rotundum foramen, crassum digitum admittens, in conspectum veniebat, omnino præternaturale, pericranio eo in loco, ut principio dictum, in levem tumorem elevato, ac pilis confito.

Membræ dura piæque, ut & cortex cerebri, quoad externam faciem, erant sanissima. Cum vero in cerebri corticem ad ventriculos ejusdem

explorandos culter fixus, viderunt corticem non excedere calami scriptorii crassitudinem, quo separato, loco ventriculorum ostenderunt amplam quasi vesicam, repletam limpidissima & insipida aqua, quantitate uncias quinquaginta excedente, neglecta ea quam spongiæ & linteamina imbibebant.

Hæc effusa collapsi cerebri ventriculi manifestò docuerunt, illam in utrumque ventriculum per corticem, medianibus tubulis, a recentioribus Anatomicis passim descriptis, destillasse, undique sua copia cerebri substantiam, cranium, pericranium extendisse, atque capiti illam deformitatem conciliasse.

Reliquas cerebri partes, glandulam pinealem, nates, vulvam &c. examinare non permisit præceps aquarum affluxus, & hunc incuncta partium illarum confusio. Ex cerebello tamen adhuc integro, & naturaliter constituto pars in spinam dorsii pro medulla deferabatur, quæ solummodo unam & alteram thoracis vertebram affecta in brachia dimittebatur pro motu illis conciliando. In reliquis thoracis vertebris medulla sentim deficiebat, & in prima lumborum erat plane nulla: Altera pars cerebelli in aquarum cerebri per occipitis ossis foramen iniecitum supra descriptum, propulsa, ibi tumorem illum pilis confitum formabat, qui signatura muriformis ante obitum credebatur.

Mater infantis quaesita, an tempore gestationis terrorem ex re aliqua adversa passa sit, unde signaturam illam muriformem foetus acquisivisset? Respondit, se quidem à muribus ordinario non moveri, sed accidisse ante 4. menses, ut Maritus parvulum sacculum herbarum odoriferarum plenum, lusum ergo ipsi ex improviso in occiput jacuerit, quo perterrita sibi imaginatam esse, murem ab alto in occiput cecidisse, & partucitius locum affectum digitis parum fricasse.

Cui vero tumorem spinæ adscribere deberet, nescivit. Nisi quod cecidisset aliquoties graviter, & semel cervi ejusdem vertebras ad usum æconomicum in longum diffindere paulo attentius intuita sit. *D. Job. Lecheitj.*

In Hydrocephalo, qui puerilis & jam pridem natorum, forte etiam nascentium, est morbus, serosa colluvies nunc cerebrum atque membranas, nunc membranas & Cranium, Pericraniumque & cutim inter, sæpius tamen in Cerebri cavitatibus, ut quæ naturæ excipiendo sero sunt destinata, deprehenditur. Unam ego Hydrocephali anatomiam, quod rara sit minusque pro sui pretio descripta, curiosius exponam. Anno vertentis sæculi sexagesimo sexto à B. D. van Horne, Anatomico celeberrimo, Infantem dissecari vidi fere septimestrem, cujus caput jam inde a natiuitate ex Hydrocephalo tumescens tandem cæteri corporis staturam enormi magnitudine infamare & vitam copia inundantis feri obruere cepit. Utrum Septenarius Criticus tantopere nonnullis & ipsi M. A. Severino, in Hydrocephalo Hildani & ipso septimestri, formidatus, an secretior impetus tempus hoc defuniverit, superstitiosi oculi cultoribus interpretandum relinquo. Certe Infanti nostro statim à partu secundum omnes dimensiones caput in majus

maius augeri coepit, invalescente tumore ad mortem usque, adeo ut peripheria capitis æquaret unam tere & dimidiam. Reliqui corpulculi & ipsius vultus proportio longe pro isto capitis ossi tumore minima; iurantes universo trunco vultuique detractam humiditatem in unum caput concessisse, adeo macra omnia atque strigola. Tenta quam maxime capitis cutis, nec Periostium, ullis aquis rigabantur; ubi tum ossium compages alia apparuit, quam esse solet. Hiatus ille rhomboïdes, Fontanel-lam vocant, longe patentior quam oportet, continuato etiam per suturas, sagittalem & coronalem, plus quam digitali divortio, satis ostendebat subiectam Cerebri molem in dies auctiorem coalitum impedivisse, atque hinc in illo suturarum divulsarum spatio cutis ipsa cum dura menynge arctissime concreverat, adeo ut laboriose scerni potuerit. Tenuiora adhuc videbantur Bregmatis ossa & cornea fere, in oris etiam quæque suis cartilaginosa ad notabile intervallum; ubi radiantium fibrarum ossæarum lufum pulchre animadvertere hinc. Nulla interim aqua, neque cranium inter & crassam membranam, neque hanc & tenuem, superficies duntaxat cerebri solito humidior; hic vero ingens cerebri tumor complanata undique superficie, mæandrorum, qui alias distinguere corticem solent, vestigia aboleverat, adeo & venæ, quæ copiose irrigare cerebrum debebant, paucæ apparuere, & in ampliata propulsaque Cerebri convexitate exiles. Itaque, cum intus ali monitrum videretur, acum admovit Anatomicus, qua in Paraceti-eli uti solemus, cerebrumque, cujus passim crassitudo vix digitorum aquabat, pertudit. Fluere statim limpidissimi feri rivus coepit, quem, quod deliquium metuendum non erat, ad Uncias Cxxiii. non numerato, quod in anfractus cerebrique basin se diffuderat, ex-cepit. Subsistebat interim Cerebrum pro ratione & modo fluentis aquæ, jamque totam & magnitudinem subsidendo amiserat, cum interiora ejus cultro rimari curiosa manus coepit; reperit autem ipsam illam Cerebri substantiam tenuem admodum, & intus etiam rarissimis sanguinis permeantis vestigiis per-fusam. In Ventriculorum fundo lenta reliqua erat & pituitosa Lympha, quæ se glutinis in-stat parietibus cerebri medullaris & ventricu-lorum limbis applicaverat. Quid quod radix Cerebri à perpetuo illo diluvio & feri incubi-tu in fibras diffuxisse videbatur, quibus alias constare naturaliter solet. Loco suo quæsitæ Glandula Pinealis non apparuit, sive avulsa seu deliquio soluta. In plexu Chorioide nullæ etiam glandulæ conspicuæ. Cerebellum autem plane integrum & nulla sui parte labefacta-tum, nulla etiam aqua in Ventriculo ejus, adeo &, quod mirandum, gyri anfractusque illi & latiore sanguinis colore perfusi. Et hæc qui-dem erat Hydrocephali historia, cujus cau-sam si altius repeto, non ambigendum, quin sæva Obstetricis manus intempestiva compres-sione ossium Bregmatis plurimum eo contule-rit, & coarctato insimul venarum spatio len-tæ Circulationi & hinc ortæ secretioni Aquosæ occasionem dederit, quæ deinde laxatis fi-brarum medullarium intervallis se in Ventri-

culos, ordinarias humidi lymphatici officinas, stillando effuderit. Vulgato experimento jam olim cognovi, ligatis venis jugularibus inter-nis in vitulo semimortuo cerebrum copiose à restagnante sero inundatum fuisse; adeo & à remissa circulatione lentiusque eunte sanguine idem fieri probabile est. *Joh. Nicol Pechlinus in Observat. Physico medic.*

Hydrocephalicus & hydropicus.

Sigmund Biermann adolescens 17. circiter an-nor. in tenella ætate, ut sciscitantibus nobis confessus est, motibus convulsivis valde obno-xius, à catarrhis toto reliquæ vitæ decursu nun-quam immunis extitit. In Nosotrophium, prop-ter summam imbecillitatem, sex circiter ante obitum septimanis adveetus, præcipue tum de diarrhœa quæ eas movit & appetitu prostrato, cum siti, quæ tantum non ad finem vitæ uique duravit: manus erant tremulæ, pulsus nunquam naturalis, sed tremulus & creber, tractu tem-poris, feri effusionibus magis magisque urgen-tibus, & infimo ventre plenius intumescente, æ-ger Creatori spiritum reddidit.

Præsentibus Medicis aliquot, inter quos tum erat Clariss. D. D. Stokerus Scaphusianus, sub vesperam operi sectionis nos accinximus Ann. 1677. mens. April. Cura præcipue fuit cere-brum, unde cranium ablato illud studiosius lu-travimus. Dura mater densissima fuit, & Pia ipsi parum absimilis, si non densior, sanguine præterea corrupto ac putrido penitus spurca-ta. Cerebrum, quasi mera gelatina obductum esset, per hanc ipsam transparuit, ejus substan-tia tota fiaccida fuit, & aqueis humoribus irri-gua, qui pia meninge ablata copiose in fugam dabantur. Ventriculi anteriores, una cum ter-tio & quarto, ichore aquoso erant referti; in plexu chorioideo glandulam utrinque reperi-mus duriusculam, nisi magnitudine. Aperto abdomine, aliquot mensuræ feri putridi, summæ foetentis eruperunt. Epiploon putruit, pan-creas albicans & durum, hepar parte cava in-flammatum & corruptum fuit. Ex vesicula felleis, cujus facies exterior gelatinosa videbatur, dis-cissa effluxit humor, qualis ex ovo putrido pro-dire consuevit. In Mesenterio lympham in vas-culis stagnantem animadvertimus, in quam ve-ro, uti nec in thoracem media urgente nocte, studiosius inquirere non licuit. *Joh. Jacob. Har-derus in Observation. Anatomico-Præctis.*

Jacobi Calvas Mercatoris Namausensis filius, tertium ætatis annum agens, vegetus & ele-gans, sine causa manifesta soporatus & torpens, ~~acipit~~ post multa valida & confertim sine fru-ctu adhibita remedia, pulsu & respiratione pau-latim deficientibus, è vivis excessit.

Aperto capite cerebrum sero è vasis scatu-riente inundabatur.

Filius Causidici Namausensis primi nomi-nis, in eadem ætate constitutus, acris ingenii, haud multum absimili, verum iniquiore fato functus est; etenim ophtalmia & Lippitudine frequenter laborans, per dies quindecim susti-nuit convulsivos motus, quos exceperere veter-nus & mors.

Apertum caput, fontanellam oppido hian-tem, futuramque sagittalem os coronale in-ter,

toricindentem, & ad nasi usque radices protensam, exhibuit. Dura meninx admodum densa fuit, ejusque vasa, quæ sub osse parietali sinistro sita sunt, fuere turgida sanguine, & inflammatione occupata. Paucissimus adfuit sanguis in vasis cerebri, quod ut & fistula spinalis, vallo feri gurgite restagnabat. Dum viveret misellus, meatulum infra sinistram aulam situm, lymphæ perpetuo madentem, verum post mortem prorsus obliteratum, gessit. Male huic se habuere pancreas & mesenterium, magnaque fuit ipsi vesicula fellea, quam limpidus, sed fusci coloris succus adimplebat. Ann. 1679. *Ex communicatione Clarissimi Viri Domini Rivalier Medici Nemausensis &c.*

Sutoris Nemausensis filiolus ab ipso ortu laboravit Hydrocephalo, ex quo caput in molem immensam, & solita quadruplo majorem, creverat; cranii suturis quatuor ferme transversorum digitorum spacio dehiscens: Hebes & sensibus propemodum orbatus, oculisque mire inversis, ad omnia, præterquam ad exsiccandas nutrices mammas, male se habens, per sesquiannum vixit. Tandem motibus convulsivis fractus fatalem diem clausit. Ann. 1680. *Ex eadem communicatione.*

HYDROMPHALOS.

Vid.

HERNIA.

HYDROPHOBIA.

DE hydrophobia fusè satis capite de Rabie agemus; Hic tantum dissertationem à Præclarissimo Domino Menjotio conscriptam trademus. Sic autem ille.

Hydrophobia, & si propter vacuitatem à febre, ac ferocitatem delirii, formam gerat manæ, ab ea tamen multifariam discriminatur, videlicet venenata qualitate, contagio, pluribusque symptomatis, ac imprimis portentoso illo conjugio huius sitis, cum aquæ & liquidorum omnium abominatione. Mania insuper morbus est chronicus, hydrophobia vero affectus præceps; neque enim tempus illud computari debet quo virus diutissime aliquando in corpore dissimulatur, quo sparsa rabiei semina nondum germinaverint. Denique mania Hippocrati notissima fuit, at hydrophobia in scriptis Hippocraticis neque vola extat, neque vestigium, ac inepte ad ipsam detorquetur locus Prothetici, ubi sic præceptor, *φρενιτις βραχυτότης ψίφου καὶ κατὰ τὸν σπλῆνός, καὶ τὸν σπλῆνός, καὶ τὸν σπλῆνός*, Phrenitici parum & raro bibentes sono quolibet pulsati, tandem tremuli fiunt. Nam ut cætera taceamus discrimina Phrenitidis unda timori non est, sed sunt saltem, sicut latine reddidit Aurelianus, parvibuli; hydrophobi autem aquam non modo non degustant, sed maxime horrescunt.

Legitur quidem aphorismus 10. lib. 8. Rabies remissa, & non agnoscens neque audiens neque intelligens morti est proximus; sed liber iste Hippocratis lucerna dignus non est: at demus

genuinum esse ejus factum, nec in ipsius familiam intrusum, tamen ut per hæc mania, ita hocce loco meram sonat desipientiam.

Scribit ex mente Athenodori Plutarchus, ætate Asclepiadis (qui sub Pompeio Magno apud Romanos in arte Medica florebat) duorum morborum monitis, hydrophobia & elephantiasi, homines noviter esse infestatos, vel saltem probabile est, canes quidem ab omni zovo rabie tactos fuisse, hominesque ab iis semper potuisse conspurcari; sed inde subsequutam hydrophobiam à Veteribus Medicis fuisse inobservatam, forte quod illico, sed plerumque tardissime post acceptum morsum exurgat: ut reverà non solum Hippocrates, verum scriptores quoque omnes Asclepiade superiores, hominis hydrophobiam præterierunt, ac ipsemet Nicander (qui ante Pompeii tempora sub Attalo postremo Pergami Rege clauit) de hydrophobia *αὐτὸν*, licet venena omnia homini lethalia concinnis versibus expresserit. Democrito tamen Hippocratis coætaneo, imo ut quibusdam lubet, ejus præceptor, nec non etiam Polybo Hippocratis discipulo, hanc affectionem cognitam fuisse, autor est Aurelianus; quin ipsi quoque Homero notam conjicit, cum ex Tantali fabula, tum ex Teucris verbis post octo viros occisos, ita loquentis de Hector.

Τούτοι δ' αὖ δῶκεναι βάλαντα κύνες ἀποκτείνοντες.

Præterea, inquit idem Aurelianus, Comicus Menander, inducens senem irascentem, istius passionis imaginem vinolentis adscripsit, dicens non posse bibere eos qui vinum usque ad vexationem potant. Plinius quoque ex Epicharmo brassicam sylvestrem laudat contra morsum canis rabidi: atqui Epicharmus Hippocrate senior fuit utpote Pythagoræ auditor, ejusque meminere Cicero & Horatius. Sed missis controversiis Chronologicis, toti sumus in medicinali hujus ægitudinis historia.

Vocatur *ὕδρφοβία* ac ulcatus *ὕδρφοβία* aliquorum & aquæ formidine: quibusdam placet eo affectu correptum *ὕδρφοβος* quasi aquisugam appellare: item *ὕδρφοβος* aquæ metu & sitis ardore pressum; vulgo hic morbus, Rabies dicitur, rectius tamen cum adjuncto Rabies Canina, ægerque *καὶ τὸν σπλῆνός*, quia rabidi canis morsu, malum istud per hæc invehitur. Alias enim rabies simpliciter pro furore accipitur, eoque sensu intelligendi sunt naturalis Historiæ Scriptores, dum a certis plantis ac serpentum morsu rabiem concitari tradiderunt. Ino rabies generalissime sumpta quemlibet notat excessum, quomodo Hippoc. ab æruginosis humoribus *λύματα ἐκ δέξις σπλάγχων ἐκ θάλασσης* oriri scripsit, hoc est ingentissimos & acerrimos viscerum ac thoracis dolores, vulgo *des douleurs enragées*.

Curiosuli verborum aucupes hydrophobiam à rabie determinant, quod illa amplissimo significato ad quosdam delirantes extendatur, qui falso mota veneni suspitione, liquores omnes renunt, quantumvis siti teneantur.

Non desunt etiam qui hunc affectum in brutis, Rabiem; in hominibus, hydrophobiam nuncupent, sed male, constat enim & homines in rabiem, & bruta in hydrophobiam delabi.

Describitur hydrophobia, Affectio primum cordis

cordis, deinde totius corporis contagiosa, à veneno rarius intus genito, sed frequentius aliunde transmissa procreata, per quam furens æger siti simul & aquæ timore crudeliter distorquetur.

Venenum istud cæterorum toxicorum more, clandestina quadam proprietate cordis substantiam appetit, deinde membratim insinuat, ac præcipue ad cerebrum iter intendit ubi rationem peritundat. Hujus autem vires reconditas esse exinde colligitur, quod in dosi etiam minutissima supremam obtineat potentiam, nulli qualitati elementari concessam: deinde quod singularibus alexoteriis per idemque modum operantibus ut pimpinella, alyso, astacis fluviatilibus empirice curetur. Nam ut docet Galenus, quædam sunt totis substantiis inter se contraria, quædam solis qualitatibus: horum quædam est methodus, illorum vero nulla, sed omnia per experientiam inventa sunt: methodus enim est per indicationem, hæc autem supponit naturam indicantis cognitam; At eorum quæ tota substantia agunt, natura ignota est. Ideoque Pelops Galeni præcepto cum hydrophobia essentiam & curandi rationem per cinerem cancerum fluviatilium ex caulis manifestis se redditorum ambitiosius jactaret, inextricabilibus contradictionibus sese implicuit, eoque nomine vapulat a Galeno. Cum ergo qualitas non agat nisi in qualitatem sibi contrariam, ac contraria dicantur quæ sub eodem genere maxime distant; si rabiei alexipharmaca abditis qualitatibus suam debeant efficaciam, hunc non ortum in eodem qualitatum occultarum ordine locari necesse est. Et mercede quicumque an malum jobolorum, verbi causa, aspidis occiso vulnere tam agile, tamque rapidum venenum diffundentis, virtutem maleficam ex primis qualitatibus demonstrabit, ille etiam ex crassi elementorum, hydrophobici veneni naturam poterit pervestigare, e nimio seminario tam feracem horrendorum symptomatum segetem propagantis.

Hanc veritatem memorabili exemplo iustulcit Fernellius. Venatores, inquit, in lupum fæviorem intruerunt, trucidatum in varia obsoniorum genera appararunt & coxerunt. Omnes quicumque esitarunt non multo post rabie corrupti, alii perierunt, alii, factorum morte prudentes facti sibi propecerunt, in ea carne tam diligenter apparata, quam tu restare putes caloris exuperantis. At vis lethifera ac venenata permansit, quæ vix igne inteseit, quemadmodum nec cantinatum vis deleteria ultione tota perit. Hæc Fernellius. An igitur credibile est intensam putredinem quam crepant elementarii Medici, nullo odore vel sapore alieno, lupinam istam carnem edentibus sese manifestasse?

Porro & si humores venefica corruptela per se fordescentes huncce morbum humanis visceribus quandoque infseminant, ut Atticorum testimonium ac interemeratorum cum antiquorum, tum neotericorum fide constat; rarissime tamen *autemque* ortuque spontaneo in hominibus emergit; sed sæpe sæpius contagione velut inferto furente prosemnatur, & ut ita dicam, inoculatur.

Ac primo quidem hydrophobia missis ad distans qualisaminiibus, fertur colore fuisse, conce-

pta. Nam Dioscorides iuxta aliorum renunciationem prodidit Themilionem dum amico suo hydrophobo officiose ministraret, quadam naturarum concordia, consimili caliditate solute percussum: & Aretæus hominem à cane rabioso, solius inspirationis interventu rabie scripsit, pariterque Aurelianus quosdam notat in hydrophobiam incidisse, adducto ære quem rabientis canis odor reuenerat. Verum per rara sunt, ne dicam dubia, ejusmodi exempla, quia venenum hydrophobicum ut & venereum, fixius est atque terrestrius, quam ut morbida pene dixerim spicula eminens jaculari queat: Proindeque rabiei inquinamenta per fomitem potius transteruntur, unde degullatos ab infectis cili os assumere, eodemque poculo comibere periculosum est. Narrant equos atque boves stramine pallos, cui sues rabie perciti incubuerant, hydrophobiam contraxisse. Satrix quædam, apud Aurelianus, cum clamydem scissam rabiosis moribus, sarcinam sumeret, atque ore stramina componeret, & lingua pannorum futuras lambere auendo, quo transitum acus faceret faciliorem, tertia die in rabiem venisse memoratur. Imo serunt a gladio, quo canis rabidus confossus fuerat, venenatum vulnus post plures annos indicium fuisse.

Iterum que per contactum paratius quam per fomitem serpunt semina ista morbosa, nonne per morsum rabidi animalis, cujus spuma eo est intensior, quo fauorum etiam animalium salivarius humor malignitate non destituitur: popissimum si jejuna fuerint, sitientia vel irata, quibus de caulis humores efferati salivam coinquinant: hæc namque cum sit excrementum partim primæ coctionis quæ in ventriculo, partim tertiæ quæ in cerebro peragitur, in tonsillas, quasi castella paulatim corrivatum, horum quoque membrorum impuritatibus facillime sedatur, ita ut nonnumquam ferarum morius tanquam violentos Celsus infamaverit: sed cordis spiritu salivæ humiditas præsertim polluitur, cujus quippe viscella, naturaliter bullata reddatur atque ampullosa.

Quinetiam sola spumæ aspergine, nullo interveniente vulnere, accenditur rabies, si lingua, labia, alivæ partes molliores ac rariore contingantur, adeo ut hydrophobos deosculari tutum non sit; Imo alleverant nonnulli, si quis rabioso accubet, tetra morbi *pericula* per mediam cuticulam cutemque licet densiorem irrepere in corporis penetralia: quicquid sit, negari non potest aliter quam salivæ vehiculo hocce venenum traduci, nam cum per totum animalis corpus disseminatum sit nonnulli propter commanducatam rabidi animalis carnem, alii hujus duntaxat unguibus oblasi, aut, si quibusdam credendum, cornibus petiti in rabiem devenere; urinam quoque canis rabiosi calcatam præcipue ulcus habentibus nocuam esse testatur Plinius.

Jam vero morbi malitia nunc ocyus nunc ferius sese prodit: raro tamen non ab ammissa contagie rabies enitet, cum propter veneni crassitiem ac hebetudinem, vel, ut loquuntur Chymici, lentam veneni minus volatilis fermentationem; tum propter salivam (consuetum ejus *excrementum*) naturaliter viscosam, nec di-

tribui facilem; sed plerumque circa quadragesimum diem ac interdum post plures menses vel annos incipit nefanda lues luos edere tumultus, vixque ultra septemvium sopita degit in corpore; licet quidam per octodecim, alii per quadraginta annos, ipsam imis sedibus velut in statione oblituisse affirmant.

Tantæ diversitatis ratio multiplex est: nimirum veneni activitas; ut enim primæ qualitates, ita etiam occultæ intenduntur atque remittuntur: Ejusdem major, minorve mensura: Tempestatis regionisque status, in cælo liquidem algido segniter magis malum sese exerit, quam in æstuoso: Profunditas vel sublimitas vulneris: Demorsæ partis conditio, nam nervo, vena, arteriave læsa, virus ad arces vitæ velocius perrepat, quam si particula ignobilior, nec cum principalibus membris sympathiz jure sociata vulneretur: dubium etiam non est interius assumptam, quam exterius adnotam virulentiam celerius multo insurgere. Locorum principum & maxime cordis alacritas vel languor, unde generosius vel ignavius adventanti hosti remittuntur: Cacochymiæ morbo analogæ, ut biliosæ ac melancholicæ uberior parciorve copia: Tandem vitæ ratio quæ si fuerit exquisita, veneni infringet conatus. Imo probabile est omnes istas causas vel earum præcipuas adeo fortunate nonnunquam conlocari, ac potissimum tam propitiam reperi posse corporis *dispositio*, ut fugato vel exarmato, vi caloris nativi, hydrophobicæ, quod transumptum est veneno, ab imminente alioquin rabie homo vindicetur, quomodo Veslez arboris in Ægyptum transferta fructus, ferunt soli sollicitate veneniferam posuisse qualitatem.

----- quæ *Barbara Persis*

*Miserat, ut fama est, patriis armata venenis
Ambrosios præbent succos, ob ista nocendi.*

Sic multi ad pestem imparati aerem pestilentem sorbent innoxie; caularum namque exteriarum virtus hebescit, ubi nihil auxiliatur domesticus apparatus; abelique corporis *passiva* ac passiva potentia ad morbum.

Quæres an silens tamdiu contagio, interim fixa stet atque otiosa, ad instar cineris illius quem in Lacinia Junonis ara subdio sita, immobitem fuisse, perslantibus undique procellis testatur Plinius. Nequaquam certe, sed surtim in humores sese multiplicat, partibusque intimatur, donec velut elatibulis desubito insiliat in naturam, quæ dum viriliter ac strenue sese tueri nititur, ex amborum acerrima *conturbatio* ac colluctatione, perquam atrocia exulcitantur symptomata.

Tametsi ex hæcenus dictis satis pateat *causa* in caliditate atque siccitate muum esse positam; faventibus tamen istis qualitatibus expeditiorem esse hujus morbi generationem inficiari non licet. Vigere namque consuevit retorridis ætatibus ac latrante Canicula,

Dum Procyon furit.

Et stella vesani Leonis.

Sole dies referente siccis.

Item affluente acriore brumæ frigore, quocalor repercutitur ad viscera. Hinc Aristoteles populos in frigoris pariter ac caloris excessibus politos, exempli gratia, sarmatas non minus

quam Nigritas, & moribus & aspectu ceteros esse scribit. Præterea sæviente ambientis *animantes* rabie crebrius quatiuntur, quam peringentes; sed constantes atque statos aeris live æltus live algores.

Causis procatarticis illæ quoque annumerantur quæ sanguinem contaminant, & lucci atrabilarii proventum faciunt; ut esus carniurancidarum aut morticinarum utpote marcidum sanguinem continentium (unde gravis illa *ῥαγισμός* apud ludæos interdictio) præsertim si hæc cerues animalium fuerint *ῥαγισμός* Jovis ignibus ictorum, testaturque Funus rabire canis, potato mentitro sanguine. Cibi itidem acres, salii & aromatici; ideoque matronæ cavere debent, ne Melitæos catulos alimentis nutrant, pipere vel zinzibere conditis. Aquæ palustres & stativæ. Famis sitisque diutina tolerantia. Mœror, ita canes ut herorum sunt amantissimi, sic eorum obitu non infrequenter in rabiem abiguntur. Terror, legimus enim historiam cujuscumque femine per noctem spectris pavescitæ quæ non solum in hydrophobiam, sed quodammodo etiam in aerophobiam lapsa, aerem tantisper commotum, vel auram leviter instilantem, haud absque cruciatu persentebat. Postremo videtur hæc passio etiam frequentare quibusdam temporibus vel locis, verba sunt Aureliani, ut apud Cariam atque Cretam, hæc enim insula aliorum animalium venenolorum raro alteri & procreatrix atque pene libera, sola canum rabie vexatur frequentissime. Idemque de diebus refert Scribonius Largus.

Ad caularum exteriarum classem ea quoque pertinent, quæ venenosam camarinam movendo, paroxysmum concitant: seu manifesta qualitate, ut ira, motus inmoderatus, admissi morius recordatio (narrat namque Aurelianus Themilonem quemdam a rabido cane quondam vulneratum, quoties hujus morbi curationem scriptis mandare aggredere, statim relapsum esse, ac propterea a scribendo destituisse: seu lecretæ virtute: fama enim circumfertur, si quis sub tegmine sorbi recumbat, aut cornu vel virgam sanguineam atrectet, donec in manibus incalecant, latitantis veneni vim ceteram splendescere; referuntque lausicem quemdam rabie peremptum, quod cornu arboris virgis lanam diu excussisset, qua de re experientia consulenda venit, ob tabellas ferme innumeras, quibus hæc naturalis facta est.

Inter animantes canis sponte intimoque vitio promptissime agitur in hydrophobiam, non propter temperaturam melancholicam (plurimum enim absunt a canibus hujus temperamenti indicia, quippe qui dum gestunt & mollibus ac inquietis tortuunculis, palpoque adulatorio blandiuntur, læticiam potius præse ferant) sed præsertim propter inexplicabilem illius animalis aptitudinem: nam subiecti rabiem recepturi legitima *causa* æque later sub arcana naturæ Majestate, quam ipsa rabiei indoles. Neque vero unus canis primario & ex principis internis hydrophobiam experitur, ut cenient Aphrodiseus & Galenus, sed etiam camelus ex Aristotele, item mulus, equus; alius, ursus, simia, mustela, viverra, felis,

gallus gallinæus, & multa alia, ac ea præ cæteris quibus nonnulli interest cum canibus similitudo, ut vulpes, lupi. Neque etiam pisces, & si iuxta Aristotelem pestem ignorent, ab hoc morbo immunes sunt, quandoquidem testis est Columella murænas rabie effecit: quinimo in humanis quoque præcordiis, hocce virus interdum creari possibile est. Sive qui aseres nunquam rabie scripserint, an propter servatum quondam Capitolium jure potiuntur adeo nobili; Sicut apud Melitenenses omne serpentum genus traditur veneni expers ab eo tempore, quo vipera B. Paulo fuit innoxia.

Aristoteles observat ex morfu canis rabidi cuncta rabire & interire animalia, *πᾶν ἀσπύριον* excepto homine. Quibus verbis confirmatur quod nuper dicebamus, nempe Aristotelis lectio nondum innotuisse, hominem fieri posse *λυοσπύριον*. Docuimus tamen interpretes pro *πᾶν ἀσπύριον* præter hominem legunt *πᾶν ἀσπύριον* prius homine, ut sensus sit animalia tali veneno præfati magis vitari atque interimiri, quam hominem: scilicet propter incuriosam illorum providentiam, si uique majorem cum morbo affinitatem. Nam homo a feritate rabiosa plus distat quam cætera animalia; partim quia humidior est, ideoque minime omnium potat; partim etiam quia rationis ope, velano rerum liquidarum timore potentius obnuitur: polito tamen eodem affectionis gradu in homine & in bruto, ille periculosius laborabit; Morbi etenim dispares deteriores sunt, quod causa non orbis majoris *κοίτης*, agrotantisque corporis longiorem à seipso recessum arguant. Denique alii *πᾶν ἀσπύριον* exponunt præter hominem ita ut is sit lenius non modo hominem, sed cætera quavis animalia rabire & interimiri à cane rabiente commota fuerint.

Quoniam vero ut plurimum hydrophobia mortificatum communicatur à cane rabido qui apud nos hospitatur, uno nobis contubernalis est, & cujus morfus, cum fami canis morfu ad sensum exacte convenit, nec ut cæterorum animalium venenatorum perniciose vulnus, dolorem egregium, ardorem, tumorem, aliaque accidentia extemplo infert, sed tum demum suam aperit *κακότητά*, cum partes principes venenati qualitatem ebiberunt; ideo signis opus est primo quæ canem rabiosum commonestrent; deinde quæ vulneris infecti velatam nequitiam retegant, ut tempestive instituat *κοφύλαξ*, & ab ipsismet mali primordiis, quæ porta aditus patuit veneno, eadem illico revocetur. Nam Baldus Iuriconsultus ille clarissimus ex rabientis catelli in labro inferiore morfiuncula, quam perniciem intus conderet, ignorans, quatto post die hydrophobia Tridenti subblatus est.

Intumescentur ergo, canis rabido furore motus, si solito tristior appareat atque macilentior; si pigrius capite ad latus contorto & ad humum depresso, auribusque flaccidis ac prægravantibus incedat: fixe torveque contueatur: fulgores tanquam fulgetra vibret ex oculis: patente ore anhelet ut frigidum aerem pleno haultu foris ducat, vaporemque fuliginosum pleno affatu foras effundat: si linguam croceam rubram, vel nigram emittat: largam spumam &

rubiginosam ore ac naribus proiundat: esse negligens sit: potum tantopere averteretur, ut aqua conspecta, toto corpore contremiscat, surrectisque letis horreat: si voce rauca umbræ oblatret, alias vero a consueto latratu desinat: domum suam ignoret: animalites hominesve etiam domesticos sine discrimine adoriatur: caudam sub alvum reflectat: intenta celestitate currit, rursusque gradum repente sistat: inter cursandum titubet, ac in obitacula quasi cæcus impingat, nec unam certamque teneat semitam, sed nunc dextrorsum, nunc laevorsum per transversa agatur itinera: denique si cæteri canes odora vi eminens præfagientes, ipsum fugitent, capti vero ei subblandiantur, ut captata fugæ opportunitate, clam sese subducant, proetiores licet atque fortiores.

Vulneris jam illati perversitas exploratur, si panis medullam sanguine vel ichore e lauciata particula recenter effluxo subactam, quilibet canis famelicus oblatam respuat, aut nequidem olfaciat. Noces quoque juglandes laxissime contritæ per aliquot horas membro vulnerato imponuntur, vel ex cruore emanante cum farina conciantur ossa, ac gallinæ obiciuntur quas si devoraverit, postero die illa necabitur, rabioso existente cane, secus servabitur incolumis.

Oriente primum & velut gemmante rabie, homo incerta & flammantia huc illucque torquet lumina: faciem gellat rubicundam: frontem vultuolam exhibet atque caperatam, morositudinis & anxietatis indicem: præter rationem ac temere totus in fermento jacet, ut phrasi Plautina utar, hoc est irarum fluctuat æstus: *καταλόφος* est, si dicere liceat omnipauus, ac è trepitu vel levissimo repente trepidat: insueta cogitata ac polydædala pectore voluit & revolvit: solus apud se musitat: adeo est *μυσητός* ut hominum congressu se excerpant, atque etiam amicorum qui antea fuerant in intinis, displiceant consortia: lucifugus est ac latebricola, vespertilionum instar atque hybridum, aliquando autem luce oblectatur, faciesque alto etiam meridie accendi jubet: de aere inclementiore ac Austrino conqueritur, quantumvis temperatus sit, & liquide serenus. Deinceps ager suspiciosus est, ac præter consuetudinem *αἰδώς*, quasi diceret, impotus: ventriculi dolore stimulatur: plumbea gravatur corporis mole: somni immemor noctem querelis ducit, vel saltem somnum capit furialem ac suspensum. In parte olim vulnerata, etsi ulcus jam pridem fuerit obseratum, refricatur dolor, ac everso inde ad cerebrum vapore, vertigo nonnunquam cietur.

Invalescens & velut hians jam morbo, crebra adest pandiculatio & oscitatio: sudor partium superiorum: frequens mutonis arreccio, per quam agrotans involuntarie *profundit*.

Seminis ingentes fluctus, vestemque cruentat.
Quæ pollutiones alias quidem somniantibus, minime vero vigilantibus contingunt: præterea spumat ager perinde ac *σπυγμός* sive arreptitius, expiitque in eos qui præsto sunt: linguam exertat: manibus ora dilacerat: *μαυρόν & γαυρόν* intuetur: omnes promiscue etiam necessarios mordicus impetit, & ad

Etici omnes essent hydrophobi, & e converso. Nec tandem exsiccantes cancrorum cinctes hunc morbum pellerent.

Melius igitur alii istum aquæ horrorem in vitium imaginationis mentisque rejiciunt; inter quos aliqui opinantur *melancholicos* esse melancholicæ speciem, cumque omnium melancholicorum communis sit metus, alios quidem alia, ac rabientes aquam peculiariter extimescere. Verum hydrophobia nullum est melancholicis deliriis arctiore attingit cognatione quam maniam, à qua tamen pluribus modis distingui superius probatum est. Deinde timorum differentia in melancholicis corporis dispositioni raro adversatur, imo hæc aberrantem animum ad hoc illudve privatum figmentum videtur potius tacite inducere: Exempli gratia, strigosi ægri atque *μυρμαρυχοι*, quos Themistiis interlicibus lignis comparavit in arente terreno natis, sefragiles testas factos esse rati, collidi metuunt ab obviantibus: & melancholicus ille apud Ætium putans *εμφυλίου* se capite detersum, hoc est truncatum esse, fortassis ob levitatem id mali patiebatur, à statu sursum lato. Etenim sicut vinum est *πολυμυρρόν* variatque potatorum ebrietas, puta melancholicorum temulentia querula est, sanguineorum jocosa, biliolorum tixosa, venereorum amatoria, ac pituitosorum veteriosa.

*O nata mecum, Consule Mantio;
Seu in querelas, seu in gortis iocosa;
Seu rixam, & insanos amores;
Sens facilem pia testa somnum.*

Ita succus ater desipientium naturis sese accommodat; hydrophobia autem, corporis affecti qualitatibus non modo non respondet, at semper ac e diametro dissentanea est: corpus namque exuctum, liti uritur *πυρρῶν*, interinque eluxata ratio aquam perhorret.

Sunt qui doceant quemadmodum externæ figuræ, ut picta peristromata, desipiendi artem præbent phreniticis, ac ut dici solet, Olenum addunt camino; ita in rabie oribus ægrorum multa spuma madefcentibus, & corde liquecente, phantasma oriri liquidi exstinguentis, ac inde consequi liquorum omnium *βδελύξιν*. Sed primo non omnes rabiosi spumescunt; deinde phrenitici sputatores, essent quoque hydrophobi, quod eventis refragatur.

Summates Medici nec proletarii, rationem reddunt istius symptomatis, quod rabidorum imaginationi species canis, à quo morfi sunt & quem reformidant; assidue obhiciatur, ita ut hunc ante oculos dies noctesque versari existiment; ac tunc præsertim canes aquæ inesse suspicentur, cum in ea faciem suam rutilam, necnon oculos flammeos ac terribiles specularunt. Sic philosophus ille Ætianus jam citatus cum à bibendo detereretur, erecta animi constantia sese colligens, diuque intra se meditans quænam absurdum sit canem in balneo delitescere, ecquid tandem, inquit, commune est cani cum balneo? ac in aquam ammosè immergi, siti explèta, simul cum hæresi malum exiit; unde manavit istud verbum, quid cani & balneo? Cui opinioni illud quoque videtur patrocinari, quod non

tantum aquæ, sed etiam speculi ac rei cuiusvis terzæ levilque utpote objectorum imagines reverberantis intuitu, hydrophobi perantantur.

Verum hæc sententia à vero quoque abluat, eamque revincere facile est. Concedamus enim ex ægrorum confessione ratum firmiterque esse, canes in aqua semper spectari, non tamen liquida omnia faciunt imagines; sed ea modo quæ pellucida sunt: nonne etiam vas aquam complectens linteo contegi, aut alio artificio potandus liquor abscondi, vel ægri vultus obnubi potest? Insuper à rabido homine, aut alio quovis animali præter canem demorfi, aut qui *ἀνὴρ ὀπίσσω*, sicut *λεωσάδην*, omnia potulenta nihilo secius exhorreunt: præterea non solum ad liquoris omnis conspectum, sed & ad tactum; imo ad ejus etiam sonitum, atque adeo ipsam mentionem ægotantes pavitant; sicut rerum ingratarum commemoratio vel aspectus nauseam proritat ac vomitum: prudenterque commonet Aurelianus, ubi sanguis rabiosis detrahitur, non tantum avertenda esse à fluente sanguine ægotantium ora, sed etiam manu sanguinem esse excipiendum, ne hujus silentis murmure inquietentur.

Ultimo speculi non minus quam aquæ contuitu terrentur hydrophobi, quod levigata quævis corpora potissimum imaginationi, delirio ac metu turbata oblata tanquam liquida appareant, ob planam claramque superficiem æquabilitatem: quapropter æquor; specillo pariter ac mari tribuitur; ac vicissim crystallus de aquis puris limpidisque dici solet, ut marmor de corpore polito etiam si solidum non sit, sic poeta.

Et quæ marmorea fert, monstrat sub æquoræ pontas;

Itaque non verè dictum est hydrophobos ad præsentiam speculi torquere, propter horridam faciem suam in eo conspectam, cum non leviori premantur angore, si ad speculi latera ita positi fuerint, ut in illo sese contueri ipsis non liceat;

Quidam forte istarum objectionum tela declinaturi, dicent aquam rabientibus esse formidolosam; non quod vultum suum canino similem in illa deprehendant; verum propter specificam proprietatem veneni hydrophobici; eamque superelementarem, nec à primis qualitatibus emendicam, sed à *δυνάμει* quæ imaginationem certo modo depravet; eique suadeat canes in liquidis omnibus contineri; talis erat ille apud Rhazensem; qui siculofus aquam expetebat, eademque propinatum fastidiose aspernabatur, canum interateis ipsam refertam esse querens. At ponamus quæpiam nunquam viso cane, quinimo nec audito ejus nomine, rabie arripi; an canes quorum spectra in mente non præhauri, aquæ subesse imaginabitur? An infantium hydrophoborum matris ubera expaventium phantasia, simulacrum canis infixum esse; quis probabiliter affirmaverit?

Igitur in tot opinionum dubiosarum anfractibus ductor nobis sit & veluti lychneuchus Galenus, post Hippocratem (quem ut Achillem semper excipi par est) omnium bonorum

nobis autor. Is ita philosophatur: Non corpus, inquit, duntaxat ipsis inarescit, & convellitur interdum, febrique acri intus adurit, sed animus etiam delirat & gravissimum ipsis affert symptoma; quippe aquam timent, & propter multam siccitatem, humidi capiuntur desiderio; à potu vero abtinent, quia mente alienati id quod auxiliari possit, non considerant: fugientes enim aquam paventesque miserrimo mortis genere intereunt. Hæ Galenus.

Quæ autem sit *adversus* illa sitis, hydrophobia comes, dissentiunt. Vulgo asserunt hydrophobos propter membrorum ariditatem sitire appetitu naturali; sed ob mentis errorem non sitire appetitu animali; contra vero prior sitis per *anxiæ* sic nominatur, ac vix aliud est quam ipsamet humidi egestas animalibus communis atque plantis Pluvio lovi supplicantibus, necnon etiam terræ solibus per istæ, quæ amicum imbrem sitire communiter dicitur. Dum igitur rabiosos tali siti premi aiunt, nil docent nisi eorum corpus superrefectum esse atque exuccum. Itaque hydrophobi siti vera & animali discernuntur, hujusque tyrannidem suis questibus luculenter exprimunt. Nec est *adversus* ab una ac eadem appetitiva potentia idem objectum diverso respectu peroptari simul atque reprobari: adest enim effrenata aquæ aviditas, prout hæc sua frigiditate atque humiditate sitim *adversus* non instrenue valet depellere, prout autem liquida est, odio habetur flagrantissimo; cumque liquorum *adversus* urgentior sit atque imperiosior, quam frigoris humorisque cupiditas, non mirum si ægrotantes tantofurore aquam exhibitam detrectent: quod si *adversus* in forma solida concinnari posset, illud sine dubio ab ægris neutiquam repudiaretur. Quid pluribus? Annon melancholici quatenus meticulosi, mori pertimescunt, quatenus autem mesti ac proni in desperationem, sunt *adversus*, monstroloque animo mortem & expavescentes & exoptantes, mortis formidinem, morte pellunt.

Porro duo supersunt gravissima dubia exsolvenda. Primum cur hydrophobi tam enormiter sitiant, quamvis præsens sit causa sitifera; cum ceteri delirantes ob dispersam divagantemque imaginationem ad suctionis *adversus* sensum obitupescant, ideoque perissent sitis expertes: non enim vim causæ sitim moventis ac phantasiam ad sentiendum revocantis criminari fas est, quia licet sitis intensissima sit atque *adversus*, delirationi tamen ad extremum perductæ nullo pacto prævalet. Altera difficultas est, unde invicta illa liquidorum omnium *adversus* succrescat; cum phantasiaci atque maniaci, in quibus non minus quam in hydrophobis *adversus* ac immanium ceptorum summa sunt onera, liquores non execrentur.

Geminum hunc nodum *adversus* expediendum relinquimus: aqua siquidem nobis hæret, ac naturæ *adversus* non tam rationem hic querimus quam voluntatem. Ad quid enim rationes proferre scilicet ac nullius æris quæ doctis auribus, & mordaci locis aceto parum satisfaciant. Ita Galenus *adversus* (ut de Democrito dicebat Hippocrates) & quem Trallianus *adversus* titulo dignatus est, cum *adversus* de mirabili corpo-

ris animalium opificio à nemine audivisset, nullam quoque apud se repertam publice testatum voluit, nec ipsum puduit sapientiores philosophorum hortari, ut solerter scrutentur, & si veritas sese obtulerit, hanc sine invidia palam faciant.

Vos isthoc Delia proles

Quæ solium sedemque Jovis scandisse libido est.

Nos vero his missis quæ captum nostrum tuperant, hydrophobiae diagnosi *adversus* abtolvamus. Observavit Avicenna rabidorum lotia carunculis quibuidam catulorum ethigies exprimentibus esse variegata, & Concinctoraie in pinguedinibus matulæ fundum perentibus, formas canum representari, quæ quatata urina, ita dissolvantur, ut nihil residueat. Testificatur quoque Averrhoes catulorum natantium figuras in urina apparere, hæcque colata, nulla ipsorum vestigia in panno relinqui: sed quiescente lotio, eadem canum imagines iterum conspiciendas dari, cujus eventus rationem sibi incompertam esse non dissimulat. At alii audaciores causam referunt, partim in diuturnam intra corpus hujus veneni moram, partim ac præcipue in *adversus* live actuosam, ubi jam manifesto agere incepit, ejus potestatem quæ hominis constitutionem in caninam quodammodo demutat, ejusque humores ita adulterat, ut animalcula catellis similia in ipso procreentur; pariter ac è sputo canis rabiosi lintheo aut velli adhærescente, parvula animalia catellis haud absimilia pullulare pro certo nunciant; atque etiam per urinas, ventrem ac vomitum velut telas aranearum ab illis excerni qui venenatis phalangiis idæi fuerat.

Transcramus ad præflagitionem. Ampliora morbus rabidi vulnera, angustioribus minus formidibilia sunt, illis enim sanies exudat, his conclusa detinetur. Hydrophobici veneni sensim ac morate *adversus* in corpore cunctatio exitialis est, majusque damnum usura quasi nautica rependit; nam quo diuturnior fuerit causarum morbiticarum generatio, eo affectionum inde prodeuntium inopinata irruptio calamitosior esse solet; silenti namque pede repentes morbi non ante declarantur, quam una cum spiritibus atque humoribus partes etiam solidas, *adversus* labefactaverint, quæ tanto difficilius morbosa spoliatur tinctura, quanto tardius propter compactam substantiæ densitatem & calidum nativum tenaciter ac profunde ipsis inditum, eadem imbuuntur: idem nempe membris spermaticis contingit ac lanis veneno Assyrio fucatis quæ sunt *adversus* quod eousque imbiberint turgentem succum, ut nulla parte pristinum fervent colorem. Quicumque ab internis causis in hanc ærumnam trahitur, pejore est loco quam traduce veneno tinctus; nam principia sunt fortiora principiatis (si cum scholis loqui liceat) virtusque veneni pestifera, transgressu victa redditur, viresque perdit eundo, nisi forte ob inundam suscipientis corporis illuviem novo revirescat robore, ac fundus, ut ita dicam, fatali fecunditate conceditum sibi semen liberaliter nimis refundat. Pauci eorum quibus post transfusam luchi remediis opportune provisum est, hoc affectu perire; uno inchoata rabies ante hydrophobiam ad-

ventum

ventum non omni spe ægrotantes deponit, multosque cum a se, tum ab aliis perianatos scribit Dioscorides. Verum insanabilis ad hosce annos tuit, ait Plinius, rabidi canis morsus, pavorem aquæ, potuique omnis afferens odium: Nuper cujusdam militantis in prætorio mater vidit in quiete ut radicem sylvestris rolar, quam cynorrhodon vocant, blanditam sibi aspectu pridie in fructu, mitteret filio bibendam: In Lusitania res gerebatur Hispaniæ proxima parte: casusque accidit ut milite a mortu canis incipiente aquas expavescere, superveniret epistola orantis ut pareret religioni, servatusque est ex insperato, & postea quisquis auxilium simile tentavit. Attamen ante Plinium Dioscorides, quippe Antonii & Cleopatræ familiaris, quosdam assurgente jam aquæ metu, sumpto elieborismo, simul atque primum morbi insultum lenferunt, morti ereptos esse annotaverat: sicuti prorsus comprehensos nunquam salvos supervisse. Venenum enim, expugnatis jam vitæ prædiis, intra septem dies necessario jugulat.

Tollere nodosum nescis Medicina podagram,

Nec formidatis auxiliatur aquis.

Scribonius Largus qui sub Claudio Imperatore Medicinam Romæ profitebatur, Nemo adhuc, inquit, correptus hoc malo, quantum ego scio, expeditus est: ita ut officiosa inhumanitate, ineluctabilis ægrotantium interitus suffocatione inter culeitras jure prævertatur. Quemdam tamen hydrobolum supervixisse assertor est tandem apud Dioscoridem: Themisonem etiam post multos annos tandem evasisse ex aliorum relatione notat ibidem Dioscorides. Nonnulli *diarum* utentes, eorum qui contagium ab homine sunt mutuari, res proligatas non esse asseveranter proferunt; quos vero aliquod animal momordit, conelamatos esse pronunciant. Non despondent denique de *hydrobolum* salute, si seipsum in speculo agnovit, quod *hydrobolum* haud sit penitus collapsum, quodque interdum natura recolectio residuarum virium agmine conflictum repetat cum morbo; nec infelicitur, utpote animos irasque sumens a casu, præsertim si auxiliatrices idoneorum remedium copiarum ipsam proximè affectentur. *Anton. Menjotius Dissertation. Pathologia. Paris prima.*

HYDROPS

ac Primò

HYDROPS in genere.

Omnis hominum ætas, sexus omnis ab Hydrope nonnunquam infestatur. Fœminæ tamen huic morbo magis sunt obnoxie quam Viri: verum hos ætate præsertim ingravescente adoritur, illas ubi jam parere desierint: Steriles autem quandoque etiam juniores occupat. Foveæ a digitorum impressione in surarum parte inferiore, sub noctem imprimis conspicuæ, mane vero evanescentes, primum hujusce mali indicium dant; quod non perinde certum est Hydropis ingruentis signum in Fœminis atque est in Maribus, cum & prægnantes, & alia quibus Catamenia quavis de causa sistuntur, haud

raro idem patiantur. Neque tamen in Viris ejusmodi tumor Hydropem certo indicat: etenim cum senex quipiam, habitu corporis paulo pleniori præditus, Asthmate jam a multis annis laborans, ab eodem derepente idque Hyemis tempore, fuerit liberatus, mox ingens tumor musculos tibiæ occupabit, Hydropticorum tumores simulans, qui Hyeme etiam magis quam Ætate, tempestate magis pluvia quam serena, pariter invalescet; & tamen sine quovis incommodo insigniori, eundem ad Libitinam ulque comitabitur. Quo non obitante, si generaliter loquamur, lura & tibiæ intumescences, etiam in Viris, pro signo supervenientis Hydropis habenda sunt; maxime si ita affecti spiritum ægrius ducant: qui quidem tumor tam copia quam mole auctor indies redditur, donec pedibus majorem aquarum vim jam respicientibus, cura tentantur, ac postea Abdomen ipsum; quod quidem sero sanguine jugiter decedente repletum, paulatim ad ultimum capacitatis suæ limen distenditur: adeo ut sæpe multos aquæ congios intus contineat, quæ in umbilicum, quæ data porta, ruentes, quandoque exomphalon constituunt.

Tria interim hunc morbum itipant symptomata, Dyspnœa, Urinæ paucitas, & sitis intensa. Spirandi difficultas oritur ab aqua Diaphragma comprimente, unde naturalis ejus motus sufflaminatur. Urina idcirco parce redditur, quia sanguinis serum, quod per ductus urinarios ex lege naturæ excerni debuerat, jam in cavitatem abdominis deponitur, & in cæteras partes excipiendo aptas natus. Sitis est & putredine colluviei feroræ quæ a mora in corpore longiore & calorem & acridinem contrahit, unde æger & febre quadantenus semper laborat, & memorata siti.

Pro rata quæ æger in partibus quas morbus obsidet, mole augetur, in reliquis magis magisque indies emaciatur, & gracilescit: tandemque cum tanta aquarum vis intra abdominis ambitum coerceri ulterius nequeat, impetu in Viscera nobiliora & vitalem artem facta, cataclysmo quasi submersus perit.

Causa hujusce morbi in genere sanguinis debilitas est, unde alimento, quod forinsecus importatur, in substantiam suam convertendo non jam par, idem in extremitates & pendulas corporis partes explodere necesse habet, mox & in abdomen etiam, in quo, quamdiu in exigua quantitate hinc inde dispergitur, natura eundem continendo Vesiculas quasdam fabricat, donec eundem, modum jam superans, uno Peritonæo simul clauditur.

Sanguini autem debilitando operam ut plurimum commodabant vel nimia ejus per Venæsectionem aut alio quovis modo evacuatio, vel morbus aliquis diuturnior, vel perditus ille liquor spirituosos ingurgitandi mos, unde & naturalia corporis fermenta destruantur, & dissipantur spiritus. Hinc est quod bibacissimi quique Helluones sæpius cum hoc morbo, frigidoliceet, quam ceteri conficiuntur. E contra etiam aquæ potatio in iis qui generosis liquoribus assueverant, sanguini eandem noxam infert.

In fœminis vero, quod notandum est, alia quædam & ab his longe diversa hydropis causa reperitur, inclusa nempe in testiculorum alterutro

Sequitur alia medicamenti formula, mihi
haud infrequens; quo illi satis commode uten-
tur, qui à repetito aliorum purgantium usu ab-

sunt, minus censeo ad Artem Medicam spectare quam ad Pictoriam.

Attamen (ne vel divinus hic Author erroris ullatenus intumescat, vel ex hoc loco Enunciati ignorantia sua patrociniis quarant) aperte dicam, me quantum attentissima cogitatione, eaque ad Praxin (quæ Medicinam profluentium Lapis Lydius haberi debet) relata allequi valeam, utcumque exultare, quod necesse omnino sit, ut Medicus structuram humani corporis probe calleat, quo rectius veras idæas & naturæ, & causarum quorundam morborum animo concipere ac formare queat. Neque enim fieri potest, ut qui Resum fabricam ignorat, ductuumque exinde ad Vesicam tendentium, conicere possit unde oriantur Symptomata illa quæ a calculo vel in pelvis, vel in ureteres altius in pæcto pendent. Nec minus Chirurgum oportet eandem humani corporis structuram perdiscere, quo melius inter operandum ab his valis, sive aliis partibus abstinere, quæ si violentur, ægro exitum afferant. Sed nec ossa dislocata ad situm naturalem, recte poterit reducere, nisi eam ossium compagem, Sceleton dictam, curiose inspexerit, atque animo comprehenderit.

Hujusmodi itaque humani corporis notitia omnino necessaria est; quam qui non habet, cum quibusdam morbis Andabatarum, quod ajunt, more pugnabit, aut sine Nautica pyxide tentabit mare. Porro hæc scientia & cito & facile acquiritur, cum id præ cæteris difficilioribus habeat compendii, quod *anatomia* in cadaveribus vel humanis vel animalium quorumlibet perdiscatur, idque nullo fere negotio, etiam ab his qui mente ac judicio minus valent. Verumtamen in Acutis quibushbet, quod genus plus quam duas tertias morborum partes comprehendit, atque porro in Chronicis plerisque, omnino fatendum est *anatomia* inesse, sive specificam proprietatem aliquam, quam nulla unquam contemplatio à speculatione corporis humani deducta, queat indagare, atque in lucem protrahere. Quamobrem ne ita homines in cadaverum dissectione præcipuam locarent operam, tanquam exinde potius quam ex *anatomia* naturalium, ut & Iuvantium & Lædentium diligenti observatione, promoveri possit Ars Medica; id opinor, ut maxime caveri in loco prædicto voluit Divinus ille Senex, non autem generalem fabricam humani corporis notitiam carpere ac fugillare.

Et profecto Virum tantum tamque sapientem nullo modo potuit latere humanam omnem investigationem ultra generalem ejusmodi notitiam pertingere non posse. Licet enim diligenti in secandis cadaveribus inquisitione ac scrutinio, majora organa, quibus natura in peragendis operationibus suis utitur, in conspectum veniant; vasaque itidem nonnulla per quæ succi ab his ad illas corporis partes transmittuntur; quæ tamen hujus motus sit origo & causa primaria, oculi docere nequeunt. Neque Microscopium quodvis vel exquisitissime elaboratum exiles istos meatus per quos Chylus, ex præter intestinis in vasa Chylifera transcoleatur, vel per quos ductus sanguis per Arterias derivatus in venarum oscula reducendus transmittatur, potest detegere. Quinimo sunt & alii

fere innumeri, sique magis adhuc atque enunciat, meatus ac pori in hac miranda hominis compage, quos nemo hominum ne per hominum quidem vidit: cum rudis & indoctus, (sic verbi venia) Cognitio nostra in rerum cortice omnis terminetur, ac ad *anatomia*, sive quod res hoc modo se habeat, fere tantum allurgens, *anatomia*, sive rerum causas nullatenus attingat. Utut se res habeat, haud difficili investigatione scire possumus quantum nobis dirigendis (prout fert restructura) sufficit in eorum Curatione morborum qui hujusmodi peritiam, quod supra dixi, sibi vendicant: nam ex vero quantum nos impellat ad Divinum Artificem luminis animi demissione adorandum, dum stupendum ejus artificium contemplamur in us quorum ratio nobis innotescit, tum illud longe excellentissimum in cæteris ad quæ prius excutimus.

Et sicuti Hippocrates eos reprehendit qui huic in humanis corporibus speculandis curiositati & *æstus* plus dant quam observationibus practicis, ac promde quam ipsius naturæ judicio; ita pari jure prudens ut quispiam in hoc nostro sæculo eos culpæ possit, qui existimant, Artem Medicam nulla re alia magis promoveri posse quam novis Chymicorum inventis. Quamquam enim ingrati proflus animi esset non libenter agnoscere id emolumentum quod Chymiz acceptum debemus, eo quod utilia nonnulla medicamenta, & indicationibus satisfaciendis perquam accommodata (inter quæ vel hoc ipsum Emeticum, de quo jam agimus, haud infimum locum tenet) nobis suppeditaverit; atque eam ob causam si intra Pharmacopœæ limites contineatur, Ars est satis quidem laudabilis: attamen nec illi culpa, aut saltem errore vacant, qui cerebrum sibi eoque excalescunt ac torquent, ut tandem arbitrentur Artem Medicam in hoc præsertim deficere quod Remediis magnis atque efficacibus à sola Chymicorum præparatione atque opera nobis subministrandis, indigeat. Cum ei qui rem recte perpenderit, satis liqueat præcipuum Medicinæ faciendæ defectum non in eo verti quod nesciamus quo pacto huic aut illi Intentioni satisfacere debeamus, sed quod non satis sciamus quænam sit illa Intentio cui satisfaciendum est. Cum vel rudissimus quispiam Pharmacopœæ servulus intra dimidium horæ quadrantem certum me faciet quo medicamento Vomitionem, Purgationem, vel Sudores provocabo, vel refrigerabo æstuantem; at vero in palæstra medica, probe exercitatus sit oportet, qui pari certitudine me docere queat, ubi hoc vel illud remediorum genus in usum revocare debeat per omnem morborum ac Curationum circuitum.

Et quidem certissimus sum nihil æque ad judicium hac in re rite formandum conferre atque observationem exactissimam *anatomia* naturalium & morborum, & pariter eorum quæ in Praxi cernuntur a Iuvantibus & Lædentibus derivata, post ea sive Remedia usurpata, sive etiam Medendi methodum istam, quibus morbos depellere satagimus. Hæc si diligenter inter se collata fuerint mihi ostendent & morbi naturam, & insuper undenam Curativæ Indicationes desumendæ sint longe melius certiusque,

quam si ad speculationem naturæ hujus aut illius principii corporis concreti tanquam ad cynoturam cursum dirigam. Etenim vel exquisitissimæ hujus generis Dissertationes nihil aliud sunt quam Metaphora belle deducta exornataque: quæ etiam ad eorum instar omnium quæ in scena imaginationis, non vero in ipsa rerum natura fundamentum habent, dies delebit ac proteret; cum Naturæ judicia rerum veritati superstructa, non nisi cum ipsa natura intercederint.

Quamvis autem Hypotheses speculationibus Philosophicis mixtæ utiles sint prorsus, cum nemo hominum scientia intuitiva præcitus sit, quæ fretus Principia queat subternere, quibus mox superstruat: attamen si Hypotheses ab ipsis rebus factis fluant, ex eis tantum observationibus natæ, quas Phænomena Practica & Naturalia suggerunt, stabiles manent & inconcussæ: ita ut licet Praxis Medica, si scribendi ordinem respicias, ex Hypothesibus orta videatur; nihilominus ipsæ Hypotheses, si modo solida fuerint ac genuinæ, Praxi quadantenus originem debeant. Exempli gratia, in Affectione Hyterica non ideo Chalybeatis utor, cæterisque sanguinem invigotantibus; nec ideo ab evacuandis me tempero (nisi scilicet in illatis quibusdam circumstantiis) & Remedia potius Pægorica impero, quia primum pro concessio habui hunc morbum a debilitatis tractisque spiritibus Animalibus pendere: verum cum *Philosophorum* Practicorum constans observatio me docuisset Cathartica exhibita nobis symptomata semper auxisse, his vero contraria eadem symptomata consopire solere: ex hac, aliisque *Philosophorum* naturalium observationibus Hypothesin meam desumpsi, ita ut Philosophus empirico hic famulareretur. Quod si ab Hypothesi cepissem, ea plane ratione insanire: atque ille qui tabulata tignaue domus superiora prius velit erigere quam fundamentum jecerit: quod quidem illis tantum convenit qui in Aere Castella, quod ajunt, solent extruere: his enim certo quodam privilegio ab alterutra extremitate licet ordiri.

Sed ut ad rem redeam. Quicumque demum sint meatus illi per quos aqua ex abdominis cavitate in intestina deducitur, certissimum Voinitionem à dicto Emetico excitatam eandem potenter evacuare, idque non solum deorsum per sedem, sed & sursum per ipsum Ventriculum atque os in vomendi actu. Etenim post duas vel tres evomendi vices, aquæ non tam medicamenti vi secretoria elici videntur, quam ruptis quasi repagulis & claustris resecatis, pleno alveo effundi: quod satis constat ex eandem eruptione atque impetu sæpe facto inter ipsa vomendi spatia, sive intervalla.

Menfe Augusto postremum elapso, Paupercula quædam annos habens 55. aut circiter, opem meam imploravit. Febre intermittente diu laboraverat, dein carcere fuerat inclusa fere per triennium, à frigore multum passa erat, venter denique ad tantam molem increverat ut ei parem nunquam hactenus viderim: Ego 3jss. Infusionis Croci Metallorum singulis diebus ad triduum exhibui, mox alternis diebus pro virium agræ ratione, usque dum doses omnino sex hauserat. Primis aliquot vomendi vici-

bus urina penitus supprimebatur, quam pollea quandoque per intervalla reddebat, sed raro admodum: quo frequentius Emeticum repetebat eo majorem aquæ copiam solebat rejicere, idque sub linem tam per os quam per sedem. Verum post tertiam dosin tumor sublidere atque imminui cœpit, & post quatuordecim dies illo, quo crassitiem corporis inflati jussu meo fuerat dimenta, iudice ac teste, jam tritus pedibus gracilior comparuit, atque aliquot aquæ Congios, suppuratione ex iis quæ mihi ipsa narravit facta, *in eadem* egresserat. Ita ut quæ prius in lecto non nisi erecta dormiebat, ne decumbens ab aquarum pondere suffocaretur, jam capite in pulvinar reclinato secunda jaceret, & de latere in latus pro arbitrio se movere potuerit. Cum vero dicta Emetica operandi violentia Vapores, quos dicunt, ad eum gradum excitarent, ut uldem diutius morbum lacerare tutum non foret, & tamen tam ex residua adhuc ventris mole quam aquarum rotatione quam toties percipiebat quories se in alterutrum latus convertibat, & velligis insuper rei cuiuslibet prementis in tibiis etiam nunc numentibus, plus satis liqueret multum aquæ adhuc in corpore restare ob causam jam dictam, reliquam Curationem Purgantibus proprie dictis cogebat absolvere. Posthac igitur vel Potionem Purgantem supra dictam, vel aliud quoddam Hydragogum præscripti; idque vel rarius vel sæpius prout vires ejus terrent, aut Vapores minus infestarent. Hæc enim & Catharsis per inferiora Affectus Hytericos aliquatenus mirabatur, licet non ita graves & violentos ac solebant Emetica. Atque in hac methodo persistebam donec prorsus convalescere videretur. Quæ dum fierent, hæc mihi præcipue observanda occurrebant: Primo quod his diebus quibus purgatione feriabatur, nonnunquam magnam aquarum vim per sedem exercebat, atque etiam sub linem per meatus urinarios, vel ad Congit mensuram; quamlibet non ultra 1b. j. vel 1b. ij. Potus pro singulis diebus concedere; ita ut porta omnes, atque canales undique patere viderentur. Secundo notatu dignum erat quod curatione fere absoluta si quando Vapores à Catharticis commoti tumularentur, venter, maxime versus superiora, intumescere, tanquam novo aquarum proventu denno repletus foret: quod tamen fieri non posse sciebam, cum ita parce bibisset; ac proinde tumorem illum à natibus, quos peperit *ab ista* à Catharticis provocata, tantum oriri: quod meum judicium eventus comprobavit. Licet enim vel Congium aquæ eo die quo purgabatur ejecisset, mox tamen cœpit intumescere: nec remittebat tumor ille, ad guttur usque surgens, & dyspnœa affligens, donec corpus à Purgantium molestia liberatum, statum naturalem ac quietem reciperet: quo facto & tumor & cætera symptomata de repente evanescebant, donec à succedente Catharsi de novo irritarentur. Denique & hoc animadvertendum erat, quod cum præfata Femina annum agens quinquagesimum quintum, fluxum Menstruum jam ab annis aliquot non fuerat passa, attamen Menses magno quasi lumine erumpebant denno; qui sanguinis fluxus debilitati & evacuationibus prægressis additus ingens Affectuum Hytericorum

ricorum agmen adducbat, dolorem scilicet in dorso & circa regionem Splenis vehementem, Cephalalgiam, & Tussim ferinam. Ad hæc tunc etiam post tam insignem Aquarum quantitatem per os, sedem, & urinas eliminatam omnino credibile esset non multum in corpore restare, attamen venter haud minus protuberabat quam nulla adhuc evacuatione tentata solebat. Quamobrem ad hos motus sedandos, qui etiam ad septimanam à postrema purgatione negotium faciebant, coactus sum ad quatuor noctes continuas Diacodii, ℥iſſ. propinare; quæ etiam Dolis erat repetenda nisi somnus intra horas tres inlequeretur. Quo tandem pacata sunt omnia, & tumor disparuit.

Hoc interim observari velim, quod si leviculo aliquo ventris tumore tentetur æger, non ita prompte educuntur aquæ per Intusionem Croci Metallorum, ac in Ascite grandiore ubi ingens aquarum copia aggregata fuerit: etenim vel ipsa aquarum copia mores dum emetici operatione agitur ac constititur, ad eandem evacuationem nire confert; atque eam ob causam nisi venter in tumorem insignem attollatur, omnino convenit ut tota res evacuantibus per interiora commutetur.

Est & aliud Medicamentum satis vulgare ac simplex quod Hydropem pari ratione qua illud de quo modo egimus, expugnat. Nempe manipuli ii. Corticis interioris Samlicii a ligno derasi in ℥b ij. aquæ & lactis simul mistorum, ad ℥b j. incoquantur: Decocti huius altera medietas mane, altera sero quotidie assumatur donec æger convalescat. Hoc remedium & vomitionem ciet & catharsin, pariter ac Crocus Metallorum, ac proinde eodem modo morbum depehit, non vi aliqua specifica: quocirca si neutram harum operationum præstet, vel si mediocriter ac parce, nihilum prodest quidem: ubi vero alterutram producit efficaciter, maxime vero si utramque, nire ad hunc u. orbem debellandum confert.

At sane, quod serio animadvertendum est, haud raro accidit ut aqua non solum in crura ac tibias deturbetur, sed etiam in ipsam abdominis cavitatem depluat, quæ tamen Medicamentis Catharticis sive ~~in~~ sive ~~in~~ ducentibus, omnino elicienda non est. Verbi gratia, quoties huiusmodi tumor vel Phthirin diuturnam excipit, vel à viscerum alicuius labe ac putredine nascitur, vel à sanguinis tono, si ita loqui fas est, non tantum relaxato sed & deperito, ac spiritibus penitus exhaustis, vel à longa Fistularum in partibus carnis mora quæ copiosam saniem egresserunt, vel à nimia debilitate atque evacuatione tam humorum quam spirituum quas advocavit sive salivatio, sive sudatio, sive etiam Purgatio iusto intentior, & Diatætenis quæ in Luis Venereæ Curatione, etiam magis quam res postulabat, fuerant adhibita. In his atque aliis morbis ad hunc modum factis, æger non tantum non juvabitur à Catharsi, sed imminuto adhuc amplius sanguinis tono angebitur malum. Quamobrem rebus ita stantibus, omnis Curationis Cardo in sanguine ac visceribus omni ope corroborandis firmandisque omnino vertetur. Inter cætera huius ordinis, præter Remedia Confortativa infra enumeranda, ego certissimo Experimen-

to edoctus sum, aëris mutationem, & in aëre libero Exercitium, quale quale demum æger ferre potuerit, huic Indicationi apprime respondit; spiritibus scilicet quasi nova vita hoc pacto afflatis, atque Organis Excretoris ad penum sibi debitum denuo revocatis.

Est etiam ubi absque omni istiusmodi Intentioni isti quæ aquas evacuandas respicit, nec Catharticis, nec Emeticis satisfaciendum est: quoties enim vel æger constitutione est infirmiore, vel femina Vaporibus atque ataxiis spirituum animalium admodum obnoxia, heri non potest ut Catharticis & multo minus ut Emeticis res geratur. Hic itaque aquarum evacuatio Diureticis committenda est. E quorum familia, licet quamplurima in Medicorum scriptis magni sint nominis, efficacissima tamen (ne dicam sola) mihi videntur ea quæ à Salsis Lixivialibus sunt: neque quicquam refert è quorum vegetabilium genere cineres petamur. Quandoquidem vero vix aliud vegetabile Genista sit parabilius, & in hoc morbo bene audiat, ego ut plurimum cinerum ejus ℥b j. in Vini Rheiani ℥b iv. frigide infundi jubeo, addendo foliorum Absinthii vulgaris pugillum unum alterumve. Liquoris per filtrationem colati ℥ iv. mane, hora quinta pomeridiana, & sero, ægro jugiter hauriendas impero, usque dum tumor evanuerit. Quo solo Remedio Hydropes pro deploratis habitos curatos vidi, in iis quorum Crasis debiliior Purgantibus ferendis non fuit.

Aquis autem, (ut ad secundam Intentionem properemus) quæ sunt proxima causa morbi, jam penitus evacuatis, non nisi ad dimidiam Curationis partem ut plurimum perventum est, nisi sanguinis etiam debilitati, quæ prima morbi origo fuit, occurratur longo & assiduo Medicamentorum Calefacientium & Corroborantium usu, unde novus aquarum proventus præcaveri possit. Quamvis enim in junioribus hæc contingat, ut aquis rite expurgatis sine alio quovis præsidio convalescant, cum eorum calor naturalis jam ab aquarum onere ac pressura liberatus, dictorum Remediorum vices supplere valeat; tamen in ætate provecioribus, & in iis qui alias minus sano corporis habitu sunt præditi, omnino necesse est, ut statim ab aquarum educatione jam absoluta, ad eorum simplicium ulum quæ sanguinem excalefaciunt invigorenturque, protinus confugiant. Inter quæ ea quæ ego jam superius in Podagra curanda laudavi, sive ipsa Remedia spectent, sive Res non-naturales, præter illa quæ jam dicentur, locum habere possint: (nisi quod Vinum à quo in Podagra prorsus est abstinendum, non tantum non noceat Hydropicis, sed & prodest admodum, si pro potu ordinario usurpetur.) Cum hi duo morbi id habeant commune, quod eadem Remedia Corroborantia utriusque causæ originali adversentur. Fatendum est interim, quod cum tam ex manifestis Phœnomenis, quam à juvantibus & lædentibus edocti simus tum hos, tum alios plures morbos Chronicos sanguinis debilitati atque indigestioni ortum debere, nec ulterius progredi valeamus, adhuc in extinto morborum cortice hæremus; nec in essentialibus eorundem differentias, & specificas Humorum depravationes ab istiusmodi Indigestioni-

Digestionibus prognatas, (quæ quidem ~~in~~ communis omnium stirps est) quimus penetrare. Uti neque varias illas specificationes quæ in morbis Acutis ab una eademque causa, sanguinis nempe inflammatione, fluunt, ultateque gallemus. Quocirca tam in his quam in Chronicis morbis, cum Specificis careamus, Curationem non ad Essentialem morborum naturam, sed ad causam eorundem magis generalem dirigere cogimur; Curandi methodum subinde variantes, vel pro indicio naturæ spontaneo, quo in morborum eliminatione illa utitur; vel experientiz, cui potissimum medicationis generi quilibet morbus facillime concedat dictantis, filum secuti.

Porro ad hanc, de qua jam agimus, Intentionem implendam, nempe ut sanguis corroboretur, sive aquarum evacuatio per hoc diureticum, sive per Cathartica vel etiam Vomitionem procuretur ut supra omnino necesse est ut æger, quantum res ferat, Vinum potare teneatur dum in curando est, (modo ne prius incipiat ~~diuresis~~ quam meatus quidantenus reclusi fuerint, & porta aquis data) vel saltem loco vini Cerevisiam aliquam e generosioribus: cum liquores tenues ac refrigerantes quilibet, utut ægri palato arrideant qui fere semper in hoc morbo siticulosus est, cum magis Phlegmaticum reddant, & aquis obstericentur: raro itaque, aut nunquam hi sunt concedendi. Atque e diverso liquores generosi, modo non sint spiritus per distillationem elicti, usque adeo sanitatem promoveant, ut vel soli aliquando amissam revocaverint: utique in morbi initio nondum multa aqua distento abdomine; præsertim si Herbis calefacientibus & confortantibus fuerint imprægnati. In Pauperibus, verbi gratia, quorum res angusta domi meliora remedia non perhibebat, Cerevisia fortis, in qua quantitas sufficiens Radic. Raphan. Rustic. fol. Absinth. vulgatis, Cochlear. hortens. Salviz. Centauri min. summitatum genitæ inclusa fuerit, meo consilio usurpata pro potu ordinario, splendet ut illarum omnium. Pro ditioribus Vinum Canarium eisdem herbis amarum potest similiter imprægnari, cujus haustulus bis terve de die inter Medicamenta supra memorata deglutendus est. Vel si id palato minus allubescat Vinum Absinthites vice ejus substituat de quo æger sumere possit cochlearia ix post Electuarii Digestivi (in Tractatu de Podagra descripto.) 5 ii. horis medicinalibus, id est, mane, quarta pomeridiana, & nocte, devorandas. Flestrarium hoc huic intentioni faciendo satis, Corroborantia quilibet Medicamenta longo post se intervallo linquit alia. Hic vero magni momenti est quod æger parce admodum bibat liquores istos qui minus generosi sunt; quandoquidem omnes, qualescunque demum sint, aquis nonnihil incrementi dant; adeo ut vel omnimoda abstinencia à potu nonnullos sanaverit, atque ob eam causam si liquoribus istis quandoque indulgendum sit, æger tamen admodum parce eos bibat. Verumtamen cum sitis magna huic affectui comitem adungere soleat, quam insuper a potu tenuiori abstinentia adaugeat, è re erit ut æger sæpiuscule

aqua frigida Spiritu Vitrioli acidulata os coluat, aut Tamarindos in ore subinde teneat, aut Limonem manducet; neutrum vero deglutens, præ eorum frigiditate quæ morbo minus convenit.

Verum inter Corroborantia, Chalybs in Hydropis incipientis curatione haud minimum locum sibi vendicat, sanguinem videlicet invigorando, calefaciendoque. Quam ob causam & Allium hic adeo conducit; cum eo solo, missis evacuantibus, Hydropem ex aliorum præscripto, non meo, depulsum noverim.

Est enim observandum, cum Hydropem qui vel pedes tantum inflavit, vel etiam ventrem, sed modice, non statim Curationem per Emetica & Cathartica sibi depolcere; sed hujusmodi liquoribus præfatis calefacientibus & corroborantibus haud raro cedere. At vero præ cæteris serio animadvertendum est, quod quoties hunc morbum solis corroborantibus, vel etiam Lixivialibus aggredimur, æger nullo modo expurgandus est sive mitiori, sive fortiori quocunque Pharmaco, tantisper dum sanguinis corroboratori navatur opera: evertet enim Catharticum quicquid Corroborans substruxerit; quod vel invitum agnoscat oportet qui observaverit tumorem, qui ab usu Corroborantium jam imminui coeperat, mox à purgatione augeri. Etenim tamen cum Intentioni isti aquas educendi satisfacere cupiamus, haud abs re fuerit etiam Corroborantia subinde exhibere? tamen cum tota res in isto solo cardine vertitur ut sanguis corroboretur, omnino necesse est ut à Catharticis abstinamus.

Notandum est autem ægrum non semper sanari, quamvis utrique Indicationi satisfecerimus, id est, tum Aquæ in abdomine congestæ omnino educta fuerint, tum etiam Calefacientia & Corroborantia postea ad præcavendum novum aquarum proventum fuerint exhibita. Etenim non raro contingit ut Ascites ad multos annos perdurans, diuturna aquarum in viscera incubatione eorum substantiam perverterit, & quasi semicoxerit; & tam ipsa viscera quam partes vicinas corruperit penitus, glandulas præternaturales & Vesiculas sanæ turgidas generans, & omnia intra abdominis cavitatem contenta in putrilaginem quasi quandam convertens: prout in eorum cadaveribus, qui ab Ascite inveterato sunt interempti, Sectio patet. Morbus ad hunc gradum jam proventus, Artis subsidia, quantum video, contemnit. Nihilominus Medici est, cum certò scire nequeat quantum adhuc noxæ visceribus illatum fuerit, curationem omni ope moliri Remediis tam Evacuantibus quam Corroborantibus: & neque animo ipse cadere, neque ægro ut cadat autor esse debet. Cui rei ob hanc potissimum causam danda est opera, quoniam in permultis Affectibus, morbi fomite jam penitus exantlato, Natura, quæ noctes atque dies nostris rebus invigilat consulitque, sponte sua mirum in modum machinatur quo ægrum à pernicioso morbi reliquiis muniat ac tueatur. Quamobrem omnis Ascites quantumlibet inveteratus, &

Si nunc primum occurrerit.

Topica sive Remedia Extrema, quantum ego obſervare potui, nihil egregium in hoc morbo præſtiterit unquam. Ea nunus ſaltem nocuere quæ in forma ſive Cataplaſmatis, quantumlibet ſunctam cladem viſceribus intulerit, haud alio modo tractari poteſt, quam ſive Linimenti abdomini ad tumorem diſcutiendum fuerint applicata: Neque tamen video quo pacto aqua poſſint diſcuti. Verum & alia ſunt a nonnullis Remediorum loco præſcripta, quæ ita non proſunt, ut etiam obſint plurimums. Huiusmodi ſunt Unguenta & Cathartica fortioribus confecta, atque abdomini adhibita. Veficatoria item cruribus & tibiis ſuperimpolita, ubi cutis in magnam molem fuerit protenſa, ad aquas ſcilicet hoc pacto educendas. Utrumque hoc genus Medicationis eſt periculoſum; cum à primo viſ ſimplicium Cathartica ita penitus nunquam naſculis & membranis impingatur, ut excitetur Hypercathariſis, nulla Remediorum ope unquam ſiſtenda. Veficatoria autem locis prædictis ab Empiricis applicari ſolita, calorem naturalem jam ferme aquis obſutum, deficientibus item ſpiritibus Animalibus, omnino extinguunt, & Gangrenam (plus ſatis in hoc caſu familiarem) ſæpenumero invitant. Etenim vulnus vel leviſſimum in Hydropicorum carnibus, maxime in membro pendente, ſanatu diſſiciliſſimum eſt; quoniam ipſa carnis ſubſtantia his in partibus uſque adeo irrigua eſt & ſcatens latice, ut data quacunque porta, continuo curſu prorumpat humor, à quo vulneris conglutinationis impeditur. Neque aut ſelicioſi cum eventu, aut minore diſcrimine adminiſtrantur, me iudice, ſive Paracenteſis, ſive Acu-puncturæ à nonnullis celebratæ quam Veficatoria.

At vero cum in externis huiusmodi Remediis jam ſim, omnino aliquid mihi dicendum eſt de Muſco quodam Indico Moxam vocant, nuper magni nominis in Podagræ Curatione, ſi nempe pars affecta eadem accenſa leviter uſtuletur. Quamlibet hoc Remedii genus Indis Orientalibus acceptum referatur, atque Europæis univerſim omnibus pro incognito habeatur, attamen conſtabit antiquioris id eſſe ævi etiam apud nos, illi qui Hippocr. eſſata jam ante annos bis mille literis tradita voluerit conſulere. In præſtantiffimo illo de Affectionibus libro, Sectione quinta, pag. mihi 524. de Iſchiade agens, hæc habet, &c. j. e. Quod ſi in uno aliquo loco ſtrictè conſtiterit dolor, neque Medicamenti expellatur, quocunque loco dolor forte extiterit eum lino crudo inurito. Et paulo poſt de Podagræ verba faciens: &c. j. e. Huic eadem quæ Articulari morbo conferunt, & longus quidem hic morbus eſt & gravis, minime tamen lethalis, Quod ſi in digitis dolor remaneat, vena in digito paulo ſupra articulum inurito; uſtio autem per linum crudum fiat. Opinor neminem poſſe exiſtimare eam eſſe differentiam Specificam inter flammam vel à lino, vel ab hoc muſco Indico excitatam, ut hæc illa in ſanatione Podagræ plus valeat, non magis quam reputaverit ignem à Roboris Segmentis accenſum majus aliquid præſtare poſſe illo qui

Fraxini ligno alitur. Hæc partis affectæ uſtulatione aliquid pollicetur (quod & efficere quandoque poſſit) ad doloris committigationem, evocata ſcilicet ſomitis morbilica parte ſubtiliſſima ac maxime ſpirituosa, in articulum jam depoſita. Attamen beneficium ab hoc remedio partum, cum Indigellionem, quæ Podagræ cauſa eſt Antecedens, nullo modo attingat, fugax eſſe oportet ac breve. Neque opus eſt ut dicam illud in Podagræ tantum incipientibus locum habere; quando enim ſive à morbi diuturnitate, ſive ab importuno atque indebito Medicamentorum uſu, Podagra, ut ſubinde fit, ad partes internas fuerit converſa, ac proinde ægritudine, torminibus ventris: atque longo huiusmodi ſymptomatum agmine, potius quam dolore ægrum multaverit, nemo ſanus igne utendum eſſe arbitrabitur. Atque hæc ſunt quæ hic de iſto Remedii genere viſum eſt diſſerere, quæ, niſi memoria mihi exciderant, loco magis ſuo fuerant dicenda.

Ut tandem finiam; quamvis hic Morbus ubi jam in verum Aſcitem evaſerit, pro deplorato ſemper habitus fuerit; attamen conſtabit quod ſi dicto modo tractetur, & quæ certo poſſit ſubjugari (modo viſcera à corruptione ſint libera) ac alii permulti qui non ita ſuncti vulgo aſſumentur.

At ſi quis forte arguerit hæc Remedia, utpote ſimpliciſſima & plane inartificialia, ego potiori jure ejus nequitiam arguam & in probos mores; ſi dum ringatur alios huiusmodi ſimplicibus Medicamentis juvari, ſe, uxorem, vel liberos ſuos, ſiquando ægrotaverint, vel viſiſſimis ad ſanitatem reduci exoptet. Adde quod ſicum ſibi facit Morio, Equitans in aundine longa: etenim Artis Medicæ pompa & dignitas non tam in Formularum concinnitate & elegantia, quam in Morborum Curatione cernitur.

Atque hæc ſunt quæ de his duobus dicenda habui; & niſi fallor alios haud attingam unquam. Verum illa quod ſpectat quæ hætenus in publicum dedi, ſi quis ea ſemel tantum perlegere dignetur, eſt quod doleam me huic eam perendi temporis anſam præbuiſſe; Quod ſi eadem ſæpius relegere voluerit, & alta mente reponere, nullus dubito quin eum fructum ex iis capiet, qui voto & magnis laboribus quos ego in iſtis obſervationibus faciendis componendiſque locavi, aliquatenus respondeat. Quæ quidem quam bona hinc fuerint tradita, haud aliter ſciat, quam ſi in earum Praxi fuerit verſatus, ac perinde in obſervando diligens ac curioſus Explorator atque Ego prius fueram. At ſi in paucis iis quæ ſcripſi, Naturam me quaſi manu ducentem, omnino ſecutus fuerim, nullius unquam Hominis quantumſcunque is demum ſit opinionibus me addicens, pro certo habeo ſapientes, quotquot ſunt, veniam mihi ſaltem duros; quos & latere non poteſt duo eſſe hominum genera qui proſectum omnem in Arte Medica ex æquo prohibent ſuſſaminare: que: Primum ii ſunt, qui nullum proſus ſymbolum ad eam, quam proſitentur Artem excolendam ipſi conferentes, illis ſuccenſent qui vel minimum conſerre videantur; defectus interrim

terim suos atque socordiam, Reverentia, quam Antiquioribus, a quibus ne latum unguem discedere audent, debere contendunt, specie pre-textentes. Quorum vero reliquas artes omnes, quæ homines minus tangunt juvantque, magna incrementa sumptisse fateamur, etiam sine ulla præcorum hominum injuria, solam autem Medicam undique perfectam existimemus? An non certioris istius quæ nunc obtinet navigandi Artis Repertores, et Pyxis Nauticæ, qui ita feliciter cessit, tentare potuerint, nisi primos ac rudiores illos qui non nisi ad stellarum conspectum, & litorum anfractus cursum suum dirigebant, prius contemplerint? Aut accuratior illa, ac magis perfecta, sive construendarum navium; sive earundem in pugna regendarum, Ars, quæ hodie præ cæteris pollent Europæ magis Occidentales incolæ, istos sagittat Naupegos, qui classes eas fabricabant quæ olim Actii depræliabantur? Aut Augustum & Marcum Antonium tanti belli Ducis & classum Rectores ignominia afficit? Ad hæc innumera fere sunt exempla rerum à nuperis hominibus inventarum, quæ antiquioris sæculi inventis longe antecellunt; quarum omnium Repertores haud potiori jure præcorum memoriæ vim inferre censendi sunt quam is filius patris famam lædere putandus est, qui rem familiarem à Parente acceptam industria ac solertia sua auctiorem ac cumulatiorem reddiderit. Est & aliud hominum genus, qui præ animi levitate, ingenii ac sapientiæ haud vulgaris titulum affectantes, Speculationes ad morborum Curationem ne hilum facientes molè ingerunt; Medicis non tam vim præmonstrantes, quam Ignibus suis fatuis devios in errorem agentes. His Natura cum ingenii modum largita est, quo de illa doctè nugari queant; ac prudentiam non dedit, qua intelligant se eam haud aliter scire posse, nisi experientia Indice, atque ejus peplum revelante; quando abjectior humanæ naturæ conditio ad scientiam intuitivam nullatenus assurgens, intra angustos cognitionis, quam à quinque sensibus haurire potest limites coarctetur. Unde nihilominus vir prudens, quantum fert fors humana, quis potest evadere; Philosophus vero saltem pro augustiori hujus Nominis Majestate, nemo mortalium evadet unquam. Medici autem Philosophia omnis in expiscandis Morborum Historiis, iisque Remediis adhibendis, quæ experientia Indice ac Magistra, eodem valent depellere, tota stat; observata tamen, ut alibi dixi Medendi Methodo, quam recta ratio (non Speculationum commentis, sed tilto & naturali cogitandi modo innixa) ei dictaverit. *Thom. Sydenham Tractatu de Hydropse.*

Hydrops confirmatus difficiliter curatur; incipiens facile.

Nobiliora tamen medicamenta, utendique ratio expedita, prætereaque subjectorum dispositio æquabiliter affecta, quandoque etiam hydropem confirmatissimum tollere visa sunt.

In singulis hydropis speciebus semper ab aperientibus & mundificantibus per alvum, nunquam à Diureticis cura incipienda: Secus nimium colluvies ventris tota ad renes con-

fertim quasi coacta summam difficultatem parit.

Purgantia universalia sunt.

1. Mercurius vitæ seu flores butyri Antimoniosi sua ab initio à gr. iiii, in Extracto Elaterii vel Colocynthidis, postea, si virescant, auctiori vique ad 10. & 12. per aliquot dies continuatus; præsertim in hydropse confirmato, stante tamen adhuc virtute ventriculi maxime prodest. In hoc casu nullos generat vomitus, sed tantum per interiora purgat.

Nota: In senioribus hæc purgatio Mercurius vitæ producit procidentiam ani, quæ postea raro seu potius difficiliter sanatur & curatur.

2. Flores Antimonii albi in oleo destillato, (ut dictum est ad Crolium) & postea illo oleo in aqua frigida repereussio, & in pilulas pulvere dulcificato bene redacto, etiam per interiora aquam intercutem expellit, citius exhibeatur.

3. Extractum compositum Crolii ad ipsecificum Hydropis.

Extractum Elaterii cum sp. V. factum. Dosis à gr. j. ad iiii, ad summum.

Post purgantia universalia deveniendum est ad leniter aperientia & viscera interiora corroborantia, ita tamen, ut semper diuretica admisceantur, partim in cibo & potu, partim etiam cum medicamentis ipsis leniter aperientibus.

Principes hic partes tenet pulvis Cachecticus supra descriptus ad 3i. vel ʒiv. in decocto centaurei minoris maceratus per noctem, & postea colatura in 2. æquales partes distributa, & duabus auroris sese subsequentibus invicem exhibita. Idem quod Essentia Alhandal efficit.

In Ascite laudatur etiam Extractum Esulæ. It. diatrichi, cum Rhabbarbo. It. gummi guttæ, sine omni mora enim materia in abdomine contenta evacuanda, præmissis tamen aperientibus & simul humorem crudum hepatis impactum præparantibus. *Joh. Harshmann in praxi Chymica.*

Curationes.

Curatur omnis hydrops probè roborando hepar & ejusdem obstructions cunctas tollendo. Roboratur autem illud summopere ac refertur obstructum. Essentia n. et n. sal. Mercurius enim in centro suo continet aquam, quæ cætera elementa continet; cujus ope omni ex parte hepar reficitur, ita ut si hæc habeatur aqua, alio medicamento non opus sit. Si autem hæc aqua careas (admodum enim difficilis factu est) poteris uti antimonio nostro purgativo superius preparato, quo ter aut quater repetitis dosibus hujus antimonii corpus purgandum est. Essentia etiam flammæ ad eundem usus valet, ut & oleum martis; aperit enim omnes obstructions, ac hydropicorum aquas in aq. communi laudati fontis assumptum oppido desiccant: oleum vitrioli quoque hepatis roborando summopere prodest, item aurum sudorificum valet multum, quoniam & metebrius laxativus hydropicorum aquas educit, easque siccant & he-

par reficit. Sal. absynth. sal. corallor. & tinctura eo. u. n. necnon omnes essentia metallica curando hepati lazio valdoperè pro'unt, ac prominde omnes hydropis species his essentia metallis curari queunt, quod basin & fundamentum mercuriale habeant, cujus solius virtute & energia hepar & lien omnino restauratur: Est enim essentia mercurialis vitæ nostræ fundamentum. *Joh. Petr. Faier Patbol. Animat.*

Ne in defectu aquæ hujus gloriolæ seu coelificatæ Philosopho. u. n. penitus deferatur hydropicus, alia remedia interim excogitanda & accersenda veniunt, ut Medicus ab hoc scandalo liberum se præstare, hoc est, hydropem sanare seu microcosmi hanc inundationem aut diluvium, quod si jam factum sit, plerumque interitum n. portendit, tollere vel avertere possit. Quod igitur antimonium illud præparatum seu purgativum Autoris nostri concernit, de illo toties jam dicta hic etiam nos saturare, & ad approbandum ejus in hoc casu usum excitare poterunt, modo hydropicus ad ultimam infirmitatis miseriam adhuc non sit redactus. Quid quod à Paracelso hic mercurius vitæ (quem Autor rectè antimonium præparatum vocat, quia revera antimonii partus est) omnia viscera & organa non secus clarificare asserat, atque libium purificare aurum alioquin solet: sanguinis enim purpurea aura, cujus serenitas ac puritas omnia lætificat membra, non immerito microcosmi vocabitur aurum atque solaris immunitas, quæ virtute hujus antimonialis prolis consimiliter puritatis restitutæ beneficium vel exaltationem potius accipit: ubi apprinè notandum, quod emeticum hoc hydropicis datum rarissimè vomitum concitet, quod sal copiosum in colluvie serosa, quæ hydropici tument, stabulans vim emeticam corrigit, sicuti alioquin notum est ratione salium ex emeticis & purg. n. b. optima diaphoretica fieri. Oleum seu sentiam tam jovis quàm martis à suis viribus in profligandis vehementioribus aut contumacibus valde morbis jam sæpius decantavimus, ubi pariter adscribimus præsidia ex regno martis desumpta palmam in refectione obstructionum & corroboracione viscerum sanguificationi destinatorum cum applausu probatæ experientia sibi vindicare, & inter epatica atque aperitiva insignia regalem locum obtinere. Ad hanc ipsam quoque classem pertinet oleum vitrioli præsertim martis vel veneris, quod eò potentiùs aperienti virtutes exhibet, quò magis ad dulcedinis suavitatem est perductum: Modus vero non unus id præstandi videatur apud Schroderum in Pharmacop. qui ex Autoribus probatoribus quasdam dulcificandi hoc oleum rationes sollicita cura congeffit. Aurum sudorificum à virtutis maximæ, quam in corroborando calido nativo ac convocando l. udato sanguine obtinet, majestate aliquoties jam nobis commendatum fuit. Magis tamen in hoc casu specificum erit bezoardicum seu sudorificum martiale, cujus præparatio ex Crollio & Agricola aliisque jam nota est. Nobile & secretum selectissimumque Diaphoreticum denominavit quoque Helmontius his verbis, quæ adscriptu digna esse censemus: Observavi, nimirum inquit si antimonium in liquorem (hoc est, ut ego quidem interpretor, si butyrum exinde fiat) ac postmodum in pulverem vertatur (ita

ut mercurius vitæ l. a. impetretur) qui tantum per sudorem purget (quod beneficio nitri effici poterit, eo plane modo, quo antimonium diaphoreticum vel etiam bezoardicum minerale simplex communiter parari solet) tunc habebitur remedium, quod omnem hydropem modeste (suaviter puta atque insensibiliter) citra ulla recidivæ metum tollit: Et hoc medicamentum mercurius vitæ bezoardicus seu magisterium antimonii diaphoreticum nostro quidem judicio rectè nominabitur.

Sal ablinth. afflictum hepar peculiariter solari, serique diluvium quasi insensibiliter ad minimum tamen vi sua diuretica per vias urinas copiosè educere, ab Autoribus experientia id juxtim comprobante asseritur; qua occasione etiam audivisse nos meminimus, quod non nemo solo sale absinth. frequentius exhibitum (ubi notandum, quod eodem sale absinthuaco loco salis communis tam juscula atque edulia reliqua, quàm potulenta, quibus pascendus ac sustentandus est hydropicus, condiri atque imprægnari debeant) hydropem exoptato successu se sanasse affirmaverit: Ad classem illam salia fraxini, stipitum fabarum, cichor. tilia, ebali, sambuci, præsertim vero florum genist. ac hyperic. recenseri omnino merentur, quorum usus etiam cum & in vino quotidianus tunc esto. Tenuioris fortunæ hydropicis cineres dictarum specierum præscribuntur, quibus ut illos sacculis seu nodulis comprehendant, atque sic cerevisiæ immittant, postmodumque infusum hoc assiduo bibant (potus enim sic innocens non solum, sed & saluberrimus redditur, ut tuto tantum potare quantum allubescat, possint) imponendum est. Socer meus desideratissimus D. D. Paulus Macasius, magnæ famæ quondam chymia ter, cineres summitatum juniperi prædicto modo in cerevisiâ pro egenis, ditiore vero in vino per infusionem usurpandos cum felicissimè efficaciz fructu commendavit. Cum prænominatis salibus vegetabilibus (unum vel alterum eligere aut jungere quædam penes Medicum vel ægrum erit) fieri poterit l. a. spiritus salis coagulatus & ad crystallinum splendorem perductus: sic enim nancisci illa salia cum gratiore sapore faciliorem penetrabilitatem queunt. Tartarus vitriolatus ut & sal armoniacum ter sublimatum vel flores ejusdem præsertim martiales consimilem operando felicitatem exhibebunt. Majoris autem virtutis excellentiam præstabit sal corallor. sicuti etiam tinctura seu vera essentia eorum, utpote quæ ambo non tantum, nobiliorum diureticorum atque eorum, quæ obstructos ductus effectissimè aperiunt, familiam affatim adornant verum etiam præterea balsamum nativum generosè exaltant, tantæque in mundificando depurandoque universo corporis sanguine coralliorum vires sunt, ut omnibus morbis ex corrupto sanguine prognatis mirificè ac præsentissimè medeantur. Ex perquam autem depravato sanguine oriri hydropem, hætenus sufficienti notitia percepimus. Tandem cur omnes essentia ex metallis hermetico artificio extractæ intentionem Medicorum in cura hydropis tantopere fortunent, ipse Autor dilucidè atque ex fundamento mercurialis astri tradidit, veluti uberius hujus negotii declarationem notæ seu scholia nostra ubertim subministrare poterunt.

run. Restat saltem, ut quæ in hydropis curatione nos facienda existimemus, & quæ in praxi nostra deprehenderimus comprobata, paucissimis nunc quoque adspargamus potius quam apponamus. Nostræ & supra aliquoties nominati clysteres ante omnia specificè hic conveniunt. Pilulæ catholicæ nostræ martiales semel in septimana usurpatæ salubritatem suam abunde hic nobis probarunt; sæpius hydropes etiam fictos solo spiritu cephalico nostro quotidie aliquoties dato felici auspicio curavimus, sed etiam tamen ut pro una dosi 80. vel plures quoque guttas præbuerimus, & id quidem in die 3. vel quater, prout postularet necessitas: horis matutinis in jussulo carnis, in quo semper aliquid de radice irid. nostræ vel etiam Florentin. (quæ inter specifica antihydrica alioquin reputantur, sicut etiam radix bryon. quam Helmontius asserit optimum esse hydragogum modo vius solutivum ab ea auferatur) decoctum erat, laudatu in hunc spiritum porreximus. Solo hoc spiritum ante hos 10. annos vir quidam desperato hydrope decumbens intra menstruum spatium sub sollicitudine nostra ex voto convalescit. Potio nostra panchrestia, item tinctura nostra contra calculum, quæ excellenti urinam strenuè provocandi facultate pollet. Tinctura anti-omni & maris utraq; nostra, spirit. nostrar philosophicus seu astralis, essentia pini vel summitatu juniperi, & alia non immerito hic quoque adhibentur, utpote quæ raro desiderium nostrum, modo natura paucisper saltem cooperari valuit, deseruerunt. *Ex Christia n. Langii animadversio. in Joh. Petri Fabri Patholog. Animat.*

Mirari hic subit plerique Medicorum, qui sibi persuadent hydropem quemcumque felicissime tolli repetitis evacuationibus per alvum, cum interea agrotos alant carnibus confusis, assis, & elixis, cum oleribus, victuque, quam par sit, pleniori. Laudandus sane Medicus ille Chrylippi discipulus, ejus idem Celsus meminit, qui notæ intemperantiæ quendam medicriter hoc morbo implicitum negavit posse sanari, quem alter Medicus se sanatum pollicebatur; quia hic ad morbum ægri respexit, ille vero ad animum; & quidem æger nec famis, nec sitis patiens, malaginata sua devorando, bibendoque propriam urinam, in exitum se præcipitavit.

Admonet quoque Fridericus Hofmannus in Hydrope, Ascite, Tympanite, & Cachexia purgantia validiora non esse usurpanda, ex Galeno, quia corpus admodum debilitant, ut postea in jor aquarum, & flatuum proventus fiat; ideoque roborantia, & aperientia frequentius, quam purgantia erunt præscribenda, hydrops etiam leucophlegmatia per concoctionem, & non per evacuationem subigitur. Nec Cachecticis purgantia ullo modo danda, cum ab his lædi Hepar, & bilis fermentum debilitari certissimum sit. Hæc, & alia Hofmannus,

Ceteri vero omnes purgantia præsertim hydragoga dicta in omni Hydrope absque ullo metu præscribunt imo & Willsius in Anasarca cathartica validiora commendat, tum Emetica, gummi guttæ, esulam, Herculei Bovij, pilulas lunares, tum alvum moventia, sambucum, & ebulum, soldanellam, Gratiolam, succum arcos, elaterium: quorum medicamento-

rum formulas, & præparationes latius ipse prosequitur: quamquam cautius in Ascite illis utitur, & in Tympanite à catharticis vehementibus nunc abstinere. Iisdem purgantibus insitit Sylvius Leboe; at solum per epicrotam evacuantium docet Barbette.

De Diureticis etiam summopere ambigendum in Ascite, & Tympanite. Nani quæ via ex Abdominis cavo in Renes materia ibidem collecta deponi possit, non facile designare licet, iuvabunt autem illa plurimum in Anasarca, sicut etiam diaphoretica sudorifica, cum ex glandulis per universam cutem disperis, porisque partium, facile lymphæ superabundans, & valis sanguiferis, & lymphaticis resorberi possit, atque ad Renes deferri, vel per poros cutis in sudorem ablegari. Verum cum aliquando observatum sit Asciticis ab urina prodigio convalescentibus, non abs re quoque fore arbitrandum, si illis interdum quis utatur, præcipue cum sponte sua aqua per eos ductus ferri videbitur. Ea autem tutiora semper erunt, quæ ex animalibus, & vegetabilibus petuntur, modo sale volatili abundant. A iure, quoque consiliat Willsius perutile diureticum præitari; atque inter plura, quæ ex illo parantur, sal illud in crystalli formam redactum, quod ex iteratis ablutionibus cerussæ antim. emergit, optimum est. In Anasarca vero diuretica c. lixivis elicta cæteris præferri idem Vuillsius, ac potissimum ex cineribus abstineli, vel genistæ cum vino albo ad 3. vi. vel viij. bis vel ter in die. Servanda tamen imprimis cautela Wedelij, ut scilicet lixivja minime exhibeantur ventriculo debilibus, & emaciatis, urinam rubicundam, & quasi lixivja similem reddentibus: his enim deest fermentum dissolvendis cibis addictum, & viscera cuncta laxantur; quare aromatica, & sale volatili prædicta illis conferent.

Cæterum Narcotica, Caustica, Vesicantia, Scarificationes, unguum ad vivum usque resectiones, sanguinis missiones, & similia periculosissima sunt. Ab his enim facile imminet Gangæna: quantvis non desuerint, qui ab istorum usu hydropis curatam fateantur, At si ex Hipp. 6. Aph. 8. aqua inter cutem laborantibus ulcera in corpore facta difficulter sanantur: sine metu mali gravioris hæc in hydropticis nunquam erunt.

Superest consideranda Paracentesis, quam vetustissimam quisque ex eo potissimum conjiciet, quod illius meminerit Hipp. Monet autem cito faciendam esse, sed non assatim aquam esse educendam: cito quidem, antequam vires delabantur, & viscera languida sint reddita, & morbi diuturnitate, & a longiori mora lymphæ in abdomine; At non assatim, quippe omnis subita evacuatio non tam facile toleratur. Cum ferro candenti haudquaquam instituentiam consiliat Panarolus; inde enim Peritonæum inflammari reformidat. Neque caustico; ne ex latiori foramine, magno impetu aqua resiliat, atque subinde grande ulcus excutetur non sine noxa viscerum subjectorum. Tutissima methodus à Sylvio Leboe, Paulo Barbette, & Io. Vanhorne præscribitur per acum argenteam cavam, quatuor circiter transversis ultra umbilicum digitis, totidemque ad ejusdem latera in

abdomen immisam. Vult tamen Formius apud Riverium haudquaquam secandos Hydropicos, nisi ex omphalos appareat, natura viam ad exclusionem aquarum affectante; alioqui omnes, qui aperiuntur, non prominente umbilico, interire ait. Suadet propterea in hunc finem admovendas esse umbilico cucurbitulas cum fermentis emollientibus, & ubi intumuerit, sectionem faciendam.

Quamvis autem Hippocrates dixerit Aquam non subito, neque totam simul educendam esse, non tamen adeo parce illi exitum concedi debere adnotat Ficus, ut irruens in adaperitum foramen aqua gangræne causa fiat, ut aliquando accidisse memorat. Quamobrem ejus ipse votum est, ut mox ab apertione, ad aquæ diminutionem, vel tertiam saltem partem evacuationis promoveatur, donec venter notabiliter detumuerit, reiecto interea patiente oleo cariophyllorum, aqua cinnamomi, vel simili; deinceps vero minori, & minori quantitate; at postremam diu relinquendam ob contractam ex diuturno tempore in abdomine consuetudinem.

Loco Paracentesis, scroti sectionem nonnulli subrogant, ubi, etiamsi gangræna superveniat, minus periculosa esse solet, ut etiam observat Hildanus.

Clysteribus quoque & Emplastris ad Ascitem vim plurimam tribuit Villisius, quod illi commode aquas ex Asciticis educant absque totius massæ sanguineæ fusione, quam Cathartica fortiora cient. Præ cæteris vero hunc efficaciorē describit: In Urinæ hominis sani, & vinum bibentis lib. j. dissol. terebinthinæ Venetæ vitello ovi solutæ ꝑ. j. ꝑ. adjecta sesquidrachma salis prunellæ. Vult autem quotidie repetendum.

Emplastra vero proponit, quæ robovent viscera, & vasorum oscula, ne ichores stillent, constringant; in quæm usum emplastrum diaphanis ipse commendat. Aliud efficacius affert Valleriola ex stercore bubulo, & caprino in aceto fervefactis, adjecto sulphure, alumine, sale, baccis lauri, succo ebuli, simulque subactis cum pice navali. Sylvius sal tostum adhibet; itemque ex cineribus clavellatis multoque sale præditis potentissime aquas allici subdit. Emplastrum e cochleis ab aliis paratur, quod ventri hydropicorum admotum creditur efficacissimum ex Dioscoride, & Galeno. At vult Platerus testas esse prius in cinerem redigendas, mox cum earundem carne esse permiscendas. Et Zecchius cochleas cum testis ex acie contritas cum aqua ardente, oleo irino, & terebinthinæ stillatitio commiscet, & emplastrum conficit.

Præterea ad Ascitem mirificæ traduntur à Iacchino pilulæ composita ex squama æris, vel ex ære isto cum melle, additis caryophyllis, aut cinnamomo. Efficacissima dicitur Rulando aqua terræ sanctæ ex bolo orient. & terra sigill. in aq. levistic. maceratis elicita. Amaco Lusitano commendantur pilulæ ex nitro Alexandri, & trochiscis alhandal. Matthiolus optimum remedium dicit esse saccharum absinthij pontici. Et Fridericus Deckers conficit condituram ex absinthio, mentha, corticibus mali citrij, diacalamenthio, sale sambuc. spiritu nitri, & oleo stillatitio cinnamomi, & macis. Pulvere bufonis usti curatum præter spem hydropicum nar-

rat Uvicius; quin & bufonem discissum, & rebus impositum hydropicorum aquas per vias urinæ expellere ait. Vix Electarii pastularum in vino albo decoctarum sanantem memorat puelam Riverius; atque alium solo vino & baccis juniperi singulo mane ad selibram epoto, Simeon Iacoz; & alios usu salis prunellæ per mensem, sale silicis, & millepedum. Describuntur à Roberto Boyleo pilulæ lunares, quæ unice commendantur ad Hydropem, tum quoque ad Paralyim etiam à Du-Hamel. Alias describit Schroderus Bontio Principis Auriaci Medico debitas, quibus aquam efficaciter educi testatur. A Riverio commendatur Mercurius vitæ correctus cum spiritu salis; itemque succus cherefolij ad ꝑ. ij. in vino albo, & decoctum radicis Brusei. A Cratone, succus cochleariæ quotidie sumptus. Et a Borello succus saturejæ, petroselinæ, & aqua Veronicæ, ab aliis decoctum rad. vincetoxici, & urticæ. Apud eundem Riverium in observationibus hinc inde excerptis memorantur plerique Ascite curati usu vini, in quo filices candentes forent extincti. Laudatur quoque a multis lotium, ejusque spiritus, & sal volatile, quod diuresim efficaciter promoveat. Mirabile remedium fertur Epiphonio Ferdinando autoritate Plinii, & Galeni Triticum, si in illud solaribus radiis excafactum ager toto corpore immergatur. Refert Forestus vetulam ab oleo, ubi ranz vivæ incocctæ fuerant, ventre inuncto, intra triduum sanantem. Fumo tabaci per fistulam hausto Asciticum convalescere testatur Bartholinus. Aquas ex abdomine insensibiliter inaniri asseverat Fabricius ab Aquapendente applicita spongia magna, quæ illud undequaque comprehendat, expressa primum in aqua calcis vivæ, & superligata. Lapis evomitur à colubro aquatico alligatus ventri hydropici aquam paulatim absorbere dicitur Hollerio. Adjuvit Helmontius ex anguim senecta per ventrem, & renes alligata Ascitem curari, itemque usu mercur. præcipitati, ut & stibij diaphoretici quæcumque hydropem tolli; pariterque bryoniæ albæ per ebullitionem in aceto correctæ; atque infusio ligni juniperi cum baccis ejusdem. A Cinnabari autem cum elixire baccarum juniperi sanatum quendam ab Ascite ipse novi.

Transplantari quoque posse creditur Hydrops Ascites exhibitio in cibum Cani, vel dui, sanguine ægri ovi putamine incluso, mox foto, tandem carnibus admisto. Itemque fumo exposita urina patientis in vesica suilla; quo enim urina ipsa in halitus extenuatur, eo etiam venter hydropici sensim detumere fertur.

Ad Tympanitem, quæcumque status discedunt, à Medicis commendantur, licet ista vana dicantur Helmontio. Hartmanno speciale remedium est liquor elicitus ex floribus capsi barbari, atque ad ꝑ. j. exhibitus in decocto seminum, & radicis feniculi; interea foto ventre urina pueri calida, in qua sal prunellæ fuerit dilutus. Ex cumino, & carvo medicamentum quoque paratur arcani loco. A Willisio magni fit fatus alter ex floribus salis ammoniaci, & crystalli fossilis dissolutis in vini spiritu multo phlegmate imbuto; postmodum adhibetur cataplasma ex fimo vaccino cum pulvere stercoreis canini, vel emplastrum ex minio,

& sapone Veneto. Ab aliis commendatur emplastrum ex baccis Lauri cum oleo nard. & rut. atque a Mynticht unguentum carminativum dictum. Retert Helmontius Cabrollium. Anatomicum Montispestulanum sanasse octogenarium fomento bis in die adhibito supra ventrem exlixivio, quo sal, alumen, & sulphur incoctur; superimposito deinde fimo vaccino. Mirifice etiam affert Mercurium diaphoreticum; & Paracellus suum præcipiolum. Præscribitur ab Epiphanio Ferdinando vinum quoddam, quod mirabile sæpiusque expertum dicitur ad educendos flatus, esseque tutum, & saluberrimum remedium tam in Ascite, quam in Tympanite: id autem conticitur: Cucumer. agrestis, seu asinini, sambuc. ireos, & soldanellæ, singul. ʒ. iij. incid. & infund. per horas xij. in lib. vi. vini albi, & clari; deinde bull. ad consumpt. tertia partis, mox add. cumin. anis. sem. fenucul. ammeos, dauc. seseleos, rut. aneth. singul. p. j. cortic. citr. ʒ. ij. cinnam. elect. ʒ. ʒ. tragac. & maltich. singul. ʒ. j. iterum bull. tandem col. & serv. Dosis ʒ. vj. vel. viij.

Vino etiam meraco usum legimus Hippocratem ad flatus discutiendos, & Galenum confectione ex tribus generibus piperis.

Alia plura decoctorum genera in vino ab aliis ad eundem usum consueverunt; his tamen moderate utendum monet Fiebus, ne venter à flatibus insigniter attollatur, & thoracis motu impedito, repente ager suffocetur. *Lucas Tozzi Medic. Pract. lib. 2.*

„ Autoris nostri Consilia duo ad hydropem,
„ (alterum ad Tympanitem, ad ascitem alterum)
„ Medicamentorum formulis præmittenda duxi,
„ quippe quæ curandi methodum, materiamque medicam præcipuam edoceant.

Epistola Doctoris Bavii ad D. Doct. Th. Mayera. 1634.

Jam annus fere est (vir celeberrime) à quo Domina Castlet annum agens sextum supra quadragesimum semex commisit curæ. Laborat enim tunc temporis ultra semel tre Tympanitide, & affectus omnia tam Medicorum quam Empiricorum eluserat conamina, antequam vocaret in auxilium. Accersitus tandem circa initium Maii ultimo elapsi, varia tentavi ut ei succurrerem, sed venter nihilominus in miram excrevit molem à cartilagine mucronata usque ad os pubis, cum continuis fere borborygmis, sine ulla inflatione crurum, manuum, aut faciei, quod speciem Hydropis, ut fallor, satis evincit. A flatibus discutientibus levamen quidem percipit, sed momentaneum. Purgantia non admodum facile fert, & illis nimis fuit exercitata sedulitate nescio quorum Empiricorum. Emerica administrare non audeo tam ratione debilitatis ægræ quam timoris, veretur enim ne majora inde sibi sobolescant pericula; & alterantia potius leniunt symptomata, quam medentur morbo. In hoc tam periculoso affectu ad te confugimus, Vir Excellentissime, ut nobis viam iteras, qua huic jam dolorum acerbitate & symptomatum violentia fere attrita succurrendum statuis, dum adhuc partes naturales mediocriter funguntur officio.

Bene enim appetit, nec de ingellis conqueritur, sed parce admodum mejit, & lotium lixivii instar saturatum est. --- Novi quantum E. T. meis faveat studiis, ac proinde submisso rogo ut votis meis in gratiam hujus ægræ, de cujus salute alias conclamatum esse statuo, respondeas. Vale, Fautor plurimum colende, & meis studiis nunquam favere desine. Vale iterum.

*Dabatur rapum Marpsfeldia 19.
Februarii. 1634.*

Tue Excell. observ.
Samuel Bæug.

RESPONSUM.

Quid de ægra tua Tympanitica languente, & tam morbo quam remediis, viribus attritis fatiscente, vel sperandum, vel statuumendum sit, nescio (Vir Ornatissime) nisi quod si non penitus relinquatur Prognostico, tamen eo in ultiram partem serio edito, dubie & caute tractanda sit, ne arti vel artifici inique imputetur id, quod soli morbo tribuendum brevi continget. Quamvis aquæ in hoc affectu status prævolent, attamen line humore, materialis causæ locum tenente, vix producit aer, seu ventus iste Microcosmi, quem rugitus & borborygmi in abdomine excitati arguunt. Materia porro ista duplex est, vel frigida & viscida, in quam debilis calor agens quantulacunque ejus attenuatione status excitat; vel calida, acris, salium acumine turgens, quorum diversorum & inimicorum concurrentes & commixta substantiæ fermentationem faciunt, in qua excitati spiritus sub flatuum specie insolenter tumultuantur, dum vitata partium naturalium œconomia & pessundato Hepatis tono, Naturæ tandem succumbat. Tuum est sedulo disquirere & exacte nosse veram præsentis mali causam, qua cognita facile erit tibi debita morbo assignare remedia, ea tamen lege ut deficientem Naturam, vana omnia & irrita fore certo asseveres, ne propinqui præstira abs te officia pro more loquacis & injustæ plebis, calumnientur. Scio te à me aliquam remedium assignationem expectare, id quod quam difficile sit in præsentis casu & moribundo subjecto tute cogita. Ne tamen plane sim & ut te vitum amicum, qui rebus suis nunquam deerit, consuluisse ægræ sciat, quid faciendum censeam, si quis restet aliquid agendi campus, paucis accipe. Hic purgandum, sed remediis specificis, qualia sunt quæ ex Mercurio, Croco metallorum & gutta Gummi desumuntur. Mercurium dulcem velim per os exhiberi, non per se, sed cum benigno aliquo Cathartico, quod audacem hospitem diu in corpore morari non sinat, sive purgans in forma solida, liquida, vel media aut molli, pro ventriculi dispositione propinetur. Infusio Croci Metallorum, ut & Cambog. in vino generoso dissolut. pro Clysteribus reservetur. Ista toties administrentur, quoties vel morbus suadebit, vel impune eorum admissionem vires latere sunt; id quod indagini ruz & prudentiæ committatur. Secundo loco movendæ urinx, cui intentioni satisfac-

cient lixivium ex cineribus Juniperi, Fificis feminae, Gaulth, Ericæ totius, stipularum & siliquarum fabarum, affusâ aqua instillatâ Pariet. rix & siliquarum viridum fabarum præparata, quorum acrimonia non retundatur modo sed penitus deleatur paulatim instillata sufficienti quantitate succi Limonum, addendo ad saporis gratiam sacchari Crystallini aut syrupi aucujus (ut ex floribus Ericæ) quantitatem sufficientem, cum tantillo aquæ Cinnamon. Non inutiliter etiam quarta pars vini Rhenani purissimi huic mixturæ adjicietur. Tertio diffusiendi status, id quod potenter præstabit Electuarium ex radice & cortice Salsifras cum speciebus Diacymini per os exhibitum, & stillicidium ejusdem ligni oleum, sicut & succini Clysteribus prædictis additum. Omne fere punctum virium conservatio, cui prospiciet victus ratio: vana quippe hic ea quæ vulgo indigitamus Cardiacæ: In alimentis erigendorum spirituum & instaurandarum virium negotium totum consistit; sic tu Coquum simul & Medicum agito. Lotum præbe medicatum cum succis antiscorbuticis, doliolo indito frusto Chalybis. Si hisce præsidiiis vel non sanetur (quod vix credibile est) vel nullum ab eorum usu percipiat levamen agra, conclamatum esse pronuntio.

Vale, & me nominis & studiorum tuorum quamdiu vixero, benevolum & amicum factorem esse & fore certo scito.

Datum Londini die 2. Mart. 1635.

Consilium ad Hydropem Ascitem.

Hydropem, præsertim Ascitem, qui mox cedit, mox revertitur, siquidem incurabilem judicant medicinz Proceres, curandum suscipere valde arduum est, nisi cum summi & funestissimi, ut plurimum, eventus præmissis prognostico; cui Medicus prudens, & non nimis sanæque amans generosam dominam agram, quæ nostrum poscit consilium, forsitan relinqueret, nisi foret satius anceps experiri remedium quam nullum. Si recenti malo difficillimum est efficacia assignare auxilia, quid quaeso, sperandum nobis in subiecti compendium, quod à variis Medicis, usque peritis, myriadem accepit præsidiorum, quorum ope infirmitatum feracissima hydra, aliqua ex parte castigata, si non absolute fuit edomita? Quid in prostratis viribus & corpore emaciato, in quo nihil plenum apparet præter aqualiculum, & inferiores partes quæ depluentem ex abdomine imbrem conditione situs excipiunt? Multa incassum tentata, quadam ex arte præscripta cum successu, at tamen augetur indies malum symptomatum imminentium nŕons, qui non tam refecatione, quam mandantes partes restauratione indigent. Observandum credo quid profuerit, quid nocuerit hæcenus, & juxta istas indicationes procedendum arbitror. Mæx non est intentionis sigillatim remedium persequi minutias, siquidem dies diem docet, & forsitan crastina lux ea producet accidentia, quæ statuta penitus immutare jubebunt. In sequentibus ambigua in attrito corpore curatio, vel saltem levamen consistit. Medici præsentem vel meliora proponant, vel si mæx acquiescant sententiæ, ejus

capita prudenter seligant: & juxta temporum opportunitates admittent.

Præscripta convenienti dicta (quam hæcenus ulque & ulque implectam, denno i pe rare, veluti recoctam cranibem apponere, importunum duco) vicissim juxta præsentem indicationem, & convertem naturæ ordinem utrumpanda sunt, alterantia, vacuantia, roborantia, procurando non tam ut aqua evacuetur, quæ satis fluida lubens faciliusque sequitur exhibitionem *separatim* impulsam, aut ut dissipentur status cruditarum & fermentationis soboles; quam ut eorum perennis generatio præcaveatur.

Porro Alterantia ista sunt: præparans universale Crolli, cum tartaro vitriolato, vel liquamine salis tartari, & spiritu vitrioli præsertim philosophico. Quæcunque ex tartaro, cremor, spiritus, sal, tinctura. Quæ ex sale petreæ, præsertim ejus stirax purissima multiplici dissolutione, filtratione, & crystallizatione correctæ. Salis spiritus conferens dissolutioni salis microcolini, cujus coagulationi necessarii confert etiam debite præparatum alumen, urinas potenter movens, sitim sedans, & innoxia attritione viscerum tonum restituens. His addantur salvia bosci, & plantag. cujus insignem effectum describit Johannes de Gadesden in Hydroke, qui etiam à calore viscerum præternaturali sapissime excitatur. Addantur etiam absorbentia serosam colluviem, ejusque acrimoniæ retundentia, inter quæ primas tenent corallus & cancerorum lapilli, quos oculos appellant. Addatur etiam cerevisiæ mediata cum lig. Nephritic. part. ii. ligni sassafras cum cortice part. iij. ligni Juniper. nottratis, cortic. radic. Tamarisc. ana part. iij. addendo ad singulos congios, sine gallon. squamæ ferri purissimæ ʒij. Liquori pro potu ordinario præparando per exactam fermentationem limpidissimo usus tempore addendum saccharum, compositum ex part. iii. sacchar. dur. & part. j. stiriarum prædictarum nitri Sed cæteris omnibus tanquam antesignani generosissimi prevalent Mars in salinam substantiam reductus, & vomica liquoris æterni, sive crudæ, sive coctæ, quibus nihil proficientibus, conclamatum esse absolute pronuntio.

Vacuationum diversæ sunt species, quæ singulæ successive in depulsionem hydropis locum habere possunt per varia corporis canalicula. Aliquando exhibitæ vel intus genitæ indignatus ventriculus poscit vomitorium, quod nolui dare veliementius, depromptum è studio, sed vel ex vitriolo, etiam Martiali, aut albo in gillam reducto, vel ex seminibus maturis cataputiz majoris tritis cum paucis amygdalis in formam Emulsionis. In viam regiam live cloucam alvi tam serum quam crassam biennans commodè deducunt Iris florent. cum pulvere interioris Jalap. à cortice liberari, semen ebulli, soldanella, baccarum spinæ cervinæ syrupus, succago, pulvis; Rosarum masecatelmarum conditum, pulvis, decoctum; Inprimis vero Mercurius dulcis, quod remedium cæteris, nŕactas quasvis causas morificas aggregatæ, & si superari possint prosteruit. Sed si iudex iste athleta in debita dosi Sero aliquando *huic* cedere tyalissimum, qui præcavebitur addito cathartico

cathartico activo satis, non tamen scammoniato, quo nihil est hepatis magis inimicum. Sed si nihilominus moveatur sputum, nihil est periculi, immo salivatio in hydrope, quamvis semper sit molesta, attamen sapissime est salutaris. Nihil majus dat hydropicis levamen, quam larga urinarum profusio, idque minima cum virium deiectione. Sales omnes sunt diuretici, verum nitrum omnibus præfero, quod sitim, intolerabile in hoc morbo flagellum, extinguit, & calorem præternaturalem visceribus in hac muria meritis impressum egregie temperat. Pauca querenda sunt & efficacia. Si exhibendi sudorifici sese offerat occasio, id queratur in Jove, & ad ultimum fixato antimonio, cujus virtus lapides bezahar & contrayerv. multis superat parafangis.

Denique vero corroborantia accersenda sunt ex Marte, in quo summa est utique aperiendi vis, & contrahendi; nec non ex corallo sive ejus tinctura, sive magisterium, sive sal exhibeatur. Valet etiam cornu cervi philosophice calcinatum, vel post vulgarem unctionem summam vitriolatum, quo modo etiam præparari poterunt ipodium, sive ebur, & dens equi marini.

Hæc omnia perito medico nota esse debent. Vanum enim mihi particularem singulorum usum exponere. Miles fortis armis instructus pugnabit pro re nata: Equidem nec rerum metas, nec tempora pono. Deus omnipotens ægram restituat, & medico inspiret tam remedium delectum, quam debitam eorum applicationem.

Datum Chelsei 26. Junij. 1651.

Ex Consiliis prædictis liquet quænam sint, Indicationes curativæ, viz. Aquas educendas per secessum & per urinas; flatus discutendos assumptis & admotis; omnia viscera naturalia corroboranda, & obstrueta aperienda.

Incipiatur à Clysteribus, postea transeat ad Cathartica.

℞. urinx pueri ꝑviij. infus. croc. metall. ꝑij. cambugæ in vino Hispanico solut. ꝑi. terebith. Venet. in ovi vitello dissol. ꝑvi. ol. sassafr. ꝑß. M. f. Enema injiciend. mane, & continueat quamdiu potest.

Vel ℞. Rad. brion. irid. nostr. ana ꝑijß. lign. sassafr. ꝑß. bacc. lauri & junip. ana 5v. fol. laur. chamæm. tot. ruta, colti hore. ana m. j. sambuci m. ii. sem. cumin. & foenugr. ana 3vi. f. decoct. & colat. ad lbj. in qua dissolve mell. anthos ꝑiij. vini infus. croc. metall. ꝑiij. cambugæ in vin. Canar. dissol. 3ß. M. f. Clyster injic. circa hor. 4. pomerid.

Suppositorum efficax. ℞. rad. cucum. asin. longam sex digit. oleo inunctam, ano inde. Mirabiliter aquam extrahit. Idem præstat rad. ebulli.

Hydragogon excellens est rad. Ireos flor. rec. & fragans in tenuiss. pulv. redacta. Ex vino albo à 3i. ad 3ii. sumptæ copiosè operatur & blande. Sæpius dedi Hydropicis felici successu & per se, & cum Jalap. (cui permista egregie purgat) & cum mercur. dulci. Consumit materiam Cachexiæ & Hydropsis, & Tumores oedematosos usu tollit.

℞. Ir. Flor. 3iii. macis 3ii. zinzib. 3iii. vel 3ß. f. Pulvis. Detur quotidie mane cochl. j. cum sacch. in vino albo vel cerevisia. Vel.

℞. Ir. flor. 3j. tartari vitriol. macis, cort. v. vinter. cort. sassafr. an. gr. v. santal. citr. curcumæ an. gr. x. sacch. anisat. 3j. M. f. f. pulvis pro una dosi, detur ex vino quotidie.

Succi ex rad. irid. expressi & per residentiam depurati 3ß. detur cum 3j. syr. ros. pallid. solutivo.

Succus è rad. ebulli vel sambuci cort. expressus; vel semen ebulli in aqua subsidens ad 3j. datur cum 3j. cinam. & sacch. ex vino.

℞. Sem. ebulli pleni & subsidentis 3j. jalap. 3ß. spec. diatr. sant. 3ß. f. pulv. subtilul. excip. paucis syr. caryoph. M. f. Bonus. Capiat mane superhaurio cerevis. aut vini rhenani momento.

Rolæ moscatellinæ simplices albæ condiantur ut acetaria solent oleo, & sale, & initio pastus comedantur ad m. j. magnum desuper patium sumendo. Bona succedit, & satis copiosa, facilisque purgatio à grato remedio. Hydragogon & efficac.

Elaterium commodè & feliciter cum merc. dulci jungitur: viz. ejus gr. ß. vel ad summum gr. j. cum gr. xii. xv. vel xx. mercurii dulc. calomel. Potenter purgat aquas & copiose.

Ex lixivio fabarum tot extrahe salem, sume 3j. cum an. ocul. can. mirabilia videbis.

Sal volat. C. C.

Vel sal junip. ex tota planta cum liquore convenienti.

A parines succus depuratus per residentiam utiliter propinatur Hydropicis incipientibus cum vino albo ad 3ij. bis in die. Ducit urinas, & insensibiliter consumit materiam.

Succus plantaginis eodem modo.

℞. Crem. tartari ab. 3ß. 3ij. 3j. sal. stipit. fabar. gr. x. vel xv. M. f. & paulatim affunde succ. depurat. limon. 3j. vinialb. tenuis & generosi 3iv. het ebullitio & tandem omnimoda dissolutio. Adde sacch. cand. 3ij. M. f. Propinetur mane & vespere.

℞. Raphanos in taleolas sect. numero viii. sacch. cad. pulv. 3vi. lap. prunell. 3ij. Conspargantur salibus taleolæ inter duas patinas, & succus sive liquor seu syrupus qui effluet servetur, exhibendus per se vel cum sorbitionibus diureticis.

Decoctum Parthenii bibatur ad perfectam curationem usque specineum est, per urinas purgans.

Ol. e bacc. Junip. cum vino sumptum.

Petroleum cum vino, urinam, sudorem & vomitum mover.

Ova formicarum in lacte ebutyrato cocta copiose urinam movent.

℞. Ovor. formicar. cochl. j. Coq. in lacte ebutyrato, exprime, & dulcora paucis saccharo: datur mane superambulando hor. 4. ante prandium per octiduum.

Mulier hydropica cui hæc ova præscripsi mirè commendavit, dixitque movisse ingentem flatuum copiam, & prolixos crepitus, magno cum levamine; dixit etiam frequens primo ortu n meiendi desiderium, tandem se tulisse copiosas urinas, ita ut una vice totam repleverit matulam sapius.

℞. Aq. still. chamæm. tot. parietar. infusion. lign. nephrit. & sassafr. vini alb. opr. an. lbj. ol. vitrioli 3ij. ol. tartari ex sale per deliq. facti q. s. ut pereat aciditas, dulcoretur saccharo, & f. Julep. de quo bibat bis in die longè à pastibus.

℞. Lap.

℥. Lap. prunell. ʒj. sacch. crystall. ʒiv. M. f. pulv. subcil. cujus cochl. j. dissolv. in cyatho cerevis. lupul. pro potu ordinat. quotiescunque bibet, idque pro lingulis haustibus.

Pro potu ordinario ut cerevisia sequens.

℥. Rad. chinæ lbj. sarsapar. lbj. lign. sassafr. ʒij. rad. fœnic. graminis, cryng. an. ʒiv. cort. rad. amara dule. ʒij. nuc. moschat. num. viii. succ. cochlear. lbiv. succ. nasturt. & becabung. ana lbj. cerevisiz lupul. (post imbibitionem tactam) gallon. viii. t. ut artis est, & post defecationem bibatur etiam in pastibus.

Vel ℥. Sarsapar. lbj. rad. anodini. petrosel. fœnic. rub. tinct. raphan. rust. an. ʒiv. cort. rad. tamarisc. rec. cort. med. fraxini an. ʒij. lign. sassafr. cum cort. ʒij. rasur. C. C. ebor. & dentis equi marini an. ʒj. nuc. mosch. ʒx. Coq. ut a. e. in gallon. iv. cerevis. decem solidor. deinde f. per setaceum colatura, cui, postquam retrixerit, adde cerevis. ejusd. recent. coct. gallon. v. succ. cochlear. lbiv. succ. nasturt. lbij. viii. rhenan. gallon. j. ciner. junip. filic. fœm. absinth. genist. opt. calcinat. an. ʒij. sinatur fieri fermentatio ad perfectam depurationem. Liquor limpidus recondatur lagenis lapideis exactissime clavis in usu ordinarium.

N. B. Cum nonnullis cinerum ingratus sapor nauseam moveat, satius est cum aqua distillata ex filiquis & staminibus fabarum viridibus & cineribus lixivium parare, vinum rhenanum addere, & cum saccharo & paucis cinamomo tacere Hippocraticum.

Vel ℥. rasur. ligni ebeni nigerrimi ʒvi. rasur. lign. abietis rec. & fragrant. ʒviii. rasur. guajac. interior. rad. althææ & urticæ ana ʒiv. cort. median. fraxini, ulmi, rad. rusci, anonid. caryophyllat. ana ʒij. rad. filicis fœmin. ʒx. rasur. eboris, dentis equi marini ana ʒij. fol. agrimon. ceterach. tamarisc. cum cortice chamæpit. beton. veron. maris an. m. j. fl. hyperici, sambuci, geniste an. p. viii. sem. cochlear. nasturt. hort. ling. avis. an. ʒij. nuc. myrist. ʒj. Omnia concisa bulliant in gallon. viii. cerevis. rec. ad ij. consumpt. Adde ejusd. cerevis. gallon. vj. sinatur fieri infusio per noctem vase probe tectò. Mane f. colatura per setaceum, quæ indatur doliolo juxta capacitatis, addendo quartam unam fermenti alæ rec. sinatur fieri fermentatio ad perfectam depurationem. Pendeat autem in doliolo lbj. rament. Jovis sacculo inclusi ex tela rara vel panno stamineo.

Vel denique, ℥. Ligni nephrit. ʒj. lign. sassafr. ʒvi. santal. citr. ʒβ. hisce concisis affunde aq. font. fervent. lbviii. stent in infus. per horas 24. adde vin. rhenan. opt. lbij. anim. hepat. ʒij. sacch. crystall. ad libitum, utatur pro potu ordinario.

℥. Gum. Ammon. in acet. scill. solut. & inspiss. ʒiβ. sagap. præp. ʒβ. pulv. stom. elect. de verm. ana ʒj. troch. de cappar. & dialacc. ana ʒij. curcumæ, sem. cochl. Batav. an. ʒij. ceruss. Antimonii & Jovis an. ʒv. sal. absinth. card. ben. artemis. an. ʒj. Mβ. & cum syr. e cort. citr. f. electuar. instat opiatæ servandum ad usum.

℥. Hujus elect. ʒij. anim. hepat. gran. xii. pulv. subcil. jalap. ʒj. Mβ. & addito paucis syrupo f. Bolus sumend. mane cum debito exercitio, Perseveret in hujus usu per plures dies au-

gendo dosin Anim. Hepat. ad gr. xvi.

Salvia bosci, agrestis, montana (Angl. *Garlick Sage*) perhibetur multis hydropicos sanasse. Preparatur ex ea Cerevisia medicata, quæ languentem appetitum erigit, & potenter purgat per urinas. Decoctum ejus idem facit.

Allium continuo comestum urinas ciet mirifice. Ac nota, quibusdam viscera præcalida habentibus Allium intolerabilem excitare capitis dolorem.

Nunquam in hydropse (præsertim humido, Anasarca, vel solo vel eo qui cum Ascite complicatur) omittenda per habitum evacuation. feri retribilis in partibus post tertium concoctionem. Flores Jovis ex theriaca ad ʒj. potenter sudores movent. Item acetum aut vinum album tenue diuturnæ infusionis ramentorum tenuissimorum Jovis Cornubiani.

℥. Part. xq. bezoar ramosi, margaritz mineralis Salæ, & margaritz sive ceruiz Jovis: Dosis est à ʒβ. sive gr. xxxvj. ad ʒj. è theriaca, superhaufta aqua Cardui bened. petatit. valerian. addit cochl. uno vel altero p. acid. guajaci.

℥. rad. hirundinar. pondere lbj. per noctem in vini albi lbj. maceretur, mane coq. ad tertias. Expressio calida potetur mane jejuno stomacho in lecto. Copiosus movetur sudor, & valide expellitur hydrops.

Crocus Martis aperiens ad ʒj. cum rhabarb. & conf. absinth. cum moderato exercitio, continuando per 10. vel plures dies, obstructions aperit & hepatis roborat.

Roborantia præcipua quantantur in Marte, cujus cum sint variz præparationes, omnes non contemnendæ. Ubi tamen insigniter sunt confirmanda viscera, croci Martis fermentati magna est virtus. Valet etiam is qui fit sine igne & acidis, sed tantum per aquam pluviam. Si major requiratur allectio, conveniat etiam corallinus.

Roborant etiam syrupus & tinctura corallorum, sp. vitriol. corallatus, lac perlarum & corallorum, diacurcuma, trochisci de rhabarb. &c. Externe item frictio longa & aspera totius ventris; fons ex decocto discutientium, calefacientium, carminantium parato in vino aut lixivio, &c.

Si status sint valde molesti, capiat à ʒj. ad ʒij. vel ʒiii. Elect. seq. superhaufto passulato junip. absinthite mane horis quatuor ante prandium, superambulando vel alio n. odo corpus exercendo.

℥. Bacc. junip. matur. succulent. lbij. cort. citr. exter. cort. Aurant. an. ʒβ. santal. citr. ʒiii. rad. sassafr. cum cort. ʒvi. vin. alb. generosiss. lbxij. Macerentur simul per quadradium ad lenem calorem, mox f. ebullitio lenta ad dimidiz partis consumpt. tum f. liquoris colatura, & baccarum per canapatum densum fortis expressio; jungantur omnia simul, & fiat lentissimo calore coagulatio ad consistentiam pulpæ, de qua cape ʒiij. diaphoretici vulgaris fidelissime præp. ʒβ. crem. tartari chalybeati opt. ʒj. ocul. cancr. præp. ʒvi. magist. corall. & perl. ana ʒiii. succini utriusque præp. ana ʒij. cinam. inter. ʒiβ. mactis, caryophyll. ana ʒi. Mβ. f. Elect.

℥. Uvar.

℞. Uvar. passar. commun. ℥viii. bacc. junip. matur. ℥iij. absinth. utriusque ana ℥iij. cort. fraxini, & cort. rad. tamarici ana ℥v. lassatr. cum cort. ℥iij. vini albi Andegavens. vel Rupellens. pint. Parisiens. xii. aquæ cisternæ pin. xxv. Omnia in doliolo posita humectentur vino, mox affundatur aqua, tandem ℥i. tinctura tartari, vel pinta una fermenti cerevisiæ, sinatur fieri fermentatio donec limpidus evaserit liquor, post defæcationem tranſvaletur, & servetur in lagenis terreis subere obturatis.

Si loco aliorum liquorum affundatur Hydro-mel, erit potentissimus potus.

℞. Mucilag. sem. psyll. & cydon. extract. in aq. ros. rubr. ℥ii. sacch. cand. ℥iij. spir. vitrioli gutt. iii. M. f. mucilag. cujus℥i. pro vice in ore tenenda ad sitim fallendam.

℞. Sterc. columbin. arid. ℥ii. troch. de thure ℥iij. myrobal. Ind. & cheb. ana ℥i. corall. rubr. & alb. macc. myrti, balauſt. ana ℥iij. acet. rosat. q. s. f. Cataplasma ad partem tumidam.

℞. Nasturt. aquat. & hortens. nasturt. Indic. cardamines, cochlear. utriusque dracon. ana fascic. j. rad. brion. utriusque recent. ana ℥i. cortic. median. sambuc. ℥iij. radic. ebul. succulentar. ℥xvi. fol. mentastri, calaminth. salv. sabiaz, lavend. ana m. ii. Concisis omnibus atque cacabo immixtis affunde vini Canarini optimi ℥iv. acet. scillit. ℥i. xung. suill. rec. ℥iiv. Coquantur ad herbarum putrilaginem & liquorum consumptionem: postea exprimatur pinguedo, de qua cape ℥i. ol. turin. & styrac. liquid. colatæ ana ℥ii. m. pro licu totius ventris tumentis, usurpando mane, sed præferre in ingressu lecti diu multumque fricando manu calefacta, superposita lana succida, quæ eidem usui perpetuo inserviat.

℞. Sterc. columb. acet. macerat. ℥i. sulphuris vivi ℥j. nicri ℥ij. pulv. rad. enulz, bacc. lauri, anethi, stor. chanæ. n. ana ℥vi. sem. nasturt. ℥ii. Coquantur omnia in vino ad spissitudinem, & adde mellis ℥ii. cerebinth. ℥ij. succ. ebuli ℥ij. iridis ℥i. farinæ fabar. ℥ij. f. Emplastrum.

Chartam bibulam intunde in aceto & applica tibiis.

℞. Cinerum fagi & mororum bati ana f. Lixivium in quo pedes tumefacti teneantur.

Sacculi repleantur herbis carminantibus & discutientibus, ollæ indatur lapis ignitus, affundantur lapidi tria aut quatuor vini cochlearia, olla tegatur sacculo, ita ut nihil expiret, incaleſcit sufficienter pro fotu.

℞. Gum. sagapeni, sandarach ana ℥ii. thuris masc. ℥ii. alcali bnfonis vetulstiss. ℥ij. alcali visc. quercin. ℥iij. f. Emplastrum pedibus tumetibus applicand. *Theodor. De Mayerne Prax Medic. lib. 3.*

Ad Indicationes tranſeo, circa quas cum fructu eliciendas, Practici unanimiter sentiunt, causas eo, quo se consequuntur ordine removendas esse, quoad fieri potest, adeoque à prima earum inchoandum. Quæ cum ita sint, clare hinc elucere existimo, Indicationem utilem non desumi a sero, quod vel sit Cathartici per alvum exturbandum; vel per Paracentesin, perforato scilicet abdomine; vel per scarificationes detrahendum; vel per urinarios meatus evacuandum; vel per interna, externaque exsicccandum; quibus bre-

viter trutinatis, Indicationem utilem subjungam.

Inprimis in Evacuatione seri per alvum fiducia non est ponenda. Ratio est, quia plerumque paucis post purgationem diebus venter nova seri colluvie in eandem molem re-intumescit, & qui gravi Hydrope detinentur, purgantibus Hydragogis perquam raro restituantur.

Deinde nec per Paracentesin serum educere convenit, primo, quia cum Deus ideo tres corporis humani ventres membranis, tanquam dentis operimentis occluserit, ut naturalis calor & spiritus, qui sunt proximum vitæ instrumentum, coerceantur, & sic in sua virtute, veluti per reflexionem, intenderentur, sit ut, perforato abdomine spiritus, quæ data porta evanescere, ac vires concidere necessum sit. Secundo, quia per experientiam constat, Paracentesin ut plurimum infelicem sortiri exitum. Tertio, quia, quamvis etiam prudenter & caute instituta operatione mortis celeris causa non fieret, tamen morbi causam non tollit. Apertio tamen Umbilici, si eum Natura propria sponte in tuamorem elevaverit, atque hac ratione hanc medelam postulaverit, repudianda minime est, modo Cautela requisita in ejus Chirurgia administrantur, atque interna simul exhibeantur.

Tertio nec in educatione seri per Scarificationes curatio consistit, primo, quia nihil præter inducias ad aliquod tempus spondere potest, sicuti ante annos undecim in muliere quinquagenaria expertus fui, quæ administratis primo Universalibus, expurgatoque per alvum sero flavo scarificationes admisit, factis quinque in interioribus furarum incisuris oblongis, cutim penetrantibus, nec non tribus aliis paulo brevioribus supra matatarsum utrinque, unde primum aliquid cruoris, mox vero purum serum in pavementum destillavit. Agra dein lecto commissa sensim ac sensim, absque ullo virium hinc dispendio, insignem quantitatem trans lectum continua destillatione emisit, unde plurimum allevata, sibi que restituta visa postea surrexit, obambula vitæque. At vero sicut imperfecta erat curatio hæc, ita & sanitas curta, nam infra menses tres re-intumescere abdomine & pedibus, scarificationes frequentare nollens, ad mortem, quam tali statu inevitabilem esse agnovit, se pie accinxit, nec enim ego tunc temporis plus poteram, Secundo, quia Scarificationes circumſpectum requirunt Medicum ob metum gangrænæ. Si enim æger senex, vel natura debilis, vel corrupto, admodum humores geltet, partes exteriores, utpote quæ à corde, seu foco, remotiores sunt, calidi innati influxu quodam modo destituantur, ac ideo necrosin facile patiuntur, facilius adhuc à velicatoriis hæc enim carnem ad mortificationem disponunt.

Quarto, nec per urinarios meatus serum in abdomine stagnans educi potest, aut debet; Primo quia quod in capacitatem ejus effusum est per venarum oscula resorberi nequit. Secundo, si lien v. g. scirrhuso tumore laboret, aut vena cava descendens, aut emulgentes, aut renun ductus ab humoribus crassibus obstruantur;

obstruantur: Diuretica illos amplius coacer-
vant, & crassos etiam angustioribus meatibus
impingunt; quod autem talis saburra in urina-
rios meatus invehatur, ex superioribus patet
ægris, quorum duo convaluerunt, nullo usi
diuretico.

Quinto serum nec per Suffumigia & balnea
vaporaria, multo minus autem per Unguenta
& Emplastra desiccantia exhausti potest. Quia
serum solummodo ex ambitu Corporis, h. e.
ex muscolosa carne potissimum, minus vero ex
cavitatibus evacuant, obstructionibus non at-
tactus. Si qua tamen externa peculiariter intima
Corporis penetrandi potestatem haberent, ea
non forent rejicienda: Hic vero de usitatis ser-
mo est.

Indicationibus inutilibus à sero, tanquam
ab effectu, desumi solitis huc usque immoratus
sui, quod nihilominus, ubi causæ rationem in-
ducit, v. g. si excedens seri quantitas suffoca-
tionis periculum minetur, tunc ejus quantita-
tem esse imminuendam indicat, donec per alia
opportuna remedia naturæ succurratur. Hanc
imminutionem clystere congruo aliquoties re-
petito obtinui.

Conspiratio viscerum intercepta est Intu-
mescentia, cum, (uti dictum,) ab obstructio-
ne tanquam effectus a sua causa pendeant, eam-
que involvant, superest unica, eaque utilissi-
ma indicatio, scilicet, obstructionem esse tol-
lendam. Quod nihil æque præstat, ac remedia
Aperitiva. Et hoc est omne, quod hoc scri-
pto insinuare volui. Aperitiva enim, seu deob-
struentia sola sufficiunt; hæc omnem paginam,
ut dicitur, absolvunt. Hoc bene intellecto,
Hydropicos quosdam desperatos perfunctis,
subiata quippe obstructione, viscus antea im-
peditum, ac veluti cæno immersum, postea
sibi restitutum *viginti & octiduo* recuperat, Cor-
de ceu Sole Microcosmico suam induentiam
vivificantem iterum libere effundente.

Neque huic sententiæ repugnant Historiæ
eorum, qui per abstinentioniam a potu curati fue-
runt; illorum quippe calor natus sic roborat-
us morbificos humores concoxit, & digessit.
Neque hic mihi adversatur, quod multi per pur-
gantia restituti fuerint; At horum effectum præ-
stitum conjicio tum in virtutem aperitivam,
quam quædam purgantia insignem obtinent; tum
in causam morbi leviolem, humorem facile mo-
bilem, vel jam coctione devictum, & ad excre-
tionem propensum.

Habet enim & Hydrops sua tempora,
non minus ac alij morbi; habet inquam,
suos cruditatis & coctionis decursus, tar-
diores aut celeriores pro Natura humoris
putrescentis, pejoris aut mitioris. Quæ qui
considerat, facile intelligit, Medici munus esse
Naturam adjuvare, ut cruda concoquantur,
crassa attenuentur, bonaque à malis separen-
tur: non vero naturam à Cæpto avocare, aut
interturbare, ut faciunt, qui varia intempe-
stive præscribunt, Natura nullatenus consulta
nec intellecta.

Neque tamen intelligi velim, ac si in curan-
do Hydrope Ebulum & Sambucum, (quæ
ob remissiolem calefaciendi vim quibusdam
purgantibus longe præferenda esse, diuturnis
serum usus docuit;) improbare: vel Cucume-

ris agrestis succum, radic. Elleb. nigr. Ileos.
Turpeth. poma Colocynth. Gratiolam, &c.
omnino rejicere cogitem; hoc absit, sed istud
notari velim, debitam purgantium admi-
nistrationem à dexteriore præparatione depen-
dere, quam si instituunt, qui Medicamentorum
operationes sola qualiumcunque humorum
eductorum copia metiuntur. Non quantum, sed
quale hic attendendum, juxta aph. 25. sect. 1. si
qualia oportet, purgantur; confert, & facile
serunt; sin minus; contra.

Conclusive denique dico, quod, qui Medi-
camentis deobstruentibus viscerum oppilatio-
nes tollere, eaque ad liberam humorum, spi-
rituumque communicationem promovere sci-
verit, is totam Hydrops curationem feliciter
absolverit. Neque est cur verbum his amplius
addam, cum remediorum Catalogus in dispen-
satoriis abunde prosteret, & mihi propositum
non sit, aliorum scriptis hanc Methodum exten-
dere. Hydrops cognitionem ampliore sup-
peditabit Dissertatio sequens. *Iob. Georg. Greu-
lichius de curandi Hydrops vera methodo.*

In curatione respiciendum ad illa, quæ vel
obstructiones vasorum lymphaticorum referare
valent, vel ad illa, quæ acrimoniam lymphæ
corrigerent & enervare possunt: insuper ad seri
extravasati educationem, vasorumque rupto-
rum constrictionem, & conglutinationem.

Inter phlegmagoga specificè commendatur
hydragoga Angli Salic, cujus descriptionem vi-
de in autoris recentioris spagirica septem pla-
netarum terrestrium.

Vel, *℞.* Pilul. cathol. nostr. desc. *℥ss.* Mer-
curij præcip. solaris, gr. viii. Res. jalapp. gr.
iij. Olei juniperi, gutt. iv. *M. F.* pilulæ pur-
gantes *N. v.* deurentur.

Vel, *℞.* Elect. cario costini, *℥iii.* Res. ja-
lapp. gr. v. Tartari vitriolati, *℥ss.* Dissolvantur
in *℥. q.* vini. enulati, *M. F.* haustus purgans.

Vel, *℞.* Extract. cathol. *℥j.* Mercurij vitæ
correcti per tartarum & salem, gr. iii. Trochisc.
alhandal, gr. ii. Olei cariophyl. gutt. 3. *M. F.*
pilulæ purgantes *N. vii.*

Vel, *℞.* Guttæ gambæ sulphur. vel mace-
ratæ cum Oleo tartari per deliquium, gr. v.
Rad. jalapp. pulv. gr. xv. Trochisc. alhandal. gr.
iij. Sem. duci pulv. *℥ss.* Olei macis stillat. gutt.
iv. *M. F.* pulvis purgans.

Vel, *℞.* Extract. esulæ, *℥ij.* Dissolvantur in
sero lactis *℥v.* *M. F.* haustus purgans. Quidam
laudant extractum elaterii à gr. i, ad iii, in
sp. vini dissolutum.

Ad aperiendum & corroborandum sequens
præscribatur decoctum.

℞. Raf. ligni guajaci, *℥iii.* Sassafras, *℥ii.*
Cort. tamarisci, rad. capparum, an. *℥ss.* au-
rent. citri an. *℥ii.* Rad. petroselinj, apci, enu-
læ campanæ, fœniculi ana. *℥i.* Coq. inf. *q. q.*
chalybeatæ, & vini, in quo filices candentes
extincti sunt sæpius an. ut artis est vel *℥100.*
col. adde Oxymell. scyllic. *℥iii.* Salis genitæ,
℥ii. Spiritus salis ammoniaci, *℥iv.* Aq. vitæ Mat-
thiol. *℥iii.* *M. F.* decoctum aperiens & cor-
roborans.

Conducunt hic chymica ex metallis præpa-
rata, & dentur tinctura metallorum à gutt. xii.
ad xxx. in vini enulati haustu.

Sua hic conferunt flores lapidis hæmatites
cum

cum sale ammoniaci elevati à 3 β. ad 3 β.

Præscribatur mars potabilis Willitii, & hinc elaboratæ aquæ spadane sulphuratæ.

Pro diaphoretico interserviant sequentes formula.

℞. Theriac. venet. 3 j. antimon. diaphor. solaris gr. 15. vel 3 j. mercurii præcip. diaphor. jovialis gr. viii. olei cariophyll. gut. 3. M. F. bolus in vino emulato dissolvendus.

Vel, ℞. Reg. antim. med. gr. 15. flor. lap. hæmatit. gr. x. confect. de hyaciuth. 3 j. olei maceis still. gut. 3. M. F. bolus ut supra solvendus.

Vel; ℞. Reg. antimonii med. 3 j. croci optimi, gr. viii. salis card. bened. gr. 15. olei feniculi gut. 4. M. F. pulvis.

Laudatur mixtura de tribus seu diaphoreticum in paracutis Paracelsi ex spiritu tartari volatili, sp. vitrioli volatili, & sp. vini theriacalis camphorato confectum.

Vel, ℞. Tart. rhenani purissimi, alum. crud. an. q. p. terantur in pulverem tenuem & exacte misceantur, & ut artis est distillantur per retortam ex arena, spiritum volatilem hinc oriundum rectificatum illi reserva. Præstabit enim illud quod a sale tartari volatili sperare potest, nam potentissime vasa rupta constringet.

Tinctura martis adstringens ex capite mortuo in sublimatione florum lapidis hæmatites educta à gut. 3. ad 10.

In Tympanitide.

Pro fotu in tympanitide præscribatur, spiritus vini theriacalis camphoratus.

Vel, ℞. Herb. menthæ, origani, an. m ij. sem. ummi, carui, bacc. juniperi, lauri q. p. vel an. ij. coq. ex lixivii debilis & vuu. an. M. F. fons. quocumqueatur.

Vel ℞. Ungu. martiat. 3 j. olei philosophi cerebinth lucidæ an. q. s. ad formam luum. quibus addatur salis volatilii aromatici pauxillum: M. l. lument. Ex Anonymi Prax. Chymiatrica.

HYDROPS ANASARCA.

Curationes.

IN Anasarca, quia semper adjunctus est humor spirituosus, viscosus & crudus ad evacuationem ineptus, ante evacuantia medicamenta præmissis tamen lenientibus præparantia adhibenda sunt, alterantia, qualia sunt imprimis syrupus de eupatorio, de absinthio, oxymel compositum, dissolve in aqua agrimonie & absinthii.

Præparato humore evacuatio instituenda interposita tamen præparatione & coctione humorum, ut & confortatione viscerum, imprimis hepatis & ventriculi in primis vis vomitum excitare licet sale præparato, aut aqua benedicta, ut ventriculus a crudis humoribus liberetur, hinc ad ea, quæ urinam & sudores movent, accedendum, ubi maxime commendatur aqua Jacobi Weickeri tantopere in hydrope celebrata.

℞. Liquoris tartar. destillati, aq. gentianæ (cum aq. simplicis per vesic. lactæ) æq. theriac. laur. 3 j. sp. vitrioli, ol. sulphur. angr. x. c. platager a 3 j. ad 3 j. cum acetante ingressum ha-

conici. Maximum quoque arcanum in hoc morbo est gratiola, quæ semper in copia tum purgantibus, tum aliis medicamentis admiscenda potest etiam ex ea fieri extractum vel sal, ex quibus componuntur pilulæ hydropicæ.

℞. Extract. gratiolæ, mechoacan. an. 3 j. Sal. gratiol. gr. vi. l. pilulæ, purgant per alvum & urinam, si non satis purgant, adde extract. trochisc. alhandal cum spir. vin. malvatici factum, quandiu visum fuerit. Possunt etiam hic nonnunquam adhiberi scarificationes in pedibus, femoribus & naribus Joh. Hartmann. Prax. Chymiatrica.

Circa therapeiam designandam duo præcipui hic medendi scopi occurrunt, viz. Primo ut aqua intercus quoquomodo evacuetur, & absumatur, dein secundo provideri debeat ne nova continue generetur & aggeretur, in quem finem danda erit opera medica; tum ut coctionis viscera recementis inanita, & obstructionibus libera chylum ulque laudabilem conficiant, ac in debita copia massæ sanguineæ suppediteant, tum insuper ut sanguis (principis ejus ad absumendum restitutus) Chyli succum ei jugiter lutiūm, rite fermentet, inque sanguinem assimilet. Indicatio vitalis minime in hoc morbo, uti in multis aliis, necessaria videtur; quoniam raro hic adsunt spirituum deliquia, aut vigilæ, pro quibus cardiaca & hypnotica requiruntur, atque victu resumptivo parum opus est, quia jejunium, & abstinencia potius juvant, & sæpiissime in magnam curationis partem cedunt, cujus ratio est, quod vasa per mediam inanita, aquas intercutes, aut alibi stagnantes resorbent, easque partim per renes, poros cutis, aliaque emulsiaria foras ablegant, partimque succo alibi adhuc turgidas corpori enutriendo utilissime impendunt.

Primo, ut prima indicatio curatoria, materiæ morbificæ evacuationem intendens, perficiatur adhiberi debent, pharmaca hydragoga omnia, tum simplicia tum composita, quin & medicamentorum formulæ, infra in cap. de Ascite recensendæ & præscribendæ. Porro huc pertinent non tantum cathartica, & diuretica, sed etiam diaphoretica, quæ licet in aliis hydropis speciebus ut plurimum interdicta, in curatione Anasarce sæpe locum habeant. In simplici Anasarca fortiter purgare licet, & non raro multum juvat. Et quidem ab hoc morbo interdum per Cathartin sanato, empirici de medelis suis plurimum gloriari habent, eorumque medicamina quædam pro curandis hydropicis multum decantata existunt, quippe si forte unum aut alterum Anasarca laborantem, specificis hydragogis, aut elateriis, eos usquam sanasse contigit, satis est de quo se & artem suam semper vantent. Si enim demum medicamento tantum Ascitis os jugularint, Quapropter licet chylæ aut elaterii præparata, pilulæ lunares, Hercules Bovii, aliaque hydragoga in quibusdam casibus nonnunquam profuerunt, tamen si indifferenter hydropicis omnibus, aut omnino ulli constitutione debili & visceribus toni præfracti, ut conformationis laço, prædicto exhibentur, sæpius licet præcedentis medici judicio committatur, quænam quousque & quibus Catharticis utendi meritis, Cathartorum cujusque generis hydropicis

scilicet tum *moderatus*, tum *immodicus* vim suam exerentium, atque tum lenius tum fortius operantium, formulas suprà descripsimus, unde possunt huc referri, & medendi methode jam propolitz accommodari. Quod si ratio inquiratur, quomodo cathartica in hoc morbo operantur, & quare felicius, & multo efficacius, quàm in aliis hydro-pis speciebus aquas educunt, dico in Anasarca materiem *lymphaticam* (quæ lymphæ est) partim in massa sanguinea, partimque in habitu corporis, intra poros & vacuitates vasorum suis interjectas, subsistere; quapropter catharticum fortius exhibitum, illico massam sanguineam exagitat, fundit; & ad superflui oulvis, aut heterogeneæ excretionem ciet; simulque arteriarum oscula, versus intestinorum cavitates dehiscencia irritat, ut per hæc potius emissaria humor è sanguine rejectus exitum inveniat. Hinc imprimis aquæ intra sanguinem fluctuantes copiosè elutriantur, dein vala inanita aquam mox interciturantur, & partim illicò per sedem, partimque per urinas, aut diaphoretin foras amandant; nullus interea metus est ne, ut in Ascite, materies morbifica à sanguine per medicamentum exagitata & fusa, in loca affecta, unde non facillè remeabilis est, amplius adigatur: item ne, ut in Tympanite, propter ventriculi, & intestinorum adbras, à pharmino nimis irritatas, viscera illa in extumescencias *typhoides* accendantur. Quæppe donec viscera erunt firma, & bene constituta medicamenti particule nullam iis noxam infligunt: verum exinde in sanguinem traductæ, non modo aquas ex eo eliciunt, sed massam ejus exagitando, particulas activas prius obrutas exulcerant, & versus *diaporesin* suam *exulcerant* disponunt. Secundò, hydragoga per diuresin operantia, tum simplicia tum compositas, necnon medicamentorum ex utriusque paratorum formulas, & exhibendi modos etiam suprà descripsimus; quæ item (ut repetitione non opus sit) huc transferri possunt. Quoniam vero phar-maca hujus generis non omnia pariter in quibusque affectionibus juvant, advertere hoc subest, pro curanda Anasarca. Lixivialia cæteris diureticis longè præstare. Enim vero tritum & vulgare nunc remedium est, ut quispiam membra habens tumida, post purgationem præmissam, sumat bis vel ter in die lixivium ex cineribus absinthii, vel genistæ cum vino albo facti. *3vi. ad viii.* ejusque usum per aliquot dies continuet. Medicamentum hoc, uti in pluribus notavi, urinas potenter movet, imò nonnunquam in tanta copia, ut lotio suprà sesquicongii mensuram, intra nyctæ hemeris spatium profuso, Egrotantes ferè ad miraculum usque brevi convalescant. Quoritu, & qualis viscera, sanguinem, aliosque humores afficiendi modo, diuretica cujusque generis operantur, in priori tractatu explicavimus; quod verò in Anasarca laborantibus, medicamina sale fixo, & lixiviali, plusquam sale acido, alcali, aut volatili prædita, urinas expellunt, ratio ut opinor hæc est, viz. in morbo isto affectis postquàm deficiente sanguinis, *lymphæ*, & virtute sanguifica, humores aquosi, & crudi tum in ejus massa, tum intra corporis habitum aggesti, ibidem, ferè immobiles aliquandiu permanserunt, tandem illi (prout succorum aqueorum paulò stagnantium mos est) coalescunt; quapropter medicamenti parti-

culæ lixiviales in sanguinem suffusæ, illico cum aquarum acidis effervescent. quas insuper dum exagitant & fermentant, in tota massa sanguinea *lymphæ* insignem, & excretivam ciet; proinde ut particulis omnibus in motum concitis, non tantum aquosæ ac recrementitiæ cæteris extrusæ, per renes amandentur, sed & ipsius cruoris inlitæ & activæ crassioribus quibus obvolvuntur sese extricent, & denuo emergentes virtutem suam fermentativam resumere, & sanguificare incipiant.

℞. Cinerum genistæ, vel absinthii, vel fermentorum vitis ad albedinem calcinat. & cribrat. *3iv.* ponuntur in lagena vitrea cum vini alb. *lib. ij.* digerantur clausè & calidè per *ij.* vel *iv.* horas, dein coletur dosis *3vi.* ad *viii.* bis in die.

℞. Tartar. alb. cum nitro calcinat. & dein in crucibulo ad caruleitatem fus. *3ij.* spiritus vini tenuioris lib. i. *β.* aq. limacum, lunbricorum an. *3iv.* digerantur clausè in furno arenæ per duos dies: dosis liquoris clari *3ij.* ad *ij.* cum decoct. radicum Rusc. & Bardanz, in cervisia facti *3ij.* Pro potu ordinario.

℞. Cinerum genistæ alborum & mundar. *lib. ij.* ponantur in sacculo cum ras. lign. salutaris *3ij.* radicem galang. minor. *3j.* baccar. juniper. & sem. dauci, an. *3i. β.* hat sacculus pro *iv.* congiis cervisiz, post 7. vel 8. dies hauriri incipiat. Diaphoretica in leucophlegmatia (quæ scilicet Anasarca proximum aut declinatio est) non raro egregie conferunt: Cæterum in hoc morbo confirmato, melius quam in aliis hydro-pis speciebus convenire soleat. Et quamvis ab initio propter habitum corporis crassiori velut palude obseisum, sudores movere nequeant, ut-cunq; dum sanguinem exagitant, particulas ejus inlitas activas, antea sopitas, & lemiobrutas exulcerant, & versus *diaporesin* disponi, quin & recrementitiæ qualisq; præsertim aqueas in motum accieri faciunt, proinde statim ut illæ è receptaculis suis exundantes, promptius ac facilius per sedem, vel urinam, & sæpè aliquatenus per *lymphæ* abscedant. At vero postquàm aquis per cathartin elutriatis, materies morbifica in tantum diminuitur, ut corporis moles & membrorum intumescencia remittere incipiant, humoris reliquæ per *lymphæ* moderatam, & diaphoretin constantem optimè absorbentur.

Pro curatione Anasarca, ea maxime conveniunt, quæ in dosi paulò largiori exhibentur: quorum enim quantitas per exigua est, particule eorum activæ aquis immeris obruantur, priusquam in sanguinem diffusa, vires suas exerere possunt. Quamobrem spiritus sive armoniaci, sive vinosi, necnon tincturæ, & elixires, imò ac pulveres contra morbum istum rarius in usum veniunt: quia nimirum in dosi minori minus efficiunt, atque in perampla si exhibentur, effertione sua viscera sæpè lædunt: quin ea potius seligantur, quæ haustu pleniori, & calidè assumta, guinem totum illabata, permeare possunt: cujusmodi imprimis sunt decocta ex lignis & radicibus, quorum particule sanguini satis congruæ, ab eoque indomabiles, totam ejus massam pertranscunt, & vim elasticam, humores omnes commovendo, exerunt.

℞. Ros. lign. sanct. *3vi.* sassaparilæ *3ij.* santalor. omnium an. *3vi.* ras. eboris, C. C. an. *3ij.* a. infund.

dantur, & coquantur in aq. font. ibi viii. ad medietatem, addendo radic. calam. Aromatic. Galang. minoris, Bardan. petasitidos an. 3j. foliorum salvia acuta, chamædryos siccat. an. m. ij. Colatura servetur ad ulum, dosi 3 viii. ad x. calide bis in die, unicuique dosi addi possunt spir. sal. Armoniac. succinat. vel fuliginis gutt. 20. ad 25. vel tinctur. salis tartar. 3ss. ad 3j. Hæc de medicamentis hydragogis internis, quæ lymphas, vel intus versus intestina eliciendo, vel extus ad renes, aut poros cutis pellendo, foras educi possunt: Præterea in usu sunt administrationes quædam externæ, quibus aquæ intra corporis habitum aggestæ commoventur adeoque vel generaliter ad egrediendum per diaphoreticū, aut diuitem disponuntur, vel particulariter, exitu in privatis quibusdam locis facto, protinus emittuntur. In prima classe frictiones, linimenta, lotus & balnea tum sicca tum humida ponuntur: dein aqu. educentia particularia sunt, vesicatoria, escharotica & per acum puncturæ. Super his singulis aut saltem præci piis quatenus ad hunc morbum spectat, breviter dicemus. Frictiones in leucophlegmatia, & Anasarca effectum sæpe utilem præstant: quippe cum habitus corporis non tantum illuvie aquosa illic aggesta adeo impletur ut nihil evaporare possit, sed & partes externæ, propter sanguinis ad eas appulsū inhibitu frigescent, frictiones crebræ ac validæ, aquas ita guantes commovent, & aliquatenus inde dissipant, quin & sanguinem, vias aperiendo in partes eas unde exularet, denuo accient, quare non solum membra intumefacta sed & totum corpus semel aut bis in die cum paucis asperis, aut cum verriculo in eum usum ordinariè nunc parato fricari expedit.

Inter, vel post frictiones, linimenta & lotus interdum conveniunt. Parantur vel ex salibus aliisque mineralibus dissolutis, vel ex vegetabilibus calidis, & discutientibus. cum vini fœtibus aquæ incoctis: quorum applicatio calida poros aperit, aquas aggestas amplius commovet, ac discutit, & jam circuitus sanguinei ambitum aggerie aquosa aliquatenus dissipata protendit. Linimenta consistunt ex sulphure, & salibus diversi generis vel ex calce viva, aliisque mineralibus, in unguenti formam redigantur: quibus ob meliorem consistentiam, olei scorpiion quantitas, idonea adjiciatur: Porro oleum hoc (modo sit genuinum) per se adhibitum, opem non raro insignem præstat.

Balnea hydropi vix ulli præter Anasarcam, atque huic non nisi in diathesi, aut declinatione conveniunt. Quippe cum ab hujus calore totum corpus ambiente, sanguis effervescent, & incitatus aquas prius stagnantes ubique commovet, & in se resorbens varie transfert, periculum est, ne (uti frequenter assolet) eas è corporis habitu, in massam sanguineam excipiens, è vestigio in præcordiis, aut cerebro deponat: quippe nihil utilitatis est quàm partium istarum affectus viz. Asthma, vel Apoplexiam, hydropicis à balneatione intempestiva, supervenire. Attamen cum morbi causa conjuncta, (viz. intumescencia) moderata, aut non multa fuerit, Balneum ex aqua salibus ac sulphure imprægnata, aut etiam Laconicum, à quibus blanda *phlogos* promovetur, non raro

cum fructu adhibetur: pro laconicopius expedit. A insigniter sæpe prodest ut Aggravantes in saliorum Adibus, prope turnos in quib. aqua mineralis, in sale decoquitur, in cellis idoneis collocentur.

Vesicatoria aquas intercuties copiose, & non raro protine nimis emittunt. De modo quo operantur infra speciatim dicemus; interim advertemus hæc caute admodum hydropicis adhibenda, quæ scilicet ejusmodi epispasticum locis tumidis applicatum, emissarium nimis patens facit, quo, pecto, aqua primò erumpens, sæpe magnam post se illuviem & tota vicinia trahit, unde statim sequitur magna spirituum concidentia. Porro nonnunquam locus ita subito inanis, siquidem caloris, & spirituum orbis, brevi in sphacelum labitur; quapropter medicamen hoc raro hydropicorum tibiis, aut pedibus, ubi calor debilis, & tunc or maximus est, sed interdum femoribus, & brachiis secturæ (quoties opus erit) applicetur. Escharotica paulo tutius, quam vesicatoria locis tumidis adhibentur: quoniam ex hoc emissario, aquarum fluxus non tam præceps, & copiosus statim ab initio contingit: verum iste moderate incipiens, deinde paulatim ad fluentem ingens accrescit; quod natura (postquam sensim ei assuescit) melius tolerat. Porro minor ab escharotico, quàm à vesicatorio, gangrenæ metus est; quoniam in ista applicatione, pars ejus continuitas solvitur, contra caloris exolutionem pectus escharam minuitur. Novi olim empiricum indoctum & rudem, qui hydropicorum membra, ut tumida, sequenti modo per escharoticum non raro feliciter evacuabat, viz. Primò tibiis fovebat vesperi & mane cum decocto chili, absinthii, chamomeli, alliarumque herbarum calidarum, cerevisiæ aut vini fœtibus adjectis; atque inter tota tempora cataplasma ex decocto illius magmate cum fursure paratum applicabat; post hæc per triduum usurpata, utramque tibiā cum pede totam cum emplastro ex pice Burgundica, tegebat; relicto tantum super utramque suram foramine exiguo, ad magnitudinem nucis avellanæ, quibus in locis escharoticum ex cinere corticis fraxini cuti nudè imponebat: quo post 12. horas amoto eschara tenuis relinquebatur, è cuius poris, aqua primò lente exuare, dein in dies paulo uberius extillare, & postmodum (eschara decidua) tanquam e fonte aperto, copiosius emanare solebat, donec è toto infra & supra crure elutiretetur. Restat adhuc alius (prioribus non inferior, etsi minus usitatus) aquas intercuties educendi modus, scilicet per Acus puncturam: quod scidem, ne præceps ac nimis accreatur aquarum effluxus, caute admodum & minutim celebrari debet. Accipiatur Acus ordinaria (quæ factores utuntur), & super locum maxime tumefactum, in cutim punctim adigatur, eoque tantum, ut sanguis non sequatur, adeoque hiant uno tempore vi. vel vii. foraminula, pollicem latum ab invicem distantia; ex unoquoque foraminulo, aqua guttatim erumpit adeoque continuè extillabit, donec circumcirca loci puncta tumor omnis evanuerit: dein proxima vice post horas modo 12. modo 18. aut 24. ejusmodi punctura in alia cruris ejusdem, aut alterius parte celebretur, adeoque deinceps semel, aut bis in

die in membro hoc, aut illo unico vel duobus, vel simul in pluribus, talia aquarum intercutum emillaria excidentur. Enimvero hoc modo uberius ac tutius quam ab alia quavis *extractione* exteriori, illuvies hydropica exhausti possit; cuius interea proventus novus, si per internam pharmaniam præcavetur, morbus facilius sanabitur. Porro in hydrope deplorato, optimè per administrationem istam vita prolongatur, in quantum scilicet aquis per emillaria isthæ externæ continue elutriatis, inundatio interna vitalis diutius protelatur. Nuper senex septuagenarius toto corpore, hydrope immerfus, nuci huius remedii ope præter spem omnium per plures menses in vita persistit, & caput super aquas extulit. Hactenus de remediorum generibus & formulis per indicationem primam scilicet curatoriam suggestitis; quod ad alteram scilicet præservatoriam spectat, quæ nempe sanguinis crasin, & virtutem *suppurativam* sive sanguificam restituendam procurat, ejusmodi illa medicamenta suggerit, quæ particulis calidioribus & elasticis prædita, massa sanguineæ principia activa aut depressa resuscitat, aut ablumta reparari facit, in quos nunc remedia alterantia vulgo dicta, sub forma electuarii, pulveris, pilulæ, cum, aquæ destillatæ, julapii, apozematis, & dietæ præscribi solent, quibus etiam spiritus, tincturæ, elixires, interdum majoris efficaciz ergo adjiciantur: Cujusque horum exemplar unum aut alterum proponemus.

℞. Conserv. abint. mar. cochleariæ, flavedinis aurantii, an. ʒij. cortic. v. winterani. ʒij. spec. diæcurcum. ʒiij. Chalybis præp. cum sulphure ʒij. sal. absinth. ʒij. syr. è corticibus citri q. s. f. electuarium, dosis ʒij. mane & hora quinta p. m. superbibendo haustum vel julapii, vel aq. destillatæ ad ʒij. vel iv.

Chalybeata in hoc morbo, uti in Pica virginum sæpenumero egregie profunt; in tantum ut non raro totus aut saltem præcipuus medendi scopus, in hoc remedii genus devolvatur: attamen advertere est, hujusmodi medicamenta non omnia in illis casibus ex æquo convenire: nam quæ maxime in usu sunt, viz. sal. chalybis sive vitriolum martis, aliæque cum acidis præparata ac sulphure in rotum spoliata, nequicquam juvant, utpote quæ sanguinis *suppurativæ* minime promovent, sed potius e contra cum nimis effertum, aut elasticum fiunt. Attamen ad Anasarcam, & quamcunque in habitu corporis Cachexiam œdematofam, ejusmodi chalybeata adhibeantur, in quibus particula sulphureæ relinquantur, & pollent; uti imprimis sunt ferri limatura, & squamma in pollinem redactæ, item Chalybs cum sulphure liquatus, & pulverisatus. Horum pulveres assumti, illico à salibus intra corpus nostrum acidis dissolvuntur, unde particula sulphureæ metallicæ *metallizantur*, & in sanguinem traduntur, totam ejus massam fermentant, particulas ibidem symbholas, autem sopitas exuscitant, ipsique adjunctæ sanguinem vigorant, ejusque vim *suppurativam* sive sanguificam prius depressam redintegrant. Quapropter observare est ab hujusmodi chalybeatibus, vel paulisper usurpatis facili *extractione* in vultum floridum mutari.

℞. Pulv. rad. Ari compos. cortic. Winterani an. ʒiij. radicem galang. minoris, cubearum,

an. ʒiij. chalyb. com sulphure præp. ʒij. sacchar. anthosat. ʒvi. f. pulvis divide in 20. partes, dos. p. j. omni mane & hora quinta p. m. cum haustu decocti ludoriferi superius præscripti.

℞. Extract. gummosi. ridentis post destillationem, elixir vitæ Quercetan. ʒij. pulv. limbricor. præp. ʒij. radic. galang. minoris, corticis Winterani an. ʒiij. salis absinth. ʒij. rubiginis ferri ʒij. balsam. Peruv. ʒij. tinctur. sal. tartar. ʒij. balsam. Capivi q. s. f. massa, formetur in pilulas exiguas, dosis ʒij. vesperi & primo mane superbibendo julapii vel aq. destillat. sequentis ʒij.

℞. Aq. florum sambuci, è succo baccarum ejus fermentato, an. ℔j. aq. limbricorum magistral. raphan. compos. mirabilis an. ʒij. syrup. è succo baccarum sambuci ʒij. misc. f. julapium.

℞. Horum Cochleario hortensis, crucæ piperitidos, an. m. vi. radic. calam. aromatic. galang. minoris, zedoariæ, iridis Florent. sambuci, Ari, an. ʒvi. cort. v. winterani, piperis Jamaicensis; an. ʒiij. baccar. juniper. ʒiv. Caryophyllorum, zinzib. nuc. moschat. an. ʒij. incisis & contusis affunde vinum Rhenani veteris ℔viii. destill. organis communibus, liquor totus misceatur. Decoctum antihydropicum supra inter diaphoretica describitur. Potus diæteticus loco Cervitiæ sumendus juxta formulam sequentem conficiatur.

℞. Rasur. lign. sancti, salaphras, an. ʒiv. radic. irid. Florentin. Calam. Aromatic. Galang. minoris, enulæ campanæ. an. ʒiij. baccar. juniper. lauri, an. ʒij. sem. anis. carui, fœnicul. dulcis. coriandr. anethi, an. ʒij. piperis. longi, cubearum, an. ʒiij. caryophyllor. nucis moschat. zinzib. an. ʒij. piperis Jamaicensis ʒij. folior. siccat. saliv. acutæ, scorodoniz, Calamentiz, Agrimoniz, an. m. j. liquirit. ʒij. incisa & contusa coquantur in aq. fontan. congiis iv. ad medietatem. Colatura frigefacta servetur in lagenis vitreis ad usum: hujus potu constanti plures Anasarca fere deplorata laborantes convalescere novi. Thom. Willis. Pharm. rational. part. 2.

Consultationes.

Morbus quo vir Juvenis N. N. affligitur, nihil aliud est quam Cachexia hydropica, ad Anasarcam proxime vergens, quod ex urina cruda colligitur, quatenus ventriculus quidem appetit, & concoctionem primam dextre tentat, ubi tamen concoctio, jecoris scilicet & lienis minus perfecte subsequitur, utpote quæ do. viscera propter siccam intemperiem, cito nimis aquositates à ventriculo attrahunt, unde tota massa sanguinea aquea & serosa redditur: hinc urina copiosa, & accedente refrigeratione dysuria, sæpius etiam circa pubem atque partes genitales ob affluxum aquositatis, intumescencia generatur. Stomachi compressivus etiam dolor post cibum frequenter adest, quod à cruditatibus in ventriculo relictis oritur, unde post potum frequens est faciei intumescencia, quatenus hac ratione phlegmatica & aquosa collectiones ebullire incipiunt maxime superfluitas illa serosa per tempus aliquot pedes occupare consuevit, ubi quotidie sudoris instar transcolatur, unde morbus levior redditur, cum aliàs proculdubio totius corporis hydropicam intumescenciam produceret

duceret. Ut autem huic dispositioni præternaturam, per convenientia remedia obviam eamus, necessarium eo respiciendum erit, 1. ventriculo, jecori & cæteris membris concoctioni prospicientibus illa convenient, quæ digestio nem promovent, 2. collectio aquosæ serosæ materię dissipanda veniet, 3. tandem interna viscera, tanquam partes mandantes, & exterius parte ut partes recipientes corroborandi erunt.

Quoad primum, vinum laxativum conveniet, tam ad primas vias evacuandas, quam etiam ad aperiendas obstructions in venis minoribus.

℞. Fl. persicor. genist. sambuc. an. p. j. centaur. min. p. s. herb. agrimon. epatic. nobil. gratiol. soldanell. Card. bened. com. absinth. an. m. j. fol. senæ Alexandrin. S. S. ʒj mechoacann. turpeth. gummos. rhabarb. elect. an. ʒiij. rad. ebulli. hirundinar. ireos nostr. an. ʒvi. cichor. ʒss. cortic. sambuc. ʒvi. calami aromatic. galang. an. ʒij. sem. careham. ʒss. sem. cardui benedict. sem. anis. an. ʒj. incisa & contusa dentur in sacculo ex serico albo, pro vino laxativo. Ubi per octiduum ulus vini laxativi continuatus fuerit, necessarium erit, ut singulis diebus bis per quadriduum assumatur pulvis digestivus ʒss. pondere, cum vino absinthii vel c. rui benedicti.

℞. Magister tartar. vitriolat. ʒi ss. fœcul. bryoniæ ʒj. salis cardui bened. Sal. Genistæ an. ʒss. magister. corall. rub. ʒij. misce & divide in 8. partes. Hoc modo digestionem facta sequens electuarium hydropicum aliquoties interpositis diebus. provocatione sumatur jejuno stomacho, quod.

℞. Mercurii dulcificati ritè præp. gr. xv. gutt. gamandæ gr. v. Conserv. rosar. ʒij. misce cum syr. rosar. solut. q. s. Quoad secundum, copia serositatum ulterius minuenda & discutienda venit, quod fieri potest tam per urinas, quo etiam sponte vergit, quam per sudores. Per urinam promovebitur, ubi frequens erit usus spiritus salis vitriolati gutt. v. vel vi. matutino tempore, cum brodio decoctionis rad. petroselin. sumti: per mutationem ergo spiritus terebinthinæ recens paratus etiam usurpari poterit; ut & syrupus sequens, cochlearibus tribus.

℞. Syr. de althæa Fernelii ʒvi. Spir. tart. ʒij. misce. Ad sudorem promovendum plurimum inserviet decoctum sudoriferum, quod hoc modo paratur.

℞. Rad. Chinæ ʒiv. sassaphras ʒij. Rad. cichor. rad. fœnicul. asparagi, eryngii an. ʒj. sem. Dauci, fœniculi, petroselin. an. ʒiij. passul. minor. ʒiij. tartar. alb. purificat. ʒj. Incisa dentur. De speciebus his dimidia pars in 6. lb. aq. ferventis infundatur per noctem in loco calido, manè coq. ad ʒ. Hujus decoct. ʒvi. matutino tempore sumantur, sudoris provocandi gratiâ, quod per octiduum repetatur. Nota vero quod ʒiij. de rob. ebulli, cum ʒj. mithridatii interdum præmitti possint, decocti ʒiij. tantum superadditis, quo tanto felicior expulsio reddatur. Quoad tertium, interius pro corroboratione viscerum diligenter tragema sumatur, cum pane tosto ex malvatico, quod.

℞. Sp. diarrhod. abb. diatrion santal. an. ʒj. dialaccæ, diacurcumæ an. ʒss. magist. margar. ʒss.

Corall. utriusq. an. ʒj. tabul. manus Chr. perlat. ʒj. sacchar. albi. parum, ad saporem jucundum. traga. Exteriorius pedes etiam topica requirunt, ubi conveniunt balneum sudoriferum, partim aquositates eo translatae discutiens & resolvens, partim et iam corroborans, quod hæc ex decoct. nasturtii aq. beccabung. betonicæ, Chamæmeli, bacc. juniperi, laur. cort. ebulli, sambuci &c. sudor linteo, mastiche perfumato, detergatur, adhibito, simul pulvere pro sumo, qui.

℞. Mastich. succin. oliban. an. ʒss. tacamahacæ ʒiij. lign. aloës ʒij. rosar. rub. m. j. f. pulvis pro sumo. Absistero sudore, pulvis, corroborationis ergo aspergatur.

℞. Absinth. vulg. heder. terrestr. scordii an. m. ij. Sabin. m. ʒ. h. rosar. rubr. fl. anthos. flor. stœchad. saliv. an. m. ʒ. farinæ fabar. farin. lentium, farin. lupinor. an. ʒi ʒ. bacc. laur. juniper. myrtill. an. ʒj. myrrh. mastich. an. ʒss. m. f. pulvis per cubium.

In victus ratione caveantur *dicenda*, quæ difficilis sunt coctionis: carnes potius assatæ quam elixæ sint: potus parcus sit, ubi vinum decocto sassaphr. diluatur. Sitis interdum passulis in vino maceratis, cerasis acidis condit. syr. citri, granatorum, berberorum & similibus fallatur. Hæc sunt, quæ pro tempore præscribere volumus, quibus Deus ex alto benedicat. Ulmæ, 14. Novemb. 1622. *Gregorius Horstius de Morbis infim. ventris.*

Abbatissa quædam septuagenaria, pallore totius faciei intumescencia, membrorum carnosorum flacciditate, pedum œdematode tumore, pectoris angustia, lipothymus instantibus, subitanea lassitudine, dejecto appetitu, & similibusprehenditur.

Cum sub initium Febr. 1623. in consilium vocarer, protinus Anasarcam adesse dicebam, ex imbecillitate digestionis provenientem, quod non tantum externa signa testabantur, ut sunt pallor totius, sanguine phlegmatico & seroso cutis substantiæ imbibito, subitanea faciei intumescencia, propter crudum sanguinem in carnosâ cute faciei minus ritè digestum, membrorum flacciditas, unâ cum laudabili sanguine plurimis excrementis in ipsis carnosissimis partibus abundantibus; pedum tumor œdematodes, qualis ex abundantia pituitosi sanguinis oriri solet: Sed interna quoque symptomata satis hoc ipsum confirmabant, uti erat angustia pectoris, tam propter diaphragmatis compressionem, quam etiam propter pituitam viscidam in bronchiis pulmonum, & congestione, & catarrho materiæ defluentis collectam: instans lipothymia, quatenus serum copiosius cordis capulam quoque replebat, ibidemque ebulliens ejusmodi symptoma producebat: subitanea lassitudo totius, ob caloris nativi sæpius imminentem suffocationem: dejectus appetitus, ob copiam peccantis materiæ, vias primas etiam replentem, unde sitis etiam nulla admodum urgebat, In hoc casu leniendi affectus gratiâ, in tam decrepita ætate, eo respiciendum esse dicit: ut singulis mensibus, luna declinante lenitivum aliquod phlegmagogum exhiberetur, 1. concoctio ventriculi roboraretur, 2. jecur etiam ab obstructionibus liberaretur 3. tandem interius angustia pectoris, & exterius etiam tumori pedum, tanquam symptomatibus

urgentibus, succurreret. Pro primo dilutum Agatici ordinavimus, quod.

℞. Agatic. ʒiʒ. zz. ʒj. f. infusio per noctem vino & aq. veronic. q. f. mane colentur ʒiʒ. adde syr. ros. solut. ʒj. extract. diacartham. ʒj. m. f. h. ultus. Pro secundo: corroborationis gratiā læpius uturpet trageam. quæ.

℞. Corall. rubr. præp. ʒiʒ. C.C. usti præp. ʒj. succin. alb. præp. ʒj. cont. arom. rosat. ʒj. manus Chr. perlat. ʒj. m. f. tragea. Pro tertio: frequens sit ulus conservæ radicum chicorei per se, vel cum brodio quodam decoctæ & extractæ. Pro quarto: angustia pectoris succurrendum: exte. ius inunctione, quæ.

℞. Ol. amygd. dulc. hl. alb. an. ʒj. anethini ʒj. cerebuth al. ʒj. ceræ parum. f. limentum. Interius. ℞. Oxyneis squill. ʒj. syr. de hyssopo, de glycyrrhiza an. ʒj. aq. præm. card. bened. an. ʒj. miscet. f. portio p. ʒj. vicibus.

Item. ℞. Aq. althinat. ʒvi. præss. tussilag. an. ʒiʒ. continuanus chr. perlatæ ʒvi. misc.

℞. Flor. sulphuris opt. ʒiʒ. sacchar. cand. ʒiʒ. m. hac pulvis. tumori pedum, totiusque corporis ordinavimus electarium sequens, quod.

℞. Rob. sambuc. ʒiʒ. mithridati ʒj. syr. papav. errat. ʒj. aq. aureæ langii q. f. electarium, immatur ʒj. antefortium. Exterius hac fomentatio per decoctum sudoriferum hoc modo.

℞. Rad. ebuli ʒiv. herb. salix, betonicæ, rosmarini an. nʒj. bacc. laur. m. ʒj. juniper. m. ʒj. incisa & confusa coq. p. balneo sudorifero pedum. Hæc in gratiam agrotantis, ab omni medicamentorum usu abhorrentis, paucissima fuerunt ordinata quibus aliquandiu fuit sustentata, donec morbo, semoque confecta, naturæ debitum solveret. *Idem ibidem.*

Vir quinquagesimum annum agens, temperamentum totius & jecoris, calidi & humidi, habitus tamen potius obesi, & coloris ad album vergentis, & post vitam otiosam, ventri & veneri debitam proximo præterito autumnio, incidit in febrem, primo acutam, mox in diuturnam transmutatam, in qua errores commisit in cibi & potus tum copia tum qualitate, neque ejus accuratam expurgationem admisit. Huic verò successit copiosa & exuberans hæmorrhagia, qua febris recessit, quo tempore tamen tussicula sicca cum exerecit, & statim cessante febre, sub initium hujus mensis, decolor omnino factus est, & albidior facies, manibus & pedibus sensim intumescens, necnon, paucis post diebus, tibiis quæ etiam & femore, & tandem abdomine, & universo corpore, fovea à contactu relicta, tensio insuper in dextro hypochondrio tactu percipitur. De agendis consulit.

Leucophlegmatiam, hypofarcidium, Anasarcam licet aliqui distinguant, synonyma tamen esse unumque, & idem significare voluit Gal. qui proinde ea distinguentes improbat, cum tamen Hipp. leucophlegmatiam, id est pituitam albam non esse hydropem, sed in hydropem tandem disciscere censuerit, qui & in ipientem, non albam sed vulgarem popularem pituitam appellavit. Uterque verò affectus est cachexiæ affinis, namque ex Asiæ in Cachexiæ alimentum agglutinetur quidem, non assimilatur, in Anasarca nec agglutinetur, quod à Gal. desumpsit. Hoc igitur aff. cu. laborat noster Pat. qui sicuti in sola aliqua particula œdema appellari so-

let, ita in toto hydrops Anasarca. Symptoma in actione sanguineatrice depravate latet, quod vitam semper ut refrigerato jecore, & naturali calore delututo, præterea præfenti casu, organico quoque morbo affecto, ut patet extensione, ex tussicula sicca, qui calor licet sæpe ex suffocatione imbecillis reddatur, ob suppressam aliquam sanguinis evacuationem consuetam, hoc tamen casu, ejusdem pauperies & defectus supponenda, ex obeso habitu cum colore totius albicante, antea liberiori vita, Veneri & gulæ dedita, ex febre, cum acuta, tum maxime diuturna, absque accurata corporis expurgatione, quæ omnia ecoris & totius calorem depopulari potuerunt, accedente externa perniciæ, ex copiosa & longe uberiori hæmorrhagia, quæ jecur & totum refrigerans, febriculam quidem extinxit, verum præter naturæ scopum, ob sanguinem vitiatum non solum hepar, sed totius quoque venas cum arteriis, & omnes ejusdem partes refrigeravit, non parum opitulante hyeme, cujus causa jecur crudum & pituitolum sanguinem primo progeniit, qui in venoso genere perfrigerato perfectiori coctione non elaboratus, neque adharere, minulque ob partes refrigeratas assimilari potuit, unde nil mirum, si decolor primo fuerit. 1. at. & postmodum extrema, utpote magis a fonte caloris semota, ac proinde primo perfrigerata intumuerint, moxque totum corpus atque ideo hydrops Anas. r. ca. subortus, fuerit.

Morbus equidem magnus, ratione essentia, quia magna intemperies, ratione partis affectæ, quia læsum jecur, in o. totum, ratione quætionis symptomatum, quia læsa sanguineatio, ratione resistentiæ & pervicaciæ, quia difficilim sanationem admittit, imò ex Hipp. impossibilem cui consentire videtur & Aret. dictus, quod totum hominem permutare Medico opus est quod, neque Diis ipsis facile fuerit. At quoniam facta pericula inter species hydropis comparisone non conveniunt Auctores, Anasarcam enim periculosiorem existimavit Hippocr. & cum eo Anatus, Vega, Vidijs, Tympaniten Altmarus, Valerius Mercatus, Pereda. Alsiton Collaus, Valerius. Avic. Rhasis. Ideo aggredienda curatio, cum soli inveterati hydropes, qui totius habitum corruperunt, Ab Ætio inf. nobiles censentur, de quibus Hipp. 4. Acut. si tamen hic liber sit ejusdem, videtur autem Anasarca minus periculosa, cum humor proprius ad naturam sanguinis acced. t.

Medicæ itaque intentiones curando huic affectui erunt quinque, primò evacuandi humores in primis, vjs conclusi. Secundo auferendæ jecoris obstructions. Tertio totum evacuandum. Quarto corrigenda frigida, tum jecoris tum totius intemperies. Et tandem jecur corroborandum, totumque exsiccandum.

Et in Chirurgico fonte, inter hydropis species, solus hic sanguinis missionem admittit quando sit ex nativi caloris oppressione & suffocatione aut ex plethorica, dispositione, aut ex suppressione mensium, vel hæmorrhoidum. Si cum Hipp. & Gal. Avic. & Trall. verum in principio, alioquin, cum sanguis in cacochymiam desciverit, medicamentis purgantibus utendum. Locus erit ex venis superioribus ple-

plethora vigente, ex inferioribus vero, superprellis menibus aut hæmorrhoidibus. A Italo- rum vero carminatione, quantum heri potest, abstinendum, nec nisi toto tumente corpore adhibenda quæ mente, tum a Galen. tum a Celio proposita sunt. Antiqui Pat. ad Solem, tecto capite, mungebant oleo, multo sale admisso, & multa salugine pertundebant. Alii areus, potissimum marinis & acerbis, hydropicos cooperiebant, detergere enim, detrahere, extendere, digerere, colliquare, & violenter exsiccare materiam sunt aptæ: addit Nicolaus & incinerationes, quorum tamen remedium loco, nos hypocaustis & sudoribus uti solemus, ut infra dicitur: Interim frictiones manibus madetactis aqua vita, pipere alterata, ad- ministrari debent: quibus præmittenda lintheis calidis, sed asperioribus tactæ. Circa velicas, & crustas, velicantia, cauteria, quæ facile a ple- risque, & potissimum a Fernelio excitari so- lent, caute agendum, namque copiosa attracta materia, facile calore particule suffocato, gan- granam inducunt.

Ad primæ itaque intentionis executionem devenimus, lementibus, præparantibus, & purgantibus. Primo itaque.

℞. Elect. lent. ʒvi. hieræ pieræ Gal. ʒj β. magist. mechoac. gr. vi. m. f. bolus duabus ho- ris ante cibum a. s. u. endus.

Vel ℞. Mel. rosat. colat. oxymel. f. aq. vitæ cinnam. an ʒj. m. pro syr. & sic pro aliis. Purga- tur vere materia præparata hac ratione.

℞. Pilul. de hiera cum agaric. alephang. ag- greg. an. ʒβ. magist. mechoacan. m. reform. pilul. cum vino malvatico, & exhibeantur v. ho- ris ante cibum. Repetatur demum præparatio tali pacto.

℞. Syr. de v. radicibus, byzant. cum aceto, oxymel an. ʒβ. decoct. menth. cuscute, pulegii, origani, calamenthi, spicæ ʒv. m. pro aliis, cui præmittatur bolus huiusmodi.

℞. Troch. cyphoidis, de eupatotio an. ʒj. m. & cum vino malvatico reform. bolus & aur. efficaces quoque sunt piluli Trall. Deinde re- petatur purgans, hac formula.

℞. Pil. aggreg. de hiera cum agaric. an. ʒβ. alephang ʒj. magist. jalap. gr. vii. vini mal- vat. q. l. m. reform. pilul. & aur. sequenti vero die, assumat bolum ac theriaca, purgantium enim medicamentorum vim delecteriam corrigi- git. Sed quoniam, tum secur obliuionibus n. agis expeditum & totum accuratius expurga- tum esse par est: ideo utrumque præstare pote- rit syr. cachect. Ferneli conflat enim ex flor. & radic. aperientibus & purgantibus, qui assu- mi debet ad ʒij. quotidie, in vino albo, xii. aut xv. dies. Et quoniam materia noxia in univer- tum corpus redundat: ideo non solum per al- vum, sed & per omnes corporis partes hæc eva- cuanda. Quare secundo loco urinam ducentia usurpanda, & bolus ita parandus.

℞. Tereb. Cypria, lotæ in aq. agrimon. ʒj. sal. agrimon. gr. v. m. reform. bolus, cui super- bibat decoct. prassii, chamædryos, agrimon. ʒvi. spir. sal. gur. v. m. in cuius viâ persistat 15. aut 20. diebus; & si res pro voto succedat, diu- tius quam etiam. Et tandem humor in ambitu corporis hærens, decocto, & sudoribus discuti, & evacuari debet. Paratur autem decoctum ita.

℞. Ligni Indirep. ʒij. rad. imperator. ʒj. lign. sallaphras ʒβ. aq. meliss. agrimon. an ʒβ. m. f. infus. per 24. horas, deinde bulliant ad consumptionem dimidii, in fine ebull. adde vin. alb. odorat. ʒβ. bul. & colatur. seruetur pro tribus vicibus, præsumpto bolo huiusmodi.

℞. Sal theriac. ʒj. sal. absinth. gr. v. pulv. hepa- tis lupini ʒβ. m. & cum vino malv. r. reform. bol. j. & aur. in hac vero intentione, præsentis sunt vius foveæ, sulph. post hypocaustum usurpanda, sicut & luta sulphurea, & balnea Apononia poterunt etiam postremam intentionem implere: quæ si præsto non fuerint, substituantur balneum, ad pedum tumores, lixivio servefacto cum ebullis & sale; facta postea inunctione huiusmodi.

℞. Ol. amygd. amarar. ʒvi. semin. anethi, cymini, baccarum juniper. an. ʒij. salis, alumin. an. ʒij. vini malvat. ʒij. aq. vitæ ʒj. m. bull. ad consumpt. vini & aquæ pro inunctione. Interim in usum revocet absinthium, quolibet modo paratum, vel bibat aliquando cyathum lixivii, ex vino albo & cinere juniperino parati, velutatur theriaca, cum cyphoide, de qua,

Invidet quoties hydropi mala corpora, tior inficit, hæc fiet liber ab Antidoto.

à qua exhibeatur potu asari decoctum. Quare parabitur bolus huiusmodi.

℞. Ther. veter. ʒβ. confect. cyphoid. quon- de vino vocant Arabes, ʒi. hepatis lupini ʒβ. m. reform. bol.

Circa victus rationem Trall. ambiens frigi- dum quam maxime damnat. Victus sit calefa- ciens, attenuans & exsiccan. & medicus inter crassum & tenue. Panis biscoctus. Vinum sit paucum, tenue & antiquum: solo enim parco usu vini malvatici quidam est sanatus, ex Nico- lo; quam minimum bibat, & quamplurimè u- laboret; multum ambulandum, currendum ali- quando est. Ubi concaluerit, adhuc à ven. re absteineat. Ad alvum movendum, utatur pilulis alephang. cum magist. mechoac. Et hæc in c. lu præsentis satis. *Raymund. Joh. Forti. Consultat. m.*

Observationes.

Puella quædam trium annorum anasarca to- tius corporis milata, penitus abhorrens ab om- ni medicamento, per usum mercur. dulc. cum gr. aliquot magist. jalap. restituta fuit morti proxima: quæ repetitis vicibus sine molestia, copiose prædictis evacuata fuit, subsequente quoque quoque balnei medicati u. u. corroborati- onis gratia. *Gregorij Hassii Epist. 2. ad observ. 3. lib. 4.*

Vir quidam vexabatur vermibus longis, cor- pus præterea totum intumescibat, & humore circumluebatur, aderat ciborum fastidium, si- tis inexhausta, faciei tumor, & color albus, uri- nam reddebat rubeam & pauculam. Corpori huic mederi in istum modum.

℞. Extract. esul. ʒij. juris pilorum ʒv. mixta, colataque potioni dabam singulis tri- bus diebus, & cum aliquoties sumpsisset, ver- mes ore longosejecit, alvo vero a quolibet om- nes deiecit: & intra mensem, Dei auxilio præ- ter spem omnium integram sanitatem adeptus est. Victus ratio erat tenuis, vinum bibebat subtile & album, frequenter etiam hoc deco- ctum diureticum.

℞. Bacc. Juniper. contus. m. iij. decoquantur in aq. fontanæ q. s. ad tertias. *Martinus Rulandus. Cur. 64. cent. 2.*

Aqua intercutem cum vehementius urgeretur puer, tantaque intus contracta esset, ut alvus nullam in partem movere posset omni auxilio medicorum destitutus, temerariam sic libertatem vindicavit: quare aqua quantum poterat e potâ in ultimum sese mortis discrimen male sanus præcipitavit. Verum siue id aquæ contractæ impulsu, siue ope naturæ factum sit, soluta est umbilici unitas: indeque tanto impetu aqua prouolare cepit, ut supra ventrem cubitos tres ascenderet: quo sane vitam finisset, nisi circumstantes opposita manu aquam fluere non permitterent: hinc medico accessito, & aqua paulatim educta, ac curioso victu, & cæteris quæ ad rem facerent adjunctis, brevi tempore in pristinam redactus est sanitatem. *Antonius Beneventanus cap. 12. lib. de abditis morborum & sanationum Causis.*

Vir quidam robustus, mediæ ætatis, postquam febre quartana epidemice contracta, & ab initio male tractata supra annum laborasset, ac interim malâ victus ratione usus fuisset, in hydroperem Anasarcam incidit, quæ deinceps, cum profici (quæ immanis erat) restringenda potui liberalius indulgeret, brevi in immensum crecevit; adeo ut membris omnibus à capite ad calcem, ipsoque insuper abdomine intumefactis, se in lecto de latere in latus, sine ministrantium ope devolvere nequiret. Hunc primò invisens, & de curatione desperans (sicut Medicus apud Celsum lib. 3. cap. 21. qui Hydropicum quendam intemperatum sanari posse negabat) illico prognosticon hoc dixi, cum scilicet ni potu abstineret brevi interituum. Ad quod respondens ille, profitebatur se, modo salvari possit, hebdomadæ spatio non omnino hibiturum. Et quidem dictum factum, admodum licet siticulosus per 6. aut 7. dies vix quidquam liquidi, nisi quod medicamentum fuit ore ingerebat; atque per id tempus, cum interim hydragoga Cathartica, & diuretica, quin & alia quælibet præscripta sedulo assumeret, multo melius habuit: & postea methodo (qualis supra describitur) aliquandiu adhibita, ad sanitatem integram restituebatur, & etiamnum post 5. circiter annos vivit ac sanus degit. *Thom. Willis, Pharmacent. rational. part. 2.*

Olim pro generoso quodam valde cacochymo & doloribus nocturnis a lue venerea, male, aut minime curata, oriundis miserrime divexato consulebat. Multa præscripsi, sed in cassum; quia medicamenta plurimum obhorrens, ferè nihil præter laudani dosim semel tantum aut bis in hebdomade pro sedandis doloribus ei concessam sumere voluit; brevi hydropicus factus, ab Ascite simulque Anasarca in tantum intumescibat, ut vix à latere in latus, sine ministrantium auxilio se devolvere potuerit. In hoc statu ad eum denuo accessitus, & præceptis medicis obstinatum reprensus, quod supererat, mortis non longe abfuturæ, & pro certo expectandæ, propterea ut se, & res suas propter æternitatem componeret, prognosticon dedi. Ille non multum perturbatus, obnixè rogabat ut diutius gratia Laudanum nostrum, parcius ante permissum ad libitum, aut saltem quoque vespere sumeret:

hoc cum addixi, Postea pharmacum illud quotidie sumpsit ille, & quotidie dosim auxit, ita, ut brevi tempore quantitatem ejus vix credibilem absumisset. Pharmacum hoc unico constanter usus in dies melius habuit, ac intra mensis spatium in tantum convaluit, ut, tumore omni, & doloribus immunis factus, stomacho valeret, & foras obambulare. Ab assiduo hujus opiæ usu, litis, antea multum urgens, cessabat; & quaque nocte in sudorem magnum dissolutus, insuper & urinam copiosam excernebat. *Idem part. 1. Pharmac. rational.*

Ingenuus annor. 20. adolescens, post inordinatam victus rationem, & largiorem aquæ potum, leucophlegmatia correptus, atque juxta Hipp. decretum, lib. de int. affect. hydragogis, diætâ exsiccante & hepar roborantibus, quinque mensibus tractatus est. Tandem natura a crudorum humorum saburra quadantenus sublevata, residuum causam morificam à centro ad circumferentiam propellens, quinque magnos divertis in locis produxit abscessus, quibus suppuratis & ultra libras tredecim materiæ purulentæ effundentibus, Adolescens restitutus est. *Nicol. Guil. Beckers.*

C. I. S. à S. ab infantia aquæ simplicis potui assuetus, vini & cerevisiæ profus abstemius, octennis à Gonzaga, Principe quodam Italo, in Siciliam deductus, diæteticè valde, Italorum more, educatus fuerat; octennio post Germaniam reversus, in R. & I. D. A. S. E. F. D. B. Epheborum nobilium numerum receptus est. Sed cum more aulico inordinate vivere, equitationi & venationibus dies noctesque indulgere, ac vigiliis multis sese defatigare oportuit, ex humorum crudorum collectione in leucophlegmatiam, & denique in anasarcam, concomitante scabie valde molesta, inciderat, Monachii Proto-Medici Electoralis cujusdam percelebris curæ & medicationi se commiserat, qui illum priori sanitati quidem restituit, hac tamen adjuncta cautela, ut in posterum ob stomachi debilitatem & jecinis discrasiam, aquæ frigidæ & simplici desuesceret, omnia cruda, salia, & acida vitaret, & placatiori vitæ generi studeret. Verum ad aulam Principis sui is rediens, ex juvenili licentia, ac posthabitis diætandis præscriptis, febre tertiana notha afflictus, in veterem mox tumorem hydropicum relapsus, Ratisbonam veniebat, atque consilium meum inplorabat: quem demum intra bimestre penitus omni hoc malo levavi, & inter alia vino quoque paulatim assuescere feci, dum primò decoctum aquæ simplicis, corticibus citri exterioribus & recentibus tinctum, in mensa potui porrigi, subsequenter aliis diebus succum carnis citreorum immisceri, paulatim vero, sed inscio illi, vinum postea aq. dilutum opponi jusseram ac ita frans feliciter successit, ut posthinc se bene haberet, & vini amantissimus in Oenomachia alteri non facile cederet. *Helvigii.*

Anatomica Inspectio.

Corpora siue pituitosa, siue fibrosa sæpius in cadaveribus Clicheeticorum, diuque & frequenter ex morbis decubuum inveni. Basilæ anno 1644. cum Clar. D. D. Felice Platero, sceminam ascite & Anasarca diu ægotantem, tandemque satis concedentem aperui. Invenimus cordis sinistrum ventriculum & aortam arteriam

teriam, in quibus corpora hæc contenta erant, tantum non duplo fuisse majores naturalibus. *Joh. Jac. Wepferus Exercit. de Apoplexia. pag. 196. & 200.*

Juvenis Anasarca diu cum laborasset, subito incidit in ictericiam, deinde in hæmorrhagiam narium, post in subitam mortem. In cujus cadavere aperuit. Hepar subalbidum, cum magno abscessu in parenchymate, lien supra modum maximus, lapidibus albisimis plenus. *Nicol. Fontanus Respons. & curat. pag. 90.*

Sexagenarius qui mendicando vitam sustentaverat, postea valetudinarius in Nosocomium delatus est, ubi per tres septimanas commoratus obiit. Ante sex circiter menses ex victu pravo in leucophlegmatiam inciderat, quæ paulatim in hydrotem Ascitem, & hydrocelem insignem Scroti degeneraverat aderat insignis pedum tumor, appetitus dejectus cum perpetuo alvi profluvio, ex dejecto viscerum tono.

Cadavere aperto, hæc p. n. erant præcipua. In abdomine aqua reperta mediocri copia, multum enim natura aut per secessum aut per diadosin exoneraverat: Hepar à naturali statu non multum aberat, nisi quod paulo pallidius; Sed lien tam exiguus ut dimidii magnitudinem, quæ rem naturali est, vix haberet; similiter flaccidus valde & pallidus erat. Ipsiusque vasa, quæ ad Portæ truncum & ventriculi fundum feruntur, vix præ tenuitate conspicua; in folliculo fellis (qui tamen mediocrem bilis quantitatem tenebat) tres erant calculi miræ constitutionis, unusquisque enim eorum mori fere figuram repræsentabat, nisi quod altius incisi erant, & partes ita sibi cohærebant ut uix rariores in uno racemo, cæterum leves, nigre & friabiles, carbonis tenerioris instar. Renes à naturali magnitudine & situ ut non aberant, sic colore multum à naturali recesserant: nam latis fere instar albicabant; in thoracis cavitate sinistra aquæ nonnihil inventum, quæ & in pericardio debito plus abundabat. Dextri autem lateris pulmopassim partibus continentibus erat adnatus, totusque fœdo ichore scatebat, cujus vitia etiam in sinistro apparebant, cordis autem cavitas, ut & magna ejus vasa humore viscido, albo & tenacissimo intarcta erant adeo ut credibile talem & sanguinem in ipso fuisse, O. *Hearnius observ. 19.*

Anno 1625. Religiosi cujusdam Anasarca defuncti cadavere aperto pulmones utriusque costis arcte adhærebant, cætera omnia vitii experta: *Joh. Rhodius Manxilla observ. 10.*

Non immerito Hippocrates 1. Epidem. Sect. v. occasiones considerare jubet ex quibus laborare quis incipit, sive ex capitis sive auris, sive lateris dolore. Etiam si autem Galenus non uno loco asserat antecedentem causam neutiquam in orbem gignere, nisi adsit præcedens dispositio, id tamen certum est eam esse quarundam causarum externarum efficaciam, ut vel corporibus optime constitutis effectum imprimant citra apparatus morbosum. Exemplum nuperrimum suppeditavit exiens September anni 1678. Pueri duo, spectatæ familiæ, laudabilis constitutionis, unus decennis, alter quatuor annos natus, puerili affectu, capitis scilicet scabie, leviter infecti, à vetula inunguntur butyro, (ut asseruit) cocto & salito, alteri rei impermisto, vix exacto bi-

duo major natu leucophlegmaticus evadit toto corpore, accedit difficilis respiratio & sius intensa citra tussim: Porrigitur illi ptisana ex radic. fenicul. & irid. recent. confecta, ex muliercularum consilio, ad alvum simulque lotium cienda, unde intendebatur tussis, triduo, horis matutinis, ante obitum accersor: in parato erat potio purgans, cujus exhibitioni animo, ad lerosi humoris eductionem, quam puer effudit, vomitu se haultam exclusisse dicens: ob affectus urgentiam manuum in iusculo dissolutam cum tartari cremore & pulvere mechoacann. præscribo, cujus hauritum vomitum illico sequutus, vix enim continebat ventriculus, in angustias redactus à subditorum viscerum tumore, abdomen quippe (sicut in hydropico) admodum erat dilatatum. Exhibitum tandem mortuum ex mechoacanna non respuit ventriculus, a quo plures & numeroz dejectiones, quanquam venter nihilum detinuerit. Paulo post suffocationis metus ingruit, respiratio ne *perit*, atque ut equus curru fatigatus illa ducit Pueri injecti clysteres (cui soli præsidio postmodum locus fuit, ob collapsas vires) ne momento morabantur, quanquam humorum copia & flatuum succederet. Alimentum, ne angustia major evaderet, exiguum & ex cochleari tantum dabatur, succus scilicet ex coxa vervecina expressus, addito ovi vitello. Respiratione tandem difficilior facta, aucto tumore ventris & totius habitus, præsertim labii superioris, exacto tertio, à quo mihi commissus fuit, die interiit: exenterationem concessere parentes, quod frater ejus natu minor, toto corpore esset tumidus, quanquam *ipso*, islemque premeretur symptomatis, inter quæ impeditus in dorsum & latus sinistrum decubitus, cum *deperit*, quod delitesceret arteria, nec se explicare illi liceret, obruta à madore carniū.

Referato abdomine vastum jecur se obtulit, lienem altero extremo contingens, sed citra labem: ventriculus exhibitum paulo ante obitum succum carnis continebat, cui lumbricus semivivus innatabat. Intestina flatibus, fœcibus & lumbricis turgebant; Lien naturalis erat, quanquam in plures lobulos discretus: vesica lotio semiplena, quod paucissimum toto morbi decursu emisit: Renes fœre inculpati: mesenterium glandulis destitutum, videbatur, quanquam ansam tumori illarum, ob *adhesionem*, dedisset puer veracissimus. In pectore mortis & affectus causa se exhibuit; quod hydrope laborabat, sero enim cruento, latere præsertim dextro, erat repletum: pulmones, sinistri costis versus dorsum arcte affixi erant: utrique vitiati, colore vario, viridi nigro: dissecati ubi candicabant, purulentam materiam effundebant. Cor erat magnum quale adulti hominis: aqua copiosa in pericardio, caput apertum non fuit quod causa mortis manifesta videretur *Christ. Unarionius Consil. 378.*

In Cadavere femine Anasarca laborantis, sequentia notanda erant: Ex abdomine aqua effluxit subflavi coloris in mediocri copia, odoris admodum foetidi. Peritoneum, om. ntum, & intestina parvis cirsofulis durioribus inquinata, valdeque inflammata, muco undique oblitata diver-

diversæ magnitudinis, quarum majores imperiorem excedebant; hæ per incisionem apertæ & extractæ materiam continebant albicantem & quasi tophaceam. Lien parvus & subrotundus, colore tamen naturali. Pulmones lividi, lobusque dexter inflammatus, ex quo inciso sanguis stillabat nigricans. *Carolus Razzer in Miscell. cur. anni 4. observ. 3.*

Nobis scœnina vidua, per multos annos pedem graviter ulceratum & fontanellam etiam in altero pede habuit. Horum diuturna molestia defessa per Chirurgum consolidari curavit, quo facto, statim spirandi difficultas occupat, appetitu edendi non ejecto, imò, ipsa dicente, jam vegetiore reddito, ita ut desiderio indulgere, ab asthma, nunquam ausa fuerit. Tandem totum corpus intumuit, & asthmate aucto, viribusque diuturnitate fractis & attritis, vitam reddidit.

In hujus post mortem latere sinistro, ad lienis situm, abscessus, quem omnium cum admiratione occultum habuerat, apertus inventus est, ex quo, defuncta jam ipsa, magna foetidissimæ saniei copia effluxit.

Sunt per plurimi, & nomine & superficie nati Medici, qui causam hujus asthmatis & ulceris occulti, fontanellæ aut ulceris consolidationi imputarent: quod reverà non est, si quis solummodo consideret, fontanellam, esse aliud nihil, quam ulcus artificiosum, cujus partis evolutus, non ab omni parte corporis corrodat, sed in ipso hoc ulcere produci, a succo nempe chyloso, ex vasculis in ulcere ruptis, emanante, & ob acoris contractionem, coagulante. Sunt certe cœci & calpis terram rostro evertentibus, qui hoc non animadvertunt. Unde ejus ulcus in altero pede ortum duxit: nisi ab humoribus eodem in loco restagnantibus, unde inflammatio & ulcus: vascula interim lymphatica, continuo lympham reddentia ulcus, ne ad consolidationem duceretur, perpetuum produxerunt. Eandem ob restagnationem, ulcus in latere sinistro, productum; eademque causa pulmones reddidit obstructos, aërique spirando minus permeabiles, unde respirandi difficultas & asthma. *Stephan. Blancard. in anat. prædic. rational.*

Judicis secundarii Nemausensis, Anasarca defuncti, cadaver tunivultuariâ anatome dissectum & exenteratum, sero diffuebat. Viscera inculcata. Vescicam felleam lacteus humor distendebat. *Ex communicatione Clariss. Rivalier Medic. Nemausens.*

HYDROPS PECTORIS.

Pectoris regionem Hydrope nonnumquam affici, & certo & multiplici iudicio plane constat: namque illud in viventibus aquarum fluctuantium sensus ac sonitus, inque defunctis *anatomica* evidentissime demonstrant. Attamen circa morbi hujus causam, & fiendi modum, quibus nempe viis, & quasi rieu dispositis, aquarum intra Thoracis specum aggestio primo incipiat, dein sensim augeatur, & sæpenumero insensim donec morbus deploratus evadit continuetur, res adhuc in abstruso latet. Siquando hydropis aut Anasarca affectus generalis existens, & car-

nes, & viscerum cavitates, ubique, aut plerisque in locis occupaverit, nihil mirum est, si aquarum istarum illuvies etiam pectoralia occupabit; attamen præterea interdum accidit regionem Thoracicam, aut primo, aut solummodo inundari, cæteris interim partibus ubique satis sanis, aut secundario tantum lætis.

Circa morbi hujus ortum & generationis modum valde ambigitur, undenam & per quos ductus, aquarum illuvies, uspiam intra Thoracis specum reperta illuc perveniat, Authores nonnulli eam desuper, viz. à capite per tracheam descendere, aliique scaturiginem ejus ab infra derivantes, à cavitate abdominis, quandoque item ab hepate vel liene, aquas istas in pectoris cavitate per vias nescio quæ ex cas deterri itant. Verum neutra ex his sententiis aut assensum mollium vendicat, aut elenchum me recurt nullus enim sanguinis, & humorum in corpore transitus perpendens, aut hanc, aut istam commeatu viam agnoscet; quin vero statuere oportet, humorem serosum hydropem pectoris excitantem, illuc pervenire, aut specie vaporis, quia præcordiis & Thoracis parietibus exhalatus, in quam facile condensatur; vel 2. serum illuc deponitur sub propria forma, quatenus nempe è vasorum, sc. Arteriarum oculis referatis, in cavitate istam exudat. Utrum lymphaductus, aut chyliiferi alicubi aperti, aut disrupti, morbum istum quandoque pariant, mox disquiretur.

Quoad prius, in tantum probabile est, Hydrope pectoris, à vaporibus intra specum ejus condensatis nonnumquam oriri, ut mirum videatur quomodo uspiam secus habeat, aut quispiam à tali affectu immunis degat. Quantum enim vaporis est, quod à sanguine ebulliente decedit? cumque in præcordiis ille insignius defervet, qui fieri potest, quin vapor copiosus in claustris hoc, velut sub Alembico conclusus in aquam condensetur? Et quidem non facile erit determinare, cum halitus vaporosi intra pectoris specum ita perpetim aggerantur, quid de his fiat, quomodo absumantur, aut exinde foras ablegantur. Profecto dicendum erit, eos vel Thoracis parietes penetrare, vel (quod potius videtur) in pulmonum poros insinuari, adeoque inter expirandum avolare. Utraque sane via vapores Thoracici exhalare possunt, & forsitan si alterutra deficiat aut præpediatur, propterea hydrops pectoris accietur.

1. Verum insuper opinari subest morbum hunc etiam modo altero, (viz. quatenus serum sub propria forma è vasis exudat) interdum contingere. Enimvero in constitutione corporis cacochymica, aut valde scorbutica, ubi sanguis aquosus & debilis serum superfluum è compage sua passim dimittit, & ab arteriarum oculis etiam laxis & patentibus ubique efficiens circulationis filo excludit, nihil ulitatus est, quam cavitates, nec viscerum, non & præcordia, imò & cerebrum ipsum illuvie aquosa inundari: porro in tam generali ad hydrophen diatesi, regionem modo hanc, modo istam vel alteram, primo & nonnumquam fere tantum occupari: quandoque item penetralibus intactis, carneis exterioribus, sc. musculos eorumque interstitia, ab illuvie serosa inundari.

3. Inter vasa materiem hydropicam in pectoris cavitate infundentia, lymphaductus, & Tubi-

Tubi chyli ferri merito in suspicionem veniunt. Ad priores quod spectat, *de his* Anatomica constat, ingens horum satellitum totos pulmones perreptare, atque ab exterioribus eorum oris citius latos, versus ductus Thoracicos tendere,isque laticem suum, quem à sanguine arterioso superfluum ubique absorbent, maxima ex parte infundere. Si quando igitur hæc vasa obstruantur aut quoquo modo à munere suo defungendo impediuntur necesse erit aquarum in pulmone agglutinationem fieri; quæ postea in pectoris cavitate decedentes, regionis istius hydropem, excitabunt. Enim vero hac lymphæ in compagem pulmonarem restagnante sæpenumero accidit vesiculas hydatidas dictas, in extrema hujus visceris superficie excitari, quæ postea diruptæ, & aquas in thoracis cavitate dimittentes, ibidem Ascitem producant. Hujusmodi affectio in ovibus, quando ob tempestatem humidiorum, & pascua aquosa ab hydropem gregatim intereunt, passim ceruitur. Et quidem nonnunquam in homine, pectoris Ascitem à tali causa procedere sequens Historia (cujus subjectum morbi hujus spirans exemplum exiit) plane arguere videtur. Nuper Adolescens satis sanus & robustus venationi, equitationibus improbis, aliisque corporis exercitiis quantumvis immodicis, dudum impune assuetus, tandem in Thorace plenitudinem seu velut inflationem quandam perlenit; intantum ut pulmonis latus sinistrum intumescere, & cor extra locum suum dextrorū protrudi videretur: ea namque ex parte pulsatio ejus maxime percipiebatur. Postquam in hoc statu aliquandiu persisterat, quodam die ejusdem quasi vasis intra Thoracis cavitate dirupti sensum habuit, indeque per semihoræ spatium in regione ista humoris velut ab alto in pectoris fundum cecidit, stillicidium non tantum ab eo percipi, sed etiam ab istantibus audiri potuit. Quanquam affectus hujus raritate primo attonitus esset, quia tamen exinde vires, appetitum, somnumque, aliisque naturalia satis recte valeret, mox denuo securus, & medicinarum negligens evasit: postmodum vero à corporis motu, inclinatione, aut agitatione quavis in latere sinistro aquæ intus agglutæ fluctuatio ab ipso perleniebatur; quin etiam ab aliis motus, & sonitus evidenter, tum tractatu tum auditu percipiebatur. Hinc cum extra dubium fuerit Domium insignem pectoris hydropem tunc affici, ita verisimilimum videbatur morbum istum ex eo originem duxisse, quod lymphæ ductus ad pulmonis latus sinistrum spectantes prope insertiones suas in ductum chyli ferum primo obstructi, ad molem ingentem intumescerent, & postea dirupti humorem suum in Thoracis cavitate extillarent.

Quando nunc præcordiorum arcisque adeo vitalis inundatio immineret, tandem vir egregius sibi prospiciendum ratus medicinam adiit, & curationis ergo pharmaca quædam rursus sumit, sine ullo tamen fructu notabili. Deinde Londinum adveniens primo D. D. Louver sibi prius notum consuluit. Hic Thoracis apertionem quasi unicam remedium proponens D. D. Michlethuvair, neque in consilii partes adscisci curavit. Dein communi statim omnium consen-

su lateris sectio decernitur, itaque post factam totius provisionem, chirurgus inter sextam & septimam vertebra cauterium applicuit, & postmodum foraminum in pectoris cavitate secto canalem indidit, quo facto statim liquor crassus, ac instar chyli albescens, & quasi lacteus effluebat. Hujus prima vice tantum sex circiter uncie detrahebantur, & postmodum tantundem. Die tertio cum paulo major quantitas exire sineretur, magno statim languore affectus, & deinde febricitans per diem unum aut alterum male habuit. Quapropter donec temperiem & vires recuperaret, materiam illius exitum inhibere, visum est: postea vero ejusdem evacuatione tantum parca quotidie facta, pectoris cavitas fere in totum manebatur: ad hæc vero canalem cum epistomio in foramine gerit, quo semel nycthemeri spatio aperto humoris usque tantillum emanat: interim, stomacho vultu & viribus valens, foras obambulat, equitat, aliisque exercitia prius assueta satis vegete obit. Pharmacia haud multa usus est aut opus habuit. Post sectionem cardiaca temperata, sc. pul. perlarum, Julapia, & quandoque hypnotica, & postea decoctum traumaticum quotidie bis sumendum præscripsimus.

Hæc methodo, & medicamentorum formulis aliquandiu continuatis, vi insignis temperiem, vires, corporis habitum, uno & pectoris immunitatem recuperare visus erat, usque tamen cannam argenteam in lateris foramine (e quo ichor quotidie effluit) gerebat: cumque post aliquot menses hæc subtracta fonticella ista occluderetur, intra pectoris specum, ejusdem humoris, per sonitum & fluctuationem perceptibilis agglutatio fiebat: deinde vero cum recurrente morbo idem recurreret remedium, proindeque lateris apertio decerneretur (forte natura hoc chirurgi munere defungente) ea sponte obveniens, materiam ad erumpendum aptæ exitum præbebat. Jamque necesse incumbit ad præcavendam pectoris illuviem, foramen istud quasi lacunam constanter patcheri.

Ex his satis constare arbitror, pectoris Ascitem quandoque ob vasa lymphatica intra pulmonem dirupta exoriri; nec minus dubito quin idem affectus etiam à ductibus chyli feris intra thoracem distractis excitari possit; attamen hic casus tam raro contingit, ut cum hæcenus neque ex propria observatione, nec aliorum relatione cognoverim. Porro minime refert talis morbi ætiologiam inquirere, quia non tantum incurabilis, sed brevi lethalis existit, quia sc. à chyli inundatione præcordia statim obruentur, simulque sanguis & spiritus animales succi nutritii vectigali solito defraudati illico exolvuntur.

Ex variis hujus morbi causis modo designatis, facile erit differentias ejus colligere: nempe primò pectoris hydrops aut affectio simplex & primaria est, regioni huic peculiaris; aut secundaria, sc. hydropi generali superveniens ut in cachecticis crebro assolet. 2. hic morbus distinguitur quoad loca affecta nempe quatenus aqua vel in toto pectore colligitur, vel tantum in altero ejus latere. 3. quoad materiam in Ascite pectorali agglutam, quæ modo limpida & plane aquosa est, modo crassior, albicans & quasi lactea, qualis in præcedenti historia describitur.

Signa diagnostica satis manifeste hunc morbum

bum produnt: nimirum aquarum fluctuatio tractatione, & corpore inclinato sensu percipitur, ejusque sonitus plane auditur. Porro affecti tussis sicca & inini plurimum molestantur, nec non dyspnœa fere continua & gravi, præsertim dum loca acclivia ascendunt, afficiuntur: insuper adsumunt sitis cum febricula, & noctu post primum somnum, propter vapores a calore tunc intensiori elevatos, magna inquietudo, & corporis jactatio. His interdum accedunt cordis palpitatio, pulsus intermittens, aut perturbatus, & crebra animi deliquia. Quoad prognosin, morbus hic sanatus semper difficilis exiit, & ex opinione vulgi incurabilis habetur. Et revera si abdominis Ascitis aut Anasaræ in toto corpore excitata superveniat, deploratus jure cemetur; attamen si affectio sit primaria, & corpori alias sano contigerit, de curatione haud protinus desperetur.

Quod ad morbi hujus Therapeiam spectat, indicationes primariæ, juxta communem in plethorice aliis affectibus medendi methodum, erunt tres: sc. curatoria, præservatoria, & vitalis.

Prima aquas in pectoris cavitate aggregatas quoquo modo evacuandas respicit. Secunda, Ne inde nova ibidem illuvies colligatur, præcavet. Tertia, vires instaurandas, & symptomata eas lætentia quamprimum tollenda procurat.

Uc primæ indicationi satisfaciat, atque ut per Ascitis inamatur, dux tantum viæ seu evacuationis modi, quibus aquarum illuvies ista educatur, occurrunt: nuntum vel ut pectoris vasa & humorum ductus inanti lympham istam rarefactam resorbeant, & dein aut sanguinis aut aeris permeatu foras convehant; vel secundo ut per lateris sectionem aquæ istæ in propria specie assidue educantur.

Prior ille modus etiam rarius, quandoque tamen succedit: quod equidem ex propria observatione testari possum. Enimvero pulmonum compages, intus spongiosa, & extus porosa admodum, aquis substratis dum quaque distoles vice immergitur, eas in vaporem conversas nonnumquam imbibit; adeoque vel sanguinem remandat, vel cum aere jugiter expirato ore exhalat. Hujusmodi effectus pro morbo isto sanando ut facilius contingat, subsidia medica hic in usum adhibentur: itaque propter intentionem istam sanguinis, aeris, & humorum ductus quantum licebit manici, & vacui servari debent. In hunc finem purgantia diuretica, & diaphoretica mitiora methodice, & per vices exhibeantur; item remedia Thoracica & expectorantia locum vendicant; victus sit tenuis & calfaciens, & ejusmodi quoad omnia regimen instituitur, quod sanguinem plus exhalare, & humores quosque superfluos evaporare faciat. Medicamentorum in hos usus accommodorum libet hic formulas quasdam subicere.

℞. Radic. cherefolii, Rusci brucei, poly-podii qu. ana ℥i. folior. eupatorii. Adianthi Botryos, hederæ terrestris, ana M. j. sem. cattharæ ℥i. radic. Ileos florentin. ℥ss. sem. ebulli 3v. rad. calami Aromatici ℥ss. coquantur in aq. fontan. ℔. iiii. ad tertie partis consumptionem, dein colaturæ adde foliorum semina ℥i. Agriaci ℥ii. mechoacæ turbiti, an. ℥ss. santal. citrin. ℥i. rad. galang. minoris ℥i. ebullient clausæ per ho-

ras ii. dein coletur. adde mellis opt. ℥ii. & clarificetur cum ovi albumine, f. hydromeli purgans, dosis ℥vi. ad viii. mane bis, vel ter in septimana.

Vel, ℞. Calamelanos ℥j. resin. lalap. ℥ss. Balsam. peru. q. s. f. pilul. iiii. sumantur mane repetendo intra v. vel vi. dies.

℞. Tincturæ sulphuris ℥iii. capiat. gut. vii. ad x. hora somni & primo mane in cochl. j. mixturæ sequentis superbibendo cochl. iiii.

℞. Aq. limacum, lumbricorum, Raphani composit. ana ℥iii. Aq. è succo baccarum sambuci fermentat. ℔. j. syrup. è succo hederæ terrestris ℥ii. misce, f. lalapium.

Vel, ℞. Tinctur. gum. Ammoniac. vel galbani; exhibe ad gut. xx. vesperi & primo mane cum eadem mixtura.

Vel, ℞. Millepedarum præparat. ℥ii. flor. sulphuris ℥ii. florum Benzoin. ℥i. pul. sem. Dauci, bardanz, an. ℥ss. Terebinthina Venet. q. s. f. massa, formetur in pilulas, exiguas, sumantur iiii. vesperi, & primo mane superbibendo haustulum ejusdem lalapii.

Hora noni matutina & 5. p. m. sumatur haustus aquæ calcis vivæ composit. ad ℥iiii. per se, vel cum alio medicamine appropriato.

Pro potu ordinario sumatur bochetum sequens.

℞. Radicum salsaparil. ℥vi. china ℥ii. lign. santal. albi, citrin. ana ℥vi. ras. eboris, C. Cervian. ℥iii. rad. calami. arom. ℥ss. passul. exacinat. ℔. β. liquir. ℥iii. f. a. infundantur & coquantur in aq. fontan. ℔. xii. ad vi. f. colatura.

Olim ante xxv. annos cum Oxonii degerem, ad Juvenem scholarem accersiebar, qui per tres hebdomadas de dolore Thoracis, & dyspnœa gravissima vesperi constanter, insuper a corporis motu citatiori, aut gressu acclivi supra modum infestante, laborabat: in neutrum latus diu potuit discumbere, verum necesse habuit in lecto supinus atque jacere, & cum capite erecto; si forsitan in latus alterutrum discumbere nitetur, corporis situm illum illico dolor affligebatur, & si forsitan a latere uno in alterum se devolveret, etiam dolore statim translato, persentiret velut aquas e loco in locum fluctuare. Hinc merito Ascitis pectoralis suspicio incidit, de quo ut certior fierem, præcepi ut supinus supra lectum jacens, caput a margine ejus usque ad pavimentum reclinari sineret; illico persentiret aquæ versus claviculas decursum, sin ulquæ illuc doloris metastasin: insuper his si quando a motu, calore lecti aut foci corpus plus solito astuteret, illico in Thorace tanquam aquæ supra ignem ebullientis sensum habuit, simulque de vertigine, & levi spirituum defectione conquiescit. Quandoquidem ex his rite perpenſis colligere liceret, cum pectoris Hydrope affligi fuisset, methodum & medicamentale sequentia cum successu præscripsi.

℞. Calamelanos g. xv. resin. lalap. ℥ss. syrup. rosar. solut. q. s. f. pilul. iiii. cepit mane primo, & duodecim habuit ledes cum magno levamine, dein die tertio ab eodem medicamine tantum quater alvus deficiebatur, sed cum majori adhuc fructu; cepit postea per plures dies Apozematis diuretici & pectoralis ℥vi. bis in die demque ultimo cathartico eodem repetito integre convaleuit. Thom. Willis. Pharmaceutic. Rationis Parte 2.

Pro pectori hujus affectus Diagnosi pergratum Lectori Studiofo fecerimus si quod communicavit Clarissimus & Accuratissimus D. Carolus Drelincurtius Medicinæ Lugduni Batavorum Professor Primarius, hic inseruimus. Sic autem ille.

Morbus certè haud infrequens est hydrops pectoris, sed Medicorum ruditate vix detectus. Mihi ter accidit ignorasse: sed cadaver apertum uti pudore tacitum me sustulit, ita fidelissimè docuit. Ruminatus deinceps symptomata quibus æger conflictabatur, & eadem in aliis observans, morbum alias protinus agnovi, & dictis fidem fecere pectora reclusa.

Illos igitur dyspnoicos conspexi, præsertim stantes & occiduo sole; ægrius insuper in alterutrum latus decumbentes, idque licet in utroque latere hydrops foret: nam reperi nunquam molem aquarum eandem. Quò igitur in latere, vel plura, vel crassiora lymphatica crepuerunt, id majus gravamen. Ad cursum præterea, vel celerem motionem quavis, pedibus, curru, equo &c. ad cantum, vocem altam, contentam & protractam, prorsus impares, in ò citra causam manifestam animo sæpius linguentes.

Paucissimis latus intumuit, vel tussis adfuit: omnibus autem productio morbo, vultus decolor & ferofus, (*un visage pâle & bouffi*) nec non pedes oedematosi; ino quibusdam serotum intumuit, & brachium e directo vel doluit, vel torpuit, inertius saltem fuit ad motum, ob nervos scilicet intercostales communicantes cum testicularibus: à stomachico; & brachialibus: à cervice & dorso. Exinde frequenter vidi in castris pectore sauciatis quibus brachium e directo vulneris enormiter tumebat.

Paucos Asciticos secui hydrope exortes, vel in altero latere, vel in alterutro; imò quandoque reperi pericranium serò flavo, falsissimòque turgidulum, §. v. g. §. 6. 7. vel 8. quod n. ihi pondus fuit summum.

Tales autem Dyspnæa jugi laborabant, gravati pectore medio, quod superius palma vel pugno contundebant. Cardialgici, irrequieti, litare, vel decumbere nescii, nullo medicamento erectiores, nullisve bechicis quicquid expectorantes.

In iis insuper polypos sæpe reperi è ventriculis cordis in pulmonem ex passos utrinque; & isti (præter signa modo relata) pulsui fuerant frequentiter intermittente. *Hactenus Vir Præclarissimus.*

Pectoris Hydropem plerumque comitantur, immo eidem præcedunt, partium nutritiarum omnium obstructio, spirandi difficultas & tussis inanis (quæ partim à compressione diaphragmatis quam invehunt naturales partes obfarcit, partim & præcipue à vitio pulmonis ac ab aqua in thoracis cavitate fluctuante pendent) cordis palpitatio, vel valida pulsatio, facies obfusca, &c. Sed certissimum hujus diagnosticon est aquæ ab hoc latere in illud cum murmure fluitatio.

Obstructa reserato; succos pæccantes attenuantibus preparato; præparatos per *crinorum* educito; aquam per urinas potius quam per sedes evacuato, item per sudores: pulmonem obfarcit liberato: omnia roborato.

℞. Rad. irid. nostr. brion. ebul. ana §i. fol. nartetar. mercurial. nallurt. erysim. chamamel.

totius ana m. j. summit. sambuc. recent. p. iij. sem. anis. fœnicul. bacc. laur. ana §iij. fol. senn. §i. §. omnium decoctio & colatura, in qua reducta ad tñi. dissolv. hier. picr. diaphoen. ana §vi. syr. ros. comp. cum agaric. §ii. vin. hyacinth. §iij. m. f. clyster. Injic. vesperi levi cœna subsequente.

Seq. mane exhib. pulv. seq. ex vino albo generoso hor. 4. ante jusculum.

pulv. subtiliss. fol. senn. §ii. jalap. §ß. cremor. tart. chalybeati §i. m. f. pulvis irrorandus pauca aqua cinamomi.

℞. Rad. fœnicul. petrosel. summit. aspar. ana §i. cort. med. fraxin. §vi. sem. alkekeng. & mihl solis ana §iij. sem. melon. rec. §ß. cappar. à sale mund. §vi. passul. pur. par. §. rasur. ebor. & C. C. ana §iij. Includantur omnia ventre pulli, & f. decoctio cum carne vitulin. addendo sub finem coctionis fol. chærephyll. fœnicul. virid. agrimon. calend. ana m. §. nallurtii aquat. m. j. macis §i. Cape de colatura §vi. in quibus dissolv. cryst. ll. utriusque ana §ß. Cap. mane hor. 4. apte prandium, corpus exercendo ambulatione, si fieri possit: sin minus, equitatione, aut vactione in rheda.

℞. Flor. irid. p. iij. leucorii rubri, aquileg. cærul. veronic. mar. teucrii ana p. iij. flor. fumar. p. ii. ros. rubr. p. i. aquæ fontanæ infusio: nis battituræ ferri, vel tertia extinctionis chalybis filtratæ tñi. vin. alb. tenuis lbß. macis §ß. sp. vitriol. q. f. ad gratam aciditatem, f. tincturæ extractio, & per chartam colatura, in cujus tñi. dissolv. syrupi capillarium seq. §iij. f. Iulap. pro 4. dos. sumendis eisdem diebus quibus æger utetur jusculo præscripto hor. 4. à prandio, duabus ante cœnam.

Syrupus capillarium. ℞. Rad. petrosel. fœnicul. asparag. eryng. mundat. ana §iij. fol. recent. ling. cervin. polytric. adianti, rutæ muraræ ana m. iij. ceterach. m. iij. Istis omnibus concisis in ampla pelvi affund. aq. fontan. calentis quantum supernatet 4. digit. f. infusio per hor. 24. deinde colatura, quam cum dimidio pondere sacchari reduc. in syrupum, addendo sub finem nodulum qui contineat santal. citrin. cinam. inter. ana §ii. Serv. ad usum.

Potus sit decoctum chinæ dilutum, in quo maceretur continuo nodulus continens battituram ferri; cum hoc decocto diluatur vinum ultra medias.

Exacto quatrinduo iterum purgetur æger apozemate seq. (præcipue si sit melancholicus, ut plerumque accidit.)

℞. Rad. gram. filic. fœm. ana §i. polypod. quercin. §ij. fol. chamædr. epithym. fumar. chamæpit. ceterach. scabios. ana m. j. flor. anth. p. iij. sem. card. bened. §ß. cortic. citr. condit. sicc. §iij. f. omnium decoctio: In colatura infund. & decoq. fol. senn. mundat. vino albo odore nutrit. §i. cremor. tart. alb. §ii. medull. sem. cartham. §ii. Expressioni addatur infusio §ß. rhabarb. seorsim facta in aq. cichor. cum §i. cinam. reducantur omnia ad §viii. in quibus dissolv. syrupi ros. pallid. comp. cum agar. §iij. sp. vitrioli q. f. ad gratam aciditatem, m. f. apozema pro 2. dos. matutin. sumendis diebus alternis horis tribus ante jusculum. Singulis dosibus addatur §ß. jalap. in alkool subtiliss. reducti.

Postea vino chalybeato tali utatur.

℞. Rad. sic. petrosel. fœnic. fragar. anonid. ana ℥i. fol. sic. scabios. meliss. ana m. ii. sem. alkekeng. ℥ii. rasur. dentis equi marini ℥i℥. nuc. moschat. numero 4. cinam. ℥℥. caryoph. ℥ii. chalyb. præp. ℥vi. vini albi ℥viii. f. infusio ut a. e. Utatur post bidui macerationem. Dosis ℥iv. summo mane hór. 4. ante prandium corpus exercendo serratione, vel deambulatione, si vires & spiritus ferant.

Tertio quartove quoque die addatur infusio ℥ii. fol. senn. mundat. minutissime incis. & macerat. in frigido per noctem in vino pauco.

Quod si ab admixtione sennæ abhorreat, & pilulis uti malit, diebus alternis hora dimidia ante levem cœnam cap. pil. seq.

℞. mass. pil. stomach. cum gum. ℥℥. antim. diaphoret. Hartmann. ℥iv. Ms. f. massa de qua cap. ℥℥. vel ℥ii. ut dictum est. Perstet in vini pilularumque usu per duas tresve septimanas.

Horis pomeridianis si magna sit sitis, sedetur bono haultu liquoris seq. qui frigidus exhibetur.

℞. Vini albi Rhenani maturi non acidi aut crudi ℥iv. reddatur acidissimum sp. vitrioli: mox instilletur tantum olei tartari ut aciditas omnisevanescat & denuo dulcescat liquor, in quo infunde florum bugloss. & borag. recentium ana p. iiii. ros. rub. p. ii. Post extractam tincturam rubicundissimam f. colatura, in cuius ℥ii. dissolv. syr. capillarium supra præscript. syr. violac. ana ℥ii. Ms. f. julap. ad usum.

Si spirandi difficultas urgeat, parentur tabellæ tales, quibus noctu præsertim utatur.

℞. Pulp. passul. extract. per decoctionem in ptisan. vulg. pulp. rad. althææ ana ℥℥. lactis sulph. optime præp. ℥ii. pulv. subtiliss. glycyrrhiz. ℥iii. iteos florent. ℥i℥. sacchar. albi. ℥viii. ms. & addita pauca aqua naphæ vel ros. f. pasta ex qua formetur tabellæ in ore tenendæ sensim deglutiendo id quod dissolvetur.

Urgente autem paroxysmo paretur syrupus acetosus talis sumend. c cochleari vel bacill. glycyrrhiz. confuso.

℞. Erysim. roris solis, scabios. ana m. ii. pulmonar. m. iiii. tussilag. totius m. iii. passul. jujub. ana ℥i. dactylor. mund. par. v. f. decoct. & colatura quæ cum dimidia parte sacchari reducatur in syrupum, ut a. e. Paretur oleum sacchari cum aqua vitæ debiliore, ut a. e.

℞. Syr. præscript. ℥iiii. ol. sacchar. ℥ii. olei sulph. q. s. ad gratam aciditatem. Utatur ut dictum est.

Si flatus, ut solent, ventriculum & hypochondria distendant, unde liber diaphragmati motus negatur, sum. ℥i. Electuarium seq. sub ingr. lect. vel alias.

℞. Baccar. junip. recent. maturat. ℥bi. cortic. citr. exter. sicci ℥i. cortic. aurant. ℥℥. santal. citrin. ℥iii. macis ℥ii. vini Canarini vel Malag. ℥bi. aq. fontan. puriss. ℥bi. Coq. ad medietatis liquoris consumptionem. deinde f. per canapationem densum sortis expressio; pulpa lento calore reducatur ad consistentiam mediocriter spissam, de qua cape & elect. ex assafr. an. ℥j. nithridatii, conf. alkerin. ana ℥℥. pulv. elect. diamb. & aromat. rosat. ana ℥ii. ms. f. Electuar.

N. B. Si mitioribus hydragogis non cedat morbus, nec ab his aquæ subducantur, ad vali-

diora transeundum est, cuiusmodi Lib. 3. cap. de Hydrope plura invenies. Quod si nec ab his latex serosus evacuari possit, ad Paracentesin deveniendum est, cuius operationis modus apertissimus supra in Cap. de Empyemate docetur. Theodor. De Mayerne Prax. Medicæ. lib. 2.

Quocunque modo gignatur Hydrops Pectoris, semper vitæ periculum minatur, quamquam ad tempus aliquod protrahi possit. Nonnulli per vices repetunt hydragoga, & præsertim pulverem, extractum, aut resinam jalapæ, & Mechoacan, itemque agarici, & quod fortius, gummi Peruani, seu gummi guttæ: & Riverius magni facit usum calomelanos cum diagridio: Alii diuretica; & alii sudorem moventia. Etiam in hoc affectu Paracentesis institui consuevit. At si quod juvamen unquam huic morbo sit adfuturum, certe ex dicta exactissima illud solum sperare licebit, indicto nimirum victu attenuante, & exiccante, non neglectis tamen iis, quæ supra, de Empyemate memoravimus. Ab aere pariter maximum juvamentum, nedum in hoc, sed etiam in reliquis Pulmonis affectibus sperandum. Lucas Tozzi Medicin. Practicæ lib. 1.

De Paracentesi Thoracis vide quæ supra Capite de Empyemate ex Thoma Fieno.

Consultationes.

Vir Amplissimus 46. annos natus, temperamenti melancolico, sanguinei, à pluribus annis varia à serò aciori redundante symptomata passus est, & præsertim urinx ardores (cum sanguine etiam quandoque admixtò) quam maxime molestos; à quibus cum ex parte liberatus fuisset per usurpata præsidia, & præcipue per aquas minerales pluries cum cautionibus necessariis epotas, nihil aliud patiebatur incommodi quam quod urinx profluvio afficeretur.

Proximè præteritâ hycme, cum minueretur lotium, multum de eo sibi gratulabatur Vir Ampliss. secum reputans laxiores urinarias vias, lotique fecernicula sic firmari ac roborari. Languidus vivebat tamen, difficiebatur appetitus,angebatur sitis, tumebat aliqu. tenus venter, tussisque, Viro Nobiliss. tempestate hyemali semper familiaris, crudelius cum anhelatione interambulandum, & febre lentâ comite, alligebat. Non sic tamen retrahi potuit à Curis Publicis, donec adventante vere, subito facto seri in vasis aggesti cataclysmo, admodum tumuerint partes uno ventri subjectæ, ipseque etiam venter; accedebat aliqua cubandi, ac præcipue in alterutrum latus, impotentia, propter dyspnoeam tunc affligentem, & perseverabat tussis ac febris. Urinx quæ jam à septem annis, eo ipso quo exercebantur momento, fuerant turbidæ, in eodem permanserunt statu, imò phlegma tam viscidum iis admiscebatur, ut in ipsis viis vesicæque cavo in pelliculas concreveret, ipsoque egestionis momento sic concretum sero urinario innatans viseretur. A quinque septimanis, ex quo scilicet se cura Medicæ subiecit Vir Ampl. varia adhibita sunt præsidia, scilicet autequam morbus se omnino explicaret, hiru-dinum venis sedalibus applicatio, antea jam ægro familiaris, facta est, posteaque purgantia, nunc mirabra, nunc validiora, pilula specii-

specificæ de Vermibus Clariss. Domini De Mayerne, asellibum emulsiones, herbatum appropriatarum succi, salia volatilia, tum e succino, tum e viperis, tum e tartaro, tum e butombus, tinctura tartari antimoniatâ, nuxtura bezoartica mistura simplici multum affinis, opiatæ martiales pluribus aperientibus & absorbentibus prægnantes, decocta lignorum & radicum aperientium, ac diureticarum cum pauculo vino pro potu ordinario admiscenda, imò ipsa decocta delicantia & sudorifera, clysteres non unius compositionis &c. in usum suum revocata, non omnino quandoque propter solum difficultatem summam laudano opiato in parvissima dosi, & addita etiam dictâ, quantum permittit Nob. Pat. inappetentia maxima sic tamen efficere non potuimus ut fugaretur malum remediis omnibus hactenus prope surdum, sed tantum obtinuimus ut tumor non ascenderet ultra id quod secunda, postquam morbus integre caput exeruit, septimanâ visum est, præterea & tussis, & cubandi impotentia, & ipsa anorexia, aliquatenus remiserunt; quamvis respectu decubitus supinus tantum esse possit, minimeque ad latera. At persistat febris, tumorque oedematofus crurum, femorum, atque ipsius abdominis, ac dorii, in quâ ex imis partibus per noctem præcipue devolvitur, tumet etiam aliquatenus manus &c. Lotium in quantitate satis respondet liquidis assumptis, sed semper confusum atque turbidum est, non tamen rubrum & sulphurebus recoctis saturatum.

Ex supra enarratis satis constat hydropem Hypoascaridum hic adesse, verum non æquè clarum an jam aquæ in ipso abdominis cavo fluctuent, aut illuc confluere sint paratæ. Inò de pectoris hydrope, quamvis ex obscurioribus signis, suspicio non parva primis ægrotationis diebus injecta est, quæ jam minuitur quidem, discedente ex parte tussis, atque mitigatâ dyspnœa, sed integrè nequaquam tollitur.

De cauteriis tibiis murendis, aliisque remediis, iis, quæ jam memorata sunt, adiungendis, cogitavimus quidem, sed prius sententiam Doctissimorum aliquot, atque Fanigeratissimorum Medicorum in re ardua audire consultum duximus; nihil non remandum rari pro Viri Ampl. producendâ vitâ, non suis tantum & familiariibus, sed etiam toti Reipublicæ pretiosissimâ.

Dabanus Genevæ die 1 Maii Ann. 1691.

*Consilium Medicum Clarissimi ac Celeberrimi Viri Domini Joh. Jac. Wepfferi M. D.
super casu proposito.*

Nobilissimi & Amplissimi Domini affectum primarium existimo esse hydropem pectoris, nam à noctu etiam levior & ambulatorio difficultate respiravit, præ dyspnœâ non solito more decumbere, nec ad hanc usque diem alterutri lateri incumbere valuit. Supinus decubitus eligendus fuit, & forte citior solito, deinde vehementer tussit, nec dum tussis penitus evanuit. Ascitis principum & Anasarea quadam, sunt ejus crura, dum ferum, seu lymphâ extravasata subtus & in prætagina sensim deorsum in cavum abdominis, indeque per coniculos ad imos pedes, femora & ad lumbos stilavit; quod citius hydrope pectoris advenit, si præ respirandi dif-

ficultate, noctu in lecto permanere nec volunt, nec possunt: tandem brachia & natus intumescunt, quia diu noctuque illis innituntur. Causam stagnationis & tandem extravasationis seri procul dubio est renum aliquod insigne vitium; quia primum pallus est dysuriâ, ut nunc quandoque admisso cruore; sequebatur profluvium quoddam diabeticum, & tandem imminebat, verum cum damno valetudinis, nam brevi post supervenerunt lassitudo spontanea, pallor, & sensim difficultas respirandi, quæ in horas incrementa sumsit. Vitium in renibus superesse tenetur urina natum in emissionem turbida. An illud sit calculus fessilis; ejusque parenchymati intus accretus, an vero ulcus, an utrumque, non certo constat; aliquid tamen renes monstrare febris lenta prodit. Quoniam apud Ampl. Domini. urina potus quantitati adhuc respondet, & levamen non exiguum ab usu purgantium, diaphoreticorum jam expertus est; dum respiratio est facilior, tussis minus vehemens & tumores subident, spes aliqua superest. Hanc ob causam vix alia medicamenta, præter illa quæ Excellentissimi Medici ordinari prudentissimi suaserunt superaddere possent; si enim resorbatio seri per constitutionem glandularum interiorum possibilis esset, hæc viam illi iterarent, & extravasatum per loca congrua educerent. Unicum hic addo me hanc aquam utilem expertum in hydropicis esse.

℞. Rad. lapat. scuti recent. ʒ iv. herbar. recent. natur. aquat. cochlear. beccabung. cheref. an. m. viii. marrub. alb. meiss. urtica flore albo an. m. iv. summit. fenic. recent. flor. sambuci an. m. iij. sem. anisi ʒ j. incisa & contusa indantur cucurbitæ seu vesicæ itanno bene olidatæ, affunde aquæ fervidissimæ lib. viii. & inposito alembico natum destillatur. Aquæ primum prodeuntis ʒ iv. statim adde spir. sal. arm. an. urinol. ʒ. aromatici, fuliginis, liquor. C. C. succinati an. ʒ ij. sal. volat. lumbricor. aut viperarum quod egregiè Genevæ paratur, ʒ j. sal. absinth. ʒ ij. M. Serventur in ampullâ bene operatâ vesicâ bubulâ, & post horas 24. in loco tepido repositâ coientur per chartam emporeticam. Hujus aquæ Cochlearia duo, quandoque, si tolerare possunt, tres permisceo jusculi carnis calidi & non saliti ʒ iij. vel iv. propinoque mane hora 6. & vespere horâ 5. Item quoties jusculum comedunt semper de hac aquâ cochlearia unum admisceo.

Dimidia horâ ante prandium & cœnam; propter inappetentiam elixyr. proprietat Claudini gr. x. cum pauxillo jusculi sumere possent. Autor illud describit in lib. de Balsamandis Cadaveribus, & nobis hic in frequenti usu est, præ elixyre vitriol. Mynsiet. aut Paracels. Purgantibus adulto hydrope pectoris nihil efficere potui, inò morbum exacerbavi. Clysteribus aliquid opis quandoque præstiti, quamvis etiam Prædici sint qui illos in dubium vocent. Fonticulos, vel in tibiis, vel femoribus, seu foris, seu intus excitare plane non tutum existimo, vix evitabitur gangræna. In robustis, quibus viscera robusta, scarificationem superficiali longo vulnere lancetâ facto aliquoties tentavi, quandoque cum fructu, quandoque vix gangranam declinare valui. Tutius in utro-

Que latere pectoris, quia non certo constat ubi aqua hospitetur, dum non semper aqua hucua-
tio audiret, ibi tuniculi excitantur ubi para-
centesis fit, nam ex Wulstii mente aliquid i. ho-
ris ex pectore emulgeat; id ante plures an-
nos apud Illustriss. Domin. Comitem de Zol-
lern in Horringen campyricum cum fructu au-
sus sum, nam adhuc superites est Canonicus Ar-
gentoratenfis. Paracentesis Thomas I. Ienus de
Operat. Chirurgic. prope unicum remedium
hydropis pectoris censet, quam tentare hecbit,
si natura viam ostenderit, & mihi quoque apud
rusticum feliciter cessit: alia vice, primum im-
posito cauterio potentiâli, frustra cutim per-
tudi cum pleura nullâ subsequente aqua, quia
procul dubio pulmo ibi pectori accretus erat:
Id nuper vidi in juvene hydrope pectoris & vo-
mica pulmonis sublato; nam pulmones in utro-
que latere firmissimè pleuræ adhaeserunt, quam-
vis multum aquæ in pericardio & dorsum ver-
sus, aliisque spatiis adhuc liberis stagnavit. Et
hæc sunt quæ mihi hæc vice succurrebant, quæ
Excellentiss. Domin. Medicor. ordinarior. cen-
suræ subjecio D. T. O. M. hæc Nobiliss. & Am-
pliss. Domino Aegro salutaria esse jubeat Sca-
phusii die 19. Maii ann. 1691.

Quandoquidem serius paulo adveniebat Res-
ponsum Clariss. Dom. Wepfieri, cauteria inte-
rim tibiis ex ferro candente fuere admota, lic-
que copiosissima educta est aqua, unde primo
enata sunt animi deliquia quod sine familiare
est copiosis omnibus ac promptis evacuationi-
bus, qualis fuit hæc, quæ nullatenus teprimi po-
terat, sed mox tranquilliora omnia facta sunt,
remisit profus febris, appetentia rediit, tumor
abdominis aliarumque corporis partium subse-
dit, urinæ copiosiores multo factæ sunt; imo
verbo ager noister liberatus quasi videbatur. Ve-
rum hæc non fuere durabilia, quandoquidem
post tres ab applicatis cauteriis, septimanas,
cum serum per illa emissaria minus abundanter
profunderet, recrudere symptomata, illaq; reme-
diis omnibus rebellia Nobilissimum Aegrum sus-
tulerunt die 19. Junii an. 1691. Obitum per aliquot
dies præcedebat febris intermittens quædam
quasi species, quam animi deliquia frequen-
tiora comitabantur, quamque continuo subse-
quebatur gangræna scroti præcipue ac ini ven-
tris, & femoris ac tibiæ dextræ: nam quod mi-
rum! eo latere quo cauterium applicitum se-
rum copiosius dimisit, scilicet latere sinistro ni-
hil profus gangrænosum visum est.

Anatomica inspectiones.

Puero trimo, ferebatur, ab humido capite,
tam frequens destillatio in subjectos pulmo-
nes, ut præter tussim, ac febriculam, contra-
xerit inde summam spiritus difficultatem, pro-
fundum soporem; & tam frequens animi deli-
quium, ut tandem repente, migraverit e vita.
Qua defunctus, obtulit Medicorum oculis, pec-
tus aqua repletum; & pulmones non tantum
flaccidos; sed sinistram cordis auriculam, va-
riis ulceribus exesam. A quorum eructante fœ-
tore, defecit proculdubio, frequentius ipsi ani-
mus, cujus deliquium etiam aliis, ex simili
causa, vidimus contigisse: sed præcipue eundem
fueri, quem propterea, ceu pusillanimum vitu-

peraverant, qui cum ipso versabantur, nebulo-
nos. Sed viderint hic eruditi. Utrum non o-
porteat, ad mentalem horum ulcerum corrup-
tionem, referre repentinas illas mortes: de qui-
bus loquitur Hippocrates, iniquens, qui exol-
vuntur ræpe, ac vehementer, sine evidenti cau-
sa, repente moriuntur lib. II. aph. 41. *Nicolas
Tulp. Observ. medicar. lib. 2.*

Sexagenarius per quaduennium initio levi,
post gravi pectoris angustia detinetur, is subito
inopinata morte, quasi subime idus corruit.
Dissectaque cartilagine colli annexa, mox
lymphæ ex vicidi citrina, cum impetu, proli-
lit, pulmones maculis nigris etiam diversico-
lores, instar spermatis ranarum occurrunt, ex
quibus sanguis nigerrimus profluxit.

Apoplecticus obiit, nam in pectoris cavi-
tate lymphæ erupit, ob tenuis copiam pul-
mones se libere movere non potuerunt, atque
sic per eos sanguinem, impius moveri con-
cellum non fuit: cerebrum interim ab ejus irri-
gatione frustratum, corpus corruit. *Stephanus
Blancardus in Anatomie Practica.*

Vir quidam aliquando febricula & tussi in-
festatur: hæc omnia tempore in pectus tuere
coeperunt, adeo ut suffocationis incertum ere-
cte sedere coactus fuit. Viribus interim de-
perantibus, obiit, postquam a longo tempore
de pectore laboraverat. Thorace aperto, ingens
aquæ fortentis copia effluxit, pulmo similiter
putridus. Splen quoque multum puris contine-
bat. In arteriæ magnæ initio, quidam sangui-
nis grumi aderant.

A corrupto pulmone, respirandi diffi-
cultas; cor si sanguinis quantitatem sufficientem
ex pulmonibus obiectis non accipiat, sese de-
bito modo non expandit, nec contrahit, unde
& pulsus defectus, præsertim si arteriæ a
sanguine grumoso obstruantur. Ob pulmonum
quoque corruptelam, vasa lymphatica rupta
sunt, ex quibus liquor emanavit, qui a fœcen-
tibus pulmonibus, foetidus redditus est. *Idem
ibidem.*

Quidam repentinâ morte è vivis eripitur: A-
perto thorace, inferior dextri pulmonis pars
erat consumpta, superstitie tamen exteriori
membrana, valde incrassata, intusque materia
sebacea oblita: supra diaphragma ingentis mo-
lis hydatides succrevere. Similiter pulmo lividus
erat. Cordis ventriculi atro sanguine turgidi.

Hujus repentinæ mortis causa fuit suffocatio,
nam sanguis in corde ob crassiciem restagnans,
pulmones aëre impleri non amplius potuerunt,
unde quoque sanguinis circuitus desillencia. *Idem ibidem.*

Nuper in Prochodochio adolescentem sede-
cennem pauperculum secui, & quidem, ceu ocu-
laris docuit inspectio, ex hydrope pectoris &
pericardii mortui. Hujus thalamos cardiacos,
quum examinarem penitus, in dextro, mox a
cavæ insertionem, polypum insignissimum depre-
hendi, cujusmodi portentum hactenus nec vidi,
nec ab aliis descriptum meminî. Totam hic
ventriculi peripheriam latitudine exæquabat;
densitate vero septum carneum, de quo Cla-
riss. Lovverus, seu parietem illum intergeri-
num; carnosum calamo dextro in sua actione
suppetias ferentem, mentiebatur primo in-
tuitu, pedibus suis multiplicibus fissuris tha-
lami

lami inter carneas columnas infixus, & inde in arteriam pulmonalem se se extendens, atque secundum totidem hujus ramificationes in complures alios furculos se se diffundens &c. Servo hujus ipsius portionem quæ dextrum ventriculum occupavit, membranam deusam duramque jam reterentem. *Ex communicatione amica Clarissimi Doctissimiq; Viri Dom. Joh. Jac. Harderi Medicina in Academia Basilienfi Professoris longè Celeberrimi.*

Insignis Respirandi difficultas ab Hydropse singulari Pectoris, quod refertum liquore cremori simili, sacculo concluso.

Puella Rumburgo-Suffolciensis tredecim circiter annorum adhibitis Medicamentis Chalybeatis contra Leucophlegmatiam seu Chlorosin, Remissionem quidem morbi sensit, sed post multum laborabat obstructione flatuum. Ab ætate 16. ad 22. semet summo opere affligebat ob obitum Parentum, & corruptos mores Fratris; interea singulis annis uno, duobusve morbis acutis laborabat. An. ætatis 18. languida admodum erat obstructio thorace, & Melancholica. Domo forte egressa ten pestate Ventosa, cogebatur domum properare; parum enim abesse, aiebat, quin vento strangularetur. Egredere admodum & lente ambulabat, magnaq; cum difficultate ascendebat in montes, vel per scalas in contignationes superiores. Tum observabatur magnopere premi uti, cum soletet bibere cubitum itura, nec non aliquando noctu; nisi vellet, ut ipsa aiebat, siccitate suffocata perire. Inter ætatem 21. & 22. ætatis suæ, descendens de scalis, sentiebat horribilem agitationem in pectore suo: quod tum aliis in eadem domo significabat, monstratoque illis modo agitationis illius motu corporis sui, secum omnes in admirationem istius accidentis pertrahere, qui judicabant, (prout plerique omnes ex fremitu judicaverunt,) Pectus ejus fere totum aqua esse repletum. Utebatur variis medicamentis, consulente Doctore Brovne aliisq; Norvici, sed circiter mentes, sine sensu remissionis morbi. Dimidio post anno initio autumnii, levi frigore affecta, tantam passa est obstipationem, ut nil nisi mullitate valeret; nec poterat prostrata cubare, sed sedebat ad angulum obliquum suffulta cervicalibus. Ego accersitus extemplo venam secari curabam, cum Phlebotomia sit remedium procurandæ liberiori circulationi, & spacio extricando, quo natura semet exoneret. Intra unius horæ intervallum spiritum recipiebat, pristinaq; conditionem recuperabat non multo post. Aliebat, se nunquam sudasse, neque ei sudorem elici potuisse per vulgaria sudorifica. Desiderio Remedii Empirici præscripsi pilulas Malthæi, quæ illi facile sudorem eliciebant, ultra memoriam ejus. Singulæ quotidianæ doses Pilularum Loclieri quaternarum, agitationem illam in Pectore removebant, ut aiebat, deorsum magis Diaphragma versus; cum metuens Hypercathartin, Pilularum usum ad duos, tresve dies omitteret, & deinde denovo reiteraret, nulla ulteriore alteratione per illas inducta. Nunquam sinistro latere prostrata jacere poterat. Anno 23. ætatis, tempore Brumali periculosa laborabat Febri comitata Diarrhœa, sed convalescebat. Ann.

24. hyeme rursus frigida gravedo illi totalem obstipationem inferebat: & post quinque, sexve dies convulsionem patiebatur, antequam vena cæsecta fuisset, per negligentiam familiarum ejus; Sera namq; Phlebotomia statim passionem levabat; ipsa vero vesperi quidem hilaritate perfuebatur, ac postridie illius diei moriebatur.

Ipsa adhuc vivens ejusq; Consanguinei permiserant nuni corporis mortui sectionem; quam etiam perfeci.

Quamobrem primo Os pectoris seu Sternum distindebam à Cartilagine Eniformi usq; ad collum: ibi tum Cavitate Thoracis exposita evaporabat, primum tactor olidus admodum, non obitante rigido gelu temporis illius, quod erat circa Natalitium diem Salvatoris nostri. Deinde ubi viam parabam exponendo utriq; lateri Sterni, cum stupore videbam (ut præfenseram) totam fere Cavitatem Thoracis superius vacuum, (cadavere supino jacente) & inferius nonnisi crasso lacte repletam. Sed ulterius investigando comperi tantum dextrum latus Thoracis integrum, & tertiam circiter sinistri partem, ita se habere. Extendebatur in parte Collum versus latitudine palmæ, & excurrebat in crassitiem trium digitorum ad dextrum latus Mediastini. Liquor Cremori similis erat, vel potius Glutini Alb. Hispanici, seu Cerussæ distinctæ flavo, instar Colostri. Immissio enim Cochleari extrahebam ex fundo spissam, limosamque materiam, simillimam Cerussæ, quæ subsidit in fundo Glutinis. Quantitas erat circiter trium pintarum, continebaturque in Sacculo, qui illius duplum & amplius capiebat. Sacculus porrigebatur a sinistro humero ad extremum lateris dextri Diaphragmatis, non directe in longum nec sinistre extensus; sed ad Palmæ latitudinem ab ortu directe descendebat ad Diaphragma, cum quo in Longitudinem concurrebat. Cutis seu pelvis ejus crassior erat pelle Stomachi, ejusque capacitas amplior, quantum flexuræ Costarum illi adjacebant & componebant plusquam dimidium circumferentia. Ubi adhærebat Diaphragmati, digitum fere crassa erat: & in loco quodam, ubi separare eam conabar a Diaphragmate offendebam tenuiorem sacculum, unde effluebant duæ, triæve cochlearia aquæ puræ: quæ qua via eo penetrasset, invenire haud poteram. Mediastinum vel totaliter fuerat assumptum, vel intextum in crassitudinem Sacculi, quod observabam accidisse in Pleura, quousque Sacculus pertinebat. Porro sacculus ille solutus & remissus jacebat ab Axillari sinistra ad Pectus, cum autem fuerit repletus aut distensus vel vento, vel liquore. Tota Cavitas erat inquinata circumcirca agitatione Liquoris, instar algæ limosæ, quæ æstui maris est subiecta. Lobus ille Pulmonum, qui debuerat extitisse in latere dextro, perierat totus, dexter autem tertia fere parte mutilus erat. In Ventre inferiore omnia se recte habebant.

Doctore Brovni, ait, se offendisse similis quid in Authore Italico. Ipsi erat sententiam salivandi eam. Ego meditabar Paracentesin. Nam ex fremitu Liquoris, & eo quod non posset sinistro Latere cubare, concludebam, quod esset Cystis in dextro. Sed si id factum fuisset, sacculus nimis crasso existente, mors forsan insegura fuisset. Agitatio simillima erat agitationi Aquæ vel Lactis. Hæc scemina plano pectore, instar

Miris, prædita erat. Quæstio est, an liquor processerit ex delapsu chyli ab axillaribus, quod videtur aliqua ratione probabile. sed ab ulteriori reflectione abstinco.

Allor. Philosoph. Anglic. anni 1667. mensis Novemb.

Canis summa difficultate spirandi laborans ob Hydropem Thoracis. rarumque Pulmonis affectum.

Cum Oxonii olim studiis incumberem, quidam me adinonuit de cane summa spirandi difficultate laborante, ita ut vix spatium viginti pedum motu. statim emetiri potuit, quia illico in humum delapsus & anhelans rapidissime spiritum trahere necesse habuit, Cum data pecunia dissecandi mihi copiam fecerant, secto Thorace integram ejus cavitatem Aqua repletam inveni; Pulmones vero ita parvi, ac quasi sacculo incluti, ut diu idio minus spatium præ solito occupabant, et si Aere inflato ope folium ad maximam sui expansionem excitaveram. Tunica quippe communis Pulmonum (quæ hic crassior & albidior videbatur) ita coarctaverat ipsorum parenchyma, & contrinxerat, ut copiam aeris pro respirationis munere idoneam, non nisi repetitis nixibus admittere potuerint. Substantia Pulmonum alias satis integra videbatur, & id unum vitium, quod non satis libere sese explicare licuit. Aquam istam in Thorace contentam multum quoque Respirationi obesse facile crederem; sed an non a contractura illa Pulmonum originem suam traxerat, cum non alias videram, unde efflueret, in medio relinquam. Canis hic venaticus fuit, & eo nomine domino suo valde gratus, sed à sex fere mensibus (si bene memini) morbo hoc detineri inceperat. Eduard Tyson.

Respirandi difficultas ab Hydrope Thoracis.

De pectoris hydrope pauca apud Præficos reperimus: ita enim Laz. Riverius Tr. med. l. 7. C. 5. inquit, Præficorum Vagus hunc morbum non describit: Carolus Piso tamen Tr. de morb. ex serosa colluvie & quidem de morbis Thoracis pag. 214 & jam nominatus River. cit. l. itemque nuperrime Sylvius in Praxi sua l. 1. C. 50. paulo fufius & satis accurate de eo scripserunt: frequens tamen est malum in oris præsertim maritumis, ratione scorbuti, & cognitu difficile. Nuper cum ex officio cum duobus Chirurgis tum temporis mihi adjunctis, in Cadavere Femina alicujus causam mortis indagare deberem, cum in supremo ventre nulla mortis signa apparerent, aperto Thorace, tota pectoris cavitas aquis distulæbat, sternum enim remoto, velut ex fonte lymphæ cum impetu dimanabat; verum ergo hydropem pectoris ibi reperi & ipsam mortis causam; (pulmones enim siderati erant & malè affecti) pergo tamen sectione ad minimum ventrem & ibi ventriculum tam pusillum, tam contractum vidimus, ut pugni magnitudinem non excederet, hepar vero julto grandius erat & scirrhum, quamvis abdomen aquis necdum distentum esset: Sic in

omni hydropis specie hepar laborare verum est, cum enim sit colatorium sanguinis, illo malè affecto etiam sanguis patitur ratione feri quod vehiculum est sanguinis, unde hydrops & alia mala, prout hepar affectum est. Ut cognitu difficilis est iste morbus, ita etiam curatu. Cognoscitur enim proprie difficultate spirandi, quod signum tamen ambiguum est: signum pathognomicum statuere oportet, inquit Carol. Piso loco supra citato pag. 239. eam in spirando difficultatem ac crebritatem, quæ de subito somni primo tempore invadat, & quiete defraudet, sed tamen procedente die sensim lentescat, quod signum cum ratio mihi dictavit. tum experimenta in omnibus comprobavit. Curatu difficilis est; pergit enim eodem loco Carol. Piso p. 220. & dicit: Vacuatio certe contentæ materiæ in thorace tentari quidem posset sive purgantibus, sive per tussim vacuantibus, sive discutientibus, sive aliis id genus, sed verendum ne ab eorum calore agitata materia, dyspnoea increbescat, suffocatioque suboriatur: quo sane consultius videtur, ut vacuetur illa sensibilibus thorace aperto Caustico potenti, in aliis autem masculi animi, caustico actuali: ubi apud ipsum Pisonem, Riverium & Sylvium locis supra allegatis plura videantur de hoc affectu. Gaspari Kollichen.

Anatome virginis Scrofulis & hydrope pectoris laborantis.

Anno 1665. d. 22. Jun. Cl. Sylvius in nosocomio Leidenensi secuit Saram Jansen, 20. circiter annorum virginem, in cujus cadavere seqq. notatu digna occurrebant.

Hepar in dextro latere loco admodum profundo situm erat, & infra umbilicum superioremque partem ossis coxendicis propendebat. Pallidiusculum erat, & quia satis grande, partes subjacentes inferius, quam secundum naturam debebant, sitæ erant.

Suspensorium hepatis, quod solet esse in dextro vel medio thoracis plane in sinistra parte situm erat, & tres digitos transversos minimum distabat a medio. Alter lobus hepatis occupabat totum sinistrum hypochondrium, quod eo totum replebatur.

Folliculus fellis in sinistro etiam conspiciebatur latere. Tinctura ipsi peritonæo a folliculo fellis erat inducta.

Ventriculus non continebatur in medio, sed totus in sinistro hypochondrio situs, erat, & quodammodo convolutus. Pylorus etiam erat in sinistro latere.

Ventriculi substantia interior interiorius nigricabat, & vasa minima insigniter conspicua erant, & stellulas quasdam quasi representabant, ex quibus alia vasa exibant.

Pancreatis substantia bene se habebat, sed glandulæ conglobatæ ipsi adhærentes grandiores & duriores erant.

Lien admodum exiguus erat, ut raro tam parvus appareat.

Intestinum Colon situm erat loco decliviori ob hepatis magnitudinem, & statibus erat turgidulum, cumque communiter e dextro latere transversim versus sinistrum feratur, in hoc subjecto deorsum ferebatur. Vasa minima & capillaria

ria in eo variis in locis valde turgida erant, quod indicium esse putabat alicujus *phlogistis*, idque sibi nunquam in crassis intestinis vitum. Tam tenuis etiam erat membrana hujus intestini, ut in nullo tenui esse solet, quod etiam rarum, & sibi non visum aiebat. Apparebat autem tenuitas illa eo potissimum in loco, ubi major ejus erat distensio.

Intestina tenuia aliqua sui parte distenta erant, & vasa illorum turgida & rubicunda, aliqua vero parte flaccida & pallida.

Glandulæ plures notabiles in Mesenterio apparebant.

Ren dexter pro constitutione reliquarum partium admodum grandis erat, finitè comprimebatur à partibus superioribus, quapropter etiam aliam à naturali conformatione habebat figuram.

Ductus pancreaticus satis grandis erat, ut duos stylos admitteret, ingressum ejus in intestinum cum ex pancreate non posset invenire, dissecto intestino, & immisso stylo in orificium ductus bilarii, manifeste in intestino protuberantis, stylus in ipsum ductum pancreaticum penetrabat.

Spacium insertionis ductuum in intestinum, quatuor circiter transversos digitos distabat à pyloro.

In cavitate Thoracis, potissimum, in dextra ejus parte, aqua foetida copiosa continebatur, quæ aliquot catinos implebat.

Ab acrimonia illius aquæ pleura & tota superficie interior Diaphragmatis exulcerata erant & erolæ, ut etiam pus darent.

Membrana pulmonis dextri quadruplo fere crassior reddita erat ab aqua illa purulenta.

Pulmo dexter plane durus erat & corrugatus, coloris lividi & fædi. In partibus superioribus interius corrumpti coeperat pulmo dexter, & aliquid puris continebat.

Pulmo sinister melius habebat, in sinistro latere aqua etiam coeperat colligi, sed limpidior, nec partes ita rubebant & exoriatae erant, hinc inde in substantia sinistri pulmonis glandulæ parvæ erant.

Pericardium plenum erat aqua limpida, quæ 6. vel 7. cochlearia implebat, cum naturaliter vix duo cochlearia adesse debeant.

In orificio interno uteri materia viscida reperiatur.

In parte interna colli uteri parvi quidem musculi eleganter apparebant, quos nunquam sibi tam eleganter apparuisse aiebat.

Ex glandulis Colli conglobatis dissectis & pressis albicans quædam materia pultacea, & veluti gypsea erumpebat. Conglomerata vero vicinæ nihil mali erant passæ. Ex glandulis Mesenterii dissectis plane similis materia exprimebatur.

Non nisi emollientibus singularibus gypseam illam glandularum materiam emolliiri posse aiebat; quarenda putabat ejusmodi remedia, quæ non tantum emolliant, sed materiam magis fluxilem reddant, scrofulatiam, squillam & ex ea parata medicamenta, ut & gummatata, galbanum, sagapenum, ammoniacum &c. commendabat. D. Joh. Henr. Brechtfeld.

HYDROPS ASCITES.

HYdrops Ascites quoad materiem & rationem ejus formalem, vel sensum simul plurimum indicio manifesto dignoscitur; viz. abdominis tumor est, ab humore aquoso intra cavitatem ejus contento. Aqua tumorem hunc efficiens, interdum ad diluvium ingens, & quantitatè vix credibilem accrescit. Semel vidi doliolem xv. congiarum capax aquis foetina ab hydrope detuncta abdomine exentis impletum. Undenam vero iste humor provenit item quo ritu & quibus de causis aggestio ejus in ventre primo incipit, & deinceps augeatur; quibus denique viis, & quali remedium hydragogorum virtute ac operatione inde rursus demum & evacuari interdum possit, explicatu difficillimum videtur.

Quoad prius, scilicet; aquæ proventum, quidam opinati sunt, eam ab hepate, alique eam à liene male affectis, in abdominis cavitatem descendere; adeoque viscus hoc, aut illud vitiatum, semper Ascitis causam esse. Veruntamen secus habere, plurimum ab hoc morbo defunctorum anatomæ manifesto declarant: cum post ventrem inundatum, hepar & lien sæpe inculcata reperiuntur. Et quidem hæc viscera haudquaquam illuviei cujusvis scatebræ videntur, ut pote nullis quibus aquæ congerantur cavitatibus donata: quapropter Ascitis tantquam igni, aut lacus originem ab humoris cujusdam rivo, aut saltem de pluvio derivare oportebit.

Humores intra ductus aut vasa velut rivos, scatentes, sunt in primis hi tres, viz. sanguis, humor lacteus, & lymphicus. Aquæ depluvium, aut stillicidium fieri possit à liquore nerveo, qui interdum e fibris, & membranis lente & insensim exudat; atque à vaporibus intra corporis speciem, aut cavitatem aliquam condensatis. Utrum ex his modis Ascites potius ac sæpius oriatur, modò disquiremus.

Et primò ad sanguinem quod spectat, extra dubium habetur, serum e massa ejus dissolutà nimis deciduum, uti fluxiones & catarrhos varii generis, ita nonnunquam majores aquarum illuvies, scilicet hydropicas excitare: quare cum Anasarca ab hoc causa omnino procedat, cumque isti morbo haud statim sanato sæpenumero Ascites superveniat, inferre licebit, utrumque affectum ab humore aquoso, arteriarum osculis ubique effuso induci. Porro non multum improbabile est, sanguinis dissoluti serum, ex arteriæ celiacæ, & mesentericæ sinibus quibusdam apertis, in abdominis cavitatem primo, & solitarie exudare, adeoque Ascitem absque Anasarca præviâ inferre: ac ita præsertim si forsitan accidat, tumores scirrhosos, ganglia, tubercula, aut aliismodi concretiones præternaturales circa mesenterium, lienem, hepar, uterum, aut alia quævis in ventris viscera prius excitari: nam quandoquidem in istis locis sanguinis circulatio præpeditur, ut cruor per arterias evehatur quoquomodo.

reduci queat, pars serosa è consortio ejus extrusa, in cavitatem decidit. Æmumvero ita fieri, experimento hoc à nobis alibi citato evidentiùs liquet; viz. si in vivo animali venis jugularibus filo exceptis, & ligatis, sanguinis reductio inhibetur, tota capitis regio aqua intercutè, & plane hydropica brevi intumescet. Et quidem sæpius observavi, tumoribus privatis, & circumscriptis alicubi in imo ventre excitatis, Ascitem supervenisse: quod certe ob rationem prædictam contigit. Quando sanguinis cursu præpedito, pars ejus aquosa brevi extravasatur, humor ille non mere serosus est, sed insuper liquor nutritivus solidis quibusque partibus alendis destinatus, in ventrem profunditur: quare dum hæc regio intumescit, membra extenuantur, & lymphæ Ascite exenta, instar ovi albuminis, à calore inspissatur & albescit.

1. Verisimile est etiam, vasa lactea disrupta, humorem suum in abdominis cavitatem effundere. Profecto Clarissimus Sylvius à tali causa, morbum hunc expressi ne progigni autumavit. Et quidem ex vasis lacteis, vel lymphicis, scilicet, aut alteris, aut simul utriusque divisis, aut apertis, aquæ aut chyli illuviem ventris imi viscera nonnunquam inundare, prout suspicari fas est, ita sequens observatio id ipsum confirmare videtur. Nuper quidam diu Ictericus, ac interea temperatus, ac à potu (ad quem sitim nime premebatur) Abstinens, Ascitem in imentum brevi adactam contraxit. Post medicamina incassum adhibita, paracentesis juxta Sylvii modum cum acu perforata tentatur; è foramine aqua non Ictérica, sed limpida & tenuis copiose effluxit, unde liceat inferre, humorem illum hydropicum non è massa sanguinea profluxisse, tunc enim coloratus fuisset; sed è vasis lymphicis, aut lacteis in abdominis cavitatem extrillasse. Vasorum lacteorum, & lymphicorum circa Ascitem progignendam rationes, utpote affines, unà conjunximus, quia sc. utraque vasa chylum, aut quod ei analogum est, ad commune receptaculum deferunt, & plurius utriusque generis rami, sive ductus circa viscera imi ventris distribuuntur; interim non improbabile est vasis alterutrius vitium solitarium quandoque Ascitem producere.

Quoad alios Ascitis generandi modos ab initio propositos, vix opinari ducor, tale ventris diluvium, ab humoris nervei stillicidio, aut propter vapores illic condensatos facile exoriri posse: quanquam in Tympanitide forsan, ubi abdominis cavitas ampliatur, & transpiratio præpeditur, effluvia exhalare solita, intus coercita in lympham vertantur, quapropter morbo illi, Ascites fere semper conjunctus reperitur.

Designatis ad hunc modum Ascitis causis immediatis, sive conjunctis, quæ nimirum videntur esse, vel humor aquosus è vasis sanguiferis, vel lymphæ aut chylus è propriis utriusque ductibus effusus; jam proxime inquirendum erit, circa morbi hujus causas remotiores, viz. ob quas ~~ascitem~~ & quo ritu vasa cujusque generis affecta sarcinas suas in ventris cavitatem deponant.

Primo igitur quod sanguinis pars aquosa in aquaticulum exudat, aut ipse cruor, aut vasa continentia, aut simul utraque in culpa reperiuntur, sanguinis vitium est, qui in crasi de-

pravatus, partes constitutivas intra compagem suam haud rite continet, quin ad dissolvendum aptus, serositates suas à mixtione passim rejicit; quas vel foras per urinam aut sudores ablegat, vel intus residere permittens, in carniū poros, aut in viscerum cavitates detrudit. Vasa sanguifera sub secunda ratione peccant, quod nempe illorum fines sive oscula aut nimis laxa, aut prorsus occlusa existunt. In priori statu circulationis sanguineæ filum haud integre & firme continuatur, sed cruoris pars tenuior & crudior abscedere apta, juxta arteriarum & venarum intercapedines, aut inosculationes, effluere sinitur; pariter è contra, cum vasorum quorundam osculis propter tumorem, aut obstructionem penitus occlusis, sanguinis curius præpeditur, huic ita coarctato ut transitus quoquo modo pateat, quod tenue & aquosum est extravasatur, inq; loca vicina amandatur, prout supra ostendimus.

2. 3. At vero Ascites Solitarie incipiens, non raro ob vasa lactea, aut lymphica vitata exoritur: quare cum morbi illius, hujusmodi causam sæpenumero conjunctam existere supponimus; inquirendum erit, quot modis, & propter quas occasionibus, hæc vasa adeo aperiri aut dirumpi solent, ut liquorem suum in ventris cavitatem effundant.

Primo igitur lymphæ ductus quod spectat, vasa hæc diversimode in culpa esse possunt, potissimum vero, aut quod juxta origines suas obstructa, aut compressa, humorem non excipiant, aut circa medietates vel fines disrupta cum in aquaticulum profundant. Cujusque horum plures sunt causæ, & efficiendi rationes: fieri enim potest ut materies viscosa eorum principia obstruat, tumores glandulosi, scirrhusi, alique præternaturales eos comprimant, nec non lymphæ exundantis diluvium ingens, quinetiam vehementes corporis motus, aut animi passionibus eos dirumpant.

Secundo vasa lactea, haud minus quam lymphica, discindi, adeoque liquorem suum in ventris cavitatem effundendo, hydropem Ascitem excitare periclitantur: & quidem pari ratione lædi solent, quatenus eorum ductus intermedi, aut fines, vel à chylo viscidioris vis impactu, aut pituita intestinali obstruuntur, vel à tumoribus in Mesenterio adnatis comprimuntur: nam proinde chylus vasorum initia subiens, & transitum non inveniens, imprimis ea plurimum distendit, & postea dirumpit. Plures sunt causæ & occasionibus, propter quas humores crassiores & oppilativi in vasa lactea propelluntur; nam præter dictam irregularem, & plerumque ex cibis dyspeptis, malum hoc sæpe incurritur à potu nimio, aut exercitiis immoderatis statim à pastu habitis, etiam à potu frigido dum viscera summe æstuant; ita nempe vasorum ductus prius hiscentes subito constringuntur, & postea arctius continent, propterea ut chylus intra rivos suos coarctatos hærens, eos brevi penitus oppleat, & obturet.

Quod spectat ad morbi hujus differentias, præter eas modo citatas, viz. quod Anasarca supervenit, vel solitaria accedat; quod etiam hæc multiplex, & diversimoda fuerit, juxta quod vasa sanguifera, aut lymphica, vel lactea, in culpa reperiuntur; insuper advertimus quod

Hydrops Ascites, interdum à mero humore & quod partes in ventris implente & distendente procedit; quandoque vero hinc diluvio membranarum extensiones, sive inflationes à spirituum incolarum inordinationibus facta, accedant, adeoque abdominis intumescantiam adaugeant, atque in hoc casu Tympanites quidam Asciti superveniunt, prout rarius e contra hæc illius soboles existit.

Porro in Ascite mere aquosa, quandoque lymphæ intra cavitationem abdominis hominodoluctuat, interim ut viscera ei immerfa ulque integra, & mole sua minime aut parum aucta persistent; interdum vero præter lymphæ in aquaticulo diluvium, sanguis ibidem tarde circulatus, & fere stagnans, aqua plurimum diluitur; insuper viscerum parenchymata, valorum & membranarum parietes, ac imprimis glandulæ ubique nuverole aqua irriguæ madefactæ intumescunt, adeoque ventris tumor ex pluribus velut aquarum stagnis, & contentis pauidolis consistens, in molem ingentem affurgit.

Mors hujus prognosis suspecta semper & mali omnis habetur: nullus enim è plebe est, quin abdominis tumorem pertinacem, summe periculolum, & curatu perdifficilem pronuntiet. Si quispiam hydrope, vel phthisi affici videatur, apud vulgus statim proxima de hærede ejus queritur.

Ascites Anasarca superveniens (qui ut plurimum à tota massa sanguinea in leontates sua, easque arteriarum oculos in cavitationem abdominis exundante procedit) facinoris curationis, aut saltem memoris spei habetur, quam morbus ille solitarius propter tumores circa viscera, vel propter vaia lymphatica, aut lactea disrupta eveniens, quippe prioris affectus tum causa conspecta, tum procacitatem, sæpe in totum aut quoad partem tolli solent; verum in altero casu, utraque ut plurimum incurabilis existit. Urina in hydrope Ascite rubicunda, lixivialis, & pauca male significat, quippe indicio est sanguinis massam, sale & sulphure scorbuticis simul incoctis refertam, in compage sua nimis strictam esse; proinde ut feculentias non bene seceruat, & per cloacas idoneas amandetur, quæ tamen coacte in ventris cavitationem, quatenus ibidem in circulatione præpeditur, perperam deponit. Enimvero in Ascite, non semper cruor ut in Anasarca dissolutus, sed in crasi sua quandoque nimis compactus existit; ita tamen ut serum salum poris cutis & viis urinariis denegatum, propter viscerum obstructions intra abdomen exuere cogatur.

Si quando in Ascite, à Cathartico exhibito, aquæ copiose cum & per se sedem evacuantur, indeque abdominis intumescantia quidpiam minuitur, de curatione non desperandum erit; sin vero purgantia parum aut nihil feri vel lymphæ educant, indeque ob fibras nerveas irritatas, inque extensiones sive inflationes viscerum & membranarum (uti crebro afolet) adactas, venter plus intumescet, & velut tympaniticus evadet, morbi eventum non nisi tunc expectare licebit.

Circa hydropis ascitis curationem, imprimis considerare oportet quibus viis, & quot modis, aquæ intra abdomen aggelæ, illinc educi, & evacuari possint, quippe per vias tan-

tum possibiles talis evacuatio tentari debet. Atque ne statim occurrat, remedia juxta ordinariam medicinæ praxim pro hydragogis habita, suemilum intendere per cathartim, per diuresim, per diaphoretim, & per inenibilem transpirationem; in quibudam agrotantium casib. hac via, inque aliis potius istæ, vel antea procedatur, & si nulla ex his possibilibus videbitur, aut bene succedat, de paracentesi mature deliberetur. Operæ præsum erit singula hæc pharmacia genera, & cuiusque rationes, & operandi modum, quantaque virtute hydragoga possint, expendere.

Primo igitur quod spectat ad Cathartim, alibi ostendimus à pharmaci irritatione, in ventriculo & intestinis habita, tum viscerum horum contenta & status, tum insuper humores tunics, & glandulis eorum impactos, item in partium vicinarum vas & ductibus aggelos, commoveri, & partim in duæus intestinales exprimi, partim in massam sanguineam relegari; proinde ut tumor abdominis, à partium ejusmodi infarctu, & affectatione velut pauidola oriundus, à catharticis tempestive exhibitis minuatursæpe, & nonnunquam penitus tollatur, verum non ita succedit, si quando hic morbus à lymphæ intra abdominis cavitationem fluctuante, vel à membranarum inflatione, sive extensione Tympanitica procedit: quoniam hydragoga aquas illas parum aut minime educunt, & si fortiora sint, pachema hoc quædam exasperant, & augent.

Cathartica pro hydragogis habita, vel sunt Emerica vel Purgantia; illa in ventriculo, atque hæc virtutem suam potius in intestinis exerentia, quæ sen'bras nerveas immaniter irritant & vellunt, simulque sanguinem, & liquorem nerveum vi quadam velut septicæ plurimum fundunt, humores serosos ubinbet impactos succuti, & quæ data via copiose amandari faciunt. Utraque varii generis, viz. vel simplicia, vel composita, vel leniora, vel fortiora, tum apud veteres, tum recentiores recentur; quedam ex his quæ præcipue notæ sunt hic breviter notabimus.

1. Hydragoga emetica maxime celebria, sunt gummi gutta, elula sive cataputia, eorumque diversimoda præparata, nec non Herculæ Bo-vii, & pilulæ lunares.

2. Purgantia sunt Sambucus, & Ebulus, Sol-danella, Gratiola, Succus Ireos, Elaterium. Cujusque horum aut præparandi, aut componendi, aut exhibendi formulas quadam & modis breviter designabimus.

1. Gummi gutta pharmacum primo Indicum; dein apud nostrates à pictorum officinis ad pharmacopolia translatum, in usum esse cepit; & ad serosos humores educendos valde prædicatur. Quatenus vero per se exhibitum, stomachum vehementer perturbat, & non raro debilitat, idcirco ut vis effera, & violenter emetica nonnihil retundetur, varii ejus præparandi modi excogitantur: omnium optime vero corrigitur, cum spiritu acido, aut cum sale Al-chalifato, aut permiscendo & subigendo cum aromaticis.

Hadrianus à Mynsicht laudat magisterium ejus, quod sit dissolvendo cum spiritu vini, & dein abstrahendo, & præcipitando cum aqua fontana, item dissolvendo cum spiritu vini vitriolato cumque rosæ, ac santalo rubro tincto;

& dein

& dein evaporando, alii præparant, cum fumo sulphuris, ad modum scammonii sulphurati, alii in marmore lavigant, imbuendo cum oleo cinnamomi, aut caryophyllorum, alii vè chymicis aromaticis. Mihi potissimum in usu esse solet, solutione ejus cum Tinctura salis tartari facta, cujus dosis a gut. xv. ad. xx. vel xxx.

℥. Gum. gut. gr. vi. mercurii dulcis gr. xv. conserv. violarum ℥iij. misce. f. Bolus.

℥. Gum. gut. gr. xii. salis absinth. gr. vi. olei macis gut. j. conserv. rosar. damasc. ℥i. f. bolus. Exhiberi etiam solet cum Tartaro vitriolat. vel cremore Tartar. & pul. Rhabbarbari.

℥. Gum. gut. sulphurati aut vitriolati gr. xv. cremoris Tartari ℥β. extract. Rubarb. ℥i. olei cinnam. gut. iij. f. pilul. iij.

Nuper femina Ascite gravissima, ac uti mihi videbatur deplorata laborans, medicamine sequenti per sex dies continuos assumpto, multo melius habuit, & brevi postea integre convaleuit.

℥. Gum. gut. pulv. gr. xii. olei cinnamomi gut. j. syrupi de spina cervina q. s. f. Bolus, dosis iudies augeatur ascendendo à gr. xii. ad. xx.

℥. Tinctur. nostr. gum. gut. ℥i. Aq. lumbricorum ℥i. syrupi de Rhabbarbaro ℥β. misce, detur cum regimine.

2. Esulæ, sive Tithymali, cum variæ sint species, omnesque propter insignem irritationem ab iis in visceribus tactam, per vomitum, aut secessum violentius operentur, proindeque serofos humores copiose educunt; tamen ob plurimum ex iis vim nimis efferam, Esula minor ferè tantum nunc in usu est; ejusque præparata maxime celebria sunt, corticis radicis ejus pulvis, & extractum, nos etiam Tincturam ejus reliquis non inferiorem addimus.

℥. Esulæ cum radicibus mundat. Miiij. ligni Aloes, caryophyl. an. ℥i. contul. coqu. in aq. fantan. lib. iij. ad medietatem, colatura depuratur per subfidentiam in vitro oblongo, dein liquor clarus evaporet Balnei calore ad consistentiam extracti, dosis ℥i.

℥. Hujus extracti ℥β. affunde in matraccio Tinctur. salis Tartari ℥vi. digerantur balneo arenae ad tincturæ extractionem, dos. gut. xx. ad xxx. cum vehiculo idoneo.

℥. Pul. radic. esulæ gr. vii. ad x. cinnamomi ℥β. salis tart. gr. 8. simul tere in mortario vitreo, detur per se, aut cum additione conserv. aut syrupi idonei, f. Bolus, aut Pilulæ.

2. Præcipitatum mercurii cum sole, sive Hercules Bovii, quod ab Authore pro sanandis hydropicis summopere prædicatur, à nobis in tractatu priore, capite de vomitoriis describitur, ejusque ibidem parandi, & operandi modus, ac Ætiologia traduntur. Pharmacum hoc quatenus acrimonia sua fibras stomachicas insigniter vellicat, & ob particulas mercuriales & salinas sanguinem fundit, vomitionem atrocem ciert, proindeque serofos humores in cavitates viscerum violenter expressos, ejici facit.

3. Pilulæ lunares dictæ, pariter ob particulas argenti vitriolicas cum aliis menstruis salinis aculeatus similem effectum producunt, sc. viscerum fibras plurimum corrugando, serofos humores in eorundem ductus fortiter exprimi, & evacuari cogunt.

Solutio Argenti in aqua stygia facta, & bene depurata, parum evaporando in Crystallum

elegantes redigitur; qui per se (aut sale nitri ad terociam virioli lunaris retundendam adjecto) cum mica panis in pilulas formantur: dosis paucula modo unica, modo duæ, aut tres pro ratione operationis, & virium tolerantia. Hujusmodi pharvacam constitutione robusta, & visceribus adhuc firmis, & bene confirmatis, cum fructu interdum exhibentur, corporibus vero teneris, aut cachecticis, vix unquam commode, & raro impune sumuntur.

Hydragoga mere, aut potissime purgantia, vel sunt mitiora, uti sambucus, ebulus, soldanella, & succus Ireos nostratis, quæ rarius per se exhibita, acriorum stimulis indigent, eorumque vice versa ferociam nimiam retundunt, vel sunt fortiora, uti Gratiola, Jalapium, & elaterium.

Sambuci & Ebuli semina, sive grana siccata in pulverem rediguntur, qui ad ℥i. pondus exhibitus, serofos humores per sedem blande educit. E succo baccarum utriusque fermento, aqua & spiritus destillantur, item Rob, & Syrupus conficiuntur; quæ cum multis aliis vegetabilium illorum præparatis, ad affectus omnes Hydropicos valde prædicantur.

Soldanella, & gratiola in nostro sectilo rarius per se in usu sunt, nec quidem medicamina ulla ex illis simplicibus elegantia, & valde efficacia parari solent; quorundam aliorum hydragogæ, ac imprimis Apozematum compositiones sæpe ingrediuntur.

Succus Ireos nostratis pharmacum utile est, & quia pro pauperibus facile parabile, pluris altimandum: datur a ℥vi. ad ℥iβ. vel ℥i. aut per se vehiculo idoneo, aut cum aliis appropriatis. Jalapium contra omnem hydropem medicina notissima, & satis vulgaris est. Unusquisque e plebe morbo eo laborans, statim radicis Jalapii pulveris quantum denario constabit, cum parum Zinziberis vino albo permixtum assumit; idemque remedium aliquoties per intervalla repetitum effectus desideratus non raro sequitur.

Elaterium hydragogon potentissimum jure habetur, utpote quod fibras splanchnicas gravissime irritans, ac insimul sanguinem & humores virtute quadam velut septica fundens, quicquid viscerum membranarum, vasorum, tunicarum, nec non glandularum, & carnes serositate in se continent, in stomachi & intestinorum cavitates expulsi cogit: à quo pharmaco feliciter operante, abdominis detumescencia nonnunquam succedit. Profecto Armamentarii empirici hoc præcipuum contra Ascitem quancumque telum est: quo tamen passim utentes, sæpius ad patientis noxam, quam emolumentum exhibent: dosis à granis iij. ad x. vel xv. sumitur vel per se, additis duntaxat Armoniacis correctivis, vel cum aliis hydragogis; in formâ pulveris, pilularum aut Electuarii. Tinctura & essentia ejus extrahuntur cum spiritu vini, aut cum tinctura salis Tartari.

Hæc sunt præcipua hydragoga simplicia, è quibus rite præparatis, cumque aliis adjectis composita multiplicia, tum officinalia, tum magistralia conficiuntur, & passim in usu sunt; quin & alia quamplurima, pro re nata extempore præscribi possunt. Ex iis formulas quasdam paucas selectiores, ac imprimis quæ sub specie potus, pulveris, electuarii, ac pilul. sumantur, hic subdecimus.

℞. Radic. ebuli, Ireos nostratis, an. ʒiʒ. folior. soldanellæ, grætiolæ, ana Mi. radicum. Alari, cucumeris Asiini, ana ʒii. radic. galangæ minoris ʒvi. Ialap. select. ʒʒ. elaterii ʒiii. cubebæ ʒii. incisis. & contritis affunde spiritus vini, tenuioris Tartarisati lb. iii, digerantur clausæ in furno Arenæ per duos dies; f. colatura clara, quæ per subsidentiâ depurata, detur c cochl. ii. ad. iii. cum vehiculo idoneo.

℞. Elaterii, soldanellæ, zinziberis, ana ʒi. galang. caryophyl. cinnamomi, an. ʒʒ. salis Tartari gr. xv. f. pulvis pro duabus dosibus.

℞. Pul. radic. Ialap. select. ʒi. zinziberi ʒi. cremoris Tartari gr. xv. f. pulvis; detur in haustu vini albi.

℞. Rhabarb. pul. ʒi. elaterii gr. v. Tartari vitriolat. ʒʒ. spicz. ger. iii. cum syrupo de spina cervina, f. pilul. iv.

℞. Pilul. Alcephangin. ʒʒ. elaterii ʒʒ. olei caryophyl. gut. iii. f. pilul. iii.

Pilulæ Hydropicæ Boetii dentur à ʒʒ. ad ʒʒ. Ad hunc modum parantur.

℞. Aloes opt. ʒiʒ. gum. gut. parat. ʒiʒ. diagridii correct. ʒi. gunum. Animoniac. solut. ʒiʒ. tartari vitriolat. ʒʒ. f. massa quæ formetur in pilulas.

Electuaria quædam hydragoga nunc passim in usu apud practicos celebrantur; cuiusmodi imprimis sunt unum à Cl. Sylvio, ac alterum à Zveltero descriptum. Nobis hoc sequens arridet.

℞. Resin. Ialap. ʒi. tartari vitriolat. ʒi. extract. rhabarb. ʒii. elulæ ʒiʒ. rad. galang. minori ʒi. iterum tere, ultimoque adde contea v. flor. Ireos nostratis ʒiii. & cum. f. q. syrupi e floribus persicorum f. electuarium, dosis ʒʒ. ad ʒiʒ. vel ii.

Possim hic multa alia hydragoga purgantia citare, aut describere, verum Cathartica Asciten non semper curant; imo sæpe exacerbant, & (si diutius eisdem instillitur) incurabilem reddunt; hinc ut necesse fuerit, pro hoc morbo sanando ad alia remedium genera recursum habere. Itaque jam proxime inquiramus utrum diuretica hic prosint, nec ne?

Et quidem facile quispiam existimet, medicamenta urinas moventia, propter aquas è quocunque loco, aut corporis specu educendas, plurimum conferre. Revera hæc Anasarcam frequenter sanare, & præ aliis quibusque remediis iuvamen præstare, experientia satis crebra liquet, videamus igitur quid pro abdominis cavitate elutrianda efficiant.

Super hoc in primis constat, nullum ad renes à stagno Ascitico, quamvis vicino, ductum immediatum patere; sed quicquid aquarum hinc inde transfertur, necesse erit primo in massam sanguineam resorberi, & deinde e sinu ejus in cloacam urinariam effundi: at vero quantum est, quod venarum oscula, circa viscerum superficies (si forsitan omnino patent) dehiscunt, excipere possunt: tunc hoc unicum diuretica efficere queunt, ut sanguinem fundendo: ejusque serositates ad renes copiosius pellendo, ipsum adeo inane aquas in ventre fluctuantes ad se allicere faciant, interim haud minus periculum est, ne diuretica intempestive exhibita, dum cruorem nimis fundunt, serum abscedere coactum, in Alciis nudum, plusquam in renes adigant,

adeoque ventris diluvium augeant potius quam tollant. Enim vero ita interduum evenire, observatione crebra mihi satis compertum est; quare cum diuretica ad Asciten curandam præscribuntur, à tali effectu contrario summopere cavendum erit. Profecto ob hanc rationem est, quod remediis hydropicis (ex veterum Auctoritate & praxi per experientiam inventa) adstringentia, & corroborantia semper admiscuntur, non quod talia Hepatis Tonum (uti vulgo dicitur) confirmant, verum sanguinis crasin live mixtionem, ne fusione nimia penitus dissolvatur, præservent. Itaque in Ascite quæ propter viscerum & vasorum compages, ac imprimis tunicas, glandulas, ipsaque fibras, earumque interstitia ab humore seroso infarctas, proindeque summe intumefactas, potissimum aut ex parte contingit, quemadmodum Cathartica, ita & diuretica conveniunt, & non raro cum fructu sumuntur; in quantum sc. horum usu, massa sanguinea (sero ad renes copiosius derivato) inanita, aquas illas juxta ipsorum oscula ubique stagnantes, facile in se recipit, & versus cloacam urinariam convehit: verum e contra in mera Ascite, ubi viscerum texturis à seroso infarctu immunibus, aquarum illuvies ventris cavitatem inundat, diuretica aut frustra, aut incommode exhibentur; quatenus nempe nihil e ventris stagno exprimunt, & sæpissimè cruorem fundendo, aquas illic instillari aptas impetuosius adigunt.

Diuretica in Ascite non omnia cujusque generis ex æquo conveniunt, neque indifferenter exhiberi debent, quippe observare est morbo isto affectos, plerumque urinam paucam, rubicundam, & quali lixiviam reddere; quod equidem indicio est, sanguinis crasin à sale fixo & sulphureo exaltatis, & simul combinatis, nimis strictam in iis exillere: proindeque serum ejus intra renes haud debite secerui; quod tamen circa viscerum obstructorum anfractus exiit, adeoque in ventris cavitatem deponitur. Quapropter in hoc statu ad urinas ciendas ea tantummodo propinare oportebit, quæ sanguinis constitutionem ita restituunt & emendant, ut salis fixi & sulphuris enormitatibus sublatis, pars serosa intra renes separari, & uberius amandari possit; in quem finem, non acida, aut lixivialia, verum sale volatili prædita destinantur. Nam sæpius observavi in ejusmodi agrotantibus, cum spiritus salis, aliaque mineralium stigmata acida, cum quo salis Tartari, genistæ, aliorumque deliquia, aut solutiones, noxæ potius quam commodo extiterent, succum plantaginis, Beccabungæ, aliarumque herbarum sale volatili abundantium, nec non Millepedarum expressiones plurimum juvasse: propter eandem rationem, sal nitri summe purificatus, live Chrysellum minerale non raro insigniter prodest. Medicaminum in hunc usum accommodorum formulæ in tractatu priori nostro extant, ubi sc. Diureticorum, quibus tum sal volatilis, tum sal nitrosus, pro basi est, exempla describuntur. Porro huc referri debet experimentum notabile, quo Iohannes Anglus Asciten à causa calida sæpius curatam asserit, quod etiam medicamentum Medicus experientissimus D. Theodor. Mayerne in simili casu præscribere & magnificare solebat: sc.

℞. Succum plantaginis & hepaticæ, & imple-

ple ollam terream usque ad summum, quæ cooperta & exacte clausa ponatur in furno calido, pane extracto, & nat ignis in lateribus ollæ debilis, ad calorem furni sustinendum, post coctionem liquor coletur; & cum saccharo dulcoratus poterit mane & sero, & curat; ad hujus imitationem, sæpe cum successu, modo sequenti præscripti.

℞. Folior. plantaginis virentium M. iiii. Hepaticæ, Beccabungæ, ana M. ii. simul contulis affunde aq. Raphani composit. tenuis, aut alterius magistralis appropriatæ ℞. s. f. expressio fortis, dosis ℥iij. ter in die.

Diaphoretica licet in Anasarca potissime, in Ascite tamen, aut nullius, aut rarioris usus existunt: quippe intempeltive adhibita, sine ullo juvamine magna in sæpe ægotanti noxam afferunt, quatenus nimirum sanguinem excofaciendo, aquas in ventris cavitate fluctuantes ælluare, & velut ebullire faciunt: propterea ut spiritus & humores a vaporibus exinde elevatis valde perturbentur: adeoque functionum omnium inordinatio consequatur, ipsaque viscera velut elixata plurimum lædantur. Porro a diaphoreli ita perperam instituta, cruor infusionem, & seri præcipitationem coactus, ipsum amplius in Ascitis nidum deponit. Quod igitur nonnulli fortis & linimenta ventris tumidi aqualiculo applicanda, & Balneationem præscribunt, laborantibus fere semper in deterius cedit; nam præter febricitationem cephalalgiam, vertiginem, spirituum deliquia, aliaque cerebri, & cordis mala symptomata ita sapissime excitata, etiam venter exinde plus intumescit: in quantum sanguis agitato & fusus, serum ibidem amplius deponit; quinimo & vasorum ora proinde magis laxantur, & aperiuntur, ut aquas e massa sanguinea abscedere aptas promptius extillent. Remedia autem quæ prope loca affecta (cum citra paracentesin morbi curatio intenditur) maxime cum fructu adhiberi solent, sunt Enemata ac Emplastr.

Priora absque totius massæ sanguineæ fusione (quam Cathartica fortiora cient) serum e vasis & glandulis intestinorum ac mesenterii proliciunt; quæ proinde inanitas lymphas extravasatas aliquantulum imbibunt. In hunc finem Clyster sequens, à nobis in hoc casu præscribi solitus, egregie convenit, quatenus nempe una fibras intestinales vellicat, atque serum à sanguine imbibitum, aut in eo prius contentum, verius renes projectat.

℞. Urinæ hominis sani & vinum bibentis ℞. j. Terebinth. Venetæ cum vitello ovi solut. ℥iij. salis prunellæ ℥iij. s. f. enema, repetatur quotidie. Emplastra nonnunquam in Ascite juvamen conferunt: illa tamen ejusmodi sint quæ virtute quadam restrictiva, & confortativa viscera corroborant, & vasorum ora ne serositates expuant nimis, constringunt: in hunc finem Emplastrum Diasaponis sæpe cum fructu ventri tumido applicare soleo. Vel.

℞. Emplastri de minio, Paracelsi, ana q. s. f. emplastrum abdomini applicandum. Si quando hic morbus cum Tympanite complicatur, alijsmodi epithemata conveniunt, prout inferius declarabitur.

Magnum & præsentissimum Ascicis remedium est, ut Paracentesi facta aquæ extrahantur: quæ

tamen administratio haud sæpius morbum curat, quam patientem interimit: quapropter summa cautione opus est cujusmodi affectis & quo morbi tempore adhiberi debet: cachecticis, & diu invaletudinariis, in quibus viscerum conformatio & temperies prorsus vitiantur, frustra erit ex Aqualiculo perforato lymphas elutriari; nam exinde statim spiritus fatiscunt, atque vires exolvuntur: quin & propediem humoris morbifici nova illuvies succedit. Porro quis prius *παρακέντησις* & quoad partes quasq; alias satis sani, a causa quadam magna evidenti in Ascitem incidunt, uti paracentesin non primo statim tentare, ita nec diuiniis, si requisita fuerit, eam differre oportebit: etenim mora longiori viscerum, dum aquis immersa, & vesut elixata diu perstant, vitiositas inemendabilis contrahitur.

Paracenteseos administrationem, siue modo ordinario, siue Sylviano per acum perforatum fiat, non opus, imo extra propositum nostrum erit hic describere: *παρακέντησις* hanc utpote periculosa cuni medici raro præscribunt, his sæpissime inconsultis, agyrthæ ac empirici eam temere ac intulste aggrediuntur: libet hic coronidis loco Ascitis veræ ac immanis absque paracentesi nuper curatæ, historiam subungere.

Femina Juvenis Mercatoris uxor, tenuis & proceræ, cum infantem suum lactaret, ad lac augendum interdum & noctu cervisiam modo simplicem, modo lacteatam immodice ingerebat. Postquam hac mala viciis ratione per sesquimensem usum fœderat, Ascitem, cujus initia minime advertebat brevi, immanem contraxit: quippe abdominis aqua intus fluctuante gravidum, valde intumescibat, ejusque moles cum e latere uno in alterum se devolveret, extra illa & reliqui corporis oram concideret: interea membrorum omnium carnes valde absolvebantur, ut non minus tabida simul, ac hydropica videretur.

Infante ablactato, & meliori victus ratione instituta ad medicinam se contulit, cepitque imprimis hydragoga leniora, tum cathartica, tum diuretica, absque ullo tamen commodo; quin a purgatione omni semper deterius habuit: hanc postea curæ nostræ commissam, & pene deploratam methodo sequenti tractabam.

Cervisæ & liquoris cujusque potulenti (pharmacis exceptis) usu fere in totum interdicto medicamenta hæc præscribo.

℞. Foliorum plantaginis, Beccabungæ, aparynes, ana M. iiii. simul contulis affunde aq. lumbricorum & Raph. composit. ana. ℥iij. s. f. expressio, cepit bis in die, viz. hora viii. matut. & v. post mer. Medicamenti hujus usum diu continuabat, sed compositionem subinde variabat. mutatis modo herbis, modo liquore iis contulis affundendo.

℞. Tincturæ salis Tartari rubicundissimæ ℥iij. cepit. gut. xx. hora somni & primo mane in cochlear. ii. sulap. seq. superbibendo cochl. vii.

℞. Aq. flor. sambuci, saxifragiæ, ana ℥vi. aq. Limacum, Lumbricor. Raphani composit. ana. ℥ij.

Super abdomen gestabat emplastrum ex emplastro de Minio & oxycroceo. Enema sequens adhibebatur primo quotidie, postea diebus alternis aut tertiis.

℞. Urinæ hominis sani ℞. j. Terebinthinæ solutæ cum vitello ovi. ℥iij. sacchari ℥i. salis Prunellæ ℥i. s. f. enema.

Horum

Horum usu constanti, intra seſequimenſem venter detumuit, ſed carne indies contabefcente Phthiſis metuebatur. Quare hujus præcavendæ gratiâ ruſ proſectâ, lac aſininum bibebat; cuius nutrimenti, & auræ purioris beneficio, medicamina uſque prædicta aſumens, intra tres aut quatuor ſeptimanas integrè convaluit, & etiamnum vivit, valetque. *Thom. Willis Pharma-
ceuticæ Rationalis Parte II.*

Curaciones.

Propter materiæ ventriculo & hepatis propin-
quâ tenuitatem, promptitudinem & copiam,
non requiro longam multamve concoctionem;
ſed ſtatim ad aquei humoris evacuationem fe-
ſtino & præter alia, hic mihi in uſu eſt gratiola
herba, quam licet valdè amarâ, & propterea
minus delicatâ, in ſubſtantia exhibere queunt
alii ad ℥ii. cum pulv. cinnamom. & ſem. anis. mo-
mento, ſaccharo & vini hauſtu; ego tamen in vi-
no decoquo m. i. ejus parvum, ſeu ℥ſſ. cum uvis
paſſis acinis exemptis, & à forti expreſſione ad-
mixta canella, anifo & ſacchar. horâ matutinâ
propino, vel hac ratione apparari poteſt.

℥. Gratiol. ℥ſſ. ſoldanell. ℥i. ſem. anis. ℥ii. p. ſul.
enueleat. ℥ſſ. bulliant cum vino ad remanen-
tiam ℥v. liquor expreſſus exhibeatur. Potens il-
lud eſt pharmacum, quo ſerolarum & aquearum
ſuperfluitatum libræ non pauciores octo quan-
doque expurgantur, proximum potentia & bo-
nitate catharticum ſuccedit ſuccus rad. iridis
& puratus qui cum ovi vitello diligenter com-
mixtus, albumine prius effuſo, ex teſta tepide
lorbeatur vel paretur ſequens hauſtus.

℞. Succ. irid. per reſidentiam deſecati ℥iii. vel
℥ſſ. ſyr. roſat. ſolut. ℥i. cinnamom. elect. ℥i. m.
Dantur item pil. aggregat. ℥ii. cum gr. ii. elate-
rii Cortex ſambuci & ebulli interior flaveſcens
vulgo hic uſurpatur, redigitur & ebulli cortex
in pulverem, ejuſque ℥i. cum aq. linar. ℥iii. propi-
natur, unde per urinam, vel etiam ſedem, aqua
cutim ſubiens potenter expellitur, frâgulæ a cla-
riſſ. *Marbiolo* deſcriptæ utilitas non vulgaris: cu-
jus interior cortex decoquitur cum eupator. ab-
ſynth. Roman. cuſcut. veron. rad. cichor. ſem. api;
& ſenicul. adjecto poſtea cinnamomo. Efficax
hic item vitis ſylveſtris radix. Sunt qui olei vi-
trioli guttâ in vini cyatho hydropicis propi-
nant, idque magni arcani loco habent, porro
hoc obſervandum, ſingulis ſeptimânis ad mini-
mum ſemel tentandam eſſe evacuationis repeti-
tionem ne venter mox denuò ſaburræ aqueæ af-
fluxu exundet, quando autem paulatim ventrem
& hepatis exonerari deſideramus, aut propter hu-
moris delinquentis abundantiam, aut labefactâ
tam viſcerum virtutem, aut plurium ſymptoma-
tum concurſum, tunc ex hoc condito quotidie
vel alternis diebus hora matutinâ ſumatur. ℥ſſ.

℞. Succ. irid. ℥ſſ. canell. galang. an. ℥ii. cay-
ophyll. macis, an. ℥i. Zedoar. ℥ii. ſoldanell. elect.
℥ſſ. in pulver. trita, m. cum melle deſpumato ad
elect. formam & baccis quoque ſambuci & ebulli
à ſemine expurgatis, & per colum trajectis, ſuc-
cus cum paucis melle deſpumato vel ſaccharo
coſtione inſpiſſatus hic utilis, ſtillatitia item
utriuſque aqua artiſcioſe extracta ad ℥vi. hau-
ſta commendatur. Prima ad hæc arborum ha-
lum germina vel fol. adhuc tenella leviter bul-

lita in acetariis hic cum ſucceſſu aſſumuntur,
quæ in eundem uſum etiam oleum more co-
quantur. Urinam cientia hic unicè prodeſſe
conſtat, inter quæ efficax eſt imprimis oleum
& juniperi baccis pure extractum, & cum
vino ſumptum. Datur à plerique petrolemum
cum vino, quod urinam, ſudorem & vomitum
mover. Memini adhuc quod *Roma* marito aſci-
te diutius excruciato, pulverem buſonis uſti,
ut veneno tolleretur, ſumptum perſtrâ uxor
exhibuerit, unde copioſum hic lotium red-
didit, hinc ipſa denuò eundem propinat pul-
verem, ut citius ærummoſam ſumpeſcitamque
vitam cum ſubita commutaret morte; qui ab
uberiore aqua conſectum per veſicam exonerat-
us, præter conjugis expectationem convaluit.
Sunt item qui propinant decoct. rad. aperient.
℥iiii. cui admixta fuerint ſem. lini ℥iii. Corre-
ctoria ſcilicet, & cantharides duæ in ul. deco-
ctæ, ſed prius ſimul colantur, interim ad vi-
ſcera roboranda hanc præſcribo mixtionem.

℥. Conſerv. rad. enulæ ℥ſſ. conſerv. abſynth.
Rom. ℥i. ſpec. diacinnamom. ℥ſſ. dialacc. ℥i.
ol. junip. ℥ii. cum ſyr. de eupator. q. ſ. t. con-
ditum. In uſu etiam ſint zinzib. conditum, ra-
dices pimpinellæ conditæ conſ. abſynth. Rom.
conſ. rad. helenii, & rad. eadem conditæ, &
liquoties vini ſublimate uſum permitto, maxi-
me in hypofarca. Cæterum duo etiamnum re-
liqua ſunt præcipua totius curationis capita,
quæ ſi ritè obſerventur, mire conducunt. pri-
mum eſt in toleranda ſiti conſtantia, quam
ſtricta adeo lege impero, ut agris non ultra
℥ſſ. vini in quemlibet diem permittam: mi-
noris vitro bibant humectata etenim ſapius
vini ſtillantis momento lingua promptius tal-
litur ſitis, nec ejus copia gravatur ventriculus.
Alterum & ſerè maximum erit ſudor; quem
quomodocumque, quantum fieri poterit
extorquere oportet. Theriaca poſttridie
purgationis, cum vino calido propinata,
huc facit extrinſecus ſudoris profluviū mul-
tipliciter molior, idque pro ægrotorum diver-
ſa conditione, tenuioris ſiquidem fortunæ ho-
minibus conſulo, ut menſæ incubans corpus
univerſum in clibanum, recenti pane extracto
etiamnum tepentem, immitatur ſic ut caput
extra præfurnium pulvinari mixtum libere re-
ſpiret, ne calidiori. ère ſuffocationis pericu-
lum ſubſequatur. Ut is quoque citius promovea-
tur & tibiaſum inflatio ſimul diſcurſatur, are-
nam in lebeſe vel cacabo calefactâ, ſive e-
tiam cineres quercinos eodem modo calentes
in ſacculum infundo, cui colligato imponan-
tur crura tumida mane & vespere. Alius ſudo-
rum exprimendorum modus mirè utilis & cer-
tior exiſtit, ſi cupa idonea prius igne vaſi im-
poſito incaleſcat, tecta ſodie, aut panno denſo
vel operculo ob tumidum corpus commodò, in
hæc ſuper ſedecula ſiſideat æger, thorace & col-
lo ita munito, ut quid vaporis exhalet: De-
inde ſequens decoctum in cacabo vel vaſculo a-
priori fervidum intra tibias collocetur, in quo ſu-
binde igniti ſilices immittentur, ut novus copio-
ſiorque deinde excitetur halitus, qui ſemper in
ventre tumido quam fieri poteſt calidiſſime ex-
cipiatur: ne tamen primi ſemper fervoris vio-
lentia urat cavendum ſedulo: quo autem con-

stantius diutiusq; hoc sudoris effluuium toleraverit agrotus, eò suæ valetudini consulat re-
ctius. Postea linteo calido coopertus, in
contiguum lectum calentem deponatur, ne
præpediatur sudoris fluxus: interim exhibea-
tur quod vires roboret, vel rehciat: deco-
cti jam dicti materia esto; rad. & folia sam-
buci & ebuli, raphanus, absynth. puleg. ru-
ta, abrotan. marrub. heder. rosmarinus, ma-
jorana, origan. salvi, calamenth. laur. folia.
thymus, hyssopus, centaur. minor. nastur-
tii species, bacc. juniper, anethum, chamæm-
quæ admixtis sulphure potissimum & sale, in
lixivio & vino, aut in lixivio solo bulliant:
vel suffitus hic excitetur solo acri lixivio,
ex sarmentorum cineribus, vel quercinis pa-
rato. *Ex Ioh. Wieri observ.*

Inter medicamenta quæ aquam educunt,
primum obtinet locum succus iridis depu-
ratus à ÿii. usque ad ÿß. bis in septimana
cum mell. rosat. ÿii. in aurora datus: hac le-
ge ut inter has evacuationes jecur corrobore-
tur hoc medicamento.

℞. spec. diarrhod. abb. trochisc. de rheo,
hepat. lupi præparat. an. ði. cum syr. de ab-
synth. f. bolus, in aurora dandus. Succus
etiam cucum. sylvestr. siccatus (quem clau-
sterium vocant) omnium efficacissime purgat,
atque cum minori molestia & violentia, si
hujus tria vel quatuor grana cum pilul. alex-
phang. ÿß. in bolum cum syr. absynth. redi-
phang. ÿß. in aurora exhibeantur. Medicamen-
tum autem ex cantharidibus paratum, licet
ex *Galeni* placitis aquosum humorem hunc per
urinam valenter expurget, mihi medici-
nam facienti semper fuit suspectum. Hydra-
gogum quod sequitur egregie aquas subducit.

℞. Soldanell. ÿii. bulliant in aq. scolopen-
dr. ÿix. ad consumptionem tertiz partis, in
colat. adde pulv. sem. ebul. ÿiß. vel ÿii. vini
alb. ÿiß. hæc potio alternis diebus maximo
cum successu in aurora felicissime exhibetur.
Subinde etiam injiciatur clyster sequens.

℞. Soldanell. m. i. mercurial. malv. flor.
chamæm. an. m. ß. sem. anis. fœnicul. carui,
dauci, an. m. i. bulliant in aq. q. s. in cola-
tur. ibi dissolve benedict. laxativ. ði. elect. è
bacc. laur. ði. ol. rutac. ÿiii. sacchar. rubr.
ÿiß. sal. comm. ÿiii. f. clyster. Hic clyster non
solum aquam corruptam expurgat, verum e-
tiam & status, qui aquoso humori semper
junguntur (unde ventris distentio & dolor)
mirifice discutit: propterea & toto etiam cu-
rationis tempore alternis saltem diebus utili-
ter injici poterit, inter cataplasmata ventri
adhibenda, quod sequitur maxime valet. Em-
plastrum videlicet ex cochleis cum testis suis
exacte contritis cum aqua ardenti, oleo itimo &
oleo ex terebinthina destillato paratum. De
Chirurgicis auxiliis, nihil habeo quod propo-
nam, quandoquidem venæsectio hydropicis
omnibus nocentissima censetur, nisi inter mor-
bi initia ex consuetâ aliqua sanguinis salubri
excretionem pendentis, neque etiam de perfo-
ratione, vel utione cogitandum judico, quo-
niam præterquam quod opus hoc periculo ma-
ximo plenum est, nihil facit ad morbi fomitem
tollendum, viscerum nempe tumorem *Ex Ioh.*
Zecchi (dist.)

In Ascite, quæ omnium communissima, sine

omni mora materia in abdomine contenta
evacuanda, præmissis tamen aperientibus &
simul humorem crudum hepatis impactum præ-
parantibus. Fiat igitur statim decoctum, quo

℞. Rad. Ellebor. nigri præp. mechoacan. an. ÿiß. galangæ ði. fol. sen. Alexandr. mund. ði. sem. anis. fœnicul. an. ÿß. cartham. ÿß. infunde in s. q. decoct. aperitiv. per noctem manè coque ad ÿviii. addendo sub finem co-
cturæ Rhabarb. ÿiß. sacchar. ðii. Colentur. f. Apozema non clarificatum pro 3. aut 4. do-
sibus, addendo ad ultimam dosin specier. dia-
turbith. cum Rhabarb. ðß. aut ði. Iostres
doses Apozematis, exhibeatur dosis Mercur.
laxativ. aut præcipitat. cum sole, cum ex-
tracto Colocynthidos & scammonii, aut exhi-
beatur ði. ad ði. extract. Elua toties à Ru-
landi ad hunc morbum decantat; præparatio-
nem vide in notis ad Crollium.

Huc referri etiam potest sp. vitæ aureus Ru-
landi, qui fit cum spir. vini Malvatic. ex
trochiscis alandhal. extracta, tinctura, quæ
pro quantitate trochiscorum & spir. vin. pro-
pinatur. Hinc exhibetur per tres dies con-
tinuos diureticum sequens.

℞. Rad. Ebul. ÿß. fœniculi, polypodii,
petrosel. an. ÿiiß. rad. irid. m. i. Elleb. præp.
mechoacan. an. ðii. fol. sen. ði Cort. inter-
rior. sambuc. ÿiß. flor. sambuc. genist. an. p.
iii. flor. lavendul. p. ii. sem. fœniculi, dauci,
an. ÿiß. zinziberis, galang. an. ðiß. Infun-
de in s. q. aq. gratiol. & florum sambuci per
noctem manè leviter coque ad ÿviii. vel cir-
citer exprimantur, Colaturæ adde syr. Eupa-
torii, syr. bysantin. an. ðii. aq. Cinnamom.
ÿß. adde semper si alvus non respondeat,
extract. Trochiscorum Alandhal aut sp. vitæ
aurei, quod visum fuerit: aut addatur suc-
ci rad. iridis nostratis, nasturtii & corticis
viridis sambuci ÿß. ad ÿiiii. Apozematis di-
cti: imò si succi dicti ad ðii. vel ðiiß. pro-
pinentur cum aq. communi tantum, poten-
ter aquam educunt. Debet etiam interdum, ne
scilicet semper purgetur æger & vires labas-
cant, exhiberi Cremor Tartari aut magiste-
rium ejusdem aut syr. de Eupatorio, Cortici-
bus citri, & oxymel scilliticum cum aq. meliss.
fœnicul. agrimon. apii, Cinamomi dilutus. It.
Tabellæ sequentes.

℞. Pulver. dialacc. diacurcum. an. ðii.
sacchar. solut. in aq. halicacab. ÿiß. tinctur.
martis ðii. ol. nuc. moschat. destillat. gr. iii.
f. s. a. Rotulæ de quibus sumat. ðii hor. ante &
post potum. It. Utatur Electuario sequente, quod,
℞. Rob. sambuci ðiii. mithridati ÿß. spec. diar-
rhodon. Abbatis, solut. perlarum, solut. ocul. can-
crorum præp. an. ði. syr. de Eupatorio q. s. sp. vi-
trioli ðß. f. Electuarium, de quo mane & vespere
3. horis ante cibum sumat ad quantitatem a-
vellanz. Potest quoque venter foveri decoct.,
quod fit ex herba menthæ, origani an. mii. florum
sambuci, meliloti an. p. iii. sem. carvi ÿiß. baccar.
laur. ðiii. stercoris capræ ad pondus omnium,
coq. in lixivio & ex aq. simplici cum decoct. aut
herbis ipsis calidis foveantur partes tumida,
post fomētum applicetur emplastrum de baccis
lauri. Hinc accedatur ad ea quæ proprietate oc-
cultâ ad quemlibet hydropem faciunt. Est a-
qua lumbricorum terrestrium rubrorum. a. aqua
sequens.

℞. Vitriol.

R. Vitriol. & Tartar. an. ℥i. rad. vincetoxici ℥ss. Spir. vin. pintam unam, stent in iniunctione per tres dies, postea destill. in arena per alembicum, aquæ destill. adde gutt. aliquot sp. vitrioli ad gratam aciditatem, detur singulis diebus tribus vicib. in decocto vincetoxici cochl. urinam properanter moveri intemperiem corrigit & obstructions tollit. 3. Pulvis bufonum. 4. Ictercus asferinum. Pro potu utatur sequente Julapio
R. Aq. petroselin. halicacab. an. ʒv. aq. flor. sambuci ʒiij. spir. vitriol. ʒss. aut sp. lap. prænell. ʒss. syr. de radicib. ʒiij. m. aut utatur vino absynthiaco chalybeato, &c. Tandem tumore sublato ad ea veniendum, quæ reliquias discutere, & partem affectam roborare valent, qualia sunt aqua Theriacalis, decoctum ligni guajaci, Balsaparill. chinæ, Balnea sulphurea & aluminosa. aut.

℥. Rob. sambuci ʒiij. sal. card. benedicti ʒi. m. thridatii, ʒi. syr. de Card. bened. q. s. ad consistentiam Electuarii, quod assumat duabus vicibus & in lecto aut supha duobus matutinis sudet, aut.

℥. Rad. Balsaparillæ, ras. guajaci, an. ʒss. sal. fr. ʒi. infund. in f. q. aq. comm. per hor. 24. postea coq. ad ʒi. colaturæ adde syr. de Card. bened. de lez. nos. an. ʒvi. sal. card. bened. ʒi. aq. cinnamom. ʒi. m. pro 2. dosibus ante introitum laconici, aut detur dosi bezoardici mineralis, aut antimonii fixi diaphoretic. cum gr. ii. lapidis bezoardici Hepar roboratur Electuario de scoris ferri. Electuario diambra: ad ejus ʒi. adde conserv. rosar. rubrarum antiquæ ʒi. croci Martis ʒi. Quod si tumor pedum, ut plerumque fit simul adsit, tunc fiat lixivium ex Cineribus quercus, & in lixivio dicto superius pro fomentatione herbe adjiciantur, & coquatur usque ad consumptionem medietatis partis. In lixivio intingantur lintea cruda, quæ exprimantur & ita calide applicentur cruribus. Ant si tumor adhuc aliquis ventris & tibiærum adsit, tunc pans niger in vino & modico aceto coquatur ad consistentiam pulvis seu Cataplasmatidis & extendatur super pannum lineum, atque superimponatur ventri toti, & relinquatur per 24. horas. Postquam decumunt, ponatur versus genua semper descendendo usque ad pedes. Quod si nec his tumor cedat, aut tanta adsit copia, ut resolvvi non possit, convenientissimum est tibiis applicare cauteria potentialia, 4. digitis supra malleolum aut 4. digitis infra genua: quo solo remedio, qui ab aliis incurabiles censebantur, tumores crurum & ventris sanari vidimus. Alii applicant folia Bardanæ dictis partibus tumidis, sæpius mutant, & sic aquam contrahi & consumi dicunt. Si ita si adsit magna, ut tolerare nullo modo eam possit, tunc & sp. Sal. in vino granatorum exhiberi potest, vel sal absynth. a gr. iij. ad vii. cujus exhibitionem si continuaveris aliquandiu, amplius non sitiet. (In hydrope quotidie detur ʒi. vel ʒi. salis ex felle vitri cum vino albo, mirabiliter juvat.) Iohann. Hartmannus in *Pract. Chyinatricæ*.

De Paracentesi Abdominis.

De Paracentesi Abdominis quandoque in Hydrope Ascite fructuosa, verbum habet Clar. Willisius: de ea hic jam distinctius agendum venit, adductis propriis hoc in argumento Accuratissimi Thomæ licet verbis. Sic autem ille.

Exempla dantur non pauca in quibus natura sponte, rupto umbilico, sibi viam invenerit pro aquis ejiciendis. Quare ergo & nos, naturam imitantes, non audebimus idem in desperato casu facere? Interim tamen sectio est periculosa, & non debet a medico, nisi prædictione maximi periculi tentari, ut sic honori suo consulat. Periculum, quod circa eam est, non consistit in ipsa sectione, per se, quia illa sectio non est per se lethalis: nulla enim ibi vena, aut arteria, aut nervi, aut partes magis momenti, sed tantum cutis, musculosa etiam caro, & quotidie videmus vulnera abdominis, etsi penetrantia sint, modo nihil internorum membrorum latum sit, facile & sine magno periculo consolidata.

In hydropicis ergo nullum periculum est hæmorrhagiæ: nullum etiam periculum est, ut a sectione interna aliqua partes lædantur: illæ enim in uno jacent, & inter eas & carnem abdominis magnum interjacet spacium, aqua plenum: verum periculum consistit in his tribus. Primo, quia periculum est, ne post ulationem aut sectionem, sequatur gangrena. Venter enim ab aqua putrescente plurimum debilitatus, & refrigeratus est, ideo a minima accedente læsione, facile omnem calorem nativum perdit, & mortificationem incurrit. Secundo, consistit in exitu aquæ: quia si aqua repente tota effluat, periculum est, ne æger statim moriatur, spiritibus mutis cum ipsa erumpentibus. Si lente exit, etiam periculum mortis ex eo est, quod etiam lente spiritus & caro exhalent, & quod partes, quæ antea solidae sunt in calida illa aqua natarent, fluctuantque nunc sublidant, situm mutant nudæ sint, & aeri in vacuo loco contento expolite. Tertio in molestia aquæ retinenda, cum jam foramen factum est. In eo enim summa, ut experienti didici, difficultas consistit: & ut foramen bene claudatur, hic opus hic labor est. Magnum certe hic imminet periculum. Nam cum foramen tactum est, aqua ea magno impetu fertur, ad exeundum. Si confertim affluat, periculum mortis est, ut Hipp. in aphor. testatur. Itaque debet retineri, ut per intervalla tantum exeat. Atque vix retineri potest, quia in foramine debet esse fistula, per quam aqua per intervalla committi possit. Nam si fistula semel exierit, non posset iterum intro mitti, propterea quod tunc cutis, peritoneum & musculi essent divulsi, & non tasselent situm in unum, & sic foramen unius non responderet foramini alterius. Itaque cum fistula non possit tam exacte foramen claudere, sit, ut aqua erumpat. Si vere eam ita, & fortiter intrudere vis, ut foramen exacte claudat, periculum est, ne gangrena sequatur, quo facillime fit, cum venter ab aqua tam refrigeratus est, & sectione insuper debilitatus: ad hoc impositis cum dolore tentis, vel fistula laceratur. Nam quod dici possit, emplastra de uper inducenda esse, quæ valde tenacia sint, & adeo fortiter ventri hæreant, ut aquam includent: id equidem impossibile est. Nam aqua impetus & ea excutit; & ipsa quoque, cum sine oleosa, ventri ab aqua humido existenti non adhærent, ut experientia didici, & sic cum factum est foramen, vel periculum est ut non bene clauso foramine aqua confertim erumpat, vel ut clauso gangrena, & utrinque mors insequatur.

Ut his incommodis obviatur commodus, perforandi locus modusque est inveniendus. Quoad locum, ita est sciendum, quod Ascitici pro aquæ educatione variis locis secantur. Interdum crura aqua tumida sunt, fiuntque sectiones, seu scarificationes plurimæ in cruribus, per quas aqua non e cruribus tantum, sed e toto sæpe ventre exit, & exire potest. Interdum cum natura aquæ copiam ex abdomine in scrotum exturbat, & scrotum aqua tumet, vel aperitur, vel ceto scrotum transgreditur, ut unde aqua tota elabi possit. Verum nos hic non loquimur de illis sectionibus, sed de illa tantum, quæ fit in ipso ventre uique ad cavitatem. Hæc secundum Paulum, & doctrinam omnium Medicorum hactenus unitatam, ut tribus aut quatuor digitis, sub umbilico, paululum a latere, modo uno modo alio. Verum nuper quidam a recentioribus doctissimus Medicus alium assignavit locum, & dicit, illam sectionem faciendam esse in ipso umbilico, & ibi heri commodissime, & securissime. Hoc probat his rationibus. Primo, quia videmus, quod natura illam viam nobis quodammodo digitum ostret, ex eo quod videamus, quod quoties natura critico quodam motu aquam aliquando ex corpore exturbat, id facit per umbilicæruptionem quadam facta, de quo leguntur apud auctores plurima exempla, qui sic erumpente per umbilicum aqua, convaluerunt. Atqui quo natura vergit, eo ducere oportet. Itaque, cum ipsa illum locum sæpe, & cum bono successu eligat, nos eum quoque præ aliis eligere debemus. Etenim *Antonius Benvenius*, c. 12. de abdominis morborum, & sanationum abditis causis scribit historiam de quodam puero, cui Ascitico jam existentem, cum præ sit nimia copia aquæ bibisset, ruptus fuit umbilicus, & aqua exiit, & convaluit. *Amatus Lusitanus* loco supra citato, scribit, de muliere quadam, quod ei umbilicus intumuit, & cum forte fortuna eum scalperet, discerperit, & aqua eruperit, & fuerit curata. *Valerius* lib. 4. observat. c. 3. & *Marcellus Donatus*, *Vidus Vidius*, *Laurentius Schenckius*, & alii adhuc alias historias habent, similis per umbilicum eruptionis, & convalescentiæ inde secuti. Secundo probat ratione. Nam illa punctio ne multarum partium solutione, coeunt enim circa umbilicum vasa quatuor umbilicalia, quæ si dehiscant, ut solent in hydropicis propter vim aquarum, eo prorumpentium, tunc tantum ipsa cutis venit secunda. Dicat aliquis, quod circa umbilicum tendiæ musculorum omnium terminentur; & quod si illa sciendantur, periculum sit convulsionis secuturæ. Sed respondet illi, musculorum omnium extrema in lineam albam terminari, sed hæc circa umbilicum perforata sunt, ut vasis umbilicalibus aditus pateret. Tertio, quia Ascite laborantes fere omnes ex omphalo, seu sarcinâ, & humore umbilici laborant, quem tumorem prorumpens ibi aqua creat. In his a. jam via, & perforatio à natura facta est, neque aliud restat faciendum, quam quod tantum cuticula transpungatur, qua transpuncta mox sine molestia aqua effluet. Quarto, quia hæc sectio hanc habet commoditatem quod post eam ægri in utrumque latus incumbere possunt, cum alias in altero latere facta sectione non nisi in unum, id est oppositum latus cubare possint, quod ipsis sæpe aut impos-

sibile aut molestissimum est. Modus hujus sectionis faciendæ talis est. Totâ umbilici circumferentia filo primum trajectenda, ut arctari possit foramen, si majori impetu erumperent aquæ. Deinde acuto, & pungente terro secanda cutis, qua parte vasa dehiscunt, mox argentea fistula in vulnus immitti debet, per quam effluere aqua potest. Verum quod ad hanc sectionem attinet, puto distinguendum esse. Nam, si Asciticus ex omphalo laboret, sicut aliquando ut & videatur, quod aqua eo prorumpat, puto quod tunc commode in umbilico illa sectio fieri possit, modo qua tunc levi cutis transpunctione solummodo opus est. Secundo, quia, quo natura vergit, eo ducere oportet. Verum, si umbilicus non tumeat imo sit valde retractus, & profundus, sicut plerumque in Ascite fit, puto quod tunc talis sectio sit difficilis, & periculosa; Imprimis enim periculosa, quia ad umbilicum quatuor vasa umbilicalia proveniunt; una vena per quam hepat umbilico annectitur, duæ arteriæ, ourachus, quo vesica annectitur eidem. Facile autem contingeret in illa sectione aliquod istorum vasorum præscindi, quod est periculosum; legimus enim aliquos vulneribus in umbilico acceptis, quod illa vasa laderentur, subito mortuos esse. Nam illis tanquam ligamentis, partes illæ in ventre suspenduntur, quibus per vulnerationem disruptis concidunt, coarctantur, & alium acquirunt situm, suis operationibus non convenientem. Deinde esset etiam difficilis, primo quia tam profunde jacet umbilicus, & difficulter attingi potest. Secundo quia est durior, & difficulter transpungitur. Tertio quia fistula non potest commode imponi, nec ita facile quoddam ad aquæ retentionem adhiberi. Denique non video, quomodo umbilici circumferentia sic filo trahi & astringi possit. Nam etsi id heri forte posset, cum umbilicus ex omphalo laborat, posset tunc quidem sic filo trahi, sed quod nullo modo sic coniungi, & per modum huius tam arcte claudi possit, ut aqua non efflueret, id quoque mihi impossibile videtur. Locus ergo ordinarius ex communi doctrina Medicorum est, tribus digitis sub umbilico, quia si supra eum foramen fieret, non posset ultima aqua quæ in fundo ventris continetur, per ipsum evacuari. Dico a latere; quia recta in medio ventris est linea, quæ dicitur alba, quæ linea nihil aliud est, quam concursus tendonum musculorum abdominis. Illas autem tendones secare minimè licet. Imo, quia hoc esset periculosum, propterea quod convulsio inde sequi potest. Secundo, quia cum ibi locus non sit carnosus, non posset postea vulnus bene consolidari, ut autem sciatur, à quo latere sectio fieri debeat, considerandum est, in quod latus æger incumbere possit, & in quod non, nam si est aliquod latus, in quod æger incumbere non potest, tunc in illo latere, in quod ratum incumbere potest, & solet, nulla ratione fieri debet sectio, sed in opposito, seu in quod incumbere non potest. Nam si sectio fiat in latere decubitus, contingeret tunc ut in nullum latus exinde incumbere posset, per sectionem enim sic etiam illud unum latus debilitaretur, quod forte etiam in illud incumbere non posset, quod intolerabile foret. Et ut posset, tamen nulla ratione deberet, quia periculum inde fieret, inflammationis, gangræ-

ac continui, & involuntarii aquæ effluvi. Si ab utroque latere æger æque commode jacere poterit, tunc videndum, cujus partis vicio hydrops orta sit, si hepatis in sinistra; si lienis in dextro latere est secandum; si neutrius potius in sinistro, propterea quod plerumque omnes homines in dextrum latus incumbere solent.

Quoad modum paracenteseos, dico, eam, sicut paracentesin thoracis, etiam vel ulatione, vel sectione fieri posse. Uisiones antiqui hydropicis circa ventrem, & umbilicum superficialis plurimas solent adhibere, quibus aqua exsiccaretur, & partes roborarentur. Sed de his non loquimur, sed de ulatione tantum penetrativa. Ea fieri potest, vel cauterio actuali vel potenciali. Nonnulli quia partes ab aqua refrigeratæ humectatæ, & debilitatæ sunt, laudant cauterium actuale: propterea quod ipsum calefaciat, exsiccet, & roboret. Sed ego improbo, primo ob crudelitatem, secundo, quia periculosum est peritonæum sic uriri, & ideo hodie ille perforandi modus exolevit. Verum moderni Medici, & Chirurghi utuntur, vel simplici sectione per vivam carnem, vel primum adhibent cauterium potentiale, & tum per eam mortuam carnem secant. Ego experientia doctus, puto posteriorem modum esse secutorem, neque probo simplicem sectionem. Nam in foramen debet imponi fistula. Ea, si arte imponatur & relinquatur, tangens fibris carnes eas molestita & dolore afficit, & periculum affert gangræ, si laxè imponitur, aqua involuntarie effluit, si eximitur, foramen, utpote parvum existens, deperditur; sicut aquam aliquando non possit amplius, cum velimus evacuare. Si verò primo eschara inducatur, non fit dolor, neque à sectione, nec fistulæ impositione melius aqua retinetur, & magnum sit foramen, quod ultro manet apertum ex quo potest aqua continuo usque ad finem evacuari. Interim tamen si indicetur, quod sectione paracentesis sit institucunda, sic fieri debet. laceat æger in lecto corpore elevato, & à ministris cutis abdominis sursum prematur, tunc sub umbilico cum scalpelloniar perforatio, (cavendo tamen venas,) tam profunde, donec aqua exeat, quæ fere est profunditas digiti transversi. Foramen non sit majus, quam ut fistula crassitudinis calami tenuioris imponi possit.

Tum confestim fistula in foramen imponatur, sic ut aqua per eam effluat. Et cum effluerit quantitas sufficiens, in fistulam epistomium ponatur, quo fistula aptetur, & desuper imponatur emplastrum astringens, quod quam firmissime ventri adherere possit. Fistula illa debet esse ex argento longitudinis fere trium digitorum transversorum, & anteriore parte debet habere labra exstantia, quæ impediant, ne ipsa in cavitatem ventris infortunio aliquo incidere possit. Labris debent ligacula annexi, quibus ipsa ad posteriora religetur ne volitione corporis ex foramine excidat. Debet enim fistula in foramine manere, quousque tota aqua sit evacuatora. Nam, quando ipsa semel excidisset, non facile denuo imponi, nisi cum dolore & molestia, unde gangræ periculum esset; & forte etiam nulla ratione imponi posset, propterea quod cutis, & musculi, & perito-

neum diversimode contrahantur, & divellantur, & mutua sibi foramina claudant, & sic foramina non maneant foraminibus opposita. Alii tamen fistulam non relinquunt, sed eam postea extrahunt, & cutem ventris, quæ ante sectionem sursum trusa fuit, dimittunt, ac delabi sinunt: quæ cadens ante foramen, quod in peritonæo ipsum obturat, & sic facit, ut aqua non possit exire; & cum volunt aquam iterum emittere, nunc cutim illam iterum sursum trudent, ut foramina foraminibus iterum possint respondere. Et hæc est causa, propter quam supra dixi, quod ante sectionem cutis ventris sursum attolli debeat. Certe, si aqua per istum modum sic reprimi, & emitti per intervalla posset, esset omnium commodissimum: quia fistulam, vel tentas in foramine relinquere parit difficultatem summam, in aqua retinenda, & periculum gangræ, per hoc, quod tale aliquid contra naturam inter labra partis vulneratæ & debilis, tam arcte intrudi & relinquere debeat. Credo equidem commodè aquam illa ratione retineri posse, sed credo postea iterum per intervalla difficulter posse emitti. Nam etsi cutem cum sic attollas, tamen quia foramina parva sunt, & partes perforatæ plurimæ, vix credo fieri posse, ut foramina illa foraminibus respondeant, & aqua iterum exire possit. Ideo puto, adhuc melius, & securius fistulam in foramine relinquere Guilnerius ait, quod ad aquam secure retinendam aliqui soleant labra vulneris transversaliter acu transigere profunde cum nulla carnis apprehensione, & circumducto circa acum filo contrahere, sicque facere, ut neque gutta quidem aquæ exire queat, cum autem aquam emittere volunt, filum solvere & relicta interim semper acu labra vulneris deducere, per quam tum aqua effluat, & postea iterum filo, & prius, circumducto, astringere. Sed nescio, an ille modus non habeat periculum gangræ.

In emissionem aquæ commune præceptum Medicorum est, ut aqua non tota simul, sed per intervalla emittatur. Hoc primus monuit Hipp. sect. 6. Aphor. 27. & aliis sapientissime libris, his verbis: Si quibus empyicis, dum uruntur, aut secantur, aqua universim effluat, moriuntur. Ratio prima, quia etsi illa aqua sit contra naturam, tamen à corpore plurimum calorem nativum, & plurimos spiritus recipit, ideo, si tota simul exeat, natura simul, & confestim privatur plurimo calore, & spiritu, ex quo partibus refrigeratis & spiritibus subito effusis, mors sequitur. Secunda, quia illa aqua secundum quid, & aliquo modo, est facta naturalis, per diuturnam in corpore moram, & partes ei jam assuevere certo modo innatare, & ab eâ quodam calore, quasi foveri: si itaque ea subito tota evacuetur, partes quæ ante ab illa tegi solent, acquirunt alium situm, & super se mutuo decidunt, & denudantur, ex qua subita mutatione in tam debilibus corporibus facile mors sequitur.

Sed qua ergo proportionem debet aqua illa evacuari? & quibus intervallis? Non memini Auresiam quantita- tem exactè determinare

Practici tamen moderni dicunt, manè & vespere aliquid evacuandum esse: pro primo non ultra duas libras, vespere tantundem: postmodum paulo plus, & sic paulatim, ne scilicet æger debilitetur nimis subitâ spirituum effusione. Verum illa ratio evacuandi videtur mihi esse pessima, & perniciofa, & postquam ego sic semel vidi aquam eductam, & ægrum intra biduum mortuum esse nunquam deinceps adimplaturus sum, aut consensurus, ut aqua tali modo evacuetur. Puto enim, totam mortis causam fuisse, tam parcam aquæ educationem. Etenim, cum aqua tam exigua quantitate educitur, ipsa via jam tacta exitum tentans, ad foramen magno impetu prorumpit, & mole sua vulnere incumbens, partem iam sectione debilitatam, debilitat magis. Inde primò surgit maxima difficultas in aqua retinenda, & si videtur, metus gangræne, quod in illo, de quo loquor, non oriente contingebat. Secundo, quid utilitatis ex tam paucâ evacuatione sequitur? solum aqua concitatur, unde vapores crebri sursum feruntur, quæ viscera feriunt, natura autem nihil alleviatur. Nam in ventre ascitici jam perfecti, 30. aut 40. pocula aquæ continentur, quam autem alleviationem potest æger tunc percipere, ex unius medii poculi evacuatione? quid aliud, nisi magnam alterationem ex aquæ, antea quietæ agitatione, & conatu ad exeundum? Meum ergo iudicium, quidquid omnes dicant, primo magnam quantitatem esse educendam usque ad medietatem, vel tertiam saltem partem, ac donec venter notabiliter detumuerit. Interim, ne ab effluvio spirituum æger debilitetur, oleo garyophyllorum, aqua cinnamomi, vino Hippocratico, aqua rosata, aceto, & similibus esse refocillandum, postmodum iterum quantitatem duorum, aut trium poculorum, tertia die iterum, sed deinceps minus & minus; sicut adhuc insignis aliqua aquæ quantitas in ventre possit remanere, quæ ibi diu relinquatur, & non nisi paulatim educatur. Quia enim in hydropicis partes jam tanto tempore præsentis aquæ alluevere ab eaque foveri, & in ea fluctuare tam diu solent, ideo puto postremam aquam non statim evacuandam, sed diu relinquendam. Primam autem puto confertim esse educendam, quo natura statim manifestam sentire posset alleviationem. Tunc n. imprimis non erit tanta difficultas in aqua retinenda; non n. erit tanta moles aquæ supra vulneratam & debilem partem: non erit necessarium tentas, aut fistulam tam arctè intrudere cum dolore, aut vulneratam partem adeo fortiter comprimere, quia propter ablatam aquæ quantitatem, non erit tanta tentio ventris, nec tantus conatus aquæ ad erumpendum, & sic non erit illud periculum gangræne, quod ab illis simul iunctis aliqui esse potest. Nec internæ partes aliquam mutationem patientur, quam non sunt consuetæ habere: adhuc enim ab aqua residua regentur, adhuc in aqua fluctuant, & calore ejus fovebuntur. Quod dici possit, cum magna illa æquæ evacuatione copiosissimos spiritus simul effluxuros, inde ægrum ita debilitatum iri, ut statim moriatur; non est adeo magni momenti. Fateor id quidem in valde debilibus fieri posse, & ideo scio

totam hanc operationem, quomodocunque nat, esse periculolam: sed tamen puto, periculum esse longe minus si sic fiat, quam si aliter. Et quia non sit tantum periculum simul, ac semel facta aquæ evacuatione, docent exempla plurimorum quibus ultro aliquando, vel casu aqua erupit, ut tota fere simul effluerit, & tamen convaluerit. Ita audivimus nuper hic Lovanium, mulieri ascitica aquam brevissimo tempore, totam fere simul erupisse, & tamen convaluisse. Legimus autem supra nominatos idem. Dicit aliquis illas expulsioniones a natura critice expellente tactas: quod autem a natura sit, bene sit, non vere ita ab arte.

Respondeo, illas eruptiones non esse criticas, sed carnales, & violentas: nihil enim differt, utrum venter casu sic dirumpatur ictu, aut alia aliqua violentia, an a sectione: Interim tamen, quomodocunque aqua exeat, seu critice seu aliter, non propterea una vice plures, paucioresve spiritus, & calor, quam alia exeunt. Si ergo mors sequeretur propter exitum spirituum, & caloris, tum bene mors sequeretur, quando aqua critice a natura expelleretur, quam quando artificio Chirurgico educeretur.

Porro, hæc paracentesis non habet in omnibus corporibus locum, & imprimis non habet locum in valde debilibus. Ut ergo ex ea fructus expectetur, non est usque ad extremum expectandum, sed dum adhuc vires ægri consistunt est adhibenda. Et hæc est ratio, cur plurimi, post eam adhibitam, statim moriantur, quia hodie fere nemo audent ad eam devenire, nisi re desperatissima, & viribus jam consumptis. Tum autem ægri tam debiles sunt, ut minima spirituum evacuatione moriantur. Secundo, tum temporis, propter tam diurnam aquæ in corpore moram, ita viscera omnia interna sunt corrupta, & alterata, ut etiam si aqua evacuetur, nihilominus æger adhuc moreretur. Hinc in his, qui fortiter febre laborant, paracentesis non est tentanda: quia duplici violentia, causa febris, & paracentesi resistere non posset. In corporibus etiam valde gracilibus, propter eandem causam, non est tentanda. Uti neque in senibus, nec in pueris. Pueros perforare dicit Celsus valde periculosum esse: & Galenus ait, se nunquam vidisse puerum perforatum, sanatum; præter unum, qui erat validissimus. Qui in hydrope incidere, ex alicujus partis corruptione, vel propter scirrhum hepatis, vel Lienis in his omnibus paracentesis non est tentanda, propterea quod nihil juvaret, & æque bene, etsi aqua evacuetur, adhuc postea morerentur; vel aqua rediret, & ratio prima. Ergo in his omnibus non liceat hanc operationem tentare; quia non sunt profananda remedia, quæ multis saluti fuerunt. *Hællenus Thom. Fianus.*

Consultationes

Pro Serenissimo Duce Parmensi, Alexandro Parmensio Hydrope Ascite occasione lienis laborante.

Quod Serenissimus Dux secundum lienem magis se habeat, tactus iudicium, quod a Medicis clarissimis, qui illius sanitati præsentibus coniu-

lunt,

lunt, refertur, ac ea quæ præcellere, demonstrant: Audio enim ipsum, ut Podagra hæreditaria molestiam, ac immanitatem evitaret, diu à vini potu abstinuisse, & aqua se totum tradidisse, quæ cum in humano corpore lienem tanquam proprium locum ex Hippocrate in 4. de Morbis, itatim adeat, necessario etiam eundem à proprio temperamento pervertit. Veruntamen, quoniam liene male se habente ventriculus, ac jecur facile ob viciniam, & colligantiam labem suscipiunt, vix insistentiam ventriculum, atque jecur per essentiam, sed non primaria ratione in Serenissimo patiente laborare, per essentiam quidem, quia facultas utriusque alteratrix ob diserasiam lentim conceptam à proprio aberrat scopo, quemadmodum ex ventris, primum autem faciei cum fædo colore subitumescencia constat, secundaria vero ratione, quoniam a liene primum affecto cladem propriam susceperit.

Cæterum, quid de eventu affectionum horum viscerum sit sperandum, non est difficile cognitu per eas discurrere. Si igitur lienem intueor, statuo eventum medium partim scilicet salubrem & partim insalubrem expectandum esse, nam sicuti ægrotantes, sub eo non perduntur, & diu vivunt, ita nunquam sanantur, quoniam scirrhorum hæc natura (& eo magis, si legitimi fuerint) ut materiis medicis reluctentur, nam præter id, quod sunt a materia pertinaci, pars affecta beneficio facultatis regitivæ destituitur, quæ in actum secundum medicamenta redigit, ut jure merito periculum etiam immineat, quod ex præstantia partis, atque difficili tolerantia augetur; nam lien quamquam non sit principale viscus, principali tamen inservit immediatè, & quasi jecur ab Aristotele dicitur 3. de partibus animal. capite 7. pariter aucta magnitudo illius præternaturam, ob symptomata aliquando supervementia difficile admodum toleratur.

Quod si ventriculum, & jecur præter naturæ leges affecta intueor, eventum salubrem futurum autumo; nam præterquam quod illorum vitia non sunt in habitu, per imaria ratione prædicta viscera non exercent; Difficultas tamen curanti Medico obviam ibit, quoniam per essentiam laborant, eorum indispositionibus causa permanens, nempe lien male affectus favet, atque jecur officina nutritionis totius corporis, & ventriculus alimentii promptuarium, non bene se habent, ut dictum est. Verum in hisce malis non nisi ad longum tempus eventus jam dictus est expectandus, non tantum quia horum aliqua sunt aliquo modo impossibilia, alia curatu difficilia, sed et jam quia omnia à causa frigida pendent. Quocirca ut Serenissimus Princeps præcaveatur ad (si possibile curetur) tum ideam, tum generationem horum vitiarum explicatius oportet aperire.

Primum igitur pro certo habendum ipsum Hydrope laborare, quod ex difficili anhelitu, siti, ventris inferioris & pedum tumore deducitur, nam ex secundo Prognost. 3. secundum Galenum, pedum tumor perpetuus est comes Hydropis, quæ cum triplex sit, Ascites, inquam, Tympanites, & Anasarca, Ascite laborare Serenissimum Ducem nulli dubium quando ipso (ut refertur) de latere in latus devoluto, manifesta fiat fluctuatio, præterea

(nam divolutio illa ex 4. de Dignoscendis pulsibus 4. non sufficit) percussio abdomine tonus cum duritie, quæ sunt propria tympanitis argumenta, non observetur; Item nec à manu abdomini pressa fovea ab anasarca inseparabilis remaneat, ut ex his Ascite solim detineri sit inferendum; in cujus confirmationem & illud facit, quod 4. de Morbis traditur ab Hippocrate nempe superiorum partium in Serenissimo Duce contabescencia satis apprensus. Verum Ascite non confirmato, sed initio, & progressu tantum laborare, prædicta symptomata non valde intensa demonstrant, ad hæc scrotum, ut audio, adhuc illi non tumet, tussis non corripitur, nec inappetens comedit. Et quoniam hoc malum ex secundo ad Glauconem, 3. & 2. Prognost. ac 5. Locor. affect. citato, sit vel tumescence jecore, vel citra ejusdem tumorem, tussisque jecore primario, vel secundario affecto quid in casu nostro sentiendum sit, patet ex dictis: nam sicuti nullus insidet jecori tumore ita secundario jecur afficitur.

De generatione hujus mali sic statuo, ut à materia aquosa in spatio, inter intestina, ac peritoneum contenta prodeat, hæc enim sui copia tum replet spatium illud, atque sic abdomen in tumorem elevatur, tum spiritualia premat, unde difficilis anhelitus, & ad pedes aliqua portio delata, eos tumefacit; amplius, quia frigida, intensa est calori nativo, quia tenuis, & putrida, calidos fumos ad os ventriculi transmittit, ac litim insert; Alio vero etiam media qualitate recondita ex lue venerea lædat, ex relictis nil certi potest haberi.

Sed duo hic occurrunt Problemata discutienda; Primum, unde nam sit, quod materia hæc in jecore genita (ut ab omnibus censetur, ab illo in cavitatem prædictam deponatur. Alterum per quas vias: quorum explicatio cum summo opere conducatur ad cognitionem regionis, per quam materia hæc possit evacuari, non est illo pacto interim negligenda.

Quod igitur ad primum attinet cum Avicenna statuendum, ibi aquam colligi ob tres causas, Prima est loci imbecillitas ob laxitatem, & inaptitudinem, Secunda est loci propinquitas tum jecore, tertia causa est, quod cum minori incommodo, ac ægri molestia aqua ibi colligitur, & ibi collecta etiam copiosa ad longum tempus citra dolorem, & ægrotantis interitum asservatur.

Quantum ad secundum spectat, Aliqui ex Hippocrate & Galeno 2. Aph. 53. dicunt in Hydrope jecur scatere quibusdam vesiculis aquosis, à quibus disruptis aqua in cavitatem Abdominis perlabitur, quod in aliquibus locum habere, sed non in omnibus cadaverum dissectione demonstrat, & ubi id accidit, non videtur qua ratione vesiculæ illæ possint tantum aqua perfundere, ut ventris tumor insignis adeo, qualis pluries in Hydropicis observatur possit atcoli, & eo magis, quia vesiculæ illæ non penetrant ad jecoris usque substantiam, alias cum aqua sanguis etiam perfunderetur. Sed neque per vasorum umbilicalium disruptionem id fieri posse existimo, quoniam vasa hæc sunt usque adeo indurata, & callo obducta, ut dirumpi vix credi possit; Ad hæc, neque per

vas aliquod urinarium disruptum idem accidere poterit, nam graviora laborarentur Symptomata, & patientes statim perderentur, cum tamen Hydropici diu superstites vivant.

Puto igitur ego, fieri quandam in membrana Jecur immittente, ac venis Meseraicis Diapedesim, ob calorem extraneum rarefacientem, atque sic coagente etiam succi tenuitate à jecore in cavitatem dictam aquam jugiter colligi, quæ cum non sit ibi, tanquam in naturali loco, a natura non regitur, & proinde putrescit, quod illi quoque ob externum calorem ab obstruccionibus illis in locis concitatum evenire arbitror, hinc fætor, hinc sitis.

Sed jam caus. s. hujus aquæ perpendamus, tum generantes, tum colligentes; generantes sunt agens materia, agens est jecoris frigida discralia, merito cujus non solum Ascites, sed etiam alix Hydropis differentix exquisitæ dicuntur, Verum in Ascite intemperies hæc est intensior, ac in Tympanite, & Anasarca remissior. Aphor. 11.

Et si quis objiceret, ergo Tympanites, & Anasarca præcedunt semper Ascitem quod experientia repugnat. Respondeo causas refrigerantes aliquando ulque adeo, vehementes esse, ut itatim Ascitem valeant excitare, aliis Hydropis speciebus non præcedentibus.

Materialis vero causa sunt alimenta aquea, chylus crudus.

Cæterum jecoris intemperies referenda in ea omnia, quæ calorem nativum lacellunt, ipsum tum dissolvendo, tum suffocando, cum Avicenna, qui hæc à Galeno loco citato, & 3. Aphor. 22. desumpsit, atque hæc potissimum refrigerant jecur, etiam à tumore liberum, nam si incumeat, à tumore, nempe scirro, suscipit frigiditatem. Quæ ergo dissolvunt, & imminuunt calorem, sunt causæ internæ & externæ; Priores sunt insignis aliqua sanguinis evacuatio, morbi vel totius, ut febris, præcipue tamen ardens, vel partis refrigeratæ, & jecori vicinæ, aut secundum cavam, uti ventriculus, mesenterium, intestina, lien, uterus; aut secundum gibbani, uti spiritalia, hinc Asthma hydropem intert.

Posteriore vero causæ, externæ nimirum sunt, & calefacientes, cujus census medicamenta calida importune, atque inmodice usurpata cœmentur; & refrigerantes, quo pertinent cibi sua natura frigidi, & aqua gelida copiose assumpta.

At quæ suffocant colorem, causæ sunt quamplurimæ, præcipue tamen retenta quilibet solita evacuatio.

Causas tandem colligentes refero in facultatem, & objectum, in facultatem quidem, ad quam generatio, atque excretio serositatis, quæ ad jecur, renes, uretera, ac vesicam referuntur attinent.

Ad jecur inquam, frigidum, quod sicuti non sanguificat, ita non segregat, non expellit, unde nascitur Hydrops exquisita, quoniam simul coit causa generans, & colligens, sub qua urinæ rubræ ob vitium segregatricis meruntur. Ad renes, si debiles non attrahant, unde spuria hydrops; Ad Uretera, & vesicam, si à materia copiosa, crassa, & lenta, à calculo, apostemate, & inflammatione angustentur.

Objectum est aqua frigida copiosa, & materia cruda non bene à jecore confecta; in quarum

causarum multitudo potus frigida, intemperies lienis frigida ex tumore scirroso, segregatio jecoris labellactata, transitus succi serosi in hepate geniti ob viarum angustiam ex materia crassa obstruente fere impeditus (ut ex parvo lotio excreto colligitur) item & objectum illud duplex in serenissimo patiente locum habent.

Quare primum in id incumbendum, ut lien per calefacientia, & discutientia tumorem illius in naturalem statum reducat, deinde pariter ut jecur ad calidum alteretur, & ejusdem proportionis servetur, quæ cum non possit Medicus obtinere, nisi succum aquosum jam genitum fluxum evacuet, fluentem retrahat, ideo ab his auspicianda curatio mediis illis medicis instrumentis, quæ vulgus Chirurgiam, Pharmaciam, & dietam vocat.

Et quod ad primum pertinet, Chirurgicæ materix, quæ pro hac curatione faciunt, omnes in unicam aquæ evacuationem dirigantur oportet; Inunctiones præterea circa umbilicum ex Avicenna, & Albucasi, Vesicantiæ Abdomini, maxime vero regioni lienis, adhibita, item & fonticuli parti domesticæ femoris utriusque, magis vero sinistri inulti probantur. Anas chirurgicæ materias non propono, quando hydrops hæc non sit consummata. Nec ab usu vescantium me amover, quod ulcera in hydropicis ob redundantem humorem 6. Aphor. non sanantur, quoniam hæc sententia de profundis non autem cutaneis qualia à vescantibus manantur, venit intelligenda.

Pharmaca materiam, & viscera respiciunt. Priora sunt evacuantia succos primum hydropis, deinde scirri lienis. Verum ante horum usum non abhorrerem à communibus pharmacis, ut scilicet leniretur alvus hieræ bolo, & melle rosato solâ, natum post bolum assumptum Vix primæ, humoresque illis insidentes præparentur oxymelle Impaci, melle rosato colato, & syrupo de eupatorio tandem purgentur pilulis de hiera cum g. an. o. Mes. vel ipsomet Agarico, exceptis hisce omnibus modico succi radice Iris; à quibus primum ad evacuantia humorem aquosum tum fluxum, tum fluxurum est deveniendum; nuxus igitur, & qui continetur in abdomine, non tantum sensibiliter per alvum, hydragogis medicamentis, verum & insensibiliter evacuetur.

In coordinatione priorum, quæ vehementissima seligenda sunt, & ratio est, quoniam materia non exiit in venis, ductusque commodi, per quos à cavitatem abdominis ad intestina materia trahatur, non reperiuntur, ideo aut debemus in iis, quæ propria natura fortia sunt, cujus census pilulæ de mezereo, confectio alchachengi, Ilybium præparatum ex vino odorato, & Elaterium ex pilulis Alephanginis datum habentur; aut usurpanda placidiora infra proponenda, sed in majori dosi. Clysteres quoque hydragogi non improbantur alternis diebus injecti, uti sunt, ex decocto brassicæ marinæ cum autis, & attemisia ex succo ebuli, elaterio, oleo irino, benedicta, vel pilulis de opoponaco, vel foetidis parantur.

Evacuant vero sensibiliter interna, & externa medicamenta.

Inter externa ego primum laudo fotum ventris per spongas madefactas in aqua aliqua thermalis sulphurea, salia, & nitrosa, in qua calx viva fuerit extincta, ea tamen ratione, ut spongiæ fasciis ventri arctè adligentur, & diu ibi detineantur, subin-

humidæque permurentur. Præterea & perfusionem ex aqua ardente potente cum pipere medicata non improbo. Cataplasma quoque ex cochleis, vel oistreis cum testa ulis, vel ex stercore Accipitris, cum succo caulium, vel ex calcanto Actii, pariterque & ceratum diadictanum cum nitro & sulphure, ac succo nicotianæ reformatum, sunt iniri ulis.

Humor aquosus in pedibus exiccabitur fotu vel ex furtivibus crassius cum sale permixtis, & calefactus, vel lotionem ex aliqua aqua thermali mineræ jam dictæ, vel illitu olei masticinæ saliti.

Interim tamen humor aquosus nondum defluxus est educendus, vel Hydroticis, vel Diureticis, vel Hydragogis. Sed Hydragoga natura seligantur, nam materia in venis continetur, & educitur facili; quocirca succus mediane sambuci, vel radice Iridis, vel palmæ Christi cum manna, & melle ros. solitem & pulvis ex radice cucumeris agrestis, cum vino Cretico præparata, vel ex seminibus ebuli, cum aqua ardenti lotis, ac postea liccatis ex eodem vino Cretico datus, nulli summo opere placent.

Pro movendis vero urinis tum sal absynthii chymicum, tum vinum cum granis Alchachengi medicatum omnibus præfero, succum tamen concretum ex eisdem granis expressum non damno; Atque quibusdam intervallis constitutis modo his, modo Hydragogis uti oportet. Quibus non sufficientibus, & si nihil aliud agendum, quare itur, & evaporatoria, suffumigiaque cum caloricis composita mihi arrident, & eo magis, si ante eorum usum, non decoctum di. an. quod quidem maxime sua humiditate actuali noceret, sed extractum guaiaci, aut ligni sassafras, carduique benedicti, vel antidotum magnam antiquam Serenisini. us. patiens assumat.

Educto aquoso humore, ad alterationem jecoris, ventriculique accedendum; quocirca, trochiscos cipheos, & de amygdalis amaris Tralliani, adjectis epate lupino, & tunica interna ventriculorum gallinæ, tanquam pharmacis proportionatis horum viscerum, summis laudibus extollo; Huc referantur Elixir Vitz, Vinum Creticum cum carduo benedicto, vel aromatibus maxime vero nucis misticinæ conditum.

An vero thermæ aliquæ Serenisimo Duci conducere possint, inquisitione dignum occurrit: nam ex una parte nulla aqua opportuna videtur, cum sua humiditate, quam actu habet, maxime lædere valeat; ex altera vero, quia aqua thermalis valenter exiccat per alvum, & urinam quoque ducit, humores noxios, videtur convenire.

Ego autem in ea sum sententia, auctoritate Galeni primo Symplic. ductus, aquas hæc plurimum conferre, dummodo calefaciant, uti sulphureæ, salsæ, nitrosæ, bituminosæ ibi à Galeno propositæ, quæ ubi redoleant naturam calcanti, tanto magis proderunt: Idcirco aquæ Spadanæ, seu de Spa in Belgio præstantissimæ sunt, nam omnibus hæc numeris afficiuntur: Accedit, quod quotquot hydropici aquas illas bibunt, omnes sanantur, hinc etiam atque etiam hortor Serenisimum patientem (quandoquidem in illis moratur locis) ut aquis illis utatur sub forma tum lavacri, tum potus, & eo magis quoniam omnes aquæ medicatæ sponte nascentes, sacre ab Aristotele effectum dicuntur,

quoniam inquam sacros, ac pene divinos effectus edunt, caute tamen eas bibendas esse iussit deo, quod omnis totum prudenti iudicio Medici curavit committere.

His omnibus peractis, ad lienis tumorem pharmaca respicientia accedere necessarium est; quapropter, jus galli antiquoris, in cujus ventre coquantur China, lignum Indicum, quod sassafras dicitur, scolopendrium, tamariscus, cuscutha, prassum, absinthium, radices capparum, radices aperientes, liquiritia, altea, & thicis maris, pastula, & pulvis tartari albi, mirum in modum laudo, quod magis proderit, si ante Symplicium matutinum devorabitur bolus ex Ammoniac, ac pulvere lienis equuli, vel aini. Medicamenta quoque chalybeata, præcipue quod ab Actio præscribitur, necnon sal theriacale ex aceto mulso, aut scillino destillato datum (nisi forte medicamentum nimis ingratum fuerit) opportuna videntur.

Sed tempore usus horum exhibenda cataplasia de helleboro, atque masticina, singulis decem diebus; Clysteres quoque sunt injiciendi ex decocto colocyridis hellebori nigri, in plucium communium, & splenetorum, hiera logadii, melle helleborato, & oleo laurino parati.

Extra convocat embroca ex oleo amygdalino dulci, & amaro, à qua adhibendum emplastrum de meliloto, vel diachylon gummatum, vel saltem aliquod lutum bituminosum post quæ emollientia deveniendū ad extenuantia ac discutientia. Quare stillicidium ex aceto infusionis Dictami Cretici, ceratum sacrum, vel Cerine dictum, lute sulphurea, salsæ, & nitrosæ, suffumigiaque ex molari lapide, vel pyrite, ita ut super lapidem projiciatur acetum, in quo macerata sint primum tamariscus, deinde colocynthis atque uterque helleborus, item & emplastrum, quod v. Localium cap. 2. proponitur, summo opere conveniunt, & si lute haud haberi possint, substituantur olea ex illis chymice confecta, & ne ab hisce medicamentis robur, calorque partis nativus dissipetur, addatur omnibus jam propositis oleum masticinum, & absinthium.

Quibus omnibus, victus accommodatus est addendus, ideo in aere calido, & sicco serenissimus patiens versetur, utatur cibis calefacientibus, & siccantibus, attenuantibus, facilisque coctionis suapte natura, & præparatione, abstineat à dilutis, liquidis, crassis, viscidis, dulcibus, ac pinguibus, atque illi usui sit pulvis in cibariis ex hepate pullorum in furno siccatorum, cinnamomo, coriandris, ac saccharo; Comedat tum carnes optimas, & euchymas, aliquando eas, quæ propria natura sicciores, & potius assas, quam elixas, tum panem nonnunquam ex flore, farinæ, aliquando vero biscotum vel qui ex tota farina cum sale, & anis conticitur. Ova quoque sorbilia, itemque gallinarum pullorumque hepata erunt accommodatissima, Passula, etiam, fictici amygdalæ, cappares, ac alices sale condita, adhuc, & intinctus ex cortice citri condito cum sinapi paratus concedi poterunt; Curandumque, ne cili copia succi crudi coacerventur. Vinum bibat album, tenue, antiquum, odorum, non dulce, non austerum, quod parè admodum est bibendum, (nonnulli etenim ab omni prorsus potione abinentes ad longum tempus, tandem sanctori fuere restituti

tuti) opportune itaque parabitur vinum medicatum ex absynthio, floribus Anthos, carduo benedicto, guajaco, ligno sallastras, ex aromatibus, & seminibus odoratis. Alvus si non sponte fluat, irretetur usu prunorum dulcium, passularum preparatarum cum infusione Sennæ, in qua prius terbuerint Cartamus, ac soldanella cum anis. deinde facta coctura dissoluta fuerit manna electa; huc etiam panis ex tota farina, adjectis sale, anis, & pulvere mechioachani confectus, in prima mensa communius referatur. Corpus exerceatur tempore opportuno, ventriculo scilicet à cibo vacuo, & aliquando ad sudorem usque. Vigilia somnum superet, ac animi mœrores, tristitiae, similesque passionibus, penitus auferantur. Quæ omnia habui pro salute serenissimi Ducis, in gratiam Christianæ Reipublicæ incolumi, & longiori vita meritis, proponenda; quæ sicuti proficua illi à D. O. M. emixe precor, sic etiam illi

Medici Excellentissimi præsentis, ut adiant & auferant, prout sibi ipsis opportunum videbitur, & occasio recta postulabit, vehementer exopto. *Iulius Caesar Claudinus in Consultationibus Medicis.*

Pro Quodam Egregio Mercatore Bononiense hydropse Ascite spurio laborante.

Præter naturam affectus, à quo vir egregius vexatur, hydrops est Ascites, quoniam illi venter tumet, & fluctuationis in eo sensus exauditur, nec non excreta per alvum aquosa redduntur. Verum quia sonitus aliquis ab abdomine percussio eliditur, idcirco status admittendi, proindeque Ascitem spurium esse pro certo habeo, qui quidem eo quod color totius non est mutatus, nulla sitis, ac anhelandi difficultas nullaque tussis adest, dubio procul erit incipiens.

Ita autem huiusmodi vitium, sicuti & quilibet alius præter naturam à toto genere tumor ex materia secundum copiam, & qualitatem peccante quæ in presenti est à prædominio aquosa, à subdominio statiosa: sed quoniam utraque hæc est opus extra naturæ leges, necessario ideo supponit aliquam actionem læsam eorum viscerum quæ generationi succorum in corpore sunt destinata, hepatis inquam, atque ventriculi, quorum actio læditur, vel ob læsam facultatem, vel ob objectum impropportionatum, vel ob vitium viatum facultati inservientium.

In subiecto autem patiente vitari facultatem sanguificatricem hepatis & chelificatricem ventriculi ob intemperiem frigidam puto, nam visceribus hisce vix ad frigidum immutatis, licetque eorum calore nativo retractorum ortui occasio est suborta, deinde vero aucta, intensiorque reddita eadem frigiditate succi aquosi generatio & collectio est inchoata, quarum utraque adaucta, venter intumuit ex quo malum, de quo agitur fuit suscitatum. Atqui caloris refractorio, ac intemperies illa frigida sine dubio à causa per se, & ex accidenti pariter frigida suam generationem habuit, per se quidem occasione potius frigida; ex accidenti vero, quoniam præcessit causa resolvens, itemque calorem dissipans, nempe sanguinis vomitus copiosus his factus.

Ut ex his omnibus pateat, medendi rationem in id esse dirigendam, ut materia genita evacue-

tur, tum sensibiliter, tum insensibiliter sensibiliter quidem per alvum, si materia sit in abdomine, insensibiliter vero per alvum totum, & sudorem, si sit extra abdomen. Adhuc ejusdem materiz nova generatio est cohibenda calefactis visceribus, eorumque proportionem servata, necnon nativo calore reparato.

Ad quos pervenire scopos forsitan licebit, nam vitium hoc est in habitudine, ac veluti ad fores, docebat etenim D Hippocrates quarto aut tertio, hydropem initiatum curari, adde quod noster hic affectus ad aliquem morbum acutum non fuit subsequutus: Non negandum tamen Medicum curantem in scopulos aliquos incidere posse, ita ut ipsi provincia quoquo pacto difficilis, ac periculosa offeratur, quoniam jecur primaria laborat affectione, & fector in excretis alvi persentitur, qui non solum ex Avicenna periculum minatur, verum, & difficultatem non levem inducit, indicio namque est vitium languori, & succorum corruptioni, Utrumque tamen spe concepta ob rationes prædictas, de præsidiorum materiis est cogitandum.

Ac primum de chirurgicis, ita decernendum ac scilicet hoc tempore à domini sapius apponatur cucurbitulæ cum multa flamma, & postquam aucto, nec femora, nec crura intumescere, cauteria in eis inusta etiam atque etiam pobo, in posterum vero, progrediente morbo à venicantio, super abdomen, & ejusdem inustionibus non abhorreo; intumescens, autem cruribus scarificationes, & punctiones omnibus antepono, Paracentesi adhuc usu postulante (nam interim affectus est in principio) tamquam remedium adeo anceps, atque mortiferum non propono; ubi tamen aegroti eam sibi heri exoptant, eos adhortari soleo, ut illam nulla ratione differant, etenim alias vires à morbo contractæ diuturniori, id remedium genus non adjuvant, & quantum ad locum, perforetur umbilicus, non abdomen propter musculos, nam ille à musculis est separatus, & eo magis quia per umbilicum natura sapius evacuationem molitur; nec obstat quod musculorum extrema in ipsum terminantur, quoniam in lineâ albam terminantur, circaque umbilicum sunt perforata, ut pateat aditus vasculi umbilicalibus.

Et si quis interea quæreret, undenam sit, quod hydropici perforati moriantur, communis est responsio, quod una cum aqua spiritus dissipatur. Sed arbitror ego, & id addendum (nam alias quotquot insignes hæmorrhagias patiuntur, propter huiusmodi rationem perderentur) quod natura privata oblectatione illius aque, quæ ob longam oram, suborta quadam familiaritate contaxerat, succumbat, quod eo magis natura accidit, quoniam aqua illa ad longum etiam tempus absque aliqua noxa, ac molesta in abdomine detinetur, sed hæc obiter.

Venio ad medicamenta, quæ sunt evacuantia, & alterantia: priora si materiam fluxam respiciant, tum per alvum, tum per insensibilem digestionem extra corpus educunt; Per alvum educunt ea, quæ valentiora sunt, cum nulla adsit via manifesta per quam materia in cavitate abdominis contenta ad intestina trahi possit: Cortex ideo radicis elulæ siccatæ, ac tritus ad scrup. j. cum malliche, & in bolo cum syrupo rosato solutivo redactus, item trisquama ex Hippocrate

pocrate ad drag. j. vel drag. j. s. cum catiohyllorum, vel Cinnamomi pulvere ex melle rosato solutivo excepta laudatur. Vinum etiam cum stybio medicatum apud Iesuitas, ac demum Elaterium cum pilulis masticinis exhibitum huc sunt referenda, & quod in simili casu (quamquam non sit in classe vehementium) mihi est in usu frequenti medicamentum, paratur ex pulvere mechoacani in dosi paulo majori solita dato ex jure columbi decoctionis, brassicæ marinæ, anisorum, & pailularum; Clysteres quoque ex decocto carminantium, ebuli, atque similium ex melle cum radicibus cucumeris agrestis factitio, benedicta, oleo laurino, & elaterio parati apud me sunt ex usu. Insensibiliter autem flatus evacuant vinum Hippocr. diaciminum, diagalanga, & electuarium de baccis lauri per os assumptum. Sed & applicita flatus, ac aquam in eo contentam discutunt, atque siccant, quemadmodum in hunc finem unguentum Agrippæ, vel Artaniæ cum elaterio, vel quod secundum Mesuem ex ipsomet elaterio paratur, pariter & emplastrum quod sit vel ex stercore bubulo, aut Caprino in furno siccato cum nitro, alumine, sulphure, speciebus emplastri de baccis lauri, farina lolii, ac lupinorum exceptis cum oleo laurino, ac therebentina, vel ex calce secundum Actuarii descriptionem adjectis baccis lauri, atque juniperi, pariter foras, qui sit per spongas madefactas in vino decoctionis Artemisiæ, anisorum, fœniculi, oorum, cumini, radicis ciclamini, & salis, tandemque perfusio ex aqua ardenti, superasperso pulvere cimini, elaterii, & piperis, ac superdato panno lineo in eadem aqua macerato, mihi probantur.

Materia verò fluens evacuat modò per alvum cum pulvere seminum ebuli ex vino Cretico, aut cum succo radicis ireos, adjecto syrupo rosato solutivo, aut cum manna dissoluta in vino decoctionis, & infusionis soldanellæ, cartami & radicis ireos rec. cum fœniculis, cinnamomo, ac papulis parato, modo per urinas cum therebentina, ac pulvere fœniculi, aut anisorum, vel cum pulvere ruber, tinctorum ex vino albo oclozo, vel cum vino infusionis asari adjecto modico cinnamomi, vel demum cum sale Artemisiæ ex aqua florum genistæ exhibitio.

Quod si sudorifica opportuna videbuntur, jus galli antiqui cum guajaco, & ligno Indico, quod sassafras vocatur, aliisque simplicibus accommodatis medicatum offeratur, & ab assumpto syrupo matutino instrumentum ligneum in lue Venerea ad sudores movēdos paratum sit in usu.

Postremò medicamēta alterantia, occurrit cujus cœtus existunt electuarii cyphoides, theriaca antiqua, trochisci de eupatorio, atque de Rhabbaro, necnon diacalamentum. Verum quoniam pater noster in hunc morbum incidit occasione sanguinis per vomitum rejecti, & periculum denuo vomitus imminet, idcirco medicamentis omnibus masticem addere saluberrimum erit.

Sed & victus accommodatus instituendus, qui mediocris inter tenuem, & crassum sit oportet, necnon extenuans propria natura, idē cibi salubres erunt panis fermentatus, qui fœniculum, & salem receperit, carnes propria natura sicciore, & ova quibus immiscendi sunt pulveres ex rotatibus confecti. Parcissime pater bibat, utaturque vino albo, odoro, at-

que factitio ex absinthio, aut rhapontico, aut prassio, adjecto mastiche, reliqua vero omnia jam dictis respondeant, sic etenim Deo concedente, Vir egregius pristinae sanitati restituetur. *Id. ibid.*

De Hydrop. Ascite, & tympanite, Pro Spectabili Viro bayarenfi.

Iuxta divinum omnino Hipp. prælagium, Quarta Aphorism. xi. Quibus tormina adfunt, & circa umbilicum cruciatus, & lumborum, qui neque medicamento, neque aliter solvatur, dolor in lœcum hydropa firmatur, contigit Spectabili nostro patienti, boni habitus, mediocriter carnosus, symposiis & conestationibus fere continuo addicto. Hic etenim paucis ab hinc mensibus, continuis ventris torminibus excruciat, cum lumborum doloribus, nullis medicis præsidis cedentibus, licet ex methodi lege à Viris Excellentiss. præscriptis, incidit tandem non solum in hydropem tympaniten ab Hippocr. prænunciatum, sed in Ascitem quinetiam, cum febre lenta, siti inexhausta, macie corporis, inappetentia, adstrictione alvi, quæ antehac sponte respondebat, cum insigni adeo virium labe, ut decumbere continuo cogatur. Propterea nostram implorat opem.

Huic itaque morem gerentes, pronunciamus, multa quidem in promptu esse præsidia, cum Chirurgica, tum Pharmaceutica; quæ tamen omnia in affectu nunc deplorato frustra sunt futura, cum habeamus ex Galeno in Comment. Aphor. citati, Tympaniten hunc factum esse ab intemperie quadam in habitu prædictarum partium, cum potissimum comitem habet Ascitem, cujus causa est intensa frigiditas, ex eodem Galeno sub finem illius Comment. statuit, ex majori frigiditate aquosum humorem generari, Ascitis causam, à minore verò tympaniten, cum in flatum humo facessere non possit sine aliquo calore.

Quare dum consulimur, utrum paracentesis ab Autoribus in Ascite proposita sit futura utilis, statuiamus omnino in hoc virium languore patientem in operatione extinctum ita, ac proinde abunde futurum, si pauca aquæ copia alternis vicibus per alvum expurgetur, puta mechoacan drach. ii. cum modico vino montano tenuis substantiæ; vel ossa parata ex cacuminibus ebuli viridibus coctis: vel emplastro ventri appposito ex cochleis contusis, succo cyclaminis, & speciebus Aromatici rosati. Brassicæ quoque marinæ recens expressus succus ad drach. ii. exhibitus, cum scrupulo specierum aromatici rosati in vino Cretico, serositatem ipsam ducet. Radix quinetiam cucumeris agrestis in calcolas resecta, in umbra exsiccata, atque in pulverem redacta, affusa aqua vitæ iterum, ac tertio exsiccata, exhiberi potest ad drachm. xv. cum vino Cretico; quibus serositas per alvum educetur. Quod fiet quinetiam per urinam, seminibus fœniculi, anisi, & dauci; quorum ope discutientur etiam flatus. Electuaria item diaciminum, diacalamentum erunt accommodatissima utrique affectui, ut & saxifragia, apium, radices asparagi, & hujusmodi; omniumque maxime urinam ducere poterunt cantharides, exhibitæ integræ, pulverizata, cum pulvere ameos & rutæ, haustis statim ab ipsis lixivii ex cineribus floris genistæ unc. v. cum guttis vi. salis absinthii Chymica arte parati, & unc. i. butyri recentis.

Atque

A potu omnino quantum fieri potest abstinendum. Novic enim ego non possem nominis medicum Hispanum publice Bononiæ proficentem, qui solo usu alimentorum astorum & abstinencia potus omnis per 40. dies continuata, curatus est, absque ullo prorsus medicamento: quod si à potu abstinere omnino non potest, bibat quantum siti remittenda facis erit, id tamen parce. Porro bibendum vinum tenue quod urinam provocet, dulcia ac nullum perinde ac pestis fugienda, acernum mirifice hydropicorum situm extinguit & compefcit: expertus ego tum acetum aqua chalybeata dilutum, sola oris ablutione sitim fregisse. Cavendum tamen ne quid aquæ in viscera descendat, imo quorundam est opinio aquam hydropicis vel solo intus in nocere. Prandium licet mediocre, cana parcior; secundæ menia & fructus omnes vitentur, poterit tamen deglutare juglandem, amygdala, mala punica, pyra cocta, & caricas interdum, non tamen quotidie, idque modice: lectus sit non admodum mollis, præsertim anasarca laborantibus, qui semper satis superque lecti secum circumferunt, puta molem illam œdematicam, & in toto corpore humorum colluviem. Si autem fieri posset ut ex herbis exsiccatis conficerentur lectuli, ut ex origano, puleg. calamenth. urtica, hyssopo, & similibus, incredibile dictu, quantopere prodesse per somnum; quod & medicorum declarant libri, qui multos in acervis frumenti obvolutos, vel arena absconditos, vel fursure calido obtectos, à somno firmos surrexisse narrant, tanta vis est in exsiccantibus medicamentis. Inter evacuantia salutare est quod sequitur.

℞. Hier. pier. ʒss. rhei elect. ʒij. exhibetur insuper rheum insutum in succo ireos hoc pacto paratum.

℞. Succ. ireos rec. per residentiam depurati ʒvi. rhei elect. ʒi. contund. parum rheum, & per noctem in prædictum succum infundatur, facta forti expressione, adde succi cyclamin. depur. ʒss. tyr. capill. veneris ʒi. aq. cuscut. ʒij. M. F. potio, quæ cum valde abstergens est, non solum internos sed externos meatus aperit, & primum quidem per secessum copiosissime evacuat, deinde etiam sudores elicere consuevit. Postea ad paratu facile, & in talibus casibus mihi domesticum remedium devenirem, quo uno curata est mulier quidam, & cujus unus ejus vir tanquam miraculosi meruerit. Remedium tale est.

℞. Mili excortic. ʒii. aq. font. clar. lbii. in mundo vase bulliant donec tantum ʒiii. vel ad summum quinque supersint, colentur, & cum aliquali vini meracioris portione mulceantur, ut si potio exhibenda calide, copiosissime sudabit, F. texeris diligenter, ut illa mulier sudavit, cujus sudore permaduit totus lectus. Usa est hac portio syrup. S. Ambrosii. Uus sum eodem syrup. in pueris hoc affectu laborantibus sæpe semperque cum successu. Inter externa laudatur epithema ex caprino limo & urina pueri confectum. Laudat Galenus emplastr. ex cochleis cum suis testis contusis, ventri impositum; quod aquam exhaurit, hoc composito uti soleo.

℞. Limac. cum testis contusar. lbj. cum in-

torrefact. & subtiliter pulver. sem. carui, ammeos, salis ulsi, ana ʒi. pulv. rad. irid. farin. lupin. ana ʒi. M. F. emplastrum S. A. ventri apponendum donec sponte decidat, vel ceratum quod ego experientia non solum mea, verum etiam aliorum comprobata mirabile inventi.

℞. Cera, picis navalis, ana ʒij. alumin. liq. quid. sulphur. vivi, bitumin. nitri ruti (si haberi queat) an. ʒss. terebinth. ʒi. ol. veter. ʒi. acet. q. l. ut fiat ceratum. Medicamentum rurale est quod sequitur, & rursum esse usui potest.

℞. Fimi vaccini arid. & tusi ʒss. sulph. vel salis ʒi. acet. q. l. M. & apponito ventri, cui ex Archigenis sententia addi possunt ova gallin. rec. cum suis testis contusa, ac brassicæ luccus. Ubi autem huius animalis in emplastro apponendum legis, ibi non recentem, sed ariam sumendum esse putabis. ubi in hydrope maximum juvamentum per urinz evacuationem speratur, idque in natura imbecilli, tali uti poteris pharmaco, quod & alvum subducit & urinam ciet.

℞. Terebinth. claræ ʒss. aq. adianth. lbj. M. & bulliant ad totalem aquæ consumptionem, & a lide cantharidum abscessis alis pedibusque & capitibus subtiliter pulver. ʒi. mastic. cinnam. ana ʒss. rhei opt. pulv. ʒi. cum oleo amygdal. dulc. rec. f. mass., cujus ʒii. tuto dari possunt. Hoc experimentum bis hoc anno mihi occurrit: primum quidem in Xenodochio Delavita in puero decem annorum diu tympanitide laborante, qui tanquam à Medicis derelictus in lecto se continebat: cumque ad ea, quæ per os dantur, propter ætatem & longum morbum, & virium inbecillitatem non admodum aptus esset, tale jussu apponi emplastrum, quotidie affixis line scarificatione cucurbitulis in abdomine; miraculoseque convalevit intra octo vel decem dies.

℞. Rad. cucum. asinin. optime con. us. & in aceto scillitico per viginti quatuor horas macerat. lbj. mell. despumat. lbj. M. & bulliant ad consistentiam cerati, in fine adde cumini subtiliter pulver. ʒiii. singulis diebus antovebatur emplastrum, & abdomini optime terito cucurbitulæ affigebantur, dein rursus emplastrum apponebatur: quumque non sincerus esset tympanites, sed una cum flatu aqua advenit, immodica tamen quantitate, paulatim una discussus est flatu, & in habitum digesta aqua; sanatusque est: cujus exemplo motus quidam non infini gradus vir, cujus nepos ex filio simili morbo vexatus, a primario quodam Medico tanquam deploratus derelictus erat, jussu me accersiri, & simili modo curatus est. Alium in Hospitali Dellaviva hoc morq. curavi.

℞. Brassic. marin. subtiliter pulver. ʒss. rhei elect. subtil. pulver. ʒij. spec. dialacc. diacurcum. ana ʒi. hepat. lupi prepar. limatur tur. chalyb. cum aceto scillitico. sæpius lotæ an. ʒss. mell. despum. q. l. M. F. electuarium cujus cochli. i. per horas duas ante prandium sumat, & similiter ante cœnam tantundem; alius inde semel aut bis in die mota: quodque excernebatur aqueum erat. *Victor Trincavellius. Consil. 32. lib. 3. & Horatius Rerum consil. 74. lib. 6. Consil. 10. Cratonis, &c.*

Cum illustris & generosa famina, jam annu

corporis debilitates anno currente, potum acidularum Suvalbacensium, cum subsequenti thermarum Wisbadensium usufructu visitaret, parum vel nihil levaminis inde sensit, utpote in crescente magis intumescencia ventris, pedum, ac dextri quoque brachii, cum intermedio horrore, sopore, vomitione salis phlegmatis, angustia respirationis & similibus. His considerata, luce meridiana clarius est, adesse hydropem incipientem, cujus origo dependet à debilitate caloris nativi circa viscera concoctionis intimi ventris, ex quo fundamento non difficile causa symptomatum præcedentium deducitur. Quamquam vero morbus hic chronicus, in ejusmodi declinantis ætatis subiecto minime nobis ad plenariam sanitatis restitutionem pervenire posse videatur: spem tamen aliquam concipimus, prædicta symptomata Dei benedictione, lenire posse, juxta scopos subsequentes diligenter observandos. Eò igitur respiciendum, ut 1. superflua ichorosa, serosaque collectio per diversa convenientia media vacuetur. 2. ut jectur, aliaque viscera concoctionibus inservientia confortentur: & 3. symptomata varia & gravia leniantur.

Pro primo non dissuademus usum enematis, quod hæc juxta consilium præsentium Dñi. Medicorum hoc modo.

℞. Brodii decoctionis gallinæ ℥i. adde herb. veronic. M. ij. Flor. chamæmeli, fol. malvæ, althææ ana. M. i. sem. Anis ℥ij. coque ad medietatem, coletur, & adde vitell. ovor. num. ii. sacchar. rub. ℥i. ol. chamæmel. lilior. alb. an. ℥i. m. Quo præmissis reiterentur evacuationes non admodum nauseabundæ, quæ fiant Magist. Rad. jalap. gr. 14. vel 15. cum ℥i. extract. diacartham. Quibus aliquoties præscriptis, spem nobis faceret mediocris cura sudorifera, cujus beneficio serosæ superfluitates consumerentur, calor nativus confortaretur, membrorum tam internorum, quam externorum intemperies frigidior calefieret, & abundantes ichores tam per sudores, quam etiam per alvum & urinas educerentur. Nec dubitamus quin generosa pariens, eo modo, quem determinabimus, sudoriferam hanc curam absque difficultate sustinere queat. Primo itaque fiat decoctum Rad. Chinæ hoc vel simili modo, juxta bene placitum præsentium Dñi. Medicorum.

℞. Rad. chinæ ponderosæ ℥ij. sarsaparill. ℥i. lign. n. Lentiscin. ℥β infund. per noctem in ℥q. ferventis ℥xij. mane testo vase coq. ad tertiam sub finē coct. adde passul. minor. ℥i. cinam. cassiæ ana. ℥ij. post refriger. coletur. De hoc decocto matutino tempore sumatur haustus quatuor unciarum, & in sudatorio, quod sit juxta altitudinis, sudor provocetur, ignitis silicibus affusa decoctione sequenti, quæ.

℞. Herb. Anagall. aquat. nasturtii aq. recent. an. m. iij rad. ebuli cum toto m. vi. flor. chamæmel. Miß. Baccar. laur. juniper. an. m. i. F. decoct. in f. q. aq. Ejusmodi sudor, quo citius natura perferat, semel tantum quotidie provocetur: protinus à sudatorio patiens ad lectum sese conferat, quo reliquæ sudoris in lecto per udam transpirationem ulterius consumantur. Quo facto, diebus alternis, duabus horis ante prandium haustum sumat laxativum, qui fiat hoc modo.

℞. Prædict. decoct. sudorifer. ℥i. fol. senn. f. f. ℥i. Agaric. in petia ligati ℥ij. Mechoaca nigra ℥i. sem. cartham. ℥i. crysall. tartar. ℥i. herb. soldanell. ℥vi. stent per noctem in loco calido per 24. horas, mane colentur per manicam Hipp. addito, pro lubitu, sacch. cand. al. ℥i. plus minus; dosis ℥ij. vel iij. Hujus beneficio peccans attenuata materia simul per proximiores vias educeretur. Non negligatur interim conveniens victus ratio, potu quotidiano simul ordinato, qui.

℞. Rad. chinæ ℥ij. Lign. lentiscin. ℥i. santal. citrin. ℥β F. infus. per noctem in f. q. 2q. mane cocto testo vase ad 4. partis consumptionem, sub finem coct. adde Passul. min. ℥iij. cinam. cassiæ ana. ℥iij. colentur ℥xxiij.

Pro secundo non repetimus corroborantia jam dudum ab aliis Generosæ Matronæ præscripta, quibus addi posset usus elect. pallulat. sive de vino, ut vocat dolenander in consiliis medicis, item usus magist. corall. rub. cremor. tartar. cum margar. præp. sicut etiam confectio de extract. lign. Aloës, Zedoar. cum ol. macis, nucis mosch. Margar. præp. &c. Elixir propriet. Paracelli ritè digellum sæpius ad gutt. vii. vel viii. vel ix. cum syrupis appropriatis, vel in brodio quodam decoctionis radicum aperientium, plurimum quoque concoctioni serviret.

Pro tertio, nimirum, quod symptomata lenienda concernit, non opus est pluribus hic agere, propterea quod pro re nata præsentium Dñi. Medicorum directioni id ipsum relinquatur, utpote ejusmodi remedia sæpius varianda veniant. Unicum addimus, ob urgentem sæpius difficilem respirationem usurpandum, mixturam videlicet hanc pectoralem. de qua sæpius cochlear unum lambendo sumatur, juxta determinationem præsentium Dñi. Medicorum, quæ.

℞. Spir. veronic. ℥i. spir. anis. ℥i. ip. sulphur. acid. ℥i. sacchar. cand. al. ℥vi. misce. Hæc sunt quæ absentes ad petitionem factam, communicare volumus: faxit Deus ut omnia succedant ex voto. Dabantur Ulmæ. Gregorius Hofstius de morbis infimæ ventris.

Nobilissimus Vir sexagenarius, calidioris & siccioris temperaturæ, olim Podagricus, mox lictericus, cui hæbant hæmorrhoides, non sine evidenti levamine, ac demum imminuta est spontè fluxio cum salutis incommodi obstructum enim est utrumque hypochondrium, & præsertim dexterum circa jecoris cavam, quod videre erat in procedente lictertia; diebus nuper elapsis cecidit, circa spinam dorsii ac renum regionem percussus doluit, hætenus molestus dolor perseverat; ab hæmorrhoidibus illico materia ichorosa, colore flava, jugiter emanat, paucò, vel nullo cruore tincta; utrumque hypochondrium tumidum apparet, tactui tamen obediens; abdomen elevatum tumet, à molestis flatibus infestatur, multa serositate inundat, tumorem in latus jacentis perpetuo sequi videmus, & recto stanti mediocris sit molec, ac tensio aquæ descensus cubanti venter sentitur mollior, pedes semel aut bis œdematosos observavimus. Febricula tempore vespertino sese offert, quæ periodicè, tertianario nempe modo exacerbatur, urinæ perpancæ, ferè semper crassæ ac rubicundæ; respiratio hætenus illasa servatur. Universum

autem corpus (dempto ventre) extenuatur, ac veluti liquefcit; fitis ad eſt moleſta, in dies vehementior, inappetentia & virium imbecillitas.

Antiquam hypochondriacam affectionem, ad ~~ascitis~~ in jecore obſtructionibus, in Cachexiam degeneraſſe, ſive melius, ad eandem perveniſſe credo, quæ quoniam in Hydropicorum caput à Medicinæ principibus appellatur, ideo miſerum, ſi hydropis quoque gradus fuerit in Nobiliſſ. Pat. iſto introductus. Et ſicuti hypochondriacam affectionem intenſis applicationibus jam acquiſitam copioſi ſtatus ſat atteſtari poterant, ita Cachexiam totius mæcies, pedum intumeſcentia, & totius color vitætuſ liquido demonſtrare valent, & hydropis principium aquæ fluctuatio cum abdominis tumore, qui lateralem decubitus ſequitur, & ſupino cubanti Viro Illuſtriſſ. abdominis molliem conciliat, & obſtructionum viſcera, & jecur potiſſimum occupantium modo tactus judicium intercipit. Propterea fluctuationem illam abdominis, ut pote ab aqua in cavitare exiſtente proveniente, diverſam eſſe ab illa quæ in hypochondriacis ut plurimum obſervatur, ab exigua ſeroſitate melancholica, in omenti duplicatura procedente, exiſtimo.

De affectu dorsi atque renum, ex caſu contracto, nil certi neque concipere, neque ſcribere poſſum, ſi quidem mutilata valde de hoc ad me pervenit relatio: febricula enim quando ſupervenerit, proſus me latet, quam ſicuti ab humoribus, circa viſcera naturalia fermentatis, procedere credo, ita forſan à contuſione ad ſuppurationem tendente provenire poſſet; præterquam quod dolores num continui, vel intermittentes, & ſolum ad motum deſcipientes, num præterea lancinantes & pulſatiles, an conſtuentes ſint, omnino me latet; ſed ex medicamentis diureticis & calidis, ſere ſtatim à caſu à viris excellentiſſ. adminiſtratis, humores ad renes ducentibus, conjicio, renum affectum ex caſu prægreſſo Eximios Viros parvi feciſſe, & ideo ejus curam externis remediis, ad contuſionem apoſitis, Chirurgus relinquo.

Quare ad prioris affectus manifeſti conſiderationem deveniens, de Ascitis cauſa dubitandum venit, quam licet ut plurimum frigidam, imo ſemper ſtatuere cum plerique Medicinæ ſcriptoriſ & ipſe Galenus, hanc tamen frigiditatem ab eximio & excedenti calore ut plurimum provenire, negligendum non eſt, ut magni viri Trallianus & Ferrelius conſiderabant, dum calor temperamenti jecoris (vulgo intemperies calida dictus) adeo calorem innatum ejuſdem labefactare valet, ut propriam operationem, nimirum hæmatoliſ, imperfecite ſolum obire poſſit, & ideo recte dicebat Gal. idem, quod quolibet intemperies valet deſiccare robur & munus partium; quam quidem cauſam in Illuſtriſſ. Pat. iſto ad Cachexiam & hydropem introducendam principaliter conſpiſſe credo, quod facile, imo neceſſario deducitur ex patientis Illuſtriſſ. temperamento, habitu corporis, præteritis icteritiis, antiqua hypochondriaca affectione, ſiti moleſta, inappetentia, urinæ paucitate atque colore, & tandem ex ſuppreſſa

conſuetâ ſanguinis hæmorrhoidali evacuatione, quæ non calidam ſolum & fervidam jecoris intemperiem, verum & iplius ſanguinis exiſtam qualitatem indicabat. Nec pro frigiditate poſitiva ullum mihi affectus ſignum conſiderandum in rebus naturalibus, nullum in nonnaturalibus, & exiguum atque valde dubium in rebus præter naturam: Podagra namque ſuppreſſa in huiusmodi temperamento, cauſam aut calidam, aut non ſine calore facile agnoſcebat.

Quare ſicut neque ego inſicior frigidam intemperiem ad hydropem, quatenus in facto eſſe, neceſſariam eſſe, & in caſu noſtro quoque reperiri, ita quatenus in fieri, ab intello & exuberante hypochondriorum & jecoris ſe. vore initium ſumpſiſſe aſſero, & ideo aquam, ſi non immediate à colliquante calore, mediate tamen ab eodem efferveſcente, nativumque jecoris calorem deſtruente, provenire ſentio.

Quibus ita ſe habentibus, difficilis evadit huius affectus non ſolum obſtatem ſanatio, ſed & ipſa curatio, & ideo mirum non mihi videtur, ſi inter eximios viros aliqua, licet levis, intercedat diſcrepantia: etenim morbus, quatenus in fieri, requirit refrigerantiæ quatenus in facto eſſe, caleſcentiæ: calor enim præter naturam excedens, continuo nativum devaſtat, atque depaſcitur, dum calor idem innatus labefactatus, reſtauratione & refocillatione indiget. Sed in hac rerum anguſtia utrique intentioni, ac urgentiori magis, ſemper incumbendum: aqua enim primo omni arte & induſtria educenda: ſi quidem aquæ educio Medicinæ locum facit, Dicebat Cæſus. Secundo loco calida jecoris & hypochondriorum intemperies corrigenda: quæ quoniam per accidens ab obſtructionibus fomentum recipit & recipit, ideo obſtructiones reſeranda, & tandem jecoris calidum innatum corroborandum.

Quibus ut ſatiſfaciamus, non eſt quod à fonte Chirurgico remedia multa petamus. aliquam tamen ex hæmorrhoidibus ſanguinis miſſionem omnino profuturam ſpero, illamque parcam, & potius repetitam, ſi Hippocr. oracula conſideremus, eoque magis, cum natura & in præſens ad illam partem convenientem vergat, ſeroſitates flavas & calidas extramittens.

Aquæ autem educio per intervalla & per epicraſin procuranda; ſed interimaperienda, ac non valde calorifica, adminiſtranda. Inter aquam educentia, eligenda quæ nativum calorem non valde labefactare, nec vires proſternere valeant, ut frequens poſſit eſſe eorum uſus, & ideo ſicut potio ex manna clariff. hic locum habet, ita & Magiſt. Mechoac. quod Venetiis paratur, ut multo minus quam, jalappæ ventriculo inſenſum, ad gr. xx. drachmis duabus electæ. Lenit. vel pilulis de tribus cum rhabarb. inmiſtum. Ita familiaris eſſe poterit Cremor ita parandus.

℞. Radic. ireos, ebuli, cucum. aſinin. ana ꝑij. ſoldanellæ, gratiolæ, mercurialis ana mꝑ. manip. ij. contundend. incidend. & adde aq. comm. opt. lbv. m. maceren.

℞℞℞℞

liant ad consumpt. quartæ, & fiat torcularis expressio. Expressioni adde tartar. albi, prius loti, & depur in unius. ros. solut. tibi. omnia reponantur in vase cooperto, bene lutato, & bulliant usque ad consumptionem totius humiditatis. Tandem colligatur fumus sub cooperculo, cremor à lateribus, & sal in fundo, & m. inde.

℞. Hujus cremoris ℥i. vini alb. ℥iij. aq. cinnam. vel flor. citr. ℥ss. misce pro una vice.

Vel ℞. Hujus cremoris ℥i. conserv. à flor. perf. ℥ss. m. pro una vice, quinto aut sexto quoque die repetendi.

Interim aperientia erunt jecori insinuanda, & esse poterunt succi cichor. & agrimon. non solum depur. verum & filtrati, vel per arenam trajecti, ut subtiliores evadant, magisque permeent, quibus vehiculum esse poterit sal. rt. volatiliz. ad gr. x. quibus habita nativi caloris illius visceris ratione, addi quoque possunt totidem grana salis viper. sicque concinnari poterit quotidianum Aperiens.

℞. Succ. cichor. agrimon. ana ℥ss. sal. tart. volatiliz. viper. ana gr. x. aq. still. cichor. agrimon. an. ℥ss. m. pro iyr. & sic pro aliis quatuor quibus succedat vel cremore proposito, vel Magisterio Mechoac. cum pilul. de tribus aq. evacuatio.

Et licet hæc oportuna mihi videantur, observatione tamen egent, ut ab iisdem quoque discedamus, nisi res pro voto succedat, & ad syrupum cachecticum Fernelii mentem convertamus ad ℥ij. juxta nostram descriptionem, alternis diebus exhibendum in vino albo, si febricula discesserit, sin minus, in exigua aqua de succo cichorii; & licet rhabarb. contineatur, & Hipp. julerit, aquam purgato, & bilem non movere, quod repetit postea & ipse Galenus, de Hydropse frigido & jam perfectio atque absoluto locuti fuerunt. Rhabarbarum autem in casu nostro, cum causam Hydropem foventem, imo facientem respiciat, quæ in fieri reperitur, admitti debet. Diebus vero intermediis aperiens aliquod non exigui valoris erit præbendum, quod non solum obstructions referandi, verum & urinam ciendi facultatem obtineat, quod ita parari poterit.

℞. Fol. cichor. agrimon. pentaph. cuscute. malvæ, an. manip. ii. absinth. manip. i. rad. chir. petrosel. gram. alparag. an. ℥iij. rad. apytenic. an. ℥ij. liquiritæ ℥i. lign. satiatras ℥ss. sem. melon. ℥ss. contund. contund. incid. incid. m. adde aq. Nocer. lib. xx. macerentur omnia per duos dies, deinde fiat torcularis expressio & expressioni eadem nova ingredientia addantur, ut rursus fiat maceratio in vase clauso ad duos dies, & fiat rursus torcularis expressio. Fæces omnes deinde calcinentur, cineres reponantur in colatorio, quibus ter & quater superaffundatur expressio fervens, ut fiat lixivium, quod reponatur in vase vitreo, & B. M. destilletur, aqua autem servetur ad usum. Spissamentum autem in fundo relictum, reponatur in vase terreo, cui superaffundatur succi absinth. depur. & agrimon. opt. depur. aa. ℥ss. bulliant usque ad consumptionem totius humiditatis, & sal colligatur in fundo.

℞. Aquæ jam dictæ ℥vii. sal. jam dicti ℥i. spir. tart. ter rectificat. gutt. x. aut spir. sal. gutt. vi. m. pro syrupo alternis diebus assu-

mendo. In horum alternato usu perseverari poterit ad triginta, & plures dies, & interim nisi aqua fortasse per urinam expurgari coeperit, quinto aut sexto quoque die hydragogum erit porrigendum: quod si validius expectatur extractum elulæ Rulandi, additis eidem gr. x. aut xii. Magister. Mechoac.

Plura scribere non licet, nisi de statu Pat. Illultriss. tunc temporis certior sum, sicuti quoque jam proposita Præclarissimorum Virorum Assistentium diligenti observatione atque custodia egebunt, ut in arena meliora consilia capere possint: facile namque lacte aliquo, si non naturali, artefacto, corpus totum nutriende opus erit.

De victus ratione quid scribam non habeo, cum recte ab eximius viris fuerit instituta, optimi succi, facilis coctionis & distributionis, nec valde refrigerans, nec omnino calefaciens, ut propolis intentionibus nostris corresponderet. Nec de vino exhibendo nigro, vel albo multum curandum: sicut enim album aperire & urinas movere, ita nigrum, calorem nativum magis roborare valet. Utra igitur harum intentionum magis necessaria sit, pro vino vel albo, vel nigro exhibendo considerandum. Sal in mensa poterit esse absinthii & roris marini. Et hæc omnia sapientibus Viris, potius consideranda, quam executioni mandanda descripsi. *Raymund. loh. Foris Consil. Tom. 6. Centuria 3.*

Historia & Consultationes super hydropse Ascite, variis symptomatibus stipato.

Viro Amplissimo & Nobilissimo D. Joh. Jacobo Wepffero Medicinæ Doctori Famigeratissimo J. J. Manget. Med. D.

Jam dudum respondissem, Vir Ampliss. Tuis ad me 14. decembr. anni 1691. datis, verum non suppetebat quid significarem de Nob. Matrona *** Jam enim illa prægnans, imo partui vicina, omnia recusat remedia, & cum satis bene se se habeat, consilia medica minus avidè exquir. Interim, redeunte morbo, cum quo procul dubio actum prorsus non est, sed tantum induciæ datæ, adhibebimus quæ commendatissimi medicamenta, quæ omnino consona sunt intentionibus & indicationibus quas hoc in morbo nobis proposueramus. Occasionem in præsentiarum ad Te rescribendi præbuit Vir ætate ad minimum quinquagenarius, temperamenti sicci & biliosi, cujus historia hæc est.

Nobiliss. D. *** jam ab annis 18. in affectum incidit asthmaticum, quo sæpius ad absolutam prope suffocationem deductus fuit; imo per plures annos sic afflicus, & per venæsectiones frequentius & largius quam par fuisset, in præsens solatium, celebratas, viribus sic exhaustis ut pulmones debilitati, ac oneri impares, sanguinem materiis aliis parce admistum, imo postea purulentum quid satis larga copia evomuerint. Illius autem puris multum semper in viscere restitit, quod & tussim vehementem ciebat, & febrem accenderet lentam per annum integrum quandoq; sine intermissione perdurantem, unde nullus fuit qui, cum tabe præterea confectum Nob. Aëgrum videret, eum Phthisi contumacata correptum non crederet. Interim tamen jam

à pluribus annis, remediis petitis ex lacte, variis sulphuris præparationibus, decoctis pectoralibus & vulnerariis, viperinis iulculis, saleque viperarum volatili, itemi florum Mei Regii summo, adjectis per intervalla levioribus purgantibus, quia facillime alvus solvebatur, semperque aderat ad diarrhæam propensio, morbus ita fuit expugnatus, ut postmodum, & peregrinationes longas, & negotia satis molesta perficere valuerit; nulla recrudescente febre, nisi cum per pulmonum debilitatem à morbo præcedaneo inducendam aliquid aggereretur quod turbas moveret; verum illud facile egebatur. Uno verbo ita restitutus fuit, ut si modo valetudine delicatula probe usus esset, satis sanus vivere potuerit. Verum cum varios in dicta errores commisisset, imo frequentius multo plus quam vires ferebant corpus defatigasset, in febrem continuam, jam à 4. prope annis, incurrit, quæ postquam ad orci fauces deductus esset, liberabatur quidem, sed sanguis debiliior dispositionem quandam leucophlegmaticam, per septimanas aliquot in partibus extremis, manibus scilicet & pedibus, reliquit; quæ demum profligata satis bene habuit, donec sub finem julii anni proxime præteriti, subito in novam dyspnæam cum adjuncta febre, tantaque virium extollutione ut pedibus stare minime valuerit, incidit. Tum abdomen integrum mihi tentum visum est, & jecoris corpus se se durum obtulit, continuo præterea successerunt, & urinarum immutatio atque rubor cum sedimento lateritio, & femorum atque tibiærum tumor grandis, eaque prope omnia quæ ascitem perfectum facere consueverunt, adjecta, quod sæpe in hoc morbo evenit, dispositione totius leucophlegmatica. Eo ipso tenore quo tumuit abdomen partesque interiores, liberum fuit pectus, & ab omni tussi aut oppressione immune; sed febris pergebat donec lenicupio per 4. dies celebrato, & aquis calidis, bituminosis, nitrosis, ac perbelle purgantibus, loci dicti *la Morhe* prope Gratiopolim in Delphinatu, per totidem dies exhibitis, succis & plantis appropriatis, dosibusque aliquot purgantium medicamentorum paulo validiorum, quæ tum sane terre commode potuit, propinatis, urina revocata sunt, & febris una cum abdominis ac partium inferiorum tumore, diminuta, imo postea omnino profligata per iteratas emulsionum ex semine, seu potius arillis ebulli præparatarum, exhibitiones. Interim crura exlicata quidem per humoris ipsa replentis eliminationem, visa sunt, sed ita dura remanserunt ut carnes fumo induratas dixisses; unde merito erat quod arbitramur petulicans quid in salibus ab aquis exhalantibus relictum quod tantam induceret duriciem, illudque præterea ita acre, ut corrosionis sensum importunum perpetuo faceret, quo somnus ita per noctem arcebat, ut ne quidem exquisitiore anodyna illum conciliare possent. In illo ipso statu pestitit Nobil. D. Donec sub mediuni mensis januarii imminutus rursus ultum urinis, non cito rediit tumor cum febre satis intensa. Tum morbo statim opposuimus eadem remedia, quæ prius bene cesserant, nempe semen ebulli, succos & plantis, tum temporis reperibilibus, parabiles, decocta aperientia varia nec non purgantia omnis prope gene-

ris, exceptis tantum iis quæ drasticum quid habent, elaterium scilicet &c. ne interanea illis terendis non sufficerent; at hæc omnia per tres septimanas sine ictu peracta sunt, quandoquidem nec per diuretica, quorum hic enumerationem non tradimus, urina largiores facta sunt, nec per purgantia, præterquam à paucissimis tantum diebus, multum obtinimus. Jam autem inter cætera semen ebulli, cui hactenus salutem suam assignavit Nob. D. officium suum repetens, satis bene illum expurgat, cumque hoc ne torminibus aut appetitus dejectione, in o sine ulla patientis detatigatione, peratur, propositum habemus per dies aliquot continuos illi insillere, adjectis subinde diureticis, aliisque serum per varias eliminantibus vias, ac viscera confortantibus. Jam autem, Vir Ampliss. ac Medicinæ verum decus, ad te confugimus ut quod habebis in ulterius Viri Nob. auxilium nobis concedere per tuam humanitatem non dedigneris. Procul dubio sic apud omnes honestos quibus magno in pretio est patiens nollet bene mereberis, & mihi doctissimorum tuorum consiliorum avidissimo pergratum facies. Vale Vir Ampliss. & me tui cultorem observantissimum &c. *Datum Genevæ die 9. Februarii ann. 1692.*

Responsum Medicum.

Salve plurimum Nobilissime & Excellentissime Domine.

Ex literis tuis Excell. D. patet apud Nobiliss. Dnum. ***. in curatione ad duo præcipue attendendum, scilicet ad pulmonum inveteratum quandam debilitatem & sanguinis vitium. Ratione pulmonum potissimum cavendum ne restricetur antiquum ulcus, nam post hæmoptoem Nob. D. vere phthisicum fuisse probant purulentorum ejectio per tussim per annum cum febris lenta perpetuo comite. Eluctatus quidem est vestra industria periculosum morbum, attamen porro ejus curam habendam exillimo, quia subinde mucosa in bronchiis colligit, sine tamen febre; & mense julio 1691. cum febris rursus dyspnæam expertus est. Non equidem puto multis pulmonicis Nob. D. ægrum onerandum, attamen cavendum sollicite erit, dum sanguinis vitium emendabitur, ne illi lædantur. Sanguinis vitium consillere puto in nimia ejus aquositate, forte etiam in lentore quodam & sallugine nimia. Persuasus sum sanguinem ipsum sanguificare, quia chylus ipsius massæ omnis confunditur, ipse calet actu, aliæ partes ejus beneficio caluit, & ipse spiritibus abundat. Officio suo non fungitur, si crudis obruitur, si spiritus ejus nimis prodige crebris V. G. profundatur, si aquosior pars non rite eliminetur, glandulis excretoriis obstructis, aut induratis; quod conjicere licet ex urina pauciore & jam prope lixiviosa cum sedimento farinæ laterum simili sæpe intensius instar cinnabaris rubente. Febres frequentes & diuturnæ depauperant sanguinem, ejusque spiritus absumunt, & non parum ad indurationem glandularum contribunt; unde forsitan Excell. D. jam hepat durum tetigisti. Notum est hepat ab elixatione valde indurari, quod idem aliis glandulis evenit. Forte febricitans multum aquæ ingurgitavit, ut plerumque fieri solet. Acrimoniam adscribendam in sangui-

ne putol temperamento connato, eamque à tot febribus, forte etiam obstructionibus in glandulis, auctam puto. Serum itagnans peperit l. utophlegmatiam, ascitem, & nunc tumorem extremorum. Acrimonia & lentor is effectus sunt crustæ & pruritus tibiæ. Jam præcipue studendum arbitror ut vix referentur per quas natura superflua aquosa excernere solet, quandoque & calcar addendum, ut largius illa exturbet, unaque opera lentor & acrimonia sanguinis emendanda sunt. Quibus præfidiis id faciendum sit vix alia superaddere novi, cum vos vel eadem, vel æque efficaciam adhibuisse ex doctissimis literis perspiciam; ne tamen asymbolus abeam illa recentibus quæ quoque quandoque proficua expertus sum apud illos quorum viscera nondum penitus depravata & scirrhopa erant: suntque primo piule.

℞. Diaphor. mart. ℥ij. oculor. cancr. præp. milleped. præp. an. ℥j. dor. sal. armon. cum lap. hemat. sublim. ℥i. sal. volat. lumbric. aut viper. ℥ss. extracti. trifolii fibrini ℥ij. vel ejus loco extracti gentianæ ℥i. ole. terebinth. gtt. iij. cum nucil. g. tragac. q. s. fiant pilulæ ex ℥i. n. xl. conspergantur pulver. glycyrrh. Dosis mane hora 6. & vesp. hora 5. n. x. cum tantillo syrapi capillor. veneris. Post quadrantem horæ bibat jusculi carnis non saliti ℥iij. cui adde cochleare unum hujus liquoris eperit. calide.

℞. Aq. gramin. petros. an. ℥iij. spir. aperitiv. ℥ij. M. spirit. aperitiv. sic paratur.

℞. Limatur. chalyb. puri ℥ij. ei in vase vitreo robusto affunde sp. sal. armon. urinosi ℥iij. sp. sal. duic. ℥i. sal. absinth. ℥ij. sal. tartati ℥i. M. Vas quod amplum sit oportet, bene tegatur; reponatur in locum temperatum & subinde agitentur: post horas 48. liquor decentetur: coletur per chartam emporeticam. Spiritus iste servetur in vase vitreo, robusto, bene clauso. Si forte jusculum ab uno cochleari acrius fiat, addatur solum cochlear dimidium. Hac ratione, benedicente Deo, unam copiosiorem tenuiorem, minuique tinctam evasisse, & sedimentum rubrum sæpius evanuisse, observavi.

Secundo. Quadrante horæ ante quemlibet paltum cum jusculo, datur elixyr. propriet. Clauderi sine acido gtt. xx. aliquando dedi cum jusculi cochlear. iij. ad gtt. xl. sine ulla molestia.

Tertio. Quin citra molestiam hætenus per tulit emulsion. sem. ebuli, in illa audacter pergendum arbitror, subinde tamen mercurium dulcem hydropicis utilem comperi: ne tamen moras necet in corpore & salivationem excitet, addidi aliquid de extracto panchymag. Crollii, aut simli. v. g.

℞. Mercur. dulc. gr. xv. ad gr. xx. extract. panchymag. ℥ss. cum nucislag. tragac. f. pilul. n. x. vel. xij. Ab hoc mercurio vidi in canibus minus ventriculum & intestina læsa fuisse, quam à gum. gott. aut magister. gialapp. Emendat iste quoque acrimoniam sanguinis. Subinde jusculis in primis mane, sal viperar. addi posset; quod a Te Excellentiss. D. egeginui parari Neocomi intellexi.

Si detinuerit, maneatque crusta in tibiis cum pruritu, audacter solum imprægnatum aqua calidis in cujus fœnij. ebullierint solummo-

do gr. vj. mercur. sublim. tibiis circumponere, vel illas mane & vesp. involverem calide, probe liquore expresso.

Fonticuli in utroque brachio excitati tunc quæque prodesse: nullo modo in tibiis paranda.

De curata non multa memoro: huc solum addo vinum non denegandum nisi febris adsit: attamen in fœ. iij. aquæ fontan. coque lign. visci. querni ℥iij. quæ vinum diluatur.

His Excellent. D. cum tota familia optime vale &c.

Aliud in eodem argumento responsum Medicum ex Gallico.

Asthma quo jam à pluribus annis afflictus fuit D. Egrotans, cum degeneravit in excreationem sanguineam & purulentam propter fluxiones quas primus hic morbus in pulmones advocavit: suspicor sane hæc funesta symptomata vena pulmonaris fuisse productum quid, potius quam veræ phthiseos; quandoquidem ab his liberatus est vitæque restaurata. Jam verò serum acre & quasi ardens quod de novo in ipsius sanguine è malis dispositionibus inibi relictantibus procreatum est; ut & debilitas ac obstructio viscerum, illum in hydropem deduxere, qui manifestus factus est per abdominis, tibiæ, aliarumque corporis partium tumorem. Timeo sane ne quæ in hoc morbo consequuntur, funesta sint, agitur enim de subiecto à pluribus malis fracto, sicque in languorem dejecto. Interea tentanda veniunt quæ magis efficacia credi possunt & pro evacuandis aquis, & pro deobstruendis visceribus, & pro corrigendâ humorum acrimonia; seligendo in eas intentiones remedia benigniora, atque magis temperata; ne scilicet alius nimium excalecat sanguis, ac supprimatur urinarum cursus, quod non semel ab usu validiorum Hydragogorum evenisse expertus sum.

Non video quod D. at. V. S. sustinere possit, quandoquidem jam à longo morbo, remediisque in ejus expugnationem adhibitis, viribus prorsus exhaustus est; satis fuerit igitur si primo purgetur medicamento sequenti, post applicitum clysterium emolliens refrigerans & purgans, cum electuario lenitivo & melle solato.

℞. Senn. elect. ℥ij. rhabarb. elect. in nodulo suspensi ℥i. sal. tart. ℥ss. summit. absinth. minor. p. s. intundantur ad ℥viij. in colata dissol. ve mann. elect. ℥i. fiat potio quæ detur mane.

Post purgationem per duodecim dies matutinis horis assumet hoc jusculum.

℞. Limat. ferr. rubigin. in nodulo suspensi ℥i. radic. fragar. & brusci an. ℥ss. dentis leonis cum toto, agrimon. capillo. vener. ac pimpinell. ana m. s. rhabarb. electi in nodulo ligati ℥ss. cum pullo gallinaceo fiat jusculum quod copiat mane.

Purgabitur ut supra in medio & sine jusculorum.

Postquam assumpserit juscula præscripta, vacabit tertio quoque die, per mensem integrum 45. aut 50. grana pulveris subsequentiis jusculo ex carne vitulina cum cichoreo ac agrimon. parato, admitti.

℞. Limat. ferr. rubigin. ℥ss. senn. mund. & rhabarb. elect. an. ℥ij. jalapp. & aquil. alb. an. ℥i. M. f. pulvis.

Pro

Pro potu ordinario adhibebit decoctum radic. buglossi, tar. xaci, & fragariæ, addita vini rubri quarta parte.

Si somnus per se non accedat, circa decimam vespertinam assumet laudani opiat gr. j. Barbeyrac D. M. *Datum Monspelii Martii xxv. Ann. 1692.*

Aliud rursus in eodem argumento Responsum Medicum. Ex Gallico.

Agre admodum fero quod non videam quid amici nostri valetudine restituenda fructuose adhibendum veniat; nam cum attendo ad ea omnia quæ prudentissime administrata fuisse pro præcavendo morbo, qui jam prorsus caput exeruit, non est quod cum Galeno non pronunciem spiritiones quæ nonnisi erectæ cervicæ ducuntur hydropem siccum faciunt per extinctionem scilicet ac destructionem caloris naturalis; à cujus privatione tandem ad habitum non datur regressus: Imò cum Hippocrate in Coacis. Hydrops curationi concedens & recidivans desperatus est. Idque præsertim quod hic partes œconomix naturali principaliter inservientes jam dejectæ ac fractæ sint per complicationes quas antea novi, quarumque in tuis doctæ ac brevis perhibetur historia. Interim tamen amor quo Egrum prosequor cogit me aliquid adducere in ipsius solatium, aut saltem ut aliquatenus prolongari queat vita; tot oppugnationibus jam quasi prostrata; Ea propter ad te mitto descriptionem præsanæ, cujus effectus non semel votis meis responderunt, in sciendis præcipue urinis.

℞. Cinerum genistæ ℥ss. β. semi. lectiss. ʒij. summit. absinth. m. iβ. tienti infusa vase diligenter operto per biduum integrum illi vini albi poculo, infusio servetur ad usum sequentem: ℞. Soldanell. m. j. (seu folior. vel radic. optime conquis.) infunde in alio dimidio poculo vini albi, etiam per integrum biduum. Postea miscerantur hæc compositiones, per hippocratis manicam deinde colandæ; sumantur ʒiv. singulis diebus matutinis tribus ante cibum horis. victus ratione convenienti posthac observata. *Datum Vesanii Aprilis 6. ann. 1692. Bonchard D. M.*

Aliud rursus in eodem argumento Responsum Medicum. Ex Gallico.

Accuratius describi non possunt affectiones D. ***. prementes, quam illud sit in historia Gratianopolim ad nos transmissa. Quod evaserit a tot morbis qui ipsam hæctenus affixerunt, debetur proculdubio peritiæ Medici ordinarii; quamvis enim sustinuerit mala omnium maxima; ea tamen semper eluctatus est; cum salutis nulla eluceret spes. Postquam scientiam atque solertiam sic probavit Medicus, non est sane quod alia adhibeantur remedia quam quæ ipsi omnino ariserint: Jam enim consumpsit quicquid solet in similibus consummi casibus. Agre interim non feret si quædam quadam proponantur medicamenta quæ, si ipsi probata fuerint, usurpabit.

Potest adhiberi resina jalappæ cum mercurio dulci, scil. mercur. ad ʒi. & resina jalappæ ad

gr. x. in conserva rosarum; pro dosi. Agre, quæ itidem erit præsanæ & cineribus ligni chý-norrhodon in aqua fontana, ut & cataphlasma e cochleis terrestribus in sartagine exaltatum. Vinum minime prohiberi debet; quandoquidem ventriculo vires addit, & propterea medicamenta e cineribus genistæ ac juniperi in vino parata apta sunt futura, si de his bis de die cochlearia duo ebibat. Syrupus de Rhamno cathartico in remedio purgante composito ex tanariind. senn. rheo, manna, & electuario de succo rosarum, & refecturus est; verum eo tantum alternis utetur, adhibitis intermediis spatiis roborantibus medicamentis, quales fuerint Diacordium, Fracastorius, aliaque; sanguis enim firmandus semper venit dum aliquid leni evacuatur. Ne nimium ebibat patiens, subinde sitis venit fallenda; si feroci tumor multum augeatur, aquaque inibi repenatur, punctio est adhibenda: Sobrie debet comedere, ac alimenta bonæ notæ. Potuatur parco, sed in id adhibeat vinum, aqua enim minus est apta restaurandis fermentis naturalibus & sanguini. Verum quidem est quod temperamentum D. Agri omnino videtur aliud exquirere, sed ex his omnibus quos paucis est morbis satis superque manifestum sit in ipso semper lympham crassiorem, salsiusque fixiori-bus imprægnatam; cumulatam fuisse. *Datum Gratianopoli Maii 8. ann. 1692. Chastelain D. M.*

Omnia quæ præscripserat Clariss. Wepterus, alique magni nominis Medici minime cum fructu cum adhibita fuissent, tandem sub initium Junii aliquid levaminis habuit D. Ager ab usu opiatae confectæ ex cortice Peruviano; viperina sive serpentaria Virginiana; floribus sal. armoniaci, aliisque volatilibus ac mistura bezoartica; rob. juniperi sicc. sale fixo, oleo æthereo, spiritusque ardente imprægnato, exceptis. Unde sic subsequenter mensibus rursus ad Clariss. D. Wepterus.

Antequam hæc claudam, superest paucis de Nob. D. **. Tecum agam, Vir Ampliss. Ille restitutus quasi videbatur, post altissima remedia, tum qualia consulueras, tum etiam alia; quorum præcipuam vim semper fecerunt volatilia; sed absente ætate, cum iter in viciniam, me invito ac reluctantem, haberet, febricitans rediit, ac continuo totius tumor re-tortus est, & ille hæctenus omnibus remediis luctatus fuit, eoque magis, quod jam medicamenta purgantia, extractum scilicet panichymagdgum admixto melleculo dulci, aut aliud quid e validioribus, imò ne quidem semen ebuli ipsi hæctenus in tanto pretio habitum; tæne possit. Unice ab aliquot mensibus ipsi proficua est opiata concinnata ex cortice Peruviano; viperina Virginiana, cum volatilibus &c: illa enim semper alvum solvit, urinas ciet, & febrem; ex quo caput exerit, reprimit: verum timeo ne quamprimum illud præsidii genus etiam infructuosum evadat, ut de aliis omnibus evenit; quorum sane non minuzam consumptionis copiam; ita ut hic sit unde & æger & Medicus uol parum defatigentur. Interim morbus augmento continuo est paratus; ni obviam illi eatur, & exoptat Nob. Pat. in sui solatium, tum sudores (quandoquidem tumor jam potius est leucophlegmaticus quam asciticus, cum mixto tibi

tius pruritu; urinæ minus rubræ, ac copiosiores, sicut moderata, febrisque satis parva) tum alia quæ Viro Ampliil. nobis indicare placuerit.
Datum Geneva Ianuar. 11. ann. 1693.

Responsum Medicum

Nobil. D. quod attinet non possum certum quid tradere, quia nescio quali febris cum leucophlegmatia efficiatur: si esset ex numero intermittentium, sive quartana simplex, sive duplex, quod ex morbi diuturnitate conicio, hanc observare soleo methodum. Diebus quietis, mane hora sexta, & duabus horis ante cenam exhibeo nucis juglandis magnitudine de hoc electuario.

℞. Conserv. rosar. rubr. ℥ii. cons. flor. centaur. min. ℥i. pulv. cortic. Quinz quinz ℥i. sal. absinth. ℥i. pulp. pom. citr. n. i. jubeoque ut ad minimum horis duabus à cibo & à potu abstineant, maneantque semper in loco temperato. Quoties juleculum comedunt semper addo cochleare unum de liquore aperitivo, pro quo.

℞. Sp. sal. armon. urin ℥i. sp. sal. dulc. ℥ss. sp. C.C. rectific. ℥i. sal. absinth. ℥ss. aq. gramin. ℥vii. M. Die paroxysmi, horam circiter ante Paroxysmum, do intusum febrifugum, postquam illos quinque horis ante insultum parce cibavi.

℞. Pulver. Quinz quin. ℥ii. antimon. diaphor. cum triplo nieri detonati ℥i. sal. absinth. ℥ss. aq. cardui benedicti. ℥ii. M. Post sumptum febrifugum nihil comedant ad finem paroxysmi, nec bibant donec calor enerserit.

Ratione leucophlegmatiz, die quietis mane hora quinta utatur scamno sudorifero; hac methodo. Scamnum calefiat batillis pruna ardente plenis. Scamno imponatur jacens, palea infarctus, tegatur linteo mundo: operculum cameratum tegatur culcitris. Antrius versus cervical appendantur lintea munda multiplicata, velut octodupla, ne calor exeat, aut caput nimis feriat. Cervicali imponatur pulvinus; ut sacco & pulvinari incumbere cœu lecto possit. Antequam scamno incumbat detur haultus decocti sudoriferi ad ℥v. vel vi calide, quale lubuerit. E. g. unum addam.

℞. Rad. falsaparill. ℥iiij. gramin. ℥i. incisa & contusa infundantur in aq. calid. ℔. iij. horis 12. postea coquant. lento ca. ore ad dimidias. Sub finem coctionis adde passulæ. major. exacinat. ℥ii. post ebullition. colentur & exprimantur. Dum scamno incumbit sæpe reficiatur julepo diaphoretico, pro quo.

℞. Aq. flor. a. acia: ℥v. antimon. diaphor. ℥ss. syr. de rubo idæo ℥ss. M. Post elapsum tempus detergatur linteis calidis, & in lectum calidum reponatur, ac subinde cochleari uno vel altero julep. refocilletur. Prima vice non relinquatur ultra horam dimidiam super scamno. Hac ratione sine ulla virium prostratione sudorem movi: præstat tamen sudorem movere mane; nec, etiamsi vires consentiant diu super scamno licet relinquere. Verum quid agendum sit præsens melius præstabis, quam si in scribendo prolixior fuero. Vale Excell. D. cum tuis omnibus optime, tæveque &c. *Scaphusii scriptum die 25. Ianuar. 1693. Joh. Jac. Wepfer. M.D. In sequentibus Clar. D. Wepfero hæc rursus significavi.*

Nobil. D. quod attinet, febris qua detinetur est

proprie de genere lentarum, sed quam tamen non parum reprimat opiata, seu electuarium nostrum, de quo supra. Sudores tolerare nequit, quandoquidem sarcina leucophlegmatica in illo major fuit, quam quæ facile & tuto hoc remedium genere dimoveri potuerit, hac præcipue tempestate, admodum importuna, quæ impossibile est ab Aegro obtineamus ut in cubiculo calido clausus maneat. Gratias interim maximas tibi agimus, Vir Ampliil. proprototypo scamni sudatorii ad nos transmissio, quod sane perquam commodum, etiam pro debilibus mihi videtur; jam vero laconicum, ad formam prope illius quod apud Harthmannum describitur, confici curaveram: at hæc omnia in tempestatem oportunior remitteremus; substituto tantum succedaneo, scilicet decoctionibus, ex china, sarfa, lign. lentiscin. &c. quibus utcumque attenuabitur humor in gelatinam undique concretus, paratiorque egressui per var. vias iasibi aperiendo, fiet. Vereor tamen ne collabentibus in dies viribus, cumulatæque semper ulterius sero facile concretescibili, in toto corporis habitu, ipsique etiam visceribus, quæ admodum infarcta se præbent, adventante vere Vir Probus, nihil aut parum proficientibus auxiliis, ad plures emigret. *Februar. 6. ann. 1693.*

Ad hæc sic respondebat Vir Ampliiff. Februar. 7. ann. 1693.

Utinam Nob. D. vel per quadrantem horæ scamnum experiretur, si omnino per febrelem lentam liceret. Certe gelatinam solveret.

Atque hæcenus varia consilia pro Nob. D. pro tempore alicitico, mox leucophlegmatico, attulimus, jam superest ut aliquid de his quæ ultimo evenere dicamus. Cum postrennis viræ mensibus, uno per annum integrum, nihil proprie levaminis, quam ab opiata supra descripta, ac à me ipsi parata, haberet, nec inde tamen sanus omnino evaderet. Vir alias præcedaneis suis ægitudinibus proflus labefactatus, in consilium tandem adhibuit Medicum quendam Galium, qui, me renuente, suavit pilulas lunares à Nob. D. Boyle in sua Philosophia experimentalis descriptas; inde autem enata est sitis inexplicabilis, inappetentia totalis, ac nigror linguæ quasi gangrenosus; brevique subsequuta est mors, quam proxime præcedebat sopor, maximæque abdominis tensio. *Mortuus est Martii 11. Ann. 693*

Consilium Medicum pro Nobil. Matrona Bononiensi Ascitica.

Ex iis omnibus quæ à Viro Præclariss. D. Levizagno Medicinæ Doctore Celeberrimo, de Nob. Matronæ Bononiensis D. N. N. latu compendio perscribuntur satis superque constat hydropem hic reperiri ascitem; nam datus, & uncti, ut & tumor femorum ac tibiærum in spinam per lectuli quietem subinde devolutus, morbi idæi non variant, aut de tympanitide atque anasarca tanquam complicatis, aliquid pronuciare cogunt, cum siquidem alicitis comites prope perpetui, non minus quam urinæ rubicundiores, quales à Nob. excernuntur Aëgra. Si minus neglectus fuisset morbus in suis principibus nec graviditatis opinio medelæ necessariæ per menses obstitisset facile

cuius multo proculdubio præsidii auscultasset. At confirmatus jam, labem viceribus inu ventris, per salia sero stagnanti combinata, misisset, unde multo rebellior, laboriosiorque curæ fuerit. Interim omni nilu expugnandus venit, ut si possibile ultiores non acquirat eundo vires. In hunc finem varia tentari debent auxilia, sero accumulato evacuando, obstructionibus referendis, viceribus corroborandis, sanguinisque tono redintegrando, dicata itaq; præter purgantia paulo generosiora, ac æger viciis magis accommodata, quorum selectus Medicis assidentibus merito relinquitur, omnino auctor essem ut frequentius, scilicet de die, uteretur oleo tartari purgante Sennerti, seu liquore terræ solatæ tartari ad gr. xxx. vel xl. in iuculis tenuioribus nalturtio aquatico & radice petroselinæ alteratis; mo, si febris non adsit, de qua ne verbum quidem in morbi descriptione, consulerem singulis potus sui ordinarii haustibus paux illum admisceretur, live salis volatilis succum vere urinosi, qualem hic conceimus, live salis volatilis tartari, live horum defectu, salis volatilis butonum, aut lumbricorum terretrium. De asellorum pulvere opiatu appropriatis immiscendo, de medicamentis martiisbus suo tempore exhibendis, de succis & beccabunga, nalturtio aquatico, lichene seu hepatica saxatili, ac plantagine, de decoctis ex rad. chinæ, ligno sassafr. &c. pro potu parandis, de clysteris ex urina terebinthina & nitro vitriolati imprægnata, aliisque confectis, sæpius injiciendis, de topicis variis, imo de paracentesi in eam alias desperato per acum tubulatam peragenda, ut & de data, hic nihil addo, ne falcem in mensem Celeberrimorum virorum lectissim. Matronæ medicinam facientium, quorumque nominibus allargo, temerius inmittere videar; sufficiat pauca hæc, mihi in similibus casibus probata, verbo indicasse. Datum Geneva Maii 4. anni 1689. *Mangel. D. M.*

Observationes.

Colonus quidam hydrope diu laborans, cum nihil opis à medicis aliis sentiret, me consilii causa accersit, cui imperavi, cum non febricitaret, ut continuo allium comederet, quo factum est, ut multum aquositate per urinam profunderit, atque ex inperato eo remedio sanus evasit: alii etiam plurimi ita curati sunt: possunt contundi alii capita viridia, succusque per pannum cum jure vervecis aut puli solatus bibatur. Novi & alios hoc solutivo subinde exhibitio, multum aquæ per intervalla per alvum reddidisse, & sanos factos esse.

℞. Sol. sen. ʒss. sem. anis. ʒi. sol. Mezereon. ʒss. rad. irid. virid. parum contus. ʒiiss. soldanell. ʒss. infund. per noctem in ʒix. feri lactis. Facta ebullitione mane hujus fort. express.

℞. ʒvi. mell. rosat. colat. syr. de eupatorio an. ʒi. M. pro duabus dosibus. Ego cum video urinam supra modum tinctam esse, loco mezereon pono ʒiiss. rhei opt. addendo spicæ ʒi. quo sæpe cum magna sollicitate usus sum in nosocomio Delphensi. Elidæus præceptor meus hoc utebatur.

℞. Rhabarb. elect. pulv. ʒi. pulv. soldanell. ʒij. m. exhibeat una vice cum decocto aut

aqua convenienti. *Petrus Forestus obs. 27. lib. 19. de morbis hepatis.*

Cuidam hydrope laboranti inter reliqua pharimaca minimum magis juvabat, quam sequens medicamentum.

℞. Succitireos ʒss. aq. casei ʒiiss. mell. crud. ʒij. F. levis ebullitio, & coletur, in colat. distolve spic. nard. ʒss. cinnam. ʒi. diagrid. gr. iij. m. detur in aurora, ex eo semper habebat ad minus octo sedes valde aquosas. *Petrus Forestus obs. 30. lib. 19.*

Quidam hydropicus inflatus ventre, manibus, pedibusque & facie, a medicis destitutus, & tanquam desperatus, adne litus marinum, & navicula per aliquot miliaria ascendit in altum maris: & provocato vomitu, post vomitum exercitio utens, sanitati restitutus est. *Idem schol. ad obs. 32. lib. 19.*

Mirabilis est historia vetulæ mulieris ab hydrope curatæ, quæ talis est. Vetula quadam hydropica à Medicis destituta, ab altera vetula edocta capiebat ranas rubetas dictas, easque vivas in ollam novam conjiciebat, superinfuso oleo olivarum illisque sic decoctæ, eo ob ventrem inungebat, deducendo minus verus inferiora a stonacho incipiens vertus inguina, idque calide; & secundo die tumor descendit ad inferiora, ita ut mirum in modum incurrerunt pedes, sed quin prosequere ut inunctionem, tertio die panitus delituit tumor cum nulla sensibili evacuatione. Laudat Gradus, si in balneis arte paratis imponantur ranæ vivæ, mirabiliter enim ad se attrahunt aquositate. Sed topica non admittenda nisi præcesserint universales purgationes. *Idem Schol. ad obs. 35. lib. 19.*

Matronæ quidam hydropicæ prius bene per pil. tres exiguas ex mezereone descriptionis. Donati ab Altomari, repurgatæ, post aliquos fortis convenientes pro cruribus inflatis, sequens etiam cataplasma cruribus supra modum inflatis apposuimus.

℞. Rad. ebull. rec. m. vi. rad. bryon. ʒbi. cortic. exterior. sambuc. m. iij. sol. cucum. alumin. m. ij. caulium rub. M. vi. sol. in alv. m. ij. sol. althææ m. iij. furfur. macr. m. v. flor. chamæran. iij. flor. melilot. m. ij. absinth. exsiccat. m. iij. decoq. in aq. fontan. q. s. pistentur, addendo unguent. Agrippæ m. iij. farin. hord. ʒss. i. cataplasma ut artis est, hoc cataplasmate crura involvebamur, usque ad genus quo multa aqua effluxit absque corrosione. Est egregium & pro arcano retinendum. *Petrus Forestus obs. 39. lib. 19.*

Vidi Venetiis religiosum quendam hydropicæ cum ex ascite & tympanite, qui fuit curatus, adfuerunt mecum excellentissimi medici plurimi, scilicet, Papiensis, Eugubinus, Trincavella, & alii. Habebat is, ut dixi, ascitem cum tympanite, & tabem cum febre hectica, oportebat tunc exsiccare & humectare, quare eramus in maxima discordia, ego volebam ut multum biberet, sed quæ aperirent, quia habebat plurimas obstructions, præterea ut humectaretur, quia ad tabem pervenerat: ordinabam ergo syrupum acetosum cum omnibus quæ provocant urinam. Eugubinus volebat quicquam esse bibendum & narrabat de quodam historiam, qui per sicca fuit curatus. Papiensis ut litem dirimeret, conclusit neque liberaliter, neque omnino nihil esse bibendum, res extraheretur, usque

usque ad noctem, deducebant nobiles unumquemque medicum ad suam cymbam, ibi tum Papiensis quod antea dissimulaverat, conversus ad magnificum quendam dixit, si vultis curare hunc Dominum, profecto non aliud erit faciendum quam quod consuluit *Baptista Momannus. Io. Baptista Momannus. Conf. 863.*

In Hospitali ventre tumente & pedibus ægrotabat pauper, cui hoc vino medicato subvenimus.

℞. Rad. irid. ʒiβ. cort. rad. sambuc. & ebul. ana ʒi. absynth. sic. ʒij. fol. senn. ʒi. sem. carui ʒi. vini mens. i. coque leviter in duplici vase, bibat mane haultum aliquoties multum & frequenter inde nuxit, insensimque tumor ventris & pedum subsedit sanitatque restitutus est. *Felix Platerus obs. lib. 3. p. 633.*

Hydropico cuidam sartori propinavi lucum ireos ut biberet ad ʒij. addito melle, unde plurimum & sæpius minxit & deiecit, & postquam repetiisset bis vel ter detumuit venter, pedesque subsederunt, ipseque sanatus est. *Felix Platerus obs. lib. 3. pag. 634.*

Cum seni cuidam hydropo laboranti, pedes mire intumescerent, & vix spirare nisi erectus posset, scarificatio cruribus fuit adhibita, unde mensuræ aliquot seri, pedetentim effluerunt, liberiusque spiritum duxit: sed rursus recrudescente malo, & repetita scarificatione, fluente aqua, semper melius habebat, donec gangræna in pedibus suborta (uti frequenter fieri solet) eum confecit. *Felix Platerus. obs. lib. 3. pag. 649.*

E pedibus in hydropo ascite tumentibus, sponte aquam e phlictanis, seu vesiculis illic natis, quæ disruptæ aquam profundebant, vel scarificatione facta, e plagis ad multas saepe mensuras sensim effluxisse, aliquosque sic liberatos fuisse, licet in aliis, mortis imminenti sit indicium, multoties observavimus. Sed quod magis rarum, in quodam hydropico, ex seroto mire tumefacto, aquaque pleno, nulla apertura facta, supra mensuras tres vel quatuor sensim exillasse vidimus, qui tamen minime mortem evasit, quod paracentesis in seroto ubi tutius fieret, plurimum profuturum in illis, qui curari possunt, nobis ostendit. *Felix Platerus. obs. lib. 3. pag. 650.*

In Xenodochium Batiliense adducta fuit puella pauper annorum decem ascitica, ventre in immensum tumente, pedibus item inflatis, reliquo corpore penitus assumpta, summaque dyspnæa laborans, ita ut pene suffocaretur, prominebat illi umbilicus vesicæ instar pelliculæ, quam Chirurgus scalpello leviter discindens, me iubente, aperuit, unde magno impetu aqua profiliit, quam cum sensim aliquot dies emitteremus, ipsaque statim ubi venter parum subsedisset, spiritum facile duceret, eamque tanquam bene habentem Chirurgus negligeret, factum ut aqua rursus se colligente, venter denuo intumuerit, vesicæque apparuerit, qua rursus dissecta, cum denuo aquæ effluxus pateret, & turunda immissa foramen ne coalesceret apertum retineretur, atque in dies aquæ aliquantum educeretur, tandem venter in pristinam formam remeante, pedumque tumore evanescente, marcisque corporis per cibum & potum emendato, ex Xeno

in nosodochium translata, ibique aliquot septimanas, permanens, integre sana cum matie discessit. *Felix Platerus obs. lib. 3. pag. 651.*

Viro cuidam hydropico singulis quatuor diebus exhibui sequentem haultum, qui miraculose depellit hydropes.

℞. Aq. abinth. ʒv. extract. diacolocynthid. ʒij. ad ignem dissolvantur, hæc potio multas aquositates, multos flatus, multos quoque alios vitiosos humores quavis vice sine dolore & molestia eduxit, ac nitrum in modum profuit. *Martinus Rulandus curat. 3. cent. 3.*

Puerum quendam novem annorum (ut & alios multos hydropicos) sanavi per solam potunculam hæc.

℞. Extract. esul. quantitatem nucis mosch. aq. ʒij. m. facta simul ebullitione. Macerentur per noctem. Mane colatum bibit frigide, quo per alvum plurima pituitosa & aquosa excrementa expulit. Pro residuis aquositatibus propellendis exhibui die sequenti iterum eandem potionem, cujus operatio bona & multa contentum sanitatem integram reddidit. *Martinus Rulandus curat. 63. cent. 3.*

Mulier quædam ascitica à me optime & breviter curata est taliter.

℞. Seri lactis ʒv. extract. esul. ʒij. π. pro haultu, quem bibit mane, & tertio post die repetiit, & hoc sane omnes aquositates ex toto corpore exturbavit, adeo ut paucis elapsis diebus sanitatem iterum obtinuerit. Lotus erat serum lactis, sed litum, meo iussu, perfecebat quantum potuit *Martinus Rulandus. cur. 94. cent. 3.*

Virum quendam hydropicum ita curavi.

℞. Aq. terr. sanct. ʒvi. l. potio, quam in lecto bene contentus bibit calide, ac sudor emanavit e toto corpore per tres horas, & post sudationem, egressit quoque multoties multas per alvum aquositates, & intra biduum annuente Deo, omnibus admirantibus, tumor abdominis, crurum & pedum, & reliqua omnia symptomata evanuerunt. Hæc aqua est optimum medicamentum hydroticum & hydragogon. *Martinus Rulandus. cur. 88. cent. 3.* Aqua terræ sanct. descriptio talis est.

℞. Boli orient. ʒviii. terr. sigill. ʒij. aq. Levillic. ʒv. macerentur per dies novem in loco calido. Postea destill.

Quidam ex domesticis Nobilis viri Joh. Francisci de Martines, Domini de Bouriod Jean Valschant nomine, natione Sabaudus, septuagenarius, sed robustissimus, morbisque raro obnoxius, anno 1597. tertiana febre nitum in modum arefactus & extenuatus fuerat ita ut post menses sex ab eadem curatus in ascitem asciderit. Quocirca corpore prius purgato, ex consilio prædicti Domini Bouriod: singulis matutinis in aurora, unum vel alterum haultum propriæ urinae ebibeat. Id cum spatio quatuor mensium continuasset, & interim hydragogis aliquoties purgatus fuisset, quin etiam optimam victus rationem observasset, tumor ventris & tibiae paulatim subsedit, tandemque plenissime convaleuit, qui cum ad annum 1604. prospera valetudine usus fuisset, tandem mense Decembri ejusdem anni, propter catarrhum decumbentem, in phthisin incidens, extinctus fuit. *Unilhelm, Fabru, Hildan. obs. 51. cent. 3.*

Cosmus

Cosinus Slotanus Chirurgus præstantissimus virum ascite laborantem curandum habuit, medicamenta permulta tum interna, tum externa, ei absque fructu adhibita fuerunt; tandem vero adeo copiose in scrotum delapsus est humor serosus, ut extincto calore nativo, secuta sit gangrena, adhibitis quæ ad gangræne curationem spectant, decidit scrotum, ita ut testiculi nudi conspicerentur. Hinc tantum effluxit humoris serosi, ut à morbo liberatus sit æger, & diu supervixerit sanus, atque liberos aliquot procreavit. Testes autem natura obduxerat callosa quadam substantia, quæ eos vice scroti obtegebat, & ab externis injuriis vindicabat. *Guil. Fabricius Hildanus observ. 3. cont. 1.*

In Urbe nostra juvenis quidam Hydrope laborans, sponte natura binis vomitibus excitatus, ingentem aquæ copiam evomit, quo facto venter detumuit & Hydrope liberatus fuit. Avicenna in cura hydropis vomitum maxime laudat; qui tamen si copiosus sponte natura viribus imbecillioribus existentibus supervenerit, mortem accelerare consuevit, quemadmodum colligimus ex historia à Nicolo descripta. Meminit enim cujusdam hydropici, qui continuo evomens aquam, extinctus est.

Piscator; quidam læsio hepatis non esset insignis, tumore tamen ingenti venter intumesceret; ex assiduo labore soluta hydrops, & detumefactus venter, perfecteque sanatus, nullis Medicis adhibitis auxiliis. *Marcellus Donatus cap. 21. lib. 4. histor. medic. mirab.*

A fide digno medico mihi relatum est, canonicum quendam ex hydrope periculose decumbentem, à Medico suo petisse, ut halecis esum sibi indulgeret, annuit medicus sed hac conditione, ne intra duarum horarum spatium, quicquam potulenti post esum halecis assumeret, & integrum halecem, si posset, assumeret, ægrotus patet. Quid sit æger tandem ad urinx emissionem stimulatus, tam large ipsam profudit, ut per horæ ferè quadrantem nulla mictionis quies interveniret, ipsumque abdomen sensibilibus magis magisque subsidere deprehenderetur. *Daniel Sennertus præf. lib. 3. part. 6. sect. 2. cap. 3.*

Novi Comitissam de Falais, quæ dum juvenula hydrope tumeret, suavis cupulam medici, abstinuit fere per solidum annum a potu, solidiore cibo & jusculis contenta: & evasit læva vivitque modo septuagenaria. Authores aliquot commendant bufones vivos utrinque renibus alligatos, solvere hydropem per lotium! Saltem vidi rusticum hydropicem sanatum alligata anguim senecta per ventrem & renes. Mercur. præcipit. curat omnem hydropem. Observavi si antimonium in liquorem vertatur, ac postmodum in pulverem, qui tantum per sudorem purget, haberi remedium, quod omnem hydropem modeste tollit, non frustra commendat simos Paracelsus, cum sint salia ciborum putridorum, quibus datum est resolvere materiam occasionalem hydropis. *Id. Helmontius tractat. cut. tit. 1. Ignor. Hydrop.*

Hydropica mulier cum nullis remediis levare potuisset, sola præstans herbæ ceterach curata fuit; ejus autem præstanz valde colorata præ copia plantæ tres haustus mane quotidie sumebat;

sic enim jecur, ubi sæpe fons & origo hydropis est corroboratum, & ad pristinam temperiem deductum fuit, adeo ut non aquosum amplius sed bonum sanguinem produxerit: alios epoto succo satureiz curatos fuisse pro certo mihi relatum fuit. Veronicæ aqua mane epota ad 5vi. per tres dies, ad hydropicos curandos valde etiam utilis est. *Petrus Borellus. obs. 53. tom. 2.*

Virgo sexagenaria per aliquod tempus ascite laborarat, cui medicus post medicamenta plurima & varia, cruridenum cantherium potentiale imposuit. Excitata ac decedente eschara, in dies serum copiosum, falsum, acre emanabat, tumor ventris & crurum totus desidebat, sicque brevi reventura ægra, quadriennium & ultra satis sanæ vitam suam protraxerat. *Helvigii.*

Vidua quædam, pene septuagenaria, Noribergæ ascite & Tympanitide per plures annos graviter laborans, ac ob corporis molem, & deambulandi impotentiam, lecto plerumque assixa, denum ex consilio villicæ cujusdam amygdalem muricæ seu brodii brassicæ conditæ calide in lecto decumbens biberat, atque citris plumeis bene operata succalescens, per vices postmodum urinam copiosam reddiderat, tumor omnis inde paulatim evanuit, & biennium adhuc satis firma supervixit. *Helvigii.*

Figulus quidam juvenis post febrem incidit in ascitem, variisque utebatur remediis, sed frustra; ita ut tandem desperaret de curatione, præsertim interveniente dysenteria. Tumor post hanc non cessavit, sed erat maximus, urgebat dyspnæa. Jussi uti absinthio, & usus est decem dies succo absynth. & postea ex suavis Ducisse axungia canis in jusculis, & pedetentim remiit tumor. *Cl. DD. Febr. p. m. d. C. [br. Winckleri]*

Novi puellam sexennem ascite aut vetius Anasarca, præ tumido quidem ventre, sed & facie artubusque præ tumore translucidis, correptam, post biennium rediit affectus cum orthopnæa desperata huic adhibui hydragoga, diuretica, & diaphoretica, tandem ex alieno consilio cum per paucos dies urinam hirci bibilet, magno juvamine vidi Hydropem declinasse anno M. D. C. L. V. Hinc patet excreta quoque naturæ benignitate fecunda esse, & Hircinam sale suo copiosis simul ac urinam humanam serosam & excrementitios humores educere, quæ simpliciora interdum tutiora, quam quæ vel ludus vel Arabs corrupta & effæta nuntit. *Salomonis Keisleri.*

Minabatur ascites æthiopæd Hafnienti extrema omnia: venter in immensam molem intumuerat, reliquum corpus inane & flaccidum, urina parvissima, & guttatim tantum erumpens, appetitus exul, alvus nigra, noctes insomnes, facies Hippocratica, pulmones, quod malum cæteris accesserat, etoli, ex quibus non raro integræ sanguinis floridi libræ in subjectam pelvim rejiciebantur; ætas in præcipiti, & fornicatus ille senibus annus sexagesimus tertius præforibus. Evasit nihilominus Libitinam, & salvus hodieque per plateas obambulat, etiam nuptias secundas cogitans. Bani verosanitate ante omnia Deo immortalis, dehinc frequentibus liquorum exoticorum decoctis

teret acceptam. Postquam enim viderem acrimia & acida, utcumque vias urinæ aperientia, hic non convenire ob debilissimam pulcherrimorum vasâ, deliccantibus instituti, & fibras intestinorum roborantibus. Ante quidem Jalappa cum gummi gotte frequenter propinata evacuavit masculine humores noxios, sed novis identidem per patulas vias succedentibus parum recreavit ægrum: ante martialia frequenter adhibita, lumbricorum pulvis in usum vocatus, tinctura salis tartari frequentata, sudores proliciti, morbo obstinate edurante: itaque persistendum monui in decocto guajaci, sailastras, lentilci, chinæ, fore enim ut hac via fontes liquoris hydropici exsiccarentur, & laxior intestinorum mesenterique tunica fibras suas striccius colligeret, adeoque irruenti quotidie novo humori vitioso reluctaretur. Ne autem jam tum hærens in cavitate abdominis aqua perpetuo ibi hæreret, ex intervallo ad jalappam, ad balnea laconica devenit, quibus demum cessit pertinax malum, & referatis iterum urinæ viis sanitas sperata reversa est, admonens, in certa desperatione certam quandoque spem, obediens ægro, superesse. *Olai horrichii.*

Gregers Dorthiana vidua tumorem sedavit decocto cotula foetida & raporum aridorum, quoque dies usa est.

Cotulam foetidam commendat Tabernæmontanus in ictero inveterato; pollet enim vi caletaciendi & siccandi in gradu secundo, ac in super deliccandi. Narravit mihi nobilis Ducatu Nissenii puerum hydropicum unico decocto cotula sanatum. Experiri volui anno præterito in hydropica annosa, sed nullo emolumento. Interim tamen in junioribus, ubi viscera salva, vi discutiendi aliquid præstare non dubito. *Christiani Winkleri.*

Augustus Schaper figulus Hildesienfis ex fictiliu per lithagyrum calida incrustatione factus, ut plerumque hoc hominum genus solet, cachecticus, in subitaneum incidit hydropem ut intra paucos dies toto corpore scroto præsertim & cruribus immane quantum intumesceret, curatur a me methodo ordinaria per aperientia, hydragoga, diuretica successively sine tamen successu exhibita, suadetur ipsi tandem a nescio quo superveniente scarificatione crurum, quam tamen ego, eventum in corpore extreme cachectico prævidens, omnibus modis dissuadeo, ille tamen quidvis potius quam nihil experiri cupiens illam acrius urget, & nisi permittatur se sibi ipsi cultro crura perfossurum minatur. Hic ego factio prius de subsequuto eventu prognostico chirurgum crura phlebotome leniter scarificare jubeo, unde intra duos dies in suppositas patellas omnis destillavit morbidus latex, & aquosus albo corpore languor paulatim ita decessit ut se omni periculo perfunctum integre sanum existimaret. Breve fuit gaudium; cum enim ancilla ejus infantem recens natum ex incuria in terram præcipientem daret, ille terrore & iracundia subito percitus crura sibi statim inflammari sentit, quæ inflammatio tantum absuit ut, quæsitissimis licet adhibitis remediis, sedari potuerit, ut potius in lethalem desineret sphacelum. Ita saepe

ubi morbi quærimus remedium mortis reperimus compendium. *D. Joh. Henr. Brachfeld.*

Vidua quædam 60. annorum hic loci sedem rerum ac fortunatum suarum habens, post varios in diæta commissos errores septem abhinc annis hydropem ascitem corripiebatur: quo in dies ingravescente, accersitus medicus nullo ad sanandum appposito remedio neglecto curationem tentabat: sed quodvis incallum adhibebatur, neque medicamentorum virtute vires morbi frangere ejusque radices evellere licitum erat. Superfuit Paracentesis, cujus tamen administrationem omnimodè recusavit, nulliusque persuasionibus eò impelli potuit, ut dicto medio locum daret, quin potius mortem appetiit. At præter omnium opinionem morbus ad exoptatorem longè eventum provectus est. Ægrotans namque vi morbi fere consumpta sentit aquam ex utriusque lateris hypocondriis, ubi pori cutis mirum in modum aperti conspiciebantur, promanare: Cui fluxui, quod mirum! natura quasi non nescia una vice hydropicorum aquam non educendam esse, præclusis poris moram interdum imperabat, quæ tamen aliis temporibus remotis obstaculis sponte solvebatur. Fluxu igitur hoc per intervalla aliquot menses durante, abdomineque sensim detumescente, ægrotans morbi gravitate magisque levabatur, donec tandem aqua præternaturali ex corpore ejus ejecta integritatem pristina valetudinis recuperaret, quæ etiam, dum hæc scribo, satis belle atque commode fruitur. *Joh. Petri Albrechti.*

Femina Juvenis Mercatoris uxor, tenuis & procera, cum infantem suum lactaret, ad lac augendum interdum & noctu cervisiam modo simplicem, modo lacteatam immo dice ingerebat. Postquam hac mala victus ratione per sesquimensum usa fuerit, ascitem, cujus initia minime adverterat brevi, immenem contraxit; quippe abdomen aqua intus fluctuante gravidum, valde intumescerebat, ejusque moles cum e latere uno in alterum se devolveret, extra ilia & reliqui corporis oram concideret: interea membrorum omnium carnes valde absquebantur, ut non minus tabida simul, ac hydropica videretur.

Infante ablactato, & meliori victus ratione instituta ad medicinam se contulit, cepitque imprimis hydragoga leniora tum Cathartica tum diuretica, absque ullo tamen commodo; quin a purgatione omni semper deterius habuit; hanc postea curæ nostræ commissam, & pene deploratam methodo sequenti tractabam.

Cerevisiæ & liquoris cujusque potulenti (pharmacia exceptis) usu fere in totum interdicto medicamenta hæc præscribo.

℞. Fol. plantaginis, Beccabungæ, Aparines, ana M. iij. simul contulis affunde aquam lumbricorum & Raphan. composit. ana ℥iij. f. expressio. cepit bis in die, viz hora viij. matut. & v. post mer. Medicamenti hujus usum diu continuabat, sed compositionem subinde variabat, mutatis modo

mutatis modò herbis, modò liquore iis con-
tutis affundendo.

℞. Tinctur. salis tartari rubicundissimæ ʒiʒ. cepit gut. xx. hora sonni & primo mane in cochlear ij. Julapii sequentis, superbibendo cochl. vii.

℞. Aq. flor. sambuci, saxifragiæ, an. ʒvi. aq. limacum, lumbricorum, raphan. composit. an. ʒij. super abdomen gerabat emplastrum ex emplastro de minio, & oxycroceo. Enema sequens adhibebatur primo quotidie, postea diebus alternis aut tertiis.

℞. Urinæ hominis sani lbj. terebinthinæ solut. cum vitell. ovi ʒiʒ. sacchar. ʒj. sal. prunel. ʒj. f. enema. Horum usu constanti, intra sesquimenssem venter detumuit, sed carne in dies contabescente lithisis metuebatur. Quare hujus præcavendæ gratiâ rus p. olecta, lac asinum bibebat, cujus nutrimenti, & aux purioris beneficio, medicamina usque prædicta assumens, intra tres aut quatuor septimanas integre convaluit. & etiamnum vivit, valetque. *Thom. Willis. Pharmacœut. rational. part. 1.*

Sudorificis suas laudes in sanando hydropnequaquam denegandas esse, exemplum hoc ante paucos annos nobis observatum oppido confirmabit: Rusticus quidam isque pauperculus hydropico malo gravissimè & quasi desperatè laborabat, adeo ut nunquam non suffocatio hinc ingrueret; Is autem cum unice hoc in desiderio haberet, ut vehementius duntaxat sudare liceret, exinde non incertum pollicendo levamen, fortè fortuna annuadvertēbat vicinum panibus pinsitandis occupatum, & propterea in hoc probe caletactō clibano se constitutum avidè exoptabat. Postquàm itaque negotium hoc furnarium tunc expediebat vicinus atque hinc discesserat, ille ex casa sua prorepēdo se totum furno illi tolerabiliter sed satis adhuc fervido cum vestibis immitte, capite duntaxat exserto & foramine cūbani linteis bene munito, ne aeris frigus irruere & furnarium calorem tam cito dispellere posset. Indulgens per trihorium sudori effusissimo, ita ut animi deliquium hinc immineret, semimortuus quasi sed onere aquoso tamen liberatus fuit extractus, lectoque exutis vestimentis, quæ hydropica quasi & undiquaque madidissima facta erant, impositus, intra paucos dies cum prospera valetudine plenarie in gratiam rediit, & adhuc in vivis sine ullo vestigio hydropis exiit. Ut itaque per sudorem contertim provocatum causa materialis hujus æruginæ oppido sic sublata & insaulta aqua hæc desiccata fuit, ita etiam suffusus ille confortativus, quem panes in furno cocti reliquerant, hic sicco pede nullo prætereundus est modo, utpote qui apertis per sudorem poris ad interiora corporis libero possit se penetrare, spiritus vitales (cum quibus immediatum concoctum servant odores) egregie confortare, ac per consequens famelica membra reficere aut balsamico velut nutrimento suo præstabiliter recreare, hoc est vitam citò attingere, & in ea puritatem suavitatemque præparare sic potuit. Verissimum adeo est, quod Helmontius dicit, altiora esse suffitum præsidia, quam ut hoc vulgo æstimari soleat: odora- mentis enim plurimorum sunt morborum sa-

nationes, quod ex illis vires & robur masculinum scaturiat: Et quamvis pauci fidem adhibeant Helmontio, aut intelligant ejus estatum, quo odorem esse fermenti symbolum & seminarium transmutationis causam continere illum se erit, tamen si penitus id consideremus, hoc verissimum & ex ipso naturæ sinu depromptum est. *Christi. Lang. in Animadvers. ad Joh. Petri Fabr. Patholog. Animatum.*

Hydrops Ascites cum Anasarca opii usu sanatus.

Olim pro generoso quodam valde cacochymo & doloribus nocturnis à lue venerea, male, aut minime curatâ, oriundis miserrimè divexato consulebat. Multa præscripsi, sed incassum, quia medicamenta plurimum abhorrens, ferre nihil præter laudani dosin, semel tantum aut bis in hebdomade pro sedandis doloribus ei concessam sumere voluit. Brevi hydropticus factus, ab ascite, simulque ab anasarca in tantum intumescēbat, ut viz. à latere in latus, sine ministrantium auxilio, se devolvere potuerit. In hoc statu ad eum de novo accersitus, & præceptis medicis obstinatum reperiens, quod supererat, mortis non longè abfuturæ, & pro certo expectandæ, propterea ut se, & res suas propter æternitatem componeret, prognosticon d. di. Ille, non multum turbatus, obnixè rogabat ut ~~medicinis~~ gratia laudanum nostrum, parcius ante permissum, ad libitum, aut saltem quoque vespere sumeret: hoc cum admonitione quâdam concedens discessi, ac uti putarem, supremum vale dixi. Postea pharmacum illud quotidie sumit ille, & quotidie dosin auxit, ita ut brevi tempore quantitatem ejus vix credibilem absunxisset. Pharmacum hoc unico contanter usus indies melius habuit, ac intra mensis spatium in tantum convaluit, ut, tumore omni, & doloribus immunis factus, stomacho valeret, & foras obambulare. Ab assiduo hujus opiatæ usu, sitis, antea multum urgens, cessabat, & quæque nocte in sudorem magnum dissolutus, insuper & urinam copiosam exercebat. *Thomas Willis, Pharmacœut. rational. part. 1.*

De Tanaceti pro Absinthio usurpatæ felici effectus.

Quam communico observationem hanc à singulari amico meo Jacobo Poirierio de la R. meo Ambæsiensi Med. Doct. à Monte Pessulano Kal. Aug. Mdcxxx. accepi: Miles quidam præsidarius in arce Monspellensi postquam per imp. obos Martis labores, & malesuadam famem in febrem lentam incidisset, hydropem tandem obsessus est, adeo ut æqualiculus sesquipede amplius exstaret, tumefactis una cruribus. Luridi vultus æger cum medicinam Rossetii Medici ordinarii fastidiret, & militare stipendium sumptibus impar esse videret, ad absinthium, stomacho ejus gratum, tanquam ad certam salutis anchoram se conferre decrevit. Verum specie delusus pro absinthio obvium tanacetum arripuit, & radicitus evulsit; quo in aqua decocto ad mediæ partis consumptionem, cum cythos duos exhaussisset calide, sitim auspiciato sedata

regina peti videas, ut indulgere religio sit. Hærent hoc morbi desperati, ut coniectis in *durantibus* sensibus alienissima quæque ab agris sollicitentur non temere concedenda; in nonnullis etiam Phantasia laborat, & duntaxat pro mobilis versatilisq; appetitus ingenio petuntur, quæ vel ipsi postea rejiciunt agri oblata, aut concessa nocent; Verum etiam ab aliquibus certo & querulo appetitu ad ea properari videas, quæ, etsi nocitura initio videntur, tamen, quod ab importuno Naturæ sibi consulenti immo pronascantur, in illo experientorum lusu concedi cum iudicio debent. Docuit id nos multiplex observatio, & ostendit a Medicis negata, pertinaci laborantium appetitui indulta ab aliis, & agrorum querimonias & morbi vim compescunt. Referte pudet, quoties Vinum a Medicis severe prolubitum in Ardentibus, ægros jamjam conclamatos & de appetitu perinde ac tæbre querulos, ab Orci faucibus, in ita lubet, revocaverit; plane autem singulare erat, quod Virgini nihil consanguineæ accidit. Laborabat hæc omnium Medicorum iudicio ex Ascite confirmato, cui, quod jam inde a teneris valetudinaria fuisset & cum Asthmate scorbutico sen per & usque conflictata, nulla admodum remedia profuere; relinquitur ergo prognostico, & mortis benevolentem patienter expectat. Interea ad sprocuram iam *tenet*

Cardiaca multis elogiis commendantur, quæ illa plane aversabatur. Inter alia vetabant Medici Cerevisiæ usum, quod illa aquas augere ventriculūq; nimium debilem labefactare videretur. Sed hæc nihil morata ægra nostra in pendio quærebat, quo sitim intolerabilem leniret. Postcebat ergo identidem Cerevisiæ haustus, quæ cum non sufficeret, ut solet per varia ambulare ægrotantium libido, ad novum & periculosum Zythi genus, quod in Batavia Bottel Bier vocant, incredibili appetitu fertur. Negam Amici se parere rogari posse, quod cerevisia illa spumosa esset atque flatulenta; illa tamen instat & vetitam potionem maxima obtinatione poscit, etiam, in protinus adit, moras fatius patat. Queritur ergo non ulli liquoris genus, & ne in conclamatum inofficiosi videantur, conceditur. Illa se largo spumantis Cerevisiæ flumine beat, neque mora, quin statim animi deliquia & pulsus distortis mortis periculum portenderent; sed pauxillum intererat temporis, cum effusio vomitu alvique fluxu enormi ad fermentationem spumantis Zythi animam agere videretur; itaque supremum illum esse Naturæ conatum omnes credidere, sed oportune accidit, ut facta seri evacuatione aqualiculus nimium quantum tensus subsideret mortique, cui jam Medicis & omnibus adjudicata erat, delinitis omnibus symptomatis eriperetur, eventusane rarissimo, & quem vel in Naturæ aut Fortunæ, si qua est, potestate fuisse unice credas. Decem nunc anni sunt, ex quo hoc morbo laboravit nunc quadragenaria, sed anniversariis morbis periculisque exposita. *Joh. Nicol. Pechlinus in Observation. Physico. Medicis.*

Anatomica Inspektiones.

In Ascitico quodam, ultra decem menses, institutam viam paracemeticam Lutetia Parisi oritur in Nosodochio l'Hotel Dieu vocato, ab illius Chirurgo jurato, *Messieur Petit*, sequenti modo & successu, facta in umbilicum incisione & immisso canali terreo, binis transversis digitis longo, aquam extraxit prima vice ad libram unam, canaliculum immisso epistomio rite clauso. Ita primo die bis, altera ter, aqua in convenienti copia detracta; Nocte quæ tertium præcessit diem, de ingentibus intestinorum doloribus conquestus, & inquietus dormiens, recluso epistomio sibi ipsi aquam educere cepit, quod cum rite loco suo reponere nequiret, nuxit aqua ad aurotam usque & adventum Chirurgi: unde pessime se habuit, & unius vel alterius horæ interjecta mora vitam cum morte commutavit, juxta Hippocr. sect. 6. aphor. 27.

Apertum ejus cadaver talia exhibuit: Abdomen ante sectionem ita erat tumidum ac distentum ac sine ne gutta humoris emissâ fuisset, quo incisione recta aperto, serosus humor subflavi coloris in magna quantitate effluxit, hac educita, & sectione ulterius continuata, inter peritonæum & musculos abdominis aqua apparebat nulla: peritonæum autem infra umbilicum conspiciebatur valde inflammatum ac rubescens, supra vero, & circa situm hepatis, quasi gangranosum, mucosa quadam viscidâque materia alba circumcirca oductum, cui insuper sanguis nigricans in grumos concretus adhaesit: Intestina inflammatione ingenti quasi erysipellate erant correpta (unde forte illi cruciatus de quibus conquerebatur) similemque materiam mucosam adjunctam habebant: Hepar genuino præditum colore ac duritie, nec nisi circa vesicam felleam albicantius conspiciebatur: Lien à statu naturali non recesserat, nisi quod vicinam habuerat vesicam aqua plenam, quamvis tunc ruptam: Pulmones boni erant & naturales: vesica urinaria admodum parva, contracta, omnique urina destituta. *Carolus Reyger. Observat. 3. Miscellan. curios. annor. 4.*

Nicolaus Sueiger, adolescens xvi. annorum, Basileæ probis natus parentibus, sed pauperculis, atque adeo viliori à teneris victui & laboribus assuetus, timidus, ac eo temperamento quod veteres sanguineo-pituitoium appellarent, præditus, spiritum à puero difficiliorem trahebat, præsertim cursu exercitatus. Igitur anno ætatis xv. ingravescente spiritus difficultate inguinum dolorem sentit, tensivum pungentemque, incellu exasperatum: Una & altera septimana post sequutus abdominis tumor, initio parvus & neglectus, in dies vero altius assurgens: Scrotum etiam ipsum jam intumescere, imo & femora, quoque & pedes: quorum tumor cuti concolor impressa digitorum vestigia aliquandiu servarat: In summo quinetiam femore, prope scrotum, serum ex ipsis cutis poris largiter stillare: Successu temporis brachium itidem sinistrum intumescere visum est, iterumque

cium quodammodo mentientes, quin & rubi-
sundi erant, & à basi latiuscula in acutum api-
cem fastigiati, serie multiplici: Propriam cor-
dis tunicam alicubi quidem coriosam, soluta
librarum compage vidimus, sed alibi carun-
culæ illæ, tanquam excrecentiæ, integræ lu-
suericiei adnatæ hærebant, aliquando semi-
nanciam altæ, totumque adeo cor fungi spe-
ciem exprimens visum est, quem cavernosum
appellant, mentis multorum, etiam principum
expectum. *Idem ibidem.*

Obliterationem eminentium intrinsecus in
cordis ventriculis columnarum & monticu-
lorum carneorum, superstitibus duntaxat
paucis vestigiis, adeo ut penitus ferme eva-
nuerint, in quodam phthisico, sed ad hydro-
pe.ii vergente, antehac etiam observavi: Cui
cor adeo fuit extenuatum, ut similiter ejus tha-
lami vix mediocri corium, dexter vero sim-
plicem tunicam parietum crassitie æquaret.
Idem ibidem.

Anno 1591. secui feminam octogenariam
hydropicam: Huic mirum in modum turge-
bat abdomen. Existimabantque e vulgo non
pauci eam fascino laborasse: Simulac cutis
separata esset, copiosa serosa materia in la-
tere dextro emanavit, quæ prænumia copia à
natura eo deposita fuerat: Pertulis abdominis
musculis protinus copiosa erupit aqua, quæ
universum replebat abdominis spatium: Quin
& in thorace omnia vitalia viscera aquosa
materie largiter innatabant, ablata quoque
calvaria ventriculi aqua repleti erant, atti-
timque cerebrum aquam profundebat. Peri-
tonæum huic cum omento prorsus absumptum
cernere erat, nam simulac musculi abdominis
distincti erant, cernere erat in intervæ abdo-
minis capacitate copiosa filamenta nervæ,
eodem fere modo uti in ventriculis cordis.
alt. copiosiora, hæc erant, & hinc inde ves-
iculas fecerant, quibus pertulis aqua efflue-
bat: hæc corpora nil nisi reliquias peritonæi
& omenti notabant: Omnia hinc fere viscera
non naturali erant statu, vesica reperiebatur
nusquam: Intestina omnia in unum conglome-
rata & veluti in globum acta, qui globus ex-
terius undiquaque peculiari eaque latis crassa
cingebatur membrana, uti videbatur ex ex-
crementis aquosæ substantiæ nata: Jecur, soli-
to multo durius, nihil tamen lapidei nitus
continebat, nec ei color naturalis, aut albidus
seu pallidus: Lien durus admodum, & solito
multo major ponderosusque figuram mutarat
suam, dum & in longitudine & latitudine ac-
creverat. Renes solito multo flaccidiores, tñm
& versus dorsi vertebres retracti: In cordis dex-
tro ventriculo substantiam quandam pituito-
sam viscidamque reperi, vitellum ovi colore &
substantia referentem, ex pituita lenta & viscida
stri concretam: Aqua quæ effluxit vix duabus
urnis capi poterat *P. Pavius Obser. Anat. 5.*

Filius parci Typographi adolescens, asciti-
cis factus est. Cum mortuum aperirem;
Præter reliqua, hepatis, lienis, renumque vi-
tia, asciticis consueta, etiam in medio cor-
dis dissecto, os tribus articulis constans, ca-
vumque & areuosa quadam materia reple-
tum inveni. *Felix Platerus observation. lib. 3.*
pag. 636.

Fœmina quædam cum imprægnationis suspi-
cione intumesceret, spe delusa in hydropem
incidit, quo etiam juvenula adhuc labora-
vit, variis interea symptomatis exagitata, post
triennii decubitus vitam finivit.

Suscepta sectione, apparuerunt sequentia
notatu digna. 1. Exhausta colluvie aquarum,
denudata fuere intestina & viscera infimi ven-
tris omnia, exceptis renibus testibusque, se-
vacco adipe, steatomatis instar incrustata,
ut visum effugerent: 2. Ex adipis crassitie in-
testinorum cavitates, angustius in morem
coarctatæ erant. 3. Stomachus cataphracta
eadem vestitus se coarctare nequit. 4. He-
par diaphragmati mediante sevo illo arctè
adhærebat: parenchyma exangue, semiputri-
dum, contractum ac subnigrum apparebat.
5. Thorax apertus, omni aqua destitutus erat:
Pulmones vero undique costis ac diaphrag-
mati adnati, & per superficiem externam
grandinibus albis atque sevacis, tanquam
margaritis, confiti, plus tamen hic sangui-
nis quàm in jecore aut liene inventum. 6. Cor
pericardio planè denudatum, quod & semel
Columbo observatum. Dextra auricula, circa
venæ arteriosæ orificium, aneurismatis modo
ultra juglandis magnitudinem erat, dilatata:
Sinister thalamus durior, crassior tumentior-
que sanguinem grumofum, subnigrum ac pau-
cum continebat, secus quàm in dextro, qui
adhuc purpureus erat: frustulum quoque adli-
posum, subluteum, molle ac lentum in duos
ramos, tanquam digitos longiusculos abiens,
inque truncorum cavitatem se insinuans, ipsis
arteriæ venosæ aortæque ostiis arctè adhære-
bat, eaque occidendo sanguinis affluxum vel
omnino impediverat vel plurimum retardave-
rat, hinc 7. Arteriæ grumefactæ cumque pau-
cissimum sanguinem continebant. 8. Venæ sur-
co pleniores, præcipuè vena arteriosa & arte-
riogenosa: venæ etiam cordis coronariæ ac su-
perficariæ sanguine adhuc turgebant. *Tr. Bar-
tholinum cent. 4. hisser. 20.*

Nepos Georgii Illustrissim. Hassiæ Principis
hydropem anno 1655. vix annum natus deces-
sit. In examine viscerum Cl. Horstius se-
quentia notavit. 1. Cutis circa regionem ven-
triculi, umbilici & inguinum, maculis atro-
purpureis, instar ecchymomatium pictæ erat.
Ex abdomine, per sectionem umbilici leniter
factam, humores serosi, biliosi, Curescentes
& foetidi, instar aquæ per canaliculum duæ
ad libras Medic. xx. profiliebant: Quibus
subductis, & aperto abdomine, omentum pe-
nitens putrefactum notabatur: Intestina cum
ventriculo aliquo modo inflata: Pancreas ve-
ro ita consumptum, ut ejus nullum fere ve-
stigium animadvertere liceret: Venæ me-
saraicæ glutinosa materia referetæ. Lien mon-
stroius tribus appendicibus instructus, lini-
stroque reni arctissime annatus, ut sine se-
ctione digitis avelli non posset: Renes ipsi
satis grandes: Hepar sanguineo colore corus-
cabat: Pericardium ejusdem coloris & tor-
toris aqua distentum erat, cui cor innatabat;
ipsum cor plane exsuccum & ne guttulum qui-
dem sanguinis intra se continebat, quod in
aliis etiam visceribus observabatur: nunquam

enim sanguis notari poterat, etiam in venæ cavæ & arteriæ magnæ incisione, sed tantum aqua loturæ carniū non absimilis: Pulmones flaccidi & ex una parte purulenti. *Bartholinus cent. 3. observ. 81.*

Illustriss. Princeps Fridericus Tertius, Elector Palatinus ad Rhenum, quamvis obeso admodum corpore, vergenteque esset ætate, putata sexagenario major, rarissime tamen agrotabat, præterquam bis aut ter in anno ex catarrho tenui ad pectus fluente, & orthopnoeam cum suffocationis periculo, ad breve tempus generante, quod post pauculos dies cessabat: Nonnunquam & cordis palpiratione vexabatur, rarius tamen, & quum contemnebat, utpote vetus vitium nec adeo molestum: Tandem 3. Octobris 1576. à venatione reverfus domum, asthma suo corripiebatur, & hæmorrhoidum fluxu, ichore quodam instar loturæ carnis recens maciata succedente: 8. ejusdem, utrumque crus ab œdemate invadebatur, tenso & subduro, quod ad femora ascendebat: accedebat, & tumor planus asseris instar, durus in imo ventre, inter umbilicum & pubem, cum pulsu inæquali, inordinato & intermittente, tumescebat sensim totum abdomen: 11. die ex male feriatorum quorundam consilio, acidulam Birckfeldianam, ut hydropem pelleret, Princeps senex, autumnū jam adulto, tempestate frigida, morboque rigido gravatus aquæ frigidæ minime assuetus, sed vinis generosissimis, moderato tamen semper, nunquam ad ebrietatem utens: acidulam, inquam, & quidem in otio, domi quietus, modiceque tantum cum largissime illam adjunctoque exercitio, quo citius in venas & per corpus distribuatur, perque urinas & sudores evacuetur, ingurgitari moris & necesse sit) bibere occæpit, & ad 20. usque mensis diem continuabat: Quam cum nec sudores, nec urinas, nec alvum ciere videret, puta propter dosim nimis modicam, & quidem in otio cubiculari, idcirco à 20. per dies aliquot, assatim largiterque illam hauriebat, persuasus ab illis aquæ potoribus hac via rem feliciter successuram, adeoque erysipelati profuturam, quod cruri dextro 20. mensis acciderat ac exulcerari cœperat, verum longe aliter accidit: Nam 24. die ab hora 2. pomeridiana ad 5. vespertinam, Principem frigus horridum occupabat, calore febrili subsequente, qui in sudorem noctu solvebatur, cum summa virium prostratione: cum qua febris postridie pedis crurisque erysipelas vehementer accrevit in noctem, totoque 25. die Sopore detinebatur: 26. Continuabat in Electore Sopor & somnolentia, ut eodem illo vesperi, paulo ante 4. horam, ex hac vita placidissime, dormienti similis, sed tamen ad interrogata annuens, decederet, ætatis 61. Notandum quod per totum hunc annum dum filius ejus Dux Joh. Casimirus in Gallia belligeraretur, per varios de rebus Gallicis rumores; Paternus animus infinitis curis; molestiis & anxietatibus excruciatu fuerit.

Postridie obitus, dissecto ad exenterationem cadavere, abdominis cavitas aqua plena; Intestina flatu turgida apparent: Interior ventriculi tunica, circa stomachum, versus dorsum

subnigricans. Hepar, Lien, Renes, nil mali habebant: In thorace, omnes pulmonum lobuli, intus atque extra, nigricabant, sanguine quoque nigro turgebant, substantia visceris æquabili, dextro tamen lobo pleuræ adnato: cor in utroque suo sinu, substantiam quandam continebat, oblongam, teretem, mollem, ex albo flavescens, lentam, medullæ offum calefactæ persimilem, sed appendicibus aliquot præditam: in dextro quidem longam digitos septem, in sinistro tamen sinu minorem multo, crassitie digitali: Substantiam hanc talibus locis contentam, verosimile est inæqualium, inordinatorum, intermittentium pulsum, fortassis etiam palpitationis cordis, qua sæpe laborabat, sicut in mercatore illo de quo alibi dictum, causam fuisse: Urinæ per totum morbi decursum crescebant, crassiusculæ quoque, attramen perspicuæ erant: Admiratione dignum est vultum exanimati hujus corporis, quod insepultum totos dies 16. servabatur; non flaccidum, non pallidum aut luridum, quales mortuorum facies esse solent, sed plenum atque rosenū fuisse & permanisse, qualis decumbenti & morienti fuerat. *Smetium miscell. lib. 10. pag. 476.*

Magister Philibertus Micaud Catapultarius, annos 35. circa finem Julii anni 1641. dum Calibone rediret siti inexplebili, itinere longo & æstu magno fatigatus, lacum inveniens totum corpus demerit in ipso. hausto Germanico & sitim, & æstum, & itineris molestias per aliquod tempus tantum sedavit, ab hausta aqua stagnantis immoderato iterum siti primaria pressus, hospitio receptus meri libras tres iterum hausit, & paulo post viam pergens in altero hospitio totidem miori sumplit: Domum reversus febre corripitur eaque continua, siti primaria comitata: Dolor lateris sinistri sub mamma urget, triduum perseverans: Cubiti sinistri vena basilica tunditur ad 3. viii. à celebrata phlebotomia tumor totius ventris & inflatio apparuit: febris in pulsu non agnoscebatur, urinæ pro morbi decursu rubræ & igneæ apparuerunt: Tunc temporis tantum accitus ad agrum ut rebus consulerem, & ipsi medicinam facerem, utrumque hypochondrium durum & tensum deprehendi, sed dextrum potissimum: per oculum remedia sumenda morbo contraria alternis tantum diebus, bene se habuit, ita ut ipsi vale non ultimum dixerim: nam genio indulgens & mero, iterum in hydropem incidit, eumque ascitem, pro quo curando vocatus fuit nebulo quidam pharmacopœus imperitus & ignarus, nomine Royes, qui sermonibus sumivendulis pristinam sanitatem promisit: Imaginatus specificum remedium, agrum tortis sudorificis, existimans è filice sudorem prolificere, hæticus enim erat, umbilico tenuis: Iterum autus ut agri malis rebus consulerem, & errores; gravissimos nebulonis corrigerem, deploratum hominem inveni, venter enim in immensum excreverat; serotum aqua plenum, crura & tibiæ tumore œdematoso tentabantur, sitis non exigua, lingua nigricans & aspera cernebatur, utrumque viscus palpari non poterat: appetitus eduliorum omnium prævus, meri tantum avidus: His autem examinatis, & in consi-

lium vocatis duobus aliis Medicis, & Chirurgo familiari Jacobo Pilerino, artis perito; denuntiato agro, uxori & amicis prognostico, anceps & extremum propositum fuit remedium, paracentesis scilicet, quam quidem in umbilico faciendam censui, propter vitiatum utrumque viscus: quæ quidem me præsentem & præsentem, cito, tuto, & jucunde facta est, circa 9. matutinam: primo quoque impetu hausimus aquas ad uncias 35. quæ non limpidæ erant, sed naturam aquæ primo haultæ stagnantis redolebant: Nonnihil levaminis æger persensit: Iterum sub vespere tantundem aquæ hausimus ejusdem furfuris & farinæ, & sic ad septimum usque bis in die aquas evacuavimus; Venter senim detumescerebat, noctes non erant juges nec insomnes, spes salutis non exigua affugebat: Tibiarum, crurum & scroti tumor & aquæ evanuerunt; nox ad septimum gravis: circa finem septimi, interiit: Suppuratione facta intra sex dies, bis scilicet in die, hausimus 168. uncias aquæ, naturam primæ haultæ redolentis.

Aperto cadavere venter medius satis laudabilis, tum in temperie, tum in situ, tum in conformatione apparuit: Hepar in imo ventre ita induratum erat, ut ligni naturam imitaretur: In liene nonnihil immutatum apparebat: Syderatio omnia occupabat intestina: nihil novi in reibus: In capacitatem ventris inferioris tantum aquæ repertum est quantum xviii. cyathi mediocres continerent: Hoc notatu dignum, vii. ab operatione die, 7. Luna die, 7. mensis die interiit, ætatis 35. Maficoni degebat: *Observatio Dom. Pellet Medici Maficonensis.*

Helluo qui quotidie inter potationes & comestiones vitam degebat, hydropicus perit, mirandum dictu, hepar in tantam molem excreverat ut universam fere diaphragmatis cavitatem replet, tam in dextra quam sinistra parte, totus durus & in magnitudine monstruosus. *Dom. Panarolus Pætec. 4. Observ. 24.*

Vir Nobiliss. per triennium circiter ictero laborans, quotidianis alvi suppressionibus, bile stimulantem per habitum corporis dispersa, vexatus, ætatis ann. 26. medicum implorat opem: Quibusdam remediis per menstruum spatium usurpatis, affectus ictericus antiquum obtinebat, qua de causa naturæ negotium aliquandiu fuit commissum; donec autumnali tempore peregrinationis contracta, quam suspicionem augebant tubercula, verrucarum instar, in genibus, in extremitate ulnarum, & circa regionem ossis sacri in dorso copiose germinantia; quorum color ex albo flavescens, superficies lævis & consistentia dura percipiebatur: Cum autem ob induratum jecur, quod tactus confirmabat, non tantum tenuis, (quam vesica biliaria separat,) sed etiam crassa bilis, quæ alias immediate per porum biliarium ad intestinum duodenum ablegatur, in sanguine remaneret, idque tanto temporis spatio, protinus statui tuberculorum istorum materiam esse bilem crassiorem, cum sanguine tenaciori, quem partes tendinosæ pro nutrimento trahunt, conjunctam; Hinc de ligni decocto cogitare cœpinus, utpote cujus beneficio mesenterii & jecoris contumaces obstructions, incidendo, attenuando, deter-

gendo & evacuando, procedente tempore corrigantur, non sine viscerum corroboracione, quam adstringens, amica qualitas, in cortice plurimum abundans, præstat: Uiu decocti, remittentibus hypochondriorum doloribus, color ictericus etiam eo usque discussus fuit, ut extuberantia circa genua & alias partes emollirentur, & plurimum minuerentur: ita ut spes restitutionis affulgeret: Sed circa finem Novembris rescribit æger de novo colorem ictericum totum corpus invasisse, qui balnei sudoriferi usu magis auctus est, invadente simul calore p. n. astigente, protinus statuimus non à reliquiis in habitu corporis remanentibus, sed ex nova bilis effusione recidivam vehementem adesse, præsertim cum insuper etiam certiores fieremus ægrum genio per septimanas aliquot indulsisse: quocirca ad intemperiem calidam alterandam nos convertimus: At quanquam usurpatis remediis calor & sitis ad martium usque sequentem perseverarent: forte quod sanguis penitus à bile vicissim copiose genita, non per vias ordinarias secreta, tervens fieret, unde circa 1. Martii vehemens hæmorrhagia urinarum patientemprehendit, sanguine copiose, maximam partem bilioso, per intervalla non admodum magna usque in tertium diem profluente: Cum autem partim acrimonia sanguinis, partim retentricis simbecillitate symptoma hoc fieret, hoc emisi prognosticum, vel viribus resolutis ægrum brevi periturum, vel hydropem subsequuturum: Revera parum vel nihil remediis adjuvantibus, hydrops successit, pedetentim ichoribus biliolis, in cavitatem ventris intimi collectis: Malumque radicarum in mesenterio & vicinis partibus antiquum obtinebat, ita ut nec enemata, nec fortia purgantia quicquam educerent, nisi tantum ea quæ circa primas vias per congestionem quotidie ex prima concoctione redundabant: hinc non mirum quod diuretica etiam efficacia nihil quicquam efficerent, interclusis scilicet viis intermediis: Hinc semper omnia in pejus vergebant, non tantum abdomine, sed ipso quoque scroto pedibusque plurimum intumescens: Scroti tamen apertionem suavisimus, etiam restitutionem in integrum, ob viscerum corruptelam, impossibilem futuram crederemus: Ea igitur parte inferiore, in dextro latere, per scalpellum instituta, subsequutus est fluxus aquæ, instar loturæ carnis, ad mensuras duas: hinc flatus ingentes, dolor tensivus immanis & alia accidentia mox remittebant, ut æger orci faucibus ereptus sibi videretur: Quanquam vero ventris tumor hydropicus non remitteret, nihilominus vires aliquo modo vicissim colligebantur; appetitus ad cibum constans permanebat, cibos varii generis, laudabiles, copiose æger ingerebat, necnon serum lactis caprini ad satietatem bibebat, & hoc modo laborans per Julium, Augustum, Septembrem, Octobrem, Novembrem & maximam partem Decembris vivebat, donec tandem sub finem anni 1636. subito vitam cum morte permutaret.

Eius aperto abdomine, serosi humoris biliiosi mensura Virtembergicæ decem extraxit fuerunt ubi postea jecur scirrhosum & induratum in conspectum venit, necnon exsiccum, instar

℥. Ammoniac. opopanax. rad. ellebor. nigr. saxifrag. aristol. rotund. & longo, colocynthid. an. q. s. f. pessar. medii digiti longitudine, terantur omnia, præter ammoniacum, quod cum aq. artemis. dissolvatur, cum quo aggregentur cætera, ex quibus postea cum succo ruta, vel decocto colocynthid. fiat Pessar. cum siso, somni tempore incipiendum in utero. Cum potionem hanc bibere recusasset, post biduum denuo vocatus fui, & inveni ventrem rursus insigniter intumuisse, & fortum putrescere, indeque oriri gangrenam, quæ totum abdomen cum insigni ardore infestabat, unde iratus quod consilio parere nolisset, nihil agere volui, cum tamen summo opere rogaret, lac virginis præscripsi 23. August. cum fortis per integrum diem in otio uteri constitutus esset, nequaquam tamen in lucem prodire posset, illaque vehementissimis doloribus afficeretur, qui tamen statim recedebant, exhibui præscriptam potionem, à cuius usu intra mediam horam fortum exiguum peperit, Paulo post correpta sunt insignibus torminibus matricis, cum motu ejusdem ad superiora, adeo ut exitimaverit alium adesse fortum, vel aliud quid p. n. Eandem ergo potionem recepit cum pessario, quod tamen licet sæpius fuerit injectum in matrice permanere voluit, sed semper exiit: Ab illa hora non amplius consultus: Illa vero cum semper deterius haberet, nec quicquam solidi per plures dies, præter brodia, pruna viridia, lac & alia quibus delectabatur, admisisset, dissipato vitali robore, 27. August. sub noctem obiit, cum ultra septem septimanas hydrope laborasset.

Sequenti mane per tonsorem aperiri curavi, uba primum ex abdomine affluxit copia maxima aquæ flavæ, foetidissimæ ultra decem mensuras: Deinde prodierunt partes omenti putrefactæ & sanioles, foetidissimæ: Musculi omnes abdominis erant absumpti una cum peritonæo: Intestina fuerunt valde inflammata: Ventriculus, postquam apertus fuit, præter aquam foetidam nihil in se continuit, ejus interna tunica erat splacelata & nigerrima, unde factum est ut mortificato sensu ventriculi prorsus nihil comedere potuerit: jecur vero erat admodum durum & papulis refertum, variolis non absimilibus, & pustulis quas Hippocrat. *σκληρά* vocat: Tale erat per totam ejus substantiam: Vesicula fellis bilem vitellinam, crassam & foetidam continebat: Lien erat admodum conglobatus & crassus: Uterus nonnihil contractus & pomum aurantium vix superabat, sereque urinale referebat per omnia, in quo Medici urinas dijudicare solent: in quo nihil aliud p. n. invenimus quam sanguinem nigrum, crassum & conglobatum: Pulmones erant paulo nigriores, nec admodum male affecti. Cor vero non erat male constitutum, expers omnis pinguedinis in cujus ventriculo sanguinem quoque crassiorem invenimus: ob cujus robur factum esse puto quod tamdiu vitam producere potuerit: Moribunda usque ad extremum vitæ spiritum satis bene omnia percepit quæ dicebantur, etiam ablata loquela, ita ut nutibus signa daret se omnia probe animadvertere. *Wolfgangus Gabelschoven cent. 3. curat. 36.*

Mulier Alcmariana ex hydrope decumbebat. Sed hæc ipsa gravida simul, postquam peperisset, paucis deinde diebus a partu mortua est, ventre æque distentæ permanentes: Hinc suborta opinio eorum qui artis Medicæ gnari non sunt, arborem in corpore adhuc permansisse: Alii vero ut & obitrix, secundum partum adhuc in corpore subesse constanter pronuntiabant: Alii vero mulierculæ molam esse suspicabantur aderat & sacrificulus Empiricus qui vesiculas hepatis adhaerere somniabat, ex quibus aqua in ventrem destillabat. Ego vero cum sustinerem neque secundum partum esse, neque molam, sed ventrem distentum esse hydrope, & cum precibus quibusdam divitis matronæ Vir eo perductus est, ut in uxore mortua fieret incisio, quam cum admisisset, effluxit è ventre tanta aquæ copia, ut octo congiis Hollandicos pluresve vas cadaveri suppositum receperit.

Erant autem interna viscere præsertim intestina fere omnia, præter uterum ac renes, corrupta & livida, neque mola reperta: Peritonæum vero undique disruptum erat ex aquæ mole ut arbitror: Omentum plane consumptum, ut ejus partes putridæ & disruptæ cernerentur: Hepar vero in scirrhum erat mutatum, ac licet non quasi lapidosum conspeximus. *Forssk. lib. 2. de incert. uric. vid. p. 199.*

Anno 1595. Virum publice secui in Nosodochio Amsterodamensi: Lien huic adeo intumuerat ac induratus erat, ut tres libras lance libratus penderet: Pulmo ferme centum locis costis ac pleuræ arctissime annexus hærebatur: Hydropicus obierat: fluctuabant namque, ac aquæ immixtabant omnia quæ in abdomine erant, erat aqua flavi coloris, foetoris pessimi. *Pet. Pauli obs. 12.*

Nobilis sumptuose & lautissime vivens, vina generosa bibere solitus, morbis quibusdam intestabatur, nunc colicis nunc nephriticis, nunc arthriticis; unde sæpe graviter affectus, ingruente senectute manus contractas digitosque attrictos reliquo vitæ tempore habuit: quotannis fere ad thermas aliquas profectus, non solum lavans, sed etiam bibens, imprimis acidulas, quas sibi eo nomine conducere credebat, quod ardorem & calorem hepatis, ex vini generosi continuo & tercuorum aromatizatorum quotidiano usu conceptum, non nihil restinguere: Tandem annum ætatis agens septuagesimum cepit illi venter subito quandoque intumescere, cum summa dispnee, quæ tamen postea iterum remiserunt. Anno sequenti 1603. circa finem Aprilis, ætatis superans 71. à convivio domum bene potus, sub noctis medium; Cælo sero, leviter vestitus rheda reverius, pectoris angustia cepit angere, tussisque vehementissima eum invasit, per quam licet copiosa excrearet, nihilo tamen melius habuit: Vocatus illico Medicus, deluxionem à capite suprapectus factam judicant, varia præscripsit, quibus usus ad 7. Maii usque, nihil intermittenste tussi & dyspnæa, vocatus frater meus, communicatis mecum consiliis, sequentia illi administravit remedia; cum crassa & tenacia difficulter expueret, utebatur oxymelite ex hydrom. malvatico, acetofo reddito, miscendo syrup. de liquir. de jujub. & tan-

faciei naturalie persistit : Me absente alii in-
 auxilium vocati Medici, Celeberrimus nimi-
 rum noster Archiater D. J. Jac. Wepsterus &
 Clar. D. Emanuel Hurterus : Ipse tandem 20.
 Septembris adveniens, percipit cum Clariss.
 istis veris Dominam istam viduam per bime-
 stre conquestam fuisse de Abdominis intumel-
 centia, tacto ventre, deprehendimus in regio-
 ne umbilicali corpus scirrhosum, incipiens à
 latere dextro, supra umbilicum, extendens se-
 se ad regionem hypogastricam, palmæ latitu-
 dine & longitudine majus, in profundo si-
 tum, globosum quadantenus, durissimum, in-
 dolens, cum motu aquæ resonantis ex abdo-
 minis impulsione ac concussione corporis se-
 quentis : Aquam pectus quoque opplere osten-
 dit tussis summe ferina, inanis, acerrima diu
 noctuque ipsam fatigans, cum dolore, asthma-
 te, sputo copioso, difficili, cruento, vigiliis,
 inappetentia, febricula, decumbendi impo-
 tentia, imprimis tempore anadolis cibi, quo
 vel decubitus mutare, vel e lecto planè sur-
 gere cogebatur : à vino læditur, deliris agita-
 tur insomniis : Hoc tempore ipsi mentes jam
 per tres septimanas copiose fluxere, antea ve-
 ro ordinati, ac copiosi semper extiterunt :
 Hinc persuasi ediximus corpus prædictum scir-
 rhosum a glandulis potius mesenterii, vel tes-
 ticulis uterinis, quam ipso uteri corpore de-
 pendere : Tussis, febris, vigiliis, asthma, inap-
 petentia, omni ingenio occurrimus ; purgan-
 tia, rebus sic stantibus, vix tuta reputantes
 8. Octobris melius habere videtur, alacrius
 comedit, libarius respirat, incedit rursus, co-
 lor faciei floridior, abdomen imminuitur &c.
 At tuber circa umbilicum & hypogastrium,
 durum adhucdum & magnum, imò majus
 quam pridem persentitur. Ad id dissolven-
 dum, & viscera roboranda varia in usum du-
 cta remedia : 19. Octobris venter denuo intum-
 escit, urina imminuitur : tuber item majus
 & durius videtur esse in testiculo dextro, nec-
 dum dolet. Tussis iterum exasperat ut & asthma,
 alvus est durior, menses singulis ferè 14. die-
 bus redeunt copiosi, aquosi. Sudor frequens
 circa collum & caput. 22. Novembris quoniam
 abdomen & tumor augescunt, ad purgantia
 accessimus, à mitioribus ad fortiora ascen-
 dendo, interpolatim ea exhibendo, per epi-
 crasin potius quam *Hydrargyrum* aquas educere vo-
 lentes, quæ primò proficua, dein molesta,
 tandem noxia animadvertimus. 20. Decem-
 bris sub vespere gravissimo, fuit obruta asth-
 mate, ac si jamjam suffocatura esset : Revel-
 lentibus & thoracicis incidentibus è mortis
 erepra periculo, abdomen monstravit tumi-
 dius, tensus, gravius : Procedente sputo co-
 pioso, ac suborta diarrhoea mitius habuit : Be-
 chica, quibus gummæ ammon. additum conti-
 nuantur cum fructu : Regio lienis & abdo-
 men valde tument ac dolent : Subinde à sum-
 pta vespere conserva rosarum cum theriaca,
 versus diluculum sudavit. A. g. Ammoniacus
 alvus fluidior evasit. Interposuit usum diure-
 ticorum, confortantibus mixtorum : Immen-
 si abdominis dolores leniuntur ab inunctione
 oleis anodynis : Mense Januarii copiosa li-
 cet excernatur urina abdomen tamen du-
 rum, magis tensum & plenum tangitur, cum

dolore in hypochondriis & circa umbilicum :
 Tubera silent, ardor stomachi molestus, cha-
 lybeata communi consilio, cum corrigenti-
 bus ac confortantibus in usum ducta, ad va-
 sa & glandulas obstruatas induratas referan-
 das, emolliendas, quo serum resorbere que-
 ant. 5. Januarii pleuritis notha superveniens
 curam ad se traxit. Dolor demum circa he-
 patis regionem fixior, fomento ex pomis
 tracidis, succo senecionis, & clysteribus eva-
 cuato colo intestino disparuit : Abdomen in-
 tenditur, purgantibus identidem parva dosi
 repetitis, relaxatur ; non admodum immi-
 nuatur : urina pauca, crassa, lixiviosa : repe-
 tita diuretica : conquertur inprimis de dolore
 ardente sub diaphragmate, ex sero acti, ut rebat-
 tur, rodente intestinum colon, eo loci situm : qui
 dolor videbatur limitari tandem funestam, hæ-
 morrhagiam, sicuti sex ante menses accidisse n e-
 mini Celsiss. Principissa de Arf. hort. ; Abro-
 gatis, vel frigide saltem continuatis hy-
 dragogis, omnia in deterius ruerè visa sunt,
 viriola magis urina ac pauciore, amillo vivi-
 do faciei colore : Suasi tandem quorundam
 (nobis de valetudine desperantibus) aliorum
 consilia & remedia experiri voluit : quibus per
 alvum licet & vesicam multum fuerit inanita,
 autum nihilominus abdomen & pedes, haud
 ita pridem naturales, summe intumuerè. Ab-
 jecto appetitu, aucta seti, aridis faucibus, adu-
 lti, lurido labiorum colore, fractis viribus, ad
 extremam reducta maciem 12. Martii obiit.

In cadaveris nocturna ac privata evisceratio-
 ne sequentia comparuere *Hydrargyrum*, oculis
 observata fidelibus, paracenteseos in modum
 pertusis abdominis involucris, protinus men-
 tras plus minus viginti aquæ flavescantis ac lxi-
 violæ eduxit, qua avacuata aperti abdomen, cru-
 cis in formam discissis communibus integumen-
 tis, & festinanti manu ac intentis oculis inqui-
 rens in tuber toties à me atque prædiximus
 Clariss. Viris observatum, inveni tuber magnum,
 obviam quasi mihi proficiens, instar renis fere et-
 formatum, pendens lacca libraturum libras decem
 civiles ortum sumens ex dextro uteri testiculo,
 carnosum extrinsecus, intus pure cruento refer-
 tum, non admodum foetido, forinsecus curè
 crassa obductum, venis respersa copiosissimis,
 cui suberat caro solidiuscula : tuber hoc abdo-
 men versus fuit durius, ac versus intestina mol-
 lius, duobus tribusve locis exesum, unde pus, ac
 parva quâtitate affudit in cavu abdominis tuber
 fuit iberum, nulli parti annexum, excepto testi-
 culo (dextro qui totus fuit extensus, cavus, pure e-
 plerum, adeo vix ut agnosci amplius potuerit)
 tuba Fallopii, & vespertilionis ala ejusdem lateris
 dextri, quæ omnia tuber ingressa, sunt non recto
 sed intorto ductu, ac si tuber in magno vel vio-
 lento corporis motu, circa principium hoc stu-
 dio fuisset in gyrum actum, superflite etiamnum
 illa involutione : Tuber istud magnitudine ca-
 put humanum superavit : viventi nullos excitavit
 dolores, excepto pondere quo fuit molestum,
 imò ne à purgantibus irritatum : Durante morbo
 increvit potius quam decrevit, etiamsi chalybea-
 tis diminuerè decreverimus sæpe. Quando ince-
 perit, & quamdiu creverit tuber nec ipsa ægra
 cessari scivit : Nullas unquam de eo movit quæ-
 telas, vel coram aliis, vel me par 20. annos ejus
 Medi.

formam exuerat Ballonius paradigm. iv.

Inter affectus mulierum non raro occurrunt tumores ventris, qui primis mensibus imprægnationem mentiuntur, & vel molæ, vel flatibus, vel colluviei sanguineæ aut aquosæ in utero contentæ adscribi solent. Materiam autem ventrem distendentem, interdum etiam extra uterum peculiaribus membranis inclusam contineri, sequens facit palam historia. Uxor juvenula, altero post nuptias anno, cœpit variis torqueri doloribus in imo ventre & hypochondriis, qui interdum omnino desisterunt, interdum ad leipothymias usque sævierunt, facies pallore suffundebatur, venter in tumorem surgebat, sed inæqualem, qui quidem ab incunte ætate paulo turgidior fuerat, menses tamen ultio hæbant tempore: Consilio usæ est primum Empiricorum, quorum unus rem totam veneficio adscripsit, cum autem dolores urgerent, nec ineptis illorum juvaretur, etiam me in consilium adhibuit, præter universalia, cum temporis oleum quoddam carminativum ei adhibuimus, ex cuius usu dolores circa matricem adeo intensos, parturientium instar, sensit, ut oblitrix vel molam, vel simile quid in utero a proditum expectaret, sed præter aquæ quædam effluvia nil apparuit, & dolores paulatim omnino remiserunt; quoniam autem interpolitis aliquot diebus & tumor ventris & dolores iterum aucti sunt, vocatus etiam fuit D. Ulianus, qui purgantibus denuo rem aggressus est, dein cataplasmate & infussionibus dolores lenire studuit, nec sine fructu, nam non solum tumor insigniter inde fuit diminutus, sed & dolores ita sublati videbantur, ut in ædibus munia domestica rursus pericere inciperet, infelici tamen omnino, cum enim sub dio frigidiore latio suum tractanti aditaret, subito epileptica concidit, & ea ipsa die obijt.

Cadaver altera die apertum fuit, in quo ventriculus, hepar, lien & intestina naturaliter se habuerunt: Matrix etiam integra sana & loco naturali reperta. Loco vero glandule Mesenterii, vesicæ venulis eisdem implicatæ & rectæ, uti & toti mesenterio hinc inde adnatæ, ultra xx. vesicæ, diversæ magnitudinis, aqua limpidissima turgentes apparuerunt, quarum una omnium maxima (capitis infantis alicujus mole) mox in dissectione conspicendam se præbuit, & totam matricem contexuit, ut Chirurgus hydropem matricis adesse primo intuitu pronuntiavit. Re vero penitus perspecta, uterus subtus latuit. Ab hac maxima, sex adhuc paulo minores pugnum æquabant, reliquæ ova gallinacea & columbina, quæ omnes inter se connexæ, ova gallinacea, partim ad maturitatem perducta, partim adhuc varia magnitudine succrescentia egregiè representabant. Ex quibus apparet nos frustra purgantibus laborasse, cum materia peccans suis membranis vel vesiculis, nullibi perviis, inclusa, medicamentorum vim facies eluserit. Quin ob diuturnam moram, malignitatem in se concipiens, venenatos ad cerebrum vapores emisit, unde epilepsia & mors consequi potuerunt. *G. Horstius lib. 5. obs. 32.*

Filius Calandrin excrevit abdomen, intra biennium, in eam molem ut crederetur finitè laborare aqua intercurrente: Sed sectio cadaveris demum admodum invenit tamen illic nihil

liquoris, verum ingens solummodo steatoma, quod ex mesenterii glandulis exarscens devenerat in eam magnitudinem ut bilanci impostum ponderaret ultra libras xxviii. Jecinore interim, liene ac ventriculo integris ac illæsis: sed pancreas erat pingue ac ponderosum, & alterutrum latus renis suo delititum; cujus vicem cum gereret mesenterium, effusum fuit illic tantum liquoris, ut glandulæ ipsius à redundantem illo sero plus æquo intumescentes, repleverint tandem ventrem universum, sed sine ullis collectæ aquæ notis. *Tulpius lib. 2. cap. 32.*

Cuidam ex plebe pauperculæ, triennio multis doloribus in abdomine vexatæ, hoc anno in molem venter assurrexit, qui distinctas extuberantias seu tumores monstravit: mulieres plures in utero latitare fortis imaginabantur sibi, maxime cum mater motum infantis in utero sentiret. Partui vicinæ exacerbati sunt in abdomine dolores, qui post enixum infantem debilem, paulo post expirantem, non desiere: medium tamen abdominis in se concidit, inæquali remanente ventre, cum latera turgida, & in tumorem sublata extuberarent: A partu lochia nulla, dolor ventris ingens adhuc, tumor minime desiccans, sed ad crescens in dies. Nescio quæ ipsi medicamenta oblata sunt ad molam ejiciendam, at defecit misera tandem, cedente anima doloribus & extincto calore, privato suo humido, tota utpote emaciata: singultibus crebris efflagitavit corporis sui apertionem, ut causa suæ acerbioris in apicem veniret latens.

Mox geritur, secatur cadaveris abdomen, nec difficile erat, cum musculorum caro contabuerit exsiccata: aperta itaque cute cum peritoneo quod lacerum & erolum ab ichore bilioso apparuit, serum effluxit bile tinctum, & dux moles globolæ in conspectum veniebat, quæ peculiariter investiebantur tunica, adherentes mesenterio, à quo mutuarunt cingentem membranam, quæ subdura erat, & hinc inde pustulosæ vesicis luxuriabat, plenis sero: Dissectis his molibus, serum effluxit primo multum, quo distentæ fuerant duplices membranæ & intaræ, ut in tantas moles assurgerent: deinde glandulæ apparebant multo ac copioso cum adipe, materia steatomatis non abimilis: Cavitates quas in ventre hæc moles non replevere, eas serum occupavit: Madebant eo omnia quasi in ventre contenta inferiori, quæ etiam ita corruptæ, ut fortior diligentiorum inhiberet indagationem: Exiguus uterus hepar flaccidum, luridum, ejus cystis turgida & infarcta crassiore felle, lien exiguus. Pulmones sicci & lituris gangranosis maculati. Sanguis paucus & nonnulli in magnis circa cor valis ater prodit: Cadaver totum exanguie videbatur, & caro musculorum omnium consumpta, contabuit enim misera, & cutis ossa & nervosas partes tegebat. Glandularum extuberanties facile erat sectione à mesenterio renovere, ideoque eas separatim secimus. *Hæschlerus Casu 6. centur. 6.*

Anno 1666. Mercator Gedanensis à multis annis ingluvie deditus, variisque modis in vitium ratione peccans, incidit in varios corporis affectus, qui quidem curati, nunquam tamen in totum sublati sunt, quia æger præceptis medicis parum obediens fuerat, tandem totius inferioris ventris æqualen t. n. o. m. percipiens, hic

que sensim languore corporis universali, afflicta, de dolore in regione lumbali gravativo, eoque sinistri hypochondrii obtuso, ac vinculo sub ventriculo transverso conquiescit. Vocatus, deprehendi ex signis pertinaces latere in corpore obstructions, quare omnem movi lapidem ut ipsi pristinam restituerem sanitatem. Cum alvus subinde adstrictior esset, exhibui blandè evacuantia, quibus tantum profecimus ut videretur sibi æger aliquoties ab illorum usu fere restitutus, quoniam scybala excernebat grandia summeque dura, adeo ut in excretionem ad pelvim sonum ederent, lapidum instar ab alto delapsorum. Quod cum forte indicasset, jussi ut adstantes excrementa mihi monstrarent, in quibus aliquot frustula caecorum induratorum, sicut illa, uti ipse æger fassus est, ante aliquot septimanas ruri tum degens pro jentaculo, pravo suo more deglutierat, invenimus: Talia quamvis sæpius cum successu educerentur, tamen longitudine morbi contabuit & naturæ satisfecit.

Aperto cadavere, observavi omnes glandulas infimi ventris, tam internas mesenterii quam externas abdominis induratas, imprimis illas copiosissime regioni lumbari incumbentes, unde dolorem lumborum deduxi gravativum: Lustatis intestinis reperi, cellulas intestini coli per transversum corporis sub ventriculo siti, scybalis frustisque caecorum ingestorum fere omnes infarctas: hinc excretiones præmemoratas ortum suum deduxisse indicavi: reliqua intestina erant omnino vacua: Remotis his examinavi hepatis, quod miratu dignum, omnibus sui partibus inventanum, etiam si æger dum viveret crapula nimium indulgisset: ultimo perquisivi lienem, & dum illum circumcirca, vellem blandè liberare, animadverti duritiem haud levem: quare novitate rei percussus, totum lienem excidi, eumque dimidia fere sui parte ossæ cartilagine incrustatum vidi, adeo dura, ut acutissimo quamvis cultro vix discindi, sineque læsione parenchymatis separari potuerit: Exinde haud difficulter dolor sinistri hypochondrii obtusus patere potuit. *Christiano & Adriaeno in Miscell. curiosis ann. 1673. observ. 159.*

Nob. Andreas Elken ann. 46. cum usque extra civitatem, utut opulentus, coelebs, admodum parce & frugaliter vivens, ex vicio dietæ primum ventriculi dolorem cum siti, dein hypochondriorum intumescentiâ percepit, quæ tandem hydrops ascites sequebatur. Hic anno 1660. in autumno Thorunium venit, morbumque summi mihi exposuit, cujus signa erant urina tincta & rubicunda, sitis magna, appetitus cibi nullus, constipatio alvina, urinx retentio frequens, noctes insonnes, tumor totius infimi ventris & hypochondriorum intensus, atrophia artuum superiorum & inferiorum, viriumque maxima debilitas. Instituta fuerunt purgationes per episcrasin, adhibita tam externa quam interna alterantia & corroborantia, sed sine ullo fructu. Tum anno 1661. adjuncto mihi D. D. Meisnero, instituta est paracentesis sub ipso umbilico versus partem sinistram, natura ipsa per vesiculam umbilicalem viam commonstrante, per Antonium Stettlander Chirurgum. Talem paracentesin Gal. 14. meth. 12. & comm. ad aphor. 27. 8. hydropicis & herniosis adhiberi suadet.

Paulus autem non omnibus aquæ intercutis generibus, sed ascitæ tantum convenire scripsit, ejusque tres in universum differentias statuit: unam sectione facta directè sub umbilico, tribus digitis interpositis, si ab intestinis origo fuerit: Aliam etiam facta à sinisteriore umbilici parte, si primario jecoris affectu malum seratur acceptum. Terciam autem à dextra ejusdem parte, si à liene vitium originem duxerit, scalpello ejusmodi sectio fieri debet, aut aculeo intra peritonæum adacto, deinde in foramen in mella zona fistula, per eam humor sensim effundendus, pro cuiusque virum ratione, cavendo ubique subitam cumulatamque vacuationem: Hæc Paulus: Idem nos quoque hæc in parte observavimus, facta incisione, impositoque canaliculo argenteo, eduximus aquam in abdomine stagnantem pedetentim, a semilibra incipiendo, tum ad libram devenimus: quotidie bis, aliquando etiam ter, pro renata, ad multarum usque librarum quantitatem: Aqua educta fuit citrini coloris, odorisque foetidi, videbaturque patiens aliquantum sibi vegetior: Verum omnia in pristino statum permanebant, indicantia scilicet dyscrasiam & corruptionem viscerum infimi ventris, quam anatomie corporis extincti postea aperuit. Quare vires indies debiliores, ægrotum ut animæ curam adhiberet admonuerunt, quæ cum peracta, ille ultimis Januarii diebus, placide animam salvatori suo reddidit. Instituta autem paracentesis altera à circumcissione Christi Salvatoris die.

A morte cadavere aperto, nullum viscus sanum & integrum repertum est. Peritonæum, mesenterium, pancreas, singula consumpta, intestina livida, hepatis & lienis aliquot frustula tantum veluti lacerata dependebant. Renes vix conspicui, uno verbo, & ante mortem pie defunctus vivum cadaver erat, apud quem post mortem adstantes præfectore maximo non diu subsistere potuerunt. *Simon Schulzium in miscell. curiosis ann. 1674. 1675. § 76. p. 229.*

Juvenis vir Religiosæ familiæ incidit in hydropem Ascitem, à medicaltro pluribus etiam agitata mediis, ex urbe in qua degebat, cum remotior locus foret, hucque illius familiæ ordo vigeret, huc deportatur, quem ubi accessi, malum incurabile superioribus detexi, partibus internis jam sideratis: Prælo nihilominus adfuit qui vultu supercilioso & fastu, velut fere si plusquam ampullosus ausus fuerit curam perbreve polliceri, & promissis vere intra paucos dies stetit. Domum forte ingredior, febris tertiana laborantem invitus, ad hunc hydropicum à sanitatis præfecto deducor, cui de necessariis moribundo nulla data mora providendum urgeo.

Ipse ut fatis mox cessit, accitum ego operationi peritum lithotomum ad paracentesin celebrandam, ut aquis daretur exitus, applico. Inde ulterius progredior, ut prognostici veritas innotesceret, pateretque ignari medicaltri iudicium: Omentum telæ ad instar tenuis se offerebat: Intestina livida primo tactui consumpta diffuebant. Glandulæ mesenterii omnes purulentæ. In parenchymate hepatis 18. apostemata viscebantur, sua cysti inclusæ; pulmonum bronchia membrana livida spissa referebat, Renes putridi: Lien induratus scatebat, crassa gypsi ad instar

intat materia, nec ultra castaneæ magnitudinem restabat intacta: Unicum cordis parenchyma sanum erat: Ex quibus patet impostoris temeritas, & in iudicando ignorantia, in una admirer vires in juvene, partibus adeo corruptis tandem in vivis persistisse. *Alardus Hermannus Cnemenus in Miscell. curiosis anni 1677. obs. 186.*

Mulieris hydropicæ abdomen in tantum excrevit, ut ulnæ nostratis cum quadrante altitudinem æquavit; maxime ad sinistrum latus vergente tumore, ex aperto post mortem abdomine sanguineum serum fortens mediam connam implevit, quam cadaveri subjeceramus, quo exhausto detumuit; omentum & peritonæum putridum & frustillatim exercebantur: Intestina omnia ad dextrum hypochondrium erant detrusa, ut initio intestinis caruisse apparuerit, sinistrum vero aqua ubertim repletum: Hepar à nativa bonitate nihil defectit, at Lien minor. Chirurgus paracentesin instituerat, sed abdominis musculos non pertransiit vulnus: *Bartholi. cent. 1. observ. 11.*

Petrus Kickup quadragenarius ex febre tertiana, eaque diuturna, curatus, in Ascitem incidit: Ego advocatus, ventrem in monstruosam fere magnitudinem elevatum invenio: umbilicus ad ovi anserini magnitudinem aqua plenus propendebat, quem ut phlebotomo aperirem obnixè rogabat: Quum vero in tam gravi morbo tenere & absque consilio nihil tentare vellem, atque de Medico accersendo, ut de umbilici incisione consultarem, cogitarem, umbilicus suus sponte ruptus est: inde per triunestre magna copia serosi humoris effluxit: Is autem humor ut paulatim fluere operam dedi, impositi ipsi umbilico lintheamine reduplicato & fasciâ involuto, ne ex intempestiva evacuatione aquæ, vires ægri, jam ob morbi vehementiam invalidæ, labefactarentur & plane prosternerentur: Sic Divino favore venter paulatim subsedit, ut tandem plenissime convalesceret, & per annos aliquot sanus vixit: Demum vero Pleuresi correptus, ac nullis adhibitis remediis, obiit. Post mortem cum cadaver ipsius aperirem, inveni venam umbilicalem, quæ in adultis in ligamentum solebat coalescere, adeo dilatatam ut facillimè pennam auferis per eam immissem. *Fab. Hildanus cent. 1. Obs. 47.*

Anno 1658. dissecuimus in nostro nosocomio juvenulam 14. annorum, quæ per 16. annos Ascite detenta, indeque tandem mortua fuerat, in qua nullius visceris manifestum vitium invenire potuimus, sola aliqua vascula lymphatica disrupta mali diuturni causa fuisse videbantur: crudeliter enim à parentibus in pueritia fuerat tractata, & ictibus pedum manuumque sæpissime excepta à quibus proculdubio aliqua vasa lymphatica dudum disrupta fuerant: Hanc suspicionem humores ipsi in abdomine collecti non parum confirmabant, nam in cadavere jam refrigerato aliquantum coagulati, apparebant, sicut lymphæ per frigus coagulari solet: & si ad tantam gelatinæ consistentiam non pervenissem, quantam consequitur lymphæ ex ipsis vasculis lymphaticis in cochleari collecta: Vitam autem per tot annos produxerat misella, propter, viscerum integritatem, atque etiam quia per juvenilem corporis calorem quotidie multum serosæ humiditatis in abdominis cavitatem sensim influentis dissipatum fuit. *De Diemer-*

broeck Anat. lib. 1. cap. 11.

Decembr. 30. anni 1675. offerebatur nobis cadaver mulieris 14. annorum; in aperto corpore D. Gerardus de Pericin, Medicus, & D. Petrus Adriani Chirurgus, nobiscum observarunt sequentia, i. occurrebat venter imus insigniter distensus, uno loco mollis, altero durus atque renitens, quamprimum integumentis exterius lenta manu leviter dissectis, ad ejus interiora pervenire concedebatur, aquæ sanguinolentæ magna effluebat quantitas, quam non tantum ventris cavitates replere inveniebamus, sed & ad externorum extensionem plurimum contulisse: lenta satis erat, illa imprimis quæ circa lumbos & in pelvi detinebatur, foetoris non levis particeps: Hac vasculo spongisque ablata, reclinatis integumentis dictis, ad considerandum exactius examen profundius julto dissectis, tumor enormis in hypogastrio, atque umbilicalis regionis parte superiore hærens, animum, oculos, imò manus ipsas sui ad considerationem commovebat: variæ hic figuræ duritieque, quandiu beneficio omenti (cujus vix reliquæ aderant) diversæ partes sibi hic jungebantur, hoc enim leviter locis variis soluto, ventriculi magnam partem, intestini aliquam portionem, ipsamque excrecentiam præternaturalem ad constructionem ejus concurrere observabatur: ventriculus ab assumptis satis turgidus, similiter ac intestinum chylo repletum: licet mollitie singulari, materiaque contenta, quoties premeretur, mobilitate, non parum se manifestarent: quale tamen intestinum hoc haberi debeat dubii valde hærebamus, eo quod an & ubi ventriculus ei jungeretur notare hand liceret; duodenum autem hic pronuntiare, sublimis valde situs, atque omnino præternaturalis contra varietur: quod enim julto naturæ ordine intestinis aliis suo modo succumbit, lumborum vertebrae oblique accedens, adeoque in occulto latens, hic se primum oculis nostris manibusque offerebat; Anteceps hæc res certior evasit, postquam per foramen in intestino dicto, circa renem dextrum factum immisus status, & sursum ad ventriculum, & oblique deorsum, vel transverso potius ductu ad intestina reliqua excurrens, & continuationem ventriculi cum intestino excrecentiæ dictæ in hærente, imò hujus cum intestinis aliis, & quale hoc intestinum haberi debeat, patefaceret: excrecentia ipsa, quæ præcipuam molis hujus partem constituebat, insignis adeo magnitudinis erat, ut etiam extra corpus librarum quinque pondus exhiberet: firmiter hæc undique vicinis partibus cohærebat, hepatis imprimis, ventriculo, intestino duodeno. ipsique continuato jejuno, ex latere dextro ad sinistrum se extendente, imò & lateralibus abdominis partibus mollibus, quæ inania dici solent, nec non ipsi colo intestino transverso ductu eidem accumbenti, ut nonnisi violentia, cultri maxime ope, separari debuerint: omnium autem arctissima unio eo loco observabatur, ubi mesenterii principium constitui solet circa lumborum vertebrae superiores hac parte, quasi collo dissecta, separatis connexis aliis modo indicatis, massam totam cum annexo pancreate è corpore auferre licebat: partibus dictis quoad adhuc unita massa hæc, curiosum valde qualiter vesica biliaria se exoneraret, notare, quandoqui-

dem ea in dies augmentum sumens, antrosum verius umbilicum se extendens & intestinum duodenum, & cum eo ductum biliarium e loco suo naturali deturbaverat: non tantum intestinum, sed & ductum in maiorem longitudinem extendi necessarium omnino fuit, observabamque adeoque flatu in vesicæ fundum, postquam bilis per foramen factum expressa, immisso, biliarium hunc porum miræ longitudinis, imo & capacitatis: Extendebat se anfractuoso quodammodo ductu ab hepatis parte concava ad sinistram massæ partem, ubi pancreas massæ ipsi uniebatur extremo eo quod in statu naturali intestino unitum, ubique firmo nexu eidem cohzrens, hinc oblique ad intestinum jejunum quod massæ parti anteriori, at simul inferiori connexum diximus. properare videbatur, quod licet oculis nostris se haud subiceret, ob dissectum ductum eo loco ubi pancreas massæ iungebatur, maxima tamen ea copia bilis, quam in aperto intestini jejuni principio massæ connexo reperiebamus, imo & ductus ipsius, eo loco ubi abieciis, capacitas ea quæ vel digiti minimo apicem exciperet, id demonstrare videbatur: alba scilicet & satis dura, quasi ex plurimis varix figuræ corpusculis concretis composita, sic ut pro steatomate vero, est scirrhus magis, omnibus habita fuerit: Durus licet hic abieciis, pars tamen ejus dextra mollis satis, adipis veram formam ubique fere referens: fere diximus, cum non uno loco puris notæ se proderent; vasa sanguinea haud quidem in eo notabilia, satis tamen sanguinis nuxus, massa ubi dissecabatur, observabilis, ea adesse indicabat.

Abcessui huic similes illi qui in hepate ipso occurrebant, si non mole, saltem substantiæ conditione, haud notabilis hic protuberantia, licet aliqua, parenchyma ipsum in alienam ejusmodi substantiam locis variis degeneratum videbatur: Abcessus se exhibebat simplex, at satis magnus, in parte hepatis dextra, à convexo se extendens ad sinum, duplex in parte sinistra, sic ut unus in gibbo, alter in cavo: Lien in hoc subjecto exiguus admodum; parenchymate bono præditus. tunica vero ejus, ea parte qua spectabat latus, cui etiam arcu cohzrebat insignem crassiciem adsumperat, imo callositatem, sic ut consistentia æque ac colore, arteriæ aortæ truncum in bove referre videretur: Ren dexter bene se habebat, at in sinu sinistri, valde parvi, præter arenularum copiam insignem, occurrebat calculus durus admodum, satis magnus. extremo uno obtuso, ureteris pelvi: quatuor aliis acuminatis, totidem fere tubulis infixus: Testiculus uterque exiguus valde, rubicundus admodum, ac si inflammatione gravi correptus: In vaginæ uterinæ principio, parte ea quæ intestino incumbit, exerescentia aderat, eo loco ubi utero cohzrebat, fibrosa, alias gangrenata, condyloma verum merito habebatur: Jam à 4. annis malè se habuerat mulier hæc, conquesta semper de præcordiorum dolore & summa gravitate, imprimis ab assumpto cibo potuere Gerardus Blasius *obs. medic. 11.*

Urinam vesica perforata in ventris cavitatem profluere aliquando à me annotatum: sed & alvi excrementa vulneratis intestinis eo quoque deferri possunt: Uxor fuit Medici formosa & vi-

vido colore prædita, carnota quoque & satis pinguis; hæc concepit, peperit, sed tæctum nec plene gestatum, nec vitalem: Post partum ventris non modo non subsedit, sed & paulo post auctior factus est, ampliusque quam prius intumuit: Suspicio nata est collectos esse in ventre aquosos humores, tametsi faciei color non mutatus sanitatem viscerum præ se ferret, ac pedes, quod sæpe hydropicis accidit, tumerent, & urina sanorum similes: Exhibita quandoque initio hydragoga, verum ab his nulla aquosi humoris successit purgatio, sed tortiones admodum molestæ. In hac miseria duos annos vixit, ventre interea in tantam molem & altitudinem distento, ut vix partes genitales manu contingeret: mirabantur omnes ventris tantum tumorem facie optimè colorata & nullis morbis notis in urina apparentibus: accessit successu temporis respirandi difficultas, quæ in dies increfcens, ac molestior facta, tandem vitæ imposuit finem.

Dissecto ventre: non aquosus humor, sed sordes nigræ, quales in cloacis, effluerunt, crassæ, foetidæ: quibus frustillatim omentum permixtum, quod solum à tantis sordibus computruerat: Dordium autem tanta fuit quantitas, ut quatuor urnas vel amplius implere potuissent, quarum singulæ 40. libras mensurales continent: Distentio autem ventris tam quoque magna, ut peritonæum, cum amplius distendi non potuerit, aliquot locis à superioribus partibus ad inferiores usque fissum fuerat, & jecur cum liene ac ventriculo, relicta propria sede, cedente septo transverso, intra pectoris spatium ascenderit, pulvisque omne corde sursum collum versum in angustias coactos: quæ viscera integra, nec ulla parte vitiata fuerat: Non licuit in tantis sordibus intestina eximere, & diligentius perquirere, sed dubium non est sordes istas non aliunde quam ex intestinis vulneratis ac laxis profluxisse: nec enim alia via aut modo in hunc locum pervenire potuerunt: *Dodonæus cap. 15. obs. medicin.*

Vidua Nobilis N. ad secundas accessit nuptias, & mox à complexu conjugali, menses, (qui statim temporibus à morte primi mariti, ad alterum usque conjugium copiosè satis fluxerant) ad 16. & plures hebdomadas jam delinisse sentiens, gravidam se firmiter credidit: sed postea novus mensium fluxus, parvus tamen, est exortus, qui sic constitutis temporibus, ut ne dies quidem deficeret, suum observavit circuitum: Dubitantem itaque ægrotam gravidam esse animum? (nam fluentibus mensibus abdomen in dies increverat) foeminarum quarundam assertio, quæ se similia gestationis expertas fuisse tempore affirmabant, in concepta graviditatis opinione detinuit: finitis vero mensibus septem, cum nullum infantis in utero motum perciperet, abdomen tamen in dies accresceret, non gravidam se amplius, sed aut molam in utero portare, aut hydrope se affectam credidit: quare variorum expetiit consilia, qui frustra hydropem expugnare tentavere: Quare se Hæmiam contulit, ubi D. D. Simon Pauli fuit vocatus, & huic post sui adjunctus collega: Nos historia morbi præsentis cognita, & inspecto abdomine, adeo tumidum illud invenimus & inflatum, ut mulieris gemellos gestantis abdomen sua magnitudine non solum æquaret, sed etiam longe superaret: Ideo

Ideo consensimus ut ascitem tympanitidem morbum appellaremus: non solum enim abdomen tumebat, sed & femora atque crura adeo erant inflata, ut ad digitorum levem impressionem relinquerent fovearum vestigia: Ad has igitur morborum species directa fuere remedia, & mitioribus catharticis ultra 20. portæ aquæ puræ, sine ullo Nobil. ægra incommodo brevi fuerunt educæ, exceptis excrementis, quæ serosam sæpe materiam exigua comitabantur quantitate: quæ tamen aquarumeducta copia, non solum non levavit ægram, sed ne abdomen quidem potuit detumescere, in dies majora excipiens incrementa: quam ob causam relictis tum catharticis tum flatibus discurrentibus, urinæ propter paucitatem, cujus horarum 24. spatio vix 5. reddebantur, diuretica variis sub formis præscripsimus, sed sine fructu, majorem enim solito urinæ copiam non excrevit, terreum itaque cum hunc morbum non solum medicamine non mitigari, sed magis abdomen, femora, crura, pedesque magis quotidie tumescere cerneremus, ne quod remedii genus à nobis intermissum videretur, tres Lanceola profundas satis & aliquantum ab invicem distantes scarificationes, supra malleolum pedis dextri administrari curavimus, ex quibus serum magna copia per aliquot effluens hebdomadas, ut tali remedio & femora & crura pedesque detumescerent, non exiguam nobis præbuit salutis spem: Verum gaudium non erat diuturnum, nam ad inferiores partes ex abdomine serum ulterius descendere, inde vulnuscula facta, una cum novo, quod in pedis superficie erat inflictum, fluere sponte delierunt, brevique cicatrice fuere obducta: omnibus hisce evacuationibus abdomen nihil minuebatur, sed quotidie accrescebat: Ideoque internis per os onerare ægram amplius nolimus, sed clysmatum commodiorum usum frequenti, satis bono cum successu continuavimus curam: In absentia postea D. Collegæ, cum continuo à me ægra nova remedia efflagitaret, balneum ipsi siccum ex sabulo marino calido commendavi, ex quo cum maxime levaretur, exque abdomine, lumbis cruribusque calore fabuli, magna seri extraheretur copia, illud tandiu, spe restitutionis, continuavit, donec vires quotidie magis deficientes, ulteriorem ipsi ejus usum denegarent: ab hoc igitur etiam abstinui, atque ægræ duo remedia generosa, Paracentesin abdominis, è regione umbilici, & perforationem paulum sub umbilico proposui, ex quibus perforationem illa se melius laturam putans: illam elegit, quam Chirurgus feliciter expedit; Sed ex intrusa, fere sine dolore in abdomen cannula, quod ne gutta quidem prodiret aquæ mirum nobis est visum, quamvis Chirurgus oris primo suctu, deinde syphone eam extrahere tentaret: quare, re quasi infecta, cannulam iterum extraxit, statimque adeo arte istud foraminulum in abdomine factum, clausit, ut ejus postea vestigium nec cognosci, nec profluens humiditas à nobis posset observari: nec ægra de ullo facti foraminis dolore conquereretur: Cannula extracta erat quadam repleta materia, quam immisso cannulæ stylo adaptato, albam & glutinosam, sed in parva quantitate, inde expulimus, factoque experimento num in lympham caloris posset resolvi

beneficio in cochleari super lentis caloris ignem, tanta adepta est ipsitatem, ut glutinum verum albo colore dixiles & fragile, quæ glutinosa substantia, aquæ frigidæ affusione resoluta, ad priorem rediret visciditatem: Hæc jam postquam extrema remedia, sine ullo fructu adhibita, cum cerneret ægra, ulteriorem Deo curam commendavit totam, clysteribus interim, quoties urgebat necessitas, proritans alvum ad excernendum, & tanta gestavit facilitate abdominis pondus, ut post oclusam ejus puncturam, carpento extra urbem vehi se aliquoties sit passa: Cum vero ad eam invensendam circa nonarum Augusti octavam matutinam adessem, nocte præcedenti bene quiescisse se & (appetitus enim toto morbi tempore non fuerat dejectus, neque sitim patiebatur) jentaculum more sumplisse solito mihi retulit. reliqua etiam omnia mediocriter habere cognovi: circa vero sextam ejusdem diei vespertinam iterum advocatus, adeo immutata vidi omnia, ut jam nihil, nisi mox parcurientis ex ægra clamores exaudirentur, retulit etiam mihi, remissa planè & pene deficiente voce, se majores circa uterum, pudenda vicinasque partes, jam parturiendi perferre cruciatus quam antea nunquam: Et quoniam hosce dolores, dixit, meas superare vires longè sentio, aut abdomen jamjam rupturum, aut me satis hoc momento concessuram credo, lique dolores toto noctis fere intervallo persistebant, nec ullum mitigandis illis aptum remedium potuit applicari, donec tandem post matutinam sextam ultima ad Deum transferret suspiria.

Quoniam vero Nobil. hæc, teneritæ alias conformationis, abdomen p.n. modumque habebat maximum, maritus metu rupturæ, postulavit, ut lanceola facta pertusione leni, quandam copiosæ in abdomine contentæ materiæ portionem educeret, quod factum: Verum non ut in hydropicis consuevit, magno impetu profluit aquæ profluvium, sed ejus loco materia talis viscosa & crassa, qualem ex viventis syphone extraxeramus, hoc tamen discrimine, quod hæc priori minus albicans ad puniceum vergeret colorem: Tum, quod largior hujus materiæ copia per puncturam factam egredi non posset, illam Chirurgus paulum fecit majorem: Tum materiæ dictæ quinque ad minimum portæ nostræ mensuræ cum impetu effluxere, & una cum hac frustum aliquod peculiare materiæ glutinosæ, quod mirabili magnitudine & figura, uvam racemiferam, aut conum pincum referebat, colore ex albo flavescente, quod à materiæ glutinosæ reliqua saburra facillimo separabatur negotio, sed basi suæ uteri ruptæ parti interiori per venulas & membranarum fibrillas adeo adhærebat arctè, ut propter raram extensionem, sine ejusdem lésione ab utero non separaretur: Illud vero in ruptæ uteri parte prodeuntis, materia quadam glutinosa, distincta, rotunda exhibens figuram, firmiter adhæreret: Venæ itaque istæ, earumque varix ramificationes, quibus singulis pro magnitudine talis glutinosæ figura erat superposita, admirabile hoc glutinosum corpus efficiebant: Exempto tandem cum materia hac racemifera, simul & ipso utero (quem in fundo & ad latera uteris ipsius ruperat extensio & raritas) in ejus latere dextro, corpus membranaceum, rotundum, capitis viridis æquans magnitudinem, fibri-

figuræ oblongæ, nec instar linguæ bubulæ, sed a. i. quomodo globosum, coloris diversi, in cuius medio, digiti latitudine, atra linea, substantia compacta, densa ut hepatis, in cuius convexo vena varicosa, crasso sanguine farcta in imo, cellulas coli, vel potius pilulas conglomerans, sic vocante D. Cneulino, referentes, varices non magnæ erant, alligatum ventriculo. Mesenterii corpus crassum, pingue adiposum ubi Coloacilio jungitur, cum paucissimis glandulis arctè vinciens intestina, veteri hercore turgida, quæ & cultro separanda fuerunt. Renes carebant vitio, copioso adipe tecti, vesica urinaria lotio turgida: Pinguedo & adeps sua copia vellicabant omnia, occultabant & viscera, ob quod pondus Stadlerio spiritus impeditus fuit. Sic ventriculi exiguitas non admittebat multum cibi. Caput intactum reliquimus. *Hæchileterum casu 6. Decad. 10.*

Honestæ erat fœmina, pudica, sexum suum decentibus virtutibus ornatissima. Hæc ante hos sedecim circiter annos, anno nempe præter propter 1666. tum annorum ætatis suæ 26. sensit, abdomen nonnihil intumescere, ignara, unde hæc abdominis intumescencia ortum ducat: quæ et sine dolore, nec ambulandi impotentiam, nec aliud quodvis symptoma actionem aliquam lædens comitem haberet; tamen super ea Medicus consultus est, qui flatulentiam subesse ratus, contra eam alias proficua remedia præscripsit & adhibere iussit. Sed frustra. Abdomen sensim magis magisque attollitur, fluentibus interim rectissime mentibus, cæterisque sanitatis indicibus plerisque apparentibus, præterquam quod artus eo magis subinde gracilesceere viderentur, quo maiorem in molem æqualiter exercebat. Abdomen totum. Anno 1672. conjugium inivit Nobilissima virgo, spe, iore, ut fortassis prolium exitu illa una sublideret abdominis intumescencia. Sed & hæc decollavit spes. Facta quidem est trium liberorum mater; at tantum aberat, ut detinuerit abdomen, ut potius subinde majus sumplerit incrementum; quo tacum, ut alia præterea supervenerint graviora symptomata, nempe ambulandi difficultas, dextræ coxæ dolor, & præcordiorum anxietas; præter illa gestationis fœtus tempore, ultimis imprimis mensibus, familiaria, ut stranguria acerbissima animique crebriora deliquia. Diris his sanitatis hostibus per aliquot annorum decursum conflata, tandem sub finem Novembr. 1682. inopinante incidit patientissima patiens in spontaneo alvi defluvium, quo abdominis moles ita re sedit, ut non levis spes, urina etiam imprimis inclies ad aliquot mensuras secedente, affulgeret teclintegrandæ valetudinis: sed quam paulo post superveniente summa respirandi difficultate, teclis eventus, placidissimus nempe obitus. D. 14. Octobris 1682. excepit. Post quem cum instituta extispicina extra lustrarentur, eni oculis nostris se illit tantæ capacitatis saccus membranaceus, ut 40. circiter mensuras tenuerit, qui innoxie omnibus visceribus incubuit, inque tantam molem extulit abdomen, urinoso liquore intra dimidium ejus repletus, cæteris visceribus plerisque intaminatis repertis: præterquam quod uteri fundo inhaeserit semitotundus globulus cartilagineus, & tuba uteri dextra, ex qua saccus ille, ceu radice, prodiit, obliterata apparuit.

atque omentum non super saccum & viscera expansum, sed corrugatum prope diaphragma inventum fuerit. *Georg. Abrahami Merklini.*

Mulieris se gravidam putantis abdomen sensim intumuit. Gestat. onis tempore elapso, hydrope laborare judicatur, per triennium venter ita accrevit, ut oneri ferendo vix sufficeret. Tandem febris continua, dyspnœa, siti inmani & inquietudine enervata animam reddidit. In vivis multo potu frigido & fructibus crudis usa fuit.

Continebat abdomen lymphæ nonaginta libras. Peritonæum parti anticæ ventriculi tam firmiter adhærebat, ut nonnulli cultello separari potuerit, adeo ut vulvus, per quod lymphæeducta fuerat, in ipsum ventriculum penetrabat. Ambo ventriculi orificia eundem situm sece obtinebant, seque invicem tangebant: Omentum superiorem partem occupabat. Jecur è loco valde elevatum, ventriculus per medium dissectus ulnam vulgarem superabat, fibris, quæ membranam interiorem contexerant, à se invicem latè distitis. Cylitis aquosa de pylori orificio pendebat, interior ventriculi membrana hydatidibus scatebat.

Quantum frigida & fructus acidi nocent, cuiusvismorum: frigida sanguinem instar gelatinæ conciescere faciunt, acida vero eundem coagulant: atque hæc duo mulierem hanc vexarunt.

Rarum certè hydropis ventriculi exemplum est, novimus hydropem esse vel generaliter per universum corpus, in partibus particularibus tantum residere, atque illa fors nostræ mulieri in ventriculi membranis contigit. Vasculis lympham, per universam texturam, vehementibus, dilatis, primo hydatides seu aquulæ ortæ sunt, & deinde post eorum rupturam, lymphæ intra ventriculi tunicas effusio, hinc quoque laterum ingens dilatatio, intra cuius intercapedinem immensa liquoris copia, dissecantibus inventa. Ob sanguinem aliquando refrigeratum & deinde incalescentem, febris laboravit: ex diata liquet multum cruditatis & aciditatis in sanguine reliquisque succis accumulasse. Ex febre, ob salivæ defectum oriebatur sitis ingens. Inquietudine fatigata est, quia acidi & visceri huiusmodi, particulas acutas habentes, membra omnia vellicabant, unde quasi totius corporis dolor. Sitim patientes, cibos vix capere aut deglutire queunt, imo abhorrenti, accedit appetitus prostratus & ventriculi ab aqua ad interiora coarctatio, unde vix cibum, nisi cum summa difficultate sumere quivit: non mirum igitur illam ad extremam maciem fuisse redactam. Tactum mihi persuaderem, ex potu frigido, quem æstate largiter ingessit, lympham, ventriculi parietes percurrentem, summe conslipatam, unde vasculorum dilatatio & ruptio: unde venter post annum unum & alterum immensum usque extensus fuit. *Sieph. Blancard. in Anatom. Præcl. rationes.*

Virgo quinquagenaria cacochymica, in utero hydropem incidit, qui ad triennium duravit. Tandem post obitum dissecto cadavere, non tantum uterus pustulis, aqua repletis, inventus, sed in ipso etiam abdomine saniosi coagulantes fortida subpurulenta ad aliquot heminas deprehensa fuit.

Cacochymia est corruptio sanguinis & humorum, unde obstructions, & vasculorum lym-

phaticorum eruptiones, hac de causa aqua facile intra membranas effluit, Hydatidesque elevat. *Idem ibidem.*

Fœmina quædam ante obitum per duos menses continuo febre quadam afficitur; quæta est de gravi pondere, (quod liberè pendebat, ut putabat) in abdomine. Urinæ ejectione non respondebat, alvus quoque dura, ac respiratio difficilis. Medici divinabant de mola in utero; alii vero de hydropo & tumorem istum abdominis octo annos gessit. Post mortem abdomen aperiébatur. Mesenterium ac pancreas immensæ molis erant, decem libris cum dimidia æquabant. Externè scirrhusa videbantur, connexa tantum erant cum lumborum vertebis posterius; antè vero cum peritonæo etiam planè scirrhuso, adeo incrassato, ut cartilaginis speciem referebat: ab intestinis, quod mirum est, plane libera erat. Varia ulcera in mesenterio inveniebantur, quorum singula singulæ quasi pellicula continebantur, quædam pure plena, olei instar, alia mellis consistentia erant, alia vero adipis liquefacti vel pultis, albuminis ovi aut lymphæ liquorem continebant: & ut brevi dicam quot ulcera, tot materiæ diversitates. Aquæ aliquot libræ effluebant, jecur planè induratum, ac ulceribus plenum: Intra octo annos, quibus iste abdominis tumor sensim crescebat, se quod menstrua & cætera sanitati convenientia, bene habuit, exceptis postremis ante obitum mensibus, tum enim præ gravitate abdominis & febre continua decumbere cogebatur.

Omnes abdominis glandulæ atheromate, meliceride, steatomate aut scirrhuso obsestæ fuerunt, præsertim pancreas & mesenterii glandulæ; atque pro varia glandularum obstructione, fuit etiam materia ab invicem varia. Ob ingentem pancreatis molem, rectum intestinum & vesica compressa, adeo ut, nihil stercoris aut urinæ excerni potuit. Sic quoque, ob elevatum, à tumoribus & aqua, diaphragma, musculisque abdominis distentis, respirandi actus liberè fieri non potuit, ideoque in difficilem incidit respirationem. Quod ante mortem febre laborabat, mirum non est, nam obstructis visceribus, sanguis tandem saburra inficitur, ita ut tandem inspissatus, incalascit. Ex ruptis in abdomine lymphaticis, aqua extillavit, unde hydrops ascites, sive venter aquosus. Mirum videtur, pancreas & mesenterium intestinis ut solet, non adhæsisse. Sed præ nimia ponderis gravitate, omnes membranas, cæteraque viscerum retinacula à pancreate & mesenterio dirupta sunt, adeoque ut ipsa facebatur viva, liberè pendebant. *Idem ibidem.*

Hydrops in quo tumor pilosus in omento repertus est.

Anno 1683. aperuimus cadaver cujusdam mulieris, jam à 15. annis hydropicæ, unde per abdomen ejus, trium ulnarum spatio distentum, vasa sanguinea crassitie & capacitate calamus scriptorium maximum superantia, dispersa invenimus. Tandem post multos, & quidem intolerabiles dolores, incidit in gangrænam supra umbilicum, qua separata, magno cum impetu, humor in abdomine contentus erupit, sine no-

tabili fœtore. Magister Abel Vander Horst de arte chirurgica bene meritus, spleniorum, & emplastrorum glutinantium usu ulteriorem inhibuit fluxum: utque partitis vicibus daretur exitus huic liquori, singulis quadrihorii quantitatem sufficientem eduxit. Hic humor, paucis post eruptionem horis, tantum concepit fœtorem, ut nemo perferre potuerit. Quarto, quintove post apertionem die, obiit misera patiens. Cadaveris aperienda copiam nobis suppetebant consanguinei. In omento, digitum crasso & carnosum, fixæque peritonæo adhærescente invenimus tumorem pugni magnitudine, quo secundum longitudinem aperto, primo paululum materiæ putacæ, albæ, nullo fœtore præditæ, erumpēbat. Hac emissâ, nihil præter glomum durum, & capillis intricatis & crispis constantem; invenimus. Hi capilli diversæ erant longitudinis; nonnulli magnitudinem digiti, alii ipathamam superabant. Hosce capillos microscopio subjectos planè convenire cum aliis capitis capillis reperi, excepto quod nullis gauderent radicibus. In cæteris visceribus nil notatu dignum observabam. *Fredericus Ruyschius in Observationibus Anatômico-Chirurgicis.*

Hydrops in quo hepatis glandula admodum tumefacta.

Hepar humanum magna ex parte è glandulosis corporibus constare, jam à longo temporeprehendimus. An. 1686. vetulæ, ex hydropo ascite mortuæ, cadaver in usum discipulorum aperui, primo cuspidè cultelli exitum paravi tenuioris sero, in abdomine contento. Post grandiori facta incisione, visui se se obtulit humor flavus, & limosus, satis indicans in hydropo ascite non tanti esse momenti paracentesin: nec adeo temere instituendam, prout nonnulli volvere auctores: pauci enim evadunt, nisi ichor intra musculos & peritonæum (alii dicunt inter duplicaturam peritonæi) hæreat. Tubis Fallopiæ compressis, materia quædam, spermatis humano analogæ effluebat. Ovaria comparebant admodum exilia: quemadmodum in vetulis ut plurimum visuntur. Intestina non solum undiquaque peritonæo, verum etiam sibi invicem connata. Hepatis superficies inæqualis, propter glandulosæ corpora tumefacta. Ejusmodi corpora glandulosa, aut glandulas hepatis magnitudine auctas, nuper quoque publice demonstravi, & aliquoties conspexi, nunquam tamen adeo copiosas, quam in supradictæ vetulæ hepate: totum enim hepar è meritis glandulis magnis constare videbatur, unde perquam inæqualis existeret ejus superficies. *Idem ibidem.*

Hydrops ascites ex hydatidibus.

Incurabilibus affectibus nobis sæpius occurrentibus, haud sine ratione dicitur, non esse in Medico semper relevetur ut æger. Quis Medicorum curare potest hydropem ascitem limosum, membranis inclusum? cujus varia quidem vidimus & apud autores legimus exempla: nunquam tamen mirabiliorem hujus rei historiam me intellexisse memini: quàm eam, quæ mihi ante aliquot annos in platea Sancti Johannis occurrit: ubi præsentè Magistro Petro Adriani filio aperui cujusdam virginis ætate provecutionis cadaver, cujus admodum distenti abdominis totam cavitatem repletam conspeximus immo-

merabilib. vesicis aut sacculis, humore tenaciori & glutinoso refertis. Nonnullæ earum vesicarum erant magnitudine pugni minoris, aliæ magnitudinem nucis juglandis non superabant, non pauca æquabant nucem avellanam. Utinam harum vesicarum subjectum glandulæ fuerint mesenterii in vesicas, aut, si mavis dicere, hydatides, degeneraræ, (quod crediderim) aut vasa lymphatica præter naturam expansa, non aulim certo affirmare. temporis enim penuria, & morosorum consanguineorum præsentia ulterio-rem investigationem denegavit. *Idem ibidem.*

Partium quarundam induratio in hydropica.

Ab atrophia & corporis marcore partes nonnullas indurescere, imò ossescere, vel lippis atque tonsoribus notum. Id autem etiam in hydropicis contingere posse sequens probat exemplum. Mulier quædam utero gerens, & hydropice ascite simul laborans syndromen malorum tempore gestationis perpessa est. Enixo fœtu maturo, non desiere illam vexare ascites, præcordiorum anxietates, dolores intolerabiles & multa alia mala; donec Deo ter Opt. Max. placuit, miseris ejus finem morte imponere. Cadaveris apertione latici aquoso exitum paravi. Quotactio peritonæum variis in locis duris particulis, arenulas mentientibus, conspersum, venamque portæ ex parte osscam factam, reperi. Venam ipsam domi reservo. Cætera viscera satis bene erant constituta, omento excepto, quod in totum erat consumptum. *Idem ibidem.*

In hydropici cadavere hepar male & quomodo affectum.

Quantumvis in hydropicis glandulas præsertim hepatis indurari, sæpius accidat, attamen non semper ad amissim sibi invicem respondere ejusmodi casus reperio. Nonnullorum hydropicorum jecinora in totum indurantur, superficie manente æquali, glandulisque insensibilibus. Aliquando ita augentur glandulæ, ut per universam hepatis superficiem expullulent. Nonnunquam hæc glandulæ sunt magnitudine nucis avellanæ. Nuper cadaver cujusdam hydropici (cujus pedes à tribus fere annis edematosi facti, unde tandem, in mari naufragio facto & multum frigoris perpessus in verum ascitem incidit) dissecui præsentibus Viro Doctissimo Petro Bernage, Medicinæ Doctore expertissimo [qui mihi cadaver aperiendi copiam fecerat] ut & Chirurgus Vogetiangh, in arte sua bene versato. In thorace, quantumvis summis & maximis anxietatibus fuerat afflictus, nil mali invenimus; omnia abdominis viscera optime erant constituta, solo hepate excepto: totum enim deprehendimus induratum, cujus superficies ubique inæqualis erat, propter glandulas induratas & magnitudine auctas. Harum nonnullæ erant magnitudine capitis aciculæ, aliæ semen lentis æquabant. In abdominis cavitate magnam aquæ copiam deteximus absque ulla notabili graveolentia. *Idem ibidem.*

In simili alio hepar itidem male affectum und cum calculo in ductu cystico.

Vir quidam cum à longo tempore ascite laborasset, tandem multis remediis incassum adhibitis, animam efflavit. Cadaveris ejusdem ape-

riendi ansam mihi suggessit Joachimus Schraderus Chirurgus minime ineptus, qui dissectionem quoque interfuit. Nulla, præter hepar induratum, viscera male erant constituta: vesicæ felicæ admodum magnam, aquosæ, (at nullo modo amaro aut biliösæ) humore refertam conspeximus, in cujus ductu cystico calculus occurrebat ciceris majoris magnitudine, qui meatum in totum obstruebat. *Idem ibidem.*

Hydrops tubæ uterine monstruosus.

Corneliæ Nicolai Virgini paupercula adversa valetudine aliquandiu viz cepit abdomen intumescere anno 1660. a quo tempore tumor paulatim & ita increvit, ut præ pondere 18. ann. molestissime vixerit, antequam materiarum tuarum invenerit finem: quem tamen circa annum ætatis suæ 43. adeptæ, tecit nobis copiam inspicendi miserum suum cadaver, in quo ann. 1678. 17. Junii, st. vet. coram aliquot Medicis & Chirurgis, nec non spectatissima studioforum corona, lequentia demonstravimus. Totum corpus quodam modo erat emaciatum, sed abdomen int. tam molem excreverat, ut reliquæ partes vix conspicerentur, & fere a nemine, qui demonstrationi non adfuit, concipi queat. Aperto abdomine nulla aqua affluxit, sed omnis continebatur in dextra uteri tuba, & quidem solummodo in ejus parte juxta testiculum, necnon in ligamento alto lato, quod ab Anatomicis alæ vesperilionis vulgo assimilatur: eaque ab aquarum copia ita erat dilatata, ut inflicto parvo vulnuscule ita. libræ effluerint. Aqua hæc erat limpida, fontanæ ad instar. saporis subtilis. Substantia in qua continebatur crassitiem habebat semidigiti. Externæ superficiei multæ vesiculæ aquosæ: necnon portiones adiposæ plurimæ adhærebant. In latere opposito eodem in loco tumor conspiciebatur tenax, continens in se purulentam, fungosam, cartilagineâ, viscidam, & nescio quam putridam materiam, necnon plurimas vesiculas limpido humore repletas ultra 10. libras pendens: cujus extremæ parti adhærebat alius tumor, magnitudine duarum manuum sibi invicem complicatarum, flavus, mollis friabilis, n. ateriam continens purulentam casei putrefacti ad instar. Testiculus erat mediocris magnitudinis, at dimidia ex parte corruptus. Uterus naturaliter erat constitutus, & decentem habebat magnitudinem, atque in ejus cavitate ne guttula quidem aquæ conspiciebatur. Meatus ex utero tubas spectantes erant aperti, ita ut libere & sine ullo impedimento ex utero in tubas utrasque stylus penetraret usque ad tubarum medietatem, ultra quam ulterius progressus nequaquam concedebatur. Hepar extrinsecus erat fœdi coloris, & multis hydatidibus oblitum, quarum aliæ ovi columbini, aliæ fere ovi gallinæ, aliæ minoris erant magnitudinis, quibus tamen non solum hepar, sed etiam aliæ in abdomine partes scatebant: interior hepatis substantia satis sani & rubicundi coloris conspiciebatur. Lien similiter bene erat constitutus. Ventriculus ad minimum apparebat naturali quadruplo maior, quem non aperuimus, ob magnam scetorem, qui modo ex apertione aliarum partium per cubiculum erat dispersus: putrescentis tamen humore aquoso & bilioso fuisse repletum, quoni. m. Medicus ipsius ordinarius nobis narravit, illam

illam aliquot ante obitum diebus similem humorem saepius vomitu rejecisse. Intestina omnia erant atrii coloris & fere sphacelata. Cum cultro perforatum esset diaphragma, magna rubicundi humoris copia cum impetu effluxit. Cætera ob magnum foetorem non inquisivimus. *Antores Bibliotheca Anatomica ex communicatione Clariss. atque Celeberr. Viri Joh. Munnicks Medicini Doctoris ac ejusdem Trajecti ad Rhenum Professoris Dignissimi.*

Hydrops cum Schirro Ovarii sinistri tuberoso.

Nobilis Matrona annos 35. nata, quæque anno ætatis 20. nupserat, quatuor filios, totidemque filias enixa semper magnam aquæ copiam rejecit, idque præsertim in ultimo partu quo tribus abhinc annis quintum edidit filium, qui adhucdum benè sanus vivit. Crediderunt tunc temporis eam gemellum parituram, quia dolores perfluebant, post editum prædictum filium, ac ea propter me in re difficili accersiri curarunt. Cum adveni uterum quidem onere omnino liberum deprehendi, verum tumorem admodum grandem, durum & inæqualem in inguine sinistro tetigi: Unde ex situ partis, præcedentisque meis experimentis, facile judicavi ovarii sinistri schirrum subesse tuberosum per tubæ uterinæ longitudinem excurrentem, eaque propter malum esse incurabile. Et sane ab ipsis primis diebus tam prodigiose intumuit abdomen, ut eam magnitudinem quam graviditatis tempore adeptum erat etiam superaret, atque abhinc ita sensibiliter auctum fuit per tres annos continuos, ut tandem ægram suffocaret. Familiam iis quæ jam dixi imbueram, unde exquisitum est ut defunctæ cadaver aperiretur, sicqueret veritas in mei laudem vel opprobrium pateret. Ex quo cadavere potitus sum, ex eo per paracentesim, aliasque etiam vias quinquaginta aquæ libras civiles eduxi, quæ faciunt pintas Parisienses 25. Hoc peracto viscera nutritiva ad examen vocavi, eaque prorsus integra reperi. Postea tumorem meum monstrosam ab uteri tuba sinistra aliisque quibus adhærebat partibus separavi, qui libras civiles decem ponderavit, cujusque figura ovalis pluribus tuberculis atque sulcis erat inæqualis. Undique apparebant globi quasi in acervum aggesti, & substantia, & rotunditate, & colore & consistencia varii. Ab instituto plenius examine omnino vidi tam confusam aggeriem nihil aliud prorsus exhibere quam ipsum ovarii corpus præter naturam mirè auctum; nam totus ille tumor à vesiculis seminalibus earumque cellulis & multiplicatis & alteratis procedebat. In quibusdam ex illis globulis aqua & limpidissima & liquidissima, in aliis serum subtilissimum ad minimum attactu perquam facile effluens, in aliis humor viscidus, ad instar mellis crassus atque parum pellucidus, in aliis viscida quidem materia, sed ad instar albuminis ovorum pellucida, in aliis gypseum quid opacum ac pluribus spiculis de se assurgentibus asperum & inæquale, in aliis tandem coriaceum quid ac schirrosam ad instar cornu ad ignem emollitum continebatur. Illi quoque omnes invicem firmissime copulabantur per callosa ac nervea quædam ligamenta. Fibras præterea de se emittebant numerosas & peritonæum & musculum abdominis transversum, & inguen ipsumque

umbilicum ita penetrantes, ut inde quasi e fornice firmo dependerent. Globorum prædictorum magnitudinem quod attinet, alii nuces avellanas, alii ova columbina, alii ova gallinacea æquabant. Verum ex iis tres erant præcipui quorum quisque pugni magnitudini accedebat, ac non multum abscedebant ab illis decem tumoribus monstrosis à Vesalio capite de liene descriptis. Mihi prorsus impossibile fuit omnes alios numerare, nam ea quæ Ingrassias solertia non præditus fui, qui in menterio solo 70. ejusdem cum meis conditionis subtiliter computavit. Cum itaque minores ab implicationibus suis expedire ac extricare minime valuerim, contentus fui eos cum cotyledonibus vituli, termino suo nati, comparare, tunc enim & grandiores & numerosiores reperiuntur, magisque ad meum accedunt subjectum, tum propter magnitudinis inæqualitatem, tum propter numerum minus certum. Tota tuba uterina ac ipsius diaboli, monstroso huic assident ovario, cum suis parvulis musculis contabulant, interim immisso in cavitatem spiritu eam expandebam. Ovarium dextrum, uterisque cum adjunctis sibi partibus intemerata ac inculpata erant. Verum monstrosæ illæ omnes vesiculæ, ac præcipue quæ ad minimum difflebant attactum apud me confirmarunt hydropis causam qualem illam Hippocr. libro de morbis Internis reteggit ac explicat, ibi enim producit aqueas vesiculas disruptas, sicque fatale facientes diluvium unde calidum innatum ac vitæ lampas extinguatur: Hic sane duo singularissima demiror, quorum alterum est, quod matrona hæc per tres quibus hydropica fuit annos semper menstruata vixerit, imò appetentiam & in potu & in cibo satis integram conservavit: alterum vero, quod in interaneis suis onus ponderis 60. librarum gerere valuerit &c. Ex Epistola galliæ conscripta quam nobis communicavi. Clarissimus atque Celeberrimus D. Carolus Drelincurtius Leiden. sis Universitatis Professor Senior.

Hydrops ingens in duplicato peritonæo.

Evenit quandoque, ut aqua non in cavitate abdominis stagnet; sed aut vesicis quibusdam, hydatidibus dictis, & visceribus adnatis includatur, ut Schenkius habet; & Zacutus Lusitanus duas invenit aqua fetida, lividaque mucoso humori permixta repletas, quarum una libras aquæ xxx. excepit, ac Mauritius Cordæus plusquam 800. in infimo, & medio ventre offendit: aut inter duplex peritonæum coarceverit, quemadmodum fidem mihi fecerunt Clarissimus viri Medici, primum quidem Simon van Zyl Cognatus mihi charissimus, qui è duplici peritonæo femina staturæ brevioris 24. feri stropas exhaustas vidit; cum illa in principio recte functiones citra tumorem pedum obiverit, affectu tamen procedente ac viribus pedetentim attritis tumor, pedum quidem subortus est, & abdominis usque adeo increvit; ut ægram suffocaverit. Continilem historiam à Carolo Drelincurtio Phil. ac Med. Doct. Pract. prudentissimo, ac in Alma Lugdunobatava acad. ejusdem Facultatis Practicæ, & Anatomies Professore experientissimo dignissimoque, præceptore meo multis nominibus venerando, meis auribus hausi, quam utpote rarissimam nolim involvisse silentio, cum præsertim parilis eventus, nec vola,

nec vestigium exstet vel apud Veteres, vel apud Neotericos, uno excepto Cl. Viro D. D. Nicolao Tulpio; sed profecto vir ille tantus in re tanti ponderis & usque adeo insolentis concisa nimis verborum brevitate usus est. Mihi igitur volupe est orationem dilatare & fusa verborum serie ab ovo usque ad mala, ut ajunt, rem totam enucleatim enarrare; isthac enim auditio uti mihi nusquam infructuosa fuit, ita me hercule, nec meæ narrationis lectio meis Condiscipulis erit infrugifera. Si quippe rerum à me narrandarum in singula momenta; tamquam in speculum intuentur, tanti casus idea illis ante oculos usque adeo fideliter obversabitur ut deinceps suæ mentis obtutu parem abstrusissimum morbum introspicere, atque etiam impendentia fata suprema istis ab ægris avertere queant. Decennium est cum ineunte veris ætate ad Clar. Drelincurtium adivit 17. annorum virgo, facie florida, habitu carnosio, temperie sanguinosa-biliofa, periodice menstruata, bene appetens & ingerens, atque etiam digerens ac egerens, non cephalalgica, non somnolenta, non dyspnoica, non siticulosa, nec ullis pressa symptomatis quæ vulgares hydropicas fatigant.

Int enim trimestre est cum primum ingenti totius abdominis tumore deturpatur, quasi passim sit virgineum sibi delibari florem, quem illi batum jurejurarum diris sese devovens si cum viro rem habuit. Meus interim præceptor à virgineo vel sanctiori jurejurando totus diffidit, probo conscius fœmineum versipelle genus miris eo univisci technas, quibus suo consultat honori, teste illa infami atque propudiosa, quæ nunc ita est sese gravidatam in balneo obiectum & residuum eo loci virile semen, quod uterus gemituræ rapacissimus allexisset atque vorasset. Idem igitur virgini sese periodis statis menstruata esse asserenti meus Pr. detrahit, dum quippe florentem illam ventriosam contuetur, facie rosea ac purpurea, artubus torosis, appetitu vāgente, & inculpatis vitæ functionibus ad loca locorum obeundis peritoneam, aliud nihil quam virginis compressæ fraudes animo evoluit; quidni enim illam suspicaretur utero gravem, licet innubam cum experientia sit consensum utero gerentes à male menstruatis inter alia multa in eo potissimum discrepare, quod utero gestans nihil nisi salubria spiret, aut quid insalubre sub prægnationis initia prodatur, id sentim atque pedetentim minuatur donec plenius atque plenius conceptus ejus alescat & augeat; ac menses moratos gravia symptomata consequuntur, quæ nova in dies incrementa capessunt. Ne diutius itaque res tota vacillet, nec jam animi pendeat Meus Pr. abdomen contulit, quo contrectato atque compulsio magis ac magis & æstuat dubitatione, & versat sese inter utramque partem, prægnationem nempe atque hydropem. Virginis enim compressum animo præsumperat, sed en signa quæ ipsum ab illa mente penitus avocant; non est quippe tumor abdominis prominens & acuminatus nec etiam subrotundus, conglobatusque circa alterutrum inguen, aut epigastricam versus regionem, nec contrectatu, & compressu hypogastrium versus sese subducens, nec denique monticulis exasperatus & prominulus inæqualiter, uti solet dum infans sese volutat, & cubitos, vel

pedes, vel nates huc & illuc devolvit, atque protendit. Accedit magnum pondus ad dubitationem de graviditate tollendam; urina liquidem immutata perstat excretionis tempore, consistentia, colore & hypostasi; at frequentior est in gravidatis obcompressam venticam ab utero mole sese in dies ampliante. Coloratio itent atque crassior est, & vel fabarum decoctum, vel jumentorum urinam similitudine retert, a suppressis enim lunaribus effluviis quidpiam albentis crassique micinales in ductus decurrit. Hic insuper alvus nulpam astrictior sicut obtingit dum infantile pondus Uterum aggravat, & princeps intestinum premit atque coarctat. Aliunde vero Hydropem culpæ nequit, meus idem Pr. quia nulla symptomata sese produnt, nullæ ventriculi, jecoris, henis, aut renum querelæ, nullum œdema vel in lumbis vel in artubus internis, nulla macies vel in trunco, vel in artubus supernis, nullæ mammarum aut detumescentes, aut flaccidæ, aut decolores; sed omnia isthac sese habent ex naturæ præscripto prorsus inculpanda. Solus aqualiculus exstat seique pede turpiter prominulus & virginem deformat atque deturpat; imo præter infamiam, quam protuberantia sua infert, insontem, ægræ ita onerosus est ut ipsa stare loco nesciat. Nihilosecius mei Pr. animo (in tantum valet anticipata rerum opinio) jugiter illud incubat, mendacium esse virginis turpissimum sese intaminatam proflentis; atque adeo virginem illam, opinione tenus, dehoratam dimittit, nullis ipsi Præonibus remediis ex arte præscriptis; satius enim ducit ab illis superfedere, quam ausu temerario in re tam lubrica, tam anceps, tam abstrusa, tam fallaci operam ludere Medicam, Artemque suam, seque Artificem infamare; alienis præsertim Medicorum damnis cautior factus, qui virginibus, falso sese tales esse asserentibus, non aquas ex alvo deturbant, sed embryonem, vel fœtum, ex utero decusserunt. Meus itaque Pr. virginis subridet ipsique memoriam refricat Divini illius Salvatoris dicti, qui valent, Medico non egent: sed qui agrotant: ac proinde, idem meus Pr. addit, mi virgo, frustraneam a me exigis operam, tuique ficti morbi fictam curam incassum exposcis: cum enim vel morbo, vel symptomati sum bellum indicurus, me fugit, alienissimus enim sum ab agyrtarum subdola gente nequam, quæ luctatur cum larvis, & phantasmata sibi debellanda fingit quo inluminis unguiculis argentarias opes hominibus male credulis exenteret. Acrior instat illi & voce supplicis Medicam opem ita rogat ut majore studio rogare non potis sit, sed Medici mens occupata supplicem non audit. Nihilominus constans illa quotidiano suo convicio, efflagitat, ut Phæbi potentibus herbis id quicquid est, sibi perinde odiosi ac infamis cum tumoris, tum oneris, feliciter subsidat, nec cumctanter tollatur. Rebus itaque singulis perspicillate perpensis Medici ad consilium adhibentur Duplicem & illi distracti sunt in sententiam, Graviditatem alii subodorantur, Hydropem alius alii sonant & hydragogis numerosis ferent uberrimum quidem proliciunt, sed ne pilum transversum deturget abdomen, imo hydragoga quo plus sunt data, plus damnosa sunt. Semestri interim exigitur in apozematis, jusculis, bolis & pilulis hydragogis: sed omnia incassum: non

modo enim irrita fuerunt leviora ex foliis Alexandrini cum radice Barbara & sale tartari; vel manna Calabrina & Syrup. modo diarrhodonis, modo de florib. mali Perlicæ, modo tandem de rhanno cathartico frequens exhibita, sed & sambuccina & ebulina sapa fortiter diagrydiata sæpius oggesta est. Dati sunt & boli ex Electuario de palmularum & seminis cnicus pulpa-mento cum mercurio dulci, & antimonio dia-phoretico. ipse Mercurius vitæ & crystalli lunæ, a que etiam agarici & colocynth: extracta e S. V. adjecto Gigarothi pulvere, aliquoties exhibita sunt, & tandem reditum est ad minora mochlica ex gutta gummi & resinoio scammonii succo, nec non radice jalappæ cum in pulvere, tum in retina, vel per se, vel cum granis regis minoribus, seu lathyridis minoris semine contuio. Conserva, condita & opiatæ aperientia & roborantia, diætetica insuper calefacientia, siccantia, hydropicis purgantibus intercalantur, sed exitu male fortunato. Ubi igitur satietas illam cepit tantæ diœtæ tamq. infelicitis Medicinæ, à genuinis Medicorum filius defecit ad agyras; qui virgini protinus sanitatem spondent, illamque annuunt integrum & argento emungunt & remediis cassis atterunt. Postquam itaque tot empiricis adnaxit, (quos singulos pollicitis quidem divites, sed re & effectis egenos comperit) totum negotium naturæ commisit, atque sic integrum aliud semestre transiegit. Verum audita tuma alterius hydropicæ (non obnata tamen) à Meo Pr. sanata, illam defectionis suæ poenituit, atque adeo gemitus mox de pectore duens, Meum pr. revocari suis lacrymis suas Amicas eit deprecata. Accedit ille, & misellum nunc nemitur corpusculum monogamum, ex-succum, exsangue, supiriosum, anhelosum, temporibus collapsis, naribus acutis, oculis concavis, cute arida, squalente, furfuriosa & intenta, colore lurido & nusquam vivaci, ungibus aduncis, viribus cassum & elumbe, respiratione frequenti, parva, molesta, pulsus crebro, duro, exili, fornicanti contemino, appetitu prostrato, siti inexhausta, lingua sicca, parva, scabra, voce vel faucibus hærente, vel gracili & intercisa; sudorib. & saliva nullis, urina parca, alvo nulla, sed infima tamen alvo tota. Sceletum esse Meus Pr. exclamat pelle conte-ctum scabra, seu machinam vocat ad humanam similitudinem effectam & arte motam, sed qui sit abdomen vel stamine vel tomento dir non am-plitudinem sufferctum atq; distentum, adeo quippe moles ejus increvit, ut horrendum omniqu: fide majus spectaculum præbeat, reliquum ve-ro corpus tot diureticis, tot hydragogis ex-haustum colliquefeit, subidet atq; ut ita dicam in nihilum redigitur.

Convocat Meus Pr. Apollinis Mystas ut vas-tum illud abdomen contemplantur, contrectent atque compulsent prodigialiter conten-tum, nulli compressui cedens, subrotundum, æquale, non acuminatum, nullisque hinc inde monticulis extuberans, umbilico projecto, venis passim turgidulis, amplis, nigricantibus, cute sub-brubra, tenui, perlucante & crepandæ mediz proxima. Tantis prolecto rerum in angustiis, tamque deploro ato rerum in statu, licet concla-matum esse judicaret meus Pr. nihilominus sa-cius esse duxit anceps experiri remedium, quam

nullum, & incertam salutem certa desperatione potio-rem habuit, atque adeo ad extremum mor-bum extremum remedium proposuit ~~remedium~~ nempe, qua ceu anchora lacta & ultimo salutis periugio liceret uti. Tot certe Ped rios Sena-tores isthæc sententia, quot Apollinis Symmy-tas in consilium evocatos habuit: sed ægra in-belli Martem exhorrescente illicitum fuit ad isthæc arma confugisse. Re igitur infecta, suo relicta est fato miscella dyphorica, & sæpius or-thophonica, ab omnibus tum eduliis, tum po-tulentis abhorrens, dulciori tamen Cerere re-cocta & generosiori Baccho madente, ceu vi-tæ propediem desitura; tomilibus uti est, atque sic querula, cur tamque sibi lexoniam. Artem tra-duens, trimetrum complevit, sed extrema tan-dem arumnarum clausula, qua toties labiis ejus oberraverat, lamentabilem illum clausit affectum, totique Asclepiad. rum fatalia, ut æternam ignotæ partis affecta notam multita & universo Medicorum choro memorabile dedit rari Hydropis specimen, de quo conticefcere nolim priusquam illud plenius adhuc atque ple-nius dederunt. Me igitur ad Cadaver accingo. ille aperto obitupere cunctore sibi prius in-visa & inaudita percussit. Incilis siquidem abdo-minis integumentis quinque communibus, & adacta scalpelli cuspe in intumum albe lineæ decursum, status primum eruperunt, una cum salientibus aquis. Mox incisione alia ra decula-tim facta, & sectatum partium angulis non di-ce revulsis sese dat in conspectum ingens lacuna, seu lacus immanis qui longe lateque sepan di- & alte penetrat, stagnanteque in urina, sive tero-salio, ubique scater. Visus est prima fronte vulgaris Ascites esse, ab aquis in abdominis alveo desidibus atque statariis. Quæsitum est hepar, utpote in quod totius damni culpa rege-teretur, sed nusquam comparuit: atque adeo in illud nusquam animadversum est. Mox intera-neæ, mesenterium, pancreas, lienem & renes sese comprehenturos sibi spondent, sed illorum nec vola nec vestigium existat. Mirabundis sin-gulis ad unum, itant comæ, lingua hæret: sed novis animis assumtis & propius admota mentis, corporisque face omnis discutitur caligo atque luculenter id latentis vitii detegitur, susque Cimmeriis e tenebris eruitur. In apertam quippe lucem protrahitur peritonæum intra se dupli-catum concludens atque coercens (tanquam-coriaceus uter immanis) tantum illud stagnan-tis aquæ pondus. Singulis igitur attentius ex-ploratis certo certius scitum est ingens illud stagnum, (quantum quantum est) totum esse à peritonæo duplici, cujus interior membrana ab externa sibi naturaliter contigua & musculis epigastrii transversis firmiter connexa atque connata longe secesserat, atque adeo sacculum ingentem coriaceum efflaxerat, quo (ve-lut utre ex densissimo corio recocto, nullisque pervio & meabili poro) dira isthæc torius inun-dantis feri colluvies ita coerceretur, suisque limitibus atque metis usque adeo concludeba-tur, ut ejus omnis ne guttula quidem una in ab-dominis alveum aut stillare aut irrepere po-tuerit.

Res tota ut aperta & conspicua foret, serum fuit Cleantho ex-nelandum labore, tuncquo vitium alterum atque alterum latens patefactum est.

Primum quidem id ipsum est quod jam attigi sed luculentius patuit quam antea totius enim ambitus ille labri, sive pelvis, formatus erat à peritonæo duplici, cujus interior membrana ab altera stillantibus aquis sentim compulsa fuerat introrsum, in abdominis scilicet cavum, atque adeo ex convexa concava facta fuerat ad instar vel marsupii, vel lanci pilei noxurum duplicis, cujus pars interior dum invertitur & extrorsum pellitur, superficiem suam concavam mutat in convexam. Ambitus autem ille protendebatur à pube ad diaphragmatis fornicem universum, cui adhesionem stricta peritonæum copulatur, & à regione lumbari sinistra ad umbilicem dextram. Istud deinceps observare fuit, nimirum quod sicut uterus gravidatus; quo plus increvit eo plus inspissescit atque crassescit, quoniam ejus substantia tota porosa est atque bibula & majorem tunc sanguinis & spirituum copiam admittit, quibus turgescat & intumeat, spissiorque & crassior paulatim evadat, donec post partum reperitis vicibus, quasi totidem eructationibus omnem illam, qua affuebat atque tumebat, sanguinis molem per lochia expurget & exuriat, neque paulatim ad pristinum exiguam recurat: Ita etiam peritonæum hic tenere fuit; non quidem porosum (satis enim poris sero perviis) sed spississimum densissimumque instar corii bubali, nullis unguibus, nulloque digitorum tractu lacerabile.

Dignissimum foret Medica disquisitione problemata, unde spissitudinem tantam nactum sit peritonæum, cum ex naturæ præscripto serica tela sit tenuius, hic autem quovis bubalino corio densius & spissius existit, ut in Hydropse Tulpiano lib. 4. obs. 43. crassitudinem digiti annularis induerant duplices illæ peritonæi tunice.

Adlubesceret præterea in aquarum illarum tanta viscositas, tantaque congeries primævis ortus inquirere: sed quia fuliores jam sumus, quam modus exigit, lubet unice viscerum reliquorum à viciis hoc eodem in cadavere inspectis pede prelo. Resecto igitur & remoto vallissimo illo & capacissimo peritonæi sacco qui instat fideliter, aut hydræ, explebatur, sese obrulerunt contemplanda viscera, quæ profecto nec saburrata nec tophacea, nec tartarea, nec gypseæ, nec calcariæ, nec saxeæ) uti sæpe videntur in hydropicis) inspecta sunt, sed dumtaxat vieta & vivacis expertia coloris, utpote marasmi passæ extremis præsertim vitæ diebus, quibus ab eduliis fere omnigenis abstinuit ægra, ne præfocationis metum sibi accerferet; nam statim ac ventriculum vel minime distendebat cibo, vel potu levioribus gravissimam dyspnœam perpetiebatur, ob majorem scilicet diaphragmatis compressum, ventriculo sese sub diaphragmatis fornice distendente, atque adeo liberæ respirationis organum istud molestante, & suis in motibus conturbante & remorante; ne igitur gravaretur ventriculus vitellos ovorum forbiles, & panem dulciarium bis coctum vino madidum assumpsit, id enim tenuioris alimenti ventriculum nusquam premit, sed confestim lacteos in tubulos compellitur. Viscera deinde & ab ipsis tot assumtis medicaminibus non levem noxam passa erant, nec leviter tot stitibus hydropogis suo orbata tere; unde nihil mirum

si color illorum maxime deflexerit à naturalis nam, haud secus ac hydragoga mochlica morbolis & nimio sero turgidulis partibus peramicæ atque salutaria sunt, ita profecto partibus sanis, nec luxuriante sero gravatis damnosa atque deleteria sunt, juxta quotidianam experientiam Hippocratis oraculo consonam. Virgine autem illam sana habuisse viscera, antequam moles aquarum ita increverit ut dyspnœam & orthopnœam ipsi pepererit, vel ex eo inquit, quod iueunte morbo facie florenter tuerit atque rosea, quod vitæ munia obiverit inculpate, quod stasis lunis menstrua passa sit, quod nullis tuerit vexata symptomatibus, uti supra notavimus. Atque adeo consequens est aquarum congeriem natura & industria paracentesi exhaustendam fuisse, antequam lethalis Orthopnœa, lunetique viscerum ille marcor fuerint invecta. In illam quippe solentiorum hydropis unam ægrotantis facies inclinata recumbent; nunc enim potiori machina, nulliusque potioris us hydraulici organis tantam tantam licuisset exsiccare: sed sic in satis fuit ut saluberrimum illud Artis Machaoniæ præsidium citam, tutam & jucundam operam allaturum, pertinax & morbo atque refractaria virgo repudiaverit. ex eadem communi actione.

Hydrops à scirrhopartium glandularum.

Anna Buosingerin annorum circiter 17. infellæ & pauperula, pravaque hinc victus ratione usa, in orphanotrophio labori quotidiano vacans, sæpius nostram imploravit operam, conquæta tum de dolore circa fundum ventriculi, & fœtore urinarum, adstantibus valde molesto: Suaviolum pulver. aperitiv. præpar. cum purgante ex sol. sen. cum prunis decoct. Rediit hinc ad pristinam operam. D. 10. Jan. 1681. quum visitatione hebdomadariaungeretur, ægra in lecto accubuit, de ventris intumescencia tenente, appetitu prostrato & artuum inferiorum tumore qualicunque conquæta: præscripta fuit mixtura per coctilem. sumenda. Viribus dementibus, maloque in pejus ruente, cardiaca propinata sunt, usque dum ægra d. 11. Februar. An. ejusd. spiritum Creatori reddidit.

D. insequ. Cadaver aperuimus præsentib. Viris Clariss. D. D. Konig, D. Licent. Speckero & Dn. Ritzio Pharmacopola. Musculis abdominis ex altero latere incisis, ad usque mensuras duas ichoris flavi; subfœtidi, ex cavitæte abdominis vacuavimus, prorumpente magna copia ichoris purulenti ex ore simul & naribus: hinc iisdem ex opposito latere remotis, epiploon putridum non tamen plane absumptum comparuit: intestina quoque non admodum inflata erant, colon tamen colore flavo maxime tinctum: Hepar prægrande satis, & parte cava lividum omnino ostendit vesiculam felleam, bilis crocea subviscida distentam, intra cujus membranarum duplicaturam, prope ductum choledochum, corpus notavimus albicans, scirrhopsum, quod discissum cum inflaremus, tunica exterior, quasi melle spumosa turgida esset, videbatur: Eidem hepatis cavo

illabitur, necesse est serum abdominis in cavitatem venisse defluxisseque e vasis, quæ decurrunt aut sedem habent, inferunturque membris ventre inferioro conclusis, liquidem hic venter undique membranis densis sepitur, & circumcingitur quas aqua non facile præterfluit: Quia ergo omnis motus, vel est ab interno principio, vel ab externo, qui duplex extractio scilicet, & pulsus, atque in abdominis cavitatem nihil quod serum ad se trahat e vasis, exugaturque reperire est, in eam certe cavitatem serum sponte sua e vasis defluit, aut motu pulsus conceptaculis suis expressum extrusumque decidit, & quocunque modo descendit, vel per diapedesin ex occultis tunicarum poris deludavit, vel per anastomosis ex apertis vasorum oscillis defluxit: nam ruptio- nis vel erosionis vasorum nullæ causæ nullaque indicia. In quibus verbis satis apposite Vir Clarissimus ex causis ascytis conjunctis principa- lissimam exposuit: humorem viz. aquosum ex vasis sanguiferis abscedentem & extillantem; cui adjungit Excell. Willsius & ipso cum plures alii Viri Clarissimi, Vasorum lacteorum & lympho- corum præpnis disruptionem, vel etiam ob- structionem aut compressionem, quæ tamen non potius placere videmus aliis, qui fontes hos- ce rarius aperiri, hancque vasorum ruptionem usque demonstrabilem non esse dicunt: Equidem ut super re satis ardua sententiam nostram ex- ponamus, itidem priorem causam pro frequen- tissima admittimus, juxta tamen nondum vide- mus, qui vasculorum lymphaticorum ruptio vel dehiscencia osculorum eorundem ab irridente lymphæ copiosa, aut etiam obstructio à viscida implente ac distendente, aut compressio ab ex- trinsecus incumbente, ac identidem ejus motum sufflaminate prorsus negari possit: quanvis enim denique una cum sero particulas fibrosas ac alias nutritias pauciores extillare posse, gelatinam sive formantes in cadaveribus visibilem, sive sero super prunas posito conspicuam, inde tamen concludi nequit, lymphæ motum pariter impe- dari non posse à tumore partium scirrholo, glandulis vasa lymphica emittentibus pariter ac reci- pientibus infarctis ac obstructis, & lymphæ ista viscidior ac torpidior existente, cujusmodi san- ne est, ubi parilem lentorem ac ad motum ine- pititudinem sanguis ipse possidet: aut dicendum erit, subsistere in partibus glandulisve partes viscidiores, tenuiores vero in vascula dicta jugiter usque recipi: quæ cum ratione & experientia conveniant, dubii hæremus adhuc, videturque absurdi nihil esse, dicere ex vasis lym- phicis in abdomine, hepate & mesenterio con- spicuis, lympham pariter extravasare posse, at- que in hydropibus partialibus illud admittit Celeberr. Ettmullerus: sed ad priorem causam transimus, humorem viz. serosum sanguine co- piose excedentem, cujus causæ variæ secum esse possunt: enim vero vel aquosior sanguis est, & ad dissolvendum aptus, cujus proin particulae aquæ facile in partibus abscedunt ac subsistunt; idem in motu torpidior plerumque est & lentescit, cui supra monuimus, hincque vasa pneumo- nica mole sua opplet pulmonesque, ipsos ponde- roso suo motu gravat, unde hinc plus rimas agunt per quas exudans serum aut etiam lymphæ vi- cinis partibus pleuræ, diaphragmati ac pericar-

dio ipsos sapissime agglutinat, imo frequen- labem una tunestam ipsis attricat cen præten- tes hitoria testantur: atque id dicere necesse habemus, in hydropicorum sectionibus, quas plures citra jactantiam insitipimus, nos usque in organis pneumonicis labem graviolem invenisse, ut persuasi sumus adhuc, in dicta sanguinis diathesi, pari celeritate partibus hisce noxam inuritur aliis usquam: vel in vasis ipsis vitium la- tet, quando oscula ipsorum vel laxiora sunt, aut prius occlusa existunt, suntque hæ causæ prin- cipes quas Clariss. Willis. allegat. cap. 1. sect. 2. Part. 2. de medicamentor. operation. Et certe obstructio vel compressio vasorum, qua sanguinis circulus interrumpitur, non parum in hydropem progignendo valet. Notant alii nobiscum ex ligatis venis jugularibus canes mul- tum aquæ sub cute capitis & mus. ulorum inter- capedinibus passim congestum fuisse, ex sangui- nis arteriosi in venas libero comœatu impe- dito, unde serosa portio facile exuadat & in- ter musculorum interstitia cumulat, alibi- que versus loca declivia decumbit: atque hac ratione hydropes subitanei oriri possunt, ex vasorum in corde conspicuorum occlusionem à polypo vel compressione: Eadem impedimento ansam dant heparis, lienis, mesenterii &c. scirrhi insignes, à quibus comprimuntur subjecta vasa, artusque interiores intumescunt, imo ipsum abdomen ca- vum aquis inundatur: Et quavis ejusmodi tu- mores, vitium sanguinis vel lymphæ jam ar- guant, indeque ad hydropem dispositionem, hinc ipsi tamen malo primum fomentum denique præbere negari nequit: sic in priore hitoria sanguinis torpiditatem ex mala victus ratione contractam atque auctam, tot scirrhis occasio- nem dedisse, imo lymphæ vitium supra notatum produxisse, cum mesenterium totum gelatinæ li- mile probare videtur, apud nos ratum est: id vero insuper rationi consentaneum, ab iisdem cum sanguinis cum lymphæ liberum curritur & recursus sufflammatum ac ita utriusque regur- gitationem atque extravasationem promotam fuisse, coarctato enim sanguini, ut transire quo- quo modo pateat, quod tenue & aquosum est prorumpit, & in vicina loca deponitur, ubi post restitans, atque membranulis interceptum hydatides, cujus in rene sinistro insignis hitoria posterior meminit, gelatinæ similes alicubi edi- cit: Præter scirrhos autem adhuc alia sunt, quæ serum abscedere faciunt, imo supra dictam sanguinis diathesin augere possunt, utque de pe- ctoris pathematibus, aliisque morbis, cetero, hæ- morrhagiis nimis &c. plura non adheciat, us, transpiratio insensilis suppressa, & in primis uri- næ excretio deficiens, frequens hydropis causa sunt, atque hinc est, quod Helmont. Renem cui adæquatum artificem omnis hydropis ascribit, dubiumque non est, quin materia gypsa, qua ren dexter ludimagistri infarctus fuit, huic com- modissimam ansam dederit, M. H. vitio, quod eadem confirmat, non prorsus rejecto: nec potuit duplicata quasi actione seri vacationem promovere Ren alter, cujus papillæ amplo ore hiantes ecquam strenue illud secreverit, pro- bare poterant: nec vasculorum renalium obstru- ctionem nude acensabimus: Regurgitans inde pars aquosa exitialem labem ipsi M. H. in- fert, dum solvi magis crasim ejus, torpescere

motum & laxari vasculorum facit oscula, hincque quia data fere porta, libimet quasi effluxum parit. Id vero apud Eruditos Naturæ Ruspatores ambiguum adhuc esse animadvertimus, negata vasculorum lymphicorum ruptione vel erosione, explicare fontem aquarum tam copiose sæpe in abdominis cavo stabulantium, a quarum limpiditate ac tenuitate ad illorum ruptionem argumentatus fuit Celeberrimus Sylvius: arteria coeliacæ & mesentericæ, harumque propaginum oscilla alicubi aperta, fontem hujus probabiliter facit Clariss. Willis. nec inficias pervicaciter ire possumus: illud vero Artis nostræ statutoribus penicilandum relinquimus, cujus Hippocrates supr. cit. loc. & sub finem præc. §. meminit, annon ex epiplooo huiusque valis aquæ hæc una scaturire possint? enim verò licet ductus aquosos, quos aliqui ipsi attribuunt, nondum credamus, id tamen asseverare possumus, in hydropicorum sectionibus partem hanc vel cioriam & absumptam, vel summe extenuatam putridamq; nos reperisse: Excellentiss. quoque Pejerus in deholio ad historiam hydropici quam method. Historiar. Anato. exhibet, magnam aquæ in ejus abdomine repertæ partem a peritoneo destillasse judicat, siquidem hoc porosum plurimique sanguineis valis distinctum fuerit, quæ hinc natura dilatarit ac multiplicarit, ut hac redundans serum commode exantaret: merentur sane ejusmodi *pancreas* ulterius scrutinium pariter ac attentionem, idque hæc aliorum iudicio submittimus quod superius in histor. hydrocephalici attigimus, annon serum ejusmodi ex meningibus harumq; vasculis æque exundare possit: ut lamellarum cranii in recens natis laxas commissuras, per quas serum facile exudare potest, inquamus: de valis vero lymphicis in cerebro conspicuis, quibus negotium facile abolveretur, nostra ex autopsia, certi quid dicere nondum audemus, aliorum hinc tantisper consenti. *Idem ibidem.*

Ex peripneumonia phthisis & hydrops.

Wilhelm Leybli¹ Lucisvallenensis, 15. circiter annorum, ex orphanotrophio, ubi quotidiano vacabat labori, morbo periculoso decumbens, mense Junio anno 1677. in orphanotrophium, sanitatis, si ita Deo placuerit, recuperandæ ergo, admittus fuit; cum tum temporis adhuc curæ ægrotum vacaremus, vidimus ægrotum, facie ex subatra pallecente, siti ex ætate intensa, pulsu præditum celeri; debili & inæquali, difficultate spirandi pressum, & de sputo sanguineo purulento, cum magna appetitus prostratione, anxie conquerentem: solliciti tum habebamus, cum meliora edocere, neque ab ægro, neque ab adstantibus potuerimus, utrum pleuritidem præcedentem æger passus fuerit, nec ne: Tandem vero cum doloris pungitivi in latere, se velligia ulla unquam sensisse, negaret, contra sputo cruento cum tussi, quod jam purulentum evaserat, ab aliquo tempore vexari confessus fuerit, cum ex peripneumonia phthisicâ jure arbitrati fuimus, hanc præscriptæ portiones vulnerariæ cum decoct. pectorali antiphtis. aliave quæ e re esse videbantur: Verum & hic, quod fieri solet, docta prævaluit arte malum, ægro vitæ hujus miscellæ affli-

ctionibus fesso, spiritum Creatori suo reddente.

Antequam occasionem cadaver lustrandi arriperemus, placuit prius ab Excell. Orphanotrophii tum temporis Medico ordinario isciitari, quoniam morbo primitus affectus fuerit, & quænam symptomata, ipsi adhuc in orphanotrophio degenti, infesta præcipue esse ceperint, qui per alium nos certiores reddidit, se in miscello hoc corpore, jamdudum affectionem scorbuticam metuisse, jamque ab aliquot spemans phthisicam eundem auguratum esse: Quibus ita exploratis operi sectionis nos accinximus, linteamentis, quibus demortuos obvolvimus, honestas suadet & Scriptura imperat, remotis, ventrem infimum tumidum omnino, de quo nec æger conquestus unquam, neq; nos quidquam in ipso animadvertimus, contuiti sumus, unde statim ingentis feri copiarum suspicio mentem nostram neque frustra cepit: Involucris intimi ventris cum epiplooo, quod subputridum erat, ablatis, deprehendimus hepar p. n. omnino magnitudinis, parte cava corruptum & putrescens una cum vesicula fellea, quæ uti in cæteris gelatinam referebat: succus tamen effluens subater erat & lividiusculus, parum spumosus: in hypochond. sinistro lievem deprehendimus tumidum, deni, flaccidum, corruptum, & quoad anteriorem substantiam nigricantem omnino. Pancreas sub ventriculo vidimus maximum, glandulis insignibus & duriusculis superbiens. Mesenterium observavimus gelatinosum plane, maxime quoad extremitates, quibus intestina cingit: gelatinosus hic humor fere intestinalium cellularum anteriorem faciem circumdedit, ipsamque mesenterii substantiam tantopere occupavit, ut difficile fuerit, vel vasa vulgo dicta mesenterica, vel quod plus est glandulas detegere: In ipsa hujus ventris capacitate ingens extitit feri copia, quæ integumentis discissis, quæ data porta fugam dare cepit, non tamen ita foetidum, uti in aliis spirabat odorem: Cætera hujus ventris satis rite habebant. Thoracis examen aggressi, diaphragmate separato, multum aquei humoris, ex thorace effluxit, neque facile fuit pericardium à sterno, cui firmiter cohærebat, abique ruptione separare: In pericardio aquam adhuc copiosam reperimus, quæ autem ruptione facta per viam Thoracis apertam ad inferiora vergebat: Pulmonum lobus uterque putridus erat & corruptus, magis tamen sinister quam dexter, uterque pressus materiam reddebat purulentam. *Idem ibidem.*

Anatome Adolescentis hydropici μεγαλοπνευμον

Anno 1678. mense octobri in Orphanotrophio diem suum obiit adolescens annorum circiter 22. nomine Furler, prociapia rustica oriundus, ex Arthritide vel magis Rheumatismo Asthmaticus & hydropicus factus: hic referente Medico, tum temporis ordinario, per totum vitæ quod traxit curriculum, imbecillioris erat constitutionis, valetudinarius, cumque morbis confictans sapius: Thermas Rheumatismo jam infestatus. Medico invito magis quam volente, invisit, ex quibus autem, si non deterior, melior saltem non rediit: hinc Empirici cujus generis Carnifices & *πνευμον*, plures hoc sæculum

saeculum alit, opem incautus efflagitavit, licet illam parum salubrem senserit: in orphanotrophium ab hoc redux, aliquot ante obitum septimanis d. symptomatibus afflimate & hydropice magis magisque obrui cepit, donec tandem natura pugnae nimietate fatigata, animam ad superiora adspirantem Creatori reddidit.

Aperto cadavere, plurima occurrere memoratu digna. Ante omnia otare licuit copiam aquarum multam, qua ex imo, qua ex medio ventre, summo cum impetu, atque hoc diuturniore erumpentem: hinc apparebant viscera (vulgo *apud veni* dicata) longe maxima: Hepar nimirum Lien & Pancreas sed scirrhusa omnia, alia tamen magis alia minus: In Mesenterio notabilem labem (vel multam gelatinam) animadvertere non licuit, secus ac in aliorum hydropicorum cadaveribus: Renes icidem magni satis, non tamen duri: reddidit interna horum substantia pressa, materiam, quandam puri analogam (quam gelatinosam fuisse arbitramur) Epiploon putredine consumptum erat: Melius Venter discissus exhibuit Pulmones steruo & costis valide adhaerentes ex utraque parte corruptos & putridos. Cor vero longe maximum, quale ac quantum portentum hactenus nec vidimus, nec apud alios legisse meminimus: Continebat illud in circuitu pollices octodecim, longitudine spithamam, & latitudine digitos octo: (Hujus substantia intrinseca fibrosa erat & carnosa, quae ipsi quoque pondus fecit insigne.) Totum cor ultra libras medicas tres pendisse judicatum fuit: uterque ventriculus cum auriculis annexis scatebat concreta materia tenaci, seu polypis & grumis, praecipue autem sinus dexter, e quo hos plena manu haurire licuit.

Confirmat utraque harum historiarum, quae de organis vitalibus ac spiritalibus in hydropicis non raro primario laesis meminimus, enimvero non rejecta sanguinis intemperie, aquositate ac fluiditate, (um in utroque scorbuticam ac rheumaticam dispositionem Medicus ordinarius, pridem tum vidit tum suspicatus sit) labem quam senserint, spirandi difficultas utrumque primo invadens, & in illo sputum sanguinolentum pariter ac purulentum, pulmonesque hinc steruo & costis valide adnati, una cum polypis complurimis in macrocardia hujus stagnantes, oppido satis commonstrant: nec arbitramur ad viscerum nativum vitium, quod in utero matris contraxerint, in eodem necesse esse recurrere, quamvis ordinariam magnitudinem superarint, imprimis cor: si enim proportionem cetera huic respondisse consideramus, insuperque robustissimas fibras, quibus erat instructum perpendimus, magis cogimur in sanguinis viciatam *2. 2. 2.* primariam noxam conjicere, quam ex mala educatione & prava victus ratione contraxisse potest uterque, neque nobis constat, an orthopnoea a prima aetate laborare ceperint: Accedente saepe ex insignibus cordis thalassicis in vasa grandiuscula sanguine ejusmodi aquoso & soluto, non tam gravati inde pulmones fuerunt, quam vero ab eodem per venas pari copia & promptitudine non reiecto, feri portio abscedere, ulterioremque labem pulmonibus sensim inducere potuit, ut lympharum vitium vasculaque, quibus recipitur jam praeteramus: accessit;

extravasanti sero in illo, una cruoris portio non exigua, unde haemoptysis successit, a quibus hinc junctim circa praecordia retentis & subsistentibus, spiritus difficilior redditus, sanguinisque circulus magis adhuc impeditus fuit, pulmonumque cum partibus vicinis adunatio & adnascencia (modo quem supra descripsimus) ulterius promota, & sic malorum lerna aucta fuit, mirumque est feri parum e cavo thoracis, in Furlero dimanasse, in quo materia tenax & polyposa, sensim succrescens & ad ostium venae cavae aggregata, partibus aquosis & cruoris particulis tenuioribus in arteriam propulsis, sanguinis ex cava liberum plenumque ingressum suffaminando, eum fere effectum produxisse potest, quem Excellentiss. Lovverus incanibus ex ligata infra cor venae cavae, prompte satis subsequi vidit, de qua etiam videri potest Clariss. Willsius citat. cap. part. 2. de Medicament. Operationib. fomentum augmentumque non leve deinceps, ex noxa a sanguinis partibus crassioribus & viscidioribus prius illata, hepate lieneque scirrhusis afferentibus, ceterum historias de corde magno qui volet, adeat Sepulchretum Excellentiss. Boneti p. 38. & 594. Idem ibidem.

Hydropis vari Historia.

Ornatissima matrona, Domina Genovesa du Verney Lugdunensis, Uxor Nobilis Viri Joani Claudii Marcellini, Doctoris & Professoris medici Collegio Medd. Lugdun. Aggregati, annos tum nata xxxiii. cum vixisset, quorum xx. in conjugio transegerat, quamvis neque puerperii, neque *2. 2. 2.* ullius, toto illo temporis tractu fecisset periculum: Vitam interim sedentariam agens, ac *2. 2. 2.* jugiter detenta: postquam per duos ante menses praeter praeter, balneo aquae fluvialis intempetive, prurientibus quippe tum itato tempore *2. 2. 2.* se immerisset: cepit mense Octobri anni 1667. animadvertere, tumorem quendam in sinistro hypogastrio sensim subnasci, qui sese postea versus hypogastrium dextrum propagavit, totumque fere spatium, quod ab umbilicali regione deorsum exporrigitur, occupavit. Tumor autem ille mediocriter durus erat ac anodynus cum tensione: quae res aliis persuasit, molam subesse, aliis hydropem uterinum, aliis tumorem frigidum in musculis altioribus abdominis conceptum. Post adhibita varia praesidia tam Chiriatrica quam Pharmacurgica, ad Thermas Vichenses ablegata fuit, ut ibi aquas de Craticula nomine dictas, actum calentes hauriret, & quidem mense Majo anni 1668. abs quarum lympharum usutantum abest ut aliquid acciperet emolumenti, ut potius ab ipsis se deterius habuisse, palam professus fuerit. Quum ergo per annum integrum ab eo tempore domi haesisset, variaque remedia incautum tentasset, adeoque ventrem indies magis ac magis intumescere videret, mense tandem Junii anni 1669. in animum induxit in Burgundiae Ducatum iter capeffere, ad pagum quendam districtus Antissiodorensis, cui nomen Seneley, ut ibi Virum quendam cui nomen *2. 2. 2.* Tour conveniret, quem fama vulgabat omnes affectus p. n. ex sola Uroscopia deprehendere, praeter-

tereaque medicamentis instructum esse ad contumaciores quosvis morbos, ceterisque Medicis insuperabiles eradicandos efficacibus, ita ut Magi potius quam Medici personam merito praeferret. Hujus itaque ardeionis remediis per dies xv. sine ullo fructu usa, Lutetiam Parithorunt se contulit, ubi a compluribus tum Medicis, tum Chirurgis inspecta, qui quo constabat affectum huiusmodi, multo vero minus persanare potuerunt: Parisiis Lugdunum reversa est xv. Decemb. ejusdem anni, graviore quam unquam alias infestata veletudine: abdomen enim adeo rigidum evaserat, ut neque erecta stare, neque decumbere posset, neque somnum capere, neque alvum, nisi clysterum adminiculo, deicere, quos etiam nonnulli egre admittebat: loria pauca reddebat: *κατὰ μὲν* verò quot mensibus periodice ut plurimum fluebant, minori tamen copia quam sanitatis tempore. Per morbi decursum febris, nulla vel *ἐν τῷ* vel idisperato. Totum corpus mire colliquefactum ac extenuatum. Quod vero apprimè notari meretur, etiam si intra ventris inferioris capacitatem ingens subisset aquarum proventus, neque femora, neque crura, neque pedes tumorem illum unquam conceperunt, cum reliquum corpus præter ventrem mire intubuerat. Abdomen ipsius, quod ante iter Parisiense, tumorem unicum præferebat ab umbilicali regione deorsum, etiam si vel tunc sublesta rudimenta tumoris in hypochondrio dextro, præsto forent, duos tumores ab invicem discretos post reditum ab Urbe manifeste spectandos exhibuit: unum obsidentem universum hypochondrium dextrum, quique ad latitudinem transversorum duum digitorum supra costas spurias inequitabat, mollis atque fluctuans: alterum vero obsidentem totam sinistri hypogastrii regionem, qui remittentior aliquanto duriorque erat hypochondrii dextri tumore. Inter geminos hosce tumores observare erat interititium quoddam vacuum, aut quasi sulcum, quo ab invicem dirimebantur ad latitudinem transversorum duum digitorum, quodque protendebatur oblique ab hypochondrio dextro, supra umbilicum progrediendo, versus partem aqualiculi sinistram. Duo isti tumores speciem mantice quodammodo effingebant, parte utraque extrema propendula laburrata, parte vero intermedia quæ cervicibus imponitur, inani. Circa regionem Renis dextri tumor quidam circumscriptus observabatur, atheromatosis ejusdem generis æmulans. Post varias tam Medicorum quam Chirurgorum *ἐπεμβάσεις*, conclusum fuit, Paracentesin hanc celebrandam, aliis consentibus inchoandam à tumore hypochondrii dextri, aliis à tumore hypogastrii. A quo posteriore tandem decretum ut inciperetur, propterea quod si forte tumor superior communionem haberet cum inferiore, hunc ipsum vacuificando, alterum etiam illum eadem opera contingeret evacuari, ita ut nova apertione minime opus foret. Cauticus itaque lapillus, pisi unius mole, admotus fuit regioni laterali mediæ hypogastrii sinistri. Eschura facta incisa fuit. Postmodum cannula in extremo suo punctata, ad magnitudinem pennæ anserinæ, longitudinis vero, trium transversorum digitorum, pa-

ratus fuit in capacitatem subjectam intromissus: tuncq; e vestigio prorupit aqua lixivii colore, & quidem tanto impetu, ut unico tere momento duas scutellas adimpleverit. Tertia vice educta fuisse $\frac{3}{4}$ xxi. & diversis vicibus plusquam cxi. $\frac{3}{4}$. Aqua primum prodeunt ultimus vicibus limpida, sub finem vero enatis, albicans, mucilaginis instar viscida, & caulium putridorum odore prædita apparuit. Ex vulnere manavit pus album, quod ex abscessu intimo sinu procedebat per paracentesin inflicto, licet profundi plerisque pinaretur ab externis incisionis oris. Tertia vel quarta die post apertionem, nihil amplius, aut nimium saltem aquæ ex vulnere ipso effluebat, eo quod Cannula alium situm sibi compararat, neque amplius ad perpendicularum, quemadmodum ab initio, vergebat, nactone videlicet deorsum converso, propter pondus inigne tumoris alterius in dextro hypochondrio consistentis, qui mole quidem nullo modo fuerat diminutus, ceterum qui tum nonnullus, propter evacuationem aquæ abdomine contentæ, supra quam prius innatabat, subfederat. Atque luciple tumor in caula erat, quod aqua non amplius per aperturam effundebatur, cum vicem repaguli præstaret, emissionem coercens, etiam si plusquam sex pintæ liquoris in abdominis capacitatem adhuc forent superfluites, sicut post mortem in cadaveris apertione ad oculum patuit. Porro cum animadverteretur, ne gry quidem aqua amplius exstillare, consilium ceptum est, similem apertionem instituendi in hypochondrio dextro: qua facta, non minori impetu ac in priore paracentesi profiliit aqua, sed nigra, non secus ac si iungo camini aqua simplici diluta fuisset. Agra autem mox languidior nonnullus evasit, & febris increvit, propterea quæ ea die à nova evacuatione satius visum fuit abstinere. Postridie evacuatio parca manu denuo tentata. Tertia die mortem oppetiit, Kal. videlicet Maii, anni 1670. hora sesquiquarta pomerid. annos tum nata xxxvi. menses II. dies. xv. Eodem die hora noctis decima, cadaver ad apertum fuit, per Henricum Charavel Magistrum Chirurgiæ Juratum, coram Dominis Petro Garnier Collegii medici Decano, Andrea Falconet, Medico Regio, & Joanne de Rhodes, Doctore med. Aggregato, nec non presentibus Antonio de la Forell, Philiberto Cochaud & Antonio Verdelet, Magistris Chirurgiæ Juratis: qua in cadaveris apertura sequentia fuisse deprehensa.

Mox ab obitu totum abdomen mirifice intumuit. Per scissuram primo loco inflictam in hypogastrio pus effluebat. Per alteram vero secundo loco in hypochondrio dextro factam aqua nigra manabat. Remotis artificiose abdominalis integumentis musculisque peritonæo, obvia fuit facta ingens ampulla rotunda aqua nigra semiplena, duarum vel trium ipsius pintaarum capax, cujus adhuc pinta una præsto erat. Hæc autem ampulla fuit molis & figuræ, qualis magna cucurbita rotunda, incumbens inter sinis omnibus lateris dextri, hepatis atque regioni renis dextri, quæ omnia obumbrabat: hæcque ipsa ampulla tumorem illum circumscriptum ad transversorum duum digitorum latitudinem

richnem supra spurias costas eminentem efflin-
gebat. Huic ampullæ ren dexter vehit iunctus
involuerat basi sua admodum lata, & qui à situ
suo naturali luxatus apparebat: quin imo is ip-
se Ren erat, qui in regione renis dextri, athero-
matis speciem falso spectatoribus repræsentabat.
Et sane Ren iste molliculus erat, aquaque lim-
pida gravidus, atque intra hunc ipsum latebat
venica aqua plena, mole & figura, quales sunt
vesicæ quæ in corporibus occurrere solent: In-
super etiam hydatides complures, singula nu-
cis juglandis mole, adnexæ viscebantur ampullæ
modo dictæ. Ren sinistèr colliquefactus erat ac
fusus. Magna illa ampulla delinebat in modum
utricularis tibiæ, in partem dextram supe-
riorem ac lateralem corporis uterini. Ampulla
ista sublata, Hepar, quod scirrholum exstima-
batur, nonnihil albidum ac decolor duntaxat ap-
paruit, nequaquam tamen admodum viciatum
in propria substantia. Lien suo modo parvis
erat fere conditionis ac Hepar. Quo ut ut credi-
bile sit, Hydropem quo detinebatur patiens,
oriundum potius fuisse a vitio renum debili-
um ac labefactorum, quam à vitio vel hepatis vel
lienis. Epiploon subflavum erat ac pene con-
sumtum, infimo hypogastrio affixum. Omnes
mesaræ glandulæ erant scirrholæ. Pulmones
utriusque maridi, nigrisque maculis respersi.
Cor parvum, ac sanum. His perlustratis, ad hy-
pogastrium perrectum est, ubi tumor valde ini-
guis comparuit, cuius tunica erat crassitie di-
gitum transveris. Erat hic tumor infiltratus in-
testinis, & ossi sinistèro ilium, ad longitudinem
& latitudinem manus humanæ: intra quem tu-
morem, multum adhuc puris continebatur,
præter illud quod tam in abdominis capacitatem
effusum fuerat, quam quod per foramen para-
centesi eo loco factum, effluerat. Hic autem
tumor delinebat etiam in modum tibiæ utricula-
ris, in partem sinistram superiorem ac lateralem
corporis matricis. Chirurgus initio adstantibus
persuadere utebatur, ingentem ampullam la-
teris dextri esse ipsumque uterum; alteram vero
quæquæ parte sinistram hypogastrii sita erat, es-
se Vesicam. Verum enimvero cum per totum
morbi decursum, nulla puris indicia in urinis
observata fuissent, hæc res impulit adstantes,
ut majori cum ~~astutia~~ ^{astutia} investigare sibi propone-
rent, undenam duo isti tumores ortum duce-
rent: quod ut melius nosceretur, totus pudoris
sinus facto abo rincto externo initio, dissectus
fuit ad uterum usque, qui in puellabus & infemi-
nis, quæ neque tactus, neque ~~adiposus~~ ^{adiposus} ulla
protulerunt, exiguus esse solet. Quapropter
cum ad Uteri corpus deventum esset, quod mo-
le & figura pyrami nostratibus dictum telum,
æquabat, occurrit totum illud uteri corpus,
sanum atque integrum. Postremo ~~abscissa~~ ^{abscissa} cun-
ctos satis superque erudit, duos hosce tumo-
res procedere ex Cornubus uteri, quæ vulgo ute-
ri Tubæ nuncupantur: unum scilicet ex Tuba dex-
tra, puta illum qui hypochondrium dextrum
occupabat: alterum, ex Tuba sinistram, nimi-
rum qui in hypogastrio sedem sumserat. Qui po-
sterior tumor, imam Hypogastrii regionem
obsederat, tam propter propriæ substantiæ pon-
dus, quam propter materiæ, quæ scatebat, gra-
vitatem, adeoque in sublime non evehatur,
quemadmodum tumor Hypochondrii dextri,

qui supra aquas innatabat: Præter enim aquam il-
lam, quæ per duo foramina pertusione facta
profluerat, plusquam sex pintæ ipsius inventæ
sunt intra abdominis capacitatem adhuc resta-
gnantes. Per hanc portio Cadaveris resectionem
notari facile potuit, utrumque tumorem ope
Cannulæ probe perforatum ac penetratum fuisse.
Et sane Tumor uterque per sectionem admi-
nistratam, perque patens illac vulnus materiei
intus contentæ portionem evomuerat: imo de-
cepti fueramus omnes, quoad materiam ex tu-
more hypogastrii eructatam: Cum enim Puris
plurimum per vulnus inflictum profunderetur,
illud ipsum suppurationi vulneratæ partis per-
peram a nobis tribuebatur, cum debuissimus il-
lud apertioni interni abscessus, unde unice
promanabant, imputare. *Idem ibidem de com-
municatione Excellentiss. Sponsi Patris.*

Hydrops ovarii muliebri &c.

Rustica quadraginta & quod excurrit an-
norum, paupercula & ponderoso oneri feren-
do allucta, ante triennium circiter dolorem
perferentem cepit, pone articulationem femo-
ris sinistri cum scchio, gravidamque juxta se es-
se arbitrata fuit: deficientibus mentiris dolores
hi increbuerunt, cum femoris pedisque fini-
stri atrophia: Ab isto tempore difficulter in-
cedere potuit, & nonnisi baculo suffulta, quin
immo, cum ob pauperiem mali rationem se-
gnius haberet, dorso amplius incumbere ne-
quit: An. 1683. cum à Pastore loci rogare-
mur, ut misellam hanc inviseremus, vidimus pe-
dem sinistrum citra sensum fere motumque gra-
viter intumuisse, manentibus undique digito-
rum vestigiis, ægraque de dolore enormi cir-
citer lumborum vertebrae & ossis innominati
regionem, eoque lancinante conquerente,
quibus accessit, urinandi difficultas, ut non
absque dolore mingeret. Variatum qua exter-
ne ad lymphæ viscidæ lancinantis solutionem,
qua interne ad ejusdem serique subsistentis at-
tenuationem & vacuationem præscripta reme-
dia, sed absque feliciore successu: tandem ad
scarificationem in pede imo devenimus, qua
multa aquarum copia educta fuit, pesque to-
tus detumuit: cum tamen hoc in statu non
perstitit, quin facta nova stagnatione, exseri cum
sanguine accedentis extravasatione, lymphæq;
in suis vasis subsistentia, immane quantum
intumesceret, cui scarificatione profundiore
non saltem hic sed parte etiam superiore itera-
ta occurrimus, aquæque copiosissime iterum edu-
ctæ, non neglectis interim mediis internis & ex-
ternis: Fonticulus quoque pedi dicto inustus, cum
ex quo aquæ continuo manare possint: ann.
1684. intra musculos femoris vastos, tumor
conspiciebatur digitis cedens, & folliculo
quasi inclusus, e quo inciso manu Chirurgi
materia primum viscidis acerrima, inde piscium
ovis similis, tandem ichorosa fortens profluxit:
specillo immisso ad inguen usque pervenit Chi-
rurgus, ut de sinu profundiore in cavum abdo-
minis pergente non dubitaverimus: interea in-
jectionibus certatum ex vulnerar. balsam. deter-
gentib. ac putredini resistentibus: Parte inferio-
re, femori magis adversa, tumor alius deinceps

prodiit insignis, ut priore tantisper relicto, ad hujus apertionem necessario progrediendum fuerit, qui apertus ichorem acerrimum fudit, simulque sinum ostendit, pone os Ischium versus sacrum & lumborum vertebrae pergentem, cui itidem convenientibus obviam ivimus, quibus tamen nihil magnopere effecimus, quin in deterius labente corpufculo, viribus exhaustis placides expiraret d. 7. Jun. 1684.

Cadaver lustravimus postridie presentibus Vir Nobiliss. D. D. Schorkopf. Hildes. D. D. Nabelio Heidelb. & D. Cand. Kartschero Brig. Siles. Chirurgisque aliquot e vicinia: Antequam abdomen incideremus, in hypogastrio tumorem renitentem animadvertimus, ad cujus examen ilico perrectum, separatis undique integumentis & peritonzo rescisso: Tum vero in pelvi ovum prominuit, aqua limpidissima subfusa, parum foetente ad 3xviii. prorsus distentum, quod totam illam regionem opplebat, vasis elegantibus donatum, a quo aliquantum remoto uterus inferius pendebat, densus crassusque, & ad latus dextrum ovarium marcidum, superius autem abscondita prodiit vesica urinae receptaculum: Inde cum ovum illud accuratius pervestigarem, vidimus secundum ipsius medium expandi oviductum cum extremitate sua foliacea, nullo alio ovari comparente vestigio, ceu curiosis etiamnum demonstrare possumus: Epiploon pene consumptum erat: Hepar & lien semiputrida: Mesenterii glandulae duriusculae fuerunt, & pancreatis facile atteri poterant: Renes flaccidi & in sinistro conspicuae protuberantiae aliquot, cujusmodi glandulosae in intestinis quandoque observari solent, quae cultello incisa, glandulas corticales cum fibrarum ductibus egregie ostenderunt: Thorax apertus pulmones non quidem adnatos sed putridos exhibuit, punctulis nigricantibus innumere maculatos: Pericardii liquor modicus, sed cor quoad externam superficiem quasi erosum, in cujus auricula & ventriculo dextris sanguis grumulosus cum polypis multus haesit: Interna vero substantia tota corrupta fuit & flaccida: Os ilium parte anteriore perforatum fuit & nigricabat, effluente ichore, a quo stylus argenteus in abdominis cavum immixtus mox arrosus fuit, quod a sanie a lumborum vertebrae & osse innominato versus inferiorem femoris partem secundum musculorum ductum dimanante, pariter evenit. *Idem ibidem*

De atrophia quidam propalandi nobis haec occasio subnaecitur, quam in universalem marasmodum dictam & particularem Practici distinguunt, hancque ipsa rariorem uno fere ore pronuntiant, cujusmodi exemplum illustre, aliquando proluxius sistemus, atrophiae viz. ossis coccygis, ex violenta Venere contractae, facta profusione & jactura spirituum animalium, simulque accedente nervulorum compressione in fistula ossis sacri, a lymphae extravasata & in mucum concreta, quam forte succum nervosum alii interpretabuntur, de quo autem fusius haec ducere non constituimus: sufficit atrophiam ut plurimum morbum vel organicum agnoscere, nervorum compressionem, aut etiam coangustationem vel obstructionem, vel intemperici, M. H. nempe talem vitiacionem, qua particulis ad nutriendum aptis illa destituitur, sive jam vi-

cus vicio illae suppeditari nequeant, sive partium chylicationi ejusdemque distributioni destinatarum labe non accedant: fere autem spiritus animalis in causa esse solet varie dicens: enim vero cum alimentarium particularum secretionem, tum earundem aggregationem, sua praesentia egregie promovere elatere suo, vel tubulorum in partibus nutriendis communis conservando ac fovendo, imo ipsissimas Massae particulas in blanda dulcedine sustentando, qua disperente sibi relictas aciores fiunt, fibrillatque nerveas vellicando atrocissimo dolori, qui in atrophia perferentiscitur, occasionem dant: Quod nervos obstruit, vel comprimit serum est vel lymphae, aut etiam sanguinis grumelcentis portio, perreptant siquidem minutae arteriolae vertebrarum propagines spinalem medullam, e quarum oscillis, casu potissimum vel ab alia causa externa vehementiore sanguis quandoque excutitur, ibidemque subsistendo grumescit, ceu superius in artuum inferiorum *atrophiam* innuere cepimus cepimus, lympham vero lentescentem sive in vasis, compressione ipsius motu impedito, live extra vasa, uno alterove ipsorum rupto, nobis persuadet autopsia, qua in foetibus vitulinis abortivis insine spinalis medullae interdum vesiculam lymphae plenam invenimus, observavitque idem in foetibus ovillis Excellentiss. Wepferus: saepe enim videntur nervi coangustari videntur, imprimis in iis qui incurvati incedunt, ponderosaeque molis ferendae assueti sunt, & interdum distorqueri, sicque spirituum influxui via praeccludi: Id haec decidendum videtur, quod spiritus animalis absentia ex compressione nervi hic accusari possit, cum tamen sensu omni pars non careat, id quod etiam in paralyti notamus, in qua pars quidem motu sed non sensu destituitur: sunt qui hoc expediunt distinctione inter nervos sensorios & motores, illos in paralyti salvos volunt, hos non item. Nobis distinctione hac non rejecta, cum multo major copia spirituum requiratur pro motu, quam vero pro sensu in anima ciendo, videtur sive unica fibrilla nervea superfluitate rationem facile dari posse, cur sensu pars adhuc gaudeat, cum e contra nec una nec duae pro motu conservando sufficiant, id est, quod fibrillae in membranas tenuissimas abeunt, usque saltem superant, principio etiam a quo ortae sunt, gravius non laeso: Quicquid sit in Rustica nostra & coangustari e lumborum vertebrae, vicinisque ossibus ad musculos cum his tum femori pedique incumbentes transeuntis nervi potuerunt, & comprimi a coagulata & subsistente lymphae, quod malum haud dubie causa externa, gravis viz. ponderis sub quo incurvata incessit gestatio frequens produxit, accessit dehinc mala vicius ratio, ob quam sanguis torpidior viscidiorque generatus, mensura subsistere fecit, sentimque reliquorum symptomatum proventum adjuvit, nempe ab haerente lymphae acriedine sua vellicante, dolores circa ischium & in lumbis primi pullularunt, maloque sensim radicato, deficiente spirituum influxu, partes vicinae, femur praecipue cum pede nutrimento defraudari ceperunt: accessit motus impotentia, unde sanguinis lymphaeque circulus magis sustinatus fuit, serumque a cruore usque non volatili & balsamico abscedere & una cum illa subsisten-

do, tam gravem intumescantiam parere cepit, particulis ejusdem aculeatis, (de quarum corrolivo genio macula in pulmonibus, cordisque superficies in histor. descripta testimonium perhibent) cum subinde membranas fibrilque vellicarent, dolorem non exiguum inferentibus: accessit primum ob nervorum continuitatem, dolore circa lumbos urgente, mingendi difficultas qua cum dolore lotium excrevit: Medicamentis variis malo succurrere annisi sumus, sed in casum, quod cum lymphâ incorrigibilem lentorem tum nervi graviores labem contraxerant: & quavis scarificatione aquæ copiosissimeeductæ sint, primaria tamen causa non ablata, diuvisum idem ilico iteravit, imo fenur ipsum petiit, collectis particulis serietiam in abdomine acerrimis viridescantibus, ossaque ipsa erodentibus, de cujus aciditate summa styius argenteus immixtus ilicoque artrosus testari potest, particulis ramolis ac ad motum minus aptis, invicem coherentibus, libique ita complicitis ovula illa piscium, particulis magis ramosis ad latera protrusis constituentibus, e cujusmodi etiam particularum similium congerie materiam lacti coagulato similem protulisse vidimus: scilicet e poris arteriarum distortis ac ampliatis, quandoque etiam ex his, cruor serosus aliisque particulis variis pragnans prosiluit, quæ deinceps sive folliculo includatur, particulis dictis ad latera secedentibus, ibidemque invicem conglobatis reliquas involventibus, aut libere stagnat inter musculorum interstitia, reliqua sui parte per venas utcumque remeante. De hydropo ovarii muliebri, quem primum in hac femina contuiti sumus, Clariss. D. D. Schorkopf, in Dissertat. Inaugural. hac ipsa occasione erudite scripsit, eandemque exemplis à Celeberrimo Wepfero communicatis illustravit, ut necesse non sit pluribus super istum commentari: Confirmavit nobis ille ovarii structuram à Malpighio, Graetio, Vir Celeberr. aliisque studiose sub cultrum vocatam & detectam, quam in animantibus brutis sapiusculè rimati fuimus: Elegantes sane sunt vasorum plexus, qui ovarium undique investunt, & notatu dignissima vasculorum minimorum expansio, quibus ipsa ovula, perreptari deprehendimus, una cum fibrillarum, seu mavis, tubulorum subtilissimorum serie, quorum ope ex his materia congrua, pro ovi maturatione jugiter secernitur, quibulve vel obstructis aut compressis aliterque lassis, ut viam liquori secernendo negent, sterilitas subsequitur, ruptis vero laceratisve à seri extravasantis vel lymphæ stagnantis, aut e vasculis suis ruptis, exundantis copia, hydropi dicto via sternitur, de quo ille prolixius: Id modo heic addimus vasorum copiam atque implicationem, qua in ovario qua oviductu & tuba conspicuam, una cum aquarum undis considerantibus ac perpendicularibus, verisimile fieri, serum ex vasorum sanguiferorum osculis copiose abscedens & collectum pari frequentia affectum hunc producere, ac lympham e suis canaliculis extillantem. *Idem ibidem.*

Historia Hydropis memorabilis.

Die 20. Martii, anni 1681. hora prima po-

merid. deuata est Ludg. Gallor. honestissima matrona, Mauricii Avinani Sartoris Vxor, annos nata Lx. quæ valetudine satis commoda usæ fuerat ad annum usque ætatis unde quinquagesimum, quo toto temporis tractu sedecim omnino liberos, toridem diversis puerperiis mater evexit, quanquam ex isto foetuum numero duo fuerint abortivi: postremum tamen puerperium laudabile admodum fuit. Anno itaque unde quinquagesimo ætatis, tertio aut quarto mense postquam periodica & ægæ exulassent, tumor quidam internus pusillus cepit in regione hypogastrica suboriri, qui paulatim ad extremum usque vitæ diem ultra modum increpescens, omnes rei confcios varia in ratiocinia merito pertraxit, etiam si ipsarum nullus verum scopum visus sit attingisse, suisve conjecturis assequi potuerit tam prodigialem Naturæ molitionem. Tumor porro ille sensim augescens, intolerabilis demum evasit, tam ratione molis quam ponderis insolentis, adeo ut cili non prius lectulo plane affixa fuerit muliereula, quam per tres ante mortem septimanas, ædibus tamen pedem efferre aut in publicum prodire, toto fere postremum vixit anni spatio nequiverit, donec Parca tandem ægrotanti finem ærumnarum fecit, eo ipso quod statim ab initio indicavimus tempore. Tunc itaque Chirurgus familiaris de Cadaveris apertione consilium cepit, ut causæ morbificæ morbi que natura palam oculis usurpari posset. Cadaver ergo mensæ impositum, spectaculum adstantibus exhibuit plane portentosum, propter miram ac enormem totius ventris inferioris struicem ac elationem, quam filo dimetri primo visum fuit, antequam cultro tentaretur apertio, dimentionum quibus constabat explorandarum gratia. Quare producto à cartilagine xiphoide ad os usque pubis supra umbilici regionem filo, eodemque similiter à transversis apophysibus spondylorum lumbarium unius lateris ulque ad apophyses transversas prædictor. spondyl. alterius, lateris rîdè supra umbilici regionem protracto, eandem mensuram dari innotuit, puta quinquipedum utrobique: unde Geometra peritus non difficulter capacitatis subditæ amplitudinem collegerit. Ut autem partium interiorum ~~mi-~~ liquido patesceret, oportuisset cautius procedere, quam factum est à præcipiti chirurgo, qui citra ullam ~~modestiam~~ repente scalpellum in partem inferiorem hypochondrii dextri alte impegit: qua perturbatione facta extemplo incredibili quodam impetu liquor inde prorumpere cepit, nullo penitus fœtore præditus, colore suberuento, qualis fere esse solet vini vappescentis, & quidem tanta copia, ut sex urceos ad minus repleverit universos: quæ quantitas collectum sumta ad libras præterpropter centum & quadraginta adscenderet, habita consistentiæ materiæ ratione, quæ tum lotio, tum sero hydropum ascitarum aliquanto spissior erat. Hoc pacto ubi detinuisse venter inferior, mox apertio ipsius instituta fuit à medico præsentem, nimirum ab cartilagine xiphoide ad os pubis tendendo, nec non altera sectio transversalis etiam adhibita. Quo facto, atque ipsa cavitate sic abunde reserata, nihil protinus in conspectum se exhibuit quàm membrana validissima unis-

mis, quæ visceribus universis in abdomine sitis superstrata, ipsa obumbrabat, & quæ hinc inde ipsis adhærescebat, videl. ad cartilagineam xiphoidem, costas spurias, epiploon, ventriculum, ac peritoneum fere totum, parte saltem superiore, unde fibræ innumera huic membrana suppeditebantur, quæ fibræ totidem erant minuta vascula succi nutritii vectricia, unde robustior, durior & spissior reddebatur quam peritonæum vel etiam duplicatum. Nec difficile admodum fuit, membranam istam utriusformem ab omnibus vicinis partibus sine ulla laceratione liberare: præterquam a Tuba uteri sinistra, cum qua continuitatem habere manifeste constitit; adde quod specillo subtilissimo ductum satis evidentem deprehendere licuit, ab ista imi sacci cavitate in ipsum usque uteri corpus pervium, qui ipse uterus solito crassior erat, ac nonnihil scirrhusus: unde conjectari fas est, ~~non~~ adeo vastam nil aliud fuisse, quam Tubæ illius sinistra dilatationem, cuius Tubæ extremitas limbriata testiculum vel si mavis, ovarium sinistrum amplexans ac obvelans, initio quidem hydatidum quarundam iis in partibus non infrequentium ~~causam~~ excepit, quas ipsas hydatidas nihil aliud esse quam vasorum lymphaticorum dilatationes, credibile est. Observandum autem heic venit, I. Tumorem hunc pedetentini, sine sensu doloris, ac citra omnem inflammationem pullulasse ac incrementa sortitum esse. II. Quum auctor evaderet tumor, ægram suæ Evexiæ partem demum amisisse, neque tamen vel crurum vel fomerum ullo turgore affectam fuisse, qualis in hyderis subnascentibus alias notati solet. III. Quod statim a prima mali generis serum quoddam per assiduam quasi exudationem (nequaquam vero per fluxum periodicum) ~~causam~~ exillavit, & quidem serum ejusdem plane coloris, ac in cavitate illa longe amplissima stagnabundum. IV. Quod nullo pravo odore prædita erat materia illa stagnans. Testiculus porro sinister, sive ovarium, mole sua æquabat majusculum gallinæ ovum, in quo hydatides numerosæ, satis insignes probe distinctæ apparebant, in unum veluti globum coactæ, sed varia materia refertæ, alix quidem liquore lymphatico limbo & glutinoso, alix magis concocto & albidior. Testiculus vero totus Tubæ uterinæ tunica vestiebatur, quæ ipsum superius plane amiciebat, & continebat, imo etiam per semipedis spatium altius quam situs ipsius naturalis postulabat. Dextra uterituba, ut & testiculus ejusdem lateris naturali plane modo visabantur constituta sacco illo ingente undique remoto, partes omnes abdominis comparuerunt satis bene constitutæ, sed sursum à prædicto utre propulsæ. Pancreas tamen perfectè scirrhusum erat. In exteriori abdominis regione observatum quoque hypogastrii dextri partem versus os pubis inguen item dextrum, & pudendi totius dextram partem, gangranosi affectas esse. Crus quoque dextrum, postquam per viii. aut x. dies ante mortem quasi ~~id~~ intumuerat, gangrena correptum fuerat per quinque duntaxat aut sex ante obitum hotulas. Quæ partium dextrarum gangrenosis non aliunde profecta fuisse videtur, quam à pondere immani prædicti utris tantopere

infarti, quod partes dextras forte magis comprimens, quam sinistras, liberum nectaris vicini appulsus ad partes illas intercipiebat, ut proinde præ hujus ipsius defectu corruptionem sentire coactæ fuerint. Aperto thorace, pulmones tori nigri, propter prægressam phlogosin, animadversilucere, quin & ad latus sinistrum pleuræ pertinaciter agglutinati & adhærentes erant, ut sine laceratione inde avelli minime potuerint. Nec mirum, cum Diaphragma ab utris supra memorati inulitata magnitudine ac fœtura tam violenter sursum versus protruderetur, ut præ angustia thoraci conciliata, liberatis perquam ~~motu~~ pulmonum relinqueretur. Cor aliæque partes circum vicina nulla ~~aliorum~~ noxæ vestigia præferbant Idem ibidem ex communicatione excellentissi. Sponii Patris.

De Aqua hydropica, in peritonæi duplicatura, in muliere.

Quis Medicorum conjecturalem esse artem medicam negabit, qui quotidiana experientia incertitudinis plurimum eam possidere dicit.

Experientia fallax, judicium difficile Hippocrati Aphor. i. sect. 1. habetur, imo nullam artem minus constantem inveniri magisque variabilem Medicina Plinius addit.

Incertitudinis hujus, mutabilitatisve variæ, causam inveire haud licet, præter partium plurimarum occultos situs, naturæ lusus varios, humorum spirituumque miscelas diversas, unde actiones corporis integre læsæ.

25. Mensis Januarii Anni 1651. aperuimus cadaver Dinæ Nicolai Thovelings, quæ uxor fuerat Pictoris apud nos celeberrimi Goverd. Hinkii, jam a primis annis ventris laboraverat, cum tensione gravi, intumescencia magna, quæ tamen circa pubertatis tempora, ætatis nempe annum 13 aut 14. mirum in modum increvit. Menstruorum fluxus non nisi bis, isque parvus valde observatus, ventre eo tempore leviter subsidente. Nec tamen molestus hic ventris tumor, quo minus matrimonii molestias subiret, impedire potuit; nupsit viro nominato, gravida infantem peperit, at sine ulla ventris detumescencia.

Varia ad sublationem tumoris hujus usurpata media, variæ institutæ medicorum, Chirurgorumve, consultationes, at irritus omnis labor; causam in aliud conjicere non licebat, quam sententiarum de vero morbi origine, & eaque affecta parte, diversitatem. Fuerunt enim qui Fungos divisos ventris dictæ extensioni ansam præbere statuerent; placuit aliis Atheromatum fasciculos mali causam dicere; Vesiculas plurimas pituita repletas hic hæcere varii asserere ausi fuerunt. Imo, nec defuerunt, qui Molam adellæ suspicarentur.

Præcipua Medicorum, Chirurgorumve, in consilium adhibitorum, pars, aquam ventre conclusam in interstitiis viscerum hærentem, causam esse habendam voluit. Clar. Walzo Medicinæ apud Leidenses Professori probabile omnino videbatur (nec, sententiam hanc mutaret, ullis rationibus induci potuit) ferosum humorem sensim ad peritonæi duplicaturam destillasse, ubi, collectione facta, tumorem produxit enormem.

Magni hujus Medici sententia quam verâ certaque fuerit antequam demonstramus, considerari meretur, brevissimo temporis spatio, octo nempe dierum, in eam molem ventris tumorem fuisse auctum, ut tres partes accesserint, ad digiti transversî latitudinem ventrem incrementum, impossibile omnino dixisses, siquidem eum intueri concessum fuisset.

Addo, quod admirationem omnem superat, agilem eam adeo fuisse, atque in motu celerem, ut nihil non, domestica officia spectans, currendo, stando, laborando, efficere valeret; paucis ante mortem diebus, referente marito, curram clivensem ascendere, descendereque sine ulla molestia potuit.

Miseram tamen nostram interea temporis, quæcunque etiam adhiberentur media, ventrem magis magisque intumescere percipiens, tandem doloris gravitate quam maxime debilitata, quod nec sedere nec stare, sed manibus pedibusque reperere cogeretur, in lecto decumbere coacta est, in quo vitam finire debuit, deo opt. max. animam, nobis, causam gravissimam hujus morbi inquirendi gratia, corpus, concessit.

In cadavere primo cutem cultelli acie circa umbilicum, (quam fere cartilagineam reperiebamus) dileximus, & aqua limpida minime fetentis quantitas centum & viginti quinque librarum effluxit.

Educta aqua, saccum, quem hæcenus ignorabamus peritonæum esse, ex quo liquor dictus effluerat, in partes quatuor, cruciati sectione, dividimus, cujus fundum materia impura, lentæque obductum invenimus; rei novitatem admirabamur, qui pervenisse nos in ventris cavitatem putabamus, nihil viscerum reperiebamus, peritonæum cuti unitum in eam magnitudinem extendi posse, qualis nobis occurrebat, nunquam admisissimus, nisi oculis nostris in sequentibus fuisset exhibitum.

Partem adeoque peritonæi superiorem, circa mucronatam cartilagineam, costæque notas separare aggressi sumus, quo facto in conspectum venire hepar, ventriculus, intestina aliæque viscera, integra, & bene constituta, præterquam quod intestinum colon plus justo contortum.

Uterus insuper sinistro latere bene se habebat, similiter ac Tuba Fallopiana, Vas deferens, Testiculusque sinister, quæ tamen partes omnes magnitudinis crassicieque erant excedentis.

Lateris dextri Testiculus deficiebat. Vas deferens & arteria (per quam menstruum excernitur sanguis in non gravidis) alieno detinebantur loco, in ipsius enim peritonæi duplicaturam deferebantur, quam pererrabant simili omnino modo ac ureteres vesicam urinariam, in quam etiam, sine dubio, sanguinem, imperfectumque semen, deduxerunt, materiam tumoris supra declarati.

Sanguinem menstruum per arterias in saccum hunc fuisse deductum inter alia demonstrare videtur, quod, imminente tempore menstruationis, quavis vice, ventris intumescencia fuerit aucta.

Hiscæ sic consideratis, inquirere aliquis posset, quomodo menses, qui statis temporibus

fluunt, aquam fere claram potuerunt producere? camque ad aliquot librarum pondus? Ad hoc quæsitum dicimus, verosimile nobis neutiquam haberi, sanguinem menstruum limpida aqua materiam præbere, quin potius fortentem ex eo produci liquorem censeamus. At vero aquam hic collectam ex parte etiam ex uretere dextro & rene descendente ad vesicam urinariam exiisse, judicamus. Ductum enim hunc errore naturæ, ad duplicaturam peritonæi, cum arteria spermatica, & ductu cæco s. Tuba uterina transiisse, per anatonem notavimus.

Et ne dissectionis nostræ opera veritas sententiæ Cl. Dn. Joannis Walaî detecta, imò etiam paracenteseos in ægrotantē hac & facilitas, & utilitas, quam idem Walaus, cum Medico nocomitii nostri Dn. Samuele Coltero valde commendaverat. *Job. & Mackgeln in Observat. Medico-Chirurgicæ.*

Hydrops gravis.

Christianus Friderici Holsatus 2. Octobr. an. 1659. apothemate laborabat sinistro abdominis latere, trium transversorum digitorum distantia ab osse ilium, dolorifico valde, ad externum attractum materia purulenta hic extra peritonæum collecta videbatur. Caeterum primo applicuimus potentiale, hinc, cultello acutiori apertionem institutus, & effluxit materix bene coctæ, non fortentis quantitas 3½ ang. iij. Sequenti die materia effluens & parciore tuit, & sanguinolenta magis; placuit itaque quo materia dictæ commodior exitus concederetur, cultello, maximâ parte luteo armato, cujus descriptio habetur apud Sculterum Arment. Chirurg. tab. 2. fig. 7. incisione secundum longitudinem tumoris factâ tumorem magis aperire.

Die tertio, quarto & quinto materia se obtulit impura, foetidaque; sexto stylo nostro explorare placuit, quousque quaquaversum, apothema hoc se extenderet. At quamprimum eum inferere aggressi sumus, inscni paracentesi institutus, illico enim aqua effluxit clara, alba, nullius foetoris, ad quantitatem medix pintæ, quem subitaneum effluxum ventris detumescencia insperata sequebatur.

Die sequenti ad foramen factum membrana se conspiciendam dabat crassa, complicata, quam intestinum esse conjiciebamus. At cum vasa in ea nulla occurrerent, forcipe eam apprehendere ausus fui, imò lenta manu extrahere; instar cornu politici pellucida erat vasis nullis prædita.

Ea extracta aquæ iterum limpida aliqua quantitas effluxit, hinc nil nisi materia foetida. Quod educta membrana sinum hic aliquem (ut videbatur) reliquisset, consultum visum fuit injectione hac eum mundificare.

℞. Fol. Scord. Ruthæ, Absinth. Rosar. an. Mß. Hord. ʒj. ʒ. Flor. Hyper. Centaur. an. ʒij. Coq. in vino rubro. in Colat. 1b j. dissolv. Mell. apii ʒ ii. Aloes, Myrrh. an. ʒj ʒ. F. Injectio.

Utilitatis aliquid adferre videbatur, quod materia magis concocta se exhiberet.

Interim etiam medicamenta ea intus sumenda

amicorumque invitationibus ad mensam paruerat, imo vero contra inhibitiones frequentissimas etiam extra tempus potui induit, suum pro exultatione guttum allegans; Quo factum ut iterum denuo colligi cœperit, atque tandem circa initium Junii 1680. me peregre profecto correptus fuit linguinis confectum e stomacho quasi eructantis iputatione, sic transactis 24. horis superveni; nocte secunda, binis a media nocte horis (31. circiter horis a prima invasione) satis cessit. Septimo cum Chirurgus famuli sui opera adjunctus Cadaver apertum communia involucria incidere, pinguedo copiosa apparuit, ut adstantibus omnibus admirationi fuerit, dein aqua flava totum ventrem implens exantlanda se obtulit. Omentum sinistro in latere nigrum erat. Intestinis pinguedo hinc inde adhaerebat. Lien erat molis magnitudinis, ut tres circiter libras penasse iudicem; Interius visci pulener atque floridus, a sanguine scilicet, quo exterius turgibat, ab omento nigro quodam in loco infectus. Hepar album, distensum meatibus albo crassoque succo infarctis. Folliculus fellis, primarius inquisitionis meae scopus, fellis 3½. (vix ultra) continebat, quod in vitrum intulum fuit. Interrogante me cujus id esset odoris, mox quidam Medicinæ studiosus, qui talem operâ præstabat, naribus admovit, atque gravissimum halitum deprehendit, cum tanta aversione, ut sibi malè quodammodo inde esse dixerit. Plura libenter investigavimus, præsertim abscessum in Mesenterio, unde pus prodibat, ut opinor, nisi amicorum præsentia obstitisset. Ex quibus præcipuè notatu digna sunt excretiones fellis per alvum, & per vena, neque deinde in sui cylindri deprehensa Corruptio; In quam qui in Hydropicis aliisque Cachecticis frequentius inquirere volent, similes fellis degenerationes plures invenient, quemadmodum accidit Reguero de Graaff. scribenti in tract. de succo pancreatico: Ictericæ Bilis fuit inventa serosa, & tam levi illa vedine imbuta, ut immissa in eam linthea non nisi exiguam admodum amaritudinis speciem exhiberent. Item quod Glissonius in an. tomia hepatis assert: Erat apud nos Mulier Cachectica in cujus vesicula fellea deprehendimus humorem serosum pallidiusculum, minime amarescentem, sed insipidum potius, dulciisque proximum, tantum quippe potest fellis constitutio, ad quam hæcenus tam pauci respexerunt, penitioris Ascitis causa in abstrusis latente. *Ioh. Georgius Greulichius de Hydropis curandi vera methodo.*

Hydrops in quo Lien præcipuè affectum receptum est.

Vir annum agens 40. temperiei calidæ & siccæ utique naturalis, coloris in facie ex atrò & citrino cuiusque confusi, opum, quibus jam confectum abundabat, cumulatam famelicè cupidus, ut etiam in earum gratiam honestæ vitæ commoda nihili faceret, infami passione imprudens Hinc radicibus, rapis, oleribus leguminibus, caseo, carne sale & sumo exsiccata, hisque idgenus ineptis & rusticis cibis, quod avara forent impensæ, ventrem alimoniarum uturpandæ inane inhiantem animaliter farciebat. Interim dums, barbè, corporis, sed animi maxime

laboribus, curis, studiis, scriptione, lectione, ruminatione & futurorum conjectura, se se inhumaniter conficiebat. Subinde cæcam hospitii cameram nactus, ringente avaritiâ, profusa vini belluatione totus inundabatur. Extemplo abique præcursoribus morbi instantis indicis, morose quæsitus est de subita virium ruina, de corporis enervis plumbea mole, de anxio respirationis pressæ gravamine, de tussi sicca, de appetitus se se desperate negligentis agonia. Interim prurienti inquietudine frangebatur nimis ærumnosum corpus, febre levi continua ardens, & inopinato totum abdomen ad duriciem explicatum illico apparuit, quod ante aliquos dies leve initium ceperat; sitis intolerabiliter avida, somnus nec minimus, pulsus debilis, intermittens, intercadens. His pensitatis prognostica rerum futurarum scientia calamitose ominandum esse non dubie dixi de affectus grandis sorte. Contra sentiebat collega Medicus mecum in efficacius cura robur rogatus; ego autem ursum ut mature sibi in horribile æternitatis jamjam inchoantis omentum, diligentia alacri ad id opus esse, ne tempus avarum, quod modicam lucis usuram concedebat spem, ita blandientem crudelissima calamitate deciperet. Medicus opposita mente à me alius, nolui ea die consilium his omnibus inire, id non adeo inane præcipitatione urgendum, sed in crastinum otiose differendum dixi, ætatis vigentis robur facile superius asserens, reposui strictim, nulli ætati ignoscere cæca prægrandium morbum fata: Et revera illa ipsa nocte obiit, ut horum tantummodo remedium opera usus fuerit. Etenim injectum calminativum, quod statibus superbe tumidis abdomen extensum diceret ordinarius. Ego quidem status plurimos tubæ ultro concessi, sed aquas iis & copia & noxa graviores. Propinata fuit potio cardiaca.

℞. Aquar. rub. idæi ℥ii. cinnam. ℥iii. confectio. hyacinthina ℥iii. elixyr. vitæ Matthioli. ℥i. syr. violarum ℥vi. M. f. potus coëctationis succidus. Exhibitum hydragogum leve.

℞. Syr. rhamn. cathart. ℥i. magister. jalapp. gr. v. tinct. gran. juniper. syr. vin. extract. ℥i. aq. baccar. ebulli ℥vi. m. nec remediis audacius vacuantes patuit, ob vires ferientis ruinæ jam lugubriter affines. Enixæ precatus fui ut corpore lecto, sensuum indignantium sententia nemini non evidenti de duplicis opinionis veritate statueretur: quod ut datum fuit, invitavi Medicum curæ socium ad spectaculum secure de nostra lite decreturum. Quando abdomen incisione inavie, illico prorupit incredibilis humoris aquei, fætidæ, adstantibus intolerabilis & subiectum colluvies, cameram prodigiose inundans, qui in spatiis inanibus inter ventris lufim partes otiose stagnat. In vicinam thoracis capacitatem irrepsit ex abdomine notabilis ejusdem diligenter crescentis portio, quæ non tardè quoquo versum diffusa corignis vitalis venerabile sacrarium tandem funebriter submerserat, unde mors repentina, quam sanguine proximi cogitatione assequi non poterant, & si eis modum quo accidisset centies ad nauseam inculcasset. Parum dærat internis partibus ad sui integritatem, nisi quod effaminatæ apparebant; Majus jecur creverat. Lien digitis pressus cedeat haud ægre, & tractatus sæpius

in pulsem spissam pigre fluebat. Ex amica communicatione viri Clariss. Domini Nozet Medici Friburgenfis Celeberr.

Hydrops ascites in quo tumores omnigeni & innumeri abdomen occupabant.

Mulier sexagenaria N. Ascite laborans & Medici cujusdam curæ commissa, male se habuit ab apozemate aperiente & purgante, incommodum pariter accepit ex opiata chalybeata & cathartica: unicum tantum pharmacum ex gummi, gutt. & mercur. dulci confectum ipsi levamen præstitit. Verum quandoquidem post catharticum citissime intumescere venter, ex paracentesi auxilium petere mens fuit. Ter intra sequi mensē ipsi perforatum fuit abdomen, acu scilicet fistulata juxta umbilicum adacta, totiesque duodecim, aut circiter, feri limpidi libræ eductæ sunt, donec ejus decursu cessante acus sanguineo rore stillaret. Grandi levata onere agrotans, spirandi & decumbendi libertatem adipiscerebat, receptisque sonno viribus res suas expedite peragebat. Verum ad modicum tantummodo tempus prospera illa valetudinis conditione fruebatur: etenim præ angustia rei domesticæ, & ob inconvenientem infelicemque victus rationem, in priora aggritudinis symptomata relabebatur. Non sinitanes & sitis, non mille alia tædia, longaue patientia ad tollendum hydropem, à Celso lib. 3. cap. 21. decantata, quicquam proficere quin potius in duro carcere, religionis ergo, diutius olim asservata, famem, frigus, inopiam, & multa alia non patiēda ferens, immanem morbum conceperat. Sed (quod spectandum, & attentioni animo in aggritudinis istius *transiti* advertendum) nunquam post paracentesim toties repetitam, aut etiam post cathartim a prædicto pharmaco sæpius institutum, intumescerebat agrotanti abdomen, quin urinx profluvium ipsi adveniret, quodque opem ferre debuisset, è contra calamitatem inferret. Jam vastius tumefacto ventre, habitum corporis lymphæ diluvium inundavit, tibiæque frequentibus rimis fatiscētes & ulcerosæ supremo frigore obsidebantur, agraque sub tam acerbo affectu sollicitam & actuosam vitam exhalabat. Apertum abdomen tumores innumeros & omnigenos exhibuit. Contentæ in illo partes, ob situm & figuræ penitus immutata, difficile innotescēbant è disruptis vasis hinc inde, scaturiente sero, epiploon, diaphragma, mesenterium, intestina, scirrhorum plena omnia. Tumorum autem scirrhorumque impares fuerē conditio & natura. In diaphragmate, peritonæo, externaque intestinorum tunica, duritie erant lapideæ; plerique autem granorum nulli speciem referebant. Unus præ cæteris visendus erat in epiploco monstruosa magnitudinis & figuræ scirrhus, duo aut ferme tria pondo, cujus interiora cellulis destincta, & vasis atro sanguine plenis instructa; materia istic sero, illic puri, hic autem gypsi instar concreta & indurata infarcebantur. Reliqui tumores ovi columbini figura & magnitudine, membrana simplici, hydatidum instar, constantes, liquore viscido albidoque pleni. Insigne ad molē hepatis decoloris ac victo erat parenchyma-

te. Lausannæ mense Nov. an. 1691. Ex communicatione viri Præclarissimi Dom. Rivalier Medici Nemausensis Celeberrimi.

Hydrops ascites in quo tumor grandis in pancrease aliisque minores per totum mesenterium ac intestinorum longitudinem disseminati erant.

Juvenis 22. circiter annos natus, jam à tredecim mensibus febre lenta correptus; tussi præterea, pectoris oppressione, ac larga hæmoptysi subinde arctatus, in marcorem primo deducebatur indeque in hydropem universalem, quo remediis aptis fugato, ultimus vita septimanis abdomen tandem non parum tumuit ac distensum est. Cadaver pro rimenda morbi lethalis prima origine die 19. Augusti ann. 1691. concutitur, exsuccum nobis primo intactu, ac quasi sceletum vitum est, imo excepto ventre molis ingentis. Aperto mo effluebantieri tenuis ac subflavi puri, ad minimum septem. Intestina flatibus quidem distenta, sed minime corrupta apparere. Venter integer fuit a liquoribus qui pro potu & cibo hauriebantur semper plenus. Epiploon valde extenuatum ac non consumptum. Hepar magnitudinis longe supra naturam, colore albio se quasi sæpius lotum ac elixum oculis exhibebat. Lien paulo tumidior ac mollior. Renes probe constituti. Totum mesenterium, imo intestina, præcipue ad radicē vasorum tum metatariorum, tum lacteorum, glandulis durioribus variæque magnitudinis, quasi coniperta. Verum se præ aliis observandum præbuit tumor grandis caput infantis annum nati magnitudine sua referens, pancreatis corpori quasi additus eo loci quo ipsius canalis duodenum perforat. Hic tumor erat racemosus & pluribus invicem unitis corporibus compactus, quibus una eademque materia, scilicet sebacea, coninebatur. Ab ejus mole sursum elevata ita comprimebatur, canalis bilis communis ut hic humor cum liber ad intestina sibi non concedebatur transitus, versus superiora veniens non solum hepatis interiora repleisset, sed etiam vesicula fellea multum amplata, inio in sui collo herniam passus fuisset, unde altera quasi vesicula efformabatur. Bilis coloris erat naturali viridioris. Ex abdomine in thoracem ascendentes, vidimus corpus glandulosum nucem juglandem magnitudine æquans diaphragmatis centro tenaxioso adnatum. Pericardium multo sero turgidum. Cor ad modum parvum, ac tibiis solidioribus & validis donatum. Cavitates, seu ventriculi cordis aperti nullum profudere sanguinem, nec ejus aliquid congelatum præbuere; hocque notatu dignum, quod in hoc subjecto, quamvis adhuc dum calido a nobis dissecto, parum admodum sanguinis effluerit, scilicet magnæ illius impensæ ac deperditiones tum in hæmoptoe præcedente, tum in variis ab ea seri separationibus (unde & tumores descripti, & aquæ extravasata) obvenerant. Pulmones undique pleuræ adherentes, ad latera scilicet, anticus ac posterius, eo magnitudinis venerant, ut sex librarum civilium pondus excederent, tantq; materiis sabulosis, sebaceis, aliisq; viscidioribus ita infarcti, ut vix ac ne vix quidem dignosci posset, quomodo tantula quidem

dem via pro respiratione qualicunque ad extremum continuanda aëri patuisset.

Hydrops Ascites in quo omentum variis tuberculis confusum, heparque suppuratum repertum est.

Vir Honestissimus mercaturā inter nostros exercens, febre continua sub finem anni 1691. Augusti Taurinorum, ubi tum degebat, correptus, inde in febrem quartanam simplicem, duplicem triplicemque incidebat, ac totam hyemem sic afflictus transigebat, non proficientibus corticis Peruviani variis dosibus, quia scilicet à nimis avaro Medico, larga satis manu non exhibebantur. Nec febris sola persistit sed sibi etiam adjunxit duritiem hepatis scirrhosam, quam identidem subsequutus est tumor universalis. Quo viso, Medicus de Aegro suo omnino conclamatum opinatus, illius curam prorsus abiecit. Consultum itaque visum est Aegro, incute vere, tempestate sanè incommoda: pro Apibus trajiciendis, iter Genevam nostram suscipere. Quomodo & qua industria illud peractum fuerit nihil opus est hic enarrare, verum quid demum in tragadix finem evenerit jam explicabo. Ex quo ad Nos accedebat plura tentavimus auxilia, unde quidem obtinuimus ut febris lenta morbi comes, ac inappetentia maxima ex parte fugarentur, sed Hydrops universalis in verum ascitem jam conversus, nec purgantibus, nec diureticis, nec specificis selectioribus vel minimis cesseret. Viribus interim adhuc dum satis constitutis, in immensumque ampliato abdomine, e re vitium est paracentesim, in aliorum omnium prædiorum absoluta desperatione, instituere idque mensis Augusti, ann. 1693. die 15. Cumque propterea acum tubulatam, cuspidem triangulatam, loco apto immisimus, statim ea prompit serum extravasatum vehementia, quæ è dolo perforato vinum quo repletum est produceret. Satis itaque largam ejus dosim una eademque die eduximus, scilicet tribus vicibus quibus evacuationem repetimus, libras civiles ad minimum octo. Die subsequenti rursus libræ sex eductæ sunt. At cum interaneorum dolores tum accederent, qui quidem ante paracentesim molesti fuerant, sed jam molestiores fiebant cum adjuncta etiam inappetentia, febris, dejectionibus alvinis, summaque virium prostratione; ab ulteriori evacuatione pro tempore scilicet per diem integrum abstinuimus, donec Aegrum nostrum cardiacis & anodynis refecissemus. Hoc peracto turbis que suscitatis maxima ex parte sopitis ad opus nos de novo accingebamus, sed modestius agentes libras tantum tres de die educebamus, sicque per dies duodecim continuavimus, quibus elapsis loco feri, pus foetidum, sensimque foetidissimum maxima dimanavit copia, tum detumescere femora ac subledebat abdomen, imo dunties illa hepatis scirrhusa, quæ hydropem præcesserat, evanescebat. Vicesima quarta paracenteseos die laxabatur denuo alvus, purulentaque copiosissima deiciebat. Tum viribus collapsis necessario ab opere desistendum erat; & quicquid restabat agendum cardiacis, topicisque loco paracenteseos admotis, pro corruptione arcenda, perficiebamus. Mors tandem lentiori pede ægri summe afflictæ sententiæ adveniens vitæ finem fecit

anno ætatis 51. Cadaver nobis concessum rara plura monstravit, quæ antequam sigillatim explicem non inutile forsitan fuerit, si verbo de paracentesi aliquid dicam. Mirus hanc operationem in hydropicis tentavi, sed nullus sic orco ereptus est, quin potius mors, aliis etiam inevitabilis sic forsitan accelerata est. Revera nostri qui toti ad hanc operationem horrent, tardius ad eam deveniunt, postquam scilicet debilitata viscera, imo etiam corrupta, jam prorsus ratiunt, eorumque libræ tono suo resumendo prorsus inabiles redditæ sunt. Præterea purulenta in hydrope, a suppuratione aliqua interiori necessario æthali proveniens apud nos satis frequens est, ut & vicinitas in materia educenda quæ illam cannuam humiliter, trajiciendæ idoneam facit; ut non semel expertus sum. Quicquid sit, non ita sine conndendum est hanc operationem ut vomit aliqui, uno aut altero exemplo persuasi: nam cum in peritonæo duplicato aquæ restagent, quod admodum rarum est, aut in ipsis morbi initis, antequam serum salibus asperioribus imprægnatum viscera corroderet, quod ab agris vix ac ne vix quidem obtinebitur, operatio peragatur; non video quid saluti ab ea exquiri debeat. Revera aliquos habui hydropicos qui præ aquarum onere, eò molestiæ ac suffocationis, deducebantur, ut ab omni situ pessime haberent, nec procumbere, sedere, aut erecti stare possent, qui ab hac operatione parte oneris levati ultimam diem suam majori cum tranquillitate, ac minus ærumnole obierunt; ac ea propter in ægrorum solatium, si non itidem in eorum salutem, aliquando utilis pronuncianda. Sed unde digressi sumus jam redeamus, scilicet in demonstrationem eorum quæ in nostro apparere cavillare. In exterioribus ipso etiam paracenteseos loco gangrena nulla, aut corruptio se manifestavit. Tegumenta communia quod spectat ea in abdomine admodum crassa reperta tuere, quia scilicet dum ab aquis quæ ipsa prius distenderant per paracentesim liberabantur, eorum libræ facile obediebant contractionibus quæ ab actione salium austeriorum ex prædictis aquis in eas permeantium, proveniebant; unde non mirum si à corrugationibus partium tegumenta constituentium ac salinis particulis tingentium, multo crassiora illa evadebant. Hoc idem evenerat peritonæo quod duarum ad minimum linearum crassitiam possidebat, dum interim per sui interiora ita erat necrosiæ ædum ut ad minimum digitorum attactu undique per lamellas discerperetur, una excepta regione epigastrica in qua minus corruptum erat. Referato abdomine multum pus, illudque admodum viscidum undique respersum visum est, quod etiam parum compresso omento, ipsoque hepatis parenchymate multo copiosius fuit, ita ut ad duodecim ad minimum librarum civilium pondus ejus assurgeret quantitas. Omentum alligabatur peritonæo ad latus dextrum & sinistrum, ac etiam ad eisdem inferiora ubi pelvis constituitur: imo idem omentum profundius in intestinorum varia interstitia se immergebat. Totum ipsius corpus cellulis erat plenum quarum majores nucem juglandem, minores avellanam facile admisissent, purulentiamque fundebant illi prorsus similem quam per paracentesim ultimo eduxeramus, quamque

in abdominis cavo stagnantem repereramus. Nihil itaque paradoxum dixerimus si asseruerimus fermentum hujus partis vitiatum, succos in sacculos adiposos ab Illustrissimo Malpighio in omento abunde demonstratos, eoque iatis copiosos in subjecto plethorico & abdominoso advenientes, in purulentum quid convertisse, quod regimini naturæ per alterationem suam subtractum, proprios sacculos, seu vasa adiposa, hinc inde per collectiones hic & illic magis aut minus copiosas, varie distenderit, eorumque perturbationes innumeris in locis fecerit. Sic sane multum de materia extravasata sufficiebatur, sicque adligationes cum partibus vicinis enascebantur, dum scilicet, puris particulae crassiores ac viscosiores glutinis partes hic agebant. Hepar undique diaphragmati coharebat, ipsiusque membrana exterior albida admodum viscebatur. Substantia tota erat vitiosa ac purulenta turgida, sed præcipue à dextris ad medium prope sui corpus in pus omnino abierat. Sicque quod restabat hujus visceris admodum parvum, & quasi lacerum apparebat. Suppuratio autem hæc per viam inflammationis non obtigerat, siquidem hepatitis ne minima quidem indicia se manifestarant, sed per fusionem lentam materiam scirrhosam in hoc viscere prius collectam. Per hanc suppurationem non tantum multum sufficiebatur humoris in cavum imi ventris diffusi, sed etiam quicquid ejus per totum intestinorum tractum copiosissime se exhibebat, alvoque etiam prius rejectum fuerat, inde effluerat. Ab illo pure in intestina per pori biliarum ramos dilabente, vas hoc justo grandius factum erat, sed dum in ipsius cum canali cylico unione crassiores particulae subsederant, opilationem ac obstructionem fecerant, quæ bilis est propria vesicula evacuationem impediens, ipsam non parum distenderat. Advertendum autem hic ratione dilatationis prædictæ, quod quandoque maxima sit, dum efficiendæ veniunt materiam in ipso hepate genitam. Sic v.g. non semel vidimus in capris atque ovibus (in quarum hepatis sæpius enascuntur vermes illi figura seminis cucurbitinum referentes, magnitudine vero minorem scarabeum creperum æquant) quod ex hujus visceris substantia sibi per pori biliarum capillares ramusculos quam maxime dilatatos, viam in intestina, ad plura etiam millia, faciebant, unde foras rejecta non pauca ex his animalibus verno tempore postea evadebant, etiam si viscus tam nobile in his tanta affectum fuisset corruptione. Unde non ita difficile fuerit percipere quomodo multi in suppurationibus jecinoris interioribus, dum viscus per alvum commode expurgatur, fatum suum declinarint. Idem etiam evenire potest glandulis mesentericis & præcipue iis quæ Asellum pancreas constituent, nam dum materia contenta turgent, sicque ad alterius pancreatis corpus accedunt, & illi uniuntur, facile pus in iis efformatum a canalibus Virsungiani ramusculis excipi potest, ac in intestina protrudi. Lien quamvis justo tumidior nihil vitii in sua contraxerat substantia, illa tantum parte qua ad hepar accedebat coloris albidioris erat. Cætera integra visa sunt.

HYDROPS TYMPANITES.

Tympanites vulgo, etiam proprie, hydropis species habetur, a quo tamen centu, Prosper Martianus Hippocratis testimonium allegans, tumorem illum, tum Anasarcan rejicit. Verum prior iste Abdominis regionem infellans, inque molem attollens, jam proxime post Ascitem (cui nonnihil alimnis est) in considerationem venit: ubi primo occurrit, affectum hunc; prout curatu, hic etiam cognitu difficillimum existere; nam licet exterior ejus species, seu ventris tumor subdurus, remittens, & a pulsatione instar Tympanitis sonitum edens, sensuum una plurium indicio evidentissime percipitur; attamen quæ sit materies morbifica tumorem istum reducens, quomodo in ventre aut progignitur, aut aliunde illuc advenit, plane nescitur: ideo Tympanitici quasi vento revera gravati, conceptus sui tempus & modum & tempus ignorant. Profecto morbi hujus naturam & causas idcirco latere arbitror, quia cum prima ejus initia non advertantur, subito in immensum accrescit; adeo ut affecti vix prius se agrotare sentiant, quin pene incurabiles nant. Dem Tympania, statum ejus peracto, in Ascitem degenerans, seu potius hanc sibi consciscens, naturam suam amittere videtur: & quidem post obitum, inspectio Anatomica vix quidquam magis in cadaveribus à Tympania quam ab Ascite detectorum detegere solet. Quod autem plerique Authores medici, affectum hunc à flatibus intra abdominis cavitatem conclusis, excitari facile pronuntiant, an vero veritatis avido minime satisfacit; quoniam omnino improbabile videtur, flatum in eo loco tam subito, & copia tam ingenti produci; aut si producerentur, tumorem adeo durum, immobilem, & constantem excitare posse.

Porro inter ipsos, de morbi sede, ubi flatum concludi supponitur, non facile convenit; statuunt enim nonnulli locum hunc in peritonæi concavo, atque ab intestinorum, aliorumque imi ventris viscerum superficie convexa determinari; quomodo autem tanta aggeries ventorum ibi colligatur, nulla ut opinor ratione, exemplo, aut parallela instantia declarari potest. Præterea si ita res haberet, multo facilius punctura quam Ascites paracentesi sanari potuisset quod tamen nunquam audiivi factum. Refert Helmontius à paracentesi in quodam hydropico habito flatum putidum editum; repente abdomen sedisse, & virum quam primum interiisse. Verum Platerus, & Smerius, Authores nihilominus fide digni, se deprehendisse asserunt, in quibusdam qui Tympanitici putabantur, post mortem sectis nullum flatum è ventris cavo erupisse, nec ventrem subsedisse, sed intestina præsertim tenuiora, adeo flatibus distenta, & convoluta profiliisse, ut in eundem ventrem amplius reponi nequirent.

At vero, neque hæc observatio mihi argumento est, morbi (de quo agimus) causam intra cavitates intestinorum subsistere, atque flatum ibidem aggestos, sæpius aut potissime, ventris intumescantiam Tympaniticam excitare. Præterquam enim, quod affectus à tali causa oriundus non ita immobilis, & frequenter incurabilis

curabilis foret; insuper opinari ducor, non tam intestina à flatibus conclusis immaniter dilatari & extendi, verum illa sæpe sponte extumescantia, flatibus quo spatia ampliata implerentur, consequenter & secundo producentis occasionem præbere, prout mox planius ostendimus.

Quod autem ab aliis asseritur, flatum, qui Tympanitis causa, sunt inter mesenterii, & intestinorum tunicas progigni, multo adhuc improbabilius videtur: quia cum nulla ibidem præexistat cavitas, quomodo flatum eas partes ita divellet, & ab invicem separabit, proinde ut à specubus ita efformatis, & ventorum cumulis illuc reconditis tota ventris regio in molem ingentem accrescat? Certe tot tantæque continuæ solutiones, absque terminibus continuis, & cruciatibus acerrimis fieri nequeunt.

Quomobrem his opinionibus circa Tympaniten posthabitis, ad pathologiam ejus paulo certius investigandam, alia procedamus via; perpendendo sc. quot modis, & quibus de causis evisceribus, abdomen intumescere solet. Itaque advertimus quatuor esse contentorum genera, à quibus ventris intumescere in viventibus procedit. (Cur in defunctis abdominem intumescit, ratio inferius explicabitur.) Sunt autem ista Solida, Humida, Flatus & Spiritus.

Primo satis obvium est Tumores viscerum intemos, sc. scirrhosos, strumatos, cancerosos, glandulosos, & quosdam forsitan alius generis, quando ad molem notabilem assurgunt totum ventrem intumescere; interea tamen donec simplices, & recentes existunt, citius percipi, & circumferri possunt: postea tamen inveterascentes in viciniam suam, imo in totam abdominis regionem mala alia accerunt. Profecto hi interdum Ascitis, uti & Tympanitis ab initio sunt causa procatactica, quibus deinde in utriusque morbi complementum, causa alia conjuncta, sc. aquarum illuvies, aut spirituum inordinatio accedit.

Secundo humor aquosus intra abdominis cavitatem aggestus, aut partibus ejus membranaceis, vel glandulosis impatus, non raro Ascitem producit, ejus rationes, & fiendi modus, satis fuse superius explantur.

Tertio flatus intra coctionis viscera à cruditate, dyspepsia, aut humorum dissimilium fermentatione excitati, non raro intestinorum cavitates inflant, atque ventris, & plerumque tamen brevem, & transitorium producunt. Quippe succorum coctione cessante, atque flatuum eruptione procurata, subinde statim ventris detumescencia succedit. Huic causæ, & Colica & Tympanites non tantum vulgo, sed etiam à multis magnæ notæ medicis imputantur; verum nostra fert sententia eam solitariam neutrum ex his affectibus producere.

Quarto restat adhuc alia subita & quidem immanis ventris intumescencia, quam spiritus Animales (non de nihilo ab Hippocrate *ἀνιμια* dicti) acciere videtur. Si quando enim hi fibras nervas ad viscera imi ventris pertinentes *ἀγνῶστος* & inordinate irerunt, illico partes quas hæc contexunt, plurimum inflari, distendi, & quaque versus extumescere facient. Enimvero ab hac causa, subitaneum totius abdominis *ὑδρῶς* & inflationem velut Tympaniticam in paroxysmis tum Colicis tum Hystericis vulgo dictis crebro accieri, alibi

sæpius ostendimus. Et quidem hi affectus Tympaniti in tantum affines sunt, ut in ipsum non raro delinant: nam frequenter observavi, passioni Colicæ, aut Hystericæ, diu ac graviter obnoxios, nisi curantur, demum Tympaniticos fieri. Et tunc maximè discriminis ratio erit, quod affectio ista, sc. ventris intumescencia, quæ prius symptoma erat, vagum, & cito pertransiens, demum morbus fixus, & permanens evaserit. Quapropter ex re fore videtur, pathematum nullo, u. n. Aetiologias, à nobis alibi traditas, ad præsentis morbi naturam, & causas explicandas acquiri addare.

Quod equidem non in magis negotii, aut difficultatis erit, supposito enim (quod alibi fufius exposuimus) membranarum & viscerum concavorum extensiones *φασίς* seu velut inflationes, à spiritu n in fibras nervas (e quibus contextur illæ) incurilibus & perpetuis exoriri, satis novum erit concipere, etiam Tympaniti à tali causa, sed fixiori, & in actu diuturno, aut perpetuo existente productione ejus discriminis rationem mox inquiremus.

Interim opinari ducor Tympaniten non à flatibus intra, vel extra Intestinorum cavitas conclusis excitari (talis enim in his locis flatuum aggestio hujus morbi affectus, sed non causa est) verum exoriri, quatenus, in imo ventre spiritus Animales, ad viscera membranacea spectantes, ab in congruo quodam in *ἀγνῶστος* adacti, fibras ubique nervas tumultuat & irritat, instantque nec statim dentio ab his recedunt: hinc peritonæum extumescit, intestina ampliata & distenta velut inflantur, mesenterium, aliaque viscera membranacea spiritu in peritono turgida, velut in molem attolluntur; porro dum hæc fiunt, ut vacuitates à viscerum concavorum extumescencia factæ impleantur, humoris statim cum visceribus contenti portio in vapores rarefacta, illico in flatum spatia ista inania oberiantes cedit.

Profecto spiritus Animales inordinatione sua partes membranaceas inflare adeoque affectus quasi *φασίς* producere, in Pathologia nostra spasmodica, rationibus, & instantiis satis clare ostendimus. Porro idem ex observatione Anatomica per vivi sectionem facta, apertissime demonstratur in quantum sc. truncus nervorum octavi paris per cervicem utrinque descendens, si excipitur & filo ligetur, totus illico ventriculus, tanquam à vento inflatus, extumescit; quod certe à nulla præterea causa procedere potest, quam quod spiritus fibrarum istius visceris insiti, alique per ductus nerveos insui (quatenus à fonte suo præscissi, in confusionem aguntur) partes illas tumultuarie, subeunt instantque. Insuper his, ad hypothesein hanc adhuc amplius illustrandam, libet hic Historiam à Clarissimo Smerio citatam referre de Tympanite (uti appellat) universali in juvene quodam Leodiensi, qui cum in conflictu subter Axilla dextra vulnus punctum factum, in pectoris cavitatem penetrans accepisset, post die toto corpore post unicam noctem, mane turgidus apparebat, non solum pectore, sed & dorso, ventre, lumbis, imo scroto quoque, præterea & Brachiis, humeris, collo vultuque ut ne palpebras quidem deducere possit, quin etiam in vertice ipso, cute ubique distenta & tumefacta, tumor ubique erat tensus, & cum dolore non paucos. Affectum hanc admirandam, Author Appellat Tympaniten universalem. Casum huic simili-

le in Cl. Sennertus ex propria noticia recēset. quin & ipse me tale quoddā a vulnere pectoris prope Axillam t. & o. legisse, vel audivisse memini.

Attamen symptomatis hujus ratio à Smetio assignata, & à Sennerto comprobata mihi haud-quāquam arridet: quippe ascribunt illi generalis itius Tympanitis causam, in insufflationem pectoris, per vulnus axillare, subter cute tota illa noctetactam, quomodo velicam recentem & flaccidam, inserto calamo à pueris inflari videmus: quod equidem non solum improbabile videtur, sed etiam vix possibile censuimus, ut ventus è thoracis vulnere exursandus, propter foramen unica nocte obturatum, cutem iubeat, indeque totum corpus permeans, ubique inter us fiat. Præterquam enim quod illinc in partes omnes ventus, et si per calamum ex ore subter cute insufflaretur, tam subito transire nequiret; insuper dum vulneris foramen obturatur, nullus omnino à cavitate pectoris ventus exinflari potest, quia nullus interea potest ingredi. At vero stupendi istius affectus, (unde etiam Tympanitis ratio formalis illustratur) causa proculdubio hæc est, in pectore prope Axillas, magni & perquam insignes, (prout in Neurologia nostra descripsimus) extant nervorum plexus, per quos nervi totius corporis inter se communicant: viz. Truncus octavi paris, cum nervo intercostali, & utriusque cum nervis spinæ dorsæ, per ramos & propaggines hinc inde missas conveniunt. Quapropter plexu illo nervo, per gl. dii puncturam forte transiit, primò spiritus ibidem hospitantes irritati, & effusi incunt, dein consensu per nervos tot eximios statim factis, & quaquever sus huc illuc transmissis, spiritus alii, & subinde alii, pares inordinationes concipiunt, atque membranas, fibrasque nerveas, (quas ubique tumultuarie subeunt) inflantes, totius corporis Affectionem quasi Tympaniticam inducunt. Propter similem furorem, sive æstrum virulentem spiritibus ali ubi impressum & inde mox longe lateque diffusum, toxica quadam epota, telorum aut ferarum ictus, vel motus venenosus, sæpenumero partium unarum, aut totius corporis intumescēciam inducunt; cujusmodi spirituum Affectio Typhodes, ab Helmontio dicitur Indignatio Arthras. Complures alii subsunt casus, & instantiæ, quibus clarissime evincitur, spiritus Animales irritatos, & in exandescēcias actos, quatenus fibras nerveas impetuosius lubeunt, partes imprimis membranaceas intumescere, & multas ex iis passiones excitare, quæ vulgo sed perperam flatibus ascribi solent: revera ut Tympanitis nulla alia causa verisimilior assignari possit.

Quod si obijcitur, defunctorum Abdomina, post aliquod tempus, à statu in molem attolli, & quasi tympanitice intumescere: dico hoc omnino ab humorum putredine, & extrema mixtionis dissolutione, in qua particulæ activæ omnes manumissæ ab invicem discedunt, & avolantes quaquever sus exitum querunt, & obitacula quæque, ac imprimis cavitatum parietes inmaniter distendunt, (quod minime in viventibus contingit) procedere; quapropter uti cadavera non omnia ex æquo putrescunt, ita illorum ventres citius aut tardius magis aut minus extumescunt: attamen durante vita nulla sit in

corpore animato putredo, aut particulatum dissolutio, & quædam sive intumescēciam splanchnicam illatura. Interea non inficias in us flatum intra pepsicos, hæmatoleos, & secretionum officinas, imò intra singulos quosque corporis nostri specus & recessus generari: attamen è singulis illis donec spiritus fibras tum nerveas tum motrices rite influunt, actuantque, ut vi cerum parietes haud distenti ac rigidi teneantur) flatibus ubicunq; genitis, æque facili patefecit exitus. Atque in tympanite revera flatum spatia vacua implere concedimus, verum spiritus ipsi, quatenus in ordinatione sua viscera extendunt, vacuitates itas (in quibus flatu secundario & consequenter progignuntur) primo efficiunt, & illi (quatenus viscera eadem usque rigida & distenta servant) huc flatu ita ablegentur impediunt.

Itaque ex prædictis satis constare arbitror spiritus Animales potius quam flatu, ejusmodi ventris intumescēcias, sicut breves & transitorias, quales in paroxysmis colicis & hystericiis contingunt, excitare. Attamen magna difficultas restat, quomodo abdominis Tympaniticus, qui fixus & permanens, imò plerumque immobilis est, à tali causa procedat: præsertim quia spiritus Animales, ex sua natura irrequieti & valde mobiles, sere semper lationem affectant, ut nisi detentati, aut demerati, vix unquam resideant.

Ut nodum hunc solvere ratiocinando pergam, considerare oportet, una cum spirituum Animalium hypostati, Succum Nerveum, qui itis ubique pro veliculo simulque pro retinaculo est: namque spiritus hujus stuenti subtilissimo potiti, libere expatiuntur, & ne ab in vicem dissipati avolent, in serie integra continentur. Si quando igitur latex ille quoad crasim, aut motum suum peccat, exinde statim spiritus Animales, in functionum suarum exercitiis varie delinquant, aut pervertuntur: ut in Pathologia nostra fusc exposuimus. Ne hinc modo repetendo, longas ambages taceam, quod ad præsens institutum spectat paucis contraham.

Itaque imprimis advertere licet, imi ventris contenta, (uen tis solum hepate, liene, ac renibus) viscēris inembranaceis (quas fibræ nerveæ magis ex parte contexunt) plurimis intrinsecis unde sequitur succum nerveum (cujus in his partibus major ambitus, & mulque angustior transitus est) renoras hic plures offendere: quod etiam ab effectu comprobatur, in quantum insulsi spasmodici, in passionibus hypochondriacis, colicis, nephriticis, & hystericiis passim excitati, abdomen ita graviter infestant. Si quando igitur latex ille, fibras harum partium nerveas irrigans, vel ex se tenax & viscidus fuerit, vel iisdem feculentias plures impingat, propterea quidem accidet, spiritus Animales, si quando in has fibras quadantenus obstruatas impetuose adigantur, exinde non omnes facile redire: cumque ita sæpius, plenior eorum incursus, & parior reditus fiat. tandem eveniet, magnas spirituum copias in fibras istas magis indies magisque impactas manere, easque distentas usque & plurimum inflatas tenere; demumque propter itum, & reditum in fibris istis vias occlusas, ibidem prorsus immobiles fieri, atque partes continentes semper extensas & rigidas servare: interea quoniam hi spir. ibidem intra ductus nerveos impactati, ac densim stipati, cum aliis ad illorum

antra influis commercium habent, idcirco pars affecta quamvis rigida, & fere immobilis, usque tamen sensu potitur. Pathologia hæc, ut ut paradoxa ac insolens quibusdam videatur, minus dubito quin à pluribus assensum merebitur, si perpendatur eos potissimum, qui affectionibus hypochondriacis, colicis, aliisque imi ventris spasmodicis diu obnoxii fuerunt, demum Tympaniticis fieri.

Designatis adhuc modum Tympanitis ratione formali, & causa conjuncta, priusquam ad causas ejus remotiores investigandas procedimus, ex prædictis licebit, morbi hujus Definitionem aut saltem descriptionem quandam tradere: nempe quod sit tumor Abdominis fixus, & constans, æquabilis, durus, renitens, & à pulsatione sonitum edens, à partium, & à scelerum membranaceorum inflatione *inflatione* ortus, propter spiritus Animales in fibras istas copia nimia adactos, ibidemque succi nervei obstruentis vitio, à recessu impeditos, cui affectioni, consequenter, flatuum in locis vacuis aggestio, velut complementum accedit.

Quod ad morbi hujus causas procatacticas, & Evidentes spectat, perraro accidit eas omnino adverti, quin tacitis iste initis obrepens, sæpe consummatus, aut depioratus evadit: antequam percipitur: proinde ut contra affectum hunc, vix prophylaxis ulla instituat: quippe donec functiones ordinariæ haud multum læduntur, ventris intumescenz tantummodo à flatibus exoriri præsumitur: dumque ut sponte evanescat, expectatur, sæpe in Tympaniten accrescit. Itaque ut hujus procatactis tempestive notetur, sciendum est Affectus quosvis prævios ad eum disponere; cujusmodi imprimis sunt Diathesis hypochondriaca, colica, hysterica, imo & nonnunquam Asthmatica; quarum paroxysmis frequenter excitari solitis, si demum abdominis tumor ut ab initio parvus superveniat, illico Tympanites metuat. Priorum ex istis affectuum calis passim occurrunt, & vulgari observationi prostant: de posteriori refert Scherichius, virum sexagenarium aliquot menses antequam in manifestum tumorem attollebatur venter, hoc symptomate infestatum fuisse, quod quotiescunque assidens mensæ, cibum mordere aggrediretur, item quando se ad somnum componens, obdormiscere inciperet, tanta corripiebatur anhelandi difficultate, ut pro crebritate respirandi, suffocationis periculum præ se ferret, quo tempore etiam percipiebat circa hypochondria palpitationem quandam, ac si præcordiis aliquid vivi animalis subellet, cujusmodi affectio postea cessit in tumorem abdominis, à quo interibat. In hoc aliisq; modo citatis casibus, eadem ratio tenet, nempe quod spiritus Animales ad faciendos in fibras imi ventris nerveas excursus irregulares assueti, tandem eas non modo crebrius & copiosius subeunt, sed in istis impacti ac impediti resident, adeoque demum viscerum inflationes Tympaniticas inducunt. Quæ quidem *Epigenesis* citius ac certius evenit, si insuper causæ evidentes accedant quæ spiritus imi ventris perturbant, inque *affectionibus* crebras adigunt, simulque succi nervei intra fibras istas scatentis, aut motum sistunt, aut crasin pervertunt, in quo censu habentur inordinationes in sex non naturalibus, passionibus inmodicæ, ac præsertim moro-

ris, evacuationes solennes suppressæ, post æstum ingentem frigidi potus, aut subita ab aere aut aqua, infrigidatio ventris illata.

Quoad Prognosin morbus hic adeo pessimi semper ominis habetur, ut vulgo ejus nomen abhorreatur: in tantum, ut sæpe cum de ventris tumore nulla fere mali suspicio fuerit, si forsitan ille tumor à medico Tympanites pronuncietur, illico de spe omni conclamatum sit. Attamen hic Affectus raro per se interficit, cum longo tempore protractus, quod demum certius jugulet, sibiimet Ataten lethi prænunciam adsciscit; in cujus rationem ut inquiramus, satis obvium erit concipere, dum in imo ventre viscera omnia distenta, & veluti rigida teneantur, insimul sanguinis, nec non humoris nervei, ac Lymphici ductus aut nimis extensos, aut compressos plurimum coarctari: proindeque laticem suum haud libere & expedite transmittere, unde sequitur unumquemque humorem in transitu angustatum ut demum quoquo modo pertranseat, e massa sua serosum quoddam, quæ data via exuere, & denique ista humorum stillicidia, in abdominis cavitatem decidua, hydropem excitare.

Quod spectat ad morbi hujus Therapeiam, fere totus medendi scopus, contra flatum dirigitur, viz. indicationes ab Authoribus practicis inculcatæ, materiam unde flatus eleventur evacuandam, & causam quæ eos attollit removendam, flatum vero qui jam ventrem distendunt, discutendos & dissipandos suggerunt.

Propter hos fines, purgantia contra humorem maxime suspectum destinata, sc. modo phlegmagoga, modo melonagoga modo enologoga, quib. insuper hydragoga, (ut resia ut quencumque holtem tendantur) cum magna contententia, etiam minimo plerumque, aut malo cum successu præscribi solent. Namque hic morbus (uti nostra observatione comitit) à catharticis præsertim fortioribus, fere semper exacerbari, & raro aut nunquam alleviari solet; cujus ratio satis evidens est, quia fibras nerveas à pharmaco aciori irritatis, spiritus Animales excursus suos irregulares reterant, & magis usque ac magis intendunt, potius quam remittunt; quare licet dejectiones crebræ & copiosæ, cum sedibus aquosis & flatuosis inde procurantur, venter tamen plus intumescit. Porro dein ad flatum dispellendos, discutendos, aut compescendos vis plusquam Æolia conscribitur; medicamenta carminativa vulgo dicta, cujusque fere generis, vel formæ, intus, ac extus, supra, ac infra, ac super partem affectam sedulo adhibentur; quibus tamen omnibus hic morbus plerumque obscurdescit; unde plurimum suspicari est, veram hujus morbi causam adhuc latere, quia medicamina per Ætiologiam ejus ordinariam indicata, aut suggesta, minime prosunt.

Quamvis non ergo meliorem in hoc morbo sanando successum, aut certiorum medendi methodum, ab experientia comprobata vendicare possim, attamen libet hic quandam alium Therapeias ritum, hypothesi nostræ accommodum, & rationibus satis firmis stabilitum, in medium proferre.

Itaque in Tympanite sicut in plerisque aliis affe-

albo parat. lb. viii. destill. organiscommuni-
bus, liquor totus misceatur.

℞. Chrysal. mineralis ℥ss. salis succini vola-
tilis ℥ij. pul. sem. dauci ℥j. Terebinth. Vener.
q. s. f. pilul. exiguae, sumantur iiii. vesperi, &
primo mane superbibendo aq. prædict. ℥iii.

℞. Spiritus salis dulcis ℥ss. sumat. gut vi. ad
xii. bis in die cum haustu ejusdem aquæ, adden-
do syrupi violacei cochl. j.

℞. Sp. salis Tartari ℥j. sumat. ℥i. ad ℥ss. bis
in die eodem modo: sic etiam spiritus, nitri;
& Tinctura salis Tartari exhiberi possunt.

℞. Folior. plantaginis, charretolii, Apa-
rines, ana M. iiii. contusis affunde aq. destil-
lat. prioris lb. j. f. expressio fortis, dosis ℥iii.
bis vel ter in die, cum alio medicamine.

℞. Radic. graminis ℥iii. rusci Brusci ℥ii.
charretolii, eringii condit. ana ℥i. ras. C. C.
eboris ana ℥ii. Cor. cervi ult. ℥iiss. sem. Ber-
danz ℥iii. coquantur in aq. fontan. lb. iiii. ad ii.
colatura fervida effundatur foliorum aparini. &
nasturtii aquat. contus. ana M. j. addendo vini
Rhenani ℥vi. f. infusio calida, & clausa per ho-
ras ii. dein iterum coletur, & adde aq. lumbrico-
rum Magistral. ℥ii. syrupi è v. radicibus ℥iiss
f. Apozema, dosis ℥iii. bis in die cum alio medi-
camine.

Dum hæc intus sumuntur etiam Tópica, &
Applicationes externæ sedulo adhibeantur, non
calida, & discutientia, sed particulis salis vola-
tilis, & nitrosis prædita, quæ nempe salum
aliorum combinationes destruunt, & spirituum
impactiones dissolvunt, in quos fines sequen-
tia proponimus. Si focus omnino in usum ad-
mitti debent, ne calide nimis applicentur, item
non è carminativis vulgo dictis, sed imprimis
è salibus & mineralibus parentur. Cabrocius
(citante Helmontio) se octoagenarium sanasse
se narrat, cujus ventrem bis in die fomentabat
cum lixivio, cui sal, alumen, atque sulphur in-
coxerat; ac inde fimo vaccino, pro cataplas-
mate utebatur. Ego sequentia præscribere soleo.

℞. Horum salis Armoniaci ℥i. Crytalli
mineralis. ℥ii. spir. vini tenuioris multo phleg-
mate imbuti lb. ii. misce & dissolve in vitro.

Pannus laneus huic tepide intinctus, super
totum abdomen applicetur, & subinde mutetur
denuo intingendo: fiat bis in die per horæ se-
mis, dein applicetur vel cataplasma ex fimo
vaccino cum pul. stercoreis canini, vel emplastr.
sequens.

℞. Emplastri diasaponis h. e. de minio cum
sapone Veneto, q. s. extendatur tenuiter super
alutam tenuem, toti ventri applicetur reno-
vando intra x. vel xii. dies.

11. Indicatio secunda remedia alterantia potif-
simum requirit, quæ nempe in visceribus imi ven-
tris humorum fermentationes, & spirituum orgas-
mos, & excursus irregulares sistunt, quæ insu-
per chyli & succi nervei mixtiones æquabiles, &
motus debitos procurant; in quos fines chaly-
beata imprimis acciuntur. Et quidem modo ad
hunc morbum, sed & plerisque alios splachni-
cos, ad medicamenta ex ferro, tanquam inde
tela maxime aculeata parentur, statim accu-
ri solet: cum interea à multis empiricis, aut
medicatis qui hæc confidenter & dogmatice
præscribunt, parum aut minime attenditur
quo ritu talis pharmacia operatur, aut quas in

melius alterationes inde expectare liceat: quæ
propter dum ferrum in medicamentum cedens,
etiãnti Goliathi gladius, à cæco arripitur &
vibratur, nihil mirum est, si in irritum cedat,
imo si loco morbi hostis, ipsa interdum natura
percutiatur, ac lædatur: & quidem ita frequen-
ter accidit, cum chalybeata, quorum magna
varietas, & operationum diversitas est, sine
ullo delectu, aut in patientibus temperamentis,
constitutionis, & morbi status respectu, & dis-
crimine exhibentur.

De medicamentis ex ferro ac chalybe præ-
paratis, eorumque virtutibus, & operandi
modis, alibi ex professo egimus: ut non opus
fuerit, hic eadem repetere. Ad morbum hunc,
si ulla omnino ex iis, certe non omnia conve-
niunt; ea namque in quibus mixti compage re-
serata, sulphur usque remanet, & solum ca-
teris prædominantur, ab hoc censu prorsus exu-
lent: quippe & præter sua insigni viscerum succos
valde fermentant, atque sanguinem & spiritus
adeo exagitant, ut tota imi ventris regio, quasi
à spiritu quodam impetum faciente, in majorem
molem attollatur.

Nec minus hic conveniunt; à quibus parti-
cula sulphurea una cum salinis prius abigun-
tur; uti sit in Croco Martis, per calcinatio-
nem fortissimam, ac diuturnam præparato. Hoc
enim medicamen cum ad illuxiones omnes si-
stendas utile sit, ita & humorum, & spirituum
impactiones quasvis figit magis, & obliuiores
reddit.

Verum restat medii generis pharmacum Mar-
tiatum, in quo sulphure in totum, aut maxima
ex parte abacto, sal vitriolicus remanet ac præ-
poilet: uti quidem habet ferri limaturæ solu-
tione, aut infusione simplici, aut acidulata; in
sale, aut vitriolo maris. chalybis præparatione
nostra, cum multis aliis, ex quibus pharmacia,
præparata aut composita, in nonnullis casu-
bus opem insignem contulisse, experientia sa-
tis crebra liquet. Hæc enim viscera non fermenta
exotica destruunt, & genuina restitunt: ob-
structiones eorum reserant, sanguinem figunt,
ejusque compagem à dissolutione nimia cohi-
bent: quapropter remedia chalybeata, quemad-
modum etiam alterantia quædam alia, contra
Tympanitis causas procatacticas, & remotio-
res, aliquantum forsân prosunt; verum ad causam
ejus conjunctam, parum aut nihil opis conferunt.

℞. Chalybis nostri tenuissime lavigati ℥ii. aq.
destillat. superius præscript. lb. ii. syrupi è v. ra-
dicibus ℥ii. misce in vitro, & per subidentiam
clarificetur dosis ℥iii. vel iiii. mane & hora quin-
ta P. M.

℞. Pul. radicum ari, oculor. cancri, ana ℥iii.
crytalli mineralis ℥ii. vitrioli Martis ℥ss. saccha-
ri Anthosat. ℥ii. misce, dosis ℥ss. bis in die cum
vehiculo idoneo.

Hartmannus, egregie prædicat, liquorem è flo-
ribus Tapli barbat, quasi remedium in hoc mor-
bo specificum: flores istos recentes inde in alem-
bicum immittendo, & fortiter comprimendo,
dein vas exacte clausum ponatur in clybano dum
panes coquantur, & postea è floribus exemptis li-
quor fortiter exprimatur, qui in balneo destille-
tur. Dosís ℥i. in decocto sem. & radic. fenicul.
Certe medicamentum hoc, si quid omnino effi-
ciet, in dosi majori exhiberi debet.

Ioannes Anglicus commendat electuarium ex rosata novella cum Diatrion. santal. & ovis formicarum, quod equidem remedium satis probabile aliquid promittere videtur. In horum imitationem libet hic sequens proponere.

℞. Conserv. florum Cichorii, nasturtii Indici an. ℥iij. pul. rad. Ari, ligni Aloes, santal. citrini an. ℥i. oculor. Cancr. ℥i. salis absinthii ℥i. ovorum formicarum ℥i. liquoris Tapsi barbati ℥ss. cum s. q. syrupi e corticibus citri, f. Electuarium, dosis ℥ii. bis in die superbibendo aq. destillat. prioris, aut Iulapii sequentis ℥ii.

℞. Aq. foliorum Ari, è succo Baccarum sambuci, Aq. Iuniperi, flor. sambuci, an. ℥vi. Aq. limacum, lumbricorum Magistral. an. ℥ii. Syrepi è succo baccarum sambuci ℥ii. misce, f. Iulapium.

III. Indicatio tertia vitalis præscribit remedia potissimum contra spirituum deliquia & dyspnoeam, & contra vigilias & sitim. Utriusque generis formulas quasdam breviter subijciemus.

1. Cardia.

℞. Aq. Naphæ, florum Calendulæ, Chamomeli, an. ℥iii. D. ris Stephani ℥ii. Tinctur. Croci ℥ii. sacchari. ℥i. Margarit. ℥i. f. Iulapium. Dos. Cochli. iiii. vel v. ter aut sæpius in die in liquoribus.

℞. Conserv. flor. Calendul. ℥ii. Confect. Alchermes, de Hyacintho, an. ℥ii. margarit. pul. ℥i. syrup. è succo citri q. s. f. confectio, sumatur quantitas nucis moschat. vespere & mane superbibendo haustum Iulapii.

2. Hypnotica.

℞. Aq. hysterica ℥vi. syrup. de Meconio ℥ss. misce sumatur sera nocte.

Vel ℞. Aq. Cinnamomi tenuioris ℥i. Diacodii ℥iii. Tinctur. Croci ℥ii. misce, sumat ad cochli. i. sera nocte si somnus defecerit. Vel.

℞. Syrupi è floribus Paralyseos cochli. iiii. Aq. pæoniz composit. j. laudan. Tartarisat. ℥i. sumat cochli. i. sera nocte si vigiliz urgebunt.

2. *Antispasmodica* in hoc morbo valde siticulo frequenter ac in quantitate solum perexigua exhiberi debent, ut molestissimum illud symptoma absque multo potu qui semper perniciosus est, compesci queat. In quem finem.

℞. Conserv. Iululæ per setaceum traject. ℥iiij. Pulp. Tamarindorum ℥ii. Salis Prunel. ℥i. syrup. è succo Iululæ q. s. f. Eclegma molle de quo sæpius lambat. *Thom. Willis. Pharmacent. Rational. Parte 2.*

Curationes.

In Tympanitide simplici purgationes raro proficiunt, (exasperatur nimirum malum) in composita vero præsertim cum ascite sæpe purgantia præsertim mercurialia & aquam & flatus excusserunt. Est autem specificum in Tympanitide simplici liquor ex floribus Tapsi barbati (Tapsi arcanum etiam valet, sed liquor hic præstat eo modo paratus, quo supra de ophtalmia liquor ex floribus Cichorii ad affectus oculorum paratus est) cujus ℥i. aliquoties & quotidie sumptus in decocto seminis & radicis fœniculi

ventositates expellit. Felicius id exequemur, si simul fiat fomentatio ventris hoc modo.

℞. Urinæ pueri mundi libii. Lapidis prunell. ℥ii. bulliant invicem ad ignem lentum usque ad casum tertia partis urinæ. Hæc urina calida fomentetur in petus, tacta insuper forti frictione cum manu (hoc modo relictur viduam Marpurgi ab omnibus Medicis tentam) post bene absolutam curam, expulsis scilicet aquis & tumoribus, cum ventris ipsius, tum reliquarum partium plane consumptis; Colophonem imponant exsiccantia, quæ sunt 1. Essentia Croci martis à Crollio in hæc specificum Hydropis in conserva rosarum antiqua, vel etiam in Rob. Ebulino aliquoties exhibita. 2. Diacubebæ Paracelsi, quod sic fit.

℞. Cubebarum h. e. granorum myrtillorum exsiccatum, sem. ocyni, Caryophyllor. ℥iij. santal. omnium. ipodii, sem. 4. trigid. majorum excorticator. an. ℥i. succini albi ℥ii. sem. endiviz, portulacæ, lactucæ an. ℥ss. pulverisata omnia subtilissime & cum sacch. ℥iiii. in aq. cichor. soluti f. Electuarium, cui adijciatur syr. granator. ℥ss. Hæc mixtura a ℥ii. usque ad ℥ss. sæpius exhibeatur. 3. Spiritus Guajaci cum Rob. Ebulino sumptus ad ludores eliciendos, feliciter exticeat. In Tympanitide sp. cumini, & carvi philosophice preparatum post primas purgationes leniores, ne malum exasperetur, ejus aliquot gutturæ cum sudoriferis & aliis specificis exhibentur. *Joann. Hartmanni. Pract. Chymiatric.*

Tympanitidi, quæ semper serosam materiam habet adjunctam cum flatibus, eadem omnia, quæ in Ascite præscripsimus, quoque proderunt, nisi quod Carminativa, cuminum, anethum, caruum, fœniculum, daucus, assumantur. Clysteres in hoc affectu ab initio incipiantur ex decocto carminativo cum ol. anethi & rutæ. Venter frigidus qui semper adest, calidis appropriatis alterandus, ut spec. diacumini, dialæcæ, diarrhodon. Abbatis, diacureumæ in tabellis cum oleo Caryophyllorum, anisi, aucum conserva menthæ, pulegii, & theriacana profunt etiam syr. de canella, oleum Caryophyllorum, masticis destillatum, sp. absinthii, cumini, & carui, illorum gutt. aliquot cum sudoriferis propinentur. Hepar vero calidum refrigerandum extrinsecus appositis succo Endiviz, Cichorii cum pauco aceti, & unguenti rosati; assumptis intrinsecus nonnunquam appropriatis refrigerantibus. Venter externe muniendus oleo nardino, masticino Emplastro aliquo aut sacculo: maxime ut in reliquis hic prodest Cremor tartari, tinctura tartari, ol. sulphur. & sp. vitrioli. Cucurbitæ magnæ cum multa flamma applicentur umbilico, incantamenti instar, flatus discutunt, teste Galeno. *Idem ibidem.*

In Tympanitide ℞. Spir. nitri ℥i. spir. Tartar. ℥ss. Rob. Iuniperi ℥i. Aq. Carminativ. ℥i. fœnicul. ℥ii. misce. detur cochleatim. (*Elixiria*)

℞. Essent. Iuniper. ℥i. Tinctur. succini. Tinctur. Tartari, spir. sal. ammoniac. succinat. ana. ℥i. misce. Dos. mane & vespere. *Vel.*

℞. Tinctur. antimon. ℥i. spir. sal. ammoniac. aromatic. ℥ss. m. Dos. ℥i. mane & vespere. *Sen.*

℞. Elix. proprietatis ℥i. Elix. Balsamici ℥ss. Spir. sal. ammoniac. acidi. ℥i. misce. Dos. mane & vespere

& vesperi ℞i. (*Confortantia & Corroborantia.*)

℞. Conserv. Abynth. menth. an. ℥i. Essent. Abynth. ℥i. Tinctur. Succini, Tinctur. Tartar. Tinctur. antimon. an. ℥ss. Elix. Carminativ. ℥i. misc. f. Conditum. Dosis ℥i. mane & vesperi. (*Externa*)

℞. Emplastr. de Cumino, Empl. Baccar. Lauri an. ℥i. ol. still. Cumini, ol. still. tœnicul. an. ℥i. misc. f. Emplastrum.

In plagis Indicis hic morbus inter plebem valde graffatur. Egrotos optime adjuvant talia vomitoria.

℞. Sulphuris antim. gr. vii. Sal. Cinnam. ℞i. Aq. calidæ ℥i. misc. f. vomitorium. *Vel.*

℞. Tartar. emetici gr. iiii. Syr. Cinnam. ℥i. Aq. sol. Cinnam. ℥i. misc. Purgatio sequens quandoque sumpta, ex voto prodit.

℞. Resin. Turbith. gr. x. Gran. Tiglium gr. iiii. Elæosacchar. sol. Cinnam. u. ℞i. misc. Ad aqua per sudorem & urina expulsiōem post posita exhibeo medicamenta.

℞. Spir. sal. ammoniac. Spir. morung. an. ℥ss. essent. lign. Colubrin. ℥i. Aq. Baccar. Cinnamom. ℥i. u. misc. f. sudoriferum. *Vel.*

℞. Spir. urin. ℥ss. sp. morung. ℥i. Spir. Lign. Ebeni. ℞i. Aq. Carminativ. ℥i. misc. Ad flatūs discutiendos unguentum Carminativum, ventri extra applicatum usurpo. *Hermanus Nicolaus Grimm. in Compendio Medico-Chymico.*

Consultationes.

Pro Perillustri, ac Nobilissimo Equite Regiensi Alexandro Malagutio Hydrope Tympanite detento.

Tormina ad umbilicum ex Hippoc. 4. aphor. ii. quæ non superantur, nec medicamentis cedunt, solent esse prælium in hydropis siccæ, à quibus etiam ante duos annos iterum, atque iterum sollicitatus fuerit perillustri eques. mirum non est, si vitium illud incurrit, quod Abdominis, tibiæ, pedumque tumor, flatuum copia, senitus cum tensione ventris, ac difficilis anhelitus docent. Verum hydropem hanc siccam esse notham, ex eo non obscure convincitur, quod flatibus immixtus est succus aquosus, quem sonitus ille obscurus, fluctuatio quoque aliqua, & aquosa excretio attestantur; quinimmo est vitium confirmatum, ac in habitu exillere, inappetentia insignis, sitis, impotentia ad motum, color totius corporis vide scædus, urina sanguinea, & genitalium tumefactio suadent: Nec obstat, quod nunc tumefactio illa delituerit ac tussis ablit, quoniam illud contingit ob evacuationes præcedentes, hoc vero, quia adhuc in pulmonibus materia non est recepta, nam morbi latitudinem quandam habent, ut non sit necesse semper omnia illa reperiri, quæ illos ex æte demonstrant, hinc hydrops hæc, est quidem in habitu, non tamen omni ex parte, quatenus inquam tussis hucusque non supervenit. Malum itaq; de quo agitur est tumor, & ob id morbus in magnitudine, ut habet Galenus libro de Tumoribus præter naturam, ad finem, & quamquam ipsum libro de Differentiis Sympt. 4. Symptomata vocaverit, alicui mirum videri

non debet: tumor namque ex libro de Differentiis Morb. 12. si ad insignem magnitudinem pervenerit ut lædat actiones, Morbus dicitur, sicut in casu proposito, lædit u. (ut ex cæcis collat) plures actiones, potissimum, utem intellimorum compressionem, quæ ut à musculis abdominis pro sæcum expulsiōe, et quod si idem tumor non vitaret actionem, jam symptomata esset facultatis sanguificatricis.

Causa huius mali petenda tum ex parte agentis, tum ex parte passi; Ex parte agentis duplex exitit, proxima & remota; proxima est materia flatulenta cum aquosa permixta in cavitate abdominis, tanquam in locum jecori, ac ventriculo proximorem, capacioresque citra dolorem, ac ægri molestiam receptat. Remota est intemperies frigida jecoris & ventriculi, nulla enim hydrops ex Galeno secundo Progn. primo, ut citra jecoris refrigerationem ob quam sanguinem statuentum, ac aquosum gignit, cui & ventriculi intemperies favet, qua facultas eiusdem concoctrix calore proprio, atque nativo ex parte orbata, a scopo aberrat, jecorique chylum aquosum, ac flatulentum suppeditat, quamquam etiam & flatus per poros membranarum ventriculi expirare, & in cavitate abdominis recipi possint.

Undenam autem horum viscerum intemperantia ortum duxerint, præter errores in victu, ac animi passionem refrigerantes. puto ego à caloris nativi diminutione ipsas ortum duxisse; Nam in ventriculo primum tunc imminutus calor nativus ob resolutionem factam in spiritibus occasione cuiusdam venarum podicis hæmorrhagiæ, quam antea nobilissimus patiens passus fuit; deinde vero in jecore, non solum primo per resolutionem, sed etiam per suffocationem, suppressio scilicet ex toto in sanguinis fluore, sic enim cacochymia vitiosa retenta sui copia, & qualitate venas jecoris obstruens, caloris extranei, ac præter naturam causa fuit, qui uti magnus ignis in calorem naturalem moderatum, agens, tanquam parvum ignem, eundem depauperavit. prius, non autem suffocavit, quoniam copia hæc non excessit, cum illius portio ad cutem transmissa lichenes, quibus vir perillustri fuit afflicti, pepererit, quæ postmodum non amplius ille demissa, sed in hepate retenta, suffocando, calorem nativum corripuit, atque sic hydropi, præter Hippocrates, & Galenus 6. Aph. 12. indicabant, dedie occasionem, à quo Symptomata jam proposita, veluti ab uno fonte plures rivuli scaturiunt. inappetentia quidem ob humiditatem excrementitiam os ventriculi supernum inorantem, sitis ob fumos calidos in eandem partem superius elevatos ab aquoso succo putrescente, vel ob moram in cavitate abdominis, tanquam in loco non naturali, & insolito, vel ob jecoris calorem extraneum ab obstructionibus in eodem exortis suscitatum; urina quoque rubra ex eo pendet, quoniam putredine, & imbecillitate segregatricis jecoris urina inficitur, ea etiam ratione impotentia ad motum patiens noster detinetur, qua spirituum deficit necessaria irradiatio, quia spiritus ipsi deficiunt, tandem fit scroti tumor. ob aquam illam abdominis descendentem; Caterum quod ad hunc hydropem

dropis ortum ficit, fuit dispositio passi hæreditaria, nam p. tientis huius consanguinei hoc Morbo detenti periere.

Si ergo medicatio esset instituenda ratione tumoris, status per insensibiles meatus & materiam aquotam fluxam per alvum, atque per eisdem pariter poros evacuare, fluentem vero per urinas, & alvum derivare, ac per sudorem revellere deberet: At ratione causæ remotæ jecur, & ventriculum deobstruere, & calefacere opus esset, ratione vero virtutis proportionem horum viscerum hepaticis, ac stomaticis conservare, & caloris nativi ruinam, immutationemque reparare, ac relaxare.

Quam medicationem ad foelicem exitum perducere non licet, quoniam vitium tractatur hæreditarium, in habitu, & cum maximo recessu à statu naturæ, vexat etenim corpus a primo semine biliosum, causæ etiam morbinæ necessario ad agendum efficaciæ existunt, nam plura Symptomata patientem affligunt, totumque corpus male habet, ac virium robur sub hisce malis pene succumbit, quod non tantum ex ætate quinquaginta sex annorum, sed etiam ex virtutis regitivæ non obscuro languore facile est intelligere, Verum tametsi medicationi locus non detur, quoniam tamen (ut Soranus tradebat) haud humanum est in extrema quoque desperatione languentes penitus deferere, ideo patienti nostro medicina non dene-ganda, si non curationis, saltem præservatio-nis gratia, quod eo magis faciendum esse puto, non solum quia malum hoc omnem sui gradum non attingit (ut ex tussis absentia, ac seroti tumore interpolato indicatur) verum etiam quoniam patiens remediorum avidus, se totum Medico obsequentem præstat, quibus omnibus rationibus impulsus materias medicas in medium proponere cogor.

Et primum chirurgicas, quas ad evacuatorias tum immanissime, tum manifeste redigo, Maxime cucurbitulæ cum plurima flamma ex Rase, ventri ad status dissipandos applicitæ: hæ vero sunt vesicatoria ibidem adhibita, & diu cerato sacro aperta asservata; huc referantur c. u. teria circa umbilicum tantum, non autem semoribus (quoniam tument) excitata, item & seroti punctiones ex Actio cum acubus, vel, quod magis probo setaceum eidem seroto affixum, cum jam ad ipsum naturæ cœperit transmutare, & commodè admodum aqua per partem illam expurgeretur, quoniam peritoneum, quod est sicuti sacculus flatus, & aquæ hypochondriorum illac descendit, perforationem umbilicalem in præsentem repleto, non solum quia senilis ætas reclamât, verum etiam quia mortem accelerat, quod si contingat, quoniam cum aqua simul spiritus innatus absorbetur, vel quoniam ingreditur aer frigida, qui vires aquæ supplet, & calori nativo jam valde imminuto adversarius eundem extinguit, non est ut interim pertractetur, sat enim est experientia novisse hoc remedium genus interimere, quare loco ejus punctiones in seroto ab Actio propositas, item & c. u. r. scarificationes substituerem, Atque ut hæc diu ichorem emittant patientem Lætica circumferre oportet.

M. di. amentia respiciunt causam & proximam, & remotam, si proximam, occurrunt evacuan-

tia sensibilibiter, ac insensibilibiter. In priorum ordine sunt, quæ alvum citant singulis quinque diebus data, uti quod ex succo radicis ireos aucta doli cum melle solutivo vel confectione de Alcachengi, vel pilulis de Opoponaco, de elaterio vel ipomet elaterio cum pilulis aleph. inginis dato paratur; quinimmo & clysteribus paratis ex elaterio, oleo laurino, de octo radicibus ebulli, centaurei min. artemisiæ, fœniculorum, anisorum, & soldanellæ, melle rosato solutivo, pilulis foetidis, vel aliqua ex hyeris magnis, ac nitro alternis diebus iteretur; umbilicalia etiam ex elaterio, scammonio, squama aris, succo tithimalli, helleboro albo, nitro, & unguento de arranita cum felle taurino exceptis continuo admoverem.

Insensibilibiter autem evacuant assumpta, injecta, & admota, Inter assumpta oleum calcanti, vel sulphuris ad guttas aliquot ex vino odoro, vel jure columbi datum, atq; utraque antidorus magna mihi vehementer arrident, sicuti & ad flatuum discussionem præcipue aqua stillatitia cinnamomi, & oleum ex anilis, fœniculis, aut rad. anthoræ destillatum laudatur; In hunc etiam usum clysteres injiciuntur ex decocto rutæ, & seminum Dauici, carvi, cumini, baccarumq; lauri in aliqua therma calida facto ex electuario de baccis lauri, oleo rutaceo, hyera Diacolocynthidos, & melle despumato parati.

Exterius pro abdomine primum forus ex decocto artemisiæ; Diptami Cretici, ac seminum flatus dissipantium cum sulphure, nitro, & alumine in vino, & lixivio composito, & per spongas applicito. Secundo, illitio facta cum oleo, in quo radix brionie in talleolas discissa fuerit trita, in quo etiam oleo parantur placenta ex ovis ad comedendum. Tertio, Cat. plasmæ ex radicibus cucumeris agrellis, & ficibus in vino decoctis, adjectis elaterio, staphide agria, hyssopo, felle tauri, cymino, ac sale, vel illud quod nono local. 3. ex Asclepiade ipoterium malagma dictum habetur, vel lina sulphurea, salsa, nitroque. Quarto, Ceratum Diapirites convenit, vel quod.

2. Cerati barbari, pharicini an. 3 ii. nitri. sulphuris vivi an. 3 j. seminum dauici, amos an. drag. ij. Terebintinæ olei laurini an. 3 R. baccarum lauri, juniperi an. drag. iii. cum cera & pice fiat ceratum molle.

Ad tumorem vero crurum, & pedum, tum lotio ex thermis calidis, in quibus calx sit extincta, tum oleum salitum atque forus ex ipsomet sale siccato, & fusturibus calefactis probantur.

Medicamenta vero, si causam remotam respiciunt diriguntur vel ad materiam antecedentem, vel ad viscera, priora per varias regiones evacuant, primo per vomitum, dummodo materia ventriculo insit, ac primis ductibus, patientisque ad evocandum sit facilis; inter cætera autem vomitoria probo quod ex decocto florum genistæ, ac oxym. simplici conficitur: Verum enim vero hæc eadem materia percommode hydragogis nitioribus evacuari potest, ac propterea succum medianæ, sambuci, mechoacanique seligo.

At si materia sit in gibba jecoris parte, ac venis superioribus, urinas esse movendas arbi-

tror vino infusionis Dauci Cretici cum Nardo, & Cinamomo, vel sale ex Sabina chymico ex decocto baccarum juniperi propinato, vel syrupo de artemisia, aut de rubea tinctorum, vel diacurcuma.

Quod si eadem materia in ambitu corporis contineatur, sudorincis omnino est educenda, ideo pulvere cardui benedicti ex vino, vel syrupo Sancti Ambrosii vocato, cum decocto cardui benedicti, vel Diureticis exhibitis vel balneis siccis, præcipue vero instrumento ligneo in lue venerea ad sudores excitandos et hinc erit excitandus sudor.

Tandem de alterantibus viscera sermo est habendus, in quorum classe ab electuario cyphoides, ab ipso dialacca, ac trochiscis de absinthio, adjecto hepate lupino haud recedendum. Theriaca etiam in hunc finem mihi non parum arridet, neque propter ætatem senilem suspectam esse censeo, quoniam Gale. 6. de sanitate tuenda capite quinto, theriacam senibus non incommode dari, & in calce libri de theriaca ad Pisonem vitam prorogare scripsit.

Utrumque tamen rationis victus maxima est habenda ratio, ideo versetur patiens in aere calido, & sicco, cuius causa licebit & solum mutare, vel navigatione ex Galeno, vel itinere pedestri, Cibus quantitate sit mediocris, qualitate calidus, & siccus, extenuans vel propria natura, vel præparatione, & admixtione pulveris aromatatum, & seminum odoratorum, qua de causa parum admodum panis comedendum, quando non nihil visciditatis retineat, ut propterea panem biscoctum magis probem, sicuti & cœnam prandio quoquo pacto uberiores non improbo; humida quoque, & liquida quæcumque vitanda censeo, potus existat vini Fulvi, ac tenuis, & quam minimum bibat vir per illultris, illudque semper ob oculos habeat, quod plures hydropici, qui ab omni potu abstinerunt, liberi tandem ab hydropse evaserunt, vinum autem factitium (uti esset anthosatum, salviatum, ac enulatum) seligere oporteret. Plus vigilare, quam dormire expedit, sicuti corpus exercere (si liceret) ambulationibus, gestationibus, vel per currum, vel per triremem, aut cymbam; Quod si somnus interdum fiat in stratis, in quibus substernantur herbarum calefacientes, uti salvia, Anthos, amaracus, serpillum, calaminta, Hyssopus, & Diptamus Creticus, plurimum conferret; Alvus proritetur, si necesse erit, vel conserva ex summitatibus rosarum communium domesticarum in manna conditis, vel pilulis de aloe in succo æreos lota, vel pulpa caricarum, & Cartami, vel sale chymice ex tartaro facta, & caricis indito, sitque inter cætera Patiens nobilissimus animo (quantum fieri potest) constanti, & læto, bene de valetudine speret, quæ ut illi quamprimum contingat D. O. M. precor. Julius Cæsar Claudinus in Consultationibus Medicis.

De Tympanite. Pro Illustriss. Gossacno, Ferrariam

Quemadmodum ex inflatione ventris tympani instar resonantis facile est determinare Tympanite detineri Illustrissimum Virum, Domum meum Colendissimum: ita accedo sententiæ Præclarissimi Viri, cui ejus cura demandata est,

affectum hunc ortum ducere ab imbecilli calore viscerum naturalium; & quidem ventriculi primo, ut patet ex variis dejectionibus pituitosis, cœliacis, & lientericis. Lienis autem imbecillior multo est, utpote quem jamdiu melancholica saburra gravat, ut propterea facultentum sanguinem in præcalido jecore genitum, accedente inordinata victus ratione, ad sese allicere, & depurare non potuerit, cujus proinde sarcina gravata natura, ejusdem per vomitum excretionem, & per alvum, forte & per urinam molita est: per quas vias lien facili negotio vitiosos humores sibi graves deturbat. Ab hac tamen evacuatione imbecilliores longe redditum fuisse calorem cum ventriculi, tum lienis. tum & jecoris mihi persuadeo, ut paulo post intumuerit venter. Cuilibet propterea palam hæc summa cum ratione à D. Hipp. determinatum fuisse. 4. Aph. 21. quod excrementa alvi nigra sanguini atro similia, sponte excurrentia, live cum febre, live sine febre, pessima. Quod tamen intelligendum non est de excretionem melancholici naturalis. Hæc etenim non raro felici cum successu à natura rejicitur, teste Gal. Lib. de Atra bile Cap. 3. sed locum habet in excretionem atræ bilis, prout variis exemplis confirmavit Marcellus Donatus Lib. 4. suæ historiæ Medicæ mirabilis: cujus qualitatis præteritum vomitum, & dejectionem fuisse mihi persuadeo, cum & elapsis annis, dum crura intumescerent, suborta fuerint ulcera, febribus acutis fuerit opportunus, & vinis generosis sit assuetus.

Quas ob causas vereor quam maxime ne tandem aut hydrops invaleseat, vel nova succedat hujusmodi materiæ lethalis excretio, quod avertat Deus.

Quare pro curatione præsentis affectus, & præsertatione à gravioribus imminentibus discutendi sunt status; eliminanda munera, à qua elevantur per alvum, & urinam, atque contemporanea intemperies omnium viscerum naturalium per moderate calorifica, & subastrictoria facultate prædita.

Quibus intentionibus abunde satisfactum video à Viris istis præclariss. decocto præscripto, cum gallo, & aperientibus, roborantibus, diureticisque præmisso bolo ammoniaci, & lienis equi pulvere tanquam à proprietate juvantis, non omisso cyphoidis antidoto, in affectu non ablinibili magui usus, addito sale absinthii, aliisque hujusmodi, si Morbus Curationem admittat. Non præter rem tamen censerem pulveris viperini usum cum aliquot guttulis olei de mentha & spiritus vitrioli, cum pro validiori subastrictione, tum pro faciliore excretionem materiæ per urinam. Nec displiceret, si aliquando dejectorium redderetur prædictum decoctum corticibus myrobalanorum. Indorum, & foliis sennæ. Quod si sperarent Viri illi præclarissimi urinam liberalius fluxuram, admixta urina destillata pueri impolluti, ratione sympathiz, in usum revocari posset. Magna tamen cautione utemur validis aperientibus, ob metum novi sanguinis fluxus; cujus ratione non abs re forsitan fuerit instillare decocto proposito quinque aut sex guttulas chalybis potabilis cum magisterio corallorum. Extrinsecus autem foveri poterit totus venter pelle vulturis, præmissa & sæpius repetita inunctione oleo de men-

savere. Bis intra biennium ægrotavit, primoque diuturnam lentamque febrem experta est, pro qua peilenda, præter, cætera, decoctione epithymi Mel. & syr. de cich. & pom. comp. usâ fuit, recidivante interim sequenti anno eodem affectu, viâus ratione, aliisque levioribus auxiliis fugato.

Demum hoc anno, elanguente vere, papulis quibusdam rubeis, violæ & rotundis, per cutem sparsis sædari cœpit, quæ assumpto jure cichoraceis alterato extemplo delituere: superstitibus tantum quibusdam pustulis miliacis in collo & dorso. Sed quod negotium facessit, est morbi deterioris, pro quo consulimus, nova propago. mense Junio proxime elapso exorta; tunc enim circa lumbos dolorose torqueri cœpit, dolore etiam ad umbilicum protensio cum torminibus, quibus per quindecim dies circiter vexata fuit, nullo interim adhibito auxilio quievit, at redit post dies cruciatus idem, cui successit abdominis totius orbicularis intumescencia, tensa, prædura, elevata & sonora, quæ aliquando spirandi tulit angustiam & decumbendi impotentiam, siquidem misella Patiens deorsum se reclinare nequibat, nec super latera jaccere, at sedens noctes diesque transigere cogebatur; Nunc vero decumbit, bene spirat, nihil tamen imminutus est tumor. A læst aliqua apud familiares suspicio, hujusmodi inflationi ansam dedisse moram diuturnam ac sedentariam supra novos ædis Sacræ parietes, quo ipsa virgo sodalitiis causa festivo tempore conveniebat. Non omnino pallefcit, non sitit, nec alia pars tumet, excepto ventre, qui tamen non fluctuat, compressus, non cedit, semperque quoquo se vertat permanet idem, nec sinit ob insulationem præmagnam, viscerum obstructions in apertum venire. Tandem accersitus ego, & cuncta diligenter contemplatus. Tympaniticam affectionem censendam esse non dubitavi; ultra namque tumoris spectaculum, etiam sonorus auditus est, nam ad palmæ percussum abdomen sonum edit; neque ad corporis conversionem spiritus locum mutat, inquit Aretæus lib. 2. cap. 1. quæ cuncta in præsentis affectu concurrunt. Quem quidem prænuñtiavit ventris dolor diuturnus quindecim. Quare divinus Senex Aph. ii. Sect. 4. ita prædixit: *Quibus tormina, & circa umbilicum dolores, & lumborum dolor, qui neque medicamentis, nec aliter solvitur in Hydropsen siccam firmatur.* Cujus profecto causam spiritum flatuosum cum Galibidem in Comm. seu flatum crassum exare afferendum cum Actuârio lib. 4. cap. 2. intra ventris capacitatem conclusum, sive in toto corpore stabulantem, ut vult Alexander lib. 9. cap. 1. exque venarum mæsaricarum oscillis cum Platero, vel per cæcos meatus cum Fernelio detrusum. Quod facile in virgine Nobilissima contigisse crediderim ob crudelitatem saburram in venoso genere scatentium, cujus indicia extant vitiatæ Menses decolores & inordinati, atque cutis efflorescentiæ prægressæ. Quas cruditates in primis visceribus nutriti suspicor ab imbecilli ventriculo ob hæreditariam diathesin humidaque forsan ipsius universalis temperatura, quam arguunt color corporis albus, pacati mores & vita sedentaria; quibus interim ab ignea jecoris effervescencia in halitus flatuque conversis, nil mirum, si prius inter menterii tunicas involuti, earum laucinati ac

tensione lumborum dolor ob viciniam exortus fuerit, inde post exitum ventris tumor, cum difficili respiratione ex ventriculi cum diaphragmate compressione. Cui morbo omnino periculoso, ut cum Aetio loquar Tetrab. 3. lect. 2. cap. 20. statim occurrendum decrevi, antequam Alutes exoriatur: Quare ex Chirurgico fonte, ratione hepatis calidioris, & Mensium aliquatenus imminutorum paucula sanguinis uncia ex pede dextero demptæ sunt, coloris atrii, sæculenti, crassi, visceri & flatuosi, Clysteres, prout res postulat, modo laxantes, cathartici, emollientes & carminativi impositi; ventri inunctiones, emplastra emollientia & discutientia. Nondum cucurbitula sicca abdomini applicita sunt sive magnæ cum Galeno 12. Meth. 3. & 14. 7. sive parvæ cum Paulo 3. de Re Medica cap. 48. quas assidue affigendas consuluit. Ex fonte Pharmacentico varia deprompta sunt, primo mundatæ fuere primæ viæ potione sovina singult. clarif. in aqua totius citri paratæ; dein per vices septem alternis diebus exhibitum est electuarium lenit. ad 3iii. cum nigr. vimag. mechoa. quandoque cum elect. lenit. permixta sunt pilul. de Aloë & hisce postremis diebus ad hieram simplicem, & species *Eleosphi* devenimus potionem quinetiam catharticam ex sena, rhab. jalap. mechoa. cum cremor. tartar. in aquis agrimoniz & menthæ cum manna præscripti. Præparavi syrup. acetos. & cort. citri; blandeque simul eduximate; ias crudas per epicræ in Cichoraceis cum Cremore tartari mixtis. Copiose deiecit virgo usque adhuc tenaces densasque pituitosas materias cum multa flavæ bilis societate. Quare nunc non abs re deveniendum putarem per dies aliquot ad sanguinæ massæ depurationem per depuratos succos cichor. & borag. prius, inde agrimoniz, cum decoct. cichor. fumariz, boraginis, melissæ, agrimoniz capill. veneris, menthæ & fer. in. citri additis aperientibus radicibus, ut ad urinæ viam duceretur, qua vergendum hortantur. Oribasius Synops. 9. c. 23. & Agneta lib. 4. cap. vigesimo octavo & 3. cap. 48. Et nimmerem de nimio jecoris calore, mihi ardiret syrup. Ferneli usus. Dein descendere cogitarem pro majori intestinorum & ventriculi correctione ad aquas Tettucianas & postea ad aquam de succo agrimoniz cum spiritu salis ac tartari, ut efficacius aperirem urinasque cicerem. Quibus peractis; ad flatus discutiendos & viscera roboranda descenderem, intus videlicet rotulis ex aaomat. ros. in. q. menthæ præparatis cum oleo fœniculi, cit. anis. chymice extractis, vel assumptione aq. de cinnam. vitæ juniperinz; theriacalis, vel syrupi de cinnamomo, aut de caryoph. Quercetani. Extra pararem Enip'lastra de baccis lauri, de meliloto præmixtis prius frictionibus inunctis manibus ol. lil. alb. rutaceo cum aq. vitæ. Et si refractarius esset affectus, ab oleis magis discutientibus, stillicidii forma, non abhorrerem. Postremum locum obtinerent vipereus pulvis, absinthii sal cum ligno sassafras, Conservæ rosarum, cichor. & de toto citro permixtus; totaque hac hyeme medicatum vinum paratum china, salsa, sassafras, lentisco & absinthio exhiberem, observata in cæteris optima vivendi ratione. Quæ ut Patienti eximie meream geram, cui salutem enixe precor, pro meorum virium tenuitate exaravi, cuncta tamen, Vir 9.2

℞. Rad. cucum. agrest. seu asinini, sambuc. ireos, & soldanell. an. ℥iii. incid. optime & infund. per duodecim horas in ℥vi. vini albi & clari, deinde bulliant ad consumptionem tertie partis: quo tempore adde cumini, anisi, sem. feniculi, ammeos, dauci, seseleos, ruta, anethi an. p.i. cortic. citr. ℥iii. cinnamom. elect. ℥℥. tragac. & mallich. an. ℥. i. bulliant s. A. & coletur, & servetur: dosis ℥vi. vel viii. hoc vinum partim est ab Aëtio desumptum, & partim ex nostra inventione, & ut ingenue fatear, mirabile est ad educendos flatus, tum per os, tum per secessum, & multoties sum expertus: evacuat per vomitum aquam citrinam, & quandoque per secessum, & tantam ructuum & flatuum copiam movet, ut certe sit incredibile: & testor Deum quod assumptis à nostra agnata bis pro vice ℥viii. istius vini, fuerit secuta evacuatio ad ℥iiii. aquæ citrinæ, & infinitum ructuum & flatuum proventus, & tumor minor factis erat: & iterum illud bis exhibuimus singulis quinque diebus, & eadem secuta sunt cum mira tumoris detumefactione. Est hoc vinum mirabile & maxium, nam si quæ simplicia sunt in ipso deleteria, tamen adiunt corrigentia: quare tutum est & saluberrimum remedium tum in Ascite, tum in Tympanite. *Epiphanius Ferdinandus hist. 41.*

Tympanitis externis curata.

Tympanicus quidam ab omnibus fere Medicis desertus, a femina quadam mihi confanguinea sola inunctione olei philosophor. totius ventris bis de die facta, & per aliquot septimanas continuata, & suppositorii loco adhibitis globulis contra flatus, perfecte convaluit. Antea Melancholia ex lypothoridiis, dolori colico sapissime recidivanti obnoxius fuit, postea vitam satis commodam per octo fere annos ducebat *Paul. Spindler. recensente Carolo Raygero in obs. Medic. Centuria.*

Historia Tympanitidis curata.

Vir annis quadraginta natus temperamento insignitus calido & humido, quod amicum inquit, sanitatis erat ad arrogantiam felix, ut pudendos & familiares diversa sortis excessus praxi vix interfectos inconcussa rideret: grandibus vitæ immodestæ peccatis aucta viribus adeo petulanter superbiit bilis, ut quæ naturæ rationalis decreto animæ agentis officio facit sinistra inverso per nefas rerum ordine illi violenta injuria subdita impudenter dominaretur, sociorumque laticum inclinationis naturalis motus injulte frustraretur; hinc vel ad umbram rei ingrata bilis igneæ raptu perditus futebat quam sapissime uxori & toti familiæ horribilis & adeo sylvestris isthæc passio in habitum inhumanum sese corruerat, ut non tantum ad occasiones ab aliis quacunque tandem sorte datas, precipitanter excandesceret, sed ipsemet capitante animo eas vel mentiretur, vel ubi per genium hic imprimis callidum licebat, malignè vexaret. His omnibus sed maxime profusa meri generosi ingurgitatione & concomitantia necessitate, irregulari & sensuali alimonia abusu imaginationem gustu animaliter ludente accidit tandem, (cum studiose agentis ruinæ denique nil non pareat) ut nutri-

ces partes deplorandam subierint felicitatis naturaliter eximia pectus medullitus corpori universo radicata intemperies per egrena, calida ea & sicca, qua arsit ignitus & humor qui-vis irrigans corpus ad varias ejusdem augendi & servandi necessitates; ceciderit tandem, quæ se generose ab injuria pertinaci aliquandiu vindicant non ostendat vires, appetitus omnis stratus, universa cutis flavo colore omnia turgent inerte tædata, præcipue album, ut solet, oculi utriusque, gutturus nata amarities mordicans, somnus brevis, isque infomnis horridis intolerabiliter gravis, interea in miferia comulorum terrificæ tensionis totum abdomen se dilatabat, ut digito percussum aliqua tympani militaris imitatione non obscure sonaret & corpus profluo: a repletionem rigidum tantum flecti pervicaciter abnueter ut conanti læpius agito & acius propterea urioso tu. s. tibias videre nō liceret. Reliquæ omnes corporis partes macie depascenti famelicè tabescebant, anxie cogebatur spiritus vivificus, brevis & frequens quasi arctato thorace; captivus pulsus erat irregularis, intermissus, debilis, frequens; urina ex rubro nigrescente colore imbuta, eaque, quod huic flatui desperatio est, avara; tussis sicca pulmonem sæpius concussum proterebat. illico ut de cubentem breviter examinavi ipsius forti nequissimæ indignatus candidæ uxori ipsius & adstantibus dixi res ipsius pessimo loco sedere, cum funesto hydrope jam radicatus corpori implantato, & quem viscerum pollutorum lues nutriat, gravissime periclitari, & ea specie, quod pejus est, quam tympanitem usus dicit, reliquis. Illic vitæ perdendæ periculo longe graviori; insuper quod hic nuntians vicinam mortem tussis jam urgeret; ex Hippocratis Aphor. 47. sect. 7. si hydropticum tussis habeat, desperatus est; quod aqueum humorem in thoracem irrepat brevi necisurus funebriter vitales functiones. post quorundam fletus, omnium commiserationis sensus teneros non ultimos discursus & denique tempestatis subita impetu primo nonnihil pacato, rogatus omnium sensu sui, ut in solamen, si in vitam reducem non pateret spes, omnia ex artis beneheæ industria & charitate humana quæ vel umbra spei blandiri valeret, studiose disponentem; quæ omnia benevolè pollicitus fui, ea ergo ipsa die illius naturalē iconem, ut rogatus fueram depinxi vicinæ urbis Medico fama gloriosa illustri, mittendam in consilium qualecunque accipiendum; Is in conclamatione non orbi futuri prognosin multo discursu parens necum haud, hæsitante ixit, ego nihilominus, ut promissa solverem has indicationes stabilivi, corpus caloris & siccitatis utriusque excedentis insolentia, viribus, spiritibus, humoribus & partibus sanguineis exhaustum humectandum, refrigerandum, reficiendum, varioque id humori in ad crassitatem excoctorum glutine oblinaci infacium aperiendum; & excrementis, quæ squalebat, extriciendum; idque interiorum & externorum medicaminum officio generoso, ejus tamen sint perpetuo conditionis quæ citra caloris hic utique funesti actum nem rem moliantur. Ergo imprimis imperata jussula ex pulvis gallinaceis & carne vitulina, quæ incoquebatur oxalis, Borrag. cichor. endiv. Bugloss.

pitatio sentirentur eoque nomine de sepeliendo corpore ambigeretur, accersitus cum ventrem aperirem, flatus tandem erumpebant: verum intestina tantopere dilata erant, ut senioris crassitiem certis in locis adæquare viderentur, atque ex compressione disrumperentur, stercolisque magno impetu profunderent: aliis vero locis adeo convoluta, intorta & implexa, ut nulla illic nec excrementis nec flatibus deorsum pateret via: Sed & vermicibus vivis, oblongis quamplurimis referta erant, qui rursus aliis minoribus repleti inæquales illos motus effecerant: Præter hæc, hepar corruptum, arenulis, lapidibus infarctum lienem immixtum, pulmones vitiatos collisque affixos (ut in aliis multis sæpe accidere dixi) ostendebat. *Platerus Observat. p. 656.*

In intestinis & ventriculo retenti flatus, necdum in spatium abdominis procidentes, non solum colicos cruciatus pariunt, sed si adeo inclusi sint, ut nullo patente exitu ea in immensum adeo attollant, ut totus venter inde distensus appareat, tympanitidis quoddam genus, & forte frequentius quam aliud quod illis in ventrem erumpentibus fieri communiter docent, procreare possunt: Sicuti in illis quos Tympaniticos esse putabant, deprehendimus, flatum nullum in seclis post mortem e ventris vivo eruptisse, nec ventrem subieclisse, sed intestina, tenuiora præsertim, adeo flatibus distenta, & convoluta prodisse, ut in eundem ventrem reponi amplius nequirent, mirumque fuerit quo pacto in ventre prius clauso adhuc contineri potuerint. Quæ & in quodam adeo attenuata ex summa illa dilatatione reperimus, ut non solum tenuissimæ velicæ instar, vento inflatæ & dilatatæ pellucida essent, sed & compressione aliqua disrupta, stercola cum flatibus procul effunderent: Cujus Tympanitis causa non alia ab ea quæ & alterius existit, flatuum scilicet proventus, atque intestinorum convolutio, vel insignis obstructio: Unde & in hac specie nec flatuum, nec quicquam per alvum longo sæpe tempore egerunt. *Idem Pract. lib. 3. c. 6. de exuberantia.*

D. Salvatoris Medici uxor 18. annorum, cui nunquam menstrua effluxerant, quæ multis mensibus antea laborarat quartana, splenemque magnum habebat; illi venter nonnihil intumescibat, licet nulla de re conquereretur, ita ut dubium esset an prægnans: die 25. Octobr. incidit in dolorem ingentem scapulæ lateris sinistri, vix poterat corpus movere, febricitabat, conqueratur de hypochondriorum dolore, maxime de sinistro, vomituriebat, & ructus emittebat, venter admodum intumuit, & subito difficulter spirabat, dentibus interdum stridebat, dolabant lumbi, potum appetebat quem raro rejiciebat: vires statim prostratæ, 29. mane, circa 2. aut 3. obiit, semper mente constans.

Ex aperto ventre ingens copia flatus erupit, foetidi admodum, inter intestina & peritonæum multus humor aderat, circa latus sinistrum apparuit pinguedo innatans, quæ suspicionem præbuit esse vel ex enematis vel ex juseulis, rem inquisivimus, invenimus foramen circa mediam ventriculi partem, ad fundum, ubi fingitur epiploon cum ventriculo prope Colico, versus sinistrum latus, magnitudinis di-

giti, epiploon, ventriculi tunica tertia, hepatis tunica, & ligamentum suspendens, omnia rant putrida: ventriculus adhuc bene habebat. Intus continebantur multa nigricantia, ita ut videretur humor melancholicus: pridie supremi diei sanguinem concretum longitudine dodrantali excreverat, præter eum grumum nullum, splen detumuerat. *Ex Observat. Joh. Banhin.*

Creber spiritus cum aqua ubi distenderent abdomen Matthæi Antonii, *tympanitis* vocatur Græcis, sategit ipse pro virili parte corrigere aliiatis illam intemperiem, vel potius imbecillitatem quæ ponitur mali causa, sed accendit illis usque eo lienem obstructum, utique bilem atram (quæ redundabat) per se satis turgidam, ut per referatas ventriculi ac lienis venas, eruperit ipsi supra infraque tam frequens cruor, ut pessum ivisset nisi impetum huius illico fransissent, cum sanguis mature missus, tum pulvis corallorum, aliæque inspissantia acutum potui data: Quorum ope superavit quidem tempestatem ab alio improvidè excitatam, sed nequaquam imbecillitatem viscerum: necdum spiritum vel aquam, cujus Tympanites nunquam est expertus.

Facta autem post mortem secandi copia, videmus perspicue quàm inconsiderate dentur sæpenuero hydropicis allata aliæque potentiora vina: intumuerat quidem lien: hepar retortidum exaruerat: intestina erant syderata: ren putridus, & in ventre ultra xxx. libræ aquæ: memini aliquando in simili hidrope, ob continuum usum vini malvatici ab empirico præscripti, adeo inflammata fuisse viscera, ut os non modo repletur aphthis, sed ignoraret ægia præ se ferret quo se verteret, donec miseræ finem inveniret. magis mors quàm Medicus. *Nic. Tulpinus observ. lib. 2. cap. 35.*

Anno 1655. mense Martio, Nobilis cujusdam vicina Cujavia conjux cum filiolo unius anni a colicis doloribus & flatibus per aliquot dies misere afflicto Thorunum venit, consiliumque à p. m. Excellentissimo D. Georgio Mochingero, Phytico tum primario, petiit: Sed puellus ille paucarum horarum elapso spatio mortuus est. Tum præfatus Dominus Mochingerus pie defunctum Excellentissimum D. Christophorum Meißnerum Phys. ord. & me, ut sectioni una cum illo interessemus, rogavit. Mirum sane dictu! quantum ventriculus distensus erat, in quo nihil præter flatum & aliquid visceri humoris conspiciebatur, intestina autem omnia tam pellucida transparebant, ut etiam multis in locis compuncta statim conciderent, ne guttula quidem humoris alicujus in illis apparente, reliquis visceribus se bene habentibus. Huic analogum exemplum recenset Ant. Benivenius Exempl. Medic. Obs. cap. 81. ubi ex solo vento in Ludovico Nicolino Generosi equitis Othonis filio, mortem subsecutam scribit, quem affectum ibidem in Annotationibus Dodonæus Tympaniti similem fuisse scribit. *Simon Scholze.*

HYPOCHONDRIACA AFFECTIO.

Vid.

AFFECTIO HYPOCHONDRIACA

PPPP +

Interea ad virium refectionem per vices cochlear unum atque alterum mixturæ cordialis exhibui.

℞. Aq. nostræ cordisti frig. ʒ ii β. aq. rubr. idæi, fr agorum, rosar. an. ʒj. emulsi. cunctorum. borragin. sine vino detrahit. ʒ ij. aq. carbonu. li ʒ j. margar. præp. ʒ j. C. C. usti ʒ ij. corallor. rubr. præp. ʒ i β. imaragd. præp. ʒ β. sp. rubri idæi ʒ β. spir. rosar. ʒ j. mixtæ cydonior. ʒ β. Muce.

Cordi & pulsibus epithemata convenientia apposui, inuncta etiam ipsius dorsi oleo amygdalar. dulcium.

His nondum proficientibus circa vesperam exhibui opiatum meam bezoardicam cum granis duobus laudani opiatum, a cujus usu in somnum profundum incidit, quievitque per integram noctem, sedatis ex toto alvi turbationibus. Vires etiam continuata cordialium usurpatione & alimentis bene nutrientibus, brevi, per Dei gratiam, pristino vigori restituta sunt, restitio evidenti documento, medicastri & barbitonforibus parum in his fidendum esse: Quæ nocent, docent. Melius à Magistratu prospectum est Italix, ubi in singulis fere Civitatibus loco publico affixæ conspiciuntur tabulæ, cum inscriptione: Nomina Medicorum, quibus licitum in hac urbe purgantia præscribere. Magna enim in molienda c. tharsi opus est cautione, etiam doctis interdum non satis expedita. *Baldus. Titman in Casibus Medicinalibus.*

Hypercatharsis à levissimo purgante medicamen. o.

Cognatus strenuissimæ Viri D. Thomas Lucas equitum Capitaneus, vir circiter quadragenarius, cum se non ad modum bene haberet, meo consilio foliorum senæ ʒ ij. (nam dicebat se facillime medicamentis moreri) per noctem maceravit in cerevisiâ tenuis ʒ iij. vel iv. atque istam colaturnam sequenti mane bibit. Afacili & levi hoc medicamento, mirum dictu! spatio circiter octo horar. sexaginta sedes cum summis torminibus habuit, & fortassis de vita illius actum fuisset, nisi sequenti haultu exhibito, & sudore provocato, luxum sedassem.

℞. Terr. sigill. ʒ i β. corall. rubr. præp. C. C. usti an. ʒ j. theriac. Andromachi ʒ iv. requiei Nicolai ʒ j. aq. theriacal. & cardui bened. an. ʒ j. M. F. naultus. Lintheamina ad ignem calfacta ventri quoque imponi & sæpius renovari iussis: atque ita substitit fluxus. Suasi autem, ne in posterum ullius Medici consilio aliquod purgans medicamentum, quantumvis leve, assumeret, sed necessitate sic urgente, alvum potius enemate proritaret, vel aliquo jusculo emolliente. *Brand. de Diemerbr. in Observationib. & Curationibus Medicis.*

Ex levi purgatione in Aurifabro mors.

Egregius ac virtuosus Dominus Georg. Heidit, Civis & Aurifaber Veniensis, rerum artificiarum deaurationi sedulo intentus, Realgaris sulphureo ac Mercuriali per inspirationem attracto fumo, reiteratis vicibus, lassitudinē ulcerosa otius corporis, tremore & palpitatione cordis

prehensus, est à me curatus; Pluribus tandem septimanis apparientis equeltribus deaurandis incubimet, ac quatuor hebdomadis omnino deaurationi superedisset, præter lassitudinem totius nil sentiendo, ordinaria lenitiva ex securissimis parata; sum praepurgatione, venenatis quantitatibus a tempore deaurationis in corpore latentibus agitatis, præfatis symptomatibus, sudoribus frigidis, Lipotymia ac Convulsionibus totius corripitur, nulli ve proniciatibus Renediis, Regia Cordis occupata, robustissimo corporis habitu exipitate cogitur.

Schonon.) Ut metallarii qui in fodinis operantur, periculis obnoxii sunt morbis, de quibus singularem tractatum edidit Theophrastus Baraccen. illoq. ieruda a disputatione Lipæ 10. 2. enucleavit colleg. cum solus præpropere demortuus Zephyrus, Leonhard. Utriusq. prof. botanices. hanc in usus Annabrianque quini. nus crebro Mercur. tractant, aut ejus tantum quovis modo, sive per os sive per aliam viam ad se trahunt, maximo suo damno experiantur morbus nervos interantes. Ut etenim in loco clauso exponatur aureum vas, & d. in mercurius supposito igne volare permittitur, totus Mercur. qui sublimis in auras evanescere putabatur, simulata fuga in auri vasis amplexibus herere invenietur, experienti Kircher. de arte Magn. L. 3. p. 3. c. 2. ne non natus in ipsis evaporationibus, quæ ab istis Artibus peraguntur, attrahitur in nares Mercur. in teque id Cerebrum genisque nervorum. Unde concludit Kircher. de arte Magn. L. 3. p. 3. c. 3. p. 635. cum Mercur. non raro in cranium in septuaginta inveniat, esse etiam talium Arcisium, cum etenim in extrahendo aut præcipitando Mercur. multum sit occupati, non exigua vaporis portem per nares excipiant, qui in singulas cerebri cellulas receptus, ibi detur congelat, ut etiam post mortem tanquam in valculis perennet, non ut Philoplati augentur, quod intra hominem & vivis Mercurius, ut materiam Lapideis sui hoc prodigio facient, invenitur. Docet hoc Avicenna Anatomi. Romæ facta: qui cum iniquos capitis dolores passus obisset, in aperti capitis cerebro plusquam Lib. j. Mercurii reperta fuerit ex vapore ejus haulto ibique congelato. In formæ calvaria quæ incisa ex Mercur. quotidie usa, & per biennium enormi capitis dolore tigrata, in ossæ calvaria Unc. ii. Mercurii inventi fuerunt. Zuing. in Thes. vit. Hum. T. I. f. 520. ex Cardano de subtil. Quin & externus admotus Mercur. per poros Corpori se insinuat, & divisus istius particulae rursus se uniant, unde ex manna canerosa Mercur. exstulavit, quod I. minæ Ungu. mercuriale adhibita fuisset Bathoni. c. 1. hist. 7. & Mercur. in sancti Emplastro adhære visus est, qui antea inunctionem parvis tuerat. Rhodius Cent. 3. obs. 87. S. ne post in partem inunctionem in Luc. G. lib. 2 Mercur. in caput interdum se insinuat, ibique relictus intensissimas Cephalalgias excitat, qui tandem Mercurius aureo globulo naribus, & aureo nummo ori indito (quia Mercur. antro ob sympathiam se associat, & illud dealbat) per vires extrahendus. Jacoz. 13. comment. River. & ipse Laz. River. Cent. 2. Obs. 91. ex articulis ve-

degeret, varios committens excessus in cruditate humorum, indigestionem, inappetentiam, pruritum ad frequentem vomitum, tumorem & inflationem stomachi incidit, sputum erat continuum maxime matutino tempore, idque album, tenax & valde viscosum, me ad se vocatum pro remedio rogavit, cujus petitioni lubens satisfaciens ordinavi illi pro digestivo vespere sumendo 36. Tartari Vitriolati in jussculo sumendam, absoluta post unam aut alteram horam pauca & liquida Cæna, ut altero die sumendum vomitorium in ejusmodi viscosis humoribus jam parumper præparatis tanto felicius succederet, nam totam materiam in Stomacho hædere adverti; assumpsit ille suum Tart. vitr. quem alias assumere solebat, nam semper eam domi pro ordinaria & domestica Medicina habebat; hora ab assumpto isto digestivo in talem purgationem incidit, ut intra 24. horas ultra centies secesserit, ita per noctem corruit homo alias corpulentus, ac si substantiam suam carnosam simul expurgasset, adeoque ob urgentia continua animi deliquia, & virium prostrationem, adhibita omni diligentia fluxum coercere debui, qui utique stetit, ita tamen ut per tres dies sequentes bis tantum singulis diebus excreverit, vires interea se modicum valde recolligebant, 4. die circa vespem accessit calor ingens, & virium dejectio adeo increvit, ut venæ sectionem prohibuerit, sed videbam etiam penes aliqualem efflorescentiam, eam autem definire nondum poteram, adfuit difficultas respirandi circa præcordia, eorumque ardor & æstus manum uferunt, & tensio tactui potenter renituit, absque tamen dolore: in his circumstantiis ita constitutus ad alexipharmaca confugi, & ordinatum tale Diaphoreticum, intermixtis aliis variis Cordialibus vespere assumpsit, & expulso sudore fetidissimo melius respirare, maculeque se potentius monstrare inceperunt, & urina turbidissima non adeo accensa mingebatur, cum autem idem altero mane ante ortum solis reassumendum ordinassem, assumpsit quoque, & circa meridiem tam copiosæ maculæ illæ petechiales conspiciebantur, ut totum corpus virgis cæsum quis putasset, Symptomata etiam omnia de hora in horam minuebantur, non neglectis interea tamen diaphoreticis continuis, sed non tam potentibus, ita ut 7. die adhuc insuper per copiosam diarrhæam fetidissimam, & variis coloribus intermixtam perfectæ & saluberrime judicatus fuerit. Mulier quædam phthisica raræ texturæ 26. annorum, temperamenti Cholericæ ad me venit, & consilium rogavit, satis adhuc robusta & vegeta, quia scalas ascendere potuit, sua etiam domi & extra absque adeo magna difficultate ritò perfecit, ordinavi illi duas Uncias mannæ in jussculo dissolvendas cum Uncia una Olei amygdalorum dulcium, & assumpto hoc laxativo pectorali venæ sectionem, & post venæ sectionem jusscula ex herbis pectoralibus & ut ulterius quæreret illi dixi, atque ita eam dimisi: vadit domum & parat sibi hoc Medicamentum, & illo assumpto ita purgavit, ut altera die etiam expurgata anima in lecto mortua inventa fuerit, ego hac de re nec minimum somnians inveni: die post in scheda mortuorum talem, & talem esse mortuam, vado ad illum locum, & quæro causam mortis, sic nihil aliud

adstantes dicere potuerunt, quam hoc, quod assumpserit mannam cum Oleo amygdalorum dulcium in jussculo carniū dissolutam, & inde per diem potentissime excreverit, sine tamen magna virium amissione, & quod altera die cum summa copia excrementorum in lecto mortua inventa fuerit, cum omnium stupore. Joh. Georgii Greiselii.

Hypercatharsis à Medicamentis Mercurialibus.

Nuper ad ægrotum quendam vocatus, invenio ipsum admodum debilem & morti vicinum. Hic ab agryta aliquo pulverem acceperat à quo sexagis secessit, & decies vomuit, tandem etiam cruenta excrevit, molestissimisque tenesmus secutus est, ex quib. & febresuperveniente, intingui virium dejectione, anxietate cordis, salivatione nimia, torminib. ventris, & dosi parva, pulverem istum Mercurialem fuisse conjeci. Hunc ægrotum. Deo (cui sit laus) auxiliante, exhibitis remediis convenientib., præprimis vero tinctura theriacali, intra quinq. dies ex orci faucibus eripui. Similem hypercatharsin non sine vitæ periculo perpessæ sunt hic mul. eres duæ honestæ ex usu Azot notissimi Empirici Heslingii, & ante paucos menses Secretarius quidam alias *degenet* hoc medicamentum plurimis admodum commendans, qui eo assumpto maximos cruciatus & brevi mortem sibi conscivit. nihil proficientibus à Medico Ordinario efficacibus etiam remediis exhibitis De hoc Azot brevibus quidem in tract. meo de varis sive Arthritide vaga scorbutica aliquid monui, sed in altera ejus editione (quam quia prior multis mendis & crassis vitiis Typographicis scatet, atque exceptis paucis exemplaribus distracta plurimum variis rarissimis medicamentis & observationibus auxi) fusius de *o cui* *hæc* acturus sum. *Valentini Andree Moellenbrocci.*

Hypercatharsis Curata

Dominus Theodorus à Biruth usus est Pilulis ex Extracto solutivo, quibus alias sæpe feliciter usus erat, die Lunæ dejecit ante prandium septies, præandio nihil amplius, sed optime se habuit; vespere cœnavit largiter, dormivit usque ad mediam noctem. Tunc subito tormina in ventre maxima cum vomitu & sedibus multis oborta, quæ die Martis duraverunt, & quoque sequenti nocte. Die Mercurii domum rediens ipsum invisi, & dedi Theriac. Div. Croc. Mart. gr. j. in jussculo; Imposui Theriac. Zi. Remisit dolor, vomitus & sedes. Vespere omnia rediere, & quicquid assumpsit, evomit. Præscripsi sequens:

℞ Rad. tormen ill. symph. maj. an. Zi. Herb. agrimon. plantag. ana m. β. fl. chamom. mß. Verbasco. Piii. Hord. mß. Coq. in f. q. v. ad 3x. Col. adde Mell. ros. col. Zi. M. F. Enema. Quamprimum assumpsit. omnia remiserunt, repetitum sequenti nocte bis feliciter. Postea corroborantia ventriculum dedi. Excrementa fuere prasina.

Scholion.) Hypercatharsis provenit vel culpa assumpti, vel assumptis. Assumpti, cum medicamentum sit violentum, vel non rite præparatum. Assumptis, cum vel ille errorem committit externum, cum sc. æri frigidiori se exponit, frigida nimis bibit, &c. vel propter naturæ ipsius errorem internum, cum sc. com-mota

commota camera viam monstratam sequitur, & ab acrimonia & copia humorum nimis stimulatâ insurgens, plus educit, quam requiritur, vel vires permittunt. Et hæc ultima causa hic locum habet. Altringentia cum narcoticis à principio mox adhibuit, ideo quod vires propter largam evacuationem abstergentia non admitterent, & morbus in centro conservaretur. Malo vero recidivante, re collectis viribus, abstergentia anodynâ & altringentibus miscuit, & ita feliciter malum sublatum est. Sequenti aliquando Hypercatharsis laborantem à medicamento violento à Tonfore exhibito, cum jam prodromi convulsionum adessent, liberavi.

℞. V. Tormetill. ʒiʒ. fol. querc. plantag. ana ʒi. Pulv. Pumic. ʒi. Syr. Cydon. ʒi. rib. corall. ana ʒʒ. M. Quantum enim Lapis pumex valeat in hoc malo sæpius feliciter expertus sum. Danl. Wincleri.

A remedio superpurgante & humores nimium acuate Apoplexia enata & mors.

Vir temperamentodotatus calido & sicco anum agens 30. in quo bilis nutritia & excrementitia reliquis sociis humoribus subditis peregrinâ virtute domina audacter imperabat, inde nata ex spiritibus sanguineve truculentius concitis, ut functionum famulis, tanta inter agendum animæ immoderatio, ut modo cum bilis flava tollitione in atram facessat, saturni morose omnia nauseantis humori melancholico effeminate obediret, aliâ nata rerum vel levi occasione bilis effera phrenitide perderetur, hinc novus accessit & atrî & bilioli humoris cumulus, & urgentior harumce passionum immodicatarum reciproca malorum productione stimulus, rerum consequentia physica; mentis insatiabilis avarities sacra iis per sepe fames fiebat, ut & mulier pro gemo illi sexui naturali tantum sapiens, imo quarundam pudendarum inclinationum nimium quamvis injuste suspecta, execrandum ferientis cœli flagellum. illis factum est ut primò universa cutis colore citrino sub pallido violaretur, sed album, ut sit, oculorum maxime, brevi dein cœpit pigrescere appetitus, corpus languere, in tabem pendere, animus passionum torturis durius premi, & functiones tandem omnes sensibiliter labascere: tum suæ salutis ex necessitatis cogentis vi sollicitus consuluit prudentissima mente feminam sublimi doctoratu dignissimam. cui soror apud milites & exterâs nationes longa & decora sexui modesto praxi nobilis secretum secretorum tradiderat omnium sine exceptione morborum remedium divinum. scammonium nempe pondere temerario rabidum, & correctione acuate sanitati humanæ longe intestius. hujus barbaræ violentiæ corpus non minus morbi languore, quam delicata naturaliter indole effectum vix suffecit, ergo in ferendas momento oppetias præcipitanter precibus coactus præscripsi post maturum, quod præsentis desperationi annuebat. rerum omnium examen, sequens remedium exta de mulcens pro sumpti acriter urentis necessitate.

℞. Ol. amygd. dulc. sine igne express. ʒiv. Syrup. de alth. Fern. ʒiʒ. aqu. malv. ʒj. misce hauriat duabus aut tribus dosibus quamprimum possibile erit, post hujus usum exhibui pulverem

fluxum on neni quasi incantamento frenantem quam brevissime.

℞. Gummi arab. tragacant. sang. dracon. an. ʒʒ. saccar. saturn. gran. xii. laud. opiat. gran. 2. saccar. rosac. ʒiij. misce f. pulvis in duas doses easdem necandus, primam accipiat immediate ut libuerit, secundam quinta post hora, si necdum quiescat iluxus, obediitis ilico frantatus, sed ne urgeti adhuc necessitati deesset in solite studiose in ut periculosas inhumani remediî notas expungerem hum. edantibus & lenientibus blande, primo emulsionibus sapius iteratis.

℞. Amygdal. dulc. ex cortic. ʒx. sem. quatuor frig. maj. ʒv. contunde amittendo decocti. horum mund. passulat. ʒvi. in colatura misce specier. diatragac. frig. ʒij. Syrup. de pom. ʒvi. f. emulsiõ quam hauriat cubitum iturus dies quindecim continuos, accessere hordeata, panatellac amygdal. dulc. juscula ex incocta l. orrag. buglos, cichor. endiv. lact. ber. &c. Quantum fide agentium favore omnis incisa noxa pergit, ergo dato amice consilio ut victu humectante & refrigerante corpus corrigeret, & vel occasiones ad motus ferventis bilis studiose luderet, generoso animæ pacatæ imperio sensimque illam ita mortificaret, donec nulla deinceps vel levis insolentia argui posset, sed nec istis gravibus malis, nec salubribus n. onitis sapere didicit, ergo cum melancholia & iræ obituaci sumulo bilis sapius ad ream turgescientiam insanivisset, rursus empiricam rogat, ut sibi periclitanti amice adesset, sed imitatione dicæ mulieris eum inclementi ni fallor, autin omni vitro imperite forsan parato exagavit ita, ut cassis viribus tenellis impar certo crederetur inimicæ vi, tunc momento questus est de rodente in capite intus doloris sensu immanissimo, de appetitus morte, de virium extinctione, de privatione dulcis somni, de lacerante in infimo ventre sensatione fixa: tunc ausus fuit secunda vice me accessere pro eodem casu rerum opprimentium desperatione cogente: hic scriptæ methode, cum idem foret rerum pessimorum casus, nihil detrahendum credidi, sed post ejusdem sedulos conatus & infirmi & iupreni ventris inclementer discrucians uterque dolor parili malitiet obstinacia perstitit; ergo altiori mentis anxia ratiocinio fallens rei mysterium disquirens credidi tandem, vomitus omnia inhumaniter violentis furore sacro sursum præcipitatum quæ unque denum via humorem acrem urentem, & probabilissime biliolum, qui suam ibi tragædi in tam crudeliter & pertinaciter ditissimis patientis impensis luderet, & particulas quasdam lacerantes hujus cathartici maniaci intestinorum tunicis internis abrasa pituita lenta, & avulso adipe insito fixas hæsisse, quæ irato aculeo eam implacabiliter vellicarent. Ut furentes ventris turbas conponerem extemplo injici jussi clystima intestinis ad insaniam offensis blande adulans.

℞. Fol. parietar. lactuc. solan. semperviv. min. an. m. j. rad. hl. alb. ʒx. flor. melior. verbasc. an. m. j. sem. hyoscin. lin. an. ʒiij. f. decoctio ex lacte recenti in colatur. ʒij. solve ung. popul. ol. catul. an. ʒiʒ. f. clystima, mox indendum, huic sociam nec disparem operam annexit cataplasma hujus compositionis.

℞. Rad.

℞. Rad. alth. mandrag. pulv. ad ʒʒ. lumbric. terrestr. purg. m. jv. farin. sem. lin. ʒvi. coque in lacte vaccini. recenter multo ad comitentiam cataplasmatis. applicetur toti abdomini calidum, & ubi retrixerit, calefiat saepius & applicetur rursus, cessit fractus his remediis indefesse adhibitis dolor: sed majus negotium imposuit is, qui caput dire lancinabat, ei ergo ut prospicerem, & eadem cura minutati de apoplexia eluderem imperavi hanc mixturam.

℞. Aq. epilept. D. Lang. fl. lil. conval. tinctur. castor. cum spir. sal. arm. parat. ad ʒij. sal. volat. succin. gr. xv. misce f. mixtio cephalica ex cochleari sumenda per intervalla, mox partem utramque aurium inferiorem perforari jussi, & radice gentianæ impleri, ut humor effusus in capite dire tripudians illuc proluctaretur: dein scarificationibus altis dorsum incidi, adhuc partibus pone aures ambas vesicatoria agglutinari, & tandem tibias iisdem emplastris magnis uri, quæ omnia effectum suum physicum sed minime intentum meum sortita fuere: ergo morbi invictæ hæcenus obstinaciæ iratus propinavi vomitorium ut ejus vi concussum generose caput excuteret forte contentum in se præternaturam humorem.

℞. Spir. ceras. nig. ʒ iij. tart. emetic. Mynsicht. ʒʒ. misce, quod impigre suo munere tunsum fuit, sed nullum excepit illud miserabilis levamen: errhino acriter titillante rei pertinaciam frangere studui.

℞. Aqu. majoran. ʒ iv. vitriol. alb. ʒ ij. naribus violenter hauriat & cerebro intinuius mandet, ilico dives mucii prodiit expurgatio, sed & ipsa inutilis insuper totum verticem rasum emplastro cephalico indui, tum denique in spem videbatur non dubiam respirare me timidus & ei & mihi applaudente, cum mulier, viris plerumque fatalis ei ad habitualis & ideo

facilis iræ commotionem ansam, aliquoties misere præbens, quamvis innoxie omnia rursus in priorem miseræ statum funeste turbavit, ut post duos gravis torturæ dies apoplexia obruente cujus non abditæ rursus toto morbi cursu meterruerant, vixerit. Instanter petii ut sectione cadaveris concessa liceret sensuum ostendentium testimonio evidenti scire, num diagnosi mea ex scientiæ principiis nata vera fuisset: ablata cranii parte superiore, cerebrum inundante sero bilioso medebat lava sui parte, ejusque venter lateralis universus eo gravidus erat, color quidem citrinus ab adstantibus plurimis distinguui haud potuit ob noctis ignis lumine tantum animatæ tenebras, tunc semper ad sensum albus sed tacite album luteum ei intinxi, quod colore citrino intenso quidem flavescerebat ad diem, naturali majore mole creverat hepar alioquin innoxium, & ei alligatam felleam vesiculam bilis ex viridi nigrescens impleverat, crassioris & æquo pinguioris consistentiæ: pulmones colore subceruleo hinc inde plurimis suis portionibus fæde polluti apparebant, cæteris partibus vix aliquid desiderabatur.

Secui adhuc aliud viri cadaver non ab similibus sortis, cujus capitis intestinas partes parilis omnino liquor biliosus inundarat, nescio an remediis an vero alio casu illuc trusus quantum ex domesticis & empyrico, cujus dispositioni is incuriè datus fuerat, extorquere potui, ex iræ & desperationis alternatim saepius & affrenatè furientibus motibus ea miseria prodierat, in corpore fortunatæ constructionis vitæ sæculum pollicentis. *Ex communicatione Viri Amicissimi Clariss. D. Nozel Archiatri Friburgensis.*

HYPOLIUM

Vid.

CORNEÆ MORBI.

Finis Libri Octavi.

BIBLIO.



BIBLIOTHECÆ
MEDICO-PRACTICÆ
LIBER NONUS.

De Morbis à Litera I incipientibus.

ICHOR & MELICERIA.



DE Hisce tanquam Ulcerum symptomatibus, atque ad Juncturarum morbos etiam pertinentibus, non est quod specificè hic agamus. Verum si quis iis quæ propriis capitibus de Ulceribus, & de Juncturarum morbis reperientur, minus contentus fuerit, ac curiosius quid hac in parte expectat; legat Clariss. Gulielm. Fabricii Hildani elaboratiss. de Ichore & Meliceria Celsi tractatum.

ICTERITIA ALBA

Vid.

CHLOROSIS.

ICTERUS.

ICterus aut per se morbus est; primario incipiens. de quo hic proprie agitur, aut alterius morbi effectus, sive productum: uti cum febris intermittenti supervenit, quam & sæpenumero judicat; de quo etiam mox obiter dicemus.

ICTeritia affectio ex communi plurimorum consensu exoriri statuitur in quantum flava bilis, è venæ portæ finibus, in poro bilarii ductus non omnino, aut non satis excepta, in massam sanguineam restagnat, eamque virore suo (unde etiam cutis inficitur) inquinat.

Obstructio ista multis modis, & variis in locis contingere solet. Quandoque enim fit juxta extremos utriusque generis vasorum, scilicet venæ portæ & poro bilarii fines; quorum intercapedines ob hepatis parenchyma intumefactum, aut alias vitiatum, nonnunquam comprimi, & obturari accidit, quapropter humor felleus è portæ vasis secretorius, in vasa altera exceptoria

minime traductus, in sanguinem regurgitat. Secundo humoris fellei transitus interdum in mediis pori bilarii ductibus intercipitur in quantum scilicet horum cavitates materia aut viscosa, aut sabulosa, & nonnunquam lapidea implentur: uti passim cernitur in jecinoribus jumentorum, hyberno tempore dum feno ac stramine vescuntur. Tertio ex observatione Anatomica etiam constat obstructionem Icteri causam nonnunquam in ipsa vesica fellea, aut in meatu cystico fieri: siquando enim illa lapidibus in plethorem non recipit, aut hic obturatus aut coalescens, bilis versus intestina descensum inhibet, humor iste quamvis à sanguine bene secretus, in massam ejus resfluere cogitur, adeoque morbum regium parit.

Contra receptissimam hanc opinionem, qua statuitur Icteri causam plerumque citra vesicam felleam, aut circa ipsam versus hepar consistere Cl. Sylvius omnino ultra hanc, viz. in meatu cystico aut ductu communi eam collocat. Quippe bilem non è sanguine intra ductus hepaticos secerari, sed in ipsa cysti fellea, ex humore per arterias illuc advecto progigni supponens; partem ejus maximam per poro bilarii ductus superius latam, sanguini propter insignes quidam usus suffundi, partemque alteram etiam ob fines necessarios, inferius ad intestina descendere statuit: quamobrem si posteriori hoc emissario occluso, bilis tota sursum in sanguinem elevatur, cum humore isto nimis saturatus & crassus genuina in Ictericam pervertet.

At vero ne meatus cystici, aut ductus communis occlusio (cujus neutra facile, aut a levi occasione contingit) ad Ictericum quicquidque excitandum minus efficax videatur: adeo sive talis obstructio locum habet, sive non, insuper ingeniose supponit vir Clariss. bilem dum in cysti generatur, quandoque mutationem notabilem subire, propter quam moveatur, & feratur impetuosius, & copiosius, versus sanguinem, cui tamen solito minus permiscetur, sed ipsi dumtaxat confundatur, adeoque facilius ab eodem recedat, partesque solidas colore suo inficiat, & tingat.

Quod autem bilis in Ictero cum cæteris humoribus permisceri, aut intime uniri inepta reddatur; heri statuit, à spiritu nimis volatili ei copiosius admulto, ipsamque proinde spirituosiorē, aliisque immiscibilem faciente. Assertionem hanc binis instantibus confirmat, in quantum scil. venenum a viperæ morſu spirituosissimum, atque potus generosior, scil. vini, aut aquarum ardentium aliquandiu usurpatus, Icterus accerſit. Insuper hypotheſi huic idem aſtruerenitur, eo quod morbus iſte non tantum à medicamentis deobſtruentibus, verum ab iis quæ ſalis volatilis ferocientis vim retundunt, (cujusmodi ſunt decoctum ſeminis cannabini, item ſapo Venetus, cum multis aliis ejuſdem ſarinz) curari ſolet.

Non huius loci, neque ad propoſitum noſtrum eſt, ad hanc litem dirimendam deſcendere, neque temere nunc determinare auiſim (poſtquam tot egregia recentiorum ingenia res fatigavit) utrum bilis revera conticiatur in cyſti fellea, vel annon à ſanguine intra hepar, magnum ſecretionis organum, dumtaxat ſeparetur; fateor poſtერიore hanc ſententiam mihi potius arri- dere. Et quidem hæc Ictero perpendens opinari ducor, Icteri cauſam in eo poſitiſſimum conſiſtere, quod bilis in hepate ſecreta, ob vias obſtructas non omnino, aut non ſatis ad veſicam felleam tranſferatur, quin neceſſe habeat in maſſam ſanguineam regurgitare; interea, tamen haud inſicias imus, affectum hunc (eſt tarius) à meatu cyſtico, aut ductu communi obſtructis interdum exoriri poſſe. Cæterum in cauſæ morbiſicæ partem, & forſan aliquando totum, etiam ſanguinis vitium accedere putamus; quando nimirum ob particulas ejus ſulphureas, & ſalino-fixas ſupra modum exaltatas, bilis in cruoris maſſa uberius, ac ocuus progignitur, quam per vias ordinarias ſecerni, aut ſoras amandari queat; quare hæc à ſanguine cum ſero ubique decedens, partibus ſolidis affigitur, iſſque tincturam ſuam imprimat. Et proculdubio ob hanc rationem eſt quod venena quædam, & imprimis viperarum morſus, atque potus generosior diutine uſurpatus, in corpore prius ſano morbum Arquatū inducit, pro cuius Therapeia interdum phlebotomia, & medicamina ſanguinem ad rectam craſin reducentia, plus quam deobſtruentia prodeſſe ſolent. Porro ob hanc cauſam eſſe videtur, quod febris tertiana intermittens, ita frequenter in Icterus terminatur; quippe haud ſuſpicari licet, Poſtquam in ſingulis paroxyſmis tanta ſanguinis & humorum agitatio, per ſtigis, & æſtum, eorumque tanta per vomitum aut ſudorem evacuatio contigerit, ductus hepaticos quoquo modo obſtrui poſſe; ac vero ſicuti paroxyſmi febriles acciuntur, in quantum ſanguinis pars ſulphurea nimis evectæ, ſuccum nutritium primo in materiam morbiſicam pervertit, & dein accenſa eandem abſumit, & exterminat; ita poſtea cum ſal fixus demum in ſanguine una cum ſulphure exaltatur, ideoque bilis pura copioſe progignitur, propter ſalis fixi vim reſtinctivam ſanguinis accenſio febrilis ceſſat, ejuſque loco dyſcrasia Ictericæ ſuccedit. Quemadmodum autem ſanguis ad dyſcrasiam ſulphureo ſalinam nimis evectus, Icterus quibusvis utut minime prædiſpoſitis accerſit, ita in aliis quantumvis

prædiſpoſitis, viasque bilarias obſtructas habentibus, cruoris ſulphur nimis depreſſum, morbi iſtius immunitatem parit; enimvero cognovi plures cachecticos, & phlegmaticos, tamen ſi hepatis quoad plurimos ejus ductus obſtructione & induratione laborarint, Ictero caruiſſe.

Circa morbi huius Aetiologiam, non eſt operæ pretium amplius ut diſquiramus; ad Therapeiam quod ſpectat, tres erunt primariæ Indicationes, quas omnes (liquidem quæ ſit poſitiſſima, & primo adhibenda fere ſemper latebit) ſimul prolequi oportebit; itaque medendi intentiones erunt. Primo ut ductuum obſtructiones, ſi quæ forſan aut in poro bilario, in meatu cyſtico, aut alibi circa hepar, vel vaſa chole- docha fuerint, aperiantur. Secundo ut ſanguis, ne bilem ſupra modum progignat, aut ſecretioni ineptum reddat, ad juſtam temperiem & craſin reducat. Tertio demum ut vires ſuſtententur, & ſymptomatis eas præcipue lædentibus occurratur.

I. Ut primæ Indicationi ſatiſſiat, evacuationes catharticæ, cum per vomitum tum per ſedem, quibus bilis verſus inteſtina deſcenſus irritetur, ſimulque vaſa obſtructa, magna eorum ſuccuſſione facta, ab infarctione liberentur, egregie conducunt. Secundo Medicamenta acria, amara, ſalfa, aliaque incitatione quadam prædita, quæ bilis in hepate aggeſcit, & ſtagnantis motum ſtimulent, adhiberi debent; huc etiam referre oportet: quæ ex ſimilitudine ſubſtantię & velut ſignatura, quatenus nempe ſucco ſavo prædita ſunt, contra Icterus juvare creduntur; attamen pleraque ex his quoniam urinas, aut ſudores cient, ſub eadem quæ priora, ſcil. ſevacuantium claſſe, ſatis apte recenſeri poſſint.

Secunda Indicatio alterantia omnino requirit, medicamina ſc. quæ ſulphuris ac ſalis fixi exaltationes, ſive efferationes deprimant, atque ſalis volatilis interim depreſſi reſtitutionem promoveant; propter hoc ſines remedia ſale acido aut volatili prædita: inſuper chalybeata adprume conducunt, hinc ſpiritus ſalis, vitrioli, ſuccus limoniorum, item ſpiritus C. Cervi, item ſtercus ovinum, aſerinum, crocus martis, aliaque diverſimoda ejus præparata, in Ictero ſæpe fructu præſcribi ſolent.

Tertia Indicatio vires inſtaurandas, & ſymptomata quibus lædantur tollenda procurans, plures & diverſimodas medendi intentiones ſuggerit, quas omnes aut præcipuas ſpeciatiim enumerare, & præſcribere operis ac tædii imenſi foret; quapropter regulas quaſdam circa dietam generales, & remedia quædam Cardiacæ & Anodyna in hoc caſu appropriata ſubdemus.

Designatis ad hunc modum Indicationibus Therapeuticis, jam proxime incumbit quibusque modo propoſitis medendi intentionibus, medicamenta ſelectoria viz. tum ſimplicia, tum compoſita accommodare, & remediorum, quæ ad hunc morbum præcipue notæ habentur, operandi modos, & rationes explicare. Primo igitur pharmacorum Evacuantium in Ictero appropriatorum formulas proponemus:

1. Vomitoria

Pharmaca Emerica in ictero recenti, dum viscerum tonus & vires constant, sæpissime juvare solent; quatenus nimirum & ventriculorum phlegmatis viscosi saburra in hoc morbo fere semper aggravatum alleviant; insuper & vasa choleodocha irritando, atque ductus omnes hepaticos succutiendo, infarctiones eorum expediunt, & bilis per vias prius assuetas transitum sollicitant.

℞. Infusionis croci Metall. ℥ss. ad ℥vi. vini scillitici ℥i. oxymel. simpl. ℥ss. f. vomitorium cum regimine sumendum.

Vesperi præcedente, interdum exhibere convenit mixturam sequentem pro faciliando vomitione præparatoriam.

℞. Pul. radicem Asari, sculæ Aronis, ana ℥i. Tartari vitriolat. ℥ss. Oxymelitis simplicis ℥i. misce.

℞. Sulphuris Antimonii gr. vii. scammonii sulphurat. gr. viii. cremoris Tartari ℥ss. f. pulvis, detur cœchl. j. panatellæ.

℞. Fol. Asari 9. incis. & contus. affunde vini albi ℥iii. exprimatur succus, detur mane cum regimine.

℞. Gum. gut. præp. gr. viii. Tartari vitriolat. gr. vii. f. pulvis.

2. Cathartica.

Medicamenta purgantia in hoc morbo sive recenti, sive inveterato locum habent: viz. tum ut uberior excrementorum proventus subinde è primis viis subducatur, tum ut vasa choleodocha ad excretionem stimulentur.

℞. Electuarii è succo rosarum ℥iii. Rhabarbari ℥i. salis absinthii, cremoris Tartar. an. ℥ss. syrup. de Rhabarb. q. s. f. bolus.

℞. Radic. lapathi acuti præp. ℥i. summitatum absinthii pontici, centaurii minoris ana p. ii. rad. gentian. curcumæ ana ℥iii. santal. citrin. ℥i. coq. in aq. fontan. lb. iß. i. ad lb. j. circa medium adde sennæ opt. ℥vi. Rhabarb. opt. ℥iii. Agarici ℥iß. sem. coriandri ℥ii. vini albi ℥ii. efferveſcant clauſe per horas 2. dein colatura per subſidentiam depuranda: Dosis ℥iii. ad vi. cum syrupi de Rhabarbaro ℥i. aq. lumbricorum ℥iii. f. potio repetenda per tres vel quatuor dies continuos, vel alternos.

In constitutione debiliori.

℞. Rhei electi ℥ii. Agarici Trochisc. ℥ß. cinnamom. ℥ß. zinz. ℥ß. f. infusio in vini alb. & aq. Cichorei ana ℥iii. clauſe & calide per iii. horas, in colatura dissolve syrup. de Rhabarbaro ℥j. aq. lumbricorum ℥ij.

℞. Pul. Rhabarb. ℥ß. ad ℥i. salis ℥i. absinthii f. pulvis.

℞. Pilul. Ruffi ℥i. extract. Rudii ℥ß. f. pilul. iv. sumantur mane cum regimine, repetendo intra iv. vel v. dies.

Tertio sequuntur Deoppilativa, quæ Diuretica, vel Diaphoretica exſiſtunt, quorum etiam nonnulla ob ſubſtantia ſimilitudinem ſpecifica habentur: huiusmodi medicamina & bilis a ſanguine ſecretionem promovenſ, ejuſque ſecretæ, per ductus & meatus in hepate minus patentēs,

transitum urgent. Porro interim ea ſanguinem fundendo, & ſerofitates, & recrementa cœnobilioſa aliquatenus per ſudores, aut urinas auſcudari faciunt.

℞. Elixir. proprietatis ℥i. ſumat. gut. xx. mane, & hora quinta p. m. cum vehiculo idoneo. Eodem modo tinctura Antimonii, aut ſalis Tartari, item mixtura ſimplex in majori doſi ſæpe cum fructu exhibentur. Pro vehiculis etiam propter eandem medendi intentionem Apozemata, aquæ deſtillatæ, & Julapia conveniunt.

℞. Radic. chelidonæ Majoris, urticæ urentis, rubiæ tinct. ana ℥i. ſummitatum abſinthii pontici, marrubii albi ſiccæ, agriarum chamædr. an. M. i. ſem. fantonici ℥ii. ras. eboris C. C. ℥ii. ſantali citrini ℥iſſ. ſem. coriandri ℥ii. coq. in aq. fontanæ lb. iii. ad ii. adde vini albi ℥iii. & f. colatura, adde ſyrupi c. cichorio cum Rhabarbaro ℥ii. Aq. lumbricorum ℥iſſ. f. Apozema doſis ℥iii. ad vi. bis in die.

℞. Folior. Marrubii albi ſiccæ. centa. ii. minoris an. M. rad. gentian. curcumæ ana ℥iii. cinnamomi ℥i. croci ℥ss. meſſa ponantur in vitro cum vini albi vel Rhenani lb. ii. f. infuſio clauſa, doſis ℥iii.

Huc ſpectat celeberrimum Geſneri Antictericum.

℞. Radic. urticæ majoris lb. j. croci ℥j. contundantur probe, & cum vino albo extrahatur tinctura. doſis ℥iii. mane per iv. vel v. dies.

Huius ſimile eſt illud Fr. Joeliſ.

℞. Radicum chelidonæ majoris inciſ. Mii. granorum ſuſiperi M. contus. affunde vini Rhenani lb. j. & extrahatur ſuccus, doſis ℥iii. bis in die.

Succus Marrubii albi à Dioſcoride, & ſyrupus ejus à Foreſto pro curatione morbi regii valde commendatur.

Loco elixiris aliorumque liquorum chymicorum, qui ad nauſeam evitandam, in quantitate perexigua ſumendi præſcribuntur, aliis fortiori conſtitutione præditis electuaria, pulveres & pilulæ cum meliori fructu exhiberi poſſunt.

℞. Conſerv. abſint. pontici, flavedinis aurant. limon. an. ℥ii. ſpec. diacucutinae ℥iſſ. pul. eboris, ſantali citrini. ligni Aloes, ana ℥ß. trochiſc. de capparibus ℥j. de Rhabarb. ℥iſſ. ſalis abſinthii ℥ii. cum ſ. q. ſyrupi de cichorio cum Rhabarbaro, i. electuarii, doſis qu. nucis caſtanæ bis in die ſuperbibendo Julapii ſeq. ℥ii.

℞. Aq. chelidonæ majoris, ſumariæ, abſinthii ſimpl. hor. ſambucian. ℥v. Aq. limacum magiſtral. lumbricorum compoſit. an. ℥ii. ſacchari ℥iſſ. miſce f. Julapium.

Vel ℞. Rad. urticæ majoris angelicæ, gentian. an. ℥iv. chelidon. majoris totius novæ abſinthii tanaceri, abrotani, utriuſque, ana Mii. cortices exteriores xii. Aurantiorum iiii. & limoniorum, lumbricorum præp. limacum, an. lb. j. Caryophyllorum contul. ℥ii. incis. & contus. affunde vini albi lb. viii. deſtill. organæ, com. mumbus, liquor totus miſceatur.

Vel ℞. Lomatia Chalybis lb. j. fragorum recentium lb. vii. ponantur in olla vitrea ta ſimul agitando, & ſicut per diem, dein adde radicem Rhabarbari Anglicani inciſ. lb. j. coq.

tices iiii, Aurantiorum incis. affunde vini albi lib. vi. & destil. l. a. liquor totus misceatur, dosis huius & prioris ℥iij. bis in die post electuarium, vel aliud Medicamentum.

℞. Pul. radic. curcumæ, Rhabarbari, ana ℥iij. cortic. radicem capparis, rad. asari, ana ℥ij. extracti gentian. centaurii ana ℥i. salis absinthii ℥iv. sem. nasturtii. ℥ss. cruz ℥ss. elixir. proprietatis ℥i. gum. Ammoniac, solut. in aq. lumbricorum q. s. f. massa pilularis, formetur in pilulas exiguas; dosis ℥ss. vespere, & mane superbibendo aquæ distillatæ ℥iij.

Sylvius pro curatione icteri valde prædicat decoctum sem. cannabini in lacte, & solutionem saponis, indeque (prout supra inuimus) hypophesin suam, qua Icteri ætiologiam à bilis alienatione potius, quam à meatuum ejus obstructione deducit, stabilire nititur.

¶ I. Indicatio secunda sanguinis alterationem sive æquationem respiciens, quo sc. bilem modice tantum progignat, & rite secernat, ejusmodi medicamina requirit, quæ sulphur & sal fixum nimis evecta deprimant. In hos fines nescio quo casu, aut ductu, pharmaca sale volatili prædita, ut lumbrici, limaces, millepedæ, imo pediculi, quadrupedum & volatilium stercorea, pro Ictero sanando in praxin introducta, non tantum ab empiricis, sed etiam à medicis celebrioribus præscribi solent: hæc interdum per se, verum sæpius evacuantibus, & deoppilativis adjuncta, præcipuas Antictericorum compositiones ingrediuntur.

Fonsæca præscribit sterco Anserculi verno tempore collect. & ficit. etiam pullorum excrementum album, quorum utriusque pulvis detur ab ℥ss. ad ℥i. in idoneo vehiculo.

℞. Pul. lumbricorum terrestrium præp. sterco anserini, ana ℥iij. eboris, fantali citrin. pulv. an. ℥ss. croci ℥i. f. pulvis, dividatur in vi. partes pro totidem dosibus matutinis cum liquore appropriato. Apozemati, & tincturæ Antictericæ superius descriptis lumbrici terrestres, item sterco anserinum, quin & ovinum utiliter addi solent.

℞. Millepedarum recentium & vivarum n. 50. ad 100. croci ℥ss. nucis moscat. ℥i. simul contusis affunde Aq. chelidonie ℥iv. lumbricorum ℥ii. f. expressio fortis, & ebibatur: ad hunc modum sumatur primo semel, deum bis in die per septimanam.

Remedium vulgare, & empiricum apud nostrates est, ut novem pediculi vivi sumantur mane, per v. vel vi. dies, quo remedio (cum alia minus efficerent) plures sanatos audivi: quod certe nullo alio modo juvare potest, nisi quod salem volatilem in sanguine depressum restituat.

Propter eandem juvandi rationem, etiam in hoc morbo flores salis Armoniaci, sales volatiles succini, C. C. fuliginis, item horum spiritus, sæpe magno cum fructu exhibentur.

℞. Pul. lumbricorum præp. ℥ii. spec. diacurcum. ℥i. florum salis Armoniaci ℥ss. salis succini ℥i. extracti gentian. ℥i. croci ℥i. gum. Ammoniaci solut. in aq. lumbric. q. s. f. massa, formetur in pilulas exiguas, dosis i. vel 4. mane & vespere superbibendo Iulapii superscripti ℥iij.

℞. Spiritus C. Cervi cum croco tincti ℥iij. Dosis gut. xv. ad xx. cum aq. destillata superius descripta.

In hac medicamina, quibus sanguis dyscrasia icterica emendata intenditur, classe, etiam remedia chalybeata jure locum vendicant; hæc enim non tam viscerum obstructions referando quam sulphuris, & salis fixi effluvia deprimendo, & cruorem volatilisando, in morbo egio, haud minus quam in aliis, cachexiæ affectibus insignis juvamen præstant.

Itaque decocto, item Tincturæ, sive infusioni superius præscriptis, ferri limatura, aut pulvis ejus (comp. ge. minerali quoquo modo resoluta) præparatus, aut sal vitriolicus extractus, commode adjiciantur: cuiusmodi hinc est, quod Acidulæ ictericos prognostico relictos, interdum usque ad miraculum sanant; quanquam & hæc præ larga quantitate epotæ, quatenus vasa omnia permeant, etiam ductus hepaticos quantumvis occlusos aperiant.

Idcirco etiam Electuario, pilulis, & pulveribus, supra præscriptis, etiam Chalybis præparata, modo hoc, modo illud, in debita proportionem addantur, porro syrupus ejus ad cochlear j. in Apozematis vel aq. destillatæ antictericæ ℥iij. detur bis in die, item tinctura chalybis ad gut. xii. vel xv. modo cum fructu exhiberi possit.

Ultimo in loco huic pharmacorum alterantium classi, accenseri debent ea quæ non intus sumta, sed exterius aut per contactum applicata, ictericorum urinis adhibita, morbum nunc curare perhibentur.

Quoad prius remedium apud vulgus satis tritum habetur, ut Tinca piscis vivens, cujus squamæ & exterior superficies nonnihil flavescunt, Ictericus hypochondrio dextro aut ventriculo juxta quosdam, & plantis pedum juxta alios applicetur, unde morbi evanescencia subita expectatur; hinc licet multi certam medellam promittunt, mihi tamen aliquoties ad ipsum experto successus defuit.

Icteri curatio altera ad distans, nescio qua sympathia aut secreto operandi modo fieri perhibetur.

℞. Urinam ictericam recentem quæ una vice mingitur, cineris lignorum fraxini cribrati q. s. misce & redige in p. stam, quæ formetur in tres pilas æquales, in loco clauso prope focum aut hypocaustum collocandas; quando pilæ hæc exiccata indurescent, Ictericia evanescet. Hoc ritu morbum hunc inveteratum, & multis aliis remediis furdum, feliciter curatum novi. Praxis hæc apud vulgus familiaris existit.

Si effectum hunc plerumque aut sapius eveniturum pro certo constaret, hujusque ratio inquireretur; imprimis supponere oportebit, consensum, sive sympathiam, inter spiritus aliasque particulas in cruore animato, cum aliis symbolis urinae recentis incolis; quoque illi pari statim ritu cum his afficerentur. Attamen satis constat, sal lixiviale urinae commixtum, salem volatilem prius subjugatum, aut aliis particulis implicitum, illico manumittere: uti plane cernitur in destillatione urinae, quam si per se arenæ calore urgebis, nihil præter phlegma ascendet; sint tartari calcem, aut cineres addas, è vestigio spiritus & sal volatilis prodibunt: quapropter administratione ista empirica adhibita, eodem tempore quo in urina icterica, etiam

in ægotantis sanguine, sal volatilis à salis fixi & sulphuris dominio vadet; proindeque Ictericæ cruoris dyscrasia evanescet. Hæc etiam ratione imititur curatio altera morbi regii sympathetica, cujus Phil. Grulingius, & Felix Placerus mentionem faciunt: scilicet mictionem supra Icterus equinum dum cælet, ab Ægro factam, plures Ictericos sanasse, in quantum scilicet urinz, proindeque sanguinis IctERICI sal fixus, à stercoreis recentis sale volatili alteratur, inque crasin debitam reducitur.

III. Indicatio Therapeutica tertia vitalis, idoneam victus rationem instituit, & insuper cardiaca, & anodyna, quibus utrisque sæpe opus est, præscribit.

Ad priorem quod spectat. alimenta in hoc morbo plusquam aliofere quocumque medicata esse solent. Etenim vegetabilia, eorumque partes, remedia Hepatica vulgo dicta, Ictericorum iusculis incoquuntur. Hæc etiam loco aliarum carniū ē lumbricis aut limacibus (qui morbi regii antidota habentur confici solent. Porro cervisia, alique potus ordinarii pharmacorum infusione imprægnantur.

℞. Radic. urticæ majoris, fragariz, ana ℥iiss. eringii conditi ℥i. ras. ebor. C. C. an. ℥ii. lumbric. mundatos n. xx. crustam panis albi, maceris ℥i. coq. in aq. fontanz lb. ii. ad lb. j. coletur per manicam Hippocratis, cui impone spec. diatrion santal. ℥ss. f. iusculum cujus ℥iv. ad vi. sumatur bis in die: pro potu ordinario doliolum iv. congiurum impleatur cervisia, cui post fermentationem imponatur sacculus sequens.

℞. Summit. absinthii pontici; Marrubii albi sicc. ana M. ii. rad. lapathi acuti sicc. ℥vi. corticis fraxini, Berberorum an. ℥iii. cortices exteriores viii. Aurantium, & ini. limoniorum, incisa & contusa præparentur s. artem.

IctERICI plerique siquidem magno languore, & crebris spirituum deliquiis solent affici, etiam remediis cardiacis opus habent.

℞. Aq. mirabilis tenuioris ℥viii. lumbricorum ℥iv. syrup. è corticibus Aurantium ℥ii. misce dosis ℥ii. vel iii.

Porro hoc morbo laborantes doloribus nonnunquam valde molestis qui noctu potissimum deferviunt, ac insuper vigiliis sæpe obnoxiū reperiuntur; quapropter etiam Anodyna in usum adhibenda veniunt.

℞. Aq. mirabilis, lumbric. an. ℥i. diacodii ℥vi. tincturæ croci ℥ss. misce, dosis coch. j. vel ii. lera nocte siquando somnus deficiet.

℞. Laudani Tartarizat. ℥ii. Aq. mirabilis ℥ii. syrup. Caryophyl. ℥i. misce, dosis coch. j. eodem modo. Thom. Willis. Pharmacœutic. Ration. Parte 2. Sect. 2. Hæc in ulteriorem ac absolutiorem morbi idæam jam adjiciamus quæ habet Præclariss. Joh. Nicol. Pechlinus in suis Observationibus Physico-Medicis. Sic autem ille.

Icteri vel regii morbi non unæ sunt causæ, neque sen per illas quas vulgo recipimus. Felix ille qui in habitu erumpit color, non protinus visceris labefacti indicium est: nam & in ipso sanguine sine ulla hepatis offensa affectus hujus semina latere posse manifestum est. Sunt in sanguine mistique in humoribus potentia

quædam fermenta: sunt ibi acidi, sunt salii, sunt amari, sunt aliarum qualitatū species, sed centro quæque suo inclusæ, nec ante sensibus nostris obvix, quam turbata harmonia, in superficie, id vero est, actum se emerierint. Sic usque biliosa hominis temperies, ac certe in sanguine nulla amaritudinis, nulla Bilis ad sensum indicia. Fermento opus est aut textura fluidi mutata, quibus jam tum Bilis in sanguine secernatur, mox colore se suo & amaro contagio proditura. Sane quæ ad leviculas occasiones, Ictem aut Tristitiam, è potentia materiæ evocatur Bilis, corporisque habitum colore suo repente infamat, haud dubie non tam solidi quam fluidi texturæ debetur, cujus tamen deinde vitium in solidum ipsumque Hepar successionem quadam dimanat. Nimirum à solo animi affectu adharere sanguini vel fermentum aut instar ejus potest, quod occultum ibi biliosum & secretioni hepaticæ relictum jam ante contextu fluidi extricet separetque, non aliter, ac venenati animalium morsus evertere sanguinis misturam latentemque ibi Bilem sistere amaram solent. Sed vix fluidi texturam mutatam reperias, quod non ejus quoque contagio in solida & Bilis quidem in Hepar transeat: sive enim tenuior justo sit & volatiliior, sive crassior, ubique est, quod Hepati adspersat vitium: hoc tamen cum discrimine, ut, ubi fluidior est bilis copiosiorque, glandulosi visceris secretionem facile admittat & saturatissima tinctura in alvo quoque se ostendat, contra, ubi crassior est viscidiorque, quod plerumque evenit ægre per contextum Hepatis transeat, tandem etiam invalescente ob sanguinis visciditatem glandularum obstrukctione repellatur alvique excrementa non tincta dimittat. Vidi, quibus per paroxysmos vel ob Dietæ aut animi vitium fermentationes hæc molestæ essent & pro modo secretionis læsæ alvus modo colorata modo alba decederet, non ante instaurato Hepatis tono, quam frequens & diuturnus amarorum atque attenuantium usus fluidorum texturam atque crasin ex æquo revocasset. Et vero laminata Bilis in intestina excretionem, quod fieri necesse est, ubi à nova secretaque jamjam Bile vetus illa non pellitur, relinquitur Lympha Pancreaticæ pituitæque facile sine Balsami hujus mistura aciescenti in intestinis dominium; unde gravia illa stultentia dolorumque lancinantium symptomata, non ante remittentia, quam calidis carminantibus succurritur, aut salum amarificantium accessione excitata Bilis contextum Hepatis perripit & intestina flumine novo proluat. Quod autem vulgo de regurgitatione ajunt Bilis, non bene concipi posse videtur, cum Bilis nomine non ante veniat liquor ille pinguis oleosus, quam transmissa glandularum Hepatis textura in ductus secesserit Choledochos: atque ex hisce ad sanguinem contraria via remitti tam improbabile est, quam quod maxime. Vero similis est in ipsa sanguinis massa latere fermentum Archeumve operante iniqui à primis causis dispositus secretionem solidi texturæ debitam in fluido peragat & ex illa centrale occultumque in superficie evocet; adeo mirum non est Auriginem esse, ubi nulla sunt obstrukctionis Hepaticæ indicia. Nota-

Glissonius ne quidem interiora Hepatis attingere Arteriam putavit, morientibus jam inter Portas furculis. Verum, cum ubique corporis fecernendos humores per Arterias efferri intelligam, non potui facile persuaderi, quod in pterisque omnibus obtinet experimentum, in uno fallere, quum potius credam aliis intentos Anatomicos Arteriarum Hepaticarum Cysticarumque propagines incuriosius tractasse. Ut vero ad primum respondeam, non equidem necessum est, ut pars excipiens deferente, mandataria mandante sit exilis, quando exemplo Arteriarum & Venarum contrarium appareat, hinc semper proportionem majorem, & etiam magnam sui parte mutui non accipiant languinem. Sed malui in causa particulari experientiam sequi, & ex occasione oblata cadaveris veritatem reinvestigare. Reperi itaque rannum illum Arteriarum Cœliacarum, qui Hepaticus auget, inque duos deinde ramos rursus dividitur, Hepaticum unum, Cysticum alterum, multo esse majorem, quam accuratissimi vulgo Anatomici voluerunt, imo, si omnium invicem ductum Arteriarum cum Cholodochis rationem ineas, proportionem non usque adeo esse disparem, certe non nimis ore dimidia. Jam, si causam quis requirit, cur vas recipiens majus esse debeat, facilis est in illa cæterorum comparatione responsio; nempe ut motus defectum, quem arteriosus sanguis frequenti illa & anfractuosa in capillaribus dilutione amisit, latitudo canalium compenset. Sed & illud Glissonii nihil est, Arteriarum Hepaticarum ramos mature & inter Portas deficere; comitantur enim usque vaginam illam, qua & Portarum rami & Cholodochii ductus includuntur singulisque lobulis totidem furculi respondent. Joh. Nicol. Pechlinus *Hædenns Clariss.*

Curationes.

Curatio Icteri varia instituitur. Equidem cum obstructo, tumefacto, obduratoque Jecore junctum, ex hoc deducuntur humores, stagnantesque dissolvantur moderabuntur; inter quæ præcipua censentur tartarum vitriolarum, sal prunellæ, sal tartari, cardui benedicti, & absinthii, bezoardicum ferrum, stibium diaphoreticum cum extracto hyperici, baccarum juniperi, spermate ceti, sanguine hirci, aliisque diuresim una simul promoventibus, decocto chelidoni, graminis, apii, fragariorum, marrubii, cum spiritu salis dulci. Si vero suspicio sit concreti lapidis in cyli, commendat Sylvius aquam, & decoctum graminis, ejusque succum cum saccharo, vel melle permixtum. Conferre quoque ait spiritum nitri spiritu vini dulcem redditum, ad gutt. x. xii. & ultra in vino, aliove potu. At vero impediunt illius concretionem salia volatilia quævis, sed præsertim oleosa, quippe quæ bilem puram reddunt defæcatamque. Cum à veneno Viperarum, aliove accidit, sudorifera volanti sale abundantia maximo usui erunt, quibus simul corrigi, & expelli illud possit: cuius census sunt sal volatile C. C. viperarum, succini, salis ammoniaci, spiritus theriacalis, theriaca ipsa, & quam vocant Germanicam, aliæque ex viperis confecta. Depravatam autem, & vi-

ciatam bilem emendari idem Auctor inquit per oleosa, & pingua, testaturque à solo cantharis semine in lacte bubulo pingui, donec rumpatur cocto, & colato, atque bis, terve in die ad ʒ. v. vel vi. sumpto se plurimos ictericos curasse. Idemque præstari a quovis sapone ad ʒi. in calente lacte dissoluto cum saccharo, bis aut semel in die exhibitio.

Specialia denique remedia ab Authoribus plurima referuntur. Apud Hartmannum præsentaneum remedium est Mercurius præcipitatus luteus cum theriaca, ejusque extracto; nec non decoctum Fragariorum. Aliis prædicatur egregium decoctum Marrubii, chelidoni, abrotani, hyperici, radice rubi tinctorum, lapathi acuti, aut lentis palustris. Croco pariter maxima in hoc tribuitur vis, itemque lumbricis terræ, millepedibus, stercore anteriorum, aut gallinaceo, sanæ urinæ, lapillis reperiatis in felle bovis, aliisque similibus. A Cardilucio describitur pulvis D. Alsteini ex floribus sulphuris, & modico croci cum aquis partibus sacchari albi: eo enim intra triduum Icterus pelli perhibetur.

Neque desunt qui magica præscribant: per linteum urina patientis intinctum, & soli expositum quousque siccetur: per tineam vivam umbilico impositam, donec moriatur: per araneam vivam testa nuda inclusam, & è collo agrotantis suspensam; dentemque leonis, cæteraque à Petro, Friderico Hohmanno, & Helmontio memorata.

Experientissimus noster Thomas Corbhelius, insigni rei literariæ damno, nuper nobis tristis fato ereptus, inter plurima alia remedium genera, illud præcipuum sibi arcanum servabat, adhuc morbum, admirandum, Aquam videlicet ex Albo Albi, quam gelidam potandam exhibebat jejuno stomacho per hebdomadam.

Rulicis demum usui est succus cucumeris sylvestris naribus exceptus; itemque succus marrubii è foliis contusis ex Dioscoride. Lucas Tozzi Medicin. Practic. lib. 2.

In Ictero flavo & nigro.

℞. Tart. emetic. gr. v. syr. absint. ʒij. aq. absint. ʒj. M. F. vomitor.

Vel ℞. Sapa vomitor. gut. vii. vini absint. ʒj. M. seu.

℞. Gummi guttæ gr. xii. sal. vitriol. ʒj. rob sambuc. ʒj. M. F. bolus.

Purgantia. ℞. Rad. jalapp. ʒss. scam. sulphur. gr. x. tart. vitriol. gran. vi. olei maceris gut. ij. M. F. pulvis.

Vel ℞. Resin. jalapp. scam mon. an. gr. v. tart. vitriol. ʒss. rob sambuci ʒij. M. F. bolus.

Seu ℞. Extract. rhei ʒj. centaur. ʒj. resin. jalapp. gr. v. cremor. tart. gr. viii. rob. sambuc. ʒij. M. F. bolus.

In India. ℞. Extr. rhei ʒj. resin. turbit. gr. vi. sal. cinnam. gr. xv. rob sambuc. Indici ʒij. M. F. bolus.

Clysteres. ℞. Folior. alth. flor. chamom. melilot. an. m. ʒ. herbar. centaur. minor. absint. an. p. ij. baccar. laur. juniper. sem. anisi an. ʒj. Coque & colat. ʒij. adde pulp. cassia ʒj. olei chamom. ʒi ʒ. sal. nitri ʒj. M.

Diuretica. ℞. Rob baccar. juniper. ʒj. essent. hyper. gut. xv. tinct. sal. tart. ʒj. aq. petrosel. ʒj. M. F. potio.

cancr. præp. lap. gagar. præp. ana ℥iii. corall. rubr. & margarit. in magister. præp. ana ℥ii. cinam. inter. cort. sassaf. ana ℥iij. sacch. alb. ℥iii. M. f. Pulvis dividendus in 24. doses sumendas mane è vino albo, superambulando diu, horis 4. ante prandium.

℥. C. C. ad albedinem usti, lap. bezoar. orient. al. an. gr. x. excip. pauca conserva ros. rubr. f. Bolus deglutendus mane & vesperi, superbibend. julap. seq.

℥. Aq. decoctionis pomor. redolent. ℥vi. syr. limon. & ceras. ana ℥vi. syr. fragorum ℥ β. acetosif. sulph. gutt. 4. m. f. julap.

℥. Verm. terrestr. præp. rad. chelidon. maj. sterc. anser. sic. ana ℥β. milleped. præp. rad. curcum. staved. aurant. crem. tartari magistral. crystal. rup. optime præp. per multiplicem extinctionem & levigationem ana ℥ii. tartari vitriolati, sal. absinth. magist. corall. ana ℥i f. omnium Pulvis subtiliss. excipiens f. q. clyst. si liquidioris chelidon. maj. f. Electuarium instar Opiatæ quotidie spatula versandum ad usum.

℥. Hujus electuar. ℥ii. exhib. involut. nebulis, bibendo desuper hauritum vinu chalyb. & absinthit.

Post assumptionem hujus remedii quiescat per horam, deinde corpus moderate exercet, & prandium differat ad quatuor horas post medicationem exhibitionem. Perseverante malo,

℥. Elect. præscript. ℥ii. vitriol. Martis, salis albi. tartari pulv. subtiliss. fol. sen. & rhab. ana gran. x. M. cum clysto chelidon. maj. f. Bolus sumend. mane, superbibendo hauritum cerevisiæ medicatæ & exercendo per plures dies.

℥. Croci Martis aperiant. crem. tartari albi. ana ℥i. conf. Alkerm. cinam. interioris ana ℥β. sacch. cand. ℥ii. vel ℥i. M. & addita pauca mucag. gum. trag. vel potius sem. alch. extract. in aq. cinam. f. pasta ex qua formetur Cortex instar cinamomi pro una dosi sumenda mane, superhaurito Julepo sequenti, corpus ferra vel trochleis exercendo, horis 4. ante prandium,

℥. Viui Rhenan. opt. ℥iij. rad. mund. rubiz maj. & chelidon. mai. ana ℥i. sterc. anser. recent. siccat. ℥ii. cinam. inter. ℥viii. Infundantur simul per biduum ante usum: cujus tempore.

℥. De liquore colato ℥iv. conf. Alkermes ℥i. aq. cinam. claret. ℥i. M. Capiat ilico post corticis facitii chalybeati supradicti assumptionem hora una ante exercitium aut saltem dimidia. Item horis 4. a prandio cum leviori exercitio etiam. Ita fiant pluribus diebus consequentibus.

Remedium Monachi de S. Jean d'Angely.

℥. Duo mala Aurantia per medium divisa, quorum singulam medietatem in medio perfora, & in singulis foraminibus pone croci Orientalis gr. xviii. aut xx. has medietates filo simul colliga, superponendo folia betæ aut brassicæ, coquantur ad lentissimum ignem instar pomorum, etiam sub campana si velis. Explica poma & macera per horas xii. in ℥bi. vini albi opt. Vinum colatum bibat æger tribus matutinis jeiuno stomacho.

D. Augerius vidit Genevæ filiam ictericam

annorum 17. quæ præmissa purgatione felicissime convaluit poto vino albo per quatuor dies in quo maceratum fuerat per diem Pomum Aurantium integrum Caryophyllis & Cinamomo transfixum, deinde sub prunis lentissimo igne coctum.

℥. Rad. Tapfi. barbati q. v. Infund. in vino albo, da pro pocu ordinario.

Succus Aparines depur. per residentiam ad ℥iii. bis in die cum vino albo utiliter propinatur.

Quidam aliis omnibus irritis curatus fuit pulv. santal. rubr. in vino albo. *Theod. de Mayerne Prax. Medic. lib. 3.*

In curatione Icteri respiciat medicus ad bilis peccantis & superfluentis educationem, ductuumque obstructorum reserationem.

℥. Rhabarb. elect. ℥ii. β. Fol. sennæ mund. ℥i. Zinziberis, ℥i. Sem. dauci, ℥i. β. Olei tart. per deliq. gut. xxx. infundantur per noctem in ℥. q. Seri lactis chalybeati, mane leviter ebulliat. col. adde tartari vitriolati, gr. xij. Syr. de cicchorio cum rheo, ℥β. M. f. hauritus purgans. Conducunt hic pilulæ universales antimoniales ex antimonio viræ correcto cum extracta rhabbarbari exhibetæ. nec non pilulæ ex gummi, uti & pilulæ Spadanæ Eligmanni.

Non abs re erit per sudores obstructionum resolutiones tentare, quem in finem mercurius diaphoreticæ istam jovialis, quam per præcipitationem factus, exhibeatur cum theriaca, ut

℥. Theriac. Venet. ℥i. Mercurii cum oleo tartari per deliq. præcip. & guttula una aut altera sp. salis irrorati, gr. iv. Croci optimi, gr. x. M. f. bolus sudorificus.

Vel, ℥. Theriac. Venet. ℥i. Mercurii diaphoret. jovialis, gr. x. Reg. antimonii med. gr. xii. Salis tamarisci, gr. vi. M. f. bolus sudorificus.

Suum hic egregie conducunt decocta, ex specificis præparata, ut.

Rad. chelidoniz, polypodii, Cort. tamarisci, & cort. rad. capparum, Herb. bryonia, chamedrii, cent. minor. Marrubii, eupathorii, Semen dauci, & fileris montani, Ligna guajaci, sassafras, quorum col. addatur. Oxymel scylliticum, Sal tamarisci, vel cardui bened. spiritus salis ammoniaci.

Vel in temperamentis calidioribus, ut spiritus salis, Nitri, Vitrioli, Oleum sulphuris per campanam. Conveniunt insuper, tincturæ martis volatilis, & metallorum: etiam vina medicata ex aperientibus & incidentibus conflata, ut

Aquæ chalybeatæ minerales artificiales, Spadanæ, spiritus aperitivus, Vini tartarificatus, Tartarus vitriolatus, chalybeatus, Mars aperitivus Willisii in quovis liquore solubilis.

Descriptio martis aperitivi Willisii, ut

℥. Limaturæ chalybis purissimæ, p. i. Terantur in pulverem tenuem, eique addantur Tartari rhenani purissimi vel Crem. tartari p. ii. Terantur simul in pulv. tenuem, iisque addito vini rhenani tantum, ut inde globuli formari queant, quos in aere exsicca, & postmodum quando panes excoquantur clymaco committito, pane excocto globulos eximito, & in pulverem terito, addito rursus vini rhenani tan-

tantum, ut globuli formari queant; Eamque operationem 3. vel 4. vice repetito, sic enim tandem materia tua viridem acquirat colorem, habebisque martern potabilem in quovis liquore solubilem, cum quo facili negotio elaborari poterunt aq. spadanæ artificiales.

Aquæ spadanæ artificialis descriptio.

℞. Aq. fontanæ. q. p. Coquantur ad medium, hisque addito Martis præparati (ut supra) tantum, quantum sufficit ad vitriolicum laporem induendum.

Quando phiolas obturare animus tibi est, sequenti odore sulphuris nobilitato.

℞. Sulphuris flavi, q. p. Fundito in patina terrea, fuso commisce Coriandri aliquot grana contusa, Linteaque trajicito, ut artis est in suffimentis Sulphureis præparandis, portionem lintei sulphurati accendito, ejusque fumum in collum phiolæ illando cogito, & arte postmodum phiolas obturato. ita enim obtinebis aquam spadanam artificialem, odore sulphuris nobilitatam, earundem virtutum æ naturaleni. *Anonymus in Praxi Chymica.*

Consultationes.

Pro Quodam Egregio Patiente icteritia Nigra, obstructione lienis, & dolore eisdem gravativo laborante.

Si casum propositi patientis diligenter intueor, cogor affirmare nec locum affectum, nec affectum ipsum curandum unum esse, nam merito illius coloris fœdi, & pravi, qui in toto observatur, Cutis tanquam locus affectus est constituta, sicuti ratione symptomatum, quæ ad hypochondrium sinistrum observantur, lien pro altero loco affecto censendus exiit. Affectus autem cutis, ut de se patet nullus est alius, nisi qui a vulgo medicorum icteritia nigra nuncupatur, symptoma inquam in qualitate visibili mutata: Affectus vero lienis non est unus, nam & obstructione ipsum laborare, uti tensio regionis ejusdem suadet, & à dolore gravativo sollicitari satis constat, qui dolor gravans proprius est visceribus, quæ sensum habent ob membranas investientes, cuius propterea natura lienem esse nemo est qui neget, & quamquam dolor prædictus morsum nonnunquam interat, id ratione flatuum contingere non dubito.

Quibus ita sese habentibus generationem horum vitiorum hujusmodi fuisse puto, quod nimirum ex mutatione loci, atque habitationis, ex comestione item piscium paludosorum, patiens noster alioquin melancholicus, a prædominio facile sanguinem sibi melancholicum comparaverit, qui in liene adauxit insignes, & contumaces pepererit obstructions, propter quas repleto viscere humore crasso, ac terreo dolor gravans occurrerit, laceffit autem calore ignato fluitus interdum excitentur, unde aliquando morsus illi; Amplius propter easdem obstructions impedita lienis facultas attractrix non potuerit (sicuti neque potest) sanguinem a suo colimoso, terreoque depurare, hinc succus hujusmodi recurrens ex jecore in venas, & ex venis in cutim eandem colore

illo fœdo infecerit, quemadmodum sensus ipse demonstrat.

Quare ut æger sublevetur, habita totius providentia Medicus totum studium ad aperiendas lienis obstructions per attenuantia, & detergentia, ad roborandum calorem mutatum ejusdem visceris potissimum, & ad discutendum succum, qui cutim apprehendit, tandemque ad prohibendum ne de novo generetur convertere debet.

Verum tamen quoniam succus melancholicus propter sui pervicaciam, non ita facile cedit materiis medicis, arbitror non nisi cum difficultate insigni Medicum sui voti compotem fieri posse; multum tamen spem remanet propter ætatem florentem, atque etiam propter id, quod mala hæc a causa externa originem duxerunt.

Curatio ideo sectione venæ basilicæ, aperi-tione venarum ani, & inunctione cauterii in crure sinistro pro parte erit absolvenda.

Quocirca alia etiam pro ista curatione perlicienda erunt necessaria, hinc lenita alvosyrupo de polypodio, & melle rosato solventibus, præparatis humoribus decocto citra, capillorum veneris, grimonii, boraginis, fumarie, lupulorum, additis syrups convenientibus, iisdemque turbatis intus in hellebore nigri cum melle rosato sol. aut confectione hamech cum electuario lenitivo, devenirem ego ad deobstruentia. Inter quæ summopere laudo jus Galli antiqui medicatum cum simplicibus jam dictis, atque etiam cum radicibus aperientibus filicis maris, liquiritiæ, & altheæ, item & cum tamariscis, prassio, ac ligno sassafras. Secundo laudo trochiscos de capparibus, & de agno casto. Tertio medicamenta calybeata quibus omnis vis pulvis lienis equuli esset addendus, ac tempore ius horum molienda est purgatio aliquot intervallis cum pilulis de helleboro.

Exterius pro toto corpore propono inunctionem factam ex oleo camomelino nutato, pro liene vero solum factum cum lapide molari ignito, aceto superasperso, probo & embrocæ factam cum oleo amygdalino amaro, rutaceo, & nardino, sicut & ceratum Diachilon gummatum cum trochillis de capparibus.

His omnibus addatur victus extenuans moderate, unde nutato aere ad siccum patiens debet vesci optimis carnibus, ovibus, fisticis, capparibus sale conditis, amygdalis dulcibus, vinum bibat medicatum guajaco, sassafras, ac tamarisco; Alvim lubricam servet pilulis de aloë in prima mensa acceptis, quo pertinet & vinum medicatum cum sena, & reliqua omnia jam dictis respondeant, ac Deus patienti saveat. *Julius cesar Claudius in Consultationibus Medicis.*

De Icteria. Pro Perillustri, & Reverendissimo Patienti.

Quemadmodum oculis patet affectus Perillustri, & Reverendissimi Patientis, annum ætatis 30. temperamenti calidi, & siccis, gracilis habitus, incompolite viventis; ita tamen causa ipsius obvia est Icteria namque est affectus, morbus Regius à Latinis vocatus, cujus essentia consistit infœditate cutis universi corporis,

quæ immediate provenit ab effusione flavæ bilis in partes cutaneas : ut propterea definierint Aëtius, & Paulus Aegineta inter Græcos, hunc affectum, per effusionem humoris bilioli per corpus, causalem ejus definitionem proponentes.

Quamquam autem à multiplici causa bilis per corpus diffundatur, cum critice, de qua Hippoc. 4. Aph. 64. Quibus in febribus morbus regius in septimo, vel nono, vel undecimo, vel decimoquarto supervenerit, bonum; iusta scilicet febre per abscessum; tum symptomaticæ, stimulatæ natura à vi morbi; de quo idem Hipp. eodem Aphor. 62. Quibus in febribus morbus Regius ante diem septimum accedit, malum; ut contigit Hermocrati ab Hipp. descripto Primo in Tertium Epid. Agg. Secundo, qui sexta auriginosus factus fuit, omniaque symptomata exacerbavit; atque ita processit affectus modo cum remissione, modo cum incremento ad 27. usque diem, qua obiit.

In præsentī casu aliunde non provenit, quam ab impedimento viarum, quæ per duodenum bilē transmittunt ad intestina, & expurgant per alvum. Quod quidem impedimentum duplex esse potest: obstructio scilicet porī fellei, & ejusdem compressio à jecoris intumescētia. Quod ex tactu colligo, qui in utroque hypochondrio duritiem prodit maxime conspicuam; quamquam majorem in dextro quam in sinistro, in quo ad tumorem scirrhosum proxime accedit, licet verus scirrhosus non sit, cum ad compressionem dolore aliquo sit gravis. Intumuerunt autem jecur, & hec ex humoribus crassis cum pituitosis, tum biliosis copia genitis, ob incompositam vivendi rationem, vitamque sedentariam assiduo scribendi studio addictam, unde coarctatis ductibus porī fellei, bilis non fuit ad intestina transmissa; accedente imbecillitate facultatis excreticis, cujus causa sanguis impurius diffunditur per venas, cum urina colore tincta, & cute universi corporis defœdata, non sine alvi stypticitate, cujus propterea fæces, ut audio, albicant.

Affectus hic est antiquus, duorum scilicet annorum, ideoque rebellis valde, qui propterea sicuti antehac generosis remediis non cessit, ita in posterum summa cum difficultate superabitur. Neque spes ulla est hæmorrhagiæ, alteriusve evacuationis, quæ in ictericis ante septimam accedens eam salutarem reddit aliquando: quinimo metuendum potius ne febris invadat, quod antehac contigit, & cachexia, aut aliæ graviore affectiones suboriantur.

Quare agendum, & bipartita instituenda curatio. Primo etenim occurrendum est tumori jecoris per attenuantia, incidentia, emollientia, & resolventia, ac sensibilibus evacuantia; deinde instituendum expurgationi bilis plurimum quidem per alvum, tanquam viam consuetam, ex parte quietiam per corporis ambitum: quod remediis Chirurgicis, Pharmaceuticis, & Dieteticis consequemur.

Chirurgica quod spectat, scrupulus hæret de missione sanguinis; cum ex Galeno habeamus de Sanitate tuenda Quarto, in cacochymia sanguinem non esse educendum; tunc tamen eximit Aëtius Tetrab. 3. Serm. 2. cap. 18. dum proponit curam ictericæ symptomaticæ, in hac sci-

licet duo esse maxima remedia, venæ sectionem, & purgationem; subjungitque quod, quibus multitudo sanguinis cum bile adeit in venotogenere; vel etiam quibus dolet hepar, vel lien, aut prædicta viscera distenduntur, nihil venæ sectione sit accommodatius, si nulla alia re id facere prohibearis. Quare in casu præsentī proculdubio sanguis est educendus, mediocri quidem quantitate, ex salvatella utraque, consilio ex Avic. 16. 3. quod mittendus utraque salvatella sanguis sit, dum mixtus est icterus ex flavo & nigro; unde cum in casu nostro tumidum sit utrumque viscus, ac proinde supponendus sit affectus mixtus, utrumque commode sanguis educitur.

Pharmaceutica sint lenientia, præparantia, & purgantia. Præmissa itaque alvi lenitione elect. lenit. & speciebus hieræ; præparentur humores redundantes syr. de cichorio, de capillo vener. & de succo lintonum, cum aqua intybi, agrimonie, & acetosæ; deinde purgantur rhabbaro infuso in sero lactis caprini, agarico trochiscato & sennæ, cum syr. ros. sol. & de polypodio composito. Mox deveniendum est ad præparationem humorum in visceribus tumefactis, juxta Galeni præceptum Primo de Naturalib. facult. 13. scribentis medicamentum ad ictericos, bilem purgans exhibendum non esse ante purgationem humorum obstructions inducentium. Quam ob causam syrupi magis aperiētes hunc in modum sunt præscribendi.

1. Syr. de duabus, vel de quinque radicibus, syr. byzantini cum aceto an. unc. i. oxymel. scyll. unc. sem. decoct. apii, petroselinii, feniculi, agrimonie, cetrach. unc. vi. misc. pro syr. & sic pro quinque. Purgetur deinde materia el. de dactylis, & confectio hamech. vel inf. agarici, epithymi, sennæ, & rhab. cum syr. ros. sol. & de polyp. compos. Repetantur validiora præparantia, & per vices evacuantia: atque ideo præparationis ergo præscribi poterunt trochisci de eupatorio, de rhab. & de capparibus, cum syr. propositis, & ammoniaco. Purgatio fiet pil. de tribus cum rhab. aggregativis, & cochleis præparatis cum helleb. exhibeanturque biduo præparantes, & tertia quaque die purgantes pilulæ à quibus aliquot dies uti poterit vel elect. Saxoniano de chalybe, vel vino chalybeato, vel croco martis, cum exercitio, additis externis fomentis, inunctionibus, & cataplasmatibus olim à Viro præstantissimo præscriptis, applicato jecori cerato oxycroceo. Quod si huc se conferre posset, lutorum quoque cum emollientium, tum digereantium usus in rem esset, quo remotis plurimum impedimentis, devenire possit ad validissima cholagoga. In quem usum proderit radix cyclaminis contusa, & cum mulla epota ad unc. iii. vel 4. Expurgat enim viscera, & sudorem ciet: propterea ab ipsius usu regatur corpus ad faciliorem sudorem. Aëtius in hanc rem laudat pulverem erinacei terrestris; corticem quietiam raphani contusum, & expressum, cum mulso assumptum. Atque hæc cum victu accommodato ex usu futura censeo in hoc affectu refractario, & difficillimæ curationis. *De rebus Silvanicus Consilior. & Respons. Medic. Cont. 3.*

Ictericis

Ictericia cum doloribus hypochondriacis.

Hypochondriaca affectio, à Gal. flatuosa, ab Arabibus mirachialis appellata, Principem Excell. jam diu divexari significabat nobis pituitosi humoris proventus, cum ventriculi subversione, frequenti viscida expuitione, & vomitu crudorum ciborum, non sine aciditate, & in fine, majori ventriculi conatu, amari quoque saporis excretionem, quandoque etiam concomitante diaria febre, ex cruditate, sive alimentorum corruptione proveniente. Affectio hujusmodi pro cauta perpetuo supponit morbum organicum non solum. verum & potissimum in intemperie, eaque calida primo in hepate, mox & in mesenterio, quæ ventriculi fundo quoque communicata, coctiones in eodem viti re nunquam desinit, modo imminute, modo depravate, unde nonnunquam Bradypepsia, quandoque Dyspepsia excitabatur, & propterea crudorum ciborum congeries frequentem expuitionem, ventriculi subversionem, corruptorum vero acidus vomitus primo, mox adaucto conatu ab inferiori parte, amarus quoque vomitus provocabat, sique effectus frigidus à cause calida, non sine ignorantium administratione non raro provenit: caliditatem enim ostendunt non solum amari vomitus, sed etiam corruptiones ciborum ad acidum; aciditas enim in facto esse frigida quidem est, at in fieri, quatenus a calore introducit, calida existit, ut in aceto apparet, qua de re plura Trallianus & Gal.; sed quoniam datur etiam aciditas à frigiditate immediate facta, idcirco ego hanc aciditatem positivam, superiorem vero privativam appellare soleo, & ita ventriculum in Excellentissimo Principe privative, non positive frigidum esse decerno. Verum quia ex improporionatis objectis, exercitiis omissis, & evacuationibus per alvum intermissis, sive retentis, cruditates quotidie majus incrementum susceperunt, hinc factum est ut retentæ in mesenterio, obstructions adauxerint, quæ à calore in halitus & vapores crallos convertæ, totum ipsum mesenterium aliasque cavitates repleverunt, & distendendo atque continuum solvendo, dolores excitarunt, hypochondriacos potius, quam colicos nuncupandos; portio vero cruditatum crassior ab expultrice facultate à doloribus irritata, ad inferiores partes detrusa, non solum porum felleum obstruendo, bilis depositionem ad vesicam felleam intercipit, & inde totum corpus inticet, verum & ulterius progrediens, vas etiam cholidochum implet, & bilis in vesica fellea existentis ad duodenum intestinum transmissionem impedit, siq; sæces ex bilis defectu albæ per alvum deiciuntur, & hoc modo jam dictis doloribus Ictericia supervenit: hæc quoties, quoties præter consuetas mesenterii obstructions, nova congeratur materia cruda, naturam ipsam infestans, febrilem etiam alterationem potius, quam veram febrem inducens, & potius à doloribus spiritus calefacientibus proveniens. Ex quibus omnibus patet quod etiam in Ictericia, quamvis affectus calidus, biliosus nimirum appareat, causa tamen frigida, cruda, & pituitosa est; ut propterea Hipp. in Ictericia cu-

randa Phlegmagoga ab initio præcipiat, mox Cholagoga; sicut enim quod clauditur, bilis est, ita pituita, quod claudit; quam copiosam observavit per alvum excretam Vir. Excellentiss. Aditans.

Hypochondriacus affectus exigit Curationem; hypochondriaci vero dolores & Ictericia Præsertionem expostulant, cui præcipue in præsens est incunabendum, dum uno eodemque tempore, in eodemque remediis & affectui hypochondriaco non parum prodesse poterimus. Quod si præsertio negligetur, frequentiores atque diuturniores dolores evaderent, & in alium affectum Hydropem scilicet siccam migrare posset.

Quare statim primæ viæ sunt mundandæ. Secundo Obstructions in mesenterio existentes, sunt saltem minuendæ. Tertio Jecoris cava apertentibus & Evacuantibus ab excrementis vindicanda. Quarto Jecoris calor omnium horum malorum principalis auctor, est moderandus; atque tandem aliquo familiari medicamento evacuante semel aut bis in mense cruditatum congeries est impedienda ac removenda. De ventriculi autem roboratione parum, aut nihil, sed potius de congrua victus ratione instituenda solliciti esse debemus.

Pro prima intentione explenda, primum Leniens sit syr. ros. sol. aut potio ex manna clarinata, sive electuarium lenit. cum crem. tartari. Quinque sequentibus diebus iæ, arans sit.

℞. Julap. acet. ℥. ii. aq. florum citri ℥. j. aq. cinnam. ℥. ℞. m. pro una vice, & sic pro aliis. Mox repetatur alterum ex jam dictis Lenientibus.

Pro secunda intentione ℞. Rhab. maturi ℥. ℞. elect. lenit. ℥. ii. m. f. boli quatuor horis ante prandium assumendi; transacta autem hora ab assumptis bolis, superbibat jus malva, borag. & endivia alteratum; tribus vero horis ab assumpto jure prandeat. Sequenti vero die assumat crem. tart. ad ℥. ℞. in jure corticibus citri alterato dissolutum, tribus saltem horis ante prandium; sique perseveret duodecim saltem diebus, alternatim assumendo & rhabarbarum, & crem. tartari; deinde succedat medicamentum purgans, ex elect. lenit. & pil. de tribus paratum, cui post horam superbibat feri capr. depur. aut aq. Nocer. lib. ij. tribus autem horis ab assumpto potu prandeat; aut paretur rhab. infusum, addito syr. ros. soluto.

Pro tertia intentione ℞. Rhab. opt. mat. ℥. j. aq. stillat. de succo cichor. de succo agrim. an. ℥. iii. m. f. inf. per noctem, deinde facta express. adde syr. de succo limon. ℥. j. m. pro una vice, & sic pro aliis. Sequenti vero die bibat.

℞. Aq. stillat. de succo cichor. unc. vii. spirit. tart. rectif. f. gutt. xii. syr. de succo limon. ℥. j. m. pro una vice, & sic pro aliis; & in horum usu pergat alternatim ad duodecimum usque diem.

Pro quarta intentione valde proderit sanguiniseductio ex Jecoraria dextera ad ℥. vii. vel viii. deinde aliquod Alterans erit offerendum; & quoniam annu tempus permittere, non poterit

terit, quod aptissimum & efficacissimum esset remedium; aquas nimirum Thermales acidulas, ideo aliud erit minus efficax substituendum; aquæ vero ad rem nostram essent Lucenses, & adhuc valentiores, in Valle Solis Agri Tridentini scaturientes, quibus in præsens substitui poterit.

℞. Sem. melon. mundat. ℥. j. sem. angur. & cucurbit. mundat. an. ℥. ℞. aq. de succo cichor. ℥. viii. M. f. emulsio, cui adde syr. de pom. ℥. j. m. pro potu quatuor horis ante cibum; in usus ulu perseveret xv. aut xx. diebus. Tandem familiaris esse poterit pilula ita concinnanda.

℞. Pil. de trib. cum rhab. ℥. j. magist. mechoac. ℥. j. in. ref. pil. n. vi. & aurentur. pro duabus vicibus, hora una ante parcam coenam semel aut bis in mense assumenda.

Ut vero aliquod ventriculo robur addamus, abs re non erit, quod Excellentissimus P. aliquando statim à prandio, aut à cœna tria aut quatuor integra grana mastiches devoret.

Quibus jam dictis omnibus congrua vivendi ratio addenda est, ut victus sit humectans, tenuis substantiæ, facilis coctionis & distributionis, parca sit cœna, & ix. aut x. horis a prandio remota, ut sigillatim ab Excellentiss. Viro Adstanti præscribi poterit. Et hæc omnia Principi Excellentiss. à Deo salutari precor. *R. Sym. Job. Fort. Consult. & Resp. Medicin. T. 2. Cent. j.*

Ictericia cum lenta febre.

Eminentissimus Princeps annorum sexaginta unius, temperamenti calidi & humidum quoad totum, hepatis vero calidioris, & ventriculi frigidioris, edentulus fere, laute libereque parumper vivens, atque sedentaria utens vita ob frequentem ad studia applicationem etiam a cibo; multis idcirco congestis in corpore pituitosis in primis & biliosis humoribus, correptus fuit, uno jam elapso mense cum dimidio, febre lenta circa vigesimam tertiam horam, dietim invadente, tanque exigua ac levi, ut ipse Princeps Eminentiss. sæpius hæc proferret verba: Dicerem me bene valere, si Medicus non assereret, me ægrotare atque febricitare; nec quidem invalidæ rationi innixus, cum perbelle comederet, noctu dormiret, omnemque aliam actionem integre ederet. Id tantum mali patiebatur, quod circa faciem incendebatur, flammeoque calore & colore suffundebatur, & urinam rubram, ac veluti sanguineam effundebat. Sed paucis post diebus hæc quoque duo ebierunt, cum urina redderetur fere naturalis, nulloque calore & colore amplius tœdaretur facies. At paucis interpositis diebus febris adaucta fuit una cum vultus calore capitisque dolore, necnon subinde hæmorrhoidum tumore, rubore atque dolore, nescio an occasione clysteris injecti, licet ex lacte, re epicrastica parati, an vero potius affluxu redundantium in corpore humorum ad hæmorrhoidum sedem à natura facti. His omnibus sublati, redactaque ad suam remissionem febre, mox supervenit immanis dolor ventriculi regionem exercens, thoracem in consensum trahens, necnon spiritus difficultatem invehens, quæ omnia sustulit larga pituitæ vitreæ evomitio; quem tamen dolo

rem excepit fœdus totius corporis cutis color, dum icteritia subsecuta est hepatis & ciliis icterica obstructionem: siquidem albiæ illius vilæ fuerunt alvi fæces, & aliqualis etiam durities atque dolor hepatis substantiam ostendebant. Ad hanc debellandam febrem, instituta primum congrua vivendi norma, lenitaque alvo, pituitosi crassique humores præparati levi deinde cathartico evacuati fuerunt. Inter Purgationem sanguis pro prima vice educus fuit ex brachio dextero (qui præscriptus fuit ad uncias novem aut decem, licet Artificis liberalitate largius, nempe ad uncias xv. fuerit extractus) minime indicatione à parva febre petita, sed ratione faciei phlogosis, & urinæ flammæ moderanda. Et quia præstat ex Galeni cons. majori ex parte evacuare, deinde ad detergendas obstructions accedere, si enim iter effeceris, ipsas magis impinges: necnon etiam præcautionis gratia, ne videlicet sanguis, in corpore plethorico exuberans, aliam febris speciem lenta longe majorem excitare valeret. Pro altera vero vice fuit sanguis ad uncias x. extractus ex crure, ratione inflammationis huius parvæ, quæ hæmorrhoides occupabantur. Quæ peracta Purgatione, ad inguen superstitem excrementorum saburram minuendam consilium de Curatione per epicrasin inritum fuit, ideoque in usum ductus cremor tartari, & iuscula deobstruentia; quibus tamen non sufficientibus, perseverat febris cum oris amarore, & inappetentiâ, adeo ut ciborum quoque nomen abhorreat: & quod pejus est, cum virium prostratione. Idcirco non parum de Princeps salute timendum videtur, præsertim cum tumor in jecore tactu manifeste percipiatur, qui progressu Hydropem minatur. Quare indicationes iniungunt, obstructions, quæ sunt lentæ febris & Ictericæ basis, referare, materias præparare, per epicrasin purgare, partesque in primis roborare, ne novæ in dies prævi regenerentur humores, cum præster humores non generari, quam genitos evacuari. Ut autem expleantur indicationes, consultum fuit aquam Tetrucianam exhibere, deinde jus pipionis aperientibus alteratum, præmisso bolo ex tartaro vitriolato, atque tandem ad usum chalybis potabilis Magni Ducis devenire: docet enim Dioscorides, contumaces obstructions sine metallis vix superari posse. Hæc raptim scripsi, utpote pluriis negotiis ac summa temporis angustia pressus; Lectorem propterea præstantissimum, me excusatum habeat, rogatum velim, si omnia inconcinna reperiatur, nullaque doctrina referta ac firmata: docuissimam cum & selectissimam à Viro præclariss. expecto, eaque Virum eminentiss. omni virtutum genere cumulatifimum, à morbo vindicantia.

Naturale robur quod à primordiis sortitus fuit Emin. Princeps, permisit eidem libertatem vivendi, quam paulatim postremis annis detrahebat & denegabat senilis aras, quæ secum duxit nativi caloris deficientiam, dentium carentiam, & ad exercitium ignaviam, perseverante forsitan, aut parum à consueta declinante

victus ratione, quo factum est ut cruditates, antehac calculorum matres, tandem in primis viis mesentericis stagnantes, fermentata, febriculam lentam primo prodixerint, quæ utinam intensior fuisset, quoniam Eminentiss. P. victum tenuiorem servasset, & medicamenta, tum attenuantia, tum detergentia & evacuantia admississet, sicque cruditates nec multiplicata, nec ulterius ad nobiliores partes nimirum ad jecur traductæ fuissent, in cujus vasis stabulantes obstructions: & in parenchyma visceris intra, forsantumorem quoque excitarunt. porum felleum & vas cholidochum repleverunt, ad cujus obstructionem, bili intercepto transitu, ad duodenum intestinum cum pervenire non potuisset, faeces ab ipsa tingi nequiverunt, sicque albidæ egelæ fuerunt; nec contra bilis, retrocedendo per venam cavam, mox per arterias ad totum corpus diffusa, fædo colore flavo habitum universum inquinavit, affectumque constituit, Ictericum, sive Anriginosum dictum; ut propterea summa cum ratione Avicennas & Aetius dixerint, affectionem hujusmodi, licet ab affecto jecore pendeat, quandoque tamen a ventriculo & intestinis sui primam originem trahere, & ideo dolores in ventriculi fundo collicos æmulantes jam passus fuit; quos potius hypochondriacos fuisse censendum, dum a vehementi pituitosæ & crudæ materiæ commotione motus ejusdem non ad superiora tantum, sed ad interiora magis, nimirum ad hepar & vasa fellea impetum fecit, cui ideo statim Aurigo successit. Quare ceteras omnes causas excludere possumus, nimirum inflammationem, solam jecoris intemperiem, vehementem adscititium jecoris ardorem, crescem in febribus, solam bilis copiam, ferarum morsum, atque tandem vesicam calculis repletam manifestissimam enim causam habemus, tactu ipso, nedum intellectu dijudicandam, Cruditates autem ultro progressæ, & nobiliorem locum occupantes, clausæ & ventilatione privatæ, a calore p. n. fermentatæ, febrem conservant, priori paulo intensiorem, tum loci ratione, tum quia forsitan aliqua bilis portio iidem copulatur, a cujus uniera vapores ventriculum elevati, Anorexiam & quasi Apolitiam una cum oris amarore dictum progressu introduxerunt. Interim, totius nutritionem bene procedere impossibile est a sanguine bilioso humore infecto, & ideo acri & amaro, cum nutriamur dulcibus; præterquam quod primum ejusdem sanguinis rudimentum, ab affecto jecore, depravatam necessario procedit, ut propterea non solum caco-hymicum, sed cachecticum quoque, & imbecille totum corpus modo redatur.

Scitus Eminentissim. P. ad perniciem magis quam ad salutem inclinat; agre namque curari potest affectus iste, ultro progressus, præsertim in Sene jam viribus destituto & a continua febre divexato; sicut ad meliorem statum redigi non potest, nisi prius obstructionibus relevis, ita cum tempus non breve requirat hoc opus, nec levioribus Purgantibus-

cellurus sit affectus, cum naturam adminiculantem, validam & irritatam non habeamus, vires nec temporis diuturnitatem, nec purgantium medicamentorum violentiam sustinere posse dubitandum: sicut interea aut Ca-chexiam in Hydropem nigrituram, aut Atrophiam tabidam suspicandum. Et quamvis gloriatur Galenus se unica Purgatione Auriginosum sanasse, a sola bilis copia, non ab obstructionibus Icterus proveniebat.

Deserenda tamen Curatio non est, primas vias expiando. Obstructiones attenuantibus, incidentibus & aperientibus referendo, humoresque crassos & viscidos per epicraticam evacuando. Deinde bilem elective educantibus expurgando; atque tandem partes affectas, nempe ventriculum & jecur roborando.

Quibus intentionibus implendis, quamvis Gal. asseruerit quod Regio morbo laborantibus si venam seceus, extremam in perniciem Agrotantes perducimus; attamen de legitimo Ictero in quo mera & sincera bilis peccat absque sanguinis subdominio, intelligendum est, & ideo sanguinis missionem admittit, quando bilis cum sanguine peccat: subdens tamen, quod Purgatio sit magis appropriata, quam sanguinis missio. Sed Phlebotomia admittitur & ab Avic. & a Paulo, habita semper peccantis humoris, ætatis & ipsarum virium, sicut in casu præsentis, temperamenti, & comitantis febris ratione. Attamen de sanguine mittendo, non est amplius quod cogitemus, sicut neque de primis viis expiandis, ne actum agamus; sed iterum ad obstructions aperientias devenire debemus medicamentis, quæ quidem conferre, sed æque tolerari possunt; ex quorum sylva eligerem ego Syrupum Fernelianum cum rhabbarbo tertio quoque die xv. vicibus exhibendum ad ʒ. ii. in vino albo tenui, non dulci, juxta descriptionem nostram. Intermediis vero diebus, validissimum Deobstruens à me multoties expertum, est spiritus tart. alcalizatus, in decoctione junculo parata fol. cichor. cucutæ, agrim. marubii, chamædryos & absinthii: ita enim & obstructions aperiri, & humores crassi ac viscidii epicraticæ evacuari poterunt.

Absoluto jam dicti Syrupi Ferneliani usu, ad aliquod chalybeatum medicamentum deveniri poterit, quod pariter & aperire, & evacuare valeat; utrumque autem præstabit vinum chalybeatum ita paratum.

℞. Vini albi tenuis lib. xii. chalybis præpar. lib. j. ponantur in vase vitreo per octo dies, & quotidie bis vas agitur, tandem adde radic. cichor. petrosel. apri an. ʒ. j. fol. senæ mund. ʒ. ii. sem. cartan ʒ. j. rhabarb. opt. ʒ. β. cinnam. integri ʒ. ii. f. infusio per tres dies, mox servetur ad usum, cujus dosis erit ad ʒ. v. singulo aut tertio quoque mane. Et dum jam dicta omnia administrentur, extrinsecus quoque regio hepatis emollientibus illinienda, unguento scil. ex rosac. & malv. parato & exiguo succo absinthii refofnato. Neque medicamenta præscripta à febre prohiberi poterunt, cum ut considera-

bat Gal. in hisce casibus causæ multo magis, quam febris sit incumbendum. Aqua vero letuciana convenire potuit in principio, ad cruciatae primas vias occupantes, detergendas & abluendas, in præsens autem exigua valde cum utilitate ventriculi, nullaque jecoris, & cum virium jactura propinaretur, cum affectarum partium corroboratio debeat semper in Arte esse postrema intentio: de qua tamen si solliciti esse velimus, non decerunt absynthii sales, ejusdem Conservæ, aut succus densatus, omnia statim ab assumpto cibo, ut ventriculum simulque jecur roborantia, assumenda.

Si tandem bili expurgandæ, Deo durante, offeratur occasio, ablatis nimirum obstructionibus, cholagoga medicamenta, & præsertim rhabarbarum cum diagrydio, sulphure præparato, per intervalla in usum duci poterunt, cæteraque medicamenta partes affectas corroborantia, Viris Præstantissimis notissima; quibus præscriptorum omnium rectum usum & congruam viciis rationem instituendam libenter committo. *Idem ibidem.*

Observationes

Filiola mea unicum annum nata, morbo regio oppressa, est, quam paucis diebus hoc solo decocto curavi.

℞. Hord. mund. passul. an. ℥i. fragar. M. ii. coq. ad lentum ignem. M. f. q. aq. fontis, quoad rubella fiat ac dulcis potio; quam continuo bibebat. Valet enim optime decoctum hoc in morbo regio. *Martinus Rulandus; cur. 6. cent. 1.*

Rulticum quendam quadraginta sex annorum ictero laborantem hoc modo brevi curavi.

℞. Juris pisorum ℥vi. pulv. sen. laxat. ℥i℥. M. f. hauritus mane bibendus, qui somitem icteri alvo soluta prolecevit blande. Pro potu utebatur decocto fragarum. Pertusa est hepatica, & sic convaleuit, Deo sit Gloria.

Alteri ex oculis ictericia remota est aqua rosarum, qua oculos mane, meridie & vespere lavabat. *Martinus Rulandus Curat. 32. Cent. 7. & cur. 30. cent. 8.*

Nobilis quædam Matrona non febricitans & bene valens, subito ictero correpta est, excrementa alba & duriora erant; ad me, consilii causa accedens, his duobus remediis, miraculi instar statim convaleuit.

℞. Syrup. infus. ros. pallid. cum sena ℥i℥. diacathol. ℥ii. aq. agrimon. ℥ii. M. detur mane: alvum egregie deposuit: mox quotidie Cereviliam bibens expresso nodulo intra scripto in cerevilia dependente convaleuit.

℞. Marthub. exsiccat M. j. rhei opt. incisi ℥i. ichananth. incisi. gr. v. croc. orient. gr. iii. spec. diarrhod. abbat. ℥i. M. f. nodulus filo alligatus.

Cognata quædam nostra solo decocto soliorum luchi in sero lactis, sine aliis remediis, ab ictero curata fuit.

Scribit Dioscorid. succum marthub. e foliis contusis expressum naribus, Regium morbum expurgare.

Mulier quædam Nobilis ictero laborans, ex oppilatione cystis tellis, admodum diu-

turno, multis remediis adhibitis per Medicos doctissimos, curari non potuit; illi continuum usum Syrupi e succo solo marthubi cum sacch. confecti, admodum commendavi, quo cum diu usa esset, ab omni flavitudine icteri, qua per duos annos & ultra afflicta esset, curata fuit: ait ut illum Syrupum procurando ictero semper in lumine honore habuerim. Sic quoque exsiccata herba in nodulo egregie protuit. *Petrus Forestus observ. 19. & schol. lib. 19. De Hepatis Affectibus.*

Collige stercus anserculi tempore, veris sicca ad moderatum solem: hujus pulveris dato ad ℥℥. aut ℥i. in inveterato morbo per hoc remedium omnis Aurigo tollitur, si per tres aut quatuor dies exhibeatur. Idem facit pullorum excrementum album pulver. ad ℥i. amygdalæ amara numero vi. jejuno ventre mane assumantur. *Rodericus a Fonseca tom. 2. consult. 34.*

Tempore æstivo potes quandoque haustum aquæ betulæ bene asservatæ sumere; ea primo vere colligenda, arboris betulæ trunco inciso, aut ramo aliquo amputato, nam large profundit aquam priusquam folia prorumpant, statim autem cum germinare coeperit, nihil humoris extillat, aqua ista limpidissima est, sapore grata, sitim sedat, interim obstructions tollit, ut & icterum sanare, & calculum e renibus carare valeat. *Reinerus Solenander conf. 16. sect. 6.*

Quidam ictericus sanatus est edendo omni die pugillum unum absynth. Idem conf. 15. sect. 5.

Mulier quædam post febrem intermittentem tota evasit icterica, alvusque penitus constipata: persuasi ut vino sequenti alternis interetur diebus.

℞. Rad. aper. an. ℥℥. cortic. rad. sambuc. ℥vi. rad. asar. ℥ii. absynth. ℥iii. summit. cent. min. ℥ii. fl. cordial. an. ℥i. sem. fenic. petrosel. cuscut. an. ℥i. fol. sen. ℥ii. turpeth. ℥iii. agar. ℥℥. zinzib. ℥℥. tartar. vini alb. & limatur. chalyb. in nodulo ligatæ, an. ℥℥. infunde in vino: coque parum in duplici vase, & utatur. Dejecit egregie hujus vini usu, in quo aliquandiu permansit, sentimque flavities minui coepit, urinæque ad naturalem colorem redire, alvusque respondere. Postea ut viscera simul roborarentur, obstructionsque solverentur, Electuarium hoc præscripsi.

℞. Conserv. fl. cichor. fl. bugl. capill. ven. an. ℥i pulv. pellicul. stomach. & intestini gallinæ ℥i. troch. de eupator. ℥i. limat. chalyb. præp. ℥ii. cum syr. de bugl. f. elect. capiat alternis diebus superhibendo parum vini diluti aqua endiv. sic restituta fuit, & licet gravida tandem esse deprehenderetur, nihil horum usu mali passa est, sed filium mox sanum & bene habitum peperit. *Felix Platerus observat. lib. 2. pag. 352.*

Urina pueri ad ℥v. aliquoties propinata probatur, quæ saccharo vel melle dulcorari potest. Stercus anserinum decoquunt alii in aqua & vino, & colaturam propinant. Salvia folia sæpius sumpta quendam curant, Pediculos alii numero xi. devoratos juvare credunt. Pulvis, quem pro singulari remedio in ictero quidam laudant, & in tres partes

dividunt, tribusque diebus continuis, mane in decocto cicorum aut pisorum exhibent, talis est.

℞ Sem. aquilin. ras. C. cervi, croci, or an. ʒi. M. F. pulvis tenuissimus, dividatur in tres doses. Felix Platerus. practic. tom 3. cap. 2. pag. 140. 141.

Vinum laxativum per triduum in hunc modum ordinavimus.

℞. Rad. cichor. ʒi. liquir. ʒvi. cortic. rad. frangul. ʒii. fol. sen. ʒx. rhei ʒi. sem. fenic. ʒib. pailul. min. ʒj. macis. cinnam. an. ʒib. spic. ind. ʒib. hat infusio in tʒijʒ. vini. & tʒijʒ. aquæ, post viginti quatuor horas, sumatur pro haultu tertia pars, addendo ʒi. crem. tartar. propter majorem apertionem; hac evacuatione lenitiva praemissa, ad obstructions venarum minorum referandas, sequenti formula potionem aperientem & digerentem præscripsi.

℞. Rad. cichor. ʒi. rad. fenic. petrosel. an. ʒxi. fol. agrimon. marthub. alb. an. M. ʒib. sem. fenic. anis. an. ʒii. cicer. rubr. ʒvi. coq. in f. q. feri lactis caprini ad tertias, colaturæ ʒx. adde syr. de cich. cum rtheo, de eupator. an. ʒib. M. pro tribus vicibus. Gregorius Horilius obs. 36. lib. 4.

Pro referendis obstructionibus, hunc julepum digestivum assumpsit.

℞ Aq. absynth. cichor. endiv. an. ʒii. syr. de cichor. cum rtheo ʒib. syr. cap. ven. de duabus radic. an. ʒib. spirit. vitriol. gut. iiii. M. F. haustus. Sequenti die pro evacuatione bilis, dedi quod sequitur cum malvatico.

℞ Gummi gutt. laxativ. gr ix. tartar. vitriol. gr. iv. M. F. pulvis, excrevit eo die egregie. Postea sumpsit M. & v. de sequenti liquore duabus horis ante cibum.

℞. Lumbric. terræ probe lotorum numero vi. coq. in aq. graminis aspar. hader. terrestr. an. ʒi. in colat. dissolv. sacch. cand. ʒi. spirit. terebinth. gr. iiii. M. Pro ulteriore obstructionum deopilatione bibat per biduum de hoc julepo.

℞. Aq. petrosel. apii, gram. an. ʒii. syr. de cichor. cum rtheo ʒib. syr. byzantin. & de quinque radicibus, an. ʒi. succin. tenuissime pulv. ʒib. spirit. terebinth. gr. iiii. M. F. julepus.

Iterum purgetur pulvere priore. Juscula fiebant cum rad. fenic. cichor. & petrosel. aurigine nondum cedente, de hoc nodulo bibit vino infuso.

℞. Marthub. sicc. M. j. rhei. el. ʒi. agar. rec. troch. ʒib. schananth. gr. vi. croci gr. iiii. spec. diarrhod. abbat. ʒi. incid. ad nodulum. Vel. sic,

℞. Marthub. sicc. M. j. rad. aperient. an. ʒi. bacc. junip. concis. M. ʒ. croci ʒib. in id. pro nodulo.

℞. Radalith. malv. fenic. cich. enulæ. an. M. ii. fol. marthub. cent. min. agrimon. absynth. chamædr. an. M. ii. ʒ. chamæm. melil. sambuc. an. M. i. ʒ. sem. cumini, fenic. an. M. ii. forfur. M. iiii. Coquantur in aq. commun. pro incessu. *Petrus Lorichius. obs. 4. & 5. cap. 2. lib. 4.*

Exhibeatur potio digestiva ut ante. Pro potu ordinario bibat de hoc nodulo in vino suspensio.

℞. Rad. cichor. fenicul. polypod. an. ʒi. tol. cent. min. absynth. marthub. sicc. card. benedict. an. p. j. H. ʒ. cordial. an. p. ʒ rhei el. ʒib. spec. diarrhod. abbat. ʒib. fol. sen. el. ʒii. pulv. chalyb. præp. ʒi. spic. schananth. an. gran. m. cinnamom. el. ʒib. incid. & conquin. ad nodulum sericuum.

Sequens pulvis anti ictericus pro tribus matutinis mlt. viat.

℞. Pulv. lumbric. terræ præp. ilerc. anserin. verno tempore collect. an. ʒib. ras. cbor. spec. diarrh. abb. diatriofantal. an. gr. xv. sacch. lunill. ʒvi. M. F. pulvis dividendus in tres partes. Interdum de elect. sequenti ad libitum capiat.

℞. Conserv. cichor. cent. min. an. ʒib. conserv. viol. ʒvi. pulv. lumbric. præp. spec. diatriofantal. an. ʒi. spir. salis rectificati gr. v. M. ad fixile. *Io. Petrus. Lotichius. obs. 6. cap. 2. lib. 4.*

Iterum à folliculi fellis obstructione ita vinces.

℞. Rhei. ʒii. cinnam. ʒi. agar. troch. ʒib. zinzib. ʒib. infund. vino tenui & aq. endiv. colaturæ adde mannæ el. ʒxii. F. haustus. Deinde,

℞. Lumbric. terræ pulver. ʒ. diaspolitici, gr. viii. cum syr. byzantino. F. pilulæ iiii. & superbibat decoctum absynth. ex vino, si non febricitet, alioqui ex aqua: & pro potu uratur solo illo decocto. *Io. Henricus. ad aphor. Hipp. 64. sect. 4.*

Vidi quendam statæ ætatis robustum virum, qui sæpe genio indulgebat: hic in plenitudinem tractus fuit: a vena secia expuebat flava æmmodum & crassa. Quarto die in icterum abiit, excrementis biliosis nimirum urina & alvi septimo, sudavit vehementer; purgabatur interdum manna cum rhab. & quia virulentum aliquid adesse videbatur, conquerebatur enim valide de dolore ad ziphoidem cartilagineam, jussimus decocto pectorali & cichoraceo incoqui scordium & aliquid marthub. utque interdum ʒi. vel ʒib. theriacæ sumeret, evasit. *Jo. Henricus. ad aphor. Hippoc. 42. sect. 6.*

Iuven quidam quatuordecim annos natus ictero tenebatur toxisso: hinc sequentia remedia præscripsimus.

℞. Fol. sen. ʒib. sem. anis. ʒi. summit. absynth. pont. fol. agrim. an. M. ʒ. liquir. ras ʒii. flor. genist. cichor. an. p. ʒ. coq. ad ʒii. in colat. dissolv. rhei in aq. absynth. cum cinnam. infus. & express. ʒiv. elect. c. succo ros ʒii. syr. rosat. solut ʒi. F. potio. capiat mane.

℞. Rad. rub. tinct. ʒib. fol. chelidon. maj. M. j. summit. cent. min. p. j. cinnam. ʒib. croci ʒib. infund. per noctem in vini albi ʒviii. colat. adde sacch. albul. ʒ. capiat ni ne per quinque dies post prædictam potionem. Deinde reiteretur portio laxans præscripta. His solis remediis perfecte convaleuit. *Lazarus Riverius. observ. 6. cent. 1.*

Infans quidam natus ex matre febre tertiana laborante, ipse in lucem editus quatuor accessiones ejusdem febris passus est. Deinde factus est ictericus: erat tantum brevis iscum ad illud curandum vocatus sum. Dubitavi admodum quid fieri posset in tam tenero corpiculo. Tandem hunc syrupum præscripsi.

℞. Rad:

℞. Rad. rubiz tinctor. & chelidon. maj. an. ℥ii. fol. chelidon. maj. cent. min. & absynth. pontic. an. Min. cinnam. ℥ii. croci ℥ss. coq. in aq. fontis ad ℥bj. in colat. dissolv. sacch. alb. ℥bj. F. syrupus, de quo capiat exiguum cochlear mane per viginti dies, & perfecte restitutus est. *Lazarus Riverius. obs. 17. cent. 1.*

Cuidam icterico egregie contulit quod sequitur.

℞. Fol. marrub. ceterach cap. ven. cuscute. card. ben. cichor. cum toto, an. M. j. rubiz tinctor. ℥i. vesicar. alkikengi, numero x. rhei el. ℥ss. caryophyll. ℥ss. incid. crass. natum specierum partem ℥. coq. in mens. j. vin. & quarta parte aq. ad consumptionem aquæ, dentur mane ℥v. calide, & duabus post cœnæ horis totidem frigide. *Hieron. Reusnerus. obs. 71.*

Vir quidam amplissimus totus ictericus, evacuatione factâ, hoc pulvere diutius adsumpto, plene sanatus est.

℞. Rhei el. ℥i. alb. græc. ℥ii. lumbric. terre sic. ℥ss. spec. diarrhod. ℥ss. cinnam. ℥ii. sacch. ℥ii. M. solo etiam decocto euphrat. in vino plurimum curati sunt, interpositis catharticeis solutivis: & pulvere millepedum siccat. cum ammoniaco & spec. diarrhod. exhibito. *Achilles Gasserus. obs. 77.*

Ego post bilis purgationem sequentibus remediis icterum ex bilis regurgitatione ortum felicissime semper curavi.

℞. Rad. chelidon. maj. rec. optime lotat. & concisat. M. in gran. jump. M. j. simul in mortario conterantur. contritisque adfundatur vini rhenani ℥bi. quibus simul tubacis beneque agitatis, validissime exprimantur, & colentur, cujus ℥iv mane & ante cœnam ebibantur.

Vel. ℞. Croci pulv. ℥i. cujus singuli scrupuli in cerâ novam & mundissimam in tenuissimamque laminam extensam involvantur, & in globulum formantur, singulique globuli in pomum excavatum imponentur, & torrantur vel ad ignem, vel in cacabo, donec cera simul & crocus in pomi carnem resoluti fuerint, ex his pomis unum per triduum mane devoret ager. *Franciscus Toel. sect. 1. lib. 4. practice.*

Nuper mihi communicavit pro secreto infallibili ad icterum, infusionem lentis palustris in vino albo per novem dies, ℥vi mane præbendo. Novi hominem qui prognostico relictus, importuno usu cent. min. in potulentis, & haultu decoctionis fortis in vino omni mane ab ictero convaleuit. D. Bates. referente Jo. Rajo. in *Catalogo Plantarum Angliæ.*

Jam diu agrotaverat quidam toto corpore ex viridi flavescent; dedi pilulas pimum aggregat. quæ parum moverunt, itaque præscripti sequens decoctum.

℞. Rad. sambuc. & cichor. rec. an. ℥. limatur. ferri in petra ligatæ, inter nucis, coq. in vino & aqua, bibit per triduum, atque egregie fuit purgatus.

• Jussi eo absoluto, sudare in balneo. fumendo bis rob. sambuci, & lixivio se abluere.

Cum octiduo exacto ad me veniens, urinam adferret, adhuc ea tineta erat, jussi hoc decoctum reiterare, quod ita profuit, ut mox discedens gratias egerit. *Felix Platerus. obs. lib. 3. pag. 60.*

In Belgio Rustici feliciter icterum curant

eupatorii canabini decocto. D. Regemontier referente Jo. Rajo. in *Catalogo Plantarum Angliæ.*

A solo cantabis semine in lacte bubulo pingui, ad crepescendum circiter cocto & colato, atque bis, tertio in die ad ℥v. aut vi. sumpto, plures curavi, ac vidi curatos ictericos, a quovis etiam Sepone ad ℥i. circiter in calente lacte dissoluto & acchari tantillo edulcorato, atque bis aut semel saltem in die usurpato aliquoties curavi feliciter icterum. *Franciscus Sylvius. prax. med. lib. 1. cap. 46. paragr. 74. & 5.*

Binas infusiones in vino neri curavi, quarum una præpararet, altera purgaret, primæ infusionis hæc erat formula:

℞. Rad. cichor. aspar. an. ℥i. rad. scenic. cortic. sambuc. ebul. dulcis amara, an. ℥vi. rad. rubiz maj. ℥iii. fol. absynth. M. j. chamædr. ceterach. chamæpit. an. M. ℥. ii. genist. borrag. an. p. j. sem. cuscute. ℥i. conqual. omnia, addendo limatur. chalyb. præp. ℥iii. adde vini alb. ℥lv. hanc infusionem bene obturata. Altera infusio sic præparatur.

℞. Rad. apuleiæ scenic. petrosel. gram. cichor. rad. ireos, rubiz maj. an. ℥ss. cortic. cappar. tanais. frasin. an. ℥ii. cortic. radic. sambuc & ebul. an. ℥i. fol. absynth. ℥iii. chamædr. chamæpit. ceterach. eupator. an. ℥ii. sem. petrosel. apul. cuscute. an. ℥i. flor. cordial. pugil. j. foliorum sen. ℥ss. F. infusio in ℥viii vini albi adsendo ager troch. & rhei el. an. ℥ss. spic. ℥j. limatur. chalyb. in panno ligatæ ℥ss. hanc per viginti quatuor horas ante illius usum. Sumebat per bidduum infusionem præparantem, tertio die purgantem. Idcirco has pilulas præscripsi.

℞. Gummi ammoniac. in aceto scillit. dissolut. ℥ss. rhei ℥ss. rad. asar. gentian. troch. de cappar. an. ℥. cinet. lumbric. limatur. chalyb. præp. an. ℥ss. cum ter. binth. F. magna pilul. capiat. ℥i. atque sic factum est. dum uno die infusionem præparantem, altero purgantem, tertio die pilulas sumeret, ut tandem excrementa tungi croceo & atro colore inciperent, ægraque aliquandiu in horum usu continuo indo, præter omnium spem, integre restitutus fuit. successum & laudans, & liberaliter remunerata. *Felix Platerus. obs. lib. 3. pag. 612.*

Ictericia inveterata.

Stannarius quidam ictericia laborans usus erat consilio cujusdam Medicasterculi qui baculo incumbens, luscus & lotipes hinc inde per civitatem discurrebat & multis imponebat tactum, ut ignorantia hujus impostoris, bonus ille Vir ad miser. bilem statum redactus de vita periclitaretur: Ictericia enim inveterata varia secum trahit symptomata eaque funesta, ut huic nostro accidit; & sicubi tritum illud locum a quo quando habuit, hic profecto meretur:

Præcipis ob stas serio Medicina paratur,

Cum mala per longas invadere metas.

Tandem vero leniter aperientibus, (ictericia enim, præsertim inveterata, non vehementia sed mixta eaque appropriata amat remedia) & quæ præterea secundum methodi leges ad morbi curationem & profliganda Symptomata necessaria videbantur ut decocto Fragariæ pro potu ordinario, præscriptis & rite adhibitis, sen-

fin, Deo benedicente convaleuit. Caspari Kocera.

De Ictero singulari.

Celsissima Princeps 32. circiter annorum, symptomatibus scorbuticis frequenter correpta, dum curæ majali sese submitteret, & à me ordinata medicamenta continue conducere, ad aliquod tempus valuit pancreaticæ. Sed ubi domo abiit aliquo modo inordinatus viveret, rediens sentit inexplicabiles dolores ventriculi, tales quidem, ut præ nimis angustius sese moriturum diceret, superveniente frigore intensissimo. subsequente paucio calore per modicum tempus durante, totum tamen corpus occupante, & singulis diebus ad noctem repetente. His adjugebatur æternus gravissimus cum dolore dextri hypochondrii, tunc tamen ulla inflatione aut alio tumore, comitante urina ruberrima, & excrementis argillaceis. Dum prædicta symptomata intus considerassem, à succo pancreatico acidioribus hoscæ dolores oriri dicebam, dum scilicet vapores austeri ad superius orificium affluentes id ipsum rodunt & molestia afficiunt. Hinc itidem succus austerior stagnatione factus dum per venas lacteas, ductumque thoracicum cor penetrat, cum sanguine ad totum corpus delatus intemum frigus excitat: quia vero in intestinis bile acriori non conjungitur, sed inter circulandum sanguini tantum bilioso obviat, sic eundem modum exagitando, modicum tantum calorem producit. itaque principalis & primaria causa prædictorum symptomatum esse videtur denegatio ipsius bilis, à qua pituita intestinalis alias abstergitur, & succus pancreaticus eliminatur. Quia vero bilis denegatur propter obstructions, medicamenta ordinata, quæ eandem reserarent, sed frustraneo cum effectu, adeo, ut grandinem vesicæ felleæ adesse nullus dubitarem.

Itaque vomitu præmissis ubi pulvisculum A. cum jusculo B. Celsissima sumeret, eundemque sæpius repeteret ultra centum grandines flavas instar nucis avellanæ per secessum excrevit, & desuper optime habuit.

Jam quæritur, ubi iidem grandines latuerunt? Ego credo minores in vesica fellea, majores vero in intestinis pituita viscida instar involucri obducos fuisse.

Pulvis. A.

℞. Sal. prunellæ, crystall. præp. lapid. ceræunii præp. judaici ana. ℥ss. magister. dentis castoris gr. iv. spir. Sal. coagulat. gr. iv. f. pulvis.

Jusculum. B.

℞. Rad. urticæ, petrosel. asparag. chelidon. filicis an. ℥ii. fol. heder. terr. absinth. pont. card. ben. flor. centaur. min. genistæ an. p. i. sem. aquileg. alkekeng. saxifrag. ana. ℥i. lign. nephrit. ℥ii. agaric. troch. ℥vi. turpeth. opr. ℥ii. rhabarb. ℥ii. epithym. ℥ii. Sal. Tartari ℥i. M. incis. & contus. in 2. chartas æquali dosi distinctas. f. species *Zuden Suppen. Joh. Ferdin. Heried.*

Icterus hamorrhoidibus succedentibus curatus.

Textor 30. annorum anno 1669. cum Ictero laboraret, Hamorrhoidibus, antea fluere non solitis, succedentibus, à morbo liberabatur. *Th. Barth.*

De Felicitissima icteri diuturni curatione per muscam Pulmonarium quercinum.

Nisi tedium vobis ex descriptione prioris Musci Pulmonarii obrepit, non inopanda forsitan præca quædam erant, quæ de vulgari musco Pulmonario quercino (qui subinde locis vacuis in foliis, quibus ad arbores, stipites & ramos se applicat, occurrentibus miras exprimit figuras) mihi constant. Ejus efficacia hic in Coniuge Honestissimi Civis & Mercatoris Andree Gossi, foemina satis corpulenta (ut & in multis aliis) cum Ictero, omnium Medicorum solertiam eludente, pene biennium consummata, ita enimit, ut intra quinque aut sex dierum spatium ex pertinacissimo contagio, cum jam de ea aciem videretur, emergeret. Duasore atque Commendatore Munitro hujus loci publico, cum corpus ante Medicamento purgari jussisset Medicorum experientissimus, eodem approbante, de hoc Musco accepit manipulum addito ℔b. Cerevisiæ secundaria, quem in olla fideliter occlusa ad dimidium decoxit, postea tredecim Cochlearia tepida, mane atque etiam vesperti, eo quem dixi, eventu felicissimo imbibit. Ita hic Muscus exoticis quam plurimis palmam eripuit, reipsa declarans, infinitam Dei bonitatem in prima rerum Creatione, non ut Novercam, parce, sed velut benignissimam Matrem largiter unicuique Regioni Medicamentis prospexisse utilissimis. Optandum esset votis omnibus, ut in tanta Ingeniorum Excellentium fertilitate, quædam ad vires plantarum vernacularum accuratius rimandas accingerentur: nec profecto tot præclarissimas plantas, utpote Ledum Siliacum, Calceolum Maris, Oreoselinum, & alias innumeras, Mylleris planissimas, sicco, quod ajunt, pede transiliremus, aut potius conculecaremus. *Jacobi Br. ynni.*

De icteri cum Hydropæ nephritide & ischuria stipati curatione.

Nobilis virgo pene nunquam passâ fuerat debito modo & ordine menstrua, licet, ut ait, à Medicastris circumforaneis, & hujus farinæ hominibus cum pluribus cruciata in juventute fuisset remediis, quam sola fere aeris mutatio domum revocata curavit, parentibus etenim orbata teneris annis in Burgundia degebat. Anno ætatis trigesimo incidit in Icterus flavum, ad quam vocatus, remediis ultro citroque à scemellis aliquot hebdomadibus ulsepatis vano eventu, animadverti primo intuitu, latere anguem in herba: Illius enim facies solito tumidior, ventris distensio, respiratio difficilior hydropem subesse notabant, firmavit opinionem pedum œdematosus tumor, sitis insatiabilis, paucitas urinæ crassæ, rubræ cum sedimento farinæ laterum simili, alvus adstrictior, &c. Itaque in ætate non provecta, viribus constantibus, curam adgressus sum admoto quantocius Clysmate ex decocto Rad. Bryon. Irid. nostr. Aspar. Brusc. Eryng. fol. Soldanell. Malv. bis malv. H. Camomill. Sem. Aneth. fœnicul. Ele&. Catholic. è Bacc. Laur. Ol. viol. therebint. Mell. Mercurial. Sal. Gemm. &c. quo feliciter alvus sua deposuit, mane pulverem hydragogum simul & diureticum exhibui ex Rad. Jalapp. crem. tartari, tartaro vitriolato

hinc & diuturno fecerit magnam copiam, sub-
sistentibus potius urinis vaporatum una ex
decotto Apocyni, cui aliquot guttus mro-
dit, & commotio litoris munit, his quidem le-
vatur agra, sed in bene ceptis petenti vno
videlicet Medicato ex Rad. Rhub. Ver. me-
choac. Jalapp. Ind. nostr. Grana. chelidoni-
ae. fol. Soldanell. Epatic. nobil. samar. piceg.
Arthem. Centauri una. cortic. Tamarisc.
fraxin. fol. Senn. Eliot. traci. tamarind. tur-
tar. urudi. Croci Martis Apetit. Sem. Anil.
Cantuar. de quo mure ritum sumpsit cum eu-
phor. Dura fuit convemens & exatillime
impellit, potus erat vinum album diureticum
chalybe cum salibus preparato impregnatum,
roborauma stomacho & epuri non detuere lu-
terecaliet in remedium usum pergeret indefes-
si, corpus ab eductis non minuebatur etiam
pulvere diuretico & hydragogo lapis utur-
pato, cui accedere cum salibus, volatilibus;
Card. Benedict. Centauri min. Scabios. Anti-
mon. Diaphoret. Bezoard. Minerar. Sodores
copiose mori: Tandem subsequitur Ischuria, do-
lores Nephritici agram augent pertinacissime,
Enematus, potibus, Electuans, pilu-
lis, anodynis, intus & extra ventri & lum-
bis admotis non cedentes, deventum ad Sa-
lia, quæ ob vim diureticam urinas una cum vis-
cosa & sabulosa expellerent saburra sanguis die-
bus ter ad 3i. sumpsit pro dosi cum O. Amyg-
dal. dulc. 3i. Salia fuere Juniper. Camonill.
Rest. bay. fraxin. stipit. fagar. volat. Succin.
Mandib. Inc. piscis, tart. vitriol. cremor. tart.
test. Ovor. Calcinat. Magist. Ocul. Cancr. La-
pid. Judaic. à quorum usu alvus præter mo-
rem solvebatur aliquoties non secus ac sumpto
pharmaco purgante, matulam inspiciens, ut de
materia magis constaret, animadverti arenulas
in fundo latitare, quas ab incuria ministrantis
provenire autumabam, clota eadem matula in
dejectione prima ecce novos adverte calculos,
electos servo, parique Methodo faciendum
impero, sicque spatio dierum octo, ni fallor,
plusquam integram libram recipio, quos ami-
cis in vicinia, ut & T. E. communicavi, re-
stant mihi etiamnum 3ii. Præfata virgo asserit,
antequam animadverterem, se longe plures de-
jecisse, cum singulis dejectionibus aliquid aspe-
ri se deponere sentiret. Hac saburra feliciter
educta, urinas nullo incommodo libere dejecit
sanæ adinstar, atqui, quod summe mirabar, in
illis nulli apparere calculi: perrexit constanter
in sumptione Salium, usquedum ab Hydrope,
Ictero, Nephritico dolore, Ischuria penitus
libera evaserit, hunc effectum excepit integro
semestri singulis noctibus sudor universalis co-
piosus absq; ulteriori virium languore, qua
crisi peracta, vixit sana & vivit jam ultra bien-
nium à funestissimis exempta Symptomatibus:
cum insuper calculi aliquam ad semen carvi ha-
berent similitudinem, inquisivi, utrumne pica
laborans, ut cachecticis peculiare est, hujus-
cemodi semine usa fuerit, à quo horruisse tunc
temporis & nihil nisi chartam bibulam avidissime
devorasse subintulit. Ista sunt, quæ hoc de af-
fectu scribenda videbantur. D. Maichanquez.

De observatis quibusdam in Icteri curatione.

Æstate Anno 1674. cælo non admodum læ-

tuoso imprimis mense Junio valde frequens
apud nos erat Icterus; nunquam plures vol-
væ, vel sub eina haberi Ictericos. Omnes au-
tem commodò corripiebantur, cum gravissima
scilicet præcordiorum compressione, morbo ven-
triculi, anxia, cibi inappetentia, constipa-
tione aut de. qut omnia tandem excepit crasi-
sis bilis per totum habitum corporis. Urine
ulque ad finem morbi erant ex viridi argillæ
vires cum feculentis viridi crassissimo in fundo.
In quodam fecunda ab initio tenax & crocea
obscura, una cum cæca hypochondrii ta-
more, sed purgato corpore, una ut alius tur-
habatur cum magni negotii allevatione.
Convalescere omnes arte tractati & chelidonis
bene purgati; V. S. adhibui nullis, coma or-
bus non in lingua, sed in exasperantia bi-
liosi humoris fuerit. Quidam tamen curabant
sibi venam aperire in apice nasi, adeptus pro-
digandum sordum fatia colorem, quod quidem
tunc excepit prima fronte, cum mutatum apud
nos, & proverbij loco venerit (*sur den nar-
vixam Nasen-Spizel lassen.*) Inveni tamen
quod Galenus incisionem hujus venæ commen-
dat in continuo dolore capitis, & Botallus lib.
de cur. per sang. miss. p. m. 37. anert multo-
ties se suam ac inlicito Medici cupidam Em-
pirici, cum juvenis chirurgiam exercuisset,
eam adinvenisse in vetulis oculorum affecti-
bus, nec non in diuturnis capitis doloribus,
utiliorem autem observasse in nasi rubore quam
in supradictis affectibus. Edoctus itaque aliis
probatas Medicis utrovisse, licet in aliis affe-
ctibus, tentavi quid in hoc valeat. Hinc ali-
quoties curavi institui, sed dubio successu, nam
æque cito curabantur ac pristinum colorem re-
cipiebant, quibus aperiebatur quam in quibus
intermittebatur. Nonnulli applicabant regioni
ventriculi tincam piscem, quam etiam com-
mendat Schroder. in Pharm. sua l. 3. cap. prop. &
ex Kentmanno confirmat Conrad. Gein. l. 4.
de aq. h. v. Ictericis aliqui Tincam viventem al-
ligant umbilico, donec immoriatur, postri-
die rursus aliam, idque etiam tertio repetunt.
Tinea immortua, intus ac foris veluti croco-
tincta redditur, & plerique hoc remedio resti-
tuuntur. Ego autoritate munitus, in nonnullis,
reiteratis vicibus, applicari jussi, sine effectui
in morbo, & sine alteratione coloris in pisce.
Quædam tamen aliquando ex adstantibus hone-
sta Matrona, mihi pro certo affirmavit, sibi
in juventute Ictericæ, hoc remedium à celebri
quodam Medico fuisse commendatum, appli-
cuisse etiam unam viventem umbilico; aliasque
duas utrisque pedum plantis, perque 24. horas
reliquisse, Remotæ, quæ in plantis pedum erant,
nihil de colore mutaverant, at illa, quæ supra
umbilicum jacuerat, ea parte, qua cutim con-
tingerat, tota fuerat crocea. Iterum probavi;
& ut dixit illa, per 24. horas reliqui, sed fru-
stra: Erit tamen ulterius probandum, cum
tantis viris fidem omnem denegare non possim.

Dum hæc in chartam conficio, ad Virum
quendam Generosum hujus Civitatis vocor;
qui hydropota, ante aliquot dies, in convi-
vio, suis convivis, variorum sanitatem, aqua
præbens, in horrendos ventriculi morsus, &
cardialgiam incidit, præscripti aquam physo-
gonam Manag. cum spir. arant. spir. nit. & ju-

lepo rosaceo, credidi namque à nimia aqua refrigeratum ventriculum ita flaribus torqueri, sed parum inde alleviationis habuit, quievit tamen per noctem. Altero die mane ipsum visitans, totum inveni ex effusione bilis flavo colore tinctum, & ictericum, cum maxima admiratione: suasi purgans, quod tamen in crastinum differre ipsi placuit. Circa vespeream novi invadunt dolores, & superius orificium ventriculi imitar cordis vehementissime pulsare cœpit (quem pulsum sive palpitationem ventriculi sapius jam in colica in primis nostrate observavi) dedi fl. nitr. cum magist. ocul. canc. perl. corall. & in instanti omnis evanuit dolor, nec rediit. Reliquias icteri purgatione & acidulis Egranis sustuli. *Caroli Kaggeri.*

Icteri cura infelix per pediculum. Ex Epistola Georgii Hannai Prof. Othin. Othin. 27. Decembr. 1664. ad D. Olavum Borrichium.

Nec silentio dignam judico raram Phthiriasin, quæ puerum in hac mea afflixit Patria. Hic puer Ictero laborans non Galbulam quaesivit, ut cam fixis aspiciens oculis, solo, teste Cl. Renodxo, à Galbulo liberaretur obtutus non ad calcinata ingeniosissimi Helmontii Alcalia provocavit, ut debellarent Arquatum; non ad appositiora Feliciss. olim Sylvii confugit apozemata, aut accuratam Medendi invocavit Methodum, ut visceri Humores pituitosi, bilem in suo motu impediētes, atque ita noxam universo communicantes sanguini, incisi profligarentur; sed in sordidissimis dignisque Empirico Pediculis solatium se inventurum ratus, vel septem vel novem devoravit. Disparet sensim morbus; unde & sibi & puero gratulabantur Parentes. Verum citato gradu appropereantibus gravioribus ipso Morbo symptomatibus, stultæ latitæ suæ graves dederunt pœnas. Pediculis enim sugillatus insidiosus hic hospes, simulata tantum fuga delituit aliquantulum, ut postea, ceu alter Pharaon, surgeret contumacior. Successit quippe in vicem hujus mali pallor infernus; Appetitus nimis imo caninus, ut jures huic quinquaginta Agzonis fuisse ventres; insignis quoque accessit Atrophia, unde mors. Cum autem ventriculus detuncti cadaveris, quod jam tum ariditatem mentiebatur, permissu Parentum, novacula cedebat in prædam; obtulit se monstruæ magnitudinis inusitata Pediculorum in unum conglobatorum Colonia, qui in hanc civitatem receptis, infelici fidere, sed tecto latere, natalibus, numerosissimæ suæ multitudinis originem debuerunt. Hinc illæ lacrimæ! hæc lerna malorum! Invisa erant hæc mala, in quæ curiosius inquirere Parentes moleste seduli prohibuerunt; sed non minus invisa hæc Medicina. Si quid contra Icterus valent Pediculi, quos in consilium sæpe adhibent anus Medicæ, nec dissuadente Zacuto; expediunt certe omne illud negotium sale suo volatili, qui præstat, ut, & inimicæ amoliantur obstructions, & corporibus nostris necessarij alacrius se moveant liquores. Verum, me judice, & nausea & periculo vacuum nobis exhiberent hæc beltiolæ medicamen, modo ad rigidissimum Vulcani tribunal protractæ excuterentur diligentissime, ut salia quæ in se possident volatilia, Chemiz

penderent. Sed antea mittendus Proxenetæ ad conscriptos mendicorum patres, qui copiam impetret. De Phthiriali cordibus Egyptiorum inhzrenti, legi apud Plinium hist. Nat. lib. 19. c. 5. verum hæc acutissime ab. Exc. T. in Hermetica sapientia explicatur per vermes in sinibus cordis hærentes.

Transplantatio Icteri. ad D. Joh. Lud. Hanne-mannum. Hafn. 27. Septembr. 1676.

Lætus excepi binas litteras, nuper mihi traditas cum fasciculo Exercitationis Tux de sanguificandi Organo, nomini meo inscriptæ, pro quo honore Tibi maximas ago gratias. Non potui singula accuratius expendere quæ pro lentitæ Tux veritate afferuntur. Nec vacavit jam crambem illam recoquere, cum alia cura me distrahant. Duo tamen animadverto errata. Ignosce libertati. Unum est, quod nimis sis in me laudando & illis excomis. Alterum, quod 9. 18. & 21. confundantur Lactei ductus cum Lymphaticis.

Cætera non tango, ne in Oceano isto, unde enatavi, si reversus fuero, submergar. Gaudeo potius rem tantam à tanto Viro sub incudem revocari, quam libenter lego, non animo examinandi, sed ut veteres delicias recolam, judicandi aliis libertate relicta. Unusquisque suo sensu abundat, & omnibus pater Naturæ campus, per quem decurrant.

Qui proxime feriet hostem, mihi sit Carthaginensis. Cl. D. Lachmundo salutem nuntia & officia mea. Lapidis Judaici delineationem mittam ex Museo Academico, quamprimum per otium licuerit, nam beati Wormij Museum dudum esse desit, quod ab hæredibus subjectissime oblatum Regio Museo cessit.

Quia de Transplantatione Morborum sæpe antehac inter nos actum memini, Tuque illi Medicinæ faventior videris, cujus non pauca experimenta & annotasti, & suggesti ego, mitto jam de Ictero arcanum, pro cuius veritate sponsor ero, sicut ex narrandis perspicies.

Illustris quidam Vir ex hepatis obstructione Icterus contraxerat. Omnia tentavimus ut viscerum obstructions tollerentur, facile enim tum evaniturum icterum bile per ordinarias vias reducta. Nec fefellit augurium. Internis enim externisque aperientibus adhibitis, disparuit Icterus, urina naturalis reddita, fœces coloratiores sensum expurgatæ, quinquam diu statuum molestiam senserit æger Magnus. Cum omnia essent in vado, nec ullum superesset flavi coloris indicium, facile etiam peregrina remedia commendari poterant cum successu certo, & morbus profligatus curari.

Ita enim ignoto nomine quidam, bono, ut videtur animo, per litteras obsignatas secretum contra Icterus expertum laudato Viro Illustri transmisit. Suadebatur ut decresciente Luna lotium ægri, in panno lineo non loto exceptum nocturno aeri exponeretur donec linteum exsiccaretur, totiesque repetendum illud eodem modo donec icterus cessaret. *Thom. Bartholini.*

In Ictericis non semper obstruitur Ductus aut Intestinalis aut Cysticus: In iisdem solito acidior evadit sanguis.

Obser.

Observavi in dissectione ictericorum non semper obstructum esse ductum aut intestinale aut Cysticum.

In cujusdam ictERICI mortui sectione memini me aliquando observare sanguinem solito acidiorum.

Ab obstructione ductus intestinalis docent vulgo bilem in descensu suo naturali plane impediri ascendere vi ad hepar, sicque ferri ad sanguinem, mox cum ipso transferri ad corporis habitum & superficiem, ibidemque parere Ictericum: Quamvis autem exitum esse aliquando ab obstructione dicta excitari Ictericum, non puto tamen sufficere istam obstructionem ad illum producendum, nisi novam mutationem subeat in suo præsertim folliculo tunc substituitur bilis; id ut sentiam plurima memorent experimenta tum Anatomica tum Practica: Observavi autem 1. in Dissectione Ictericorum non semper obstructum esse Ductum aut intestinale aut cysticum: 2. Non semper in Ictero pallere alvi excrementa, licet solito essent citius tincta. 3. Non tantum à veneno peculiari, verum ab animi motore gravi & inexpectato, sæpe citius productum Ictericum quam ut quis aut aliis persuadere possit productam tam subito, à quacunque demum causa, tunc præsertim agente in ductibus biliaribus, obstructionem; 4. Curari, & quidem sæpe cito, à medicamentis quorum ope solutam, vel tam cito solutam obstructionem vix aliquis credat, nisi præiudicio præoccupatus: In hunc centum refero cum canabis semine decoctum lac bubulum, cujus unius beneficio plures curavi: Saponem cum olivarum vel raparum oleo, vel balnearum pinguedine paratum, lacte solutum & assumptum: Observavi 5. infantes multos nasci cum Ictero, aut mox post partum ipsis erumpere Ictericum: Ex his observationibus cum pateat Ictericum posse produci absque ductus biliarum obstructione, quaeritur merito quænam vera sit, aut esse possit ejus causa? Hæc ut scilicet & facilius eruatur, præmittam symptomata Ictericum instantem aut præsentem indicantia: Solet igitur Ictericum frequentius præcedere, ac initio etiam comitari Compressivus cordis dolor dictus, & circa ventriculi regionem inferiorem maxime molestus, concurrentibus anxietatibus, atque obscuris in dextro hypochondrio, ubi & bilis folliculus & ejus ductus existit, lancinationibus: Alvi excrementa sæpe albescent, suntque coloris cineritii, nec à bile, ut alias diversimode tincta, quin segaius ad deiciendum ægri sollicitantur: Mox urinae prodeunt obscure rubentes, atque immixta lintea colore croceo inficientes: Tandem in facie ac collo, & magis evidenter in adnata oculorum tunica, hinc per universam corporis cutem, color citrinus & flavus, quin aliquando ad viriditatem obscuram vergens exsurgit, unde nunc flavus nunc niger vocatur Ictericus: Ubi inclinatur, nonnunquam pruritus magnus sentitur in tota corporis superficie: Inter causas externas, non raro vidi ex spiritus vini, aliorumque potuum generosiorum abusu productum Ictericum, & huic succedentem Ascitem, ut plurimum lethalem: Quibus omnibus rite expensis, censeo, siue locum ha-

beat cujusvis ductus biliarum obstructio, siue. his obstructio nunci nequeat, Bilem tunc subire mutationem notabilem, propter quam moveatur & feratur impetuosius & copiosius versus sanguinem, cui tamen solito minus permisceatur, sed ipsi duntaxat confundatur, ideoque facilius ab eodem recedat, & non tantum cuti partibusque externis, verum in oculis quoque atque visceribus se jungat, & illa colore suo imbuat & tingat; hinc enim naturaliter se habens, tum in tenui intestino, tum etiam cordis ventriculo dextro, haud laxè tantum, sed intus admiscetur ac permiscetur concurrentibus humoribus, & ita quidem ut ab illis amplius separari nequeat: quæ unio sit ob ipsius effervescentiam in loco memorato utroque cum confluente Acido junctam: Quoniam igitur desiderari videtur in Ictero, ista Bilis cum ceteris humoribus intima conjunctio, ac secundum aliquas sui partes commixtio, ut & laudata illa effervescencia, si non in totum, ex parte saltem impedita, videndum quo utriusque hujus effectus, quin & Icteri quoque causa innoscat, quid requiratur in bile ad effervescentiam utramque perficiendam, quidnamque illi advenire possit ut ipsam minuatur vel tollat: Jam vero notum Effervescentiam omnem contingere inter Acidum & Sale m lixivum, quovis de Sale lixivo participat, & in quantum de ipso participat: Quisquis autem Bilem examinaverit, & tam cum acidis liquoribus quam cum Salibus lixivis qualibuscunque confuderit, facile capiet Bilem concurrere ad excitandam effervescentiam ratione Salis lixivi, sed multis modis in ipsa multum temperati, ne fiat in corpore potens ac vehemens, adeoque nocens, quin blanda potius & naturæ amica Effervescencia: Quod si Salis lixivi rationem habeat in effervescencia excitanda Bilis, ulterius pergendum, ac videndum quæ affici queat ejus Sal, ut minus sit ad effervescendum aptus: Notum autem per experientiam, iterum Sale m lixivum purissimum, adeoque acerrimum, esse ad effervescendum passum, eundem contra quomodocunque obtutum, ad effervescendum reddi plus minusve ineptum: Obtrundunt vero Salis lixivi acrimoniam plura & 1. quidem omne Oleosum & pingue, quod testatur Sapo quivis: 2. Omne spirituosum volatile, quod testatur Tartari Sal, cum spiritu vini rectificatissimo volatile factum. 3. Omne terrenum, quod testatur corallia, margaritæ, oculi cancri, creta & alia plura: Salis lixivi effervescentiam promovet, facilitatque aqua si pauca ipsi jungatur: eandemque infringit & offuscatur, si multa ei effundatur: Solus ignis ejusdem lixivi salis acrimoniam acuit & auget: unde quo diutius illud urgetur ignis vi & flamma, eo redditur idem acrius, & ad potenter ac vehementer effervescendum convenientius: Hæc omnia ut præsentis negotio accommodemus, atque doctrinæ de Ictero lucem præstatam afferamus: Quisquis attente Bilem consideraverit, agnoscat facile non parum oleosi & pinguis ei secundum naturam esse admixtum: propter quod, utpote potentissimum ac effluacissimum, adeoque primarium acrimoniam Salis retinens, nunquam & magna, durante sanitate, observatur bilis aut in corde aut in tenui inte-

Simo effervescencia: Eidem Bili admistum esse Salis volatilis aliquid, dignoscet quisquis non tantum nervos satis grandes viderit ad Hepar deductos, sed insuper ipsam cognoverit rebus quibusvis facile admisceri: quod non fieret nisi ei permixtus esset notabili quantitate spiritus volatilis: nam ob comitem oleositatem volatilem difficiliter admiscetur rebus omnibus Sal lixivus, cui quoties junctus est spiritus volatilis, toties aptior fit ad illam cum singulis commitionem absolvendam: Sed eo ipso redditur insuper Sal bilis temperatius, unde hætenus quoque blandior existit ejusdem in statu naturali effervescencia: In Bile aliquid reperitur Terræ; non tamen tantum ac multum male putant, alias minus esset mobilis & fluida, minusve aliis se insinuans, quin etiam mobilia præstans, sicut id peculiariter patet, in colorum materia, quæ à bile admixta redditur fluidior & ad pingendum aptior: ab admixta vero terra, etiam pauca, infringitur Bilis effervescencia, ne in statu sanitatis contingat potens acrisque: Ignis vero in humano corpore talis tantusque ingi nequit, à quo uri, acriorque fieri queat Bilis Sal lixivus, nequidem in statu recedente maxime à naturali: cum si quis rem rite examinaverit, primaria caloris intensioris in statu naturali, aut præternaturali, causa in corpore ipso existens sit à bile petenda deducendaque: Errant enim qui solum ignem esse agens, & quidem universale putant, quod rebus omnibus naturalibus omnem afferat mutationem: Experimenta enim Chymica ostendunt infinitas mutationes occurrere quæ ab igne deduci nequeant, & non paucas quæ igni adversantur: Dixi autem caloris causam primariam in corpore existentem, sive Internam; quo distinguam ipsam ab Externa quavis, quam nil impedit posse aut ignem vulgarem, quovis pabulo sustentatum, esse, aut Solem, à quibus humores omnes, ac præcipue bilem, aciores fieri nulli non notum: Quoties proinde acrior redditur in humano corpore bilis, & quidem acrimonia propria, & in Sale lixivo consistente, toties acrimonia illa querenda deducendaque ab externo igne nunc solis, nunc foci: dixi acrimonia propria, quo distinguatur ab accidentali, quæ ipsi ex admixto acido acri contingit, quod bilem producit nunc æruginosam, nunc atram, prout nimirum magis vel minus acre acidum bili admiscetur, & compositum humorem constituit, uno licet bilis nomine notum: Cum proinde inter ea quæ in corpore inveniuntur, atque inter causas internas referri possunt ac debent, nil occurrat quod bilem possit reddere acriorem præter succum acidum, facile quoque patet cui adscribi debeat bilis incendium; His ita præmissis, querendum porro, cuiusnam præsertim debeat suam in ictero se humoribus cæteris pernoscendi ac intine unendi ineptitudinem bilis? Hoc ut pateat, considerandum sæpenumero icterum brevi temporis spatio excitari à Vipera morfu: cujus venenum, quoniam celeriter opus suum absolvere solet, valde mobile, adeoque subtile, quin naturæ volatilis & spirituosæ omnino censendum: A spiritu valde volatili copiosius bili admixto, ipsamque spirituosiore faciente, icterum produci

posse, confirmare videtur icterus, sat sæpe vini generosioris, ac præsertim ejus spiritus, potatoribus, propter neglecta simul alia alimenta solidiora superveniens, ac imprimis quando aliquis animi moror præcessit permanetque. Adeo ut non videatur mihi improbabile bilem ad icterum producendum reddi, nunc à veneno vipera penetrantissimo & spirituosissimo brevi tempore, nunc à potu generosiore diutius usurpato, sed longiori tempore, nimium spirituosam, & ad convenienter cum acidis effervescendum, hinc & humoribus cæteris se intine jungendum minus aptam. Sed dicat aliquis rei attentus, Si à veneno Vipera, aut à potu generosiore ita immutari potest bilis, ut absque obstructione in ductibus bilariis existente, produci queat icterus, non desinet saltem ad tenue intestinum deduci bilis, à qua licet minor ac debiliior contingat ibidem cum succo Pancreatico effervescencia, quidni ab eadem saltem tinguntur alvi excrementa, ut alias fieri solet? Respondeo 1. in omni ictero haud æque albicantia, ideoque minus flavo bilis colore tinctas occurrere feces unde judico alias plus, alias minus bilis admisceri quoque in ictero alvi excrementis, à quibus plus vel minus tinguntur. 2. In omni ictero haud æque male affectam esse bilem: unde hætenus quoque magis vel minus ipsa excrementis alvi admisceri potest eademque tingere. 3. ut à bile rite tingantur alvi excrementa, desiderari præviam & sufficientem ejusdem cum succo Pancreatico effervescenciam, ob quam ejus partes diversæ ab invicem secedunt, ac tincturam habentes excrementis junguntur: 4. Si durante ictero spirituosior & volatiliior, ideoque fluidior & mobilior existat bilis, poterit eadem facilius penetrare ex hepatis glandulosis acinis per numerosos suos ductus ad venæ cavæ radices, atque cum sanguine ad cor: maxime si ab eadem bile spirituosiore irritatus acrius contrahatur, aut etiam aliquando obstruatur ductus bilarius intestinalis, quam ob rem factò ad hep. r impetu, in eodem persistat bilis, neglecta ordinaria, sua licet ampla, versus intestinum tenue via: Potest namque fieri ut si non obstruatur in totum, angustetur saltem ductus bilarius intestinalis à pituita, imprimis post mæorem gravem viscosiore facta, ipsum quovis modo obducente: vel à bile spirituosiore facta, ideoque turgente, ac è suo folliculo effusa, irritetur idem Ductus ad sui contractionem acriorem, propter quam ipsi transitus denegetur liber ad intestinum, atque adeo ipsa sursum ad Hepar feratur pene tota per Ductum Hepaticum, mox cum sanguine ad dextrum cordis ventriculum delata, cum descendente ac lymphatico sanguine solito minus effervescat, ideoque sanguinis massa toti magis confundatur quam permisceatur, mox ubique à sanguine recedens, partes quavis colore suo inficiat & ad nutritionem naturalem minus aptas reddat, quocirca sensim succedat ictero vel atrophia vel hydrops, ni brevi curetur: Quamvis enim non putem requiri necessario ad icterum producendum Bilarii ductus obstructionem, non video tamen cur non possit aliquando ipsa præbere ansam ictero, dum sistendo bilem naturali suo exitu in tenue intestinum, causa est quod

quod bilis ibidem moram neccens alteratur, & si ita loqui fas est, spirituscat, cum accessu majore spiritus animalis, cum exaltatione atque attenuatione ulteriore partium ipsam constituentium: Hoc vel inde patere videtur quod multis, antequam Ictericum patientur, solet summa in dextro hypochondrio, ubi observatur intestinalis Ductus insertio in tenue intestinum, sentiri anxietas, precedente nonnunquam morore gravi, alimentorumve pituitosorum abusu: A morore autem solent humores omnes reddi glutinosi ac viscosi, maxime in tenui intestino, & quidem ob succum pancreaticum idcirco factum austeriorem: unde cumque autem pituita existat glutinosa & viscosa, eadem apta est nata in tenui intestino Ductus biliaris orificium obducere atque obstruere, sicque bilis descensum exitumque impedire, quapropter angustia excitabitur ibi loci a bile innotatam pituitam vim suam exerente, atque flatus, ex ipsa producente, dum pars reliqua in semetipsam agens attenuatur, spirituscat & tandem Ictericum excitat. Ex his videor mihi non improbabilem Icteri, absque biliaris Ductus obstructione necessariam, generandi modum & rationem invenisse, Auctam scilicet bilis tenuitatem & spirituositatem, ideoque ad rite & satis effervescentem ineptitudinem: quam idcirco in Bile notavi, quoniam observatur ipsa tunc sanguini non tam permisceri quam confundi. Videndum porro an symptomata Ictero familiaria, & superius notata, deduci queant à modo assignata ejus causa: denique an nota ejusdem curatio eidem quadret? Compressivi cordis doloris eadem causa est quam dixi paulo ante, esse Anxietatum circa ventriculi regionem inferiorem, in tenui intestino excitatarum. Pituita g'utinosa ibidem coactervata, & in flatus ex parte deducta, continentisque partes diducens angens ac premeus: Lancinationes in dextro hypochondrio adscribendæ humori acido & pancreatico, à bile parcius accedente minus tracto, adeoque puriori, noxamque suam potentius exferenti, partesque sensiles pungenti & lancinanti: Alvi excrementa solito sunt minus tincta, tum ob bilem parcius accedentem, tum ob eandem minus effervescentem, ideoque partes suas tingentes minus ad ipsa inficienda deferentem. Segnius ad deiciendum sollicitantur ægri ob causam eandem, minusque acrem bilem: Urinæ obscure rubent, ob bilem copiosam & tinctura multa prægnantem ipsis admixtam. In cute tota, sed in primis magis tenera, qualis est faciei, colli, manuum, quæ carne universa, exoritur diversus color flavus ab eadem bile, ob auctam suam spirituositatem, partiumque suarum unionem intimiorem, minus quoque in corde effervescente, minus proinde sanguini se permiscente, quin potius ipsi duntaxat confusa, ideoque notatis partibus ubique, dum transiit cum ipso, adherente, atque colore suo flavo, nunc pallidiore, nunc obscuriore, atque ad viriditatem quandoque vergente, ipsas inficiente: Ihelmate Ictero sentitur in corporis superficie pruritus, propter effervescentiam ubique resuscitatam, & halitus subacres inde erumpentes, atque partes

sentiles blande mordicantes. Fieri enim nequit quin postquam usu medicamentorum convenientium correctæ est, non tantum in suo folliculo, in quo multa est collecta, verum in universa quoque sanguinis massa, cui est confusa, quæ partibus continentibus & solidis omnibus, quibus adhæret, bilis ubique ad occursum succi pancreatici & lymphæ, imo ipsius sanguinis solito acidioris (quod in cujusdam IctERICI mortui sectione nemini me observare) excitetur quam prius potentior effervescentia, ex qua proinde halitus attollantur subacres, qui ad sensiles partes, ac præsertim cutim delati, pruritus ibi pariant: Quæ modo dixi confirmabuntur amplius ex Icteri curatione, quæ in eo constitit ut 1. Remotiores causæ, animi moror, alimentorum viscosorum, potusve generosioris abusus tollantur. 2. Mediæ causæ, pituita glutinosa, ductum biliarium obducens aut obstruens, quoties locum habet, aut venenum qualecunque bilem immutans & vitians, corrigantur ac emoveantur. 3. Causæ proximæ, bilis corrupta & vitata, nimium scilicet spirituosæ, & ad rite effervescentem ineptior facta emendetur, & ad intestinum iterum deducatur. 4. Color cutis tordus separetur & naturalis restitatur, &c. *Francisc. Sylvius Prax. lib. 1.*

IctERICI scellio à Clav. Sylvio anno 1664. administrata, in quo folliculus fellis solito major, ac bile turgens deprehensus, Hepar coloris ex flavo obscure virescentis, &c.

De querelis Martini Hanskenii, ex observationibus meis practicis, in Nosocomio notatis, hæc præmittenda duxi vi 1. Mali conqueritur de doloribus variisq; hypochondrii, qui à notuita augentur ut fere intolerabiles sint; quos etiam transversim in ventre unguli instat sentit. Decumbens paulo melius habet: Ier duos jam annos laboravit hoc affectu, sed initio adhuc ambulare potuit; Jam vero per septem hebdomadas in Nosocomio, & per 8. dond fere semper decubuit: constitatur jam per annos 4. vel 5. cum variis morbis, tandem fit Ictericus. Præscripta illi sunt a Medico ordinario varia, a quibus nullum levamen sensit. Inter cætera & oleum juniperinum & Philonium, a quibus semper pejus habuit: ab assumpto alimento molestias majores sentit, 5. horis circiter post alimenta assumpta; hora 6. vespertina cœnat, & deinde per mediam fere noctem se hinc inde jactat, nec dormire potest, deinde obdormiscit sed vix per semihoram continuam: Non assumit nisi juleula. Totus fere ossæus, Alvus morigeræ est: quotidie deiecit, excrementa albicant. Vires animales quoad motum sunt valde debiles: Appetitus integer, etiam sapor, digestio male habet: Respiratio quandoque difficilior, imprimis a sumpto cibo: conqueritur de frigore præsertim in pedibus; nunc 11. Ictero raro febri conjuncta est: 1. Non tantum superficiës cutis sed etiam ipsa caro Ictericorum flaret, quod ex cadaveribus dissectis patet. D. Sylvius

res graves, appetitum integrum : Pituitam item viscidam abundare, propter diuturnitatem morbi & sensum doloris gravativi, quare sequentia præscripta.

℞. Aq. cochil. menth. ana. ℥i. theriac. s. ℥β. laud. op. gr. ii. syr. cochl. ℥i. m. 9. Maii. non est sine animi mœrore æger, propter uxorem & liberos : Heri non assumpſit, sed hodie aliquot cochlearia misturæ, unde id commodi habet quod dolor in hypochondriis non est tantus : Iteretur itaque mistura 10. Maii die præcedente nocte melius solito dormivit, & ille dolor qui instar cinguli abdomen afficiebat, magis ad interiora tendere videtur, dejicit commodè : Fæces paulo magis tinctæ ac antea fuerant. 12. Maii in pectus ruit ob defectum medicamentorum : Iteretur mistura die 8. præscripta, 15. Maii conqueritur de dolore magis interius quam exterius urgente : Sensit humorem in sinistro crure à genu ad pedem usque : Forsan in hydropem incidet, quod facile fieri potest, & sæpe fit. Sensit frigus & humorem per totum corpus distribui ab assumpto potu, quia potus cum parte pituitæ solutæ per venas lacteas in corpus distribuitur. Iteretur mistura die 8. præscripta. NB. Qui in hydropem incidentes multum bibunt, in iis plethoræque hydrops se primum in abdomine manifestat, Qui vero sobrii sunt in potu, in iis plethoræque in pedibus se primum manifestat. 16. Maii non adiuimus Notocomio. 17. levamen sentit, perget uti præscripto 19. Maii proficit in melius; 20. die habuit paroxysmum febrilem, & quidem frigus circa 10. matutinam initium fecit. Conqueritur de debilitate genuum: observat in ipsa febre quosdam dolores, præcipue circa articulos, qui simul ac in somnum incidit, caput petunt, & tunc quasi delirium sentit. Die 21. per totum corpus dolorem molestum sentit & debilis est, habet quod sumat: 22. Dolor per totum corpus auctus : Surrexerat circa meridiem, & frigus tunc sensit, nunc aliquem calorem habet, pulsus est frequentior. Appetitus prostratus, fauces siccæ.

℞. Rad. petros. scenic. apii ana. ℥i. coq. in aq. pura, in colat ℥xxv. dissolve. syr. de 5. rad. ℥ii. sal. prunell. ℥i. m. 23. Die pulsus paulo melius habet, febricula levior : Præscripto uti perget. 28. die conqueritur de sapore sallo, quem in decocto deprehendit : Lingua flavæ est quasi filia : Aëstus, deglutitio & respiratio difficilis, Emaciatio.

℞. Aq. petrosel. scenic. ana. ℥i. syr. de 5. rad. ℥vi. ocul. cancr. ℥β. acet. stillat. ℥β. m. 29. die paulo melius habet: Utetur præscripta heri mistura. 30. die iteretur mistura 28. Maii præscripta : 2. Junii iteretur mistura 20. Maii præscripta.

℞. Sacch. alth. ℥ii. 6. die paulo melius habet, Pulsus robustior, dejicit sponte, appetit varia, sed simul ac quædam ex istis que tantopere expetiverat comedit, nauseat eadem : De deglutitionis difficultate conqueritur : videntur prope gulam quædam pultule albicantes instar aphtharum.

℞. Aq. pluv. q. s. adde paulum aceti & sacch. utetur tepide pro gargarismo : Iteretur mi-

stura 28. Maii præscripta. 9. die deglutitio adhuc difficilis : pulsus paulo robustior : habet quod sumat. 10. die, pejus habet ac heri : pulsus paulo frequentior : in robore ac magnitudine vix judicatur : Respiratio difficilior, sitis urget. Per 8. jam dies amarum in ore sentit saporem, imprimis vero hodie.

℞. Aq. cichor. scenic. ana. ℥i. syr. de 5. rad. ℥i. spir. sal. dulcis ℥i. m. N. Syr. V. Salis d. radic. vim habet incidendi, solvendi pituitam viscidam ad appetitum. 11. die de vigiliis conqueritur, Alimenta commodius appetit & consumit; alios in eodem statu. Habet medicamenta : 12. die iteretur mistura. 10. Junii præscripta: adde laud. op. gr. ii. ob vigiliis. Assumat vesperi dormiturus : 13. die commodius jam somnum sumit : habet medicamenta. 13. Jun. appetitus restituitur, Somnus mediocris, vires dejiciuntur : 17. die eodem modo se habet.

℞. Sapon. ven. nuc. mosch. magnitudine, dissolve in lacte dulci, capiet quandoque cochlear. 15. die iteretur mistura 10. Junii præscripta : 20. die appetitus indies restituitur magis magisque, assumpta alimenta minus solito gravant: visus ante biennium obscurari cœpit, & nunc in dies magis obscuratur. die 22. Jun. conqueritur adhuc de summa crurum debilitate : Appetitus permanet integer postquam spir. Olis dulci est usus, Somnus impeditus & vigiliarum tere continuz, De visu obscurato valde conqueritur, videt tamen singula debito colore.

℞. Aq. euphr. ℥iβ. scenic. ℥i. syr. cochl. scenic. ana ℥β. o Sal commune dulc. ℥i. laud. op. gr. ii. m. cochleatim sumat, 25. die calor semper molestus. Videtur aliquanto clarius videre adstantes : putat feliciter sese habiturum ab assumpta minori misturæ quantitate, cum à majori alvus semper adstrictior sit. Appetitus omnino restitutus, alimenta etiam recte sapiunt, carnes tamen non generantur.

℞. Sem. cannabis, decoque in lacte dulci, capiat una vice ejus decocti ℥ii. 27. die melius se habet : heri male habuit à decocto cannabis sem. ob nimiam ejus assumptam copiam, cum loco ℥ii. dimidiam pintam hauserit : habet adhuc quod sumat, 30. die status mediocris; non in pejus ruit, nec multum etiam proficit : Sedens vel decumbens ægre surgit : Habuit aliquot abhinc annis dolores in sinistra scapula & toto illo latere, ad inferiora usque qui nunc cessant. Iteretur mistura 23. Jun. præscripta. Die 1. Julii in dies magis magisque proficit, color faciei non amplius tam flavus, clarius etiam quam prius videre potest : habet medicamenta : die 2. Jul. in dies melius habet ab assumpto decocto cum semine cannabis. 3. Jul. in eodem est statu : die 4. proficit : Iteretur mistura 23. Jun. præscripta. die 7. proficit in omnibus, excepto motu corporis : iteretur mist. Die. 8. in eodem statu, adde misturæ die 23. Jun. præscriptæ ol. mac. still. gutt. iii. die 9. Jul. iteretur mistura. 23. Jun. præscripta, adde ol. mac. still. gutt. iii. die 14. iteretur mistura 23. Junii præscripta adde ol. mac. still. gutt. 3. ad discutiendos statum: die 25. in eod. statu, ut & 16. die 17. urina valde tin-

tincta, alias in eodem statu: die 18. excrementa albicantia sunt minusque mollia, iteretur mistura 23. Jun. præscripta, adde ol. mac. still. gutt. ij. die 20. in eodem statu, habet medicamenta: die 22. iteretur mistura 23. præscripta, cum gutt. iii. ol. macer. Die 23. in eodem statu: ad tumorem pedum utetur decocto fursurum cum sale, pro lavacro pedum: die 28. in plerisque levamen sentit, solæ vires debiles, excrementa alvi adhuc albicant: pergit uti decocto cannabis cum lacte: iteretur mistura 23. Jun. præscr. cum ol. mac. gutt. iii. Die 29. habet medicamenta: Die 1. Aug. iteretur mistura 23. Jun. cum gutt. ol. mac. Die 4. iteretur duplo mist. 23. Jun. præscripta, cum ol. mac. gutt. 6. utetur porro decocto sem. cann. cum lacte: anno 1664. die 10. Nov. frequentante iterum Nosocomium Cl. Sylvio, invenimus eundem quod ad omnia symptomata iterum in statu pejore: omisit usum decocti sem. cannabis præterito mense cum exiret aliquando in publicum, capitis dolorem vertiginemque expertus est, & deinde etiam capillorum deluvium, sanguis etiam præterito mensis tempore copiosus e naribus effluxit, spurumque sanguinolentum deiecit, quod sine dubio fluentis sanguinis parte in fauces decedente ita tinctum est: somnus paucus, interceptus, alvi dejectio multa, excrementa albicantia. Per tres dies levem habuit alvi fluxum cum torminibus: parum sicut, appetitus cibi integer, bene assumit, sed gravatur ab assumptis, neque nutritur sed sensim fit macilentior: tumor levis in pedibus, hydropis initia, ventris tamen tumor adhuc nullus est: lancinationes in articulis inferioribus, ut in flexura genuum, &c. Stris nulla.

24. Rad. galangæ, enul. camp. an. 3ß. sem. anis. fœnic. an. 3i. Summit. absinth. abrotani, an. man. 3. concisa & crasse contusa indantur sacco, suspendanturque in pinta vini, de liquore bibet mane. Inserviet medicamentum, ut ejus ope defectus bilis ad intestina non defluentis restituatur, sitque loco bilis ibidem: die 12. Nov. queritur de summo dolore lancinante, in dextro hypochondrio imprimis, quoties corpus dextrosum intorquet: plus deiecit quam ante, parum quidem singulis vicibus, detur sæpius: affundetur iterum præscriptis speciebus vinum, continuabitque in usum ejus. Die 13. excrementa adhuc subalbida: hodie mane alacrior fuit quam nunc est, hypochondrii dextri dolores adhuc sentit: subinde quoque aquas circa ventriculum quasi fluitantes, unde metus est leipothymia, hodie non tam frequenter deiecit: die 14. habet medicamenta: die 17. Nov. capitis doloribus continuo infestatur, lancinationibusque in dextro hypochondrio, unde respiratio quoque impeditur: parum quiescit. Quotiescunque assumit vinum præscriptum, levi vertigine corripitur: videtur medicamentum illud bilem nimis acrem reddere, abstinere proinde per diem ab usu illius: die 17. ante tres dies incidit in gravedinem & tussim: excrementa nondum tincta: Subinde cardialgiâ patitur, capitis dolor ante gravior quam nunc: quater deiecit: in hypochondriis adhuc malum perdurat: superiori anno gravedinem similem passus est.

25. Aq. beton. petrosel. fœnic. an. 3i. theriac. 3. vi. laud. op. gr. iii. syr. de s. radic. 3i. m. die 10. assidens foco paroxysmum febrilem

sensit, A mistura præscripta melius paulo habet die 21. melius habet: pergit uti medicamento, quod iteretur. Die 25. sensim magis debilitatur: Non potest jam tandiu extra lectum se sustentare. Hæc vespere iterum febrilem paroxysmum passus est, cum levi frigore per univertum corpus, unde somnus magis interruptus fuit. Videtur quartana, cum die.

26. Etiam senserit paroxysmum: Copiose hodie deiecit, retulitque excrementa jam magis tincta fuisse: servabit cras illa: Die 27. Nov. sensim magis labefactatur: gravedine & tussi molesta jam ab octo diebus laborat, quæ augetur ab humoribus à capite in pectus descendentibus: Dolores in hypochondriis jam remissiores: Non habet medicamenta: Iteretur mistio 19. præscripta. Excrementa similia hæsternis, & adhuc albicantia. Die 26. hac nocte quater liquida deiecit, nullo purgante sumpto: Color excrementorum manet cæruleus: Gravedo & tussis perstant: die 27. æger debilis est, pulsus simul hac nocte & interdum quies deiecit & liquida: die 28. habet aliquantulum melius, bis tantum deiecit, obiit 1. Decembris.

In sectione hæc occurrebant, cutis universa flavescens, aperto abdomine membrana, & pinguedines imprimis, flavo colore infectæ, carnes non item, quæ solito magis tantum pallescent & flaccidæ erant. Penis glans tamen flavescerebat, in abdom. insignis quantitas aqueosi humoris, quæ in magna quantitate spectata rubra, in parva vero flava videbatur, eodem plane modo ac si croco tincta fuisset. Quæ in fundo erat aqua, rubicundior erat, & ad sanguinis colorem magis accedebat. Intra tunicas Omenti cruoris aliquantulum inveniebatur, qui copiosior in abdominis fundo occurrebat firmiter, & in longum instar Polypi concretus & cum liene coherens: Omentum variis quasi glandulis interspersum, quas pinguedinem corruptam Cl. Sylvius judicabat. Lienis membrana tenerrima erat, ut & tota ejus substantia, quæ plane sanguinis concreti consistentiam habebat, fibræ tamen satis firmæ. In una ejus parte membrana ad notabilem latitudinem rupta erat, ita ut vasa ejus apparerent: Ex illa sine dubio sanguis profluxerat qui aquam illam in abdomine contentam adeo tinxit, quem mirum est non magis concretum & coagulatum fuisse.

Ventriculus cum intestinis flavens tumensque: color hepatis ex flavo obscure virescerebat: pulmones lividi & cæteris intestinis flaviores. Costæ valde teneræ & nullo labore frangibiles & scissiles. Cl. Sylvius easdem aliquando ejusdem duritiei in aliquo qui aneurismate obierat, deprehendit: Folliculus fellis solito major ac bile turgens, colorisque albi, cum plerumque subviridi, videatur. Dexter ren valde exilis. Separatis ductibus biliaris, epatico nempe, cystico & intestinali, factaque, proxime subligatura, in superiore epatici parte instituta, foramine, immixtus ope tubuli leniter flatus ad intestina sine impedimento penetravit, uti & immixtus humor cæruleus. Immixtus deinde ab intestino versus epat flatus etiam facile in folliculum fellis penetravit, nullo tamen modo potuit inde iterum exprimi: quod Cl. Sylvius jam antea notaverat: Dissecto per longitudinem intestinali ductu,

apparuit in illo materia viscida. Ductus cysticus magis hians, sive inflexus versus epaticum quam versus intestinalem. Bilis in folliculo contenta julto viscidior, colorisque diluti, ita ut immisum linteum non magis tingat quam urina ictericorum. Immissus in ductum hepaticum flatus, observatus penetrare in ipsum etiam folliculum, ubi is epati annexus: Intestinum tenue non ita interius obductum picta viscida erat, uti solet alias: Pericardium cum sua pinguedine flavebat impense. Liquor contentus paucus, flavus, subsalsus & parumper amaricans, Cranii exterior superficies flavens: ossis frontis interior superficies colore flavo infecta, ceterorum non item. Dura meningis flavescent, ut & liquor sub ea conspicuus cujus sapor non erat notabilis. Tenuis meningis flava: cerebri substantia satis alba: in ventriculis liquor satis copiosus, limpidus, subsalsus: plexus choroides valde glandulosus: substantia infundibuli extrema in quam desinit, subrubra, quodammodo carni simile, quod sæpius observatur. *Matthias Paisenius in Miscell. cur. ann. 4. & 5. observ. 194.*

Icterus à tectore indurato, lapillis referto.

Memini ego nonnullorum, qui ab Ictero in Alciem delapsi erant, Iecinora vidisse adeo dura, & lapillis adeo plena, ut novacula præcindi non potuerint. *Dodonaus ad cap. 3. Benivenii de abduis.*

A simili causa productum fuisse icticum judicavit Plazus in Nobili quodam ictico & cachectico, qui dolorem in regione hepatis ex compressione sentiens, urinasque effundens copiosis arenulis adeo rubicundis & cruentis refertas, ut ex contactu lintea tingent, ab iis malis ejusmodi excretionem liberatus est.

Icterus ab hepate vitiato & subviridi.

Religiosus toto corpore subviridis referebat colorem qui Gallis *feuille morte*.

In cadavere defuncti nulla obstructio aliave reperta fuit ejus causa, præter parenchyma Iecinoris concolor. *Ioh. Rhodius Centur. 3. observ. 21.*

Icterus ab hepatis vitio quod ὀνόχλωπος erat,

Comitis Chaulnei filius ictericus factus est & mortis appetens: is annos natus 14. olim venustus, lepιδulus & bonæ indolis, facilis, postea vero illepidulus, morosus & subtristis; cervicosus. Ictericus factus derepente: febricula, alvi profluvium albicans, fortens & corruptum, ita perseveravit per dies 15. medicamenta obstinate abhorruit: Cum nil tale cogitaretur, stridebat dentibus, ad interrogata non respondebat, nunc vox querula & horribilis: tota die ὀνόχλωπος, convellebatur nocte, velut extaticus erat: vox inarticulata & ejulatus magnus, convulsionem, mors; expirando è naribus excrevit nescio quid subnigrum & subviride: Dubitamus an id à cerebro esset, an recursus liquoris medicamenti quod datum erat ad os, & ab ore ad nares.

In cerebro nihil commemorabile deprehen-

sum est quod mortis causa fuisset. Pulmo vitium insigne contraxerat: vitiosus erat epas, & velut ὀνόχλωπος: anno superiore ante mortem exanthematis scdissimis laboraverat, & ab eo tempore non belle habuerat. Galenus simile quid annoravit in historia de eo qui repente phreniticus factus paulo post interit: Non interit, inquit, vi phrenitidis, sed ob donatum humorum virulentorum qui sua malignitate vires veneni adæquant. *Ballonius Epid. & Ephem. lib. 2. p. 144.*

Observatio VII.

Icterici intestina tumefacta apparuerunt & coloris citrini: Pericardium humore destitutum, Sanguis in cordis ventriculis concretus, & ipsius cordis substantia pravi coloris, &c.

Cum N. N. Tonfor sanus degeret, cum amico affluentius pransus esset, A comestione nonnullis elapsis diebus sensim in Ictericam incidit, ac procedente tempore totum illi corpus virore defædaturum est, hinc nulla cura adhibita in fatuitatem & dementiam lapsus est, ac tandem vitam cum morte commutavit.

Cadavere aperto, intestina tumefacta apparuerunt & coloris citrini: pericardium omni humore destitutum. Sanguis in cordis ventriculis congelatus, & ipsius cordis substantia pravi coloris, caput tumefactum: labia admodum grossa, pulmones coloris citrini & secundum alas nigricantes, ac mediastino & pleuræ adhaerentes. Lien mollis ac diffuens, & alia nonnulla signa attestantia veneni propinationem.

Quæritur an ex propinato veneno, vel ex ingenito & intrinseco aliquo morbo occubuisse? Exhibitum venenum videtur, cum nulla signa ex antecedentibus, comitantibus aut subsequenter hic deesse videntur. Et primo urgentissima videtur præsumptio quæ ex antecedentibus desumitur, ac præsertim ex statu defuncti præcedente, cum immediate ante præsumptam veneni acceptionem optima sanitas frueretur, viribusque constaret: Vide Galeni locum 6. de loc. aff. cap. 5. Comitantia symptomata id suadent, quæ primo fuerunt perniciosissima, terribilia & exitalia, naturam illico prostrantia ac superantia, quæ non verisimile est accidere potuisse ex ictericia ab interna causa procedente, in qua præter immutatum colorem, non solent adesse talia. 1. Si modum eventus symptomatum spectemus, ea non sensim & ordine quodam, ut in morbis ab interno veneno provenientibus evenire solet, apparuerunt, sed cum impetu & confertim abque ordine, quod in exhibitio veneno evenire solet, ut docet Cardanus lib. 2. de venenis cap. 4. Denique series symptomatum id docet, quia in veneno ingenito hæc symptomata nunquam sunt sine febre, Contra in veneno exhibitio, ut in casu nostro, in quo febris adesse non solet. His adde signa ex cadavere desumpta, quæ vix occurrunt in corpore naturali morbo extincto, quæ propinato veneno sunt familiaria. In contrariam partem afferri potest, quod si exhibitum esset venenum, illud fuit aut Corrodens, aut Putrefaciens, aut inflam-

quod pro signo talis veneni desumi possit. Non putrefaciens, quia tali maxime patitur primo stomachus & jecur, quæ illata apparuerunt. Non inflammans, quia non modo nullus calor adit, sed & à febre fuit immunis æger: Congelantis nulla fuisse signa, ut nec Tabeticientis. 2. Omnia venena aut Præsentanea sunt, quæ subito, cum violentia aut paucorum dierum spatio operantur: aut Temporanea, quæ lente, sensim & longo post tempore. Præsentaneum non fuit exhibitum, per plures enim dies, nempe per dies XXI. nullum evidens symptoma, præter mutationem coloris patius est: demum symptomata sensim apparuerunt: Temporaneum non fuit 1. quia mors nimis propere videretur sequuta: at tale ad longum tempus opus suum retardat, & lentum est in operando: 2. quia ejusmodi omnia ex tabeticientium numero sunt. 3. Cum posita causa præsentæ & patiente prædisposito, necessario sequitur naturalis effectus, si supponatur exhibitum venenum, causa in agendo maxime efficax, supponatur etiam patiens, quod careat impedimento ad resistendum, debuit necessario sequi veneni effectus, nempe aut naturæ succumbentia, aut illius pugna cum veneno, quorum neutrum fuit sequutum, nam patiens ab assumptione præsumpti veneni per plures dies incolumis intra interna ergo causa morbus ortus est. 4. Nulla adfuisse signa adesse solita in potionatis, notant enim D. D. omnes veneni omnia esse mali odoris, aut saporis: in assumptione nauseam, vomitum, gulæ ardorem, stomachi morbum excitantia, at de talibus à pastu sumpto nunquam æger conquestus. 5. Accidentia veneno præbito supervenientia, cum impetu & vehementia ut plurimum irruunt, non tolerante natura vim improvisam veneni, sed repellere conante ac superare. Contra vero si ab ingenito veneno eveniant, nam ut plurimum sensim paulatimque, & ordine quod in servato succedunt, juxta aphor. 30. 2. Circa principia omnia debiliora: quia natura interno veneno ob moram in corpore veluti assuescit, hoc autem maxime ostendit venenum fuisse ingenitum: quod in hoc casu verificatur, nam patiens sensim paulatimque flavescere coepit, nullo alio notabili apparente symptomate; in progressu utillaque cura adhibita, alia symptomata sequuta, quæ tandem exacerbata mortem intulerunt: Cum tamen si icteritia ab externo veneno venisset, contra evenire debuisset, ut primo alia symptomata notatu digna, ut vomitus indefinens, anxietates, dolores insignes, syncopæ, &c. de hinc icteritici: & ratio est, quia ad effusionem bilis allevatur natura, humore noxio liberata: ideo potest repente, nec prægressis aliis symptomatis ingruere: at in propinato veneno nequaquam, quia primo & ante epur necesse est lædi stomachum & cor, hinc præcedere debent accidentia offesi stomachi & cordis. Cum ergo constat à propinato veneno non fuisse extinctum, à quo morbo interierit indagandum. Illud exprimit Hipp. 3. de morb. num. 12. Hujusmodi morbus Regius acutus est, & cito necat: color totius malicorum refert, ex viridi pallescens, & quales laceri virides, simileque fere corpus est. In urina quod subsidet velut ervum sulvum est, & febris & horror levis detinet, quandoque etiam vestes ferre non iustinet, sed ab his mordicatur

& pungitur. Jeuno mane viscera plerumque lacerantur, & si quis cum exciter aut alloquitur, non patitur: hic tere intra dies 14. moritur quos si effugerit, convalescit. Eadem fere habet l. de int. affect. num. 38. ubi aliam speciem hujus lethalis morbi, sed longioris describit: quorum morborum signa si cum morbo quo extinctus est N. N. comparantur, similitudo deprehenditur: Hæc ergo causa fuit symptomatum, ex effusione bilis ad totum corpus, partes omnes extenua secundum colorem contraxere, qui varius esse potest pro natura bilis influentis, cujus variz sunt species. Ex effusione vero bilis ad exteriora, cerebrum humescere ac refrigerari dictum unde debile in omnibus operationibus redditur, præsertim retentrix: Mala est ex morbo Regio fatuitas, ait Hippocr. 1. Protr. n. 4. & in Coacis. Debili reddita retentrix, pituita ad internas partes, per venas, nervos & arterias lapsa, varios timores in variis partibus excitavit, ut alias in his qui jam non orbi proximi sunt evenire sole: Cætera quæ de puncturis & anxietudine in universo corpore habentur, & alia recentia, ab ipsa bilis effusione facta fuisse notissimum est, &c. Zacchias *Questionum Medicarum Legatum lib. ix.*

Icterus à lapidibus in vesica fellea & calculis.

Doctor Rumoldus Van der Borch. Leopoldi Roman. Imperatoris Protomedicus, ætatis ann. 64. Postquam annis quamplurimis atrocissimo icthi dico dolore cruciatus, aliminate ac orthopnoea, ut non nisi recti cervicæ spirare posset, defatigatus, auriginoso corripitur morbo: quorum morborum diversorumque symptomatum vehementia natura devicta, tandem fatiscit.

Cadavere extenterato, præter bina in pulmonibus tubercula, 72 lapilli coloris flavo subnigri, fabarum minorum ac pisorum magnitudinem adæquantes in vesica fellea ac portis cholidochis reperi tuerunt. *Obs. Nicol. Gul. Beckeri Medici Vienne. si in Miscell. curios. ann. 1670.*

Calculus in cysti felis plerumque concrevit niger, sed tamen levis, & qui aquæ immersus innatat: neque, ut qui e renibus aut vesicis evellitur, subidet in imo: Origo illi est a flava bile, quæ proprio receptaculo diutius coercita, nec tempestive vacuata, nec nova influxu renovata, mirum in modum obdurefcit: Id autem imprimis accidit cum uterque cystis ductus obstruitur. Huius quidem neque manifesta sunt notæ, neque gravia symptomata, quibus certo ac facile detegi possit: At suspectus his esse debet quibus gravis & diuturnus fuit icterus. Decrepitus quidam senex, in iram mire propensus, post decessum sine felle ac sine cysti inventus est in cujus sede ingens calculus concreverat. Quinetiam post diuturnum icterum, oborto alvi profluvio, huius naturæ innumeros calculos, instar pisi aut hordei, in plerisque exturbati deprehendimus: *Fernelius pathol. lib. 6. cap. 5.*

Alias secui famulam senio & morbis confectam. Inveni in fellea vesica duos insignes lapides coerules quorum alter quasi ovi columbini magnitudinem æquabat: laborabat diu regio morbo, ac ultimo febri correpta occubuit: *Cotter libello observ. Anatom. & Chirurg.*

Brigida N. Uxor, nulla remediorum adjuncta ope, icteritia interiit. Huic dissectæ in vesica fellis inventi sunt lapides cœrulei, splendidi, plurimi, angulosi, quorum superficies ita inter se cohzrebant & conglobabantur, ut unus primus lapis visentibus judicatus fuerit: vesicam fellis ita adeo oppletam ac extensam detinebant, ut bilis nec recipi in ea nec permeare posset.

Similes, xviii. numero, nucis Ponticæ magnitudine in Constantia Acciarolia & Elizabetha Capponia reperti, neutram tamen arquatius morbus interfecerat. *Ex observat. Neretii Neretii Med. Florentini.*

D. Luques Chirurgus mihi retulit se lapidem amygdale magnitudinis, e cyllide fellea ictero laborantis detraxisse: bilis autem loco suo, a lapide occupato, per totum corpus regurgitavit. *P. Boerhaave observ. iv. centur. 1.*

Anno 1612. Colonia a D. D. Jo. Fabricio & H. Strapedio, lapides duo ingentis magnitudinis mihi exhibiti fuere, qui ex vesica fellea Comitæ cuiusdam septuagenarii extracti sunt: unus oblongus, alter fere rotundus est, pro magnitudine tamen non adeo usque ponderosi sunt: major enim (qui ex una tantum parte excavatus est, ut tertiam fere partem minoris excipere possit, cumque a continua frictione unius contra alterum ita excavatum fuisse certum est) drachmas xiv. minor vero drachmas quatuor & semis solummodo pendet, quandoquidem spongiosi sunt & per lamellas concreti: sed ab initio multo ponderosiores, neque adeo duros fuisse assererat D. Fabricius. In majori namque hinc & inde (ut solent esse in limo cum a sole exsiccantur) conspiciuntur. Color aliquibus in locis croceus, aliis vero in locis ad nigredinem vergit.

Predictum Comitæ per totam vitam robustum, neque morbis ulque adeo obnoxium (nisi quod aliquando icteritia laboraverat) tandemque circa annum lxx. febre continua maligna obiisse referebat idem Fabricius. A multis annis quoties in lecto sese convolveret ex una parte in aliam, pondus magnum, molestum, & ex una in alteram partem delabens e regione Hepatis percipere poterat. *Fabricius Hildanus cent. iv. observat. xlv.*

Pater Sanctorius Franciscanus sæpius rebellis, immani, importuna & frequenter renascente icteritia corripiebatur: mortuo secto, lapides flavi, magni, in cyllide fellea reperti fuere. *Dom. Paracelsus Pentec. 5. observ. xxii.*

M. trona prius ævus, jam ævus. quin & natus in toto habitu præferre cepit, qui color bilem prædominantem, & inde productum icterum prædidit, cuius humoris quæ fuerit hinc colligi potest, quod præter punctiunculas molestas cutim passim in tubercula pisi magnitudinis elevarer: velut ab apiculæ spiculo in fixo compunctis contingit, quæ in evanescencia subinde sedem mutabant, & cum inquirere maxima ægræ huc illuc vagabantur.

Varius præscriptis præfidi is nihil proficietibus, morbo tam diu succumbere coacta est: In aperto cadavere, viscera parum a statu naturali recedentia reperiuntur, excepto Hepate, quod decolor & durius fuit: sed in vesicula fellea res lapides castaneæ æquantes, triquetra fi-

gura & nigri, gagatem referentes, cum pluribus aliis minoribus, & arenulis ambos ductus cholidochos distendentibus, de tantorum affectuum causa antecedenti nobis omnem dubitationem eximerunt. *Alex. Deodati valetudinarii pagina 248.*

Illustris Baro doloribus arthriticis diu multumque affectus in icteritiam incidit: adhibita varia sine successu: supervenit tandem & hydrops ascites aliæque symptomata, quibus cum ultra semestrem colluctatus, leniter exspiravit.

In defuncti cadavere inventi 1. Calculum in vesica fellea ejus magnitudinis ut totam fere cystin repleret: unde liquido constat obstructionem illam a calculo veram icteritiam causam fuisse, nullique remedium expugnari potuit. 2. Hepar maxima quidem ex parte salum, sed croceo colore tinctum conspiciebatur. 3. Cor. Pulmones, Lien, ventriculus, mesenterium & omentum naturaliter fuere constituta, 4. Intestina maculis nigris & livescens hinc inde distincta. 5. Renes flaccidi &, quod notabile, adeo parvi ut magnitudinem nucis juglandis vix æquarent. *Balibazur Timaus lib. 3. observ. 28.*

Secundum cadaver hominis qui diuturno morbo laboraverat & hydropicus postremo effectus erat. In eo reperi hepar grande, colore nigricante & fere tali quale in splene alias conspeximus, folliculus fellis plenissimus erat: Hepatis venæ in parte ejus cava, prorsusquam in communem illum caudicem portæ desinunt, omnes obstructæ erant lapillis eas distendentibus, foris nigris intus flaventibus, porro & ille meatus qui ex folliculo fellis in intestinum desinebat, lapide ejusmodi obstructus erat. Hunc cum examinavimus, nihilominus tamen bilis effluxit, coaluerat enim foramen illud defuetudine bilem ad intestina mittendi.

Hinc istius meatus obstructionem ego causam fuisse video icteritiam, qua hic homo ante hydropem longo tempore confectus fuerat, regurgitante ad totum ambitum venarum bile, quæ purgari per intestinum debuisset: nam meatus ille qui ex folliculo fellis in hepar est, liberissimus erat. *Jacobus Cameracensis Epist. ad Matthiolum.*

Nobilis Conradus a Reinberg, pituitosus & cacochymicus, obstructionibus viscerum, præter maligno ad genu sinistrum, interdum etiam icteritia annis aliquot laboravit, ac tandem obiit ex febre.

In vesica fellea invenimus lapidem durissimum, ad nucis juglandis magnitudinem, anteri-
us atrum, posterius croceum. *Fabricius Hildanus cent. 1. observ. 60.*

In felle etiam Tartarum reperitur, ac tantæ etiam Lapides in vesica fellea reperiuntur qui totam eam replent: ut ego in quadragenario quodam, cui per septem annos icteritiam patienti nemo Medicorum auxilium ferre poterat, defuncto tandem Lapidem magnitudinis vesicæ fellea reperi, ac præterius mihi custoditur, ea autem persona antea maxime iracunda ac violentissima erat: *Johannes Hinen lib. de morbis Tartaricis.*

Fuit in Prussia Ducali, non procul Mesacco, quidam insignis conditionis Nobilis, nomine Sach, in cuius cyllide fellea nonaginta novem lapides, pisorum magnitudinem æquantes

iuventi sunt. Is nominatus Dominus patiens Ictero nigro subactus cecidit. *Andreas Cnoffellius in Miscell. curiosis anni 1673. observ. 206.*

§. 16. Halberstadii ante paucos annos in Pincernæ ejusdam, Ictero & Hydrope demortui cadavere, in fellea cystide plurimi deprehendebantur lapilli, causa istius affectus complicati lethalis. *Mabius in Fundam. Physiolog. c. xvi.*

Constitutio Cystis fellea in iis qui calculos in ea congerunt.

Cum difficile sit Calculos ex Bile ortos dignoscere, non mirum si eorundem curatio res intricata videatur multis Medicis: Quoniam tamen isti calculi post obitum reperiuntur in felleis folliculo, reliqua bilis amurcam imitatur, sordibusque scater ac facibus subsidentibus, qualem non semel vomitu excretam observavi, exultimarem in talibus metum esse ne aliqua Bilis pars concreveret in calculos, dum in tales faeces abit alia. Ideoque tunc usurpanda medicamenta hosce biliosos calculos solventia ut & concretionem quamvis impediunt. *Franciscus Sylvius de lelior. praxeos lib. i. c. xlv. §. 12. & 13.*

Ictericæ bilis cysti conclusa serosa & vix flava reperta est.

Observavimus in Ictérico anno 1664. in Nosocomio Leydensi, à Clar. Sylvio dissecato, ejus Bilem, dum eam accuratius examinavimus, plane serosam, & tam levi flavedine imbutam, ut immixa in eam lintea vix ulla flavedine tingerentur: atque in lingua nonnisi exiguam admodum amaritudinis speciem exhiberet. *Regn. de Graaf. Tractatus de Succo Pancreatico cap. 8.*

Icterus à Pori choledochi vitiosa figura.

In Firmino Chaudone, Ictericia extincto, reperiimus Porum choledochum immensi magnitudinis ad Hepar, ad intestinum vero meatu capillari: hunc excrementum præcluso transitu jecur repetebat, ac inde per cavam in universum se corpus effundebat: quæ res flavitiei strigositæque causam dabat, etsi corpore omnibus alius esset procerior. *Barthol. Cabrollius observ. x.*

Icterus ab ossæ constitutione Vesicæ felleæ ejusque meatus, cum parte mesenterii.

Puella quædam satis boni habitus, Ictero foedata diuturno, tandem post iutum aperiendum aliorumque præsidiorum usum, vita ipsam defecit.

In cadavere, præter vesicam felleam, ejusque meatum in duodenum intestinum, bona mesenterii pars fuit plane ossæ: itaque recedente in ventriculum bile, assumpto cibo dolor vehemens materis commotione cruciabat. *Job. Rhodius cons. 2. observat. 96. & cons. ii. obs. 3.*

Icterus exortus ob vesicam copia bilis turgentem.

Secutus à D. Sylvio febricitans & ictericus, in quo folliculus felleis grandis, distentus bile,

hinc ægro ob ductus bilarii obstructionem diuturna fuerit alvi constipatio. *Bartholinus Epist. 97. cent. 3.*

Icterus à Iecore magno, duro, viridi, Et molli ingentique Liene.

Prosper Marcellus cum multis annis Regio morbo laborasset, & subito ex bilis in ventriculum miro confluxu exspirasset.

Jecur inventum magnum, durum & viride, cum molli ingentique Liene. *Vesalius l. 5. c. 9. de hum. corp. fabr.*

Ictericia à visio hepatis subalbidi, abscessu tentati: Lienis maximi, Lapidibus referti.

Juvenis anasarca diu cum laborasset, subito incidit in icteritiam, deinde in hæmorrhagiam natium, postea vero in subitam mortem.

In hujus corpore apparuit Hepar subalbidum, cum in parenchymate magno abscessu: Lien supra modum magnus, lapidibus plenus albidissimus. *Nic. Fontanus Resp. & curat. pag. 90.*

Ictericæ Anastome, in quo Jecur Scirrhosum &c. Cystis sine felle, Lien & Pancreas scirrhusa &c.

Ne vacuum ad te redirent literæ D. Bonete, placuit observationem addere, in progressu operis tui, forsitan profuturam. Ictero ab obstructis visceribus Vir quidam in urbe nostra, Fackius, defecatus diu anxiam vitam inter mortem & inediam traxit: ventriculo enim debilitato omnia assumpta respuebat, vomitu statim rejecta, & quoties lacticia ingerebantur, totiens in caecum concreta morabant ea via qua accesserant.

Cadaver defuncti xx. Februar. 1675. apertum à Philippo Hacquart Chirurgo Regio, præsentibus mecum Exercitissimis Medicis D. Henrico à Moynichen & D. Olao Borrichio, interiora viscera musculosque ab effusa bile flaventes ostendebat: hepar ingens scirrhosum, ea parte qua renum regioni vicinior erat, rubens & quasi sphacelo correptum, quo loco quoque de doloribus conquestus fuerat: vesicula felleis sine felle, sed amurca quadam plena & quasi argilla repleta, quæ in solidum corpus concreverat, forma & magnitudine nuclei majoris dactyli, quod sine dubio, si diutius vita superfuisset, in calculum calore degenerasset: ventriculi cavitas universa rubicunda, venis distentis, unde & vomitus continuus, & nonnunquam cruoris sputum: Neque enim ex liene vel Hepate alius ductus patens apparuit: Lien & Pancreas scirrhosum, Cor grumis sanguinis plenum: Pulmones flaccidi & putridi, superiori parte costis adnati, præsertim in latere dextro: *Observatio hucell. Thom. Bartholin. in Actis Medicis annor. 1674. 1675. & 1676*

*Anatome IctERICI, in quo Mesenterii vena
cruore flavo ac stercoreo scatentes
reperita sunt.*

Helmontius lib. de Schol. Humorist. passiva deceptione, Ictere, famoso Icteri patratore, profligato, novum in theatrum producit, Virus nimirum excrementosum, seu cruorem flavum & stercorem, sive Icterus liquidum flavum, secundæ digestionis prolem, sursum p. n. raptum in venas & totum corpus dispersum: Quod in duobus cadaveribus dissectis, Ictero extinctis, manifeste se deprehendisse affirmat, in quibus nulla præsentia folliculi fellis obstructione, mesenterii venæ cruore hocce flavo ac stercoreo scatuisse, qui autem urinae & alvi sordibus permixtus nullam affricasset amaritatem, quum & ipse ea destitueretur.

*Icterus niger ab Hepate scirrhuso, Vesicula fel-
lis vacua, Omento putrido.*

Anno 1657. Senator Erfurtensis cum per quinque menses Ictero nigro laborasset, & medicamentis nihil proficientibus, sentini viribus consumptis obiit.

In ejus aperto cadavere inveni hepar scirrhusum, lignique instar durum, ac tartareis atlastisque quasi humoribus infarctum: vesiculam felleam plane vacuam, Omentumque omnino putrefactum. *Ex observ. D. Valent. Andrea Mollenbroecii Medici Hale Saxoniæ in Miscell. curiosæ anni 1670.*

Icterus niger à Lienis absentia prognatus.

Uxoris cujusdam Nobilis viri cutis, atro colore tota ita fuit tincta atque fœdada, ut solummodo ejus aspectus omnibus horrorem incuteret: hæc absque febris molesta perpetuo nam universa corporis superficies Æthiopis colore erat conspurcata: Medici causam judicarunt contumacem lienis & mesenterii obstructionem (licet nulla, aut saltem sensui conspicua reperiretur partium tensio ac durities) à remediis deobstruentibus & nigrum humorem vacuantibus pejus habebat; Tandem accedente assidua leipthymia, & sequuta continua febre obiit.

Cadaver dissectum sine liene inventum est, qui cum sit receptaculum melancholici succi, nihil mirum si eo deficiente corpus rotum redderetur nigrum i. quia humore atro non attracto, hujusmodi humor per venas cum sanguine ferebatur, ex quo massa sanguinis infecta, corpus nigro colore fœdavit. *Zacutus Praxis admoir. lib. 3. observ. 137. Ex communic. D. Gasparis à Costa Med. Rothomagensis.*

*Icterus à parvitate Lienis, grandiore Vesica fel-
lea, & obstrueta.*

H. Fab. Aquipendens Patavii dissecuit cadaver feminae Ictero nigro extinctæ, cujus jecur, ieti & reliqua viscera, nil consideratu dignum offerebat: sola cystis usitato grandior, aspectu terrior è cinere concretos continebat globulos: quibus & vena quæ à cyli ad jejunum proficisci-

tur, infarcta, parvo & exiguo prorsus conspecto liene.

Discoloratio à Vermium copia in intestinis.

Vermibus intestina scaterere frequenter, non tantum in agris; verum etiam in sanis supplicio affectus lapsius deprehendi: Inter quos medicus quidam, qui tamen dum viveret discoloratus erat, capite multatus, sectus supra viginti lumbricos intestinis inclusos gerebat. *Platerus observat. lib. 3. pag. 885.*

Icteri anatome, cujus interiora omnia membra, imprimis Hepar & Intestina, bile suffusa deprehensa sunt.

In Ictericorum cadaveribus dissectis, quia separari bilis non potuit, bilis colore omnia fœdantur. In Sfortia Cardinale Romano, Ictericia defuncto, cum cadavere resecto, inquisitio interiorum membrorum facta, omnia, imprimis hepar & intestina, croceo colore totaliter infecta deprehensa. *Christoph. Guarionius Consil. 215.*

Mater Ictero laborans, puellum enititur eodem infectum, cujus sanguis totus erat flavus.

Mater Ictero laborans, octavo gravitationis mense peperit mortuum foetum puerum quidem, sed ita flavum ut e cera confectus puer non pariter humanus videretur: cum potestatis meæ tactum seco, pro sanguine humorem fellis instar flavum reperio, eumque diligenter lagena exceptum servo: Ad ossa ubi pergentum, ea si erant humore eodem, eodem colore flavo imbuta, ut si non ipse secum corpusculum illud mihi atque arte tincta fuisse putarem. *Th. Kerckringius observat. Anat. 57.*

IctERICI & SPLENETICI Cadaveris inspectio.

Homo facie Ictericia, à multis annis tumore in sinistro hypochondrio laboravit cum dolore intermittente: Tentatus interdum dysuria, nunquam vomitu materiae nigrae. Postea accitus obiit.

Intestina, præter solitum, flava. Vesica fellea præter serosum humorem variosque lapillos ac grumos nihil continebat, Lien inmensæ molis, libras medicas quinque facile superans. Renes nigri, in pelvi sinistra aliquantulum puris.

Ingens plenus moles fuit causa difficultatis urinae; vesica enim urinaria pressa, urina reddi non potuit, hinc dysuria. Ob ipsius visceris obstructionem, sanguis, qui alias ex ventriculi tunicis in splenis ramos transit, regurgitans, in ventriculum erupit, unde vomitus nigri. Vasa enim splenica etiam, ut de vesica dictum, premebantur. *Stephanus Blancardus in Anatomia Practica rationali.*

J E C T I G A T I O.

ES motus tremulus ac convulsivus, vel totius corporis, vel membrorum tantum quorundam ejusdem, procedens à succo nervoso aliave materia partes nervosas ac musculares irritante. De hoc morbo tanquam ad convulsiones referendo, dicere jam super sederemus, nisi ipsius Historia ac Responsiones Consultatoriz de

de ejus cura, a pud Franciscum Ignatium Thiermaurium, oppido curiosè reperirentur, quæ hic inferi mereantur. Sic autem ille.

Jectigatio & Palpitatio Membrorum fere omnium, una cum levi Melancholia.

Pro

Juvenula Comitissa Illustrissima.

Perillustris Virgo Juvenula Comitissa N.N. annorum decem, temperamenti sanguineo melancholici, correpta & obruta est subito non levi melancholia, cum jectigatione & palpitatione membrorum fere omnium, maxime rachiorum, manuum, & pedum, sine intermissione & quiete. Quæ melancholia cum extra naturæ terminos, & in tali juvenili ætate sine evidenti causa externa invaserit, præfenti Medico merito movere scrupulos, & primogenitum quid latere autumat. Ut ut sit, curam methodice præparantibus & melancholiam evacuantibus, quantum natura & ætas juvenilis concedit, aggressi sumus, non neglectis, caput & cor confortantibus. Jectigatio & palpitatio illa membrorum cum proveniat à vaporoso, crasso spiritu intra musculos partium & panniculum membranosum, quem multi abusive panniculum carnosum vocant, vagante & exitum non habente, mitigatur leni præcedente frictione, decocto herbarum arthriticarum. De cætero non est dubium, quin omnia hant secundum artis leges; modo inclementia tempestatis modernæ, ut humores in corporibus multum agitant, & hyems futura adhuc rigida propitius cooperentur, quo blandis sudoribus materia vaporosa dissipari possit. Dabam Landishuti ad petitionem ex Mufzo, currepte calamo 25. Januarii. 1670

Franc. Stockerus.

Responsio

Continua & universalis f. e. jectigatio, ac palpitatio membrorum, brachiorum præcipue & pedum, qua Illustrissima Comitissa Virgo de repente, una cum melancholia non levi (uti nobis scriptum est) obruta fuit, à vaporoso crasso spiritu membra agitante, juxta Clarissimi Domini ordinarii opinionem, dependere videtur. Nam uti similia temperamenta sanguineo melancholica, ex natura sua, passionibus animi subjecta sunt; præsertim si vel ira, vel timor accedat; facile profecto in tali ætate (ubi judicium nondum subsistit) spiritus inde commoventur, agitantur, humoresque fermentantur melancholici: ex quibus vapores sui generis pravi, ne dicam, maligni excitantur, continens causa sufficientissima palpitatiois spatio, atque tam insolite.

Hic modo dictis jactationibus, an dolor, insomnia turbulenta connexa sint? dubitamus; scimus tamen, periculum subesse, ne similia accidentia degenerent in epilepsiam. Neque incongrue quis suspicatur, an non ab hypochondriis, vel etiam ex parte ab utero descripta incommoda profluant? novum enim non est, Virgines etiam nondum adultas, hystericiis torqueri passionibus, præsertim mature pubescentes. Quin an affectus similes non etiam ad arthritides flatulentas commode referri possint? judicio Medici Clarissimi ordinarii relinquimus.

Verum cum præsupponamus, præmissas esse

purgationes convenientissimas, specifica quoque ad idæas morbosas seminales extinguendas determinata præcessisse; ea, quæ hic addimus, judicio itidem Clarissimi Medici ordinarii libenter committimus, omnia juxta præsentis & imminentes indicationes immutanda.

Quod si affectus iste simpliciter ab evaporationibus dependet; præmissis universalibus, materia peccans commodissime resolveretur per sudores. Si à viscerum dyscrasia, obstructionibus, vel humorum prava aliqua qualitate foveatur; lenioribus epicraticis purgationibus opus erit: quales forent Brodium Laxativum, Syrupus Aureus, manna julepata, electuarium de tamarindis &c. Humores digerentur syrupo de corticibus citri, de pomis, de pæonia, superbibendo jusculum gallinæ, in quo radices, cichorii & boraginis, additis seminibus citri, si flatulentia urgeant, fuerint incoctæ. Si suspicio sit de affectu arthritico flatulento cum humoralis materia; viribus subtilissimis, conducet electuarium de tamarindis cum Cariocostino, addendo pro correctione cortices citri conditos.

Ex quacunque denique causa affectus suboritur; decoctum chinæ, santalorum, cum radice pæoniæ propositum in jure gallinæ factum atque si melancholica insomnia, molestæ essent, addita tinctura ex floribus buglossi elicta cum aqua è floribus boraginis. Nec emulsionem pro somno conciliando negligendæ, quibus Margaritæ, Smaragdus, præparati merito commiscantur. Theriaca sinaragdinæ in similibus affectibus, ac hystericiis præcipue & melancholicis eximium est remedium: nam vitælia, animalia corroborat, flatus vaporesque discent, pravitatem corrigit, viresque instaurat; dosi ʒss. ad ʒi. cum vehiculo, juxta exigentiam. Ad sudores pro necessitate movendos lapidem bezoar præferimus aliis, ad graxii exhibitum, cum aqua scorzonæræ, & e toto citro. Judicium de venæsectione suspendimus, excellentissimis medicis præsentibus relinquendum; quam tamen (si opus) ex inferioribus magis, quam superioribus venis probaremus. Monachi mense Februario 1670.

Joannes Jacobus De Maphacis.

Franciscus Ignatius Thiermaur.

SCHOLIA.

*An puella, ante solitos pubertatis annos, hystericiis passionibus possint esse obnoxia?
Narrantur aliquot historia rare.*

Quæres, an in consilio nostro recte factum sit, quod in puella illustrissima, decem tantummodo annorum nata, motum illum depravat, ad affectus hystericos deduci posse, suspicionem moverimus? respondeo: Nollem affirmare in hac Illustrissima puella, quam deinde ipsi vidimus, & examinavimus, utrum probabiliter inculpari potuisset, fatendum tamen nec ætatem, nec vivendi normam in puellis obliare, quin hystericiis morbis torqueri possint: dicitur ætas ad ætatem, natura una ab alia distingui debet: tempus quod huc est pueritia, alteri adolescentiæ esse potest: illæ, quæ carnes habent molles, laxos meatus, quæque lascivis imagi-

nibus deditur vivunt, temporius viro maturæ menses acquirunt; aliz, quibus paucus sanguis est, meatus adstrictiores, quæque castam ducunt & semotam à virorum consortio vitam, tardius menses experiuntur, atque adeo non tam cito pubescunt.

Clarissimus Vir Tobias Geigerus utriusque medicinæ Doctor, vitricus uxoris meæ, in suis collectaneis M. S. historiam sequentem manu propria annotatam reliquit. Miles quidam Oenipontanus venit ad me die quinto Septembris, anno 1618. cum filiola quatuor annorum, quæ laborabat singulis mensibus menstruo fluxu, nec non mammæ (quod rarum est) perfectas habuit, ac si fuisset virgo annorum viginti &c. A quarto in octavum ætatis annum periodice fluxisse menstrua, quibus suppressis omnis sanis in caput convertebatur; notat Tulpus lib. 3. observ. cap. 36. octavo ætatis anno menstruantem puellam, atque hanc ipsam postea decennem ob menstrua suppressa epilepticam factam novit, & feliciter curavit affinis & olim discipulus meus, excellentissimus D. Joannes Jacobus à Zimern. Landshuti medicus. Puellam novem annorum utero gestasse, visam esse, ait Savaudola tract. 6. cap. 21. Rubr. 6. I. orolivensis supra primam partem, de membris generationis scripsit auctoritate fide digni, puellam octavum agentem annum fuisse imprægnatam. Hoc idem asserit & causas aliquas reddit Paræus operum suorum tractatu de renunciationibus, ubi de signis Virginitatis agit. Pariter monstrum est, quod Saxonia Parte 3. Præx. de moniale refert, quæ vixit ad 105. annum cum menstrua purgatione. Valleriola lib. 2. c. 18. Loc. Com. ex Valescio à Taranta narrat, visam esse puerperam mulierem, quæ sexagesimo septimo sætatis anno peperisset, cum annos sexagesimo, & sexagesimo primo, edidisset fœtus. Apud nos Monachi infrequens non est, fœminas quinquaginta aliquot annorum gravidas, ac feliciter parturientes videre. Scio monialem nobiliter & honeste natam, & hoc anno 1671. quo hæc scribo, adhuc viventem, quam mater per annos omnino triginta, eodem in conjugio sterilis, tandem gravida facta enixa est, utique jam annis prope decrepita. Amplissimus Vir Ioannes Jacobus de Maphæis sancte mihi affirmavit, nosse se Illustrissimam Dominam Comitissam à Wolkenstein, quæ, postquam quadraginta annos in conjugio vixisset sterilis, tandem filium peperit, etiamnum inter Magnates Tyrolenses viventem. Tanta scilicet est fœmineæ inconstantia diversitas: modo enim ante solitos pubertatis annos viro maturescunt; modo jam decrepitæ revirescentes adolescunt; modo denique jam edentulæ, renascentibus iterum mordentibus armis, repuerascunt. Sic vetulam in juvenem paulatim iterum rediisse tradit lib. 6. Valescus. Novissime egomet ipse, quod Illustrissimæ Matronæ Dominæ Baronissæ de Graevenek, Illustrissimi Gynæcei in Aula Electorali Bavaria olim Præfessæ, edentulæ & iam septuagesimum primum vel secundum annum agentis, dens nolaris unus, recenter non sine magnis doloribus, succreverit. Hæc Piissima & Nobilissima Matrona, licet bis dentata à natura fuerit facta, vixit tamen inter alias nobiles fœminas, præter morem aulicum, nunquam mordax.

Pro eadem, Ulterior Consultatio.

Quandoquidem Illustrissima Virgo patiens patrios invilere Lares cogitat, nostræque ulteriora Consilia, pro itinere, expetit; illud, quod nunc in præsentia Illustrissimæ Virginis Comitissæ &c. hic Monachi commorantis, ipsimet observaverimus, & quid ulterius observandum existimemus, paulis, sed præmeditato studio, & ea observantia ac devotione, qua in Illustrissimam hanc familiam ferimur, complexi sumus.

Perpetua ista membrorum jectigatio, affectus nobis videtur mixtus, tum ex partium nervosarum molliæ, tum ex earundem motu contractivo, convulsivo constans. Dolebat Illustrissima Virgo, uti refert, omnium primo dolore capitis, exin defluxiones palpi, incidit in hunc motum adeo depravatum; sine dubio dum extraneus humor in capite sive collectus, sive aliunde transmissus, in nervosum deinde genus delapsus est, illud partim copia enervans, partim vaporoso aliquo & pravo miasmate continuo lacerans; copia quidem, quandoquidem Illustrissima patiens nec dolore capitis, nec fluxione etiamnum libera est; extranea vero & prava qualitate, cum seminale aliquod miasma subesse, præter nos Clarissimus ordinarius D. Medicus non immerito suspicetur.

Prognosis exercitatis Medicis nota. ipsa sane Epilepsia (quam jam semel Illustrissima Virgo, prout in priori Consilio prædixeramus, incurrit) quam maxime extimescenda; speramus tamen præsentem affectum Illustrissimorum DD. parentum dulci solatio & utum deliniri posse, atque tempus, nativum solum, ætatem, ipsaque demum remedia, a perito Medico adhibita, non parum profutura.

Ex Fonte Pharmaceutico alvum epicraticæ subducentia necessaria credimus; illa tamen, quæ humores non acuunt, fundunt, aut congesti & violenter exturbant; sed potius, quæ leniendo contemperant & evacuant, qualia à nobis in priori nostro Consilio descripta sunt, ubi etiam similes syrupos præparantes proposuimus. Omnia impenite calida proscribimus, utpote in juvenula biliosa facile nociva. Decoctum Chinæ ibidem descriptum, & admodum temperate compositum hoc loco repetimus, cum potissimum in finem; cum Illustrissimam patientem nondum videamus defluxionibus liberam. Prægressis universalibus remediis thermæ commendantur; sed temperatæ à Clarissimis Viris adfidentibus tanquam locorum gnaris, in specie determinandæ: has enim speramus nervorum laxitatem roborando correcturas, nec non pravam miasma, minerali sua virtute extincturas. Habent thermæ divini aliquid, solentque malignas corporum sordes peculiari analogia extrahere, salinas solvere, sulphureas temperare, mercuriales ligere, affectibus demum uterinis peculiariter prodesse. Quod si thermæ ob siccitatem in corpusculo parum nutrito suspectæ sint, aqua dulci temperari poterunt, vel artificiales substitui; prout scilicet præsentis indicationes postulaverint, & prudentiæ Medicorum adfidentium visum fuerit. Alia specificæ non proponimus; thermæ

tiacæ tamen Smaragdina, quam in similibus ca-
libus magni æstimamus, si exspectatur copia, il-
lum lubentissime, hic in aula confectam, trans-
mittentur.

In fonte Chirurgico sanguinis Missionem lau-
damus, non ab initio, delintra semel alvo, cæ-
lebrandam: inde semel, bis in anno, pro judi-
cio Clarissimo: uni Medicorum adfidentium, &
viribus Illustrissimæ Patientis; semper tamen in
inferioribus magis, quam in superioribus venter
reperendans; imminuit enim paulatim anni pu-
bertatis, modo citius modo serius in quibusdam
efflorescentes. Commendamus præterea mu-
ltiones, cauteria ad nucham; utpote quæ ma-
teriam e capite in nervosum genus depluentem
intercipiunt, derivant, evocant, evacuant. To-
pica,unctiones,omenta non omittenda,
& ea quidem, quæ digerunt, resolvunt, corro-
borant, omnia tamen moderate agunt, cum
corpus habeamus ad maciem facile dispositum.
Atque hæc omnia, uti & victus instituendi ra-
tionem, iudicio Clarissimorum Medicorum
adfidentium lubenter committimus, Monacii
5. Julii 1670.

Ioannes Iacobus de Mapheir.
Franciscus Ignatius Thiermair.

SCHOLIA.

*Discurritur de Motuum convulsivorum, tremoris
&c. Differentiis; Nec non infrequentium con-
vulsionum exempla aliqua adducuntur.*

Illustrissima hæc Pociens, postquam ad pa-
trium aërem, proprioque Lari pervenit, no-
stro Consilio supra scripto, sanguinisque Mis-
sione per venas hæmorrhoidales uia est, ac paulò
post convaleuit. Tantum potest Aer patrius, pa-
rentum consolatio, animi contentus, & Medica-
mentorum recta adhibitio. Cæterum Jectiga-
tionem illam perpetuam, speciem tunc motus
convulsivi, mihi quidem semper persusum fuit:
quo enim alio nomine explicari poterat motus
tam inordinatus, inordinatus ac depravatus?

Non fuit Saltus S. Viti, de quo peculiaris
exempla leges apud Felicem Platerum observ.
lib. 1. in Mentis Alienatione, Nicolaum Tulpium
Observ. Med. lib. 1. observ. 16. Ludovicum Ca-
merarium Syllog. Mem. cent. 2. Nec inculari po-
terat morsus Tarantulæ, de quo Matthiolus lib.
2. in Dioscoridem cap. 70. Epiphanius Ferdinan-
dus, & novissime ac diligentissime R. P. Athana-
sius Kircherus doc. Jesu, in libro suo de Arte
Magnetica, lib. 3. Nam non saltabat Illustrissima
Pociens, non discurrerebat, sed majori ex parte le-
cto affixa decumbebat, nullaque alia, præter
brachia manusque, adeò notabiliter agitabat
membra, secus, quam in morsu Tarantulæ aut
Saltu S. Viti, Tarantulæ morsui haud ablimili af-
fectu, contingere solet.

Spasmus non fuit, cum spasmus seu convul-
sio proprie dicta sit musculi versus suum princi-
pium contractio, rigido ex in membro remanen-
te; in hoc enim differt spasmus à motu convul-
sivo; quod, ut dictum, in convulsione seu
spasmo membrum ex contractione rigidum ma-
net, in convulsione verò & spasmatice motu,
membrum agitatur, vibratur, & variè concutitur.

Neque Tremoris nomine donari poterat præ-
dicta involuntaria Jectigatio: nam licet in tre-
more membrum varia vicissitudine moveatur,
motus tamen tremulus ex toto involuntarius
non est, teste Galeno lib. 2. de symptomatum
caulis cap. 2. ubi fuse & pluribus docet; quod
tremor nihil aliud sit, quam motus voluntarius
depravatus membrorum motui intervientium,
quo perpetua vicissitudine seu elevantur & de-
primuntur, dependens a facultatis motricis im-
becillitate; ita ut duobus motibus contrariis
partes tremore laborantes afficiantur: uno, qui
movere voluntarius est, & à facultate animi mo-
vere instituitur; altero, qui contra voluntatis
imperium accidit, quo membrum ob gravita-
tem & pondus deorsum, aut in aliam loci dif-
ferentiam labitur; cujus prolapsus cum facul-
tas movens iterum conetur erigere, pondus
contra perpetuo renitatur, brevius & quæ vix
discerni possunt intervallis, hæc motus vicissi-
tudo accidit. Proinde cum, in Illustrissima Pa-
tiente nostra, motus ille seu jectigatio nullo
modo voluntaria fuerit, sane tremoris nomine
denotari non poterat, præcipue cum adesset
magna & admodum inordinata, tremori haud
conveniens, brachiorum inquietudo, humore
vaporoso, vel potius, ut ego quidem credo, se-
rolo, nervosum genus vellicante, & ad hunc
motum depravatum vere convulsivum impel-
lente.

Nec obstat primo, quod similes depravatos
motus, tremoris nomine aliqui Medici scripto-
res explanent. Hieronymus Cardanus in 6.
Aphorismis Hippocr. 26. quem sequi videtur Fe-
lix Platerus cap. 3. de Motu Depravato & Tre-
moris causa, duplicem tremoris differentiam
constituit: unam, in qua scilicet ultimas motricis im-
becillitas in causa esse recte censetur; dum
membrum, ut patet, movere, vel extensum
servare nequit, quatenus in sensibus contingit,
& nos paulo ante ex Galeno explicavimus: Al-
teram vero, quæ validis corporibus accidit,
cuique causa non imbecillitas nervorum, sed
vapor quidam stimulus, pungens nervos, que-
madmodum in febribus malignis subinde ex-
perimur, vel ut Platerus loc. cit. loquitur, hu-
mor excrementitius nervum irritans, & ad mo-
tum illum depravatum impellens. Verum enim
vero tales involuntarias & inordinatas convul-
siones ab humore vel vapore nervum vellicantibus
ortas, haud recte tremores dici, sed potius
motus convulsivos compellari debere, equidem
cum Sennerto lib. 1. Præf. cap. 25. part. 2. hinc
crediderim; cum non videam, quo modo cæ-
teroquin tremor à motibus convulsivis distingui
rectius possit. Quæ proinde duo symptomata
tremor & motus convulsivus in eo recte differre
dicuntur, quod motus convulsivus sit motus
plane involuntarius, è contrario tremor præcise
in imbecillitate instrumenti ac motu facultatis
voluntario consistat, ut supra ex Galeno diximus.
Interim non nego, contingere, ut motus convul-
sivi cum tremore aliquando mixti membrum
agitant: nam in febribus acutis, aut aliis
affectibus quibuscumque, si facultas seu instru-
menta ex morbo ad movendum debilia existant, quis
dubitet, accedente humoris vel vaporis pravita-
te, ipsos nervos vellicante, motum quandam ex
convulsione & tremore mixtum oriri posse.

Neque

Neque obstat secundo, quod Jectigationem istam convulsivam, affectum dixerimus mixtum, tum ex partium nervosarum mollitie, tum ex earundem motu contractivo convulsivo constantem. Quippe novum non est, ut partes fluiditate humoris emolliat, ejusdemque humoris inimica aliqua acrimonia laceat, motibus convulsivis agitentur: quin & observatum est, interdum motus convulsivos cum ipsissima paralyti, seu totali resolutione, in eadem parte conjungi: Hujus rei testis est Thomas Bartholinus Historiarum Anatomicarum cent. 4. histor. 3. Paralysis & convulsio, inquit, sibi subinde invicem succedunt, subinde quoque se presso pede comitantur. Viro Clarissimo, amico nostro, circa vespas ex linguæ Paralyti sublata loquendi potestas. Postero die sinistram latus resolutum, & os adeo hrmiter constrictum fuit, ut nulla vi aperiri posset, dextrum verò latus convellebatur. Nempe materia maligna, cujus indicia petechiæ apparentes prodiderunt, sinistram principii spinalis partem prorsus obstruens sensum motumque illius lateris abolevit; in dextram vero partem non ita copiose irruens, membranas vellicando, quia nervum totum replere non poterat, ad convulsiones irritavit. Honesta alia matrona, cui curandæ præfui, durante spasmo dextri cruris & pedis, in eadem parte paralyti tentabatur per æstatis decursum, ita tamen, ut sensus in pede remanserit, motu sublato. Eadem fere testatur Galenus in Hipp. lib. 1. Prorrhet. Com. 3. textu 26. ubi exemplum narrat, se vidisse: nempe & semel ego quendam, qui ita affectus erat, permutationemque varie sese mutuo excipientium symptomatum habebat, vidi. Fiebant autem & illi hæc, prægressis lumborum collique & capitis doloribus: post quos manus tota ægre tum sentiebat, tum movebatur: sicuti & in dictione dictum est, paraplectico modo, cum non esset exacta paraplegia: mox superveniens convulsio sensiliorem eam, atque ad motiones expeditiorem fecit: placata autem convulsione, sensim rursus deterior reddebatur: deinde rursus tum lumborum tum colli tum capitis dolore correptus universam subitamque habebat paraplegiæ in manu adactionem: atque rursus postea non parùm convellebatur. Casum haud absimilem vidit etiam Petrus Salius Diverfus in notis in Altinarum cap. 13. & Valeseus de Taranta in suo Philonio cap. de Epil. narrat, habuisse se curandum hominem annum sextum natum, qui eodem tempore Apoplexiam debilem, Paralytin universalem, & frequentissimos Epilepsie paroxysmos sustinuerit.

Neque obstat tertio, quod Illustrissimæ Patientis Jectigationes dixerimus motus convulsivos, seu, quod idem videtur esse, epilepticos, absque eo, quod Patiens ceciderit, aut alia communia epilepsie signa perpeffa fuerit. Etenim uti illi omnes, qui graviore epilepsia detinentur (quali jam semel detentam fuisse Illustrissimam Puellam narrarunt) accedente paroxysmo fortiter concidunt, clamores edunt, spumam ex ore emittunt, convelluntur, ita aliqui, ubi causa levior, vel in una solummodo parte fixior, nihil aliud experiuntur, præter partium determinatarum motus convulsivos, nunc majores nunc minores, ac subinde adeo obstupescendas, ut

visa sit convulsio, postea à medicenda Aberrans, Statoria, Sedentaria, Procuriva seu Ambulatoria, Circumrotatoria.

Habui olim in adibus meis Monachii cognatum, octo circiter annorum puerulum, qui nocte quadam, inquietudinem brachiorum, superiori in casu recensita haud absimilem, de repente incurrit; quæcumque manibus brachiisque peregit, per modum inordinatissimæ jectigationis contexit: nullibi dolebat: cum æqualibus circumcurabat: solus tamen comedere non potuit: nam, quod admodum mirabile adstantibus visum fuit, dum ori admoveere conaretur cibum, via regia aberrans, nunc dextram nunc sinistram aurem versus, involuntario tractu, cochleare protrudit; adeò ut convulsivos huiusmodi motus Aberrantes appellare vitium sit. Durabat malum multis septimanis, & crescentibus jectigationibus prædictis, emaciari puer, ac doloribus arthriticis affligi videbatur. Timebam ego epilepticos graviore insultus, sed hydroticis purgantibus epieratice institutis aliquoties sublevatus, tandem restitutus est, ita tamen, ut multis post annis, vernali semper tempore hujus incommodi sentiret argumenta; donec atate firmior, & nervoso genere magis corroborato, omnimodo convalesceret Vir religiosus nunc optimus.

Quietior fuit, quam nunc exhibeo, Convulsio Statoria. Novi Religiosum epilepticum, virum quadraginta aliquot annorum, morbo caduco graviter afflictum sapius. Is cum diu Herculeo hoc monstro torqueretur, tandem, affectu mitescendo, rarius & non nisi stans, oculis solummodo fixe convulsis epilepticum paroxysmum sustinuit. Interim illud mirabile, quod, durante paroxysmo, pedibus adeo firmiter insisteret æger quocumque loco prehensus; ut, licet sapius ab adstantibus, vel in scellam aliquam, vel lectum truderetur, illico tamen in pedes sese erigeret, ac ita stans convulsivam accessionem absolveret, mentis, per totum paroxysmi tempus, sibi minime compos. Hoc idem fere observavit Marcellus Donatus in Hist. Med. c. 4. Benivenius apud Dodonæum obs. 97. Chiffletius obs. Med. 1. obs. 1.

Convulsionem Sedentariam vidit, & lib. 1. suarum observat. cap. 14. annotavit eruditus Tulpius. Virgini, inquit, quindecim annorum, divexata frequenter à vulva, intervenit tandem admirabilis quædam nervorum contractio: invadens ipsam non nisi sedentem: stanti quippe & ambulanti nihil peperit unquam negotii: quocirca libuit illam vocare convulsionem sedentariam. Causa inusitati hujus morbi insedit procul dubio cum lumbis tum ligamentis, vulvam illic loci ossibus utrimque adnecentibus. Moris enim lumbis & femore versus sedile inclinato, movebatur evidenter noxia materia, illic loci stabulans, excusius æcri vapore verisimile est, laceffitos fuisse nervos à spinali medulla lumbis concessos, & ex eorum, cum cerebro, consortio, expressam sedentariam hanc convulsionem &c. Sedentem quoque accessionis tempore Virginem vidit Dodoneus observ. Rararum c. 97.

De Convulsione Procuriva scripsit Bootius de affect. omis. cap. 6. Thomas Erastus narrante Raymundo Joan. Fortis cent. 1. Consil. 41. Talem etiam viderunt antehac Archiatri Bavarici hic Monachii, in Clarissimo & experientissimo

tissimo Thoma Mermano, Viro Medico optimo, Archiatro Principibus Bavariz acceptissimo. Ita enim Mermannus de se ipso ad Amicum scribit. Cum sub finem autumnii proxime elapsi ex itinere Umenli, ubi Acidulis aquis tam balneo quam potu uti tuere aliquot Serenissimi Principes nostri, domum reverterer, repente in gravissimum capitis dolorem, sed brevem illum, post vero in vertiginosam quandam & prope inexplicabilem debilitatem, cum incredibili quadam anxietate, & quasi mortis jam imminens formidine conjunctam incidi. suspicor ego, aliud nihil fuisse, quam ingruentem Epilepsiz paroxysmum; sed quod causa insufficiens, naturaque robusta esset, irritum recurrebat symptoma illud crebro, diebus singulis, nulla precedente nausea, & cibi appetentia vigente. Levabat, ac paulo post finiebat accessionem una inambulando, ac motus corporis concitator usque ad sudorem fere vel madorem saltem, dissipato, in salior, ac digesto vapore caput offendente &c. Qua super re Godefridus Stceghius V. r. celebris, à Mermano consultus, sequentem in modum respondit. Deambulatio illa continua & spinæ dorsii in anteriora incurvatio ad depravatam motum spectant; quemadmodum enim in convulsione natura, se contrahendo, conatur in auxilium protrahere partes annexas quo id, quod molestum est expellat (exitimo enim solum molestiz sensum esse continentem convulsionis causam) ita rationi consonum est, irritatos circa os sacrum, qui in crura extenduntur, nervos, ad continuum ingressum impellere; quo motu tanquam aliqua convulsione, quod noxium est excutiant. Equum vero est, eam materiam irritantem tenuem esse, atque acrem, ex tenui scilicet pituita & bile; si frigida & humida ellet, magis obstrueret; iis etiam qualitativis actiones diminueret: non depravaret; & oreretur magis Paralytis. Hæc ibi Stceghius in aliquo M. S.

Convulsionem circumrotatoriam Thomas Bartholinus se vidisse narrat, du n. centur. histor. Anatom. 2. Histor. 90. ait: Juvenula quedam Artusienfis septendecim annorum ad me salutis causa 1647. accessit, quæ oborta circa caput nubecula in motus convulsivos inciderat, semperque fere ad dextrum latus circumrotabatur. brevissimos habebat paroxysmos, sæpe recurrentes, & cum timore insolito desinentes. Vide quid ego supra in Scholio de Melancholia, de Monacho, in lectulo tempore Paroxysmi, sese citissime circumrotante annotarim. Observatum porro est, in paroxysmis, Epilepticos alios risisse, flevisse alios, hos mites mansuetosque, illos furibundos extitisse; tot scilicet modis Epilepsia miserum hominis concutiente corpus.

Mentis convulsiones hoc loco non tangimus: nam infrequentes non sunt. Hominis voluntas quotidie trahitur, retrahitur, ac non raro contra naturam convellitur, in iis præcipue, quibus lingua, mens, ac voluntas venalis est.

*Perfricuit frontem Rex; Auscens illico vultum
Contrahit, ut, cum Sol occidit, umbra fugit,*

I L E O S.

Ileos est morbus in quo excrementa alvina per os rejiciuntur. Causa ejus rectè dicitur motus intestinorum peristalticus inversus, ita ut revera id quod est vomitus in stomacho, hoc sit ile-

us morbus in intestinis. Nam quando incipit inversio motus peristaltici in quodam loco intestinorum, in specie in tunc ilei circa principium coli (ibi enim est frequentior sedes morbi ilei) tum fit ileus. Unus enim & continuus est tractus ejusdem substantiæ similiter connexæ à summitate gulæ ad extremum podicis hiatum: Quæ substantia nunc est amplior, nunc angustior; amplior est dum constituit stomachum; angustior vero ubi gulam & intestina efficit. Unde sicut in statu naturali unus est continuus motus à summitate gulæ usque ad podicem, qui per fibras circulares oblique se incidentes, perficitur, & quo ingesta successive, motu peristaltico naturali protruduntur: ita si quodam in loco invertatur hic motus, ut hac contrario modo sursum versus, tunc oritur excretio contentorum in hoc tractu non per podicem, sed per gulam. Quæ excretio interdum est vomitus si incipiat motus peristalticus inversus à pyloro: interdum est cholera, si incipiat inversus motus circa insertionem ductus pancreatici & cholidochi; Interdum est ileus morbus, quando incipit motus inversus in ileo seu reliquis intestinis. Nam interdum podex est locus ubi incipit talis inversus motus: quæ ratione non tantum clysteres injecti, sed etiam suppositoria fuere rejecta per os.

Causa occasionalis motus compressivi inversi est irritatio quæcumque in intestinis, ita quidè ut intestinus irritatus non possit bene deorsum versus moveri; quando enim irritatur in quodam loco intestinum deorsum versus contenta sua deprimit: ubi vero ex quacunque causa hæc protrusio irritantis versus inferiora impeditur, propter hoc unpedimentum, continuata tamen irritatione, à contractis libris sursum promoveantur contenta. Hæc causæ occasionales irritantes quidem, sed tamen impediētes, sunt variz: Hild. observ. cent. 1. obs. 61. asserit quod causa, seu radix ilei imprimis consistit in tunc ilei circa cæcum, in principio coli, ubi est valvula quæ ex attenuatione ilei causatur, ubi se ampliat in cæcum; constrictionem itaque in isto loco, ac coacervationem scybalorum circa cæcum (scybalis tamen magis frequenter) esse causas ilei: quod confirmat loco citato, ubi asserit iliacam passionem ortam ex scirrho & ulcere cancroso in cæco, quod ileum oppleverat ut nihil ad colon penetrare potuerit. Facit huc etiam observatio Nicolai Fontani in Conf. & Respons. p. 84. de iliaca passione lethali, in qua sine ullo volvulo intestinorum, cæcum tantum apparuit plenum materia indurata, & quasi lapidosa, intestinum ita extendente, ipsique ita adhærente, ut extrahi non potuerit. Unde etiam Zacutus Lusitanus est in hac sententia quod ileus tantum oriatur à forti intestinorum adstrictione. Unde notum est quod hernias, tam ubi intestina in umbilicum, quam ubi eadem in scrotum incidunt, sæpius subsequatur iliaca passio, quia non possunt expelli excrementa per intestina in umbilico & scroto convoluta, ac capropter versus superiora necessario à parte irritata rejiciuntur. Panarolus Pentec. obs. 50. quatuor species habet ilei à diversitate causarum inter se diversas. Primam causam dicit esse herniam; secundam vult esse convolutionem intestinorum; tertiam adstrictionem alvi instar sarciminis Lucanici repletæ; & quartam vult esse descensum partium cuiuspiam intestini in cavum alterius.

Examinemus has causas; istam de convolutione

ne intestinorum cum falsam propalo. Hypothesis enim nondum est pro vera agnita, quod intestina ita convolvi queant; nam quoad adherent mesenterio impossibile est talem intestinorum convolutionem dari, demonstrante hoc ipsum Helmont. tractatu de flatibus; unde & appellatio volvuli est absurda, dum à volutatione sic dicitur. Verum descensus partis unius intestini in aliam, seu superioris intrusionem in cavitatem inferioris, & vice versa, est satis frequens, & in praxi à Sylvio aliquoties observatus. Quare autem una pars intestini ingreditur in alteram, sive hoc deorsum, sive sursum fiat, prædicat hanc causam, nempe flatum intestinum tenuis diversimode distendentes, quo fit ut in uno loco magis dilatetur quam in altero, sicque pars arctior in ampliorem dilabatur; nimirum dum æger in torminibus varie se contorquet, corpusque varie mutat, ac agitat, facillimum est ut intestinum à flatibus distentum admittat partem aliam intestini flatu non distenti & propter angustiam loci fit ut se invicem uniant. Præter exempla Sylvii etiam videbitis in Schenck, l. 3. obs. factam mentionem ingressus intestinorum tenuium in ileo ad digiti longitudinem. Alias Barth. cent. iv. epistol. p. m. 542. plures recenset ilei causas, quæ possunt ibidem videri.

Notum etiam est quod inflammatio intestinorum & hanc subsequens gangræna, quæ corrugantur intestina, sit causa ilei lethalis.

Quod attinet signa diagnostica, ea per se clara sunt, nihilominus hic imprimis notanda quæ ileum præsentem, aut futurum esse monstrant. Futurum præcunt alvus pertinaciter suppressa, intestinorum tenuium crudelia tormina. Jam incipientem nausea imo vomitus. Quod si singultus superveniat mors est in olla, & imminet fatum.

Signa prognostica quod spectat. Raro evadunt illiaci, unus tamen facilius curatur quam alter. Ileus ex inflammatione & gangræna prorsus est lethalis. Ileus ex scybalis induratis, item ex mutuo ingressu intestinorum curari potest. Ileus ex hernia ut plurimum lethalis.

Superiunt adhuc nonnulla curiosa quoad ileum. Rarum est quod habet Schenck. lib. 1. obs. de ileo contagioso, quod nempe ileus aliquando fuerit contagiosus. Quadrat huc obs. Amat. Lusitan. c. vii. ubi habet ileum epidemicum, in quo cum stercore vermes per superiora fuerant reiecti.

In insula Americana Iamaica, ileus dicitur morbus endemicus, seu communiter grassans in incolis, in quibus etiam oritur ex mutuo ingressu intestinorum in se invicem, uti hoc videbitis apud Bartholin. c. 4. epistol. p. 529. Alias nota est observatio Dodonæi quam recenset Forestus l. 1. obs. 19 in scholio, nempe de ileo periodico tertio quoque die recurrente.

Cura consistit id eo, ut irritatio intestinorum sistatur. 1. ut excretio contentorum quacunq; ratione promoveatur. 2. quæ usurpantur sunt tam interna quam externa.

Moneo tamen in genere, ubi stercore dura sunt, aut saltem ubi talia præsupponantur, nihil agi posse nisi antea hæ ipse feces induratae emolliantur. 2. quod in ileo morbo purgantia fortiora quacunq; ratione adhibita, aut etiam leviter stimulantia per os exhibita non convenire, nisi jam ubi sedata est omnis intestinorum irritatio & hinc ortus motus eorum inversus. Subsistente namque irritatione, & durante, aut imminente vomitu intestinali, purgantia quæcumque tam levia quam fortia, semper evadent vomitoria, & ita malum non parum exasperabitur. Unde recte dicit Sydenham tractatu de methodo curandi febres, qui admodum est elegans, quod non applicanda sint purgantia nisi prius restitutum in integrum ventriculo, quod verissimum est.

Deinde etiam hoc observetur, quod in tali morbo ægri laborent summa virium dejectione, & non raro etiam animi deliquiis, propterea Medicus semper squ. rheriacal. campb. aut vinum cum aqua cinnam & similia refectiva, item spir. rosar. ambrat. caute debet admiscere, quo etiam viribus consulatur. Animi deliquium oritur ex fœtore, quo tales sunt aff. 3. omnia enim fœtida spiritibus nocentissima iudicantur De fœtore hoc consulatur Panarol. Pentec. 4. obs. 16. de juvene quodam volvulo tandem mortuo, qui foetidissimum odorem, non tantum in omni vomitu & ructu,

sed etiam tandem ex toto corpore exspiravit.

Quæ ergo conveniunt in hoc morbo, sunt clysteres abitergentes, & emollientes, quos ex vino, urina pueri, & seminib. carniant. commendat Zacut. Lusitan. lib. 7. Medic. Princip. histor. 97. Simplicia emollientia satis sunt cognita & quomodo ex his sunt clysteres. Ubi opus est stimulo, iisdem incoquitur colocynthis, imprimis in alvi obstructione; aut oleum lini, aut raparum, quibus incoquantur trochisci alandhal commoæ injiciuntur. Riverius commendat pro clysmate decoctum intestinorum & orienti vervecis in quo butyrum & sal gemmæ dissoluta sunt; sed in induratis fœcibus, Ubi metus est inflammationis intestinorum, Lindanus laudat clysterem ex decocto hordei in quo nitrum usque ad ʒiij. dissolutum sit. Facit huc Zacut. Lusitan. loco supra citato, qui habet observationem de iliaco malo, cum vomitu stercoreum, per clysterem ex oleo cum ruta & nitro decocto paratum curato. Rulandus habet observationem de ileo periculoso curato per clysterem ex sem. lin. ʒvi. trochiscor. alandhal ʒiij. quæ mutuo bullita, partim umbilico inungantur, partim alvo immittantur loco clysteris. Facit huc Poterius cent. 1. cap. 84. de iliaca passione, per oleum supra & infra infusum curata.

Hoc tamen moneo, ubi motus peristalticus inversus jam incipit in intestinis crassis, aut ab ipso podice, omnia injecta raro scopo satisfaciunt, immo nunquam, sed observanda bene circumstantia.

Internè notum est quod convenient globuli sclopetorum, (quod primum credo introduxisse Helmont.) sive sint faeces remoratae, sive ingressus intestinorum partis inferioris in superiorem: ubi vero inflammatio & gangræna, & quando superius ingreditur inferius non conveniunt. Videatur præter Helmontium, Henricus ab Heers in observ. oppido raris, item Zacut. Lusitan. lib. 2. prax. admir. cap. 27. ubi dicit & observat quod pilæ plumbeæ 18. devoratae, parvæ tamen, curarint ileum desperatum ex nimia castanearum crudarum ingurgitatione, seu ingluvie, indeque fœcibus induratis, natum. Sic etiam habet exemplum ilei ex pyris crudis copiose injectis. Cæterum globulos plumbeos superat adhuc mercurius vivus, sed copiose injectus, in dictis casibus, nempe ubi utiles sunt globuli. Communiter ad ʒi. præcipitur ut capiatur in oleo cumini, quod quidem non contemno, sed puto tamen quod dosis debeat esse ab ʒi. ad ʒii. vel iv. pro necessitate in qua constitutus est æger: & postmodum simul ac per alvum ejectus est, (nam si minor est dosis tarde & difficulter ejicitur) propinetur olei amygdal. dulc. ʒß. & olei destill. anisi ʒß ut lubricentur denovo ac actuentur intestina. Aliquando Erbenius, cum esset Archiater Polonus, propinavit lbß. ad lb. i. mercurii in obstructione alvi, quæ ad aliquot dies in ægro substitit, ut ergo promptius operaretur, ægrum curui impositum hinc inde cum violentia & impetu trahi iussit, qui postmodum don ù reversus in somnum incidit, mane vevo reperit stercorea cum mercurio vivo in lecto, ut per tres dies illum detinuerat. Qui vult videre quædã de mercurio in iliaca passione conferat Riveriũ in praxi p. 456. item Henric. ab Heers in citat. loc. Fontanum in Conf. & resp. p. 95. Rhod. c. 2. obs. 80. Lysenum in observ. cultro anatomico annexis p. 144.

Et quidem quod mercurius sit melior globulis plumbeis, patet ex Fontano qui in cons. & resp. p. 85. refert macam passionem tandem mercurii ope curatam, postquam tres globuli bombardarum deglutiti fuissent, &c.

Præter mercurium & similia, interne commendantur juscula enellientia, quæ temperant acrimoniam & materias induratas enollunt; quorum historiam habebitis in Riverio. Iulicolum autem naïvæ, aut decoctum flor. meliloti & chamom. item decoctum flor. chamom. & hordei cum melle & nitro, aliud endum Sydenham loc. citat. in principio morbi laudat Zi. sal. absinth. cum succo limon. assumti, superingestia ubinde aqua menthæ. Alias interdum etiam prominentur pingua, intestina lubricantia; qualia sunt, oleum commune, amygdal. dulce. item spirit. terebinth. qui a Petrazo seu egregius commendatur ad sistendam irritationem. Commendatur etiam theriaca in haustu vini ad Zi. assumpta, item syrup. papav. & similia.

Externe commendatur oleum chamomill. extruendum cum pinguedine taxi multum & abdomini probe illitum. Item Zacut Lusitan curat ileum pertinacem ex esu malorum cotoneorum. Ad induratis facibus contractis, aliis omnibus irritis, per sterco vaccinum recens, toti abdomini illitum, curatus est ileus. Veteres, & jam quoque moderni, applicarunt follem, & status copiosos in intestina iniecerunt, cum intumescerent, ut status intestina distendentes scybala a parietibus abscedere facerent, & postmodum facilius, si quæ adessent in intestinis stercorea, removerentur. Uideri potest hunc applicandi modum in Amat. Luit. cent. 1. curatione 100. item in Riverii prax. p. 456. uti etiam in Epiphanio Ferdinand. hist. 74. Sic Zacut. Lusitan. lib. ii. prax. admir. observ. 25. habet tale exemplum ilei ex esu nimio oryza semicrudæ, per applicationem follii curati.

Ubi dolor urget, quod est frequens symptoma, admodum laudatur omne tum vervecis recens impostum. Item specificum est in tali dolore si sanguis vesperilionis iungatur hypochondriis; uti etiam si exuvie serpentum cum oleo rosæ. decoctæ ventri applicentur.

Denique, cum omnia alia videntur frustra, deliberandum est an audiendus sit Barbette, qui Anatom. Pract. p. 148. dicit, aliis nihil juvantibus, apertio abdominis institunda & manuali opera situs intestinorum corrigendus Michael Ettmullerus Collegii Præf. lib. 1.

Curationes posteriores hoc in morbo adhibendas, vide cap. de Colica ex Harthmanno & Hermanno Nicolao Grimm; item cap. de Febribus, in eorum scilicet symptomatis ex Thomâ Sydenham. Hic itaque continuo pergitur ad Consultationes, Observationes & Anatomias inspectiones.

Consultationes.

Iohannes Puthomme post curas aliquot, & intempestivas comestationes, in quibus liberaliter satis genio indulgebat nec mero parcebat rerum domesticarum curam gerens, quod nunquam solitus fuerat, per alvum inferiorem sanguinis copiam profudit. Huic solemniter erat

evacuatio per venas hæmorrhoidales: tandem veritum est ne si immoderatus sanguis ille fluere, de viribus nimium detraheretur. Ei bolo cassiæ & meo iudicio venæ sectione consultum est. Malum tenuit. Non ita longe post queritur de doloribus acerrimis ad ventrem in modo colicorum dolorum ægrum vexantibus. At colica passio non erat ea quæ proprie dicta est, pulvis erat cæcæ, u. inz alias aqueæ alias bile saturata. ad utrumque enim dolor erat fixus ac in partibus illis aut lapis insisteret, aut aliquid simile: nullum ventum statumque per ventrem emittebat. Clysteribus juvabatur, sed momento tantum. Egrediebatur medendo. Indita enemata carminativa nihil aut parum adjuvabatur. Aliquando magnam urinx copiam profudit. Infomes dies noctesque ducebat. per. etui tectus erat: necnon ac si in mineret, & ratocatio, sentiebat dolores summos ad retnum, & thoracem. Regio renum oppressu levi dolebat gravissime. Si quiesceret dolor per tempus breve mox acerbior redibat. Nil vomuit. Si colica passio fuisset aut dolor colicus, vomitus aliqui aut præcessissent, aut adessent, ut ex Galeno patet. Tamen nil tale apparuit. Borborygmi aliqui aderant sine tumore aliquo, ventris non detumuit. Medici inter se digadiabantur de essentia morbi & natura. Alii tanquam colica laborantem variis remediis calidulnis eum fatigabant, agarico, folliculis, syrupo rosarum solut. Denique magnam frigidorum humorum copiam esse rati eo suam convertebant operam, ut calida medicamenta & phlegmagoga præscriberent. Nil est profectum, sed egrediebatur medendo. Alvus vero perpetuo sicca remanebat, & nil reddebat nisi, quod vocat Hippocrates, *ἡδὴ ἀεὶ ἔχον* Flatus vero omnis exitus præcludebatur, immo quod à pharmacopæo relatum est, cum clystima indebatur, recti intestini pars extrema contorta paulum videbatur, & non nisi vi impiebat. & glans immittebatur. cataplasmatibus anodynus dolor levabatur. Dicebat se tumultuantes quosdam flatus sentire, non quomodo in colico dolore, sed esseri erant quidam flatus divellentibus membranas, & dolores & profundos in mesenterio excitantes, & sublimis in peritonæi tunica, unde minimo digitorum appressu ejulabat præ dolore. At in colicis doloribus nil tale contingit. Nulla per os excretio fiebat. Alii autem Medici, & multo acutius, veriusque observata victus ratione, quod multis & generosis vinis assuescet, genio indulgisset, susque deque habita dixit usus fuisset. Item observato pulsu inflammationis cujusdam in toto mesenterio latentis indice. Præterea observatâ illa per anum sanguinis excretionem, quæ repressâ aliquantum fuisset, quod ne immodica foret Medici vererentur, cum fortassis melius fuisset cum nonnulla virium lætura assatim adhuc sanguinem effluxisse. Omnibus (inquam) iis observatis collegerunt in toto ventre inferiore velvulosam esse quandam affectionem ab inflammatione quadam, aut potius calore concepto in toto mesenterio & intestinis ex olida putrique materia flatus malignos excitante, unde torminosi dolores & ructus perpetui, & stomachi sine vomitione occultæ subversiones. Quæ materia reses, & ignava, & pigra erat, ea sensum doloris modo gravis, modo pungens.

ris in profundo præsertim ad renum regionem excitabat: elevatus vero ex eadem malignus spiritus vagos erraticosque *πρίον* provocabat. Neque vero materiam istam pigram necesse erat efferri, sed in parte in qua residebat dolor excitabatur, qui ab eadem parte tanquam radice sese sensim insinuando ac propagando in partibus vicinis dolorem excitabat. Hanc doloris ideam, Galenus videtur vocasse *πρίον διὰ τὴν ρίζαν*, vertunt turgentem: qui nimirum a parte primo affecta, veluti à radice incipiens celeriter in partes adjacentes traducitur. Nam causa morbi uno loco conquiescit. Uel enim dolorem *πρίον* vocare possumus, infixum; sed tamen alix partes, præsertim si qua sit continuïtas affici possunt. Causa illius doloris, vel est copia humorum confertim ingruentium, vel spiritus flatuosus. Sed revera, vel ratione ægrotantium, rem non intelligentium vel rei ipsius quæ per se obscura est implicita, difficilis admodum est cognitio speciei doloris. Dolores autem istos reciprocos, revolutos, reductos, Hippocrates in Prognost. vocat *ῥεφραδίας* atque illo aphorismo mihi videtur quodammodo adumbrasse morbum quo miserrimus iste æger cruciabatur: quibus (ait) lumborum tenues & diurni dolores & ad hypochondrium reducti, revolutique. & ciborum aversio cum febre, dolor his valens contentusque ad caput perveniens, cito cum quadam convulsione interimit. id est: sæpe circum præcordia & mesenterium residet & restagnata materia olida putrisque; quæ si contingeret aut cholera morbus, aut vehemens alvi fluor, nullam molestiam plane afferret: sed cunctando varia inducit symptomata, initio quidem exiguos & torminosos excitat dolores, sed sensim atque sensim ac magis collecta, exitu prohibita majores malignitatis nervos nata tandem fastidium cibi accersit, & febrem: rursus febris materiam deteriore reddidit. Tandem aliquando effera magis reddita quaquaversum erumpit, & suæ malignitatis notas edit, prout in hanc aut illam respicit partem. Quod certe huic ægro contigisset, si febris major fuisset, quæ materiam deteriore reddidisset, & nisi materia coercita intus fuisset.

Præterea frequentes clysteres injecti, medicamenta præscripta, tametsi minime idonea, tamen impediverunt quominus exaggeraretur humor, taliaque symptomata eaderet tandem, qualia in prothetis ab Hippocrate describi diximus. De doloribus *ῥεφραδίας* dictum in definitione.

Aut certe eum morbum speciem quandam volvuli esse dicemus, sumpto nomine volvuli non stricte, ut apud Hippocratem sumitur; Ait enim phlegma à capite descendens volvulos diurnos excitare, id est, dolores iliacos, & volvulosos, & torminosos, in quibus imus venter & hypochondrium utrumque dolet. Nec enim credibile volvulum morbum esse diurnum, nisi improprie sumatur. cum itaque intestina ob flatum nonnullos, tum ob copiam humoris maligni in mesenterio & intestinis collecti dolent, & totus venter, eaque torqueri quodammodo, convolvique (Grece *ἀνίσταται*) videntur, volvulosa dicitur passio, ut ex Hippocratis loco superius adducto pa-

tere potest. Simile quid apud Hippocratem legere est in lib. de affectionibus, ubi triplicem volvulum constituit, unum hyemalem, ut cum quis nimio viâ calido & humido utitur, & non sese deambulationibus dedit, &c. Alium arcuatum, qui ætatis tempore in regionibus palutribusprehendit, & dicitur volvulus, in eoque æger auruginolus fit. Tertium hæmatitem & autumnalem, quem eodem loco describit. Nomine volvulorum intelligit quosdam dolores torminosos volvulososque ob pravam dietam aut temporis intemperavitatem nascentes, qui pro diversis affectibus & temporibus in quibus pullulant. Varias condiciones & nomina sortiuntur. Æger noster hæmatite & autumnali volvulo præhendi visus est. Nam ut ante demonstravimus, sanguinis sæculenti residuum erat aliquod ab excretionem quæ præcesserat, à quo prima mali labes. Et tale quid Hippocrates visus est observasse in Coacis, dolores ex lumbis diuturniores febris tertianæ modo exacerbantes (id est quorum dolorum non semper est acerbitas, sed unus dici dant inducias ac si motum quandam haberent, tertianum) grumolum sanguinem egerere faciunt; id est, dolores isti excitantur a conclusa in ventre materia nigricante, adusta, & veluti sanguine sæculento existente, quorum remissio non fit, nisi ejusmodi materix sæculentæ, aut ob putredinem, aut moram diurnam nigritiem adepta, è corpore hat exclusio. Quæ omnia diligenter sunt notanda. Et Fernellius dolores ventris non absimiles doloribus colicis (cum tamen non sint) agnovit quodam circuitu per iodoque repetentes in quibus ægri miserè conticantur. In hoc ægro dominabatur calor præter naturam, flatuum malorum, quales in libro de flatibus describit Hippocrates, copia & vis excitabatur, meatus non erant liberi, unde exitu prohibebantur, & revolvi cogebantur ad superiores partes: denique materia non dissipabatur, ideo flatum non emittebat, nec cum bombo, nec sine bombo, & stridore: de quibus flatibus Hippocr. in Prognost. flatum emittere sine bombo & stridore, saluberrimum: quod significetur vis caloris facile materiam dissipantis; item libertas meatuum: & tamen optabilius una cum bombo flatum excludi quam illuc revolvi: revolvi autem grece dicitur *ἀνίσταται*. Itaque ad etymon & proprietatem nominis *ἀνίσταται* alludit senex. Porro revolvitur flatum, cum non exit, aut incendio partis, aut depravato motu intestinorum, proprio autem viciatos: & ista flatuum devolutio in tenuibus intestinis tormina parit, alvum pulsant, nauseam excitat, & si ad diaphragma appellens respirationem viciat: quæ omnia in ægro paruerunt. Nam & tormina in tenuibus intestinis excitata sunt, & nausea aderat, & aliquando species quædam suffocationis; quæ omnia ob flatuum revolutionem ad superiora contigerunt; revolutionem autem peperit & incendium, & motus depravatus intestinorum. Horum quoque demonstratio peti potest ex lib. 4. Aphor. cum ait: quæ ista suspensa obmurmurant, lumborum dolore superveniente alvi humectantur, nisi flatum erumpant, aut urinæ profluvium consequatur. Hæc vero in febribus. Murmur etenim fit ex flatu juncta humiditate; si non separaretur flatum à

materia, alvus necessario humectatur; si separatur, alvus non humectatur, sed aut flatus, aut urinx excretio fit. Et quod addit, in febribus; considerat vel febres symptomaticas, vel febres essentielles, symptomaticæ sunt ut in pleuritide, peripneumonia, in quibus si murmur oriantur, aut suspendeant hypochondria, non perinde tamen aut flatus erumpunt, & murmur ita contingit, ut aut urina fluat, aut alvus feratur. Si enim murmur adsit, non est quid secundum naturam, sed tantum quid symptomaticum; propterea humiditas murmuris causa, naturâ duce non facit aut alvi aut urinx profusum. Sed in febribus, essentialibus quia non pars aliqua peculiariter laborat, sed totum genus venosum, & cononua naturalis laborat, vitatur coctio, hinc à cruditate flatus surgunt cum murmure: hinc naturâ motu, aut si flatus erumpunt, aut urina fluit, aut alvus. In agro nostro urina aliquando largè fluxit, unde diabetæ metus esset, factaque humidæ materiz erat secretio ad renes; dolores tamen non cessaverunt, quia flatus non simul eruperunt: quod si erupissent, facta fuisset dolorum solutio.

Itaque intemperies erat calida flatus excitans, morbus intestinorum depravatus, augustinia venarum. Idemque contingeret quod & Galenus contingere ait in melancholia flatuosa; ut legere est lib. de locis affect. sed quæri potest, quomodo flatuosa esset alvus inferior, cum calor esset multus, immo & essentia morbi in calore & intemperie & phlogosi constituitur? Nam ex Hippocrate, icterici non valde sunt flatuosi, ob dominatum caloris acris, & paucitatem crudi humoris qui flatuum est materia. Nam tametsi in 4. Aphorismor. habitualis & hæctica intestinorum & ventris inferioris dispositio hydropis sicci causa sit, & inflationis ventris ipsius, non tamen ista habitualis dispositio à calore est, sed à frigore; quanquam tantum non est quantum in reliquis hydropis speciebus. Dicemus ictericos quidem non esse flatuosos per se, sed per accidens, nimirum si partium ad ventrem attinentium sit imbecillitas. Maxime autem imbecillitas contrahitur ob paupertatem caloris naturalis, & dominatum caloris contra naturam omnia pervertentis; immo & omne alimentum in corruptelam & malignum spiritum convertentis. Quod si corpus in quo intemperies est calida ab omni crudo humore immune esset, flatuum quidem ilias non gliceret: sed si qua crudorum succorum quantitas sit, facile adaugetur ob calorem contra naturam. De ictericis an flatuosi sint, an non, dictum à nobis in comment. de Definitionibus Medicis. Cæterum, indicavit abunde curatio qua ex causa morbus foret. Nam cum inmedicabilis per multos dies permansisset, usurpatis præsertim validioribus medicamentis rerum quæ sequuntur, usu plurimum est adjutus. Primum reliquis gravioribus enematis, in blandioribus flatuum est. Vena secta ter, ut inflammatio tolleretur. Sanguis inflammatus & corruptus. Juscula temperata & insulsa data sunt. A vino temperavit. Tertio die in balneum descendit temperatum ex aqua dulci. sequenti die data tabella diacarth. ex jusculo pulli ad diacrydii vim debilitandam. Deinde rursus in balneum

descendit. Paulo post morbus cepit humescere, phlogosis temperari, liberari obtinuit, flatus erumpere: erumpentibus allevatio multa. Deinde syrupo violato sæpe usus & potione sequenti.

℞. Sem. melonum, cucum. an. 3. i. s. sem. citrii & fenic. an. ʒi. granorum alkek. & Kerne an. ʒi. malv. bisinal. & scabios. an. m. j. cinnamomi ʒi. fiat decoct. ad dosim. In colat. dissolve vini hippocratici ʒʒ. succi amygdal. dulcium ʒi. s. utatur longe à pastu.

Repetatur idem poculum sæpe.

Item lotus post balneum adhibitus est sequens.

℞. Malv. bisinal. an. m. i. florum chamæm. melilot. summit. aneth. an. m. sabynth. pont. menthæ, an. m. s. semin. lini ʒi. cypper. scenan. an. ʒi. ben. albi, ben. rub. an. ʒi. fiant sacculi qui bulliant in aqua & vino pro lotu ventris totius & ventriculi, cum spongia.

A lotu liniatur oleis sequentibus.

℞. Butyr. recent. ʒii. mucag. sem. lini & altheæ an. ʒi. pulver. mallich. & cypperi, an. ʒi. ol. absynth. mallich. & chamæm. an. ʒi. ol. rotati ʒʒ. aceti ʒʒ. misce, fiat litus ad ventrem totum.

Item adhibitus pullus gallinaceus & catulus ventriculo.

His remediis levatus. Cessantibus ventris doloribus gravissime illi doluerunt partes externæ, præsertim genua & pedes.

Annotationes.

1. Si verè morbum illum nominare velis, speciem quandam cholerae sicce appellares, de cuius potis & signis dictum est ante.

2. Urina er. t. pene cruda & incocta, quod declarabat incendium renum præproptere sereni attrahentium: & suppressionem humoris biliosi quæ suppressa malum deterius reddebat.

3. Est ubique sunt icterici sunt flatuosi, est ubi non sunt flatuosi, secundum sententiam Hippocratis. Nam cum sit icterus per inflammationem partium, nec pituitosa crudaque materia subest quæ in flatum vertatur, tunc absunt flatus. sed si aut præcesserat congestio materiz pituitosa, aut chyli propter pravam limatum hepatis dispositionem, corruptio sequitur, etiam in ictero potest esse flatuum multitudo. Uel dicemus ex agitatione materiz crudæ, & caloris contra naturam excitatos esse flatus malignos. Idemque factum esse quod in generatione flatuum, de qua in nostris Definitionibus. Galenus comment. in partic. 2. lib. 4. Acusor. ait à spiritus interceptione non inferri flagrantem hypochondrio affectionem. Quod verum est. sed si gravis in hypochondrio dispositio potest flatus excitare.

Quod mirum est quiescentibus post balnea doloribus ventris & renum, cepit dolere tibias & malleolos, adeo ut per omnes noctes clamaret, nec ulla ratione sedarentur. Hunc morbum graphice explicat Hippocrates, lib. de intern. affect. *Gulielm. Ballonius Consil. Medicin. lib. 1.*

Iliaca Passio.

Reverendiss. Abbas 40. annum agens, temperamentum totius & jecoris, calidi & sicci, gracilis habitus, multis abhinc annis hypochondriacus. Theologicis studiis addictus, & rei quoque œconomice quammaxime incumbens, multum comedens, & vina meraciora bibens, nec vel brevis omnino jejunii patiens, natura enim vorax propemodum observatur, parum tamen concoquens, pituitosæ proinde, & crudæ materiæ vomitibus jamdiu obnoxius, ignava tamen valde atque adstricta alvo, tandem diebus proximis elapsis Venetias petens, negotiorum sui cœtus gratia, Conchyliorum & Ostreaceorum copia se infarsit, vinaque Cretica bibit, suppresso interim consueto crudæ & pituitosæ materiæ vomitu, alvoque adstrictiori quam antea, & stercora sicciora egerente, quinimo tota hebdomada præterita omnino otiante, adacti in ventre rugitibus intestina instantibus ac distendētibz. Cujus rei causa pilul. ex Aloe cum Mastich. ubi familiares deglutiit, quas tamen nulla evacuatio subsequuta est, ideo ad clysterem confugit, quo pauca & exsiccata, atque materia pituitosa involuta dejecit. Cum autem dolores summum ventrem torquere inceperint, magis magisque invalescentes, cum vomitu ferè continuo & vehementi heterogenæ, materiæ, biliosæ scilicet atque pituitosæ, Medicum domesticum accivit, qui statim Potionem ex Syr. & Mel. Ros. sol. præscripsit, quam tamen illico Pat. evomit, quibus perterritus, statim nre quoque, casu tunc temporis Venetiis agentem, in consilium advocavit.

Licet nonnunquam Colicus dolor cum Iliaco, & hic cum illo confundatur, ut videre est apud Gal. dicentem. Cum sit omnis Volvulus periculosus, qui in sublimioribus intestinis consistunt, iis qui in crassius sunt deteriores, ut qui contagio jecur & lienem afficiant. Cui subscripserunt quoque Aret. & Trall. quinimo & Diocles Caryllus apud Celium Coli intestini dolorem Ileum vocavit, potissimum vero id experientia confirmat, qua videmus stercorea in seroto obdurata, Coli inflammationem excitare, & postea Iliacam passionem, cum fecum vomitu, cuius opinionis fuerunt quoque Petrus Salinus, Mercurialis, Mercurialis, & Fernelius, qui vidit Colon pituita repletum in Cadavere Ileo defuncti. Nihilominus Iliaca passio non datur, nisi Ileo intestino affectio, quod hisce casibus sit solum per consensum, sicut primario semper dicitur in legitima atque exquisita Iliaca passione, quæ non ex ab Ileo intestino ossi illi adhaerente habet, seu à verbo Græco Eileo, hoc est misereor, ob levia & miserranda symptomata illam comitantia unde Miserere mei appellata quoque fuit Hæc autem esse affectionem Abb. Reverendiss. divexantem demonstrat ejus proprium & inseparabile pathognomonicum signum, nempe quod nihil ad inferiora descendat, licet Medicorum vulgus falso sibi persuadeat. hoc potius esse stercoris vomitum: Gal. enim ita de Ileo locutus est. Et vomitus non semper adest, sed quando exitiales sunt, & si vehementius distorqueantur, stercus ascendit, atque singultunt. Quod alibi repetit dicens. Vomitus autem stercoris

advenit eis qui exitialiter se habent, & Ileo sub finem morbi conspiciatur. Id autem confirmat hystoria ab Hipp. allata de Muliere apud Tisamenum, quæ tertia die volvulosa, sine ullo vomitu obiit. Neque obstat, quod in eadem dejectiones tenues, crudæ, & pauca fuerint, cum enim inflammatio fuerit in superioribus intestinis, excrementa, quæ intra inflammationem hærebant in crassioribus, attenuata & liquata, paulatim tenuia, cruda, & pauca descenderunt, verum nihil amplius foras expulisset, si diutius affectus perdurasset. Quod comprobatur quoque Hipp. dum Ilei ex inflammatione curationem proponens præcipit, educenda esse feces intra inflammationem stabulantes glande ex Melle lalle Taurino illita, cui subseripit quoque Petrus Salinus. Sed præterea Iliacam passionem confirmat doloris situs atque casu nostro assidui quoque vomitus, ob Ileum Ventriculo proximum, & potissimum rei potulentæ, quia potus innatans facilius vomitu quam cibus rejicitur, Quæ tria signa Gal. ipse quoque confirmavit.

Causa vero hujus affectus multiplex esse potest, à casu tamen nostro inflammatio excluditur, quia febris non adest, excluditur item durus tumor, quia paulatim affectio facta non est, nec abscessus locum habet, quia nec diuturno tempore, nec cum sensu doloris illius partis genitus est affectus, quare superest nobis consideranda fecum retentio, necnon pituitosæ & crassæ materiæ accumulatio. Et quidem ex una parte temperamentum totius & jecoris, calidum & siccum, totius & abdominis præsertim, gracilitatem, consuetam alvi stypticitatem, meracioris vini familiarem usum, atque tandem fecum diuturnam retentionem consideremus, hanc esse hujus passionis causam, summa & cum ratione concludi posse videtur. Si vero ex altera consuetam Pat. Reverendiss. voracitatem, quotidianam crudæ & pituitosæ materiæ generationem, & suppressam ejusdem per vomitum evacuationem, una cum potrema Conchyliorum & Ostreaceorum ingluvie expendamus, neque hanc certe excludi posse cognoscemus, atque utramque ad Iliacæ hujus passionis ortum conspirare, asserere cogemur, potissimum cum utriusque præsentia signa hæceamus. Et enim fecum retentio non statim, sed multis post diebus, mordacitate scilicet acquirita, dolores excitare solet, tuncque sursum halitus elevarunt, & cum vomitu primo bilioso, mox etiam pituitoso per os excernuntur. Et licet a pituitosa materia, utpote humida, dolores vehementes inferri non possint, attamen invalescere capiunt, quinimo graviores evadent a flatibus copiosis & acerbis, ob stercoris præsentiam intestinum distendentibus ac vellicantibus. Neque pituita induratis fecibus faciliem exitum parare possunt, quia a fervido viscerum calore crassifacita, & ipsa ad motum inepta reddita est.

Hanc vero causam pituitosam admittit quoque Avic. capite proprio, imo & Hippocrat. dum dixit, quod, Quibus ex stiliiduo urina Ileos supervenerit, in septem diebus pereunt, nisi febre superveniente satis urina fluxerit. Nihilominus eam ablegare Gal. conatus est negans hunc Aphorismum esse Hipp. quamvis postea in progressu illam concedat dicens. Difficulus

id evenire posse, at si placeat, & ista causa ponatur.

Passio Iliaca ex se acuta & periculosa censetur ab Hipp. ipso, quam fœtidam & mortiferam appellavit Oribasius, ideo Ab Ileo vomitus, singultus, desipientia, vel convulsio, malum. Comparative tamen considerata, minus periculosa est quam quæ ex abscessu, duro tumore, aut inflammatione procedit. Neque nos prorsus deterreat, nec spem omnino abscindat fœcum retentio novem dierum, siquidem Rhulius historiam narrat mulieris paralyticæ, quæ integri mensis spatio ventrem non exoneravit, sicut Nicolaus de quadam gravida aliam refert, quæ 45. dies nihil per alvum deiecit, quæ tamen nec in Iliacam passionem inciderunt, minusque perierunt. Magni tamen facere præsentem affectum nos cogunt Iliaci dolores cum vomitibus, verendum enim ne alia duo præva & exitiosa symptomata contingant, difficilis videlicet respiratio, & fœcum per vomitum excretio, præsertim cum ad passionem hanc producendam duplex causa concurrat.

Statim itaque propriis & efficacioribus remediis sedulo agendum, & si medica intentio ab essentia est elicienda, omnium primo adversus fœcum & materiæ pituitosæ retentionem convertenda laxantibus & subducentibus. Quoniam vero urgent, & in posterum magis urgebunt dolores, Anodyna, & Narcotica quoque videntur usurpanda, licet in hoc peracuto, imo acutissimo affectu locum non habeant, præ temporis brevitate. Nam dicebat Galenus Non adhibeantur opiata, nisi post adhibita alia medicamenta, dolores enim sedant, sed dispositiones non sanant. Causis itaque contraria remedia opponenda, quæ quoniam sunt fæces retentæ, & materia crassa atque viscida pituitosa cum copiosis flatibus, ideo primo fæces internis emolliendæ. Secundo dissolvendæ & evacuandæ, & si res pro voto non succedat; Tertio intestina ventro replenda & inflanda, ut facilius dura stercora devolvantur. Inde quarto statim Clyster injiciendus, qui fæces dissolvere & colliquare possit: atque interim crassa & viscida pituita attenuanda, & una cum fecibus evacuanda, flatulque discutiendi. Quæ omnia attigit Hippoc. 3. de Morbis.

Primo itaque exhibeatur statim Oleum Amygdal. rec. ad ʒv. cum ʒiiii. Olei de Lino, ob præsentiam pituitosæ materiæ. Sex vero aut septem exactis horis, in Balneum descendat ex Oleo paratum, cui suffundatur decoctio emolliendi & laxandi facultate pollens, quam etiam Oleo impertiri possit. Paretur autem ex Aqua dulci, alterata foliis Malvarum, Pariet. Viol. Radic. Alth. & Lil. alb. sem. hordei, & fœnugr. Balneo vero egressus Pat. & deterfus, assumat Flor. Cass. recentiss. extractæ ad ʒx. à qua, si vomitus nullus fuerit metus, bibat jus emolliens, Malvis scilicet alteratum: inde somnus permittatur, & tribus aut quatuor horis ab assumpta Cassia, cibus offeratur, exigua quidem copia, sed multi nutrimenti: & à cibo rursus somnus capietur, ut aliis quatuor post horis Clyster fæces emolliens & evacuans injiciatur, ita parandus.

ʒ. Decoct. Malv. Betar. Mercur. Chamæm. ʒbi. Mel Ros. fol. Ol. Amygd. an. ʒiii. Salis Genumæ ʒii. Vitell. ovor. n. iij. pro Clyst. His peractis,

superfedeendum opere, neque enim ad valde attenuantia ratione pituitæ devenire licet, ut ad vinum generosum, cum Aqua vitæ, Elixir vitæ cum Aqua Cinnam. præscripta à Mercato, & Ietro Salio in hoc affectu, sed potius iterum laxantia, Ol. scilicet Amygd. recens Ol. Amygd. amar. vel paucis Cretico commistum, cum Matthiolo repetenda, & Pat. rursus in Balneum immergendus.

Quibus si non cedat affectus, ad tumefaciendia, & stercus induratum dimoventia, necnon suo pondere extrudentia erit confugiendum. Quare folle fabrili, cannula per sedem introducta, intestina ventro implenda & insufflanda, mox Clyster dissolvens & moderatè irritans injiciendus, qui peti poterit à Scribonio Largo Medicinæ Principe, Lib. de Medicam. Compos. 118. propositus, & ab eodem feliciter expertus, dum Servum cujusdam Vnguentarii, stercus per os efficientem liberavit. Paratur autem ex Oleo, in quo decocta fuerit Ruta, addito Apironitro, ad fœcunciam, valet enim flatum discutere, & fæces dissolvere, ut asserit quoque Gal.

Quibus non sufficientibus, ponderosa sunt usurpanda. Sic Trall. proponit plumbum devorandum. Mercatus Chalybem, Pareus Argentum vivum, quod tamen remedii genus desumpsit à Mariano Sancto, qui præbebat Mercurium vivum, ad libras, in Aqua calida, quo multos vidit in Ileo deplorato morti proximos liberatos.

Hæc autem sunt efficaciora & selectiora remedia, quæ Sapientissimo Viro proponere potuimus, quorum recto, & opportuno usu Rever. Abbati in adeo truci malo, sanitas reparanda; congrua addita victus ratione, quam antea innumus. Vno omnino non interdicto. Raym. Joh. Foris Consult. Ti. Cent. 2.

Medicatio viri, Iliaca Passione Laborantis.

Vir 36. annorum, in gluvici deditus, cum varii generis malis cibis longo tempore esset usus, incidit in intolerabilem doloris cruciatum; totum quidem ventrem circumdantem, sed maxime in umbilicali regione, & circa hypochondria, ipsum miris modis torquentem. Accersit cibi fastidium, & deinde etiam vomitus, quo nec cibus, nec potus, retineri potest. Multos corruptos humores per superiora excrevit. Alvus ita adstricta est, ut nullum flatum, necdum quicquam aliud, per inferiora excernere queat.

Afficiuntur in hoc agro ventriculus & intestina, ac inter ea potissimum intestinum ileum. Idque ex vomitu & ingenti illo dolore, totum quidem ventrem, sed regionem umbilicalem & hypochondriorum, ubi intestinum ileum situm est, potissimum occupante, est manifestum.

Morbus, quo hic æger affligitur, est intemperies ventriculi & intestinorum, ac præcipue ilei acris & putrida, & forsan eorum etiam angustatio; quæ dolorem crudelissimum in iis partibus, ac præcipue in ileo, ac præterea corruptionum humorum per superiora copiosam excretionem per inferiora impediens illius, vel Iliacæ passio, à parte præcipue affecta, vulgo appellari solet.

Causa procacitica hujus morbi est ingluvies illa, quæ varii generis pravi cibi diu à viro hoc ingestifuerunt. Pravi verò & corrupti humores hinc in partibus affectis, jam commemoratis, geniti, ibique existentes, & cum sanguine mixti, & per corpus diffusi, antecedentem hujus morbi constituunt causam.

Pars vero eorum ab illis imbibita, eaque suâ acrimonia & copiâ vellicans, & forsan etiam crassitie suæ, vel convolutionem eorum pravam excitando, angustans, intemperiei hujus, ac doloris crudelissimi; nec non excretionis per superiora institutz, per inferiora verò, ob spiritus animales, qui in libras intestinorum oblique ascendentes fortissime ab irritatione hic factâ fluunt, penitus impeditz; itemque cibis & idii, continens est causa.

Periculum est, ne hic morbus stercoris vomitum inducat, & agrum syncope, doloris vehementia inductâ, occidat.

Diligentissima itaque Curatio mox est adhibenda; Eaque in humorum pravorum per inferiora educatione, doloris sedatione, & intemperiei per contraria correctione consistet. Mox itaque injiciatur talis clyster.

℞. Malvæ, bismalvæ, mercurialis, betæ, an. m. j. Rad. althææ ℥ii. Flor. meliloti, camomill. an. m. j. Caricar. ping. ℥i. Decoq. in jure pulsi ad lib. iß. in Colaturâ Dissolve electuar. diacatholici, diaphanici an. ℥i. Vitelli. ovi No. i. butyri, ol. anethini an. ℥i. s. Salis comm. ℥i. Misce f. Clyster; mox injiciendus, & quam diutissime æger poterit retinendus, & aliquoties reiterandus.

Ubi per inferiora excretio aliqua facta fuerit, tale per os dandum erit.

℞. Cassiæ recent. extractæ. ℥ß. Electuar. diaphanici, diacatholici an. ℥ii. Olei anisi. ℥ß. Aq. decoct. hordei q. s. misce f. Haustus brevis.

Per os etiam postea exhibeatur oleum amygdalarum dulcium ad uncias duas, cum jure vervecino mixtum. Venter foveatur tali fomento:

℞. Fol. malvæ, althææ, violariæ, an. m. iß. Flor. camomillor. meliloti an. m. s. Sem. lini. anisi, anethi an. ℥i. Decoq. in aq. comm. q. s. pro Fomento. Et postea venter oblinatur tali oleo.

℞. Ol. anethini, camomillor. Amygdalar. dulc. an. ℥vi. Misce. Doloze perseverante exhibeatur talis bolus.

℞. Theriacæ Andromachi ℥ii. Rêquiei Nicolai ℥ß. Laudani opiati gr. iiii. Cum syr. de papav. alb. q. s. f. Bolus. In clystere etiam antea proposito addi poterit philonium Romanum ad ℥i ß. vel ℥ii.

In victus ratione, Aër, sit calidiusculus. Cibibus eupeptis & euchymis, ex jusculis. Potus sit cerevisia & vinum mediocre. Somnus sit longior. Alvus respondeat arte, vel natura: Tristitia vitentur.

Medicatio Faminæ ileo, Ex Bubonocèle, Laborantis.

Mulier quadraginta annorum; jam à multis annis ex partu in dextro inguine herniosa, incidit in diarrhæam; qua, dum alvum frequenter deponere cogitur, intestina, quæ ligamenti externis artificialibus in loco suo retinere solebat, in inguen cum tumore sunt prolapsa; tumque ea ob duritiem reituentem, in locum

reduci non possent, incidit in intolerabilem ventris dolorem, circa umbilicum ipsam potissimum torquentem, ac cum vomitu enormi & continuo variorum excrementorum, imo ipsarum etiam fecum alvi, conjunctum. Jam à biduo hoc torquetur malo, multaque remedia per os & anum sunt adhibita, sed ea hæcenus fuerunt irrita. Adest febricula.

Afficitur in hac ægra inguen dextrum, quod ex ejus tumore; & intestina, quod ex dolore ventris, circa umbilicum ipsam potissimum torquente, & tumorem in inguine faciente, nec non ex enormi illo vomitu, est manifestum.

Morbus, qui ipsam affligit, est tumor inguinis dextri, ex intestinorum illic prolapsu ortus; qui intolerabilem ventris dolorem, vomitumque excrementorum, imo etiam ipsarum fecum, enormem & continuum faciens, Ileus ex bubonocèle appellari solet.

Causa procacitica hujus morbi est diarrhæa illa; qua ægra alvum frequenter evacuare, corpusque inclinare coacta, intestina cum copiosis fecibus frequenti illo motu in inguen deturbavit; eaque ibi hærentia, atque contorta ac pressa, partesque vicinas distendentia, ac dolorem in iis excitantia, descensumque excrementorum impediencia, continens hujus morbi & symptomatum sunt causa.

Ab illaplis enim intestinis factus est inguinis tumor & tensio, & intestini clausio; indeque dolor; & à dolore pori in cerebro ita fuerunt affecti & spiritus ita in eo determinati, ut illi in inguen multos impellerent humores, tumoremque & dolorem ita ibi augerent, ut tumor induraretur, & dolor intolerabilis evaderet: in fibras vero intestinorum oblique ascendentes spiritus continuò ita influerent, ut ea, versus superiora magno impetu ab iis contracta, quicquid in iis continetur, magna vi per vomitum continuò ejicerent.

Morbus hic periculosissimus est. Metus, enim est, ne intestini illapsi fiat inflammatio, ex qua oriatur gangræna. Et præterea, ne ex vomitu & dolore vires ita prosteruantur, ut ægra in lethalem incidat lipothymiam.

Celerrima itaque, quantum fieri potest, Curatio morbus est impugnandus: quæ tota in intestini reductione, & doloris sedatione consistet. Itaque tali decocto emolliente & flatu discutiente inguen dolens continuò foveatur.

℞. Fol. malv. flor. camomil. anethi, Sem. lini an. Mi. sem. cumini ℥ii. Concoquantur in lacte bubulo pro fotu, quo spongiæ imbuantur, eaque calidæ adhibeantur, & leni pressione manuum reductio intestini tentetur.

Dum autem hoc agitur, ægra ita in lecto erit collocanda, ut caput valde sit declivè, crura vero elata.

Si vero hac ratione intestinum non potest reduci, cutis & peritonæum in inguine, ad intestini illapsum restitutionem, chirurgiæ erit aperienda; & intestina reducta, ope subligaculi, in abdomine retinenda. *Henricus Regius apud Theodorum Craanen Medication. lib. 3.*

Observationes.

Pro ileo.

Imperavi ut ℥ii. amygd. d. rec. sumeret; hæc uñtè valet & multis profuit; dedi autem calidè, non

non tepide ne evomeret. Petrus Forestus. obs. 16. lib. 21. De mesenterii & intestinorum effectibus.

Mulier quædam Romæ cum deplorata haberetur, & stercus per os evomeret, neque ullis remediis sanari posset, tandem sumpsit omni die jusculum malvæ, & sanitati restituta fuit: ut constat ex arcanis Cornelii Medici Roterodamensis: nihil æque stercora dura emollit, quam juscula pinguis. Idem Schol. obs. 21. lib. 21.

Quidam ileosum conclamatum a summa desperatione liberavit gallinaceo fimo ex vino albo vel syrupo epoto. Idem Schol. obs. 21. lib. 21.

Vir quidam ileo laborabat cum vehementissimis doloribus supra & intra umbilici regionem, & gravibus vomitibus non solum ciborum sed & stercorum, & alvi per septimanas octodecim continua suppressione: ego hujus viri misertus, curam ita institui.

℞. Olei sem. lini ꝑvi. troch. alhand. ꝑiβ. M. & fiat ebullitio parva. Postea inunxi umbilicum bene hoc clystere, ac reliquum per siphonem injeci: hoc facto post duas horas cœpit egere stercora durissima, mucosa, purulenta, foetidissima, varia & plurima, ac rectè mox habuit, cibum & potum non evomit, non amplius doluit: & quod mirum, intra diem sanatus est. Martinus Rulandus. curat. 99. cent. 10.

Cum per superiora multa evomeret, per inferiora verò nulla remitteret; post plures injectos clysteres, quibus nihil egressum, ad hoc artificium devenimus, quo scopum obtinuimus, & ægrum ab orci faucibus liberavimus. Follem fabrillem ano indidimus, & eo statim in ventrem immisimus, quo extracto, infusum emolliens, cum troch. alhand. paratum, per clysterem subito ejaculari fecimus, quo stercora illico dissoluta ac colliquata fuere, & demum educat: sic enim in hoc morbo operandum suadet Hippocrates. Amatus Lusitanus. curat. 100. cent. 1.

Cum ad consilium biduo ante mortem vocaret, negaretque medicus chymicus ipsi sanguine junctus se alterius Medici præsentiam passurum, fusi qui me consulebat fratri, darent patienti argentum vivum crebro per corium transitu perurgatum, quod sæpè vidi sine noxia, momento citius, eductis secum obviis facibus per intestina transisse: à cuius usu, ne frigore suo interanea læsiße posset, statim clysterem ex puro Cretico vino injiciebam: sicque aliquot colicinia tensione morituros, cum Dei gratia liberavi. Sed Medicus maluit hominem in certa morte relinquere, quam remedium, quod inexpertus judicabat periculi plenissimum tentare. Pilas ali in hoc casu aureas, argenteas aut etiam si illa desint, plumbeas præscribunt: sed argentum vivum pilis omnibus expeditius, velocius, intestina percurrit, perpurgatque: vivunt hodie multi, qui norunt centurionem non ita pridem mortuum, qui cum princeps commensabundus, in media comperatione, risum captans, sellam argenti vivi in capaci poculo vino pleno propinandum curasset, ipse obducto amygdalide vase, præsentibus omnibus, neque enim, adhuc sibi bibens, fugere poterat, atque in cachinnoseculis, lægillime & cum sœnore pridie cœnt, per anum innoxie reddidit: ultraque triginta annos sanus vixit, dicens cum inter pocula rideretur se clysteris compendium fecisse: alius idem evenisse scio. Hemicus ab

Hærs. observ. 2. lib. 1.

Cogente necessitate ad mercurium erat condescendum, quod a Massaria Capivaccio, Parzo & Mariano Sancto ad athera commendatur, in hoc morbo est remedium indicatissimum, nam juvat mirum in modum ratione ponderis & fluxibilitatis & penetrantiz, neque ejus malitia timenda est, nam non est vere venenum, exit enim facile e corpore, in Gallia Cisalpina, inquit Matthiolus, exhibetur mulieribus ægre parturientibus, & pueris etiam in casu verminoso: quare tuto descendere possumus ad hoc remedium urgente necessitate. nam extremis morbis extrema sunt applicanda remedia. E. iphanus Ferdinandus. hist. 74.

Dux quidam strenuissimus cum post lulum parvæ pilæ, sudore madidus, sitique oppressus, aquæ nive nimium infrigidatæ calicem ebiberet, ilico ab ejus potu, in sublimioribus intestinis torsionem sensit: cum intentissimo cruciaretur dolore, multaque jam tentaret efficacissima auxilia, iisque necesse, ructum crepitumve emitteret, imo vomitionibus sædis oppressus in malis esset, nullo alio præsidio quam libræ hydrargyri potu potuit levare: à quo & fæces excrevit, & ex dolore melius habuit; quo sedato, & clystere ex generoso vino injecto, perfectam consecutus est sanitatem: optimum sanè remedium est, nam anodynum est, & suo pondere intestinum aperit, & obstruentes fæces deturbat, & cum vehementer sit humidum, tenuibusque consistet partibus, & valde mobile, irritat naturam, & stercus valida ventris perturbatione propellit: Authore Avicenna Argentum vivum plurimum qui bibunt læduntur eo, egreditur enim cum dispositione sua per inferiorem regionem. Zacutus Lusitanus observ. 3. lib. 2. prax. admir.

Quidam ex castanearum crudarum ingluvie multa, in omnimodam incidit facum retentionem, ita ut ventris tumore, doloreque immani oppressus fuerat: hic tunc in agone esset, & frigido sudore madidus, stercus per os ejiceret, variaque interna & externa expertus esset incassum auxilia: tandem duodecim parvas pilulas plumbeas quibus sclopetarii ad enecandos passerēs utuntur, devorandas dedi; quibus dolor aliquantisper conquievit: sed post tres horas iterum increvit, cumque iterum octodecim pilulas propinarem, fæces reddidit, & injecto clystere ex aq. vitæ & urina pueri à dolore immunis evasit: nec mireris, nam hoc catapotium transvortatum voluolosos juvat, quoniam intestina involuta, implicita & vincta explicat suo pondere, & aperit; fæces impellit, & obstruentia excludit, lenitque dolorem: in quem usum Mercatus lib. 3. de morb. intern. cap. 16. chalybis limaturam propinat. Zacutus Lusitanus. observ. 34. lib. 2. prax. admirand.

Narrat Sanctus Marianus multos se novisse, qui in ileo desperato, imminente morte liberati sunt haustis argenti vivi cum aqua sola fßiii. pondere enim suo intestinum velut vinctum expedit & evolvit, prædurasque & obstruentes fæces deorsum deturbat. Addit & valuisse in colico affectu apud alios id medicamentum, fßiii. pondere haustum. Ambros. Parac. lib. 17. cap. 65.

Intestinum si elapsum sit in scrotum, ilico reponatur, antequam febris & singultus supervenerint. Si enim illa supervenerint, ac si vi repo-

natur, ante septem fere horas moriuntur: si in hoc morbo stuant sudores foetidi, anhelitusque & ructus oleant male, lethale: superum intestinum inferiori illapsum sit, clystis ac glandibus acerbis deorsum itat motio: sin infernum se supermo intruserit, globulo plumbi devorato abactio fit. *Ioh. Heurnius. ad aphor. Hippoc. 10. sect. 7.*

Pharmacopæus maximo ilei tertio quoque die dolore torquebatur: quo sciviente febris aderat satis vehemens, & umbilicus una cum circumvicinis partibus in tumorem attollebatur: injecto autem in ipsis doloribus enemate satis acuto, expurgatisque vitiosis, admodum viscidis, crassis, foetidisque fecibus, dolor conquievit, febrisque cessavit. Quod sæpius contingeret, & nec delinerent huiusmodi tertianæ exacerbationes, nec enemata, nisi cum adhiberentur, prodessent, de aliis remediis deliberatum. Tentata quædam sunt, sed cum nec his dolores integre sedarentur, pilulæ iliacæ occurrerunt, quæ à Rhodi libr. 9. ad Almanforem describuntur: harum. Si in die quietis exhibitus admodum pravos & vehementer fœtentes humores eduxit: quibus expurgatis, ilei dolor multum sopitus: cum autem in universum non cessaret, eadem in paulò maiore dosi exhibitæ: quibus, reliquis humoribus eductis, ilei dolor omnino conquievit. *Rembertus Dodo-næus observ. 36.*

Medicus quidam longo usu famigeratus, hydrargyri ʒiv. cum melle rosac. solutivo propinatis, iliacum dolorem ab inversione intestini deploratum compescuit. *Ioh. Rhodius observ. 80. cent. 2.*

Neminem volvulo perire sivi; potandos nimirum dedi aliquot globulos plumbeos musquetarum, ut sui solo pondere durum istud excrementum propellant, quo plures hauriuntur, & majores, eo tutior & celerior sequitur sanatio, modò æger stet vel ambulet. *Ioh. Helmontius tract. cui titulus de fluxibus.*

Vir quidam ileo laborans à quinque diebus, ut feces per os rejiceret, multis remediis frustra tentatis, sumpsit mercurii cum sulph. extincti & in somam pulveris redacti ʒi. in globulo ceræ inclusam. Statim post exhibitionem focus continuo adhibiti, & clysteres frequenter injecti. Post aliquot horas fruttula quædam ceræ in rejecto clystere apparuere, quod indicio fuit apertam fuisse viam, & medicamento purgante exhibito æger à morbo prorsus liberatus est. *Franciscus Chomel. observ. 1.*

Volvulum hydrargyro propinato plures curatum prodiderunt: nemo tamen hoc modo, quem Petro Penæ familiarem notavit Petrus Aisselinus Gallus medicus Venerus, felici successu commendatum. Purgabat enim primo hydrargyrum à plumbagine sua, coquendo cum vino & aceto, trajiciendoque postea per alutam: tum tenuissimam membranam; in qua aurum exterlum erat, nodulum compingebat filo ligatum: ea hydrargyri, ut supra, defæcati, sesquiunciam includebat, & glutine ex tragacanth. facto observabat, lentoque igne siccabat, educto filo, melle aut syrupo intinctam pilulam ægroto devorandam exhibebat: sic glutine in ventriculo statim dissoluto, hydrargyrum copiose alvum ducebat: bis autem sumpto tali globulo quendam

sanatum videbat. *Georg. Hieronimus Velschius observ. 43.*

Ventris sævum dolorem ex ileo lenivimus sacculo ex suillo stercore aceto decocto confecto. *Martinus Rulandus. curat. 74. cent. 7.*

A violentis vehementer purgantibus in hoc malo omnino abstinendum erit, quod hæc excitant status, & augent malum. Sanguis vesperthionis hypochondriis illitus mirifica experientia ilei dolores sistere creditur. *Franciscus Boel. pract. lib. 4. sect. 3. cap. 6.*

Mulier quædam ex hernia umbilici in iliacam passionem incidit, ita ut vomitiones continuæ contentorum in alvo subsequerentur; in quibus sistendis nihil quidquam profuit, excepto elixire proprietatis. Parac. cujus gr. v. vel vi. in brodio exhibitis, ad miraculum per viginti quatuor horas, enormes vomitiones sistebantur, quanquam ægra, quod intestina inflammata nullatenus reponi possent, naturæ debitum solvere cogebatur. *Gregor. Horstius. observatio. 15. lib. 4.*

Volvulus ex ira.

Morbus tenuioris intestini quem *ἰλεὺς* nominant, occidit, nisi resolutus sit, inquit Celsus, ante septimum. Sed ortus ab inflammatis intestinis, consumit hominem multo celerius. Accensa quippe intestina, ut facile emoriuntur; sic amittunt vires facillime sensum doloris, & præcipitant ægrum, non tam in sudorem frigidum, quam ipsam mortem.

Vxor mercatoris, dolens acerbe, circa umbilicum, ob bilem præ iracundia liberalius in tenuia intestina effusam, incidit ilico in insignem præcordiorum angustiam, sitim immensam, alvum tardam, præter crebrum ac exilem arteriæ pulsum, in tantum gutturis ardorem, & tam indefatigabilem vigiliam: ut die tertio refrigerit ipsi corpus universum: cum viscido madore, vomitu bilis æruginosæ, & tandem lethali omnium nervorum contractione.

Sed intestinis hætenus acute dolentibus, perierat prius omnis doloris sensus. Nemo enim (ut Senecæ verbis id efferam) potest valde dolere & diu. Sed indolentia hæc arguebat huius fistulæ mortem. Ac proinde, quæ in aliis ilei speciebus, obstinate supprimitur, illa ipsa dejectio sequebatur hic sponte. Sed mali augurii est, dolorem hæc ratione deliniri; & alvum ex indolentia fieri citam. Nisi enim vitrix natura, in ordinem iterum redegerit universum intestinum motum; qui iliaccis familiaris est; & nihilominus plurima vergant deorsum: certum est illic aliquid monstri alii; neque duplici hac viâ, tam averti, quam augeri vitæ periculum.

At enim, quo constet clarius quæ se habeat natura intestinorum. Sciendum illa, in viventibus, continenter in gyrum redigi, & instar alicujus lumbrici, per indefatigabiles circumvolutiones, ac sinuosa volutana, lentè ab illis deorsum propelli quicquid in se concludunt. Quem motum vocat Galenus peristalticum sive compressivum.

Qui

Qui manet animalibus, non tantum quamdiu moventur vel cor, vel auriculæ utrinque ipsi adpositæ. Sed etiam longe post; videlicet donec se movet spiritus arteriis inclusus. Cujus motum observavimus in animalibus morientibus longe diutius permanere quam illum quem habent auriculæ cordis. Quibus hæcenus, sed perperam, ultimus fuit attributus motus.

Institum autem hunc motum quo intestina naturaliter, quasi conglobato agnive deorsum tendunt, lædit evidenter obitricio. Sive illa sit à lenta pituita: sive ab immisione unius intestini in aliud: sive etiam ab inflammatione; de qua agit hocce exemplum. Remoraturque non modo naturalem expulsiōnis motum: verum inducit contrarium. Qui incipiens a convulsione musculi circularis, ano circumpositi, trahit omnia sursum; rejiciendo per os quæ ex naturæ lege tenderent deorsum.

Velut clarè videre est apud Galenum comment. 33. lib. 3. de vict. in morb. acut. Quocirca non temere Hippocrates. Ab ileo vomitus vel singultus, vel convulsio, vel delirium, malum lib. 7. aphor. 10. Quibus siquidem, certè lubet addere, alvum sub finem morbi lubricam, intestina indolentia, & sudorem frigidum: habebis omnes desperatæ inflammationis notas. Emortua namque intestina, destinant hominem cadi. Et quo minùs doloris, eò plus dejectionis, & maturius interemptus homo. *Nicol. Tulpus Observ. lib. ii.*

De Doloze Ilei, ac corporis membranosi per alvum excretionē.

Modestissima vidua, annorum quadraginta, de ulceroso ilei dextri, tempore dejectionis alvi præsertim, sæviente dolore conquerebatur, quem alimphriticum, colicum alii mulierculæ vero hystericum existimaverant, variaque ad id facientia præscripserant remedia. Accersitus ego suavi blandiori decocto abstergente, balneis ac ematibus, emollientibus & dolorem lenientibus præ cæteris insistendum esse. His per octiduum sedulo continuatis, corpus membranolum digiti majoris longitudinem & latitudinem ædæquans, parvum & erosum ab una, ab altera vero parte clausum, triplici tunica, tenui, carnosa, ac rugosa constans, genuinum quasi intestinum cæcum referens, exiguo cum cruore, cujus ante vestigium nullum, per alvum dejecit. Postea, quod notandum, inappetentia ac alvi constipatione nulla arte solubili correpta est; Verum nona & sequentibus diebus alvo sine dolore, sponte soluta appetitus rediit, & patiens pristinae valetudini restituta. Si verum intestinum cæcum, quod ex doloris specie, loci situ, ac partis excretæ conformatione quasi affirmare liceret: admiranda sane natura, quæ defectum ejusdem, ileon & colon per intentionem secundariam ac quietem sine qua fieri non poterat, reuiniendo supplevit, ac à fati se vindicavit. *D. Nicol. Gul. Becker.*

Dolores Iliaci & Hernia ab intestino vermibus erosa.

Fœmina N. N. 36. annorum in ventre circa

regionem umbilicalem magnos dolores patiebatur, inde a vindemiarum tempore, quo vas uvis repletum, junctis viribus attollebat, & in inguine rupturam cum dolore sentiebat, subsequente tumore, vomitu, siti, febre & magna debilitate: tumor ad tactum erat instar ligni durus, lividus & contusus: triduo integro alvus adstricta mansit, clysteres ergo applicati sunt, & cataplasmata emollientia lacti incocta tumori imposita, cordiales potiones exhibitæ, septimo die ruptus fuit tumor foramine juglandis magnitudine facto, atque effluxit ex intestinis materia putrida, nigra, fatidissima: cavitatem ulceris Chirurgus adimplevit plumaceolis spiritu vini imbutis, foribus foris applicatis e scorodio, absinthio, veronica, myrrha & sale marino, spiritu vini, & vino albo paratis, unguentum quoque digestivum vulnerato intestino adhibitum è terebinthina, ovi vitello, spiritu vini, myrrha, & ung. Egypt. paratum. Post plures vermes ex ulcere prodibant vivi & mortui, intestinum hoc gangrena affectum ritè dictis remediis deligatum, octo dierum spatio, separavit emortuam partem à sana ad palmæ manus latitudinem, sarcoticoium beneficio vulnere cicatrix inducta, & ægra Dei gratia percurata est. *D. Job. de Muraltis.*

Ileosus in agone mortis Celotomia restitutus.

Lugduni Gallorum, ubi Chirurgi alias summe rigorosum sustinere coguntur examen dum versarer, viro ex Hernia diutina Ileo correpto plurima exhibitæ & adhibita fuere medicamenta, verum his nihil juvantibus, omni usque mortem intentantibus, sacerdoti fuit commissus qui extremam unctionem, aliosque ceremonias ex Ecclesia Romanæ ritu ipsi administravit, ægerque jam de bonis suis disposuit & amicis legavit, ut adstātes quivis de ejus salute desperarent: Contigit autem ut chirurgus quidam expe i miss. de misero ipsius statu certior redderetur: quægrum visitans extremum remedium adhuc tentari posse ipsi significavit, Celotomiam scilicet, seu apertionem inguinis, qua intestina reponi, sicque fecit us alvi exitus procurari posse, id quod hæcenus frustra aliis remediis tent. tum: Æger moribundus sustinere hanc operationem in tali statu animi non recolligit, parumque fecit difficultatis; Chirurgus igitur ipsum dextre locans incisionem fecit ex arte tutam, circa foramen ovale peritonæi (circa cujus in homine erecto summa patet creatoris sapientia) per quod intestina stercomibus repleta in scrotum prolapsa sunt, hæcque sursum dextrè reponit, rupturam ritè claudit, sic ut postea injecto clystere è lubricantibus & carminativis, sterces duræ subsistentes per alvum seu locum ordinarium ejectæ fuerint, ægerque e faucibus ore ereptus.

Scholia. Operationum chirurgicarum insignem esse usum, non aximum quoque abutendum absque illis natura sapius minoribus adjecta remediis affectum sanat, Nosodoctorum ægrotorumque alibi dispersonum exempli docent; Quam nobilis verò sit in anus Chirurgi & tantum non divina prædicta monstrat observatio, si e tali enim operatione aliquid doli in æger iteri ingressus fuisset, nullo dicitur redire non reum. De tali ergo operatione à celebri Chirurgo

go Parisiensi Dn Bienaise prae reliquis Chirurgis administrata, lubeat quaedam adhuc apponere; Administratur ea, agro prius, ut decet, tabula lignea commode adaptato, incisione in inguine caute facta, quae non laedat intestinum, super cannulam scilicet ex una parte rotundam ex altera v. cavam, quae in procellum inseritur, ut impediatur omnis intestinorum instrumento attractus & laesio; dum verò incisio satis magna est, reducitur intestinum, acque cum filo bis perforato & ligato processus tandem gastraphia cura absoluitur. *D. Emanuel Konig.*

Ileos à Bubonocèle.

Dominus Arthcaudius, celebris ille Chirurgus Laufanensis, hanc operationem in cive Laufanensi die 24. Aprilis Anni 1675. celebravit, posteaque ealum his verbis à Gallico in Latinum translatis ad me perscriptit.

Mr. du Cloux concivis noster 50. annorum, nunc triduo decumlit agrotus, horrendos patitur dolores in regione umbilicali, assumpta statim revomit insigni quidam violentia, plures clysteres ipsi fuerunt exhibiti, quia Medici colicam biliolam esse rati sunt, hi autem clysteres sine emolumento rejecti fuerunt: Quod vero motus spalticos in igno hocce dolore animadverteream, iudicavi Bubonocelen adeste, & compressionem intestinorum, omnium symptomatum originem: In inguine dextro tumorem tetigi magnum, & durum, & ad tactum immobilem, quem nactus est ager à gestatione & elevatione oneris gravioris; huic imposui Cataplasmata emollientia ex malva, althæa, violatia, butyro & liliorum alborum oleo parata; post clysteres exhibui fortiores, immixti ægrum balneo, & intestini in locum suum reductionem variis artibus tentavi sed in vanum omnia, adeo ut symptomata aucta singultusque molestus, & metus gangrenæ adfuerit; quare, in consilium vocavi Dominum Dapples, Dn. de Bergeries, Medicos doctos, usque quod à priore Medico Constantio peractum sit recitavi, & nil nisi operationem manualet restare subinnui: Cum autem hæc operatio hic loci sit admodum rara, Dn. Dapples difficulter assensum præbuit, tamen quia in extremis morbis extrema sunt tentanda remedia, agerque emixe eum expostularit, hoc modo coram Constantio Medico, Chirurgo Gerband, & Pharmacopola Millot celebrata fuit: Ægrum elevatis, diductisque femoribus à famulis meis sustentatum altius in lecto reposui, ego vero integumenta communia supra tumorem digitis prehensa, quantum potis eram, elevavi, cultelloque usque ad peritonæi productionem, seu processum (quem iuxta longitudinem aliquantum aperire debui) incidi, tum intestinum naturalem suum colorem mutasse conspexi, & indice sinistra manus processum intra vaginam dilatando ad musculi oblique ascendentis abdominis annulum perveni, dextra vero intestinum in locum naturalem reposui: Insimul femoribus elevatis intestinum felicissime sedem nativam subingressum est: futuram vulnere postea quatuor in locis, integumentis atque peritonæo adhibui, & media post hora enema applicui, quod cum copia excrementorum fœtentium brevi rejectum est, agerque placide dormire cœpit, antea quatrduo integro vigil existens. Vulnus præterea balsamis adstringentibus curavi, & tribus septimanis,

Deo benedicente, restitui.

Scholium. Similem herniæ curationem describit Ozias Aymar in observ. 8. Riverio communicata, quæ n. ultis remediis in casum per novem dies adhibitis, intestinum in scroto incarcerationum feliciter fuit repositum, incisione usque ad processum peritonæi instituta. In quo casu magnam peritonæi dilatationem fuisse necesse est, quæ intestina prolapsa non admodum comprimens, eadem quominus inflammationem & gangrenam, sanguinis utpote motu à valis compressis, haud omnino inhibito, nec flatibus via denegata, subierint, effecerat; cum alias facile gangrena supervenire soleat, quam intestinis postea omnino sphacelatis, quamvis arte denuo repositis, certam mortem accelerare, non una vice notavi; sicut è contra, tempestive adhibita, imprimis cataplasmata ex emollientibus, simulque flatibus discutientibus concinnata, salutem ægris non adeo incertam pollicentur. *D. Ioh. de Muraltro*

Anatomica inspectio.

Quod spectat ad sanguinis aut feri intra intestinorum tunicas lutiones, à quibus phlogosis, aut tumores dolorum excitantur, revera ita fieri interdum conceditur, in o. *anatomia* novimus, ex inde vero passionem non Colicam sed Iliacam excitatam fuisse observavimus: Quippe cum plures ab Ileo defunctos aperuerim, Intestini cujusdam inflammationem, ac sphacelum fere in omnibus, & morbi & mortis causam fuisse deprehendi, neque mirum hoc, quoniam in membrana tenera & maxime sensibili, magna solutio continui spasmos & contugationes dolorificas ita continuas & atroces creabat, propterea ut intestini affecti motus peristalticus, quo fæces alvi versus anum protruduntur, inhibeatur ac prorsus invertatur. *Willis Tract. de Anima Brui. part. 2. cap. 15.*

Intestina crassa tunicas easdem ac gracilia obtinent cumque in Colozæ recta ascendunt, fibris carnosissimis robustioribus, quæ contractionis motum fortiolem efficiant, opus est Hinc si inflammatio, aut sphacelus (ut sæpius novi circa coli initium contigerit, adeo ut fibræ carnosæ laxæ contractiones pro fæcibus sursum elevandis obire nequeant, illæ versus Ileon restagnantes passionem Iliacam incurabilem inducunt: *Idem Pharmac. ration. sect. 1. cap. 1.*

Mulier quædam dolorem Iliacum pati videbatur cum matricali commixtum, tandem quinquagenaria facta, ætivo tempore in hunc incidit dolorem, & trium dierum spatio in vulvum delit affectum, unde in quarta mortua est: huic erat scirrhus tumor in continuo intestini coli, qui erat repletus ossiculis multum auctis, & veluti intestinum pungentibus atque vellicantibus; quapropter observatione (obstructione) in intestino facta, & inflammatione suborta, flatibus repleta, dolore admodum insigni cum fœcum rejectione correpta interiit. *Hippolitus Roscius de Facultate Anat. Lect. 2. p. 74.*

Rusticum novimus, qui cum post longiores torsiones & ventris diuturnas inflammationes diem obiisset, & demortui incideretur corpus, longior in intestino fissura inventa est; ex qua etiam recentes uvæ, quas paulo ante comederat, prorupisse conspeximus. *Benivenius cap. 76. de Abdiis.*

Anno 1668. Amstelodami vir quadragenarius moritur, hic ab aliquot jam annis, quasi tabe contereretur, marcebat, & inter dubia vitæ mortisque vota miseram trahebat animam: tandem febri correptus fuit 14. ante fatalem tibi diem: post x. nihil excrementorum per interiora deiecit, tertio faeces per os scædum in modum ejecit, quas triduo post anima sequebatur: Laborabat is omnium opinione volvulo, & revera is erat morbus, cui peritio. es Medici, vel quod æger victus doloribus se convolvat lapsus, vel quod status in ventre quasi volvatur, etiam hoc nomen indi non abnuerunt; Nondum mihi hominem, vere miserando hoc morbo extinctum, secundifuerat oblata occasio: hanc igitur non negligendam ratus, apud propinquos eam mihi impetravi veniam.

Ego inter secandum convolutionem intestinorum nullam, sed ea circa coli principium arctius compressa atque inflammata reperi: & ubi cauta lenique incisione ea aperueram, niscus inveni, quod transitum ad inferiora faecibus negabat, & hinc quæ deorsum vergebant, vacua, quæ sursum, excrementis plena; quin ipse ventriculus is infectus, scædum visu, grave odoratu spectaculum erat: Post inventam morbi causam, dum causæ causam indago, ecce tibi Pancreas se offert, quod ordinariam longitudinem media sui parte: latitudinem tribus transversis digitis, crassitudinem incredibili modo, pondus xiv. uncias excedebat pendebat enim uncias xix. cum hominis quinque, equi xi. plerumque pendeat; Omni ex parte plenum erat scirrholis glandulis, ovum columbinum magnitudine exæquantibus: Hac Pancreatis mole compressum ileum, primo inflammatum, deinde exulceratum negaverat excrementis transitum. *Th. Kerckringius observ. Anat. xlii.*

Aperui in corpora ex Iliacæ passionis defunctorum in quibus Omentum & Intestina tota Sphacelo tenebantur: Ex his fœtor gravissimus vetuit penitus morbi causam indagare. *Fabritius Hildanus lib. de Gangrena cap. 4.*

Clericus annos 22. natus horruit & incalescit: Nox implacida, Vomitiones assiduas rerum variarum, deinde velot cineritiæ ac nigricantes: Dolor ad totum ventrem implacabilis: hypochondria triduo & distenta: neutrum in latius decumbere potuit: febris assidua, jactationes; ferre potuit phlebotomias, nec adjutus est: venter perpetuo siccus non solvebatur: Volvuli magna erat suspicio, 5°. die repente interiit: Vomendi finis non fuit: Incendium intus magnum: Mortuus valde è maligno intumuit.

Aperto cadavere, Colon erat velut nigrescens, Epiploon totum putre, ad regionem Hepatis sanies purulenta: fœtebant adeo omnia ut viscera dimovere impossibile fuerit. Audio halitum illi fœtentem fuisse. *Ballonius lib. ii. Epidem. & Ephemer. pag. 193.*

Novi ebriosum Jureconsultum, qui cum temperamento biliosissimus esset, ideoque bile mota, quam clysterem naturalem vocat Avicenna, bis, ter in dies alvum deponeret; demum ut docet Hippocr. aph. 52. sect. 1. cum senescenti adstringeretur, pituita nimirum bilem

superante, & ætatis & quotidianæ ebrietatis vicio, erat enim sexagenarius proximus, nec alvum tentari ulla arte posset deponere, naturæ pensum percolvit, intestinis inmane quantum tumentibus, adeo ut viderem crassitie brachium adstantis, quod duabus vix capiebam spithanas, superasse.

Lum mortui fieret anatome, statim muscularibus abdominis & peritonæo secto, intestina sponte crepuerunt, anatomicumque & viciniores, tanta vimarum sacum mole obruerunt, ut vestes morum nemo adstantium internosceret: itaque omnibus tortorem sugientibus, nihil ulterius observari potuit: Hoc rarium quod Colon inflammatum, & inmane quantum tentum; loco suo motum à Medicis judicabatur, adeo enim cætera premebat intestina, ut alvo omnimode suppressa, decimo denum die Ileofus factus fato suo fingeretur.

Cum ad consilium biduo ante mortem vocarer, suavi dari patienti argentum vivum, crebro per corium transitu perpuratum, quod sæpe vidi sine noxa, momento citius, eductis secum obviis faecibus, per intestina transiit: A cujus usu, ne frigore interanea læderet, statim clysterem ex puro Cretico vino injiciebam, sicque aliquot coli nimia tensione mortuos, cum Dei gratia servavi: Sed alius Medicus Chymicus maluit hominem in certa morte relinquere, quam remedium, quod judicabat periculi plenissimum, tentare: Pisas alii in hoc casu aureas, argenteas, aut etiam, si illæ desint, plumbeas præscribunt, sed argentum vivum pilis omnibus expeditius, velocius intestina percurrit perpurgatque. *Henn. ab Heers observ. Medic. ii.*

Clariss. Guido Patin. inflammatoriam dispositionem Ilei intestini semper hunc producere morbum censet, adeoque plurimòs evadere per Venz sectionem, fetus tepidos, semicupium ex aqua tepida & enemata emulgentia: Idem ante annos triginta in auriga ejusdem Archiepiscopi, ex volvulo demortuo, totum hoc intestinum corruptum, nigrum & gangrana conspersum suis literis mihi indicavit. *Blasius in Vestingii Anatom. c. 3. p. m. 46.*

Ileus à mutuo intestinorum subingressu, seu Intussusceptione.

Animadverti intestinorum tenuium mutuum ingressum spatio ampliore quam sit digiti longitudo, præsertim in nonnullis quos dolor Iliacus enecaverat. *Columbus lib. 5. Anatom.*

Aliquando intestinum in cavitatem intestini descendit, unde obstructio faecis & corruptio illius cum morte oritur, sicut in sectione Anatomica observavi, Juvenis enim quidam hoc morbo affectus sine ullo hydrargyri juvamine mortuus est: quod cum permeare non potuisset, prope obstructionem à me inventum fuit. *Dom. Panarolus Pentec. 1. observ. ultima.*

Alteri hujus mali causa post mortem à me deprehensa fuit, Intestini tenuis parte quavis coarctati ingressus in partem proximam, sed flatu solito magis expansam: Unde alvinis faecibus transitus omnis ad alvum præcludebatur, consequente mox earundem regressu & ascensu ad ventriculum, cum miserabili ipsarum evomitione.

Iudicavi modo dicto illum contigisse intestini tenuis in partem proximam ingressum, et quidem nunc partis superioris in proximam inferiorem nunc inferioris in superiorem, quoniam observaveram sæpius 1. Intestinum tenue variis in locis flatu distentum, atque in partibus proximis, tam superioribus quam inferioribus, ad notabilem longitudinem arctissime contractum. 2. Aëros eosdem torminibus pressos corpus suum mire agitare ac non raro subito inflexile: Ita vero inflexione sæpius repetita contingere potuit ut subinde ob relaxatum in alterutro extremo intestinum, ulterius pressus flatu locum concederet opposito Intestini adhuc coarctati extremo sese in satis sufficienter expansi intestini cavitatem insinuandi, succedente mox ejusdem intestini a propulso flatu liberati coarctatione satis violenta circa partem proximam insinuatam: Quoties autem pars intestini inferioris subit superiorem, toties aut sponte per assumpta alimenta, aut arte per pilulas plumbeas, aureasve deglutitas, curationis spes superest: Non item, quando pars intestini superior ingreditur inferiorem, quoniam sensim ulterius pergit pars conclusa, unde augetur magis magisque angustia, omnisque præcluditur contentis descensus, quocirca necessario certoque inde venit expectanda mors. *Franciscus de le Boë Sylvius Pract. l. 1. c. 15.*

Dissecui quandam volvulo denatam, cujus superior intestini pars in inferiorem inferebatur. *Plempius fundam. Medicinæ cap. de mesenterio.*

Intestini tenuis coarctati parti cujusvis ingressus in partem proximam, contingit, juxta *Franc. Sylvium Præcos p. 183.* quod intestinum tenue variis in locis flatibus distentum, atque in partibus proximis, tam superioribus quam inferioribus, ad notabilem longitudinem arctissime contractum sit: Quod vidi in Nosocomio Leydensi in cadavere viri, ut & in foemina xl. annorum ab eodem dissecta: unde si ad dolorem levandum, vel aliam ob causam, abdomen prorsus vel comprimatur, vel antrum inflectatur, facillime hic ingressus continget, idque vel partis inferioris in superiorem, vel superioris in inferiorem, Inflammatio autem contingit ob sanguinis in intestina effusionem, præsertim acrioris &c. Sic vidi vascula sanguinea ita tumescere à sanguine in iis hærente, ut supra tenuium intestinorum tunicam distenta egregie observarentur in dissectione illius foeminae; Inflammationis vero illius causam fuisse judicabantur carbonēs suppositi, quatenus immediate supra eum locum, trium scilicet digitorum transversorum spatio sub umbilico, in cute abdominis observata fuerant quamplurima macula nigricantes: Quod autem à carbonibus suppositis ortum censebatur, ratio hæc est, quatenus è numero mendicatum erat, quæ hyeme semper multum ignis secum circumferunt; atque supponunt, moxque iterum auferunt, partesque omnes corporis aeri frigido exponunt: unde puto primo à nimio calore humiditatem sanguinis affluentis in tam exiguis vasculis aliquomodo dissipari, sic nimis fluxilem reddi: Secundo à subito frigore stagnari atque incrassari: vascula quoque ab intenso illo igne

aliquomodo corrugari posse credo. *Joh. Von de Flammerdinge Disputat. de Iliaco dolore.*

Interdum revolvitur intestinum instar digiti cheirothecæ reduplicati, quod omnino obstruit viam intestini, inde vomitus intestinorum per partes superiores: Reduplicationem hanc omnino scitiam dicit nominatus *Patinus*, quam nunquam videre potuit: At bis terve eam in cadaveribus dissectis cum *Clariss. Joh. Walz* videre contigit. *Blasius comm. in cap. 3. Anat. Veslingii cap. 3. p. 46.*

Sub ipsa præteriti nuper anni 1676. auspiciis, mulierem ex pago Vallis Leporinæ, Fauto, advenam, cui eadem exitus ex hac vita quæ adventus in hanc urbem (Schafusam) hora contigerat, in Xenodochio nostro dissecimus, diros ante obitum ventris cruciatus, cordis anxietates, dejectiones cruentas, tandemque vomitus perpessam.

Patfacto abdomine Ileon alicubi plane contractum, ac velut injecto laqueo strangulatum vidimus: Nimirum ejus portio, quatuor transversos digitos longa, plurimum contracta & angustata, intra proxime superioris cavitatem abscondita prorsus latebat, hacque sua parte verum ejusmodi intro-susceptionem, qualis à *Clar. de le Boë Sylvio Idæ Prax. Med. lib. 1. cap. 15.* describitur representare visa est. Iatus vero non Intestina duntaxat, imprimis Ileon, sed & ventriculus multis quasi stigmatibus insignitus erat.

Post inde ac nuperius dissecui Puellam octennem, cujus Ileon tres ejusmodi Intro-susceptiones distinctis intervallis spectandas exhibuit, una cum lumbricis alicubi velut conglomeratis, & mucagine intus contenta valde biliosa & crocea, interiora quoque ventriculi incrustante: Unde judicatu omnino proclive fuit Puellam sine torminibus, & præcordiorum anxietate vitam non finivisse; quod & assertione eorum qui curam ægræ habuerunt confirmatum. *Joh. Conradus Peyer Tractatu de Glandulis intestinorum.*

Saltatoribus, mimis, aliquando tenuia intestina intorquentur: Filiolus *Dom. Petrei*, Medici celeberrimi, volvulo interiit, In dissecto Ileum ita replicatum inveni, ut si cheirothecæ digitus contraheretur. *Joh. Riolanus Pract. p. m. 156.*

Quam rarum sit Ductuum dari intussusceptionem, nulli non cadavera hominum curiosis dissecanti notum: In cystico bilario se eam invenisse in observatis tradit *Joh. à Mekeren*: In infante non uno, postquam Iliaci interierint, me eam in Ileo intestino observasse scias velim: imo etiam in puero 14. annorum eam notare licuit, & quidem duplicem, si uno loco pars intestini inferior se inseruerit in superiorem, altero pars superior in inferiorem. *G. Blasius Observ. Med. p. 3. obs. 3.*

Intestina, lumbricorum instar varie se moventia, intussusceptionem quandam incurrunt, imprimis ubi dolore atroci afficiuntur, & hoc modo excrementis transitus ad anum denegatur, hinc Ileos; Mediis ordinariis nihil efficientibus, cucurbitula magna sine scarificatione sæpius parti dolenti apponi potest, atque iterum auferri: Annon etiam præstaret facta dissectione musculorum & peritonæi, digitis sus-

sulceptum intestinum extrahere quum certa morti ægrum committere? *Paulus Barbeta Anatom. Pract. lib. 4. cap. 1.*

Theodori Roulen puerum aliquoties inuisi, qui dolore hxo & continuo sub regione Hepatis per annos aliquot laboraverat, eodem ex gravissima Iliaca passione mortuo, vocatus sum ut causam præcedentis doloris inquirerem.

Aperto corpore, inveni intestinum Cæcum contractum, in intestinum Ileum se insinuasse, idque oppleville, adeo ut nihil ex superioribus intestinis ad Colon permeare posset, inæthiaca: Denique fuso Ileo, & exempto Cæco, id ubique inflammatum & tumens inveni: Præterea scirrhus exulceratus, aut potius cancer exulceratus in ipsius Cæci intestini fundo conspiciebatur.

Diversæ constituuntur causæ Iliacæ passionis: Præcipua autem est Ilei contractio & coarctatio: Itaque rei indaganda causa diverta cadavera inspexi; & quamvis ut plurimum lætor adeo teter erat, ut vix possent exquisitè omnia considerari, id tamen in omnibus hæcenus observavi, principium & originem hujus morbi fuisse circa intestinum Cæcum: h. e. sacculum, quum sine Ilei & coli principio conspicitur. Quare existimo valvulam (quum Clar. Bauhinus in initio coli invenit) primum ex intestini Cæci inflammatione adeo contrahi & contringi, ut plane nihil excrementorum permeare possit, sicque accrescere inflammationem, ut tandem totum intestinum Ileum, imo & circumjacentes partes gangræna & sphacelo corripiantur: ut observavi in omnibus quos præter prædictum puerum hæcenus dissecui. *Fabritius Hildanus centur. 1. observat. lxi.*

Puer triennis, qui 25. dies decubuerat, ac ex lumbricis ægrotasse putabatur, dissectus fuit: Hunc intestina cuncta statu turgida & lucida, unam tenuis intestini partem intra se contractam ac convolutam, quasi in se infartam, ut duritiem quandam, tanquam tumoris speciem repræsentaret, vidimus: nam quod sesquipollicem longitudine æquabat dum involutum esset, id leniter evolutum, duos fere palmos implebat. *H. Smetius miscellan. lib. 10. pag. 579.*

Observatio.

Ileus ab implexis, involutis, intortis intestinis. A connexis & convolutis instar funis. Ab Ileo contortuplicato. Ab Ileo tribus complicationibus complicato. Ab Ileo diversis in locis convulso. Ab Ileo tribus nodis confrieto. Ab ejusdem confrictione.

Puer XVII. annos natus, hydropicus, cum 14. dierum spatio excrementa alvi per os evoheret, nec per feces quicquam egeret, expiravit: In hoc cum post mortem rugitus ventris, & illius quædam palpitatio sentiretur, eoque nomine de sepeliendo ambigebatur, accersitus, cum ventrem aperirem, flatus tandem erumpebant: Verum intestina tantopere distenta erant, ut femoris præstiterint certis in locis adæquare viderentur, atque ex compressione discumperentur, iterumque magno cum

impetu profunderetur: Aliis vero locis ateo convoluta, intorta & implexa, ut nulla talis nec excrementis nec flatibus deorsum pateret vias: Sed & vicinibus vivis, oblongis, quum plurimum repleta erant, qui rursus aliis minoribus repleti, inæquales illos motus effecerant. Præter hæc Hepar corruptum, arenulis, lapidibus infartum, Lienem imminutum Pulmones vitatos cotisque atrox ostendebat, *P. Astruc observat. lib. 3. p. 6. 7.*

Intestina aliquando aliquomodo connectuntur, ut observavi, tanquam in tunc maderet, qui potimodum convolvitur: Et in hoc cum mirum in modum pila cum plumbea, tumaræ genti vivi potio prodest. *D. Panarolus Pænet. 1. observat. ult.*

Per Iliacam passionem *aliæ* convolvi videntur intestina, Testisque mihi fuit D. Tilemannus, se vidisse aliquando in sectione anatomica ab Ileo mortuo, intestinum ileum contortuplicatum, ut pannus a loricebus convolutus. *Dietericus Jarrei pag. 40.*

Die 29. Januarii 1644. D. Patris laborare cepit colico dolore vehementi ex intenso frigore concepto: vocatus Pharmacopæus injectit statim clysterem emollientem, carminantem & laxantem, quo læces multas excrevit: dolore perseverante iteratus fuit idem clyster, adjectis oleis carminantibus, quem non rejecit, dolore adhuc sæviente, tertius postmodum injectus est, quem etiam retinuit: plurimis immixtis suppositorum, clysterum portionem excrevit sine ulla materia lætenta: Die 2. morbi vocatus, præscribo totum emollientem & anodynum toti ventri admoveendum, & clysterem ex tota decocto paratum, quem etiam diu retinuit & exiguius illius portionem rejecit sine ulla materia: Nullus dolor aderat, neque ulla febris, vomitus autem per intervalla intestabat: Hunc coningere licuit ægrum Iliaca affectione laborare, sed a qua causa heret, valde dubitatum est in consultationibus pro tanto affectu convocatis: Inflammationem enim testari videbatur febris, quæ tertio die supervenit, sitis & lingua ariditas; Sed quomodo inflammatio intestinorum adesse posset citra dolorem concipere non poteram: Videbatur potius fieri à facibus induratis, vel contortione aliquis intestini: Multa remedia urpatæ fuere, venæ sectio ter repetita, bis in brachio & semel in pede: iulepi refrigerantes exhibiti, clysteres ex decocto intestinorum vervecis omni hora injecti totus emolliens continuo admotus toti ventri: atque ad septimum diem vomitus perseveravit, quo juscula & potulenta exercebat cum materia biliosa, pituitosa & necerosa, nihil vero per alvum effluebat: circa finem septimi diei alvus fluere cepit, & læces multas excrevit per intervalla, cessante prioris vomitu: alvus usque continuavit per quinque dies, manente tamen febre & virium imbecillitate, liquida in fine dejiciebat, qualia ante vomere conneverat: die 15. morbi gravius inquietudinebus affectus est, cum virium languore, quibus sensim deficientibus è medio sublatus est.

Aperto cadavere, inventum est intestinum Ileum tribus complicationibus convolutum & quasi compactum in unum in Ilii circa finem illius: Tota autem illa intestini portio

complicata, gangræna affecta erat, cum portione mesenterii sibi adjuncta: Intestina reliqua amplissima apparebant, ut brachii magnitudinem æquarent: Præterea intestinum gangræna affectum, perforatum erat supra complicationem: exultimo a pondere materiæ contentæ in superioribus intestinis fuisse disruptum, postquam sphacelo affectum est: Per illud foramen tota excrementorum illuvies in abdomen effluerat, & mora sua partem ani internam corruperat, in qua etiam foramen aliud apparuit, per quod excrementa effluebant per anum, & obstructionis intestinorum apertionem mentiebantur; unde pater alvi fluxum Ileo supervenientem posse interdum Medico imponere. *Lazarus Rivertus centur. 3. observat. 26.*

Secui puellam quadrimam verminosam, quæ post epilepsiam liecia facta, per os & vermes & alvina excrementa deposuit: Quærens causam, tandem in hinc Ilei, quinque intestini complicationes inversi maximas, ita ut ad longum mentis digiti, in quolibet complicationum Ileum convolutum invenirem: quodque pessimum erat, hic interne solum repebat, at ibi lumbæ acodum implicabatur: atque ita supernam ac infernam medicationem eluserat: Hujus sine dubio, putri vaporis, atque à verminibus elevato, origines suam debebat: *H. ab Heers. observ. 24.*

Pauperrimus quidam Walo morbo hoc, miserrere mei dicto, summo cum dolore perit: aperto cadavere, septem diversis in locis intestinum Ileum vidimus ita convolutum, ut cibus, potui, facibus omnem necesse fuerit denegari transitum. *P. Barbette Præses lib. 4. cap. 7.*

Ilei quædam species est, quando Ileum, ut asperi, ita arctatur quasi farcimen, (quod vulgo lucanica dicitur) cum inter unam & alteram lucanicam circumducitur filus: Hoc ad unguem inveni: Intestinum enim tam strictum erat ut non secus quam filo vinctum coerceretur; Humor enim biliosus ob acrimoniam morbum hunc pepererat. *Panarolus Pentecostæ. observat. ult.*

Ileus à compressione jejuni intestini in hypochondrio dextro.

Jejunum intestinum sæpe comprimitur, id quod primum ad longitudinem quatuor digitorum transversorum latitudinem sub costis spuris in hypochondrio dextro compressum vidi Tiguri cum Dom. Parente anno 1667. in Josia Bunschedlero de Hottingen: *lib. Henric. Lavaterus Thesum Inaugur. 1.*

Ileus à Cæco Intestino obstructo & coangustato à devorato Cydoniato.

Septennis puella Diarrhœa correpta, quoniam per dies complures subalbidam ac putrem olidamque materiam indolenter alvo redderet, diuturnitatis fluoris ejusmodi pertæsa, æjus avia consilium de cohibendo cum aliis mulierculis cepit: In eam rem cydoniato larga manu exhibitio, sic est ejus utriusque alvus repressa, ut eo die & sequenti nocte nil omnino reddiderit: sed excitatis sævissimis ventris doloribus & torsionibus, usque eo intumuerit, ut hydropica dere-

pente evasisse putaretur: Accitus Medicus, quid rei esset suspicatus, clystomatis primum lenibus, deinde etiam acrioribus identidem injectis, hærentem alvo materiam noxiam foras evocare; totum dolores lenire tentat, sed id frustra: invalescentibus quippe doloribus immanibus, cum crebris animi deliquiis, tandem liquidioris liercoris vomitione intra biduum miserabiliter extincta est.

Aperto corpore, cæcum intestinum coangustatum contritumque, adeo obhærescente, & internamque ductum obturante cydoniato, deprehensum est, ut illac nullo modo porus quicquam posset pervadere: unde accidit ut acris illa & corrupta materia meatui, prohibita, objectaque mora restagnans, inulceratam sibi viam in abdominis spatium pertecerit, paulo supra obstructum locum periclo perforatoque intestino, quo velut emissario & cumulo actio excidens, abdominis totam capacitatem repleverat: Hinc acerbissimi dolorum morsus, hinc distensio, hinc animi defectiones, obortoque sædo vomitu crudelissima mors brevi consecuta: Hæc historia ad eos valebit, qui redundantem nocentemque humorem, undecunque is profluit, intempestive sistere atque coercere properant, maximo ægrotantium malo. *Fernelius Pathologia lib. 5. cap. 6.*

Ileus à coalitione & gangræna Ilei. A flatu in cohibito, hinc fissio. A gangræna in vicina cæci, ob ligaturam in Hernia. A materia lapidea obturante intestina juxta Cæcum. A colo cancro affecto. A colo prope Rectum sphacelato & disrupto. A Colo exulcerato cum siercore retento. A Tumore vesicali Recto intestino annexo. A Recto intestino constricto & replicato. Ab abscessu in intestinis.

In schedis suis annotavit Caspar Bartholinus mulierem Germanam Patavii, robustam & corpulentam, nonnihil pinguem, sexagenariam, nihil exire visse per anum ipso novem dierum, nec tamen clysterem admittere voluisse: Incidit tandem in febrem malignam cum vomitu bilioso, & transacto biduo obiit.

Aperto cadavere, Pulmones sere putridos, Hepar parum scierthosum & inflammatum: Ventruculi tunicam internam inflatam: Intestinum Ileum in medio gangræna obsessum & putridum, ut inopinato contactu disruptum sit: universam partem supra Ilei gangrænam, internam tunicam inflammatam, ut supra modum venæ mesaraicæ essent turgidæ: partem vero Ilei inferiorem totam coaluisse, ut nihil hac via pertransire potuerit: *Th. Bartholinus centur. 6. observat. 38.*

Tenuioris intestini morbo, quem Græci *ἰλῆος* vocant, urgeri commune est, sed urgeri sic ut vitam tollat, inauditum: Corpulenta quædam mulier, cum modo supra modo infra umbilicum intolerabili premeretur dolore, nec ullus hinc inde erumperet spiritus, adeo agitata est, ut scisso tandem intestino vitam finierit, Quod nisi incisa mortua pluribus innotuisset, nescio an citra mendacii suspicionem à me scribi potuisset. *Bonvenius de abditis cap. 76.*

Gallus agryta Leodium venit lithotomum professus herniarumque curam, filo aureo certissimam pollicetur: Huic cum plurimi se crederent, rogatus a patre aditarem vincituro epiploon tholi sui, in scrotum delabens, Aditio, filum, non jam aureum, sed ferreum, mercurio crudo oblitum, in inguen pueruli trimi agenti: Videris, inquam, altius & iusto & solito mihi adigere. Quæ tua sunt, inquit, cura, ego quæ mea sunt rite exsequar: interim filum, ejulante multum puero, valide torquet: sed, quod commiseratione dignissimum! intestinum Ileum, in vicinia Cæci, una compenendit, itaque vincit, ut negato per inferiora fœcibus exitu, per os ejectionis stercoreibus, Ileotus factus puer, peristaltico intestinorum motu mutato, animulam inter mille tormenta, cum fœtore & cruciatu eiecerit, die à ligatione quinta: Mortui cadaver aperiens, inveni intestinum, quæ parte ligatum fuerat, unoque supra infraque ligaturam digito, omnino gangrena infectum & jam putre: Hunc postea Turnoni humilium scelerum pretium crucem tulisse accepimus. Henricus ab Heer observat. med. 22. p. m. 151.

Orphanus ex Iliaca passione expiravit: Inspecto corpore nullas vidi plicas nec volvulum, sed circa cæcum intestinum vidimus materiam induratum, lapidosam, intestina extendentem, & ita arte adhaerentem ut Cheirurgus impossibile videretur extrahere. Nic. Fontanus Respons. Genrat. pag. 84.

Cancer etiam hoc idem causare potest, cuiusmodi vidi in fabro ferrario, qui cum in colo per plures menses cancerum passus fuisset, ex quo in transitu fœcum quotidie vehementi cruciabarur dolore, maximas per sentiens punctiones, perinde ac si acubus perforaretur, tandem aucto cancro, ab eodemque obstructis intestinis, factus Iliacus, præcedentibus stercoreis vomitibus, misere vita functus est. P. Salins Diversus de aff. parit. cap. 11.

Matrona sanguinea 50. annor. 7. integris diebus nihil defecerat, purgans exhibitum vomitu rejectum, nihil quoque effecit enema, 7. die, & subsequentibus varia assumpsit purgantia fortia, sed tristi eventu: morbi 22. die dicebat intestinum aliquod crepassse: 22. fatis cessit.

Dillecto cadavere nil quicquam vel circa ventriculum, vel in intestinis tenuibus poteram reperire quod morbi causam indicaret: Cum obstructis præsentis ergo uterum explorarem, vidi intestinum Colon, non procul à Recto sphacelatum, tunicasque disruptas. P. Barbeau Præceos lib. 4. cap. 7.

Non multos post annos quandam secavi mulierem, quæ semper sana fuit tempore suæ vitæ: Sexagenaria tandem colico dolore affecta in volvulum incidit, sive in morbum miserere mei dictum:

Huic colon intestinum in suis anfractibus erat assato stercore repletum, ita ut lapidescere videretur: Et ab hoc stercore anfractus intestini Coli videbantur exulcerati: vixit hoc patiens octo dies, per os stercores excrendo. Hippolitus Bosius de Facult. Anatomica s. 1. pag. 24.

Ut quid in intestinis observavi dicam, anno 1580. in quadam muliere quinquagenaria

defuncta, quæ per triginta annos passa fuerat dolorem, quasi diceret matricalem, reperi. Tumorem veluti velicam, non dico magnitudine tantum sed tunica, in qua erant pinguedo saponosa, & ossa veluti diceret mandibula, in quibus erant duo alveoli cum dentibus duobus, alter erat caninus, & alter malleterum, & videbantur ita lenia, ut diceret per multum temporis spatium ex usu in ore humano fuisse: circumquaque hæc ossa capilli multi oblongi, ad longitudinem magni palmi circumducebantur, involuti omnes ab hoc saponoso humore: & quia tumor iste amplexus erat recto intestino, ob id monialis hæc, post multos dies quibus passa fuit dolorem quo aliquoties vexabatur, per dies novem volvulo fuit correpta, à quo vitam cum morte commutavit. Hippolitus Bosius de Facult. Anat. Lect. 2. p. 25.

Anno 1671. mense Septembri, quidam, vocatus la Grange, Genevæ obiit, cui alvus totos 15. dies adstricta fuit, hinc dolores ventris vehementes, succedente sub hunc

Aperto cadavere intestina omnia, tam tenuia quam crassa, fœcibus turgentia reperta sunt: Intestinum vero Rectum reduplicatum inventum, præterea membranæ annulus arcte id contrungebat, enatus e proximo peritonæi pro. essu, in scrotum abeunte: hinc adstrictionis alvi causa & remaneantium tumorem.

D. Maignam Medicus & Professor Regius in Mathematicis; volvulo interit, impetu magno pituita multa in intestina prolapsa, ibique collecta & putrefacta inde abiectionis factus, hinc morbus. Jac. Thevart. Annotat. 2. in consp. 31. G. Ballonii lib. 1.

Ileus à Colo pituita infarcto.

Caroli V. Imper. Legatus dolore torquebatur, necnon tumore à dextro hypochondrio per ima ventriculi in sinistram exportecto: huic cum sexennio toto remedia genus omne, tanquam emolliendo scirrhus adhibita fuissent injecto tandem acriore clystere, durum ac firmum quippiam, medio ductu pertusum, pedis longitudine detractum est, quod ille intestini portionem esse metuebatur sed quum repente levatus videretur, adhibito continuo iterum ac tertio clystere prolutus est, rursusque simili evulsa materia continuo est prius valetudini restitutus: Alteri quidam simili, sed gravior affectus alvum prorsus cohibuit: qui tandem ventre supra modum intumescente decessit & vivis: Inventumque est Colon intestinum usque adeo infarctum pituita concreta, ut solidum prorsus censeret, nihilque omnino fæcis in alvum dilabi sineret. Fernandus Parbol. lib. 6. cap. 9.

Ileus à prolapsu intestinorum in scrotum.

Joh. le Charron Volvulosus factus à prolapsu intestinorum interorum: Manus adhibita, Reposita intestina, restitutus: sed postea excreta est à medicamento innumera humorum colluvies, prius mota sed non promota. Ille evasit quidem tunc; exactis aliquot post annis alio morbo interit.

Aperto cadavere, observatum est mediam quandam partem intestinorum & mesenterii, rupto peritonæo, in scrotum amplissimum, & omni inde majus, prolapsam, ut etiam inde retrahi nequiret; Et ista prolapsio erat illi naturalis, intestinique tanquam in loco nativo & augebantur in scroto, & nutriebantur. *G. Ballonius consil. medic. lib. 2. consilio 24.*

Iliaca passio à prolapsu intestino in inguen, cum imi ventris quasi syderatione.

Jac. Berthier post longas corporis agitationes & conatus, & usum rerum flatulentarum, in colicum dolorem, ut putabant, incidit, sed Iliaca, passio erat: aut saltem à torminibus cruciatibusque conturbata convolutaque iursum deorsum intestina, tandem id mali intulerunt: Circa inguen apparuit tumor, intestini prolapsus erat: semel tantum eum prolapsum fuerat passus, tamen principio non putabat intestinum esse provolutum, sed tumorem testiculi: Quod ne cui mirum videatur, sciendum in eo conformando naturam sui oblitam fuisse: nam testiculus neuter in scroto erat, sed uterque intus conclusus erat: unus quidem apparebat tactui soli, & circa pectinem locatus erat, alter delitescere plane: sicut tumorem tantum testiculi circum pectinem suspicabantur: At aliter res erat, & frequentes vomitiones, & suppressa omnino alvus prolapsionem intestini indicabant: dolor erat magnus circum umbilicum, qua situm est Ileum: Pars fomentis & semicupis non est remolita, sed eorum usu an contingerit, nescio, intra triduum totus pecten inflammatus est, & aliquid acuminatum apparuit, ex quo pus aniosum & foetidissimum excretum est: dubitabant an id ab intestino rupto nasceretur, Et magna rupti intestini erat suspicio: quicquid sit devolutum erat intestinum e sede sua, quod tumor ad pectinem indicabat: clysteribus tentata alvus nil reddidit, longioribus balanis sollicitata, reddidit; Quæ materia rupto exiguo tumore excreta est, ea graveolebat admodum, hinc feculentæ materiæ magna fuit suspicio; tamen speculo res explorata est, nec incisum intestinum compertum est, febris perseveravit, dolores frequentes, sputiones, vomitus, sed non ita frequentes ut in aliis observavimus, sudores, defectiones animi: 6. die totus pecten intumescens magis, erysipelatodes, mors denique nono die.

Aperto cadavere, imus venter quasi sideratus apparuit, prolapsum Ileum: *G. Ballonius consil. 31. lib. 1.*

Ileus à mesenterii scirrho genitus.

Observavi Ileum ex scirrho mesenterii compressis intestinis. *Joh. Riolani medendi meth. sect. 3. tract. 1. cap. de Ile.*

Anatome Famine Passione Iliaca defunctæ.

Fœmina 40. circiter annorum, aliquot liberorum mater, plures annos ante hernia inguinali decensa, ex manifestâ notaque causa ex-

terna in Passionem Iliacam incidit, eaque, frustra adhibitis omnibus remediis, obiit. Post mortem facta corporis Anatome, ut genuinam morbi causam inveniremus, vidimus intestina tenuia pene omnia inflammata ac sphacelata, unde dolor ille ventris continuus & intolerabilis cum intemperie calida & siti inexplebili ortum duxit: omento non supra intestina expanso, sed plane detracto, & in hypogastrio prope inguen dextrum complicato: Intestini vero Ilei portio digiti articulum longitudine vix superans cum particula omenti in processum peritonei dextrum delapsa externum illum in inguine dextro conspicuum tumorem excitavit, quem jam non, ut quidem alias facile fieri poterat, in corpus, adhibitis licet omnis generis emollientibus, ac inflammationem arceret solitis, cum internis, tum externis remediis, retundere atque reprimere licebat, quia non minus illam in processum peritonei dextrum delapsam intestini atque omenti portionem inflammatio & sphacelus in tumorem interea attulit, maxime processu illo peritonei ante nimium ampliato, interea vero iterum coarctato: quo etiam evenit, ut non solum excrementa nulla per alvum secederent, sed & redundarent, & per superius guttur egererentur, quin & per os assumpta quæcunque in hac nempe intestini portione, quæ processum peritonei lubit, sufflaminata, ultra transire nequirent: quo propterea in casu mercurii etiam Clysterumque omnium usum plane frustraneum deputamus *D. Georg. Abrah. Mercelini.*

Virginis cujusdam ileo laborantis, & bufones vomentis dissectio.

Virgo per annos 20. plurimos bufones evomit. Laborabat pedum tumore, in quo cutis ipsa sæpe fudebatur, ac humor tenuis extillabat. Erat admodum emaciata. Circa stomachi regionem dolore atroci vexabatur, eodem ritu ac si unguis ventriculi parietes lancinarentur. Potus & cibi astitia. De dolore, duritie, & pondere in dextro hypochondrio semper fere querebatur. Inter dormiendum multum sanguinis evomebat. Tandem, post evomitibus immanes, cum excrementis intestinalium latentibus, interiiit.

Duos tumores habebat, magnitudine ferme nucis juglandis mediocris, alter in sinistro latere circa intimos lumbos, alter vero pube tenus eruperat; hic paulo ante obitum sponte sua erumpens in ulcus degeneravit.

Aperto abdomine, ilium tribus in locis involutum erat. nodi, seu involutiones, digiti longitudinem æquabant, & ab qua intercapedine ab invicem distabant. Intestinum illud, hac involutione, se ut duplicata tam arcte angustatum fuit, ut liquor siphone injectus non nisi guttatim pertransiret. Injecto liquore, & involutiones evaginatz sunt, & per pauca, dura & parva excrementa cum quatuor lumbricis perexiguis exturbabantur.

Hepat solito grandius, quatuor libras pendebat. In media parte concava erat macula alba ducatum aureum adæquans, adipis instar, tactu mollior, cartilagini per similis, quæ totam jecoris substantiam penetrabat. Huic & aliz

alix minores comites erant. Hepar intrinsecus album & durum apparuit pure & sanie repletum. Cadaver admodum foetebat.

Varia de bufonum vomitu habemus observationes, ane fuerint bufones, an analogum quid, certè hæreo. Sum in ea opinione nihil animale produci nisi ex semine, non dicam ex virili & foeminino, cum, expertus loquor, mense Martio araneam vitro incluserim quæ ova pepererit, & postquam exliccata fuerint, alia rursus peperit, ex quibus, quod mirandum est, novæ araneæ exclusæ sint, idque obturato semper vitro, ita ut certus sim araneam masculam non adfuisse. Per se ex putredine ranas, bufones, aut lumbricos generari nego. Quid de lumbricis in corpore genitis sentio, postea dicam.

Crediderim faciliè ægram hanc non vomuisse bufones, sed simile quid: fieri potuit illam ejecisse caseosum quid; imo quibus menstrua deficiunt, sæpe vomitus cruentos incurrunt. Quid si sanguis coagulatus esset ejectus, qui viscidis ac biliosis humoribus erat involutus, non ab humilis bufonibus semierosis fuisset?

Vehementi hoc vomitionis notu, intestina ita invicem illata & vaginata fuerunt, adeo ut tota fistulæ intestinalis cavitas maxima ex parte esset occulsa. Non mirum igitur eam dolore atroci circa ventriculi regionem fuisse vexatam; cum istæ intestinorum convulsionēs (quæ convulsione & spasmō excitantur) admodum dolorificæ sint imo ab hac occlusione factum est, illam afeitia laborasse, nam quicquid potus aut cibi assumpserat, evomere iterum coacta fuit.

Hunc morbum ab acido in sanguine & chylo abundante, originem habere non dubito: ferum illud acidum glandulis intestinorum extillans, cum tam acre fuerit, ut ventriculum & intestina erodere potuerit, dolores intolerabiles excitati sunt, hinc convulsionēs, quibus intestina invicem volvebantur. Ex humoribus lentis, ibique stagnantibus, lumbrici producti sunt. Corrodente acido vascula sanguinea erodente, sanguis effluebat, qui infecta ægra vomitu nocturno tempore exturbabatur. Ex hac saburræ stagnatione etiam foetor ortum habuit.

De dolore, duritie & gravitate sub dextris collis, etiam a sanguine acido & lentis humoribus inquinato, hepatis vascula obstruente certe originem sumit. Fecit obstructio ut plus humoris admitteretur, quàm in venas redeuntē amandari poterat, hinc mole auctum fuit. Interna interim substantia ab humoribus obstruentibus, qui & corrumpēbantur, erosa fuit, inde dolor. Durities veniebat, quia partim sphacelatum, partim ab humoribus contentis distendebatur.

Ulcera externa etiam ab obstructionibus in musculis aut glandulis ortum duunt. *Siephanus Blancardus in Anatom. Practic. rationali.*

Post dolorem fixum in dextro hypochondrio & passionem iliacam cadaveris inspectio.

Filius alicujus mercatoris à longo tempore continuo dolore fixo in dextro hypochondrio vexatur. Tandem iliacam passionem passus, moritur.

Aperto abdomine, cæcum intestinum erat contractum, & in ilium insinuatum, adeo ut nihil ex illo in colon descendere potuerit. Cæcum extractum non tantum inflammatum & prætumidum erat, sed etiam cancerosum.

Iliacis passionibus causa sæpe est inflammatio, a fœcibus obstructio, flatus, aut hernia; exinde intestina distenduntur, & succi nervoli curius pervertitur. Hinc quoque intestini partis paralytis, & contractio, adeo ut intestinum arcte contractum facile in distentum incidat. Canceri in intestinis fieri possunt, cum eorum glandulæ obstruantur. Cancer enim est mortificatio glandularum, quæ in carne sphacelus & in ossibus caries dicitur. *Idem ibidem.*

Ilei affectus vera causa per varia exempla anatomica demonstrata.

Qualis sit affectus ileos (quem vulgo etiam miserere mei vocant) quæque proprie ejusdem causa, haud satis convenit inter Medicos. Nonnulli credidere in eo intestini tenuioris fieri circumvolutionem, seu contorsionem. Alii è contra pernegant, intestina posse in nodum circumvolvi quandiu mesenterio sunt annexa. Putrefacto vero mesenterio (quale semel atque iterum me vidisse nemini) idem utique evenire posse arbitrantur. Quod si vero attendamus ad ea quæ post mortem observare nobis contigit, oportet ut statuamus ileon atoniam esse intestinorum, & præcipue tenuium, concomitantibus vomitionibus frequentissimis, alvi adstrictione, & non raro quoque doloribus valde atrocibus, imò morte repentina. Hæc intestinorum atonia provenit primò a nervis intestinorum, si non in totum, saltem ex parte obstructis unde oriuntur intestina & præteritum tenuia, imò motu peristaltico naturali destituuntur, utpote spiritibus animalibus deficientibus. Secundo, eadem oritur ab obstructione intestinorum, quam vel excrementa indurata, vel deglutita ossa, similiaque solida alia inferunt. Tertio, susceptio, seu ingressus intestini subinde affectum illum gignit, sive ingressus iste ortum ducat à motu peristaltico præpostero, sive à motibus convulsivis, imò à nimia dilatione particulæ intestini, aut ab ejusdem nimia constrictione; unde pars magis ampla, partem arctiorem in se se recipere apta redditur, in hoc vel illo intestinorum motu. Quarto, hujus mali causam invenio contractionem & coarctationem esse intestini, quod aliquoties adeo contractum reperi, ut vix minimum digitum admitteret, neque deglutita, nec flatus penetrare sineret. Quatò, ab hernia intelli-

nali idem affectus sæpiissime provenit. Et de-
num sexto, inflammationem quoque intestino-
rum ad causarum seriem referre oportet. A
nervis intestinorum obstructis ortum habuisse
hunc affectum in uxore cujusdam Viri Docti,
(quæ nuper in totalem alvi adstrictionem &
vomitus continuum, sine notabili dolore sine
febri, inciderat, unde mors subito sequeba-
tur) nullus dubito. Quod intestina à func-
tione sua quoque desistant, simulac, vel ab excre-
mentis induratis, vel deglutitis ossibus aliisque
similibus solidis intus obturata sunt, in cada-
veribus me his animadvertisse memini. Tertio,
hoc malum à susceptione, seu ingressu intestini
unius in aliud provenire, non est dubitandum,
imò bis publice idem demonstravi in intestinis
filii cujusdam pistoris, ut & aliis cujusdam hos-
pitis, à me exemptis & dissectis; qui, dum vive-
rent, multis malis fuerant correpti, sed præser-
tim ventris doloribus, idque horâ una atque
alterâ post paltum. Tertium exemplum hujus
affectus conspexi in cadavere à me dissecto,
præsentente Joachimo Schradero Chirurgo satis
perito. Dixi quoque hujus mali causam esse in-
testinorum coarctationem. In cadaverum nempe
apertione aliquoties observavi intestina ita
coarctata, ut ne minimum quidem digitum ad-
mitterent. Si igitur in hoc casu excrementa
paululum indurentur, aut si flatibus transitus
denegetur, quid mirum, homines subito ex in-
tolerabili dolore & inflammatione interire? *Fre-
deric. Ruysch. in Observation. Anatomico-Chirur-
gicis.*

Ex enterocèle & gladii ictu ileos funestus

Anno 1675. cum Parisiis versaremur in No-
trophium la Charité dictum miles advectus
fuit, ictu gladii profundiore & in abdominis
cavum penetrante, vulneratus: Periclitissimus Dn.
Morellus Partem omenti prominulam, manu
ilicoprehendit & filo quod per acumen trajece-
rat, partem ejus incolorem ligavit, abscon-
dendo portionem aeri diutius expositam, re-
liquamque blande reponendo, medicamen-
tis necessariis non neglectis: Biduo post
æger malo iliaco misere vexatus interiit: Ca-
davere aperto intestina tenuia, ileon præpri-
mis lalum gangrenatumque deprehendimus:
In alio quopiam, cujus interanea idem Vir
Exercitatus lustravit, triplici in loco portio-
nem hujus intestini intra alterius cavum rediisse,
sive intro susceptam vel inferiorem in su-
periore ejusdem partem intortam fuisse no-
tavimus cum tamen non constiterit affectu ist-
hoc agrotum laborasse. Eundem mali exitum
vidimus An. 1681. in Viro sexagenario ma-
jore, qui subligaculum ex linteis male com-
tectum, aliquandiu gestarat, successu non æque
felici, cum intestinorum prolapsum illud sem-
per prohibere non valuerit: Unde de commo-
diore omnino prospicere sibi debuisset, ni
intempestiva verecundia malum clam haberi
voluisset, intestinorumque optata in abdomen
quandoque regressione. sibi meliora pollicitus
esset, quibus tamen se frustratum vidit, dum
munis publicis functurus decem circiter ante
obitum diebus, intestina subito prolabi denuo

expertus est, non sine multa animi consterna-
tione, imprimis cum emollientibus medica-
mentis, aliisque convenientibus adhibitis, in-
terne & externe, pristinum locum illa repe-
tere nollent, quin imò elapsis diebus aliquot,
nauseam vomitusque cicerent, quo tandem
cum assumptis sacculenta ejecit, subsequenti-
que febri & delirio, viribus prostratis, ad
Creatorem, cujus intuitionem perpetim frui
ardenter desiderabat, emigravit.

Scholium. De variis vobis heic dicendi an-
sa subnascitur, ac præprimis de vomitu illa-
corum: Illustri Willisius vel de hoc potissimum
solicitus fuit, ut qui Medicamenta per os
assumi solita operationes suas peragant, tan-
dem inveniret, huncque ob finem ventricu-
lum, intestina, cor & arterias sub cultrum stu-
diosè vocavit, quo de ipsorum affectibus ac
ratione formali eo certior esset: Equidem in ven-
triculo, si quis alius affectus, vomitus frequen-
ter accidit, in quo fundum ventriculi, omni-
um superius versus se recipere, & quidquid
intus contentum habet, per illud deiecere,
jam Vett. statuerunt, modo autem laudatus
Vir, in media ventriculi tunica fibras carnes
dedit, varii generis, circulares præprimis,
harumque binos ac distinctos ordines, stoma-
chum, quoad omnem sui dimensionem cin-
gentes: suntque istæ satis conspicuæ, ubi ven-
triculum tantisper elixaveris: & sane motus
ventriculi in animalium vivorum sectionibus
demonstrabilis est, suadetque a sana ratio-
ne, enimvero ingesta quibus ille secundum
peripheriam suam distendi videtur, cedenti-
bus tantisper fibris, instar lapideum illic hære-
rent, ni motus iste superveniret, docuitque
nos ventriculorum caninorum post paltum
examen, uti & ruminantium, dictas fibras in-
gesto alimento quasi disjunctas contrahit, &
magis magisque coangustari & ad se invi-
cem redire, hocque ipso retentivis facul-
tatis robur, si non & constrictivis Veterum
absolvi, siquidem actione ista è glandulis
stomachicis menstruum spirituosum exsillet,
quod massam undique compactam, promptis-
sime pervadit: in vomitu illud notavimus,
quod unusquisque vel in se experiri potest,
adduci ad se invicem latera ventriculi dicta-
rum fibrarum ope, juxta tamen has ita cor-
rugari, ut valide reniti ventriculus ad ac-
tatum fundi ratione deprehendatur, eodem
quo thalami cardiaci modo, fibris ipsarum
ad sanguinis quem susceperunt expulsionem
se accingentibus. Est hic motus ventriculi
peristalticus in homine inversus, quem in vi-
varum bestiarum anatome sæpius quoque vi-
dit Celeberrimus Wepferus: cui constat ex
Hist. & nox. Cicut. pag. 87. verba ipsa, ut po-
te Willisii sententiæ, nostræque robur ac lucem
addentia paucis heic subidemus: ventriculum
non semel vidi constringi lente versus stoma-
chum subsequente vomitu, aut versus pylorum
contentis in duodenum explosis: nunquam
gracilior & brevior reddebatur, mox iterum in-
tument, subsequente rursus nova coarctatione,
quæ vel versus pylorum vel stomachum progre-
diebatur: Motus istos peragit fibrarum benefi-
cio, quarum maxime conspicuæ sunt exterior,

rectæ, à quibus se contrahentibus undiquaque ventriculus brevior & gracilior evadere videtur, & internæ his subjacentes circulares, à quarum motu peristaltico, undiquaque latera libimet accedunt & contenta propelluntur, præter transversas, quarum beneficio utraq; connectuntur: Ut vero motus isti subsequantur, necessario requiritur stimulus aliquod nunc blandum & amicum, nunc inimicum, unde irritari Spiritus illos crebrius & vehementius iterant, fibrisque quaquaverlum contortis, vomitui enormi ortum præbent: in statu naturali ita comparatum est, ut singulari Dei providentia, constitutisque legibus, quamprimum massa alimentorum in ventriculo soluta in intestina tenuia appellat, motus peristalticus succedat, quamvis forte irritamen non addit: nempe, si nil aliud, parietes saltem intestinorum, ita lenim adaugeta, sibi modo contiguos diducere valet, sicque fibris optimo instituto contra nitendi motumque hunc continuandi ansam tradere, quamdiu alimentum nondum subacti & à fecibus secreti, portio notabilis adest, ut ipsius massæ particulas & succos hoc ipso motu strictis ductuum vicinorum fibrillis accedentes, jam silentio prætereamus, quorum acrimonia non attemperata, intempestivæ dejectiones sæpius subsequuntur. Inde fibris istis nerveæ præeunt, imo junctæ atque intertextæ sunt, ut ad ipiculorum noxiarum eliminationem, junctis viribus usque insurgerent, nec opus est nerveam coronam ventriculi, hujusque innumeras per substantiam ejus propagines, tunicam nerveam, pariter ut in intestinis constituentes, heic multis adducere, quarum sensibilitatem, dolores ventriculi & intestinorum atrocissimi, indeque nati motus spasmodici satis evincunt, merenturque legi quæ harum ratione Excellentiss. Wepferus p. 83. Cicut. aquat. scripta reliquit: nos quoque superius plura de his diximus. Quandoque autem vellicans materia in ventriculo immediete non contenta est, sed vel circa octavi nervorum paris propagines subsistit easque aggreditur, ceu in affectibus nephriticis, colicis ac hysteriis palam est; enim vero strictæ illic ab irritante fibrillæ, spiritusque in motum impetuolum acti, passio eadem fibrillis confinis inducitur, indeque fibris carnis una in subsidium vocatis, motus ejusmodi peristaltici subsequuntur, quandoque vani & inanes, uti in nausea ac vomitione: In herniosis, si intestinum prompte reponatur, labes facile succedit, enim vero compressis intestini parietibus, & fibrarum motus impeditur, & sanguis in vasculis capillaribus non raro stagnat, gangranamque hinc, acquisita corruptela inducit, quorum utrumque violentæ fibrarum irritationi, & funesto exitui non raro occasionem suggerit. Accedit sæpenumero iterata intestini procidentia, unde labes vel non vel levior prius vicibus inducta, sensim natales & augmentum cepessit, inprimis si manuum contrectatio sæpiens vel imprudens, qua intestinum reponi consuevit, supervenerit, hinc enim vascula sanguifera si vel comprimuntur, irritanturque haud parum intestinales fibræ, intestinis nihilominus non semper regredientibus, quod procidentia vel major est, intestinaque constricta admodum ob fibras non parum

irritatas, vel etiam portio superior à fibris pericælis peritonæi, itidem sele utringentibus, acitius comprimitur & coarctatur: interdum autem intestinum secundum unam alteramve sui portionem in se ipsum redit, idemque fibrarum motum, massæque isthuc subigenda & a feculentis liberanda obstaculum parit: In adolescente, qui ope chirurgica ab enterocæle liberatus fuit, non putamus gravem labem intestino illatam fuisse, quod vomitus frequentior fuisset, motusque spasmodici, de quibus corpus verius umbilicum ascendens, testatur, vehementiores, neque interdum, ut a materia acri ad intestinum ileon delata, levius irritante, ob fibras ad talem motum ex prægresso symptomate dispositas, vomitus in talibus mox subsequatur: quin inopuit in coli angustis illic loci notabilibus, colligi & harere vellicans pituita, motuque pari per fibrillarum nervearum seriem, ob dictam octavi nervorum paris ramificationem, ventriculus affici: & lane vomitus ultimus à materie saburra in hujus plicas collectæ profectus videtur, præcessit en. capitis dolor, junctus cum oris amarore, compressione circa præcordia; in milite gangranæ intestini manifestata fuit, dubiumque non est, quin in sexagenario inflammatum fuerit idem, febri, delirio & vomitu materia feculentæ, fidem huic tacentibus: nostrum cum peterece a consanguineis consilium, suavisimus ne multis intestini regressum manu molirentur, si foribus aliisque medicamentis ex artis præscripto usurpatis obtemperare nollet, sed ad cultrum tempestive devenirent: antequam noxam funestam acciperet: Fuerunt autem, qui contra senserunt, operationem, si repositum fuerit intestinum, institui non posse, contra quam cum ipsi Parisiis celebratam vidimus, tum etiam Pignus Chirurgus peritissimus epitome de præcept. Chir. & Medicin. gallice edito docet, cap. 1. lib. 2. Et si l'advient, que le boyau soit tourné, la matiere estant enfermée dans luy même, lors ny la main, ny les médicaments, ny la situation, ne peuvent plus servir, tellement qu'il faut venir à l'extreme remède, qui est l'incision du peritoine &c. Quandoque intestinum prolapsum multo cum sudore & labore introsum recedit, parvo tamen agroti cum solatio, exitiali labe prolapsus: mora ipsi inusta mox subsequente: qua de re notabile est exemplum, super quo aliquando nobiscum contulit, beati memorie Sponius Pater Hac ipsa, (inquit in literis An. 1675. ad nos exaratis) die memorabile quid in hac urbe contigit; insignis Jurisperitus enterocæle à pluribus annis obnoxius, præcautionis ergo subligaculum gestare conueverat: cum vero pronuper per aliquot dies illud abdicasset, ecce repente in bubonocælem gravem incidit: accersitus Chirurgus satis solers, intestinum omni ope reponere sitagit, verum frustra, quin imo supervenit postmodum ilcus cum frequenti vomitu: Alii Chirurghi in reductione ejusdem intestini suam etiam industria exercebant, sed irrita conatu: iterum tunc vena: Enemata subdita, hydrargyrum nec non globuli aurei & argentei devorantur, sicut & oleum amygdalinum sorbendum datur: Tandem consilium cogitur Medicorum & Chirurgorum: Dece-

usque foramina obiter quærentibus notare licuit, à quibus materia dicta in cavum ventris abiit, pone hoc mesenterii scirrhum, circa glandulam Mesenterii magnam insignem animadvertimus, longitudinale, & ipsum, forte à contactu ilei rubicundum: Hepar fere exuccum & pallidum. Vesicula fellea, loco non naturali in lobo nempe hepatis infimo sita, & ab hujus extrema superficie exorta, circa finem pylori cum initio duodeni arte cohærebat: Ventriculus admodum nullatus, sinistrum hypochondrium fere totus occupabat, quasi e sua sede secessisset: Pancreas duriusculum: Lien autem & Renes naturaliter habebant: Venter medius pulmones exhibuit putridos, & ex sinistra parte adnatos: Cordis auricula dextra lata & ampla, sinistra vero parva & angusta: in illa delituit polypus figura dimidii thaleri, 33. circiter pendens, cuiusmodi alius oblongus 5iv. in arteria magna hæsit, & alius 5iij. longitudine, venam pulmonalem occupavit: fibræ, ventriculi dextri, præ flacciditate collabascabant: Pericardium ichore turbido plenum, & glandula thymus dura & subatra: Pulmones v. incisione facta præter materiam subpurulentam & spumofam nihil ostenderunt. *Idem ibidem*

*De Ileo sponte sphacelato & Miserere mei
lethifico.*

Puero ætat. 14. per aliquot hebdomadas præfui, torminibus excruciabatur diu; sursum & deorsum assumpta fœcesque regerebat. Convellabatur univèrse, præsertim in furis, dentibus stridebat, & dum brachia fortiter contenderet, manibus contractis, abdomen ipsi hinc inde globosum fiebat, à musculis valde contractis, & ventre suo tot monticulos formantibus.

In consilium fortissimi quique Medicinæ Atlantes adhibiti, causam morbi refundebant in bilem porraceam & æruginosam, sed ipsorum præsidii nihil juvantibus puer indies dolentior, debilior & mactior, convulsus tandem enormiter, abreptus est. Cadaver mihi cessit extremum ileon (qua parte in colon ascendit, & valvula munitionem est prægrandi, ne fœces in cœcum assurgentes relabantur.) univèrse attextum, putrido tabo, musculo iliaco, quem arroserat, adeo ut nihil nisi liquidissimi præterflueret, idque dolenter admodum & convulsissime, imo ab ipso crassioribus transitum negante, intestinorum motus peristalticus invertebatur, vomituque refundebantur assumpta, plurimo glutine atque bile, modo flava, modo viridescente perfusa.

Ileus idem famineus.

Puerperæ æt. 30. per menses aliquot adfuit sub initia dolebat modicè ad ileum dextrum carminantibus: nullis vel assumptis, vel admotis adjuncta fuit. Dolor vero pedetentim ita increvit, ut ægram in ejulatus impulerit, imo in vomitus enormes. arte nulla compescendos & exinde ita debilis evasit, ut exanimis videretur, sed vitellis ovorum vel vino, vel spir. vini dilutis recreabatur.

Millies me rogavit ut medium ipsi recluderem abdomen aculei dolentissimi extrahendi causa.

Convulsionibus tandem & febre nobis est erepta, atque muto corpore suo fidele nos docuit tot symptomatum originem esse ilei ext. emi & valvulæ ejus univèrsæ sphacelum obfirmatum, nullis Pæoniis herbis medicabilem. & *Collegius Clariss. Dom. Car. Drelincurii.*

IMAGINATIONIS VITIA.

ANtequam de Imaginationis vitiis hic dicamus, quadam de imaginatione in genere præmittenda veniunt: Est autem Imago facultas corporea potius quàm spiritalis, quæ res exteriores atque abientes, tanquam præsentibus nobis sistit, idque spirituum animalium organo, qui vestigia in cerebro ab objectis vitiis prius impressa, refricant. Nec tantum objecta absentia nuda & qualia sunt nobis sistit; verum etiam vel multiplicat ac conjungit quæ, aut pauca, aut separatim visa sunt; vel dividit quæ conjunctim objecta fuerunt. Quando illa in statu naturali subsistit non cogit mentem præsentia credere quæ tanquam talia repræsentat, quia scilicet moderata est spirituum actio. Verum quando iidem spiritus, vel per particulas a sanguine vel succo nervoso degeneribus suffectas, aut etiam extus advenientes, in motus cientur & perniciores ac vehementiores, non tantum objecta absentia pro præsentibus per profundioris sui insinuationem in ea quæ premunt vestigia, habere cogunt, sed etiam plures rerum ideas toto cœlo diversas momento per excursions suas in cerebrum promptissimas ita copulant atque combinant, ut inde præsentia objecti protius chimerici menti proponatur, cui etiam se subripere minimè valeat. In hoc itaque spirituum vehementiori motu, atque pernicitate, imo in eorundem particulis paulo fixioribus, ac de natura salium ad fluorem evictorum participantibus, unde ex quo semel quædam pressere vestigia, his obstinatius insistant. In hisce, inquam, omnibus consistit tota imaginationis læsæ vis, de qua jam aliquot exempla adducemus.

Vires imaginationis.

Mercator quidam Hafniensis, intensissimo dolore capitis afflictus cum dies, noctesque aliquot insomnes trausgisset, pharmacis incassum tentatis, iussu fonticulum in brachio aperi, & quidem, ut e vestigio humorem noxium ad se raperet, scalpello in vivam carnem adacto. Dum autem in eo sum ut pressu digiti interstitium musculorum inveniam, æger averso vultu pressum illum, scalpelli idem interpretatus, stentorea voce Ah, inquit, quam penetravit ferrum ad ipsa usque ossa, simulque in deliquium animi lapsus, ægre post quadranthem horæ sibi restituitur, irrisus suaviter ab assistantibus mulieribus, quod digitum à ferri cuspe nequisset distinguere. Sed tantum potuit imago scalpelli animo ejus impressa. Aliud: Nicolaus Bagge civis sanatus ministerio meo ab ictero intensissimo, post tres hebdomadas improvise nuntio. eoque tristissimo exterritus, in

in idem malum subito relapsus est, graviusque quam ante decubuit. Scilicet, futuri damni imago metum iniecit, & porum choledochum jam ante apertum iterum observavit. *D. Olai Borrichii.*

Imaginaris dolor pedis ab amputatione cruris.

Observavi in Nosocomio civico quosdam post crurum abscissionem conquestos fuisse de dolore digitorum pedis abicissi, Et signum erat imminenti jamjam convulsionis, cerebro, nervorum principio, jam sine dubio patiente, quæ postmodum per defensiva & appropriata cauta fuit. *Paulus de Sorbani.*

Ex Imaginatione mors.

Henricus ab Heer libro observ. Medic. oppido rararum in Spa & Leodii animadvertarum, observ. 6. recenset tria Exempla perionarum imaginationis suæ vicio è vivis sublatarum: in quorum lectionem cum nuper forte fortuna inciderem, revocavi mihi in memoriam casum simillimum ante aliquot annos in Urbe hac nostra Thorunii observatum. anno millesimo sexcentesimo sexagesimo quarto, Magnifici cujusdam Præ-Consulis Thorunensis filia unica, tum ante annum Magnifico itidem Præconsuli in eadem Urbe, (quorum uterque adhuc vivit) nupta, cum tempore graviditatis sibi post partum moriendum esse firmissime imaginaretur, hoc argumento nixa, quoniam mater mox à partu illius ipsa supersistere vivere desierit, die sexta Novembris mulier sana, juvenula, & liberaliter hucusque educata, felici cum successu peperit filiulam sanam, quæ adhuc in vivis est. Hæc paucis à partu horis, satis vegeta existens, nulla ex causa, Epileptici insultibus, quousque ad mortem sine intermissione miseram gravissime torserunt, correpta, omnibus quamvis selectissimis & expertissimis remediis à Beato excellentissimo D. Meisnero & me frustra adhibitis, die nona dicti mensis naturæ debitum persolvit: cujus mortis causam (omnibus circumstantiis, ante, in & post partum rite expensis) nullam aliā quam, unicam eamque magnam imaginationem invenire potuimus, quæ etiam absque omni dubio ex metu mortis Epilepsiam induxit. *Simonis Scholzi.*

Kerkringius Spicileg Anatom. Observ. 41. simile exemplum habet de Fœmina. Catharina Petri, in Pago Quadiisk. Holand Septentrionalis habitante, Hæc cum elemosinam mendicæ denegasset, mendicæ ipsi intra sex menses mortem prædixit; quæ cum sæpe fatalem terminum sibi proponeret; ad imaginem illius cohoresceret, aucta in dies imaginatione, indeque infirmitate, eo ipso die mortua est. *J. Jac. Sachs.*

Mira Imaginationis vis in somniante.

Valentinus Reich, Præconsularis Minister, annos aliquot supra triginta natus, vir robustus, sanus & vegetus, nocte quadam sub initium Decembris Anni millesimi sexcentissimi septua-

gesimi dormiens, vidit per somnium hominem quendam procera statura, Polonica veste indutum sibi obviam venientem, & lapidem in manu dextra tenentem, propiusque ad eum accedendo lapidem in pectus ejus vibrantem, & super ventriculi regionem percutientem, quo somnio ille expergetus percipit dolorem in pectoris media parte supra ventriculum, accenditque candela, animadvertit in dicto loco maculam nigram, orbicularem, magnitudine pugni, inde perterritus, animo angitur. Post Solis ortum, accersito Chirurgo Antonio Statlander, somnium narravit, simulque maculam illam monstravit, qui, Sphacelum metuens, locum affectum scarificavit, postea Empl. str. discutientia & resolventia applicavit, tum pedetentim macula illa colorem mutare cepit, dieque quinta plane evanuit, viro illo admodum sano & munia sua obeunte. Quem casum mihi, ut verissimum, dictus Chirurgus bona fide ipse retulit. Quid hic aliud statuendum, quam quod ex forti impressione cum terrore conjuncta, humores vitiosi in corpore commoti locum affectum subito occuparint? Siquidem patiens affirmavit, faciem illius hominis animo ipsius ita esse impressam, ut cum inter plurimos alios dignoscere adhuc non dubitaret. Alias miras imaginatricis facultatis affectiones collegit Marcellus Donatus, quem benevolus Lector videat *Lib. 2. Hist. Med. Mirab. cap. 1. Simon. Scholzi.*

Purgatio ex Imaginatione.

De viribus imaginationis in hypochondriacis præsertim obvia sunt apud Autores plurimæ; nec ignota sunt quæ de prægnantium impressione inter plures alios Th. Hænus eruditissimo in Tractatu suo consignavit Nauseam medicamentorum impressionem facere posse satis gravem sæpius expertus sum, inter alia exemplum sequens exponere non abs re fore judicavi.

Uxor famosi apud nos mercatoris. J. D. P. quartana laborabat molestissima, corpus totum atrocissime affligente, lentiebat dolorem osteocopon, lumborum & dorso gravitatem, rigorem, inappetentiam, & alia quartanæ familiaria symptomata. Advocor, ut de remediis prospicerem; ea respuebat omnia, ita ut nec ad salia, nec essentias, nec tincturas, nec spiritus per guttas sumendos, vel dolo etiam quod sæpius fieri oportere praxis docet, perueniri posset. Tandem antiquitatum mentem exhibere dolo tento, ipsa citius nimis & attentam elusit consilium meum: quare an conservam rosarum assumere posset, habere me mirum & saporis grati & molli quocumque conflectabatur, accommodatissimam, ex cuius usu febris sine dubio cessatura sit? annuit tandem persuasionibus, & an vomitus, an dejectiones illa sit motura, & an certo certius febris etiam peritura sit, perquiri. Cessabit, inquam ego, Dei ope, infallibiliter (ita enim erigenda etiam alias remedium non admissit) febris ope rationem autem medicamentalem experiris, quod si ventriculus pravis abundaverit humoribus, forte vomitum, dejectiones autem modicas quidem, sed certas conciliabit. Mitto circaveperam febrisugi dosim cum rosarum conserva

serua permixtam, simulque ut mane vice una, nam boli habebat formam, deglutiret, signficari curo; Agra impressionem vomitus dejectionumq; habens, maximam autem in medicamentum & eius operationem ponens spem. sollicita tamen numine postero die sapor ingratus sit futurus, circa noctis horam tabæ majoris quantitatem degustat tantum; inde nauseabunda statim quater vel quinques cum maxima violentia vomit, simulq; sexies vel septies alvum exonerat. Accedo mane & de operatione remedii quæro; male, inquit, mecum actum fuisset, si ex consilio tuo conservam deglutivissem, gustabam enim hesternæ vespere medicamentum & vix me vivam amplius reperissem; verebar, ut nosti, vomitus, verebar dejectiones, periculum tamen facere volui, an, te sic volente, saporem remedii ingratum superare possim, & quod timui experta sum; vomitus enormes, dejectiones copiosas; si totum assumpsissem remedium, qualiter cum vita mea actum fuisset, ipse iudica, Dignam, respondeo, temeritatis luiti poenam, ex imaginatione enim & nausea sola operationem talem subsecutam esse, certa sis, ut effectus etiam, febris nimirum lunatio, jam subsequatur, annuitis voveo. De ea, inquit, nullus dubito. Habebat tempore eodem ancillam quartana etiam laborantem. Ut videas, dico, non adeo periculosum nē tibi exhibuisse remedium & ex imaginatione sola factam fuisse operationem, ancillæ, quæso, meo periculo, quod reliquum est totum devorandum exhibe; parat ac exhibet ancillæ remedium, quæ sine nausea, sine vomitu quinques blande deiecit: In hera imago & impressio, quam de medicamento habuit, in ancilla medicamentum ipsum felicissimum fortiebatur ex itum; utraque enim molestissima aliàs liberabatur febre; sicque dozi una binæ curabantur febres. *Joh. Schindli.*

Superiori vere vir quidam egregius, cujus nomen, uti petiit, supprimo, vagos stomachi & hypochondriorum dolores non sine magna molestia integrum sextiduum animosè sustinens, tandem me accessit, omnique voto genuinas pilulas Francfurtenses, quas Beiero acceptas referunt officinæ, expetebat, serio & mihi sibi persuadens solam mali sui medelam latere in illis pilulis, quare omnia alia, licet meliora, pertinaciter damnaabat remedia, nec ullis precibus abduci poterat a suo voto. Mirans ego fervidum optum viri desiderium, tandem promisi me satisfacturum ejus voluntati, dictasque pilulas fideliter confecturum. Interim, ut & alii scirent, quantum mentis ludibrium foret imago & impressio, ex micis recentis panis cum saliva xviij. formo pilulas, easq; inuratas mitto Domino patienti; ille in aurora avide devorat omnes. Circa vespertinum ad me venit lætus sanusque, insignem pilularum mearum efficaciam astræ super lærens, meque specioso mactans elogio. Quinques alvum insigniter deposuerat & semel vomuerat. Vix fidem dabam insolita narranti, Domum itaque comitabar eundem, ut coram viderem materiam rejectam, quam in patina asservaverat. Profecto stupebam ego manam tenacis pituitæ saburræ, & nisi his oculis vidissem, nunquam vel juranti credidissem.

Vah! quid non molitur pertinax in re aliqua opinio aut fiducia? Certe quos nec ratio, nec ars interdum curavit, temeritas sanavit & mera imago ac superstitio, quod vel infinita confirmant exempla. *Joh. Schindli.*

§. 3. Quantum imaginationi in humores corporis imperium sit, ut ex Th. Fieno, & aliis passim experimentis liquidum evadit, ita eo, quod subjicitur, exemplo confirmabitur. Primarius quidam civis Hafniensis ex febre tertiana convalescerat, & domito jam morbo, corpus solenni cathartico expiarat, jamque sibi plene restitutus rogabat, ut uxorem quoque leni purgante tentarem. Pareo & pilulas duntaxat quinque propino. Dum illa delicatula in deglutendo tricatur, m. ritus, nisi, inquit, subito hauseris, quod apponitur, jam mihi quoque nauseam commovebisti abhorrebat enim maritus a pilulis, sorbitioni addictior. Dictum, factum, vorat illa hamum, & maritus, qui hauserat nihil, ante uxorem strenue purgatur, nec ternis dejectionibus, hisque luculentis contentus provocasse uxorem, etiam gemina vomitione stomachum evacuat, hac parte uxore superior, ut quæ nihil per os rejecerit. *Olai Horrichii.*

Alia imaginantium exempla.

Illustrissimus quidam belli Dux febre continua auctus meam exposcit operam. Venio, & quæ salutaria visa sunt, per aliquot dies prescribo, cum vespertina quadam nona subito evocor in auxilium, identidem occurrente famulo, Dominum suum in extremis esse, haussisse per imprudentiam venenum, jamque sudore frigido perfundi. Miratus inexpectatam mutationem ad volo, invenio ægrum prope modum desperandum, pulsum turbatum, omnia confusionis plena, famulum qui venenum obtulisse credebatur, fuga elapsum. Sciscitatus causam audio famulum similitudine vitrorum pharmaceuticorum deceptum, non consulta prius inscriptione, Domino suo gargarisum ebibendum porrexisse, cum debuisset offerre analepticum. Hic ego, peccatum, inquam, hoc est, sed non adeo grave, quippe gargarisum illum nihil ingreditur quod vitæ intidiari possit, utcumque ejus simul hauriatur integra libra. Tum vero experrectior Illustrissimus, At ego, respondit, frequenter audiivi gargarismos solis sanctibus consilere, stomacho autem & intestinis esse inimicissimos, id quod & jam expertus sum, ita horam pæne integram affligor, & vertigine funesta circumagor. Ego placide, nil, inquam, in Dania gargarismis permiscetur quod haustum graviter nocere possit, & simul ad pharmaca roborantia convertitur propino ægrotanti liberalem hauritum. Unde mox alacrior deposuit de veneno opinionem, & noctem quiete transegit, inque paucis diebus sibi restitutus est. Sed ad experimentum aliud. Uxor Christiani Nærgeri statuarii tertiana contumaci exacerata recipit, meo jussu, vitæ duo, alterum sudori eliciendo, paulo ante paroxysmum, alterum corrigendis stomachi cruditatibus destinatum, ex absinthio, centaurio min. gentiana, aliis. Imminente autem jam paroxysmo, per errorem totum illud vitæ exhaustum, quo stomachicum extractum in plures hebdomadas suffecturum continebatur, & ad

ad sudandum se componit. Intervenit frater ægræ, studiosus, & intellecto; ex inscriptione, errore, non, inquit, soror sudandi tempus jam est, sed de extremis cogitandi, hauristi enim illud una vice quod in dierum viginti usum præscriptum est. Illa anxia in sudores frigidos declinare, circumspicere sacerdotem, & si adhuc locus esset auxilio, opem meam ardentissime implorare. Advenio, & ægram jubeo habere bonam mentem, nihil esse quod mortem formidet, paratum me esse ut in ejus gratiam tantundem exauriam. Illa præter spem suam in novam vitæ spem erecta in paucis diebus perfecte convalescit, nullumque amplius experta est paroxysmum, formidine mortis, haud dubie, ita effervescentiam humorum febrilium turbante, ut in statum morbosum nescierint reverti. Tolerabilia hæc in ægris medicam artem ignorantibus, sed & Medico D. D. Oldenburgio similia ante biennium contigere. Is, ut erat castrensis Medicus, & artis suæ alioquin oppido peritus, sed imaginationum intervallis obnoxius, & in hæsiolando imminentibus suo corpori ægritudinibus prolixè anxius, postquam diebus aliquot Helsingoræ decubisset ex suspitione febris malignæ, quod existimaret traxisse se miasma à præfectis aliquot militibus, quib. in petechiali febre medicinam nuper fecerat, Hamiam se jussit transportari consilio meo usus. Ego cum toto triduo nihil vel febrile, vel malignum in pulsu, urinisque deprehendissem, quum, inquam, Amice, ad alia convertimur, febris equidem suspicio evanuit, sed noto corpus tuum pravis stagnare humoribus, ex diætæ & aquarum vitio, in obsidione Christianostadiensi contractis. Annuit ille, & me suatore, lene bibit purgans, quod lienis, aut certe acidi putrescentis circa lienem fæces exturbaret. Post triduum adsum iterum, & Oldenburgium meum propemodum desperandum invenio. Et quid, inquam, turbatur? Ille, decepit te, respondit, stochasticus tuus, ego enim jam mortem imminere sentio, quod in medio febris ardentis, & malignæ æstu catharticum assumpserim, unde jam totus exundo petechiis, iisque præ malignitate liventibus, simulque fenora & crura ostendit maculis scorbuticis distincta. Tum ego, aut, inquam, me fallunt omnia, aut hæc non sunt febriles petechiæ. Consulo pulsum, urinam, contrecto frontem, nullum usquam febris indicium. Ille diu reluctatur, & in febrim lipyriam se incidisse credit; cumque nec pulsus iduaderet, nec arderent interiora corporis, tandem, licet satis ægre, expugno pertinaciam tristitia sibi ominantis, & antiscorbuticis insistendum moneo, quibus ad breve tempus usurpatis cessavere maculæ, & Medicus sibi restitutus sanus in Scaniam ad exercitum rediit. Audio tamen ipsum hoc anno Helsingoræ obisse, sive recurrenit similis imaginationis constantia, sive serio rem gesserit Morbosa. Contumacior, funestiorque observata est imaginatio in clarissimo quodam Duce militari, qui nescio quo infortunio persuasissimè us erat se gratia regis excidisse, in conservandis præsidiariis sibi commissis negligentius egisse, eoque jam ad tribunal citari, ut capite lueret socordiam. Quæ licet sola animi tristitia secum agitantis inquietudo distaret, (nec enim ullius criminis reus depre-

hensus est) duravit tamen in pertinaci illa credulitate adeo obstinata mente, ut nec sacris, nec politicis, nec medicis rationibus contraria docentibus pareret, immò nec præienti aliquando indulgentissimæ Reginæ, & prolixè Regiam gratiam offerenti crederet; multo minus Medicis, qui duo simul advocati eramus, nostra enim pharmaca totidem toxica interpretabatur, & in alimentis aspidum virus recondi præ se ferebat; donec tandem ex longa & precibus omnium invicta marcidus inedia, peltiferæ imaginationi immortalis est. D. Olai Borrichii.

Historia de Imaginatione timida insolenti.

Virgo annorum circiter 30. temperiei calidæ & humidæ, cum naturali ubivis moderatione, pulmonem si exceperim, quem calor auctioribus gradibus misere dives infide afficiebat, humores illic indilcrete prolestants, sputorum specie postmodum fastidiosè explodendos. Animi vivacis, lepidi, hilaris, passionum turbinibus facile versatilis. Cum in eam frater, ægræ mentis vesania, subito irrueret, nimis trucibus, vultus maniaci larva formidabili ad desperationem aspersus, rutilante, quod horridius est, sanguinis avido ente, Jove illuminante terribior, se milites perditam rata, qua desperatio abripi bat, palante fuga se præcipitavit, licque terribile furentis iræ tatum decepit domo quomodo-cunque recepta. Ut otium fuit in rei neas libere intuenti jam innoxium, modo terrore quasi etiamnum absorbentis periculi examinabatur; modo pruriente vindictæ capeßendæ iunulo, effusa ira, amens sæviebat. Sic alternatim mutatis vicibus, bina & diversa passio sui moderandi impotentem perimebat. Ut vocatus ad finem secundi diei eam vidi, totamque rei hujus seriem ab adstantibus garrulitate læminna certatim strepentibus, sermonemque, ut in hæc in casibus ambiciosum est indiscrete miscerentibus, cumve invicem tumultuarie rumpentibus, didici, pulsus sortem exploravi, ut lascivarum passionum in corde periculosè ludentium conditio innotesceret. Erat is debilis, deses, intermittens, irregularis, qualis mortem proximè vicinam omnatur. Ut momento ambæ ex intervalis tempestates desæviebant, statim apparebat animæ facete vigor in sales alacris, ut delirio nugante delipere crederetur familiarib, aut nescio quies spirituum non visibilium larvis mystertose agi. Utriusque passionis immodicæ aluetum inordinationis motum, inter tumultus, ut licet succincte perpendi; scilicet in timoris præcipitationis confusione, omnia irregulariter turbante, & calor vivificus, & spiritus animans, nec non sanguis alens, uno quasi instinctu acti in cordis viciniam, quoad licet, certatim f. tui proruunt, illudque nonnunquam imprudenti auxilii ferendi ardore lucuose obruunt, & tumultus sic spiritibus, nec non calore comite, vitæ moderatoribus; ut circulatione, non vilioris ad vitam perennandam fati, anxie impedita, dum immorigeri cum permixtis spiritibus humores tumultuarie cor inundant, instinctui nativo, inde nata consuetudini, ut & cordis tremuli vultu imperio pervicaciter rebelles; spretis injurie hoc pacto partibus externis, grundi percellentis casus horrore fallendo inconsulte sacrificatis

ficatis, ut unicordi, pene quod vita fors est, sic satis tuto proliat. Hanc inordinationem Poeta pinxit. Palluit, & subito sine sanguine frigida sedit. In ira autem turbine, contrarius priori est humorum spirituumque raptus, nempe a centro ad circumferentiam evaginantur ij, externas partes furiose armaturi, ut intolerabilem injuriam amoveant, & si licet, vindicent, quacunque demum prurientis passionis arte. Hinc opposita omnino est externa species hominis hac bina passione abrepti; ignescunt ira & duris calor ossibus ardet: bilis liquidem irata agitatione spumantis fit truculenta in vicina loca eruptio. Id ambabus pariter proprium est, quod lugubri pretiosissimorum spirituum detrimento peccent, quamvis opposita insolentiz ratione. Duplici ergo indicatione pro rei urgentis necessitate, anxie plenus, illi parui prius quæ propiorem perniciem minitabatur, methodo ambabus apposite annuenti, sacre videlicet fugitivi spiritus restorationi.

℞. Elix. vit. Matthiol. ʒiʒ. tinct. croci ʒii. Specierum diamb. ʒi. Spir. vini rectif. ʒiʒ. Syr. cinnam. ʒiii. aq. meliss. ʒii. M. capiat sapius pro vitæ per intervalla sese horride negligentis, necessitate ex cochleari.

℞. Conserv. flor. violar. tunces, aurant. an. ʒiii. confectio. hyacinth. ʒiv. ambr. gris. gr. iii. cum syr. alkermes f. optata partitum magnitudine nucis avellanæ ad libitum capienda. Juscula imperabam ex gallis gallinaceis seniores & columbis, quæ spiritibus superbis in similes casus utilissime catullunt. Porus erat vinum generosius, sed avara copia concessum. His quatuor dies, nullo virium jugentium progressu frustra institimus, quod lethifera horridæ tragediæ idea, imaginationem adhuc tremulam sæpe sapius misceret; affectiones sic totas toties renovans. Forte quinta die vicini pagi necessitas me occupabat, cum solito frequentiores animi deficientis pavores desperate ingeninabantur; ergo in mei desiderati absentia, alius Medicus fuit rogatus, qui de repente prognosi exitiali præsentis inepte confectis, ut suis in aternitatem rebus ultimo sensu imperarit precipitanter, ne fato properante, lacum adeo opus forsitan præoccuparetur. Interim domum redux, viso ægram horum omnium imperitus. Ut has funebres lugentis domus ceremonias vidi, ex levi indignatione admirationi mixta parceri; dum omnes susurrante vultu mihi tacite insultarent, & statim postquam serio & parco discursu hujus timoris errorem futilem calligavi, cujus forte non amplius dubia omnium persuasio vix patiens erat, hoc enema injeci jussi, quo alvus sui perniciose incuria ad actionis necessitatis beneficium blande moveretur; bilisve portio aliqua circum præcordia infide otiosa in alvu n utilissime seducta excederet, in hujus affectus pertinacia imprimis rea.

℞. Decoct. emollient. & refrigerant. ʒix. electuarii lenitivi, olei violacei an. ʒiʒ. M. F. Clyster jam indendus. Evacuationem optimam excipiens insigne solatium prostratam non obscure recreavit, vix ob funereum mendacis persuasionis characterem sanæ persuasionis capacem. Hujus purgationis perutilis beneficio suavis, audax præscripti cholagogum sequens.

℞. Syr. rosar. solut. de cichor. cum rhubarb.

ana ʒx. electuar. è succo rosar. ʒiʒ. Spir. vit. dulc. ʒiʒ. aq. violar. ʒiʒ. f. mixtura mane ter ex cochleari sumenda. Effectus & copia humoris & discretionis actionis, & quod fatum est, affectionis solamine pretiosus fuit, ita ut postmodum in horas sehcus emendaretur, quamvis rardo progressu, & repetitis subinde assultibus retrogrado. Ex communicatione Clariss. atque amicissimi Viri D. Nozæ Eriburgensis Archidact.

Imaginationis falsa observatio quam anatomica manus detexit.

Rustica quædam sibi ad mortem usque ranas viventes tres, per quatuor menses geltare imaginabatur. Ex tunc per fistulam scaturiente bibit, & jam satata, ore a fistula remoto, pedem ranæ titulæ inhaerentem vidit, unde se tres, uti dictum, ranas imbibisse vulgus, per rugitus statimque, præsertim jejuno stomacho, uti solent discurrentes, & quasi coarctantes, sedulo persuadebat. Imo tria quasi ranarum capita in superficie abdominis tangi adstantibus videbantur. Tandem ex ascite obijt.

Aperto abdomine, lymphæ affatim effluxit. Tres excrecentiæ se prodibant, quæ omenti glandulæ scirrhoræ & induratae erant. Adnatus hisce tandem tumor omenti scirrhus qui libras duas cum quadrante penderit. Mesenterii glandulæ etiam scirrhoræ. Cætera inculpabilia.

Hoc modo & Medici vulgares & adstantes falluntur. Medici enim perspicaces, rationeque utentes facile conipiunt ejusmodi animalcula in corpore nostro vivere non posse: oportuit igitur ei ab imaginatione falsa dissuadere. Multi quippe morbi ab imaginatione non raro generantur, & per imaginationem curantur.

Pro varia enim imaginatione succi nostri varie disponuntur, & ad hanc vel illam partem diversimode fluunt. Quare per vesicatoria, tontanellas artificiales, setacea (quæ ad rem nihil faciunt) aliquando morbi curantur, quàm quod præ dolore arte excitato, a parte morboza avertantur. Hoc est idea de dolore setacei, te non amplius de dolore mali cogitare cogit, adeoque ut hac occasione spiritus per vim imaginationis in partem morbosam aliàs ituri, jam ad partem aliam mittantur. Steph. Blancard. in Anatom. Practic. rationali.

IMBECILLITAS

Vid.

VIRIUM PROSTRATIO.

IMPERFORATI.

De cura eorum quorum penis podexve clausus, similiter ac earum quarum vagina non aperta.

IN recens natis non raro podicem imperforatum observari, exclusionem lœcibus denegante membrana quadam crassiore, orificium intestini recti claudente, varia ab auctoribus variis proposita exempla declarant, legi hæc de

xx xx

materia possunt quæ habent *Fabr. Hildanus part. 1. obs. 3. Anus in omni venis lib. 1. cap. 30. Ambrosius Paracelsus lib. 24. cap. 17.*

Membranam hanc anum claudentem ungibus lacerari posse Paulus Ægineta lib. 6. cap. 6. docet. Hier. Fabr. ab Aquapendente orincia claua instrumento secante aperiri vult, imo ungibus venenatis imperite obitericis apertionem hanc minime permitti debere; addit insuper monitum hoc: Nullum ratione perficiendum esse aliqui in parte corporis apertionem alio loco, quam a veri foraminis vestigium, digito obvium, notari potest: Ubi enim, inquit, vestigium nullum occurrit, cultri nus non obtingit. Exemplum hujus rei apud *Hildanum, part. 1. cap. 75. invenire licet.*

Honesta, inquit, quædam Matrona Genevensis alium peperit, qui clauso ano excrementa per ductum urinarium simul & urinam excretaebat, accessit itaque Medicorum & Chirurgorum collegio, nullus in ea fuit opinione, ut de ani incisione quicquam tentaretur. Tandem cum excrementa indurescerent, nec per ductum ulum amplum amplius perire possent, inflatus est venter, exorta febris, aliaque signa promota, ita ut decimo septimo ætatis die & vita decesserit, aperto cadavere inventum est intestinum rectum vesicæ fundo adnatum. Admonitionem hanc consideravimus in recens nato filio alicujus aurifabri, cujus glans non perforata, nullo præsentis meatus vestigio. At subtus glandem insculptum observabamus foraminis vestigium, membranaceo quodam velamento tectum, hoc loco instrumento à nobis noviter invento, in hypopio usuali, apertionem fecimus, & effluxit urina insigni satis copia, satisque rivulose.

Infantes nobis occurrerunt varii, quorum anus perforatus, integumentum membranaceo intricatus, similiter ac puellulæ diversæ, quarum vagina uterina velamento simili occlusa. In omnibus felici successu instrumentum modo indicatum usurpavimus, nec unquam foramini facto turundas aut alia ejus sortis imponere coacti sumus, cum nullus metus sit modo dicto aperta conglutinari subito iterum posse, quale quid sibi persuadet Paulus, continuus enim materię effluxus unionem hanc non potest non impedire; in puellulis tamen cum larga, continuaque adeo, imo nulla excretio humoris excrementive liquidioris, per vaginam, non multo observavimus Emplastrum Diapalma liquefactum plunaceolis exceptum, turundæ formæ vaginæ imponere, quo inhibeat conglutinitio, *Job. à Meckren in observation. Medico Chirurgici.*

De imperforata quadam Epistola ad virum celeberrimum D. Joannem van Horne, Anatomies Profess. Lugd. Batavum. Domine.

Ultimas nostras ad te missas, quibus dubia quædam curiositatis gratia solvebantur his concludere verbis:

Quod si quædam rarius occurrentia in arte nostra se exhibuerint, haud intermittam quin eorum te participem reddam.

Accipe ergo, Vir Celeberrime, haud adeo

admiratione dignam, quam rarius occurrentibus annumerandum quod civitas nostra mulieres tales qualem hic proponimus rarius exhibeat.

Propositum minime nobis de puellis agere, sed virginem exhibebimus aduтиorem.

Rensje Eeltjens, ex Frisia oriunda, Amstelodami licet nata, virgo robusta, annorum viginti duorum, & alvi & urinæ excrementa legitima quantitate, debitoque tempore, deponebat, menstrua vero necdum observaverat, satis licet annosa; urinæ tamen excretio tandem valde interrupta fuit, forsitan quod materiosa ventris cavo colligeretur, brevi enim ab domuius tensivo tumore correpta. Accedebant pressiones doloris gravissimæ circa pudenda, vehementes hæc adeo fuerunt, ut vestimenta lacerare, omniaque turbare coacta fuerit, imo desperatione mota violentas sibi intulisset manus, si soror impedimento fuisset.

Quæcunque ipsi præscripta fuerant medicamenta plus noxæ quam commodi attulerant.

Differentium medicorum Chirurgicorumque ingens satis hic numerus, unde factum, quod quæcunque usurparentur nihil omnino efficerent, adeoque ansa data fuerit vulgo, Medicorum Chirurgorumque inscitiam magis accusandi, quam statum ægrotantis desperatum deploRANDI.

Fuerunt qui causam horrendi symptomatis menstruorum suppressionem constituerunt, ex valorem uterinorum præternaturali angustia ortam.

Alii graviditatem subesse suspicabantur; rati denique venetico rem totam adscribere haud detrectarunt.

Petrus Potgieter, Chirurgus, publico salario ad id obligatus, ut parturientibus pauperibus in casu necessitatis succurrat, uterum ad orificium externum prolapsum statuebat, quod vitium manuale operatione corrigere tentabat, sic tamen ut capiti insisteret ægrotans.

His aliisque sic frustra usurpatis, vaginam uterinam imperforatam esse, sic ut ingressus æque ac egressus negaretur excludendo æque ac admittendo, eo quod membrana valida orificium clauderetur, innotuit.

Membrana hæc Medicis variis exerescentia habebatur carnea, aliis carcinoma, aut aliud incurabile malum, in re adeo dubia certi aliquid quo constitueretur, Medici Chirurgique alii prioribus juncti, inter hos & me accedere voluerunt consanguinei.

Inspectione conveniente habita, portam eam angustam per quam Catæres, reges mendici, omnisque ordinis homines, mundum hunc intrant, membrana quadam incrassata clausam invenimus, cui simile exemplum Hildanus part. 3. obs. 60. & 61. proponit; Clausura hæc arcta adeo observatur, ut digito nullus concederetur introitus, unde factum quod mensstruus sanguis, indies acrimonia, mense quovis quantitate, auctus, ad locum angustatum fuerit collectus, quæ causa repletionis, tensionis, intumescenz, dolorisque summi.

Hoc incasum inedium nullum excogitari posse indicabam, quam instrumento commodo vaginam aperire, & quidem ad modum eum quem in ancilla fere mortua exersuit Fab. ab Aquapendente

pendente part. 1. oper. Chir. cap. 82. & Wierus lib. de prat. Damon. cap. 38. in virgine Craneburgenti. Attentiebat agrotans, suadebant idem Chirurgi Medicique praesentes.

Operationis modus quis fuerit, antequam proponamus, duo hæc consideratione nostra digna occurrebant. 1. Annon exiguo quodam foramine membranam dictam perforare necessarium, ne materia intus collecta confertim nimis effluat, cum virium prostratione summa; quale quid in apertione abscessuum magnorum observamus.

2. Annon sectio quædam hic institui debeat cruciata, quam commendat Corn. Celsus lib. 7. cap. 28. ut laedatur via urinaria.

Ad primum respondebam, vix eam humoris copiam hic collectam esse, quæ æquiparari queat ponderi foetus recens nati cum annexis, nec tamen puerperas calore, spiritibus, roboreque præter modum semper destitui.

Ad secundum, sufficere hic sectionem simplicem, quæ à parte inferiore deducatur ad superiorem, quo, etiam jam effluente materia, apertio continuari queat, nec humor exiens eam inhibeat.

Operatio ipsa hoc modo instituta. In dorsum prostratæ virginis crura utrinque primo ad latera depressa, quo labia pudendi magis distarent, hinc lanceola dissectio membranæ obliquo ductu ne orificium vesicæ urinariæ laederetur, peracta, illico materiæ impuræ, aliquomodo torrentis, colore & consistentia hepatis comminuto similis quantitas ea effluxit, quæ librarum quatuor cum dimidia; nocte sequenti ejusdem humoris quantitas major se exhibuit; parcius hinc est alterius conditionis.

De eventu suo tempore certiores te faciemus, interim tuum erit Hymen, an membrana incrassata imperforata vitium hoc appellari debeat, determinare. Operationi dictæ adfuerunt. Arnoldus Tholinus Franciscus van der Schaagen. Joannes Deyman. Simon Dilleman; Adriaen Reyniers, Medici. Georgius Van Lora, Chirurgus.

Vale vir magne in commodum Republicæ Medicæ, & nominis gloriæ æternam; favereque perge in nullo non inservire tibi paratissimo Jobo à Meckren. Idem ibidem.

Atresia accidentalis, & una mensura.

Non temere statim omnem atresiam, quæ infantibus puellisque evenit (pro periculosa habendam esse sequentibus exemplis persuadeor. Puella erat annicula, intertrigine aut excoriatione copiosa ob urinæ acrimoniam, ut fieri solet, affecta, huic tandem Vulvæ oræ coalescunt interveniente membranula alba, nonnihil etiam dura, quippe quæ initio immissi specilli apicem repellere videretur. Mira inde Parentum sollicitudo, non statim in hoc casu ad Medici aut Chirurgi operas properantium; sed, dum interim animi pendente locumque iterum iterumque inspicunt, veriti, ne longiore mora magis induresceret valvula & tandem sero negligentiae poenam lucrent, auxilium Medici implorare constituunt: Nutricula autem, cum Medici Chirurgive manuum crudelem ominaretur, effusissimis precibus fere & fletibus Parentum propolitus Medicique praesentiam si non

avertit, certe dilationem aliquot dierum impetravit. Illa interea locum quotidie diligentius inspectat, nec, quod ante sæpe & liberata manu tentaverat, partes illas sero obducit. Octavo inde die foraminulum, quod forte sero ante occluserat aut occlusum solidaverat, apparet; magna inde Nutricula, majora etiam Parentibus stupidia. Jam vero patulum foramen non inspicere tantum sed & tractare ausa Nutricula, balenatiam alterius faminz consilio immittit virgam, lenteque ad justæ magnitudinis proportionem dilatat, ex qua nihil tale in adolescente virgine conspectum. Ad hoc etiam initio leviculis adjecta natura magnos prævertere morbos solet. Crediderim ego hic ab urinæ acrimonia exelos interiores labiorum naturalium naves purulenti quid sudasse; hanc deinde saniem, conjuncta in illo membrorum politu superficie utraque, exsiccatam membranulæ quandam præbuisse speciem, non aliter atque excoctæ partes coire invicem, aut jungi per lympham saniosam glutinosamque tolerant. Aliud menstruum ^{virginis} genus puellæ jam nubili & octodecim annis majori evenisse meminimus, cui quoties menstrua fluxere, fluxerant autem ab anno quarto decimo, toties tribus quatuorve diebus ante fluxum nymphæ per membranam coalescebant gelatinosam, adeo ut aditus penitus obstrueretur: hanc illa adventante jam sanguine molliorem digitis facile resolvebat, patente hunc in modum fluxui via. Certe hic etiam à lymphâ uterina & vaginali, quæ sæpe acris & copiosa præire mensibus solet, membranulæ valvulosæ speciem enatam arbitror, sed quæ à sanguine emolliata, digitis facile cederet, nec ante rediret quam eadem illa sanies, quod tribus quatuorve diebus ante menses fieri solebat, angustias subiret menstruumque ^{paucum} repeteret. *Lib. Nicol. Pecklinus in observationibus Physico-Medicis.*

Infantis penis non perforatus.

Sicuti puellæ quandoque clausis nascuntur vaginis (quod pluribus probaverim testimoniis) ita pueri interdum oclusis prodeunt virgis. Hujusmodi exemplum vidi cum Chirurgo Adriano van der Cruys, in nantæ cujusdam tholo, cujus masculi membri anterior pars non erat perforata, vel minimum saltem aperturæ indicium solito gerebat loco, quæ tamen transmittendo lotio non esset apta. Ita ut procedente tempore aliam sibi aperuerit urinæ prorumpens viam, sub freno videlicet penis. Infans tamen, quoniam recens natus erat, fidei Chirurgi opera hoc incommodo fuit liberatus.

Varia clausurarum virgarum exempla passim habent scriptores nostri; quibus, solito deficiente transitu, urina sibi alium aperuit, vel infra glandem penis (uti precedenti observatione patet, ac mox de adultiore dicetur) vel in media urethra, aut etiam circa penis radicem prope pubem, ipsæ quandoque in perinæo.

D. Melchior Fribe obs. 98. Miscell. Medico-Physicorum, Ann. 3. p. 158. virum quendam se novisse tradit, cui penis non solito loco, sed infra prope frenum perforatus esset; per quam aperturam idem non urinas tantum, sed & genituram egeret. Duxerat bis uxorem ille, ac

sex genuerat liberos, nec minus quàm ali coitu delectabatur. Nec dissimile est quod tradit G. Samuel Polissius obs. 106. Miscell. Medico Phys. Decur. i. ann. 9. p. m. 265. de senescente, qui ejusmodi male formato pene prodierat; ac licet hic solito loco foraminis quoddam gereret vestigium, seminis tamen urinæque excretioni non sufficiebat; hæc tamen ille per aperturam infra glandem absque incommodo egerebat. Uxorem duxerat, liberos autem non procreabat.

Apud Benivenium cap. 90. p. m. 259. de puero legere est, qui obstructa anteriore penis parte, per angustum foraminulum infra glandem urinas ejiciebat, quod earum vi paulatim eo loci factum erat, quamvis non sine lachrymis, membrisque illius tumore procederet ejectio. Idem quoque de puero refert, qui, licet pene perforato, meatum tamen urinarium fere media in virga, in seipsis parentibus ne noctulecuium permingeret, præcluserat. Ita ut vinculum illud, quanquam impete ferretur, removere nescia urina duobus in locis tumentem admodum aperuerit penem, quæ foramina, non nisi hac vi transeunte urina, atque oris etiam temporis processu callo obductis, sanari nunquam potuerunt. Meo quidem iudicio, nisi cutis forsitan fuerit minus tenuis, foraminis labia incidi & abradi potuissent, inducta interim antrosum in penem plumbea vel argentea canula, donec medicamentis idoneis cicatrix nata fuisset, remansura.

Simile præclui fuit penis exemplum Bierlingus obs. 204. p. 305. Ephemer. Medico-Physic. German. se vidisse ait in puero, cujus virga supra locum quo præclusa erat tota sphacelo corrupta, ac putrescebat. Ille autem per factam, quæ proxime ventri adhæret, penis aperturam, postea semper absque incommodo lotium excrevit.

De infante bimulo scribit Amatus Lusitanus Curat. 27. Cent. i. p. 42. cui pene non perforato, nec ullo foraminis loco debito existente signo, prope testiculos per aperturam egredere urina.

Pueri trunuli meminit Gerh. Blasius obs. Med. 5. p. 39. qui recte alioquin se habens, lotium per foramen in perineo excreverit prope penis radicem, hic enim nullum omnino permittebat transitum, nec ullo tegebatur præputio.

Casus ejusmodi meminit Theod. Kerckringius obs. 54. p. 115. de egro quodam, cujus in cadavere infra scrotum titula fuerit reperta, per quam multos annos, perforata etiam ipsa vesica, nec non transitum negante virga, urinas emiserit. *Cornelius Stalpari. observationum variarum Cent. i.*

Annus imperforatus, Ejusque Anatome.

Ancilla ex illicito concubitu prægnans, xv. Octobris 1679. Viennæ fortum, quoad externa masculum, ad initium noni mensis, alius quidem vivum (sed cum pedibus prius in partu venisset, ac collo diutius inter sinus muliebris latebras hæssisset deinceps suffocatum, enixa est; Qui cum à Medicinæ Studio ad me delatus esset, convocatis aliis Collegis studiosis, partes externas exanimò, in quibus alias nil

præter naturale observatum; nisi quod dextra manus duobus tantum digitis prædita esset, Metacarpus etiam ita conatus, ut potius plantam pedis reterret, addita portione callosæ pellis circa extremam partem, quæ non inconcurre calcem representabat. Pedes etiam nisi quod mire contorti, nil insoliti habebant: converso vero fœtu in abdomen in dorsi spina *umbilicis* seu obliquatio observata tum & anus desiderata, loco cujus eminentia quædam callosa ad lineam ulque, fœtum dirimentem, protensa erat, contrectatisque à me digitis his partibus, Meconium per penem prodit; unde, statim conjectatum, naturam vim pro alvinis excrementis per membrum affectasse: quæ ut melius pateret, abdomen decussatum, illatis tamen Umbilicalibus vasis, aperto; inter quæ arteria Umbilicalis sinistra, tum & Urachus desiderabatur, dextra etiam non recta deorsum in iliacum ramum descendentem terebatur, sed paulo altius ante divaricationem Aortæ inferebatur. Hepar mole valium, & uti fieri in nuper natis allolet, utrumque Hypochondrium occupans: sub eodem stomachus latebat, qui admodum contractus, ac multum protensus potius intestinum quoddam reterebat; Scatebatur præterea mucus subpallescente, qualis & in ore reperiebatur. Lien naturaliter se habebat, intestinum duodenum vero, ubi cholodochus, seu potius communis ductus inferebatur, summo pere dilatatum, ita ut novum quasi ventriculum representaret. In jejunio & ileo nil. p. n. observatum; Cecum vero, licet protensus, contractum tamen & vacuum. Colon ab initio satis tenue, sed in progressu dilatatum, nec multis cellulis exaratum, versus rectum copiosissimo Meconio turgescerebat, ac tandem in rectum terminabatur, quod etiam eo loci, ubi alias vesica locari solet, in appendicem vesicæ æmulam (hæc enim etiam in hoc fœtu dehebat) dilatabatur, ac tandem non per anum, sed antrosum, membrum virile pendulum præputio suo munitum referens, extra corpus finiebatur, cujus structuram, ut melius innotesceret, propria manu delineatam transmittere lubuit. Jam admirabar naturæ indutiam, quam putabam loco vesicæ dilatationem, seu appendicem recti substituisse, sicque compendiarie via utrumque excrementi genus excretum voluisse; sed cum in Renes inquirerem, hi non glandulosi reperti, sed eorum loco glandulæ tantum Renales, irregularis figuræ, substantia solito solidiori præditæ, & compressæ admodum conspectæ, adhærescebant ex insuper ramusculis ex Aorta & cava descendente oriundis, quæ emulgentes venas & arterias supplebant, nulli etiam Ureteres ad appendicem recti, vesicæ æmulam, visebantur: unde in opinione mea superiorime saltim deprehendebam. Ex iisdem Aortæ & cavæ truncis vasa exoriebantur spermatica utrinque in testiculos minutos cicoris magnitudine, & compressos, formineos fere æmulantes, ac vasis seu capricolis suis pampiniformibus insignitos, terminata; qui testiculi non in Scroto, sed ad latera pelvis in abdomine (qui locus alios muliebrium est) situabantur. Scrotum vero vacuum erat ac darto crassiori præditum. Inquirebam in testiculorum detereptis vasa, ac testiculos

culas seminales, & prostates, sed præter confusionem vasorum quasi gangrena tactorum, ob comprimens rectum meconio admodum turgescens, nil observare licuit, neque aliud in abdomine præternaturale visum. Unde ad examen mediæ & summi ventris progitum, qui nil p. n. etiam in se recondebant. Dubium tamen ex huius moveri posset, utrum fetus hic enixus (in utero enim vixisse supra relatum) supervivere potuisset? & num ad generationem aptus? Putarem ego salvo meliori iudicio, nec vivere illum stante hac constitutione partium potuisse, nec enim locus erat pro excretionem Urinæ, nec generationi aptum (cum & locus pro excretionem seminis desiderabatur) fuisse, tum corpora nervosa penem non constituebant, quæ ad rigiditatem illius in generatione necessaria, involuntarie etiam feces alvinas deturbasse, inde colligere licuit, quod Musculi ani tum levatores, tum sphincteres deficiebant, *D. Wölfftriegel: Litt. Vienna datis ad D. Sachsum.*

De Ano clauso.

Anno 1672. d. 7. Jan. Vocatus fui ad Civis cuiusdam primarii filium vix viginti quatuor horas natum, inveni misellum illum fasciis involutum in gremio obitricis jacentem & quasi animam agentem, ut ab adstantibus etiam mortuus crederetur: a fasciis ergo ipsum liberari jussi, & linteis calidis debile illud & pene emortuum corpusculum involvendum curavi; hoc facto, quamprimum ex proximo pharmacopolio affertur potuit exhibui cochlear aquæ ex typhis C. C. recens destillatæ, inde semim ad se rediit pulio, inquisivi postea ulterius in causam istius debilitatis & hypothyriæ; anum ergo guttur illud interius impervium esse comperi, observans præterea quoties misellus ille respiraret, materiam excrementosam in ano contentam, exitum vi quadam moliri: meo jussu advocatus fuit Chirurgus expeditæ manus, qui instrumento incisorioticam illam quæ anum claudebatur, perforavit, exiit illico materiam excrementosam atramenti crassioris instar satis magna copia; sublevatus inde paulum bonus ille pulio libenter respirare coepit, sequenti tamen die satis concessit, quia, quamprimum anus pervius esset, etiam per nares materia purulenta effluebat, forte abscessus? latens signum: sic Ars nisi naturam adiutricem habeat, frustra sæpe tentat auxilium. *D. Casp. Kolichen.*

Anus imperforatus.

Anno 1669. Mense Octobri in Suburbana Uratistavia Villa, Fabro cuidam lignario nascebatur puellus cætera optime conformatus, præterquam quod anus penitus clausus esset. Obstetrix id vel ex negligentia non observaverat, vel nescio qua ex timiditate rem parentibus revelare distulerat. Tandem quarta post partum die anxia ad me venit, consilium petens, cui respondi periculum hinc vitæ impendere, nisi ocyus à Chirurgo perito clausa porta aperiretur, opus tamen fore ut ante ipse infantulum viderem, quàm certum curationis modum determinare possem, properat obte-

trix & parti responsum meum denunciat; qui hanc cunctanter Nilolum ad me deferri curat, ipse spectator curationis futurus. Sublatis ab infante linteolis, comperio anum rite quidem locatum, non nihil tamen prominentem præter solum, & penitus coactum veluti constitutum, nec nisi levissimum, ac vix ab acutiori oculo rite discernendum iudicium foraminis, quod lineola subtilissima, veluti calame inscripta, designabat. Digito etiam comprimeretur anus, in intestino tamen recto quicquam detineri excrementum, nequaquam dijudicari poterat. Econtra gutt. itim semel atque iterum, aliquando etiam paulo longius feces alvinas modo tenuiores modo crassiores, prout paucior copiosiorve urina ipsas diluebat, per mentulam excernebantur, ex qua non rari etiam status cum sibilo prorumpebant. Jani quoque venter ab excrementis retentis manifestè intumescerebat. Interea serio penitatis, quæ in tali casu, Sennertus, Riolanus, Mercurialis atque Minadous consulunt, atque insuper in consilium adhibitis viris aliquot ex Praxi Medica celebribus, Fautoribus & Amicis meis omni cultu & honore observandis, vitium hoc non sine ratione pro inemendabili habitum est: Nilominus ut parenti, tam anxie flagitanti ut quodvis auxilium tentaretur, etiam si frustraneum foret, satisfaceret, indultum mihi Chirurgo, alias satis solerti, ut periculum faceret, quoad aperiri clausura posset. Hic quidem Lineola supra memorata, atque ab ipsa natura in prominentem anum inscripta, Lancetolam dextre intigit, verumtamen sive ob profunditatem coalescentiæ, sive ob laxitatem corrigatæ in extremo sphinctere cutis, acies instrumenti etiam valentius & bis adacta, profundius penetrare non potuit quam ut locus superficiei nus cum paucarum guttarum sanguinis prousione, vulneraretur, quemadmodum laudatus Sennertus satis clare & fideliter lib. 5. instruit. p. m. 1105. prædixerat.

Cum ergo melius esset, ut ab operatione hac manus detraheretur, quàm ut infantulus porro & frustra torqueri deberet, statueretur, patri spe omni curationis excluso filiolus domum reportandus redditus est. Infantulus vero, abdomine toto à Genitalibus usque ad sternum, mirum quantum intumescere, ut tantum non inclusa ibi viscera, præprimis tamen ventriculus, transparent, die abhinc tertia (quæ septima à partu erat) miserrimo adstantium parentum spectaculo, suffocatus obiit.

Cadaver, sectione dignissimum, nec prece; nec promissis, nec comminationibus à matre nimium superstitione obstinata impetrari potuit. Infantulum hunc spectantur Consilioque & operationi interfuerunt Viri Nob. & Experientiss. DD. Godofredus Tilesius, Physicus Reip. DD. Philippus Jacobus Sachs à Leuvenhain, D. Gasparus Feldnerus, D. Ioh. Janissus, Practici Vratislavienses, nec non Dn. Daniel Schmied, Chirurgus.

Scholion. Tres occlusorum modum potissimum dari species ex practico traditione & quotidiana Experientia comprobata facile, videlicet Angustiam sive Conniventiam intestini Recti, Ani Clausuram per membranam, & Coalitum, propter quem patientes proprie Atreta sive imperforati dicuntur.

Illam observavit Scultetus in Armamentario Chir. obs. 77. (vel 71. secundum exempl. German. Francof. edit.) ibique curationem per immisos penicillos ex radice Gentianæ, ad intestinum dilatandum, exhibet.

Istius descriptionem & curationem Sennert. Instit. l. 5. p. 1. S. 2. c. 7. p. m. 1005. Fabricius Hildanus C. 1. obs. 73. Ronileus Epist. 14. p. m. 45. nec non Borellus C. 1. obs. 77. & C. 3. obs. 9. fideiiter communicarunt; unde elucet Eandem contingere triplicem, videlicet, in aliis inveniri membranam tenuem, quæ facile digito dilacerari potest; in aliis membranam densiorem, quæ scalpello opus habet; quale exemplum Nobiliss. Dom. D. Sachs à Levvenheimb, Fautor & Amicus, inter præcipuos ob singularia benevolentia sue testimonia merito habendus, communicavit; nimirum quod Anno 1663. mense Mayo vocatus fuerit ad Fabri cupisdam Lignarii recens natum puellum, cujus anum membranula contextum invenit, subtus latente colostro nigro. Is, sectione membranulæ adhibita, & suppositorio absterivo & dilatante, operationem faciente Chirurgus Henrico Neugebanero, feliciter restitutus est, & aliquot annos vixit. Similem huic historiam *Oethus observavit, referente Schenck. lib. 1. pag. m. 383.*

In aliis denique foramen ani membrana prædura, in qua nullum fere veltigium ani, præter maculam (quam lividam in suo infante spectavit Hildan l. modo citato) apparet. Nec dubito quin ad hanc classem reduci debeat Sculteti obs. 77. ubi refert, se novisse obstetricem Patavinam, quæ anum totaliter oclusum acicula communi perforare, & foramen turundis ex Gentiana ampliare solita est.

In hac ultima, sive tertia specie foramen podicis omnino ocluditur sive carne, uti Ronileus Epist. cit. existimat, sive etiam cute densiore, vel, quod fortasse sæpius contingere potest, utroque modo. Neque etiam à vero absiona videtur conjectura naturam in his duplici modo aberrare. vel in Conformatione intestini recti, quando illa hoc vel fundo vesicæ vel ipsius corpori, recto ductu (quemadmodum oblique ureteres inferuntur) implantavit, quod Anatomia pueri Genevensis apud Hildan. C. 1. obs. 75. & filiolæ lapideæ Scaphusiæ, ap. Schenck. l. 4. obs. 6. de intest. recto. p. 383. itemque Lauremberg. Process. Anat. l. 1. c. 16. confirmat. vel quando collo vesicæ intestinum inferitur, uti in scemellis in pudendum, ut plurimum solet desinere.

Vel II. in Conformatione Ani, quando intestinum rectum quidem recte conformatum est, Sphincter vero connascitur vel carne oppletur, quod Beniven. c. 30. d. Abdit. observavit. Hinc enim me mirum, si quandoque una cum fecibus alvinis Urina quoque supprimatur, quale exemplum Garnerius Schenckio communicavit, & ab Hoc recensetur l. 3. obs. p. m. 383. vel etiam si intestinales feces per Urethram excernantur, citra insertionem intestini recti in vesicam; si quidem pluribus exemplis compertum est, materiam retentam sua sponte sibi viam ex intestinis ad vesicam per exulcerationem ac fistulam quaesivisse, videlicet ex morbo intestinali, ut Scirrhus. Calculo, Vulnere, Ulceribus venereis, &c.

Hoc tamen miratu dignum videtur adeo tennella infantum corpora tam diu sub tormento tam atrocis morbi durare posse; nam ut noller infans septimum, sic Ronilei undecimum, Garnerii ap. Schenckium decimum tertium, & Hild. decimum septimum diem attigit. Observatu quoque dignum, quod imperforatis, si recte nobis sic dictis, Puerulis hoc vitium semper lethale sit, quod & Riolano c. 33. lib. 1. Enchir. Anat. p. 210. non obscure innuitur & plurimis exemplis alibi, præcipue tamen ap. Iulpium l. 4. c. 3. p. 50. & Plater. l. 3. obs. p. 565. confirmatur; scemellis vero non item, certe non tam subito, aut frequenter funesta est ani oclusio, quod a Minadon lib. 5. d. Ext. Aff. c. 18. p. 17. cel. 3. exemplo puellæ, comprobatur, cui cum anus imperforatus esset, & intestinum rectum in pudendum desineret, per id feces nunquam non excernebat, vitam ad annos sex & forte ulterius producens: cum quo conlatur *Fr. Sanchez. obs. p. 375. & alii.*

Denique verbo notamus, quod non aliud exemplum imperforati ani, quod nostro magis simile sit, in lectione Practicorum obtigerit, quam quod Platerus in obs. p. 564. habet, excepto eo, quod ibi præputium quoque coaluerat, & nota in Ruga figuram rotundam obtinuerat. *Hent. Volgnadi.*

De Intestini recti perfecta & profunda coalescentia.

Pellionis filiolus altero demum post partum die imperforato ano deprehenditur: instituta proin inspectione, & collecta hinc intima coalescentia, pro deplorato habitus est. Cum autem parentes quidvis experiri vellent prius, quam innocens pulio propriis excrementis quali suffocaretur; cordatus quidam Chirurgus interveniens, facto tamen denuo prognostico, lancetta aperturam aggressus est, loco simul non tam oculis, quam conjectura qualicunque concepto, puello interim, quasi bene secum ageretur, quietissimo, imo conatum fere quandam egerendi adversus Chirurgi manum ostendente. Postquam ad articuli pene longitudinem lente sursum pergendo pervenerat, nil vero exiret, destitimus, donec elapsis aliquot horis, rogantibus denuo parentibus, insertaque iterato lancetta (exigua semper cruentatione) sensim ac sensim ad finem coactis, qui longitudine sua duos Auricularis digiti articulos (in mediocri viro) facile æquavit, perveniretur, & excrementa nuper natis consueta, cuspidi occurrerent, satis liquida. Unde inserta turunda prælonga meatus amplius dilatatus, indeque circumcirca usualibus medicamentis cicatrifatus est: infante bene ingerente, bene egerente vegetoque. Demum anniculus, ni fallor, (affectu maligno tum, an epileptico? mihi nunc incertum,) diem suum imperato obiisse dicitur. *Danielis Ludovici.*

De Pudendo Muliebri natura clauso arte adaptato.

Quemadmodum sæpe infantes orificio ani ocluso nascuntur; ita nonnunquam & scemini-

sius

sinus muliebris in Utero Matris membrana quadam obducitur, ceu plurimi Authores annotarunt, quorum observationes congescit Schenck. lib. 4. observ. Medic. observ. 12. 13. 14. Præter eos Guil. Fabr. Hild. cent. 3. observ. 60. & 61. & Dan. Sannettus Instit. Medic. lib. 5. p. 1. sect. 2. c. 7. similitum casuum tractationem proposuerunt. Nos qui quid hac in materia Antonius Stadlander Chirurg. nobis communicavit, tibi benevole Lector candide impertiemus. Vocatus est prædictus Chirurgus ad Scabium Veteris Civitatis H. B. mihi bene notum, cuius filiola quatuor annorum à primo statim ortu hucusque urinam guttatim & cum summa difficultate atque maximo dolore rendebat: Parentes calculum suspicantes ad eum depellendum varia remedia quaesierunt, sed frustra, Chirurgus autem naturalia puellæ inspiciebat, invenit eadem membrana valida obducta, vix conspicua rima, quali aculeviter facta versus intestinum rectum apparente, per quam urina in vagina cumulata non stillabat, sed vix transudabat: Uterius instrumento illuc intruso, invenit membranam admodum crassam, circumcirca cum carnosa parte firmiter connexam, mo cum ipso meatu conjunctam, unde puella gravissimum dolorem in emissionem urinæ percipiebat. Tum Chirurgus Parentibus indicavit, naturale hoc vitium nullo alio remedio præterquam Sectione corrigi posse: Sed hæc demum tertia die, illis perterritis, instituta est, ubi Chirurgus in præsentia Parentum & Consanguineorum, puella decenter disposita, sectionem ab inferiore parte versus superiorem aggressus, benedicente Deo, feliciter peregit, primum quidem scalpello, dein forcipe acuta ad id singulariter tota: separatim itaque singulis urinæ liberum transitum hucusque prohibentibus, partes vulnerata Medicamentis, partim dolorem, partim sanguinem sistentibus, à prædicto Chirurgo undaque secundum artem circummunitæ & tandem unguento Diapompholygos perfecte sanatae sunt. Puella ista per Duagratiam intotum restituta in hunc usque diem optime valet. Notandum autem in ejusmodi operationibus magnam diligentiam adhibendam esse, ne vel partes versus collum lædantur, vel, quæ separari debent, intactæ maneat, neve foramen nimis angustum fiat, quod postea in matrimonio constitutis nocere poterit, & tandem ne partes divisæ iterum coalescant: Ceu plura exempla talium casuum apud authores inveniuntur. Singularem casum de partium Genitalium coalitu videat benevolus Lector apud Gregor. Horst. Epist. Med. lib. 1. Sect. 19. Faciliorem sectionem & Curationem instituit dictus Chirurgus in Nobili quadam Virgine, cui Genitalia naturaliter membrana, tympani crassitie, obducta erant, relicto à natura foramine ad pisi magnitudinem, per quod tamen urina libere effluebat. Similia exempla & operationes vide apud Hier. Fabr. ab Aquapend. Oper. Chir. pag. 1. cap. 82. 83. & 84. Joh. Andr. à Cruce Offic. Agr. lib. 5. cap. 47. Guid. de Cailiac. Tract. 6. cap. 7. Beverovic. Chir. cap. 3. de Paracent. Henr. van Roonhuysen obs. P.

1. pag. 102. 103. Paul. Barbet. Part. 1. Chir. cap. 13. tum etiam apud Franc. Peccet. & Pignat. in Chir. Sec. D. Simonis Schuberzj.

Rustica imperforata.

Par conjugum ex plebe rusticana se invicem Ratisbonæ coram Consistorio Episcopali, de impotentia maritali coarguentes, divortium petebant. Præses consistorialis, post multas altercationes, ad certiore litis decissionem, per certas personas, more veteri, utrorumque conjugum inspectionem corporalem decreverat. Qua facta, culpa in uxorem recidit; hæc etenim præter naturam licet vicennali major ætate fuerit, imperforata inventa est. Igitur per Chirurgum ex artis lege incisio facta, posthinc concordēs satis in conjugio isto vixerunt atque liberos progeneraverunt. D. Job. Helvigii.

IMPETIGO.

Vid.

CUTIS VITIA.

IMPOTENTIA VIRILIS.

Impotens is dicitur qui non potest id quod maritum decet. In duobus ergo consistit in potentia proprie sic dicta, nempe in debita membri erectione; & convenienti per illud seminis ejaculatione laxis. Prior tamen defectus ut plurimum hoc nomine venit, nempe deficiens erectio, & hinc congressus debitus.

Læditur autem erectio penis, & hinc copula maritalis debita tribus modis: 1. Quando deficit & est immixta. 2. Quando excedit & est nimium extensa. 3. Quando depravatur, dum penis non convenienti modo & figura turgescit & erigitur. Præsuppono hic ex Physiologico-Anatomicis distensionem & turgentiam membri fieri primario a sanguine arterioso, quando corpuscula ejus duo nervosa instar spongiæ excavata & perforaminata replet, & ita repleta corpuscula fortiter distendit. Hæc de distensione & inflatione penis.

Erectio verò inflati penis & motus ejus tonicus (ut in tali figura & statu persistat) dependet imprimis à duobus musculorum paribus circa ejusdem radicem implantatis, à quorum musculorum actione, nempe contractione versus suam originem, indeque in eorum medio intumescencia; non tantum comprimitur & angustatur vena per penis dorsum excurrans, ut ita sanguis per arterias in corpora penis nervosa effluat eadem que distendens non possit refluere, sed præterea quoque horum musculorum contractione iis alligatus penis prius distensus sursum versus retrahitur: quæ ipsum semen spiritibus tempore congressus turgidum (dico tempore congressus aliàs non) inflans vesiculas seminales ab horum musculorum contractionum vesiculas simul comprimentium ro-

bore, in sua eruptione in meatum urinarium non leviter juvatur. Hinc simul atque contractio & tonus cessat, sanguis ex pene refluus per venam in denuo apertum corpus ejus flaccidum, rugosum & tandem pendulum relinquit.

Læsiones ergo hujus erectionis imprimis fundatæ erunt in istis musculis sanguinem penem distendentem, aut sistentes, aut linquentibus. Deficit ergo penis extensio triplici de causa. 1. Quando musculi paralyti laborant, sequæ exinde debite contrahere nequeunt, id quod fit in quâcunque & à quâcunque causa orta paralyti eorundem. Item ex nervorum affectionum vitiis. Hinc v. g. ex nimia equitatione compressis nimis & in se coactis his musculis erectio penis impeditur. Tale exemplum recenset Jacob. Fontanus Conf. 2. de Nobili, qui ab exercitio violento, & qui equitatione nimia incidit in privationem erectionis penis, ob vias ejus & meatus à motu obstructos, qui ad muscululos derivantur. Sic casus super dorsum & os sacrum, aut vicinas partes, ut paralytim aliorum locorum, ita & penis inferre solet. Tale vero exemplum recenset Hildanus Cent. 6. obs. 59. ubi ex casu in dorsum erectio penis omnino tuit sublata, manente etiamnum forti ad venerem stimulo, quatenus nervi ad penem ejusque muscululos tendentes, aut compressione, aut laceratione, aut alia ratione affecti fuerunt. Citato in loco similiter ex gravi capitis percussione, talem membri erigendi impotentiam ob similem causam ortam refert.

2. Causa propter quam deficit penis erectio est absentia spirituum animalium in musculis istis ad penem erigendum & distendendum necessariis. Deficiunt spiritus in musculis istis, vel in genere ex eorum defectu universali, ut fit in languidis, in morbidis & similibus. Unde in morborum acutorum statu & declinatione, erectio membri naturalis (naturalis dico: nam interdum est præternaturalis & convulsiva, quæ mala) rediens, faustum solet esse signum spirituum animalium regeneratorum & in debitas motiones dispositorum. Vel in specie deficiunt specialiter in musculis penis, vel in pene: quando animus, aut imaginatio (loquor cum vulgo) circa aliud objectum occupata spiritus animales eo evocat, vel in aliis partibus detinet, ac minus ad penem mittit. Hac ratione & pudor, interdum, imo sæpius, penis erectionem impedit, aut etiam jam factam denuo tollit, quatenus alio vocantur spiritus. Sicuti è contrario meditatio rerum venerearum ad penis erectionem disponit; quia scilicet spirituum motus sic eo dirigitur.

Ex hac causa, nempe pudore nimio & intempestivo, subinde fit ut noviter nupti se maleficiatos putent, cum tamen potius ex inconsulto pudore membri erectio impediatur, quo tandem discessu negotium alacriter succedit.

Pertinent huc ii qui melancholia hypochondriaca laborant, qui ut variis subinde conflantur phantasmatibus ita & subinde imaginatione propria decepti se impotentes existimant. Aliquot exempla et ista vide in Salmuth. cent. 2. obs. 78. Qui tales postmodum curato malo hypochondriaco sponte ad rem redeunt. Simile exemplum est quod habet Silvaticus cent. 4. conf. 4. ubi refert impotentiam ad coitum ex malo hypochon-

driaco, in quo distenditur penis, sed dum accingitur ad opus flaccescit. Ad hanc causam, nempe spirituum absentiam, revocandus est etiam deficiens veneris stimulus à semine deficiente ortus, cum notum sit quod ex copia, aut turgescencia hujus, indeque facta partium istarum irritatione, & hinc dependente determinato spirituum motu ad istas partes, tam polutiones nocturnæ, quàm interdum etiam diurnæ oriuntur.

Huc faciunt flagra natibus infligenda: quorum flagrorum ad rem veneriam magnus est usus. De quo vid. elegans tractat. Meibomii de usu flagrorum ad rem veneriam, quem nuper tunc notis illustratum edidit Bartholinus. Ubi refertur exemplum cujusdam, qui nunquam potuit amalia satis facere, nisi prius virgis cederetur ab hac: unde postmodum ita cæius egregie officio præstando functus est.

3. Causa propter quam deficit subinde membri erectio, & hinc succedens negotium, est fascina, seu maleficium noviter nuptorum: dum scilicet sub ipso sacerdotalis copulationis puncto, per seram clausam, aut per ligulam constructam, aut aliis ultra 50. modis, quos taceo, ita ligatur sponsus, ut postmodum stimulante licet natura & erigente se membro, tamen cum sponsa gaudia optata peragere nequeat, quia, ubi propius accessum parat, subito membrum flaccescit; adeo ut etiam cum quâcunque alia optime & facile coire possit, sin vero ad sponsam vel noviter nuptam propius accedit, non ex mentula torpida rugata contrahit cornua. Existimant equidem multi, quos inter est Wierus de Præstig. Demonum; item Borellus cent. 4. obs. 65. talia esse vanæ, & omnem hanc ligaturam esse fictam, quia proveniat solummodo ex affectibus animi, aut nimio gaudio, aut pudore, aut metu, aut alia quâcunque, vel etiam ex falsa imaginatione spirituumque animalium hinc avocatione. Cujus tamen verius contrarium videbitis assertum in Bartholini cent. 3. libror. anat. 71. causa, si non omnino perferatilis est hujus fascini, aut si non præcise ad dæmonem referendum sit (quod non temere faciendum in rebus naturalibus, quippe quæ Deo potius acceptæ ferendæ) forsitan à sola imaginatione ligantis, seu ejus qui hanc vexationem facit, sita est: quod non tantum inclinat Verulamius in Sylva sylvarum, sed præterea etiam Helmont. & Marcus Marci in scriptis. Qui omnes, uti hoc scimus, ita & reliquos affectus ab incantatione inductos, soli imaginationi Sagæ vel Incantatoris tribuunt.

Signa horum affectuum de erectione membri ista quod attinet: facile patet malum ex relatione agri, seu potius uxoris ejus. Causæ perscrutandæ & cognoscendæ à Medico. Et quidem si defectus spirituum animalium adsit languor ac imbecillitas in corpore & actionibus reliquis animalibus adest: sin vero illi alio avocantur in hypochondriacis, variæ cogitationes, varia phantasmata & similia subjecta actu se repræsentabunt. Sin adsit paralytis membri, flacciditas manet, & à nullo unquam objecto illud moveri aut evigilari poterit. Sin deficiat stimulus veneris hoc ipsum facile patet, quod ipse patiens nullum appetitum habeat ad tales actiones. Denique si

ab incantatione malum sit, homo aut antea ad venerem tunc aptus, aut etiam cum a ra quacunque se communicare potest excepta sola ipsa.

Prognosis est quod tales sint infecundi, tandem scilicet: quamdiu debite coire nequeunt.

In cura usurpanda venerem stimulantia, tam interne, quam externe: applicanda vel inungenda nervina, olea penetrantia & similia. Animus omni cura est solvendus, & fascinum empiricis, seu expertis alias, est solvendum.

Interne ergo conveniunt omnia ea, quæ supra diximus seminis generationem promovere; ex formicis, ex ambra, ex sanguine galli & denique aromatibus parata sunt optima. Sic namque essentia satyrionis cum spir. formicarum parata in haustu vini malvatici sub introitum lecti assumenda. Cinnamom. & Cubebe seu graua paradii cibis permista, aut vinum cinnamomo maceratum, egregie conducunt. Sed de his internis ad nauseam usque ubi de seminis generatione laesa. Externe balnea vel inunctiones ad paralyses usitatz, alias instituendæ, cum cubebis in vino generoso bulliant, & ita applicentur testibus & locis vicinis. Inunguntur testes ipsumque membrum virile cum iucco ex ovis formicarum expresso, cui parum zibethi additum sit; aut loco huius preparato succo oleum de castoreo, oleum de piperibus, in specie oleum caryophyll. permiscenda, & ita partes blande fovendæ & inungendæ. Alias oleum costinum, ol. macis, ol. euphorbiæ ac similia in usu sunt. Balsamum venereum Mysicæ hic est egregium, hoc namque ad erectionem & ad voluptatem facit perinæ & radici penis inunctum. Addi potest ol. formicarum. Felapri peni inunctum magnam & erectionem & delectationem facere Montagnana asserit. In usu etiam altis est balsamum apoplecticum radici penis ad firmam erectionem inungere, sicuti glans eodem illita, utrique sexui voluptatem auget. Unde etiam præcipitur ut in passione hysterica, & ejus paroxysmo desperato fere, vir glans ita inuncta uxorem comprimat, pro solvendo paroxysmo. Angelus Sala tale habet linimentum.

℞. Zibethi gr. viii. ambre gr. vi. moschi gr. v. Olei cinnam. gtt. vii. ol. nucist. gtt. iv. Balsam Peruvian. q. s. ut incorporentur omnia. Hoc inungatur glans ante congressum, vel post balneum ex nervis eodem inungatur perinæ. Singularissimum est si recipiatur pulvis rad. pyrethri, qui miscetur cum pinguedine coturnicis, & hoc ipso linimento inungendum est membrum: hoc enim non tantummodo validam facit erectionem; sed & hoc præstare dicitur (sit fides penes experientiam) ut & mulier virgo, & ipse maritus magis hastatus appareat.

Quod si ab incantatione fuerit malum, aliis opus est remediis: mixtus per scopas betulinas experimentum est Carichter, exercitissimum, si quis alius, in morbis ab incantatione. Confirmat hoc Helmont. tract. de lithias. c. 8. §. 25. Ubi potum cerevisiæ betulinz, seu in qua decocti sunt furculi betulæ, commendat tanquam experimentum contra maritorum seu sponzorum fascinationem. Harthmanni experimentum certum & aliquoties probatum est quod ipse recenset in Prax. Chymiatr. lotio pudendorum utriusque sexus cum decocto aquilegiz: (hoc enim est singulare) post lotionem

fiat suffitus ex dente hominis mortui super carbones ponendo, qui suffitus excipitur membris latis. Modus suffitus est hic. Recipiuntur tres dentes ex capite mortui viri, qui minute pulveriscentur. Hinc recipiuntur duo lateres novi, qui candefacti per crucem disponantur in terram, hinc affundatur sp. vini rhenani opt. & superimponatur pulvis dentium istorum contutorum: tumo inponatur membrum incantatum, & ita excipiatur fumus donec membrum incipiat sudare. Hic sudor cum linteo mundo deorsum verius abstergetur; quo facto inungatur membrum cum assa fatida: (quæ est basis emplastr. Minichti contra incantar.) hinc linteis involvatur & ita cubitum se conferat. Quidam addunt dentibus hominis mortui corallia semenque antirrhini. Conpositionem huius pulveris videbitis in Grassii tract. de coralliis. Hic pulvis saepius repetitus probatus fuit aliquoties in his ipsis ligaturis virorum. Mercurius vivus in nuce avellana, vel in calamo scriptorio collo appensus præservativum est certum sponzorum ne ligentur in copula sacerdotali: quibusdam placet una cum hoc mercurio calam. scriptorio incluso facere nodulum, additis florib. hyperic. capill. vener. sem. antirrh. baccis paridis & similibus: quæ omnia nodulo inclusa suspenduntur ex collo, & præservativum sunt hic aliquoties expertum. Fuit experimentum D. Michaelis, alias etiam probatum, si quis emat lucium piscem lexis masculini, huic per vim aperiatur os, & in os immittatur urina maleficiati: Hinc lucius ita vivus immittatur in fluvium, idque contra ejusdem cursum, & ita sinatur; subito namq; tollitur maleficium, si non sit nimis inveteratum, seu in maleficio novo. Probatur etiam fuit si sponsus ante copulationem, & etiam post illam, mittat urinam per anulum sponsalium quem accepit a sponsa: ubi hoc non sufficit accipitur rasura annuli sponsalium, quæ rasura interius in potu vini assumpta singulare est experimentum in tali casu. Alias tanquam secretum habetur quorundam rasura campanæ, ex eo loco derasa ubi pistillum eam ferit. Rasura hæc miscetur cum paucis coco, & paucis pulveris priapi cervini, & ita usurpatur interne. Fuit aliquando curatus quidam similiter incantatus consilio ipsi a vetula suppeditato, dum scilicet in cameterio quodam misit urinam per anulum cu usdâ lapidis sepulchro in. ibentis. Denique, si qui aliud, singulare est, si quis accipiat ovum recens, hoc coquat cum urina propria ad abruptionem medietatis; quo facto urina superflua abiciatur in flumen secundum ejusdem cursum; ovum vero ita coctum leviter apertum immittatur in acervum formicarum. Unde quando formicæ assumpserunt ovum, solutum erit fascinum. Plura, quia pertinent ad morbos de incantationibus non addo. Michael Emmullerus in Collegio Practico speciali de morbis virorum, Mulierum &c.

Inutilis sæpe est Medicorum opera, qui opitatus excitandæ, explicandæque veneri proprias architectantur & concinant, quo ægri & corpore & animo dominabus sint gratiores: nam hic judicio opus est, undeque frigidiores ineptique, & insulti ingrati sunt salacissimo mulierum generi. Et obiter unum notandum, quod is tardus dicatur, qui corpore & membris ineptus est & imbecillus ad venerem, & ideo minus

minus amabilis apud dominas. Tardus facile venerem non explicat, id quod est meretricibus odiosum: insulsus qui caret sale non est salax & cupidus coitus.

Aliquando non arrigit verpus, alias arrigit, sed mollisculus est. Sic non subit, nec semen ejaculatur. Id fit aut vitio peculiari instrumenti, aut totius corporis morbo, aut seminis defectu, aut ejus inefficacia, ut minus turgat, & penuria spirituum labore, & minus intentus maneat verpus.

Videndum de ætate, si ætas congrua, an olim minus aut magis aptus fuerit, an proclivior ad venerem, ut vetere ubertate quasi arefactus langueret, naturæque infirmior manus quasi dederit.

Videndum quoque an naturalia illi non laborarint, an mercurii litum, aut cinnabris suffitum patia fuerint, an vitio dixit, ut si vinis albis & tenuioribus usus fuerit, ac rebus liquidioribus, quæ quasi laxant & effeminant carnes & semen: alia enim carnem solidiorem reddunt. Scire oportet an parcus edere, ut sufficiat ad esse, non autem ad robur.

Item canones alii sunt observandi, ut loco & tempore congregiatur, non crudus; aliqui ineptus erit: precedente titillatione; ut sit ad venerem incentivum & calcar. Id fit retenta urina & mæjendi desiderio.

Minus bona habitudo ineptitudinem istam conciliat, vel quia totum alimentum absumit, & non sinit semen esse reliquum, ut succulentæ & ~~nutrices~~ nutritices minus sunt aptæ; sunt enim vasa angustiora, & in viris & in mulieribus præ viole & pinguitudine. Rationes apud Actium exponuntur a nobis.

Denique vivendum, ne quæ adfertur infæcunditas, aut impotentia ut iusta repudiî causa, sit imaginaria & falsæ ac mendacis amicitia testis. Sunt enim corpora quædam quæ simul juncta quædam & lætam, de qua sic Plinius loquitur. Est quædam privatim dissociatio corporum, & inter steriles ubi cum aliis junxere gignunt. Acetosa & olera fugienda. Commendant asparagos ad excitandam venerem, facilius est usus. Ablic jejunium. Vitetur nimia repletio; tum ne cruditas oriatur, aut ne revocatus calor & spiritus ad ventriculum plenior deferat testes & partes semini mitificando & cogendo destinatas. Nimia cura obest. solliciti arrigunt, sed fugax est erectio.

Quidam hoc commendant quod sequitur.

℞. Amygdal. pistaciæ. pinearum & dactylor. an. ʒi. conf. satyr. anth. myrobalan. condit. an. ʒi. cort. citr. cond. ʒi. ʒinziber. condit. ʒss. scincor. vino albo lotor. ʒvi. carn. capon. & perdic. an. ʒiii. cinnam. caryophyll. nuc. moschat. ʒan. ʒii. macropiper. ʒi. galliæ mosch. ʒi. sem. anis. ʒi. nic. an. ʒss. sacch. ʒxii. fiet opiata, utatur singulis matutinis vel hac sequenti.

℞. Satyrien. cond. ʒss. rad. & sem. ascalonii an. ʒi. ʒss. sem. crucæ, traxun. & pastinac. an. ʒi. renum scincorum Div. conserv. eryng. ʒss. ʒinziber. cond. ʒss. confect. alkermes ʒi. cum syr. conservation. satyr. fiat opiata, de qua capiat dormiturus ad quantitatem nuc. mosch. adde conservam anthos.

℞. Aq. vitæ ʒiv. sem. staphid. agriæ ʒiii. macerati sinas per horas duodecim ad verpi

fortum & perinzi.

Ex majore parte istorum simplicium concinnatur a Ieruelio opiata dialatyria; huic inest mira vis calfaciendi: sed & in mulieribus, ut ante diximus, bona victus ratio sanguinis boni, & spirituum proba generatio, unde fecundum & multum semen conficitur, & superfluit ex reliquiis alimenti; sic cibis & potus primas tenent; bellariorum & multorum ciborum infarctus (unde citius & turbatio contingit) nocent plurimum sanitati, & minus fecundos & ad palæstram venerem idoneos reddunt. Notandum illud Hippocrati Libanæ, & potus, & obsonia (excepto pane & maza, quæ hinc ex farina hordei totius liquore aliquo subacta) exceptis & carnibus, & piscibus, & aqua, reliqua omnia tenues & debiles utilitates habent ad augmentum, ad robur & ad sanitatem. Ad sanitatem (ait alio loco) optima sunt quæ modice ingesta sufficiunt, ut & famis & sitis sint medela.

Quod si ob causam aliquam impotentius reddatur corpus, est opiata analeptica apud eundem Ieruelium, cujus usus ille potest in eo affectu.

Annotatio. Non perperam hoc adjectum de reficiendis & consulendis viribus, sed quod primum animadverti debet, est quod non semper more Medicorum Practicorum ad excitandam venerem impense calidis utendum est. Nam calidiora extinguunt semen, ut sabina & agnus castus. Item quidam temperamento sunt calidiora, & æstuantiora habent viscera, & hi minus sape ob ~~divergentiam~~ istam manus apti sunt ad explicandam venerem: deinde vero quæ sunt calidiora status dissipant, quorum usus aliquis ad arrectionem. Itaque hic judicio opus est, nilque temere agendum. *Galienus. Ballonius Consil. Medicor. lib. iii.*

Extinctam virilitatem, vel saltem imbecilem restituit. 1. Essentia satyrionis apud Crollium, cujus mirabiles virtutes in deprædicant, qui egentes ejusmodi confortativis aliquando usi sunt. 2. Paracelsus tribuitur sequens.

℞. Castor. galang. macis, caryophyll. anisi, piper. longi, borrac. venetæ an. ʒii. tol. saturæ, rad. satyrion. valerian. an. ʒi. boleti cervini ʒi. ʒss. carnis scincor. marior. rad. aronis, cardamomi an. ʒss. M. & redige in pulverem, quem cum saccharo in aqua rosinar. solutum M. & F. tabulæ. Dos. à ʒiii. ad ʒvi. Fortius operatur, si aliquoties in laconico umbilicus & partes vicinæ inungantur cum oleo maceris destill. Mirabile nimirum est confortativum oleum maceris. 3. Valet essentia anibræ cum sp. rosar. extracta, & pilularum forma exhibita: hoc vero in senioribus præcipue operatur. Dos. gr. iii. iv. v.

℞. Confection. alkermes ʒss. ambra gris. ʒii, zibeth. non sophisticati ʒi. aq. magnammutatis ʒiii. M. recondantur diligenter. (Ne evaporent) hujus misturæ à ʒss. ad ʒi. exhibe alternis vespers cum aqua cinnamomi. 5. Pudenda cujusque sexus decocto aquilegiæ simplicis diligenter laventur. Legatus Persicus ad Principem Holfatiz in itinere suo pulchram concubinam ex Russia emit, & quia ob senium non par fuit solvendo, consilium à Russo quodam accepit. Justus est semen cannabis in vitello ovi friso læpius comedere. Sequutus consilium continuavit. ferme virgæ tensionem sensig.

Nobilis

Nobilis est essentia satyrionis Crollii in primis si illi addatur ambra essentificata & aurum potabile Auglicum. v. g.

℞. Liquor. satyrion. ℥i. ambre essentificata ℥ii. auri potabilis ℥i. Dos. a ℥ss. ad ℥i. Hæc & similia interdum materiam tam fortem reddunt ut simul anima cum vita expulsa fuerit, omne nimirum nimium naturæ inimicum. Valet quoque diatrion pipereon tabulatum, si illi admisceantur aliquot grana ambre & olei cinnamomi. *Job. Harthmann. in Praxi Coymiatr.*

Utile est linimentum ex moscho & ambra cum oleo nuc. mosch. vel oleo caryophyll. sed omnium effi. acissimum est quod sequitur.

℞. Ol. sesamini, lil. alb. an. ℥i. formic. alatar. ℥i. simul bulliant, mox coeatur, adde euphorb. ℥ss. sem. rutæ, pipere. an. ℥ss. sinapi ℥i. iterum bulliant: & colatura utatur pro linimento partium affectarum & vicinarum. *Jo. Zechlin. consult. 21.*

In usum vocetur hæc opiata à Rondeletio commendata.

℞. Testicul. vulpis in hydromel. decoctior. ℥i. contusis adde pinear. & avellandar. insular. in paucolacte & melle, an. ℥ss. carnis leutræ, stercor. muris, mochan. ℥ss. cum syr. conserv. cortic. citri. F. opiata, sumat præterea saepe ex hoc Electuario.

℞. Zinzib. rec. condit. rad. eryng. rec. condit. rad. pastinac. condit. an. ℥i. pinear. præpar. pistacior. avellan. assatan. diatrionis an. ℥ss. sem. baucæ (i. e. pastinac. sylvestr.) napi, an. ℥i. testicul. vulpis, cerebellor. passerum, an. ℥ss. cum syr. conserv. zinzib. viridis, F. electuarium, capiat cochl. i. & superbibat vinum dulce: egregie profuit hoc electuarium: ut & eryngiorum radices cum melle conditæ, iussu autem ut frequenter comederet castaneas molles, dactylos, erucam, ut & fabas recentes excorticatas, in aqua coctas, aquaque ablata contusas, adjecto oleo amygd. d. pipere albo, & zinzibere exiguo, in ulum vocentur cibi delicatiores, quique maxime alunt, vinumque bibatur meraciusculum. sequens opiata à Rondeletio commendatur.

℞. Cortic. citri, zinzib. virid. an. ℥i. conserv. eryng. ℥ss. carnis leutræ, testic. vulp. priapi tauri, vel cervi, an. ℥iii. pulv. diamosch. d. & diamb. an. ℥i. cum melle in quo Zuccantharidum integratum prius maceratur. in lacte dissolvantur: fiat opiata, capiat ad quantitatem avellanz, superbibendo parum vini malvatici; duobus horis ante coenam, quæ pauca sit. Ego abhorreo cantharides, ob gravia accidentia quæ inferunt, ideo postea paravi sine illis. Lactis pondo cum cinnamomi ℥i. continuis diebus quadraginta si bibatur, pectere id infirmitatem viriliam traduat: etiam consumptos venire reficit: tenuis is fortunæ homines ova cum capis & butyro tringunt: sed regum impensa est, virilitatem opobalamo, & renuni patres cum mero diluto moscho inungere: sed quia opobalamo catemus, possumus naturalia hoc oleo inungere.

℞. Pyrethr. ℥ii. cinnamom. ℥i. euphorb. ℥ss. unde cum oleo sesamino, adjecto exiguo oleo caryophyll. & mosch. gr. v. *Petrus Forestus. obs. 18. & 19. lib. 26. De Penis & Virga utilis.*

Ad Venerem augendam, n. unam Satyrionis

per chymicum aliquem conficiendam curet. Hanc Galarei quidam & Regii medici, nuper Imperatoribus & Regibus multo in usu vel. tunc que fuisse mihi adfirmarunt in Spa. Formula ejus hæc est: ineunte vere, vel autumnio neudis aut exeunte, hoc est floribus folisque vel nondum natis vel deciduis, radices Satyri collectas aqua puræ injice, duobus quibus constant orbiculis divulsis, quotquot innataverint, ut inutiles abjice; quæ fundum petierint, contunde in mortario lapideo piloligno, sensim tantam panis albißimi & recentissimi addendo; & propter lentoris dilutionem affunde spiritum vini malvatici extractum, irrorando paulatim suavissime: dein optime mixta pone in alembico cæco, clausaque digere in balneo per sex septimanas: tum prælo exprime, expressum iterum per mensem digere in alembico: innabit liquor rubini æmulus: hunc inclinandò caute collige, abjectisque facibus, cuique selibræ adde salis margaritar. ℥ss. olei nuc. mosch. anisi, cinnamomi, an. ℥ss. dosis guttæ xv. in vino; juscuto, vel conserve corroborante. *Henricus ad Heers. obs. 9.*

Ad ignaviam genitalium expertus sum boracem officinalem ciceris magnitudine in ovo sobili mane crebro acceptum, erectionem & coeundi potestatem facere: *Hieronymus Merckvialis. tome 1. consult. 48.*

Pro Venerē excitanda. Species confortantes.

℞. Spec. diatrion. simpl. diatrion pipereon an. ℥iii. diamosch. dulcis, diamb. an. ℥i. thontriptic. ℥i. boleti cervini, priapi cervi, carnis felici marini an. ℥i. semin. urticæ, erucæ, lingue avis an. ℥ii. cardamomi, cubebarum, macis, cassiæ ligetæ cinnamomilata, caryophyllat. an. ℥i. olei macis ℥ss. cinnamomi gtt. v. M. natque pulvis subtilissimus. In confort. nda & stimulanda venerē est pulvis præstans. Dosis ℥i. ad ℥i. plus minusve, prout Medico videbitur, in aqua cinnamomi cordiali q. si hora una ante sonnum.

Trochisci confortantes S. Reg. Majest. ex præscriptio- ne Dni. D. Matth. Litten.

℞. Magisterii butyracei perlatum, carnis scinci marini, priapi cervini debito tempore, (dum videlicet in coitu est) excisi & subtiliter pulveris an. ℥i. ambre gryseæ ℥i. macis ℥i. pulveris viperini, succoblata Indicæ an. ℥vi. sacchari albißimi ℥ss. cum glutine veteris cervini q. s. & confect. alkermes ℥ii. Fiat massa, adde olei cinnamomi gtt. iii. caryophyll. gtt. ii. aut mosch. expressi ℥ss. essentia moschi gr. xii. Impastentur optime, tandem fiant trochisci. Ad testabrandam totam naturam, senibus & his conducunt, qui officium maritale præstare non possunt. Dosis a ℥i. ad ℥ii. subingressum lecti, in haustu vini malvatici optimi.

Trochisci viperini confortantes Dni. D. C. pro S. R. M. Vladislao 12.

℞. Ambre gryseæ cum semine aleæ odoriferæ in pulv. subt. redactæ ℥ii. moschi orientalis veri optimi ℥i. magist. perlatum butyracei ℥viii. pulveris viperini nostri simplicis, succolade Indicæ subtil. pulv. an. ℥i. sacchari Cuiat. pulveris ℥ii. Ex omnibus exacte mixtis, addi-
tis

ris confect. alkermes & gelatinæ priapi cervini an. q. s. F. Pasta mollis, ex qua formentur trochisci minores scrupulum dimidium ponderantes, qui chartæ inclusi lente exsiccandi sunt, Sign. rotulæ pro S. Regia Majestate.

Dosis n. iv. usque ad vi. & viij. hora una vel altera post cenam, superbibendo bonum haustum vini generosi seu aquæ cinamomi cordialis.

Pasta Regia confortans.

A. Amygdal. dulc. excortic. *℥*iv. pinearum mundat. non rancidarum, pistaciorum decorticat. an. *℥*ss. Contundantur probe & minutissime in mortario lapideo ad pulvis formam, addendo per intervalla, aquæ cinamomi cordialis q. s. quibus postea admisceantur succoladæ Indæ subtil. pulveris *℥*iii. sacchari albiissimi pulv. *℥*xx. rad. satyrionis condit. *℥*ii. cortic. aurantium condit. zingib. Indic. condit. an. *℥*i. nûcis Indicæ conditæ *℥*vi. spec. confortantium *℥*iii. cinamomi pulverisati *℥*ss. caryophyllorum pulverisat. *℥*ss. macis *℥*vi. ambræ *℥*ss. Misceantur in mortario lapideo & fiat massa tenax, ex qua formentur orbiculi ad placitum, qui postea characterè ponderis ex una parte, ex altera vero signo consueto aquilæ albæ insigniri possunt: tandem exsiccantur in sartagine occlusa vel super fornace, vel in alio loco calido, & asserventur in scatula lignea sicca.

Pasta alia pro Placentalis in extincta virilitate

A. Amygdal. dulc. excortic. pinearum mundatar. pistaciorum non rancidorum decortic. an. *℥*iv. pulpæ capi assati, perdicis assatæ an. *℥*ss. dactylorum, uvarum Damascenarum enuclear. an. *℥*i. cerebelli passerum in æquinoctio verno captorum & aquæ cinamomi ablutorum n. xxx. renum cuniculorum juvenum n. iv. rad. eryngii conditæ, satyrii conditæ an. *℥*i. cinamomi acuti *℥*iii. cassiæ caryophyllatæ, pulveris viperini an. *℥*ss. *℥*iii. carnis stinci marini *℥*v. ambræ gryseæ *℥*iii. moschi electi *℥*ii. sacchari albiissimi *℥*ii. Omnia optime miscendo redigantur in massam tenacem, ex qua postea formentur panes dulciarii, qui sensim exsiccandi & auri foliis obducendi sunt.

Ad virilem fortitudinem instaurandam, maxime si impotentia a maleficio aut incantatione, aut pharmaco aliquo originem duxit. Dosis à *℥*ii. ad *℥*ss. ante ingressum lecti.

Ex communicatione Dn. Sebastiani Englerci, Serenissimi Principis Caroli Ferdinandi Pharmacopœi.

Morsuli confortantes D. D. C.

M. Amygdal. dulc. excortic. pistaciorum excortic. pinearum mundatarum non rancidar. an. *℥*ss. priapi cervi raspati, tauri raspati an. *℥*i. seminis urticæ *℥*ss. carnis stinci marini *℥*ii. borracis *℥*i. galliæ moschatæ *℥*ss. sacchari albiissimi *℥*iv. F. cum aquæ cinamomi cordialis q. s. Confectio in morsulis.

Electuarium diasatyrionis Dn. D. C.

M. Electuarii diasatyrion simpl. officinæ Regiæ *℥*ss. pinearum recent. non rancidar. pistaciorum excorticat. an. *℥*ss. rad. eryngii condit. M. N. semin. fraxini, etucæ an. *℥*i. spec. diatrion. piper. *℥*ii. carnis stinci marini *℥*ss. extracti glycyrrh. borracis an. gr. xv. olei cina-

moni gr. iii. caryophyll. gr. ii. elæosacchari citri ex recentibus corticibus sine igne parati *℥*ii. Ex omnibus prius contusis & concisi: more consueto cum syrupo zinziberis condiri q. s. F. electuarium mediæ consistentiæ. Dosis à *℥*i. ad *℥*ii. & *℥*iii. sub ingressum lecti: superbibatur vitrum vini moschatellini seu Alicantini.

Essentia Regia composita.

A. Confect. alkermes *℥*ss. ambræ n. m. parat. *℥*ii. ess. perlacum, trium pipereon per elixir Matthioli factæ an. *℥*i. *℥*i. zibethi non so. phisticati *℥*i. moschi *℥*ss. olei cinamomi gr. viii. caryophyllorum gr. iv. macis *℥*i. spir. tormicarum compositi per spiritum ardentem facti. elixir. Matthioli an. *℥*iv. Misceantur probe & in vitro angusti orificii, quod optime clauditur, stent per octiduum in digestionem, in loco tamen non nimis calido, postea filtrentur, & ad usum in vitro bene munito serventur.

Cordiale, cephalicum & venericum est insigne. Dosis gr. vii. ad xv. & ultra, in vino generoso Hispan. seu moschatellino vel aq. cinamomi. *Martin. Bernard. de Bernitz in Fasciculo Medicament. singular. Andrea Cnoessetii aliorumque &c.*

Consultationes.

De roboranda & confortanda Virilitate in immixta potentia circa actum matrimonialem, pro quodam magno Principe.

Serenissimus & Potentissimus quidam Princeps circa alterum & novum matrimonium, & quidem ante adventum charissimæ sponse suæ, conquestus est aliquomodo de impotentia quadam in ejaculando semine, quam contraxerat ab immoderato congressu venero latini post finitum morbum podagricum celebrato: non quidem quod torus acius ille ablatu esset, sed saltem imminutus, liquidem rem pericere potuit, nisi quod aliquando membrum in ipso coitu non satis diu permaneret rigidum, a quo coitu semen cum impetu ejaculare non poterit. Falis præterea est se eo tempore, quo dolores podagrici in declinationem vergunt, vehementiores stimulos sentire, quam alias. Summo pere autem & immodice rei veneræ deditus erat, etiam jam declinante vigore ætatis.

Consilium autem à medicis suis exegit, tum in gratiam venturæ sponse, tum quoque liberorum, quos serio expetebat, sibi quoque certo ex hoc conjugio promittebat, procreandorum causa. Dequens itaque Medici consilium præscripserunt, dictante illud & proponente Clarissimo Dn. D. Cnoessetio.

Primo instituebatur bona victus ratio, huic debilitati comoda, quæ etiam literis consignata pharmacopœo exhibita fuit, tali sensu.

1. Nocte cibetur Serenissimus Princeps spermatica gelatina ex perdicibus, coturnicibus, caponibus, testibus gallorum cum radicibus satyrionis majoris ex brodio mcoct.

2. Ovis tribus vel quatuor sorbilibus, quæ omni tempore & jejunii occasione varianda sunt, de quibus omnibus culinæ præfectus à pharmacopœo sufficientem informationem capiet.

3. In singulo ovo exhibeatur ambræ gryscæ

sex veræ ʒi. ita ut pro una nocte ʒi. capiat: Superbibat haustum vini boni & generosi, nempe moschatellini malvatici, seu Hispanici, idque fiat per triduum, si necessitas urgebit; sed ne quid nimis.

Deinde externè pro roboratione sphincteris applicetur & intrudatur quantum potest penicilline sequens balsamum, quod.

℞. Olei nucist. ʒj. ʒi. zibethi. ʒi. croci mart. nostr. præparation. q. l. pro excipiendo balsamo. Miscuantur probe. Applicetur cum bombace quotidie, semel sub ipso tempore & necessitate reponendi intestini. Quo tempore etiam simul regio tauri & perinæ, calfactis prius digitis, inungatur sequenti unguento, quod

℞. Olei nucist. express. ʒʒ. lauri ʒi. pulver. rad. pyrethr. cubebarum an. ʒiv. rad. aronis. alumia. plumosi an. ʒʒ. olei castor. still. Jacobi de Maulis ʒi. garyophyll. still. ʒʒ. zibethi ʒi. mosch. ʒʒ. M. & F. unguentum. Cum hoc unguento etiam testiculi circumcirca inungantur: vel solo zibetho oleo nucistæ excepto, sed parce tamen & semel per diem, cubitum iturus fricet.

Reliquo quadriduo, noctu sub ingressum lecti capiat emulsionem sequentem.

℞. Nucleor. pineor. ex cortic. pistacior. mund. amygdal. dulc. an. ʒii. testicul. satyr. maj. num. vi. caponis num. 2. aq. meliss. citratæ & petroselinæ an. ʒiii. F. emulsio. Adde syr. cinnamomi, julebi rosacei nostri an. ʒi. confection alkerm. magister. perlar. butyrac. an. ʒʒ. ad ʒii. M. Singulo mane sumat rotulas citro tartarico. corallinas num. vi.

Interim de moderatione circa ipsum actum matrimoniale Princeps admonitus fuit ne in illo excederet; & si possibile, post primum peractum somni: secundum Hippoc. qui victus rationem instituens omnino vult ut labores sequatur cibus, cibum somnus, somnum coitus.

Balsamum Vladislavianum.

℞. Olei nucis mosch. expressi, unguenti stomach. sereniss. Reginæ Czæliæ an. ʒʒ. axung. galli Indici ʒii. rad. aronis pulver. pyrethri an. ʒʒ. specier. diatrium piper. ʒii. alumin. plumosi ʒii. olei formicar. per oleum spicæ vel baccar. lauri facti, & ol. semin. crucæ seu sinapi an. ʒii. caryophyllor. still. ʒi. mosch. ʒij. zibethi ʒʒ. M. F. balsamum, cujus usus & vires cum præcedente conveniunt. *Andr. Cnossellum in prædicto Fasciculo &c.*

Pro Nobili Adolescente Bononiense ignavia partium genitalium, Intemperie calida renum, melancholiaque hypochondriaca laborante.

Vicia, à quibus Perillustis Adolescens extorquetur sunt ignaviæ partium genitalium; intemperies calida renum, & affectio hypochondriaca; Cæterum, quoniam primus affectus ad earum partium actionem pertinet vel diminutam, vel ablatam, unicuique satis perspectum esse, in præsentia actionem tantum diminui, vel ex eo confido, quod penis quidem erigitur, sed statim flaccescit, & semen

emittitur quamquam aquosum, paucum, & fere citra delectationem; Intemperies autem renum calida ex arenulis, & filamentis, quæ fere semper cum urinis excernuntur, nec non ex insigni calore ad regionem renum percepto clarius innotescit: Affectui vero hypochondriaco statum copiosa, tum inferius, tum superius excretio. somnia turbata, suspiria, sputumque humidum, attestantur.

Quorum omnium affectuum principia generationis interea sunt perquirenda, & quantum attinet ad primum, si diminutam colis erectionem spectem, nulli dubium est, hanc fieri, quoniam facultas, aut non suscipitur, aut non insuit, non est dicendum non suscipi, alias penis ad tactum frigidus persentiretur, ergo non insuit existimandum; At quoniam facultas non insuit, vel quia ejusdem transitus prohibetur, vel quia non mittitur, postquam nullum adest signum in via prohibentis transitum facultatis, reliquum est, ut statuatur non transmitti, quatenus meo judicio alio advocatur propter timorem, à quo continuo detinetur, & quia spiritus in ea copia, ac qualitate, quæ necessaria ad hanc actionem naturaliter edendam existit, non gignuntur in corde, sicut colligere licet ex intemperie cordis frigida, quam depilatio thoracis, timiditas, audaciæ defectus, segnities, & pulsus raritas, itemque parvitas demonstrat: ut ex his non sit difficile cognitu, patientem nostrum (quamquam melancholicus sit, ac flatibus scateat) haud esse salacem, quoniam flatu concurrent quidem ad Colis erectionem, sed tanquam cum causa, spiritus vero ut causa principalis, & hi ipsi deficiunt, cui accedit dispositio quædam hæreditaria ex parte matris, quæ narrat filios etiam se peperisse, atque in coitu nullam unquam percepisse delectationem.

Quantum autem spectat ad feminis emulsionem pariter imminutam, puto facultatem lædi non solum organi vitio, verum & objecti; Organi primum, quatenus vasa generationi seminis deservientia intemperie frigida laborant, & humida, quibus accedunt tum rei veneræ tardus aggressus, tum ad venerem ablata, vel saltem admodum diminuta propensio; nec obitæ partes genitales pilis esse retertas, quoniam id solum ad appositum adstruendum non sufficit, & eo magis ubi patiens fuerit jecoris calidioris, (ut in casu proposito) merito cujus multa materia fuliginosa pro generandis pilis coacervatur; sed & secundo objecti vitium occurrit, quod pertinet ad impuritatem, ac improbitatem sanguinis, qui continuo testibus à jecore suppeditatur, quod suadet affectus melancholicus, qui & ipse impuri, atque improbi sanguinis partus esse solet, acceditque hinc lassitudo quædam totius corporis, de qua fere semper continuo perillustis patiens conqueritur.

Intemperiem calidam renum à jocinore justo calidiore, & à decubitu super dorsum occasione variolarum, à quibus annis superioribus fuit immaniter tractatus orici unicuique satis cognitum cognosco, quamquam etiam per plures menses, & annos immoderatus totius corporis motus accesserit occasione ludi parvæ pile.

De origine autem affectus statutosi quid sit statuendum, non est difficile capto, nam cum

Jecur incensum sanguinem crassefaciat, & ventriculus refrigeratus multa excrementa pituitosa coacervet, facile est percipere in hypochondriis insignes obstructions fuisse concitatas, merito quarum partes ad illa pertinentes astant, sanguinem, ac excrementa ibidem contenta exurunt, vaporesque concitant atros, qui cor, & caput adeuntes symptomata melancholica pariunt.

Ut igitur ab omnibus hisce malis patiens non ster vindicetur, partes Medici erunt, prius habita totius providentia spiritus reparare, cor, atque testes una cum vasīs seminalibus callescere, obstructions referare, jecur, & renes attemperare ac ea administrare, quæ à proprietate partes genitales iuvant.

Quos scopos assequi ex parte ignavix partium genitalium fere impossibile existimo, quando vitium hoc sit fere nativum, ac sibi conjugat mala viscerum principalium hæctica: Ex parte vero intemperiei jecoris & renum, res aliquam apud me difficultatem habet, quemadmodum & ex parte affectus flatuosi, cum huiusmodi vitia non soleant materiis Medicis (ubi in habitum tendunt) de facili cedere, censeo tamen Dei auxilio primum, prudentia deinde perillultris patientis futurum, ut ipse saltem quoad affectus istos posteriores meliorem statum debeat recuperare.

Ex quo ad materias Medicas devenio, de chirurgicisque statuo, nullam aliam ex uln esse posse, nisi frictions partium genitalium factas cum oleo jasmino, cariophylorum, tandemque cum oleo de Cherua.

De pharmaceuticis decerno, ut primum leniatur alvus cum melle rosato solutivo, & syrupo de polypodio solvente, deinde præparentur humores cum decocto ex jure columbi, betonicæ, buglossi, boraginis, cichorii, graminis, & passularum cum syrupis appropriatis, demum humores præparati deturbentur infuso Agarici, & Senæ cum manna; Verum post hæc patiens nobilissimus aquam Tetractianam per tres dies assumat, & ab hac jus bibat columbinum medicatum cum china, modico sassafras, capillo ven. Citrac, radice filicis, mentha, cichorio, boragine, buglossi, coriandris, betonica, & passulis. Ad hæc & Diambra, utrumque Diamusculum, Dianthos, lætificans Almansoris non solum assumpta, verum etiam regioni cordis illita laudantur, sed præ cæteris extractum Croci eodem modo usurpatum probō; Exterior vero summis laudibus extollo gossipium aliquot granis Musci, Ambra, & Zibeti refectum in serico purpureo confutum, & super cordis regionem gestatum. Pro testibus præter olea superius commemorata mihi probatur fœtus factus cum vino Malvatico, in quo aliquot grana Musci, Ambra & Zibeti fuerint dissoluta, deinde illitio cum unguento facta ex oleo pinearum, samplici, additis pariter Musco, Ambra, & Zibeto jam dictis.

At non contemnenda medicamenta, quæ à proprietate hisce in casibus prodesse plurimum solent, quæ interius assumenda, sunt caro synci, & propie illa, quæ circa renes, radix testiculi canis majoris, virga Cervi, sem. erucæ, sem. lini, sem. potri, pastinacæ, ac urticæ; inter coactica maxime probō D. 4. 17. 10. 1.

Exterius vero sel capræ, vel hirci illicitum regioni pudendorum in hunc usum facit, sicuti & oleum samplici, in quo ebullierint formicæ alatz, sed & pollex pedis dextri cum oleo, in quo cantharides pariter ebullierint inungendus.

Futuro autem vere, si opus erit, præmissa totius corporis purgatione modo superius exposito jecur, & renes usu succi cichorii ex jure pulli poterunt attemperari.

Eo tamen constituto, ut nunc, atque tunc, compar vivendi ratio observetur, præcipue ratione cibi, ac potus, vescatur propterea nobilissimus patiens cibis probe nutrientibus, columbis cum macere coctis, cerebris passerum, testiculis gallorum, usus etiam castanearum probatur, ac cibariis inspergatur pulvis factus ex semine lini, erucæ, croco, Musco, addito saccharo; vinum sit album, clarum, subdulce, & aliquo pacto generosum, quinimmo in primo mensæ potu vinum cum modico Croci medicatum probarem, & hæc sunt, quæ pro affectibus perillultris, & nobilissimi patientis mihi dicenda occurrunt, faveat mosio Deus Opt. Max. *Julius Casar Caudinus in Consultationibus Medicis.*

De Congressus impotentia.

& Quidam annos natus 26. ad venerem ineptus erat explendam: non talis natura: sed quia primis annis pubertatis æstro libidinis excitatus se se exhauserat & confecerat; sic & instrumentorum erat quædam imbecillitas intempestivo labore contracta, & aut nimis aut inellicacius semen. Insulsus non erat, quia satis ad libidinem titillabatur sed tardus quia venerem explicare non poterat: Eviratus, erat, quærit a nobis ut vir hat.

In hoc affectu considerandum, an defectus sit materię seminalis, an ejus vitium, an instrumentorum & vasorum spermaticorum an ejaculantium.

Magna hic prudentia adhibenda, nam nec nimis calfaciendus, (ut sit in aliis, quod frigidis convenit) quia ætas & temperamentum reclamant, & febris facile moveretur: nec ad vulgaria remedia adigendus; nam usû calidiorum ilatus dissiparentur, quorum aliquis usus est in exercenda venere: frigidiora nocerent semen extinguendo, & nimium refrigerando.

Juscula moderata conveniunt: vinum temperandum, & cibo præbito bibendum. Abstinentium per tempus ab actu venereo. Aliquando verpus patitur resolutionem aliquam ob majorem extensionem manu factam, id quod meretrices conari narrat Rondeletius. Balneum non confert metu efforminationis partium: ni in eo coquantur adstringentia ad robur partium, aut immergatur corporis media pars in magnate racemorum.

Clysteres cum herbis mediocriter siccantibus: medicamenta roborantia, cassia & quæ emolliunt laxando non proderunt.

Tabellæ roborantes & conservæ, pro decocto
R. Rad. tormentill. sanan. unda & consolid. utriusque, fol. veron. frag. r. bellid. prunell. pilosell. herb. Robert. itellat. gran. kern. flor. veronicæ, altitil. sem. cardui. portulac. ocym. Folia senn. infund. & Rheumii dissolvend. syr. de cichor. compos.
Pulver.

℞. Pulver. electuar. triasantalor. ʒi. aromatic. rosati, diambraz, pulveris scynæ, corallu & succini an. ʒi. conserv. rosar. & symphit. an. ʒii. rhubarb. ʒii. rad. dictanini, torment. & sign. aloes an. ʒi. fiant tabell. cum sacch. in aq. rqi. sol. & vino hippocratico pauc.

Fiat massa paus qualis descripta apud Fernelium.

Hæc opiata sit in usu. ℞. Conserv. rosar. cortic. citrii, myrobalanor. an. ʒvi. pulv. scynæ ʒii. conserv. consol. ʒiii. pincar. pistaciar. an. ʒi. diasatyron ʒii. diamargar. frig. & diarrhodon, an. ʒi. terr. sigillat. ʒi. Cum sacch. ros. fiat conditum, vel opiata cum syrupo. Hora somni præsertim.

Confectio diasatyron erit omnium instar descripta apud Fernelium.

Fotus blandi ad perinæum & partes vicinas, ex ros. communib. & tranimar. santal. radicib. consol. bistort. & tormentill. utriusque, foliis myrti, & plantag. coctis in aq. & vino.

℞. Emplastr. contraruptur. ʒi. unguenti Comitiss. & desiccativ. rubr. an. ʒvi. trochiscor. de spod. & terr. sigill. an. ʒi. pulveris santal. & mastich. an. ʒiv. Cum cera lora in aq. rosar. & aceto pauc, addita pauca terebinth. fiat magdaleon pro inguinibus & partibus vicinis.

℞. Empl. ad fract. ossium ʒii. cerati santal. ʒi. M, pro lumbis. Iniectiones fiant in penem roborantes ex rosar. heptaphyll. & pentaphyll. decoct. Forte & blandum scynæ decoctum valebit. additis santalis. *Gulielm. Ballonius consil. Medicor. lib. 3.*

Pro quodam juvene ad venerem inutili.

Junior ad venerem avidior, promptior & ardentior fuit, hinc & seminis minor vis & vitalitas, & instrumentorum mollietates. Parum arrigit, & arrectio fugax; effluit etiam sponte sine libidinis pruritu quippiam spermaticum, sed salum & adulterinum: temperamento est calidior. Equitationibus magnis & frequentibus usus. A calidioribus abstinendum putavimus, item venerem exercendum, sed ex longis intervallis, & prægressis incentivis, & pruribus libidinis. Hæc capita sunt deliberationis.

Putanius purgandum corpus cassia, rheo, addito cinnamomo.

Clysteres, non vulgares ex emollientibus, sed qui sint vice injectionis ex ros. commun. plantag. fol. rubi, radic. tormentill. trifol. consolidis, lapath. agrimon. Dissolve mel rosar. sacchar. rubr. & rosar. syr. ros. pallid. cum diapruno pauc sine oleis.

Opiata sit in usu ex conserv. bugloss. borrag. anthos. cortic. citrii, flor. salv. beton. addendo parum semin. cruceæ & paltinac. renum scyncorum, pincar. pistaciar. cum tantillo confection. alkerimes vel de hyacinth. utatur satyrio condito, & præsertim ejus radice succulentiore: nam duplex radix est, una tenuior & inutilis, alia succulentior.

Frequens sit usus pincarum pistaciar. & amygdalar. Item bulvorum paratorum ut decet, & parum conditorum.

Cerebellis passerum & columbarum quidam utuntur ad excitandam venerem.

Imus venter & perinæum foveantur sequenti decocto, aut muria.

℞. salv. minutior. puleg. rorismar. an. m. j. sem. cruceæ, paltinac. an. ʒi. rosar. rubr. nor. chamamel. nichil. an. m. ʒi. cyperi ʒi. excipe sacculo qui bulliat in aq. & vino rubr. styptico profotu perinæi & pectinis.

Parte deteria fiat litus ex mastichino additis ovis fornicatum & pauc castoreo. Non alienum erit admoveere emplastra, ut ante dictum est. *Idem ibidem.*

De profluvio seminis non venereo.

Non abs re Vir Nobilis curam suæ sanitatis habet, (quorum enim felicitas, si non adsit sanitas?) & naturam ducem sequi destinavit; hæc æternitatis est avida, aliàs capax, aliàs rapax, & per novam sobolem, ut per progerminationem id facit. Si in arboribus adeo sedula, quid in homine agat, qui ad Deum tanquam archetypum formatur, & ex tantulo semine, re tantula, miros effectus producit. Ideo D. Laborans in eo conservando laborat ut semen sit prolificum, non infusum, non degener, non evanidum, ut homo ex homine exiliat. Tantulum semen ex omnibus quasi partibus deciduum rapit secum ideam quandam hominis, ut homo sit tanquam character, & transcriptio quædam viva: semen est tradux ad æternam propagationem, ex omnibus partibus decedit, & deceditur ex prona quasi semina ductuque; omnes meatus, aut tubi ad partes naturales imas (quæ per *ἀποκρίσις*, naturales dicuntur, aut potius *ὑποκρίσις*) tendunt, diriguntur, conspirant, hinc summa in palæstra venerea voluptas; idè harum partium maximè habenda ratio, sive ut simplices, sive instrumentales considerentur, nervi, tendines, miro artificio fabricati, in generatione valent plurimum. At partium principum ad opus aliquod etiam leves affectus magni sunt momenti; inter cætera animantia homo à congressu maximè exolvitur, quia proportionem corporis multum seminis ex æternitur, & quod robustum est exilit, & ut ædificii constructio, sic corporis compages quatitur ac convellitur, dum semen decedit. Mirum quod maximè in mistu, & egerendi conatu ægro Domino semen effluat, id partium vicinia & sympathia facit: hinc qui meiendi desiderio tenentur concumbere nequeunt, quia meatus implentur per affluxum, & qui concumbunt si meiendere velint, penis intenditur, id quod ad rem præsentem pertinet: inde est formæ & morum similitudo, & in aliis animalibus major est similitudo quàm in homine, quia cogitatio alio traducit: hinc majores differentiz, dissimilitudines, quia velocitas cogitationum, celeritas animi, notas multifarias imprimit, non sic in aliis animantibus: imo in iis certi sunt per anni tempora concubitus, homini omnibus horis dierum ac noctium, quod (ut aiunt) magis intersit hominem nasci quàm cætera animalia: imò nulla animalia gravida præter mulierem coitum norunt: itaque non mirum si sanitatis maximè ratio habetur, & ut natura ad pristinam integritatem redeat: ulius enim veneris ad æternitatem quandam per sobolem, & ad sanitatem si moderatus est confert. Quia qui tardius & moderatius venerem exercuerunt maximam laudem habuerunt, quia validiores & longioris vitæ fuerunt: sic statura corporis alitur, aluntur vires. Mirum in homine cæteris animan-

tibus in congressu satietas, homini prope nulla, licet usus veneris ad aeternitatem producenda sobole, & ad sanitatem, si moderatus est, conferat, ut praefractor & magis ridiculus videatur Democritus, qui usu non veneris damnavit, ut in qua homo ex homine exiliat. Id ad Paganos non ad Christianos, apud quos eximia soboles desideratur ad gloriam Dei, & ejus cultum, & eximia gerenda negotia in Reipubl. decus & salutem. Laudo antiquitatis studium, quae tanti fecit hominis generationem, ut remedia quaedam excogitavit ad generandos liberos pulchros & bonos; Hermelias vocatur.

Continet multa laudanda & non negligenda; non ita est efficax, ut quod promittit exolvat, & spem effectus mentiretur, aut elevaret.

Danda quae suctum lentum generant, ut sunt extrema animalium & testudines, & olivae. Arbores sunt vivaciores quae lentum habent succum. Exercitium violentum malum, inutilis a cibo contentio animi & jugis actio, spiritus ad partes superiores fertur, inferiores fraudata spiritu imbecilliores redduntur.

Homines solertes & negotiosi liberos generant imbecilliores, vulgus est proletarium, robustos generat.

Magna pars urbanorum est imbecilliore ventriculo, item studioforum pertinax vigilia crudelitatis parens; ex cruditate affluxus humorum & effluxus labor naturalis, in visu, auditu & ceteris excessus vitetur.

Ira vitanda, licet oxythymiam laudet Hippocrat. & exandescitiam ad honos succos generandos & *in Regum*. Id de pinguibus & succulentis audiendum non de biliosis & gravi negotio occupatis & studiosis.

Corpus & animus instar duorum equorum viribus aequalium corpus & enim tanquam currus & vehiculo, id est se ipsos trahere debent.

Sinapi, acris, alia sunt vitanda.

Dixit aliquando siccans & adstringens.

Portul. intybum, (nam quidam aiunt cichoracea semen minuere) plantago, lactuca, bugloss. borrago, in iure conferunt hordeata, oryza, quidam consulebat pistacia, pincas, passulas, avellanas, amygdalas sed parum consulto; semen enim augent, & ad ventrem excitandam commendantur si inhiuntur ut sit semen crassius. Usus si vini crassa diluiti aqua, aut simplici, aut in aqua torquis aureus candens extinguatur.

Purgatio ex rheo & syr. de cichor. ex intervall. apozemata ex endiv. scariol. plantag. semin. lact. cicutill. coque in aq. adde syr. limonum, de granat. ros. siccat.

Opiata commendantur ex acetositate citri, semine cannab. cariphor. sem. portul. lact. nenuph. floribus, semine agni casti, ruta.

Alia opiata ex ydomis conditis ad 3ii. corall. rubr. margarit. an. 3ss. b. lautilior. 3i sem. agni casti & ruta an. 3i. conditum fiat cum syr. ros. siccat. valent trochisci de terra sigillata.

Quod ad topica spectat. Fotus ad perinzum ex fol. plantag. rapli, centioid. cupressi, rosis, florib. chamem. cortic. granat. sacculus plenus bulliat in vino rubr. & aqua fabrorum.

2. Olei rosati, myrtill. mallichini an. 3j. pulver. corall. rubri mastich. anthera an. 3i. cum cera fiat unguentum.

Emplastrum Comitissae, & desiccativum rubrum, confere.

Quae evocant ad cutim valent. De aquis plumbaribus videbitur, si res urgeat.

Inicilius in plena decocto adlu ingenti, pehi impositis partibus naturalibus.

Testudines valent, cancri juveniles, syr. resumptivus, semen salicis & viticis albae confert.

Valer purgatio ex conterv. rosar. nymph. symph. rhab. myrobal. cond. aut syr. convenient.

Juvat mandere rheum cum passulis. Utatur vino optimo, non hujus anni in quo vina sunt renuis quae sanguinem ex Hippocr. imbecillum generant & serum tenue.

Abstineat a diureticis, utatur pane in lacte subacto.

Marcipanes cum carne pulcorum conferunt.

Diarrhod. Abbat. Electuar. de gummis, pallia regia.

Hec scripta collata sententia M. Jacobi Guillemeau Chirurghi Regii, & c. in libellum.

De re Venerea & impotentia pro 3. libelli 1. ro.

Quamquam ignavia, seu impotentia ad ventrem plures causas agnoscit; in hodiernis nobili viro quinquagenario non aliam vengo, quam nimiam laxitatem corporum nervosorum penis, rara lubritas, quae sanguinem arterialem non continent, ad perfectam erectionem necessarium, qui praeter voluntatem inesse effluit, nec non semper paralysim multorum penis exigentium, productam a pituitosa materia ad eas partes confluente obimmoderatam, & violentum contum. Ad quam rem quoque faciunt etiam morborum reum affectiones: quatuor cum a muliere copiose procreantur, licet haec princeps causa non sit hujus affectionis.

Quicquid tamen horum sit, non nisi difficili negotio pristinum robur partibus illis conciliari poterit, cum & in juvenibus id magni laboris opus esse experientiae fide constet.

Quod tamen ut consequamur, praemissa blanda totius corporis purgatione, in usu sint alia certa, quae copiosum semen, & materiam sterulentam producant; quo facilius partes nervosae membra virilis surgant. In quam rem opportuna censetur quae instant; ciceres scil. rubri, fabae, parmanica, & origanum, modice assumpta, & praeterea, semina crucis, urticae, & raphanus, atque inter aromata, zingiber, & cinnamomum, in usu condiendorum ciborum. Quibus accedant nuclei pinei, pistacia & hujusmodi huic scopo accommodata: necnon composita, quae prostant apud pharmacopolas; puta diamoschina, diafatrium, & diambra quae ex usu quoadque sunt; ut & Mithridatica confectio, & virile membrum cervinum in pulverem redactum. testiculi vulpis exsiccati, scinci marini, bulbi, & qui testiculi canis vocati, si eorum pars crassior comedatur: juvabit etiam carnes cum mace coquere, galli testiculis pro cibo uti, & ovis perdicis. Extrinsicis vero plura usurpari possunt, in quibus primum locum obtinet infusum in aquis thermalibus sulphureis, ac deinde in aqua fabrorum, in qua ebullierint calamenchtha, salvia, stoechas, rosmarinus, & lavendula: tunc inunctio perinze adipe leonis, oleo de castoreo, sinapi, & pyrethro, necnon fotus illarum partium ex vino generoso, cui incodit fuerint herbae praedictae, aut hujusmodi, vel hujus formulae linimentum.

4. Ol. laurini 3iii. ol. caryophyl. 3v. pyrethri pipery

piperis an. drach. i. seminum urticae pulverizatorum, adipis suilli drach. ii. ambræ, & moschi parum. ceræ q. s. f. linim.

Validioribus deinde remediis arenularum productioni occurrendum erit opportuniori tempore. Atque hæc habui, quæ in medium afferrem. Viri Illustriss. mandatis morem ut geram. Quæ ut ipsi juvamento sint, juxta nobis in spe, & votis est. *Bened. Silvaticus Cons. & Resp. Medic. Cent. iv.*

De Impotentia ad Coitum. Pro Illustriss. Frederico Martinengo, Brixienfi. Veneto Nobili.

Secundus nunc agitur annus, cum Illustr. Vir, annorum 22. temperamentis sicci, ad frigidum vergentis, gracilis, & proceræ staturæ, lectissimæ, & elegantissimæ Virgini matrimonio junctus, hujus tamen jura nondum persolvit, nec ipsam inire potuit. Cum primum enim in ejus ruit amplexus, arrigitur quidem penis citissime; quod nec raro etiam contingit ab ipsa sejuncto; cum vero veneream palæstram aggreditur, illico flaccescit, cum gravi cordis palpitatione, idque quoties statibus redundat: hypochondria continuo fere rugitu obmurmurant; plusque appetit, quam concoquat; noltram propterea efflagitat medelam.

Ex enarratis itaque cuilibet compertum est, hypochondria esse partem potissimum affectam; ut patet ex rugitibus, & statuum copia; de causa vero affectionis ipsorum, & de coitus offensa, quæ ab hac manat, non ita constat. Si enim Galenum consulimus 3. de Loc. Aff. 7. ubi data opera juxta Dioclis sententiam de hoc affectu verba fecit; quam & amplectitur; duplicem causam melancholiæ hypochondriacæ agnovit; vel immoderatum calorem in venis illis, quæ chylum à ventriculo excipiunt, Mesaraicis scilicet, cujus causa sanguis in ipsis crassescit: ex cujus deinde tenuiori substantia flatus eleventur, rugitum excitantes: vel quod infernum ventriculi officium intestinis continuum, pylorus nempe, phlogosin concipiat, erudique attrahat humores; qui attenuati, & in flatus facessentes, rugitum excitent, cum siti, obstum, sielismo, à scrofitatibus melancholicis, aortæ pulsatione, cum ob compressionem, tum ob effervescentiam: ac tandem timore, & mœrore, melancholici affectus luculentis indicibus, à vaporibus crassis in caput elevatis, spiritusque animales offuscantibus, non sine cordis contentu, ex Hipp. enim Timor, & mœror diutius durans est signum melancholicum. Quod si expendamus symptomata in nobiliss. patiente, cum neque se prædat æstus in hypochondriis, nec sitis, vel sielismus, vel aortæ pulsatio, neque tandem timor, & mœror, quæ morbi progressu subduntur, pronunciandum omnino est, affectionem melancholicam quidem esse, ratione pariter affectæ, non tamen hypochondriacam melancholicam, cujus causa non sit phlogosis mesenterii, vel pylori, cum nullus sit æstus: verum solum flatum hypochondriacum, excitatum ab intemperie frigida, & sicca cum ventriculi, tum cordis, cui contentur habitus totius corporis, ex Gal. lib. Artis Medicinal. ubi de hac intemperie. Cum enim calor est unbecillis, deficitque humidum

primigenium, perfectæ coctiones fieri non possunt, statuumque copia succrescit, qui in venterii duplici membrana conclusi, atque ægre erumpentes, hunc affectum inducunt. Majus taceat negotium causa impotentæ coitus. Si enim juxta omnium Medicinæ scriptorum sententiam, flatulenta penis attractioni quam maxime sunt accommodata, fabæ in primis, phaleoli, eruca, pastinaca, & hujusmodi, qui in casu præsentis flaccescit, quin potius rigidior sit penis, cum ex Hipp. constat 3. in 6. Epid. quod, quibusdam cum venere utuntur inflatur venter, ut Demagoræ, & quibusdam in hac strepitus, ut Archæsilao. Quod luculentius expressit Text. 22. ejusdem libri, his verbis: In accessionibus, id est in congressibus, sunt qui strepitum edunt, quidam autem jam accessuri, horrentes, rugosi sunt, id est ipsorum cutis corrugatur, & quidam cum accesserint, ventre inflantur. Addam ego, quod Viri cuidam Nobilissimo in congressu solvebatur alvus. Quorum sane causa est natuum, & humorum motus in congressu. Flacciditatis vero illius causa in Illustrissimo patiente, experientia comperit timorem fuisse, & animi perturbationem, eadem scilicet ratione, qua tunc spiritus, & vapores, ad cor recurrentes, gravem illam palpitationem induxerunt. Cum enim medicis præsidis, & blandi decocti usu, præmissa universali purgatione flatus ducere animus esset, atque Vir Illustriss. juvenili æstro actus biduo formosæ meretricis nocturnos appeteret amplexus, in eo conatu, eadem imo & graviore cordis palpitacione correptus est, cum gravi mœrore, cujus postea blanditiæ, & verborum lenocinia illi animos cum addidissent, concubio perfunctus, ut virum decet, eadem & sequenti nocte nullo labore, atque in patriam redux nono post mense, cum uxore filia prole omnia nuptes vota. Verum à naturæ ortu temperamentum frigidum & siccum sortitus, innati calidi proinde inops, paucorum annorum curriculo vitæ spatium absolvit. *Idem ibidem*

De impedita seminis ejaculatione arrepto pene Virum à causa naturali, vel à Fascino ortum ducat. Responsum.

Ex historia ad me à Germanis transmissa, constat, Virum quendam annorum 46. salacissimum, ita ut aliquando noctem continuas coitionibus suffecerit, à duobus annis uxorem duxisse, quam hucusque sæpius inire tenta erit: irritum tamen conatu. nec semine unquam emissio; cum viribus alioquin, & viribus valeat latis, ad Venerem proclivis; quanquam pene arrepto, & in mulieris loculos irrumpente, non sine iusta in illis mora, seminis nihil emittat; quinimo flaccescat tandem ille, veluti lorum in aqua, & luctu se subducere cogatur: si tamen eundem mox flaccidum, aut vulvæ applicet, aut quandoque attrectet, semen cum voluptate, aliqua copia ejaculetur, nulla præcedente attractione, neque unquam dum penis tu net: quærit propterea an magicis vinculis implicetur, Martis instar à Vulcano irretiti, quod derepente subortus sit affectus, cum multo ante matrimonium rem habuit cum quadam muliere, cujus maritus magicæ artis suspicione laborat, ex quo postea quamlibet aliam aggressus, nunquam semen emittit.

suspicio sit potissimum in motu internarum partium; cum non solum torpescat corpus, in viro Excellentiss. vegeto antehac in omnibus actionibus, & motu, imprimis cui nunc laxa adeo sunt membra, ut non solum ad gressus singulos gradum sistere cogatur, sed etiam baculis innixus ambulet, nullis licet in corpore tumoribus, doloribus, aliisque affectionibus conspicuis. Ut propterea affectus hic sit semiparalyticus internarum partium, quæ non solum earum motum perimit, sed etiam illorum musculorum, qui sub urethram per ejus longitudinem excurrunt comprimunt prostates, & semen elidunt, in ejus ejaculatione. Qua omnino ratione in epilepsia, ex violenta musculorum concussione semen quandoque præter voluntatem effluit. Quamquam enim seminis emissio sit motus facultatis naturalis, expultricis scilicet ut & urinae, faecum, aliorumque excrementorum excretio, illam tamen musculi sollicitant, ut diximus: ut propterea in Nobiliss. patiente nonnisi magno conatu, nec sine animi deliquito fiat seminis ejaculatio. Penis autem rigidus sit & tenditur à copia spirituum, & vaporum, qui arterias, & nervos titulosos penis replent, ac proinde absque motus animalis opera, accedente tamen aliqua seminis penuria, quod alioquin, vel post congressum efflueret, vel ex ipsius emissionem in coitu non succederet animi deliquium. Semiparalyticus vero inferiorum partium aliam non agnoscit causam, quam venerem immodicam, quæ lumborum partes agitando vehementius pituitosam materiam in capite humidissimo redundantem ad prædictas partes rarefactas & imbecilliores attrahit.

Qui quidem affectus gravissimus est: quippe qui minatur paralyticum partium etiam superiorum, imo & apoplexiam, cum jam afficiantur oculi hæreditario jure.

Totum itaque corpus accurate expurgandum, & caput in primis, mox internis, & externis discutendi humores paralyticis autores, atque nervosæ partes pro virili roborandæ, facta diversione materiæ ad partes affectas influentis.

Toti purgando alvus est lenienda melle. ros. solut. & manna. aut el. lenitivo, cum speciebus hieræ. Præparandi humores syr. de betonica simplici, oxymel. sim. & syr. de hyssopo, cum decoct. vel aqua cicchorii, betonicæ, borraginis, & menthæ: quo tempore sanguis modice ex jecoria dextri brachii mittendus erit, ob jecoris fervorem. A quibus purgetur corpus agarico trochiscato, cum syr. & melle ros. solutivis. Repetenda postmodum humorum præparatio qui longius à primis viis redundat, & quidem syr. de betonica: & oxymel. compolitis. syr. de stæchade, vel oxym. scyllitic. cum decoct. calendulæ, herbæ paralyticæ, jux artheticeæ, & cicchorii: purgato corpore pilulis de hiera cum agarico, & aggregativis, capite vero per nares erthius, & per os apophlegmatissimis, A quibus, internis, & externis topicis demum locus erit. Inter interna principem locum obtinet decoctum ex ligno Indico, alfa parilla & visco quercino, cum salvia, stæchade, herba paralyticæ, & calendula, præmilio bolo ex terebinthina Cypria, & castoreo, cujus usus erit triginta dies, semel in die vel iterum etiam, si per vires licuerit. In externorum vero usu, sudor partium inferiorum sollicitandus erit, doliolis potissimum aqua hydrotica, vel lixivio

calido repletis, cui incoquantur, laurus, juniperus, & prædictæ herbæ, vel, si earum fuerit copia, aquis Thermalibus sulphureis, in quibus se, deat umbilico tenus Luta quinetiam Thermalis a discutientia quammaxime ex uis crunt: a qua us inungenda regio ossis sacri oleo de castoreo, petroleo, laurino, & vulpino, cum aqua ardente, necnon picationes prædictæ partis sæpius repetendæ, atque fonticulus sinistro brachio inurendus, divertendæ fluxioni.

Victus in usu decocti erit attenuans, & tenuis, ac exticcans, panis scilicet biscotus, cum pallulis, & pistaciis, concessis quandoque carnibus assis, & loco vini, potui erit mulsa ex coriandro, & superlute decocti materia parata. Alvus sollicitetur octavo quolibet die, usu pilul. de hermodactylis, & de hiera diacolocynthidos, & quolibet quatrinduo, clystere, ex decoct. colocynthidis nodulo inclusæ, cum centauro, prassio, beta, & nialva, additis mell. ros. & oleo rutaceo. Vinodemix vero tempore vinum medicatum paretur ex iis, quæ decoctum componebant, quo solo tota hyeme continuo utatur. Atque hæc, in calu præsentis ex usu potissimum futura censeo. *Iidem ibidem.*

Penis Flacciditas.

Nob. Patiens, calidi & humidi temperamenti, habitus maxime carnosus, 37. ætatis anno, ex longa sub fervidissimo Cælo equitatione, calidam viscerum naturalium intemperiem contraxit: unde ex vini nigri summe refrigerati, frigidæque uberissimo potu, ventriculi, viscerumque omnium gravi imbecillitate laboravit, plurimamque urinam fere per septennium reddidit, cum insigni carnis consumptione, totius corporis lassitudine, orisque siccitate perenni. Gravissimi vero affectus detecto discrimine, ad Archiatrum longe celeberrimum curandus confugit, à quo longa cum sapientissimis doctoribus, de affectus essentia, habita disceptatione, diabeticam tandem spuriam affectionem unanimiter statuerunt, ea potissimum ducti ratione, quod assumpta non oquebantur, nec (ut in Diabete exquisito contingit) immutata excernebantur; toto autem curationis tempore, in dies collecta urina, 15. librarum pondus æquavit, cruda, crassa, & interdum utcumque oleosa; quam tamen longè pinguiorem antehac reddidisse probabile est. cum Patiens Nobiliss. valde carnosus & obesus esset.

Instituta victus ratione, levisque totius expiatione præmissa, quatuor uncie sanguinis ex venis sedalibus educæ fuerunt; mox ad emulsionem amygdal. dulc. & sem. papav. albi, lactis item bubuli (desideratur quippe ovillum) chalybeati usum, necnon dulcis aquæ balneum, & inunctiones ex oleo viol. & amygd. recent. preperatum est; syrupum pariter coral. necnon rosar. tincturam ad viscerum robur assumpsit, quorum remedium op. paulatim se remisit affectus, corpusque instaurari cepit, licet observatum fuerit hac omnibus præsidis antecellere; quod propterea triennium, toto verno tempore maximo cum emolumento ei exhibitum fuit. Observatum præterea roborantia, calefacientia ac valde nutrientia præsentem tulisse opem, quod imbecillitatis, & in modice naturalium viscerum, ex frequenti largoque gelidæ ac vini in pensius frigidæ potu, contractæ perfrigerationis certissimum præbuit indicium.

Grave & laxitate. Quibus tandem penem erigendi impotentiam successisse, jure merito estimari potest; hinc Scythæ, ut habemus ex Hipp. ad coitum minime alacres ac prompti sunt, ob corporis laxitatem, molliem & trigiditatem, necnon diuturnas equitationes; genitalis namque semen copiosum & calidum, ut & acre sit oportet, ut coitum excitet; ipatentiam autem a sanguine, calorem a corde, acrimoniam a jecore, valis & testibus suscipit; hinc infans, ob caloris concentrationem, tum seminis effusio, tum forsitan etiam penis erectio contingere potuit, ut Milelio ab Actio & Orbi. descripto; atque adeo, quodlibet impedimentum in via, tum a tumore, tum ab exsiccatione abortum, omnino excludi debet; sicuti neque de calore, ad hujusmodi affectum conspirante, ullus rationi aut suspicioni locus est, etenim flaccidus penis factus fuisset in diabetica affectione, quo tempore calor magis vigeat; qui modo calori nativo & immutato, ut ita dicam, & quodammodo labefactato successit.

Affectus utique huic Viro permolestus, cum uxori iusta perolvere nequeat, & qui ipociet, potius quam individuo Patienti, hac ætate, nox foret, nisi Ventriculi, hepatis, cordis, verbo, totius corporis imbecillitatis indicium adesset. Quare curandus, ut robore toti restituto, vita diuturna frui possit Nob. Patiens, quam tamen, statu præienti, eidem polliceri non possumus, ipse tamen eam nos consecuturos, si Medicis præsidus accurata victus rationis fundamentaloliderit.

Medicæ vero intentiones jam patent; etenim, cruditatibus evacuatis, ventriculum & cor calefacere ac roborare oportet. ut probus sanguis, indeque superiores spiritus, & semen copiosum & calidum procreari possint; pudendorum quoque roboratio & calefactione non omittenda.

Ad medicamenta itaque devenientes, omnia quolibet sanguinis missione, primæ viæ cruditatibus emundandæ melle ros. solut. cum manna claris aut elect. lunt. cum hinc; quod opus ut percheiatur, diebus sequentibus adhzrentes cruditates detergendæ, & incidendæ mel. ros. simpl. oxym. & syr. de cort. citr. sine diluto, à quibus si abhorreat, præbeatur quotidie semunc. crem. tart. in jure sem. citri, vel cinnam. alterato dissoluti. Inde repetatur supra propositum medicamentum; quod si primum licim excitaverit, præbeatur ab eo multa diluta ad lb. i. s. vel ii. Hac secuta primarum viarum expiatione, aqua Terebintina, cum vehiculo mel. ros. sol. poterit ventriculum & intestina à crudis excrementis omnino liberare, easdem partes exsiccando & roborando; atque si conjectetur massam sanguineam cruditatibus scatere, repetatur infra scripta præparatio & expurgatio; sin minus, omittatur, & ad juris usum deveniatur. Secunda autem præparatio absolvatur decoct. eichor. borrag. melis. beton. saly. absinth. calendulæ, nasturtii; additis oxymel. & syrup. de prassio. Quod si dulcia hujusmodi repuar. substituantur succi dep. borrag. betonica, summat. prassi, a lʒ ii. aut iii. in decoct. præscripta. Ideo purgans medicamentum præscribatur, quod quidem cruditates educere, sed & ca-

lorem naturalem enervare non possit; quale poterit esse pil. de hiera cum agarico, malic. cum gr. x. extracti mechoac. Jalappa enim ventriculo nimis intensa. Post hæc allumat jus columbæ 40. dies, ita paratum.

℞. Ligni lentisci c. Chio ʒi. s. fassafra, ligni rosinar. an. ʒ. s. aquæ meliss. borrag. an. lb. i. s. m. s. inf. per horas 24. deinde adde dimidiam columbam turricolam, & bul. ad consump. dimidii, ita ut supersint ʒxvʒ. & collar. servetur pro duabus vicibus, mane sumenda; cui præmittatur pulv. viperinus sic paratus.

℞. Pulv. vip. gr. xii. confect. anacard. vel alchemes parum, itaur ref. b. Nec ad urinæ vias audent medicamenta perducere, ob prægressam diabeticam dispositionem. Topica tamen interim, tum interna, tum externa pudendis & genitalibus non sunt deneganda, calorem & robur eisdem partibus præstantia, extrinsecus vero, quoniam præsto non sunt aquæ sulphureæ pro intestu, ideo adhibeantur totus perinæ & testibus, spongia magna madefacta in vino, in quo ebulliant folia calament. salviæ, rosinar. aquilegiæ, nux myristica & pyrethrum; vel paretur ex aqua vitæ, sem. staphylag. alterata. Post totum de more fiat inunctio adipe isonis, cum moscho & zibetho, vel oleo de spica addito zibetho.

A proprietate vero juvat oleum formicarum alas habentium, inungendo perinæ & testibus. Per os quoque aliqua usurpari poterunt; non tamen valde calefacientia, nec violenta, ut semen crucæ saccharatum, radix eryngii, condita, gingiber conditum, confect. amygd. pineorum, pillaciorum, aliquando vero primo vini cyatho, in cœna parum croci abstundatur.

Et in victus ratione omnium primo mittat gelidum potum, sicut quoque potum aquæ. Vitet repletiones & cruditates. Modice bibat, vinum album & subdulce, subgenosum, & in omnibus prudentissimæ tuz curæ sese committat, sine qui irrita evaderent à me quoque adducta & præscripta, ut Nobiliss. Patiens ab hac molestia liberetur, & totius corporis robore adepto, vitam feliciter proroget *Reym. Joh. Forss. Cons. & Resp. Medic. T. i. Cerci iv.*

Ignavia ad Venerem.

Nob. Juvenis, 28. annum agens, temperamentum secundum totum, & secundum jecur calidi & humidi, ad obesum vergens, hirsutus tamen, mediocri staturæ, vegetus, & ad omnes operationes animales promptissimus, & sen enocysime ac scillime nutritus, anno 1657. Venetiis per dies 15. seorti consuetudine maxime oblectatus, non erecto pene semen profudit, cum aïas, eodem rigido, Veneres congressus obiret; & redux ita persistit usque ad hyemem anni 1661. quo integris noctibus, cum dilecta puella, ad fenestram veritatus, oculis atque amplexibus, citra congressum, iterum & tertio, flaccido pene, semper semen protudit. Venetias postea reversus, rursus, erecto pene, Venerem invit, a qua gonorrhœam reportavit, & ad pristinam relapsus est ignaviam, cum qualibet etiam fornicat. potius solo intuitu pulchre aliquis

cujus mulieris, semen, cole non erecto, ejaculatus. A gonorrhœa autem aquarum Masini, & aliorum remediorum ope, sex post mensibus liberatus est. Modo tandem pudendum frequentius, absque res venereæ meditatione, & jucundi objecti præsentia, tenditur perfecte & arigitur, noctu potissimum, à somno expergefæcto. Raras vero ex insomniis pollutiones patitur. Tanta vero calamitatis Juvenis generosis causas quarit, opemque implorat.

Penis flacciditatis, quæ Nob. Juvenem anxium habet atque contristat, quæque actio est imminuta, non ex toto abolita, causa sedulo à nobis perquirenda, ut pristino robori restitui possit; non posthabita cita nimis, & nonnumquam fere involuntaria seminis ejaculatione. Primo itaque in seminis defectum culpa conjicienda non est; genitale enim copioso & calido semine abundat, quod commodè coitum procurare potest; licet nos semini penis arrigendi vim minime concedamus; sicut eam admittimus Veneris excitandæ; deficit enim erectio huic Nob. Juveni, copioso adeo semine abundanti, quæ Eunuchis concessa rigidum penem frequenter habentibus, nec tamen quicquam seminis emittentibus. Neque vitium instrumentorum criminandum, ut Scythis contingere solebat, ob molitiem ac frigiditatem eorundem; siquidem nec equitationes immodicæ, aliique labores aut paralytis præcesserunt; & præterea habet hirsuta pudenda. Superest itaque, quod vitium spiritibus insit, aut quia non producantur, aut quia producti non transmittantur, aut producti & transmissi, in illis pudendorum partibus non exsuscitentur. Spirituum autem penuria in eorundem ortu nullo modo admittenda, cum totum ejus corpus calidum & humidum, ac sanguine abundet, cui spirituum procreatio deficere non potest: Genitorum autem influxus intercipitur aliquando; aliquando vero alio avocatur; nostro casu non intercipitur, quia nollus conjici potest affectus in via; neque divertitur, quia in veneris congressibus nullus contingit metus, nec adeo corde frigidus est. Reliquum est igitur, ut spiritus geniti atque transmissi in vasibus excitentur, non quidem ob frigiditatem, quæ insignis atque manifestissima esse deberet, ut in frigidis & maleficiatis; sed non vegetantur, quia transfusi à pudendarum partium calore illico attenuantur & dissolvuntur, eoque facilius, cum ob rarefactam ab eodem calore illarum partium substantiam, sanguis arteriosus diu cohiberi minime possit; unde immodicum calidum, tum carum effeminationem, tum nervorum incontinentiam producat, ut dicebat Hipp. Hanc autem veritatem confirmare possunt illarum partium hirsuties, copiosum calidumque semen, in Venerem facilis proclivitas, & omnium maxime impotentia, sive flacciditas, quæ tunc potissimum contigit, quando cum scorto & puella, objectis sibi dilectissimis, versatus fuit; etenim, quo major est oblectatio & volupras, eo fervidiores, tenuiores, & ad penis erectionem ineptiores, in hujusmodi temperamentis, redduntur spiritus; abique vero hujusmodi intenta cogitatione, noctu expergefæcto facilius contingit penis erectio; prout etiam dum illi objecta non adeo

dilecta objiciuntur. At citam, atque celerem nimis, imo & involuntariam seminis ejaculationem, partim ab irritata expultrice, ob lemmis acrimoniam; partim à debilitata retentrice vesicularum semen continentium, nec non glandularum prostaticarum provenire credendum; quæ vasa ex semeltri gonorrhœa majorem laxitatem adeptæ esse, minime dubitandum; cum ab eadem involuntaria, quæ antea non aderat, facta sit seminis profusio. Pollutio autem in somnis frequens ei non contingit, deficientibus forsitan speciebus, tunc facultatem moventibus atque excitantibus; aut circa renes immoderato calore non præsentem; vel ipso forsitan etiam ægro haud supino dormiente.

Affectus autem hujusmodi nunquam facile sanantur; minoris tamen laboris censendus est præsens casus, quo nec ullus morbus instrumentalis, nec frigiditas ullo modo concurrens, quæcunque enim ea sit, sive essentialis, sive per consensum, sive privativa, sive positiva, caliditate semper deterior habetur. Quare optatum finem nos consecuturos, sperare juvat. Intentiones autem medicæ erunt, universo corpore prius leniter expurgato, Jecoris, totius & pudendorum calorem contemperare; eadem pudenda corroborare; & aliqua à proprietate juvenia, sed temperata in usum revocare. Quibus si, hoc anni tempore, omnino satisfieri non poterit, sub finem saltem Veris, vel æstate incunte perficietur curatio.

In præsens itaque sat sit Nob. Pat. omnium primo assumere leniens ex syr. ros. sol. cum lenit. vel flor. cass. cum lenit. & tart. sequentibus vero decem aut duodecim diebus, quotidie, quatuor horis ante prandium, sumat cass. cum pulp. tamar. Primis vero quatuor aut quinque diebus.

℞. Flor. cass. ℥ii. pulp. Tamarind. ʒi. m. f. b. reliquis vero.

℞. Pulp. Tamarind. ℥ii. flor. cass. ʒi. m. f. b. statimque superbibat jus, plantag. & rapis alteratum. Duodecim vero exactis diebus, si venter bene subierit, nullo alio solvente medicamento opus fuerit, sin minus, repetat præscriptum ab initio, à quo hauriat aquam, aut jus hordei, ad ℥b i. & subinde mulum ducat jus ita paratum.

℞. Santal. alb. legit. ℥ii. cort. secundi, hoc est, subcort. ligni frax. ʒ. f. Aq. com. Chalybeat. ℥b iv. m. t. inf. per horas 24. deinde adde dimidium pedem vitulinum, & bull. ad consumpt. dimidii, colat. vero servetur pro tribus vicibus, matutino tempore assumenda, cui singula vice infundantur gutt. v. tinct. corall. chymicæ; & hujus usui insistat ad dies 40. & ultra, absque ulla in vivendi ratione arcta adeo & rigida cautione; nisi hac sola, quod si mane ventriculus fuerit ex præterita pleniori cœna repletus, omittatur die illa potio præscripta. Interim extrinsecus, derasis prius pudendorum pilis, fiat de more hujusmodi illitus.

℞. Ung. ros. Mes. ℥ii. Adip. Leonis ʒ. f. coaguli lepor. ʒ ii. ol. myrt. ʒ f. m. ref. linum. quo illinantur pudenda & perinæum.

Post hæc, aliquod à proprietate juvenis, nec operosa compositionis, nec Nob. Pat. injucundum

dum remedium præscribi poterit. Sic parentur testes vulpis exsiccati, & in pulverem redacti, quos innoxium, & minime vacuum membri tentionem efficere asseruerunt, tum Orib. tum Aetius, quibus addi poterunt semina erucæ, pauca tamen dosi,

Uc. 2℥. Pulv. testium Vulpis 3℥. sem. erucæ pulv. 3i. m. cujus dosis ad 3i. cum aqua Ononidis, vel ex pulv. ref. bol.

Victus ratio ad frigidum declinet, neque tenuis, neque attenuans; repletiones tamen & cruditates fugiendæ; sanguinem enim corrumpunt, semen extinguunt, & calorem naturalem præfocant. Cæna sit prandio parcior. Venereis excitant, pulli, columbæ, perdices, verveces, potissimum testes, ova recentia, Trotta. Legumina, & potissimum faba, cicer, & pisa, capæ cotæ, tubera terræ, oryza ex lacte, ostreacea. Mitto gallorum testes, pistacia, erucam, hominum, satyri rad. crocum & cætera aromata, ut calida nimis, casu nostro. Vinum sit mediocre & sub-stypticum. Sic somno potius indulgendum, quam vigiliis. Consuetæ exercitia non omittenda, Venus aliquando, sed raro usurpanda, cum abstinencia torpidos reddat. Cæterum alacri ac præsentis animo vivat.

Quod si jam dictis non cedat affectus, mense Junio proxime futuro, sanguis ex Jecoraria semel, aut partitis vicibus educendus, totum pro usu expurgandum; & primis fusi diebus, Nob. Pat. ad aquas vitriolatas assumendus se conferat, aut Engaddinæ Sancti. Mauriti aut Vallis, Sohis, in Agro Tridentino; etenim si Aquæ Matini, quæ nitro, ferro & sulphure constant, jam opem tulerunt, multo magis id illæ præstare poterunt; cum & ad contemperanda viscera ac pudenda, & quam maxime eadem roboranda, egi egium sit hoc medicamentum. Infeilus quoque in inde fieri poterunt, balnei vice, ita ut pudenda in ipsis immergantur, vel spongia isdem aquis imbuta illis applicetur. Et licet earum vis quam facillime evanescat, ac resolvatur; tepidas tamen extrinsecus illas admittat Nob. Pat. cui à Summo Deo optatum finem precor. *idem ibidem.*

Penis difficilis Erectio, Arenularum Mictio, & Imminuta Visio.

Illustriss. & Exc. Marchio, 29. annum ægens, temperamenti secundum totum, & potissimum secundum caput, calidi & humidi, habitus carnosus, rosei coloris, longis itineribus, & violentis exercitiis assuetus, vel ante ipsam pubertatem in coitum valde proclivis, atque adeo 13. ætate anno Uxori addictus, gonorrhœam isdem teneris annis passus fuit (cui Excellent. ejusdem Parentis frequenter obnoxius fuerat) ex consuetudine cum alienis mulieribus, totam etiam gallico infectis; cui & in humido carcere menses conclusio contigit capillorum desuam, um aliquo capitis dolore; licet solutus rursus capillus evaserit; & cum Romæ commoratus esset, nitro: statim copioso sanguine, nigro & limbo, sudore uberiori, à validis motibus manante, omnino convalescit. Verum proxime superioribus annis, de penis debilitate, aut difficili erectione, & aliquando de seminis in ipso coitu suppressione conqueri coepit; & præterea

de arenularum in urina subsidentium mictum cum aliquo spinalis medullæ dolore, qui tamen à corporis motu remitteret. Quibus adhaerens perdurantibus, visioni difficultas accessit, in oculo sinistro; dum enim diutius legit, aut scribit attentius, oborta lacryma turbatur visio, ut desistere cogatur, cuius causa dextero oculo fere omnino orbatum te cognovit. Modo de agendis levaminis causa consult.

triplici affectu molestanti Illustriss. & Excell. Juvenem, ex enarratis colligimus. Penis scilicet flacciditate respectiva, cum seminis quandoque in coitu suppressione. Secundo arenularum mictione. Et tertio visione fere abolita in dextero, & imminuta atque turbata in sinistro oculo. Et primo quidem penis erectionem imminuit in quod attinet, hanc à vitio instrumenti, partium videlicet genitalium, necnon facultatis in eodem insidentis, procedere credimus, si præterita & præsentia consideremus; etenim partes genitales ex paterna hereditate debiles, primo à præmature & immoderato coitu, mox & à longis itineribus, atque validis exercitiis laxitatem facile contrahere potuerunt, unde penis flacciditas, cui accedit & vitium facultatis, tum determinatæ, tum communis imaginationis scilicet. quæ sicut ab objecto novo, valde delectabili magis magisque ad venereis accenditur, ac proinde promptior evadit penis erectio; ita ab objecto familiari, & consueto minus concitatur, & penis flaccidior, ut, determinatæ vero, ob defectum spirituum, non qui non generentur, hoc temperamento calido & humido, ac juvenili ætate; sed quia ab illarum partium immodico calore præternaturaliter dissolvuntur ac dissipantur; nec sperantes adeo facile excitentur à parte, non quidem frigida intemperie (hirsuta enim est, & exuperanti calore prædita) verum laxitate laborante; quarum causarum alterutram conieci quoque solet nonnunquam ejaculandi seminis difficultas.

Hinc autem vasorum seminalium inbecillitati hereditariæ facie necessit gonorrhœa, accedente immoderato, & totum violento coitu, à quo tamen liberari potuit copiosa sanguinis missione, statim Romæ facta, & copiosis sudoribus, à validis motibus sollicitatis.

Arenulæ secundo loco considerandæ veniunt, quibus procreandis, sicuti causam materiale à capite, & ventriculo ad renes decumbere credendum; atque efficientem, eorundem scilicet. ætatem, ipsi inesse, ita ad calculi procreatio, nem causam sine qua non, malam videlicet tum ipsorum renum, tum vasorum conformationem considerari sperare juvat.

Visio tandem valde imminuta & turbata pendenda, quæ in oculo dextero jam commutata, abique ullo evidenti vitio in tunicis aut humoribus oculi, ab intercluso spiritu non induratum habuisse existimamus, semihabituæ sive dentatis optici nervis, à catarrhali materia in humido capite genita, illucque transmissa, in oculo vero sinistro, visio in ipso intuitu turbatur, atenui catarrhali materia, quæ à capite extra cranium, per pericranium, extra acuatam, ad oculum descendit, & visionem turbat, quousque facta ejusdem materia expressione, per oculi angulum, lacrymæ specie colligitur.

cujus portio aliquando per musculorum spatia, vel parietes spinalis medullæ delabens, lumborum dolores excitavit, motibus corporis evanescentes, eadem materia à calore resoluta.

Præsens ad Venerem ignavia, hac juvenili ætate licet eo nondum progressa sit, ut speciei detrimento esse possit; verendum tamen ne brevi temporis spatio calore magis invalescente, ad impotentiam perducatur, quæ ideo nec in præsens negligenda, sed ut signum quoque consideranda; calor enim ille, qui spiritus dissolvit, arenulas quoque procreat; quæ glutinoso humore accedente, diutius conclusæ, conglobari & in calculos cogi poterunt. Visio quinetiam imminuta, magnificienda; etenim cum oculi dextri curationem vix admittere possit, nos omnino sollicitat ut oculi sinistri, dextero validioris, curam suscipiamus. Quibus jam dictis curationem infra proponendam, quam maxime profuturam, speramus.

Totum itaque per partes, & caput evacuandum: Renum, & jecoris calor contemperandus; vasa seminalia roboranda; & capiti, prout hoc tempore licuerit, omni conatu corroboratio concilianda.

In Chirurgico itaque fonte, sanguinis missionem omnino necessariam, ex Jecoraria censemus medico præsentem; si enim niger effluerit, ex altero brachio repetenda fuerit, eo parcius prima vice, educito. Cauterium brachio, jussu Exc. Pat. inurendum subjiciemus. Frequentes circa dorsum & occiput frictiones commendamus, ut fluxio ab oculis revocetur.

Ex Pharmaceutico desumenda sunt Lenientia, præparantia, purgantia, alterantia, & roborantia. leniens erit syr. ros. sol. cum lenit. Vel potio ex manna clarif. vel elect. lenit. cum tart. Primum præparans, mel ros. simpl. cum julap. acet. cortic. citri aromatiz. ad ℥iii. quinque diebus sine diluto; mox attenuati humores eodem modo quo supra evacuandi. Secunda præparatio, hoc anni tempore perficietur succis syruporum loco, ad ℥iii. cich. nempe depur. & borrag. quibus, si sanguis extractus niger fuerit, addatur quoque succus fumar. sin minus, acetosæ, in decoct. cich. borrag. end. acet. viol. nenuph. & septem post diebus, præbeatur purgans ex infus. rhab. agar. & fennz, addito syr. ros. sol. & elect. de succo rosarum. vel elect. dialebesten, cum scammi. & de succo rosar. superhausto ser. depur. ad lb ii. His peractis, si sanguis educitus niger fuerit, præbeatur tribus aut quatuor vicibus, tertio aut quarto quoque die, decoct. epith. Mes. ad ℥ vi cum ser. depur. intermediis vero diebus exhibeantur succi depur. superius præscripti. Quod si sanguis niger non apparuerit, loco decoct. epith. exhibeantur pil. totum & caput purgantes, aggreg. cum aureis, hausto semper ab his sero depur. capr. aut asin. Atque interim masticatoria parentur, ex maltiche, pulvere fœniculi & cera.

Ita toto & capite expurgatis, alterantia erunt usurpanda, ad contemperandum Jecoris, & Renum fervorem; in quem finem, succi depur. cich. acet. opportunissimi fuerint. Quod si succum cich. ut amarum respuat Exc. Pat. illi substituat succus end. viol. nenuph. Interim, adventante tempore opportuno, in corroborantibus auxi-

liis, casu nostro, principem locum obtinebunt Aquæ Thermales Vitriolatæ, in Valle Solis Agri Tridentini, quæ præterquam quod genitales partes roborare, renes quoque emundare, calorem quinetiam contemperate poterunt, absque ulla ventriculi noxa.

Capitis quinetiam abstersiones quotidie adhibendæ, à peccinatione, spongia prius imbuta infusione ligni visci quercini & rosinarum in vino albo, mox expressa & exsiccata. Erunt quoque ex usu capitis aspersiones, sub somni tempus, pulv. ros. rubr. cornu cervini, majoranæ & Ireos. Conservæ quoque eodem tempore in usum revocentur, quandoque rosarum, quandoque vero betonicæ, aut euphrasie.

Et victus ratio jam dictis proportionem respondeat. Vinum autem paretur medicatum euphrasie & santalo. Quæ omnia à summo Deo, Nob. Juvenis salutaria precamur. *Idem ibidem.*

Vasorum Seminalium Imbecillitas.

Vir Illustrissimus annorum 30. calidioris & siccioris temperamenti, biliosi scil. prædominio, & subdominio melancholici, alias robusti & hirsuti corporis, multis abhinc annis aulicæ vitæ addictus, quæ in rebus nonnaturalibus, præsertim potibus frigidissimis, comestationibus, exercitiis violentissimis, ut ludo pilæ, equitationibus, Venereis congressibus, plurimos commisit errores, tribus abhinc mensibus incidit in febrem biliosam, tertianam duplicem continuam, non tamen exquisitam, cum symptomatibus ab ea non alienis, ut sit magna, dolore capitis, animi deliquis; à qua tamen, facta humoris biliosi præparatione, obstructionum reseratione, & educatione materiæ peccantis, non omisis cordialibus, & quæ symptomata reprimere possent, adhibita quinetiam exacta victus ratione, feliciter convaleuit. Quia tamen sanitate, auro multo pretiosiori, diutius frui deliderat; ideo expetit normam, quæ ab his & hujusmodi morbis in posterum præservari possit. Hic autem, juvenili flore ætate, decennio abhinc, temperamento stimulantem, nimium indulgit Veneri, ita ut virulentam contraxerit gonorrhœam, prout alioquin fieri solet, cum turgine & ardore urinz, nec tamen exercitia valida prætermisit, quæ licet annum perduraverit ab ea tamen utcumque sanatus est, permanentibus tamen capillamentis quandoque, quæ subinde cum ardore urinz, præsertim dum à Venere abstinet; modo tamen absque dolore prodeunt. Urina insuper, natura stimulante, diutius contineri non potuit, quinimo paucis abhinc mensibus eadem sat segnitè & cunctanter, absque impetu, mori senum effluxit. Observatione quoque dignum est quod à biennio, post sanatam gonorrhœam, sub finem emissionis urinz, duæ aut tres guttule seminis aliquando, primo subrufæ, mox & albicantes, modo albuminis ovi similes, cum titillatione emanarunt. Hic vero fluxus, pro exercitii modo magis vel minus violenti ratione, crebrius vel rarius recurrit, nec nili octo abhinc mensibus derepente cessavit, nisi quod in urina, anno abhinc cum dimidio circiter, prout & illius Parentibus contigit aliqua apparent vestigia. Et licet enarrata mala patientem

tem in vitæ muneribus obeundis non tantum infellent: nihilominus cum uxorem habeat iuvenem, boni temperamenti, & integra sanitate gaudentem, nulla tamen prole beatus, prudentissimum tuum consilium illustrat. Vir enim efflagitat.

Historiam accuratam status Viri Nobiliss. à doctissimo Viro nobis enarrata, tum individuum, tum speciem spectate, ac probe utriusque curationem à nobis exposcere videmus: licet, bona valetudine Nobilissimo Viro comparata, speciei quoque à nobis prospectum fore iure speremus; siquidem Viro, non vero Mulieri, utpote quæ jam concepit, sterilitatem imputandam censuimus.

Fuit autem Nob. Vir temperamento totius & jecoris juto calidiori atque sicciori à natura præditus, quod semper in dies ab erroribus, in comotationibus, violentis corporis motibus, equitationibus, venericisque congressibus, & convivis majus majusque augmentum luccepit; adeoque ad bilis generationem aptissimum, biliosis quoque febribus obnoxium, & ob exultionem ab insigni calore, ad melancholiam quoque primum eundem reddidit; quam tamen adulationem in sanguine à tabo Cælico nec impressam, nec adhaerentem fuisse credimus ex gonorrhœa, quæ olim laboravit, quoniam viri vasa spermatica transgressum non esse, nec ad jecur, nihilque ad massam sanguineam pervasisse, sed in illam hæsisse existimamus, quæ spatio mensum, imò integri anni ad nihilum redacta, cum semine ipso, foras ab irritata expultrice detrusa fuit. Verum quoniam tunc temporis liberaliori ac intemperanti vivendi rationi indulgere non destitit, quæ & immoderatum viscerum calorem fovere, & cruditates accumulare potuit; hinc primo à durissima gonorrhœa laxatis vasis seminalibus, & imbecillitate inducta, seminis guttula statim in mictione multo tempore post sanam gonorrhœam ipsam, observata fuerunt, copiose quidem, & frequentiores post validiora exercitia (laxatæ retentricis, non amplius, ut ab initio, irritatæ expultricis indicio) quæ tamen tandem suppressæ sunt omnino, ut propterea secundo ob eandem dorsali, ac renali partium imbecillitatem, cruditatum portio, à ventriculo, jecore, & forsitan etiam à toto, per emulgentes transmissa, & à renibus suscepta ac superflua, capillamentorum specie, cum ardoris sensu, una cum urina ipsa excreta sit: adeoque urina stranguitior non nephritice fuerunt, sed alia pro aliis, ex Hipp. dum (addidit Gal.) totum corpus per urinam expurgatum est; in quod vitium facilius prolabi potuit Nob. Vir, quoniam diathesin, & imbecillitatem illarum partium hereditariam à Parentibus contraxit.

Ex quibus facile patet, semen Viri Nobil. ex impuro & fervido sanguine productum, nec perfecte, ob illarum partium laxitatem atque imbecillitatem elaboratum, sterilitatis causam esse. Unde narrat Hipp. de Aëre, Aquis, & Loc. Scytharum gentem, ob laxitatem, ex continua equitatione contractam, secundam fuisse; atque adeo cum triplici ratione à Viro contingere possit sterilitas, nimirum ex testibus, pene, & semine, nec ulla in testibus, aut pene labe observetur; in semine vero eadem sit ma-

nifesta, ab hoc vitiato procedere statuendum, si enim, ut consideravit Arist. agricola puriora grana pro semine colligunt, & sedulo eligunt, quid nobis agendum in humana propagatione? Quamquam nos non latet sterilitatem iere ab omnibus in mulieris vitium rejici, cum vir sola seminis ejaculatione egeat; mulieri vero seminis emissionem, sanguinis menstrui suba-mistationem, & laudabili uteri constitutione opus sit.

Status Nob. hujus Viri jure merito salubrior desideratur, cum enim gonorrhœa sit proprie instrumentorum seminis, non vero pudendorum affectio, illa ideo laxata hoc perfectum atque promiscuum reddere minime possunt. potissimum ex improbo sanguine. Quare, sicut in præsens dehit propagatio, ita Nobiliss. Viri corpus neutrum agnitudinibus opportunum atque obnoxium semper habendum erit.

Quæ incommoda ut auferantur atque arceantur, totum corpus expurgandum; massa sanguinea purificanda; jecoris & vasorum cæca intemperies corrigenda; vasaque seminalia roboranda. Quæ i. plenda remediis Chirurgicis, Pharmaceuticis, & Diæticis.

In Chirurgia repetita ex utroque brachio sanguinis nullo ex u. u. omnino luerit.

A Pharmacia vero desumenda Lenientia, Præparantia, Purgantia, intemperiem Corrigentia, & vasa seminalia Roborantia. Lenientia esse poterunt, man. clarif. vel syrup. ros. sol. cum man. vel cal. cum lenit. & tart. ro. Primum præpar. sit julap. acetos. aromatizat. cinnam. ad ʒiii. cui addatur pulvis tenuissimus crem. tart. ad ʒiij. repetendum quotidie, quinque dies. Mox leniens supra propositum rursus præferendum. Inde ad validiora præparantia deveniendum, non mellita, nec saccharata, utpote quæ bilem facile & viscera insent. Quare succi herbarum depurati præferri poterunt.

Ut. ʒi. Suc. depur. cichor. borrag. end. an. ʒi. Decoctionis cichor. borrag. end. viol. plantag. ʒvi. m. pro syr. & sic. pro aliis decem. Aquibus succedat talis expurgatio.

ʒi. Rhab. opt. agar. troch. fol. sennæ mund. an. ʒii. cinnamomi integ. ʒi. f. aq. cichor. q. f. m. f. int. per horas xii. deinde facta forti expressione, colaturæ adde syr. ros. sol. ʒv. m. f. p. & tribus horis ab ea bibat feri capr. depur. lb. ii. & duabus horis ab eo prandeat; vel bolo. sumat elect. lenit. cum di. cath. & de succo ros. sero pariter superhausto. Hac peracta expurgatione, ut totius sanguis purificetur, decoct. epith. Mel. assumat Nob. Vir tribus saltem vicibus, quarto quoque die hac, hac formula.

ʒi. decoct. epith. Mel. ʒvi. aquæ florum citri parum m. pro potu, & incepta evacuatione. superbibat serum depur. ad lb. ii. duabus vero horis ab eo prandeat, & duobus intermediis diebus, sumat syrupum hujusmodi, sanguinem emundantem.

ʒi. Succ. cich. depurati, fumar. an. ʒi. decoct. cich. borrag. end. acet. beton. fumar. agrim. ʒv. m. pro syrup. & sic. pro aliis. Toto expurgato & emundato sanguine, jecoris & vasorum fervor fuerit contemperandus, & vasa seminalia roboranda. utrumque vero præstare poterunt aquæ Therm. aciculæ. in Valle Solis Agri Tridentini scaturientes, vitriolata; prærogativa enim sunt prædictæ singulari, tum viscera

nes insurgunt, hypochondriacam affectionem, melancholicam reddentes: quæ semper sit vitiata in aliqua parte ipsi sanguine; & ideo Aristot. dicebat prudentiam in probi sanguine consistere, quod ab Hippoc. desumpserat, docente, quod probus sanguis secundum magnam partem conuertit ad Prudentiam atque Sapientiam; à quo in hypochondriis vitiato existente, vitiati quoque spiritus produciuntur, qui una cum exhalationibus per vasa, per venas scilicet ad cor elevati, inde per arterias carotidas ad ipsum cerebrum, spiritus animales, opacitate cum Averroë, & nigredine cum Gal. inncentes atque obtenebrantes, sicque imaginationem ipsam depravautes, timores de non timendis incutiunt, & mœrores afferunt sine ulla manifesta causa, adeo ut quandoque Patientem illustriss. non solum ad solitudines, verum etiam ad luctuosa suspiria & fletus duxerint. Et quoniam melancholicæ exhalationis proprium est spiritus crassefacere & torpidos reddere, ut innuebat Hippoc. dum dicebat, quod si aliqua pars corporis stupore elanguet, tale est melancholicum signum; ideo mirandum non est, si torpentibus quoque spiritibus, erectioni penis inservientibus, torpeat ipsa Venus, quæ sine ulla animi distractione & cum hilaritate exerceri debet; eoque magis languet, cum stupor & torpore ipsa non à sola crassitie, sed ut ego reor, ab aliqua frigida conditione privativa procedat. Non tamen ejusmodi conditionis est semen ipsum, quod ut acre & mordax, expultricem facultatem ipsam ad sui expulsionem irritat, & etiam cum debili penis erectione in somno pollutiones inducit, non sine ventriculi & totius corporis noxa.

Affectus iste quamvis ratione diuturnitatis confirmatus, imò & in habitum conversus videatur, non tamen ita se habet ratione causarum; obstructions enim sunt quidam exiccata, ac viscera, sine tumore, medicamentorum refrigerantium & humectantium ope servata suere: ut ideo salutis spes nobis super sit, præsertim in hac florida ætate, dummodo præceptis medicis constantè obsequens sit: Melancholicorum enim inconstancia sæpe constantis & perseverantis hujus affectionis in causa est: cum tamen non nisi diuturno Alterantium & Aperientium usu, & repetitis Purgationibus affectus hujusmodi tolli possit.

Et quoniam dixi geminas habere radices, calidam scilicet & siccam intemperiem, atque viscerum obstructions, primo morbus organicus, nempe obstructions, sunt referenda, quod præstare non potest hoc autumnale tempus; mox intemperiebus remittendis Vere venturo & Æstate erit incumbendum. Ut igitur primum intentum obtineamus, primæ viæ sunt expianda. Secundo Obstructions in mesenterio firmata & exiccata, sunt aperienda. Tertio quæ in jecore & pancreate reperiuntur, referenda. Quarto Massa sanguinea parumper depuranda. Quinto Calor quoque non nihil contemperandus, totumque corpus renutriendum.

Pro prima explenda intentione, repetitum Leniens necessarium erit ex syr. ros. solut. aut ex flore cassiæ cum electuario lenitivo, quibus superbibat us, aut malva, aut hordeo alteratum. Intermediis vero quinque aut sex diebus sum-

mo mane assumat Preparans ex julapio acet. corticibus citri alterato, & exigua aqua florum citri dissoluto.

Pro secunda intentione, subsequenti mane assumat jus pullæ Cichoraceis alter. cum, additis foliis malvæ, melissæ & petroselin. in quo dissolvantur gr. xii. solis tart. fixi. sequenti vero die præscribantur boli ita parandi.

℞. Flor. cass. rec. extr. 3. ii. rhabarbari maturi ʒ. j. m. t. boli, quibus post horam superbibat jus superscriptum, sed sine sale tartari, duabus vero vel tribus horis ab assumpto jure prandeat. Tertia die repetat jus cum sale, & ita saltem xx. diebus perseveret, alternatim sumendo jus cum sale, & cassiam cum rhabarbaro. Interim primis diebus aperiatur Jecoraria, & parce sanguis educatur ad sanguinis eventationem & expulsionem. Terminatis autem viginti diebus jam dictis, præscribatur Minorativum ex syr. ros. cum infusione senæ & rhabarb. Vel, melius ex flore cassiæ cum pilula de tribus cum rhabarb. quibus superbibat serum asinin. depurat. ad lb. j. ʒ. vel 2.

Inde ad tertiam & quartam intentionem explendam, opportunissima erit rhabarbari infusio & tinctura chalybis, aut crocus Martis aperitivus, talem in modum.

℞. Succ. cichor. depur. ʒ. ii. decoct. in jure tenui parata borag. endiv. malvæ, sonchi, pentaph. agrim. rad. graminis ʒ. v. tincturæ Martis aperitivæ ʒ. j. aut croci Martis aperit. gr. v. m. prosyr. matutino cui addi quoque poterit portio succi limonum vel syrupi de succo limonum, ad gustum Patientis. Sequenti vero mane.

℞. Rhabarb. maturi incisi, fol. senæ n. und. an. 3. j. aq. stillat. de succo cich. ʒ. vi. succi limon. ʒ. j. aq. cinnam. cochlear j. m. t. inf. per noctem, & mane facta colatura, haurienda præbeatur quatuor horis ante cibum; in quo rum alternato usu est perseverandum ad vigesimum usque diem; quo tempore hos cassiæ, ut supra, cum pilula de tribus offerri poterit, cui superbibat seri depur. libras. Toto vero hoc tempore, post primarum viarum expiationem, abdomen totum est quotidie inungendum ita.

℞. Ungu. malv. buryri rec. ol. amygdal. an. ʒ. j. m. reform. ad ignem; præterea universum corpus quotidie oleo amygdal. rec. illinitur.

Pro postrema intentione, quoniam lac naturale hoc anni tempore non adeo probum & boni succi esse potest, patetur ita arte factum.

℞. Sem. melon. mundat. ʒ. j. sem. cucurbitæ mundat. ʒ. ʒ. amygdal. dulc. mundat. n. xx. m. contund. & cum jure pullæ aut vituli extrahatur Emulsio, cui addatur sacchari albiissimi cochlear, & assumatur quotidie summo mane quatuor horis ante prandium per mensem: etenim hypochondriorum calorem contemperare, sanguinem edulcorare, & totum corpus quodammodo nutrire valebit.

Hæc in præsens; quibus Vere venturo forsitan addi poterit Acidularum usus, sed certe lassis asinini, & postea caprini: necnon Balneum aquæ dulcis, herbis refrigerantibus & humectantibus alteratum.

Et interim congrua vivendi ratio à Doctiss. omni Viro Adstanti erit præscribenda, quam ego

quoque ut Illustrissimo Patienti melancholico morem geram, paucis attingam. Et primo, degat in aere, neque montano, neque palustri: ille namque nimis exiccat, iste spiritus increasat, & officit nutritioni: dormiat vero in cubiculo, ad Orientem vel Meridiem posito. Secundo, quoad alimenta, inter carnes, abstineat à suilla, leporina, bubula, & volucrum aquatiliū, ab extremitatibus animalium, ut à capite, pedibus vituli. Inter pisces, caveat à glutinosis, lutosis & squamis carentibus, ut anguilla, tinca, &c. à Conchyliis & Ostreaceis; à piscibus & carnibus sale aut muria conditis. Inter lacticia, caveat ab ulcasei; ab edulis ex pasta paratis, delicatioribus quibusdam exceptis. A leguminibus omnibus, excipiendo orizā & hordeum. Inter fructus, conceduntur fraga, pepones; poma, pyra & perlica cocta. Inter olera, prohibetur brassica, præsertim valde cocta; item caphanus, frequens usus apii & fœniculi, & prorsus tungi ac tubera terræ. Ex condimentis, abstineat ab acidis, ut ab aceto, succo agreste, arantiorum, citri & limonum: à calidioribus, ut ab aromatibus, cinnamomo & pipere ruditer confuso exceptis; pariter a condimento allii, caparum & Laridi suilli. Potus sit vinum tenuis substantiæ, non dulce, non acerbum, sed maturum, nec saxosum, aut argillosum. In prima mensa prandii de ore bibbat jusculum boragine aut endivia alteratum: & intercedant horæ decem inter prandium & pricam cœnam. Tertio Somnus nocturnus sit diurnus, diurnus vero brevis, aut nullus. Quātō Exercitium utile erit moderatum, sed ante cibum: Labores enim ante cibum, dicebat, Hippocrates. Quātō Venus hoc tempore ableganda, vel saltem raro amplexanda; & ad pollutiones evitandas, sub ingressum lecti illuminatur reum regio unguento rosæ. Menses, succo sempervivireformato, & aceto rosato asperso. Alvus autem lubrica servanda, & flore castæ ad 3 ii. vel iij. si opus fuerit, quandoque sollicitanda. Ultimo, Animi passiones, alterationes & perturbationes, quantum fieri potest subterfugiat: sicut & intensas applicationes; seipsum vero, etiam invita inclinatione, ad solatis, ad geniales, & confidentes conversationes convertat, & alacri atque confidenti animo vivat. *Idem T. 2. Centur. 3.*

Penis flacciditas cum Affectione Hypochondrisca &c.

Nobiliss. D. N. annos circiter 34. natus, jam à primis vitæ annis temperamentum habuit ad melancholicum inclinans; solitudinis fuit amans & maximæ appetentiæ. Præterea ex quo studiis incumbere cepit, in iis noctes insonnes non semel transegit: ac in aliis pluribus non parum erravit, unde non mirum si is acor conciliatus sit sanguini à nativitate prædisposito, qui vigilias à multis annis molestas, imo dolores vagos in toto corpore; ac præcipue in imo ventre & lumbis, cum ponderis quadam sensatione, & urinari ardore, procreaverit: Illa enim omnia sero acriori salibusque quam maximè imprægnato, tum in vias urinarias, sibi familiares & ordinarias, tum etiam in intestina, mesenterium, mûculos varios, eorundemque membranas, effuso,

merito adscribenda veniunt. Dum interim Nob. Pat. quandoque se hernia laborare, aut ad eam maxime pronum esse (propter pondus, scilicet, quod ab ingurgitatis cibis, flatuumque inde enatorum circa inguina, supraque ipsius os pubis, pressione perleatit) arbitratus est; ac propterea subligaculum ab aliquo e nostris Chirurgis accepit, quod demum errore detecto abiecit. Quandoque propter urinæ ardores (quumvis nunquam sane atroces, & nocui tantum vexantes) se vesicæ calculo affligi opinatus est, ac propterea specilli exploratorii, seu cateteris in vesicam intrusionem non semel sustinuit, quo nihil prorsus, ut ipsi sæpius significaram, præter mucolum quid repertum est. Verum quod ipsum præcipue & merito anxium habet, est quædam ad venerem impotentia, unde se matrimonio, ad quod ab aliquot sollicitatur annis, inhabilem videt. Non sanè quod testiculi, vesiculæ seminales, aut prostata, multum peccare deprehendantur; semen enim abunde conficitur & colligitur, ut patet ex frequentioribus nocturnis pollutionibus, illiusque etiam ad minimum manustractionem promptis effusionibus. Sed præterquam quod partium generationi intervenit, tum à sinistris debilitatem aliquam indicant pilorum in scroto & pube, præcipue hoc in latere, à pluribus jam annis effluxum, testiculique sinistri flacciditas quæpiam; penis seu per pendulus est, nec unquam satis erigitur, imo & erectio, si quandoque adveniat, & admodum imperfecta, & tantum momentanea est, cum interim membrum illud in omnib. sui partibus satis bene conformatum, ac firmioris etiam structuræ, magnitudinisque naturalis, appareat, nec tam dehecere videatur erectio verpi fabricæ vitio, quam potius liquorū in illum influentium culpa; si. il. vel quod sanguini ad cellulas corporum spongiosorum via non sit satis expedita, vel quod mûculi ad radicem penis positi illum valide satis non contringant, aut dum id quod ab arteriis advectum liberè per venas non refluit, partem pro tempore repleat, vel quod liquoris demum alicuius spirituosioris, ac volatilioris, sanguini contenti ad turgescentiā partis rarefaciēdo, destinato unde cunque tandem advenientis, appulsus præpeditur. Accusat Nob. Dom. succussiones quas ab equo impetuosius exiliente ac cursitante per duas ferme horas sustinuit in itinere quod jam à 15. annis in Germaniam habuit: Ab hinc liquidem, in testiculo sinistro, & ejusdem lateris semore, ponderis gravantis quædam sensatio semper persistit, quæ cum debilitate descripta (antea enim in arrectione partis mascule se habebat) ea in dies incrementa sumpsit, quæ post aliquot demum annos ipsum ad auxilia Medica confugere coegerint. Non ausim pronunciare an ejusmodi succussiones vim fecerint fibræ mûs ulorum penem constringentium; an vero illuc tantum evocarint aliquid succi melancholici, quo frenum quasi injectum sit spiritibus continuo accurrentibus; an denique idem succus stypticitate ac teretilitate sua, obstructions, & constrictiones meatuum, tum qui spiritus in mûculos, tum qui sanguinem in cellulas corporum penis spongiosorum deducunt, fecerit. Hoc tantum adjiciendum habeo, sc. erectionis defectui hic non parum facere maximam seminis acrimoniam, ac fluxilitatem, à sero, ut mox dictum, peccante, propter partium seccantiā

tum unde quaque demum conquiritam debilitatem, copiosius admulto, inductam, imo sphincterum orincis per quæ semen à vesiculis suis ad urethrae radicem eructatur adpositorum, laxiorem texturam. Sic enim seminalis materia viis proprio vitio facillioribus, pro egressu sibi referendis semper ita prompta est, ut sapius ad primum puella amata contactum effluerit, non concessio erectionis necessario tempore. Varia in pertinacis morbi medelam adhibita sunt remedia, tum interna, tum externa, nullo tamen cum fructu; quin immo debilitas in dies incremenda capescere videtur jamque dolores non tantum femorum, hypogastrii & lumborum, sed etiam omnium prope artuum sibi socios facere cum multa lassitudine: subsistente interim appetentia, seu potius voracitate quadam. In re tam difficili, Viros Præclarissimos ac Famigeratissimos, ad quos dimittetur ejus hystoria, obnixè rogamus humaniter nobis accurrere non graventur, quidque de morbi natura, causis, prognosi & remediis sentiant, explicare non dedignentur. Scribebat Genevæ Auj. 1693. Joh. Jac. Manger M. D.

Super casu proposito Consilium Medicum Præclarissimæ Viri D. Joh. Jacob. Wepfferi Medici Scapphusiani longè Celeberrimi.

Ob quatuor præcipue affectus Nob. D. Ager de sua valetudine sollicitus est, & opem Medicam postulat. 1. Mictio quædam dolorifica, quæ jam ab aliquot annis durat: in hujus mictionis principio dolet circa radicem virgæ, seu sub finem colli vesicæ, insuper crebro ad illam stimulat, adeo ut in una nocte quandoque 30. vicibus ad urinam emittendam urgeretur, rarius interdiu: pridem cum ardore magno in Hollandia minxit, imo dysuria hæc ibi aliquando in stranguriam degeneravit; aliquando etiam in primo paroxysmo tertianæ cujusdam ischuriam passus est. Ob hoc mictionis vitium diutius perseverans de calculo vesicæ latente suspicio oborta est, quam obrem etiam explorationem per catheterem admisit. Suspicionem hanc subinde adhuc fovent, molestia quædam ante mictionem in hypogastrio, utroque inguine ad os coccygis usque ob quam ad promovendam & facilitandam mictionem palma hypogastrium premit, & noctu in genua decumbens urinam emittit; deinde descensus ponderis cujusdam ab umbilico ad os pubis & radicem penis: Verum dum nobiscum erat diligenter omnibus observatis, tum ratione modi mictionis, tum urinæ, vesicam à calculo & ulcere, hucusque immunem credere potui, nam iterato vidi illum sine forti usu, citra ruborem faciei, dentium & manuum constrictionem, & quasi calcitrationem pedum, urinam libere, siue interruptione, aut interceptione intermedia, crasso late filo non in ramos divisam emississe; & finita mictione non ulterius ad mictionem coactum fuisse; quorum tamen omnium contrarium in calculo, aut ulcere vesicæ affectis nimium quam aperte observatur, saneque magis in fine quam principio mictionis affliguntur. Urinæ omnes à 11. ad 25. Januar. erant clare, perspicue, subflavæ, in una patum mucii, sed pellucidi subsidit, qui virgulto adherens in filum trahebatur: Non crassus turbidus, instar tereti inethinæ viscidus, pertinaciter matula adherens. Nunquam cruenta minxit, nisi semel post catheterem violentius

& imperite intrusum, nam inde valde doluit & virga intumuit. Ipsemet profunde, dum nobiscum erat, intra collum vesicæ immisi sine dolore citra urinæ immutationem, nec quicquam alieni, vel in vesica vel in urethra deprehendi. In perinao siue illo stante, siue decumbente, ullam duritiem, aut tumorem iterata exploratione inveni, quin etiam, fortissimum attractum & compressionem pertulit. Molestiam illam mictionem præcedentem & sensum ponderis ad os pubis & ulterius procedens, facientem, existimo effectum esse diuturnæ dysuriæ, ob quam muscutorum abdominis contractione validiore, & ejus compressione palma urinam promovens intellina profundius in pelvim adegit; plerumque flatibus in hypogastrio valde diuturno, in primis post partum; forte subligaculum ferreum cum pulvillis subjectis huc quoque symbolum contulit. Calculum è renibus ad vesicam unquam descendisse non verosimile est, quia nullum unquam paroxysmum nephriticum, ut retulit, passus est. Dolores dorfi, de quibus hic etiam querebatur, qui quandoque ad intercapulum ascendunt, & ad os sacrum & coccygis usque descendunt, non sunt in renum regione, sed secundum spinam dorfi potissimum afficiunt. Ischuriam in paroxysmo febrili obortam, nullo modo calculo siue vesicæ siue renali adscribere possum, quia tollebatur lan. succida & demulcentibus internis, nec unquam vel in illa febre vel post eam redit, Dysuriæ causam proximam quam in collo vesicæ & sub illo in regione prostatica & principio urethrae, ob quam crebrius ad mictionem stimulat & in principio mictionis dolet, hucusque existimo esse denudationem. Per denudationem intelligo talem harum partium constitutionem in qua non sufficienter mucosuo naturali munitæ sunt contra urinæ & seminis acrimoniam. Illud quasi absterlum fuisse existimo à salugine nimia urinæ & acrimonia seminis. Urinæ acrimoniam vel maxime in ulpandam huc esse propterea existimo, quia dysuria hæc autè 8. annos potissimum in Hollandia incepit, ubi insolito victu, scil. cibis salitis & fumo induratis per 15. mentes fruebatur; præterea ibi abusus est spir. vin. & tinct. cinnaui. Urinam & ipsum etiam semen acrimonia imbuta esse plurima testantur; quorum quædam dum D. Ager nobiscum erat rescivi: nam post ablactationem, a teneris unguiculis, cibabatur ovis, carne ovilla, artocreis; in tenebris hac ætate etiam vinum concedebatur: sterculosus evasit: nunc læditur à Chiocollata, decocto Coffee aliisque paulo calidioribus: facilius perfert frigida: abusus est saccharatis: sol & hypocausta ipsi nocent: frequenter patitur pruritus sub oculis in facie: S. Galli pulvinari pennis infarcto noctu incumbens tinea quadam correptus fuit: ante biennetie correptus cardialgia quadam, illa mitigata dolorem per totum pectus omnesque artus expertus est ac si cultris sauciaretur: forte etiam dolores dorfi & utriusque lateris amines effectus sunt seri acrioris. Seri & urinæ acrimonia magis innotescet, si seorsim in cochleari ad siccitatem inspissentur super prunis, aut cercola subtus posita nam licet sal volatile evanescat cum fumo, manebit tamen sal acerrimum in corpore exsiccatum.

II. Est hernia, cujus causa Nob. D. Agerum non parum angit testatur subligaculum terneum cum

penforio quod jam ab an. 1684. gestat. Metus huius mali post equitationem infelicem incussus fuit. Parisiis anno 1684. suggereretur illum illum cistocolem pati, an vere anve dolose nescio. Certe dum nobiscum erat, & postquam subligaculo deposito per plures horas obambularat, tussierat, retento spiritu intellina deorsum trulerat, nec bubonocoles, nec cirioceles, vel minimum velligium apparuit. In sinistro latere nec visu, nec tactu, vasa præparantia, nec tumidiora, nec magis irretita & varicosa esse, quam in dextro, vel alias sanissimo, deprehendere valuisse legitimum magnitudinem ab egressu ex abdomine, in progressu & circa paratitas habuisse tactu comperi. Legitima moles & forma testiculi sinistri clare demonstrant D. Aëgrum immunem ab hydro- & sarcocoele esse. Equitatio quidem metum superventuræ aliquando herniæ incussit; verum postquam locum illum monstravit qui in succussione super equo alto & latum dorsum habente, & pede sinistro ex itapede elapso, ultra sesquihoram fortissime allidebatur, facile intellexi non fuisse, vel testiculū sinistram, aut processum peritonæi, sed capita musculi tricipitis & alius vicini ubi ossi pubis adnascuntur; ibique adhuc dolet, dolorq; inde ab interformineo ad genua usq; exporrigitur. Certe si vel testiculus vel processus peritonæi in illa succussione contusi fuissent, luculentius damnum apparuisset, quia dum D. Galli & domi morabatur metum suum ad tertium annum prope retinuit, omniaq; remedia alias necessaria neglexit quod sine graviore noxa neutiquam facere licuisset. Certe nec nunc subligaculo opus haberet, nisi forte equitaturus, Italorum more præcautionis causa.

III. Est erectio virgæ imperfecta, aut erecta cito flacciditas; præpropria seminis ejaculatio, minuscq; fortis, cum minore titillatione ac oblectamento, unde se matrimonio imparem fore videretur. Causa huius symptomatis obscura & dubia videtur; hoc tamen asserere ausim Nob. Do. non frigidum esse, nam organa genitalia omnia bene conformata sunt & legitimam magnitudinem habent, insuper scrotum, pubes & abdomen ad umbilicum usq; pilosa sunt, pilis virilibus similibus. Salvo aliorum iudicio culpam omnium tribuo seminis nimis fluxilitati, & osculorum vasorum ejaculatoriorum, vesicularum seminalium & prostaticarum nimis laxitati nam ejecto semine protinus virga tensa flaccescit & collabitur etiam apud maxime viros, sublato scilicet stimulo sanguinis arteriosi influxum sollicitante & urgente. Unde hoc vitium seminis & osculorum memoratorum provenerit, non anxie multis in causam ejus inquiram. Solum hic memoro me hoc vitium observante potissimū apud illos qui pueri adhuc matrimonio iungebantur, aut sæpius manib. seminis ejaculationem promoverant; & vix credo masturbatore ab hac calamitate immunē esse. Nob. Dom. semen producere adhuc mihi fidē faciunt pollutiones nocturnæ quas subinde experitur.

IV. Est Melancholia Melancholicum Nob. D. Aëgrum esse concedendum est, si qui solitudinem amant, minutias exaggerant, sibi que nescio quæ pericula fingunt ex illis, uno verbo etiam omnia tuta timent, & ut putant non sine ratione, phantasia non raro præconcepita quadam opinione, plerumq; erronea imbuta: attamen hoc fieri posse idque sæpiissime solvis hypochondriis forte quoque non negabitur.

Apud Nob. D. Aëgrum partes sub hypochondriis graviter affectas iterito examine, ut verum fatear, deprehendere nequit; appetit bene cibum tolerat; hora 3. aut 4. post prandium, quando chylus crassior ex ventriculo potissimum eliminatur, non affligitur in præcordiis: chylus in intestinis legitime separatur, ad massam sanguineam rite ablegatur quotidie: nam alvus quotidie aperta est, fæces frequenter indurantur potius quam ut pultaceæ secedant; si molliores sint consistentiam quandam habent & flavescunt. Jejuno stomacho & mane nunquam vomit sive acida sive amara, neque alias nisi medicamenta sumat, aut cibo vescatur nocuo. Ructus sunt modici & insipidi; flatibus abundat, sed quia vitam sedentariam agit & multo cibo idque ter in die fruitur. Hepar aut pancreas ægrotare nullo certo iudicio comperi. Lienem portiones sanguinis crassiores & acidas in reticulatum suum parent chyma admittere hactenus persuaderi nequit, cum proxime à corde æque laudabilem per insignem suam arteriam, quam cerebrum per carotidas accipiat.

Indicationes ergo præcipue in curatione Nob. D. Aëgræ erunt, operam dandam esse, ut sanguis laudabilis seu futura seminis materia producat, ut oscula vasorum seminalium firmetur, & collum vesicæ cum urethra ampliore continue demulceantur. Ut his indicationibus satisfiat ante omnia dicta accuratissima observanda. Hac neglecta omnia cætera frustra erunt: Commendandi in primis cibi boni succi & facili digestionis illicque temperatissimi: nominare illos nolo, cum Excel. D. Medici præsentibus id melius coram indicare & inculcare possint: certe crudi, acidi, valde saliti, admodum aromatizati acresque semper nocebunt: frigida, nimis pinguis & saccharata non conveniunt maxime in cænz. Si prandium fuerit lautum cæna sit parcius. Vinum bibat bene maturum: nimis generosum diluat decocto chinæ præ alio. Corporis motus & exercitia moderata plane non intermittat. Bene faceret si nocte tempestiva lectum peteret, & mane surgeret post horas 8. in lecto traductas, ut sensim ad somnum naturalem invitaretur: certe illum semper narcoticis conciliare non tutum est. Alvus quotidie aperta sit: tardior promoveri poterit clystere emolliente, non purgantib. per os sumendis. Sudorem matutinum non supprimit. Seminis proleclio omittatur donec partes genitales suum robur acquisiverint & tunc præ aliis remediis præstaret matrimonium. Animus semper ad meliorem spem erigendus est. Si venæ sectioni assueverit illam propter hæmorrhagiam narium non omittat. Fonticulo non opus habet.

Ad laudabilis seminis productionem non suadeo illa quæ sub magnanimitatis nomine venditantur aliaque aphrodisia calida & stimulantia: certe hoc in casu non utilia futura, ac potius viis urinariis nocitura. Hoc tempore ad principium veris suaderem hanc gelatinam.

℞. Limatur. C. C. crud. ʒ iv. eboris crud. ʒ ii. Infund. cum aq. fervid. lb iv. Simantur bene et cæta in digestionem in loco tepido horis 12. postea adde sequentia. ℞. Rad. satyrion. purpur. ʒ β. flor. bugloss. citri an. p. i. sol. capill. vener. p. ir. pulver. carn. viperinæ ʒ iii. ichthyocoll. ʒ ii. passul. maj. exacin. ʒ ii. Incis. cum infus. C. C. indantur vasi vitreato, aut probe stanno obducto, & lento prurum

naru. n calore coquant. ad consumption. diuidia aqua. sub finem ferè coctionis adde conserv. ros. rubr. ʒi. Colat. exprellat adde confect. alkerm. compl. ʒj. M. servetur in vase terreo. Hujus gelatinæ sumat mane hora 6. vel 7. cochlear. ij. cum juscul. carniū non saliti ʒiij. vel ʒiv. calidè & tursus vesperti duabus horis ante cœnam.

Præstans remedium esset hoc in affectu cura lacteas. sed non eo rigore quo illam suadent Itali & Galli. De modo suo tempore illum Deo volente scribam.

Ad vias urinarias demulcendas prodesset hic pulvis. ʒ. Rad. althææ ʒi. far. hordei mund. ʒvi. sem. bombæ portul. an. ʒij. tragach. sol. ʒi. sacchar. penidiar. ʒiij. M. F. pulvis. Dosis, omnia aliquandiu gelatinæ C. C. sit ʒi. mane & vesperti hora 4. cum tremor. hord. ʒiv. calidè, idque cum dysuria urserit, Deus T. O. M. his benedicat. Die 25. Januar. ann. 1693.

In eodem casu Consilium viri Præclarissimorum Medicorum Basiliensium.

Nobilissimus Dn. Patiens, cuius historiam pleniorē ad nos misit Excell. Dn. D. M. nger, affectioni hypochondriacæ obnoxius videtur esse, testimonium perhibent varia in historia contenta: enimvero solitudinis amans est, vitæ sedentariæ assuetus, & qui etiam studiis noctes insonnes transgigit: hujus certe constitutionis homines plerumque serum lymphicum acrius, naturæ ut plurimum acidæ solent congerere, cujusmodi deinceps tum circa fibras nerveas intestinorum & glandulis ibidem extillans, tum plexus quandoque nerveos splanchnicos transudando per porosas, vasculorum tunicas, plurimorum for. unda mater est symptomatum cœ sunt dolores vagi in toto, præcipue autem in abdomine ac lumbis, spirituumque turbulenti motus, à quib. singulis spirituumque turbulenti motus, à quibus singulis nec cerebrum ipsum immune manet, at autem in eiusmodi, fibrarū tenerior constitutio, vellicanti materiz minus resistit, atque spirituum, & facilius obtemperat, unde dolorosa partium harum inflationes subsequuntur, ita eadem herniæ eadem imaginariæ anxiā dare possunt apud D. Aegrotum, ut ab intestini prolapsu dilatari autumat, cui non nisi status viam pepererunt, seri autem urinosi salsacidam acrimoniam urinx ardor comprobare potis est: Nec tamen de his magis sollicitus Dn. Patiens, quàm de Venerea quadam impotentia: Perpendentibus sane exacte omnib. & attendentibus ad legitimam partium genitalium structurā & constitutionem, ad pollutiones nocturnas, imo citam, ubi tantillum membrum fricaveris, seminis effusionem, neque horum vitium, neque materiz seminalis inopia in culpam trahenda ardetur: forte etiam seminis serosa acrimonia non peccat, ni ex frequenti pollutione nocturna ejus crasis labem acceperit, imo nec testiculi sinistri vitium aliquod: concessit ex equitatione fortiori detrimentum aliquod ipsi illatum fuisse, huic impotentiz protrudendæ unice sufficit, siquidem dextro suis partibus strenue fungente, appetitus atque erectio membri necessaria usq; vigerent: Persuasum hinc habemus, ni forte in virili membro vena aliqua amplior & p. n. dilatata) unde sanguinis breviorē moram & hinc momentaneam virgæ erectionem deducimus: in causa fuerit hanc impotentiam ex perversa magis imaginatione & meti-

culosa apprehensione provenire, quàm vero aliunde derivandā esse: sunt certe ejusmodi exempla nobis notissima etiam uxorum, qui postquam a pluribus annis frequenter cum suis uxoribus coevertunt, frequentiz defectum, annorū incrementū cautante, etiam cum virga naturaliter erecta est dum uxori suæ appropinquant, ex metra apprehensione eandē rursus inaccessibile animadvertunt: Ad membri erectionem materiz seminalis legitima presentia requiritur, præcipuis autem fluidi utriusque cum vitali tum animali jugis influxus sanguinis videlicet arteriosi & animalis spiritus: atque hujus contentio quàm maxime necessaria est, h. modo, (quod certissimum est) corpora penis nervosa turgida persistere, atque hinc necessaria erectio curare debeant: jam vero ex levi quapiam apprehensione, ne dixerim abluvia imaginatione hanc ipsam animalis spiritus contentionem atq; influxum cohiberi atque intrinigi posse, quis non videt: inde nec de lampatari Nob. D. Aegrotō juxta salubrem victus rationem, ciborum boni succi, & si ita loqui liceat, lactiferorum (cui sunt amygdalina & his adgnata omnia. Cuperemus quàm maxime, ut ipse sit bono animo atque ejusmodi nihil apprehendat, utatur potius & quarat conloquium pulchrarum atque blandiloquarum virginum, si bique jungat propediem thori sociam amicabilem, quæ ipsum excitare suavibus colloquiis exhilarare valeat: singulorum tamen ratione, utilissimas fore deprehendimus thermas nostras Badesles in Helvetia quæ cum fluxile reddere fluidum, excitare spiritus, robur conciliare partibus & aperire meatus, sicuti necesse est, potis sunt, quibus addimus usum linimenti ex unguento Comitiss. rotat. cum essent. ambr. parat. aut ambr. A. convenient. solut. quo balneum post thermatum usum illinire toties poterit: Pariter essent. ambr. ulum interne quàm maxime commendamus: potest illa misceri cum confect. alk. & bis terve de die sumi: aliquib. cubitum ituris nuce pineas contus. in haustulo vini malvatic. juxta exhibuimus: sunt etiam illa, quæ Celeberr. D. Wepferus ordinavit perquam utilia, quibus prom, uti libuerit itidem locum concedere poterit Deus præstet successionem!

Joh. Jac. Harder. Pr. Ord. Med. p. r. Decan.

N. Eglinger. Jac. Zot Colleg. Sen.

In eodem rursus casu Consilium Celeberrimi ac Præclarissimi D. barbeyrac Medici Mospeliensis.

Impotentia virilis de qua jamdiu conqueritur Vir Nobilis, stuporem musculorum penem erigentium causam agnovit propter quem sanguis ardore, & impetu venereo ad ligamenti cavernosi sinus. & mœandros ruens, non potest ibi coerceri ad membri virilis extensionem, inflationem & robur excitandum, non solum languent muscoli penis, sed etiam vesicularum seminalium ora, & sphincteres hiant, cum semen ex iis elabatur ad conspectum, & momentaneum mulieris contactum: hæc ægrotudo ex obstructio nervi lumbatis ramo ad penis musculos extensio oritur, cujus culpa spiritus animalis influxus hanc partem erigificantis impeditur, & illa obstructio ex sero tenui in ejus poros illapso genita est, & continuo fovetur.

Hinc malomederi oportet evacuantibus diaphoreticis & aliquando extremis sudorificis, & omnia cautè administranda sunt in constitutione

melancholica ad atrabiliariam vergente, ne partis unius saluti incumbendo, toti labes inferatur.

Debet mitti sanguis ex alterutro brachio ad deplenda vasa, ad 3ix. præmisso clystere emolliente & laxante.

Una aut altera die à venæ sectione exhibebitur ipsi catharticum blandum, ex sena. pulp. cass. & syrup. de pomis compos.

Post purgationem sumet juseula viperina per xv. dies mane, & purgabitur in medio & hinc juseulorum portione supra præscripta.

Peractis juseulis viperinis utetur sequenti opiata bis in hebdomade hora somni ejusque sumat singulis vicibus 3ij.

℞. Conserv. satyrionis 3iv. confectio. de hyacinth. 3i. confectio. alchem. 3ß. pulver. viper. 3ß. ambar. & mosch. an. gran. xvi. cum syrup. de ros. siccis. fiat opiata ad usum dictum.

Adibit thermas Sabaudiz, vel Germaniz mense Junio proximo, catumque balneum ingreditur per quatrimum, semel in die, usque ad lumbos tantum promovere solito.

Ante & post ulum thermarum purgabitur ut supra.

Datum Montpelii 25. Aprilis
anni 1693.

In eodem casu Consilium Amplissimi ac Præclarissimi Viri D. Caroli Drelinhartii Vniversitatis Leidensis Professoris Antiquissimi.

Suffragor enterocèle & calculo nullis; sanguini autem falsiori, serosiorique, unde semen damni consors catuliens & fluidius levi Veneris idea confestim erumpit, adjutrice sibi laxitate partium.

Sanguini igitur temperando & incrassando, genitaliumque tono firmando totus studeo vno nimirum generosiori rubro, cibus opimis, pane primario, iurulentis vitulinis & ovillis; volatilium electissimis; fortilibus ovīs, vel solis, vel jure dilutis vervecini femoris.

Pastus vero singulos pistaciis clauderem, datylis, amygd. dulcib. passulis, pincis; & conditis vel corticib. arant. citr. nucis moschat. vel nucib. jugland. vel teminib. fenic. & coriandr. vel cumini. & carui.

Tabellis frequens uteretur Confect. Alchem. largis ambar. gris. & mosch. perfusa.

Conserv. adhiberem rad. satyr. sol. salv. major. flor. anth. beton. lilior. convall. atque lavend. Chocolata demum multus pascere, Caffè autem nullo.

Sacculos pararem ex absinth. ros. rubr. trias. sant. castor. civett. styrac. liq. scroto adaptandos.

Illitus mihi forent ex aq. Reg. Hung. styrac. liq. civett. castor. ad scroto perin. & penoni.

Injectiones denique è terebenth. ol. hyper. syr. symphyt. maj. sem. cydon. myrtillor. vel è syr. ros. rubr. cum modico Peruviano balsamo, quibus ejaculantium ora firmentur.

Istis, vel bimestri spatio adhibitis, haud in strenuus fiet Domitianæ athletæ. Arrecturus ergo, intromissurus, & semen ejaculaturus mascula virtute prægnans Leidæ 20. Maii 1693.

Præclarissimus Nobilissimus ac Amplissimus Dominus Redi in responsoriis quibus nos 24. Julii ann. 1693. cohonestare dignatus est in eodem

argumento Italice sic scribebat.

Infirma valetudo quæ in hac mea progressa fruor ætate non permittit ut mentem scripturis consultatoriis applicem, unde tibi manus mirum videri debeat, si respondere non valeam doctissimæ informationi quam ad me de morbo Nobilissimi cuiusdam Viri transmisisti: Unicum cum vero candore, non Medici, sed amici partes agens dicere possum, nimirum ex consilio meo Dominum Ægrum abstinere in potterum debere ab omni genere tot tantorumque medicamentorum quibus hæcenus ad fatigationem potius quam ad sanitatem usus est. Eum vero dum in us persistet poterit in vitæ periculum incurre, aut saltem in aliam aliquam novam infirmitatem priore multo peiorem devehit. Hæc est charissime Domine Marget mea sententia, quam tamen submitto omni alii meliori consilio.

In eodem rursus casu Consilium Illustrissimi ac Præclarissimi Dom. Malpighii Archiatri Pontificii Dignissimi.

Melancholia hypo-chondriaca vexatur Nobilissimus Patiens, hæc abhinc annis cum doloribus in lumbis, & in variis corporis partibus manifestatis, gravitate in utro ventre, aliqui symptomatibus in doctissima scheda eleganter expositis, quibus associatur ad Venerem impotentia, cum penis pendulus jaceat, & non tantum tendatur. Successit autem hæc morbo affectio, ut optime innuitur ab Eruditissimo Viro, ex acidarum particularum, sylvestriumque salium copia in fluidis luxurante, unde imi ventris glandularum fermenta & præcipue bilis sales enervata languent, nec primam coctionem absolvunt; hinc nec debite dulcoratur chylus, nec excrementa præcipitantur. Quapropter chylus hujusmodi acidis salibus turgidus, sanguini affusus propriam labem eidem communicat, quæ in secundariis etiam humoribus perpetuatur; & cum ob inopiam volatilium particularum secundum naturæ leges sanguis non volatilizetur, nec per transpir. cum depuretur, circulatione media musculos, & membranas exteriores licessendo, dolores varios inducit, rectius autem ad interiora ulteriori usura fermenta viscerum inquinat, & nervorum fines vellicando, membranasque terebrando, dolorem, & pondus manifestat. Exarata autem labis vis præ reliquis in seminariis vasis patet, cum penis erectio vitietur, cujus causæ solerti indagine à Doctissimo Viro inquiruntur, & indicantur. Erit igitur probabile læsionem hanc vitio fluidi, & organi contingere: & licet non adhuc integre pateant penis structura, & mechanicus modus, quo tenditur; conjectare tamen licet hunc musculum esse sui generis concavum, cujus tendinosa, & mirabilis contextura, corpus nervosum dictum efformat, carneæ autem fibræ radicem constituunt.

Impulsus itaque ab arteriis sanguis, & venarum compressionem interceptus, turgentiam excitat, ni addere velim expressi à proximis glandulis succi copiam ad inducendam rarefactionem. Contrahitur autem penis tendinosa compages

ges, quæ argentei coloris, firmæque substantiæ fibris coagmentatur: unde in actu illo, nerveo succo saturata tenduntur, & ex gemino nixu tenho excitatur, quare laxato penè fibræ crispantur. In casu igitur nostro verisimile est tendinosas fibras proprio tonico motu non gaudere, sed quasi paralyticas jacere, propulsumque pariter Languinem ob paupertatem volatiliū particulatum, & copiam acidorum salium, debitam fermentationem, & elaterem non excitare. Nec verisimile est ex succussatione, contusa parte id accidisse, cum ex stagnatione acidorum ichorum in adjacentibus partibus satius successerit; pilorum enim plantulæ velut in sterili & vitriolato solo contabuerunt, & testis flaccidior redditus est, nam stagnante concreto succo, spermatico fortasse arteriæ, non patent, vel saltem intestinula, quibus compaginantur, acidis salibus oppilata, secretioni seminis non favent.

Effluit porro frequentibus pollutionibus semen; nam fibræ carneæ, quibus vesicula seminales, extremitasque ejaculantium vasorum firmantur, cum debito tonico motu non gaudeant, contra irritantis, & modice turgentis seminis impetum non agunt, juvante pariter eruptionem, salum copia in semine luxuriante.

Medicæ igitur indicationes sunt absumendi, si fieri potest, acidos sales, juvandi viscerum coctiones; tollendi irritationes, & firmandi generationis organa, quæ quidem perardua cenico, cum a tenella ætate ex primæva constitutione, ex studio, & vivendi genere, fermenta, & præcipue lymphæ, ita inquinata sint, ut minime etiam folliculorum structuræ immutata probabiliter fuerint. Ut autem aliquam opem præstem, quædam cursim indicabo. Pro lenienda itaque alvo, irritantia, & validiora vitentur solventia, sed blanda tantum administrentur, & præcipue oleum amygdalarum dulcium, extractum absque igne, & clysteres emollientes sufficient. Acidi namque ichores solis vomitoriis extirpantur quæ tamen si admittantur, non mineralia sint. Pro corrigenda vero aciditate convenient succi ex sumaria, absynth. coelestria, & similibus, quibus gra. viii. limaturæ chalybis subtiliter contriti addi poterunt, hisque superbibat jusculum chalybeatum. In similibus uti soleo sero caprili colato tantum, in quo per noctem absynthii roman. coma maceretur, & pro tollenda irritatione in imo ventre, & lumbis esurpo antimonium diaphoreticum, & pluribus etiam decoctio crudi antimonii arridet. In vino infundantur chalybs, & absynth. romanum. Potus Thee salutaris erit.

In jusculis bulliat limatura cornu cervi vel salvia, aut gentiana pro juvanda fecunditate. Victus sit mediocris, & carnes sint elixæ, & facilis coctionis, vitet varietatem ciborum, acida & acrida. Motu locali, prout licet, plurimum exerceatur. Hilare vivat absque studio & curis. Pro firmandis autem spermaticis partibus conuenient semicupia aquis thermalibus parata, quæ naturam sulphuris sapiant, vel totus administrentur ex aqua sapius chaly-

beata & alterata simplicibus alkalicis; Et pro excitanda erectione ex usu habeo linimentum quod Bononiæ prostat in Atomataria solis. Hæc indicabam in tam contumaci morbo, eaque subiciebam acri iudicio Doctissimi Viri. Faxit Deus, ut cedant ex voto &c.

Romæ Kalendis Augusti 1693.

*Super eodem argumento Epistola, Responsoria
Præclarissimi ac Amplissimi Viri Domini;
Luca Tozzi, in Vniuersitate Neapolitana
Medicinæ Professoris Celeberrimi.*

Excellentissimo, ac Præclarissimo Viro,
Domino Johanni Jacobo Mingereto Medico, atque Anatomico præstantissimo
&c. Salutem & felicitatem.

Literarum, Ornatissime Vir, 6. nonas Julii data ad me, nonnisi 7. idus Augusti delata sunt. Fuere autem mihi charissimæ, & quod tanti Viri fuit, qualis tu ipse es, præclarissimum nomen rorante, & quid de Bibliotheca Medico-Practica sub Prælo versante, ac de Bibliothecæ Anatomicæ iteranda editione, tua industria, principem me feceris: opus utrumque inigne, & maximo cum fructu cunctis rei Medicæ Professoribus commendabile, de qua re gratias tibi satis non sum ut, quas debeo, referam immortales. Id vero solum citrationem actum videntur illæ continere, quod auide à me inter Professores minimo, de ægritudine à Te metipso quam optime examinata vestrae cujusdam Nobilis consilium expectant. Sunt enim à Te tam scite tamque accurate, quæ ad naturam, causas & partem affectam pertinent luculenti stylo prodita, ut nil penitus habeam, quod ætimatione dignum sit, adicere. Equidem ex temperamento ejusdem ad melancholicum vergente ex vagis doloribus præsertim in imo ventre, ex urinarum ardore, cum sensu ponderis in regione hypogastrica, aliisque similibus symptomatibus, quæ diu illum molestarunt, serum sanguinis acritate præditum fuisse bene deducis, adeoque varias partes tractu temporis potuisse afficere; quæ & ipse crediderim sanguinem ipsum, lympham, liquorem nervorum ceterosque corporis humores simile vitium sensim sensimque adeo contraxisse, ut etiam postremo semen infecerint. Succussiones autem illas ex laboriosa equitatione haudquaquam causas, sed occasiones duntaxat putare est; quomobrem in partes pudendas potius male affecti humores decubuerint, cum jam illi entea præestiterint, si non hunc, alium planè & fortasse graviolem morbum allaturi, si nimirum in alias præstantiores, principalesque partes delati, aut hæssissent, aut suo acore rectum eorundem tonum fuissent vitiatum. Quoniam vero (bono ne an malo fato nescio) partes seminis confectioni ac conservationi dicatas acor ille potissimum affecit, proinde factum, ut si ven. quod. potio dilutius & sale acriori præditum levi quacunque de causa, aut titillatione effluat

& inter Martis ac Veneris implexus membra illa pugnam non sustineant, imo imbecilliter admodum se gerant. Vereri quoque valde licet, factam in mulculis, ad radicem & latera penis, sitis, quandam veluti paralyfin, qua motus erectionis fatiscit, & nedum ipse, verum etiam aliz circumjacentes partes ac finitæ testis ingentem laxitatem patiuntur, unde flacciditas, languor & pilorum deluvium a vitio liquoris nervorum eas partes pertingentium. Hac eadem de causa timere est, ne graviora mala ibidem exoriantur, imo in toto illo tractu nervorum male affectorum, cum & vesica jam jam, ut memoras, occupatur, & urina parcius egeratur, & venter immo gravante dolore molestetur. Meminime aliquando vidisse quendam pari impotentia coeundi laborantem ex languida penis erectione, qui tandem in urinz suppressionem incidit; recte enim noli quam inter se consentiant vasa spermatica, & urinaria. Ut igitur præfenti, quoad fieri poterit, opitulemur, atque imminenti morbo occurramus, peropportuni exultimo, remediis acorem in humoribus retundere valentibus, utendum esse, & simul una iis, quæ partem sanguinis floridam reficere, & succum nervorum vividorem reddere apta sunt. Hac quippe ratione penis erectio juvabitur, & sanguis ac semen a sua acritate repurgabuntur. Quæ ex chalybe conficiuntur medicamenta ex una parte optima sunt, præcipue vero pulvis ille Cachecticus Quercetani, aut etiam vinum ex infuso Marte paratum. Est apud nos in usu chalybs igne reverberii cum nitro, sulphure, & vitriolo Romano præparatus, qui infusus in vino albo veteri blandam nimis, nec inluavem tincturam communicat, in ejuscemodi agritudinibus, atque humorum vitis, summopere efficacem, si ad mentes integros, aut mane jejuno stomacho, aut in primo potu prandii ad uncias tres circiter exhibeatur. In eundem finem commendare solemus jura ex carnibus viperarum elicitæ, adjectis Cornu Cervi, rasura eboris, radice Chinæ, satyrione, aliisque simplicibus e genere Anticorbuticorum. Non multis ab hinc annis e nostratibus unus non dissimili impotentia affectus perfecte convaluit, & res suas strenue gessit, solo usu Diasatyrionis, cum quo assu-mebat etiam cochleare unum, vel alterum aquæ Magnanimitatis dulcis redditæ; verumtamen in cæteris bene se habebat, neque tot tantisque symptomatibus vexabatur. Novi alium qui solis Therinis Pithecusanis amillam coeundi impotentiam recuperavit: mirum enim quantum aquæ istæ in iis aliisque similibus affectionibus imi ventris proficiant. Cæterum Diambra, Diagalanga, Diacis. Adriani à Minsicht, & alia hujus generis electuaria, ut tibi notissima, & fortasse etiam in usum ducta, prætereo hic commemorare. Sed quorsum hæc? non nisi ut jussis tuis obtemporem: cum cæteroqui bene sciam me noctuas Athenis asserre. Interea me amatui nominis perpetuum & devinctissimum cultorem.

Dabam Neapoli V. Idus Augusti 1693.

Quæstio, an cui testis unus sectione ademptus, alter etiam incisione quasitus, nunquam deprehensus, est matrimonii capax.

Affirmativa non vana veritatis specie gloriatur.

1. Ante annos circiter 21. matrimonium iniiit post consilium D. D. Medicorum, id ipsum à D. D. Medicis Lucernensibus formaliter nuper datum ad secundum matrimonium mortuæ jam uxore.

2. Quod loci illius ordinario suffecisse mihi videtur.

3. In salacem venerem libidinosè catullit.

4. Penis in duritiem erigitur, ubi veneris blandientis species, pruriunt partes genitales idque promptè & sæpius.

5. Semen cum voluptate evibrabat inter mulieris amplexus ea frequentia, quæ aliis ut plurimum familiaris est.

6. Semen non aqueum & iners esse inde judicatur, quod per nocturnas inter dormicudum pollutiones indusum proluat, quod ubi siccat rigidum evadit ut tere a glutine imbutum.

7. Subinde unus immo uterque testis intro abditus delitescit mutatione alterius sexus.

8. Etiam utrinque castratos quosdam fecundos fuisse ex historiis discere licet.

9. Et quædam animalium perfectiorum species testibus carent ut notat Aristoteles, unde universaliter concludit cum quibusdam authoribus Medicis, semen prolificum testium opus neutiquam esse, sed solummodo eos ad æquilubrium partium generationis operi sacrarum famulari.

Sed meo judicio opinioni negativæ longe gravius probabilitatis momentum inest.

1. Adeo familiaris apud Medicinæ authores sententiæ hætenus fuit, ut quasi supponatur grande spermatoris opus testiculorum ad id natorum beneficio peragi, quæ naturalis ad id conformationis aptitudo minime deest, ut apud anatomistas videre est. & si concederetur ipsum humorem & causam materialem seminis non fabricare testes, sane spiritum saltem fecundum subtilisabunt, quo assabunt humorem seminis in vicinia confectum, ut etiam ovaristæ utero admittunt, id alias sterile sic imprægnaturi.

2. Vixit cum uxore & ut jactat, generose mariti munere functus fuit ad annos 21. nullius prolis parens, quæ etsi non jucunda sanitate felix fuerit, cum tamen eo usque vitam qualemque protraxerit, probabile non apparet nequam adeo vitium subfuisse, quod efficaci obstaculo fuerit.

3. Nulli proffus nec scæminini pili mento in barbæ decus crevere.

4. Vox proceræ corporis sat aliàs vegeti staturæ nulla proportionè concors est.

5. Non virilis color faciem honestat.

Quæ ultimæ rationes quatuor seorsim sumptæ cum fecunditate subinde deprehensæ, at simul sumptæ, quod credo, nunquam.

Fateor ut objicitur ex Aristotele & nonnullis Medicinæ auctoribus cum exemplis quibusdam, testibus privatos valuisse ad generationem subinde sæpius iteratam, sed revera crediderim,

vel intus latuisse natura. Sic errante testes mulierum exemplo, sed id monstrosum, & insolens non nisi exus vim tenet: vel in operatione herniæ observata methodus minus nota & vitata, ut testis intactus, intus abdatur.

Quales eunuchi seu spadones, non censentur ex Concilio Medico per summum Pontificem imperato; & revera multis animalibus negantur testes, ab Aristotele, in quibus tamen eos curiosa anatomiarum solertia detexit, vel aliqui ipsis in idem opus naturæ providentia substitutum.

6. In calitatis semen quod etiam pruriente voluptatis sensu profilit, aqueum est, & ideo sterile, quamvis non modicus subinde in luxuriam sollicitans.

7. Penis etiam ordinariæ longitudinis tamen solito magister est. Nonnulli interim scrupulo animi veritatis religiosè curiosum angit, quod interrogatus iurandi sapius indicanti momento responderit, quod delicata voluptate semen ejaculatus fuerit, idque sapius, quod indiceret, ipsum vexet in eam actionem sollicitatio: quod penis erigatur, prompte ad imaginationis sollicitantis imperium & ad duriciem constantem, rigidus sit; quod semen pollutione inter noctis otia, emissum viscidioris & ipsius sit consistentiæ, ut ex indusio madido & postmodum siccatum discere est: ex his audacter suspicor, quod non insolitum est. Et cum D. D. Medicis Lucernensibus, absconditum testem, dictorum motuum auctorem, quem frustra, in pueri semetiri quaesivit Chirurgus.

Datum Friburgi die 30. Maii 1691.

Nofet Medicinæ Doctor & Urbis
Friburgi Physicus

Sic etiam testatur Joannes Savazy
Chirurgus.

Observationes

De impotentia ad Coitum, propter contusionem capitis & lumborum.

Anno 1630. 9. Februarii iussu Consistorii matrimonialis, cum reliquis Medicis Ordinarius Bernensibus, Collegis meis plurimum honorandis, hominem 20. annorum, robustum & optimo corporis habitu præditum, Michaelen Jutzeler, de impotentia ad Coitum ab uxore sua accusatum, exploravimus. Exterius quidem nihil quicquam, quod congressum cum uxore impedire posset, invenimus. Etiam si enim ex una parte caliratus esset, reliqua tamen secundum naturam se habebant omnia: Continebatur insuper, stimulum libidinis sapissime non deesse, sed penem erigi non posse.

Hujus impotentiae causam, & antea ex vita statum, cum diligenter perquireremus, retulit nobis se ante annos octo circiter, baculo ad dextrum bregma graviter percussum, multumque ex hac contusione se perpassum fuisse, imo & additum amissum dextræ amississe, urinam

quin etiam involuntarie effluxisse. Ex quibus, coniecimus, postictum & contusionem capitis, materiam quandam præter naturam deorsum fluxisse, & nervos, imo & arterias, quæ erectioni penis inserviunt, opplevisse. Hæc cum Consistorio matrimoniali relata essent, divortium factum fuit.

Impotentiam ad Coitum post lapsum in dorsum sequutam quoque esse, in viro quodam robustissimo, ab uxore sua (quam antelesquissimum duxerat) ut inepto ad congressum matrimonialem, in jus vocato, Anno 1625. 15. Novembris, hic Bernæ observavi. Fuit is rusticus quidam, *Hanns Reschlmann* nomine, ex vicino pago *Langnau*, oriundus. Hic in primo matrimonio ex uxore sua liberos aliquot susceperat: in secundo vero plane impotens fuerat, etiam si circa genitalia omnia secundum naturam se haberent. Referbat ille, etiam tempore coitus libidinis stimulus non deesse, membrum tamen virile erigi non posse. Hujus impotentiae causa erat calus ex arthore, ex quo lumbi mirum in modum contusi, nec a rationalibus Medicis aut Chirurgis ex arte curati fuerant.

Anno 1630. 3. Martii iussu Magistratus nostri, una cum Collegis meis hominem 36. annorum, *Durs Gärzi* nomine, robustum & optimo corporis habitu præditum, exploravi, is eodem modo ex casu in dorsum ad congressum matrimonialem impotens factus fuerat.

Hæc in gratiam Medicorum & Chirurgorum, quibus aliquando a Magistratu amplissimo examinandi, & explorandi eos, qui a libidinosis & luxuriosis mulieribus, ob impotentiam ad iudicem Consistorii matrimonialis citantur, in mandatis datur scribere visum fuit. *Guilielmus Hildanus Obs. Chirurg. Cent. vi.*

De impotentia ad coitum, propter frenum nimis breve & durum.

Viro Clarissimo atque Doctissimo Domino
Joanni Jacobo Cramio, apud Neocomen-
ses Doctori Medico ordinario atque
Celeberrimo, Guilielmus Hildanus
Hildanus S. P. D.

In Viro isto quem ad me misisti, Clarissime atque Doctissime mi Domine Doctor, maleficium nullum adfuit. Quod autem ad accidit venereum hactenus ineptus fuerit, id propter frenum penis accidisse reperi. Adeo enimerat breve, durum, atque validum, ut simile nunquam mihi videre contigerit. Adhærebat præterea frenum usque ad ipsum ductum urinarium, uti ex ipso agrote prolixius intelligere poteris. Quapropter disceuro pene, & retracto præputio, glans, (testis sum ocularis) versus perinæum tere usque retrahebatur. Ex his facile intelligere poteris, cur ex inordinato atque præternaturali illo coitu voluptatem nullam haberet. Quæris causam, cur in primo concubitu cum sponsa sua melius commodiusque quam deinceps semen eiecerit? Respondeo, ipsum hoc imaginativè fecisse, cum certum sit, eandem causam malitiae vitium freni in primo coitu, non minus quam in posterioribus assidue. Verum in primo congressu cum nova sponsa, propter seminis & spirituum abundantiam, tantus ardor, aut potius

potius furor ad Venerem fuit, ut etiam mens si non aliquo modo perturbata, adeo tamen occupata esset, ut verum a falso non satis recte distinguere posset. Ab eo vero tempore ex continuo, & quidem (ut ille ipsemet testatur) laboriosissimo coitu dissipatis spiritibus, & aliquo modo exhausto humido radicali, Mens, quia in coitu non ita, uti antea, occupata est, melius verum a falso distinguit. Nudius quartus traxim a glande separavi, majori tamen cum difficultate, quam in quodam alio viro, de quo vide historiam Centur. 3. Observ. 54. Si diutius moram hic trahere voluisset, maxime consultum fuisset: aliquando enim frenum iterum recoalescere solet. Verum quia negotia sua id non concedebant medicamentis ipsum instruxi, quibus ipsemet se curabit. Quod petis Oleum ex Vitellis ovorum, hodie extractum, nunc ad te mitto; Uti quoque Emplastrum pro Nobili puella. Retinaculum & medicamenta pro puero hernioso, per famulum meum brevi, Dante Deo, mittam; Uti is, qui has Tibi traditurus est, fusius significabit. Vale Vir Clarissime, & aeternum feliciter vive. Raptum Bernæ, 6. Aprilis 1616. Idem ibidem.

De sterilitate, propter coitum dolorificum ob longitudinem penis, & quomodo emendata.

Generosus quidam juvenis, robustus & corporis proceritate, elatior multis aliis, Virginem ex nobilissima familia oriundam, formosam, sanam, & quam optivo corporis habitu præditam, duxerat, quæ in secundum annum non tantum sterilis permansit, sed tandem quoque in cacochymiam incidit. Hujus rei causam quum mater, matrona singulari virtute, pietate, ac prudentia prædita, ex filia anxie expiscaretur, repondit, ob immensam longitudinem penis mariti sui se maximos dolores, non solum in ipso coitu, verum etiam post congressum perferre: genitalia quinetiam sua ob intempestivum coitum læsa esse. Mater cum ex oculari inspectione cognovisset, collum matricis filiae suæ exulceratum esse, & anxiosa esset, Coloniam (ubi tunc temporis artem meam exercebam) filiam suam adduxit, Anno 1593. Vocor in consilium, exque matre omnia, veluti internumtia, percipio. Suadeo ut ad tempus a congressu Venerico, & consortio atque familiaritate cum viro suo abstineat, interim corpus aliquoties blande expurgo, & quia propter violentum & intempestivum ac dolorosum coitum obstructions viscerum exorta fuerant, apozemata aperitive exhibeo. Conservis quinetiam, tabellis, Elevariis, & Confectionibus Alkermes, de hyacintho, & similibus partes nobiles corroborare studeo, & collo matricis multilaginem teminis Cydoniorum cum aqua plantaginis, & rosarum extractam, cui admixta erat tutia, cerussa, cornu cervi usum & præparatum, per matrem bis terve in die imponere jubeo.

Hicce adhibitis remediis, cum intumescit collum matricis remississet, Excoriatio quinetiam persanata esset, & maritus uxorem suam invensum diu Coloniam venisset, & congressum cum ipsa urgeter, anxiosa fuit juvenecula, cui præceden-

tes dolores, quos passa fuerat tempore coitus animo innixi adhuc innarebant: quapropter cum iterum in consilium vocatus essem, iussit ut instrumentum quodam instar scuti, interius acuminato, & ex tubere fabricato, lana quinet ammittito, tempore coitus penis munitetur, ne profundius intraret. Scutum autem hocce quærat spissitudinis quantum penem in longitudine proportionem nullam excedere conjicere potuimus. In medio foramine ea magnitudine, ut penem excipere posset, præditum erat. Externa facies plana & aequalis erat, interna vero propter ossis pubis exuberantiam non nihil excavata, sed ubique Lana vel gossipio bene munita erant. Scutum hocce ante congressum cum uxore apponebat maritus, idque non sine maximo successu. Tam bene enim successit inventio hæc, ut non solum sine dolore, verum etiam cum voluptate cum viro suo conet: Eventus quoque idem fecit. Non diu cum post prægnans facta fuit, filiamque formosam peperit, quam ego cum An. 1611. Coloniam profectus essem, una cum matre, & nonnullis aliis infantibus ex ipsa natis, vidi. Hinc plerumque maguos morbos ab initio, exiguis remediis removeri posse videmus. Ex doloroso enim coitu omni procul dubio, tandem putridum, sordidum, & incurabile ulcus in collo matricis sequutum fuisset. Idem ibidem.

De Impotentia Virili.

Vir quidam generosus ac in militia strenuus, de sequenti affectu conquestus: Quando cum uxore propria æstu libidinis percitus coire appetit, in momento omnem appetitum coeundi evanescere, membrum virile flaccescere; interdum vero ab hoc morbo immunis est, verum tum iusto citius opus suum peragit, si vero cum meretricibus consuevit, tum optime sese posse suæ virilitatis nuncire longi, & nil tale ipsi evenit, nisi cum propria conjugē. Ejus uxor mihi confessa est, Marito cum ea coire volenti, tale quid accidere. Quæstio est naturalis, vel Magicum vitium sit?

Hic Generosus Dominus (nomini parco) si curam posceret, nova hac mea Methodo Deo auxiliante facile restitueretur, quod autem curam non poscat, causa est: credit etenim fascinum esse, ac per malos homines ejus Virilitatis magnanimitatem munui, hincque etiam Generosa conjux sterilis permansit. Hæc autem Methodo procederem, quam novam dico, quoniam nullibi similem legi.

1. Generosum Virum, ut & Generosam Conjugem appropriato pharmaco sine aromatibus purgarem.

2. Generoso Viro Venam mihi notam apud membrum virile secarem, Venam utriusque tali, saphenam dictam, incidere quoque in Generosa Coniuge.

3. Octiduo elapso post hæc administrata, iterum Dominum & Dominam purgarem pharmaco in forma sicca iterum absque aromatibus.

4. Purgatum Herum ut & Heram introduce-rem in cameram aromaticum odorem spirantem, cujus pavimento stratum radice satyriosis incisa,

cisa, inque ea camera Domino balnea parata esse juberem, alterum pro Generoso Viro, alterum pro Generosa femina. Balneum pro Viro hincce contabit;

℞. Herb. Majoran. Melissæ, betonic. Salviz, serpilli an. M. ij. Flor. rosar. boragin. buglossi. Violar. an. M. ij. 4. sem. frigid. maj. an. Drach. iv. Carnis bovinæ, Vitulin. coct. in jure balnei an. l. ii. Panis similaginet. M. V. Pæoniæ, bryoniæ Unc. j. M. f. l. a. Decoctum in Lacte, & decocto affunde Vini Malvatici l. V.

In hoc balneo collocarem Virum, cum carne utriusque animalis, ut & cum herbis fricarem integrum corpus; apud testes reponeret hunc sacculum in vino Hispanico coctum ac sequentibus refertum:

℞. Radic. satyrion. incis. Unc. j. Pæoniæ incis. Bryon. incis. an. Drach. j. Passerum carnis Unc. iii. Cerebr. passer. Unc. j. Mac. Nuc. Moscat. an. Drach. j. 4. sem. frig. majoran. an. Drach. j.

M. f. sacculus longus, ut commode cingat inferiorem ventrem & sinui involvat testes, per horam ita detinerem in balneo. Sæpius vero haustum præberem sequentis Mixturæ.

℞. Vin. Malvatic. Unc. vi. Aq. Rosar. unc. viii. Destill. cum vin. Meliss. Unc. j. succi Radic. satyrionis Depurat. Unc. ii. Confect. Aikerm. complet. Drach. ij. Syrup. Rub. Idæi unc. vi. Elixir. propriet. Helmontii unc. f. M. f. Mixtura, Dosis unc. f.

Sæpius etiam darem in balneo Morsulos Viriles Mynsichti per 4. semin. frigid. major. correctos juxta notum præscriptum.

Dorsum adhuc balneo insidentis inungerem pinguedine ex passeribus collecta cum momento uxingiz ciconiæ. Egressum ex balneo totum inungerem sequenti Linimento:

℞. Ol. Verbasci destillat. chamom. carul. destillat. drach. j. amygd. dulc. scrup. j. piperini, gut. v. euphorbi gut. j. M. f. linimentum.

Poſt inungere inferiorem ventrem, testem, penem Ballamo meo Mulceberino Venereo. Morsulos vero Viriles juxta nostram descriptionem semper masticaret, vel nostrum Electuarium, opipare semper cauaret, jubere.

Peracta hac methodo cum Nobilissimo Viro; cum Coniuge ita procederem.

Hanc bellam feminam obitetriz in Balneum sequens collocaret:

℞. Herb. Meliss. Matricar. artemis. Puleg. an. M. Sabinz Mf. Castorei scrup. ii. Mac. croci in petia ligat. an. Scrup. j. Carnis Vitulin. l. ii. Schœnanthi Drach. iii. M. f. l. a. Balneum in la- &c.

In hoc balneo detineretur per semihoram, ex quo deduceretur, hausto primo confortanti potu, in aliud Balneum, cujus beneficio uterus sese aperiret magis quam in prædicto, totum inferiorem ventrem inungeret obitetriz in balneo unguento aperitivo nostro, quo uterus pateret, in quem obitetriz manum successive infereret, ac decocto nostro uterino optime elueret, ut nihil sordium amplius superesset, putrescentem enim sanguinem quidam Medicus ex sterili utero aliquando ademit. Ita elotum uterum, sordibusque ejectis, haustuque facto confortativo, ut & pulvere nostro confortativo assumpto du-

ceretur in Balneum nostrum astringens, cujus beneficio uterus iterum clauditur, tumque inungerent linimento nostro attritico. His peractis semen generantia propinarem, & ad carnalem copulam cum Viro subeundam, elapsis tribus horis post hæc (invocato primo numine divino) hortarer. Cuique poma mea Venerea masculina & feminina traderem. Cum Viro bis in anno hunc processum instituerem, mulierem confortarem saltem iis, quæ mihi tum ratio tum natura agræ suadebant. Hæc est mea nova Methodus curandi sterilitatem in utroque sexu. Et nisi hæc efficeret, ad curam meam Magnificam confugerem, quæ posthac aperienda. *Joh. Lud. Harnischmann.*

Impotentia ex frigore.

Novi olim virum doctum, jam pie defunctum, qui hyemis frigore sæviante, iter aliquot horarum equo cæsius paralyſin penis incurrit, succisit oppido coitus impotentia salva manente urinæ excretionem, quod etiam Aetius l. 6. v. 35. observavit, Grave fuit illi hoc malum, ut pote viri boni habitus, ad quinquagesimum vergenti & præcipue (Foreſt. l. 10. Obs. Med. 93.) uxorem habenti. Medicos non inima notæ in consilium vocarat in principio, sed nihil proficere, miserat vir optimus, multorum antea liberorum parens.

Ineptus thalamo choriverebus; Joh. Jov. Pont. l. 1. Bojar.

Interim cum suo munere adhuc vasa spermatica fingerentur, resolutis saltem in ulculis, aut potius eorum partibus nervosis tendinibus, nocturnis quidem pollutionibus non tentabatur, singulis tamen mentibus tribus aut quatuor ante plenilunium diebus calore internarum partium, dolore capitis cum appetitu proſtrato, & intolerabili cutis circa regionem pubis pruritu defatigabatur. Foſt urinam turbidam per diem unum & alterum mingebat, quæ frigeri exposita magnam partem in materiam albuini Ovi non abſimilem resolvebatur, quæ vero fundo scaphii adhærebat, colore & consiſtentia lardum referebat. Fuit ſine dubio Semen reſtentum, quamvis pituitam aliquam partem conſtituiſſe etiam copia arguat. Quod nocui non fuerit pollutus, ſingulare, quodve urinam, ſi præſatos dies excipias, per totum mentem non inuixerit turbidam, aut filamentis albis conſpicuam, qualem in venereo ſemine proſſuſio notat Lemnius l. 3. d. Sign. morb. p. 257. Sed claram & diaphanam, ob partium, ut dixi, ſpermaticarum conſtans adhuc robur. Ant quodidani Tabaci uſus, quo inpenſe delectabatur, conſuſerit portionem humoris genitalis, aqueam inprimis, quod illis qui ſumo paſci aut in ore, non ita liquet. A modico Tabaci uſu ſumiſugos impotentiam non incurrere, Megnerus Exerc. 6. de Tabac. §. 10. p. 116. probare contendit, ab immodico autem ſemine portionem aqueam & ſpumofam diſſipari, æream autem intenſiorem fieri non negat p. 117. Si etiam è cerebro, ut placuit Hipp. l. xl. genitura, magna pars ſemine deſcendere ad vaſa genitalia, Tabacum vi, quæ pollet, exſiccandi cerebrum, multum ſemine generationi obſtaret. Narcotica ipſius facultatiſ quam quidem ridet & reſi-

cic Primerosius l. 4. d. vulg. Error. c. 31. p. m. 176.) aliquid comprimis dandum putarem hac in parte, eo modo uti famem sedare dicitur. Id namque non facit ut approbe Helmont. tr. mortis occasiones p. 592. quali satisfaceret defectui, sed in quantum defectus sensum tollit, simulque functionum exercitia. Cur vero circa plenilunium Semen mejebat? Ut Sol aeris, ita Luna matricibus aquis præsidet, Helmontius tr. Formarum ortus n. 924. p. 10. respondebit. Medullis & Ossibus præest Luna secundum Eundem tr. ignota actio regiminis n. 42. p. 120. De cerebri in & decremento, juxta diversas lunæ phases libro 2. d. mirac. mort. Tit. 6. Tempore novi & plenilunii venas sanguine repleri, medullis Ossa, inde concubitus corpori tunc parum officere concludit Lemnius (l. 2. d. acc. nat. mir. c. 41. p. m. 263.) Calorem istum, Cephalalgia stipatum febrem dixisse aphrodisiacam aut potius spermaticam. Cur vero fundum petebat Scapuli materia Seminis? Eandem Urinæ instar pinguedinis experti Lemnius c. l. p. 287. Hugo Benensis Consil. 74 p. 64. aut crustuæ albicantis, ut in præparatione cremoris tartari semper & constanter supra natæ, nec fidere agitatam Henric. ab Heer Obs. 18. docuerunt. Aquositate, & id quod æreum fuit, forsitan Semini subduxit nimius Tabaci usus, pondus vero addidit pituitæ admixtio. Urinæ Chylosæ meminit Th. Bartholinus d. Hep. d. f. p. 54. Lactæ Rhodius ap. Schneider. l. 3. de Cathari. c. 7. p. 166. Symptoma quod Bieher vulgus vocat, quo Urina lac sere representans excernitur, Dracuz. d. Scorb. Tit. 9. p. 377. à Chyli crudi cum urinæ miscela orti statuit. In hoc nostro vero Chylum esse absolvendum, contra Semen potius fecisse paginam, corporis constitutio, ratio morbi & symptomatum, & menstrua evacuatio evincere videntur. *Christ. Friderici Germanni.*

Impotentia ab obstructione vasorum spermaticorum & seminis egressus per foramina quadam in parte dextra Epigastrica.

Vidi Anno 1656. Wurzenz in Grammatophylatio Rev. Capituli Wurzenensis scribam quandam, virum ann. 38. si rite recorder, gracilis atque cachecticæ constitutionis. Is Dn. D. Fortifredo Wellshio &c. aperiebat affectum satis mirabilem; satis etiam periculosum, ratione facultatis Generatricis, & insinuat consilium ejusdem anxie effugitabat.

Conquerebatur autem de Impotentia coeundi, non à flaccido verpo, vel vitio conformationis oriunda, quandoquidem urgebatur vehementissimis membri Erectionibus, sed potius, quod erectum penem, nulla subsequi voluerit seminis emissio: Pertulit hanc passionem per integrum annum, in casum semper sollicitando venerem, quo ipso tempore non parvam etiam virium jacturam perpeßus fuit, adeo ut ipsi Marasmo via jam strata videretur.

Natura seminis copia procul dubio gravata, alium interea querit exitum in parte dextra Epigastrica, tria foramina, instar minuti fonticuli, excitando, per quæ laudabile semen, quoties volebat, velut lac è papula exprimebat. Annulla curæ potuisset adhiberi hunc morbo, tunc

disputabatur, & plurimi stabant pro negativa, quod eventus etiam docuit, quandoquidem paulo post tæbe correptus, obiit.

Clarum ex hoc casu fit, quod naturæ omnium hominum, nullo utantur Doctore Hipp. lib. de alimentis p. m. 596. præsertim in excogitandis viis? pro excretionē retentorum; & Helmontius calculum meretur, quando in lib. de Vix. Rat. p. m. 64. §. 19. ita scriptum reliquit. Natura in homine est sapientior quovis Medico, magisque gnara suæ utilitatis atque damni, quam cuncta scholarum ingenia. Pauli Ammanni.

De Juvene de Impotentia suspecto, feliciter defenso.

Quinto Februarii anni hujus 1666. jamjam cum Deo finiendi, Vir Juvenis Dominus N. N. 25. annorum, constitutione Corporis Rhegmaticus, mihi, Medico suo, confidenter exposuit, quod forma & virtute virginis ejusmodi invitatus, erga illam castum in animo an orem conceperit, reciproque ab ipsa obtinuerit quem cum ætiori Matrimoni vinco necere, consentientibus Parentibus & consanguinitate propinquis, constituerent, relique eo nunc devenisset, ut nuptiæ celebrandæ forent, se præter expectationem naturæ suæ robore ditatum, veteri, ut ad præstandum debitum conjugale habilis sit futurus, utpote quod membrum excendæ veneri dicatum, omni vegetum & robustum, jam molli languore solutum experiat, ideoque hunc defectum prosteri, & vinculum istud cum cordiolo rescindere necesse habere. Hinc à me petere, ut hujus rei interpretem agerem apud eos, quos verbis suis fidem derogare dicebat. Ad quæ respondebam: Arduum hoc esse negotium, accurato mentis scrutinio subijciendum, ubi ante omnia ocularis membrorum genitalium inspectio requiratur, quam ut concederet, suam, & quamvis ob verecundiam invito, persuasi. Deprehendi autem illi, quoad externam formam, recte disposita, nisi quod flaccidam viderem Spinam virilem; pro ceteriori itaque censura hortatus sum, manu adnota erigere cum attentaret: non refragante, secuta quidem aliqualis penis intumescencia, sed haud rigida, quin flaccidior & languidior, ut Claustrum virginem referare, ac intimius penetrare potens esset. Quare cum coram pronubis non absolute pro impotente pronuntiavi, Consiliumque dedi, ut Medicam opem ad tempus experiri concederent, futurum forsitan, ut Natura commodis auxiliis adjuta imbecillitatem deponat, prælinum autem virtutis robur vicissim adipiscatur, præsertim cum reliqua Corporis constitutio firma sit & robusta. Illi vero regerebant, per se licere, Juvenem Medicam nãta usurpare vel omittere, neutiquam tamen obligatos se futuros desponsationi illius virginis renovandæ, aut minime concessuros, ut, virilitate fors robustiore facta, aliam ducat, antequam notificari virgini, ejusve Parentibus, vel agnatis Connubii contrahendi propositum, ac licentiam ab iis obtinuerit; quæ conditione posita tum discessimus. Ab eo tempore in peregrinas regiones Juvenis ille profectus, Herbipoli media ætate in febrem ardentem incidit adeo vehementem, ut de vita fuerit periclitatus, superato autem morbo ad patrios Lares rediit, ubi

ubi recollectis viribus notabilem corporis mutationem observans, se satis aptum nunc ad congressum & actum venereum exercendum futurum ratus, mihi istud latus expoluit, insuperque petiit, ut pro pleniori fide literas de mutato ejus statu conquirem testimoniales. Cui respondi, me petito non refracturum, si prius indicasset, quibus ex signis tantum fiducia attribuat redintegrata (pro sua opinione) naturæ. Ille stimulo ad venereos amplexus haud raro interdum nocturne se incitari, membrisque virilis erectione valida affici aiebat, quin somniantem interdum cum aptitudine & delectatione pollui continebatur. Cum iniret, an hæc vera essent, quæ enarraret? & an secum eadem literis hæc interenda non dubitaret? Omnia certa & non lucata jurato asseverabat. Pensitans igitur mecum, & probe examinans ab ipso prolata, maxime in re tam ardua, fallenti in presentium fortune & sanæ detrimentum cessuræ; cum quilibet præsumatur bonus esse, inculpatæ præteritum alias vitæ, qualis hic *ὁ ἴσχυρος* audit, laude commendatus, fidem eis adhibere non reculaui. Imp. imis quod haberet faveantes suorum verborum rationes phycas, quæ suspicionem impotentiae ab ipso removere sufficerent. Cum etenim diminuti coitus, & impotentiae ejusdem, suffragio Clarorum in Arte Medica Virorum, inter quos est Foresius l. 24. Observ. 18. pag. 516. variae quidem existunt, aut ad tres magis principales referri possunt, nimirum vel ad virtutem, potissimum vim imaginativam; vel instrumenta generationi inservientia, vel materiam spermaticam: quæ omnia diffusius explicare, temporis & chartæ angustia non permittit. Thonnerus Observ. Medicar. lib. 3. cap. de Impotentia pag. 194. e Felicis Plateri Observ. itatuit, impotentiae causas (scilicet naturales, de præternaturalibus, utpote fascino, incantamento, vel maleficio, hic nobis non est sermo) latitare in vasis spermaticis potius, quam exterioribus membris, utrum autem sit vicium organicum, vel intemperies vel obstructio, cum in abscondito, iudicium esse difficile. Atqui in hoc subiecto præter corporis status si rationis trutinæ expendatur, apparebit nulli horum vitiorum sive defectuum culpæ obnoxium esse, sed incolumi gaudere sanitate. Etate enim Adolescentis floret. 25. nativitatis annum vix dum egressus; laudabilior, quam ante perpeßam febrem erat, nunc præditus est temperamento, omnes partes præcipuas bene temperatas habet; intermedie partes nullo laborant morbo; vasa seminaria, testes, pudendum bene constituta sunt, id quod ex pollutione nocturna, diurna que ad amplexus venereos cum erectione pudendi canalis titillatio præsumitur. Si obijciatur, Anni terminum nondum præteritum esse, ex quo invariabilitatem ad actum venereum perficiendum falsus sit, unde ergo metamorphosis hæc tam repentina eveniat, quod jam potentem se pateret? Resp. Exuperantem in perpeßa febre calorem haud leve momentum mutationis facere dære potuisse: notum enim est ex Practicorum libris, quod lebris morbis frigidis curæ, cui sententia imprimis favet Hallerius in Schol. ad Hipp. aph. 20. Sect. 2. dum inquit. Calor quicumque fuerit, sive externus; sive internus, sive naturalis, sive præter naturam, curat morbos,

argumento est febrilis calor, qui morbos frigidos, & qui ab humoribus frigidis pendent, curat; rationem mox subjungit his verbis: Quia calor febrilis incidit, attenuat, ac discutit materiam crassam, frigidamque intemperiem, quæ pituitosi humoris causa est & effectus, ad calidiorem permutat. Hæc ille. Atqui impotentia maximam partem debilitati vel frigiditati mentis, pituitosa materia ad partes genitales constituenta, acceptam referre debet. Ergo novi aut inauditi nihil est, si naturæ transmutatio ab habitu pituitoso in meliorem & calidiorem per febrem istam secuta sit. Pro exemplo inserviat historia Senis cujusdam decrepiti apud Lorichium in Observ. Med. lib. 4. cap. 9. Obs. 2. Is octogenario major, cum priori conjugio defunctæ aliam, & quidem Juvenculam, annorum viginti quinque superinduxisset, è gravi periculoque morbo eluctatus, Senex ille tanquam rejuvenescens, vires tanto robore atque incremento recepit, ut vere e bene, veriusque quam fallax ista Ovidiana Medea recoxit Aëlacum, Juvenis, instar anguis alicujus, evasisse, senectamque omnem deposuisse tantum non videretur, sed re ipsa existeret; veritatem rei eventu comprobante. Convixit enim insuper aliquot per annos mulerculæ Juvenculæ ipse tanquam Juvenculus, &, præterquam quod distinctos numero filios procreavit deinceps, tam libidinosus etiam fortisque ea parte fuisse dicitur, qua viri sumus, ut mox Achillei æquipararet, uxoriq; vix ferendus, etiam Protechlo, quod ajunt, exhiberet se gratiosorem. Similem causam de quodam cano & edentulo Concionatore Dano rejuvenescente nova Francofurtensia nundinarum Autumnalium anni 1655. pag. 79. perhibuerunt. Exinde subsumi potest, quod si hæc in senibus contigerunt, cur non facilius in junioribus eadem accidere queant. Et forsitan in præfata nostri adolescentis ad erigendum membrum instituta exploratione, verecundia & timor haud leve obitaculum præbuerunt, quo minus voluntati obsecundaret veretrum, quia per illa animi pathemata spiritus revocati, erectionem impedire potuerunt; mirum enim est, secundum Pauli Zacchii Quæst. Medico-Legalium lib. 3. fol. 6. quantopere Animi passiones vehementes in re venerea operentur; unde Alex. Benedict. suæ Pract. lib. 24. cap. 11. Scimus, inquit, quosdam cum in venere conjugali essent vel promptiores, facta inter eos dore tristi mentione ita ab opere imperfecto solitos desurgere, ut veluti intermortuum langueretur genitale membrum, quosdam in coitu sordidum auditum verbum de venereo diverticulo deturbat, alios verecundia tenet, nonnullos metus ipse, tot modis suspenditur cum animo coitus. Quod de erectione membri absque illo clarissimus verbis explicat Horat. Augen. Epist. & Consule. Med. lib. 3. pag. 404. Medicum Judicem & arbitrum verbis sequentibus admonendo: Cave ne aberres, ex hoc actu (applico ad nostrum) concludens, nunquam antea erexisse, nec de cætero erecturum. Quia certe neque hominibus maxime venereis semper erigitur cum voluit. hoc quidem non est in nostra potestate. Et ut sententiam suam Augenus firmaret, addit: Repeto, ex eo quod quipiam aliquando non erigat, non tollitur erigendi potentia radio ten-

pore: alioquin omnia dirimerentur matrimonia, cum neminem esse sciam proutearq; cui aliquando cuiuscumodi non contingat calus. Hucusque Augenus. Concedo igitur, & credo, quod si amore reciproco fuerit potius noxer juvenis, per jus matrimonii castum ac legitimum, tum debitum conjugale sit solutus expedite, ubi elanguiscentem venerem imprimis excitabunt amplexus, quibus, monitore Forelto, subinde grata & formosa blandaque Coniux promorem maritum excipiat, cum, si Zacchiz l. c. min. pag. 8. verbis auctoritatem tribuimus, etiam calore naturali ad coitum destituti, a foemina interdum a formositate (& blandiens, excitati, ad coitum perfecte moveantur. Deum quæso, ut felix illi (si voti reddetur compos) fiat concors & æternus lætundo Amore læta cum sua nympha cohabitatio, inter humana bona maxime exoptanda beatitudo. Dabam Augustæ 27. d. Decembr. anni ad calum vergentis 1666.

(L.S. Luca Schrockius Med. D. & Reipubl. Augustanae Physicus juratus, Coll. Med. p. t. Dec.

Redintegratam sic sentiens naturam suam læta indolis adolefcens, primam sponsam ad novas iterato sollicitabat nuptias, sed cum responso illum non dignaretur, & sic tacite connubium refugeret, aliam virginem venientem, attentum præbentem, post causam ex literis hinc sufficienter cognitam, Ecclesiastici fori Iudice, matrimonio secum junxit; ex qua anni curriculo filiolum suscepit, paterque factus est. Pariter secunda ac tertia, in concordia conjugio, prole ditatus, sanitate inculcata is cum uxore sua fruitur. Luca Schrockii.

De Anæsthesiæ soluti Matrimonii causa.

Varias anæsthesiæ causas in utroque dari sexu Practicorum docent observationes, docet quotidiana experientia. Usitatissima apud Viros causa vel defectus est seminis, & partium ad feminis generationem facientium lætio; vel membri virilis, quod genitum semen in uterum deponere debet, vitium. In viro singulare hisce diebus videre exemplum mihi contigit. Accusabat juvenem quædam succi plena, cui nuper nuplerat, maritum, quod ad actum matrimoniale prorsus ineptus esset, coram Consultorio, & propterea vinculi solutionem petebat. Dominus Officialis loci hujus, ut ex officio in reverentem inquirerem, rogari me curat, sin ulque Coniuges ad me mittit. Examino uxorem, quæ causa querelæ in maritum esset, quæro; ipsa, nondum me ex eo tempore quo ei copulata sum, cognovit, respondet, imo quod magis est, nec digito quidem me tetigit; sed trunci ad instar immobilis semper in lecto jacuit: quæro, nunquid non salibus vel illecebris stimulum veneris interdum excitare tentaverit? Num non contrectatione mammillarum, vel pudendorum, vel suavis, maritalem testatus fuerit amorem? Nihil horum omnium quicquam factum unquam fuisse serio affirmat: quæro num illa non ad negotium conjugale ausam præbuerit? Non sui hoc sed mariti fuisse officium replicat; nam cum adeo eum insensibilem deprehenderem, cur

plus iusto ei me exponerem, vel ad amores invitarem, causam habui nullam. Devenio ad maritum, exploro genitalia, optime ea ut figura & magnitudine constituta invenio: de venenecio suspicari incipio; quæro, numquid unquam penis erectionem? ej. culationem sentiens? vel pollutionem nocturnam antehac senserit? pernegat omnia: nunquid ullam aliquam libidinem perceperit? insonnia venerea unquam habuerit? numquid virgines amplexando, vel oscula eis præbendo non summam perceperit amoris? nunquam se clandestinis amoribus deditum fuisse, nec virginum expectante conversationem? multo minus ullas veneris illecebras unquam amasse respondet. Cur ergo, inquam, uxorem duxisti? quia moris ita esse existimabam replicat; nec conjugale, quod nunc a me exigitur, officium, in rebus veneris itum esse putabam. Cum promptum cum deo ad matrimonii solutionem invenirem; quæro, cur tam facilis fuerit coram Consultorio ad solutionem? quia, inquit, odio me habet uxor, quæ si tranquille mecum vivere vellet, mihi esset exoptatissima. Cum ergo seminis defectum causam viderem impotentia hujus, quamvis in habitu athletico defectum talem mirarer, solutum fuit a Consultorio matrimonium. Joh. Schmidii.

De Singlari continentia exemplo.

Vir Nobilissimus & Clarissimus Joh. Chemicius, & c. abbas. Magistratus Gedanensi annis 45. a secretis, qui anno ætatis suæ 8. vere celebs in coelestem migravit patriam, inter alias præclaras laudes, probæ nimirum vita & eruditionis eximie, & hanc post se reliquit, quod miram vitam castimoniam coluerit; à prima quippe statim juventute à conversatione mulierum abstinuit, imo omnes occasiones vitavit, & datas pro animo superavit; neque impotentiam in eo arguere licuit, cum boni semper, & vegeti fuerit corporis, & de hoc gloriatus sapius fuerit, quod ad senam ulque senectutem morbi causa nullis opus habuerit remediis, unde de aptitudine nulla fuit dubitatio unquam: sed averatio a sequiori sexu erat insuperabilis, præsertim si vel virginem aliquam videret latevientem, vel famulam in ædibus suis domestica nympha exercentem, & æstivo tempore paulo liberius mammas exponentem conspiceret, cum præterire illam forte contingeret, averfa facie, & oculis, ne viderent vanitatem, in terram demissis exspuens. & phui, phui exclamans subito in mutuum se suum contulit; tanto magis laudandus, quod nullo facto voto talem observaverit ex sola pietate & Numinis Divini reverentia castimoniam. Non ea ei mens fuit, quæ stolido alicui, referente Diag. Laert. de vita & morib. Philos. juveni, qui audiente Pythagora dixit, malle sese cum mulieribus esse, quam cum Philosophis conversari; cui recte Pythagoras, & sues, respondit, libentius in cœno, quam in aqua versantur. Huic cum pijs & doctis conversari dulcius, quam illecebris sese exponere mulierum. Cippumsei vir quidam consularis Generosus & Magnificus J. E. S. Patronus mihi magnus erexit, quem ut memoria dignum hic addere volui: Joh. Schmidii.

Quem

citur, & in quod Deferentia vasa, postquam coiere inseruntur, seminis elaborationi præter alios interveniente. observavimus lapidem munitum: Non poterat semen hic vir, nisi paucum admodum aquosumque valde in coitu excernere, Dissectusque pro lapidis vesicæ extractione occubuit. *Marc. Donatus histor. mirabil. lib. 4. cap. 30.*

Vid.

INCUBUS.

Veneris libido in quibusdam nulla est à mala conformatione vasorum horum ab ortu quibusdam innata, quæ qualis sit in vivis difficile est discernere, nisi ex eo quod perfectis alioquin membris genitalibus, & nulla prægressa causa, ad Venerem tamen minime apta sunt: Et in mortuis lectio, quandoque vasorum semen deferentium, aut generantium absentiam aut ductum perversum, si in utroque præsertim hoc latere invenitur, sicut ipse deprehendi, vel aliud quid in causa fuisse patefacit. *Platerus prax. lib. 1. cap. 17.*

Nos in cadavere Monachi, cujus Testes in
adolescentia moderatam magnitudinem a natu-
ra erant adepti, procellu temporis ob votum
catholici, inviolabiliter per multos annos ob-
servatum, fere penitus contabuerunt, valaque
spermatice una cum semine ejus redundante
adeo aruere, ut exsiccatorum nervorum, seu
ligamentorum duriorum imaginem potius præ
se ferrent. *Vidus Vidius, junior de curatione mem-
brarum lib. II. cap. 2.*

ANNO 1640, disiectus est adolescens Epilepti-
cus, cujus membra generationi infervientia
erant contormata p. n. nam vasalimen deferen-
tia vix conspiciebantur, præparantia in uno la-
tere deerant, Testiculi intus iuere retracti.
S. Scholizius in miscell. curios. anni 1671. obs. 62

Inter eum utraque arteria spermatica ducit, quod sterilitatem affert in bene compositis corporibus, quæ partes genitales optime conformatas habent, fortiter attriungunt, semen excernunt, sed infœcundum quia vitali spiritu destitutum. *Riolanus Anthropograph. lib. 3. cap. 23.*

cap. 43. Mortuum secumimus qui ab utraque parte vasa spermatica ex emulgentibus venis & arteriis orientia habebat: Hujus semen cum admodum aquosum & frigidum esset, ob ferossi humoris copiam, generationi erat summe ineptum. *Don. Panarolus Pentec. 2. obs. 35.*

Retulit mihi Celeberrimus D. D. Theodor-
us de Mayerne &c. in ultima cadaveris hu-
mani dissectione quam suis manibus fecerat
Lutetiz, insolitam sibi & inauditam oblatam
fuisse sterilitatis causam, Calculum videlicet,
exactissime meatum illum claudentem, qui
à Prostatis in urethram dehiscit; per quem è
venis varicosis semen vibrante ejaculatione ex-
pellitur: quem quidem calculum, nonnisi vi, cum
partis aliqua laceratione extrahere potuerit.
Frid. Loffin. lib. 1. observ. 33.

Non in ~~Federico~~ Triviolo Mantuz, in Glan-
duloso corpore illo quod velicæ collo adnat

Incubus seu Ephialtes est gravis corporis oppressio, ac nocturna suffocatio, vocem interceptiens, & absurda super injecta molis imaginatione somniantem deludens. Illius itaque essentia in duobus potissimum consistit nempe respirandi difficultate, & gravi ipsi adjuncto insomnio.

De loco affecto eleganter admodum loquitur Clariss. Menjotius in suis dissertationibus pathologicis, cujus hæc sunt ipsissima verba. Facultates animales in incubo offenduntur, vel à succo aut habitu densiore, cerebri batum, à qua septem nervorum conjugationes, spinalisque medullæ truncus, enascuntur, obstruente; unde illiberalis succedit. *ἡ ἀπὸ τοῦ πυκνῆς καὶ* etiam à narcotica qualitate, abique ullis viarum obicibus, spiritus animales quodammodo vinciente, ac ex impigris & infidelibus, inertes segnelque reddente. Suspiriosa vero respiratio sequitur compressionem partium thoracicarum, ac præcipue diaphragmatis, ab humoribus, aut vaporibus copiosis atque crassis, seu inferne evectis, seu per se intra vasa stabulantibus. Neutra portio utarum nozarum, videlicet cerebri atque pectoris, seorsim, sufficit creando ephialti; sed ambas combinari opus est. Nam ductuum cerebri obturatio in incubo minus completa est, aut spirituum animalium *ἡ ἀπὸ τοῦ πυκνῆς καὶ* minus eximia, quam ut spiratui officere queat, cum ipsimet carotici pro voto aerem ducant. At nec vicissim septi transversi, aliorumve instrumentorum *ἡ ἀπὸ τοῦ πυκνῆς καὶ* constrictio ephialtem potis est invehere, nisi cerebro coactio, vis animalis in nervos exire prohibeatur, quia una cum respiratione & voce, universi corporis motus, & capropter commune movendi principium obleditur. 2. quoniam incubus perniciosum cerebri affectuum, ut apoplexiæ & epilepsiæ est *ἡ ἀπὸ τοῦ πυκνῆς καὶ*. Tandem quod ephialtici sat ægre expergiscantur, excitati vero, nec denipenitus discussa capitis plenitudine in errorem *ἡ ἀπὸ τοῦ πυκνῆς καὶ* aliquandiu perieverent. Concludamus ergo incubum esse velut monstrum *ἡ ἀπὸ τοῦ πυκνῆς καὶ* seu mixtum *ἡ ἀπὸ τοῦ πυκνῆς καὶ* pectoris conjunctum & cerebri memorata invaletudine. Verum de hac, aut simili ex parte opinione, hæc habet Clar. Willisius. Hæc opinio (haud magis verisimilis quam incubati conceptus) assensum non meretur; quippe nec ulla humoris istius circa præcordia aggesti, ante, aut post paroxysmum vestigia apparent: quin ubi hæc regio plurimum aggravatur, ut in phrensi, altissime aut hydrope pectoris, incubus non propterea, aut crebrius.

aut crebrius, aut gravius infestat: porro non constat quomodo materies in præcordiis aggesta, in somno tantum molesta fuerit. Quapropter affectus hujus ætiologiam longe aliam statuendam esse arbitror. Hic itaque arbitratur locum in hoc morbo unice affectum esse nervos è cerebello ortos, & ex parte ad cor tendentes; nam ipsius motu cessante, propter spirituum influxum pro tempore denegatum, sanguis in hujus sinibus, ac in vasis pneumonicis stagnans, ibidemque plurimum angustatus, magni quasi ponderis sensu pectoris regionem opprimit; quod item eo gravius videtur, quia una cum corde, pulmones, diaphragma, & thoracis muscoli, à motibus suis impedita, & quasi constricta, magno se se exerendi nixu laborant.

Differentiæ quæ incubum inter aliosque capitis affectus intercedunt per se abunde patent.

Causam Clar. Willisius reponit in materia quadam incongrua quæ inter dormiendum una cum succo nervo cerebello instillatur, quæ spiritibus in prima scaturigine torporem, live narcosin quandam inducens, eos mox à functionum suarum munis paululum cessare cogit; proinde ut ab altero velut Lethargo, intra cerebellum excitato, actiones vitales eclipsim brevem patiantur: quadurante, partim à præcordiorum obstrictorum lucta, partimque à sanguine in his plurimum aggesto, & stagnante, gravamen illud, ac velut molis incumbens sensus suscipitur; deinde quoniam cæteræ omnes totius corporis facultates à cordis motu dependent, idcirco hoc impedito & suppresso, illæ statim deliquia, aut inordinationes subeunt: præsertim vero quia sanguinis in cerebrum, pro spirituum animalium fomite, affluxus interruptitur, propterea mox horum effluxus in systema nervosum supprimitur; adeo ut laborantes dum molem pectoris imaginariam excutere satagunt, nec corpus, nec membrum aliquod movere possint; nimirum, quia spirituum (donec sanguinis affluxu destituuntur) irradiatio in partes motrices inhibetur: interim qui in cerebro resident, huc, illuc, latè phantasmata confusa, & ex molestia à præcordiis impressa, horrenda spectrorum insomnia concipiunt. Paroxysmus autem cito finitur, quoniam materies cerebello raro, aut nunquam alius insidens, facile excutitur, aut in sanguinem resorbetur. Quod autem in corde & diaphragmate tremores & vibrationes celerrimæ succedant, ratio est, quoniam hæc corpora, quamdiu à motibus suis cohibentur, exerendi se nixu laborantia, quamprimum restituantur, intra justos limites se continere nequeunt, quin totas vires simul exerentia, & nimis ætiosa, debitum officii munus excedunt. Hæc ex Viro Clar. fusius adduximus, quia ingeniose & admodum doctè naturam hujus morbi, ejusque causam explicant: unde jam cum vulgo lemuribus atque larvis tristitia ephialticorum visa, ipsis soporatis immitti stolidè non suspicandum, aut cum Plinio Faunorum in quiete ludibria vocitanda, aut ad alia superstitionis phantasmata recurrendum. Causa siquidem ab extra nullatenus accedit sed intus in imi ventris visceribus, & ipso sanguine accumulata, per vices inter dormiendum in cerebrum irrumpit, ibique tragicos parit effectus, jam ex parte memoratos, &

ulterius in morbi diagnosi mox describenda enarrandos.

Diagnosis ex historia à Clar. Diemerbroeckio allata, hucque jam adducenda, satis declaratur, Mulier quinquagenaria, inquit, boni habitus, carnosa, fortis & plerhorica, capitis gravitate & catarrhus ad pectus delabentibus hyberno tempore interdum obnoxia, hæc hyeme nullis catarrhis infestata, interdum bene sana, mente sensibusque integris vixit, sed nocte ad quietem composita, frequenter in somno nocturnis ludibriis afficitur: interdum enim putat se decemone obrui & detineri, interdum à magno cane, vel latrone corpori incumbente suffocari, adeo ut vix loqui, aut respirare possit; cumque se ab hoc onere expedire nititur, quasi fortiter detenta, non potest membra movere, tantaque anxietate premitur, ut se jam suffocatum iri putet: atque dum in illa lucta est, tandem difficulter & cum summa perturbatione interdum sponte evigilat, interdum à marito, obscuram, inarticulatam & anxiam ejus vocem audiente, e somno excitatur, moxque se in lecto erigens, aliquandiu celeriter respirare cogitur. Sape etiam contingit, ut postea ad loquium se iterum componens, in idem malum rursus incidat. Menses illi ante decennium ætatis ratione defecerunt. Ex hac incubi historiâ, integram ejus diagnosis continentem, patet illum nihil proprie cum epilepsia habere commune, & malè à quibusdam nocturnæ & munitæ epilepsie titulo insigniri. Incubus enim expers est omnis convulsionis, præter momentaneam illam celerem respiratio-nem facientem, quæ paroxysmum finit, cujusque rationem ex Clar. Willisio attulimus. Jam vero tota epilepsia in convulsione consistit: rectius itaque incubus exigua apoplexia dici posset, quandoquidem ejus natura, symptomata, atque causæ, morbo syderato quàm comitiali magis respondent, hicque in illam facile abit ut in sequentibus dicitur.

Incubus si sæpius recurrit, & si diutius persistit, in carum, apoplexiam, melancholiam hypochondriacam, imo maniam facile degenerat: obesos & pueros nonnunquam suolocat, adfertque Aurelianus ex Siliacho contagiosum & epidemicum incubum Romæ grassantem multos pestis instar jugulasse: hoc itaque sensu periculosus est affectus. Verum si rarerer occurrat, vel à crapula oriatur, discrimine prorsus vocat. Incubus qui vertiginem mentisque stuporem post se relinquit, formidabilis est, quia cerebri aliquam idiopathiam, aut impressionem in spiritibus & nervis nimium permanentem denunciat.

Indicationes sunt causæ antecedentis, si quæ addit, ablatio, cerebri & nervorum inde ortorum corroboratio, spirituumque per eisdem nervos ad cor & præcordia influentium exhilaratio & excitatio. Quibus omnibus providebitur, tum iis quæ in sequentibus, ubi de melancholicis affectibus, tum iis quæ supra in affectibus soporosis, caro, comate &c. affertur: seligendo scilicet ab utraque parte quæ magis apta videbuntur. Hic itaque toti hujus morbi theoricæ finem faceremus, ac continuò ad varias ejusdem curationes à variis Autoribus propositas pergeremus: verum in Lectoris nostri majus commodum non possumus quin prius inferamus quæ doctè super hoc argumento scripsit Clarissimus

Bellini suo de morbis capitis tractatu. Sic itaque ille.

Ephialthes Conjuncta.

Imaginatio alicujus incumbentis plerumque monstri, vel Dæmonis, qui premat, Venerem exerceat, suffocet: vocis interceptio, corporis immobilitas, somnus. Experrectis subito evanescent omnia.

Succedentia.

Non raro apoplexia, epilepsia, insania.

Quoniam incubus semper invadit in somno, ac tum excitatur imaginatio alicujus incumbentis, qui premat, Venerem exerceat, suffocet; excitatur igitur in somnis species cujusdam lædenti, & si enim excitatur species exercentis Venerem, quia tamen illa cum pressione, & suffocatione conjuncta est, quæ summum nobis affert discrimen, & exercetur vel a monstro, vel à malo Dæmone, quæ à nobis concipiuntur, ut maxime lædenti, concipi Venus illa non potest, absque eo quod excitetur species summi discriminis. Incubus igitur est cum excitatione speciei summum discrimen repræsentantis, adeoque timorem maximum incutientis, & hinc ipsam maximi timoris speciem excitantis: & hæc species maximi timoris in incubo excitatur subito, cum in incubo subito occurrat animo comprimendi illius species; igitur necessario producet in corpore quicquid conjunctum est cum summi alicujus discriminis timore subito excitato, sed summi alicujus discriminis subito excitatus timor omnem corporis motum intercipit; igitur in incubo fiet corpus immobile toto autem corpore immoto nec moveretur pectus, & hoc non moto suffocatur, nec loqui possumus; igitur in incubo vocis suppressio, & suffocatio etiam terribile illud non concipiatur, ut suffocans. At vero multo gravior erit suffocatio, si terribile illud etiam ut suffocans concipiatur; per suffocationis enim speciem cogentur magis musculi, unde motus eorum quasi tonicus validior, quam si à solo timore cogerentur. Patet igitur ex his, experrecto homine quicquid est in incubo statim evanescere debere sopita per sensus externos specie comprimendi illius, à quo excitabatur species timoris subiti, & magni discriminis, adeoque incubum nihil aliud esse, quam somnium, & partem ipsius potissimam sitam esse in specie rei noxiæ, per quam excitatur species timoris, ex quo immobilitas, & reliquæ incubi affectiones pendunt, ut exposuimus. Quemadmodum igitur somniorum omnium causa potissima est casus excitans hanc, aut illam speciem fortuito, prout particula perspirationis nervis occurrentes, vel per eorum liquidum se agentes ipsum in has, aut illas ondas, vel nervos in hunc, aut illum tremorem agunt, ita casus excitare aliquando poterit speciem alicujus incumbentis, gravantis, monstriosi &c. cum qua specie quia conjuncta est, species timoris subitum aliquid, ac summi periculi obliquentis excitata specie illius terribili, hæc eadem necessario excitabitur, & incubo nos præhendi dicemus. Quia vero ex species facilius à perspirationis particula excitantur, quæ sunt facillioris motus,

& illæ sunt facilius mobiles, à quarum motu vel per brevius ipsarum temporis desistimus, ut puta quas dimovimus cogitando &c. antecedenti die, vel antequam cubitum iremus, vel quibus indormivimus, vel quas pluries dimovimus aliquando, etiam deinde per longiusculum tempus eadem quiescere permiserimus (in utroque enim casu nervi ad circumferentias flexionum servant facilem ad motum dispositionem oportet, in primo quidem ob brevem quietem, in secundo vero ob diuturnam, & milites repetitam flexionem); igitur si eodem die, vel cum in cubitum, Dæmonem, vel quid simile cogitabimus, vel aliquot ante diebus ejusdem meditatione diutius, atque attentius incubuerimus, facile in ejus somnium, seu in incubum incidemus. Quod si meticolosi fuerimus, multo facilius eadem excitabitur species: semper enim dubitabimus, atque verebimur, ne terrifici illius species occurrat, & ex eo ipso quod verebimur, ne excitetur, excitabitur subito, cum vereri nequeamus, ne concipiamus determinatum aliquid, quin ipsius illius rei, quam nollemus concipere, species excitetur, unde semper obversabitur animo interdum species illius terribili, & facile proinde excitabitur etiam in somnis. Quæ incubi generatio nihil habet cum humoribus, sed cum quadam quasi assuetudine concipiendi dæmonem, vel quid simile conjunctum. Quia vero species rerum timorem incutientium possunt esse ex earum genere, quæ excitantur, & sunt momenti minoris, hinc fieri poterit, ut quando incubus casu excitatur, proveniat ab his humoribus, à quibus perspirant particule momenti minoris, hoc est humoribus crassis, lentis, frigidis, siccis: ac tum provenire potest tanquam à causa remota ab abundantia ejusmodi humorum, à quibus particule minores momenti perspirant, quæ non nisi species minoris momenti trementes excitare possunt. Rursus quoniam timoris species per motum tonicum, seu perpetuam contractionem musculorum liquidorum fluxum intercipit, & hæc crassescunt, tonescunt, & frigidiora sunt quiete, vel motu magis lento; igitur incubus per assuetudinem productus si sæpius, ac multoties recurrat, poterit sanguinem ad majorem crassitiam, lentorem, & frigiditatem disponere, atque adeo idem ita dispositus particulas perspirabit minoris momenti, quæ proinde species solum minoris momenti excitare pore poterunt, seu incubi imaginationem in somno facilius, hoc est, frequentius, singulis nempe noctibus semel, aut pluries obliquare. Quia vero species illius terribili concutit, seu in vividum tremorem agit nervos, adeoque partim excutit eosdem, partim motu prohibet, ne quod apponendum esset humidum apponatur, hinc sponte expergiscimur non secus, ac ab alto somno expergiscimur per vividum sonum, percussionem &c. ob similem concussionem nervorum eosdem excutientem, & concepto motu impediens ne humescant ulterius. Quia vero à crassis humoribus infarciuntur vasa, adeoque ipsorum amplitudo fit major, pia igitur mater ab his infarta comprimere poterit totum cerebrum, ita ut apoplexia invadat. Incubus autem repetitus vel crassos humores supponit, vel eosdem ad crassitiam disponit, ac tandem omnino crassos reddit; igitur ab incubo apoplexia. Ad-

epileptici ex ungula alcis ꝑ. aq. rorismar. ꝑ. i. M. pro una dosi horis matutinis exhibenda.

Vel ꝑ. Bezoart. de cornu Rhinocerot. ꝑ. i. essentia rorismar. ꝑ. j. aq. menth. ꝑ. ii. M. utere sicut præcedenti.

Vel ꝑ. Specier. dialunæ ꝑ. i. conserv. flor. cinnam. ꝑ. i. essent. rorismar. gut. xx. M. Dosis mane & vesperti ꝑ. ii. *Hermann. Nicolai Grimm Compendii Medico-Chymici lib. i.*

In incubo 1. Evacuandus est stomachus & primæ viæ. 2. Propinanda medicamenta antiepileptica seu convulsionibus appropriata.

Inter evacuantia vomitus obtinet primatum; Inter vomitoria vero excellunt infusa antimoniana & mercurialia. Modus infundendi omnibus est notus.

Sinolimus vomitorium propinare, ut ut vomitus sit optimus, saltem instituat evacuationem per inferiora cum extr. ellebor. nigr. & mercur. dulci in forma pilulari, quæ in epileptico insultu est experta.

Ꝓ. Extr. ellebor. nigr. mercur. dulc. an. gr. xv. scammon. sulphur. gr. 2. vel 3. extr. trochiscor. alhandal. gr. i. cum s. q. olei destill. succini f. pilulæ purgantes stomach. & cephalicæ. Adspargantur pulvere succini præparati.

Alias etiam infusa sennata sunt in usu; item massa pilular. officinal. de lapide lazuli commendatur a quibusdam.

Inter appropriata hic convenientia præ exteris palmam refert pœonia, cujus rad. sem. & flor. sunt in usu frequenti: sive radix inundatur potius; sive ex seminibus fiat emulsio; sive ex floribus fiat tinctura. Huic adjunguntur nonnulla alia in epilepsia usitata. flor. stœch. id. lavend. anthos.

A quibusdam pulvis sinaragdi præp. contra pavores nocturnos, & contra incubum insigniter commendatur: Quibusdam in usu est, ut dum cubitum eunt theriacam in aq. pœoniæ præervationis gratia assumant. Item oleum rorismar. succin. saliv. cinnam. & similia per sacchar. in electosacchari formam redacta, & sub introitu lecti assumpta commendantur. In primis tamen pœonia mas & semina ejus singulariter commendantur, ac præcipue si ex his fiat emulsio. Expertum etiam est remedium si passulis majoribus indatur aloë: si scilicet passulæ majores excavatz, seu exemptis acinis impleantur aloë optima ciceris parvi magnitudine, quarum passularum nonnullæ semper in antora duabus horis ante cibum assumptæ curare cretè dicuntur incubum, modo aliquandiu continuetur remedium.

Zacut. Lusitan. lib. 7. Medic. Princip. exemplum taliter curati refert: Aloës scrupuli duo passulis indendi, & tamdiu earum usus continuandus donec omnes assumptæ sint.

Pilulæ alephangin. ur̃i ex Zacuto notum est, quod arceana ebrietatem, ita in incubo laudantur si earum v. vel vi. una altera ve hora ante cibum assumantur: Loco harum pilularum substitui possunt pilulæ sine cura Cyriaci Weberi, quarum descriptio vid. in Pharmaz. August. Class. 6.

Anisum quoq; appropriatum est in incubo, si scilicet ejus semen in introitu lecti comedatur. cum præterea mirifica præstet in somnis truculentis & turbulentis, si olei ejus aliquot guttæ cum alio permixtæ post cœnam assumantur. In primis pavores in pueris potenter curat. *Michael Ettmullerus i. Collegio Practico.*

CONSULTATIONES.

Generosus & strenuus D. Abrahamus Schönnichel equitum in exercitu Imperatorio Magister ebrietati deditus, quoties supinus decumberet, sub initium somni onere gravissim. os premeret, interdum ab hoste invadi & quasi strangulati somniabat, ita ut neque clamare, neque se movere, neque fugere posset, donec tandem multo labore & conatu de somno expergisceretur.

Incubus quem signa præsentia manifestè detegunt, a levi obstructione meatum in cerebri, qui ad initium spinalis medullæ excurrit dependet; quatenus spir. animales obstructis viis ad organa sensus & motus libere deferri nequeunt. Obstructionis hujus causa non est humor, sed vapor, cito namq; fit, & cito desinit: vapor iste a pituita viscida & crudis humorib. in hypochondriis & circa præcordia hærentibus elevatur. Quoties enim per crapulam & cruditatem, vel alius de causis turgescit & movetur, diaphragma & pulmones comprimunt, inde in cerebrum delatus nervorum principium quodammodo obstruit, motumque thoracis denegato spirituum animalium influxu impedit, quo impedito & respiratio & vox intercipitur, & phantasia vilis tritibus turbatur. Levior est obstructio, alias enim carum vel apoplexiam induceret.

Invadit sub initium somni; quatenus hoc tempore vapores crassiores majori copia ad caput elevantur.

Cum supinus decumbit æger, quia promptior tunc est vaporum ad caput adscensus, qui ipsi & facilius in nucham & posteriores cerebri partes & medullæ spinalis principium feruntur, cum meatus in illo decubitu non nihil deprimantur.

Multo labore & conatu expergiscitur, quia vapor crassior est & narcoticæ qualitatis particeps.

Curationem difficilem fore prædixi, non tam morbo, quam intemperantia ægri territus. Severius itaque monui, ut ab ebrietate, repletionem & crapula sibi in posterum caveret, vini potentis & cerevitiæ crassioris valde quæ lupulæ usum, cibosq; flatulentos & vaporosos de vitaret, sobrie frugaliterque viveret, parcius cenaret, nec à sumptu cibo ad somnum nisi elapso trihorio se componeret, supinusque nunquam decumberet.

Ad ventriculum primasq; vias à pituitosi humoris infarcto liberandas exhibui decoctum meum laxativum, Hinc ob plethoram ex cephalica brachii sanguinem detraxi. Mox ad materiam viscidam, lentam & crassam initionem, attenuationem, & præparationem, mixturam sequentis singulis matutinis uncias tres exhibui. Ꝓ. Aq. betonic. hyssop. an. ꝑ. iii. fenic. saliv. an. ꝑ. ii. syr. de beton. & de hyssop. an. ꝑ. ii. oxymel. simpl. ꝑ. iii. M. Pro electiva purgatione præscripsi pilulas.

Ꝓ. Extr. agar. ꝑ. j. panchymagogi Croll. ꝑ. j. olei still. fenic. gut. 3. M. f. pilulæ nu. 13. de aurentur. ad revulsionem pediluvia militui & frictiones, postmodum & saphænz sectionem.

Pro roborando ventriculo & cerebro commendavi diacorum tribus ante cibum horis sumendum. Conservam item flor. tuncz cum confectio. alkermes, essentiam ambræ, rorismar. magister. corallior. perlar. &c.

Ad reprimendos vapores à passu, ad cubitum ituro dedi tragacam. Ꝓ. Sem. coriandr. præp. ꝑ. v. pœoniæ ꝑ. i. corallor. rubr. præp. ꝑ. i. olei still. carui gut. x. ol. nuc. mosch. gut. vii. rotul. man. Christi perlat. ꝑ. i. M. f. tragac. Ad

su semen, vel corruptionem, vel saltem calidam & acrem qualitatem concipere possit; & præterea quia ventriculi cerebri, temporis spatium, majorem imbecillitatem atque laxitatem contrahunt, sicque facile & vapores & humores admittunt: unde etiam facile & Epilepsia & Apoplexia succedere possent, in hac Juvene, succis & copioso sanguine redundante. Lethalis enim nonnunquam affectus iste observatus est in pueris, & ob eis derepente suffocatis, prout Aurel. epidemicum & perniciosum incubum Romæ grassantem describit.

Quamprimum itaque huic malo occurrendum, ut consulunt Aëtius, Paulus, & Orib. Curatione, scil. vaporem discutiendo; & Præservatione, ejusdem regenerationem inhibendo. Id autem præstabitur, humorem evacuando: Partem mandantem corrigendo; & errorem externum auferendo.

In accessione itaque Virgo leniter à somno excitanda, compellatione, vociferatione, vellicatione, corporis frictione, & exufflatione pulv. in nares ex Iride, & Nigel. parati, ad sternutamentum excitandum; in qua rem, habeat penes se in auxilium custodem famulam.

Pro præservatione, præmissio leniente, sanguis erit ex brachio mittendus, tempore æque distant ab utraque, præteriti nimirum & futura menstrua purgatione; corpus enim est plethoricum, sanguine & humore abundans. Quod si menstrua non satis copiosa fluere, saphena quoque aperienda. Perseverante vero affectu pluribus mensibus, repetenda erit ex brachio eadem sanguinis missio. Frequenter sub ingressum lecti adhibeantur partibus internis frictiones asperæ, atrox ligaturæ, & lotiones aquæ calente.

A Pharmaceutico fonte desumenda Lenientia, Præparantia, Purgantia, Discutientia, Semen Extinguentia, & a Proprietate juvantia.

Leniens esse poterit, Potio ex Man. clarif. vel Lenit. cum Lact. Præparantia primo erunt Julap. acet. cum syr. de Cort. Cit. ad. ʒiii. sine diluto quinque diebus, repetito deinde leniente superscripto. Præparantia postmodum ita præscribenda.

℞. Decoct. cich. borrag. endiv. violar. nymphetz, portul. aut plantag. lact. ʒi. Succ. depur. Pom. dulc. succi lim. an. ʒi. m. pro syr. & sic pro aliis.

Vel ℞. Aq. still. nymphetz ʒiv. Lactucæ ʒiii. Conf. de acido Cit. succi lim. ʒi. m. pro syr. & sic pro aliis. In quorum usu persistendum quindecim saltem diebus, atque in horum intermedio, sicut & in fine, purgans erit exhibendum hujusmodi.

℞. Pot. ex Man. clarif. ʒvi. addendo infus. consuetæ Agar. trochis. ʒii. Rhab. opt. ʒi. Spicz gr. vi. & f. p.

Vel ℞. Fl. Cass. rec. ext. ʒvi. Elect. de succo ros. ʒii. Diaphen. ʒi. m. f. b. quibus superbibat Aq. Necerianæ lib. ii. Absoluto autem syr. usu, Pilulæ hujusmodi exhiberi Poterunt, ut capitis quoque ratio aliqua habeatur.

℞. Pil. Aur. Coch. præpar. an. ʒi. Mastich. ʒi. m. refor. Pil. cum succo ruta, & aur. quibus pariter superbibat Aq. Nocer. ut supra.

Caput purgare opus non esse videtur in casu nostro: cum caput ab utero & ventriculo vaporosam materiam suscipiat nihilominus, si per u-

res ducatur pulvis ex Major. Iride, & Nigel. paratus, reliquum vaporosæ materiæ discutit, & caput quoque nonnihil roborari poterit.

Interim semen extinguentia in usu diuturno sint. Sic mane jejunæ comedat Conf. e Fl. Nymph. Viol. vel sem. Lactucæ sacch. incrustata, vel lactucam sacch. conditam, quibus superbibat cyathum aq. still. Lactucæ, aut jus lactucæ alteratum, addito quoque lim. succo. Comedat in cena acetaria, vel ex lactuca, vel ex portulaca, vel ruta hortensi, vel ex omnibus simul nullis parata, & aceto copioso condita.

A proprietate juvare unanimis omnes Medicinæ Principes asserunt, Peroniz nigre fructus, si gr. xv. trita devorentur, & aq. ejusdem Peroniz superbibatur; quod genus remedii à plurimis quoque recentioribus admittitur. A Chymicis commendatur tinct. Corall. Magist. Perl. Extract. Peroniz, & Visci querc.

Inter externa, Rad. peroniz è collo suspendenda, Corallia rubra, Chrysolithes, Malachites lapides sinistro brachio gestati; Cucuta item ex pelle lupina noctu capite gestata.

Vicius ratio debet esse comuncto tenuior, attenuans & flatus discutiens; quare omni. flatulenta & vaporosa vitentur. Cena frugalis erit maximum, & potissimum remedium; imo, si quandoque ab eadem abstinerit, paroxysmum præcavebit. Potus sit Vinum album, aquo-um, & cena claudatur Cydoniato, vel Conf. Rosar. live Abiant. si ventriculus non omnino bene se habeat. Vigilet a cena saltem duas horas, & supinum decubitus vitet. Se exerceat in reb. domesticis. Bis in mente lili. matricinam sub cœnam assumat, & consueto macri antino vivat. *Raym. loq. Fortis Consult. & Resp. Medic. T. i. Cent. i.*

Vir quadragenarius, boni habitus, qui diu ebrietati & ingluviæ incussit, inter diu bene se habens, & mente ac sensibus integer, ubi sub noctem se ad quietem componit, frequentissime noxurno quodam ludibrio afficitur. Putat enim se in somno interdum viâ venetem sollicitari; interitum à magna mole, vel homine incumbente suffocari, adeo ut vix loqui aut respirare queat; sensibus stupefactis, non tamen ademptis. Cum se movere cupit, maxima accedit anxietudo; qua summo opere perturbatus, tandem evigilat. De capitis gravitate etiam interdum conqueritur.

In hoc ægro afficitur cerebrum secundum illam partem, unde nervi respiratorii originem ducunt; & hinc etiam afficiuntur musculi thoracis ac pulmo: quod ex læsa respiratione, & capitis gravitate est manifestum.

Morbus, qui ipsum divexat; est incubus: sive intemperies sanguinea & pituitosa cerebri, quæ meatus ejus, in nervos respiratorios desinentes, in somno frequentissime angustans, insomnium excitat, quo ægro, ab incumbente vel strangulante aliquo corpore, respiratio & vox præcludi videntur.

Causa præcatartica, unde hic morbus primo originem duxit, est ingluviæ & ebrietas, quibus æger noster diu fræna laxavit. Hinc magna copia humorum sanguineorum & pituitosorum in ejus corpore fuit genita: quæ antecedens hujus morbi est causa. Eaque in vapores soluta, ac in cerebrum copiosius delata, illudque in somno nimis gravans, & meatus nervorum respiratorio-

rum angustans, spirituumque iustam in eos reciprocationem impediens, continentem, ejus, & symptomatum, constituit causam.

De causa Incubi sic commutatur Clar.

Craanen.

Hic morbus oritur, cum vapor aliquis crassus abdomen impleverit, & distendat, qui sua crassitie avolare non potest, sed calore excitato totum abdomen distendit, quare etiam diaphragma sursum premitur, & ideo non tam commode deorsum trahi potest, præsertim in somno, ubi propter minorem influxum spirituum animalium minus vehementer inflatur, & deorsum ducitur. Sic vidi hydropicam alias sanissimam, quæ moriebatur, quia casu fermentatio producebatur in aquis in abdomine existentibus, tunc vapores crassi excitati abdomen distendentes, & diaphragma prementes, tam incommodam fecerunt respirationem, ut intra horæ spatium respirando defatigata, diem suum obierit.

Altera causa hujus affectus potest latere in musculis abdominalibus, qui inspiratione extrorsum debent propelli; cum enim diaphragma deorsum premitur, omnia viscera in abdomine contenta loco suo movet, quæ necessario abdomen debent dilatare, quare musculi abdominalis debent convexum corpus componere, & extra situm vulgatem propelli: hinc necessario longiores debent fieri, & tubuli intra fibras debent angustari, si jam asueverit, sit acrimonia quædam existat in musculis abdominalibus, quæ nervos vellicando multos spiritus in illos alliciat, necessario inflantur, & distenduntur, quare breviores redduntur, & non possunt satis commode cedere visceribus in abdomine contentis; hinc etiam diaphragma minus deorsum potest trahi contra nitentibus abdominalibus visceribus.

Hinc primo, cum anima istam difficultatem sentit, sic ratiocinatur; semper cum pectori & abdomini aliquod pondus incumbit, cum respiratio lædatur: ergo reciproce, cum impræsentiarum respiratio impediatur, pondus quoque corpori incumbet, & in eo fallitur quæ maxime.

Secundo cum abdomen nimis extrorsum premitur, etiam minus aeris in abdomen intrudit, quare sanguis solito modo non refrigeratur, sed magis fervidus ad sinistram cordis ventriculum deferitur, hinc ibidem majori vi ebullit, majorique vi & motu in arterias ingreditur, & plures velociorefque spiritus ad caput deferuntur, & in varia membra influunt, & homo quædamtenus expergiscitur, sed quia statim omnes circumstantias non rite examinat, ideo confusa & anxie cogitationes ad tempus in anima manent, donec plane mori fuerint spiritus in omnia omnino membra, & circumstantias conuectens, anima se somniasse perceperit.

Causa incubi etiam hæere potest in valvulis, quæ a musculis respirationi intercurrentibus in musculos antagonistas diaphragmatis spiritus transmittere debent; cum nempe illæ clauduntur (& tunc spasmi ejusdem species hic morbus est) & ita spiritibus transitum vel partim vel omnino prohibent: hinc inspiratio, si non in totum aboleatur, saltem diminuitur, & depravatur: secundo, sanguis è dextro cor-

dis ventriculo in pulmones egressus, non satis coagulatur ab inspirato aere, quia respiratio impeditur, ideoque in ventriculo cordis sinistro vehementius ebullit, & magna vehementia quaquaversum expellitur, atque sic in arterias capillares vehementius tendens, & eas quoque una cum venis capillaribus sanguini implendo, ruborem in facie producit, (quod omnes experiri possumus, si tantillum respirationem combicemus;) tertio, vehementi ista rarefactione cordis palpitationes & anxietates producit: quarto, vehementi sanguinis in cerebrum impulsu spiritus copiosiores generantur, & hinc homo evigilat.

Quod hic morbus ab ingluvie, & ebrietate producat, non universaliter verum est, nam etiam homines temperatissimi hoc morbo divexantur. In diaphragmate ab anterioribus in anatomia veritatis inveniuntur pori, qui facti sunt, cum diaphragma adhuc tenerum fuit, qui postea conservati sunt, quia abdomen naturaliter vaporibus scatet, ideo cum diaphragma deorsum trahitur propter angustiam ibidem factam, necessario quidam vapores per diaphragma in cavum pectoris delabuntur, quorundam aliqui etiam in pulmones penetrando cum aere expirato extra corpus propelluntur, cum diaphragma sursum iterum propellitur; quidam vapores vice versa à cavo pectoris per diaphragma in abdomine progrediuntur; si ergo aut in vapores nimis crassi fuerint, aut pori nimis parvi, evidenter respiratio impeditur. *Hactenus Clar. Craanen.*

Dum enim ab humore vaporoso, meatus nervorum respiratoriorum, in somnis occupante, respirationis difficultas, & inde magna molestia, ergo nostro oboritur: hinc spiritus animales in ventriculis cerebri fortius dilatati, & sensorium commune a superioris cerebri pressione, omnia insomnia, omnesque cogitationes alioqui impediende, liberantes, ipsi imaginationem excitant; quæ, quia veram molestiam istius respirationis causam in somno excogitare non potest, ab invadente aliquo sibi fauces ac thoracem magna vi comprimunt, putantque sibi præcludi, imaginatur, Ille autem magno conatu, ab opprimente pondere vel homine invadente, se, ut putat, in insomnio expedire laborans, præ imaginari periculi timore magnopere angitur; & quia nervi tactorii, per totum a subsidentis cerebri mole compressi, propter hujus insomnii inquietudinem parum tantum patent, idcirco tactus ipsi, in isto agitando corporis conatu, stupet. Conamine vero isto laborioso diutiuscule perseverante, spiritus animales in ventriculis cerebri vehementius dilatantur, & novi è corde tam copiose eo propelluntur, ut non tantum sensorium commune, sed etiam ventriculi cerebri & nervi cerebro subjecti, à pressione & subsidentia liberentur, ac humores vaporosi, qui nervos respiratorios angustabant, discutiantur; atque ita æger noster, magnopere insomnii istius ludibrio turbatus, tandem evigilet, & ab ista respirationis difficultate liberetur.

Et quoniam semen copiosum in partibus genitalibus, ex copioso sanguine ab ingluvie & ebrietate natum, quod venerum insomniorum cogitationes, suo peculiaris temperamenti motu,

ti motu, sæpe excitare solet, nonnunquam in ipso redundat; ideoque molestiam respirationis in somno percipiens, interdum ab invadente quopiam se vi ad venerem iudicari & cogi somniat.

Metus est, ne hoc malum ingravescent in ipso paroxysmo ipsum suffocet, vel sanguinem in ventriculos cerebri, aut ejus substantiam effundendo, vel carotidis arterias, vel plexum choroidem, aut eorum poros obstruendo, apoplexiam, vel carum, vel alium similem gravem cerebri morbum agro nostro accersat: ideoque tempestiva Curatione, hujusmodi mala sunt præcavenda.

Eaque tota in causa præcatartica, antecedente, & continente tollenda, & intemperie corrigenda, versabitur.

Primo itaque talem sumat haustum jejunis.

M. Spec. diaturbith cum rhubarb. diacarthami, an. ʒi. Cremor. tartari ʒj. Scammonii gr. 12. Cerevisiæ tenuis q. s. M. F. Potio.

Protridie aperitur ipsi vena in brachio dextro, & sanguis educatur ad uncias decem.

Postea præscribatur hoc medicamentum:

M. Rad. acori, angelicæ, pæoniz an. ʒi. Fæniculi, petroselinii an. ʒj. fol. betonicæ, fumariz, cucurbitæ, scolopendriz, acetosæ an. m. j. Hyssopi, endiviz, borragin. an. m. f. Sem. anisi, fæniculi, an. ʒiii. cymini an. ʒj. Decoquantur in aq. communi ab lib. j. f. Addendo sub finem decoctionis fol. fenniz ʒi. f. Rhubarb. agarici, jalappæ an. ʒiii. Cremor. tartari ʒiiij. Colaturæ adde syr. de cichorio comp. cum rheo ʒj. f. F. Apozem. de quo sumat quotidie ʒiv.

Corpore his universaliter purgato, utatur erithinis & apophlegmatismis, & sternutatoriis, jejunis, ad particularem capitis evacuationem instituendam.

In nucha, vel alterutro brachio, excitetur fonticulus, diuque apertus servetur.

Interim hoc utatur medicamento:

M. Spec. diarthod. abbatiz, aromatici rosati, diambiz, diamusci dulc. an. ʒj. Dissolutis in aq. betonicæ adde sacchari albiss. ʒii. & F. Confectio in tabulis, de quibus sumat ʒij. vel iij. post singulos pastus.

Et per plures dies sumat pzoniz maris semina xv. pulverisata, & aqua betonicæ mixta.

Nocturno tempore hanc cucupham gesser, capitis tegumento inclusam.

M. Cortic. citri sic. ʒi. Rad. cyperi ʒiii. Fol. rosmarinii, majoranz, betonicæ an. m. f. fl. livenduz, rosmarin. salix, stæchad. Arab. an. p. j. Cinnamomi, cariophyllor. maceris an. ʒi. F. Pulvis, qui excipiat cotone moschato, & cum panno serico interposito formetur Cucupha. Singulis septimanis his utatur pilulis; mane jejuno ventriculo:

M. Fil. cochiarum ʒi. Extracti catholici gr. xii. Scammonii gr. iv. Cum syr. de stæchad q. s. F. Pilula N. vii.

Vesperis. ab ista purgatione, sumat theriacæ dragmam unam, cubitum iturus.

In istius ratione aer sit moderate calidus, potus. Cibus sit facilis digestionis, bonique succi, non fatulentus, hyssopo, seipillo, saureia, aliisque attenuantibus conditus. Potus sit cerevisia tenuis, vinum tenue & parvis sumtum. Cæna sit valde frugilis. Viret omnem crapulam & ebrietatem, Corpus tempestive & moderate exercetur. Inter carnem & somnum res ad minium intercurrant horæ.

Decubitus hæc in alterutro latere, nunquam sit supinus. Noctu fidum adjunctum habeat hominem, qui lætæ antem & quæstantem mox capere faciat. A ius res on deat natura vel arte. Affectus animi sine peccati. Hæmorrh. apud Theodor. Crænum Medicationum lib. .

Anatomica inspectio.

Academicus Oxoniensis, hydrope pectoris extinctus postremo morbi decursu somnum nisi prona facie & inclinato capite capere non potuit: Si enim capite in pulvinar reclinato somno se componeret, intra tertiam horæ partem horrendis in omni & terribus tristis semper exilavit, quin & Tremore cordis & ejusdem oppiessione maxime diu postea afflictus fuit.

In cerebro post mortem aperto ventriculi aqua summe distenti reperiebantur, nulla autem præterea notabili culpa in toto capite apparuit.

¶ Novi quendam Incubo olim maxime obnoxium, virum alius robustum & laus sanum, qui per duos annos nunquam in dorsum conversus dormivit, quin simul affligito corripere, adeo ut necesse haberet servum contubernalem in eodem lecto decubentem admittere, qui statim ac gemitus & suspiria, quibus affectus iste incipere solebat, exaudiret, ipsum in latum alterum converteret, quo factum est semper ut intuitus illi præstarentur.

Cum ventriculus quartus cerebello subiectus multo declivior & magis in profundo situs sit quam reliqui in cerebro, & quam ipsum etiam infundibulum, ita eo sit ut lymphæ in ventriculos cerebri & plexu choroidæ secreta, in dictum ventriculum reliquis magis declivem, potius quam in infundibulum defluat, præsertim si capite reclinato somnum quis capiat, Ex quo humorum decubitu cavitæ illa plurimum repletur, & consue agitatur ut ponderis ejus sensu nervis præcordiorum communicato, sæpe cordis oppressio & Incubus inducantur: Atque adeo solenne hydrocephalis fere omnibus ut nunquam supini impune dormiant, quin in latum hoc aut illud decumbere cogantur, quo melius hujusmodi molestias prævertant: Quin & plerimos infantes recens editos, si moribus convulsivis obnoxii fuerint, nunquam diu aut placide in cubili dormire, sed variis spasmodicis & artuum subsultibus corripitur obervare est: Causa hæc videtur, quod si quidem eorum cerebra multa aqua abundant, ex hujusmodi lupino decubitu, qualis in cubili est, aqua in ventriculis cerebri contenta, ob situm magis declivem in ventriculum quartum potius quam ad infundibulum defluit, & proinde medullam oblongam (ex qua nervi præcordiorum oriuntur) valde aggravat, & comprimendo iam spirituum in nervos transitum impedit, unde cordis gravamen & motus convulsivi tandem succedunt: Atque hoc ideo magis verisimile est, quia in contrario situ, scilicet et intra vias nutritum, vel in eam sinu, ubi caput magis attolitur, placide & secure magis obdormiunt: Richardus Lœvver. Traët. de Cordo cap. 2. p. 110.

INFANTVM MORBI.

De his jam plura propriis capitibus de variolis, Morbillis, Colicis, Diarhæis Dentitione, Epile; sis &c. Vnde ab ulteriori in hoc argumento tractatione commode supersedere cossemus Verum de eo in genere ita solide scriptis Doctissimus & Accuratissimus D. Gaether. Harris Celebratissimi Medicorum Londinensium Collegii Socius ac Censor ut eum hic legendum exhibere de re omnino futurum duxerimus Sic itaque ille.

De Morbis Acutis Infantum.

Comestare dudum et ipsa verba forte se erit Petrisimo Consummatissimoque Medico Domino D. Sydenham. de successibus repetitis quos in medendis Infantum periculosioribus afflicto sapienter fueram expertus sane Magnus ille vir attente percontatus est, quam meo methodo uti solem in re adeo hæcenus desiderata, & cuius plenam notitiam (nequit gravius dicam) Medici omni laude dignissimi vix ac ne vix quidem sibi assiquiti. Cui ego tum proxime methodum quæ præ aliis mihi placuit, libentissime exposebam Re tandem ab eo perpena ac in praxi sua examinata, ille non modo methodum nostram non improbat, sed & cum aliis perutilem fore, expectatæ suæ propriæ iam confirmatus præ iabat, atque literis eandem consignare magnopere hortabatur. Tanto igitur Autore calumum pro virili arripio, & reipublicæ saluti, quæ utrumque est, vere intersive audeo.

non inficiantur, an albidæ, viridescentes, vel bile sunt admodum saturatæ. Norunt an sit præternaturali, atque adeo febre detineantur; an ulcuscula in ore (Aphthæ dictæ) late serpent, atque inter cibandum molestias creent. Percontanti respondebunt, an insultus membrorum epileptici dicti, majores vel minores, diuturniores aut breviores, repetiti vel rariores, puerilia corpora jam corripuerint; an Dentionis sit tempus quo male se habent; denique an quid alienius momenti, sive sit Tumor abdominis, aut alterius partis, sive exanthemata quælibet aut Pustulæ, vel color ictericius, aut Phlegmonodes, intar Rosæ quam dicunt, extra se se prodant. Reliqua ad speculationem subtilem, quam ad Praxin, mihi quidem videntur magis actinere.

Incertæ vero diagnoses (quæ nunc apud plures obtinet) querela non tam a symptomatum defectu, quam à præpostera ac ineptæ medendi ratione ortum suum duxisse videtur. Sub hoc enim prætextu & velo medicæ ignorantiam & errores suos quoquo modo celare contendunt. Neque excogitare possum, quæ ratione summum numen omnia gubernans & prospiciens, & in viros agendi ordines res quælibet optime disponens, quodque ipsis bellis, & infectis omnium vilissimis nativam quandam & sufficientem sese conservandi sagacitatem communicare dignum est, quorundam inquam, humani generis gynæceæ æquam & idoneam conservationis rationem voluerit detinere, quæ in aliis universis cunctis suppetit.

Quod ad Pulsum puerorum attinet, is naturaliter quidem, aut levissima quavis ex causa est creberrimus, ut quodammodo febricitari nunquam non videantur. Præterea, ita morum protervia juniores fere omnes sunt præditi, ut æræ eodem situ vix non ito plerique sustineant ad pulsum atrectandum. Denique sunt totidem quæ eorum pulsum accelerant, vel alias immutent, ut sententia exinde lata sit ut plurimum fallax futura.

Urinæ puerorum sanitate recta gaudentium sunt crassissimæ, ut si inspiciat curiosus quispiam hujus rei nescius, affectum quenspiam gravorem subolebit, cum interim valetudine jam fruantur secundissima. Infantum urina una cum facibus inter pannos continuo redditur, atque excoriandis suis femoribus quam profundo hariolatoris examini potius intervit.

Ut morbos eorum rectius investigemus, Causæ Procatareticæ nostræ non est in totum prætereunda. Ea autem potissimum refertur ad dispositionem tam maternam quam paternam, qua principia prolifica tum temporis constabant, cum Conceptus ipse primum transigeretur: ac deinde ad illud alimentum genus quod in utero materno vitæ & notus itamina inchoantibus, per umbilicum, vel etiam poros carnis, ne dicam cutis, tunc apertissimos transmissum fuerit ad nutritionem debitam foetus præbendam.

Nemo est qui inficias ibit, morbos dari hæreditarios, à parentum altero prognatos: qui dubitet, quin Arthritis, Epilepsia, Calculus, phthisis, &c. à fonte paterno in filios nonnumquam profuant. Integræ familie ex eadem prosa-

pia oriundæ, sæpe eodem morbi genere vitam claudunt. Scilicet semen prolificum sæpe diathesin morbosam tactui, adeo clavo trabali inhiat, ut nulla unquam arte vel industria in posterum amoveri queat.

Ego vero Hæreditariæ labis pueros ab ortu inficientis nullam existimo causam frequentiore, quam quæ à matre in utero gestante participari solet. Prægnantes enim mulieres mille erroribus in vicu sunt prone, mille casibus fortuitis expositæ, quibus vel terrefactæ, vel alias læsæ, injurias indelebiles foetui à tenerimis unguiculis sæpe sapius communicant. Quam absurdis enim desiderijs urgentur Prægnantes! Hæc carbones, illa gypsum, tertia cineres devorat, inque summis deliciis habent; hæc carnes, illa pisces crudos comedit; uno non desuere quarum appetitus adeo enormiter fuit depravatus, ut nullum edulium eas reficere poterit, nisi quod ex corporis humani parte aliqua callosa constaret. Quinetiam quanta imaginationis vis in Gravidis pollet, quot portenta produxit! Maculas omnis generis fortibus impressas unusquisque in via quotidie conspiciat. Atque si historias gravidarum admirabiles ubique colligere esset animus, hoc est, si sub ambra eruditionis copiosæ niemet tanquam insatiabilem librorum helluonem magnopere vendicarem, locus est jam à capto docte desistere, & in amplum campum, utut alienum expatiari. Sed malim institutum recta proficere, & brevitati studere, quam plurimis verborum ambagibus, atque Autorum diu tritorum citationibus ineptis, scientiæ falso sic dicæ ostentationem facere. Semper ratus Doctorem revera esse, qui de re una aut altera ex proprio penu scit verum pronunciare, quam qui mille autorum litigantium sententias, indolentem peritissimus, novit congregare.

Genitricibus istis, quæ in hosce appetitus depravati effectus magis sunt proclives, eam labentibus inurunt, quæ non nisi temporis medicantis ope in solidum est eluenda. Paupercula, quarum animos à Melancholia detinet labor, vel ministerium aliquod quotidianum, & quarum victus tenuior est & simplex, depravationes recentitas minime omnium experiantur. Præ cæteris Hystericæ mulieres (quibus annumerare jam possumus longe majorem partem earum quæ cuticulam lautius curant, atque otio liquecunt, & quarum sanguis lento torpore perinde coalescit, ac stagnantes aquæ putredinem subeunt) diathesin morbosam foetui una cum primis naturæ rudimentis nunquam non communicant. Siquidem mali corvi malum, ut ajunt, ovum.

In cæteris animalibus innata generis bonitas proli certissime transfertur, partim quia victus eorum simplicissimus est & parvus, idque potissimum, quia mas naturæ leges inviolatas universim servat, neque est piaculi istius reus, ut gravitanti famellæ se unquam commiscere voluerit, postquam sive odore, sive instinctu suo admodum sagaci, ne dicam Rationali, famellam utero ingravescere suboleverit. At vero genus Humanum (cujus ratio intumescens plerumque distat cristas in sublime erigere, & præ se brutum omne sem-

per aspernari) quovis hirco fere salacius, indomitam suam ibidem adeo nescit gubernare, ut a prima conceptione ad ipsum parturienti momentum, feminam vix denotat importunius exagitare. Hinc viri torosi & vegeti prolem valetudinariam non raro progignunt. Hinc annosi senes, scilicet ab extraneis amplexibus (benigno naturæ favore) jam pridem emancipati, liberos rectius valentes ex ætæto suo semine plus semel procreant, quam juvenes utcumque strenui, atque altu Veneræo flagrantissimi solent.

Non causam Procatarticam prædictam à principiorum generationis conditione ac statu deducendam, aut a matre gravida plurimum pendente, causæ eorum affectus propius respicientes ad quatuor capita referri possunt. 1. Ad frigus susceptum. 2. Ad lac Nutricis nimis crassum. 3. Ad carnis deglutitionem præmaturam. Et 4. Ad insanam matercularum, ac nutricum plerarumque indulgentiam, in pituitatione vini, aut liquoris alicujus spirituosi, suis infantibus non raro permittenda.

Et primo frigus ab his facillime susceptum, idque frequenter ab aere vespertino, viam præsumunt affectibus febrilibus, quibuscum jactari solent Infantes. Quandoquidem nullo naturali vestitu, prout cætera animalia, matris utero nudi prædeant. Ratio, vel potius natura statim dicat, sobolem adeo destitutam ope propria, alienam magis necessario requirere, atque involueris admodum calidis indolenter committendam. Præterea aeris mutabilitas, & continua vicissitudo nunc caloris, nunc frigoris apud nos se invicem excipientium, aperte monent, nos cunctos maxime sollicitos esse oportere in protegendis aeris incuriis. Quo tenerior enim est alicujus, etiam adultæ, ætate, eo magis subicitur externis aeris impressionibus. Verum tenerrima omnium & molliorina est Infantum crasis, & nihil summa adhibeatur cura in vestimentis adaptandis, non splendidis & sumptuosis, sed calidis, atque ætati idoneis (idque populum in pueris honeste natis) morborum multos vespertino frigori debitos non diu enugere possunt. Atque amicus exquisita ratio (quicquid contra obstitrent athletici hominuli) singulis ætatibus ita necessaria videtur, ut qui valetudine nimis firma per totam vitam divexantur (in quantum mihi observare licuit) ut plurimum spiritum diutius ducant, & frequentius in senectute in vergant, quam qui ingenuo carnoso, & temperamento robustissimo, hoc est, optimo sunt natura præditi. Quod nihilominus quam summe vestimentorum illis cura, his incuriæ, merito ascribendum est.

2. Nutricis lac magis crassum. Etenim si nutritrix vino, aut poculis spirituosius ebibendis dedita sit, lac suum repente flammis succenditur, & per mammas ignes fere inextinguibiles lactentibus facile transmittuntur; in eadem matris amplexus intempetivos, durante lactationis tempore, lascivior admittat, menses ex coitu irritari solent, & propterea lac corrumpitur, & coalescit, atque aliorum derivata lactis materia ipsum senim diminuitur, ac sirigosus intans victu incongruo aliquamdiu lacescit multoties enecatur. Si

denique nutritrix hysterica sit, hoc est, teneriori & delicatulo temperamento prædita, ut cæta sit, ac sobria, tamen lac degeneret, & crassius, tandem aliquando ex ipsa temperie est evasurum. Quanto igitur discrimine veritatur universum lactantium genus! In quam lubrico exponitur prolis innocuæ salus! Micherucle ex hac, & causis illico recensendis meritolet, quod pagorum in vicinia Londini campanæ tenebres tere semper sonare audiantur, ob instantem aliquem nutritris errores imminuto mentem, ac non alia de causa lato jam detractum quam quod nutritricem metus sit minus sobriam, immundam, protervam, aut motum turpitudinis aliqua coinquatam.

Quinetiam ex eisdem causis pendebat observatio, quam non ita pridem fecit fide dignus Theologus, parochiz dicitur Hales duodecim nulle passibus a Londino rector, qui cum annui dolore gravissimo mihi a trabat, suam Parochiam hincumspatio, & numero incolarum non parvam, atque in aere admodum laubritam, fuisse sub primam ejus adventum instantibus lactentibus quaquaverius repleam, & nihilominus intra spatium unius anni se universos (duobus tantum exceptis, & unico suo libero, quem parum limum curæ meæ, ex quo primus natus est, non inauspicato commattebat) tumulo mandasse, nec non eundem numerum Infantulorum itam bis suppletum (pro more nutritricum mercedi soli inhiantium) ex urbe per totum terrarum orbem forte maxima, & semper inexhausta, se eodem illo anno terræ parenti ante diem reddidisse.

Ad hæc crassities lactis, undecumque nata, non potest non secum trahere diversi generis incommoda, cum infantum corpora præ omnibus aliis continuo fluida esse debeant, cum ductus tenuissimi chylo transferendo destinati ut aperte conservandi, cum denique crassities ipsa alimenti præternaturalis ex adverso sit naturæ infantum fluidissimæ, atque obstructionibus primarum viarum quibuscumque locum præbeat.

3. Ad præmaturam carniæ, ne dicam etiam led deglutitionem. Est autem res perquam admirabilis, quod matres infantes suos victu prorsus incongruo & onisariam improprio, penitus jugulare non vereantur, quos tamen ita perditæ amant, ut ipsorum amore plane insanire conspiciantur. Quis enim serio existimet carniæ tæncem substantiam infantibus tenellis commodam fore, qui nullos adhuc dentes ad masticandum extrinsecos, vel si qui forte extrudantur, minime firmos habent ad opus masticationis quadantenus peragendum? Quisnam ingenii acumine leviter prompto donatus, luxum virilis & intingenter robustæ ætatis, tenerrimæ & simplicissimæ, ac viribus maxime infirmis prædita, quomodocumque convenire pronunciet verit?

In omnibus ætatibus diætæ ratio non est admodum negligenda, sed quia juniorum temperamentum injurias ex ea parte inflicta facillime omnium suscipit, atque vires affectibus resistendis impares habet, ideo cautela diligentiori us opus est ad istiusmodi errores præveniendos. Ingluvies enim carniæ præmature ingestæ Crudicatum est feracissimum, quæ voraci huic ætatulæ fere inseparabiles alimentum crudum

crudum & indigestum humorum putredinem necessario progignit, ex qua putredine non solum lumbrici generantur, verum etiam symptomata diversa, & gravissima, eaque valde anomala, quibus infelli intabescunt, sapissime pendunt.

Hic obiter animadvertam, quod cruditates infantum ex abundanti quotidie accumuluntur, eo quod nutrices fere omnes statim ab usu victus, qualicumque is sit, eos obdormire nunquam non permittunt.

4. Ad pituitationem vini, aut liquorum spiritibus abundantum imprudenter, concessam. Hæc etiam causa, licet & præcedens, ad tantam materiarum indulgentiam est referenda. Scilicet augurantur, ea quæ ipsis bona & jucunda, & quæ eorum sollicitudine oppressum exhilarare solent, nequaquam ponere infantibus suis in vitium vertere. Quam vero eadem caligi omnibus pedibus aptari, quasi crepundia vitis, vinna puerulis accommodari poterint? Mehercule bonæ illæ mulieres non satis animadvertunt, quam duræ & tenacia sint ipsarum tergora, & quam molles & teneræ humorum pelliculæ; nequaquam recordantur, quod alterius alimentum (ut dici solet) fuerit nonnumquam alterius venenum; denique ex animo tollunt, quod ipsarum stomachus ferme oblatrans non nisi bovum quandoque satietur, cum appetitus horum languens, & debilissimus, panatellæ ægre digerendæ vix sufficiat.

Quo propius vero ad senectutem quisque vergit, eo magis illi vina convenire solent. Quandoquidem calor senum languidus succulentis spiritibus plane indiget, quæ ex vino copiose suppeditantur, ad naturam sui caloris tum conservationem tum incrementum. Quapropter infantum naturæ, utpote à sensu longissime distat, vinum est maxime alienum, quorum nervi omnes debillissimi eo facile franguntur, & quorum tenera corpuscula subtili calore vini aut senum colliquantur, aut in flammæ febriles præcipitanter ruunt.

Sunt qui vini usum minimis indulgere volunt, eo quod carnibus ita præmature vescantur. Nempe coctionem Cruditatum, quibus carnivori infantes sunt proculdubio obnoxii, plurimum promovere vel in hac ætate vinum apud illos censetur. Verum an error unus at altero emendandus, an vero uterque potius non sit aufugendus, non tam pluribus discipulo, quam observationi eorum tradam, qui infantes pauperiorum victu simpliciter ac sobrio necessario nutritos, cum his divitum & luxu semper gaudantium inter se conferant.

Sane vini omnis generis paulo liberalius ingesta, quemadmodum & liquores quilibet aliis spiritibus repleti, fermentum naturale ventriculi puerorum destrunt, appetitum prosterunt, tunicas ventriculi comburunt, nec non eas, illarum pergamini coram igne nimis affecti, corrugant; sed & tunicam nervorum (quod maxime in hoc casu est momenti) summo perebunt, atque mediante hac tunica universos corporis nervos labeficiant, & spiritus animales in omnimodam confusionem perturbentius adigunt. Quod minus omnium temperatam hanc ætatem lædit est vinum album,

utpote à Veteribus frigidum appellatum, non vero absolute frigidum, sed comparate ad vinum aliud, live rubrum, live colore fulva aut flavescens. Galenus autem pueros ne gustare quidem vinum, rigide imperavit.

Omnes causæ ægritudinum infantium Antecedentes, & mediæ, quot unque ree-ra fuerint, aut excogitari poterint, in una causa Proxima & immediata tandem coalescent, nimirum in Acido longe lateque præpotenti.

Historia igitur affectionum graviorum, quibus plerumque corripuntur infantes hoc se modo fere habet.

Ventriculus ipsorum, à quacunque causa id primario pendet, in Acidam intemperiem nunquam non lacessit, unde fit quod alimtum suum omne nequaquam in homogentiam chyli substantiam rite conteratur, verum in lac quoddam coagulatum. A glacie, à posse, continuo transiat. Inæqualis illa Chyli, aut nutritivi conditio, Aciditati prædominanti jugiter nitens, Nauseam, & Vomitiones, & Ructus acidum redolentes, præ aliis omnibus parit. Si diutius res protrahatur, paulatim magis magisque impallescent, nec non quippiam flavescens aut viridescens coloris admixtum decolor vultus ostendit. Tum statibus intumescit ventriculus, atque eruptiones flatulentæ sursum feruntur. Interim Punula Rubra una, aut altera (certissimum Acidi redundantis signum) cuticula exurgit, in superiori aliqua corporis parte, nunc scilicet in genæ utraque, nunc in mento, nunc fronte, aut in colli regione, aut quandoque inferius; atque infans indies in aetere vergit. Sed & idem Anhelat, & cum liortore aures altantium feriente nonnumquam spiritum ducit; quo quidem symptomate semper laborare deprehenditur (maxime si carnosior sit) quoties morbus in Acutorum partes transit. Porro tussicula levi, eaque sicca, & nonnumquam suffocativa, læpius urgetur: Sicca quidem tussis ob acrimoniam humorum ramulos asperæ arteriæ valde sensuæ continuo vellicantem; suffocativa autem propter bronchia pulmonum serositatibus in ea depluentibus, neque exitum invenientibus, gravissime onusta. Quinetiam quæ nervosi generis debilitatem maximam habent, atque mollitie temperiei summa ac delicatula sunt donati, ideo vim tussendi molestissimam ferre nequeunt, atque agitationi pectoris violentæ, quasi suffocati, & nigricantes facie, fere succumbunt. Sin coagulationes prælatæ ex ventriculo in intestina (quod sæpissime fit) mox descendant, nunc Tormenta ventris, nunc Dejectiones alvi Viridescences, nunc vero Diarrheas violentissimas producant. Dum vero in ventre inferiore agitur tragædia, vel Tormentum dolor ingens febrim Acutissimam accendit, quæ minus perite tractata plerisque infantibus ita terripere solet vel dolor aliquantulum mitior, & curationi qualicumque imperitæ torte cedens, in tumorem abdominis duriusculum sæpe desinit, qui in nonnullis aut rachitidi, aut scrophulis produendis commode inservit. Galena quædam tremula (proxima lumbicis generandis materia) nunc albidior, nunc fusci aut flavescen-

its coloris, nunc viridi juncta, nonnunquam sponte, sed sæpius à recta medicamentorum operatione, una cum fecibus excernitur. Fricant interim infantes sæpissime suas nares, quod non modo presentibus lumbricis contingit (ut mulieres vulgo credunt) verum & in unaquaque febre, quæ ab humorum corruptela exoritur; acrimonia enim humorum sursum lata sensiles Narium membranas, tum in Acutis, tum in Chronicis affectibus plerisque, tamque in Adultis quam junioribus, vellicare aut pungere solet. Tormina ventris memorata, viginas, inquietudines, querimonias, aut ejusmodi noctes diesque efficere solent, quibus quoquo modo compescendis nutrix toties quoties mammas lactenti admovent, quo inducitur molesto suo officio aliquantisper interponi poterunt. Cæterum si nutricula rerum domesticarum omnium penuria laboret, atque idcirco infantem sudo acri ejulantem subinde relinquere cogatur, vel si ea mercedi soli inhians (ut nonnunquam fit) nulla commiseratione versus plorantem teneatur, ille hernia intestinali, aut omentali, ad plures sæpe annos perseverante vulgo detinetur. Porro lac vel cibus omnis (durantibus sc. Torminibus) minus recte concoquitur, magisque acescit & coagulatur, febricula sensim exoritur, sitis intenditur, a tus omnes flaccidi fiunt, collum non sustinet capitis onus, atque tenellus magis magisque debilis quotidie existit. Utque coronis huic miseræ ægritudini tandem imponatur, motus convulsivi, aut membrorum subsultus debilissimo superveniant: Et cum nervi nullam ulteriorem vim musculis cordis commoendis, & sanguini per arterias (Circulationis lege) protrudendo relictam habeant, albedines oculorum ad cælos (proprium innocentæ nullatenus violatæ domicilium) natura sursum feruntur, atque infans brevem vitæ curriculum immature conficit, antequam recta ratio edocuerit, quam sit revera miserum in rerum natura diutius versari.

Si dentitionis sit tempus, quo male valent, plerisque symptomatum prædictorum cruciari solent, atque insuper aphthæ, ulcera oris, caliditatis fere igneæ (crusta quasi inalbescens) quæ ante dentitionem ab ortu primo sæpissime adveniunt, & nonnunquam serius, sed quæ hoc potissimum tempore prædominium habent, os totum adeo interdum exulcerant, ut nec mammas ipsas quantumlibet dilectas neque cochleare queat sine molestia & averfatione adittere os ipsorum tenerimum, & quaquæ versus exulceratum.

Addam quod, ore infantum aphthis multum fauciat, sæpe accidat, ut neque vagitum aliquot diebus emittere, neque lacrymam ex oculis destillare poterint, quamvis oris tenebrositudine summa, & calore intenso, nec non ex eris pluribus febrim concomitantibus malis, miserrime exeruciantur. Atque idcirco his rem bene augurari soleo, cum ex mutis in clamorosos illi vertantur, cumque sub exitum morbi fletu & plangore tota domus compleatur.

Pueri natu paulo majores febrilibus symptomatis tentati, de capite affecto, plerumque conqueruntur, cujusmodi dolorem rarius idio-

pathicum, sed ut plurimum sympatheticum esse, nimirum ex ventriculi & inferiorum partium dyscrasia pendentem, verisimilimum quidem videtur.

Quod universa hæc, & consimilia symptomata immediate proveniant ab alimenti nimia coagulatione, aut incrassatione, eaque longe majori, quam quæ infantum naturæ quomodocunque convenit, quorum ductus omnes fluidissimi necessario debent esse; quodque istiusmodi coagulatio aut cuipiam aciditatis gradui jugiter innitatur, aut saltem exinde proficiscatur multo sæpius quam ab alia quavis causa, luculentissime constabit, siquæ sensibus ipsis, aut demum Curationi (quæ Acidum obtundentibus, & Coagulationes solventibus optime instituitur) fides certo adhiberi possit.

Frequentes vomitiones gelatinæ tenacis, aut pituitæ cujusdam viscidæ & coagulæ, ejusdemque nonnunquam viridis, cum vehementius ægrotent; anhelitus eorum sæpenuerq; acidum redolens, sunt res sensibus admodum manifestæ.

Quod viridis fecum color acido bili admixto se prorsus debeat, observationi plene sensibili illorum, qui experiri ante colorum in viridem mutationes aceto & spiritibus acidis perficiendas, evidentissime apparebit. Præterea odor dejectionum viridum nunquam non curatricibus acidulculis appellatus idem dilucide commonstrat.

Torminum dolor immanis in ventre inferiore, atque una pallor faciei insignis, humorum acidorum prædominium aperte confirmant. Porro quando unque diris cruciatibus pueruli torquentur, utut sanguineo prius, & florido corporis temperamento fuerint donati, tamen tum temporis summe impalescunt, nisi quod genarum rubore, eoque in pallidum facile ac cito redeunte, subinde soleant perfundi.

Hic obiter adnotabo, quod honorem (si quis sit) Novæ Hypotheseos inveniendæ nullatenus ambiam, neque si Hypothesin aut uspiam excogitaverim, aut quoquo modo stabiliverim, mei esse ducam, omni nota argumenta invita quidem natura (ut moris est) cogere, ut dictæ Hypotheseos veritati fidem faciant. Res siquidem primaria Medicæ artis, & quæ humani generis salutis unice inservit, in tali morborum dignotione versatur, qualis Experientiæ & Curatione ipsa tum fundatur, tum corroboratur. Reliqua enim quæcunque *Philosophi* explicatio quantumvis docta & subtilis habeatur, Sophistam acutum, aut Philosophum improprie sic dictum, vel ingenium pronptissimum non raro ostentare potest; sed Medicum revera peritum atque arte sua præstantem, haudquaquam denuntiabit. Etenim omnes istæ perbellæ speculationes, & juniorum animis lascivientibus (perinde ac Poetici volatus) semper admirabiles, sæpissime nuspiam existunt, nisi in ipsa Inventoris phantasia, atque etiam ab iis, qui Praxi Medica minus omnium feliciter valent, haud raro solent excogitari. At vero ideæ morborum solidæ ac veræ nunquam rectè edificuntur, nec earundem veritas nisi in ipsa Praxi aut dijudicatur, aut probatur.

Scio quam obnoxia, & fortasse non immerito,

Merito, animadversoribus videatur hæc notio a ceteris à nobis existimari in omnibus Puerorum affectibus insignioribus prædominium habere. Neque tamen disceptabo, nimius in hac re, an singulæ aciditatis notæ, quæcunque homines nascutuli, altercationibus gaudentes, aut negotiis vacui, possunt comminisci, acido illi, quod in ventriculo Puerorum dominari sustineo, ad unguem quadrent. Votis meis abunde sufficere (ut in perpolienda notione minus perfecte laborem) si ita felix fuerim, ut curationis methodum efficaciorē, ac certiorē ea quæ hæcenus passim obtinuit (quod lubens quidem relinquo iis, qui veritatem dictorum experiri volunt, determinandum) tandem indigitare valeam.

Nihilominus non præteribo quæ Medicorum omnium facile Princeps, Hippocrates, de causis morborum paulo fufius explicat in libro de veteri Medicina: Ut scilicet penitus evincat, morbos universos non primis, ac secundis qualitibus originem suam debere. Verba igitur sua sic se habent: *ὁ δὲ ζῷον ἢ τὸ κρύον, ἢ τὸ θερμόν, &c.* Non sicco, neque humido, neque calido, neque frigido, neque horum quoquam hominem lædi existimantur (nempe veterum Medicorum præclarissimi) neque horum aliquo ei opus esse. Sed quod in unoquoque potentius esset, & supra naturam humanam, adeo ut ab ea superari non possit, id lædere censerunt, & tollere conati sunt. Est autem valentissimum inter dulcia dulcissimum, inter amara amarissimum, inter acida acidissimum, & quod in re quæque summum est. Hæc enim in homine inesse, eique nocere videbant. In homine namque mellis & amarum, & salum, & dulce, & acidum, & acerbum, & insipidum, aliæque infinita, quæ pro copia & viribus varias habent facultates. Et hæc quidem mixtione, & mutua inter se contemperazione, neque cernuntur, neque quæquam molestia afficiunt. At ubi horum quidpiam secretum fuerit, & per se extiterit, tunc & conspiciuntur, & hominem molestia afficit. Quin & ex cibis qui minime nobis conveniunt, & qui in corpus ingesti hominem lædunt, horum uniusquisque aut amarus est & minime temperatus, aut falsus, ac acidus, aut alio aliquo modo intemperatus & vehementis, ideoque perturbationē in corpore efficiunt. Et postea, *ὁ δὲ τὸ θερμόν, ἢ τὸ κρύον, ἢ τὸ μέλαν, ἢ τὸ λευκόν, &c.* Neque enim est calidum, quod magnum vim habet, sed ipsum quatenus acerbum, & insipidum, aliæque de quibus dixi. Rursus, *ὁ δὲ τὸ θερμόν, ἢ τὸ κρύον, ἢ τὸ μέλαν, ἢ τὸ λευκόν.* Non propter calidum simpliciter homines febricitant, neque ipsum solum affectionis causa est, sed est & amarum & calidum idem, & calidum ac acidum, & falsum ac calidum & alia infinita; ac rursus frigidum aliis facultatibus conjunctum, &c.

Ex his, & quamplurimis ejusmodi aliis in libro prædicto fufius explicatis, liquidum est, nostrum Divinum Senem, sapientia Medica omnibus aliis prælucentem, pro certo determinasse, quod secundæ illæ qualitates, nempe aciditas, amaritudo, falsedo, & consimiles, synptomatis caloris aut frigoris conjunctæ, sint ut Causæ morborum principes & efficientes, præcipuè considerandæ. Et proin-

de addere nullus dubitabo, quod naturaliter sequatur, Curationem ipsam non tam ad calorem frigidum extinguendum quam ad aciditatem obtundendam, quemadmodum & amarum alterandum, salum contemperandum, crassos humores incidendos, tenues & nimis fluxos compactiores reddendos, asperos leniendos, ac denique obstrictos corporis ductus aperiendos atque infarctu liberandos, imprimis dirigi oportere.

Verum antequam Curationem ipsam aggrediar, operæ pretium forte videbitur aliquid loco Prognostici, ut usu comparatum est, præmittere.

Prognosis autem, prout mihi videtur, potius pendet ab ipsa Curationis methodo, recta vel secus facta, ut & à Nutriculæ moribus, an scilicet sibi nimium placeat, atque sola sapiat (quæ, pro dolor! mortalisissima est consideratio) an vero morigera sit, & quæ in mandatis habet, fideliter exequatur, quam ab infantum ac puerorum ægritudinibus ipsis. Leves enim ex se sunt puerulorum febriculæ, neque tam exardet, aut efflagrat eorum calor febrilis, quam suo modo paulum intendi rectius dicatur; nisi cum Ars inepta Cardiacis igneis & spirituosius nitens, auspiciis admodum sinistris, in auxilium advocetur.

Corpulenti & obesi infantes, pituita diffluentes, verticis regionem mollem (pupæ adinstar tremulæ) & apertam quam dicunt, Anglicè an open Mould, ab anteriori ad Posteriores Crani Sutura per sepe excurrentem diutius retinentes, Rachitidi, Tussi Convulsivæ, Aphthis difficulter cedentibus, ac tandem Scrophulis, maxime sunt obnoxii.

Macilenti & strigosi sunt omnium tenerissimi, acerrimo calore aduruntur, & in febres pessimi moris, hoc est, summe inflammatorias (pro ratione ætatis) & nervoso generi adversas, sunt ut plurimum proclives.

Pueri ex matribus hysteris, teneris, morbosus, fructus horarios aut acetaria (tempore gestationis) continuo devorantibus, aut acida & acerbæ quæcunque tunc temporis percipientibus, aut ex iis quæ sunt ventricolæ, ac mera abdominis mancipia, aut denique in quibus appetitus insigniter depravati, cujuscunque fuerint generis, regnare solent, hiæce inquam parentibus orti, & gravi aliquo morbo difficiliter convalescunt.

Quicumque alvo sunt laxiore præditi, melius sese habent, quam qui stricta.

Tempestas, verna, atque æstiva, Febris cito propulsandis maxime omnium favent, nimis vero tempus autumnale aut hyemale.

A medio mensis julii ad medium Septembrem Tormina infantibus Epidemica (utpote quorum vires æstus tempestatis annuus tunc penitus exhaurire solet,) adeo quotannis increbrescunt, ut plures tenelli unico mense, quam tribus vel quatuor aliis mensibus mioribus, tum temporis extinguantur.

Convulsiones, aut saltem membrorum subsultus, tenellos hac vel illa ægritudine aliquamdiu debilitatos, aut regimine calidiori paulo plus incensos, coronidis loco, vel finem miseriarum, quibus excruciatii sunt, ut plurimum perducunt.

Neque enim ratio vivendi magis requirit, ut pars cibi melior & succulentior per venas lacteas transmittatur, ad debitum nutrimentum corpori præbendum, quam quod pars ejus crassior & deterior (quæ nimis diu retenta halitus noxios, imo venenatos, lactum emittit) natura aut arte per sentinam corporis expellatur. Et profecto eam gloriam sibi ipsi purgatio jure acquisivit, ut ex usu vulgato, nomine Medicinæ amplissimo sola omnium ingnoscatur.

Septennario nuper elapso mos mihi fuit in Febrilibus puerorum, nec non Infantum vel minimorum, secundum methodum jam laudatam cathartici adhibere: licet id in adultis negligerem: & quantum res ex animi sententia luceret nequeo facile narrare.

Quomobrem cum primum schedulam præfictam attente perlegissem, eadem animi lætitia perfundebar, ac si insignem aliquem favorem a Numine Divino me recepisse contigisset. Itaque facillime adduxus fui ad feliciter experiendam methodum catharticam in adultis, quo ex eadem in juniorum febribus succellus optatos sæpissime fueram expertus.

Prima autem indicatio in curandis infantum febribus est, acidum rite præparare, quo melius id eliminetur. Atque acida debere præparari, antequam poterint seum & phlegma expurgari, facile constabit, si naturam acidi paulum expendemus: nempe si incrassandi & coagulandi vim, quæ idem pollet; si generalem obstructions parienti causam ex isto parente quam sæpissime oriundam; si naturalem omnium liquorum, exceptis maxime spiritibus, in acidum putredinem; si molestiam illam maximam, quæ medici solent torqueri in his curandis, quorum corpora acido humore multum scatent; sed & præ aliis argumentis si tormenta consideremus, quæ purgationes sine corporis præparatione debita exhibitas, in habitu in acidum vergente comitari solent.

Sero quod vox illa, Humorum præparatio, apud auctores complures legi possit. Atque hinc propositus fuit, ut Cathartici tandem aliquando securum eo felice eventum haberet. Nempe crassos humores attenuare contendebant, fervidos temperare, obstructas vias aperire, vel per poros cutis Diaphoreticis eisdem repellere. Verum ut plurimum huic fini nescio quos Syrupos, aquas simplices destillatas, atque ejusmodi nugamenta adhibuerunt, quæ præparationi sive alterationi deliquisse nihil prorsus constulere. Interim tempus, quod morbo acuto subjugando appropinquare necessarium fuit, otiose quidem, imo pessime absumebatur.

Hæc vero qualis qualis præparatio ortu suum, ut opinor, duxit à trito illo, verum non satis intellecto Hippocratis Aphorismo §. 1. n. 22. Cocta, non Cruda, sunt Medicanda. Atque hujus magni canonis in alienos a re sensus frequentem contorsionem fuisse causam nandum equidem existimo, cur Medici tot celeberrima multis retro sæculis ne hilum sere soviarnat de purgationis beneficio in febribus continuis. Nepe cum febrium primi insultus (& maxime postquam agrotantes lectulo calidiori fuerint aliquandiu meatu crati,)

Cruditatis signa evidentia sæpissime exhibeam, Medici astantes utut in Praxi aliis egregie verati, statim ad sudorifica tanquam unicum Alylum plerumque contugiant, ad Catharticos autem mentionem non minus ipsi quam ineptæ nutrices magnopere exhorreant.

Nec me præterit, quod Auctores aliquot de Cathartici in febribus, sicut & de aliis sere omnibus, disputationes prolixas instituerint, sed si rem ipsam paucis complecti liceat, potius ad implendam paginam, ad animum lectoris occupandum, atque ad doctrinæ copiam ostentandam, quam ad veritatem ipsam sive illustrandam, sive determinandam verbose collimarint. Magnum hujusce ævi ornamentum & lumen Sydenhamus, insolita animi fortitudine ac ingenio non vulgari præditus, hanc rem de qua alii plane verba dedecunt, tum ratione multiplici comprobavit, tum factis, hoc est, Praxip-sa plenius absolvit.

Præparatio humorum Crudorum in febribus usitata, per Alexipharmaca ac Suaviorica, magis ad humores Crudiores reddendos, quam ad Coctionem veram introducendam spectat. Profecto ista immaturam potius ad mortem præparant, dum Cruditates ex immis corporis partibus sursum ad Caput in pellendo, Phrenitides, Convulsiones atque ejusmodi deplorendæ symptomata certo certius arcessunt.

In principis Februm (sive sint Essentiales, sive Symptomatice) siquidem præ Coctionis lenta expectatione, evacuationes necessarias in crallum producemus, tempus illud opportunum sæpe irrevocabile celesti pede præterlabitur. Tempus illud, quo fundamentum omne Curationis lectura illico jaciendum fuit, quo denum vires constant, quo lere solo evacuationes emolumento esse possunt, sub Cardiacorum insulsa administratione, vel Chymicorum febrifugorum fallaci experimento, paulatim fugit, atque ager nuper athleticus, furibundus nunc demum redditus, nescitine perit. Adhuc affirmo, quod non obstante hominum cæco præjudicio, evacuationes opportune celebrata Urinam, quæ Cruda apparuit, ad Coctionem exoptatam, atque una agrotantem ad incolumitatis propiorum spectum citius ac certius ducat, quam quodlibet aliud, quantumcumque illud fuerit, quod nobis innotescit, humani ingeni tentamen.

Præparatio igitur, de qua nunc agitur, nequaquam est aggredienda sudorificis propriè dictis, hoc est, corpus excoalscentibus, quæ nullo nomine teneris Infantibus aut puerulis prosunt sed multifariam ledere deprehenduntur. Quandoquidem res prorsus temperatæ Aciditatem prædominantem secure absorbeant, ebullitionem paulatim leniant, atque Anodyna potentia acuta sunt evasura. Talia sunt oculi & chelæ cancerorum, testæ ostreorum, concharum, os sepis, cortices ovorum, creta, coralla, corallina, margaritæ, mater perlarum, I pis Bezoar uterque, c. cumm ebullitum os e corde cervi, ratura c. c. unicornu bolus Armena, terra sigillata, lapis hæmatites, &c. Inter composita, pulvis e chelis compositis, lapis e Goa, species Contusionis de Hyacintho, facile primas obtinent.

℞. Aq. ceras. nigr. ꝑiv. totius citri ꝑii. mirab. margar. pp. ana ꝑii sacch. albiꝑ. ꝑß. M. F. Julap. Perlatum; de quo capiat cochlearia tria, ut prius.

Sin molesta Tussi opprimatur Infans, capiat subinde de Mixtura aut Linctu quodam molliori cochleare dimidium, interim pulveres superscriptos parcius allumens.

℞. Corallin. pulv. e chel. 6ꝑ. simpl. ana. ꝑß. Syr. capill. Ven. de althea ana ꝑj. de Balsam. Tolut. ꝑß. aq. papav. rhazid. ꝑß. ad diluendum M. Bolus Armena sæpe talibus proprie admissetur, utpote catarrhos in pulmones depluentes potentissime lileus. Succus Pulegii, in quo calefacto solvitur saccharum candum, paucis remediis cedit. Oleum amygdalarum dulcium etiam optime conducit, si palato infantuli paulum aridere deprehendatur. Item sulphur vivum, aut flores sulphuris (mira exiccandi, penetrandi, imo & compactos humores in quacunque corporis parte discutendi, facultate præditi) acidum absorbentibus additi, in habitu phlegmatico, maxime sunt ex usu. Neque enim sulphur noxiam aliquam aut deleteriam facultatem obtinet) prout Crato, alique egregii nonnulli viri immerito quidem somniant) sed potius vi alexipharmica, expulsoꝝ, & corruptela humorum opposita, maxime valet.

Repetitio Pulverum prædictorum rarior, vel frequentior, non est exquisitè definienda nisi pro ratione symptomatum, quatenus aut mitiora sunt, aut graviora. Id duntaxat repetam, tormina omnia, inquietudines, & vigilias infantum, Testaceis apte exhibitis æque certo demulceri, ac dolores aut vigilias adultorum ipsis Narcoticis ad tempus tolli.

Hic autem, qui vel Praxin Medicam mediocriter delibaverit, objiciat, quod ejusmodi Pulverum exhibitio nihil Novi præ se ferat. Cui duntaxat refero, ineptum quidem, insipidum, parcissimum eorum usum, atque nullo minimo intentioni rite satisfactorium, diu nimisque fuisse pluribus notum: atvero neque tam repetitam, neque tam magnam eorundem dosin, neque subsequenter purgandi necessitatem fuisse hactenus literis consignatam. Nota est fabella (quam & quicumque volet ad rem hanc nostram transferat) de lepido quodam, qui cum astantes gloriose provocasset, ut ovum alterutrius extremo immobile collocarent, neque quisquam eorum, varia tentans, mysterium penetrare valeret, ipse utrumlibet ovi extremum mediocriter frangens, admirationem omnem derepente tollebat, & simul risum commovebat. Id quippe cognitum, toti sodalitia jam fuit facillimum.

Tertio die à quo sum advocatus, nisi variolæ, Morbilli, aut febris Scarlatina, caput attollant, purgandum esse præcipio, nempe infantem unius anni, in hunc fere modum:

℞. Syr. de cichor. cum rheo ꝑii. rhabarb. el. pulv. gr. xv. aut ꝑi. aq. lact. alexit. ꝑi. vel cinnam. ten. gur. xxx. ad diluendum, Misce. Vel ℞. Syr. de rhamn. cathart. ꝑi. vel ꝑii. pulv. diasen. gr. viii. M.

℞. Pulv. Comit. Warvicens. in nuperrima editione Pharmacopœiæ Londin. descripti, alius pulv. Cornachin. gr. vi. Sumat in cochlea-

ri aq. ceras. nigr. sacchari tantillo edulcorat.

℞. Amygd. dulc. excort. n. iii. Contund. in mortario marmoreo. sensim affundendo aq. hord. aut aq. alicujus simpl. ꝑi. vel ꝑii. colat. distillat. aut opt. ꝑii. vel ꝑß. M. F. Emulsio cathartica.

℞. Elect. lenit. ꝑii. vel iii. solve in aq. lact. alexit. ꝑi.

In symptomatibus istis, ex summa humorum putredine oriundis, sæpe ex usu est Ethiopis Mineralis interius descripti grana vi. vel Mercurii dulc. gr. 4. admixta in mortario vitreo, cum floribus sulphuris tantundem, in Syrupi alicujus grati cochleari parvo, nocte cathartim præcedente, exhibere.

Si agrotus utans ad tres vel quatuor annos jam antecessit, vel si Dentitionis negotium sit maxima ex parte absolutum, & præsertim si lubricorum aut putredinis humorum gravioris aliquandiu contraxerit sit suspicio aliqua notabilis, Bolus ex illiusmodi preparationibus apprimè conveniet, atque potest committi, cum miva cydoniorum, vel cum cortice citri condito, perferaceum tracto.

Ejusmodi Boli illis haud parum conducunt, quorum alvus est vulgo constipata, & medicamentis difficiliter solvitur, utpote præparantes, quo Cathartici mane insequenti instituenda faciliorem ac meliorem protinus edat effectum.

Nonnunquam etiam regioni umbilici Emplastrum sequens, aut continuè, adhibendum impeto.

℞. Aloes Succotr. ꝑi. sol. sabin. summit. centaur. min. flor. chamam. pulverat. ana ꝑi. cerebin. Ven. qs. f. simpl. cujus margini insinatur paulum emplastri e Cympho, quo melius parti adhæreat. Lixerdum & cæteris colocynth. ꝑii. addere licet.

Nullum omnium medicamentorum Purgantium novi magis accommodum ætati puerili, magisque ex se innocuum notissimo, atque usitatissimo Rhabbarbo, quod febrim tenellorum, materiam blande admodum, & tuto subtrahit, quod ventriculum, imo & totum corpus vitiosis humoribus prægravatum, tum leniter expurgat, tumq; itrenue corroborat, quodq; eo nomine infantibus, pueris, prægnantibus, senibus & ex morbo aliquo jam imbecillis, maxime quidem convenit. Titulum hiez Rhabbarum protectio æquius meretur, mire colaudata apud veteres, nec non a recentioribus etiamnum celebrata, & in piulis omnibus Officinalibus locum primum, sive basin, tenenti Aloe, quæ ob amarorem suum insignem non exiguam laudem quandoque postulat, verum ob acrimoniam, corrolionem, & calorem quem corpori summi impertit, aliquam subit, nec immerito, infamiz labem.

Ab operatione Lenitivi alicujus purgantis, pulvis prioribus consimilis est vesperi injungendus, & postea repetendi sunt ter vel quater in die, temporibus opportunis, pro duabus aliis Nyctemeris; & rursum tertio die iteranda est purgatio, cujus quantitas tunc demetienda est pro ratione operationis prioris.

His rite peractis plerumque cessant graviora omnia symptomata, vel saltem multum leniuntur, ut proinde in vado jam res sit, quæ in extremo discrimine paulo ante fuerat.

Pueris aliquantum provecioribus eadem methodus (sub quacunque Forma perficiatur) humores

mores primum Preparandi, dein Expurgandi, tutissimo usui esse potest. proportionem alterutrius medicamenti, secundum ætates, diligenter observata.

Notandum est, quod prima Catharsis quam Pueris febricitantibus adhibemus, sit non tantum è Lenitivis, verum etiam dosis eorum plerumque sit mitior, quam alias heri debet; quodque nocte primam Catharsin præcedenti Læna mitissimum è lactis vaccini uicis quatuor saccharo dulcorati, & salis cantilii addito in alvo attrita, sit nonnunquam injiciendum.

Intuper ad vim primæ istius Purgationis accelerandam, atque defectum medicamenti Cathartici (si quis tunc sit) supplendum, crystallorum Tartari scrupulus unus, aut alter, in cochlearibus aliquot juteuli avenacei tenuioris, aut similis, solutus, tutissime atque efficacissime exhiberi potest.

Verum imprimis cavendum, quod crystalli tartari luceri, & recte preparari, in usum vocentur, non autem adulterini illi, & vulgo venales, quorum pretium fere idem est, ac tartari ipsius crudi.

Si Infantem carnosum, obesum, aut temperamento humidissimo atque in facidum degeneri contantem, ægrotatio aliqua difficilis (idque tempore brumali potissimum) corripiat, ut putredo acetosa duabus Purgationibus in hunc modum exhibitis nequeat in totum superari, tunc in eadem methodo ad vicem unam aut alteram adhuc persistere oportet, donec ægrotudo omnis penitus evanescat: nisi quod vicis unus aut alterius intervallum præstatis diebus, in quibus Pulveres Acidum alterantes erant exhibendi, debeat superaddi.

Nec incommodi quicquam observare unquam potui ex toties repetitis Purgationibus in temperie contumacissima, sed vires prius enervatæ gradatim redintegrari sunt semper visæ.

Id solummodo cavendum in Puerulis purgandis, quod nulla unquam occasio, quæcumque ea sit, viribus fortiozem catharsin us adhiberi possulet.

Quam obrem hic præterire non possum quæ maximus rei Medicæ magister, Hippocrates, in libro de Medicamentis Purgantibus scite, sed minus recte intellecta, edidit: Quicumque igitur a febris fortibus corripitur, his medicamenta purgatoria dare non oportet, donec remiserit febris. Sin minus, saltem non intra quatuordecim dies. Carnes enim ipsorum & ventres, quum calidi sint, medicamentum assument, & nihil depurgantur, & febris major fit, & color evertitur, & morbi regii speciem præ se ferunt. Commota enim bile, & non purgata, non sorbere vult æger, neque bibere, sed omnia abominatur, & plerumque perit. At si hac die superstes maneat, & una cum purgatione remittat febris, sanus sit. Quapropter in febris vehementibus medicamenta purgatoria exhibere non oportet. Verum si aliquid opus fuerit, iusum per clysterem adhibere potes, quotiescunque volueris. Hoc enim minoris periculi est.

In his verbis magistri nostri Observandum est. 1. Eum verba facere de febris adultorum, quæ fortes, vehementes, atque Ardentissime

esse solent, non vero intelligenda esse de febris infantilibus aut puerilibus, cujusmodi sunt natura nutes, & minus ardere aptæ. 2. Medicamenta purgantia sui temporis fuisse vehementia fortissima, nec non dicta deleteria, ut elaterium, colocynthida, Helieborum, & similia, nostrorum vero Lenitivorum pleraque Mitissima, imo maxime Temperata, si non quædam acutrigida, fuisse ejus sæculi sapientibus adeo incognita, ut antipodes, ut novum orbem, ut denique Artem Typographicam. 3. Hippocratem loqui de Febris in naturali suo itatu, & libi alias permisis, sicut & descriptiones suæ Morborum Epidemicorum verissime atque accuratissime sese habent: non vero de febris intelligi ipsum fas est, quatenus ars futurorum sæculorum, & maxime præsentis hujus sæculi, utcumque invidis præsentia male audire solent, provector quidem & maturior (quod potiori grata memoria, ni maxime salior, recolent, & facile continebuntur) tandem dedit, eas ad purgandum recte Preparare, atque earum truculentiam liberaliori Adultorum venæsectione, die præcedenti catharsin habita, multum temperare, aut etiam perdonare. 4. Considerandum est, Hippocratem hic docere, quod si febre detentus medicamentum Catharticum assumat, atque ejus diei periculum forte effugiat, ipse statim, id est, eadem ipsa die in sanitatem incolumis redeat. Quod verum quidem esse, & pueros febricitantes eadem ipsa die, ab operatione primæ Catharseos absoluta, symptomata febris universa, (id autem imprimis tempore verno aut æstivo) statim exequisse sæpe sæpius vidi.

His itaque præmissis dico, Hippocratem recte sentire, de purgantium medicamentorum deploratis affectibus, prout pharmaca sui sæculi fortissima in Febris ardentibus imperite, nempe Venæsectione haud præmissa, exhibebantur. At vero si in adultis, & præsertim Sanguineis, aut Athletico temperamento donatis, die Catharsin præcedenti, lingua libera manu detrahatur, atque Lenitiva nostra proxima exhibeantur: aut si Juniorum corpora Testaceis, & ejusmodi acidum contemperantibus præparentur, quo melius causa febris primaria radicitus expuegetur, via ad sanitatem celerior, imo securior iteritur, quum Cardiacis aut Diaphoreticis quibuscunque necesse potest.

Videtur autem mihi (ut id obiter dicam) ea esse vera & principalis ratio cur catharsis apud Medicos bene doctos in acutis Morbis hactenus ita male audierit: nempe quia indem plantarum equis, ut ajunt, præponere forent, hoc est, Catharsin venæsectioni præmitterent, aut saltem posthabita sectione venæ, ubi apprimè necessaria fuerit, Catharticum solum, idque è fortioribus, temere præponerent.

Quod ad Venæsectionem puerorum attinet, quamvis materiam fetalem in pulmones metathesis insignior, & Iustus Convulsivæ, eam in minimis Infantibus quandoque exigant, tamen aperte constat, eam non esse medicinam us natura consentaneam, neque magis huic tenerimæ, quam decrepitæ ætati accommodam. Ex proinde minime necessarium duco ejus auxilium

implorare in quibuscunque Infantum affectibus, nisi in Tullibus illis Convulsivis, vel ubi febrem subito exortam Tussis importuna concomitari solet: nisi & in Contusionibus gravioribus, quæ nonnunquam contingunt. Etenim raro aut nunquam Infantes victu tenuiori & minime lauto nutriti soliti vera Plethora (utcuque fuerint floridi) laborare sunt habendi. Humiditas iis inest, quæ diffundere omnes solent, atque ejusdem Humidi in acidum præternaturalis ac facili conuersio, est omnium illis agritudinum causa. Neque credam, sanguinem corpore eductum posse Humidum temperamentum, idque præsertim in Acidum jam degeneratum, proprie corrigere.

Sunt qui pertinaci Contradicendi cupiditate flucti, omnimodum mittendi sanguinis usum, vel in Adultis, incusant aut reformidant. Nimirum hi sunt Helmontii illius nunquam iracundi, & rationi medicandi veteri semper amicissimi, sequaces discipuli; Arcanorum tantorum fortunati hæredes, ut nec Ars medica, nec Respublica eorundem Notitia unquam fuerit digna. Nimirum & hi sunt qui Chymiz cuiusdam non vulgaris, Medicis omnibus peritis plane ignotæ, quæ non nisi mirandos effectus producere solet, Adeptos & Philosophos per ignem sese venditant.

Testacea omnia valide exiccant, eaque de causa affectibus ab humiditate nimia pendentibus, sicut & naturis eadem abundantibus, proprie convenient. Puerorum autem temperies humidissima est, eo quod omnium mollissima. Quia & leuissimula attritione sunt eadem prædita, quæ ustione deperditur, quanquam ustio calorem, imo & acrimoniam non exiguum impertit, quod in Calce viva, ut & in Chymicis quamplurimis medicamentis, manifestum apparet. Cæterum & Aciditatem potentissime obtrundunt, quæ humiditatis aqueæ putredinem periinde sequitur, ac ignem calor. Porro Testacea nullam calefactionem teneris corpusculis præbent, quæ potissimum consideratione ductus eorum usum omnibus aliis medicamentis in Puerulis curandis longe antepono.

Sed est & aliud, propter quod huiusmodi testacea in Pueris tractandis prædico. Ventriculus ipsorum fermento quodam voraci, ne dicam insatiabili, imbuitur, cui tantisper conpescendo Liquida sola minus valent. Siquidem aut obtundi debet Butyro officio ventriculi superiori diu innatante, aut panatellis, vel fartis farinaceis, haud ita confestim ventriculo depullis, nutriti discupit. Atque ægrotantes puerulos non semel observavi vix alia causa languescere, quam quod eos nutrices victu tenuiori ac nimis liquido reficere solerent. Quapropter Testacea multis nominibus puerorum naturæ sunt idonea, neque impressionem sive alterationem quam in ventriculi regione faciunt, ita celeriter ac liquida medicamina quæcunque deperdunt.

Ut nihil dicam de avibus quamplurimis pica sive appetitu depravato (quod Pullariis notum) debilitatis, quæ arena cibo inspersa, atque una deglutita cito convalescere solent.

Testaceorum nomine, non solum proprie dicta intelligi, sed & Corallia, Creram, Corallinam, bezoar utrumque, & similia, eadem tere

facultate Acidum absorbendi conspicua, & potius a huius, licet pleraque stirpis profusius designari volo.

Huiusmodi medicamenta quidem diu in Medico fuerunt, verum usus eorum recentior, & naturæ puerili maxime accommodatus, aut saltem innotuit, aut opem fere nullam hactenus tulit. Perminuta enim illorum dos plane efficit, ut ad alia minus tuta, imo naturæ puero tunc contraria & noxia (intelligo Opiata) quàm et Medicorum, in Vigiliis & doloribus compescendis, jamdiu transiret.

Atque hic me non fugit scemina quoddam super hac re a medico celeberrimo in me commissum. Nempe cum ad subveniendum Lucio Nobili, maximarum facultatum hæredis, curæ meæ demandari solito, & febre periculosissima tum languescenti, meo monito accerferetur, atque ille Narcotici exhibitionem statim proponens, me ejusdem usui maxime reluctantem inopinato offenderet, tu inquit, more exoleto, non hodierno, si ita sit animus, medicinam facere videris; cui ego: neque, ut mos inest, pueris medicinam quidem aut facio, aut unquam me facturum credo. Cum enim ex prædicto usu, non minus certus sim, in eo longe certior (in plurimum fallor) & saltem tutior, in Tormentis compescendis, vigiliis sublevandis, doloribus quibuscunque leniendis, & denique in diarrhoeis sistendis, ac est quilibet alius (quantumlibet Narcotica vulgo æstimantur) cum maximo vitæ discrimine, per id genus medicamenta.

Nullus, quod scio, Opiatorum insanus admirator eorum usum in Debilibus, imo Debilissimis naturis unquam iudavit; licet in eisdem nonnulli Opiatorum usum tacite persequerentur. Nempe proverbium illud tum o tenaci forte complectentes, quod Mortui obmutescant. Verum enimvero cum pulvis iuniorum sit debilissimus, temperies naturæ tenerrima, & vires sint admodum infirmæ, neutiquam mihi constar, cur incertis & periculosis medicamentis, quando tutiora, imo tutissima sint æque in promptu, ægrotanti Puerulo subvenire contenderemus.

Adjiciam & illud, quod ex quo mihi abunde innotuit Testaceorum, atque, uti odi, vis profusæ Anodyna, imo Infantibus Soporifera (dummodo dos ad finem attinendum requisita tum exhibeantur, tum repetantur) vix quæpi eorum agritudo, quantumvis d. lorifica, nimiam Narcoticorum proprie dictorum delibationem postulare mihi visa est.

Ut autem in nullis Infantum affectibus pharmacica Opiatica est probanda, ita neque in eisdem Medicamentorum Calefacientium (quantumlibet nomine Cardiacis, aut saluiferis vulgo inscribantur) usum, saltem liberaliorem, laudare unquam possum. Cardiaci nomen aff. bre, & singulari artificio inventum fuit, ad mullerculas omnes blande demulcendas, ad facilem caprum rusticorum sæpe a medicis peritis longe habitantium, atque a bonis in vicinia marionis medicinam Eleenofynariam cum laule facientibus Cardiacis ad omnes mortuos reportantium, & denique ad ignorantes universos summa oblatione nunquam non perfundendos. Quis enim ex Cardiacis propinquo malum, quod suspicetur? Et tamen res est aliquantum dubia

nonnullis emunctæ naris Medicis, an eorum qui citra violentiam diem obierunt, plures ex Morbis vel Cardiacis revera interierunt. Quicquid enim morbi symptomata exasperare solet, sitim auget, linguam aridam facit, aut quoquo modo teutem nannam incendit, naturis omnium tenerrimis, & vires illatæ injuriæ tere nullas oppositionis minime quidem convenit. Et propterea diversa noventia, ne dicam exitia, ex egritudine puerorum Calidiori iterum atque iterum supra adverti, cum ex usu Temperatorum prædictorum, quotiescunque is fuerit, ne una n quidem in modum observare unquam si verit.

Hic objiciet aliquis, quod ex dura, & pene Saxeæ medicamentorum prædictorum substantia, Obstructiones necessario progignantur, quodque res ejusmodi indolem Puerorum tenerissimam, & vias omnes minimas, propter partium exiguitatem, procliviores obstructionibus reddere debeant.

Cui dubitationi quo melius satisficiamus considerandum est, parentem obstructionum solennem & legitimum esse Acidam Intemperiem, quam sæpe contrahere solent infantes, ex ipsa Aeris frigiditate, atque ex temperamenti sola teneritudine, utut victus tenuissimus, ac limpidissimus ratione utantur. Ideo & quæcunque Acidam Intemperiem corrigunt, contemperant aut obtundunt, & Coagulationes solvere apta sunt (quod imprimis ejusmodi res faciunt, & nunc calor tantilli additamento) obstructionibus submovendis, & reliquæ symptomatum catervæ ex hac antea pendentium cito devincendæ maxime sunt idoneæ.

Ani fortasse crimini dabunt, quod abdita, & in Scholis Medicorum jamdiu celebrata de crisis doctrina interim negligatur, quodque diebus criticorum computatio veteribus ad unguem instituta, & ab his, qui res minus intelligibiles maxime admirantur, etiamnum prædicta, in oblivionem nobis abeat. Suo jure igitur, cum Crisis sit repentina mutatio in morbo facta, vel ad salutem, vel ad mortem, eam, quatenus summa diligentia observare licuit, ab ipsa curationis Methodo (idque maxime in tenellis de quibus hic res agitur) in totum pendere, atque a solertia artis vel imperitia aut accelerari, aut produci. Etenim cum Evacuationibus generalibus tempertive adhibitis curatio principaliter innitatur. Cruditates febrem committentes citius, quam alias fieri solet, concoquuntur, pars materię morbificæ statim eliminatur, & reliquæ viribus impar medicamentis deinceps administratis facilius cedit. An vero cum Diaphoreticis, & Cardiacis dictis exagitari soleant humores, aut in majorem confusionem spiritus quotidie subvertantur, atque res permittatur solis enematis, quæ ultra crassa intestina integris viribus nunquam transgrediuntur, uti concoctio, ita crisis ipsa, jure merito post nimio opere doctam & solennem medicamentorum quamplurimum pompam iero, uno tardissime est expectanda.

Ut vero finiam, crisis nihil aliud quidem videtur, quam ultimum naturæ conamen reliquis omnibus viribus materiam morbificam per locos convenientes tandem evacuare. Idque apud nos sæpissime contingit per Sudores, unum ob

ob præpositum regimen calidioris vitæ. Hæc etiam sæpe per Hæmorrhagiam, per Alvi fluxum, per Vomitus, & nonnunquam per urinas. Quæ omnia concludere efficiunt, quod Natura ipsa, Medicorum optimus, & sapientissimus, nullam aliam febres judicandi rationem, nisi quæ debitis evacuationibus perhibetur, aut vult unquam intelligere, aut conari.

Multa nuperis hisce temporibus varie sunt conscripta, atque argumentis disceptata, de insigni Præcipitantium usu in medicina, quasi omnes ægitudines quibuscum homines conflantur facillime abigerentur, si Præcipitantis proprii & Specifici cuique morbo maxime accommodati dignotionem exquisitam nos haberemus. Notandum est autem nos impræsentiarum agere de affectibus Interorum acutis & febrilibus, qui vitæ eorum de repente internantur, non vero de Chronicis, qui medicanti longas dant inducias, atque novas rerum facultates curiose experiri tutius permittunt. Rursus præcipitatio est separatio particularum crassiorum, quæ vi solventis Acidi in impore aliquo claro imperceptibiles suspendebantur, aut ope acidum infringentis, vinctulis immolutæ, ad fundum depelluntur. Porro cruditæ, quæ in febribus apparere solet, nobis quidem videtur esse prædominantis acidi genuinus effectus: coctio vero acidi multum intracti, atque naturæ vincentis signum. Et proinde Cathartis arte sollicitata Cruditates lustrum prius latas versus fundum corporis deorsum impellit, & videtur præ omnibus aliis medicamentis proprie præcipitare, quo eadem per alvum vel urinas tandem exonerentur. Quinetiam quodcumque aliud medicamenti genus (tametsi speculatores, Philoosophos se nuncupantes, longe aliter sentiunt) Præcipitandi rationem aliquam habet, vix aliam ob causam, nisi quatenus quodammodo Catharticum, illam effectum unquam producit. Neque enim præcipitatio in corpore diversiformi, atque totidem succis & humoribus, tot ductibus & anfractibus conitanti, eadem aut celeritate aut certitudine transigi posse intelligenda est, qua præstigiator Chymicus in stillationibus varii generis in suos liquores, vel colorum mutationes plane admirabiles molitur, vel præcipitationes dictas Magisteria quantocius conficit. Quandoquidem igitur febris partes vitales, & maxime superiores, intentare solet, neque experimentis incertis aut periculosis moram aliquam relinquit, prudentis medici certe erit, quæ potest efficaci methodo, materiam febrilem non modo levioribus aut fictitiis Præcipitantibus denudare, quin & veris & genuinis, hoc est, evacuationibus opportunis, quamprimum fieri potest, radicitus extirpare.

Cum vero per plurimos Medicos famæ celebritate admodum conspicuos, jamdiu, imo etiamnum, serpsit consuetudo fugam omnium fere febrium Sudorificis maturandi, non absereit hic paucæ quædam eo spectantia nunc subnectere.

Ut primum quæpiam febre epidemica correptum vident, de Malignitate nescio qua protinus somniant, atque alexipharmacis & diaphoreticis haud parum calidis Malignitatem illam propulsare indefinenter contendunt. Inter

rim febris ex sua natura sæpissime mitis, nec mali omnino moris, ex ipsa methodo vere maligna (si quæcunque alia) solet effici. Etenim cum serum sanguini per venas & arterias transferendo debitum sudorificis importunis ita penitus exhauriatur, nil mirum est crassiores sanguinis partes in motu suo interrumpi, ac quodammodo stagnare; Pulsus exinde debiliari atque inæqualem, undosum, tremulum, formicantem, aut intermittentem reddi; Urinas insuper eadem de causa paucissimas esse, aut Cruditatis summæ indicia exhibere; ac denique notas malignitatis primarias, nimirum petechias, Maculas purpureas, & quandoque stigmata pestilentialia, (varios gangræne fientis aut facti gradus) sese ostendere soere. Nempe habitus corporis humido multo prius perfusus, & benigno calore constans, sub regimine calidiori statim exarescit, adurit, atque æstu acerrimo prorsus torretur: ut proinde neque lymphæ irrigandis continuo partibus destinatæ copia sufficiens relict, neque sanguis crassior jam redditus, & passim stagnando idoneus, per vasa circulationi pereunni ad vitam sustentandam necessariæ inservientia amplius fluere aut moveri possit.

Illis autem qui malignitatis infelicem notionem & retinere volunt, & cæce deperibunt (utpote nomen funestos ignorantæ epidemice effectus tutissime celans) propono considerandam communem Turcarum praxin, a mercatoribus fide dignis mihi conceditam indotam quidem, sed vere rationalem, quinimo naturalem, in curanda ipsa peste malignarum omnium Februm facile princeps, per luccum limonium in omne jusculum liberalius instillatum, per frusta limonum saccharata ore frequenter masticata, & per pocum apud eos vulgatissimum, dictum Sherbett, hoc est, per ipsum regimen frigidissimum: utpote quibus mithridatium, theriaca Andromachi, radix serpentariæ Virginianæ, & cætera nostrorum remedia calidissima, Alexipharmaca nuncupata, bonis auspiciis sunt plane incognita, aut in nullo numero saltem habentur. Neque igitur mirum est, pestem (cujus terror nostratum animos fulguris adinstat longe lateque percutit) apud ipsos nonnunquam minorem hominum stragem facere solere, quam mitem alias febrium in regionibus in quibus grassatur doctrina.

Argumentum est infidum, & vel puero dignum, quo medici nonnulli, ad partes malignitatis tuendas, uti solent, quod scilicet febrium quarundam natura rectè statuatur maligna, quoniam eadem sunt sæpe contagiosæ. Nam si contagium necessario indicaret aut probaret existentiam malignitatis, consequeretur scabiem ipsam morborum malignorum numero fore accensendam. In quo tamen morbo nec vires concidunt, neque appetitus proternitur, nec pulsus, aut Urina quicquam a sanissimis discrepant; ac denique in quo functiones tum animales, tum naturales constant, & rectè fiunt. Certe Contagium aliquo non carent morbi, quotquot insignem inflammationem in se habent, ut pestis ipsa, de qua jam loquor, ut variolæ, ut morbilli, ut Tussis infantum Convulsiva, & cæteri id genus morbi, qui inflammationi intensissimæ originem suam debent.

Quod ad Sudorifica in febriculis atque in haud inficias eos, Sudores sive naturales, & arte sollicitos, in primis Februm insensibilis (cum porcutis incipiant occludi, cumque sensibilis aut insensibilis perspiratio corporis plurimum impediatur) nonnunquam maxima & re fore. Sudorifica autem, quæ in usu esse debent, sint Temperata, non ea quæ incendium internum promouent. Neque sint tam sicca, & pharmaceutica, neque etiam tam spirituosæ, qualia flammam flammæ admovent, quam Liquida & culinaria, quæ materiam copiam sudoribus proliciendis supplere possunt, quæque ob calefactionem externam, non ob calorem suum ingentium sudores provocant.

Rem unam hic notatu non indignam, nec à scopo nostro prorsus alienam, nolo prætermittere. Ea nimirum febris, quæ anno jam præterito grassata est, & cujus historiam nunc breviter tradam, malignæ etiam nomen, apud medicos quosdam diaphoreticorum usu notissimos, forte asciscerat.

A media parte mensis Maii anni ultimo elapsi ad aliquot septimanas, febricula quædam (quæ ægrotantes de leviscentis doloribus singulos eorum artus per vices tentantibus, de dolore etiam Capitis frontem imprimis corripiente, atque de Vertigine quadam maxime conquerebantur) adeo epidemice invalescebat, ut nullam similiter, quacunque ex causa, aut quavis anni tempestate, hæcenus observaverim. Integre familie quamplurimæ eade in febre pariter corripiebantur, ut vix uni e multis procellam illam generalem effugere contingerit. Insultus autem hic febrilis ita epidemicus ex varietate aptius tempestatis anni tunc temporis pendere mihi plane videbatur, æstu aliquot dierum intensissimo in frigus derepente mutato, perspiratione corporis sensibili tunc impedita, & poris qui apertissimi fuerant ex improvviso occlusis. Illud vero super hac re advertam, nonquam tot homines simul ægentasse, nunquam pauciores fuisse satis perfunctos. Ea quidem tempe laborantes, methodis tam congruis quam absurdis, nimirum venæsectione, cathari, sudorificis, administrationibus omnibus muliebribus, culinaribus, aut medicinalibus, domi aliquantisper continendo, foris in aerem prodeundo, equitandi exercitio aut alio quocunque, uno perturbatione omni & cura paululum vacando, ac denique nihil quicquam aut quodlibet agendo in universum fere omnes convalescebant. Siquos autem mitissimo illo morbo male mulctari acciderit, adolescentes fuerunt & juvenes, fervidiori temperamento donati, atque sudorificis calidissimis ultra modum lacesciti. Quod in hac re notandum restat, extimescendum est nobis, naturam hujusce febris ita nunc ac benignam, tam impropiis quam salutaribus remediis facile propulsatæ, effectus diros atque funestos posthæc forte habituram: nempe optatum illum successum frustra expectantibus bonis illis mulieribus, & gregalibus medicastis, ex cardiacis suis & nescio quibus sudorificis (cum alia tempestas anni curationi fuerit plane adversa, & febris quæpiam truculentis admodum symptomatis stipatam sese ostenderit) quoniam tempore vernali, & æptis quibuscunque plurimum favente, atque in febre omnium mitis

ma, prius visi sunt experiri.

Præterquam exempla aliquot Curationum methodi nostræ beneficio peractarum libeat proponere, paucula quædam adjiciam, quæ symptomata infantum in his ætate respiciunt: quæcunque apud Autores vulgo inveniendæ sunt curiosis relinquens.

Inter omnes affectus, qui vitæ infantum interminantur, nullus tot gravia symptomata progenerare solet, quot dentitio difficilis & laboriosa. Ægrotudo ista novem menses, sive prægnatio (quæ sexcentarum & innumerarum calanitarum autor, justius quam ipse uterus, perhiberi potest) genitricis non paucioribus periculis, quam totum omnem Dentitio exponit. Etiam cum gingivæ tenellorum inflammationem talem sapissime tubeant, qualem aliæ corporis Adultorum partes (unde febres hæc impendent vehementissimæ) eo quod dentes ex alveolis in conspectum erumpere nequeant, minime est denirandum eorum tenera corpacula tot symptomatis febrilibus gravissimis eapropter jactari solere. Nimirum illicitis Tormenta ventris, Vigilæ, Inquietudines, Profluvium alvi, aut ejusdem constipatio, dejectiones & Vomitus virides, aphthæ, febres, convulsiones, & similia: quæ universa eidem tere methodo (ratione ætatis, & symptomatum violentiæ habita) Acidum primo contemperandi, ac deinde leniter expurgandi indubio cedunt; nisi morbus Chronicus in Acutum transiens, sit valde complicatus, atque altas adeo egerit radices in regione partium principalium, ut nulla jam arte dimoveri queat; aut nisi misellis fuerint ingenta mala, imo pessima stamina vitæ.

Duplex est dentitionis tempus, infantibus molestum: unum, quo dens osse maxillari primum emergere nititur, & quo gingivæ pars externa & superior, absque aliquo ejusdem tumore, albedo quodam circulo circumscribi ut plurimum solet. Alterum est, quo dens mole jam auctior & amplior factus, gingivam tumidam semper reddit, inflammationem insignem in eadem parit, atque eam percurrere omni vi conatur. In primo illo dentitionis molimine, æque ac in secundo, chirurgi gingivæ infantum quacunque ex occasione imperite incidunt, quo scilicet dentes facilius erumpant, unde vulnus citra necessitatem, & nullam plerumque opem ferens, teneris promiscue infligitur, quum secundum solummodo dentitionis tempus (quod diligenter notandum est) eam plagam inferri proprie requirat.

Est & aliud circa hinc rem observatione non prorsus indignum. Nempe quod chirurgorum nonnulli gingivam intumescens aperire jussi, phlebotomo suo id facere consueverunt: quod pluribus exitio fuit. Nam cum incisio ejusmodi statim cicatricetur, neque foramen aliquod denti extrudendo aliquantisper permaneat, plane inefficax ea sit, atque alia remedia interim negliguntur. Curandum est igitur medico, ut instrumento magis commodo (sive sit Scalpellum quo calami scriptorii vulgo conficiuntur, sive sit aliud, cujus dorsum in densitatem novæculæ æmulam assurgat) incisio semper fiat.

Cum aphthæ ab halitu acri incendi interni,

teneram oris pelliculam (quemadmodum & alias corporis partes interiores) rodente aut vellicante proveniant; quæ illam acrimoniam potenter retundunt, atque etiam tollunt, ea sola nobis maximi sunt æstimanda. Gargarismata autem, topica, & præterea quædam nunc hic sunt vius. Nequeunt enim infantes os suum quoquo modo colligere, nisi id inter ipsam deglutitionem quadantenus evenire existimetur. Quippe illico deglutiunt, quicquid ipsis propinatur ad colluendum aut hauriendum; imo ipsum illum humorem, qui Tussis vi ad fauces rejicitur expuere nolunt (nisi invitos quandoque Vomitus cogat) sed in ventriculum suum delabi constanter permittunt. Nec vero materia ex qua gargarismata coniciuntur ita est nonnunquam innocua, ut tuto eorundem unum in tenellis locus relinquatur. Certum est, aphthas (quantumlibet lactationem, aut qualemcunque estimationem impedire solent) Testacis, & tenuissimis catharticis dicto modo intercalatis protinus recessuras esse; neque video, cur pluribus artificijs ad finem attingendum nimis doctè uteremur, cum pauciora medicamenta, & simpliciora, tam tutissimos quam præstantissimos effectus edere poterint.

Ratio autem, quare oris superficies adeo aphthis producendis faveat, cum interim ceteræ corporis partes ulceribus nullis afficiantur, hæc est: quoniam pellicula est eadem, quæ circumvestiens regionem oris per asophagum in ventriculum ipsum continua serie ejusdem tunica exporrigitur ac descendit. Quamobrem halitus acres ex effervescencia corporis præternaturali circa hypochondria contingenti, tanquam ex atheno per oris spiraculum sursum feruntur, atque membranz illius partis labem suam facillime infligit. Ideoque gustus linguæ delicatulus sapor omnes promptissime distinguit. Denique propter eandem rationem Medici temperiem corporis prædominantem ex conspectu linguæ usitato valent dijudicare.

Diarrhæa infantum ab orgasmo humorum in intestina delabentium, vel a turgescencia illibilis cum acido prædominium habente semper profluens, neque Astringentibus proprie dictis, neque narcoticis est cohibenda. Astringentia enim refluxum humorum acrium versus partes nobiliores producere solent; quod humidissimo & fluidissimo temperamento præditos in discrimen vitæ manictum conjicit. Narcotica quidem ferociam humorum turgescensium ad tempus consopiant, quo scilicet vi sæpe majori paulo post recrudescent. Adde, quod vires puerulorum tenerrimæ, & a morbo jam multum fractæ ac enervatæ opiatorum energiam potentissimam raro sine maximo salutis discrimine sustinere valeant. Quæ vero acorem molestias omnes facientem molliter demulcent, & tutius exhibentur, atque his rectius conveniunt. Quantumlibet enim in levioribus hujusmodi casibus (ubi febris abest) diascordii, & similibus, utroque medicamenti genere constantium, usus in malam partem non cessasse quin potius emolumento alicui fuisset, nobis quidem videatur, tamen compertum est, ea in febricitantibus infantibus periculo suo haud vacare; atque cretam, corallias, margaritas, acid genus alia ferocientes humores compescencia, citra aliquam caloris novi accensionem,

sione, ut demum Rhabbarbaro expurgentur, Symptomati huic perdomando optime conducere, & suppetias saniores ferre.

Nec minus in fluxu deorsum, quam sursum habito, sive vomitu eadem prodesse liquebit. Quamdiu enim in ventriculi regione potissimum regnat quæ est perturbatio, atque Aciditas in primis omnium viis potestatem suam maxime exerat. medicamenta quibus facultatibus pollent eas integras, & illibatas, ventriculo impertiunt. Emetica, ut Sal vitrioli, vinum benedictum, Tartarum emeticum, &c. hic præ aliis remediis palmam nonnullis præcipere videntur; sed si ætatis tenerrimæ, & virium summæ imbecillitatis ratio in emeticis propinandis locum aliquem promereatur, & si coagulationum facilis solutio, ac deinde subductio, à rebus nullam naturæ vim injicientibus, nullum vitæ periculum secum ferentibus, satis efficaciter, imo longe tutius, atque ab emeticis, aut narcoticis, haberi possit, sane prudentis Medici erit ab illis omnibus abstinere, aut etiam in totum abhorreere.

Neque eadem profunt tantum in fluxu omni, verum & in torminibus infantum undecunque natis, in quibus non modo præstantes, sed & specificas (si quælibet alia) facultates habent. Non ego Corticem Peruvianum (principem omnium hujus sæculi medicamentorum) febribus intermittentibus magis specificum, non opium (celebratissimum illud alterum remedium) vigiliis & doloribus magis compescendis, quam testacea illa prius memorata torminibus infantum specificæ subvenire censeo. Quamquam enim inter innumerata fere experimenta, in tanta temper. mentorum varietate, maternis tot tractatibus inimitatibus contingentiæ, forte singulam hic illi instantiam contra nos militantem, curiosus quispiam forte fortuna, inquam, observare poterit, id tamen naturæ summæ depravatæ, non remedio in viribus suis delinquenti, est omnino tribuendum. Neque enim corticem ipsum, longe lateque pro specifico deprædicatum, asthmaticis viris febre sive intermittenti, sive aliquantum remittenti laborantibus, ita certo convenire constat. Et nihilominus specificorum omnium princeps in id genus morbis, & maxime in primo illorum genere, jure merito nunc audit.

Quod ad convulsionem spectat, aut insultus illos sæpe improprie dictos epilepticos, tam à viribus jam proxime attritis & exhaustis, quam ab acrimonia materiæ morbificæ propaginem nervosam extimulante ut plurimum pendentes, testacea nostra, & maxime si caloreum vis adjiciatur, magis eximius imo & magis innocuis facultatibus, vel in tanto affectu, vigere deprehenduntur (utcumque apud plures hæcenus pro quiescentibus & rebus nullius momenti sint æstigmata) quam aut aquæ antiepilepticæ, quæ teneros plurimum excalesciunt, ut spiritus volatiles qualescunque qui scintillarum instar in omnes corporis partes extemplo profluunt, quique ex parvis initiis magnum incendium febrile sæpissime faciunt. Nam cum tunica ventriculi interior tota sit nervea, atque tum alimentorum tum medicamentorum facultatibus in penetralia corporis intimiora quantocius transferendis sit ideo accommodatior, cumque spiritus ejus partibus, ut & cæterarum, incolæ jamjam irriterentur,

vellicentur, ac in motus inordinatos exagitantur, videtur nobis maxime necessarium, ut acrimoniam illam nervos irritantem absorbentibus remediis, & tumultum spirituum plane compescerentibus, imo somnum iis sine præparato conciliantibus, non autem rebus tumultum spirituum majorem excitantibus, & quæ calorem jam late depopulantem augent, curatio potissimum instituat.

In convulsionibus quamplurima pro specificis vulgo habita (quorum nomina diu in omnium ore tritissima reticere placet) tam ab autoribus gravissimis quam à practicis celeberrimis decantari solent. Veruntamen virtutes eorum (quantum observare licuit) nostram de se expectationem videntur vix ac ne vix quidem explevisse. In Paroxysmis infantum convulsivis, utpote à Torminum prægredientium materia acri nervos omnes vellicanti jugiter obortis, ea quæ acidum obtundunt, contemperant, aut infringunt, idque sine corporis novo æstu aut calefactione, quæque aciditatem sic infractam atque aculeis orbatam per interiora deducunt, post alia infinita incassum tentata, veras continere vires huic symptomati horrendo debellando pares tandem agnoscentur.

Quin & hujus dicti veritatem multum comprobata habui in puella annum vix unicum agente, filia cujusdam honesti viri, nomine Jacobi Louvy, convulsionibus quas nunquam vidi gravissimis, vehementissimis, & frequentissimis correpta, quæ per plures dies ante meum adventum labia, oculos, artus, imo & totum corpus minima cum intermissione exagitaverant. Fuit illa tunc temporis pallidissima, nec non horrido aspectu; alvus interim attrita, atque id quod parcesime deiciebatur colore fuit viridissimum. Alta tamen voce ejulabat. quantumlibet vires prosterni videbantur, ut viciniam commiseratione haud levi eadem amitteret. Durantibus vero hisce motibus convulsivis, ac torsionibus ventris, vix cochleare alimenti aliquandiu assumpserat. Cardiacis solummodo nescio quibus subinde nutrita. Huic miseræ infantulæ subveniebam, & Curationem feliciter adhibebam, nullis aliis medicamentis, nisi uncis aliquot oculorum 69. cum crystallis tartari admixtis. Simplicissimæ illius pulveris scrupulum unum aut amplius singulis horis in aqua pulegiæ aut confusimilitatim deglutire cogebatur. à cujus repetita dosi somnus paulum conciliabatur, ac paroxysmi Convulsivi sunt plurimum imminuti. Enema elacte saccharato, eodemque salito, semel atque iterum injiciendum esse curaveram: donec tandem crystalli tartari (tam alvum leniter solvendi, quam obstructas vias aperiendi facultate pollentes, modo quantitas eorum sufficiens introsumatur) viam sibi per interiora patentem faciebant. His vero paucis, & hac nulla remediorum pompa, infans ille deploratus è faucibus imminentis fati, insperato quidem, sed perfecte evadebat. Cur autem, ut id obiter dicam, tenellos convulsionibus excruciatos, & simul Vigiliis ac inquietudine quasi absumptos, vesicatoriis aut nuchæ aut aliis partibus admotis, ulterius ego torquerem, nequeo probe intelligere; quandoquidem id genus medicamentum comatosi stupore excitandis aut etiam

extorquendis videatur esse propriæ & peculiariter dicatum.

Quidni addam, quod, ex quo methodo supra laudata in medendis infantibus ulus tim, plures eorum, sub primum meum ingreſſum, convulſionibus correptos viderim, imo & nonnullos iis adeo jam graviter debilitatos, ut medicamentis quibulcunque deglutiendis nullz omnino vires amplius ſuppeterent: ſed quod vix meminerim quidem tenellorum quenquam convulſionibus tunc temporis prius immunem, poſt primum uum pulverum prædictorum, denuo conceptum memet unquam vidiſſe.

Variolæ & morbilli infantum, plerumque illis mitis & tranquilla ſanguinis efferveſcentia, ſæpe non ita male ſe habere ſolent, ubi nec Medicorum auxiliatrices manus expetuntur, neque curatricum ſibi magnopere placentium abundans pericia eſſagitatur. Cum vero extraneis ſanguinis impetus Medicam opem jure expoſtulet, teſtacea prius recensita id ſere auxilii infantibus, quod adultis narcotica, præbere ſolent. At vero ſpiritus volatiles, qui in uſu ſunt, aquæ cardiaca, mithridatium, Theriaca Andromachi, & cætera calidiora & ſiſiphariaca, aut diaphoretica, ſunt imprimis fugienda, quæ exanthematis præpropere expellendis, atque infanz eorum foras extruſioni omni ope molienda præcipue deſtinantur: atque, loco virtutis cardiaca aut expulſoria quam præſeferunt, variolas ex ſe benignas in periculofas multoties immutant; & morbillorum materiam, alias in ſuperficiem corporis facile ſecedentem, irritant, perturbant, & introvertunt, Dyſpnæas lethales ſæpe invitant, & catarrhos tuſſicativos excitant; ac denique ſanguinem leviter & modice ſtuant mox ulterius luſcendendo videntur maxime quidem inſervire.

De variolarum natura penſitanti mihi in mentem ſæpe ſubiit admitti, quæ ratione regimen intenſe calidum in hoc morbo non modo apud ineptas nutrices, verum & Medicos alias ſatis doctos ita invaleſceret; cum hicce morbus ſit maxime inflammatorius, cum denique ſuppuratoria omnia medicamenta, propriè ſic dicta, partibus corporis ſive uni ſive pluribus intumentibus, & in ſuppurationem proclivibus externe applicari ſolita, tum à Medicis tum à chirurgis, uno omnium conſenſu, ſint & eſſe debeant facultatibus ſumme temperata; qualia ſunt radices althææ, & liliorum, folia malvæ, althææ brançæ uſing, farina lini, ſanguinei, tritici, butyrum, adeps, oleum, vitellum ovi, mucilagines, medulla, & ſimilia, quæ calore minime excellunt. Remedia enim calidiora ſive interna, ſive extra adhibita, ſunt plane diſcutiendi, & rarefaciendi, & facultate priori contraria prædita: adde quod hæc functiones naturæ ſuppurationi ita incumbentiſſe revera perturbent, & in conſuſionem alienam neceſſario adigant. Quamobrem teſtacea, quæ ſunt viribus admodum temperata, quæ ſuppurantibus Medicamentis natura ſua benigna ac miti proxime accedunt, quæ putredini corporis univerſali ſummopere reſiſtunt, quæ denique functiones neque animales neque naturales interturbant, aut inordinatas reddere ſolent, pluribus certe nominibus variolarum curationi ſymbolum conferunt.

Potui pluribus rem inſtitutam defendere, atque adeo limites huius opellæ in longinquum proſeſſe. Sed lectorem nolo diutius detinere, ambagibus ſcholasticis nullam unquam determinationem aut ſubitum aut promerentibus; & ad praxin Medicam nihil quicquam attinentibus; nolo autorum inter ſe in æternum velicantium citationibus g'oriolis umbram eruditionis non vulgaris aucupari; ac denique nolo aliorum ſententias ſubtiliter convellere, quo in alienis hallucinationibus ipſe triumphos agam, & quo meam qualem qualem opinionem quoquo modo propugnem. Etenim probe novi, quam revera difficilimum ſit, veritatem rerum penitus ſcrutari; novi quod is ad veritatem cujuſque rei proxime accedat, qui minus aliis erraſſe deprehendetur, Utcunque enim homines ex qualibet anſa criftas ſuas in altum vulgo erigunt, & ſcientiæ conſummatae ſpeciem in hac vel illa diſciplina ubi facile aſſumunt, mortalibus tamen haud conceſſum eſt ultra tenuitatis & fragilitatis naturales terminos progreſſuſſacere. Et protecto quanto quis ſciis ſcientia eſt ſuperior, tanto ut plurimum ſe gerit ſubmiſſior. Videtur autem noſtis quædam rerum medicarum comprehenſio, atque pari ſcientiæ proportionè limitata, omni ſæculo partem diſtendi, ut ſcilicet neutrum alterius ignorantiam nimiam merito exprobraret. Sane perdidimus nos, inter magnas rerum humanarum viciffitudines, quamplurima quæ in prioris ævi ſæculi præclaram memoriam & ceſſerunt, & ſemper vertent. Neque etiam deſunt iplimet noſtro huic ſæculo (quicquid invidi ringuntur) ſua inventa laude admodum digna, quæ artem Medicam, uſque dum ars erit, & magnopere nobilitabunt; & a noſtris ſic exultant teræ poſteritati ſacram tradent.

Exempla aliquot infantum Methodo hac noſtra curatorum nunc tandem exhibebo; id autem non eo animo ut conamina noſtra, qualia qualia ea ſunt, aliis omnibus peritioribus methodis anteferenda proponerentur. Quippe quid alii iudicio magis valentes poſſint, non eſt noſtri determinare. Illud duntaxat agimus, ea quæ pro vero, aut ſaltem veriſimillimo, ex noſtra obſervatione, ſunt comperta (eandem iudicandi poteſtatem aliis libere relinquentes quam nos jure ſuſcipimus) & quæ nonnullis e re ſore haud veremur conjectari, in lucem emittere, & publici juris facere.

Obſervatio. 1.

1. Nobiliſſimus infans, filius natu maximus Illuſtriſſimi Domini, Domini Caroli Marchionis & Comitæ Vigornienſis. (Viri junioris omnium in Republica maximorum ſumme capacis, quem nulla rerum humanarum viciffitudines ab integritate ſingulari unquam tranſverſum egerunt, ac denique ingeni celeritate quædam incredibili donati) Temperamento corporis valde ſanguineo & ſucculento præditus, ſed cui nervi omnino infirmi fuerunt, febre acuta plus ſemel ſuit correptus; materia autem febris in pulmones ipſius potiſſimum ſe ſemper tranſferebat. Interim Dominatio ſua dyſpnæa graviter laborabat, & difficilis inter dormiandum anhelitus aſſantibus clare ſuit auditus.

Pallor

pallor faciem venustissimam obducebat, sitis maxime urgebat, & calor cutis intensus ac mordax, cum jactatione & inquietudine continua.

Sanguinem è brachio paulo liberalius primum detraxi, ac deinde ipsa hac methodo quam descripsi semper auspicato sum usus, qua febris cum omni symptomatum satellitio fuit facile profligata, & sanitas denum restituta.

Ceterum primum tempus quo illustrem hunc infantem ac domum ego invisebam fuit, cum jam quatuordecim menses esset patus, fujii die 14. Anno 1685, Tussi autem convulsiva tunc temporis fuit maxime debilitata, cum cura nostræ committeretur Domino Doctore Short, medico nemini secundo, in sociam operam feliciter accersito. Vena brachii dexteri ex communi consilio itatim aperta, & sanguinis uncias circiter quatuor detractis, equidem proponebam margaritarum, & similium Aciditatem prædominantem contemperantium, utrum solito liberaliorem; Succipulegii saccharo cando edulcorati cochleare interim bis vel ter in die simul præbendo, atque tertio quoque die alium ejus manna blande solvendam; cui quidem methodo, ut a me alius comprobata, ac simul tutissimæ, facile annuebat Vir candore singulari, & perspecta morum probitate, non minus quam peritia artis, præstantissimus. Acque eo pacto Nobilissimus ille infans, Augusti nax post Regiam Familix Ducis de Beaufort proximus a patre hæres, qui ex judicio præclarissimi illius medici haud minus trium montium spatio liberandus videbatur, decem circiter diebus (ut non male tunc temporis palam augurabar) e gravissimo hoc morbo convalescebat.

Porro eundem nobilissimum puerum, jam quinque annos natum, nuper febre continua decumbentem; & primum de capite ac ventre alternis vicibus quiritantem, sed mox immensum torminibus in regione illi intellum mittere excruciatum, (ut ad hæc am passionem jam proxime accederent) cum pulsu debilissimo (tortuante numine) ad sanitatem reducebam. Notandum autem, quod cum hæc febris acutissima & continuas intermitterentem & cutem denum transmutaretur, ejus paroxysmus, nullo frigore aut frigore inter initia (ut fieri solet) constans, sed tussicula sicca a litum sibi pariter ac durationem faciens, semper à prandio singulis diebus recurrebat, corticis peruviani vires experiri placuit. Verum emolumentum exinde enatum erat fugax & mere palliativum, donec illi aliquot sanguinis è naribus fluentis cum tussi vehementius urgente, & febre novas vires capessente, me aliquamdiu prius reluctantem (eo quod robur nativum ex hoc morbo jam plurimum attereretur) è brachio sanguinis uncias ad minimum sex detrachere tandem cogerent, atque die proxima catharsin adhibere. Quibus igitur exactis, Julapium corroborans, & reliquis tussis abigendis præcipue destinatum, illi jam valde inbecillum ita protinus conluebat, ut ad pertectissimam valetudinem quotidie propius accederet, & sanitas ex omni parte constata qua ab illo tempore jam integra fruatur, et restitueretur.

Observatio. II.

1. Filiolam ejusdem Celsissimi Marchionis, & Dominam, Dominam Elizabetham, undecim menses natam, habitu opimo & crasso præditam, febre acuta cum tussi fere convulsiva, ineunte vere, sed & tempestate admodum frigida, nuper correptam, methodo prius recentita auspicato tractabam, & paululo majore temporis spatio (nempe æquatione tempestatum anni habita) ad integram sanitatem reducebam, nisi quod sub finem curationis guttas aliquot Elixir propriet. dulc. & testaceis exhibitis denum adijci curaverim.

Observatio. III.

3. Unicus filius Illustrissimi Comitissæ Pembroke (non modo antiquo natalium splendore, verum & universis animi dotibus egregiis ornatissimi) septendecim septimanas natus, torminibus ventris, dejectionibus Viridibus, aphthis, inquietudine perpetua, nec non subsultibus membrorum crebro recurrentibus, incipiente februario, laborabat. Aures, quibus madidus quidam humor (pro more infantum) copiose effluere solebat, jam fuerunt prorsus exarefactæ. Hujusmodi præscriptionibus obtinui, ut Nobilissimus ille infans intra spacium sex dierum quam rectissime valeret.

℞. Pulv. & chel. 6ʒ. comp. ʒi. margar. pp. ʒii. sal. prunell. ʒj. M. F. pulvis in viii. p. x. dividendus. Sumat unam itatim, in cochleari Julapii sequentis, superbibendo cochleare alterum.

℞. Aq. lact. alexit. ʒiij. pulg. ʒii. prun. comp. ʒiii. sacch. perlat. ʒi. M. F. Julap.

Postquam primis duobus diebus illustris infans de pulveribus prædictis quod præscriptum erat assumpserat aliquoties in die ad Symptomata quibus detinebatur consopienda, & ex quibus revera sunt consopita, exhibui diei tertie aurora Syrupum Solutivum sequentem; quo alvus leniter subducebatur, atque res omnis in vado fuit constituta.

℞. Syr. de cichor. cum rheo, de rham. cathart. ana ʒi. rhei el. pulv. gr. xii. tinctur. croc. gr. x. M.

Deinceps duos alios dies in pulveribus illis exhibendis adhuc pergebam, ac rursus tertio cathart. eandem mittebam. Quibus absolutis ægritudo omnis in totum evanuit, color faciei pallidus fuit in vividum immutatus, atque aures, uti prius, exudare protinus ceperunt.

Observatio. IV.

4. Honoratissima ejusdem Illustrissimi Comitissæ Filiola, Domina Catherina, tres Fannos & dimidium quarti ementa, febris lenta exacerbationibus valde irregularibus constanti corripiebatur, atque illa de gravi capitis dolore maxime, (& Ventris nonnunquam) conquebatur. Alimentum omne fastidio ei fuit, & somnolentia identidem premebatur, ut variolarum suspicio apud domesticos omnes fuerit oborta; subsultibus memborum aliquoties inter dormiendum, nec non tussibus

secca, nonnunquam tentabatur. Sequentia præscripsi.

℞. Aq. lact. alexit. ℥ vi. epidem. ℥ β. margar. pp. ℥i. pulv. e chel. 69. simpl. ℥ ii. Sacch. crystall. ℥ β. M. F. Julap. de quo capiat cochl. iij. quarta quaque hora, vasa prius diligenter agitato.

℞. Aloes. Succotr. ℥i. summit. centaur. min. fol. sabin. licc. ana. ℥ β. pic. Burgund. ℥ i. tereb. Ven. q. s. f. Empl. umbilici regioni adhibendum.

Die proxima persistebat in usu Julapia.

Epispasticum etiam subtus nucham fuit applicatum.

Enema è lact. saccharat. & salit. ℥ vi. quoniam alvus non respondebat, injiciebatur.

℞. Ethiop. mineral. calomel. an. gr. vi. mixt. cydon. ℥ ii. f. Bolus sero exhibendus.

Sequenti die sumebat Syrupum hunc catharticum:

℞. Syr. derhamn. cathart. ℥ ii. pulv. Comit. Warvicensis gr. vi. rhei el. pulv. gr. xii. tinctur. croc. gutt. xx. aq. ceras. nigr. ℥i. M.

Crystall. tartar. ℥ β. ad vim purgativam exacuendam in haustu seri possetici propinabatur.

Eadem nocte quatuor cochlearia Julapii prædicti exhibebantur hora somni.

Quarta die & quinta Mixtura sequens cochleatum delingenda reliquis additamento fuit.

℞. Corallin. ℥ ii. fol. menth. sicc. pulv. ℥j. pulv. e chel. 69. simpl. ℥i. syr. de balsam. Tolut. de althiza ana ℥i. aq. aurant. ℥ β. M.

Vespera sextum diem præcedente bolus superscriptus repetebatur; & mane insequenti Syrupus catharticus; ex cuius vi & efficacia, sub meridiem, Nobilissima domina lumbricum spithamæ longitudinis ventriculo evomuit. Quo facto, ab ægitudine omnimoda promptissime liberabatur.

Observatio V.

5. Honoratissima, & unica filia serenissimi principis Jacobi Ducis Ormondæ, vix unum mensem adhuc nata, nausea ac vomitione fuit male affecta, nec non sedibus viridibus, ac proinde torminibus cruciata. Pulvere perlato ad gr. viii. vel ℥ β. in cochleari aquæ menthæ, bis vel ter in die propinato, tormina ventris facile propulsabam; atque rhabarbaro à gr. vi. ad ℥ β. in tantillo Syrupi de cichorio cum theo materiam morbosam blandissime subducebam: ex quibus color dejectionum viridis in meliorem immutatus, ac torsionibus statim sublatis dies noctesque fuerunt quietis plenæ. Nausea pariter ac vomitus, ventriculo jam emendato, protinus cessabant.

Observatio VI.

6. Filia unica eximii domini domini Foot Onsovv Armigeri, apud Kensington, præsentis Parlamenti Senatoris, atque ex amplissima & florentissima familia in Comitatu Surrix oriundi, sex menses nata, febre insolita, ac mali moris, quam malignam nuncupare amant, aliquamdiu fuerat correpta. Dejectiones ejus virides fue-

runt, color faciei pallidissimus, nec non plumbeo proximus. Aphthæ oris lactationem omnem prorsus impediebant; & Symptomata quedam inusitata maximum vitæ discrimen una intentabant. Mentum suum, quantum potuit, sursum attollebat, & caput retrorium dies noctesque deflectebat, ut ego apostema aliquod circa fauces hærens, aut Strangulationem repentinam, statim ac advocatus, proinde suspicer. Huic alterum è pulveribus præmemoratis ad gr. xv. qualibet vice exhiberi jussi, secundum methodum superius descriptam. An vero toties quoties is propinabatur, è vestigio contigit ebullitio talis, qualem in nullo infante tam perceptibilem observare adhuc licuit. Omnia enim deinceps in tumultum enormem conversa sunt, atque res in extremo discrimine perinde versari videbatur, ac si Suffocatio totalis eam statim confectura esset. Ebullitionem vero usitatam inter acidum & alcali, sub primam eorum in vase admixtionem, plane referebat. Porro effervescentia hæc finita, illa sudore multo protinus disfluebat. Neque tamen post plures pulverum doses, & subsequenter lenissimam cathartin, aut Symptoma illud tantillum minui, aut cetera in melius mutari videbantur. Itaque mercurii dulcis, & florum sulphuris ana gr. iv. in tantillo Syrupi caryophyllorum, tandem vesperi exhibebam; & mane insequenti, ad summam humorum corruptelam, sive corrigendam, sive averruncandam, eadem repetebam. Ex secunda autem illorum dosi matutina, non ita diu exhibitionem, magnam humorum putridorum & fetidissimorum sanguine striatorum copiam, colores iridis multiformes æmulantium, illa evomuit; ex quo statim convalescere incipit, & pulveres illi, à quibus paulo ante ita abhorrebat, tunc iterum propinati optime quidem conducebant, nulla jam ebullitione inter eorum usum amplius comparente. Exinde etiam plorare, ac strenue vagire, tanquam sana, tunc valebat. Item tussis perexiguam molestem creans, tum fuit exorta, tum facile propulsata. Aphthæ quantocyus recedebant, febris protinus evanescerebat, color vividus vultui restitutus, atque infantula hæc univærsis pro deplorata merito habita pristinum vigorem omni ex parte statim recuperabat.

Observatio VII.

7. Filius unicus domini Burton, præfecti navis onerariæ ad Indias Orientales navigare solitæ, octo dies tantummodo natus, tempore hyemali, torminibus, dejectionibus viridescentibus, atque inquietudine continua laborabat. Adde, quod aphthæ, ad instar crustæ albæ, labia interna, imo & totum os adeo jam obducebant, ut mammis nutriticis os suum tenerimum admove-re, aut minimum lactere, haud sustineret. In hunc igitur modum ei præscripsi.

℞. Margar. pp. ℥ ii. pulv. e chel. 69. simpl. ℥i. M. F. pulvis in viii. chartulas dividendus. Sumat unam ter in die, temporibus opportunis, in cochleari Julapii sequentis.

℞. Aq. lact. alexit. ℥ ii. puleg. ℥i. sacch. perl. ℥ iii. M.

Die prima, ac deinceps, Tormina sunt conso-pita, & somnus placidus conciliabatur.

Tertia

Tertia die sumebat Syrupum solutivum sequentem:

℞. Syr. de cichor. cum rheo. ℥ij. pulv. rhabarb. gr. vi. aq. rosar. ꝑt. xxx. M.

Eadem vespere pulverum prædictorum alter propinabatur.

Die quarta lactere incipit, aphthis jam disparentibus, atque sedes fuerunt omnis viriditatis expertes. Veruntamen eadem die, & quinta, in usu priori pulverum perseveravit.

Sexta syrupum solutivum cum Rhabarb. el. pulv. ℞. loco gr. vi. assumebat. Quibus demum exactis, perfecte convaleuit.

Observatio VIII.

8. Filia domini Georgii Sclater, (Theologi, liberali eruditione eximie perpolita, & Rectoris parochiæ Hajes prope Bromely) decem circiter menses nata, profluvio alvi violentissimo, inter dentiendum, corripiebatur, ut ex defectionibus continuis (quæ virides fuerunt, nec pauciores quadraginta aut quinquaginta, spatio viginti quatuor horarum, ut parentes mihi retulerunt) fere exanimis foret, & ab omnibus relictæ pro deplorata. Exhibebam ei pulverum descriptorum (inter quos in sistendis diarrhæis cretam primas obtinere, & vel coralliis præstare, conjectari soleo) scrupulum quarta ad minimum quaque hora, sed & sæpius inter initia, donec fluxus admodum remitteret, ferocia bilis sedaretur, somnus una conciliaretur, & vires aliquantum redintegratæ fuerint. Tertio die præparatos jam humores e corpore exigebam rhabarbato illo nunquam satis laudando, quod tam partium jam imbecillarum robur firmat, quam impuritates blandissime tollit & expurgat. Perseveravi in eisdem ter vel quater in die exhibendis, donec tertia dies rursum rediret, quæ Catharsin eandem repetebam. His finitis perfecte convalescebat.

Hic porro adjiciam. Quod in nodum rhabarbaro, inter purgantia infantibus, sive feбри, sive alias affectis accommodata, palmam facile adjudicem; ita vix aliud repertum est ex natura sua insalubrius, aut periculosius, in tenellorum febribus, decantata illa aloë, quæ febricitantibus (quantumlibet præparatio ejus sacra indigitetur) perniciosissima tamen extat, cum propter intensum suum calorem, tum propter corrosivum suum insignem tenerrimæ indoli maxime adversam. Atque hujusce rei veritatem poterim, si libuerit, confirmare, huiusmodi plane incredibili nobilissimi infantis vix quadriennis, febre lenta correpti, & binorum dierum spatio ad eas incitas redacti, per usum potissimum hieræpicæ, in vehiculo, uti mos est, calido, ut labes viscerum inde subito enata, quam autoplia anatomica postmodum demonstrabat, omnem fidem longe superaverit. Verum illico, memor quemadmodum de mortuis, ita & Quoad viventes, nil nisi bene & honorifice loquendum.

Observatio. IX.

9. Filia Generosi, quadriennis, ætate anni 1637, laborabat febre omnium vehementissima, quas in tenera hæc ætate nunquam vidi; habi-

tus corporis fuit admodum macilentus, sitis inexplebilis, calor cutis ultra illos annos acer & mordax, ut tangentis manus incendium ejus internum vix aliquantulum sustinere potuerit. Parotides interim cruciabant, nec non mediocriter intumebant; genæ rubore summo ut plurimum perfundebantur; atque anxietate & inquietudine continua languescere. Eam sic agrotantem vespere primum invisebam. Cui illico propinabam ex pulveribus prædictis, & redditus paulo expulsiis, semidrachmam, paulo post repetendam, in cochleari aquæ phlegmæ. Mane insequenti eadem sunt iterata, sed bihorio post hauritulum matutinum, sanguis e naribus copiose fluxit, atque tota frons livida & turgidula erat, cum rubore insigni hic illic intersperso, ut omni ex parte fultibus recens verberata frons ejus videretur. Sub tempus sinistrum macula plene coccinea, magnitudinis duorum plus digitorum, eademque rotunda se exhibebat. Quibus spectatis neutiquam deterritus, imo rem bene ominans, in pulveribus acidum contemperantibus, sed his jam minus expulsiis, propinandis per illum diem permanebam. Proxima autem, hoc est, die tertia, ex quo adveni, tametsi febris, Calor, & sitis, æque intensa atque prius tunc manerent, tamen pulverem purgantem, cujus operationi promovendæ opem non exiguam conferebant Crystalli Tartari, exhibere nullus verebar; unde quinque aut sexies dejecisse eam contigit. Denique eadem ipsa die febris illa in totum profligata est, sitis vespere nulla, & calor cutis, tanquam sanissimæ, jam fuit tactui maxime temperatus, ut promde sub noctem pusilla integræ valetudinis conscia parentibus fuisse exclaimaret: Quam rectissime nunc ego valeo.

Observatio X.

10. Filia Domini Golton, generosi, annum unum nata, habitu optimo & præpingui. mense Novembri, propter difficilem dentitionem gravissime febricitabat; sitis ei fuit inexplebilis, vultus pallidissimus, nisi quod & nonnulla viriditatis pallori conjungeretur. Quotiescunque os mammae lactatua admovebat, Tussis statim exorta a latione desistere ea toties cogebatur; quo symptomate eundem admonitus, uvam tumidam ac inflatam fuisse conjiciebam. Os præterea aphthis valde faucibus, quod firme oclusum vix unquam aperire vellet, nisi naribus arte compressis, ad spiritum ducendum, & simul medicamentum sumendum, nonnunquam impelleretur. Sedes ejus viridissimæ, atque acidum redolentes, cum jactatione frequenti, Tomminibus ventris eam cruciari denunciabant. Inter dormitandum anhelatio astantium aures clare seriebat. Præterea ne tantillum vagire tunc potuit, donec excurrente septimana, & ex remediis ipsissima hac methodo, quam descripsi, administratis multum retusa ægritudine, clamor infantibus usitatus præsentium aures tandem demulceret. A secunda catharsi singula Symptomata manifesto remittebantur; & a tertia celebrata, color vultui floridus cum candore viridissimo sen-

quorum vel ad asyla ignorantie confugerent Medici, nisi rerum diu notarum, & a pluribus expertarum, suspicio aliqua notabilis merito fuisset oborta? Certe umbram, amissa substantia, non ita avide captaverant, nisi lux umbræ illius tremula incantamento quodam oculos forte perstrinxisset. Nolim vero chymiam intra pharmacopœæ limites circumscriptam temere vixpendere, quemadmodum & nullis limitibus Medicis conclusam nolim alios inconsulto magnificare.

Notatu autem dignissimum est, maximos rerum Chymicarum fautores, & rationi medendi veteri præfervidos hostes (ut nihil dicam de Cinistombus illis, & circumforaneis operatoribus qui omnia medicamenta adulterinis corrumpunt, & fumos tantummodo vendunt) in summa rerum inopia, paucissimis exceptis, vitam plerumque agere; tametsi credulis, imperitis, & avaris aureos montes (quod ajunt) polliceri haud vereantur. Quanquam autem verum sit, Divitias ac facultates viris Sapientibus, peritis, & in unaquaque Arte optime versatis, juxta meritum suum haud semper concedi, tamen verisimillimum id esse duco, quod extrema eorum inopia ita passim obvia Medicamentorum aut Arcanorum suorum Celeberrimorum noxia, quinimmo summe pernicipi, originem suam debeat: quodque pars eorundem non exigua sit salutis generis humani (propter ignis exitialem sive participationem sive incorporationem) saltem inidonea, si non maxime adversa. Etenim si hominibus magna ex parte è re forent, aut vires eorum dictis vulgo congruerent, etsi hunc vel illum alchymistam locupletare non valerent, tamen sedulos ejusdem Artis cultores in pecuniis corradendis (quemadmodum plerisque omnes artifices industriam adhibentes, & utilitatem aliquam publicam præ se ferentes, quæstus, unde vivant, mediocris concomitari non desinit) haud ita frequenter frustrarentur. Si filio meo charissimo consilium dare animus esset, quid ei factu opus sit ad magnam vim auri, aut saltem sufficientem comparandam; me quidem auctore, spectata morum probitate sese oraret, nullis fraudibus quenquam ludificaret, neque confingendis mendaciis quoquo modo operari daret, quodcumque vitæ genus aut quicquamque negotiandi rationem, ad rem familiarem augendam, ex instituto ille prolequeretur. Nec minus eidem inculcarem, eam esse rationem omnium promptissimam, quo in egestate misera degeret (quantumlibet veteratoribus nonnullis imposturæ suæ ad tempus aliquod prospere contingunt) alios perfide circumvenire, falsa pro veris narrare, atque scelesti impostoris aut hominis nequam partes ulla agere.

Sed ut ad chymica redeam, quantumlibet Opera naturæ apud quosdam evalescant, & natura ipsa, apud Epicurum, ceu iners incusetur, nunquam ego possum non existimare, naturæ opera iis quæ solertia artis comparantur longissime quidem præstare, imo cum Galeno eadem omni laude esse majora & excellentiora. Quamobrem rectissime Divinus noster Senex. *Hic quædam præstare non potest*

Ut autem ad umbilicum perveniam, id eos haud prætereant, quætem de qua jam loquor in deliciis nimis habent, quod vix quælibet

Præparationum chymicarum (ut plus semel apud me conquesti sunt ipsi hujusce artis, siqui sunt, adepti) nodie venum vulgo prohet, quæ non sit plane e mentitia, atque sordida lucri causa jam tandem facta Adulterina.

Objicient demique nonnulli Venæsectionem tantæ ætati nunquam recte convenire posse, nedum eam fore quandoque necessariam.

Respondeo, Venæsectionem vel minimorum omnium Infantum, ex Summi Numinis, Summi Medicorum, præscripto fuisse olim imperatam per circumcissionis illud institutum; magnas saepe Hæmorrhagias illinc exorlas, & quas sistere difficillimum fuit, nisi remediis exquisitis capropter paratis; & tamen scriptores Judæos, quod maxime notandum est, audacter affirmare ne unum Infantulum ex millibus, eo quod sanguis ita mitteretur, cognitum desiderari, aut è vivis præmature excessisse.

Deus Optimus Maximus, à quo tanquam fonte æternum inexhausto omnia bona ac fausta continuo descendunt, à cujus gratia scilicet medicæ artis successus, præ aliis quibuscunque, jugiter pender, his, quæ sincero animo fideliter scripsi, pro sua bonitate favere dignetur, quo in publici commodum, privato semper anteterendum, cedant. Hactenus *Præclarissimus Dominus Hæris insequetur unica Raymund. Job. Fortis Consultatio.*

Pro Vitalitate Natorum adipiscenda.

Illustrissimi ac Præclarissimi jugales, quæ prompta semper fruuntur fecunditate, crudeli, heu nimis celeri ac perenni natorum orbitate premuntur; Vix enim vel limina vitæ ingressi, vel infantilem, aut puerilem percurrentes ætatem, sereno opprimuntur catarrho; epilepsia tentantur, hujusque convulsivis tortoribus miserrime pereunt. Cruciantur inæstissimi genitores, & causam sedulo inquirentes, ut ab uniformi Natorum jactura, eadem in omnibus agnoscant; sic a sese derivatam ac in sese latere extimentunt. Unica filiola quatuor annorum superflite gaudent, fluxione tamen copiosa à capite tentata, & molesta tussi laborant, quandoque etiam præterito tempore convulsivis quibusdam moribus epilepticis correpta. Ab ipsis utque incunabulis patitur vir Illustrissimus continuum fere auris dextræ pugulentam emanationem; utriusque oculi dextri potissimum imbecillimum visum; totius capitis ad quosvis etiam minimos excessus facillimam alterationem, quæ in destillationes frequenter desinit; cui compatiuntur spiritalia Anacatharsi, & Ptyalismo ventriculus, nec fortasse emolliitione abnuat corporis reliquum. Detinetur autem Matrona Præstantissima animi angore, moestitia, importunis cogitationibus, alvi adstrictione, pauca cibi potusque appetentia, nullo Veneris sensu, aut oblectamento; Prolem edit non æque nutritam, exilem, juxta conformationem carentem, ut non immerito suspicari liceat, efficientis materialisque causæ in communi generationis concursu adesse defectum: præstet utramque cum Philogalenicis scemina, vel det ista materiam tantum in sanguine menstruo, concurrentque vere active ipse Vir; utriusque viget vitium in utraque causa

expurgantia. Quarto ejusdem capitis humidam intemperiem corrigentia, atque tandem & aures, & oculos respicientia.

Pro prima intentione, opportunissimum erit oxymel exigua aqua flor. citri dilutum, præmissa portione magistr. ex manna clarif. quæ erit quoque post prædictum Præparans repetenda.

Pro secunda intentione, ulteriora Præparantia erunt usurpanda, ut decoctio chicorac. agri. meliss. pentaph. & betonicæ: præmissa pariter oxymelite diluto ad ʒ ii. vel iii. Inde præparati humores purgandi infusione agarici, senæ, rhab. addito syr. ros. solutivo; vel electuario lenit. Diacath. diaphan. quibus superbibat jus, vel aquam hordeaceam, eadem postea repetita præparatione & expurgatione.

Tertiz intentioni erit satisfaciendum pilulis capit. præsertim cochiis præpar. & aggreg. ter tertio quoque die repetendis, quibus pariter jus hordeo alteratum, vel aquam superbibat Et interim per nares capitis ejusdem expurgatio erit procuranda errhino ex pulvere ireos, major. & nigellæ parato.

Quartæ & potissimæ intentioni satisfacere poterit decoctum sudoris. sine quo nihil reliqua juverint, ex visco querc. vero, salsa, ligno tor. mar. & medul. guaj. ci, in aqua stillat. cichor. beton. & rutæ capr. paratum, cui succedat sudor in hypocaufto, ut caput, omnium malorum fons & origo exiccare possit; in cujus usu quadraginta dieb. insistendum. Ut vero remittatur calor, facile à Decocto sudorifico introductus, terminato sudoris tempore, hauriat summo mane xii. aut xv. diebus cyathum aquæ stillat. de succo cichorii: præmittendo bolum Conservæ rosarum; aut eidem aquæ conservam de acido citri immiscendo.

Tandem postremæ intentioni satisfaciendum, turundam in aurem introducendo, primo melle rosato, mox digestivo, nimirum ex terebinthina & ovi vitello parato, & postremo Balsamo naturali, sive Opobalsamo intinctam. Oculis vero Ophthalmicum egregium admodum erit tinctura croci metaliorum, aquæ chelid. immitta; quæ parata habetur Venetiis ad signum S. Margaritæ prope pontem apud Dominum Hieronymum Rizzetum.

Interim capitis aliqua roboratio negligenda non erit, usu alicujus conservæ capitalis, ex floribus vel beton. vel roris mar. vel salviæ sub ingressum lecti frequenter assumenda.

Hæc autem omnia congruo tempore erunt administranda, incunte nimirum proximo autumno, aut verno tempore venturo.

Victus ratio jam dictis intentionibus proportionem respondens, erit à Viro Excellentissimo Adstanti præscribenda, & ab Illustrissimo servanda.

Pro Illustrissima Uxore multo minus operosa erit incunda Purgatio, primas vias mundando; massam sanguineam ab humore melancholico defæcendo; jecur & hypochondria refrigerando; & cordi atque capiti aliquod robur addendo.

Quibus intentionibus ut satisfiat, Jecoraria dubio procul erit aperienda, sed sanguis parce mittendus, tempore medio inter utramque purgationem menstruatam, quæ si immipute procedat, supplebit in fine purgationis, adhuc

mantibus vasorum uteri orificiis, Saphenæ apertio.

Primæ intentioni satisfacere poterit potio ex syr. ros. sol. & manna clarif. addita portuicula aquæ flor. citri. Inde quinque diebus summo mane assumat julapium a. et. corticibus citri alteratum, ad ʒita exigua aq. totius citri, ut mox Leniens præscriptum repetatur: cui superbibat. jus malva alteratum.

Pro secunda intentione; succi depur. erunt in usum ducendi, ut a dulcibus, quantum fieri possit, abstineamus. Sic parabitur Præparans ex ʒ. iii. succi depur. & per arenam trajecti cich. borag. & pom. dulcium, qui dissolvantur in decoct. jure pullæ parata sol. malv. melissæ, viol. sonchi, cum frustulo citri recentis; in horum autem usu xv. aut xx. diebus erit insistendum; sed sexto quoque die medicamentum elective purgans erit exhibendum, ex flore cassiæ, electuario de succo rosarum & portuicula confecti. Hamech parandum, cu. post horam superbibat serum depur. ad lb. i. ʒ. tribus autem horis ab assumpto sero prandeat. Vel paretur infusio senæ & rhab. addendo syrup. ros. sol. & de polypodio, cui pariter superbibat ad lb. ii.

Viginti jam dictis transactis diebus, tertiz intentioni satisfacere poterit potus aq. Noce-riane; primis diebus dejectionis, reliquis vero diuretico modo propinata; vehiculum autem dejectionis poterit esse syr. ros. sol. aut potio ex manna clarificata; diureticum vero spiritus tartari ter rectif. ad semidrachmam in primis cyathis.

Tandem cordi & capiti erit prospiciendum. Sic mane jejuno ventriculo convenire poterit aqua totius citri, additis gutt. julap. gemmati, aut scorzonæ, una aut altera addita gutt. olei de cortic. citri. Ventriculo quoque & cordi gratissima erit confectio ex guttulis olei legitimi cinnamomi, tum mane, tum vespere assumenda.

Sub ingressum lecti juvabunt conserva totius citri; & flor. rutæ capraræ, lil. convallium, roris marini; & deficiente somno, ex floribus violarum.

Quibus omnibus congrua erit addenda victus ratio, à Viro Excellentiss. præscribenda; & super omnia animi passionem, curæ, sollicitudines & solitudines sunt ablegandæ, imo geniales conversationes procurandæ; fugato namque melancholico affectu, qui respuere solet omnes oblectationes, græci quoque atque jucundi evadere poterunt cum suo Viro congressus.

Puellam quod attinet, cum sit destillationibus tussique obnoxia, magnopere juvabitur à Cauterio sinistro brachio inusto; cum enim catarrhi fontem exiccare in adeo tenella ætate non liceat, genitum à pectore divertere, & educere optimum fore existimo: sed præterea aliqua etiam in usum ducenda, quæ materiam catarrhalem continuo in ventriculum delabentem incidere, abstergere & expurgare, præterea nonnihil fontem ipsum exiccare, atque tandem symptomatibus occurrere valeant.

Primæ intentioni satisfacere poterit frequens usus, singula nimirum hebdomada, crem. tart. ad ʒ. ʒ. cum saccharo in jure pullæ dissoluti.

Pro secunda intentione valebit usus chinæ in taleolas incisæ, & in jure carniū consueto ebullitæ.

D d d d d

Pro tertia Julapium acet. in usum ducatur juno ventriculo ad cochlearia, tum ut tussi educatur e pectore catarrhalis materia, tum ut à ventriculo abducatur; præterea sit familiaris, usus matutinus aquæ prœonæ; quandoque rutæ capraræ; quandoque betonicæ, cui instilletur guttula spirit. cranii humani, aut cornu cervini; nonnunquam etiam spiritus vitrioli.

His autem omnibus custodia aliqua in victus ratione erit addenda; & omnium primo saltem usque ad septimum annum prorsus vinum interdiceretur saluberrimum foret. Superingestiones etiam, quoad fieri potest, sunt inhibendæ, & exercitium permittendum; sicuti applicationes nimis, utpote ætati infantili improprie, non sunt imperandæ. *Raym. Ioh. Forstii Consult. & Resp. Medic. T. ii. Cent. iv.*

INFLAMMATIO seu PHLEGMONE.

Antiqui omnem calorem, naturæ modum excedentem appellabant inflammationem, & hanc duplicem faciebant, φλόγη & φλεγμα. Igitur sicca illa inflammatio, in qua citra ullius humoris defluxum calor parti insitus excitatur, φλόγη Græcis, Latine Exarsio appellatur, estque prope incipiens inflammatio. Sed Phlegmone dicitur, i. de quovis tumore calido, & eo respectu est calidorum humorum defluxio, sanguinis nempe puri, volatilis, aut biliosi, tenuis, fervidi, ut complectantur erysipelas, herpes, & similes tumorum species. 2. De ea inflammationis specie, quæ nomine generis absolute & usitate recentioribus dicta est Phlegmone; tumore nimirum à sanguine puro, coque mediocri, seu temperato.

Est ergo Phlegmone seu inflammatio rubescens, tenitens, dolorificusque tumor. Vel potius dicatur, tumor præter naturam è sanguine in cutem & subjectos musculos effuso, calorem, rubedinem, dolorem, pulsationem, & tensionem excitans.

Distinguitur porro Phlegmone in exquisitam & non exquisitam seu spuriam. Exquisita dicitur, quando purus sanguis extra sua vasa in aliquod membrum effusus est, eique inherens alteratur, & incenditur. Non exquisita appellatur, quæ sit ex sanguine minus puro, sed hoc vel illo humoris genere abundante, unde Phlegmone Erysipelatodes, Oedematodes, Scyrrhodes.

Ideoque Phlegmonis causa habita semper fuit, vel purus sanguis extra sua vasa effusus, vel permixtione alijs humoris inquinatus, qui non solummodo in cutem, sed in subjectam quoque carnem tandem confluit. Quum enim venæ atteriturque majores immodica sanguinis copia distenduntur, gravatur in minores quasi onus deponunt, atque hæc demum in minimas, tumque per minima illa um oscula sanguis, quæ cohiberi nequit, effluit, ac in vacua illabitur spatia; quæ inter fibras sunt primorum organorum, præcipue musculorum, arteriarum, venarum, nervorum, atque membranarum. Quæ partes dum fluxione perfunduntur ac implentur, copia distentæ quasi divelluntur, ferventisque sanguinis ardore in-

calescunt, ac dolorem excitant: sanguis quippe extra vasa collectus, nec libere circulare potens necessario putrescit, ac incenditur.

Verum enim vero sanguinem licet veluti causam tumori huic enodando plerique assignent auctores, tamen hendi modum plurimi tacent; quem inter veteres aliquatenus exprimit, Doctissimus Fernelius l. de extern. corpor. affect. c. 2. quando dolorem ex calore, hunc ex vehementi inflammatione, illam à sanguine non in solam cutem, sed & in subjectam carnem impactio, & ex venis eo confluyente oriri contendit, &c. Hic quanquam causam attribuat fluxioni vasa distendenti, quæ distentio à plethora ad vasa oritur; equidem credendum non est, omnem omnino inflammationem à sola sanguinis copia fieri, cui ratio & experientia quoque contrariantur. Enimvero in plethora cruor tali modo vasa distendit, permeatque, ut sua sponte carceres suos non perfringat, nisi aliud quid accedat, quod sanguinis motum retardet, quodque stagnationem, effusionem, atque adeo inflammationem molietur. Cl. Sylvius Praxeos Medicæ l. i. c. 40. incendi sanguinem, & inflammationem oriri arbitrat, quatenus ex ipso in vasis suis valde distentis, & alijs quibuscumque partibus subsistente, hoc est, stagnante mox incipiunt evanescere partes spirituosæ, magisque volatiles & subtiles, tum acidas, tum salinas temperare solitæ, unde utraq; aciores factæ acrius in se mutuo insurgunt, effervescentiamque ob particulas sanguinis oleosæ calidam excitant, quæ paulatim sanguinem ita corrumpunt, ut in pus vertatur, & quidem pro sanguinis corrupti varietate plane varium: ubi satis clare acidum accusat minus temperatum, partibusque spirituosissimis volatilibus illud temperantibus privatum.

Ex dictis itaque constare videtur, sanguinis in minoribus vasis stagnationis, hinc ejus effusionis, indeque ortæ inflammationis, primam esse causam Plethoram ad vasa, vel ex obstructione vel compressione. Enimvero venæ cum nunc à sanguine, nunc à pituita in ipsis coagulatis ac concretis obstruuntur; vel ab æris externi frigore, aut potenter adstringentibus, medicamentis admotis constringuntur, tunc plus sanguinis per arterias influit, quam per venas nunc obstructas vel compressas refluere potest; hinc cruor paulatim collectus, eadem vascula magis, magisque distendit, & ita quidem, ut referatis eorundem osculis, exitus ipsi pateat; unde tunc (quoniam sanguis ex arteriis in venas non per anastomoses, sed per intermediam partium substantiam, hoc est, carnum tubulos seu poros circulator) is necessario extravasatur, ac in vicinarum partium substantiam effunditur; ubi copia mediocri saltem collectus, modo nunc exposito, mox excandescit, & caloris sensum molestum in parte sensili producit; quæ mutatio inflammatio vocatur.

Sequuntur nunc ordine symptomata pluribus tumoribus communia, quæ illa sunt dolor, tensio, pulsatio, rubedo, febris, perpendenda. Et sane inflammationi plerumque conjunctus est dolor, propter peccans acidum acidius ac volatilius, effervescentiam inordinatam primo sanguini, dein membranosas partes vellicando dolorem inducens. Dolorem excipit tensio ab affluxu sanguinis in partem subjectam, quem venæ recipere nequeunt

effervescencia præternaturali, obstructis vel compressis vasis, incipiente, tandemque ebullitione sanguinem in pus præcipitante, quæ postmodum cessat. Rubedo oritur ab extravasato & excandescente sanguine per cutem ac cuticulam transparente; altius enim in præterius per musculos, cutemque vix transiret, ac nunc rem inducit ruborem, qui tamen pro ratione ebullitionis vel effervescentiæ sanguinis vel accrescit, vel decrescit. Cæterum Febris, quæ non raro adest, vel primaria est, vel symptomatrica; Viz. à sanguine acido, vel altera depravato, atque hinc in parte inflammata stagnante, unde motus ejus vitatur, ac inordinatur fit.

Signa porro, quibus dignoscitur hic affectus sunt membri inflatio, rubor, calor, dolor, profunda pulsatio, molestaque tensio, & alia ejusmodi, quæ sanguinis abundantiam & extravasationem aperte arguunt.

Hæc vero partium externarum inflammatio à multis morbis liberat partes internas, adeoque salutaris plerumque; nisi extensione gangranam produxerit. Periculosa equidem & difficilis curationis est inflammatio, quæ Oculos, Facies, Penem, Muliebrem pudendum, Articulos occupat. In juvene, & Aetate brevius curatur: tardius in corpore pingui, quam macilentio.

Ut autem recte perfecteque phlegmone curetur, duo imprimis sunt observanda: primum ut causæ antecedenti occurramus: secundum ut causam continentem evacuemus: quibus tertium adjungi potest, ut emendentur symptomata; quæ aliquando tam læva superveniunt, ut omnem Medentis curam ad se, neglecto etiam morbo, convertant.

Repellimus ergo, & corrigimus causam antecedentem recto rerum nonnaturalium usu, & humoris in partem influentis Revulsionem.

Rectus rerum nonnaturalium usus in bona Dieta, seu debita ac ordinata illarum rerum dispensatione consistit. Aer eligatur serenus. Cibus Potusque modice sumantur, neque refrigerantes: calida quavis, dulcia, pingua, ut Zinziber, Piper & similia nocent. Nocet etiam corporis motus, imprimis partæ lævæ. Conducit somnus moderatus. Obiunt Alvi durities, Venus.

Quod si bona Dieta, hoc est, recta rerum nonnaturalium dispensatio ad humorem, qui in partem affectam influit avertendum, nec satis idonea, nec satis valida fuerit, venæsectio quamprimum instituat, utpote summopere necessaria; vel ad evacuandum, vel ad revellendum, vel ad derivandum.

Interim vero dum hæc fiunt, cum rarissime corpus vitiosis non abundet humoribus, etiam per clysteres, atque purgantia leviora rite usurpata, sæpe æque ac venæsectio iteranda, multum efficere possumus.

Alterum autem Medici ac Chæirurgi de evacuanda conjuncta materia consilium versatur in recta Topicorum applicatione, & comoda administratione, hoc est, in debita ac tempestiva eorundem ad partem affectam appositione, diligenter considerando, quod sit tumoris initium, quæ progressio, &c.

Remedia igitur quibus in inflammationis initio uti oportet, sunt modice repellentia, qui-

bus aliquid discutientium admisceatur, ut influentis materia arceatur, & quæ nunc influxit leviter interim resolvatur. Quem in finem conducunt æq. plantaginis, lotatri, Iperimatis ranarum rosarum, florum sambuci, ætæum rosarum, sambuci, vinum rubrum adstringens, Læcharum Saturni, camphora, & similia abstinendum vero a vehementer austriquentibus, Bolo sc. armeno, sanguine Draconis, Acacia, Gallis, Alumine, omnibusque oleosis & pinguibus, utpote valde noxus. Quæ omnia poros obstruendo, adeoque distillationem prohibendo dolorem, calorem, hinc & inflammationem augent.

Sed quæquam incipienti inflammationi sine imponenda Repellentia, ab his tamen abstinendum, 1. ubi juxta partes nobiles est inflammatio, vel in glandulis, 2. Quando humores maligni sunt. 3. Quando critice expelluntur. 4. Quam sit inflammatio in corpore Cachectico, quumq. pars affecta debilis admodum sit.

In incremento, hoc est, incremente phlegmone, quoniam & repellere, & digerere tum oportet, habenda magis ratio humoris influentis, & ejus qui in influxit. Sic nimirum repellentia admixtis resolventibus & lenientibus erunt temperanda, ut resolventia prævaleant. Fomentum ver. gr. applicetur ex Malva Althæa, Violaria, Allynthio, Scoruo, Ruta, floribus Camomillæ, Meliloti, Sambuci, Rosarum rubrarum, Baccis juniperi, similibusve in aqua vel Cerevisia tenui decoctis.

In statu vero resolventium pondus augeatur, admixtis una anodynis, si dolor molestus admodum sit. Cum autem ad declinationem vergat inflammatio, vehementius discutere convenit, adeoque sola discutientia & resolventia sunt imponenda. Quem in finem applicetur sequens, aut simile Cataplasma.

℞. Fol. malvæ, althææ an. Mj. lum. absinthij, flor. camomillæ, meliloti an. Mss. Coq. in cerevisia tenui ad molliem, dein in mortario contundantur; contusis atq. de farina hordei, fœnigræci an. ℥iij. olei anethini ℥ij. pulv. croci ℥ss. M. F. Cataplasma. Cataplasmatibus loco non minore cum fructu apponatur fomentum ex superscriptis discutientibus, additis & aliis, decoctum, cui vel Vinum Galicum, vel spiritus vini; pro renata, admisceri potest.

Quod si inflammatio ægre resolvatur, tendatque in suppurationem, promovenda erit & acceleranda puris confectio ac generatio. Hoc vero præstant omnia medicamenta emollientia & Maturantia vulgo dicta, Radices puta & folia Althææ, Malvæ, Liliorum alborum, Brancæ ursinæ, Flores Camomillæ, Meliloti, Farinæ lini, Fœnigræci, Fabarum, Caricæ, Cæpæ sub cineribus assatæ, Unguentum Basilicon, Emplastrum Diachylum, & similia. Ex quibus commodissime parari solent cataplasmata. ex. gr.

℞. Rad. liliorum albor. recent. ℥iij. cæparum sub cineribus assatæ. ℥iij. fol. malvæ, althææ, flor. meliloti an. Mj. Caricarum ping. conficiss. N. x. coq. in aqua pura vel cerevisia tenui ad molliem; tunc in mortario contusis adde farinæ seminis lini, fœnigræci an. ℥iij. unguenti basilici ℥ii. M. F. Cataplasma.

Si autem Aëris arrideant magis unguentis

ne erysipelatodes in cubito oborta, ut scribis, facile crediderim. Venarum eminentia & tumor rubens in parte affecta, atque in dolore fervor ac pullatilis dolor, quæ graphice admodum in literis tuis delineasti, id ipsum mantere evincunt. Methodum vero in curatione susceptam probare nullus possum. Vidi plures agros perisile magis debitorum remedium neglectu, quam intempestiva & temeraria læpe eorundem administratione. Venæsectio, ut fecisti, nullo modo omittenda erat, quæ in corpore plethorico, quale tuum est, omnino requiritur, & præcipuus scopus est in morbis à plenitudine obortis, ne scilicet sanguinis copia ad affectam partem confluens malum adaugeat, dummodo in principio instituat. Inchoantibus enim morbis ex Hippocratis decreto, si quid movendum videtur, movendum. Gignitur enim phlegmone ex sanguinis copiosioris influxu quam pars postulat. Undecumque etiam influat, aut si qualitate præter redundantiam molestit sit. Requirebat eandem febris; quæ accessit, non quidem abuta, quod materia phlegmones in parte externa, longe à corde distita, hærebat, magna tamen, quod inflammatio fuerit magna & profunda. Huius generationi in Te proculdubio, si præincipientem causam respexeris, magnam causam præbuit, nimis concionandi labor & ardor immo-
dicus, quo factum ut per æstum attenuato sanguine & concalescente, exagitante motu & in fervorem sanguinis massam deducente, propulso foras sanguine e vasis majoribus ad minora; & inde ad minora, donec tandem e venis quasi expressus & ad mania musculorum spacia delatus, in phlegmonem degeneraverit. Ex quibus patet, quam male & quanto damno tuo neglecta fuerit venæsectio. Nec obstat, quam præterendis, vitium imbecillitas, tanquam contra indicans, cum illa à gravante sanguinis & humorum copia, minime vero resolutione aliqua eveniret. De purgatione omissa itidem es culpandus, præsertim in corpore cacochymo & sedentariæ vitæ assueto. Eth enim inflammationes maxime a sanguine natales ortus derivent, attamen ansam his præbent humores vitiosi & calidi qui sæpe sanguinem secum rapiunt. Hi itaque expurgandi, quod commode effeceris infuso rhabarbari cum corrigentibus in decocto tamariindorum, addita uncia una syrupi rosarum solut. & de cichor. cum rhabarb. Quod phlegmonem ipsam attinet, cum jam suppurata sit nihil habeo quod addam. An sponte sua aperta fuerit, an vero ferro vel medicamentis, de eo nihil in literis tuis. Illud tædiosum, diuturnum, & sæpe minus tutum. Hoc non sine dolore. Ut ut sit, pus diligenter evacuandum, non una vice, sed pluribus; dolor mitigandus; & si reliquæ quædam non suppuratæ apparuerint, in pus concoquendæ; vulnus mundificandum, ut ejus fieri possit agglutinatio, & alia, quæ Chirurgus tuo ex artis lege administranda relinquo. Tu his frui in commodum tuum uberrimum, me quæ, ut facis, amare perge vale. *Friedericus Lossius in Consiliis Medicis.*

Observationes.

Rustica quædam mulier magnam phlegmonem in brachio habebat, huic cum menstrua de-

ficerent, facta est phlebotomia in crure ex loco opposito. Postea applicuimus parti affectæ quæ repellerent.

℞. Aceti opt. ℥iii. album ovi ℥i. aq. rosar. ℥i. rosar. rub. pulv. ℥ss M. & petias lineas in hoc liquore madefactas loco affecto applicato. Hoc utebatur Benedictus Faventinus præceptor meus.

℞. Unguent. de cerussa ℥ii. succi plantag. & semperv. an. ℥i. aq. rosar. ℥ii. M. & cum petus lineis apponito. At cum hæc valde repellentia ob inguentem dolorem minus juvarent, appolui emplastrum ex mica panis cribellati cum oleo rosar. & lacte; quod in omnibus inflammationibus cum rubore sæpe experti sumus, & dolorem sedare, & fluxum materiæ inhibere; dolor vero illo appposito mitigari capit, & inflammatio cessare. Interim statim post sanguinis missionem corpus purgavi us.

In alia ad inflammationem brachii inunximus primo unguento rosaceo. Postea cum dolor intenderetur, cataplasma sequens inposuimus.

℞. Malv. m. ℥iii. pistentur ad mollietudinem. add. farinæ hordei ℥ss. ol. viol. ros. unguenti populi an. q. s. l. cataplasma: septies tunc reiteratum. Postea etiam brachium inunxit unguento populeo, oleo viol. amygd. d. ros. an. part. æq. imposito deinde iterum cataplasmate superscripto, tandem bene habuit & a phlegmone curata est: alteri hoc cataplasma egregie proluat & dolorem sedavit.

℞. Farin. tritic. q. s. coq. in aqua addendo ol. rolar. q. s. & parum croci; hoc etiam maturat: hoc item emplastro commode sæpe uti sumus ad dolorem sedandum, & tumorem & tensionem resollendam, & materiam insensibiliter resolvendam.

℞. Farin. sem. lini sænuigr. sem. aneth. si. chamæm. melilot. bisinal. coq. pistentur & corporantur cum mucilag. sem. althææ & butyro recentis potest addi in processu farina fabarum. *Petrus Forestus. obs. 5. lib. 1. obs. Chirurg.*

Ubi cognoveris resolventia non complere opus suum, statim dybes sollicitare ipsius phlegmones suppurationem, quam complebis sequenti emplastro.

℞. Rad. malv. fol. viol. an. M. iß. rad. alth. minutim incis. ℥ii. rad. lil. alb. ℥i. bulliant omnia in aq. ad medietat. consumptionem: deinde adde mucil. sem. caulium ℥i. farin. frumenti ℥i. pingued. porcine butyr. rec. lact. mulier. an. ℥i. ol. lil. alb. amygd. d. an. q. s. ad inspissandum emplastrum, quod calidum loco dolenti apponatur. Ad idem egregie maturans & suppurans.

℞. Lactis vaccini ℥bi. medull. panis subtiliter triturate ℥bi. succi caulium ℥ii. croci ℥i. ol. lil. alb. ℥iii. M. & calide apponito: maturata vero phlegmone (cujus indicia erunt mollietates cum undolitate apparens, carentia doloris, & tensionis privatio;) debes te præparare ad illius disruptionem, quod si patiens ferio vel igne terretur, distempnatur sequentibus.

℞. Diachyl. simpl. ℥ii. fermenti ℥i. ol. amygd. d. ℥ss. M. grosso modo, extend. supra corium, in medio pone stercor. columb. subtiliter pulver. ℥i. & phlegmoni applicato; stercore appolito in loco in quo habilior erit ejus disruptio.

secundum ingenium est hoc ruptorium.

℞. Fermenti ꝑ℞. salis ꝑ℞. aceti opt. ꝑ℞. pulv. cantharid. Div. omnia simul bene misce, & in mortario bene ducantur, quousque fiat pasta, cujus ꝑ℞. vel secundum quantitatem phlegmone disrumpenda applicabis apostemati, superposito emplastro supradicto: rupto apostemate, sic ut plurimum medicaberis.

℞. Terebinth. ꝑ℞. vitell. ov. numero 1. optime agitentur simul quousque F. forma unguenti, in quo tentam tactam ex pecia vel ejus filis ad quantitatem foraminis affecti intinges, & foramini impones; tum vero ipsum unguentum extendes supra peciam, & totum apostema teges: factaque idonea ligatura non multum stricta, ne prohibeatur eventatio spiritus & caloris ad membrum, & materia residua maturatio: sic continuabis per dies, donec materia fuerit sufficienter evacuata, & labia vulneris optime digesta. Postea ad majorem mundificationem & abstersionem, appones unguentum sequens, & tentam intinctam in eo.

℞. Terebinth. ꝑ℞. mell. ꝑ℞. M. & usui servas: semper superponendo unguentum digestivum prius factum: mundificata phlegmone, quod poteris videre ex privatione generationis sanguinis & alterius malæ materiae currentis ex ulcere & sufficienter absterisa, indigebit tunc ulcus incarnatione & consolidatione: ideo cum sequenti unguento procedes.

℞. Terebinth. ꝑ℞. mell. ꝑ℞. thur. mastich. myrrh. aloes; an. ꝑ℞. sarcocoll. ꝑ℞. pulverizanda pulver. & omnia in mortario bene ducantur & agitentur, quousque F. unguentum: & sic continuabis usque ad veram ipsius consolidationem: hæc Præceptor meus Faventinus admonerat: si vero vehementer dolor inflammationi accesserit, modis omnibus is mitigandus est, quod si anodynus non demulcetur ad narcotica transiendum erit: inter hyoscyamum admirandam opem sæpe contulisse frequenti experimento præter quorundam auctoritatem comprobatum est: itaque folia ejus sub calidis cineribus coquito, recenti axungie miscero & admoveo; hoc vehementer dolores mulcet, & phlegmonosos tumores ad suppurationem perducit. Petrus Forestus. schol. obs. 5. lib. 1. obs. Chir.

Vir quidam vexabatur in metacarpio & glibo manus phlegmone seu apostemate calido: exhibui balsamum sulphur: ut eo mane meridie ac vespere apostema probe illiniret, & linteola superimponeret cum levi ligatura; quod cum fecisset, statim maturationem, mox disrptionem & tandem per paucis diebus consolidationem & optatam curationem consecutus est. Martinus Rulandus. curat. 90. cent. 1.

Plurimos, cum paterentur apostemata, seu phlegmones, sanos feci intra paucos dies solo emplastro diasulph. (cujus descriptionem, vide lib. 18. sect. 22. subsect. 4.) admovi autem illud mane & vespere, unde citissime ad suppurationem venerunt. Deinceps ultra rupta, & indies his mundificata mox ad consolidationem perducta sunt: quia in hoc emplastro miranda & celeris inest vis emolliendi, suppurandi, rumpendi, abstergerendi & conglutiuandi. Martinus Rulandus. curat. 94. cent. 1.

Cuidam laboranti phlegmone cryspelatode

in facie, folia hederæ arboreæ in aqua quæ à rectis regulatis catuleis destituit cocta, & humida supra faciem posuimus: hoc experimentum habuimus à Chirurgo quodam seniore, quod in seipso, tum sua uxore sæpius, ad guttam quoque rosæcam in facie expertus fuerat: & ego in quamplurimis: semper enim mihi feliciter successit applicatio fol. hederæ post universalia adhibita remedia: eodem modo & fol. tussilag. cocta in aqua & apposta egregie profunt, ut expertus sum; quanquam in herpere magis convenient. Petrus Forestus. obs. 6. lib. 1. obs. Chir.

Planta pedis inflammationes periculosa.

Cum plantæ pedis partes sint nervosæ, ac proinde exquisitissimo sensu præditæ, atque in parte decliviori sita, non leviora symptomata ex ipsarum inflammatione oriri solent, cujus rei exempla aliquot in gratiam tyronum hic in medium adferre non gravabor. Juveni cuidam Coloniz viginti circiter annorum ætatis, ex domesticis generosi Viri Dom. Gulielmi de Hodorff. Dn. in Leud. & Wel. &c. cum ex nimis violenta deambulatione dolor in ipsa planta pedis exortus esset, & ab initio remedia rubia adhibita fuissent, auctus est dolor, & mox sequuta inflammatio. Ego vocatus totum pedem in tumorem elevatum, & phlegmone occupatum inveni. Dolor aderat maximus, & ad coxas usque se extendens; febris continua & ardens; inquietudines item, delirium & hypothyria. In curatione autem hunc in modum processi. Instituta victus ratione tenui, sequenti potiuncula corpus purgavi.

℞. Electuar. de succo rosar. ꝑ℞. pulver. Passavanti cum rhabarb. ꝑ℞. syr. rosar. sol. ꝑ℞. cum decocto agrimon. veronic. radic. lapath. acuti, cortic. inferior. radic. frangul. & sem. anisi, fiat potiuncula. Qua clementer expurgatus fuit. Eadem die post cenam per duas horas ipsi ad gr. vi. laudani exhibui; quievit ea nocte, viresque aliquo modo refocillatæ fuerunt; quapropter postridie venam brachii lateris laborantis incidi, & sanguinem ad ꝑ℞. extraxi, erat enim plethoricus & robustus, hinc febris, dolores & inflammatio multum imminuta sunt. Statim quoque ab initio, coxam, genu, & quicquid ab inflammatione liberum, sequenti linimento inunxi.

℞. Olei rosar. ꝑ℞. olei lumbric. & axung. human. an. ꝑ℞. M. loco vero affecto, quia pinguis ex Galen. doctrina lib. 5. de simpl. medic. facultatib. admovenda non erant, sequens applicui cataplasma.

℞. Sem. cydonior. sænigr. alth. an. ꝑ℞. pulveriscentur & macerentur aqua calida per duas horas deinde admisce farinae hordei ꝑ℞. pulver. rosar. ꝑ℞. coquant. cum. s. q. aq. ad formam cataplasmatum, postea admisce vitellum ovi cum albumine; applicetur & renovetur quotiescunque opus videbitur. His adhibitis medicamentis dolor multum cessare cepit, & locus materiae apparuit, cui emplastrum basiliconis, toti vero pedi cataplasma præscriptum applicui. Et quia pars illa pedis maxime callosa, lacte calenti, in quo semen sænigræci, folia malvæ & violarum incocta erant, diligenter fomentavi

fomentavi, deinde novacula callositatem illam abradi, quemadmodum obs. 97. cent. 1. in curatione paronychiæ scripsimus. Sic brevi in ipsa planta pedis rupta vomica, feliciter evasit. Interim dum circa curationem atque sanationem hanc occupatus eram aliquoties mihi narravit Generosa Dom. de Leud. quendam ex suis consanguineis ex simili morbo intra paucos dies extinctum fuisse. Quod mirum nemini videri debet, cum locus iste, ut antea dixi, sit nervosus, & exquisitissimo sensu præditus, ut proinde gravissima symptomata accerferet. *Gustelm. Fabr. Hildanus observat. Chirurgicar. cent. III.*

INQUIETUDO.

QUandoquidem aliorum morborum symptomata potius quam morbus per se dici meretur ejus specialis tractatio consulto hic omittitur.

INSANIA

Vid.

DELIRIUM.

INSOMNIA.

CUjusmodi sit insomniorum significatio, tum naturalis, prout cerebri intemperiem indicant; tum fatidica prout à Dæmone inspirari, atque futura prænuuntiare assumentur, hic consulto præterimus: solummodo inquiremus quali spirituum animalium motu, & agitatione, in cerebro insomnia producantur. Dicimus igitur, quod spiritus animales, licet alterna motus, & quietis tempora naturaliter affectent, dumque requies indulgent, humoris nervosi cerebro recens instillati complexibus, velut catenis, ne motum ineant, sese colligari patiuntur; tamen plerumque accidit, quod spiritus nonnulli hoc vinculum facile excutiant, atque inter alta reliquorum silentia huc illuc expatiari ament. Atque revera insomnia sunt tantum excursus quorundam spirituum in cerebro ligatione solutorum, qui dum cæteris arcte constrictis, huc, illuc, sine duce, aut regulatore quovis divagantur, atque motuum typos veluti choreas prius edoctas repetunt, rerum prius actarum cogitationes, licet more valde confuso, repræsentare solent. Spiritus qui aliis interim constrictis, custodia soluti varie discurrunt, duplici ratione in motus libertatem vindicantur. Nimirum spiritus nonnulli somni captivitatem effugiunt, plerumque ob nimium cerebri calorem, & agitationem, prout à vini potu, Nicotianæ fumo, exercitio immodico, necnon passionibus, aut studio æriori accidere solet: his enim modis spiritus stimulatione quadam citantur, ac velut in impetus adiguntur, ut somno licet obrepente, una omnes constringi, ac coerceri nequeant; quin aliqui velut spectra in cœmeteriis, inter reliquorum sepulchra obambulant, & stupendas rerum apparitiones faciunt. Alia spirituum quorundam in cerebro, qua insomnia producuntur, exuscitatio, sit ob spiritus quosdam in aliis partibus, uti in præcordiis, stomacho, liene, genitalibus, &c. perturbatos, à quibus dum perturbatio eadem per nervos in cerebrum com-

municatur, unus forsitan, aut alter spirituum manipulus, ibi concitatus, varia phantasmata repræsentari facit. In affectione incubo dicta, um præcordia ob nervos constrictos, aut alias impeditos in motu sistuntur, aut al quoddam, aut pondus grave pectori incumbens, respirationem inhibere somniamur. Huius generis in valis turgescens, eademque irritans, insomnia impudica producit. Cibi dyspepti, & crassiores, in cœna conestii, quatenus ventriculolum aggravant, & molestia afficiunt, sonos item periturbatos, & phantasmatum terribilium interstices reddunt; pariter de multis aliis partibus habere, in promptu est ostendere.

Dum spirituum turba quasi privata, in cerebro exuscitata, & huc, illuc, se proripientes, phantasmata exercent, illorum ~~partes~~ live excursus, modo regulariter, modo inordinate contingunt; proindeque insomnia, aut rerum actarum series, aut tantum chimæras, live notiones omnino dispares, & incongruas repræsentant. Porro dum spiritus animales, eo ritu intra cerebrum agitati, insomnia, seu cogitationum simulachra producant, non raro in genus nervosum resiliunt, ibidemque spiritus alios citantes, motus locales diverim odos producant; quapropter homines nonnulli, etiam quando alie dormiunt, è lecto exurgere, huc illuc ambulare, supellectilem juxta positam loco in locum movere, saepe vestimenta induere, fores aperire, scalas ascendere, loca anfractuosa, & vigilantibus vix adeunda pertransire solent; interim si illorum progressui obstaculum occurrit, aut illud consulto prætereunt, aut è via amoveant. Novi quendam hoc ritu, instar spectri noctambulæ solitum, qui alios vigilantes obviam, factos alloqueretur, manibus comprehenderet & non raro pugnis caderet, deinde nisi asperius tractatus expergisceretur, ad lectum rediens, & postea sponte evigilans, nihil omnino à se actum consciret. Quinimo de plerisque ita lemurum more noctu vagari solitis observare est, quod expergefati fere nihil rerum in somnis à se gestarum recordantur; quasi diverim aliquid à somniantibus paterentur; namque hi se motus locales edere concipiunt, quos revera minime edunt, verum isti loco moventur, nec tamen istius conscii sunt. In somniantibus spiritus excitati omnino interius versus corpus callosum lati, tantum imaginationem, & memoriam afficiunt; in somnambulis vero, illorum manipuli quidam exporrecti ~~partes~~ suam solummodo exterius versus partes motrices dirigunt, interim sensu communi, imaginatione, & memoria minime affectis. Mirum est, quod sagis, seu veneficis passim accidit, nimirum ista, dum sopore profundo sepulta jacent, se loca valde remota adiisse, marium, & terrarum spectacula iis prorsus ignota vidisse imaginantur, & ex æde describunt; quod procul dubio est, quoniam Diabolus rerum ideas phantasia illarum objiciat, adeoque fortiter imprimat ut sese illis interfuisse pro certo credant: è contra somnambuli totas divagantur ~~et~~ eorumque procincius, & actiones diversimodis revera perficiunt, quarum vigiles facti, prorsus ignari sunt. Si huiusmodi passionis ratio inquiratur, hic primo occurrit, quod taliter affecti, facultates tum sensitivas, tum loco motivas isto tempore libere exercent, quippe non tantum pedes, & brachia, velut certis mo-

dis, & numeris movent, uti solet machina rotis ac elatere instructa in super auribus audiunt, oculis vident, & cum discretione quadam, juxta impressiones à sensibili factas, motus suos locales variant. Quare hinc concludere licebit, spiritus quosdam animales intra cerebri medullium posterius, forsitan circa corpora striata inordinate excitatos, nervorum capitella ferire, aliosque dem spiritus, longa serie intra ductus nerveos, & partes motrices confitos, exciere, inque motus prius assuetos ineundos adigere; hinc ut corporis & membranarum lationes diversimodè producantur. Attamen quia spirituum excitatorum non tantum exterius tendit, & non omnino interius in corpora striata & callosum reflectitur, proinde ut nec commune sensorium, nec imaginatio afficiantur, idcirco agentes actiones suas nec percipiunt, nec recordantur. Quod si interrogetur (liquidem sensus communis hoc tempore obtorpescebat) quo itinere spiritus animales, juxta sensibilibus impressiones, ad motus locales hujus, aut alius generis obeundos determinantur: dicendum erit, quod hæc sensus, & motus reciprocatio, à consuetudine potissimum dependeat, spiritus scilicet hoc, aut illo ritu ordinari prius assueti, in somnio actionis libertatem nacti sponte sua ad solitos agendi modos se componunt; non secus atq; dum Citharædus aliud quidpiam meditatur, digiti ejus modulaminis numeros prius edocti, fides miro discrimine, & agilitate exacte pulsant. *Thom. Willis de Anima Brutorum.*

De Insomniis morbofis juxta quædam capite de Incubo. Hic rursus pauca per observationes & Miscellanæ curiosæ & Aliis Hassniensibus exceptas.

Mirum, sed nunquam fallens ægra somnium.

Femina nobilis, jam ab aliquot annis valetudinem minus firmam experta, sæpe arthritica, semper ~~periclitans~~ aliquando calculosa, in qua incommoda incidit ex non interrupto ob mortem filiz unica luctu, quamquam plurimum Medicorum pareat consiliis, familiarius tamen meo, quoties grave incidit symptoma, utitur ministerio. Hæc sine omni hesitatione præfagit venturum proximo biduo morbum, quod trienni jam experimento constantissime edocta sit, quoties de me somniat, instare sibi adversam valetudinem, licet sana ad dormiendum se componat. Credibile oberrare in corpore ejus semina mali antequam se plenè colligant, atq; ab istis vagabundis motuiculis membranas cerebri inter dormiendum leviter pungi, & ab his vellicationibus redire memoriam eorum quæ solemniter geruntur, quoties punctiones ejusmodi crebrius infestant hoc est, discurrendum ad sollicitandam Medici familiaris operam. Hinc quoties eam in viso, primo omnium percunctari soleo, utrum inter somniandum me viderit vel lætum quicquam, vel triste agentem; si neget, jam securus sum proximo ad minimum biduo de mali induciis. *Olai Borrichii.*

Somnium mortis nuntium.

Uxor charissima jam à tribus annis dolore vexatur hypochondriaco cum suctis symptomatibus, quæ noctu fere eam affligunt; ante vero per somnium quasi sentit venturum malum; quare somnio habet ut plurimum hujus vel alterius morbi obrepentis, interdum periculi in aquis, nonnunquam rerum aliarum tristium: expergefacta statim, vel paulo post, sentit incumbere dolores istos: quoties ergo noctu contingit (con-

tingit vero maxime) toties per somnium nuntiatur: alia somnia veridica possunt videri apud Heuric. ab Heer. obs. 2. & Gassendum in vita Peireskii. 2. p. p. m. 73. *Georgius Francus.*

Insomnium Exitusum.

Matthias Brischy viz temperamenti melancholici, annum agens 21. & hospitans apud tutorem suum, in cujus ædibus terrifica spectra videri censent cum die 28. Septembr. Anni hujus 1671. cubitum iturus (dormivit autem solus in illa domus vestibulo) terriculamenta quadam in superiori domus contigione audiret, lectum gravi percussus timore ingreditur, ac profundo opprimitur somno. Non diu post cecidit in somnus hæores, qui civem, optime mihi has notum in vestibulum deducunt, & carnifici non procul a dormientis lecto capite plectendum offerunt. Nec tenuit ille, sed celeri ita caput cervicibus abscondit. Cæterum, caput truncatum adstantes omnes crudeliter interemit, ipsique somniant præsentissimam minabatur mortem, quam ut ille citigeret, ad januam se contulit. Et licet, ut per somnium ei videatur, revulsam caputem insequeretur, à vicinis tamen hinc periculo eximitur, dum caput & simul cum illo omne remouent periculum. Et hic quidem fuit finis insomni, non tamen huius mlieræ somniantis. Corripiebatur namque finito somnio epilepsia gravi, quam cum maxima membrorum jactatione horribilique boatu insiliebat. Audiverat quidem hos tumultus in hypocausto ipse Tutor, qui a febre petechiali, Deo benedicente & me assistente, vix reconvalescerat, sed pro illusionibus spectri eos cum uxore habebat. Sequenti die 29. Septembr. mane surgens ager, de insomnio horribili & capitis dolore conquestus est coram domesticis, consueta tamen obivit munia. Sed vesperi, nihil quicquam cogitantibus adstantibus, paroxysmo epileptico iterum intestatur. Ubi ex membrorum jactatione & boatu merito colligitur, simile ei præcedenti accidisse nocte Advolat interim amita ægri & recognita, propinat ægro Medicamentum aliquod, cujus vires antiepilepticas mirum quantum deprædicaverat. Sic quidem æger sequenti nocte, & die, quæ hanc excepit, nullis infestabatur manifestis paroxysmis, attamen interdum per quadrantem horæ & ultra oculos habens apertos, sine sensu & motu decumbebat, mox rursum ad coniectos labores se conferens, eadem die ego vocatus, urinam turbidam & pure repletam ostendo, simul quoque ægrum de capitis & lumborum dolore conquerentem audio. Quare necessitatem purgantis medicamenti propono, & ægri corpus porione digerente, quam etiam antiepileptica ingrediebantur, præparo. Die 1. Octobr. post assumptum Medicamentum dejecit sine molestia decies, & remiserunt dicti dolores. Die 2. Octobr. citra voluntatem scitunq; meum egrediens ex hospitio suo, amitamq; invisens, in illius ædibus denuo, sed ultima vice, convellitur. Inde in hospitium reductus, ea atq; sequentibus diebus diversis ei prospexi antiepileptics, tam internis, quam externis. Die 4. Octobr. cum nonnisi difficulter responderet, in et adstantes innatæ ejus morositati ac pervicaciz id adscriberent, variis tamen sollicitationibus à me victus, respondit tandem se, quandoquidem fauces nimium dolerent, inquit non posse. Vocatus mox Balneator, ægri Patruus, atq; ut faucium leviter inflammatorum curam haberet

haberet, iustus. Die 5. Octob. loqui desit, & manum dextram cum dextro pede difficulter movere cepit. Ego lateris illius Paralyfin imminere consiciens, ad malum illud avertendum diversa præscripsi interna pariter & externa, sed cuncta sine fructu, unde ingravescente malo tandem die 7. Octob. noctu ad plures abiit. &c. *D. Georgii Segeri.*

Ex Insomnio Ingens Catarsis.

Consulis Hanovienſis filia, octodecim circiter annorum virgo, consueſta erat purgare alvum Extracto Rhabbarbari, quod cum aliquandiu neglexisset, monebatur quadam vespere à matre, exiit se filia, præſtendens nauseam a familiari illo purgante, & sic aliquanto diutius ob id increpata à matre una cum Sorore jectum repetit. Hora prima post mediam noctem incipit nauseabunda hæc virgo gemere & suspirare, & expergefacta à Sorore conqueri de ingentibus alvi doloribus ab usu Rhabbarbari, quod se sumpsisse somniaverat, & paulo post cogitur relinquere lectum, aliquot horarum spacio plus quam sexies copiose purgata a sola phantasia, humores illos mobiles & fluctuantes deturbat. Hic recorder. Observationum de vi imaginationis in ton. 2. Ephemeridum German. p. 31. & 211. à D. D. Sorbait & Scholzio communicatarum, quæ ibidem à curioso lectore videri possunt. *D. Job. Jacobi Waldschmidii.*

INTERTRIGO

Vid.

CYTIS PITYA.

Hic uno tantum verbo de ani intertrigine, quæ nihil aliud est quam partium ano vicinarum, ac inter femora etiam sitarum, æritus ac excoarctio, à motu vehementiori & equitatione orta. Curatur sevo cervino & hircino, vel non pulvere ex floribus Balauſt. ros. sant. rubr. & camphora, parato ac insperſo. Alii farinam uclis juglandis inspergunt, sicq; dolorem mitigant. Alii partem affectam aqua ros. in qua aliquid salis saturni sit dissolutum lovent. Alii laudant adipem anseris, anatis, gallinæ, chalcitidem aqua subactam, mucilaginem semini cydonior. & tragacant. ex aqua rosarum, vel malvæ paratam, item oleum amygdalar. dulc. myrtin. rosar. vitell. ovor. item plumbaginem cum aceto & vino mistam, pulverem gallarum oleo vitell. ovor. exceptum, mista plumbagine myrrha & alumine, unguentum de cerussa, de lithargyr. cum panxillo mercur. vivi, item gryseum ac sambucinum. Tandem remedium Foreſti est si intertrigini argentina herba contusa apponatur, vel hujus herba succo partes affectæ liniantur.

INTESTINORUM MORBI.

DE intestinorum fabrica, membranis, vasis, glandulis, de eorundem differentiis, situ, connexionibus, actione ac usibus fuse agitur ex Clar. Glissonio & aliis in Bibliotheca nostra anatomica. Morbos quod attinet; illi sunt inflammatio Angustia, Lævitas, tumores, flatus, motus imminutus, intussusceptio, vermes, hernia, vulnus, ulcus, ac intestini recti affectus speciales, qui sunt inflar. m. tio illius specialis, verrucæ, rhagades, ulcus & fistula. De inflammatione, angustia, tumoribus, intussusceptione actum capite de

ileo, ac etiam de colica & de alvo adstricta, de lævitate, capite de diarrhæa. De vermibus, hernia, vulnere, ulcere, verrucis, rhagadibus, fistulis, propriis capitibus. Hic itaq; p. legium tantum aliquod eorum prope omnium per consultationes, observationes, & anatomicas inspectiones hinc inde excerptas, exhibebimus.

Consultationes.

Pro Illustri, & Nobili Mirandulano, tumore scirrhuso intestini recti à sanatis hæmorrhoidibus exorto laborante.

Postquam satis perſpectum est tumorem ad sinistram sedis partem in nobili, & illustri viro ab hæmorrhoidibus olim unimodice fluentibus per incisionem, ablationemq; sanatis subortum latitanti, ipsum idcirco rectum intestinum obſidere pro certo habendum; & quoniam tumor durus, ac remens existit, inter tumores ideo scirrhusos, eorq; potissimum qui ex minera melancholica mixta prædominante sunt, est reponendus, in ea inquit parte contexta sunt venæ prædictæ ejusdem mineræ receptacula, patiensq; habitus melancholici proponitur, atqui succum pituitosum subelle ex his vel facile persuaderi potest, & primo quia occasione cujuslibet hæmorrhagiæ calor natus valde depauperatur, unde insignis pituita proventus habet, necesse est; secundo ubicumq; succo melancholico pituitosus commiscetur, unaq; ad cutim demandatur, colorem subrubrum suboriri contingit, qualis in tumore nostro conspici scribitur, pituitosus ergo succus melancholico subdominatur, in cujus rei confirmationem facit, & illud, quod pars laborans imbecillior facta quam pro naturæ statu conveniat, proprium hauri bene conficit alim. entum, pioindeque excrementa pituitosa cruda coacervare cogitur, ut minime interea dubitandum sit, scirrhum hunc illegitimum esse, non solum quia ex minera mixta ortum ducit, verum etiam quatenus ob dolorem adjunctum non est immunis a sensu, quamvis dolorem partes adjacentes magis, quam tumidâ excruciare putem: ut ex his etiam pateat, scirrhum hunc esse de genere eorum, qui non incipiendo, sed qui ex alterius morbi permutatione sunt, patet adhuc à natura e. neri liberum existeret, quando neq; venosus, neq; lividus, nec inæqualis existeret, continuoq; non doleat, sed ubi tantum ab excrementis crassioribus descendentibus, fluxioneque humorum irritatur.

Scirrhus igitur hic (ut modus generationis ejusdem clarius innoteſcat) à succo melancholico peccante, pituitosoque subpeccante ortum ducit, & ex eisdem incrementum suscipit; an vero ab illis per repletionem, siccationem, vel concretionem fiat, & an humores eundem efficientes per fluxionem, vel congestionem colligantur, meo judicio non est difficile decernere, nam quoad primum cum non sit dubium, corpus egregii viri succo melancholico plurimo scatere, minime fieri potest quin scirrhus per repletionem fuerit subortus; pariter quoniam locus affectus, minera morbitica, ac usus olim medicamentorum adstringentium in unicam frigiditatem (à qua concretio) conspirant, ea propter in hujus tumoris generatione concretionem locum habere sentio, siccitas autem, quoniam causa ipsum inducentes, uti nimis calefacientium, ac dissipantium usus, similiaque non præcessere, mea sententia omnino secludenda

quoniam causæ ipsum inducentes, uti nimis calefacientium, ac dissipantium usus, similiaque non præcessere, mea sententia omnino secludenda. De secundo, & postremo statuo, succum melancholicum per fluxionem, pituitosum vero per fluxionem, & congelationem (ut ex supra dictis liquet) in parte laborante, & per transmissionem, ac attractionem colligi. Per hanc quidem primum ob maximum in alvo deponenda conatum, qui ab angustia intestini recti per constipans tuberculum facta. Procedit, deinde ob doloris subsequenter acerbitatem: per transmissionem vero ob partis imbecillitatem nativam, tum adscititiam, & à morbo, & à remediis adhibitis acquisitam, quam transmissionem sicuti respectu humoris melancholici à toto, vitio jecoris fervidioris (quod succi melancholici ferax esse solet) necnon forsan lienis haud bene massam sanguineam defæctantis, fieri non dubito, ita & respectu pituitosi ab eodem toto ob errorem fere triplicis coctionis totius nutritioni destinatæ prodire certum habeo; Error autem hic non nisi ex caloris nativi jactura, ac labe dependet, merito cuius in parte quoque laborante succus idem, ut statutum fuit, ex parte coacervatur.

Doloris vero generatio sicuti & cujuslibet alterius ex objecto improporcionado tactus organo oblato dependet, ex intemperie videlicet frigida inæquali, & soluta unitate à copia materiæ partes sentientes distrahente producta. Dolorem autem augeri modo, modo imminui contingit, quoniam minera peccans à debili calore in spiritum flatuosum interdum aliqua ex parte resoluta majorem infert distensionem, unde doloris augmentum, atque sævities; ac spiritu illo dissipato distensio minuitur, sicque dolorem miscere contingit; idem deinde dolor est periodicus, quoniam causa illius, fluxio inquam, & spiritus flatuosus quibusdam intervallis accedunt, & agunt, ubi scilicet alvus in proprio fuerit munere; causam vero propter quam per unam, vel alteram horam ab excretionem, & non statim dolor insurgat, ac infæviat, nullam aliam esse existimo, nisi quod fluxio sine temporis aliqua intercapedine materiam in ea copia, quæ vincat, & ob id tristem sensum excitet, suppeditare non potest, ut non sit mirum post unius, vel alterius horæ spatium ab alvi conatu, atque secretionem dolorem accedere, ad quod etiam spiritus illius flatuosi generatio, quæ subito fieri nequit, non parum conducit, tandem dolor est uniformis, quia causa operatur, & ad operandum uniformiter promovetur.

Ex quibus ita constitutis facile sit intellegi ad Medicum curantem attinere materiam absorptam, replentem, & concretam evacuare discurrentibus, ac emollientibus, calefacereque moderate calefacientibus, prius tamen danda opera, ne hæc eadem de novo generetur per alterantia viscera in contrarium, quod ubi Medicus obrinere non poterit, saltem materiam genitam ab affecto loco deflectat, sed inter cætera caloris nativi jacturam ut reparet omnino conabitur.

Sed ut verum fatear horum vix scilicet eventus est expectandus, quoniam sicuti scirrhus

illegitimus difficulter admodum ob materiæ pervicaciam curationem admittit, ita ab eodem graviora longe mala superimminent, primum quidem in casu nostro fœcum retentio, quæ facile ob ipsius incrementum (ut ego sæpius vidi) succedere potest, unde omnis postmodum occasio volvuli non exquisiti; secundo imminet carcinoma non solum propter id, quod scirrhi melancholici à medicamentis quàm facile irritati in cancerum degenerant, sed ea potissimum ratione; quod patiens in ea est ætate constitutus (agit enim trigésimum septimum annum) in qua ut plurimum succi atrabiles gigni consueverunt; At quod curationis difficultatem auget, ut fere ex hoc impossibile evadat, est quod scirrhus veluti internus existit, atque vix topicorum usu gaudere potest, quibus & illud accedit, quod purgatio succi peccantis per medicamentum catharticum summo opere necessaria per locum sit affectum, à quo maxime abhorret vera medendi methodus; In id igitur saltem incumbendum, ne aliquid deterius contingat, & quod nunc infestius magis quam fieri potest imminatur.

Quod assequi materiis præsidiorum Medico licebit, atque primum Chirurgicis, ex quarum ordine præter venæsectionem prius medianæ dextræ, deinde salvatellæ sinistræ, hoc tempore administrandam & fonticulos in brachio dextro, femore sinistro, tandemque ad spinæ caudam quamprimum inustos propono, atque ut fonticuli magis, ac magis prodescent, pilas in iisdem gestari juberem ex pulvere hellebori nigri, & agarici simplicis cum cera excepto paratas, extrema quoque tricarri, vinciri, lavari aqua acta calente, ac jugiter ventosari vellem.

De pharmacis autem ita sentio, ut ad universalialia, ac particularia redigantur, in genere priorum primo occurrunt quæ materiam genitam respiciunt, & sunt præparantia, & evacuantia. Priora erunt; quæ ex betonicæ decocto, boraginis, buglossi, fumariz, lupulorum, agrimonii, cichorii passularumque & syrupis appropriatis fiunt; Posteriora vero, si sint evacuantia sensibilibus, ac primum lenientia, occurrunt tanquam accommodatiora syrupus de polypodio magistralis, & mel rosatum solvens; si sint purgantia per alvum, ab infuso hellebori nigri, & agarici cum electuario lenitivo, aut decocto Epit. aut syrupo de polypodio dicto, non est recedendum: quinimmo non semel, sed pluries hoc vel simili medicamento uti proderit, quocirca hellebori ejusdem præparati, cum pulvis succo rosarum pluries irrigatus, in umbraque siccatus, tum extractum ejusdem mihi plurimum arrident, huc infusum myrobolanorum Indorum, & chebulorum in vino subdulci, necnon epitimi in sero caprino depurato, prout Dioscorides perhibet, est ut referatur.

Nec ab horum usu me abducit illud, quod, scilicet, per locum affectum non sit evacuandum, quoniam id ipsum in Medicina (ut dicunt) regulari, non autem coacta, qualis est, quæ nunc facienda proponitur veritatem habet: Accedit, quod utique per partem affectam evacuare conveniens est, ubi materia medicamento purgante deducta in ipsa non detineatur, sed statim educatur, eo purgantis

purgantis genere, cui medicamentum aliquod robur addens sit adnexum, & idcirco myrobolanos, Rhabarbarum, ac similia addere si opus fuerit, expediet.

Sed purgantia per sudorem, urinas, ac vomitum non despicienda, pro sudoribus ergo movendis præter Syrupum Sancti Ambrosii vocatum, extractum cardui benedicti, decoctum chinae, & salsa, modicique guajaci, aliquot simplicibus diureticis temperatis, ac emollientibus, cicoreaceisque temperatum, instrumentum ligneum ad sudores movendos paratum summis laudibus extollo: Pro ciendis autem urinis ab usu feri caprini infusionis anisorum destillati adjecto lacte semi-melonum non recederem, quo non conferente ad pulverem rubeæ tinctorum, ad species electuarii Iustini adscendere non dubitarem. Vomitus si modo ad ipsum pronus, facillime patiens fuerit, copia cibi sapius moveatur.

At si medicamenta evacuantia insensibiliter agant, Medicamentum aliquod ex viperis paratum, item pus galli antiquioris, simplicibus fere omnibus commemoratis medicatum, nec non ammoniacum cum lacryma terebinthi, utramque antidotum magnam, ac saltem thetriacalem ex conserva boraginis propinatum omnibus præfero.

Verum si medicamenta respiciant materiam morbi, generationem, potissimum ad viscerum alterationem diriguntur, quare gratia jecoris præter lac alinum, atque caprinum serum cum succo cicoreaceorum assumptum, thermas etiam frigidas bibitas de more pono, sicuti & perfusionem factam ad hypochondrium dextrum cum succo prædicto adjecto aceto, ac tandem balneum aquæ dulcis non improbo; gratia vero lienis forsitan læsi usum tum troascorum de capparibus, vel de agno casto, item & medicamenti ex chalybe assumendorum, tum ammoniaci in aceto dissoluti cum succo radicis cyclaminis, & oleo capparum admovendi propono proficuum; postremo gratia ventriculi mastiche, nucem myristicam conditam omnibus præfero, urgenteque necessitate thermas calidas non vitupero, à quarum usu si aliqua noxa timeatur, licebit ex oleo communi, atque butyro clysteres injicere; exterius pro eodem ventriculo convenit ceratum ex mastiche cum speciebus diambæ, aut etiam stibidium stomachicum, prout decet paratum.

Topica post hæc occurrunt, & primum sub forma infusus, qui commodè satis, vel ex oleo semi lini, vel ex lotura lanarum, vel ex decocto herbarum emollientium, adjectis pinguedinibus, ac medullis poterit parari, quibus in progressum addere licebit oleum rutacum, irinum, ac laurinum, licebit & incoquere herbam Nicotianam, radicem peucedani, atque cucumeris agrestis: pariter injicere prædicta medicamenta vel primo medicamentum filii Zachariæ, ceratum ex Oesipo, & diachilone gummatum, deinde ceratum sacrum dissoluta in vino decoctionis fenugræci erit opportunum; sed mihi maxime placet injectio, quæ sit ex mucilaginis altheæ, fenugræci, semi lini cum succo tabaci: Tentæ etiam ex lana, quam succidam dicunt, prædictis imbuta uti & glandes factæ ex pinguedine capræ, leonis,

orsæ, Medulla cervina, & gummi ammoniaco; debilioque, ac pulvere radicum cucumeris agrestis, & florum tabacci Indi non sine fructu uturpari poterunt; Iuta quoque Patavina, primum Divi Bartholomæi, deinde Sanctæ Helenæ quomodocumque administrata meo iudicio mirifici erunt vius, quinimmo cum sciam ex his olea chymice parari, illa propterea (sicuti & balsamum verum) injecta maxime edicacia futura prædico. Et quantum ad fissum attinet statum, dum frequens est usus patienti jam dictorum, licere etiam sibi per anum funum recipere, qui tum ex lapide pyrite, vel molari ignitis ac aceto acerrimo asperitis, tum ex decocto actu calente simplicium dictorum facto in lotura lanarum, & aceto, in quo lapides igniti fuerint extincti, excitatur.

Vivendi modum appositum non propono, quoniam ab excellentissimo curante apposite satis superque poterit institui, solum illud admoneo, ut continuo patiens bit ac vinum aliquod cum china, guajaco, boragine, buglossio, ac similibus medicatum, & alvum sibi lubricam clysteribus emollientibus, passulis, ac prunis præparatis conservet; Atque hæc sint satis à me nunc proposita pro salute nobilis viri, cui Deus utinam saveat. *Julius Cæsar Claudius in Consultationibus Medicinalibus.*

De dolore Colico ex Calculo. Pro Nobili Acciolina Tarvisina.

Nobilis Matrona annorum 30. temperamenti sanguinei, cum bilis subdominio, mediocriter carnosa, proceræ staturæ, sexdecim abhinc diebus conqueri cepit de dolore in illo sinistro, satis intenso, gravativo, & fixo, cum adstrictione ventris, & vomitu materię crudæ, & pituitosæ, boni coloris, urinis variis medicis prædiis sanata tandem quattordecima post excretionem pituitosæ viscidæ ejectæ usu clysteris excrevit per alvum duos calculos tephaceos, inæquales, magnitudinis ovi columbini; retulitque se ante biennium Bergomi cum esset, alvum similem ejecisse. Propterea de agendis, præservationis ergo consulit, cum alias perfecta sit corporis salubritate.

Cum itaque morbum ostendat sanatio, non est difficile determinare quænam sit pars affecta, qualis affectus, & quæ causa. Licet enim in regione illi positus sit ren sinister, & intestinum colon, doloresque renales, & de quo jam agitur convenire possit, nihilominus cum urina non sint crudæ, ut in nephritide, nec adsit vomitus heterogeneæ materię, qualis comitatur nephritidem; atque cum alvus sit adstricta, quod in nephritide non adeo contingit, calculique per alvum sint excreti, compertissimum est dolorem hunc colicum fuisse, eumque a calculo in intestino genito: quos licet Galen. 6. de Loc. Aff. 1. non observaverit, oculata tamen fide testari possum ipsos etiam in intestinis generari posse. Ubiunque enim adest materia disposita, & agens, potest & debet fieri actio. Illa autem plurimum est pituitosa, & viscida; agens vero calor exiccans, & eandem in calculosam, ac tephaceam convertens; qua cum abundent potissimum intestina crassa, non raro per clysteres excreta, atque in iisdem calor non desideretur,

tur, licet non æstuosus, cum sint partes exsangues, & membranosæ; hic tamen diutius agens in prædictam materiam intestinorum aufractibus conclusam, potest ipsam exsiccare, ut in calculos coalescat. Si enim concreverint in cerebro natura frigido, & humido, in quo eos vidit Brasavolus 3. Aph. 16. & Cornelius Gemma l. 1. Cosmocr. 6. in articulis item, ut in doloribus articularibus tophaceis, quid prohibet quominus generari possint etiam in intestinis, ut & in aliis pluribus corporis partibus, pulmonibus nempe, vesica fellea, & in utero, præter renes, & velicam, quarum sunt proprii morbi. Quod oculata fide testatus est Anton. Guainerius in tractatu de calculosa Passione c. 1. Benivenius 9. sui de abditis morbi causis, & Brasavola 4. Aphor. 59. qui refert, se Ferrariz mulierem Gallam vidisse, quæ calculos quinque ano excrevit, & Iul. Cæsar Scaliger de subtilitate ad Cardanum, Exerc. 108. n. 3. his prope verbis hoc prodidit: desperata inquit ab omnibus valetudine senem, summo dolore intestinorum divexatum, cum videremus carere febre, neque tumorem extare quempiam, quotidianis dejectionibus alvum exonerare, pondus in ipsis intestinis sentire, fatali quadam conjectura lapidem subesse rati, enemata ex bdellio, & oleo nostro Telino croceo malignate, butyro, & quodam decocto infundi iussimus; tertio clysmate magna vis lapidum educta est. Ex quibus constat, calculos dolorem intestinale producere, quem non necessario comitetur alvi aditritio, & pro quorum curatione clysteribus sit opus.

Cum itaque calculus sit jam eductus, dolorque sublatus, sat nunc censemus de præservatione consulere: quod non difficile fore speramus.

Tria itaque in hunc finem peragenda veniunt. Primo intestina detergenda, & a viscida pituita emundanda. Secundo divertenda materia ad intestina fluens; & tertio roborandus ventriculus, in quo huiusmodi materię proventus. Quos scopos implebunt remedia Chirurgica, Pharmaceutica, & Dietetica.

Chirurgica quod spectat, si menses libere non fluxerint, non abs re erit sanguinem educere ex saphena; vere & autumno, moderata quantitate, supersedendo quibuslibet aliis validioribus remediis Chirurgicis.

Pharmaceutica item vere, & autumno præscribenda, atque ideo lenientia deterfiora erunt opportuna, puta mel. ros. sol. Hiera picra Gal. vomitoria semel in mense ex usu erunt, ex oxymel. simplici, & succo raphani, cum hydrelæ. Purgatio quinetiâ bis in anno exigitur, cum mel. ros. sol. & agarico trochiscato; præmissa humorum præparatione cum oxymel. simplici, syr. de Stœchade, de hyssopo, & de corticibus citri. Aqua Terutiana Vere, & Autumno, pro deterfione erit apprimè utilis: sicuti corroborationi ventriculi consulamus aquis Thermalibus, Aponitana in primis, ad l. viii. circiter, quæ & inferiori ventri prospiciet: cui etiam stillicidium præscribi poterit.

Ac tandem curationem absolvet congrua vitæ ratio, & ventriculi corroboratio vino abstinentie, & Theriaca antiqua hyeme usurpatis. *Benedictus Silvaticus Consil. & Resp. Medic. Cent. iii.*

Observationes & Anatomica Inspectiones.

De Alvi excrementis per genitalia ejectis.

Martini Jemeri, mercatoris apud nos, filia sexennis manibus pudenda continuo tricebat, quæ ob rei turpitudinem à parentibus læpius corripiebatur, tandem ex fructuum horzorum intemptivo usu in malignam incidit dytenteriam, qua de causa vocor in consilium, ptopino contra malignitatem & humorum acrimoniam pugnantiæ remedia, non neglectis subinde cordialibus & roborantibus, enema etiam ex abstergentibus & consolidantibus injici curo, quod dum applicatur, liquor enematis per pudenda rursus effluere conspicitur, territus ad insolitæ rei hujus vitium patiens, me advocat, & ut inquirerem & edicerem causam obnixè rogat; accedens puellam tabulæ imponi jubeo, pudenda inspicio, & velamento aliquo carnoso illa subducta, sicque clauula esse animadverto, ita tamen ut superne & interne stilus exilis intronitti possit, ubi exilia foramina, per quæ urina impetuosè extrudebatur, compiciebatur; cum autem liberum exitum urina non haberet, moram circa velamentum trahere opus habebat; acrimonia autem leri retenta loca obsecunda rodebat, & vellicabat, quæ causa erat frictionis pudendorum, erosum tandem per moram longam line dubio ex illa acrimonia intestinum rectum est, unde per alvum excernenda, per genitalia communi tacto meatu exire conspiciebantur. Licet autem natura viam apertionis & sectionis monitraret, nolui tamen propter instantia fata, ne accelerasse me eadem jure culpari possem; nam summa virium debilitas, & extremorum refrigeratio, quam sudor colliquativus excipiebat, postero die infelicem a'valore terminabantur. *Joannis Schmidt.*

De Excretionē fecum per umbilicum

Vocatus Haynam Misnicorum, & Medicinam ad hunc usque diem ibifaciens, Anno 1668. ex Gemellis ibidem natis, alter erat masculus, qui duodecimo à nativitate die insultu epileptico tentatus idoneis tamen medicamentis restitutus, post tres aut quatuor præter propter Septimanas, circa umbilicum rubor quidam inflammationem minitans, sine tumore tamen, in eo se prodidit. Applicarat Chirurgus emplastrum quoddam defensivum, cottidie bis renovatum: Hoc tertio die remoto, umbilicus simul excidebat, & postea, præprimis alvo segniori, sterco ra per umbilici foramen patiens excernebat, nihilque per anum dejiciebat. Externis consolidantibus umbilico læso impositis, simul interna, nempe syrupi & clysteres emollientes, laxantes, & intestina rupta consolidantes alternatim adhibiti, consociabantur. Hisce continuo adhibitis, non solum excrementa per emunctorium ordinarium dejiciebat, verum etiam intra paucas septimanas, coalescente iterum umbilico, infantulus restituebatur, excepto, quod cottidie guttulæ quædam aquosæ in loco affecto ad hunc usque diem, quo hæc scribo, exsudent, sine ulla tamen læsione, rubore aut dolore. *Melchioris Fribe.*

Lapis in Intestinis.

Perillustris & Generosissima Matrona Hildes-
ia vivens (cujus nomini consulto parco), à
prædite assumptis ex meo præscripto pilulis è
gummatibus Nobilissimi dyvii præceptoris ho-
noratissimi; altero mane cum excrementis la-
pidem exturbat ovi columbum formam referen-
tem, in exteriori superficie subcinereum, &
cum à me clavo ferreo in duas æquales partes
diffringitur interius instar crystallo albicantem
& rutilantem, ita ut qui olum ex huius stercore
aurum, hic colligere potuisset gemmas Joh. Henr.
Brechfeldi.

Intestina Sphacelata.

Viduus quidem literatus, J. S. Uratislaviæ
degens, quadragenario major, melancholicus,
& dum viveret, valetudinariæ constitutionis,
M. februario Anni 1670. solito plus conquiescit
est de ructibus austeris, inappetentia & dolo-
re Ventriculi, nec non Renum & dorsi. Subse-
cutæ dehinc sunt obstructions alvi, noctes in-
quieta & sæpe insomnes, doloresque obsuri,
gravativi circa ilia, sique in sinistro latere su-
pra Ventriculum quasi adscendentes. Febris
apparuit nulla, major tamen nonnunquam sub
vesperam, quam interdiu, Lumborum dorsi-
que incalescentia. Urinx pallidiores, pierumque
& crassiores deprehensæ, cum sedimento copio-
so, nonnunquam tæreo rubro, sæpius albo,
mucofo. pulsus iudies debilior, ab initio tar-
dior, versus interitum celerior. Supervenit
his omnibus Vomitus sanguinis nigricantis in
grumos majores tenacissimos maximam par-
tem concreti; qui cum intra triduum copiosior
aliquoties rediisset, Ægrotus, exhausto virium
thelauo, lipothymias frequentiores, ipsamque
demum mortem, quam die 6. Aprilis beate obiit,
accerfivit.

Ut itaque tot Symptomatum causa inquie-
retur, permisso ipsius Agnatorum, cadaver
aperire concessum fuit, quod etiam facium
præsentibus Viris Excell. D. Godofredo Tiesio,
Ph. & Med. D. & Physico Uratislav. meritis-
simo, & Dn. Phil. Jacobo Sachs à Leuvenheimb,
phil. & med. D. & Practico sanigeratissimo,
Amicis meis honoratissimis, qui ambo ul-
timis diebus mecum Ægri curam habuerant,
Sectore dn. Franzio, Chirurgus nostro indu-
strio.

In aperto Corporis demortui Abdomine at-
que Thorace sequentia ad partem affectam, cau-
sasque morbi & mortis imprimis facientia, occur-
rerunt notatu digna.

- (1) Pinguedo quidem fat multa sub cute per
totum corpus diffusa;
- (2) Musculi vero Abdominis & Thoracis ex-
carnes.
- (3) Cor nihilominus obesum satis, duriuscu-
lum, compactum, beneque constitutum,
Sanguine vacuum.
- (4) Pulmones quoad colorem quidem à natu-
rali statu parum differentes; flavi tamen
& exsanguis, horumque lobus dexter in-
terior versus dorsum Thoraci annexus.

- (5) In Ventriculo nullus Sanguis, tunicæ be-
ne constitutæ.
- (6) Lien iustæ figuræ, magnitudinis & coloris.
- (7) Meenterium non glandulosum, sed una
cum Pancreate naturaliter constitutus.
- (8) Hepar admodum magnum, totum obvol-
vens ventriculum, admodum pallidum,
totum licet Sanguine vacuum, pon-
derans tamen ponder. Medic. lb. iii.
3. viii.
- (9) Vena portæ versus hepar Sanguinis ex-
hausta.
- (10) Intestina in sinistro latere ferme bene
constituta, quæ vero in dextro, livida,
nigricantia, sphacelata, Valaque mefe-
rica in intestina delincentia sanguine
nigricante turgida.
- (11) Intestinum coli pars superior in sinistro la-
tere supra Ventriculum iudata, quæ vero
deorsum vergit incunum, sanguine concre-
tosæculento, nigerrimo, instar pictæ,
quale vomitu rejecerat Ægrotus, admo-
dum repletum.
- (12) Renes pallidi & flavi, inque dextro
horum materia multa tartarea, & circa
intundibulum calculus instar sabæ mi-
noris.
- (13) In sinistro vero major & albicans calcu-
lus, prodere scrup. V. ng. & magnitu-
dine cordis avium oblongiore terminata,
multæ materiæ seroso-lactææ, quæ una
cum plurimis particulis tartareis, in-
star calcis, per totam Remis substantiam
dispersa erat, quasi innatans.

Mirum, quod viscera lienis, pancreatis,
Hepatis cum suo felle, Ventriculiq; in hoc
corpore omnia deprehensas fuerint tanta & na-
turaliter constituta, cum tamen Ægrotus per
totum vitam patium, pallidus, & tristis incen-
sit, solitariamque & sedentariam vitam ama-
verit, omniumque Medicorum consultorum
sententia Hypochondriacus audiverit.

Nec minus mirum, Intestina illius sphacela-
ta tunc sine præviis doloribus Abdominis, tunc
prævia Febre manifesta. Conjectura est, Sangui-
nem melancholicum, acido austerum inhaer-
entem quidem ineptumque fuisse ad concipien-
dum subitam & magnam fermentationem &
exaltationem febrilem, nihilominus tamen,
forte ab errore dietæ excalescente intra mo-
bi decursum commisso, in tantum irritati &
commoveri potuisse, ut per val. melarata (hæc
enim versus intestina repleta, versus hepar va-
cuescunt appaerere) ad intestina successu con-
fluxerit, hincque sphacelum, misero vero mortem
attulerit. *Friderici Orulubii.*

*Vulnus Intestinale periculosum feliciter
curatum.*

Anno 1676. Dominicus Simeoni Patavinus,
annos natus xxvii. unus ex palatii apparitori-
bus, amicum quemdam suum litibus obrutum
è castello Baldo, Patavium inter & Ferrarium
suo, educere cupiens, quem à lictoribus con-
quistum noverat, breviori via summaque di-
ligentia eo concessit. Supervenientibus lictori-
bus quatuordecim, inclusi tres, portas appri-
me obserrarunt, aditumque fortiter negaverunt.

Explosa utrimque sclopeto fictori uni vitam eripuerunt, duos alios graviter vulneraverunt. Castellus dominus & ipse globo transfixus occubuit: Noctis, beneficio autugit amicus ille, ob quem exorta erat rixa. Solus remansit Dominicus, qui pulvere pyrio destitutus, hostium numero cedere coactus est. in latens & corpus antrosum submittentis abdomen, sclopetum majus (quod archibugio Itali nuncupant) explosum. Lictores actum esse de illo opinabantur, quem paulo post spirantem adhuc cernentes, in curru collocatum, Patavium reduxerunt. Magistratus indulgentia, Dominico faucio in aedes suas deportari concessum est, quem brevi in carcere periturum magna erat conjectura. Medicorum habito consilio, desperata fere omnia censebantur. Vultus maximum in epigastrio dextro non procul ab umbilico, disrupti, præter tegum nra, tendines musculique, rectus, transversalis & obliqui, ingens *αἱματὶς* dejectiones supernæ internæque, frequens syncope, protractæque vires, ut ægro, sic Medicis spem omnem præciderere videbantur. Nunquam tamen omnino deferendum esse ægotantem, dubiamque spem certa desperatione potior, & hoc confirmat exemplum. Quippe quinto morbi die, per alvum una cum fecibus à clystere sollicitatis, in pelvim exiit globulus, tragædiz instrumentum. Longior non ero in enarranda cura: Saviora abhinc cessavere symptomata; atque post unius mensis periodum plane liberatus est æger. Non deicientibus miraculum esse censentibus, benefici erga amicum animi pretium: At Medicis opera Naturæ curiosius scrutantibus alia via procedere expedit.

Perpendatur imprimis quæ à deciso globulo oritur maxima difficultas: Quo modo is in intestinum penetravit? quo modo & hoc sanatum est? Qui enim fieri posset per podicem deijci quod intestina non subisset? si subierit, intestino perforato quænam tunc Medicina? Hanc cælo delapsam interpretentur qui ulterius inquirere fastidiunt. Intestinorum quæcumque illa sint, sectionem periculosissimam esse docent Authores, ratio & experientia. Crassa vix sanantur, Tenuia nunquam; ita Hipp. aph. 18. & 28. sect. 6. *ἡ τὸ λεπτόν τι τὸ χυδαῖον*. Nulla profus facta fuit *ἐντοροτομία*. Ergo concludere liceret profundum vulnus, Naturæ providentia agglutinatum fuisse, ut non immerito corpus nostrum innato balsamo sibi proprio refertum credatur. Quod majus est, nihil confutum fuit, neq; cutis, neq; muscoli, neque tenuis illa membrana, nervosa atque exanguis, quæ vix araneæ telam mole superat, *πυρρὴ* nuncupata, sed omnia tam cito coiere, ut eadem superet. Nihil perinde incommodi reliquum fuit. Observatum in omnibus Galeni præceptum, Meth. 1. 6. c. 4. excepta suntione, quæ inutilis censita est: Excisa intestina cum omento, in suum locum recondita sunt, medicamenta imposita, & ne quæ præstantior pars simul afficeretur, quantum fieri potuit, prospectum.

Multos audio dicentes globum præter musculos non penetrasse, ac inter adiposam abdominis molem latuisse, donec tum suo pondere, tum etiam Naturæ vi, in imas ejus partes collapsus fuerit. Eito, nec tamen

pater ad exitum via: An deinde globulus in capacitatem intestini penetravit, absq; substantiæ deperditione? quo modo reparata illa fuerit? Qui taces, ne foras profluerent, coercitæ? Quod factum de sanguinis copia in abdomine sparsa, disruptentis concutientisque globuli vi? An & hæc per disruptum intestinum effluerit? Observationes huc referat quæcumvis curiosior, à Schenckio scriptas, l. 3. de acu, cultro, aliisque per diversas a naturali vias excretis, aut alienis humoribus per intestina deductis. Naturam continuo beneficam innumera producere liquet arti non expectanda, imo ne speranda quidem. Hunc Gal. monente, l. 3. de crilibus, Generosus Medicus neque difficilissimis casibus terreatur. Celsus ad id, temeritatem aliquando efficere docet in morbis, quod prudentia nullo modo tentare deberet.

Ego quidem ad hujus rei conjecturam nec à temeritate prælidium invenio. Sic Dominico superstes fuero, ab eodem vitam adhuc agente, venia jam accepta, scrutabor in ejus intestinis, si forte tam prodigiosa valetudinis latentem in odum dignoscere potero. Lutereasi vobis, viri Eriditissimi, aliquid occurrat quod propositæ difficultati satisfacere queat, pro vestrâ & in Collegium benignitate & in rem medicam studio, mihi palam esse facturos & spero & rogo.

Intestinorum aliquod a globuli explosi impetu fuisse hic læsum, vix dubitandum est; neque enim credibile eundem tam parvo temporis spatio, nec singulari aliqua violentia externa protrusum, cuniculos per tot illæsas partes, etiam satis crassas & membranosas, agere potuisse, ut quinto morbi die jam intestinum rectum ingressus fuerit: Symptomata etiam gravissima non levius aliquod vulnus cutem tantum penetrans, sed altius progressum, & in specie dejectiones illæ supernæ internæque &c. ipsorum intestinorum aliquod læsum satis indicare possunt. Neque ullo modo obstat Hippocratis auctoritas, multiplici ejus experientia procul dubio firmata, in aphorismo 18. sect. 6. ab Exc. D. Authore citato: uti enim Coum nostrum lechælia sæpe dicere vulnera, quæ ut plurimum, non ex necessitate & semper sunt talia, alibi in hoc Libro ex Galeno fuit notatum, atque ipse etiam lib. 2. Pronet. vulnera, quæ magnam quidem perniciem adferunt, non eam tamen, ut, ceu ipse se explicat, nemo ex his servari possit, recensens, intestinorum quoque, nullo inter tenuia & crassa facto discrimine, quæ sunt, eis adjuvat. Dum vero Coac. prænot. 503. & sect. 6. aphor. 24. ex tenuibus si quod dissectum fuerit, non coalescere scribit, partim de vulneribus ut plurimum, ceu dictum, taliter se habentibus, partim etiam de magnis dissectionibus interpretari debemus; prout ipse quoque 9. seq. 509. Coac. prænot. cum mortem prædixisset in intestino aliquo, siue crasso siue tenui, vulneratis, si nempe per transversum fiat plaga & magna: si vero parva & recta, quosdam evadere edicit. Nemo itaque amplius, intestina vulnerata mortem simpliciter inferre ex Hippocrate evincet. Neque aliud nos variorum decent observationes, qui tam crassorum, quam tenuium intestinorum, vulnera sanata viderunt illorum ex. gr. Specimen suggerentibus Nicol. Tulpio lib. 3. observ. Med. cap. 20. & Joh. Rio-

lino in app. Sim. Paulli tr. de febb. horum Ephemeridibus nostr. Curios. Ann. III. obs. 176. Jacobi. Seidelio obi. Med. 5. Joh. Heurnio in comm. sect. 6. aph. 18. Hipp. & Jacob. Hollerio obi. propr. 17. nec non Comm. in cit. aphor. Contratur etiam historia ab Ambrosio Paræo lib. 24. Oper. cap. 19. memorata, nec non alia hinc Authoris admodum similis, quam Franc. Dilettiola lib. 4. obs. 9. consignavit. Unde etiam quodcumque tandem intestinum in hoc casu globulus transierit, licet vel ipsum jejunum id fuerit, cen quidem ex denominatione loci percussu, scilicet epigastrii dexteri non procul ab umbilico, quo nempe in loco illud naturaliter situm obtinere solet, nobis conjecturare licet, saluum evadere potuisse ægrum, non adeo est incredibile. Videri quidem hic posset, sculpulum sapere metuendam chyli ex vulnere into in cavitatem abdominis effusionem, quam omni non nemo pro stabilenda similitudine in tenuibus intestinis vulnere lethaliitate publice in medium protulit, ita ut æger necessario nutrimento, in sanguinem & ad singulas partes derivando, orbatus perire necesse habeat. At (ut taceam, quod ipsa læsæ partis glutinatio, de cuius utpote impossibilitate nullum penitus argumentum producit, exitum illum chyli impediatur, si quem vero egredi detur, sicque consolidationem is retardare queat, eandem tamen omnino inhibere minime valeat, cum chylus non continuo à ventriculo suppeditetur, perque intestina permeet, si in superiori parte intestini, & quidem ita in corpore à natura locati, ut transversum situm obtineat, plaga insigatur, ille chyli ex cavitatem illius prolapsus non adeo prompte aut copiose continget, ut mortis periculum, ob defraudatum corporis alimentum, inde sit metuendum. Galenus quidem lib. 6. Meth. Med. cap. 4. jejunum omnino incurabile esse adserit, tum propter magnitudinem multitudinemque vasorum, tum quod tunica ejus prætenois nervosaque sit, bileque insuper sinceram universam recipiat, & jejunum omnium maxime sit vicinum. Verum quod attinet i. magnitudinem multitudinemque vasorum, sculpulo huic satisfacit Heurnius, proutque calamitosum esse, l. c. scribens, si intestinum tenue ea parte vulneretur, qua metenterium attingit, ob venarum eo venientium magnitudinem, quæ plurimum sanguinis fundunt; id quod in parte opposita non adeo est metuendum. 2. ipse Galenus Comm. 6. aph. 1. tunica tenuitatem & nervosam naturam quodammodo impugnat, dum verba faciens de omnibus tenuibus, intestinatorum tenuium naturam non parum participare ait carnosæ substantiæ, ideoque in summa parte vulnerata sepius conglutinari, tota autem discissa usque ad interiorum cavitatem, non quidem nunquam, sed tantum rarissime, hoc autem, addens, non est propter eorum substantiam mihi videtur accidere, quam quod non possumus æque intrinsecus sicut extrinsecus medicamenta vulneribus imponere. 3. Bilis in intestino jejunum jam acrimoniam suam, qua vulneris unionem impedire posset, deposuit, videlicet tam à lymphâ visceratica &c. quam ipso imprimis chylo acido alterata, atque ita in sinceram suam naturam multum immutata; sic ut humorem viscidum e

glandulis intestinalibus egressum, aut etiam serum nutritium ex discissis arteriolarum oscillis extillans impedire minime valeat, quo minus tenacitate sua vel glutinositate, sive balsamica, si ita loqui liceat, virtute, seu sarcocolla aliqua, vulnerata partis labia, ab aere externo inproportionato, vulnere sanationi non parum contrario, ob intimiorem, quem occupat, in corpore situm, sic satis innuunt, & post vulnerationem, dum aer in cavitatem intestini prius contentus ex hiatu egreditur, coincidentia, sicque propius ad invicem accedentia, conjungat, illamque continuolurionem ita reumat, quod denique 4. de vicinia hepatis dicitur, quo modo in considerationem venire hic queat, penitus non video. *Caroli Patini.*

De illo vulnerati curatione.

Vocatus ante decennium ad Sartoris conjugem, cui maritus cuncto vulnus inmixerat in hypochondrio dextro supra Os Ileum interpositiva nocte. Vnus obligatum est, mane cum Chirurgus, Nicolaus Reumard, Emplastrum removeret, torces alique subiequantur, dilatatoparnaper vulnere apparet intestinum adicolum lrum, placuit in casu desperato periculum facere, nec æger 15. annorum dolores recubabat, modo vita non recit. Intestinum cuncte ac alligari cum eunti, recentique larii lamella interposita, in torces alique pateret transitus eunti iungere jubeo, quod & lactum, poriones præterito vulnerarias, quibus ad stuporem curata est, binoque cura est liberos annis sequentibus, cum de valitudine ipsius nuper quærerem, satis cessisse anno proxime præterito accepti. *D. Adm. p. 17.*

De intestino Colo vulnerato cum Hypogastrio vulnerato coalescente.

Quod Natura sit morborum medicatrix, nemo nescit, & in hoc exemplo manifeste apparet. Anno M. DC. LXXII. die 12. Januarii, servus à stabulis Illustissimi Dn. Dn. Co. itis Schinhard, &c. temperamenti sanguinei in taberna intercomptandum à quodam studio, circa tertiam lumborum verticillam ex parte dextra à tergo gladio quadrangulari per initium intestini coli & hypogastrium versus illa sinistra transixus, in domo ejusdem Illustr. Dn. decubuit. Coram ejus sedulam Chirurgus suspiciens illum deligavit: altero die amota ligatura excrementa per vulnus hypogastrii exivere, & hac via alvi imitatur natura se per dies novem exonerare conabatur, quod in quavis deligatione apparebat: quo etiam tempore, alvus suum, nonnulli per glandes sollicitata, præstitit officium, tandem decimo ab accepto vulnere die, per alvum copiosa deiecit, anno alias præfens: ad omnia oblata bene se habere vilus est, nihilominus decimo sexto die satis cessit. Ut lustrationi adesse, Chirurgus ex me petit, quod etiam libens præstiti. Apertum abdomen tetram odorem spiravit, nam torces per vulnus intestini coli in cavitatem illapsæ, intestina corrupta & gangrenosa reddiderant, vulnus vero intestini coli, sive labia il-

viua tarda valde atque molesta, imò materiæ purulentæ cui sanguinis plurimum commixtum, hoc enema injici curavimus, ad doloris mitigationem valde conveniens.

℞. Decoct. emollient. ℥ ix. olei mucag. amygdal. dulc. an. ℥ i. unguent. popul. mell. rosac. an. ℥ i. M. F. Clyster.

Podici applicatum hoc cataplasma.

℞. Micæ panis albi, farin. hord. an. ℥ ii. mucagin. cydonior. ℥ i. unguent. popul. ℥ ii. croc. II itann. gr. xxii. vitell. ovi num. i. M. F. Cataplasma.

Tantum hæc profuerunt, quantum profuissent siquidem pulvini fuerint applicata: febris interim, dolor, vigilæque, hinc quærelæ, magis magisque crescebant. Pharmacopœi servus qui applicaverat Enema, aliquod corpus durum occurrisse sibi, ubi fistulam arte imponere laborabat, per quam injiciendus clyster, referebat; hoc audito necessarium duximus digito in anum immisso an aliquid loco eo hæretet aut præternaturalis quædam constitutio intestini recti adesset, explorare; quamprimum digitus in anum immisus occurrebat substans illa dura, cujus mentionem fecerat pharmacopœus, hæc extracta mandibula erat ipsius illius quem Belgæ vocant Eenschol, bronchisubbranchius hærens: eam ante octiduum se avidius pisces tales comedentem deglutivisse, ante actorem jam memor, referebat æger, imò cum dolore ventriculi, intestinorumque gestasse.

Ablato hoc officulo (quæ ablatio non sine dolore peragebatur, eo quod transversum non solum situm obtineret, sed & utrinque lateribus intestini firmiter in hæretet, unde symptomata dicta exorta) illico symptomata omnia remiserunt, febris scilicet, dolor, excretionis alvine suppressio, vigilæ continuæ, somnus econtra inductus placidus.

Parti affectæ applicavimus turundam melle rosaceo cui Aloes aliquid mixtum, inunctam. Et integre convaleuit.

Similis tere casus occurrit aliquando Medico hujus loci celeberrimo Dn. Arnoldo Tholinx, nisi quod hic intestini recti circa plicaturam exulceratio accederet, & Chirurgus frutularum, duas scilicet in partes forficis ope divisum officulum, extrahere coactus fuerit.

Graviter obvenit ægrotanti illi, qui, referente nobis Collega nostro Dn. Daniele Floriano, curæ Rogerii Bernardi olim Nosocomii chirurgi ordinarii subfuit, in quo officulum simile, gravissimo cum dolore, per lumborum inferiora, ulcere intercedente magno, prodibat. *Job. à Mecklen in Observat. Medico Chirurgicis.*

De intestini tennis vulnere.

Anno 1678. Vir nobilis & robustus, annos circiter natus 21. cum Galli & Lotharingi, aliquandiu exubias contra invicem agerent, gravi vulnere gladii punctim ictus; ex illorum exercitu, ad nos advectus fuit, ut pristinæ sanitati restitueretur, sedulam hunc ob faciem operam ipsi locante chirurgo solerti Claudio Passavanti: denudato & ampliato tantisper vulnere; quod admodum angusti oris primum fuit, in abdominis cavum illud verge-

re deprehensum fuit, medicamentisque hinc convenientibus illi prospectum: mox suspicio de intestini tennis læsione Medicorum Chirurgorumque, quos ad ejusmodi vulneris spectaculum ille invitavit, animis in hæretet cepit, nec tetellit eventus, subsequenter enim diebus quoties fere vulnus denudabat, materia chylota evidentissime profluxit, & in inteolis vel plumaceolis conspici poterat, adeo ut una de vasculi lactei punctura, chylo puro ita exstillante, indicia certissima depromere potuerimus; Instituta exactissima diætâ, qua ægrotus ipse peiorum symptomatum adventum elusit, & adhibitis vulneratis convenientibus, singula feliciter cesserunt. *Job. Jacob Harderus Observationum Anatomico-Practicarum libro.*

Intestini à lumbricis perforatio cum tumore subitaneo in inguine dextro.

Vir 50. & quod excurrat annorum, sanus & incolumis, uti sibi quidem videbatur, d. 11. Aug. 1683. cum tota d. strenue defudasset in vineis, domum redux de atrocissimis torminibus ventris conqueritur, quæ excepit ilico horror & calor inguinisque intumescencia, paulatim ita adaucta, ut femoris partem anteriorem & superiorem maximopere occuparet tumor, qui primum remittebatur, aliquot autem dierum spatium, instar velicæ humore distentæ suæ sponte rupius fuit, ichoremque primum subatrum, hinc viridem, & deinceps purulentum, s. magis fæculentum copiose fudit, transudante primum sero tenui glandularum, inox hinc viis magis apertis, una materia fæculenta: materia quoque faniola inter musculorum femoris interstitia collecta, illis pressis acervatim erupite accersitus Chirurgus illius loci, medicamentis putredini resistentibus ac detergentibus sedulo pugnavit, nostram autem mox implorare jussit operam: Vocati d. 25. ejusd. sub vesp. mali faciem intuiti sumus, quam satis horridam deprehendimus: ex inguine enim dextro, pone scrotum, materia fæculenta, ubi tantillum premebamus, tenuis & graveolens, profluit, retulitque Chirurgus, ex eodem antro, (quod vulnus dilatatum satis non erat) triduo ante lumbricos sex se extraxisse: pridie etiam cum uvæ comedisset ægrotus, semina earum per foramen dictum excrevisse, atque ab hoc tempore fæces per alvum dejecisse amplius: nec minus femoris interiora a massa serpente fuerunt erosa, foraminibus linuosis hinc inde conspicuis: Facta incisione scrotum versus, ut mali exitus pateret magis, fæces liquidæ, cum sibilo & strepitu ex intestino evidentius prorumpabant, hujusque perforationem labiis vulneris sensim remotis, posttridie magis patulam fore prædiximus, interim seq. usum præcepimus: Chirurgus ter de die vulnus calidiusculum lavet cremore & sero lactis caprilli cui immista sint sangu. dracon. subtiliss. & myrrha cum mastich. inde balsam. vulnerar. quod præscripsimus, moderato caloris gradu vulnere instillet: plumaceolisque eodem irroratis intestinum obducat pro viribus: ægrotus autem singulis diebus m. hauriat cyat. lact. caprill. cui sanicula consol. sarac. veron. & alchimill. fuerint incocta: horula v. post ut & sub 4. vesp.

ἀποσπασίμῳ aliquam ab hernia oriundam sublequi posse. & periculum in mora esse dixi, ac cum manu periti Chirurghi huc requiri iuniorum : Chirurgus viam inerte & agrum jam invivente, gravissima comperimus, non vitu tantum, sed etiam olfactu : partes interiores putretactæ à sanis protenus erant liberandæ : partes adhuc sanæ a contagio vindicandæ & defendendæ, cum jam colon ipsum in hoc intendendum contribuerit, putredine infectum ea tenus, ut per hujus aperturam ex inguine, crassiora alvi excrementa, neque per urach, neque per duas solas hebdomadas fuerint excreta : & tamen tota hæc mali dicta tragœdia tam felici exitu absoluta est, ut post sex septimanarum intervallum, sanitas fuerit reducta, sine fistula vel alio incommodo post relicto : hæc ille. *Idem ibidem.*

Colica à bile non uno modo degenerare ac corrumpi.

Nihil certe verius Fernelii doctrina de febribus intermittentibus quæ degenerant in colicam ad febris typum periodicè recurrentem. Imo stupore quodam me percussit immanis ille cruciatus ipso converfus in omnium artuum paralyti indolentem, & hanc aliquoties aquarum Boboniensium potu & embroche miratus sum vegete sanatum.

Verum unus ex iis febrientibus colicæ tormento exenteratus est, & morte mihi subductus, prævia paralyti nullæ, & tunc certe laudatissimus mihi fuit Citesius de Colica puerorum. Ejus quippe ductu intestina reperi hic & illic per areas quasdam bile suffusa, & per modum tincturæ sparsim vel flaventia, vel viridantia, vel atrata, prout scilicet bilis multiplicis acuti se se tonicis intus infixerat. Bilem enim intestinis impactam sedulus observavi, hic vitellinam, hic vero porraceam, hic demum atram, & ab ipsa spiculis hamata, dolores illi suscitabantur rabidi, ne quidem vel Homero Nepenthe, vel ipsius Phæbi paregoricis ullis placabiles. *E Clarissimi ac Celeberrimi Viri D. Caroli Drelincourtii, Disertissimi Communicante Clar. D. Guyot Medic. Doct.*

Colica Convulsiva in prægnante lethali.

Autissima Matrona, laudabilis temperamenti, annos circiter 28. nata, quantoque prægnans, totum gestationis suæ spatium molestum habuit, siquidem febris prope continua, eaque noctu exacerbationes faciente, afflicta vixit, imo fluxiones & ad dentes & ad alias corporis partes easque atroces dolores patientes, subinde passæ est permanente interim ad cibum appetentia. Cum demum nonum gestationis mensem attigisset dentium dolor pro tempore aliquatenus sopitus, non tantum recruduit, sed etiam rabidus factus est, tumoremque totius genæ cum gingivarum erosione produxit, nec ex parte quidem cohiberi potuit quin prius accersitus Chirurgus unum e dentibus eduxisset. Verum non diu vivebatur inducta sic aliqua tranquillitate, nam biduo ad summum post dentem evulsam, subito furioso dolore, sub illo sinistro prehensa est, qui ab ipsa totam diem clamores &

ut ita dicam, ululatus expresserunt. Horis pomeridianis, post longum ægæ laborem advocatus inhaletanter sanguinis e brachio educationem suavi, cochleariaque aliquot julapii carnianantis & anodyni propinavi, sic dolor circa mediam noctem inducias dare coactus est, quæ ad horam secundam pomeridianam ejusdem diei producebantur. At quasi novas sic vires acquirit morbus, cum exsuscitabatur, non tantum in regione iliaca sinistra, sed etiam in dextra, imo toto abdomine dirum in modum ægram fatigabat, ipsiusque viscera quasi lacerabat, cum frequentibus animi deliquiis. Eodem tempore factum utero contentum de sede excidisse, caputque exitui præsentasse creditum est ab obstetrice adstante, imo aquarum stilla quædam è matrice emanavit, cum interim nulla in orificio seu collo ejus interno dilatatio, aut aliud aliquod signum, unde de partu proximo contingeret, observaretur. Dolores colicos subsequantur motus convulsivi universales cum oculorum globi inversione prorsus horrida, visusque totali deperditione, ac abdominis montuosa tensione. Injecti sunt de novo clysteres, exhibiti pulveres ac julapii antepileptici & anodyni, imo tandem ad venæsectionem in malleolo inventum qua momento sane liberatum est cerebrum, restituta visio, ejusque organum spasmodice retrahi desinit, & evacuationes per alvum, prius duas dies cohibitz, ac remediis interim minime sollicitabiles, clysterio etiam benignissimo tum faciles fuere. Itaque sic ad parebat res in melius abire : at circa quartam vespertinam post multam materiam feculentiorē, glutiniorē ac foetidiorē per inferiora redditam, pulsus debilitatus est, imo prorsus suppressus, repetere convulsiones, dimanavit e, toto corpore frigidus sudor, extremæ quasi congelata refrigere, morique præcipitatur adveniens tot malis tunc impositus.

In cadavere totum abdomen maxime tumefactum vidimus, etiam si multæ evacuationes per sedem factæ fuissent. Interius Omenti vasa sanguinea prorsus varicosa reperta fuere. Venter vultior ac flatibus distentus, ut & Intestina interque ea præcipue Colon, aliis cæteroquin materiis vacua, Cæcum cum apophysi sua vermiculari omnino flaccidum, Jecur, Lien, Renes Pancreas, Mesenterium cum suis glandulis, intemerata omnia, bene colorata, ac julæ magnitudinis. Uterus vultior, de se ad primam, illamque levem punctiōem, seri flavescens particulis nigrioribus variegati, odorisque paululum ingrati libras circiter octo promebat. Fœtus, qui masculini erat sexus, cubabat super latere sinistro, caputque suum in orificium matricis, aliquatenus tum dilatatum profundius jam intruserat, ab omnibusque suis involucris liber, utero tamen non tantum per placentam, sed etiam quod varius est per magnam chorii partem firmius adhærebat.

Ex enarratis satis manifestum est dolores colicos in nostra ægra lethales, dispositionis aliquis inflammatoris, vel uteri, vel intestinorum, productionem minime fuisse, de qua sane, imo etiam de gangrenoli subsequente apud nos multa suspicio erat. Verum totum morbum potius convulsivum fuisse & in nervis, libris nervis, spiritibusque eorumdem vehiculo has par-

git. Ego in consilium adhibitus fracturam feliciter sanitati restitui.

Ante annos autem aliquot contusionem talem circa carpum ejusdem brachii ex calu quoque contraxerat, ut eo tempore manus veluti resoluta & impotens permaneret: portem. autem curatio tam feliciter successit, ut in nus penitus in integrum restituta fuerit. causam hujus sanationis hanc esse, mihi videtur: Primus affectus sive contusio carpi, cum ab imperito male curata esset, & imprimis plurima medicamenta refrigerantia applicata fuissent, materia quidam viscida inter ossa carpi remanserat, qua post fractum brachium, ab humore affluente veluti irrorata, emollita, & excoacta esset, postea medicamentorum emollientium & resolventium, à me summa, qua fieri potuit diligentia exhibitorum beneficio, resoluta & dissipata fuit. Quæ exitioria nobis videntur, frequenter commodum maximum afferunt.

Petrus Jacobi Amstelodamensis anno 1661. utriusque brachii laboraverat aliquandiu abscessibus, ulceribusque, circa articulationem humeri & ulnæ, Chirurgus, quo usus fuerat, ad veram eorum figuram, convenientemque usum haud attendens, non incurvata sed rigida ea reliquerat, unde ori aliquid his admove-
re impossibile ipsi.

Cura nostræ ubi subjectus, Fomenta varia, Cataplasmata, Emplastra, applicata, diversæ brachiorum fricationes, extensionesque institutæ, ast nihil hæc omnia effecerunt, nec humor glutinosus articulos fere accedens, nec musculus articularis, articulo motui dicatus, ullo modo resolvi potuit, ut mobilitas aliqua adferretur membris dictis.

Cibum ori admove- quod haud valeret, cochlear ipsi parari curavimus similiter az cultum excedentis longitudinis. Quid sit, panis dissecti particulam cultri apici impositam ori admove- laborans, ea privatur, procidens enim in terram à cane præsentente aufertur, iratus ille pedibus percutere canem dum laborat, innumum prolabitur, hoc ubi sit, eo quod brachiorum uno resistentiam pavimenti lapidei perciperet, soluta materia ad dictum articulum huculque detenta, & quod hactenus rigidum immobileque fuerat membrum, ex improvise mobilitatem debitam acquisivit, sic ut eo ad modum pristinum ubi potuerit.

Joh. Henrici Wolvegad, bajulus, ex violentia externa pedis utriusque fracturam non solum, sed omnimodam comminutionem contraxerat. Hujus curatio nobis committitur, quæ etiam ex voto successit. Ex lecto surgens, non modo fracturam dictam curatam notavit, sed & herniam intestinalem inveteratam, ad eam tamen curationem nihil à nobis adhibi-
tum.

Plura huc facientia qui desiderat, quomodo nempe ex incommodis commoda producta, adeat Fabr. Hildanum part. 1. obs. 29. & part. 2. obs. 8. Job. à Meckren in Observationibus Medico-Chirurgicis.

De Synovia,

Synovia nihil aliud est quam liquor chylosus nutritius, in parte vulnerata degenerans in li-

quorem saniosum & aquosum, sub qua degeneratione acorem occultum contrahit, & exinde vulnera istarum partium insigniter contumacia ac simul periculosa fuit: partes vero istæ interea, dum desuntur convenienti nutrimento, necessario atehunt. Unde fibræ exsiccant & contractæ poros partis internos angustant, eosque connivere, seu quasi subsidere faciunt. Itaque sanato licet vulnere nihilominus tamen difficillime & tardissime pars denuo nutriripotest, quin potius lapsius pertinax aut contumax aridura sequatur. Quin & cum debilitata dicto modo pars minus robusta sit, atque alia ipsi respondens, (id quod robur iniquale vocat. Helmont.) propterea facilius ac sensibilis fere externorum objectorum in pressionem recipit, unde tales ægri restituti licet, tamen qualvis aeris mutationes in loco antea læso mox præsentunt.

Ut autem hæc Synovia, periculosum sane vulnerrum in partibus tendinosis articulationum symptoma conspiciatur.

℞. Ostrearum, nempe testarum. ʒi. cranii adulti, ossis sepiæ, mandib. lucii piscis calcinat. an. ʒii. spodi terre sigill. an. ʒiij. quæ multa inspergantur: Sic nantque cito evanescat synovia.

Optimum quoque est unguent. fusc. Wurtzii, quia tamen præparatio est laboriosa, & propterea difficulter potest parari.

℞. loco ejus vitriolum tories calcinatum spir. vitæ dulc. speciatim ex vitriol. mart. & dicto modo cum hoc procedatur atque vult Auctor; nempe inmittantur in acetum destill. quoddam vulnerrum, & ita addatur mel, flores aris, sicque porro misceantur.

Vel ℞. Unguent. Egyptiac. simplex, & adde terram vitriolatam Dulcem in aceto destillato dicto permixtam quantum postulat ingredientium proportio, hoc potest esse loco unguenti fusc. Wurtzii, & unguent. Egyptiac. magister compos.

Alias singulare experimentum est si sterco porcino cum sanguine vulneris invicem mistum coquatur, & ita vulnere externe applicetur instar cataplasmatidis: hoc enim compescit synoviam.

Quin & linteam sanguine primo menstruo virginis tinctum humidum sive siccum applicatum certissimum habetur remedium ad compescendam synoviam. Polychr. sive est si velletur aq. ex cancr. humatilib. contusis: hæc enim cum linteis duplicatis imposita, non tantum synoviam sistit, sed præterea omnes inflammationes, erysipelata, dolores partium vulneratarum; ac NB. quod cancri humatiles multum prosunt in casibus Chirurgicis. Michael Emmulterus Collegii Practici parte 2. cap. 1. Item in Chirurgia Medica.

De Synovia r'ne sectionem infantiam in brachio factam subsequente.

Victori nostri oppidi Barbarossæ venam medianam Balneario scalpello vehementiori cum calitro adacto pertuderat, tendine musculi bicipitis subjacente simul læso, quod ipsum fieri ab

005635863





